

## **Вопросы с вариантами ответов по специальности «Сестринское дело (бакалавриат)» для аккредитации**

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:

<https://medik-otvet.ru/product/sestrinskoe-delo-bakalavriat/>

### **ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕМ СРЕДСТВЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ РАСЧЕТ ПРОВОДИТСЯ ПО**

- 1) количеству инструментария, помещающегося в контейнер
- 2) сроку годности дезинфицирующего средства
- 3) частоте использования контейнеров
- 4) площади многоразовых контейнеров

### **ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНА ПРИ**

- 1) гестационном диабете
- 2) сахарном диабете 1 типа
- 3) вторичной резистентности к пероральным препаратам
- 4) гипогликемических состояниях

### **НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ И ОПЕРАЦИЙ С НЕПОЛНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА, ПОВЛЕКШИМИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ТРУДА, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) V
- 2) III
- 3) I
- 4) IV

### **ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ СИНУСИТА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) отсутствие носового дыхания, выделения из носа гнойно-кровянистые с запахом
- 2) припухлость щеки, боли и увеличение лимфатических узлов шеи
- 3) затруднение носового дыхания, насморк, лицевые боли и снижение обоняния
- 4) затрудненное болезненное дыхание через нос, кашель и чихание

### **ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ С ТРАВМОЙ ЖИВОТА, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ВЫПАДЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, НЕОБХОДИМО**

- 1) попытаться вправить выпавшие органы
- 2) накрыть выпавшие органы влажной, чистой тканью
- 3) приложить холод к выпавшим органам

4) дать пострадавшему обезболивающее

**НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ОСТРОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (ОРВИ) У НОВОРОЖ**

- 1) бронхит
- 2) ларингит
- 3) бронхиолит
- 4) трахеит

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) обезвреживание – утилизацию
- 2) дезинфекцию–предстерилизационную очистку– стерилизацию
- 3) дезинфекцию -стерилизацию
- 4) предстерилизационную очистку – стерилизацию - утилизацию

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ТРЕТЬЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ДЕТЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ГРУППАМ РИСКА, ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 5
- 2) 10
- 3) 6
- 4) 2

**СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАССОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ СОСТАВЛЯЮТ**

- 1) способы расчета статистических данных
- 2) категории и понятия статистики
- 3) статистическую методологию
- 4) методы изучения динамики явлений

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В СПИРТСОДЕРЖАЩИХ АНТИСЕПТИКАХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА, ПАЛАТЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, РЕАНИМАЦИИ ПЕРЕД ИНЪЕКЦИЯМИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) среднее число инъекций в сутки
- 2) количество антисептика для обработки инъекционного поля
- 3) количество инъекций за год
- 4) минимальное количество инъекций в сутки

**В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПЕРВОМ ПРОХОЖДЕНИИ ОСМОТРА И ДАЛЕЕ В ВОЗРАСТЕ \_\_\_\_\_ ЛЕТ И СТАРШЕ 1 РАЗ В (ГОДАХ)**

- 1) 25; 3
- 2) 30; 2

3) 40; 1

4) 55; 1

### **СУХОСТЬ КОЖИ, КОЖНЫЙ ЗУД, ЖАЖДА И ПОЛИУРИЯ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ**

- 1) эндемическом зобе
- 2) диффузном токсическом зобе
- 3) сахарном диабете
- 4) гипотиреозе

### **МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА**

- 1) КТ височных костей
- 2) отоскопия
- 3) акустическая импедансометрия
- 4) акуметрия

### **ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ, СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ, ПЕРВАЯ ДОЗА АНТИБИОТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВВЕДЕНА МАКСИМАЛЬНО РАНО, НЕ ПОЗЖЕ ПЕРВЫХ 4 ЧАСОВ, Т.К. ЭТО**

- 1) уменьшает частоту госпитализаций
- 2) увеличивает выживаемость и снижает летальность
- 3) сокращает расходы на лечение
- 4) сокращает длительность стационарного лечения

### **ДЛЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ХАРАКТЕРНО**

- 1) умственная деградация
- 2) параличи конечностей
- 3) нарушение координации
- 4) тремор кистей

### **ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКУ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) письменное заявление работника
- 2) ходатайство непосредственного руководителя
- 3) ходатайство выборного органа первичной профсоюзной организации
- 4) устное обращение работника

### **СУБЪЕКТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) территориальный фонд обязательного медицинского страхования
- 2) страховая медицинская организация
- 3) страхователь
- 4) медицинская организация

### **ГРАФИК РАБОТЫ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА УТВЕРЖДАЕТСЯ**

- 1) заведующим структурным подразделением
- 2) старшей медицинской сестрой

- 3) главной медицинской сестрой
- 4) главным врачом

### **ВРЕМЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ**

- 1) 1-2 минуты
- 2) 3–6 минут
- 3) более 20 минут
- 4) 10-12 минут

### **К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СИНЕГО ТИПА ОТНОСИТСЯ**

- 1) дефект межжелудочковой перегородки
- 2) тетрада Фалло
- 3) открытый атриовентрикулярный канал
- 4) дефект межпредсердной перегородки

### **ЕСЛИ ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ ИМЕЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ АРТЕРИИ, ТО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЕТСЯ**

- 1) после проведения обезболивания для избежания травматического шока
- 2) в первую очередь
- 3) в порядке, обусловленном силой кровотока
- 4) после применения холода для уменьшения кровопотери

### **ДЛЯ ХОБЛ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ (GOLD) ХАРАКТЕРНО ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 (%)**

- 1) 30-50
- 2) > 80
- 3) 50-80
- 4) < 30

### **САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБСЛУЖИВАТЬ СЕБЯ, ХОДИТЬ ПО КОРИДОРУ, ПОДНИМАТЬСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ МОЖЕТ БОЛЬНОЙ НА РЕЖИМЕ**

- 1) общем
- 2) постельном
- 3) палатном
- 4) строгом постельном

### **ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НЕПРИЖИГАЮЩИМИ ЯДАМИ МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗОВАЯ ПОРЦИЯ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (В ЛИТРАХ)**

- 1) 1,3-1,5
- 2) 12-15
- 3) 0,3-0,5
- 4) 0,1-0,2

### **ВРАЧЕБНУЮ КОМИССИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ВРАЧ**

- 1) специалист, прошедший повышение квалификации по специальности «терапии»
- 2) терапевт
- 3) профпатолог
- 4) невролог, прошедший повышение квалификации по специальности «профпатология»

**МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ В \_\_\_\_\_ ФОРМЕ**

- 1) устной
- 2) письменной
- 3) электронной
- 4) нотариально заверенной

**ДС-М-АНАТОКСИН ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ**

- 1) ревакцинации детей, имеющих аллергические реакции
- 2) вакцинации детей, имеющих противопоказания к введению АКДС-вакцины
- 3) ревакцинации детей 7 лет, 14 лет и взрослых без ограничения возраста каждые 10 лет
- 4) профилактики дифтерии у детей до шести лет, ранее не привитым против дифтерии и столбняка

**ОРИЕНТИРАМИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ГРУДНОГО РЕБЕНКА СЗАДИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) затылочные бугры
- 2) область ниже затылочных бугров
- 3) область над затылочными буграми
- 4) теменные бугры

**ПОЯВЛЕНИЕ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОБИЛЬНОЙ ПЕНИСТОЙ РОЗОВОЙ МОКРОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ**

- 1) крупозной пневмонии
- 2) легочного кровотечения
- 3) бронхиальной астмы
- 4) отека легких

**МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОСТОЯНИЯХ, ОБОСТРЕНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) плановой
- 2) реабилитационной
- 3) неотложной
- 4) экстренной

**ПРИ ОБМОРОКЕ АД У РЕБЕНКА**

- 1) не изменяется

- 2) резко снижается
- 3) снижается постепенно в течении нескольких часов
- 4) резко повышается на несколько минут

**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ РАБОТНИКАМИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ ИНСТРУКТАЖ**

- 1) внеплановый
- 2) первичный
- 3) повторный
- 4) вводный

**ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КРУПНЫХ БРОНХОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кашель без выделения мокроты
- 2) кашель с мокротой
- 3) повышение температуры тела
- 4) одышка инспираторного характера

**ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ ПРОВОДЯТ**

- 1) урографию
- 2) цистоскопию
- 3) ультразвуковое исследование органов брюшной полости
- 4) лапороскопию

**ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ НА ЭТАПЕ ЗАБОРА КРОВИ**

- 1) длительное наложение жгута
- 2) кратковременное (до 60 с) наложение жгута
- 3) забора крови в вакуумные системы
- 4) забор крови самотеком

**НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД РЕКТОРОМАНОСКОПИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ПАЦИЕНТ**

- 1) опорожняет мочевого пузырь
- 2) выпивает 2 литра жидкости
- 3) выпивает бариевую взвесь
- 4) чистит зубы

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ**

- 1) специальной подгруппе «А»
- 2) подготовительной
- 3) основной
- 4) специальной подгруппе «Б»

**ВНЕЗАПНОЕ НАЧАЛО, ОЗНОБ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ВОЗБУЖДЕНИЕ, РИГИДНОСТЬ ЗАТЫЛОЧНЫХ МЫШЦ, СУДОРОГИ, ЛЕЙКОЦИТОЗ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) парагриппа
- 2) острого гломерулонефрита
- 3) гриппа
- 4) менингита

**ПРИ ОСТРОМ ИНФЕКЦИОННОМ ГЕПАТИТЕ ЭХОГЕННОСТЬ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ**

- 1) повышенная
- 2) пониженная
- 3) нормальная
- 4) средней интенсивности

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пожелание родственников ребенка
- 2) установление или уточнение диагноза заболевания (состояния)
- 3) отсутствие стойкой компенсации физиологических функций или стойкой ремиссии хронического заболевания (состояния)
- 4) достижение стойкой компенсации физиологических функций

**ОСЛОЖНЕНИЕ ГИПЕРТОНического КРИЗА**

- 1) порок сердца
- 2) бронхиальная астма
- 3) перикардит
- 4) острое нарушение мозгового кровообращения

**ДЛЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) химическую вакцину
- 2) бактериофаг
- 3) анатоксин
- 4) живую вакцину

**ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УПАВШЕМУ С ВЫСОТЫ ЧЕЛОВЕКУ, ПОЛУЧИВШЕМУ ССАДИНЫ НА ЛИЦЕ, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КРОВОПОДТЕКИ ПО ВСЕМУ ТЕЛУ, С РАЗОРВАННОЙ В ОБЛАСТИ БЕДРА ОДЕЖДОЙ, НАЛИЧИЕМ КРОВОТЕЧЕНИЯ ОБИЛЬНОЙ СТРУЕЙ ТЕМНО-ВИШНЕВОГО ЦВЕТА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НЕОБХОДИМО**

- 1) обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи
- 2) остановить кровотечение путем прямого давления на рану и наложения давящей повязки
- 3) обработать ссадины антисептическим раствором
- 4) вызвать скорую медицинскую помощь

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР**

### **НАНОСЯТ НА СТЕНЫ ПУТЕМ ОРОШЕНИЯ ИЛИ ИХ ПРОТИРАНИЯ НА ВЫСОТУ**

- 1) на всю высоту стен
- 2) на высоту роста проводящего уборку
- 3) не менее 2 метров
- 4) 1,5 метра

### **ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НА 1<sup>0</sup> С ПРОИСХОДИТ УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА НА \_\_\_\_ УД. В МИН.**

- 1) 8-10
- 2) 2-8
- 3) 1-3
- 4) 20-30

### **В КАБИНЕТЕ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ХРАНИТСЯ**

- 1) статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (форма № 025-2/у)
- 2) сертификат профилактических прививок (форма № 156/у-93)
- 3) история развития ребёнка (форма № 112/у)
- 4) карта профилактических прививок (форма № 063/у)

### **БОЛЕЕ ЧАСТОЕ РАЗВИТИЕ ГНОЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В КОЛОТЫХ РАНАХ ОБЪЯСНЯЕТСЯ МАЛЫМ ВХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ И**

- 1) линейной формой раневого канала
- 2) возможными некрозами кожных лоскутов
- 3) инородными телами в ране
- 4) извитым раневым каналом

### **КОЛОНОСКОПИЮ ПРОВОДЯТ НА \_\_\_\_\_ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**

- 1) четвертом
- 2) первом
- 3) втором
- 4) третьем

### **ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ?**

- 1) некроз гепатоцитов
- 2) цитолитический синдром
- 3) появление признаков инфекционно-токсического шока
- 4) развитие почечной недостаточности

### **РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ СОСТАВЛЯЕТ (ДЕНЬ)**

- 1) 7-14



- 2) 30-35
- 3) 21-30
- 4) 14-21

**ТЕРМИН «ПРОТЕИНУРИЯ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ В МОЧЕ**

- 1) глюкозы
- 2) лейкоцитов
- 3) белка
- 4) эритроцитов

**ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИГОТОВИТ**

- 1) 5% раствор глюкозы
- 2) раствор Рингера
- 3) 40% раствор глюкозы
- 4) инсулин короткого действия, физиологический раствор

**ДИНАМИЧЕСКИЙ РЯД ОТРАЖАЕТ**

- 1) результаты измерений в определенный временной период
- 2) качественные признаки
- 3) значение статистических показателей
- 4) результаты исследований в разных регионах

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕМОГРАММЕ ПРИ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- 1) СОЭ в норме
- 2) лейкомоидной реакцией
- 3) нейтрофильным лейкоцитозом
- 4) лейкопенией

**КРАТНОСТЬ ПЕРВОЙ РЕВАКЦИНАЦИИ АДС-АНАТОКСИНОМ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ РАЗ**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**ПО КЛАССИФИКАЦИИ ХРОНИЧЕСКИЕ ГЕПАТИТЫ БЫВАЮТ**

- 1) алиментарные
- 2) системные
- 3) травматические
- 4) инфекционные

**ПЕРВИЧНОЙ (ИНДИВИДУАЛЬНОЙ) ТАРОЙ ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ ОБЪЕМОМ 5 МЛ МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) металлический пенал
- 2) ампула из стекла

- 3) банка
- 4) флакон

**В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 7 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) ПРОВОДЯТ**

- 1) иммунодиагностику с применением аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми единицами очищенного туберкулина в стандартном разведении
- 2) флюорографию легких или рентгенографию органов грудной клетки (легких)
- 3) исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии
- 4) компьютерную томографию

**МАКСИМАЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_ ЧАС(А), ПЕРЕРЫВ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_ МИНУТ НА 1-2 МИНУТЫ**

- 1) 1,5; 10
- 2) 0,5; 15
- 3) 1; 30
- 4) 2,5; 20

**ИНТЕРАКТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) познанием друг друга
- 2) установлением взаимопонимания
- 3) восприятием друг друга
- 4) организацией взаимодействия

**ГИПЕРСПЛЕНИЗМ ВСТРЕЧАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ**

- 1) амилоидозом
- 2) желчнокаменной болезнью
- 3) циррозом печени
- 4) острым лейкозом

**РОЛЬ МАРКИРОВКИ В СОХРАНЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО**

- 1) приведено название нормативного документа
- 2) указан регистрационный номер товара
- 3) изображено назначение товара в виде рисунка
- 4) указаны правила и сроки хранения товара

**ДЛЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) бактериофаг
- 2) анатоксин
- 3) живую вакцину
- 4) химическую вакцину

### **ПОД КОММУНИКАЦИЕЙ ПОНИМАЮТ ПРОЦЕСС**

- 1) взаимодействия двух или более людей в процессе выполнения трудовой деятельности
- 2) передачи осмысленной информации, ее эмоционального и интеллектуального содержания от отправителя к получателю
- 3) восприятия и понимания коммуникаторами друг друга в процессе общения
- 4) взаимодействия двух или более людей в процессе решения совместных творческих задач

### **КУРС ВАКЦИНАЦИИ АДС-АНАТОКСИНОМ СОСТОИТ ИЗ \_\_\_\_\_ ПРИВИВОК С ИНТЕРВАЛОМ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 4; 90
- 2) 5; 120
- 3) 3; 60
- 4) 2; 45

### **ГРЕЛКА НЕОБХОДИМА ПОСЛЕ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ**

- 1) масляного раствора
- 2) водного раствора
- 3) вакцины
- 4) триггера

### **МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРОЯТНОСТЬ БЕЗОШИБОЧНОГО ПРОГНОЗА РАВНАЯ (В ПРОЦЕНТАХ)**

- 1) 95
- 2) 90
- 3) 68
- 4) 50

### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

- 1) обработка участков кожи раствором перманганата калия
- 2) массаж, туалет кожи, неподвижное положение больного
- 3) массаж, туалет кожи, изменение положения тела
- 4) массаж, туалет кожи, вынужденное положение

### **УЧЕТНАЯ ФОРМА «КАРТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО» ИМЕЕТ КОД**

- 1) ф 080-Д/у
- 2) ф 030
- 3) ф 033-Д/у
- 4) ф 030-ПО/у-17

### **КОРЬЕВАЯ ВАКЦИНА СОДЕРЖИТ**

- 1) инактивированный вирус кори

- 2) инактивированный вакцинный штамм вируса кори
- 3) живой вакцинный штамм вируса кори
- 4) живой вирус кори

### **К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) снижение памяти, запоры
- 2) сухой кашель, одышка
- 3) отёки, боли в пояснице
- 4) жажда, кожный зуд

### **ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ, СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_%ОТ \_\_\_\_\_**

- 1) 5; каждого наименования изделий, обработанных за смену
- 2) 2; каждого наименования изделий, обработанных за смену
- 3) 1; одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц
- 4) 3; одновременно обработанных изделий каждого наименования

### **НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИНЯТЫЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОТ РОДСТВЕННИКОВ УМЕРШИХ БОЛЬНЫХ, ПОДЛЕЖАТ**

- 1) передаче другому пациенту
- 2) уничтожению
- 3) отправке на экспертизу физико-химических свойств
- 4) возврату в аптечную организацию

### **ПРИ ПРИЁМЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА КОНЕЧНОЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЛЕВОМ ЖЕЛУДОЧКЕ**

- 1) понижается
- 2) повышается, затем резко снижается
- 3) не меняется
- 4) повышается

### **УКАЖИТЕ СИНДРОМ, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ РЕФЛЕКС КЕРНИГА**

- 1) менингеальный
- 2) пирамидный
- 3) экстрапирамидный
- 4) натяжения нервных стволов

### **ПОКАЗАТЕЛЬ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА ПРИ ЗНАЧЕНИИ**

- 1) 15,0 кг/м<sup>2</sup> -16,9 кг/м<sup>2</sup>
- 2) 25,0 кг/м<sup>2</sup> -29,9 кг/м<sup>2</sup>
- 3) 30,0 кг/м<sup>2</sup> -34,9 кг/м<sup>2</sup>

4) 18,5 кг/м<sup>2</sup> -24,9 кг/м<sup>2</sup>

**ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ КРОВИ НА СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) обработку 1% раствором протаргола
- 2) промывание водой или борной кислоты
- 3) промывание водой с мылом
- 4) обработку слизистых иммуноглобулином

**ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С**

- 1) табелем учета рабочего времени
- 2) графиком отпусков
- 3) планом отпусков
- 4) графиком работы

**ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ БОЛЕЕ ДВУХ ЧАСОВ**

- 1) положить в холодильник дополнительные хладоэлементы
- 2) иммунобиологические лекарственные препараты необходимо переместить в термоконтейнер
- 3) положить вакцины в холодильник на пищеблоке
- 4) не открывать холодильник до устранения неисправности

**ДЛЯ МИКОПЛАЗМЕННОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРНО ВЫЯВЛЕНИЕ**

- 1) грубого «лающего» кашля
- 2) асимметрии хрипов в легких
- 3) нормальной температуры тела
- 4) притупления перкуторного звука

**БОЛЬНОМУ С КЛИНИКОЙ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ПОКАЗАНА**

- 1) госпитализация в инфекционное отделение
- 2) госпитализация в терапевтическое отделение
- 3) лечение амбулаторно
- 4) лечение в условиях дневного стационара

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ, АССОЦИИРОВАННОМ С HELICOBACTER PYLORI, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) В12-дефицитная анемия
- 2) базальная секреция с рН выше 2,5
- 3) локализация процесса в теле желудка
- 4) эрозивный антральный гастрит

**ТРЕБОВАНИЯ, КОНКРЕТИЗИРУЮЩИЕ И УТОЧНЯЮЩИЕ СТАТУС СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ, В ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ РАСПОЛАГАЮТСЯ В РАЗДЕЛЕ**

- 1) ответственность
- 2) должностные обязанности
- 3) общие положения
- 4) права

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ О ПОЛНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ЗА**

- 1) просроченные медикаменты
- 2) порчу имущества при заливе производственных помещений
- 3) медицинские изделия с браком
- 4) недостачу вверенного имущества

**ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ХРОНИЧЕСКОГО БЕСКАМЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА В ФАЗЕ ОБОСТРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) болезненность при пальпации в правом подреберье
- 2) болезненность в зоне Шоффара
- 3) положительный симптом Пастернацкого
- 4) болезненность при перкуссии в эпигастрии

**УЧЕТНАЯ ФОРМА МЕДИЦИНСКОГО ДОКУМЕНТА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТИМЕЕТ КОД**

- 1) 003/У
- 2) 025-ЦЗ/У
- 3) 025/У
- 4) 004/У

**ВРЕМЕННЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В НЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дисбактериоз
- 2) синдром дыхательных расстройств
- 3) острое инфекционное заболевание
- 4) недоношенность III степени

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЕТОЛОГИЯ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ У ПРЕТЕНДЕНТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) акушерское дело
- 2) медико-профилактическое дело
- 3) лабораторная диагностика
- 4) организация сестринского дела

**ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА, ПРОТЕКАЮЩЕГО С**

### **ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ МЕЛКИХ БРОНХОВ,**

- 1) кашель с мокротой
- 2) одышка
- 3) кашель без выделения мокроты
- 4) повышение температуры тела

### **ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОТХОДОВ КЛАССА Б НА МЕСТЕ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВРЕМЕННАЯ МЕРА ПРИ ОТСУТСТВИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

- 1) участка обращения с медицинскими отходами
- 2) централизованной канализации
- 3) установок для обеззараживания физическим методом
- 4) установок термического обезвреживания

### **РЕБЕНОК 4-Х МЕСЯЦЕВ ДОЛЖЕН УМЕТЬ**

- 1) переворачиваться с живота на спину
- 2) в положении на животе поднимать голову и верхнюю часть туловища
- 3) ползать
- 4) самостоятельно садиться

### **ДРЕНАЖНЫЕ ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЛУЧШАЮТ**

- 1) дыхательную поверхность
- 2) лимфоток
- 3) кровообращение
- 4) отток патологического содержимого из бронхов и альвеол

### **ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В СЕМЬЕ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) серологическое обследование на менингококк членов семьи
- 2) люмбальная пункция всех членов семьи
- 3) бактериологическое обследование всех контактных с семьей за последний месяц
- 4) бактериологическое обследование членов семьи на менингококк

### **ВДОХИ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ**

- 1) соблюдении максимально возможной скорости вдувания
- 2) обеспечении восстановления проходимости дыхательных путей
- 3) обеспечении очистки полости рта пальцами
- 4) соблюдении максимально возможного объема вдувания

### **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ ИЗ КИСЛОРОДНОЙ ПОДУШКИ МУНДШТУК НАДО ОБЕРНУТЬ**

- 1) салфеткой, смоченной этиловым спиртом
- 2) полиэтиленом
- 3) сухой салфеткой
- 4) влажной салфеткой

**ЗДОРОВЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ИМЕЮЩИХ НОРМАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, БЕЗ АНАТОМИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) II
- 2) III
- 3) I
- 4) IV

**В ОБЩЕНИИ С КОЛЛЕГАМИ, РУКОВОДСТВОМ МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ СЛЕДУЕТ**

- 1) демонстрировать свое превосходство
- 2) идти на конфронтацию
- 3) держать дистанцию
- 4) соблюдать субординацию

**МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА НАСТУПАЕТ**

- 1) когда, несмотря на все предпринятые меры, работнику не удалось сохранить вверенное имущество
- 2) за ущерб, причиненный работником медицинской организации в результате виновного противоправного поведения
- 3) при крайней необходимости
- 4) по вине работодателя, который не обеспечил сотрудникам надлежащие условия для хранения подотчетных ценностей

**ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОСТОЯННОГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ И ОБРАТНО, НАПРИМЕР, К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ДОМОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ МИГРАЦИЕЙ**

- 1) сезонной
- 2) безвозвратной
- 3) маятниковой
- 4) временной

**ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СОСТОИТ В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ**

- 1) заболеваний, требующих психолого-педагогического сопровождения
- 2) ранних стадий заболеваний, препятствующих занятиям физкультурой и спортом
- 3) патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития
- 4) ранних стадий заболеваний, препятствующих отдыху в оздоровительном лагере

**ОСНОВНЫМ ЭТАПОМ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) профилактический
- 2) стационарный



- 3) диспансерно-поликлинический
- 4) санаторно-курортный

### **РАЗВИТИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА СПОСОБСТВУЕТ**

- 1) генетическая предрасположенность
- 2) ожирение
- 3) использование системных глюкокортикостероидов
- 4) хроническая сердечная недостаточность

### **СТАРТОВАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПНЕВМОНИИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) оральные цефалоспорины II поколения
- 2) макролиды нового поколения
- 3) аминогликозиды
- 4) фторхинолоны

### **К ЗАНОСУ ИНФЕКЦИИ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОТНОСИТСЯ СЛУЧАЙ**

- 1) инфекции мочевыводящих путей, присоединившейся через 1 сутки после катетеризации мочевого пузыря
- 2) синегнойной инфекции области хирургического вмешательства, диагностированной у пациента через 7 дней после операции
- 3) острого вирусного гепатита В, диагностированного через 3 дня после поступления пациента в отделение кишечных инфекций
- 4) пневмонии у пациента отделения реанимации и интенсивной терапии, присоединившейся через 72 часа после искусственной вентиляции лёгких

### **СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОКЛЮША НАЧИНАЮТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 9
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 8

### **МЕТОДОМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) динамическая сцинтиграфия почек
- 2) изотопная рентгенография почек
- 3) исследование суточной микроальбуминурии
- 4) УЗИ почек

### **ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРОБНОГО ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лицо, шея, грудная клетка, спина, голова, живот, таз, конечности
- 2) голова, шея, грудная клетка, спина, живот, таз, конечности
- 3) голова, грудная клетка, спина, живот, конечности
- 4) грудная клетка, спина, голова, шея, живот, таз, конечности

**ИММУННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ НА ОСНОВЕ АНТИГЕНОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) анатоксины
- 2) вакцины
- 3) антибиотики
- 4) сыворотки

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ В РАЦИОН ПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЛАКОВ, СОДЕРЖАЩИЕ**

- 1) микроэлементы
- 2) растительную клетчатку
- 3) витамины группы В
- 4) углеводы

**ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ СОСТАВЛЯЕТ (ЧАС)**

- 1) 1
- 2) 0,5
- 3) 5
- 4) 1,5

**ПРИЗНАКОМ РАЗРЕШЕНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ ПРИ КАШЛЕ \_\_\_\_\_ МОКРОТЫ**

- 1) стекловидной вязкой
- 2) обильной жидкой
- 3) «ржавой»
- 4) пенистой

**ГРАЖДАНИНУ С УКУСОМ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ, ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ НАПАДЕНИЯ БРОДЯЧЕЙ СОБАКИ 3 ДНЯ НАЗАД, С НЕИЗВЕСТНЫМ ПРИВИВОЧНЫМ АНАМНЕЗОМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**

- 1) назначить прививки против бешенства, прививки против столбняка не назначать, рану не обрабатывать в течение первых суток после укуса
- 2) назначить прививки против столбняка, прививки против бешенства не назначать, рану не обрабатывать в течение первых суток после укуса
- 3) обработку раны, прививки против бешенства и столбняка не назначать
- 4) обработку раны и назначить прививки против бешенства и столбняка

**МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССА Б ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твёрдым бытовым отходам
- 2) эпидемиологически опасные отходы
- 3) токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности
- 4) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы

## **ЧИСЛЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ПАЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР БОЛЬНИЦ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ**

- 1) расчета на один круглосуточный пост в зависимости от двух- или трехсменной системы обслуживания
- 2) сложившейся практики
- 3) численности лечащих врачей отделения
- 4) определения трудоемкости сестринского ухода с учетом фактического числа пролеченных больных

## **ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕМОГРАММЕ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- 1) лейкопенией
- 2) нейтрофильным лейкоцитозом
- 3) лейкомоидной реакцией
- 4) СОЭ в норме

## **ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) введение газоотводной трубки
- 2) проведение промывания желудка
- 3) проведение очистительной клизмы и ограничение пищевого режима
- 4) рекомендации пациенту к отказу от курения перед исследованием

## **НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ НЕОТЛОЖНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ РАЗВИТИИ КЛИНИЧЕСКИ ВЫРАЖЕННОЙ ГИПЕРКАПНИИ У БОЛЬНОГО В АСТМАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) перевод на искусственную вентиляцию легких
- 2) усиление регидратационной терапии
- 3) назначение дыхательных аналептиков
- 4) назначение гидрокарбоната натрия в/в

## **НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта
- 2) ультразвуковое исследование поджелудочной железы
- 3) определение уровня ферментов поджелудочной железы в крови
- 4) копрограмма

## **ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ**

- 1) гепатита
- 2) синдрома Жильбера
- 3) дискинезии желчевыводящих путей
- 4) каротинемии

**ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРЕХМЕСЯЧНОГО ЗАПАСА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ КАТЕГОРИИ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 4

**РЕБЕНОК ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ, ГОВОРIT ОКОЛО 10 СЛОВ, НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ ЗАПРЕТ, ПРИУЧАЕТСЯ К НАВЫКАМ ОПРЯТНОСТИ В ВОЗРАСТЕ**

- 1) 1 год 6 месяцев
- 2) 1 год 9 месяцев
- 3) 9 месяцев
- 4) 12 месяцев

**ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ПЛЕЧЕВУЮ АРТЕРИЮ ПРИЖИМАЮТ К**

- 1) головке плечевой кости
- 2) большому бугорку плечевой кости
- 3) внутренней поверхности плечевой кости
- 4) внутреннему краю двуглавой мышцы

**ДИАГНОЗ «СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ» СТАВЯТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ У ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ**

- 1) выраженной деформации пальцев
- 2) снижения чувствительности в области стоп
- 3) сухости кожных покровов стоп
- 4) язвенного дефекта подошвы стопы и сенсорно-моторной нейропатии

**ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРОВАНИИ ИССЛЕДУЕТСЯ**

- 1) сок двенадцатиперстной кишки
- 2) сок поджелудочной железы
- 3) желчь
- 4) желудочный сок

**РЕБЕНОК 4-Х МЕСЯЦЕВ ДОЛЖЕН УМЕТЬ**

- 1) самостоятельно садиться
- 2) ползать
- 3) переворачиваться с живота на спину
- 4) в положении на животе поднимать голову и верхнюю часть туловища

**ГЛЮКОЗУРИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- 1) пиелонефрита
- 2) избытка глюкозы в пище
- 3) несахарного диабета

4) сахарного диабета

**ГРАЖДАН, У КОТОРЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) IIIб
- 2) II
- 3) I
- 4) IIIa

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА НА НАЛИЧИЕ ЛЕГИОНЕЛЛ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) по показаниям
- 2) 1 раз в месяц
- 3) 2 раза в год
- 4) ежеквартально

**КОМПЕНСАЦИЯ - ЭТО СПОСОБНОСТЬ К ВОЗМЕЩЕНИЮ УТРАЧЕННОЙ ФУНКЦИИ ЗА СЧЕТ**

- 1) трансплантации
- 2) улучшения микроциркуляции
- 3) полноценной заместительной терапии
- 4) усиления деятельности поврежденного органа или других органов

**ЛЕГКАЯ ИНТЕРМИТИРУЮЩАЯ СТЕПЕНЬ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПРИСТУПОВ**

- 1) менее 1 раза в неделю
- 2) менее 1 раза в месяц
- 3) не чаще 1-2 раза в неделю
- 4) приступы не возникают

**«ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ» ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ \_\_\_\_\_ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ**

- 1) производства
- 2) транспортировки
- 3) введения
- 4) маркировки

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВЫСТУПАЕТ**

- 1) внутрипеченочный блок при жировом гепатозе
- 2) внепеченочный блок в результате тромбоза селезеночной вены
- 3) внутрипеченочный блок при циррозе печени
- 4) синдром Бадда-Киари

## **ЛЁГочной клинИко-рентгенологической формой бактериальной деструктивной пневмонии является**

- 1) пиоторакс
- 2) булла
- 3) пиопневмоторакс
- 4) пневмоторакс

## **При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится**

- 1) по усмотрению работодателя
- 2) накануне этого дня
- 3) после этого дня
- 4) по усмотрению выборного органа первичной профсоюзной организации

## **Артериальная гипертензия при феохромоцитоме обусловлена**

- 1) повышением образования ангиотензина
- 2) повышением секреции ренина
- 3) повышением секреции катехоламинов
- 4) избыточной секрецией минералокортикоидов

## **За работу в условиях с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда устанавливаются**

- 1) надбавки к должностному окладу
- 2) повышение окладов
- 3) стимулирующие выплаты
- 4) компенсационные выплаты

## **Учетным документом для регистрации диспансерного больного является**

- 1) контрольная карта диспансерного наблюдения
- 2) карта ежегодной диспансеризации
- 3) статистический талон
- 4) амбулаторная карта

## **Иммобилизация верхней конечности при переломе костей предплечья в нижней трети производится**

- 1) гипсовой повязкой от лучезапястного до локтевого суставов
- 2) гипсовой повязкой от лучезапястного сустава до средней трети плеча
- 3) гипсовой лонгетой от пястно-фаланговых суставов до средней трети плеча
- 4) циркулярной гипсовой повязкой от лучезапястного до локтевого суставов

## **На втором этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения проводится**

- 1) краткое индивидуальное профилактическое консультирование
- 2) общий анализ крови

- 3) анкетирование
- 4) осмотр врачом-хирургом

**СООТНОШЕНИЕ ЧАСТОТЫ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ К ВДОХАМ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ДВУМЯ СПАСАТЕЛЯМИ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 5:1
- 2) 30:2
- 3) 15:1
- 4) 15:2

**ДЛЯ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) короткодействующие  $\beta$ -адреномиметики
- 2) ингаляционные глюкокортикостероиды
- 3) ксантины
- 4) пролонгированные  $\beta$ -адреномиметики (монотерапия)

**ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, АККРЕДИТОВАННЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, НА ВЫВОЗ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

- 1) врач-эпидемиолог
- 2) главная медицинская сестра
- 3) заместитель руководителя по хозяйственной части
- 4) руководитель организации

**К РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) биопсия
- 2) холецистэктомия
- 3) обходной анастомоз при раке кишки
- 4) гастростомия по поводу раны пищевода

**ПОСТРАДАВШИЙ С НОСОВЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) лежа на спине, голова запрокинута
- 2) сидя, голова запрокинута
- 3) сидя, голова слегка наклонена вперед
- 4) лежа на боку, валик под головой

**РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРОВОДЯТ**

- 1) без предварительной подготовки пациента
- 2) после опорожнения мочевого пузыря
- 3) натощак
- 4) непосредственно после очистительной клизмы

**В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В ОТ ДОНОРСТВА ОТСТРАНЯЮТ ЛИЦ**

- 1) мужского пола, практикующих секс с мужчинами

- 2) с хроническими заболеваниями печени
- 3) из числа трудовых мигрантов
- 4) не привитых против ГВ

**ВЫПУСКНИК МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА, УСПЕШНО СДАВШИЙ ПЕРВИЧНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО», МОЖЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ НА ДОЛЖНОСТЯХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) гигиена и санитария
- 2) бактериология
- 3) гигиеническое воспитание
- 4) гистология

**ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ВАКЦИНЫ ФОРМИРУЕТСЯ ПРИОБРЕТЁННЫЙ \_\_\_\_\_ ВИД ИММУНИТЕТА**

- 1) искусственный пассивный
- 2) естественный активный
- 3) искусственный активный
- 4) естественный пассивный

**У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ В ПОКОЕ НОРМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (УДАРОВ В МИНУТУ)**

- 1) 120
- 2) 80
- 3) 100
- 4) 60

**МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ДИАГНОЗ «ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ», ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) биопсия
- 2) УЗИ органов брюшной полости
- 3) биохимическое исследование крови
- 4) компьютерная томография брюшной полости

**МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК, НА КОТОРЫЙ МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПО МАССАЖУ, СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 7
- 2) 5
- 3) 9
- 4) 8

**ГРУБЫЙ, «ЛАЮЩИЙ» КАШЕЛЬ, ОСИПЛОСТЬ ГОЛОСА, ЗАТРУДНЕННОЕ ШУМНОЕ ДЫХАНИЕ ХАКТЕРНО ДЛЯ**

- 1) пневмонии
- 2) загночного абсцесса



- 3) обструктивного бронхита
- 4) стеноза гортани

**К ЗАБОЛЕВАНИЮ, ПОСТОЯННЫМИ СИМПТОМАМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ЧИХАНИЕ, ЗУД В ОБЛАСТИ НОСА, ОБИЛЬНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ВОДЯНИСТОЕ ОТДЕЛЯЕМОЕ ИЗ НОСА, ЗАТРУДНЕНИЕ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) аллергический ринит
- 2) острый ринит
- 3) острый синусит
- 4) аденоидит

**РАЗМЕР УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО РАБОТОДАТЕЛЮ ПРИ УТРАТЕ И ПОРЧЕ ИМУЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФАКТИЧЕСКИМ ПОТЕРЯМ, ИСЧИСЛЕННЫМ ИСХОДЯ ИЗ**

- 1) первоначальной стоимости имущества с учетом сроков его использования
- 2) стоимости имущества с учетом износа
- 3) стоимости, определенной приказом работодателя
- 4) рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В СПИРТСОДЕРЖАЩИХ АНТИСЕПТИКАХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) минимальное количество инъекций в сутки
- 2) среднее количество антисептика, необходимое для обработки
- 3) среднее число инъекций в сутки
- 4) количество инъекций за год

**СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ УПЛАЧИВАЮТСЯ**

- 1) страховыми медицинскими организациями
- 2) государством
- 3) страхователем
- 4) страховщиком

**ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПРИНЦИПОМ ОХРАНЫ И УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) улучшение психологической помощи населению
- 2) развитие профессионального спорта
- 3) увеличение и улучшение стационарной помощи
- 4) усиление профилактического направления медицины

**ОБЪЕМ РАСТВОРА ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ КЛИЗМЫ СОСТАВЛЯЕТ (В МЛ)**

- 1) 200 - 250
- 2) 100 - 150
- 3) 50 - 100
- 4) 150 - 200

**ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОЙ СТРАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ МИГРАЦИЕЙ**

- 1) челночной
- 2) внутренней
- 3) временной
- 4) маятниковой

**ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ**

- 1) только дети
- 2) только больные
- 3) больные и здоровые
- 4) только здоровые

**ЛИСТЫ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, РАСПЕЧАТЫВАЮТ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО БРОШЮРОВАНИЯ**

- 1) ежеквартально
- 2) ежедневно
- 3) ежемесячно
- 4) еженедельно

**ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СДВИГИ ЯВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ ИЛИ ПО ТЕРРИТОРИИ, НЕ РАСКРЫВАЯ ИСТИННОГО УРОВНЯ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ, ОТНОСЯТ К ПОКАЗАТЕЛЯМ**

- 1) регрессии
- 2) наглядности
- 3) распределения
- 4) соотношения

**СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВО ВРЕМЯ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БЕСКАМЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА СОСТАВЛЯЕТ (ДЕНЬ)**

- 1) 14-20
- 2) 7-10
- 3) 21
- 4) 28

**ЧАЩЕ ВСЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ НА ПРИВИВКУ АКДС ПРОЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) в первые три дня
- 2) сразу после введения
- 3) через 2 недели
- 4) на 8-10 день

**В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ПОЛОСТНОЙ**

### **ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ЗАДАЧА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ**

- 1) накормить пациентку
- 2) ввести анальгетики
- 3) напоить пациентку горячим сладким чаем
- 4) следить за гемодинамикой и состоянием послеоперационного шва

### **ПО ОЦЕНКАМ ВОЗ ОПАСНЫМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ ЛИТРОВ В ГОД**

- 1) 6
- 2) 8
- 3) 2
- 4) 4

### **ХРАНЕНИЕ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ, НЕОБЕЗЗАРАЖЕННЫХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В**

- 1) холодильных камерах
- 2) специальных контейнерах на территории хозяйственной зоны
- 3) одноразовых пакетах у входа в помещение
- 4) многоразовых емкостях в подсобных помещениях

### **СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОРИ НАЧИНАЮТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 15
- 2) 13
- 3) 12
- 4) 14

### **В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ КОНТАМИНАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (КОНТАМИНИРОВАННЫЕ) РАНЫ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ КАК**

- 1) операционные раны со значительным нарушением техники стерильности или со значительной утечкой содержимого из желудочно-кишечного тракта
- 2) операционные раны, проникающие в дыхательные пути, пищеварительный тракт, половые или мочевыводящие пути при отсутствии необычного заражения
- 3) неинфицированные операционные раны без признаков воспаления
- 4) операционные раны, в которых микроорганизмы, вызвавшие послеоперационную инфекцию, присутствовали в операционном плане до начала операции

### **ИНФИЦИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ МИКРООРГАНИЗМАМИ 1-2 ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ ОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА**

- 1) В
- 2) Г
- 3) Д
- 4) Б

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ**

- 1) овощи
- 2) гречневую кашу
- 3) рыбу
- 4) мясо

**ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ОСТРОГО БЕСКАМЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) инфекционное заболевание
- 2) полип желчного пузыря
- 3) холестероз желчного пузыря
- 4) увеличение в рационе питания овощей и фруктов

**СУХИЕ СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ НАД ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ФЕНОМЕНОМ**

- 1) наличия жидкости в плевральной полости
- 2) нарушения бронхиальной проходимости
- 3) уплотнения лёгочной ткани
- 4) повышения воздушности лёгочной ткани

**ДЛЯ ЛАКУНАРНОЙ АНГИНЫ ХАРАКТЕРНА СИМПТОМАТИКА В ВИДЕ**

- 1) гиперемии небных дужек и небных миндалин
- 2) нагноившихся фолликулов на поверхности небных миндалин
- 3) белых или светло-желтых налетов в лакунах небных миндалин
- 4) расширения лакун небных миндалин

**ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ № 030/У «КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ» НОМЕР КАРТЫ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ НОМЕРУ**

- 1) СНИЛС пациента
- 2) талона пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- 3) страхового медицинского полиса пациента
- 4) медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях

**СТАРЧЕСКАЯ АСТЕНИЯ КАК ФАКТОР РИСКА, ПОВЫШАЮЩИЙ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ У ГРАЖДАН СТАРШЕ \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 50
- 2) 45
- 3) 55
- 4) 65

**К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В «ХОЛОДОВОЙ**

### **ЦЕПИ» ОТНОСИТСЯ**

- 1) гигрометр
- 2) пульсоксиметр
- 3) хладоэлемент
- 4) термометр

### **КАТАРАЛЬНЫЙ СИНДРОМ МОЖЕТ БЫТЬ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ**

- 1) коревой вакцины
- 2) БЦЖ
- 3) АКДС
- 4) АДС

### **НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ НА ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ I СТЕПЕНИ**

- 1) алкоголь, как согревающее средство
- 2) растирание отмороженного участка с чистым снегом
- 3) наложение термоизолирующих повязок, обильное горячее питье
- 4) растирание отмороженного участка подручными средствами

### **ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛера**

- 1) полусидя, полулежа
- 2) на боку
- 3) на животе
- 4) на спине

### **ВЕРНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, КАСАЮЩИМСЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наличие приступов удушья
- 2) наличие кашля с мокротой на протяжении, по крайней мере, 3 месяцев в году в течение 2 лет и более
- 3) очаговый характер заболевания дыхательных путей
- 4) обратимый характер бронхиальной обструкции

### **КОНТАКТ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ ОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА**

- 1) Г
- 2) А
- 3) В
- 4) Б

### **ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ ОТХАРКИВАЮЩУЮ МИКСТУРУ, СОДЕРЖАЩУЮ ВЫТЯЖКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ**

- 1) валерианы
- 2) пустырника
- 3) толокнянки

4) термопсиса

**ГРУППА ЗДОРОВЬЯ РЕБЁНКА, ИМЕЮЩЕГО ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ В СТАДИИ  
ОБОСТРЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТСТАЮЩЕЕ ОТ ВОЗРАСТА,  
ДИСГАРМОНИЧНОЕ ЗА СЧЁТ ДЕФИЦИТА МАССЫ ТЕЛА, ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВОЗРАСТУ, ГАРМОНИЧНОЕ, ЗА ГОД, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЙ  
ОБСЛЕДОВАНИЮ, ПЕРЕНЕСШЕГО 3 ОРВИ, ПАРАГРИПП**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 2

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ ПАЦИЕНТА ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

- 1) через день
- 2) в зависимости от состояния пациента
- 3) ежедневно утром и вечером
- 4) согласно рекомендациям лечащего врача

**КОНФЛИКТ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К ОСЛАБЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА И СНИЖАЕТ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) деструктивным
- 2) конструктивным
- 3) агрессивным
- 4) созидательным

**ОБЯЗАННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЕ ТРУДА  
ВОЗЛАГАЮТСЯ НА**

- 1) работника
- 2) работодателя
- 3) профсоюзную организацию
- 4) комиссию по охране труда

**ОСОБЕННОСТЬ УХОДА ЗА АГОНИРУЮЩИМ ПАЦИЕНТОМ**

- 1) создать «постельный комфорт»
- 2) создать «желудочный комфорт»
- 3) обеспечить судном
- 4) провести гигиену полости рта

**СОВРЕМЕННЫЙ БЫСТРЫЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ  
ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ**

- 1) общий анализ мокроты
- 2) посев мокроты на питательную среду
- 3) молекулярно-генетическое исследование мокроты
- 4) микроскопия мокроты

## **ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ**

- 1) спленомегалии
- 2) расширения подкожных вен нижних конечностей
- 3) расширения вен нижней трети пищевода
- 4) гепатомегалии

## **НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ КОНТРОЛЯ НЕОБХОДИМО**

- 1) обеспечить четкость (без искажений) распространения информации
- 2) проверить полноту выполнения медицинскими сестрами врачебных назначений
- 3) разработать стандарты и критерии
- 4) описать результаты деятельности сестринского персонала

## **ЭКСТЕНСИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАЖАЮТ**

- 1) удельный вес, структуру явления
- 2) частоту распространения явления
- 3) соотношение двух независимых совокупностей
- 4) взаимосвязь между двумя зависимыми совокупностями

## **ПОД ЗАКОНЧЕННЫМ СЛУЧАЕМ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОНИМАЮТ**

- 1) набор профилактических мероприятий, направленных на предупреждение хронических неинфекционных заболеваний
- 2) перечень консультативных медицинских услуг, предоставленных пациенту в рамках одного обращения по конкретному случаю заболевания
- 3) комплекс лечебно-диагностических услуг, предоставленных пациенту в рамках одного посещения при его обращении в медицинскую организацию
- 4) комплекс медицинских услуг, ограниченных временным интервалом и предоставленных пациенту для получения лечебно-профилактической и консультативной медицинской помощи при его обращении в медицинскую организацию

## **ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СПИСОК III ПЕРЕЧНЯ, ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ**

- 1) 117/у-НП
- 2) 148/у
- 3) 107/у-НП
- 4) 148-1/у-88

## **ОСНОВА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ**

- 1) адекватный общий наркоз
- 2) адекватное обезболивание
- 3) сбалансированное питание
- 4) адекватная реабилитация

## **ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА**

## **ДОЛЖНОСТЕЙ**

- 1) врачей-терапевтов
- 2) среднего медицинского персонала
- 3) медицинского персонала городской поликлиники
- 4) врачей, ведущих амбулаторный прием

## **ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ПОВЫШАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ**

- 1) колоректального рака
- 2) лейкемии
- 3) мезотелиомы
- 4) рака влагалища

## **ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТОВ ИЗ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ В ПЕРВУЮ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О(ОБ)**

- 1) эффективности диспансерного наблюдения
- 2) индексе здоровья населения
- 3) своевременности охвата диспансерным наблюдением больных
- 4) полноту охвата диспансерным наблюдением

## **СПЕЦИАЛЬНЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ПРИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) корригирующие
- 2) дыхательные
- 3) симметричные
- 4) рефлекторные

## **К ОСНОВНЫМ СПОСОБАМ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ РАНЕНИИ ЛИЦА ОТНОСЯТ**

- 1) наложение кровоостанавливающего жгута
- 2) применение холода в области ранения
- 3) пальцевое прижатие сонной артерии
- 4) наложение давящей повязки

## **ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ОФОРМЛЯЕТСЯ**

- 1) инвентаризационная опись
- 2) опись имущества, выявленного при инвентаризации
- 3) протокол осмотра имущества
- 4) протокол результатов инвентаризации

## **ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- 1) препаратов глюкокортикостероидов
- 2) нестероидных противовоспалительных препаратов
- 3) антигистаминных препаратов
- 4) препаратов эссенциальных фосфолипидов



**СРОК ПОВТОРНОГО ОСМОТРА ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕДИКУЛЕЗА И ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ (В ДНЯХ)**

- 1) 7
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 14

**АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПОДОЗРЕНА У ПАЦИЕНТА С ЖАЛОБАМИ НА**

- 1) боль в теменной и затылочной областях
- 2) эпизоды потери сознания
- 3) одышку
- 4) периферические отеки

**КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) объемом вентиляции
- 2) подвижностью воздуха в помещении
- 3) числом, показывающим, сколько раз в течение часа воздух помещения должен быть сменен наружным воздухом
- 4) объемом воздуха в помещении

**К ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КАЛЕНДАРЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ, ОТНОСЯТСЯ**

- 1) учащиеся 5-11 классов
- 2) лица без определенного места жительства
- 3) работники медицинских организаций
- 4) дети в возрасте от 2 до 5 лет

**ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ РАССЧИТЫВАЮТ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ**

- 1) абсолютных величин
- 2) средних величин
- 3) целых чисел
- 4) сводных показателей

**НОЖНИЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК ОТНОСЯТСЯ К КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЕ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ «РЕЖУЩИЕ \_\_\_\_\_»**

- 1) хирургические
- 2) вспомогательные
- 3) стоматологические
- 4) анатомические

## **ОСНОВНОЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ БРОНХАЛЬНОЙ АСТМЕ**

- 1) сублингвальный
- 2) внутримышечный
- 3) ингаляционный
- 4) через рот

## **ТУРГОР ОПРЕДЕЛЯЮТ**

- 1) прикоснувшись к коже пациента тыльной поверхностью пальцев
- 2) собрав кожу в складку
- 3) по специальным лабораторным показателям
- 4) слегка надавив на кожу

## **ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА, ПРОТЕКАЮЩЕГО С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ МЕЛКИХ БРОНХОВ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кашель с мокротой
- 2) одышка
- 3) кашель без выделения мокроты
- 4) повышение температуры тела

## **БАЗОВЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ МЕНИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ангиография
- 2) электроэнцефалография
- 3) исследование ликвора
- 4) электронейромиография

## **ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ РЕВМОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) слабость
- 2) головная боль
- 3) боль в области сердца
- 4) снижение аппетита

## **ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К РЕКТОМАНОСКОПИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ**

- 1) очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования
- 2) сифонную клизму вечером
- 3) масляную клизму утром
- 4) сифонную клизму за 2 часа до исследования

## **ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ПОВРЕЖДАЮТСЯ**

- 1) собирательные трубки
- 2) почечные артерии
- 3) канальцы почек
- 4) капилляры клубочков

### **АКДС-ВАКЦИНУ ВВОДЯТ**

- 1) внутривенно в область предплечья
- 2) внутривенно струйно
- 3) внутримышечно в передненаружную область бедра
- 4) интраназально

### **ПАЛАТНЫЕ СЕКЦИИ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ, ОТНОСЯТ К ПОМЕЩЕНИЯМ КЛАССА ЧИСТОТЫ**

- 1) А
- 2) В
- 3) Г
- 4) Б

### **АНТИБИОТИКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВБИ СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ ДО ОПЕРАЦИИ**

- 1) за 3 часа
- 2) не ранее 2 часов
- 3) накануне вечером
- 4) за 6 часов

### **ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЖАЛОБ БОЛЬНОГО С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЖАЛОБА НА**

- 1) приступы удушья
- 2) кашель с гнойной мокротой
- 3) кровохарканье
- 4) боль в грудной клетке

### **УКУПОРОЧНЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пакет бумажный
- 2) картонная пачка
- 3) крышка пластмассовая
- 4) флакон из полимерного материала

### **СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИСТАХ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ (МЕДИЦИНСКИМ) ОБРАЗОВАНИЕМ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) группе усиления
- 2) лечебной группе
- 3) лечебно-диагностической группе
- 4) группе управления

### **КРОВЬ БЬЕТ ФОНТАНОМ ПРИ \_\_\_\_\_ КРОВОТЕЧЕНИИ**

- 1) венозном
- 2) капиллярном
- 3) артериальном
- 4) паренхиматозном

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ 1 РАЗ В**

- 1) день
- 2) квартал
- 3) неделю
- 4) месяц

**В ЖАРКИХ СТРАНАХ ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ ГЕПАТИТ**

- 1) HEV
- 2) HAV
- 3) HCV
- 4) HDV

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В СПИРТСОДЕРЖАЩИХ АНТИСЕПТИКАХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) количество суток в расчетном периоде
- 2) количество операций
- 3) среднее число операций в год
- 4) среднее число обработок в сутки

**ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫМИ КОЙКАМИ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: (ЧИСЛО КОЕК) /**

- 1) (численность населения на 01 января текущего года) ? 10000
- 2) (среднегодовая численность врачей) ? 10000
- 3) (среднегодовая численность населения) ? 10000
- 4) (число больниц)

**ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПЛЕЧА ПОКАЗАНА \_\_\_\_\_ ПОВЯЗКА**

- 1) черепашья
- 2) спиральная
- 3) восьмиобразная
- 4) колосовидная

**ПРИСТУПАТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СЛЕДУЕТ**

- 1) при возникновении у пострадавшего признаков острой сердечно-сосудистой недостаточности
- 2) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания, дыхания и кровообращения
- 3) при отсутствии у пострадавшего реакции зрачков на свет
- 4) в случае, если с момента потери сознания прошло не более 5 минут

**НОРМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (УДАРОВ В МИНУТУ)**

- 1) 90 - 100
- 2) 100 - 120
- 3) до 60
- 4) 60 - 80

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР РАБОТНИКОВ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ (ОТДЕЛЕНИЙ, ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ) В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДЯТ**

- 1) 1 раз в 2 года
- 2) в индивидуальном порядке
- 3) 2 раза в год
- 4) 3 раз в год

**К «БОЛЬШОЙ ТРОЙКЕ» ПРИЧИННЫХ ФАКТОРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) сахарный диабет, генетические факторы, стресс
- 2) курение, гиподинамия, гиперлипидемия
- 3) курение, злоупотребление алкоголем, стресс
- 4) генетические факторы, артериальная гипертензия, прибавление веса в зрелом возрасте

**КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПАЦИЕНТА ПРИ КАРДИАЛЬНОМ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ВКЛЮЧАЕТ ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ**

- 1) грудной клетки
- 2) головы
- 3) живота
- 4) бедер

**ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВНОСИТ ЖУРНАЛ**

- 1) учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб
- 2) контроля работы стерилизаторов воздушного, парового
- 3) генеральных уборок
- 4) кварцевания кабинета

**МНОГОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТХОДОВ КЛАССА А ПОДЛЕЖАТ МЫТЬЮ И ДЕЗИНФЕКЦИИ 1 РАЗ В**

- 1) день
- 2) неделю
- 3) квартал
- 4) месяц

**ПРЕИМУЩЕСТВО ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНИ**

- 1) работают 30 000-50 000 часов
- 2) могут использоваться для обеззараживания воздуха помещений
- 3) не требуют специальной утилизации
- 4) создают свет, по спектру максимально приближенный к естественному

**ВМЕСТИМОСТЬ НИЖНЕЙ КОНЪЮНКТИВАЛЬНОЙ СКЛАДКИ СОСТАВЛЯЕТ (В КАПЛЯХ)**

- 1) 1-2
- 2) 2-3
- 3) 3-4
- 4) 4-5

**ДЫХАНИЕ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) грубое сухое
- 2) клочущее
- 3) везикулярное
- 4) слабое поверхностное

**ВРЕМЯ ПОСТАНОВКИ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ СОСТАВЛЯЕТ (В МИНУТАХ)**

- 1) 2-3
- 2) 0,5-1
- 3) 7
- 4) 4-5

**ИСПРАВЛЕНИЯ В ЖУРНАЛАХ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ЗАВЕРЯЕТ**

- 1) заместитель руководителя медицинской организации по лечебной работе
- 2) руководитель медицинской организации
- 3) лицо, ответственное за ведение и хранение конкретного журнала
- 4) главная медицинская сестра

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В**

- 1) квартал
- 2) месяц
- 3) год
- 4) полгода

**ЭКСТЕНСИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ, КАК ОТНОШЕНИЕ**

- 1) абсолютного уровня последующего значения к предыдущему, выраженное в процентах
- 2) ряда сравниваемых однородных величин к одной из них, принятой за 100 %
- 3) части явления к целому явлению, выраженное в процентах
- 4) каждой последующей относительной величины к предыдущему значению

**ДЛЯ ПРИСТУПА УДУШЬЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У РЕБЕНКА ХАРАКТЕРНО**

- 1) обильное отхождение гнойной мокроты
- 2) клочущее дыхание
- 3) наличие экспираторной одышки
- 4) наличие акроцианоза

### **ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ВАЖНО**

- 1) не снимать обувь и одежду, не пытаться вернуть конечность в нормальное положение
- 2) вернуть конечность в естественное положение
- 3) снять или разрезать обувь и одежду, потому что из-за нарастающего отека пострадавший может испытывать болезненные ощущения
- 4) выпрямить конечность, чтобы более качественно наложить шину

### **РАБОТНИК НЕСЕТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ \_\_\_\_\_, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ ИЛИ ИНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ**

- 1) трех средних месячных заработков
- 2) минимального размера оплаты труда
- 3) причиненного ущерба
- 4) своего среднего месячного заработка

### **АУСКУЛЬТАТИВНО ДИФFUЗНОЕ ОСЛАБЛЕННОЕ ДЫХАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ**

- 1) неосложненной пневмонии
- 2) острым бронхите
- 3) коклюше
- 4) приступе бронхиальной астмы

### **ВОЗБУДИТЕЛЕМ АНГИНЫ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) палочка инфлюэнсы
- 2) стафилококк
- 3) В – гемолитической стрептококк
- 4) вирус

### **ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ И РЕВАКЦИНАЦИЕЙ ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) общий анализ крови
- 2) осмотр врачом-педиатром
- 3) биохимический анализ крови
- 4) общий анализ мочи

### **ПАЦИЕНТУ БЕЗ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМО ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЛОСТЬ РТА**

- 1) каждые 4 часа
- 2) два раза в день
- 3) каждые 2 часа
- 4) один раз в день

### **СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- 1) камня мочевого пузыря
- 2) пузырно-мочеточникового рефлюкса
- 3) нейрогенного мочевого пузыря

4) острой и хронической почечной недостаточности

**СПРАВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ФОРМА №070/У-04) ДЕЙСТВИТЕЛЬНА В ТЕЧЕНИЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 12
- 2) 6
- 3) 9
- 4) 10

**ПОСТРАДАВШЕМУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ, НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ ПРОХОДИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ**

- 1) поворотом головы набок
- 2) запрокидыванием головы с подъемом подбородка
- 3) поворотом пострадавшего на живот
- 4) подкладыванием валика под лопатки

**ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ «АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ» ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ РУК ЧЛЕНОВ ОПЕРАЦИОННОЙ БРИГАДЫ) НЕМЕДЛЕННО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО**

- 1) обеззараживанию воздуха операционной
- 2) вакцинации против гемолитического стрептококка
- 3) экстренной профилактики гепатита В и ВИЧ-инфекции
- 4) вакцинации против столбняка

**К ПОМЕЩЕНИЯМ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ**

- 1) сестринские посты в отделениях
- 2) помещения производителей наркотических средств
- 3) помещения аптечных организаций
- 4) кабинеты главных и старших медицинских сестер

**В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ИРРИГОСКОПИИ ИЗ РАЦИОНА ПАЦИЕНТА ИСКЛЮЧАЮТ**

- 1) соль, сахар, печенье, конфеты
- 2) мясо, рыбу, печень, каши
- 3) овощи, фрукты, молоко, черный хлеб
- 4) соусы, пряности, кофе, какао

**ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА**

- 1) вызвать врача, уложить с приподнятым головным концом, обеспечить полный физический и психологический покой
- 2) проводить в поликлинику на прием к участковому врачу
- 3) успокоить и уложить на правый бок, вызвать врача
- 4) вызвать врача, уложить с приподнятым ножным концом

**БАЗОВЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ**



**КАБИНЕТА ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) сестринское дело
- 2) сестринское дело в педиатрии
- 3) общая практика
- 4) медико-профилактическое дело

**ДЛЯ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ**

- 1) постепенное начало, парестезии, головная боль, рвота
- 2) острое начало, высокая температура, головная боль
- 3) кольцевидная эритема, головная боль, рвота
- 4) головная боль, высокая температура, нарушение сознания

**МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ ВЫЗЫВАЕТСЯ**

- 1) грамотрицательной коккобациллой
- 2) грамположительным стрептококком
- 3) грамотрицательным диплококком
- 4) грамположительным кокком

**СМЕНУ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЯ РОДИЛЬНИЦАМ ПРОВОДЯТ 1 РАЗ В (В ДНЯХ)**

- 1) 7
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 5

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ АСЦИТА НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ НЕОБХОДИМО**

- 1) начинать терапию петлевыми диуретиками в максимальных терапевтических дозах
- 2) доведение суточного диуреза до 2-3 литров
- 3) применение диеты с ограничением белка
- 4) соблюдение диеты с содержанием поваренной соли менее 3 г/сут

**НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) расширение зрачков
- 2) остановка дыхания
- 3) отсутствие пульса на сонных артериях
- 4) судороги

**ИНСТРУКТАЖ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ЗАЩИТЫ ЕГО ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОВОДЯТ 1 РАЗ В**

- 1) три года
- 2) шесть месяцев
- 3) год

4) месяц

**КЕТОАЦИДОЗ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ**

- 1) липолиза
- 2) катаболизма белков
- 3) гликогенолиза
- 4) гликонеогенеза

**СОГЛАСНО ФЗ-323 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЦЕЛЬЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проведение реабилитационных мероприятий
- 2) выявление медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ
- 3) своевременное выявление инфекционных заболеваний
- 4) оценка состояния здоровья

**ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОВМЕСТНО С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ (ВРАЧОМ-ЭПИДЕМИОЛОГОМ) РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ, СТЕРИЛИЗУЮЩИХ СРЕДСТВАХ ПРОВОДИТ**

- 1) медицинская сестра, ответственная за хранение дезинфицирующих средств
- 2) заведующий лечебным подразделением
- 3) главная медицинская сестра
- 4) руководитель медицинской организации

**УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) режима эксплуатации
- 2) соблюдения правил хранения
- 3) материала изделия
- 4) конструкции изделия

**ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЛАРИНГОСТЕНОЗА У ДЕТЕЙ СПОСОБСТВУЕТ**

- 1) воронкообразная форма гортани
- 2) узкая трахея
- 3) одинаковый угол отхождения бронхов от трахеи
- 4) мягкий надгортанник

**ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ ПАЦИЕНТА ВЫПОЛНЯЕТ**

- 1) процедурная медицинская сестра
- 2) старшая медицинская сестра отделения
- 3) заведующий отделением
- 4) медицинская сестра палатная (постовая)

## **КАРМАННЫЙ ИНГАЛЯТОР ПРИМЕНЯЮТ ПАЦИЕНТЫ С**

- 1) ринитом
- 2) отитом
- 3) гайморитом
- 4) бронхиальной астмой

## **РАБОТНИКИ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ НЕСУТ ПОЛНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИШЬ ЗА**

- 1) возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы
- 2) умышленное причинение ущерба
- 3) ущерб, возникший при необходимости обороны
- 4) ущерб, возникший в случае крайней необходимости

## **ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ ЛИХОРАДКИ И**

- 1) ангины, лимфаденопатии, диареи
- 2) тошноты, рвоты
- 3) лимфаденопатии, болей в животе
- 4) ангины, лимфаденопатии, гепатоспленомегалии

## **ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ**

- 1) не развивается серия припадков
- 2) в промежутках между припадками сознание восстанавливается
- 3) в промежутках между припадками сознание не восстанавливается
- 4) развивается гипертермия

## **ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖАЛОВАНО РАБОТНИКОМ В(НА)**

- 1) собрании трудового коллектива
- 2) государственную инспекцию труда
- 3) заседании профсоюзного комитета
- 4) административном совещании

## **НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ИЗ СПИСКА II ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ниметазепам
- 2) морфин
- 3) метиламин
- 4) ацетон

## **ПРИ ПАЛЬЦЕВОМ ПРИЖАТИИ СОННОЙ АРТЕРИИ ЕЕ ПРИЖИМАЮТ К**

- 1) поперечному отростку 4 шейного позвонка
- 2) 1 ребру
- 3) поперечному отростку 6 шейного позвонка
- 4) остистому отростку 6 шейного позвонка

## **МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ПРОТОКА В ОБЛАСТИ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ**

## **СОСТАВЛЯЕТ (ММ)**

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 4

## **ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) в соответствии с приказом руководителя организации
- 2) по распоряжению заведующего структурным подразделением
- 3) в соответствии с распоряжением главного бухгалтера организации
- 4) по распоряжению вышестоящей организации

## **ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) синуситами, простым бронхитом, лакунарной ангиной
- 2) назофарингитом, повышением температуры тела до субфебрильных цифр
- 3) бронхиолитом, обструктивным бронхитом, бронхопневмонией, ДН II-III
- 4) острым бронхитом, фарингитом, тонзиллитом, бронхиолитом, ДН 0-I

## **НОРМЫ И УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ МОЛОКА НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ**

- 1) Правительством Российской Федерации
- 2) учредителем медицинской организации
- 3) Минтрудом России
- 4) Минздравом России

## **ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К СБОРУ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ**

- 1) полоскание рта кипяченой водой
- 2) полоскание рта спиртом
- 3) полоскание рта раствором фурацилина
- 4) полоскание рта раствором гидрокарбоната натрия

## **ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ СМАЧИВАНИЯ ГОРЧИЧНИКОВ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)**

- 1) 20 – 24
- 2) 50 – 60
- 3) 36 – 37
- 4) 40 – 45

## **ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) антибиотики, отхаркивающие
- 2) антибиотики, диуретики
- 3) бронхолитики, глюкокортикостероиды
- 4) бронхолитики, диуретики

### **ЗАРАЖЕНИЕ БЕШЕНСТВОМ ЧЕЛОВЕКА ПРОИСХОДИТ ПРИ**

- 1) укусе животным, больным бешенством
- 2) укусе насекомыми
- 3) ослонении неповрежденных кожных покровов человека животным, больным бешенством
- 4) употреблении инфицированных продуктов

### **ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ КРОВИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) гипергликемия
- 2) гипопроотеинемия
- 3) гиперпротеинемия
- 4) гипербилирубинемия

### **ПОД ЗАКОНЧЕННЫМ СЛУЧАЕМ В АМБУЛАТОРНО- ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОНИМАЮТ КОМПЛЕКС**

- 1) лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, в результате которых наступает выздоровление, улучшение, или больной направляется в стационар
- 2) медико-социальных мероприятий в соответствии с конкретной программой обследования
- 3) профилактических мероприятий, направленных на предупреждение хронических неинфекционных заболеваний
- 4) индивидуальных мероприятий, выполненных пациенту, в соответствии с состоянием его здоровья

### **К РАЗДАЧЕ ПИЩИ БОЛЬНЫМ В БУФЕТНОЙ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**

- 1) старшая медицинская сестра
- 2) младший обслуживающий персонал
- 3) врач
- 4) заведующий

### **СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СОВОКУПНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ НАБЛЮДЕНИЯ**

- 1) предмет
- 2) формат
- 3) объект
- 4) единица

### **ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В**

- 1) воздушно-пылевой
- 2) воздушно-капельный
- 3) парентеральный
- 4) контактно-бытовой

## **АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА**

- 1) усиливает и ускоряет негативные обменные процессы
- 2) облегчает течение всех болезней
- 3) не оказывает влияния
- 4) способствует повышению устойчивости к болезням

## **ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ УРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ЛИЦУ С ДИПЛОМОМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ**

- 1) обучение на цикле повышения квалификации «Сестринское дело»
- 2) профессиональную переподготовку по специальности «Сестринское дело в урологии»
- 3) профессиональную переподготовку по специальности «Сестринское дело»
- 4) обучение на цикле повышения квалификации «Сестринское дело в урологии»

## **ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ ИСТИННОМ (АЛЬВЕОЛЯРНОМ) ОТЕКЕ ЛЕГКИХ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ**

- 1) пропотевания форменных элементов крови в альвеолы
- 2) бронхоспазма
- 3) попадания жидкости в альвеолы (аспирация жидкости)
- 4) пропотевания плазмы крови в альвеолы

## **МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ДО ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ**

- 1) выписывают для комиссии доверенность
- 2) дают расписку
- 3) утверждают состав инвентаризационной комиссии
- 4) готовят проект приказа о проведении инвентаризации

## **НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПРИХОДУ И РАСХОДУ ИНВЕНТАРИЗУЕМЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

- 1) продолжают
- 2) прекращаются
- 3) отклоняются
- 4) допускаются

## **О РАЗВИТИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У РЕБЕНКА С ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ**

- 1) наличие мелкопузырчатых влажных хрипов при аускультации
- 2) появление коробочного перкуторного звука
- 3) участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания
- 4) наличие свистящих хрипов при аускультации

## **ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЖЕЛТУХИ ПРИ**

## **ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ОТ ЖЕЛТУХИ ПРИ АКТИВНОМ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- 1) субфебрилитета
- 2) гипербилирубинемии
- 3) ретикулоцитоза
- 4) спленомегалии

## **СТЕНОКАРДИЧЕСКИЕ БОЛИ НОСЯТ ХАРАКТЕР**

- 1) постоянных ноющих в левой половине грудной клетки
- 2) интенсивных болей за грудиной, более 20 минут, не купирующихся приемом нитроглицерина
- 3) колющих
- 4) сжимающих, давящих за грудиной

## **ЗА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ, УСТАНОВЛИВАЮТСЯ**

- 1) повышения окладов
- 2) компенсационные выплаты
- 3) доплаты
- 4) стимулирующие выплаты

## **ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ОТ \_\_ ДО \_\_\_\_°С**

- 1) +2-+8
- 2) -2-+1
- 3) +9-+12
- 4) +13-+18

## **ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УТОПАЮЩЕГО ИЗ ВОДЫ НЕОБХОДИМО**

- 1) повернуть его на живот так, чтобы голова была ниже уровня его таза
- 2) перевернуть на живот так, чтобы голова была выше уровня его таза
- 3) положить на спину
- 4) придать «устойчивое боковое положение»

## **ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ХОЛОДИЛЬНИКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В**

- 1) месяц
- 2) неделю
- 3) день
- 4) квартал

## **ЕЖЕДНЕВНЫЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ БОЛЬНЫХ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА В ОТДЕЛЕНИИ, СТАЦИОНАРЕ ВЕДЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ**

- 1) книги регистрации листков нетрудоспособности (ф 036/у)
- 2) листка ежедневного учета движения больных и коечного фонда (ф 007/у-02)
- 3) статистической карты выбывшего из стационара круглосуточного пребывания (ф

066/у-02)

4) медицинской карты стационарного больного (ф 003/у)

### **ТЯЖЕЛЫЕ РЕАКЦИИ НА ИНАКТИВИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ**

- 1) с 5 по 12 день
- 2) не позже двух дней
- 3) молниеносно
- 4) не раньше 4-5 дня

### **ШОКОВЫЙ ИНДЕКС АЛЬГОВЕРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) отношением частоты пульса к диастолическому артериальному давлению
- 2) отношением частоты пульса к систолическому артериальному давлению
- 3) разницей между частотой пульса и дыхания
- 4) разницей между систолическим и диастолическим давлением

### **СОДЕРЖАНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДАХ РАДИОНУКЛИДОВ С ПРЕВЫШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ УРОВНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ ОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА**

- 1) Д
- 2) Г
- 3) В
- 4) Б

### **СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ**

- 1) медицинская сестра приёмного отделения
- 2) врач
- 3) заведующий приёмным отделением
- 4) старшая медсестра приёмного отделения

### **СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) внутривенное струйное введение физиологического раствора
- 2) введение внутримышечно/подкожно раствора эпинефрина 0,1%
- 3) осуществление ингаляции кислорода
- 4) придание пациенту положения на животе

### **ПОД ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОНТРОЛЯ ПОНИМАЮТ**

- 1) отсутствие обратной связи
- 2) установление субъективных критериев контроля
- 3) недоступность информации о результатах контроля
- 4) направленность на результат

### **ДОСТОВЕРНЫЙ ПРИЗНАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ**

- 1) прекращение сердечной деятельности



- 2) прекращение дыхания
- 3) симптом «кошачьего глаза»
- 4) расширение зрачка

### **ТРЕТИЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) проведение корректирующих мероприятий
- 2) разработку стандартов и критериев
- 3) сравнение полученных результатов с запланированными
- 4) измерение достигнутых результатов

### **НЕМОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТНИКОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ, ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ**

- 1) наложение дисциплинарного взыскания
- 2) отстранение от должности
- 3) перевод на другую должность
- 4) снижение размера заработной платы

### **В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕДИКУЛЕЗА ОТМЕТКА «Р» СТАВИТСЯ**

- 1) в листе назначения
- 2) в температурном листе
- 3) на титульном листе медицинской карты стационарного больного
- 4) на экстренном извещении

### **ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) Преднизолон
- 2) Интерферон альфа
- 3) Рибавирин
- 4) Урсодезоксихолевая кислота

### **ПРИ НАЛИЧИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕНТГЕНОЛОГИЯ» ДОЛЖНОСТЬ РЕНТГЕНЛАБОРАНТА МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ЛИЦО СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) медицинский массаж
- 2) лабораторная диагностика
- 3) фармация
- 4) медицинская оптика

### **ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ В МИНУТУ**

- 1) 16-20
- 2) 25-30
- 3) 35-40
- 4) 45-50

### **БЕЛЬЕВЫМ РЕЖИМОМ ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ СМЕНА БЕЛЬЯ**

**БОЛЬНЫМ 1 РАЗ В \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 20
- 2) 10
- 3) 7
- 4) 14

**ПОСТВАКЦИНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА АКДС ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ**

- 1) дефект кожи - пустула и затем корочка на месте введения вакцины
- 2) гипертермия, гиперемия и инфильтрат в месте введения
- 3) гипертермия, боль в горле
- 4) нарушения со стороны нервной системы - головная боль, судороги

**С КАКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПРОВОДИТСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПРИ МЕНИНГИТЕ?**

- 1) грипп с явлениями нейротоксикоза
- 2) скарлатина
- 3) острый пиелонефрит
- 4) острый бронхит

**В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ**

- 1) прием снотворных
- 2) очаг хронической инфекции
- 3) нарушение липидного обмена
- 4) длительное переохлаждение

**ЧАСТОТА НАДАВЛИВАНИЙ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ В 1 МИНУТУ**

- 1) 60-80
- 2) 100-120
- 3) 80-90
- 4) 40-50

**ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ БОЛЬНОГО С ПЕРЕЛОМОМ ПОЗВОНОЧНИКА ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) на носилках в положении «лягушки»
- 2) на боку на носилках
- 3) на щите, на животе
- 4) на щите, на спине с соблюдением «оси безопасности»

**НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ЭКГ
- 2) ЭхоКГ
- 3) коронароангиография

4) рентгенологическое исследование органов грудной клетки

**СХЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УТВЕРЖДАЕТ**

- 1) руководитель организации
- 2) главная медицинская сестра
- 3) врач-эпидемиолог
- 4) лицо, ответственное по приказу за организацию обращения с медицинскими отходами

**ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) острая «кинжальная» боль в животе
- 2) схваткообразная боль в животе
- 3) частый жидкий стул
- 4) ноющая боль в животе

**ВЫДЕЛЯЮТ \_\_\_\_\_ КЛАССОВ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ, ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ И РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ**

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 3

**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ПРОВОДИТСЯ**

- 1) анализ мочи по Зимницкому
- 2) анализ мочи по Нечипоренко
- 3) двухстаканная проба
- 4) тест с нагрузкой глюкозой

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ТРЕТЬЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЕТЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ГРУППАМ РИСКА, ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 6
- 2) 8
- 3) 9
- 4) 12

**АКДС-ВАКЦИНУ ВВОДЯТ**

- 1) внутримышечно в верхний наружный квадрант ягодицы
- 2) перорально
- 3) подкожно в область предплечья
- 4) внутривенно капельно

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК**

## **ВТОРУЮ РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)**

- 1) 12
- 2) 8
- 3) 6-7
- 4) 9

## **ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ЗАЛОЖЕННОСТИ НОСА НА ФОНЕ ОСТРОГО РИНИТА ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ**

- 1) промывание носа солевым раствором из шприца или груши
- 2) прогревание пазух носа и луковый сок в нос
- 3) гипертонические солевые растворы или деконгестанты в виде капель в нос
- 4) антибиотики или антисептики в виде капель в нос

## **НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ИСХОДОМ РЕВМАТИЧЕСКОГО ЭНДОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) атеросклероз
- 2) порок сердца
- 3) выздоровление
- 4) пиелонефрит

## **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РВОТЕ У РЕБЕНКА**

- 1) уложить ребенка, повернуть голову на бок или держать ребенка над тазом, расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ свежего воздуха
- 2) уложить ребенка, повернуть голову на бок или держать ребенка над тазом, обеспечить доступ свежего воздуха
- 3) уложить ребенка, повернуть голову на бок или держать ребенка над тазом, ввести внутримышечно церукал
- 4) вызвать скорую медицинскую помощь

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОРФИНА У БОЛЬНЫХ С ОТЕКОМ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипертонический криз
- 2) порок сердца
- 3) инфаркт
- 4) старческий возраст

## **МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ**

- 1) расчёта истинных показателей в сравниваемых группах
- 2) сравнения интенсивных показателей в неоднородных по составу групп
- 3) определения значимости различий в интенсивных показателях
- 4) выявления влияния фактора внешней среды на показатели сравниваемых групп

## **ПРЕКАРДИАЛЬНЫЙ УДАР ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

- 1) наносится при отсутствии у пострадавшего признаков жизни
- 2) не наносится

- 3) наносится, если у пострадавшего нет болей за грудиной
- 4) наносится при отсутствии эффекта от проводимой сердечно-легочной реанимации

### **ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ БЕШЕНСТВА**

- 1) пищевой
- 2) контактный
- 3) трансмиссивный
- 4) воздушно-капельный

### **ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, АККРЕДИТОВАННЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, НА ВЫВОЗ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

- 1) главная медицинская сестра
- 2) заместитель руководителя по хозяйственной части
- 3) врач-эпидемиолог
- 4) руководитель организации

### **ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ПОКАЗАНО**

- 1) тепловые процедуры
- 2) голодание
- 3) морфин
- 4) диета № 15

### **ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АТИПИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- 1) полусинтетические пенициллины
- 2) аминогликозиды
- 3) цефалоспорины 1-2 поколений
- 4) макролиды

### **САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТ**

- 1) санитар
- 2) сам пациент
- 3) медицинская сестра или младшая медицинская сестра
- 4) родственники пациента

### **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОБЩАЯ ПРАКТИКА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ У ПРЕТЕНДЕНТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) управление сестринской деятельностью
- 2) медико-профилактическое дело
- 3) лечебное дело
- 4) гигиеническое воспитание

### **ПРИ ПРИЕМКЕ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНИВАЮТ ИХ**

- 1) конкурентоспособность

- 2) маркировку
- 3) этап жизненного цикла
- 4) величину сбыта

**СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ, В КОТОРОЙ УЧАСТНИК ОРИЕНТИРОВАН НА ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- 1) сотрудничество
- 2) подавление
- 3) компромисс
- 4) конкуренция

**ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕЙСЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ХАРАКТЕРНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ**

- 1) гематурии
- 2) массивной протеинурии
- 3) микроальбуминурии
- 4) лейкоцитурии

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕМ СРЕДСТВЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) фактический срок годности раствора в сутках
- 2) количество обрабатываемого материала
- 3) объем дезинфицирующего раствора
- 4) кратность обработки в сутки

**ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) работниками планового отдела и другими специалистами
- 2) материально ответственными лицами
- 3) специальной комиссией, назначенной руководителем организации
- 4) работниками бухгалтерии

**ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) перестает капризничать и адекватно реагирует на осмотр
- 2) появление сухого кашля после горчичного обертывания
- 3) появление звонкого голоса после щелочной ингаляции
- 4) снижение температуры после физических методов охлаждения

**ВЫСОКИЙ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ ГЕПАТИТОМ В ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ НАБЛЮДАЕТСЯ У**

- 1) новорожденных детей матерей, имеющих воспалительные заболевания женской репродуктивной системы
- 2) пациентов центров гемодиализа
- 3) лиц, имеющих беспорядочные половые связи со многими партнерами

4) больных, подвергающихся частым инвазивным методам обследования и лечения

**ЧАСТОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ АНГИНЫ У ВЗРОСЛЫХ ЭТО \_\_\_\_\_ АБСЦЕСС**

- 1) эпидуральный
- 2) заглочный
- 3) надгортанника
- 4) паратонзиллярный

**МЕСТО, ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ИССЛЕДУЮТ ПУЛЬС**

- 1) плечевая
- 2) бедренная артерия
- 3) лучевая артерия
- 4) височная артерия

**САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ**

- 1) аутоиммунной деструкции бета-клеток поджелудочной железы
- 2) опухоли или травмы поджелудочной железы
- 3) генетически обусловленных дефектов функции бета-клеток поджелудочной железы
- 4) инсулинорезистентности и относительного дефицита инсулина

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ**

- 1) Конституцией РФ
- 2) Законом РФ «О бухгалтерском учете»
- 3) Законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- 4) Трудовым кодексом РФ

**К ПОКАЗАТЕЛЮ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕМУ СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ, ОТНОСЯТ СМЕРТНОСТЬ**

- 1) неонатальную
- 2) младенческую
- 3) детскую
- 4) перинатальную

**К АССОЦИИРОВАННОМУ КЛИНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) трикуспидальная недостаточность
- 2) аортальный стеноз
- 3) расслаивающая аневризма аорты
- 4) аортальная недостаточность

**СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ У ВЗРОСЛЫХ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОВЕДЕНИЯ**

- 1) 15 компрессий грудной клетки
- 2) 3 искусственных вдохов
- 3) 5 искусственных вдохов

4) 30 компрессий грудной клетки

**НЕСОГЛАСИЕМ, КОГДА КАЖДЫЙ СТРЕМИТСЯ, ЧТОБЫ ПРИНЯЛИ ЕГО ВЗГЛЯДЫ В УЩЕРБ ДРУГОЙ СТОРОНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) спор
- 2) дискуссия
- 3) конфликт
- 4) полемика

**ПОСЛЕ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ**

- 1) 1 год
- 2) 2 лет
- 3) 10 месяцев
- 4) 6 месяцев

**ПОКАЗАТЕЛЕМ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) МВЛ
- 2) ФЖЕЛ
- 3) ОФВ1
- 4) ПСВ25-75

**К СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГРУППЕ «Б» ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ (IV ГРУППА) ОТНОСЯТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

- 1) имеющих нарушения состояния здоровья постоянного характера (хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации)
- 2) имеющих морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленных
- 3) с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности
- 4) входящих в группы риска по возникновению заболеваний (патологических состояний)

**АНТИМИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) острого гепатита В
- 2) алкогольного цирроза
- 3) первичного билиарного цирроза
- 4) болезни Вильсона-Коновалова

**ВЫБОР МОДЕЛИ ОБЩЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕН**

- 1) окружающей обстановкой
- 2) стилем общения
- 3) настроением, эмоциональным состоянием человека в момент выбора модели
- 4) целями, которые человек поставил перед собой и хочет реализовать в процессе



общения

**СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ, НАХОДИВШУЮСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х ЛЕТ И ПЛАНИРУЮЩУЮ ВЕРНУТЬСЯ НА РАБОТУ ДОСТАТОЧНО НАПРАВИТЬ НА \_\_\_\_\_**

- 1) цикл повышения квалификации по специальности «Организация сестринского дела»
- 2) профессиональную переподготовку по специальности «Организация сестринского дела»
- 3) профессиональную переподготовку по специальности «Сестринское дело»
- 4) цикл повышения квалификации по специальности «Сестринское дело»

**К РАБОТЕ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА**

- 1) работающие на руководящих должностях
- 2) страдающие аллергическими заболеваниями
- 3) достигшие 18-ти летнего возраста
- 4) страдающие хроническим алкоголизмом

**КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ**

- 1) главной медицинской сестрой
- 2) заведующим структурным подразделением
- 3) главным бухгалтером
- 4) руководителем организации

**ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В РОДДОМЕ ВАКЦИНИРУЮТ ОТ**

- 1) краснухи
- 2) менингококковой инфекции
- 3) столбняка
- 4) гепатита В

**НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) согревание одеялами или использование металлизированных покрытий
- 2) бережная транспортировка
- 3) внутривенное введение теплых кристаллоидных растворов
- 4) прием небольшого количества алкоголя

**ЗАМЕНУ ОДНОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ПО СБОРУ ОСТРОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПО МЕРЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, НО НЕ РЕЖЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 48
- 2) 36
- 3) 72
- 4) 24

## **ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЗА ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ**

- 1) графика работы
- 2) табеля учета использования рабочего времени
- 3) приказов главного врача о приеме на работу работников
- 4) докладной записки об использовании рабочего времени

## **РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПОРАЖЕНИЯ СЕТЧАТКИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тракционная отслойка сетчатки
- 2) появление «ватных» экссудатов
- 3) появление новообразованных сосудов
- 4) появление микроаневризм

## **ВО ВРЕМЯ ВДУВАНИЯ ВОЗДУХА ГРУДНАЯ КЛЕТКА ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) не реагирует на вдувание воздуха
- 2) должна приподниматься
- 3) должна приподниматься только, если искусственное дыхание проводится аппаратным методом
- 4) приподнимается с одновременным вздутием в эпигастральной области

## **ПРИ АСПИРИНОВОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИЕМ**

- 1) стабилизаторов мембран тучных клеток
- 2) антибактериальных препаратов
- 3) антигистаминных препаратов
- 4) нестероидных противовоспалительных препаратов

## **ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) улучшение подвижности суставов
- 2) лечение очагов инфекции
- 3) восстановление работоспособности
- 4) повышение устойчивости организма к метеорологическим колебаниям

## **ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ**

- 1) предстерилизационной очистке
- 2) мытью с моющим средством
- 3) стерилизации
- 4) дезинфекции

## **ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАБОТНИКОМ УЩЕРБА РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН**

- 1) истребовать от работника письменное объяснение
- 2) установить причину его возникновения

- 3) установить размер причиненного ущерба
- 4) создать комиссию для установления обстоятельств произошедшего

**ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ, КРОМЕ АДРЕСА ОБЪЕКТА**

- 1) время возникновения пожара
- 2) наличие на объекте первичных средств пожаротушения
- 3) место возникновения пожара, фамилию позвонившего
- 4) количество пострадавших при пожаре

**ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НЕПРИЖИГАЮЩИМИ ЯДАМИ ПЕРЕД ПРОМЫВАНИЕМ ЖЕЛУДКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДАТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ**

- 1) натуральное молоко
- 2) столовую ложку порошка активированного угля
- 3) слабительные средства
- 4) крепкий сладкий чай или кофе

**К СПЕЦИФИЧЕСКИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ МЕНИНГИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТНОСЯТ**

- 1) симптом «подвешивания» Лессажа
- 2) судороги
- 3) гипертермию
- 4) симптом Греффе

**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЧАЩЕ ИССЛЕДУЮТ**

- 1) мочу
- 2) кал
- 3) желчь
- 4) кровь

**ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ КОЛОНОСКОПИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) простые запоры
- 2) повторные кровотечения из прямой кишки
- 3) боли по ходу толстой кишки
- 4) спастические запоры

**ВМЕСТИМОСТЬ ПАЛАТ ОТДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ИММУНОКОМПРОМЕТИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ (ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ, ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ОЖОГАМИ) ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ \_\_\_\_\_ КОЙКИ (КОЕК)**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

### **ПУТЁМ ПЕРЕДАЧИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) воздушно-капельный
- 2) фекально-оральный
- 3) трансмиссивный
- 4) пищевой

### **ПО СТЕПЕНИ НОРМИРУЕМОГО МИКРОБНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ КЛАССЫ ЧИСТОТЫ Б ОТМЕЧАЕТСЯ КАК**

- 1) чистое помещение
- 2) условно чистое помещение, количество микроорганизмов не нормируется
- 3) «грязное» помещение, количество микроорганизмов не нормируется
- 4) особо чистое помещение

### **К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ ОТНОСЯТ**

- 1) наследственность
- 2) метаболические нарушения
- 3) атеросклероз
- 4) гипергликемию

### **ПРИ РАЗВИТИИ ПРИСТУПА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) горизонтальное с приподнятым головным концом
- 2) горизонтальное
- 3) полусидя с опущенными вниз ногами
- 4) горизонтальное с приподнятым ножным концом

### **КАКИЕ ЖАЛОБЫ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ С ЭКССУДАТИВНЫМ ОТИТОМ?**

- 1) внезапная резкая ушная боль с приступом головокружения, снижение слуха, боль в нем, подъем температуры до 38 градусов
- 2) снижение слуха, ребенок увеличивает громкость телевизора, близко к нему садится, снижение успеваемости в школе
- 3) снижение слуха, боль в ухе, выделения из уха
- 4) приступ системного головокружения со снижением слуха, шумом в ухе, нарушением зрения на стороне поражения

### **МОЧЕПРИЕМНЫЕ СОСУДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ**

- 1) бесцветные, непрозрачные
- 2) темного цвета, прозрачные
- 3) из бесцветного, прозрачного материала
- 4) не имеет значения

### **ВАННЫ ИНДИФФЕРЕНТНЫЕ В ТЕЧЕНИИ 5-7 МИНУТ НА ОРГАНИЗМ ОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ**

- 1) тонизирующее

- 2) расслабляющее
- 3) регенерирующее
- 4) стимулирующее

**РИТМ ПУЛЬСА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО**

- 1) наполнению артерии кровью
- 2) числу пульсовых волн за 1 минуту
- 3) силе, с которой нужно прижать лучевую артерию чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания
- 4) интервалу между пульсовыми волнами

**СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДОЛЖНА ПОВЫШАТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) сестринское дело в педиатрии
- 2) сестринское дело
- 3) организация сестринского дела
- 4) управление сестринской деятельностью

**КОД АТХ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «КАГОЦЕЛ» МОЖНО НАЙТИ В**

- 1) ГОСТ
- 2) РЛС
- 3) ОКДП
- 4) ТУ

**ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: (ОБЩЕЕ ЧИСЛО УМЕРШИХ ЗА ГОД) / (СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ) ?**

- 1) 1000
- 2) 10
- 3) 100
- 4) 100000

**ЗАПОЛНЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ВМЕСТЕ С ДОКУМЕНТАМИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_ ЛЕТ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ В НИХ ПОСЛЕДНЕЙ ЗАПИСИ**

- 1) 25
- 2) 7
- 3) 5
- 4) 10

**ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕЛЯТСЯ НА \_\_\_\_ ГРУПП**

- 1) 5
- 2) 4

- 3) 3
- 4) 2

**НАЗОВИТЕ БАКТЕРИАЛЬНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ РИНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ**

- 1) хореоретинит
- 2) увеит
- 3) дерматит
- 4) синусит

**ЕСЛИ У РЕБЁНКА ЧЕРЕЗ 4 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ИММУНИЗАЦИИ В МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ БЦЖ-ВАКЦИНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ «ХОЛОДНЫЙ» АБСЦЕСС, ТО ДАННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О**

- 1) введении вакцины одновременно с другими вакцинами
- 2) хранении вакцины на свету
- 3) нарушении техники введения вакцины
- 4) хранении вакцины при комнатной температуре

**ОСМОТР СОСТОЯНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В**

- 1) квартал
- 2) месяц
- 3) неделю
- 4) год

**СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) вакцинацию
- 2) закаливание организма
- 3) использование специфических диет
- 4) применение иммуномодуляторов

**ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СМЕНА МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ МИГРАЦИЕЙ**

- 1) сезонной
- 2) маятниковой
- 3) временной
- 4) безвозвратной

**СТУДЕНТ 5 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДИАТРИЯ», УСПЕШНО СДАВШИЙ ЭКЗАМЕН ПО ДОПУСКУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МОЖЕТ РАБОТАТЬ В ДОЛЖНОСТИ**

- 1) медицинской сестры патронажной
- 2) медицинской сестры приемного отделения
- 3) инструктора по трудовой терапии
- 4) медицинской сестры стерилизационной

**К ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ \_\_\_\_\_ ЗАПАСА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

- 1) трехмесячного
- 2) полугодового
- 3) месячного
- 4) суточного

**«ЛАСКОВЫМ УБИЙЦЕЙ» НАЗЫВАЮТ ВИРУС ГЕПАТИТА**

- 1) В
- 2) D
- 3) А
- 4) С

**ИНЦИДЕНТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) приписыванием партнёру по общению определённых мотивов и причин, объясняющих его поступки и другие особенности
- 2) отрицательным переживанием, вызванным невозможностью удовлетворения важнейших потребностей
- 3) формированием у участников повышенной раздражительности и недовольства окружающими
- 4) действием участников конфликтной ситуации, провоцирующих резкое обострение противоречий и начало борьбы между ними

**К МЕТОДАМ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ОТНОСИТСЯ**

- 1) применение лейкоцитарного интерферона
- 2) закаливание организма
- 3) вакцинация
- 4) применение амантадина

**ТУБЕРКУЛЁЗНАЯ ЭТИОЛОГИЯ МЕНИНГИТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ**

- 1) обнаружением ДНК МБТ методом ПЦР при исследовании ликвора
- 2) повышением уровня сахара, снижением уровня белка, нейтрофильным цитозом
- 3) снижением уровня сахара, повышением уровня белка, лимфоцитарным цитозом
- 4) выпадением фибриновой пленки на поверхности ликвора

**НАЛИЧИЕ НЕСНИЖАЕМОГО МЕСЯЧНОГО ЗАПАСА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ КОНТРОЛИРУЕТ**

- 1) заместитель руководителя медицинской организации по хозяйственной части
- 2) заведующий структурным подразделением
- 3) главная медицинская сестра
- 4) заместитель руководителя медицинской организации по эпидемиологической работе

**ПАЦИЕНТЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ В  
ОТСУТСТВИЕ ИЗВЕСТНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ К  
ГРУППЕ РИСКА**

- 1) очень высокого
- 2) высокого
- 3) умеренного
- 4) низкого

**ПРИ МЕНИНГОКОККОВОМ МЕНИНГИТЕ В ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ  
ВЫЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ксантохромия
- 2) нейтрофильный плеоцитоз
- 3) опалесценция
- 4) высокий уровень глюкозы

**ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ**

- 1) визуально
- 2) индивидуальных стандартов
- 3) центильных таблиц
- 4) возрастных стандартов

**ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТА С ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЬНЫМИ ОТНОСЯТ К  
МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА**

- 1) Г
- 2) Б
- 3) А
- 4) В

**ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ  
МОБИЛИЗАЦИОННЫХ НУЖД, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ КАТЕГОРИИ ХРАНЕНИЯ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ СПИННОМОЗГОВОЙ ПУНКЦИИ НЕОБХОДИМО УЛОЖИТЬ НА**

- 1) спину с приподнятым головным концом
- 2) живот без подушки
- 3) спину с приподнятым ножным концом
- 4) бок с приведенными к животу коленями

**ПРИ ПЛАНОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ НА СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТЫ НА**



**ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ В СЛУЧАЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ НА**

- 1) грипп
- 2) маркеры гепатитов В и С, сифилис
- 3) ротавирусные инфекции
- 4) мононуклеоз

**ТЕМПЕРАТУРА В ПРЯМОЙ КИШКЕ**

- 1) выше температуры в подмышечной впадине на 1°C
- 2) ниже температуры в подмышечной впадине на 1°C
- 3) идентична температуре в подмышечной впадине
- 4) выше температуры в подмышечной впадине на 2°C

**КАТАРАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ПАРАГРИППЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) гнойными выделениями из носа, влажным кашлем
- 2) яркой отграниченной гиперемией зева, гнойным выпотом в лакунах
- 3) слизистыми выделениями из носа, гиперемией зева, грубым сухим кашлем
- 4) частым навязчивым коклюшеподобным кашлем

**К БЕССИМПТОМНОМУ ПОРАЖЕНИЮ ОРГАНА-МИШЕНИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) микроальбуминурия
- 2) стенокардия
- 3) сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса
- 4) энцефалопатия

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОСРОЧНО, СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В (ГОДАХ)**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

**ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЧИ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ СОСТАВЛЯЕТ В НОРМЕ**

- 1) 1012–1015
- 2) 1030–1040
- 3) 1007–1010
- 4) 1018–1025

**ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ**

- 1) метастатическом раке печени
- 2) хроническом панкреатите
- 3) хроническом гепатите

4) циррозе печени

**ПОД БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ ПОНИМАЮТ НАРУШЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ**

- 1) воздушного потока по мелким и средним бронхам
- 2) дыхательных путей вследствие аспирации инородного тела
- 3) дыхательных путей вследствие отека голосовых связок
- 4) главного бронха вследствие опухоли

**ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ РАЗ В**

- 
- 1) 5; неделю
  - 2) 1; неделю
  - 3) 1; сутки
  - 4) 2; сутки

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРТОВОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ ПНЕВМОНИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ (СУТКИ)**

- 1) 4-5
- 2) 2-3
- 3) 8-4
- 4) 6-7

**ПЕРЕХОД ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО ГЕПАТИТА В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ**

- 1) желтуха
- 2) варикозное расширение вен пищевода
- 3) энцефалопатия
- 4) гипоальбуминемия

**ПОКАЗАНИЕМ К ПЛАНОВОЙ ФИБРОГАСТРОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дегтеобразный стул
- 2) желудочное кровотечение
- 3) острый холецистит
- 4) обострение хронического гастрита

**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ХРОНИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЕЗНЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**

- 1) УЗИ органов брюшной полости
- 2) дуоденальное зондирование
- 3) обзорную рентгенографию органов брюшной полости
- 4) ЭГДС

**ТАРОЙ ДЛЯ СБОРА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНФУЗИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) одноразовая герметичная упаковка
- 2) одноразовые пакеты
- 3) многоразовые емкости
- 4) одноразовая твердая упаковка

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_<sup>0</sup>C**

- 1) 34 – 36
- 2) 39 – 41
- 3) 23 – 25
- 4) 36 – 37

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ С СЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НАБЛЮДАЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- 1) отрыжки тухлым
- 2) отрыжки кислым
- 3) изжоги
- 4) запоров

**ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПУНКЦИЮ С ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ НАЗНАЧАЮТ ПРИ**

- 1) бронхиальной астме
- 2) хроническом бронхите
- 3) экссудативном плеврите
- 4) крупозной пневмонии

**РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАМКАХ ПЕРВОГО ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ**

- 1) колоноскопия
- 2) рентгенография легких
- 3) маммография
- 4) компьютерная томография легких

**ПРИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ РИТМ СЕРДЦА**

- 1) правильный
- 2) неправильный
- 3) с ритмичным выпадением сокращений желудочков
- 4) редкий ритмичный

**В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ОСНОВНОЙ ГРУППОЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЮТСЯ:**

- 1) противовирусные
- 2) гепатопротекторы
- 3) антибиотики
- 4) ферментные

**ЛИЧНАЯ ДИСТАНЦИЯ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТАМИ,  
КОЛЛЕГАМИ СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)**

- 1) 45-120
- 2) 120-400
- 3) 400-550
- 4) 400-750

**СВОЙСТВО ПУЛЬСА, КОТОРОЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОДИНАКОВЫМ КОЛИЧЕСТВОМ  
УДАРОВ НА ОБЕИХ РУКАХ**

- 1) величина
- 2) ритм
- 3) симметричность
- 4) частота

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЖДУ ХРОНИЧЕСКОЙ  
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ И ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) спирометрия
- 2) бронхоскопия
- 3) иммунологическое исследование
- 4) рентгенография легких

**ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ**

- 1) повышенное артериальное давление
- 2) головная боль
- 3) кашель с гнойной мокротой
- 4) экспираторная одышка

**ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ СИМПТОМОМ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кашель
- 2) кровохарканье
- 3) одышка
- 4) свистящее дыхание

**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ЯДОВИТЫМ ВЕЩЕСТВОМ,  
ПОСТУПИВШИМ В ЕГО ОРГАНИЗМ ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ,  
НЕОБХОДИМО**

- 1) предложить пострадавшему выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту (если он в сознании)
- 2) вызвать скорую медицинскую помощь, не предпринимая никаких действий до ее приезда
- 3) выполнить промывание желудка раствором соды с помощью зонда
- 4) предложить пострадавшему выпить молока для нейтрализации ядовитого вещества

**ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК ВКЛЮЧАЕТ МЫТЬЕ РУК МЫЛОМ И ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ (В МИНУТАХ)**

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 4

**ВЫПУСКНИК МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА, УСПЕШНО ПРОШЕДШИЙ ПЕРВИЧНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К РАБОТЕ В ДОЛЖНОСТИ \_\_\_\_\_ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

- 1) главного фельдшера
- 2) старшего фельдшера
- 3) фельдшера
- 4) фельдшера-нарколога

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ПРИЗНАКОВ ГОРЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО**

- 1) немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей
- 2) немедленно приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в случае, если не удалось самостоятельно потушить пожар
- 3) немедленно приступить к спасению материальных ценностей
- 4) немедленно надеть средства индивидуальной защиты

**К ПОКАЗАНИЯМ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНОГО ПНЕВМОНИЕЙ ОТНОСЯТ**

- 1) отсутствие эффекта от проводимой антибактериальной терапии, одышку свыше 30 в минуту, возраст старше 70 лет
- 2) отсутствие эффекта от проводимой антибактериальной терапии
- 3) одышку свыше 30 в минуту
- 4) возраст старше 50 лет

**ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гематогенный
- 2) бронхогенный
- 3) травматический
- 4) лимфогенный

**ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИПА В**

- 1) хеликобактериальная инфекция
- 2) отравление
- 3) аутоиммунные нарушения
- 4) нерациональное питание

### **ГЛЮКОМЕТР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ**

- 1) кетоновых тел в моче
- 2) глюкозы в пищевых продуктах
- 3) глюкозы в моче
- 4) глюкозы в крови

### **СЕРОЗНЫЙ МЕНИНГИТ В СОЧЕТАНИИ С ДВУХСТОРОННЕЙ ПРИПУХЛОСТЬЮ В ОКОЛОУШНЫХ ОБЛАСТЯХ УКАЗЫВАЕТ НА**

- 1) лептоспироз
- 2) инфекционный мононуклеоз
- 3) туберкулез
- 4) паротитную инфекцию

### **КОЛОНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ**

- 1) мочевого пузыря
- 2) тонкой кишки
- 3) толстой кишки
- 4) желудка

### **К КЛИНИЧЕСКОМУ ПРОЯВЛЕНИЮ ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ**

- 1) выраженную одышку
- 2) грубый «лающий кашель»
- 3) фебрильную лихорадку
- 4) сухой плеврит

### **ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕ ГРАФИКА ПРОВОДЯТ**

- 1) при получении неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды
- 2) по желанию старшей медицинской сестры
- 3) перед административным обходом главной медицинской сестрой
- 4) перед проведением контрольно-надзорных мероприятий

### **ПРИГОДНОСТЬ РАБОЧЕГО РАСТВОРА АЗОПИРАМА ПРОВЕРЯЮТ НАНЕСЕНИЕМ 2-3 КАПЕЛЬ РАСТВОРА НА**

- 1) стерильную салфетку
- 2) стерильный ватный шарик
- 3) кровавое пятно
- 4) стерильный тампон

**ВЫПУСКНИК МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА, УСПЕШНО ПРОШЕДШИЙ ПРОЦЕДУРУ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА», МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К РАБОТЕ В ДОЛЖНОСТИ ЛАБОРАНТА \_\_\_\_\_ ЛАБОРАТОРИИ**

- 1) гистологической
- 2) радиоизотопной
- 3) бактериологической
- 4) клинико-диагностической

**ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПЕРЕЛОМ**

- 1) обезболивание, шинирование, холод на область перелома
- 2) шинирование, холод на область перелома, обезболивание
- 3) обезболивание, холод на область перелома, шинирование
- 4) холод на область перелома, шинирование, обезболивание

**ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ (АСЕПТИЧЕСКОЙ) ПОВЯЗКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) создании постоянного доступа лекарственного вещества
- 2) герметизации раны
- 3) остановке кровотечения
- 4) профилактике вторичного инфицирования

**К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Б ОТНОСЯТСЯ**

- 1) регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные
- 2) «чистая» и «стерильная» зоны стерилизационного отделения
- 3) помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях
- 4) санитарные комнаты, помещения сортировки и временного хранения грязного белья

**ЗАВИСИМЫМ СЕСТРИНСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ**

- 1) клофелина
- 2) инсулина
- 3) папаверина
- 4) морфина

**К ОСНОВНОМУ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ**

- 1) гомогенное затемнение соответственно доли или сегмента
- 2) картину ателектаза
- 3) тяжистый лёгочный рисунок
- 4) очаговые тени

**ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ В ОТКРЫТЫХ АМПУЛАХ И ФЛАКОНАХ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ**

- 1) только дезинфекции
- 2) дезинфекции и стерилизации
- 3) контролю стерильности

4) только стерилизации

### **ТИПИЧНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ФАРИНГИТОВ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) клебсиелла
- 2) стафилококки
- 3) вирусы
- 4) гемофильная палочка

### **МОЧА, СОБРАННАЯ ДЛЯ ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТАВЛЕНА В ЛАБОРАТОРИЮ**

- 1) в замороженном виде
- 2) в вертикальном положении
- 3) при комнатной температуре
- 4) в опечатанном контейнере

### **ДИАГНОЗ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА СТАВИТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА ОСНОВАНИИ**

- 1) клинической картины
- 2) стадии гипертонической болезни
- 3) величины диастолического АД
- 4) эффективности антигипертензивных средств

### **ТИПИЧНАЯ КАРТИНА ЗЕВА ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ АНГИНЕ У ПАЦИЕНТА С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ**

- 1) гиперемию, отек мягкого неба, небных миндалин
- 2) появление папул на гиперемированной поверхности небных миндалин, небных дужек, мягкого неба, которые в дальнейшем превращаются в пузырьки белесовато-серого цвета, затем в эрозии
- 3) гиперемию, отек мягкого неба, небных миндалин, точечные налеты в лакунах, которые в дальнейшем превращаются в обширные язвы
- 4) гиперемию, отек мягкого неба, небных миндалин, задней стенки глотки

### **ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕСЯЧНОГО ЗАПАСА ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК III ПЕРЕЧНЯ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ КАТЕГОРИИ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 1

### **НЕИНФИЦИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ОТНОСЯТ К КАТЕГОРИИ**

- 1) условно чистых
- 2) чистых



- 3) грязных
- 4) загрязненных

### **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА РУКИ РЕАНИМАТОРА РАСПОЛАГАЮТСЯ ГРУДИНЫ ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) чуть выше середины (на 1-2 поперечных пальца выше середины грудины)
- 2) на границе верхней и средней трети
- 3) на границе средней и нижней трети (на 2-3 поперечных пальца вверх от мечевидного отростка)
- 4) на мечевидном отростке

### **МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОСТОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПО СМЕНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) журнал регистрации температурящих пациентов
- 2) порционное требование в 2 экземплярах
- 3) журнал приема и передачи дежурств
- 4) журнал учета ядовитых и сильнодействующих препаратов

### **ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И УРЕТРЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ**

- 1) бронхофиброскопа
- 2) колоноскопа
- 3) цистоскопа
- 4) ректоманоскопа

### **ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ ПРОВОДЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ОБСЛЕДОВАНИЯ**

- 1) УЗИ брюшной полости
- 2) цистоскопию
- 3) лапороскопию
- 4) урографию

### **ПРИ ОБРАБОТКЕ РАН НА ДОВРАЧЕБНОМ ЭТАПЕ НЕОБХОДИМО**

- 1) тщательно промыть раневую поверхность растворами антисептиков с помощью пульверизатора или тампона
- 2) обработать только кожу вокруг раны растворами антисептиков
- 3) промыть раневую поверхность водой с мылом
- 4) обработать края раны растворами антисептиков, ввести в рану турунды с растворами антисептиков

### **КОМПЕТЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА**

- 1) оксигенотерапии
- 2) введение эуфиллина внутривенно
- 3) проведение отвлекающих процедур

4) введение антибиотиков

**МЕТОД УДЕРЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТА «ЗАХВАТ ЧЕРЕЗ РУКУ» ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПАЦИЕНТА**

- 1) к изголовью кровати
- 2) на бок
- 3) к спинке стула
- 4) при ходьбе

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОСЛОЖНЯЕТСЯ РАЗВИТИЕМ ОСТРОЙ ИНФЕКЦИИ ИЗ-ЗА МАССОВОЙ ИНФИЦИРОВАННОСТИ ВИРУЛЕНТНОЙ ФЛОРОЙ ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ РАН**

- 1) рвано-ушибленных
- 2) огнестрельных
- 3) колотых
- 4) укушенных

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ АРТЕРИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО**

- 1) отсутствию болевых ощущений у пострадавшего при давлении в точку прижатия
- 2) исчезновению пульса ниже места прижатия
- 3) правильности нахождения точки пальцевого прижатия
- 4) уменьшению или остановке кровотечения

**ТОВАРНЫЕ ВИДЫ ШПРИЦОВ ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНЫХ ВЛИВАНИЙ ВЫПУСКАЮТСЯ ОБЪЕМОМ \_\_\_\_\_ И \_\_\_\_\_ (В МЛ)**

- 1) 2; 5
- 2) 1; 3
- 3) 4; 7
- 4) 6; 10

**ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ С НОСОВЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В СОЗНАНИИ, НЕОБХОДИМО**

- 1) уложить его на бок, приложить холод к носу
- 2) плотно засунуть ему в каждый носовой ход ватно-марлевые тампоны, смоченные перексидом водорода
- 3) усадить его с запрокинутой назад головой и зажать ему нос на 15-20 минут
- 4) усадить его со слегка наклоненной вперед головой и зажать ему нос на 15-20 минут

**ДЛЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ КОКЛЮША ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) химическую вакцину
- 2) бактериофаг
- 3) живую вакцину
- 4) инактивированную вакцину

**СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИСТАХ СО СРЕДНИМ**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ (МЕДИЦИНСКИМ) ОБРАЗОВАНИЕМ, ФЕЛЬДШЕР  
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА ОТНОСИТСЯ К**

- 1) лечебно-диагностической группе
- 2) лечебной группе
- 3) группе усиления
- 4) группе управления

**ОБМОРОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) полным выключением сознания с тотальной утратой восприятия
- 2) снижением зрачковых реакций
- 3) кратковременной потерей сознания
- 4) выпадением корнеального рефлекса

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ИММУНИЗАЦИИ ВАКЦИНОЙ АКДС:**

- 1) прогрессирующее заболевание нервной системы
- 2) экссудативно-катаральный диатез
- 3) недоношенность
- 4) перинатальная энцефалопатия

**ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА МОЖНО  
ОТМЕНИТЬ ПОСЛЕ ТРЕТЬЕЙ ИНЪЕКЦИИ ВАКЦИНЫ, ЕСЛИ**

- 1) у пациента выявлены медицинские противопоказания
- 2) выяснилось, что пациент был укушен неизвестной собакой на территории, где бешенство среди собак не регистрировалось более 5 лет
- 3) получен отрицательный результат люминесцентной микроскопии при исследовании материала от животного
- 4) животное, подозреваемое в качестве источника инфекции, оставалось здоровым при наблюдении в течение 10 дней после контакта с пациентом

**ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (ВРЕМЯ В МИНУТАХ)**

- 1) 1 - 2
- 2) 15 - 20
- 3) 5
- 4) 10

**ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ КЕТГУТ ОТНОСИТСЯ К ТОВАРАМ**

- 1) медицинским
- 2) хирургическим
- 3) клиническим
- 4) фармацевтическим

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПНЕВМОНИИ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К  
ДЕСТРУКЦИИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гемофильная палочка
- 2) стафилококк

- 3) пневмококк
- 4) синегнойная палочка

**ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ) О ВЗЫСКАНИИ С ВИНОВНОГО РАБОТНИКА СУММЫ ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕГО СРЕДНЕГО МЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА, МОЖЕТ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕН НЕ ПОЗДНЕЕ \_\_\_\_ МЕСЯЦА/МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ \_\_\_\_\_ УЩЕРБА**

- 1) одного; обнаружения причиненного работником
- 2) шести; окончательного установления работодателем размера причиненного
- 3) двух; обнаружения причиненного работником
- 4) одного; окончательного установления работодателем размера причинного

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДОМАШНЕЙ ПНЕВМОНИИ У ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хламидия
- 2) легионелла
- 3) микопlasма
- 4) пневмококк

**БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ ПРИСТУПАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НОЧНЫМИ, ЗАТРУДНЕННОГО ДЫХАНИЯ, ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В НЕДЕЛЮ, КОТОРЫЕ КУПИРУЮТСЯ ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОНХОЛИТИКОВ И ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ, РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК**

- 1) легкая персистирующая
- 2) тяжелая персистирующая
- 3) среднетяжелая персистирующая
- 4) легкая интермиттирующая

**СНИЖЕНИЕ АЛЬБУМИНОВ КРОВИ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ**

- 1) диспротеинемии
- 2) нарушения всасывания белков из кишечника
- 3) нарушения синтетической функции гепатоцитов
- 4) портальной гипертензии

**ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ В ДАННОМ НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ ИЛИ НА ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОТНОСЯТСЯ К \_\_\_\_\_ НАСЕЛЕНИЮ**

- 1) наличному
- 2) неактивному
- 3) постоянному
- 4) занятому

**ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 1 РАЗ В \_\_\_\_\_ ГОД(А)**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

**КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СЧИТАЮТСЯ МЕСТАМИ \_\_\_\_\_ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

- 1) временного
- 2) постоянного
- 3) эпизодического
- 4) регулярного

**В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ**

- 1) психотерапевтические
- 2) экологические
- 3) немедикаментозные
- 4) диагностические

**ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕМ СРЕДСТВЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ УЧИТЫВАЕТ**

- 1) количество суток в расчетном периоде
- 2) объем дезинфицирующего раствора
- 3) фактический срок годности раствора в сутках
- 4) количество обрабатываемого материала

**ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ЗА СБОР И ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗНАЧАЕТ**

- 1) руководитель организации
- 2) главная медицинская сестра
- 3) врач-эпидемиолог
- 4) представитель Роспотребнадзора

**ПОРАЖЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гастритом
- 2) тошнотой
- 3) запорами
- 4) рвотой

**ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА К ВОЗБУДИТЕЛЯМ ИНФЕКЦИЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- 1) серологический мониторинг
- 2) диспансеризация
- 3) профилактический осмотр
- 4) скрининг

**В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО СОЗНАНИЯ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМО ВЫЗВАТЬ**

- 1) после оказания первой помощи
- 2) после проведения сердечно-легочной реанимации
- 3) сразу
- 4) после проверки дыхания

**В ФОРМЕ № 025-1/У «ТАЛОН ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ» ПОДЛЕЖАТ УЧЕТУ**

- 1) посещения врачей любых специальностей, ведущих прием в амбулаторных условиях, в том числе консультативный прием
- 2) случаи оказания медицинской помощи медицинскими работниками станций (отделений) скорой медицинской помощи
- 3) обследования в рентгеновских отделениях (кабинетах), лабораториях и других вспомогательных отделениях (кабинетах) медицинской организации
- 4) случаи оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме на занятиях физической культурой, учебно-спортивных мероприятиях

**НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ИЗ СПИСКА II ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) масло каннабиса
- 2) лизергиновая кислота
- 3) кокаин
- 4) медазепам

**САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОБУСЛОВЛЕН**

- 1) бактериальной инфекцией
- 2) снижением чувствительности тканей к инсулину
- 3) абсолютным дефицитом инсулина
- 4) психоэмоциональными перегрузками

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПЕНИЦИЛЛИНОВОГО РЯДА ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ АНГИНЕ, ВЫЗВАННОЙ**

- 1) синегнойной палочкой
- 2) бета-гемолитическим стрептококком группы А
- 3) вирусами
- 4) стафилококками

**ЭВАКУАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАТЬСЯ**

- 1) в 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года
- 2) в случае возникновения пожара

- 3) по окончании рабочего дня
- 4) при прекращении электропитания рабочего освещения

**ПОДДЕРЖАНИЕ ОХВАТА ПРИВИВКАМИ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ %**

- 1) 30
- 2) 50
- 3) 95
- 4) 70

**ПАЦИЕНТУ С ЯВЛЕНИЯМИ ОТЕКА ЛЕГКИХ НЕОБХОДИМО ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) с приподнятым головным концом кровати
- 2) лежа на боку
- 3) сидя с упором на руки
- 4) ортопноэ

**К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Г ОТНОСЯТСЯ**

- 1) операционные, послеоперационные палаты
- 2) ваннные залы (кроме радоновых), помещения подогрева парафина и озокерита
- 3) залы лечебной физкультуры
- 4) помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях

**СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ И ИСКУССТВЕННЫХ ВДОХОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛР**

- 1) на 15 компрессий - 2 вдоха
- 2) на 30 компрессий - 2 вдоха
- 3) на 6 компрессий - 3 вдоха
- 4) на 5 компрессий - 1 вдох

**В СЛУЧАЕ ВЗЯТИЯ КРОВИ ИЗ ПАЛЬЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦОЛИКЛОНОВ НЕОБХОДИМО БРАТЬ КАПЛИ КРОВИ**

- 1) выделяющиеся после массажа пальца
- 2) первые, выделяющиеся без сильного надавливания на палец
- 3) в зависимости от индивидуальных особенностей взятия крови у данного больного
- 4) первые, выделяющиеся после сильного однократного сдавливания пальца

**СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ МЕНИНГИТЕ ВЫГЛЯДИТ КАК**

- 1) мутная жидкость с наличием хлопьев или геморрагических сгустков
- 2) гнойная жидкость, выпадает осадок с включениями зеленого или ржавого цвета
- 3) прозрачная жидкость, при стоянии выпадает осадок с включениями зеленого цвета
- 4) прозрачная или опалесцирующая жидкость, при стоянии выпадает фибрин в виде нитей или тонкой пленки

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ**

- 1) подтверждающим прохождение аттестации медицинским работником
- 2) определяющим уровень квалификации медицинского работника
- 3) подтверждающим освоение программ дополнительного профессионального образования
- 4) дающим право на осуществление медицинской деятельности

**КОГДА ПРИ ВИЗУАЛЬНОМ КОНТАКТЕ, ДЛЯЩЕМСЯ БОЛЕЕ 3 СЕКУНД, КОММУНИКАТОРЫ МОГУТ ИСПЫТЫВАТЬ ЖЕЛАНИЕ ОТВЕСТИ ВЗГЛЯД, ЭТО ГОВОРIT О**

- 1) желаний взять слово
- 2) развитию доверительных отношений при знакомстве
- 3) возникновении у них дискомфорта
- 4) повышении уровня эмпатии у коммуникаторов

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНAM ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ**

- 1) средств обязательного медицинского страхования
- 2) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ
- 3) исключительно из личных средств граждан
- 4) средств добровольного медицинского страхования

**ПЕРИОД СОБСТВЕННО КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА ПРЕКРАЩЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ДЛИТСЯ (В МИНУТАХ)**

- 1) 30-60
- 2) 2-3
- 3) 4-5
- 4) 10-15

**СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА ВНОСЯТСЯ В УЧЁТНУЮ ФОРМУ**

- 1) «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» (форма № 058/у)
- 2) «Карта обратившегося за антирабической помощью» (форма № 045/у)
- 3) «Журнал регистрации микробиологических и паразитологических исследований» (форма № 252/у)
- 4) «Карта профилактических прививок» (форма № 063/у)

**ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ГРЕЛКИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ**

- 1) герметичности
- 2) плотности сжатия
- 3) времени наполнения водой
- 4) максимальной высоты наполнения

**ГЕМОТРАНСФУЗИОННОЙ ШОК РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ**

- 1) глубокотравматичных операциях



- 2) тяжелых инфекционных заболеваниях
- 3) переливании несовместимой крови
- 4) большой потери крови

### **2% ВОДНЫЙ РАСТВОР КАРБОЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПОМЕЩАЕТСЯ В ШКАФАХ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ХРАНЕНИИ**

- 1) резиновых изделий
- 2) шовного материала
- 3) пластмассовых изделий
- 4) перевязочных средств

### **МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УНИЧТОЖАЮТ ПУТЕМ**

- 1) разрезания
- 2) раздавливания первичной упаковки
- 3) сжигания
- 4) дробления

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К ИММУНИЗАЦИИ ВАКЦИНОЙ БЦЖ**

- 1) аллергическая реакция на перепелиные яйца
- 2) прогрессирующее заболевание нервной системы
- 3) аллергическая реакция на пекарские дрожжи
- 4) масса ребенка при рождении менее 2000 г

### **ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ НА ДОВРАЧЕБНОМ ЭТАПЕ ПРОВОДЯТ**

- 1) активную антидотную терапию
- 2) активную синдромную терапию
- 3) активную детоксикацию
- 4) любое активное воздействие, которое возможно провести

### **ВСЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ НА**

- 1) вербальные и невербальные
- 2) традиционные и нетрадиционные
- 3) устные и письменные
- 4) эффективные и неэффективные

### **ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА - ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛИЦЕНЗИЙ НА ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОБЯЗАНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРОВОДИТЬ**

- 1) сдачу пустых ампул наркотических средств
- 2) подсчет пустых ампул психотропных средств
- 3) опись наркотических средств и психотропных веществ
- 4) инвентаризацию наркотических средств и психотропных веществ, находящихся в распоряжении указанных лиц

**ВЕДУЩИМ МЕРОПРИЯТИЕМ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) половое воспитание в семье
- 2) выявление и лечение больных острым вирусным гепатитом В
- 3) вакцинопрофилактика
- 4) выявление и лечение больных хроническим вирусным гепатитом В

**ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНОГО С ПОЛИСЕГМЕНТАРНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СНИЖАЕТСЯ**

- 1) объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1)
- 2) жизненная емкость легких (ЖЕЛ)
- 3) индекс Тиффно
- 4) максимальная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 25-75 % (МОС25-75)

**В ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВШИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЛИЦ СТАРШЕ 50 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ (%)**

- 1) 20-25
- 2) 75-80
- 3) 10-15
- 4) 45-50

**ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРИЖИГАЮЩИМИ ЯДАМИ ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРОВОДЯТ**

- 1) на фоне обезболивания
- 2) только после интубации трахеи
- 3) только в присутствии врача
- 4) только в стационаре

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЧАСТО И (ИЛИ) ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) I
- 2) IV
- 3) II
- 4) V

**АБСОЛЮТНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) количественным выражением признаков статистических явлений
- 2) качественной характеристикой изучаемого явления
- 3) характеристикой для сравнения и сопоставления совокупностей
- 4) критерием для обобщающей характеристики совокупности

**К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ**

- 1) пол
- 2) курение

- 3) неблагоприятный семейный анамнез
- 4) возраст

**ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ТЕЛА ДЛЯ ПОСТРАДАВШЕГО С КРОВОПОТЕРЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лежа на правом боку
- 2) лежа на левом боку
- 3) полусидя
- 4) лежа, с приподнятыми ногами

**НАИБОЛЬШИЙ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА «С» СВЯЗАН С**

- 1) половыми контактами
- 2) проведением парентеральных лечебных процедур
- 3) внутривенным введением наркотических и психотропных веществ
- 4) вертикальной передачей

**В ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ ЛЕЖИТ**

- 1) длительность курса лечения
- 2) местные сдвиги в кожных покровах и слизистых оболочках
- 3) влияние температурного, химического и механического факторов
- 4) нервно-рефлекторные и гуморальные реакции организма

**ПАЦИЕНТУ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ РЕТИНОПАТИЕЙ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА**

- 1) невролога
- 2) офтальмолога
- 3) хирурга
- 4) терапевта

**ВНЕЗАПНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ НОЧЬЮ У РЕБЕНКА 2 ЛЕТ «ЛАЮЩЕГО» КАШЛЯ, ОСИПЛОСТИ ГОЛОСА И СТРИДОРНОГО ДЫХАНИЯ**

- 1) острого тонзиллита
- 2) приступа бронхиальной астмы
- 3) острого обструктивного ларинготрахеита
- 4) острого бронхита

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ**

- 1) рыбу
- 2) мясо
- 3) гречневую кашу
- 4) овощи

**ОТЛИЧИЕ В КОНСТРУКЦИИ МАЛЫХ ПОВЯЗОК МЕДИЦИНСКИХ СТЕРИЛЬНЫХ ОТ**

## **БОЛЬШИХ ПОВЯЗОК МЕДИЦИНСКИХ СТЕРИЛЬНЫХ СОСТОИТ В НАЛИЧИИ**

- 1) внутренней оболочки
- 2) марлевого бинта
- 3) бандероли
- 4) наружной оболочки

## **ТРИГГЕРЫ – ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОБОСТРЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА**

- 1) боли в сердце, животе
- 2) стресс
- 3) респираторные вирусные инфекции, физическая нагрузка, холодный воздух
- 4) бессонница, трудное засыпание

## **ПРИ ПНЕВМОНИИ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН \_\_\_\_\_ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ**

- 1) внутривенный
- 2) внутримышечный
- 3) пероральный
- 4) сочетанный (внутримышечный и пероральный)

## **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА АБСОЛЮТНЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ РИСК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ У ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ**

- 1) 18-25 лет включительно
- 2) 26-39 лет
- 3) 65 лет и старше
- 4) 40-64 года включительно

## **ЭЛЕМЕНТ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ РВОТЕ**

- 1) обильное щелочное питье
- 2) применение пузыря со льдом на эпигастральную область
- 3) промывание желудка
- 4) обработка полости рта

## **ПРИ ПЛАНОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ НА СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТЫ ДЕТСКИХ СТАЦИОНАРОВ ДО 2 ЛЕТ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДЛЕЖАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ НА**

- 1) кишечные инфекции
- 2) грипп
- 3) мононуклеоз
- 4) ротавирусные инфекции

## **НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ (ГОСПИТАЛЬНОЙ) ПНЕВМОНИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) клебсиелла
- 2) хламидия

- 3) микоплазма
- 4) пневмококк

### **НА ДОВРАЧЕБНОМ ЭТАПЕ НА РАНУ НАКЛАДЫВАЮТ**

- 1) повязки с растворами антисептиков
- 2) сухие асептические повязки
- 3) повязки, смоченные физиологическим раствором
- 4) полуспиртовые повязки

### **АМБУЛАТОРНО ПНЕВМОНИЮ ЛЕЧАТ**

- 1) по просьбе пациента
- 2) у молодых больных при легком или среднетяжелом течении заболевания
- 3) у лиц с сахарным диабетом
- 4) у пожилых пациентов

### **АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) расслаивающая аневризма аорты
- 2) беременность и первая неделя после родов
- 3) прием антагонистов витамина К
- 4) травматическая и длительная сердечно-легочная реанимация

### **ПРИЧИНОЙ ИНФИЦИРОВАНИЯ ГЕПАТИТОМ С МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) пользование общей посудой
- 2) употребление недоброкачественной воды
- 3) прямое переливание крови без обследования донора
- 4) употребление просроченных продуктов питания

### **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА**

- 1) лучевой артерии;
- 2) сонной артерии
- 3) брюшной артерии
- 4) тыльной стороне стопы

### **ТИП ОДЫШКИ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ**

- 1) экспираторный
- 2) инспираторный
- 3) смешанный
- 4) стридорозный

### **ОБЩИЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК ОТКРЫВАЕТСЯ В \_\_\_\_\_ КИШКУ**

- 1) тощую
- 2) подвздошную
- 3) сигмовидную
- 4) двенадцатиперстную

## **К РАЗВИТИЮ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИВОДИТ**

- 1) повышение давления в малом круге кровообращения
- 2) спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки бронхов и скопление вязкой мокроты
- 3) воспаление плевральных листков
- 4) отек гортани

## **ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВЕДУТ**

- 1) по каждому виду вакцин
- 2) только по инаktivированным вакцинам
- 3) только по живым вакцинам
- 4) только по импортным вакцинам

## **ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-АНЕСТЕЗИСТ С 5-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ДОЛЖНА ПРОЙТИ**

- 1) повышение квалификации по специальности «Анестезиология и реаниматология»
- 2) профессиональную переподготовку по специальности «Анестезиология и реаниматология»
- 3) профессиональную переподготовку по специальности «Лечебное дело»
- 4) повышение квалификации по специальности «Организация сестринского дела»

## **МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ С УЧЁТОМ АНАМНЕЗА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВАКЦИНИРОВАНЫ ПРОТИВ КОРИ И**

- 1) папилломавирусной инфекции
- 2) краснухи
- 3) полиомиелита
- 4) вирусного гепатита В

## **ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТОВ ИЗ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ ВО ВТОРУЮ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О(ОБ)**

- 1) индексе здоровья населения
- 2) низкой эффективности диспансерного наблюдения
- 3) полноту охвата диспансерным наблюдением
- 4) своевременности охвата диспансерным наблюдением больных

## **ХАРАКТЕРНОЙ ТРИАДОЙ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) боль в животе, желтуха, высокая температура
- 2) боль в животе, метеоризм, диарея
- 3) боль в животе, рвота «кофейной гущей», мелена
- 4) боль в животе, прожилки крови в кале, слизь в кале

### **НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ПРИ ГАСТРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дыхательный уреазный тест
- 2) эзофагогастродуоденоскопия
- 3) анализ кала на скрытую кровь
- 4) фракционное желудочное зондирование

### **МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДМЕТЫ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ КРОВЬЮ И/ИЛИ ДРУГИМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ**

- 1) Д
- 2) В
- 3) Б
- 4) Г

### **ДИЕТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) ограничение острых и мясных блюд из свинины и баранины
- 2) увеличение потребления жидкости и сладостей
- 3) ограничение жидкости и соли
- 4) увеличение потребления жиров и пряностей

### **ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ, НАНЕСЕННЫХ ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ, ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) антистолбнячную вакцину
- 2) антистолбнячный анатоксин
- 3) антирабический гамма-глобулин
- 4) антирабический гамма-глобулин+антирабическая вакцина

### **ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ НА ДОВРАЧЕБНОМ ЭТАПЕ НИТРОГЛИЦЕРИН МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПОВТОРНО С ИНТЕРВАЛОМ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 5-10
- 2) 20-30
- 3) 5
- 4) 10-15

### **УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРОВОДИТСЯ В КАБИНЕТЕ**

- 1) физиотерапевтическом
- 2) функциональной диагностики
- 3) рентгенологическом
- 4) электрокардиографии

### **АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) острый перикардит
- 2) стеноз ствола левой коронарной артерии
- 3) гипертрофическая кардиомиопатия

4) острый инфаркт миокарда в течение первых 2 месяцев

### **ОБРАБОТКА ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ КОЖИ С ПОМОЩЬЮ КОЖНОГО АНТИСЕПТИКА**

- 1) обладающего моющими свойствами
- 2) обладающего спороцидными свойствами
- 3) содержащего краситель
- 4) спиртосодержащего

### **КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ТОНИЧЕСКИХ СУДОРОГ ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИСТУПЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рот широко открыт
- 2) цианоз лица
- 3) опистотонус
- 4) размыкание челюстей и высовывание языка наружу

### **ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТАЮЩИХ ПРОВОДЯТ В**

- 1) дни отпуска за счет работника
- 2) свободное от работы время
- 3) дни очередного отпуска
- 4) рабочее время

### **СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ДОЛЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПОЛИКЛИНИКИ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ СПЕЦИАЛИСТ, ИМЕЮЩИЙ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) акушерское дело
- 2) лечебное дело
- 3) сестринское дело в педиатрии
- 4) организация сестринского дела

### **ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА УДУШЬЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ**

- 1) лежа на животе
- 2) сидя на корточках
- 3) сидя, слегка наклонившись вперед с прочным упором на руки
- 4) лежа на правом боку

### **РАЗВЕДЕННАЯ ВАКЦИНА БЦЖ**

- 1) может храниться в шкафу два дня
- 2) может храниться в морозильной камере неделю
- 3) может храниться в холодильнике три дня
- 4) должна быть уничтожена в конце рабочего дня

### **ЛЕЧЕБНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР ТАЛЛАСОТЕРАПИИ**



- 1) морские купания
- 2) горный воздух
- 3) лечебная грязь
- 4) солнечная радиация

### **ЭМПАТИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) способностью человека представить, как он воспринимается партнёром по общению
- 2) способностью сообщать о понимании клиента, возникающего в результате ролевого отождествления с ним
- 3) способностью индивида действовать согласно своей совести
- 4) способностью к чрезмерному обобщению чего-то или кого-то

### **ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПРОВОЦИРУЕТ**

- 1) стресс
- 2) избыток фруктов
- 3) прием жирной пищи
- 4) переохлаждение

### **ЛАБОРАТОРНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭНТЕРОБИОЗА ПОЛУЧАЮТ ПРИ**

- 1) исследовании кала на яйца гельминтов
- 2) бактериологическом исследовании кала
- 3) копрологическом исследовании кала
- 4) исследовании перианального соскоба

### **УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ 058/У ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования
- 2) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
- 3) статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов
- 4) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, психического заболевания

### **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА БОЛЬНЫХ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА (В ДНЯХ)**

- 1) 20
- 2) 14
- 3) 7
- 4) 10

**ПРИ НАЛИЧИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В КОСМЕТОЛОГИИ» ДОЛЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО КОСМЕТОЛОГИИ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ЛИЦО СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ**

## **ОБРАЗОВАНИЕМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) акушерское дело
- 2) фармация
- 3) медико-профилактическое дело
- 4) медицинский массаж

## **ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТА С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ НЕОБХОДИМО**

- 1) убрать из-под головы подушку
- 2) приподнять ноги
- 3) избегать изменений положения головы
- 4) часто менять положение головы и туловища

## **ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ 1 РАЗ В**

- 1) полгода
- 2) год
- 3) 2 года
- 4) месяц

## **ПРИ УТОПЛЕНИИ В МОРСКОЙ ВОДЕ БЫСТРЕЕ ВСЕГО РАЗВИВАЕТСЯ**

- 1) сердечная недостаточность
- 2) одышка
- 3) коллапс
- 4) отек легких

## **ПРЕКУРСОРОМ ИЗ СПИСКА IV ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) метадона промежуточный продукт
- 2) петидин
- 3) дезоморфин
- 4) эфедрин

## **ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА НЕОБХОДИМО**

- 1) обезболить
- 2) оставить пострадавшего в том же положении, в котором он был найден
- 3) уложить на левый бок
- 4) уложить на спину

## **ЖИВАЯ ВАКЦИНА И ИНАКТИВИРОВАННАЯ ВАКЦИНЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ НА**

- 1) одной полке
- 2) разных полках
- 3) самой нижней полке
- 4) самой верхней полке

**НОРМАЛЬНОЕ АД НАХОДИТСЯ В ИНТЕРВАЛЕ (В ММ РТ. СТ.)**

- 1) 120/80-130/90
- 2) 100/60-139/89
- 3) 110/70-150/85
- 4) 100/60-140/95

**КАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРОСТЕЙШИХ ДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ**

- 1) не позднее 24-х часов с момента дефекации
- 2) в течение 3-х суток, если хранение осуществлялось при температуре – 3-5°C
- 3) через 1 час
- 4) немедленно тёплым

**УНИЧТОЖЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПО МЕРЕ НАКОПЛЕНИЯ, НО НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 9
- 2) 12
- 3) 6
- 4) 3

**ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА**

- 1) полные
- 2) контрольные
- 3) плановые
- 4) частичные

**РАННИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ СКАРЛАТИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отит
- 2) полиартрит
- 3) панкреатит
- 4) аппендицит

**СОБРАННЫЕ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО ПРОБЫ МОЧИ ТРАНСПОРТИРУЮТ В  
ЛАБОРАТОРИЮ В**

- 1) термоконтейнере
- 2) замороженном виде
- 3) вертикальном положении
- 4) опечатанном контейнере

**К АССОЦИИРОВАННЫМ СОСТОЯНИЯМ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ОТНОСЯТ**

- 1) микроальбуминурию и соотношение альбумина к креатинину (30-300мг/г; 3,4-34мг/ммоль)
- 2) скорость каротидно-феморальной пульсовой волны > 10м/секи лодыжечно-плечевой индекс <0,9
- 3) ранние сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе

4) ИБС: инфаркт миокарда, стенокардию, коронарную реваскуляризацию

### **ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ**

- 1) проводится по желанию родителей
- 2) не проводится
- 3) проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок
- 4) проводится по индивидуальному плану только в периоды стойкой ремиссии

### **К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ**

- 1) тетрада Фалло
- 2) открытое овальное окно
- 3) аневризма межпредсердной перегородки
- 4) евстахиев клапан

### **ДЛЯ РАСЧЕТА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ШКАЛА**

- 1) визуально-аналоговая
- 2) Морсе
- 3) SCORE
- 4) Глазго

### **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ А ОТНОСЯТСЯ**

- 1) операционные, послеоперационные палаты
- 2) послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка, палаты для недоношенных
- 3) палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений
- 4) «чистая» и «стерильная» зоны стерилизационного отделения

### **МЫТЬЕ ОКОННЫХ СТЕКОЛ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СНАРУЖИ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В**

- 1) год
- 2) неделю
- 3) полгода
- 4) 3 месяца

### **ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА В**

- 1) рамках медицинского освидетельствования
- 2) качестве самостоятельного мероприятия
- 3) рамках диспансеризации
- 4) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема)

## **СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ПО**

- 1) нозологиям
- 2) моделям пациентов
- 3) возрасту
- 4) полу

## **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО**

- 1) следить за соблюдением строгого постельного режима
- 2) запретить курение
- 3) предложить средство, купирующее кашель
- 4) проводить дыхательную гимнастику, массаж

## **ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО БРОНХИТА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) очаговая пневмония
- 2) хронический бронхит
- 3) туберкулез
- 4) рак легкого

## **ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕХНИК ЭФФЕКТИВНОГО МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) контраргументация
- 2) ориентировка в собеседнике
- 3) активное слушание
- 4) аргументация

## **СПИРОМЕТРИЮ ПРОВОДЯТ НА \_\_\_\_\_ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**

- 1) втором
- 2) первом
- 3) третьем
- 4) четвертом

## **ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА В ЦЕЛОМ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ 1 РАЗ В**

- 1) неделю
- 2) месяц
- 3) квартал
- 4) день

## **НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЖЕГОДНОЙ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) недостаточной привитостью населения и низкой иммуногенностью вакцин
- 2) несвоевременной иммунизацией и высокой заболеваемостью гриппом

- 3) недостаточным охватом населения профилактическими прививками и ежегодными эпидемиями гриппа
- 4) изменчивостью циркулирующих штаммов вируса гриппа и продолжительностью формирующегося иммунитета в 6 месяцев

### **ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТА УДОСТОВЕРЯЕТ СПРАВКА**

- 1) 095-у
- 2) 058-у
- 3) 030-у
- 4) 025-у

### **ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ**

- 1) муколитиков
- 2) противовирусных препаратов
- 3) антибиотиков
- 4) противогрибковых препаратов

### **РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАМКАХ ВТОРОГО ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ**

- 1) рентгенография легких
- 2) маммография
- 3) исследование кала на скрытую кровь
- 4) определение простат-специфического антигена в крови у мужчин

### **ПЕРЦЕПТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) обменом информацией
- 2) восприятием партнерами по общению друг друга
- 3) организацией взаимодействия
- 4) обменом действиями

### **ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) приступообразная острая боль
- 2) резь при мочеиспускании
- 3) ноющая боль в пояснице
- 4) высокая температура

### **РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ, ОБОЗНАЧАЮЩУЮ СТРУКТУРНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ВЫБОРОЧНОЙ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТЕЙ, НАЗЫВАЮТ**

- 1) обобщающей
- 2) качественной
- 3) количественной
- 4) детерминированной

### **ПРИ ПЛАНОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ НА СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТЫ**

**ПСИХИАТРИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДЛЕЖАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ НА**

- 1) мононуклеоз
- 2) ротавирусные инфекции
- 3) грипп
- 4) дифтерию и кишечные инфекции

**МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ**

- 1) ингаляции бронхолитиков
- 2) сосудорасширяющие средства
- 3) грязелечение
- 4) жемчужные ванны

**ПЕРКУТОРНЫЙ ЗВУК НАД ЛЕГКИМИ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА УДУШЬЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ**

- 1) тупой
- 2) коробочный
- 3) притупленно-тимпанический
- 4) тимпанический

**ПО СТЕПЕНИ НОРМИРУЕМОГО МИКРОБНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ КЛАССЫ ЧИСТОТЫ Г ОТМЕЧАЕТСЯ КАК**

- 1) «грязное» помещение, количество микроорганизмов не нормируется
- 2) особо чистое помещение
- 3) условно чистое помещение, количество микроорганизмов не нормируется
- 4) чистое помещение

**ГАЗООТВОДНУЮ ТРУБКУ СТАВЯТ МАКСИМАЛЬНО НА**

- 1) 30 мин
- 2) 1 час
- 3) на ночь
- 4) 2 часа

**К ОСТРЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) кетоацидоз
- 2) диабетическая нефропатия
- 3) офтальмопатия
- 4) артериальная гипертензия

**ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ В СТАЦИОНАР ПРОВОДИТСЯ**

- 1) в обязательном порядке
- 2) по тяжести состояния
- 3) по решению врача-эпидемиолога
- 4) по желанию родителей

## **ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛОТКИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) тонзиллитом
- 2) ринитом
- 3) ларингитом
- 4) фарингитом

## **ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕМ СРЕДСТВЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ МНОГОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) фактический срок годности моющего раствора в сутках
- 2) количество суток в расчетном периоде
- 3) объем раствора дезинфицирующего средства
- 4) общую площадь многоразового контейнера

## **НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА**

- 1) катетеризация мочевого пузыря
- 2) резкое ограничение жидкости
- 3) обеспечение мочеприемником
- 4) резкое ограничение соли

## **ЗАПИСЬ О ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАРКОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В**

- 1) процедурном журнале
- 2) листе назначений
- 3) журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в истории болезни
- 4) журнале учета лекарственных препаратов

## **МЫТЬЕ ОКОННЫХ СТЕКОЛ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ ИЗНУТРИ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В**

- 1) неделю
- 2) полгода
- 3) месяц
- 4) год

## **ПРИ ОЦЕНКЕ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО К ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТ**

- 1) средний доход на душу населения
- 2) продолжительность жизни населения
- 3) прожиточный минимум
- 4) региональный внутренний продукт

## **В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СБОРОМ, ВРЕМЕННЫМ ХРАНЕНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КОНТРОЛЬ**



**ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В**

- 1) месяц
- 2) полгода
- 3) год
- 4) квартал

**ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИМИ СЧИТАЮТ ЛИЦ, БОЛЕВШИХ В ГОДУ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ**

- 1) 10
- 2) 30
- 3) 40
- 4) 20

**К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ В ОТНОСЯТСЯ**

- 1) комнаты управления рентгеновских кабинетов и радиологических отделений, фотолаборатории
- 2) палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных
- 3) кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов
- 4) помещения для мытья и стерилизации столовой и кухонной посуды при буфетных и столовых отделениях

**ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лимфоцитоз мокроты
- 2) усиление одышки
- 3) лихорадка и гнойная мокрота
- 4) увеличение количества сухих хрипов при аускультации

**СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ КОДЕКУ РФ НОЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ РАБОТЫ СЧИТАЕТСЯ ВРЕМЯ С \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 20
- 2) 23
- 3) 22
- 4) 19

**У ПАЦИЕНТОВ С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДЯТ КОНТРОЛЬ**

- 1) копрограммы
- 2) общего анализа мочи
- 3) частоты дыхательных движений
- 4) артериального давления

**НА ОСНОВЕ СВЕДЕНИЙ О ПРОХОЖДЕНИИ ГРАЖДАНИНОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ЗАПОЛНЯЕТ**

- 1) форму о диспансеризации определенных групп взрослого населения

- 2) карту учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)
- 3) карту амбулаторного больного
- 4) паспорт здоровья

**ОСНОВНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) повышенная воздушность легких
- 2) ячеистость легочного рисунка
- 3) ателектаз
- 4) легочный инфильтрат

**ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ СОКРАЩАЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ**

- 1) холецистокинина
- 2) гастрин
- 3) панкреатического сока
- 4) секретин

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КРАСНУХИ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)**

- 1) 11
- 2) 12
- 3) 8
- 4) 6

**К ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) ингибиторы ферментов
- 2) антибиотики
- 3) ферменты
- 4) холинолитики

**СОГЛАСНО ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ НА 30 КОЕК ДОЛЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРОЦЕДУРНОЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ИЗ РАСЧЕТА ОДНА ДОЛЖНОСТЬ НА \_\_\_\_\_ КОЕК**

- 1) 15
- 2) 12
- 3) 10
- 4) 20

**СРЕДНЕ ТЯЖЕЛЫЙ ПРИСТУП БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПИКОВОЙ СКОРОСТИ ВЫДОХА (В %)**

- 1) 75-85
- 2) 50-70
- 3) 35-45
- 4) 25-30

**СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТОЛЬКО С ЦЕЛЬЮ**

- 1) сравнения изучаемых показателей
- 2) использования в других формулах
- 3) отображения в отчете медицинской организации
- 4) использования в учетных документах

**ВНЕЗАПНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ НОЧЬЮ У РЕБЕНКА 2-Х ЛЕТ ЛАЮЩЕГО КАШЛЯ, ОХРИПЛОСТИ ГОЛОСА И СТРИДОРОЗНОГО ДЫХАНИЯ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ**

- 1) острого бронхита
- 2) острого стенозирующего ларинготрахеита
- 3) острого тонзиллита
- 4) приступа бронхиальной астмы

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПЕРВУЮ РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 9
- 2) 12
- 3) 15
- 4) 18

**ПРИ КАКОМ ПОРОКЕ СЕРДЦА РАЗВИВАЕТСЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ?**

- 1) дефекте межпредсердной перегородки
- 2) коарктации аорты
- 3) стенозе аорты
- 4) стенозе легочной артерии

**ПРИ РАЗВИТИИ ОТЕКА КВИНКЕ У РЕБЕНКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОРАЖАЮТСЯ УЧАСТКИ ТЕЛА С РЫХЛОЙ ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКОЙ, К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) шея, надключичная область, губы
- 2) паховые складки, передняя брюшная стенка
- 3) ушные раковины, губы, мошонка
- 4) пальца рук и ног

**ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) вирусы и «атипичные» бактерии
- 2) грамположительные бактерии
- 3) грамотрицательные бактерии
- 4) простейшие

**ГЛАСПЕРЛЕНОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В**

- 1) стоматологических отделениях
- 2) эндоскопических отделениях
- 3) операционных

4) перевязочных кабинетах

**АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИИ «ШКОЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ» МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ**

- 1) рекомендации по фитотерапии заболевания
- 2) обучение технике применения дозированных ингаляторов спейсера
- 3) лекцию о правилах питания при бронхиальной астме
- 4) просмотр видеофильма по профилактике обострений бронхиальной астмы

**ПРИ МАССОВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- 1) осмотр с целью выявления ангиопатии
- 2) определение гликемии натощак
- 3) ультразвуковое обследование органов брюшной полости
- 4) определение глюкозурии

**БАРЬЕРОМ В ОБЩЕНИИ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) положительная обратная связь
- 2) критика и советы
- 3) искреннее сочувствие
- 4) активное слушание

**ОТЕК, НЕПОСРЕДСТВЕННО УГРОЖАЮЩИЙ ЖИЗНИ**

- 1) отек Квинке
- 2) гидроцеле
- 3) гидронефроз
- 4) асцит

**ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ К НОЧНЫМ, СВЕРХУРОЧНЫМ, РАБОТАМ В ВЫХОДНЫЕ, НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, НАПРАВЛЕНИЕ В КОМАНДИРОВКИ**

- 1) разрешается только в связи с производственной необходимостью
- 2) разрешается только с согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
- 3) запрещается
- 4) разрешается с письменного согласия женщин

**СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ АКДС**

- 1) подкожно
- 2) внутрикожно
- 3) через рот
- 4) внутримышечно

**ЕСЛИ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ВОЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА РАБОТНИКОМ ПРОИЗВОДИТСЯ С РАССРОЧКОЙ**

### **ПЛАТЕЖА, ТО РАБОТНИК**

- 1) самостоятельно определяет порядок возмещения ущерба в пределах срока его возмещения на основании соглашения с работодателем
- 2) должен выплачивать часть суммы в счет погашения ущерба каждый квартал
- 3) должен выплачивать часть суммы в счет погашения ущерба при каждой выплате зарплаты
- 4) обязан предоставить работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей

### **ВИРУЛИЦИДНОЕ СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ**

- 1) умерщвление грибов
- 2) гибель бактерий в вегетативной форме
- 3) инактивацию вирусов
- 4) гибель спор микроорганизмов

### **ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ КРОВИ НА СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) промывание водой
- 2) обработку 1% раствором протаргола
- 3) обработку слизистых иммуноглобулином
- 4) промывание водой с мылом

### **ВОЗБУДИТЕЛЕМ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) менингококк
- 2) вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
- 3) цитомегаловирус (ЦМВ)
- 4) вирус гриппа

### **БАЗОВЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) сестринское дело
- 2) медико-профилактическое дело
- 3) акушерское дело
- 4) лечебное дело

### **НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ИЗ СПИСКА I ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) героин
- 2) галазепам
- 3) хлорэфедрин
- 4) бромистый этил

### **ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ» НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЕ ОБ УРОВНЕ**

- 1) глюкозы в крови
- 2) белка в крови
- 3) ферментов поджелудочной железы в крови
- 4) белка в моче

**КАПИЛЛЯРНОСТЬ БИНТА МАРЛЕВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ**

- 1) потери в массе при высушивании в проветриваемом помещении
- 2) величины поднятия жидкости по материалу
- 3) плотности ткани как показателю качества исходного сырья
- 4) количества впитываемой жидкости с нейтральной реакцией

**ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кашель с выделением пенистой мокроты
- 2) приступ удушья с затрудненным выдохом
- 3) инспираторная одышка
- 4) одышка смешанного характера

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПЕРВУЮ РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЕТЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ГРУППАМ РИСКА, ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 19
- 2) 12
- 3) 13
- 4) 18

**ПОКАЗАНИЕМ К ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ОБЪЕМЕ 4 СТУПЕНИ ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тяжелая интермиттирующая бронхиальная астма
- 2) тяжелая персистирующая бронхиальная астма
- 3) легкая интермиттирующая бронхиальная астма
- 4) бронхиальная астма физического усилия

**ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРИКРЕПЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) врач-специалист
- 2) медицинский работник, уполномоченный руководителем медицинской организации
- 3) руководитель медицинской организации
- 4) врач-терапевт

**К НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЯМ ПРИ РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ МЕНИНГИТЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСЯТ**

- 1) стрептококк группы Б (*Streptococcusagalactiae*)
- 2) пневмококк (*Streptococcuspneumoniae*)

- 3) синегнойную палочку (*Pseudomonasaeruginosa*)
- 4) грибы рода Кандида (*Candida*)

**ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ**

- 1) ультразвуковое исследование органов малого таза
- 2) эхокардиографию
- 3) рентгенографию органов грудной клетки
- 4) фиброгастроскопию

**ФАКТОРОМ, ПРОВОЦИРУЮЩИМ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) переохлаждение
- 2) чрезмерное физическое и психическое перенапряжение
- 3) гиподинамия
- 4) недостаточное питание

**ПНЕВМОНИЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ ПРОТЕКАЕТ ПО ТИПУ**

- 1) очаговой
- 2) интерстициальной
- 3) полисегментарной
- 4) очагово-сливной

**ХОЛЕСТАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ**

- 1) хронического гепатита С
- 2) первичного билиарного цирроза
- 3) болезни Вильсона
- 4) аутоиммунного гепатита

**СИНДРОМ ПОДРОСТКОВОГО (КАПЕЛЬНОГО) СЕРДЦА ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) одышкой
- 2) брадикардией
- 3) артериальной гипертензией
- 4) обмороками, снижением АД, тахикардией, появлением шума в сердце

**ЕСЛИ СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТА НА КОЙКЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ТО ОБОРОТ КОЙКИ**

- 1) не меняется
- 2) сначала увеличивается, а затем снижается
- 3) увеличивается
- 4) снижается

**ОЦЕНКА ИМЕЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, ОЦЕНКА БУДУЩИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НИХ, РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЭТИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ЭТАПЕ**

- 1) перераспределения

- 2) отбора
- 3) планирования
- 4) набора

**ПРИ ОБШИРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГРУДИ НАКЛАДЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПОВЯЗКА**

- 1) колосовидная
- 2) окклюзионная
- 3) спиральная
- 4) восьмиобразная

**ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСТРОГО БРОНХИТА НЕ ИМЕЕТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ**

- 1) промышленное загрязнение атмосферного воздуха
- 2) переохлаждение
- 3) нарушение режима питания
- 4) наличие вирусных и бактериальных агентов

**ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-АНЕСТЕЗИСТ С 5-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ДОЛЖНА ПРОЙТИ**

- 1) профессиональную переподготовку по специальности «Анестезиология и реаниматология»
- 2) повышение квалификации по специальности «Организация сестринского дела»
- 3) повышение квалификации по специальности «Анестезиология и реаниматология»
- 4) профессиональную переподготовку по специальности «Лечебное дело»

**РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ С ДЕТСТВА ПРИНИМАЕТ**

- 1) заведующий отделением
- 2) участковый педиатр
- 3) медико-социальная экспертная комиссия
- 4) клиничко-экспертная комиссия медицинской организации

**КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нормализация температуры через 48-72 часа
- 2) полное рассасывание инфильтрата в легочной ткани
- 3) нормализация всех лабораторных показателей
- 4) нормализация температуры в утренние и дневные часы

**ПРИ ОСТРОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ СИНДРОМ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕН В \_\_\_\_\_ ПЕРИОДЕ**

- 1) постжелтушном
- 2) инкубационном
- 3) преджелтушном
- 4) желтушном



## **ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ ПОКАЗАНО**

- 1) ингаляция муколитиков
- 2) грязелечение
- 3) ультразвуковая терапия
- 4) диадинамотерапия

## **РАНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ, ЕСЛИ**

- 1) в ней находится инородное тело
- 2) повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка
- 3) повреждены мышцы и кости
- 4) повреждены только кожа и подкожная клетчатка

## **К ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ИНФЕКЦИЯМ ОТНОСЯТ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА**

- 1) 60
- 2) 90
- 3) 45
- 4) 30

## **ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАЗНАЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ЗА СБОР ОТХОДОВ В ОТДЕЛЕНИИ**

- 1) заведующий структурным подразделением
- 2) руководитель медицинской организации
- 3) главная медицинская сестра
- 4) заместитель руководителя по эпидемиологической работе

## **ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НАПРАВЛЯЮТ НА \_\_\_\_\_ КУРОРТЫ**

- 1) грязевые
- 2) горные
- 3) климатические
- 4) бальнеологические

## **ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ОПЕРАЦИОННЫХ, ЛАБОРАТОРИЯХ, ПОДЛЕЖАТ СБОРУ В**

- 1) одноразовую твердую герметичную упаковку
- 2) многоразовые емкости
- 3) одноразовые пакеты
- 4) одноразовую твердую упаковку

## **ПРИЧИНАМИ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ БЫВАЮТ**

- 1) слабительные и мочегонные препараты
- 2) заболевания сердца, длительный прием антибиотиков

- 3) травмы носа, повышение артериального давления, заболевания крови
- 4) кортикостероиды при ингаляциях, длительная иммобилизация тела

**ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- 1) определения факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
- 2) дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния)
- 3) выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ
- 4) своевременного выявления инфекционных заболеваний

**СРОК НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КОНТАКТНЫМИ ВО ВНУТРИБОЛЬНИЧНОМ ОЧАГЕ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ (ДЕНЬ)**

- 1) 10
- 2) 35
- 3) 7
- 4) 20

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ ДЕТЯМ С ДИСКИНЕЗИЕЙ**

- 1) 6 месяцев
- 2) 2 месяца
- 3) 1 месяц
- 4) 3 месяца

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕОБХОДИМО РАССЧИТАТЬ**

- 1) количество суток в расчетном периоде
- 2) длину стороны предмета мебели
- 3) общую площадь внутренней поверхности помещения
- 4) ширину стороны предмета мебели

**ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ИВЛ НОВОРОЖДЕННЫМ ДЕТЯМ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ РАЗ В МИНУТУ**

- 1) 30
- 2) 25
- 3) 20
- 4) 40

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пульсоксиметрия
- 2) спирометрия
- 3) пикфлоуметрия
- 4) велоэргометрия

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВХОДЯЩИХ В ГРУППЫ РИСКА ПО ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ), ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ**

- 1) специальной подгруппе «А»
- 2) специальной подгруппе «Б»
- 3) основной
- 4) подготовительной

**ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ТУАЛЕТ ПОЛОСТИ РТА**

- 1) 2 раза в день: утром и вечером
- 2) 1 раз в день утром
- 3) каждые 2 часа
- 4) после каждого приёма пищи

**ЖГУТЫ РЕЗИНОВЫЕ ХРАНЯТ В**

- 1) сложенном по длине состоянии на полках
- 2) плотно закрытых коробках, пересыпанными тальком
- 3) подвешенном состоянии на крюках
- 4) скатанном виде в холщовых мешках

**ПРИ КОЛЛАПСЕ СНИЖАЕТСЯ \_\_\_\_\_ ДАВЛЕНИЕ \_\_\_\_\_ ММ.РТ.СТ.**

- 1) диастолическое; ниже 40
- 2) систолическое и диастолическое; ниже 100, но выше 50
- 3) систолическое; до 80-50
- 4) только систолическое; до 100

**РЕГИСТРАЦИЮ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЕДУТ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ЖУРНАЛЕ ПО \_\_\_\_\_ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА**

- 1) каждому наименованию
- 2) дозировке
- 3) срокам хранения
- 4) лекарственной форме

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) переохлаждение
- 2) инфекция
- 3) вдыхание раздражающих газов и аэрозолей
- 4) курение

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕМ СРЕДСТВЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) периметр обрабатываемой поверхности

- 2) общую площадь санитарно-технического оборудования
- 3) количество санитарно-технического оборудования
- 4) фактический срок годности раствора в сутках

#### **К ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДАМ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ**

- 1) рентгенографическое исследование органов грудной клетки
- 2) спирометрию
- 3) бронхоскопию
- 4) бронхографию

#### **ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕГИОНЕЛЛЕЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) макролиды
- 2) цефалоспорины
- 3) аминогликозиды
- 4) защищенные аминопенициллины

#### **РЕНТГЕНООПЕРАЦИОННЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ, ОТНОСЯТ К ПОМЕЩЕНИЯМ КЛАССА ЧИСТОТЫ**

- 1) А
- 2) Б
- 3) Г
- 4) В

#### **ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ДИЕТЫ БОЛЬНЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ С СИМПТОМАМИ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ**

- 1) углеводы
- 2) жидкость
- 3) жиры
- 4) белки

#### **ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ**

- 1) определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе
- 2) выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ
- 3) раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития
- 4) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников

#### **ЦВЕТ ОДНОРАЗОВЫХ ПАКЕТОВ И ЕМКОВ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА «А» ДОЛЖЕН БЫТЬ**

- 1) любой, без ограничений
- 2) любой, за исключением желтого и красного
- 3) красный
- 4) желтый

**МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗОВАЯ ДОЗА САЛЬБУТАМОЛА ДЛЯ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ**

- 1) 2,5
- 2) 5
- 3) 1
- 4) 3,5

**ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бронхоскопическое исследование
- 2) анализ мокроты
- 3) рентгенография грудной клетки
- 4) исследование функции внешнего дыхания

**ВАКЦИНА БЦЖ ВВОДИТСЯ ТОЛЬКО**

- 1) внутримышечно
- 2) внутривенно
- 3) подкожно
- 4) внутрикожно

**ПОД ТИПОМ ВОПРОСА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕЧАЮЩЕМУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫСТРОИТЬ СВОЙ ОТВЕТ, ПОНИМАЮТ**

- 1) множественный
- 2) наводящий
- 3) закрытый
- 4) открытый

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ НЕСЕТ**

- 1) руководители подразделений (отделений)
- 2) начальник управления кадров
- 3) инженер по пожарной безопасности организации
- 4) руководитель организации

**ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ**

- 1) прохождения только пожарно-технического минимума
- 2) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума
- 3) ознакомления с планами эвакуации
- 4) проведения только противопожарного инструктажа

**В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ СЕЙФ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ**

- 1) опечатан
- 2) открыт
- 3) закрыт
- 4) под видеонаблюдением

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА, ОПРЕДЕЛЯЮТ, КАК \_\_\_\_\_ УСЛОВИЯ ТРУДА**

- 1) хорошие
- 2) оптимальные
- 3) приемлемые
- 4) допустимые

**ДАВЛЕНИЕ НА ГРУДИНУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛОМУ ПОСТРАДАВШЕМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) кулаком одной руки
- 2) ладонью одной руки
- 3) двумя расположенными одна над другой руками, взятыми в замок
- 4) ладонями обеих рук, помещенными крест-накрест

**СКРИНИНГ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ**

- 1) через полгода после установления диагноза «сахарный диабет»
- 2) через 5 лет после установления диагноза «сахарный диабет»
- 3) с момента установления диагноза «сахарный диабет»
- 4) через 1,5-2 года после установления диагноза «сахарный диабет»

**ДЛЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ БОТУЛИЗМА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) живую вакцину
- 2) анатоксин
- 3) бактериофаг
- 4) химическую вакцину

**КАЖДЫЙ ОГNETУШИТЕЛЬ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ОБЪЕКТЕ, ДОЛЖЕН ИМЕТЬ**

- 1) защитный металлический кожух
- 2) только порядковый номер, нанесенный на корпус черной краской
- 3) только паспорт
- 4) паспорт и порядковый номер

**ПЕРВУЮ РЕВАКЦИНАЦИЮ АДС-АНАТОКСИНОМ ПРОВОДЯТ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ЗАКОНЧЕННОЙ ВАКЦИНАЦИИ**

- 1) 1-2
- 2) 4-5
- 3) 3-6
- 4) 9-12

**ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ КРЕПИТАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ**

- 1) пневмонии
- 2) туберкулёзе внутригрудных лимфатических узлов

- 3) экссудативном плеврите
- 4) бронхите

**ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОДИН РАЗ В**

- 1) месяц
- 2) квартал
- 3) неделю
- 4) день

**СТАДИЯ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В БЕЗ БИОПСИИ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ПРИ ПОМОЩИ**

- 1) дуплексного ультразвукового сканирования
- 2) компьютерной томографии с контрастированием
- 3) транзиентной эластометрии
- 4) магнитно-резонансной томографии

**ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ВВОДЯТ ИНСУЛИН**

- 1) среднего действия
- 2) короткого действия
- 3) сверхдлительного действия
- 4) длительного действия

**ПАЦИЕНТУ ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА БОЛЬНОЙ СТОРОНЕ ПРИ**

- 1) бронхите
- 2) бронхоэктатической болезни
- 3) сухом плеврите
- 4) бронхиальной астме

**ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА, ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СУХИЕ, СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) сердечной астмы
- 2) приступа бронхиальной астмы
- 3) пневмоторакса
- 4) тромбоза легочной артерии

**ПОД ТЕКУЩИМ КОНТРОЛЕМ ПОНИМАЮТ ПРОВЕРКУ**

- 1) готовности персонала, оборудования к работе
- 2) правильности выполнения обязанностей и сестринских манипуляций персоналом
- 3) достижения запланированных результатов сестринского ухода
- 4) результатов деятельности сестринского персонала

**ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ**

- 1) определение холестерина липопротеидов

- 2) электрокардиографию
- 3) эхокардиографию
- 4) измерение артериального давления

**РИСК РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ПОВЫШЕН У**

- 1) людей, в возрасте до 1 года, получавших коровье молоко
- 2) женщин, родивших ребенка массой менее 2,5 кг.
- 3) людей, часто болеющих вирусными инфекциями
- 4) женщин, родивших ребенка массой более 4,5 кг.

**ДЛЯ ПРИСТУПА ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМ**

- 1) Бартомье-Михельсона
- 2) Ражба-Ортнера
- 3) Мейо-Робсона
- 4) Ситковского

**ФЕРМЕНТОМ, МЕТАБОЛИЗИРУЮЩИМ АЛКОГОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) алкогольсинтетаза
- 2) глюкозо-6-фосфатаза
- 3) алкогольдегидрогеназа
- 4) алкогольоксидаза

**ЛЕГКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА СООТВЕТСТВУЕТ УРОВЕНЬ БИЛИРУБИНА ДО (МКМОЛЬ/Л)**

- 1) 25
- 2) 65
- 3) 85
- 4) 45

**В ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ СЛЕДУЕТ ПРОЯВЛЯТЬ**

- 1) растерянность
- 2) агрессивность
- 3) равнодушие
- 4) эмпатию

**ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ВАКЦИН МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПРОВОДИТ В**

- 1) медицинском халате
- 2) противочумном костюме
- 3) хирургическом костюме
- 4) спецодежде и средствах индивидуальной защиты

**СТЕРИЛЬНЫЙ СТОЛ НАКРЫВАЮТ НА (В ЧАСАХ)**

- 1) 9
- 2) 6



- 3) 18
- 4) 12

**ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ**

- 1) антагонистов кальция
- 2) аспирин
- 3) лидокаин
- 4) сердечных гликозидов

**ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- 1) занятия в основной группе через 3 месяца после приступа
- 2) освобождение от физической нагрузки
- 3) занятия в подготовительной группе через 1 месяц после приступа
- 4) занятия в группе ЛФК и дыхательную гимнастику

**ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЧИСЛОМ**

- 1) пациентов, направленных в стационар
- 2) коек на 100000 жителей
- 3) пролеченных за год больных
- 4) коек на 1000 жителей

**РЕАНИМАЦИЯ – ЭТО**

- 1) совокупность состояний, сопровождающихся при определенных обстоятельствах
- 2) разновидность несчастных случаев у детей
- 3) комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма
- 4) угнетение жизненных функций

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ В ОПЕРАЦИОННОМ БЛОКЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР НАНОСЯТ НА СТЕНЫ НА ВЫСОТУ**

- 1) не менее 1,5 метров
- 2) стен
- 3) роста человека
- 4) не менее 2 метров

**ПРИ ЯВЛЕНИЯХ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) может проводиться одновременно с проведением сердечно-легочной реанимации
- 2) должна производиться до начала реанимационных мероприятий
- 3) может быть произведена только после успешного проведения реанимационных мероприятий
- 4) осуществляется только после прибытия на место происшествия сотрудников

полиции

**НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) центральное венозное давление
- 2) общее периферическое сопротивление
- 3) артериальное давление
- 4) минутный объем сердца

**ДЛЯ СИМПТОМА ОЗЕНЫ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пароксизмальное чихание
- 2) зловонный насморк
- 3) перемежающаяся заложенность носа
- 4) какосмия

**АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМО ИЗМЕРЯТЬ**

- 1) 3 раза с интервалом 1 - 2 минуты
- 2) 2 раза с интервалом 1 - 2 минуты
- 3) 1 раз
- 4) количество раз и интервал не имеют значения

**У ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ И У ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ВТОРОГО ТИПА И ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК, УРОВЕНЬ СУММАРНОГО АБСОЛЮТНОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПО ШКАЛЕ SCORE НЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ И ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) умеренным
- 2) низким
- 3) высоким
- 4) очень высоким

**ИНФИЦИРОВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СОПРОВОЖДАЕТСЯ**

- 1) снижением секреции гастрина
- 2) развитием антрального гастрита
- 3) недостаточностью кардии
- 4) ахлоргидрией

**УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА**

- 1) излучателей
- 2) электродов
- 3) конденсаторных пластин
- 4) индукторов

**КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) определением стадий конфликта

- 2) столкновением интересов разных людей с агрессивными действиями
- 3) состоянием переговоров в ходе конфликта
- 4) противоречивыми позициями сторон по поводу решения каких-либо вопросов

### **ОСОБЕННОСТЬЮ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отсутствие стволовых нарушений
- 2) постепенное развитие симптомов заболевания
- 3) частое развитие менингококцемии
- 4) яркая выраженность менингеальных знаков

### **ВСЕ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА РЕГИСТРИРУЮТСЯ В ЖУРНАЛЕ**

- 1) регистрации амбулаторных больных (ф 074/у)
- 2) регистрации переливания трансфузионных сред (ф 009/у)
- 3) записи оперативных вмешательств в стационаре (ф 008/у)
- 4) записи амбулаторных операций (ф 069/у)

### **СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЕТЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ГРУППАМ РИСКА, НАЧИНАЮТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 6
- 2) 11
- 3) 4
- 4) 3

### **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ А ОТНОСЯТСЯ**

- 1) палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных
- 2) шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений
- 3) рентгенооперационные, в том числе ангиографические
- 4) процедурные и асептические перевязочные

### **В КАЧЕСТВЕ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИНТОВ ЭЛАСТИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) вату компрессную или гигроскопическую
- 2) пряжу хлопчатобумажную и нить латексную обкрученную
- 3) марлю медицинскую и вату гигроскопическую хирургическую
- 4) хлопок 70% и вискозное волокно 30%

### **К ОСНОВНЫМ ФИЗИКАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ ХРИПЫ**

- 1) рассеянные сухие свистящие
- 2) рассеянные мелкопузырчатые
- 3) локальные мелкопузырчатые

4) локальные сухие

**ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ**

- 1) колющая боль в области сердца
- 2) ноющая боль в области сердца
- 3) за грудиная боль, купирующаяся нитроглицерином
- 4) за грудиная боль, не купирующаяся нитроглицерином

**АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПАРАМЕТРАМИ МИКРОКЛИМАТА И ПОКАЗАТЕЛЯМИ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В \_\_\_\_\_ МЕСЯЦЕВ(А)**

- 1) 9
- 2) 6
- 3) 24
- 4) 12

**К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ МЕНИНГЕАЛЬНОМУ СИМПТОМУ ОТНОСИТСЯ**

- 1) западение родничка
- 2) симптом Лесажа
- 3) гипотония шейных мышц
- 4) нижний рефлекс Ландау

**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СРЕДНЕГО УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (АД), РАССЧИТАННОГО НА ОСНОВАНИИ ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ БОЛЕЕ 95-ГО ПРОЦЕНТИЛЯ КРИВОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АД В ПОПУЛЯЦИИ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА, ПОЛА И РОСТА РЕБЕНКА ДИАГНОСТИРУЕТСЯ**

- 1) высокое нормальное давление
- 2) артериальная гипертензия
- 3) нормальное артериальное давление
- 4) гипертоническая болезнь

**ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНОСЯТСЯ В**

- 1) форма 026/у-2000
- 2) учетную форму № 030-ПО/у-17
- 3) отчетную форму № 030-ПО/о-17
- 4) форма 086/у

**ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ, СТЕРИЛИЗУЮЩИХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) старшая медицинская сестра структурного подразделения
- 2) главная медицинская сестра
- 3) заведующий структурным подразделением

4) заместитель руководителя медицинской организации по эпидемиологической работе

**КАНЮЛЯ ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННОЙ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ**

- 1) латуни
- 2) углеродистой стали
- 3) нержавеющей стали
- 4) нейзильбера

**ВЛАЖНЫЕ ХРИПЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКОМ**

- 1) бронхиальной гиперсекреции
- 2) наличия диффузного перибронхиального склероза
- 3) обструкции
- 4) трахеобронхиальной дискинезии

**ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА С ОЖИРЕНИЕМ ПРИОРИТЕТНЫМ НЕЗАВИСИМЫМ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ МЕДСЕСТРЫ БУДЕТ**

- 1) подсчет частоты, глубины, ритма дыхания
- 2) измерение артериального давления
- 3) определение свойств пульса
- 4) измерение массы тела

**ТРАНСПОРТИРОВКА ЭНДОСКОПОВ И ИНСТРУМЕНТОВ К НИМ ПО КОРИДОРАМ  
МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО И ДРУГИХ ОТДЕЛЕНИЙ ДОЛЖНА  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В**

- 1) жестких контейнерах или лотках в закрытом виде
- 2) мягкой тканевой упаковке
- 3) лотках без крышки
- 4) любом удобном виде

**ПОСЛЕ КАЖДОГО ДНЯ СДАЧИ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ РАБОТНИКУ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ**

- 1) дополнительный день отдыха
- 2) материальная компенсация
- 3) моральное поощрение
- 4) право на внеочередное повышение квалификации

**САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОКАЗАНО ДЕТЯМ**

- 1) с тяжелым течением бронхиальной астмы
- 2) всем, страдающим бронхиальной астмой
- 3) с легким и среднетяжелым течением бронхиальной астмы в любой период заболевания
- 4) с легким и среднетяжелым течением бронхиальной астмы в межприступный период заболевания

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИЧНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ  
УМЕНЬШАЕТСЯ НА (В ЧАС)**

- 1) 1,5
- 2) 0,5
- 3) 1
- 4) 2

**НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ**

- 1) информированного добровольного согласия
- 2) справки с места жительства
- 3) справки из детского сада или школы
- 4) чека на оплату медицинского осмотра

**ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ**

- 1) обеспечить полный покой, холод на эпигастральную область
- 2) отвести в ближайшую поликлинику
- 3) провести промывание желудка
- 4) обезболить

**НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПРИ ВСПЫШКЕ ОЧАГОВОЙ ПНЕВМОНИИ В  
КОЛЛЕКТИВЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) микоплазма
- 2) кишечная палочка
- 3) пневмококк
- 4) протей

**ПРИ ОЦЕНКЕ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО  
УЧИТЫВАТЬ, ЧТО К ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТ**

- 1) средний доход на душу населения
- 2) младенческую смертность
- 3) прожиточный минимум
- 4) региональный внутренний продукт

**МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ МЕДИЦИНСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ, ВОЗЛАГАЕТСЯ НА РАБОТНИКА, ЕСЛИ**

- 1) организация заключила с работником письменный договор, но условий не создала
- 2) ущерб относится к категории непредвиденных обстоятельств
- 3) ущерб относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска
- 4) ущерб причинен по вине работника при исполнении трудовых обязанностей

**ПОТРЕБИТЕЛЬНЫМ СВОЙСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ ТИТАНОВЫХ**

**СПЛАВОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКАЯ \_\_\_\_\_**

- 1) твердость
- 2) коррозионная стойкость
- 3) упругость
- 4) износостойкость

**ДЫХАНИЕ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ОНО**

- 1) не нарушено
- 2) частое, глубокое
- 3) редкое, с длительным апноэ
- 4) поверхностное, неритмичное

**СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ПОЛНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ ОТ ПОДЛЕЖАЩИХ ТКАНЕЙ, ДЕФЕКТЫ КОЖИ, НЕКРОЗЫ КОЖНЫХ ЛОСКУТОВ, ОТНОСЯТСЯ К РАНАМ**

- 1) рвано-ушибленным
- 2) скальпированным
- 3) укушенным
- 4) огнестрельным

**ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) стресс и психическое напряжение
- 2) низкое атмосферное давление
- 3) длительное переохлаждение
- 4) прием снотворных

**ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) Инсулин
- 2) Глибенкламид
- 3) Метформин
- 4) Глипизид

**ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО СОБИРАЮТ \_\_\_\_\_ ПОРЦИЮ \_\_\_\_\_ МОЧИ**

- 1) среднюю; утренней
- 2) первую; утренней
- 3) последнюю; вечерней
- 4) последнюю; утренней

**ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ВОЗ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КАШЛЯ НЕ МЕНЕЕ**

- 1) 3 месяцев в году в течение 2-х лет подряд
- 2) 4 месяцев в году в течение 3 лет подряд
- 3) 6 месяцев в году в течение 2-х лет подряд
- 4) 2 месяцев в году в течение 3-х лет подряд

**ЦВЕТ ОДНОРАЗОВЫХ ПАКЕТОВ И ЕМКостей ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА «Б» ДОЛЖЕН БЫТЬ**

- 1) синий
- 2) зеленый
- 3) черный
- 4) желтый

**ПРИ ПЕРВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ПУЛЬС НАДО СЧИТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ (ВРЕМЯ В СЕКУНДАХ)**

- 1) 60
- 2) 15
- 3) 30
- 4) 10

**ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ**

- 1) сидя, с упором на руки
- 2) горизонтальное
- 3) горизонтальное с приподнятыми ногами
- 4) лежа на боку

**ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СОЗНАНИИ С РАНОЙ НА ГОЛОВЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ОБИЛЬНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ТЕМНОЙ КРОВЬЮ, НЕОБХОДИМО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО**

- 1) приложить холод к голове
- 2) вызвать скорую медицинскую помощь
- 3) придать пострадавшему устойчивое боковое положение
- 4) положить на рану салфетку из аптечки, прижать, зафиксировать повязкой

**ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ДЕСЕН В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА ПОДГОТОВКИ К ИССЛЕДОВАНИЮ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ОН НЕ ДОЛЖЕН**

- 1) чистить зубы пальцем
- 2) использовать жевательную резинку
- 3) полоскать рот натрия гидрокарбонатом раствором 3%
- 4) чистить зубы щеткой

**АКДС-ВАКЦИНУ ВВОДЯТ**

- 1) внутримышечно
- 2) перорально
- 3) подкожно в область предплечья
- 4) внутривенно капельно

**В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ КОНТАМИНАЦИИ ГРЯЗНЫЕ (ИНФИЦИРОВАННЫЕ) РАНЫ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ КАК**

- 1) операционные раны со значительным нарушением техники стерильности или со



значительной утечкой содержимого из желудочно-кишечного тракта

- 2) операционные раны, в которых микроорганизмы, вызвавшие послеоперационную инфекцию, присутствовали в операционном плане до начала операции
- 3) неинфицированные операционные раны без признаков воспаления
- 4) операционные раны, проникающие в дыхательные пути, пищеварительный тракт, половые или мочевыводящие пути при отсутствии необычного заражения

### **В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ПОД ТЕРМИНОМ «ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ» ПОНИМАЕТСЯ**

- 1) совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий
- 2) совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий
- 3) предотвращение возможности дальнейшего распространения горения
- 4) создание условий для ликвидации пожара имеющимися силами и средствами

### **БОЛЬНЫЕ ДЕТИ С ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ МАНИФЕСТАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ЖАЛОБЫ НА**

- 1) боли в суставах
- 2) прибавку в весе
- 3) похудание
- 4) потливость

### **КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ДОЛЖНО ВЫЗЫВАТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА ДИФТЕРИЮ?**

- 1) колит
- 2) менингит
- 3) ларингит
- 4) панкардит

### **ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗНАЧАЕТ**

- 1) заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом
- 2) заместитель главного врача по лечебной работе
- 3) главная медицинская сестра
- 4) руководитель медицинской организации

### **ПРИ ПНЕВМОНИИ ДЕЛИРИЙ ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ**

- 1) у детей
- 2) при высокой лихорадке
- 3) у стариков
- 4) у людей с алкогольной зависимостью

### **ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ III-IV СТЕПЕНИ**

- 1) обезболивание
- 2) сухие асептические повязки
- 3) повязки с растворами антисептиков
- 4) полуспиртовые повязки

**УЧЕТНАЯ ФОРМА № 039-1/У-06 «ДНЕВНИК УЧЕТА РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ УЧАСТКОВОЙ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ УЧАСТКОВОЙ ОДИН РАЗ В**

- 1) день
- 2) неделю
- 3) месяц
- 4) квартал

**РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ОСНОВАНО НА СПОСОБНОСТИ**

- 1) печени не выделять с желчью йодсодержащие препараты
- 2) печени выделять с желчью йодсодержащие препараты
- 3) печени вырабатывать желчь при поступлении в организм йодсодержащих препаратов
- 4) тканей и органов неодинаково поглощать рентгеновское излучение

**В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) влажного обертывания
- 2) холодного компресса
- 3) горчичников
- 4) грелки

**ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛЮБЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НОСЯТ \_\_\_\_\_ ХАРАКТЕР ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ**

- 1) избирательный
- 2) рекомендательный
- 3) обязательный
- 4) консультативный

**УСТАНОВКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) способностью человека осознанно сосредоточиться на самом себе
- 2) неспецифическим ответом организма на любое предъявляемое ему требование
- 3) определённым взглядом на предмет, человека или идею, основанным на убеждениях, эмоциях и поведении
- 4) предвзятым, не подтверждённым суждением о человеке или явлении

**СИМПТОМ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА**

- 1) Пастернацкого
- 2) Ситковского
- 3) «падающей капли»

4) Ортнера

**РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ \_\_\_°С СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_МИНУТ**

- 1) 132; 20
- 2) 160; 120
- 3) 120; 45
- 4) 180; 60

**ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ**

- 1) определения состояния здоровья работника
- 2) стимулирования работника к более высокой производительности труда
- 3) проверки соответствия работника поручаемой ему работе
- 4) проверки моральных и деловых качеств

**К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Г ОТНОСЯТСЯ**

- 1) кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов
- 2) помещения для мытья и стерилизации столовой и кухонной посуды при буфетных и столовых отделениях
- 3) помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях
- 4) процедурные и асептические перевязочные

**РЖАВАЯ МОКРОТА БОЛЕЕ ТИПИЧНА**

- 1) для тромбоэмболии ветвей легочной артерии
- 2) для очаговой пневмонии
- 3) для крупозной пневмонии
- 4) для муковисцидоза

**ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В СОЧЕТАНИИ С ИБС ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) препараты центрального действия
- 2) диуретики
- 3)  $\beta$ -адреноблокаторы
- 4)  $\alpha$ -адреноблокаторы

**ОСЛОЖНЕНИЕМ ХОБЛ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) абсцесс легкого
- 2) легочное сердце
- 3) полицитемия
- 4) дыхательная недостаточность

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛЕЙКОЦИТОВ, ЭРИТРОЦИТОВ И ЦИЛИНДРОВ В МОЧЕ ПРИМЕНЯЮТ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ**

- 1) по методу Нечипоренко
- 2) на сахар

- 3) на диастазу
- 4) по методу Зимницкого

**ЛЕГКИЙ ПРИСТУП БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПИКОВОЙ СКОРОСТИ ВЫДОХА (В %)**

- 1) 25-30
- 2) 50-65
- 3) 70-90
- 4) 40-45

**ТЕСТ ВСТРЯХИВАНИЯ («ШЕЙК-ТЕСТ») ВАКЦИНЫ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ**

- 1) срока годности вакцины
- 2) соблюдения «холодовой цепи»
- 3) завода-изготовителя
- 4) номера партии вакцины

**ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО БЫСТРЫМ ТЕМПОМ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ И КОНЦЕНТРАЦИЕЙ В НИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ \_\_\_\_\_**

- 1) миграция
- 2) эмиграция
- 3) урбанизация
- 4) иммиграция

**КОМПЛЕКС МЕР, ВКЛЮЧАЮЩИЙ МЕТОДЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ, ФИЗИОТЕРАПИИ, ЛФК, ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ, ХИРУРГИЧЕСКУЮ КОРРЕКЦИЮ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) профессиональной реабилитацией
- 2) медицинской реабилитацией
- 3) психологической реабилитацией
- 4) социальной реабилитацией

**ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ, НАЧИНАЯ СО ВТОРОЙ СТЕПЕНИ, ПОСТРАДАВШИМ ПРОВОДИТСЯ ПРОФИЛАКТИКА**

- 1) дифтерии
- 2) бешенства
- 3) столбняка
- 4) кори

**К ПОКАЗАТЕЛЮ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕМУ СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ, ОТНОСЯТ СМЕРТНОСТЬ**

- 1) неонатальную
- 2) детскую
- 3) перинатальную
- 4) младенческую

### **ПАЛЬЦЕВОЕ ПРИЖАТИЕ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ**

- 1) выше места ранения на несколько сантиметров, с усилием, достаточным для остановки кровотечения
- 2) выше паховой складки кулаком, зафиксированным второй рукой, весом тела участника оказания первой помощи
- 3) в верхней трети бедра двумя большими пальцами рук
- 4) ниже паховой складки кулаком, зафиксированным второй рукой, весом тела участника оказания первой помощи

### **НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В СЕМЕЙНЫХ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОЧАГАХ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) банные полотенца
- 2) постельные принадлежности
- 3) столовые приборы
- 4) маникюрные ножницы

### **К ОТЛИЧИЮ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ОТ ЛАКУНАРНОЙ АНГИНЫ ОТНОСЯТ**

- 1) налеты островчатые или пленчатые, выходящие за пределы лакун
- 2) налеты на миндалинах рыхлые, гнойные по ходу лакун
- 3) регионарные лимфоузлы, увеличенные «пакетами»
- 4) регионарные лимфоузлы болезненные

### **ПАЛЬЦЕВОЕ ПРИЖАТИЕ СОННОЙ АРТЕРИИ ПРОИЗВОДИТСЯ НА**

- 1) стороне повреждения двумя пальцами (указательным и средним) в области гортани ниже места ранения
- 2) боковой поверхности шеи на стороне повреждения по направлению к углу нижней челюсти
- 3) боковой поверхности шеи на стороне повреждения позади грудино-ключично-сосцевидной мышцы одним большим или несколькими пальцами по направлению к позвоночнику
- 4) передней поверхности шеи снаружи от гортани на стороне повреждения четырьмя пальцами одновременно по направлению к позвоночнику

### **СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА ХАРАКТЕРИЗУЮТ**

- 1) неукротимая рвота, потеря сознания до 4-6 часов, антероградная амнезия
- 2) потеря сознания через 2-3 часа после травмы, анизокория, очаговая симптоматика
- 3) кратковременная потеря сознания, рвота в первые часы после травмы, ретроградная амнезия
- 4) пролонгированный общемозговой синдром, повышение температуры тела, рвота

### **ГРАФИК ОТПУСКОВ РАБОТНИКОВ УТВЕРЖДАЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА \_\_\_\_\_ НЕДЕЛИ/НЕДЕЛЬ ДО НАСТУПЛЕНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА**

- 1) 3
- 2) 4

- 3) 5
- 4) 2

### **ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ИЗ АВАРИЙНОГО АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ТРУДНОДОСТУПНОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) в случае, если у пострадавшего отсутствуют признаки серьезных травм
- 2) во всех случаях, когда пострадавшему требуется немедленное оказание первой помощи
- 3) при наличии угрозы для жизни и здоровья пострадавшего и невозможности оказания первой помощи в автомобиле (труднодоступном месте)
- 4) только силами сотрудников скорой медицинской помощи или спасателями МЧС

### **ТРЕМОР ПОКОЯ ПО ТИПУ «СКАТЫВАНИЯ ПИЛЮЛЬ» ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- 1) мультисистемной атрофии
- 2) прогрессирующего супрануклеарного паралича
- 3) болезни диффузных телец Леви
- 4) болезни Паркинсона

### **ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ИЛИ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМОЙ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ К ВВЕДЕНИЮ**

- 1) гепарин
- 2) инсулин короткого действия
- 3) папаверина гидрохлорид
- 4) клофелин

### **ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ (ТЕКУЩИХ И ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) заместитель руководителя медицинской организации по эпидемиологической работе
- 2) главная медицинская сестра
- 3) старшая медицинская сестра структурного подразделения
- 4) заведующий структурным подразделением

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДИФИКАЦИИ ДИЕТЫ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ МОТОРНЫХ ФЛУКТУАЦИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ВКЛЮЧАЮТ**

- 1) питание маленькими порциями каждый час
- 2) увеличить количество жиров в рационе
- 3) увеличить количество углеводов в рационе
- 4) уменьшить количество белков в рационе

### **СПОСОБОМ ПОГРУЖЕНИЯ В РАСТВОР ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОМЫВАНИЕМ ВОДОЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮТ**

- 1) термометры
- 2) подкладные клеенки

- 3) фартуки
- 4) чехлы матрасов из полимерной пленки

**К ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕМУ НАЛИЧИЕ ОБСТРУКЦИИ БРОНХОВ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СТАРШЕ 5 ЛЕТ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) менее 80% от должных величин
- 2) снижение жизненной емкости легких
- 3) отрицательная проба с бета2-агонистом
- 4) объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) от 80 до 100% от должных величин

**КРЕАТОРЕЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- 1) хронического панкреатита
- 2) болезни Крона
- 3) ишемического колита
- 4) синдрома раздраженной кишки

**ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) желание материально ответственного лица
- 2) распоряжение главного бухгалтера
- 3) устное распоряжение руководителя организации
- 4) выявление факта хищения или порчи имущества

**ЖЕНЩИНАМ В СЛУЧАЕ НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ С \_\_\_\_\_ НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 34
- 2) 28
- 3) 30
- 4) 40

**МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ ПРИЧИНЕННОГО РАБОТОДАТЕЛЮ УЩЕРБА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ**

- 1) постановлением Правительства РФ
- 2) локальным актом медицинской организации
- 3) трудовым договором, заключаемым с работником
- 4) трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером

**ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРИНЯТЫХ ОТ РОДСТВЕННИКОВ УМЕРШИХ БОЛЬНЫХ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ КАТЕГОРИИ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

- 1) 4

- 2) 3
- 3) 2
- 4) 1

### **НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пневмококк (*Streptococcus pneumoniae*)
- 2) гемолитический стрептококк (*Streptococcusagalactiae*)
- 3) кишечная палочка (*Escherichiacoli*)
- 4) гемофильная палочка (*Haemophilusinfluenzae*)

### **ДЛЯ НАЧАЛА МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА ХАРАКТЕРНЫ**

- 1) быстрое повышение температуры, головная боль, рвота без болей в животе
- 2) постепенное начало, головная боль, рвота, жидкий стул
- 3) высокая температура, рвота, боли в животе
- 4) высокая температура, головная боль, нарушение зрения

### **ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ СОЗНАНИЯ**

- 1) следует придать пострадавшему положение на животе, с валиком под головой
- 2) ни в коем случае нельзя трогать пострадавшего
- 3) следует придать пострадавшему положение на спине, с приподнятыми на 30 см ногами
- 4) следует придать пострадавшему устойчивое боковое положение

### **ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ**

- 1) реактогенность вакцин
- 2) одновременное введение нескольких вакцин
- 3) введение антибиотиков
- 4) нарушение иммунитета

### **ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРИВИВКАМИ ПРОТИВ РАЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ ИХ ПРОВЕДЕНИИ (НЕ В ОДИН ДЕНЬ) ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ**

- 1) 1 месяца
- 2) 1 недели
- 3) 2 недель
- 4) 21 дня

### **ОСНОВНЫМ ПРИЕМОМ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) активность в задавании вопросов
- 2) внимание, «присутствие», доброжелательное молчание, подтверждение понимания
- 3) настойчивость в выдвигании контраргументов
- 4) перебивание, не дослушав



**ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ, ВНЕЗАПНО ПОТЕРЯВШЕМУ СОЗНАНИЕ, НО ДЫХАНИЕ У КОТОРОГО БЫЛО СОХРАНЕНО, НЕОБХОДИМО**

- 1) уложить его в устойчивое боковое положение
- 2) уложить его на живот
- 3) повернуть его голову набок
- 4) для скорейшего восстановления сознания дать понюхать аммиака раствор 10%

**БЕЗОПАСНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАБОТАЮЩИХ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ**

- 1) соответствует утвержденным уровням
- 2) исключено
- 3) не превышает рекомендованных уровней
- 4) соответствует утвержденным ориентировочным безопасным уровням воздействия

**МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССА Г ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твёрдым бытовым отходам
- 2) токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности
- 3) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы
- 4) эпидемиологически опасные отходы

**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОБИОЗА ПЕРИАНАЛЬНЫЙ СОСКОБ НАПРАВЛЯЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИЮ**

- 1) бактериологическую
- 2) клиническую
- 3) цитостатическую
- 4) иммунологическую

**В ПОМЕЩЕНИИ, ОТНОСЯЩЕМСЯ К ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ, СЕЙФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИКРЕПЛЕН К ПОЛУ ИЛИ СТЕНЕ В СЛУЧАЕ, КОГДА ЕГО МАССА СОСТАВЛЯЕТ**

\_\_\_\_\_ КГ

- 1) 750
- 2) 1100
- 3) 1500
- 4) 1750

**ОСТРАЯ ОПИЙНАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ОБЫЧНО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) галлюцинациями
- 2) дисфорией
- 3) эйфорией
- 4) депрессией

**НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рентгенография грудной клетки
- 2) анализ крови
- 3) плевральная пункция
- 4) анализ мокроты

### **ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДИЕТА С**

- 1) механическим и химическим щажением
- 2) пониженным количеством белка
- 3) повышенным количеством белка
- 4) ограничением жирных и соленых блюд

### **ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО С ПРИЗНАКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ СЛЕДУЕТ**

- 1) повернуть пострадавшего на живот
- 2) положить пострадавшему под голову валик из одежды, вызвать скорую медицинскую помощь
- 3) придать пострадавшему устойчивое боковое положение
- 4) подложить валик из одежды под плечи пострадавшего, обеспечив разгибание шейного отдела позвоночника

### **ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЫСОКИЙ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НАБЛЮДАЕТСЯ У**

- 1) медицинского персонала, выполняющего неинвазивные процедуры
- 2) персонала и пациентов центров гемодиализа
- 3) пациентов терапевтических отделений
- 4) персонала физиотерапевтических кабинетов

### **СОСУДОСУЖИВАЮЩИЕ КАПЛИ В НОС ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ**

- 1) облегчения носового дыхания
- 2) снятия воспаления в ухе
- 3) восстановления дренажной и вентиляционной функций слуховой трубы
- 4) улучшения слуха

### **ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРНЫ ДЛИТЕЛЬНО СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ХРИПЫ**

- 1) рассеянные мелкопузырчатые влажные
- 2) крупно- и среднепузырчатые влажные
- 3) рассеянные сухие свистящие
- 4) локальные мелкопузырчатые

### **У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА, БОЛЬНЫХ МЕНИНГОКОККОВЫМ МЕНИНГИТОМ, ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) экспираторная одышка
- 2) повышенная потливость

- 3) рвота
- 4) «лающий кашель»

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ОБЩЕЙ ЗАДЕРЖКОЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) IV
- 2) II
- 3) I
- 4) V

**ИЗМЕНЕНИЕМ В АНАЛИЗЕ МОЧИ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ II СТАДИИ ГИПЕРТЕНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) микроальбуминурия
- 2) снижение удельного веса
- 3) повышение удельного веса
- 4) лейкоцитурия

**ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ГИПЕРТЕНИЧЕСКОМ КРИЗЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ В ПЕРВЫЕ 2 ЧАСА ДОЛЖНО СНИЖАТЬСЯ НА \_\_\_\_\_ %**

- 1) 15
- 2) 25
- 3) 35
- 4) 10

**КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 15
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 20

**НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРЕПАРАТОВ ЛИТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нарушение аппетита
- 2) потеря массы тела
- 3) бессонница
- 4) тремор

**БАКТЕРИЦИДНЫЕ КАМЕРЫ, ОСНАЩЕННЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ЛАМПАМИ, ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО С ЦЕЛЬЮ**

- 1) хранения инструментов
- 2) дезинфекции инструментов
- 3) стерилизации инструментов
- 4) предстерилизационной очистки инструментов

### **ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИСТУПЕ**

- 1) каждый припадок начинается своеобразно
- 2) развитию судорог предшествует психотравмирующая ситуация
- 3) у пациента ускоряется темп мышления
- 4) развитию судорог предшествует аура, возможны прикусы языка, ушибы головы, туловища

### **ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В РОДДОМЕ ВАКЦИНИРУЮТ ОТ**

- 1) туберкулеза
- 2) дифтерии
- 3) кори
- 4) коклюша

### **МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССА Д ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) радиоактивные отходы
- 2) эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам
- 3) эпидемиологически опасные отходы
- 4) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы

### **ЭТАП ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ, ПРОХОДЯЩИЙ В БОЛЬНИЦЕ, ГОСПИТАЛЕ НАЗЫВАЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ**

- 1) стационарной
- 2) экстренной
- 3) амбулаторно-поликлинической
- 4) санаторной

### **ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ КЛИНИКИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА НАИБОЛЬШИЙ УРОВЕНЬ АМИЛАЗЫ КРОВИ МОЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ (ЧАС)**

- 1) 18-24
- 2) 24-36
- 3) 12-18
- 4) 48-72

### **В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 3-Й КАТЕГОРИИ, ХРАНЕНИЕ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В**

- 1) специальной зоне для размещения холодильников, отделенной от основного места хранения металлической решеткой с запирающейся решетчатой дверью
- 2) термоконтейнерах, размещенных в сейфах
- 3) запирающихся холодильных камерах
- 4) контейнерах, помещенных в термоконтейнеры

### **ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТАХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ НИЖЕ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)**

- 1) +16

- 2) +22
- 3) +18
- 4) +20

**ОСНОВНОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА У БОЛЬНЫХ С ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЯЗАН С**

- 1) расширением периферических артерий
- 2) расширением периферической венозной системы
- 3) замедлением ЧСС и снижением потребности миокарда в кислороде
- 4) увеличением коронарного кровотока вследствие увеличения частоты сердечных сокращений

**ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) объемы соответствующих видов медицинской помощи
- 2) протоколы ведения пациентов
- 3) стандарты медицинской помощи
- 4) порядки оказания медицинской помощи

**СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА (УДАРОВ В МИНУТУ)**

- 1) 110
- 2) 90
- 3) 170
- 4) 140

**ОРГАНИЗАЦИЯ УДОБНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ, ЭРГНОМИЧНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ**

- 1) заботу старшей медицинской сестры
- 2) создание условий труда
- 3) вариант наставничества
- 4) способ адаптации

**ЛЕЙКОПЕНИЯ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ СЛЕДСТВИЕМ**

- 1) хронического лимфолейкоза
- 2) острого панкреатита
- 3) миеломной болезни
- 4) хронического гепатита

**ПЕРЕД УНИЧТОЖЕНИЕМ НЕПРИГОДНЫХ ВАКЦИН И СЫВОРОТОК ФЛАКОНЫ И АМПУЛЫ НАДО**

- 1) разбить
- 2) вскрыть
- 3) нагреть
- 4) положить в холодильник

## **НАИБОЛЬШИЙ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА «С» ОТМЕЧАЕТСЯ У**

- 1) потребителей неинъекционных наркотиков
- 2) пациентов на регулярном гемодиализе
- 3) контактных в семейных очагах
- 4) новорожденных детей у инфицированных матерей

## **ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПАТОГЕНЕЗА ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) замедление опорожнения желудка
- 2) нарушение моторики пищевода
- 3) дисфункция желчного пузыря
- 4) преобладание в рационе питания белковой пищи

## **ДЛЯ ОДЫШЕЧНО-ЦИАНОТИЧЕСКОГО ПРИСТУПА НЕ ХАРАКТЕРНО**

- 1) усиление цианоза
- 2) брадикардия
- 3) тахикардия
- 4) одышка

## **«СОСУДИСТЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ», «ПАЛЬМАРНАЯ ЭРИТЕМА» ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ**

- 1) синдрома холестаза
- 2) синдрома Жильбера
- 3) острой печеночной энцефалопатии
- 4) хронического гепатита

## **БРОНХОФИБРОСКОП ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК**

- 1) пищевода и желудка
- 2) трахеобронхиального дерева
- 3) толстого кишечника
- 4) тонкого кишечника

## **ПАЛАТНАЯ (ПРОЦЕДУРНАЯ) СЕСТРА СОСТАВЛЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПИСАТЬ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА НА ОСНОВАНИИ ЛИСТОВ**

- 1) врачебных назначений
- 2) учёта процедур
- 3) температурных
- 4) учёта движения пациентов

## **ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА В СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ РАЗВИВАЕТСЯ**

- 1) резкий спазм сердечной мышцы
- 2) некроз
- 3) аневризма
- 4) резкое расслабление сердечной мышцы

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ОБЛАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ У ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ПРИ ПОЛОЖЕНИИ НА СПИНЕ**

- 1) голень
- 2) подколенная ямка
- 3) крестец
- 4) бедро

**МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДОЛЖНА ПОВЫШАТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) сестринское дело
- 2) трансфузиология
- 3) гемодиализ
- 4) сестринское дело в хирургии

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ**

- 1) нитрофураны
- 2) антибиотики
- 3) гепатопротекторы
- 4) антигистаминные

**РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕДМЕТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ОТНОСЯТ К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА**

- 1) Г
- 2) Д
- 3) В
- 4) Б

**СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) утратой сознания
- 2) менингеальным синдромом
- 3) двусторонними пирамидными знаками
- 4) зрачковыми расстройствами

**ТОЧКА ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ СОННОЙ АРТЕРИИ РАСПОЛОЖЕНА НА ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНОЙ МЫШЦЕ, А ИМЕННО НА \_\_\_\_\_**

- 1) середине по ее внутреннему краю
- 2) основании снаружи от места ее прикрепления к ключице
- 3) уровне верхней трети у места ее прикрепления к сосцевидному отростку
- 4) любой удобной точке по ее длине

**ОСНОВНЫМИ ФИЗИКАЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОЧАГОВОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ХРИПЫ**

- 1) локальные сухие свистящие
- 2) локальные мелкопузырчатые или крепитирующие
- 3) рассеянные сухие свистящие
- 4) рассеянные мелкопузырчатые влажные

#### **ПО НАПРЯЖЕНИЮ ПУЛЬС РАЗЛИЧАЮТ**

- 1) полный, пустой
- 2) ритмичный, аритмичный
- 3) твердый, мягкий
- 4) скорый, медленный

#### **СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВТОРУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОКЛЮША ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 4,5
- 2) 6
- 3) 8,5
- 4) 12

#### **ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЖАЛОБ НА РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-**

- 1) невролога
- 2) терапевта
- 3) онколога
- 4) офтальмолога

#### **ПОСЛЕ АППАРАТНЫХ СПОСОБОВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ОТХОДОВ, ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТХОДЫ КЛАССА Б МОГУТ НАКАПЛИВАТЬСЯ, ВРЕМЕННО ХРАНИТЬСЯ, ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ, УНИЧТОЖАТЬСЯ И ЗАХОРАНИВАТЬСЯ СОВМЕСТНО С ОТХОДАМИ КЛАССА**

- 1) Д
- 2) В
- 3) А
- 4) Г

#### **В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ИССЛЕДОВАНИЮ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ПАЦИЕНТ НАХОДИТСЯ НА ДИЕТЕ (В ДНЯХ)**

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 4

#### **СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) характера манипуляции



- 2) метода стерилизации
- 3) упаковки
- 4) вида изделия медицинского назначения

**ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ С ВОДОСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 72
- 2) 24
- 3) 12
- 4) 48

**РАЗЛИТАЯ ГИПЕРЕМИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛОТКИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) острым фарингите
- 2) катаральной ангине
- 3) лакунарной ангине
- 4) ангине Симановского – Венсана – Плаута

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УРОГРАФИИ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТОВ:**

- 1) овощи, молоко, черный хлеб, сахар, кофе
- 2) винегрет, фрукты, кофе, молоко, черный хлеб
- 3) овощи, фрукты, молоко, кофе
- 4) овощи, фрукты, молоко, сахар, черный хлеб

**НОРМА ОБЩЕГО БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ СООТВЕТСТВУЕТ**

- 1) 55-65 г/л
- 2) 90-100 г/л
- 3) 35-45 г/л
- 4) 65-85 г/л

**ПОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ ПОНИМАЮТ ПРОВЕРКУ**

- 1) правильности выполнения сестринских манипуляций
- 2) результатов деятельности сестринского персонала
- 3) соблюдения деонтологических принципов в общении с пациентами
- 4) готовности персонала, оборудования к работе

**ИЗМЕНЕНИЕМ В ЛИКВОРЕ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОСТРОГО МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) большое количество эритроцитов
- 2) нейтрофилез (до 80-90%)
- 3) примерно одинаковое количество нейтрофилов и лимфоцитов
- 4) лимфоцитоз (до 80%)

**ПРИ СБОРЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

- 1) снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции
- 2) собирать отходы в специально предназначенные емкости в зависимости от класса опасности
- 3) устанавливать одноразовые емкости для сбора отходов на расстоянии 1,5 м от нагревательных приборов
- 4) использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора жидких биологических отходов

**МЕТОДОМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ УСТАНОВИТЬ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ ИСТОЧНИКА ВОЗБУДИТЕЛЯ ГЕПАТИТА В И ЗАБОЛЕВШИХ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) цитологический
- 2) радиоиммунный анализ
- 3) электронная микроскопия
- 4) молекулярно-биологический

**К БЕССИМПТОМНОМУ ПОРАЖЕНИЮ ОРГАНОВ –МИШЕНЕЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса
- 2) клинически манифестное поражение периферических артерий
- 3) цереброваскулярная болезнь
- 4) пульсовое АД > 60 мм рт.ст. (у пожилого и старческого контингента)

**НАИБОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ИНФИЦИРОВАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ОТ МАТЕРИ С HCV–ИНФЕКЦИЕЙ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) наличию anti-HCV IgG в сыворотке крови матери
- 2) наличию у матери цитомегаловирусной инфекции
- 3) высоких концентрациях вируса гепатита С в сыворотке крови матери
- 4) повышенной активности аминотрансфераз в сыворотке крови матери

**ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР 40% И ИНСУЛИНА РАСТВОРЫ ОТНОСЯТСЯ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ТРЕБУЮЩИМ ЗАЩИТЫ ОТ**

- 1) воздействия повышенных температур
- 2) улетучивания и высыхания
- 3) воздействия газов, содержащихся в окружающей среде
- 4) воздействия пониженных температур

**ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ:**

- 1) СП 3.1.1.2341-08
- 2) СП 3.1.3112-13
- 3) СП 3.1.5.2826-10
- 4) СП 3.1.2825-10

## **КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) отрыжка тухлым, рвота
- 2) боль в правом подреберье, горечь во рту
- 3) асцит, сосудистые звездочки
- 4) рвота «кофейной гущей», мелена

## **ТЕРРЕНКУР -ЭТО**

- 1) воздушная ванна
- 2) норматив лечебной нагрузки в лечебной физкультуре
- 3) аппарат для реабилитации пациента
- 4) дозированное восхождение

## **ТРЕТЬИМ ЭТАПОМ СИСТЕМЫ СБОРА, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы
- 2) транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы
- 3) обеззараживание отходов
- 4) захоронение или уничтожение медицинских отходов

## **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПОСЕЩЕНИЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ОТНОШЕНИЕ**

- 1) фактического числа к общему
- 2) планового числа к фактическому
- 3) фактического числа к плановому
- 4) планового числа к общему

## **ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УГЛУБЛЕННОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРОВОДЯТ НА \_\_\_\_\_ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**

- 1) четвертом
- 2) первом
- 3) втором
- 4) третьем

## **ВСЕ ПАЦИЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕЧЕНИИ, ОСМАТРИВАЮТСЯ НА ПЕДИКУЛЕЗ КАЖДЫЕ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 14
- 2) 3
- 3) 18
- 4) 7

## **ВАКЦИНАЦИЯ ПНЕВМОКОККОВОЙ ВАКЦИНОЙ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В (ГОД)**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 5

**ОСНОВУ ХЕЛИКОБАКТЕРНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) очаговая атрофия эпителия и желез
- 2) воспаление с инфильтрацией собственной пластинки слизистой оболочки желудка нейтрофилами, лимфоцитами и плазмócитами
- 3) метаплазия
- 4) колонизация слизистой оболочки микробами

**ЗА КАЖДЫЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОСТУПОК МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНО \_\_\_\_\_ ДИСЦИПЛИНАРНОЕ(ЫХ) ВЗЫСКАНИЕ(ИЙ)**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) угнетение дыхания
- 2) фибрилляция желудочков сердца
- 3) отрыв конечностей
- 4) кровотечения и переломы

**СМЕНА ОДЕЖДЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОГО И АКУШЕРСКОГО ПРОФИЛЯ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ \_\_\_ РАЗ В \_\_\_\_\_ И ПО МЕРЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ**

- 1) 1; неделю
- 2) 1; день
- 3) 1; 2 дня
- 4) 2; неделю

**БАЗОВЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) операционное дело
- 2) лечебное дело
- 3) анестезиология и реаниматология
- 4) медико-профилактическое дело

**К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ УРЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ОТНОСИТСЯ ЗАПАХ ИЗО РТА**

- 1) сероводорода
- 2) миндаля

- 3) мочевины
- 4) ацетона

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПЕРВУЮ РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 12
- 2) 10
- 3) 18
- 4) 9

**ОСНОВНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 6 ЛЕТ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) *Mycoplasma pneumoniae*, *Legionella pneumophila*
- 2) *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*
- 3) *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*
- 4) *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*

**ПРАВая ГРАНИЦА АБСОЛЮТНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА В НОРМЕ ПРОХОДИТ**

- 1) на 1 см кнаружи от правого края грудины
- 2) по левому краю грудины
- 3) на 2 см кнаружи от правого края грудины
- 4) по правому краю грудины

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА, ТРЕБУЮЩИМИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) V
- 2) III
- 3) I
- 4) IV

**СИНДРОМ УВЕЛИЧЕННОГО КРОВОТОКА ЧЕРЕЗ ЛЁГКИЕ (ГИПЕРВОЛЕМИИ МАЛОГО КРУГА) ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) стойкой артериальной гипертонией
- 2) ослаблением II тона на лёгочной артерии
- 3) одышечно-цианотическими приступами
- 4) повторными бронхитами, пневмониями

**АТЕЛЕКТАЗ У ДЕТЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) инородном теле бронха
- 2) обструктивном бронхите
- 3) бронхиальной астме
- 4) остром трахеите

### **ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) мокрота в виде «малинового желе»
- 2) «ржавая» мокрота
- 3) большое количество гнойной мокроты
- 4) небольшое количество вязкой стекловидной мокроты

### **НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА Е ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обеспечение населения доброкачественной питьевой водой
- 2) своевременная изоляция больного
- 3) специфическая профилактика групп риска
- 4) профилактическая дезинфекция в детских дошкольных организациях

### **В ПОМЕЩЕНИИ, ОТНОСЯЩЕМСЯ К ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ, НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРЫ ХРАНЯТ В ЗАПИРАЮЩИХСЯ НАСЫПНЫХ ИЛИ ПРИКРЕПЛЕННЫХ К ПОЛУ (СТЕНЕ) СЕЙФАХ НЕ НИЖЕ \_\_\_ КЛАССА УСТОЙЧИВОСТИ К ВЗЛОМУ**

- 1) 5
- 2) 6
- 3) 4
- 4) 3

### **ЛЁГочНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ХРОНИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЕМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, НАЛИЧИЕМ РЕСПИРАТОРНЫХ СИМПТОМОВ, ТАКИХ КАК СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ, ОДЫШКА, ЗАЛОЖЕННОСТЬ В ГРУДИ И КАШЕЛЬ, КОТОРЫЕ ВАРЬИРУЮТ ПО ВРЕМЕНИ И ИНТЕНСИВНОСТИ И ПРОЯВЛЯЮТСЯ ВМЕСТЕ С ВАРИАБЕЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эозинофильная пневмония
- 2) бронхиальная астма
- 3) гиперчувствительный пневмонит
- 4) фиброзирующий альвеолит

### **ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ ГРИППА ВОЗРАСТАЕТ ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПНЕВМОНИЕЙ, ВЫЗВАННЫХ**

- 1) пневмоцистой
- 2) клебсиеллой
- 3) кишечной палочкой
- 4) микоплазмой

### **ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ПРИЗНАКАМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипокалиемия
- 2) гиперкапния
- 3) гипоксия
- 4) гиперкалиемия

### **ПОЯВЛЕНИЕ ПРОЛЕЖНЕЙ - СВИДЕТЕЛЬСТВО**

- 1) недостаточного ухода за пациентом
- 2) неправильно назначенного врачом лечения
- 3) несоблюдения пациентом больничного режима
- 4) неправильного питания пациента

### **ОСНОВНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА**

- 1) повреждение трахеи
- 2) перелом позвоночника
- 3) перелом ключицы
- 4) перелом ребер

### **ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дискриминантный
- 2) штриховой
- 3) фасетный
- 4) факторный

### **В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ ЗА ВОСПРИЯТИЕМ СООБЩЕНИЯ СЛЕДУЕТ**

- 1) оценка сообщения
- 2) интерпретация сообщения
- 3) выделение и понимание смысловой части
- 4) обратная связь

### **ПОРЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЕТ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА**

- 1) постовая (палатная)
- 2) процедурного кабинета
- 3) участковая
- 4) старшая

### **ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) аллергические высыпания на коже
- 2) падение АД
- 3) отсутствие пульсации на периферических артериях
- 4) нарушение дыхания

### **ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ D РАЗВИВАЕТСЯ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ИЛИ ОСТРЫМ ГЕПАТИТОМ**

- 1) С
- 2) В
- 3) G
- 4) А

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК  
ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КРАСНУХИ НАЧИНАЮТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 13
- 2) 12
- 3) 19
- 4) 18

**ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ**

- 1) расчет температуры воды при купании
- 2) кормление со сниженным калоражем
- 3) физические нагрузки по самочувствию
- 4) организовать гипоаллергенную среду

**ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОМ ХРАНЕНИИ, ЗАПИСЫВАЕТСЯ В**

- 1) реестр инвентаризируемых ценностей
- 2) общую опись
- 3) отдельную опись
- 4) акт результатов проверки ценностей

**ПРИЧИНОЙ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ МОЖЕТ СТАТЬ**

- 1) пропуск инъекций инсулина
- 2) самостоятельная отмена лекарств
- 3) несоблюдение питьевого режима
- 4) передозировка инсулина

**КУПИРОВАНИЕ АНГИНОЗНОГО ПРИСТУПА НАЧИНАЕТСЯ С НАЗНАЧЕНИЯ**

- 1) нитратов внутривенно капельно
- 2) нитроглицерина сублингвально
- 3) наркотических анальгетиков
- 4) спазмолитиков

**ПРИ ПОПАДАНИИ ВАКЦИНЫ НА СЛИЗИСТЫЕ ГЛАЗ НЕОБХОДИМО**

- 1) промыть их любым дезинфицирующим раствором
- 2) обработать их перекисью водорода
- 3) обильно промыть их водой
- 4) обработать их раствором спирта 40о

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА  
МЕДИЦИНСКОГО СТАТИСТИКА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ**

- 1) 28
- 2) 24
- 3) 30
- 4) 36



**ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ БЕШЕНСТВА БЫВАЕТ**

- 1) контактный
- 2) пищевой
- 3) трансмиссивный
- 4) воздушно-капельный

**В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В РОССИИ НЕ ВХОДИТ ПРИВИВКА ПРОТИВ**

- 1) кори
- 2) бруцеллеза
- 3) полиомиелита
- 4) краснухи

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ**

- 1) подписаны постовой медицинской сестрой
- 2) заверены печатью и подписью главного врача медицинской организации
- 3) заполнены в произвольной форме
- 4) подписаны заведующим структурным подразделением медицинской организации

**ИЗЛИШКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАТ**

- 1) принятию к учёту
- 2) списанию
- 3) продаже
- 4) передаче в уставный капитал организации

**ВЛАЖНУЮ УБОРКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В ОТДЕЛЕНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПРОВОДЯТ \_\_\_\_ РАЗ(А) В СУТКИ**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**К ЛЁГочНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПНЕВМОНИИ ОТНОСИТСЯ \_\_\_\_\_ ЛЁГКОГО**

- 1) опухоль
- 2) киста
- 3) абсцесс
- 4) гипоплазия

**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЁГКОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) эхокардиография
- 2) рентгенография органов грудной клетки
- 3) спирография

4) электрокардиография

**ЕСЛИ ИЗ ПРОНУМЕРОВАННОГО СПИСКА ПАЦИЕНТОВ В ВЫБОРКУ ВКЛЮЧАЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ПАЦИЕНТ, ТО ВЫБОРКУ НАЗЫВАЮТ**

- 1) типологической
- 2) серийной
- 3) случайной
- 4) механической

**ТЕРАПИЮ БРОНХОДИЛАТАТОРАМИ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ХОБЛ ПРОВОДЯТ ДЛЯ**

- 1) улучшения эластической тяги легких
- 2) предупреждения дальнейшего снижения функции легких
- 3) подавления хронического воспаления
- 4) улучшения переносимости физической нагрузки

**ПУЛЬС ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ 98 УДАРОВ В МИНУТУ – ЭТО**

- 1) норма
- 2) брадикардия
- 3) тахикардия
- 4) аритмия

**ПРИ ТРОМБЭМБОЛИИ ЛЁГочНОЙ АРТЕРИИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кровохаркание
- 2) тахипноэ
- 3) гиперкриния
- 4) боль в грудной клетке

**КОНТРОЛЬ ПОКАЗАНИЙ КАЖДОГО ТЕРМОИНДИКАТОРА В ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ**

- 1) регулярно с интервалом 2 часа
- 2) перед завершением работы
- 3) утром до начала работы
- 4) 2 раза в сутки

**НАЛИЧИЕ ИНФИЛЬТРАТА (ПАПУЛЫ) ЛЮБОГО РАЗМЕРА НА ДИАСКИНТЕСТ ОЗНАЧАЕТ РЕАКЦИЮ**

- 1) гипертермическую
- 2) сомнительную
- 3) положительную
- 4) отрицательную

**КАРТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ХРАНИТСЯ В**

**МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 5
- 2) 8
- 3) 10
- 4) 15

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАДИОИЗОТОПНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕОБХОДИМО**

- 1) исключить применение лекарственных препаратов, содержащих железо и висмут
- 2) проводить профилактику метеоризма
- 3) исключить применение лекарственных препаратов, содержащих йод и бром
- 4) очистить кишечник

**К НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) пиелонефрит
- 2) наследственный нефрит
- 3) синдром вегетативной дистонии
- 4) порок развития сосудов почки

**БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮТ ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПРИ ОТСУТСТВИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

- 1) централизованной канализации
- 2) установок для обеззараживания физическим методом
- 3) установок термического обезвреживания
- 4) участка обращения с медицинскими отходами

**ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ХОБЛ ЗНАЧЕНИЕ ОФВ1 СООТВЕТСТВУЕТ**

- 1)  $30\% < \text{ОФВ1} < 50\%$
- 2)  $60\% < \text{ОФВ1} < 80\%$
- 3)  $\text{ОФВ1} < 30\%$
- 4)  $\text{ОФВ1} < 60\%$

**ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ ДЛИНА ТЕЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В СРЕДНЕМ НА (\_\_\_ СМ)**

- 1) 25-30
- 2) 20-25
- 3) 12-15
- 4) 15-20

**ТКАНЕВОЙ САЛФЕТКОЙ, СМОЧЕННОЙ РАСТВОРОМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ДЕЗИНФИЦИРУЮТ**

- 1) предметы ухода за пациентами
- 2) кислородные маски
- 3) мочеприемники

4) наконечники для клизм

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) анамнестическое указание на употребление наркотиков
- 2) тяжелое течение гепатита
- 3) выраженная слабость
- 4) развитие алкогольного делирия

**НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ФОРМ \_\_\_\_\_ КОНТРОЛЯ**

- 1) ведомственного
- 2) государственного
- 3) общественного
- 4) внутреннего

**ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) статистический талон
- 2) амбулаторную карту
- 3) талон на прием к врачу
- 4) извещение о пациенте с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования

**ПОКАЗАТЕЛЬ БОЛЬНИЧНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПУТЁМ ДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА УМЕРШИХ ЗА ГОД НА ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ**

- 1) направленных в стационар из поликлиники
- 2) прикрепленных к поликлинике
- 3) выбывших из стационара
- 4) поступивших в тяжелом состоянии

**КРИТЕРИЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТЕРАПИИ АНТИБИОТИКАМИ ПРИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТОЙКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ (СУТКИ)**

- 1) 6–7
- 2) 8–10
- 3) 1–2
- 4) 3–5

**ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ УПАКОВКИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК II И ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОМЕЧЕНЫ \_\_\_\_\_ ПОЛОСОЙ**

- 1) волнистой зеленой
- 2) тройной желтой
- 3) двойной красной
- 4) прерывистой синей

**ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ИНФИЛЬТРАТА И ГИПЕРЕМИИ ИЛИ НАЛИЧИЕ «УКОЛОЧНОЙ РЕАКЦИИ» ДО 2 ММ НА ДИАСКИНТЕСТ ОЗНАЧАЕТ \_\_\_\_\_ РЕАКЦИЮ**

- 1) гипертермическую
- 2) сомнительную
- 3) отрицательную
- 4) положительную

**К ПОМЕЩЕНИЯМ ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ**

- 1) кабинет главной медицинской сестры
- 2) помещения производителей наркотических средств
- 3) сестринские посты в отделениях
- 4) аптеки

**У ЛИЦ СТАРШЕ 40 ЛЕТ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКИХ БРОНХИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) врожденная функциональная недостаточность мукоцилиарного аппарата воздухоносных путей
- 2) повторная вирусно-бактериальная инфекция
- 3) курение
- 4) воздействие промышленных газов и аэрозолей

**К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ**

- 1) отказ от курения
- 2) повышение уровня липопротеинов высокой плотности
- 3) сахарный диабет
- 4) нерациональное питание

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)**

- 1) 6
- 2) 8
- 3) 9
- 4) 15

**ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) температура воздуха в помещении  $\leq 10^{\circ}\text{C}$
- 2) влажность воздуха в помещении  $\leq 30\%$
- 3) отсутствие в воздухе закрытого помещения углекислоты и аммиака
- 4) защита от действия прямого солнечного света

**ЙОДОФОРМ, ГИДРОКАРБОНАТ НАТРИЯ ОТНОСЯТСЯ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ**

### **СРЕДСТВАМ, ТРЕБУЮЩИМ ЗАЩИТЫ ОТ**

- 1) воздействия повышенных температур
- 2) воздействия пониженных температур
- 3) воздействия газов, содержащихся в окружающей среде
- 4) улетучивания

### **МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ РАБОТНИКУ НЕПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕМ РАБОТОДАТЕЛЯ, ВОЗМЕЩАЕТСЯ**

- 1) государством
- 2) работодателем
- 3) общественной профессиональной организацией
- 4) профсоюзной организацией

### **ДЛЯ СПРАВОЧНОГО СТОЛА СПИСОК ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ОТДЕЛЕНИИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИИ) МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) медицинская сестра ночной смены
- 2) старшая медицинская сестра
- 3) заведующий отделением
- 4) процедурная медицинская сестра

### **К ОСНОВНОМУ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ**

- 1) гомогенное затемнение соответственно доле или сегменту
- 2) картину ателектаза
- 3) тяжистый л?гочный рисунок
- 4) очаговые тени

### **ДЛЯ РАСШИФРОВКИ КОДОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) РЛС-аптекарь
- 2) ОКПД 2
- 3) реестр лекарственных средств
- 4) регистр лекарственных средств

### **ДЛЯ ОСТРОГО ПРОСТОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРЕН \_\_\_\_\_ ПЕРКУТОРНЫЙ ЗВУК**

- 1) притупленный
- 2) коробочный
- 3) лёгочный
- 4) укороченный лёгочный

### **СТАНДАРТЫ И ПОРЯДКИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УТВЕРЖДАЮТСЯ НА УРОВНЕ**

- 1) федерального органа исполнительной власти
- 2) главного врача медицинской организации
- 3) заведующего отделением медицинской организации

4) территориальных фондов обязательного медицинского страхования

**ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) усиление боли при осевой нагрузке на сломанную кость
- 2) ослабление боли при осевой нагрузке на сломанную кость
- 3) крепитация костных отломков при движении
- 4) патологическая подвижность

**ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ**

- 1) кабачки
- 2) обезжиренный творог
- 3) капусту
- 4) макаронные изделия

**РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ В НЕБНЫХ МИНДАЛИНАХ ПОД ЭПИТЕЛИЕМ ЖЕЛТЫЕ «ПРОСЯНЫЕ» ТОЧКИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ АНГИНЫ**

- 1) фолликулярной
- 2) лакунарной
- 3) дифтеритической
- 4) агранулоцитарной

**РЕЦЕПТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 148-1/У-88, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ СО ДНЯ ОФОРМЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 90
- 2) 30
- 3) 15
- 4) 60

**ВТОРЫМ ЭТАПОМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) высушивание рук стерильным полотенцем
- 2) вытирание рук бумажными салфетками однократного применения
- 3) мытье рук мылом и водой
- 4) обработка антисептиком кистей рук, запястий и предплечий

**О СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ ГАСТРИТА СУДЯТ ПО КЛЕТОЧНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА**

- 1) лимфоцитами
- 2) макрофагами
- 3) эозинофилами
- 4) лейкоцитами

**ОЖОГ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИРАВНИВАЕТСЯ К \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ ОЖОГА**

- 1) 10; глубокого
- 2) 1; глубокого
- 3) 10; поверхностного

4) 5; глубокого

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ХОЛОДИЛЬНИКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В**

- 1) 3 недели
- 2) 2 недели
- 3) месяц
- 4) 2 месяца

**ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ**

- 1) профессиональными некоммерческими организациями
- 2) соглашением сторон
- 3) страхователем
- 4) государством

**ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ**

- 1) улучшение аппетита
- 2) коррекция психоэмоциональных нарушений
- 3) снижение потребности в инсулине/сахароснижающих препаратах/
- 4) обеспечение полноценной двигательной активности

**ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСНОВНЫМ УЧЁТНЫМ ДОКУМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отчёт о деятельности стационара
- 2) выписной эпикриз
- 3) статистическая карта выбывшего из стационара
- 4) медицинская карта больного

**ОБРАБОТКА ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) однократно
- 2) двукратно
- 3) на усмотрение процедурной медицинской сестры
- 4) трехкратно

**ОТСУТСТВИЕ В СОСТАВЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ ОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА**

- 1) Г
- 2) Б
- 3) А
- 4) В



**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЗДАЕТСЯ \_\_\_\_\_ КОМИССИЯ**

- 1) по составлению инвентаризационных описей
- 2) общественная
- 3) постоянно действующая инвентаризационная
- 4) административная

**НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 5 ЛЕТ ИМЕЕТ**

- 1) определение общего иммуноглобулина класса E (IgE) в сыворотке крови
- 2) исследование функции внешнего дыхания
- 3) рентгенография органов грудной клетки
- 4) общий анализ крови

**В ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИ**

- 1) неясном происхождении выпота
- 2) стойком выпоте
- 3) малом объеме плеврального выпота у больного с пневмонией
- 4) подозрении на эмпиему плевры

**ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЖГУТА В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ ПРОВОДИТЬСЯ**

- 1) один раз в неделю
- 2) после загрязнения биологической жидкостью пациента
- 3) после каждого пациента
- 4) в конце рабочей смены

**НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНА В ПЛАНЕ**

- 1) тромбоэмболии мозговых сосудов
- 2) развития инфаркта миокарда
- 3) развития венозной недостаточности
- 4) развития легочной гипертензии

**ДЛЯ БЕЗЖЕЛТУШНОЙ ФОРМЫ ГЕПАТИТА НЕ ХАРАКТЕРНО**

- 1) появление ринита
- 2) увеличение размеров печени
- 3) появление желтухи
- 4) повышение температуры тела

**ПРОТИВ ДИАГНОЗА БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ**

- 1) пластическая ригидность
- 2) постуральная неустойчивость
- 3) тремор покоя
- 4) раннее появление деменции

## **ПРОМЫВНЫЕ ВОДЫ ПОСЛЕ ЭТАПОВ ОЧИСТКИ И ОПОЛАСКИВАНИЯ ЭНДОСКОПОВ ДОЛЖНЫ СЛИВАТЬСЯ В**

- 1) емкость для кипячения
- 2) централизованную канализацию без предварительного обеззараживания
- 3) емкость с дезинфицирующим средством
- 4) централизованную канализацию с предварительным обеззараживанием

## **ПРОФИЛАКТИКА СТОЛБНЯКА ПРОВОДИТСЯ**

- 1) только при огнестрельных ранах
- 2) только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели непосредственный контакт с почвой
- 3) при любых ранениях
- 4) только при укушенных ранах

## **РИСК РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ВЕЛИК ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПОВЫШЕНИИ В ПЛАЗМЕ КРОВИ**

- 1) ЛПВП
- 2) ЛПОНП
- 3) ЛПНП
- 4) ЛП(а)

## **КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЧИСТКИ СТВОЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ, МУСОРОСБОРНЫХ КАМЕР СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) один раз в смену
- 2) ежедневно
- 3) ежемесячно
- 4) еженедельно

## **ПРИ ПОДАЧЕ СУДНА ПАЦИЕНТУ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ**

- 1) влажным и теплым
- 2) не имеет значения
- 3) комнатной температуры
- 4) сухим и теплым

## **ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ТЕМ, ЧТО**

- 1) начинаются со слов «зачем?», «сколько?» и т.д.
- 2) задаются в тех случаях, когда необходимо переключиться на другую проблему
- 3) предполагают ответ «да» или «нет»
- 4) на эти вопросы не даётся прямого ответа

## **ПОД РОТАЦИЕЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ПОНИМАЮТ**

- 1) смену дезинфицирующего средства в пределах группы
- 2) замену дезинфицирующего средства на препарат из другой группы
- 3) переход от химической дезинфекции к централизованной системе обеззараживания

4) переход от химической дезинфекции к аппаратным методам обеззараживания

#### **ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ КРЕПИТАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ**

- 1) бронхите
- 2) туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов
- 3) пневмонии
- 4) экссудативном плеврите

#### **РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) госпитализация в хирургический стационар без дополнительных лечебных мероприятий
- 2) исключение приема пищи и жидкости, спазмолитики, передать «актив» в поликлинику
- 3) обезболивание, спазмолитики, госпитализация в хирургический стационар
- 4) ЭКГ, холод на живот, спазмолитики, госпитализация в хирургический стационар на фоне инфузионной терапии кристаллоидами при интоксикации или гиповолемии

#### **ПОСТРАДАВШЕМУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В СОЗНАНИИ И ИМЕЮЩЕМУ ПРИЗНАКИ КРОВОПОТЕРИ, СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) на спине с согнутыми в коленях и разведенными ногами
- 2) устойчивое боковое
- 3) на спине с приподнятыми ногами
- 4) полусидячее

#### **ПОД ИНТЕНСИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПОНИМАЮТ**

- 1) частоту явления в среде, непосредственно его продуцирующей
- 2) встречаемость явления в среде, непосредственно с ним не связанной
- 3) изменение явления во времени
- 4) распределение целого и части

#### **РЖАВЫЙ ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) крупозной пневмонии
- 2) бронхиальной астме
- 3) остром бронхите
- 4) ОРВИ

#### **ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОТПРАВЛЕНИЙ В ПОСТЕЛИ ПАЦИЕНТУ ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) Фаулера
- 2) Симса
- 3) на боку
- 4) на спине

#### **ДЛЯ УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ БЫЛ**

- 1) опорожнен самостоятельно

- 2) дренирован
- 3) опорожнен с помощью катетера
- 4) наполнен

### **В КАЧЕСТВЕ ОТВЛЕКАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ**

- 1) горчичники на затылок и икроножные мышцы
- 2) горчичники на область сердца
- 3) холод на голову
- 4) горячие ручные и ножные ванны

### **БАЗОВЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ ГИГИЕНИСТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) стоматология ортопедическая
- 2) стоматология терапевтическая
- 3) стоматология
- 4) стоматология профилактическая

### **ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ДЫХАНИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО, КОТОРОМУ ПРОВОДИЛАСЬ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ, НЕОБХОДИМО**

- 1) позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи
- 2) продолжить проведение сердечно-легочной реанимации, прекратив выполнять вдохи искусственного дыхания
- 3) продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью
- 4) придать ему устойчивое боковое положение и контролировать его состояние

### **ВАЖНЕЙШИМ КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) изменение газового состава крови,
- 2) появление у больного одышки при обычной физической нагрузке.
- 3) наличие бронхиальной обструкции
- 4) кашель с мокротой не менее 3 мес в году на протяжении последних двух лет

### **МАРКЕРОМ ИНФИЦИРОВАННОСТИ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) anti-HBe IgG
- 2) anti-HBs IgG
- 3) HBsAg
- 4) anti-HBcor IgG

### **ПРИ ПЛАНОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ НА СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТЫ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДЛЕЖАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ НА**

- 1) грипп
- 2) туберкулез

- 3) ротавирусные инфекции
- 4) мононуклеоз

**ПРОВЕРИТЬ НОМЕР И ДАТУ РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СЛЕДУЕТ В**

- 1) общероссийском классификаторе продукции
- 2) справочнике Видаль
- 3) регистре лекарственных средств
- 4) классификаторе лекарственных средств

**БРОНХОСКОПИЯ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ**

- 1) радиоизотопным
- 2) лабораторным
- 3) эндоскопическим
- 4) рентгенологическим

**ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ПОДКРЫЛЬЦОВАЯ АРТЕРИЯ ПРИЖИМАЕТСЯ К**

- 1) лопатке
- 2) головке локтевой кости
- 3) головке плечевой кости
- 4) головке бедренной кости

**УРОВНИ ОБЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ КАК**

- 1) убедительный
- 2) доверительный
- 3) общественный
- 4) внутриличностный, межличностный и социальный

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НУЖНО ИСКЛЮЧИТЬ**

- 1) рыбу
- 2) мясо
- 3) гречневую кашу
- 4) овощи

**ИНДИКАТОРЫ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗАКЛАДЫВАТЬ В РАБОЧИЙ РАСТВОР**

- 1) до начала использования
- 2) в процессе и после использования
- 3) через 5 минут от начала использования
- 4) по окончании использования

**ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПИЩЕБЛОКОВ, А ТАКЖЕ ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ И/ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КРОМЕ ИНФЕКЦИОННЫХ, ОТНОСЯТ К**

## **МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА**

- 1) Б
- 2) А
- 3) Г
- 4) В

## **ПОД КОДИРОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ПОНИМАЮТ**

- 1) деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного и многократного использования для упорядоченности в сфере производства, обращения и потребления товара, а также повышение его безопасности, экономичности и конкурентоспособности
- 2) разделение рынка на четко выраженные группы покупателей, каждая из которых может приобрести определенные товары
- 3) процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в данной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон
- 4) присвоение наименованиям продукции и операциям условных обозначений

## **ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПАТОЛОГИЮ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В ТОЧКЕ МАКСИМАЛЬНОЙ БОЛЕЗНЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ СИМПТОМ**

- 1) Щеткина-Блюмберга
- 2) Пастернацкого
- 3) Бабинского
- 4) Кернига

## **ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ**

- 1)  $(\text{число умерших}) / (\text{численность населения на 01 января данного года}) \cdot 1000$
- 2)  $(\text{число умерших за год}) / (\text{среднегодовая численность населения}) \cdot 1000$
- 3)  $(\text{число умерших в течение года}) / (\text{число живущих})$
- 4)  $(\text{число умерших в течение межпереписного периода}) / (\text{среднегодовая численность населения}) \cdot 1000$

## **ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОДНОГО ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ**

- 1) рост 65 см
- 2) закрытый большой родничок
- 3) окружность головы 40 см
- 4) масса тела 8,0 кг

## **СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ЧЕТВЕРТУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ДЕТЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ГРУППАМ РИСКА, ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 9
- 2) 7
- 3) 12
- 4) 3

### **У ПАЦИЕНТА С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III СТЕПЕНИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) повышение артериального давления
- 2) головная боль
- 3) резкое снижение артериального давления
- 4) возбуждение

### **КРИТЕРИЕМ ДИАГНОЗА «УЗЕЛКОВЫЙ ПОЛИАРТЕРИИТ» ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) развитие полиартрита
- 2) наличие вируса гепатита В
- 3) легочное кровотечение
- 4) поражение верхних дыхательных путей

### **ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ У РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) артериальное давление на ногах выше, чем на руках
- 2) артериальное давление на руках выше, чем на ногах
- 3) артериальная гипотония
- 4) сохраненная пульсация на бедренных артериях

### **ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ АД У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ (ММ РТ.СТ.)**

- 1) 140/90
- 2) 130/80
- 3) 120/80
- 4) 140/80

### **МЕНИНГЕАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ**

- 1) симптом Кернига
- 2) декортикационную ригидность
- 3) асинергию Бабинского
- 4) симптом натяжения

### **ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАТЬ УРОВЕНЬ \_\_\_\_\_ СЫВОРОТКИ КРОВИ**

- 1) панкреатической амилазы
- 2) глюкозы
- 3) холестерина
- 4) кальция

### **АБСОЛЮТНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) увеличение концентрации в плазме крови альдостерона
- 2) наличие признаков опухоли надпочечника и гиперпродукции катехоламинов
- 3) низкий уровень катехоламинов в крови, оттекающей по почечным венам, и их концентрация в моче

4) высокий уровень в моче 5-оксииндолуксусной кислоты

### **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ**

- 1) товарный отчет
- 2) расчетно-платежная ведомость
- 3) инвентаризационная опись
- 4) кассовый отчет

### **ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ СВЯЗАНА С**

- 1) увеличением носоглоточной миндалины
- 2) катарально-экссудативным ринитом
- 3) наличием фибринозной пленки
- 4) грибковыми наложениями

### **ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) мертворождение и смертность жизнеспособных плодов в течение первых 7 суток (168 часов) жизни
- 2) все случаи самопроизвольных абортов (выкидышей), независимо от сроков беременности
- 3) смертность новорожденных в течение первого месяца жизни
- 4) смертность новорожденных, обусловленную перинатальными причинами

### **К МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОСТАНОВКЕ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ ОТНОСЯТ**

- 1) контроль температуры исследуемых изделий
- 2) использование резиновых перчаток при приготовлении перекиси водорода из пергидроля
- 3) удаление остатков азопирама с исследованных изделий после проверки
- 4) использование азопирама рабочего раствора в течение 1-2 часов

### **ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) острый инфаркт миокарда в течение первых 2 суток
- 2) критический аортальный стеноз
- 3) острый миокардит
- 4) стеноз ствола левой коронарной артерии

### **В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТ В ЗАПИРАЮЩИХСЯ СЕЙФАХ НЕ НИЖЕ \_\_\_\_\_ КЛАССА УСТОЙЧИВОСТИ К ВЗЛОМУ**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4



### **ГОСПИТАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ**

- 1) через 48 и более часов после поступления в стационар
- 2) в момент поступления в стационар и позднее
- 3) через 12 и более часов после поступления в стационар
- 4) через 24 и более часов после поступления в стационар

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПАРАФИНОЛЕЧЕНИЮ**

- 1) хронические заболевания внутренних органов
- 2) хронические гинекологические заболевания
- 3) заболевания периферической нервной системы
- 4) острые гнойные воспалительные процессы

### **НАИБОЛЬШУЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ИМЕЮТ БОЛЬНЫЕ**

- 1) менингоэнцефалитом и менингококцемией
- 2) острым назофарингитом и «здоровые» носители менингококков
- 3) серозным менингитом
- 4) пневмонией и трахеобронхитом

### **НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ КРИТЕРИЕМ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ В ЛИКВОРЕ**

- 1) плеоцитоз
- 2) обнаружение возбудителя
- 3) лимфоцитарный плеоцитоз
- 4) снижение глюкозы

### **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕНИНГИТ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИЙ АНАЛИЗ**

- 1) ликвора
- 2) крови
- 3) мочи
- 4) кала

### **СНИЖЕНИЕ СВЯЗЫВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ С БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ ВЫЗЫВАЕТ**

- 1) бронхиальная астма
- 2) пневмония
- 3) цирроз печени
- 4) острая инфекция

### **ПРОБОЙ ЗИМНИЦКОГО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ**

- 1) количество сахара, ацетона
- 2) количество форменных элементов, бактерий
- 3) плотность и диурез
- 4) наличие уробилина, желчных пигментов

**ИСТОЧНИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИИ ПРИ БЕШЕНСТВЕ МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) человек, привитый от бешенства культуральной вакциной
- 2) дикое животное
- 3) человек, привитый от бешенства мозговой вакциной
- 4) работник лаборатории по производству антирабической вакцины

**АНАЛИЗ МОЧИ НА САХАР СОБИРАЕТСЯ В**

- 1) течение 10 часов в одну ёмкость
- 2) течение суток в 8 банок, каждые 3 часа
- 3) стерильную пробирку
- 4) течение суток в одну ёмкость

**ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ, ДИАГНОЗ НАПРАВЛЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ДИАГНОЗ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЗАПИСЫВАЮТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО В**

- 1) приемном отделении стационара
- 2) лечебном отделении стационара
- 3) диагностическом центре
- 4) поликлиническом отделении объединенной больницы

**ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ**

- 1) рост в см минус 100
- 2) масса тела в кг, деленная на рост в м<sup>2</sup> (в квадрате)
- 3) рост в м минус 100
- 4) масса тела в кг, деленная на рост в см

**ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ МАММОГРАФИЯ ПРОВОДИТСЯ ЖЕНЩИНАМ 40-75 ЛЕТ 1 РАЗ В \_\_\_\_\_ ГОД(А)**

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ**

- 1) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
- 2) экстренное извещение об инфекционном заболевании
- 3) статистическую карту вышедшего из стационара
- 4) журнал учета амбулаторных больных

**ПЕРЕЧЕНЬ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДАЕТ**

- 1) Министерство здравоохранения Российской Федерации

- 2) Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков
- 3) Президент Российской Федерации
- 4) Правительство Российской Федерации

**ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТНИКОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) добровольным
- 2) желательным
- 3) обязательным
- 4) необязательным

**КЛАССИФИКАЦИОННУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПО МКБ-10 СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В РЛС В РАЗДЕЛЕ \_\_\_\_\_ УКАЗАТЕЛЬ**

- 1) фармакологический
- 2) нозологический
- 3) производителей лекарственных средств
- 4) анатоμο-терапевтико-химический

**ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПЕРВИЧНОГО ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) менингококк
- 2) стрептококк
- 3) стафилококк
- 4) энтерококк

**ПРИ ЭФФЕКТИВНОМ ЗАКРЫТОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ПРИ КАЖДОМ НАДАВЛИВАНИИ НА ГРУДИНУ ОЩУЩАЕТСЯ ПУЛЬСОВАЯ ВОЛНА НА \_\_\_\_\_ АРТЕРИИ**

- 1) сонной
- 2) лучевой
- 3) локтевой
- 4) подключичной

**ЗАРАЖЕНИЕ БЕШЕНСТВОМ ЧЕЛОВЕКА ПРОИСХОДИТ В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ**

- 1) ранении человека предметами, загрязненными слюной или веществом мозга больного бешенством животного
- 2) укусе кровососущими насекомыми, паразитирующими на больных бешенством животных
- 3) ослюнении неповрежденных кожных покровов человека диким животным
- 4) употреблении в пищу мяса или молока больных бешенством животных

**ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА В СРЕДИ ЛИЦ, РАНЕЕ НЕ ПОЛУЧАВШИХ ПРИВИВКУ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, ПРОВОДИТСЯ**

- 1) до 55 лет
- 2) до 15 лет
- 3) в любом возрасте

4) до 30 лет

**ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бронхиальное дыхание
- 2) возраст старше 65 лет
- 3) субфебрильная лихорадка
- 4) кашель с гнойной мокротой

**ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕЛЯТСЯ НА \_\_\_\_\_ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ**

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 5

**САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ \_\_\_\_\_ РАСЫ**

- 1) смешанной
- 2) негроидной
- 3) европеоидной
- 4) монголоидной

**ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ**

- 1) могут отсутствовать симптомы со стороны кожных покровов
- 2) всегда имеются уртикарные высыпания
- 3) всегда имеются ангиоотеки
- 4) всегда имеется гиперемия кожи лица

**ДЛЯ САНИТАРНОЙ (ОБЩЕЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ) ОБРАБОТКИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ИСПОЛЬЗУЮТ АНТИСЕПТИКИ**

- 1) спиртосодержащие
- 2) не содержащие спирты
- 3) обладающие моющими свойствами
- 4) содержащие краситель

**ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ В САНИТАРНЫХ КОМНАТАХ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 48
- 2) 24
- 3) 12
- 4) 36

**ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) измерение температуры в прямой кишке

- 2) прием контрастного вещества перорально
- 3) очистительную клизму утром и вечером
- 4) премедикацию

### **МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ ОФОРМЛЯЕТСЯ ФЕЛЬДШЕРОМ В СЛУЧАЕ**

- 1) работы в отдаленно расположенном структурном подразделении медицинской организации, не имеющем врача
- 2) констатации смерти на дому при работе в составе бригады скорой медицинской помощи
- 3) если в медицинской организации работает только один врач, при его отсутствии (отпуск, болезнь) и в порядке исключения
- 4) если в структурном подразделении медицинской организации работает исключительно средний медицинский персонал

### **МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТКАЗАНО В ПЕРЕВОДЕ НА ДОЛЖНОСТЬ СТАРШЕЙ АКУШЕРКИ ТОЙ ЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ**

- 1) документов о повышении квалификации
- 2) необходимого стажа работы
- 3) профессиональной переподготовки по специальности «Акушерское дело»
- 4) базового образования, соответствующего должности старшей акушерки

### **РАННИМ СИМПТОМОМ ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) поза на боку с запрокинутой головой
- 2) вынужденное положение конечности
- 3) мозговой крик
- 4) гиперестезия кожных покровов

### **РЕАНИМАЦИЮ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ ПРИ**

- 1) отсутствию признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 30 минут
- 2) отсутствию признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 10 минут
- 3) попадании желудочного содержимого в дыхательные пути
- 4) появлении пенистой мокроты из верхних дыхательных путей

### **АНТИРАБИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ**

- 1) бешенства
- 2) столбняка
- 3) буцеллеза
- 4) клещевого энцефалита

### **МАРКИРОВКА РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НАНОСИТСЯ НЕСМЫВАЕМОЙ КРАСКОЙ И ОБОЗНАЧАЕТ**

- 1) адрес завода-производителя
- 2) комплектность
- 3) размер (номер)
- 4) название нормативного документа

### **ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРИСТУП НАЧИНАЕТСЯ С**

- 1) клонических судорог
- 2) тонических судорог
- 3) возникновения иллюзий
- 4) гиперкинезов

### **ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ ЛИСТКОВ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, НАЗНАЧАЕТСЯ**

- 1) по устному распоряжению руководителя медицинской организации
- 2) приказом по медицинской организации
- 3) главной медицинской сестрой медицинской организации
- 4) по распоряжению главного бухгалтера медицинской организации

### **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ**

- 1) используются стерильные медицинские изделия
- 2) приготовление растворов производится на лабораторном столе в хорошо вентилируемом помещении
- 3) реактивы, входящие в состав азопирама, должны храниться в плотно закрывающихся емкостях
- 4) исследуемые изделия должны иметь комнатную температуру

### **К ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ОТНОСЯТ**

- 1) вялость, сонливость
- 2) головные боли и головокружение
- 3) потерю больным сознания в момент травмы
- 4) тошноту, рвоту после травмы

### **МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 18
- 2) 16
- 3) 144
- 4) 36

### **ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА ГЕПАТИТА В КОНТРОЛИРУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ В КРОВИ КОЛИЧЕСТВА АНТИТЕЛ К**

- 1) HBe антигену класса IgA
- 2) HBe антигену класса IgG
- 3) HBcor антигену
- 4) HBs антигену

**АЛЛЕРГИЯ НА ПЕКАРСКИЕ ДРОЖЖИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ**

- 1) полиомиелита
- 2) дифтерии
- 3) гепатита В
- 4) туберкулёза

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ХРАНЯТ В**

- 1) кабинете старшей медицинской сестры отделения
- 2) металлическом шкафу (сейфе) в технически укрепленном помещении
- 3) кабинете заведующего отделением
- 4) запирающемся ящике стола старшей медицинской сестры отделения

**О РАЗВИТИИ РАКА ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА МОЖНО ПОДОЗРЕВАТЬ ПРИ ПОВЫШЕНИИ В КРОВИ**

- 1) альфа-фетопротейна
- 2) АСТ
- 3) иммуноглобулина А
- 4) холинэстеразы

**ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) дифтерийный бактериофаг
- 2) живую противодифтерийную вакцину
- 3) вакцину АКДС
- 4) дифтерийную сыворотку

**ГРУППОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ \_\_\_\_ И БОЛЕЕ СЛУЧАЕВ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ И ОБЩИМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ**

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 1

**ПАЦИЕНТЫ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА СНИМАЮТСЯ С ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ВРАЧА**

- 1) кардиолога
- 2) ревматолога
- 3) педиатра
- 4) кардиохирурга

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ**

## **ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пневмоторакс
- 2) ателектаз
- 3) булла
- 4) абсцесс

## **ПЕРФОРАЦИЯ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ ПРИ ОСТРОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ**

- 1) ее прорыва из-за резкого втяжения
- 2) ее прорыва под давлением гноя
- 3) резкого повышения давления в барабанной полости при глотании
- 4) дистрофии участка барабанной перепонки

## **В КАЧЕСТВЕ АНТИКОАГУЛЯНТА ПРИ ЗАБОРЕ КРОВИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛЯЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) цитрат натрия
- 2) этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА)
- 3) гепарин
- 4) оксалат натрия

## **КАРТА ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ИМЕЕТ КОД**

- 1) 003/у
- 2) 063/у
- 3) 025-ЦЗ/у
- 4) 064/у

## **МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, ПОДВЕРГШИЙСЯ УГРОЗЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, НАХОДИТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА В ТЕЧЕНИЕ (В ГОДАХ)**

- 1) 5
- 2) 25
- 3) 2
- 4) 1

## **ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ ОПИСИ ПРОИЗВОДИТСЯ**

- 1) переписыванием
- 2) отдельным актом за подписью руководителя организации
- 3) замазыванием белилами
- 4) зачеркиванием неправильных записей с подписью членов инвентаризационной комиссии и материально-ответственного лица

## **В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПОРЯДКОМ И СРОКАМИ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ДОЛЖНА ИМЕТЬ СТАЖ РАБОТЫ ПО**



### **СПЕЦИАЛЬНОСТИ НЕ МЕНЕЕ (В ГОДАХ)**

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 7

### **ДЛЯ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРНА СЕЗОННОСТЬ**

- 1) зимне-весенняя
- 2) осенне-зимняя
- 3) весенне-летняя
- 4) летне-осенняя

### **К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ МЕНИНГЕАЛЬНОМУ СИМПТОМУ ОТНОСИТСЯ**

- 1) западение родничка
- 2) тоническое напряжения мышц
- 3) гипотония шейных мышц
- 4) нижний рефлекс Ландау

### **ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ МАССАЖА ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ**

- 1) очистительную клизму
- 2) лечебную гимнастику
- 3) гигиенический душ
- 4) физиотерапию

### **ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭРИТРОЦИТОВ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ**

- 1) острым пиелонефрите
- 2) стенокардии напряжения
- 3) ХОБЛ
- 4) сепсисе

### **ПАЦИЕНТУ С ВЫРАЖЕННЫМ КАШЛЕМ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) рентгенография
- 2) ультразвуковое исследование
- 3) эхокардиография
- 4) реоэнцефалография

### **ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ EAN-13 В ОТЛИЧИЕ ОТ ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ ПО СИСТЕМЕ EAN-8 СОДЕРЖИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О/ОБ**

- 1) фирме-производителе
- 2) стране происхождения
- 3) контрольном числе товара
- 4) исходном сырье

### **ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ (ЧАС)**

- 1) 96-120
- 2) 12-24
- 3) 48-72
- 4) 72-96

**ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ЧАСТО ПОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) острая боль в сердце
- 2) выбухание вен шеи
- 3) удушье
- 4) головная боль

**ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОСТЕЙ ДЕСТРУКЦИИ В ЛЕГКИХ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ**

- 1) энтерококком
- 2) пневмококком
- 3) стафилококком
- 4) хламидией

**ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ОБЩИЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ РАССЧИТЫВАЮТ КАК \_\_\_\_\_ ЕСТЕСТВЕННОГО И МИГРАЦИОННОГО ПРИРОСТА**

- 1) произведение
- 2) сумма
- 3) отношение
- 4) разность

**БАЗОВЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ ИНСТРУКТОРА-ДЕЗИНФЕКТОРА ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) медико-профилактическое дело
- 2) лабораторное дело
- 3) гигиена и санитария
- 4) гигиеническое воспитание

**ПРИ УТОМЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРМОМЕТРИИ**

- 1) меняются периодически
- 2) снижаются
- 3) повышаются
- 4) не изменяются

**В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ РАБОТНИКУ ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА СРОК ДО (В КАЛЕНДАРНЫХ ДНЯХ)**

- 1) 14
- 2) 7
- 3) 5
- 4) 10

**В КАБИНЕТАХ ФИЗИОТЕРАПИИ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ 1 РАЗ В**

- 1) квартал
- 2) полугодие
- 3) неделю
- 4) месяц

**В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 4-Й КАТЕГОРИИ, ХРАНЕНИЕ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В**

- 1) специальной зоне, отделенной от основного места хранения наркотических лекарственных препаратов металлической решеткой
- 2) контейнерах, помещенных в термоконтейнеры
- 3) запирающихся холодильных камерах
- 4) термоконтейнерах, размещенных в сейфах

**В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НА ГЛАЗНОМ ДНЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) дистрофия сетчатки
- 2) атрофия зрительного нерва
- 3) ангиопатия
- 4) нейроретинопатия

**ПО НАПОЛНЕНИЮ ПУЛЬС РАЗЛИЧАЮТ**

- 1) полный, пустой
- 2) твердый, мягкий
- 3) ритмичный, аритмичный
- 4) скорый, медленный

**ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) низкое АД
- 2) боль за грудиной продолжительностью более 20 минут
- 3) холодный пот и резкая слабость
- 4) брадикардия или тахикардия

**ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ОТНОСЯТ К КЛАССУ**

- 1) Д
- 2) В
- 3) Б
- 4) Г

## **ПОКАЗАТЕЛЕМ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) исчезновение френикус-симптома
- 2) нормализация температуры тела
- 3) сохранение болевого синдрома
- 4) тяжесть в эпигастральной области

## **ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К**

- 1) бронхоскопии
- 2) рентгеноскопии
- 3) томографии
- 4) флюорографии

## **ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ**

- 1) повышение выносливости дыхательной мускулатуры
- 2) подавление воспаления в дистальных бронхах и бронхиолах
- 3) устранение психоэмоциональных нарушений
- 4) повышение работоспособности

## **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Б ОТНОСЯТСЯ**

- 1) помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые
- 2) помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях
- 3) стерилизационные при операционных
- 4) помещения для мытья и стерилизации столовой и кухонной посуды при буфетных и столовых отделениях

## **СЫПЬ ПРИ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА**

- 1) лице, груди, животе
- 2) волосистой части головы
- 3) разгибательных поверхностях туловища и конечностей
- 4) ягодицах, нижних конечностях, внизу живота

## **ПРОВЕТРИВАНИЕ ПАЛАТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ НЕ МЕНЕЕ 4 РАЗ В СУТКИ ПО (В МИНУТАХ)**

- 1) 30
- 2) 10
- 3) 15
- 4) 20

## **ВОСПАЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) острым бронхите
- 2) крупозной пневмонии
- 3) сухом плеврите
- 4) бронхиальной астме

**СИМПТОМОМ СМЕШАННОЙ ФОРМЫ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ (МЕНИНГОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ + МЕНИНГОКОКЦЕМИЯ) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нормотермия
- 2) боли в животе
- 3) желтуха
- 4) геморрагическая некротическая сыпь на коже

**ПУЛЬСОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) аритмичный пульс
- 2) напряжение пульса
- 3) разница между систолическим и диастолическим давлением
- 4) сумма систолического и диастолического давления

**ПРИ НЕВРИТЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА ВЕДУЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ПАССИВНОЙ ГИМНАСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лейкопластырное натяжение с пораженной стороны на здоровую
- 2) исходное положение лежа
- 3) лейкопластырное натяжение со здоровой стороны на пораженную
- 4) исходное положение лежа на боку (на непораженной стороне)

**ПОСТУРАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ**

- 1) корригирующее положение
- 2) специальную укладку конечностей пациента, а иногда и всего туловища в определенное положение
- 3) смену положений тела на протяжении занятия по лечебной физкультуре
- 4) выполнение упражнений на снарядах

**ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА В ФОРМЕ МОТОРНОЙ АФАЗИИ ВКЛЮЧАЕТ ПОМОЩЬ**

- 1) логопеда
- 2) дефектолога
- 3) психолога
- 4) психиатра

**В НАЧАЛЕ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У БОЛЬНЫХ ОТМЕЧАЕТСЯ КАШЕЛЬ**

- 1) с выделением «ржавой» мокроты
- 2) с выделением стекловидной мокроты
- 3) с выделением пенистой розовой мокроты
- 4) сухой

**ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ НАБЛЮДАЕТСЯ ЖЕЛТУХА**

- 1) гемолитическая
- 2) метаболическая
- 3) механическая

4) паренхиматозная

**ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ ТОЛЩИНА СЛОЯ РАСТВОРА ХИМИЧЕСКОГО СРЕДСТВА НАД МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ (В СМ)**

- 1) 7
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 1

**КАКОЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ТЕЧЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ПО ТИПУ «ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ»?**

- 1) гемоколит
- 2) энтероколит
- 3) гастроэнтерит
- 4) гастрит

**ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИТА ПРОВОДИТСЯ**

- 1) сначала вне стационара, затем в стационаре
- 2) сначала в стационаре, затем вне стационара
- 3) в стационаре
- 4) вне стационара

**ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ**

- 1) глюкозурии
- 2) полиурии
- 3) анурии
- 4) ацетонурии

**НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) смещение переходной зоны в V1-V2
- 2) смещение переходной зоны в V4-V6
- 3) увеличение интервала PQ
- 4) патологический зубец Q

**В ЛИКВОРЕ НЕ БУДЕТ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ**

- 1) менингококковом энцефалите
- 2) менингококковом менингите
- 3) менингококцемии
- 4) менингококковом менингоэнцефалите

**ЭКСКУРСИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ – ЭТО**

- 1) разница между вдохом и выдохом
- 2) количество вдохов и выдохов в 1 мин
- 3) частота колебаний грудной клетки в 1 мин
- 4) сумма между вдохом и выдохом

**В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫМ И МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ ПРОВОДЯТ**

- 1) иммунодиагностику с применением аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми единицами очищенного туберкулина в стандартном разведении
- 2) иммунодиагностику с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении
- 3) исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии
- 4) флюорографию легких или рентгенографию органов грудной клетки (легких)

**КЛЮЧЕВОЙ ФАЗОЙ ОБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) выбор канала передачи сообщения
- 2) восприятие
- 3) обратная связь
- 4) подбор слов и грамматики

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ТРЕТЬЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 12
- 2) 7
- 3) 6
- 4) 9

**ПРИ УГРОЗЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОМЫ У БОЛЬНОГО ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ДИЕТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КАСАЮТСЯ**

- 1) углеводов
- 2) поваренной соли
- 3) жиров
- 4) белков

**ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ \_\_\_\_\_ ПОМОЩИ**

- 1) паллиативной
- 2) первичной медико-санитарной
- 3) специализированной
- 4) скорой

**ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ВКЛЮЧЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, РЕГЛАМЕНТИРОВАНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ**

- 1) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
- 2) «Об обращении лекарственных средств»

- 3) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
- 4) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

### **БРОНХОСКОПИЯ ПРИ ХОБЛ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ**

- 1) выявить обструкцию периферических бронхов
- 2) получить материал для микробиологического исследования
- 3) выявить трахеобронхиальную дискинезию
- 4) получить материал для цитологического исследования

### **ТРЕБОВАНИЯ-НАКЛАДНЫЕ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, ВЫПИСЫВАЮТ НА ОТДЕЛЬНЫХ БЛАНКАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ**

- 1) стоимости лекарственных препаратов
- 2) формы выпуска
- 3) фармакологической группы препаратов
- 4) способа применения

### **СПЕЦИАЛИСТ, ПРИНЯТЫЙ НА ДОЛЖНОСТЬ УЧАСТКОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, ДОЛЖЕН ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ \_\_\_\_\_ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА**

- 1) с момента подписания
- 2) со дня, определенного сторонами
- 3) через 7 дней со дня подписания
- 4) на следующий день после подписания

### **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Г ОТНОСЯТСЯ**

- 1) рентгенооперационные, в том числе ангиографические
- 2) послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных
- 3) клизменная
- 4) палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений

### **ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ У ПОСТРАДАВШЕГО МОЖЕТ НАСТУПИТЬ АПНОЭ В РЕЗУЛЬТАТЕ \_\_\_\_\_ ПРИ \_\_\_\_\_**

- 1) поражения легких; прохождении петли тока через грудную клетку
- 2) полного расслабления дыхательной мускулатуры; длительном контакте с источником тока
- 3) тетанического спазма дыхательной мускулатуры; длительном контакте с источником тока
- 4) поражения межреберных мышц; прохождении петли тока через грудную клетку

### **СМЕНА БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ**

- 1) 1 раз в 3-4 дня
- 2) каждый день
- 3) 1 раз в 7 дней
- 4) до прекращения выделений из ран



**УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ С ОТКРЫТЫМ ПЕРЕЛОМОМ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ (ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ НЕТ)**

- 1) повязка на рану, шинирование, холод на область перелома, обезболивание, транспортировка в медицинскую организацию
- 2) холод на область перелома, повязка на рану, шинирование, обезболивание, транспортировка в медицинскую организацию
- 3) шинирование, повязка на рану, холод на область перелома, обезболивание, транспортировка в медицинскую организацию
- 4) обезболивание, повязка на рану, шинирование, холод на область перелома, транспортировка в медицинскую организацию

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ФЕРМЕНТОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В МОЧЕ ПРИМЕНЯЮТ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ**

- 1) на диастазу
- 2) по методу Зимницкого
- 3) на ацетон
- 4) по методу Нечипоренко

**ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА, КОТОРОЕ ОН НЕ В СОСТОЯНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОМЕНЯТЬ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) вынужденное
- 2) активное
- 3) пассивное
- 4) дренажное

**ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) поэтажная манометрия
- 2) рентгенологическое исследование желудка
- 3) эндоскопия с прицельной биопсией
- 4) исследование секреторной функции желудка

**ЗАПОДОЗРИТЬ НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ МОЖНО ПРИ**

- 1) повышении температуры тела
- 2) ощущении сердцебиения и/или перебоев в области сердца
- 3) повышении артериального давления
- 4) гематурии, отеках

**ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТА С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПАЦИЕНТОВ ОТНОСЯТ К КЛАССУ**

- 1) Б
- 2) А
- 3) В
- 4) Г

### **К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ МЕНИНГЕАЛЬНОМУ СИМПТОМУ ОТНОСИТСЯ**

- 1) нижний рефлекс Ландау
- 2) гипотония шейных мышц
- 3) западение родничка
- 4) симптом Кернига

### **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕШЕННОЛЕТНИХ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ ВНОСЯТ В**

- 1) карту учета диспансеризации
- 2) медицинскую карту стационарного больного
- 3) паспорт здоровья
- 4) маршрутную карту

### **ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫЕ В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБКАХ, ДОПУСКАЕТСЯ ИЗВЛЕКАТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_ ЧАСОВ ПОСЛЕ ИХ ВСКРЫТИЯ**

- 1) 6
- 2) 12
- 3) 24
- 4) 8

### **ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРОВЕРЯЮТ ПРИЗНАКИ СОЗНАНИЯ, ДЫХАНИЯ И**

- 1) наличие произвольных движений
- 2) реакцию зрачков на свет
- 3) кровообращения
- 4) измеряют артериальное давление

### **НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) геморрагическая звездчатая сыпь
- 2) менингеальный синдром
- 3) гепатолиенальный синдром
- 4) пятнисто-папулезная звездчатая сыпь

### **ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ВЫЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) лейкопения, лимфоцитоз, нормальная или замедленная СОЭ
- 2) лейкопения, лимфоцитоз, увеличенная СОЭ
- 3) лейкоцитоз, нейтрофилез, увеличенная СОЭ
- 4) лейкоцитоз, лимфоцитоз, нормальная или замедленная СОЭ

### **ИНТЕНСИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАЖАЕТ**

- 1) характеристику явления в среде, непосредственно с ним не связанной
- 2) распределение целого по составляющим его частям

- 3) изменение явления во времени
- 4) распространенность какого-либо явления в среде, непосредственно связанной с данным показателем

**В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ ОБРАБОТАННЫЙ ЭНДОСКОП В СОБРАННОМ И УПАКОВАННОМ В СТЕРИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ВИДЕ МОЖЕТ ХРАНИТЬСЯ ДО ОЧЕРЕДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 12
- 2) 24
- 3) 6
- 4) 3

**К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ МЕНИНГЕАЛЬНОМУ СИМПТОМУ ОТНОСИТСЯ**

- 1) западение родничка
- 2) симптомы Брудзинского
- 3) гипотония шейных мышц
- 4) нижний рефлекс Ландау

**ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) аллергические высыпания на коже
- 2) падение артериального давления
- 3) отсутствие пульсации на периферических
- 4) нарушение дыхания

**ДИАГНОСТИЧЕСКИ ИНФОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гипербилирубинемия
- 2) гиперурикемия
- 3) гипопроотеинемия
- 4) амилаземия

**ОБЪЕКТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ САМОКОНТРОЛЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) суточная доза ингаляционных глюкокортикостероидов
- 2) объем мокроты за сутки
- 3) показатели пикфлоуметрии
- 4) суточная доза бронхолитиков

**АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) стенозе легочной артерии
- 2) дефекте межпредсердной перегородки
- 3) коарктации аорты
- 4) дефекте межжелудочковой перегородки

**ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕДМЕТЫ УХОДА**

- 1) резиновое судно
- 2) резиновый катетер
- 3) мочеприемник, абсорбирующее белье
- 4) грушевидный баллон

**ПНЕВМОНИЯ, РАЗВИВШАЯСЯ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ ГРИППА, С БЫСТРО ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ДЕСТРУКЦИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ВЫЗВАНА**

- 1) микоплазмой
- 2) пневмококком
- 3) стафилококком
- 4) палочкой Фридлиндера

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПАКЕТЫ, КОНТЕЙНЕРЫ) ДЛЯ ОТХОДОВ КЛАССА «Б» И «В» В ОПЕРАЦИОННЫХ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ**

- 1) после каждой операции
- 2) один раз в смену
- 3) ежедневно
- 4) каждые 72 часа

**СИМПТОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) поверхностное дыхание
- 2) профузный пот
- 3) гипертермия
- 4) запах ацетона в выдыхаемом воздухе

**ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) бактериальный посев мочи
- 2) анализ мочи на микроальбуминурию
- 3) проба по Зимницкому
- 4) анализ мочи по Нечипоренко

**ПРИЗНАКОМ, ОТЛИЧАЮЩИМ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ ОТ ЛИЧНОСТНОГО, ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ УСЛОВИЕ**

- 1) цели общения лежат за пределами процесса общения, общение подчинено решению задач
- 2) наличие формально-деловой ситуации общения
- 3) коммуникаторы должны принадлежать к бизнес-среде
- 4) непосредственный контакт коммуникаторов

**МАНИПУЛЯТИВНЫМ ОБЩЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) беспредметное общение
- 2) общение с учетом личности собеседника
- 3) способ получить выгоду от собеседника
- 4) формальное общение

**ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ОТ \_\_ ДО \_\_\_\_°С**

- 1) +9-+10
- 2) +11-+12
- 3) -2-0
- 4) +2-+8

**ФЕЛЬДШЕРУ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ «АКУШЕРКА» ВО ВНОВЬ ОТКРЫВАЮЩЕМСЯ РОДИЛЬНОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ**

- 1) обучение на цикле повышения квалификации «Акушерство»
- 2) профессиональную переподготовку по специальности «Лечебное дело»
- 3) профессиональную переподготовку по специальности «Акушерское дело»
- 4) обучение на цикле повышения квалификации «Охрана здоровья женщины»

**ПИЩЕВОЙ РАЦИОН ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ**

- 1) большое количество белка
- 2) ограниченное количество белков
- 3) большое количество углеводов
- 4) ограниченное количество углеводов

**НАРУШЕНИЕ ЖИРОВОГО ОБМЕНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) гиперхолестеринемией
- 2) снижением уровня бета-липопротеидов
- 3) гиперкетонемией и кетонурией
- 4) дислипидемией

**В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ**

- 1) препараты инсулина
- 2) бигуаниды
- 3) инкретины
- 4) препараты сульфонилмочевины

**КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) микроальбуминурия
- 2) гематурия
- 3) полиурия
- 4) лейкоцитурия

**ПРОЦЕДУРА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- 1) оценку практических навыков (умений)
- 2) оценку портфолио
- 3) анкетирование

4) решение ситуационных задач

### **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ В ОТНОСЯТСЯ**

- 1) стерилизационные при операционных
- 2) санитарные комнаты, помещения сортировки и временного хранения грязного белья
- 3) помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые
- 4) залы лечебной физкультуры

### **К СИМПТОМАМ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) менингеальные знаки
- 2) боли в суставах, мышцах
- 3) катаральные явления в ротоглотке, конъюнктивит
- 4) узловатая эритема и импетиго

### **ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ШТРИХОВОГО КОДА СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В**

- 1) общероссийском классификаторе продукции
- 2) справочнике Видаль
- 3) энциклопедии лекарств
- 4) классификаторе лекарственных средств

### **ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВОМ ИЗ СПИСКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) диазепам
- 2) никоморфин
- 3) фолькоин
- 4) эскодол

### **ДЛЯ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА МАЛОХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) повышение температуры,
- 2) одышка
- 3) кашель с выделением мокроты
- 4) кровохарканье

### **БАКТЕРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ**

- 1) гибель бактерий в вегетативной форме
- 2) инактивацию вирусов
- 3) гибель спор микроорганизмов
- 4) снижение вирулентности микроорганизмов

### **ПРЕТЕНДЕНТ НА ДОЛЖНОСТЬ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ \_\_\_\_\_ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ \_\_\_\_\_**

- 1) сестринское дело; общая практика

- 2) лечебное дело; сестринское дело
- 3) акушерское дело; сестринское дело
- 4) медико-профилактическое дело; общая практика

**ОГРАНИЧЕННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ ИЛИ ХАЙРОПАТИЯ У ПОДРОСТКОВ С ПЛОХО КОМПЕНСИРОВАННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА СВЯЗАНА С**

- 1) дефицитом мышечной массы
- 2) избыточным гликированием коллагена
- 3) отставанием в линейном росте
- 4) недоразвитием эпифизарной хрящевой ткани

**ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) общая слабость
- 2) затруднение вдоха
- 3) затруднение выдоха
- 4) головная боль

**ПРИ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ МИКОПЛАЗМОЙ, СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ**

- 1) цефалоспорины
- 2) тетрациклины
- 3) пенициллины
- 4) макролиды

**УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ 090/У ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, психического заболевания
- 2) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
- 3) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования
- 4) статистический талон о впервые выявленном случае заболевания

**ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) врачи-инфекционисты
- 2) врачи-эпидемиологи
- 3) врачи прививочного кабинета детской поликлиники
- 4) врачи-травматологи и (или) врачи-хирурги

**НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВАТЫ ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЛАЗНОЙ ИДЕТ ХЛОПОК \_\_\_\_ СОРТА**

- 1) 0-1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

### **ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) премедикацию
- 2) прием перорально контрастного вещества
- 3) очистительную клизму утром и вечером
- 4) измерение температуры в прямой кишке

### **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ КЕРНИГА ПРИ МЕНИНГИТЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сгибанием головы с приведением подбородка к груди
- 2) разгибанием голени при согнутом под прямым углом к туловищу бедре
- 3) поднятием выпрямленной в коленном суставе ноги
- 4) надавливанием на лонное сочленение

### **ПАЦИЕНТУ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НЕОБХОДИМА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ**

- 1) на 3-й сутки заболевания
- 2) на 4-е сутки заболевания
- 3) на 2-е сутки заболевания
- 4) в первые часы заболевания

### **ЕСЛИ В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ, ЗАКЛЮЧЕННОМ СО СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, НЕ ОГОВОРЕН СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ, ТО ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ**

- 1) недействительным
- 2) заключенным на неопределенный срок
- 3) заключенным на срок 5 лет
- 4) заключенным на срок 1 год

### **ПРИЗНАКОМ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) подъем температуры тела
- 2) чувство жажды
- 3) психо-моторное возбуждение больного
- 4) снижение мышечного тонуса конечностей

### **ВСЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКА РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ**

- 1) с предыдущего места работы
- 2) из независимых источников
- 3) у самого работника
- 4) из открытых источников

### **ДОГОСПИТАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ**

- 1) холод на область заднего прохода
- 2) очистительная клизма
- 3) внутривенное введение этамзилата
- 4) повязка с мазью



**ДЛЯ ХОБЛ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ (GOLD) ХАРАКТЕРНО ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 (%)**

- 1) < 30
- 2) 50-80
- 3) 30-50
- 4) > 80

**ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ ИССЛЕДУЮТ СОДЕРЖАНИЕ В КРОВИ**

- 1) фибриногена
- 2) холестерина
- 3) белка
- 4) глюкозы

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КОНКРЕТНОГО РАБОТНИКА ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ С МОМЕНТА ЕЁ**

- 1) изучения работником
- 2) составления для данного работника
- 3) подписания работником
- 4) утверждения в данном учреждении

**РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ НА РАБОТУ ЛИЦ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ТЕЧЕНИЕ**

- 1) недели после заключения трудового договора
- 2) пятнадцати дней после подписания приказа о приеме на работу
- 3) трех дней после приема на работу
- 4) месяца после приема на работу

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОКАЗАНЫ \_\_\_\_\_**

**ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ**

- 1) низкодозные микрогранулированные
- 2) низкодозные таблетированные
- 3) высокодозные таблетированные
- 4) высокодозные микрогранулированные

**СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА СКОПЛЕНИЕ КРОВИ В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ**

- 1) отставание больной стороны при экскурсии грудной клетки и притупление перкуторного звука
- 2) алая пятнистая кровь из полости рта
- 3) рвота «кофейной гущей»
- 4) кровохарканье

**ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ФИБРОГАСТРОСКОПИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) промывание желудка перед исследованием

- 2) очистительную клизму утром и вечером
- 3) голодание утром
- 4) применение газоотводной трубки

### **ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ИЗ ВОДЫ НЕОБХОДИМО**

- 1) оценить сознание, при его отсутствии оценить наличие дыхания, при отсутствии дыхания поручить помощнику вызвать скорую медицинскую помощь, приступить к сердечно-легочной реанимации
- 2) определить наличие пульса и реакции зрачков на свет, при их отсутствии – очистить ротовую полость, повернув голову пострадавшего набок, приступить к сердечно-легочной реанимации
- 3) проверить наличие признаков жизни, при их отсутствии поручить помощнику вызвать скорую медицинскую помощь, перекинуть пострадавшего через свое бедро лицом вниз, дождаться окончания выделения воды из его рта, положить пострадавшего на спину, приступить к сердечно-легочной реанимации
- 4) тщательно очистить ротовую полость и полость ротоглотки от ила, водорослей и других возможных загрязнений, приступить к сердечно-легочной реанимации, по окончании реанимации доставить пострадавшего в медицинскую организацию

### **ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ГЛУБОКОМ ОЖОГЕ МЕСТО ПОРАЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО**

- 1) охладить, обработать пантенолом, вызвать скорую медицинскую помощь
- 2) обработать пероксидом водорода, вызвать скорую медицинскую помощь
- 3) накрыть влажной салфеткой, вызвать скорую медицинскую помощь, дать пострадавшему обезболивающее
- 4) охладить, затем наложить влажную повязку, вызвать скорую медицинскую помощь

### **ОТХОДЫ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ОТНОСЯТ К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА**

- 1) Д
- 2) Г
- 3) Б
- 4) В

### **ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО К МЕХАНИЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСЯТ**

- 1) фертильность
- 2) естественную убыль населения
- 3) естественный прирост населения
- 4) маятниковую миграцию

### **СРЕДИ АНГИН НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА**

- 1) банальные ангины
- 2) ангины при инфекционных заболеваниях
- 3) ангины при заболеваниях крови
- 4) грибковые ангины

**МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В КАБИНЕТЕ МАССАЖА**

- 1) 24 °С
- 2) 18 °С
- 3) 20 °С
- 4) 22 °С

**СИСТЕМА СБОРА, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ВКЛЮЧАЕТ \_\_\_\_\_ ЭТАПОВ**

- 1) 6
- 2) 5
- 3) 8
- 4) 7

**ОТХАРКИВАЮЩИЙ ПРЕПАРАТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИТА У ДЕТЕЙ**

- 1) эуфиллин
- 2) тавегил
- 3) мукалтин
- 4) либексин

**ВЕДУЩИМ ЗВЕНОМ ПАТОГЕНЕЗА ПРИ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) поражение эндотелия сосудов
- 2) развитие отека и набухания головного мозга
- 3) поражение миокарда и перикарда
- 4) поражение эпителия верхних дыхательных путей

**ОСТРЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) стридорозным дыханием
- 2) осиплостью голоса
- 3) удлинённым выдохом
- 4) грубым лающим кашлем

**ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 7 ЛЕТ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ МАКСИМАЛЬНО ВЫДАЕТСЯ НА**

- 1) весь срок
- 2) 5 дней
- 3) 10 дней
- 4) 15 дней

**ПРИ АНАЛИЗЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО**

## **РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИМЕЕТ ЦЕЛЬ**

- 1) научную
- 2) исследовательскую
- 3) статистическую
- 4) общественную

## **ОПРЕДЕЛЯЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И РАЗРАБАТЫВАЕТ ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ**

- 1) врач-эпидемиолог
- 2) главная медицинская сестра
- 3) руководитель организации
- 4) лицо, ответственное по приказу за организацию обращения с медицинскими отходами

## **ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ СЫПЬ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ С НЕКРОЗАМИ В ЦЕНТРЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- 1) энтеровирусной инфекции
- 2) менингококковой инфекции
- 3) герпес зостер инфекции
- 4) стрептодермии

## **ЗАТЯЖНОЙ НАЗЫВАЮТ ПНЕВМОНИЮ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ БОЛЕЕ**

- 1) двух месяцев
- 2) шести месяцев
- 3) двух недель
- 4) четырех недель

## **ПРИ ВЫПИСЫВАНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК II ПЕРЕЧНЯ, В ВИДЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОФОРМЛЯЮТСЯ \_\_\_\_\_ РЕЦЕПТА**

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

## **НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ С ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) золотистый стафилококк
- 2) пневмококк
- 3) микоплазма
- 4) гемофильная палочка

## **СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА ПОЗВОЛЯЕТ**

- 1) выявить закономерности при малом числе наблюдений и большом разбросе

показателей

2) с помощью нескольких чисел получить представление о всей генеральной совокупности

3) анализировать большое число статистических наблюдений в определенный временной период

4) с помощью одного числа получить представление о совокупности массовых явлений

### **ВАРИАНТОМ НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ПРАВИЛЬНОМ РИТМЕ НА ЭКГ С ЧСС 170 УДАРОВ В МИНУТУ (КОМПЛЕКСЫ QRS НЕ ИЗМЕНЕНЫ) ЯВЛЯЕТСЯ**

1) пароксизмальная наджелудочковая тахикардия

2) пароксизмальная желудочковая тахикардия

3) синусовая тахикардия

4) ускоренный эктопический ритм

### **ОБСЛЕДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НА НОСИТЕЛЬСТВО УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРОВОДЯТ**

1) ежеквартально

2) ежегодно

3) только по эпидемиологическим показаниям

4) ежемесячно

### **РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ**

1) обработку отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов

2) прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования

3) хранение и захоронение отходов

4) перемещение отходов с помощью транспортных средств

### **КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ ЖЕЛЧИ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРОВАНИИ**

1) 3

2) 5

3) 7

4) 10

### **АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ БЕТА-АДРЕНОБЛОКТОРОВ СЛУЖИТ**

1) атриовентрикулярная блокада I степени

2) хроническая обструктивная болезнь легких

3) бронхиальная астма

4) атеросклероз сосудов нижних конечностей

### **К КАТЕГОРИИ ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ ОТНОСЯТСЯ ИНВАЛИДЫ В ВОЗРАСТЕ ДО (ЛЕТ)**

- 1) 14
- 2) 18
- 3) 17
- 4) 16

**ОСНОВНЫМ ЭКГ-ПРИЗНАКОМ НЕКРОЗА СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) широкий и глубокий зубец Q
- 2) снижение сегмента ST
- 3) подъем сегмента ST
- 4) уменьшение зубца R

**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- 1) antiHAVIgM
- 2) HBsAg
- 3) antiHbcorIgM
- 4) antiHbelgM

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК НА НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО ИМЕЕТ ЦВЕТ**

- 1) розовый
- 2) голубой
- 3) светло-зеленый
- 4) желтый

**ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) горизонтальное с приподнятыми ногами
- 2) сидя, с упором на руки
- 3) лежа на боку
- 4) горизонтальное с приподнятой головой

**РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ВЫДАВАТЬ РАБОТНИКАМ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА РАБОТАХ**

- 1) связанных с загрязнением
- 2) в медицинских организациях
- 3) предусмотренных типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты
- 4) с вредными и (или) опасными условиями труда

**СОЧЕТАНИЕ АНЕМИИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) В12-дефицитной анемии
- 2) синдроме Иценко-Кушинга
- 3) хронической почечной недостаточности
- 4) акромегалии

**БАЛЛОНЫ С КИСЛОРОДОМ В ЗДАНИЯХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
УСТАНОВЛИВАТЬ И ХРАНИТЬ**

- 1) разрешается в подвальных помещениях
- 2) разрешается в специально отведенных помещениях
- 3) запрещается, если отсутствует централизованное водоснабжение
- 4) запрещается при отсутствии специального подъезда

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ ПЕРЕД СОСТАВЛЕНИЕМ \_\_\_\_\_  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

- 1) годовой
- 2) квартальной
- 3) полугодовой
- 4) месячной

**СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОДНИМ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАНЯТИЮ ДОЛЖНОСТИ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ ХОСПИСА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ  
НАЛИЧИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ВОПРОСАМ**

- 1) осуществления ухода за пациентами
- 2) оказания психологической помощи пациентам, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи
- 3) оказания паллиативной медицинской помощи
- 4) лечения болевого синдрома и других тяжелых проявлений заболеваний

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ХРАНЯТСЯ В  
СООТВЕТСТВИИ С**

- 1) фармакологическими группами
- 2) рекомендациями лицензирующего органа
- 3) полученной листовкой о применении лекарственного средства
- 4) условиями имеющегося складского помещения

**СОГЛАСНО ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ  
«ГЕРИАТРИЯ» ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОЛЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  
УЧАСТКОВОЙ ВВОДИТСЯ В СЛУЧАЕ ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ  
БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ % ЖИТЕЛЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА**

- 1) 20
- 2) 10
- 3) 40
- 4) 30

**СОКРАЩЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ И СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_  
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ**

- 1) 36
- 2) 35

- 3) 38
- 4) 37

**БОЛЕЗНЕННОСТЬ В ЗОНЕ ШОФФАРА-РИВЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- 1) панкреатита
- 2) аппендицита
- 3) эзофагита
- 4) холецистита

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА, ПРЕВЫШАЮЩИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА И ВЫЗЫВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮТ, КАК \_\_\_\_\_ УСЛОВИЯ ТРУДА**

- 1) опасные
- 2) нежелательные
- 3) плохие
- 4) вредные

**БОЛЬНОГО ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ НУЖНО УЛОЖИТЬ НА**

- 1) левый бок
- 2) правый бок
- 3) живот
- 4) спину

**НОРМА ПУЛЬСА \_\_\_\_\_ УД. В МИН.**

- 1) 60-70
- 2) 60-90
- 3) 55-75
- 4) 60-80

**СМЕНУ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЯ РОДИЛЬНИЦАМ ПРОВОДЯТ 1 РАЗ (В ДНЯХ)**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 7
- 4) 5

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЦЕНКА СВОЕВРЕМЕННОСТИ ЕЁ ОКАЗАНИЯ, ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ**

- 1) медико-социальной экспертизы
- 2) экспертизы качества медицинской деятельности
- 3) экспертизы качества медицинской помощи
- 4) медико-экономической экспертизы

**ПРОФИЛАКТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ВКЛЮЧАЕТ**



- 1) иммунизацию против пневмококковой инфекции
- 2) естественное вскармливание
- 3) своевременное введение прикорма
- 4) достаточное пребывание на свежем воздухе

**НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ**

- 1) устранение гиподинамии
- 2) закаливание
- 3) нормализация массы тела
- 4) адекватное питание

**ЕСЛИ ИЗ ПРОНУМЕРОВАННОГО СПИСКА ПАЦИЕНТОВ В ВЫБОРКУ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПАЦИЕНТЫ С НОМЕРАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАБЛИЦЫ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ, ТО ВЫБОРКУ НАЗЫВАЮТ**

- 1) типологической
- 2) серийной
- 3) механической
- 4) случайной

**НУМЕРАЦИЮ ЗАПИСЕЙ В ЖУРНАЛАХ РЕГИСТРАЦИИ ПО КАЖДОМУ НАИМЕНОВАНИЮ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В ПРЕДЕЛАХ КАЛЕНДАРНОГО**

- 1) месяца
- 2) года
- 3) полугода
- 4) квартала

**ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНА РАБОТА**

- 1) в образовательных учреждениях
- 2) связанная с неблагоприятными метеофакторами
- 3) на компьютере
- 4) предполагающая незначительные физические нагрузки

**ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ В КРОВИ**

- 1) амилазы
- 2) мочевины
- 3) щелочной фосфатазы
- 4) тропонина

**ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ**

- 1) является признаком вторичной артериальной гипертензии
- 2) чаще встречается у гипертоников старше 80 лет

- 3) чаще встречается у гипертоников младше 50 лет
- 4) связано с повышенной жесткостью стенок аорты

### **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МЕНИНГОКОККОВОМ МЕНИНГИТЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) обычно 7-10 дней, зависит от показателей ликвора
- 2) весь период повышения температуры тела и 5 дней после нормализации температуры
- 3) 10-14 дней
- 4) 5 дней

### **У БОЛЬНЫХ С ИБС, ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ НИЗКИХ ДОЗ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ**

- 1) уменьшает риск повторных ИМ только у мужчин
- 2) уменьшает риск повторных ИМ
- 3) рекомендуется только для больных с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа
- 4) не влияет на прогноз

### **«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) компьютерная томография
- 2) пикфлоуметрия
- 3) бронхоскопия
- 4) спирометрия

### **ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТ ХОБЛ СОСТОИТ В**

- 1) ответной реакции на лечение ингаляционными глюкокортикостероидами
- 2) обратимости бронхиальной обструкции
- 3) ответной реакции на лечение пролонгированными холинолитиками
- 4) выраженности бронхообструктивных нарушений

### **К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ПРЕОБЛАДАНИЯ ТОНУСА СИМПАТИЧЕСКОЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТ**

- 1) повышение артериального давления
- 2) спастические запоры
- 3) красный дермографизм
- 4) гипергидроз ладоней и стоп

### **НАИБОЛЕЕ ЧАСТО САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА РАЗВИВАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ (ЛЕТ)**

- 1) 10-15
- 2) 25-30
- 3) 20-25
- 4) 50-60

### **ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА РАБОТНИКА**

- 1) при опоздании на работу больше 4 часов без уважительной причины

- 2) в случае наступления хозяйственного риска
- 3) при причинении вреда имуществу
- 4) при заключении договора о полной материальной ответственности

### **НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ОСТРОГО СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) вирус парагриппа
- 2) цитомегаловирус
- 3) вирус герпеса 6 типа
- 4)  $\beta$ -гемолитический стрептококк группы А

### **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Б ОТНОСЯТСЯ**

- 1) послеоперационные палаты
- 2) комнаты управления рентгеновских кабинетов и радиологических отделений, фотолаборатории
- 3) рентгенооперационные, в том числе ангиографические
- 4) помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях

### **РУКИ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ К ГРУДИ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ЖЕСТОМ**

- 1) пассивности
- 2) честности и открытости
- 3) беспокойства
- 4) упрямства

### **Герметизация одноразовых контейнеров для сбора колющих/режущих отходов класса Б и В в местах их образования осуществляется после их заполнения на**

- 1) 1/3
- 2) 1/2
- 3) 3/4
- 4) 2/3

### **К основным методам исследования, позволяющим верифицировать диагноз «Хронический гастрит», не относится**

- 1) анализ желудочного сока
- 2) дуоденальное зондирование
- 3) гастроскопия
- 4) рентгенография желудка

### **Цель исследования мочи по Нечипоренко**

- 1) определение микрофлоры мочи
- 2) определение функционального состояния почек
- 3) определение количества форменных элементов осадка мочи
- 4) определение суточного диуреза

## **ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА ЧАСТО ОТВОДИТ ГЛАЗА ОТ СВОЕГО СОБЕСЕДНИКА, ЭТО МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ, ЧТО**

- 1) ещё не всё сказано
- 2) он нервничает
- 3) он собирается с мыслями
- 4) разговор его мало интересует

## **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ ПРОВОДЯТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- 1) определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе
- 2) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления заболеваний
- 3) предупреждения несчастных случаев на производстве
- 4) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы

## **ДЛЯ НЕКРОТИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ПРИ СКАРЛАТИНЕ ХАРАКТЕРНО**

- 1) обильное гноетечение из уха с резким гнилостным запахом
- 2) отделяемое из уха без запаха
- 3) отсутствие гноетечения из уха
- 4) сильная боль в наружном ухе

## **ИММОБИЛИЗАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ В СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПРОИЗВОДИТСЯ**

- 1) гипсовой повязкой от голеностопного до коленного суставов
- 2) гипсовой лонгетой от голеностопного сустава до средней трети бедра
- 3) гипсовой лонгетой от плюсне-фаланговых суставов до средней трети бедра
- 4) циркулярной гипсовой повязкой от голеностопного до коленного суставов

## **НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ИЗ СПИСКА I ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эргометрин
- 2) метилакрилат
- 3) квазепам
- 4) каннабис

## **ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ, НЕПРИГОДНЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТНОСЯТ К ОТХОДАМ КЛАССА**

- 1) Д
- 2) В
- 3) Б
- 4) Г

## **ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РЕНТГЕНОГРАФИИ ЖЕЛУДКА ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ**

- 1) отварное мясо (курицу, говядину), нежирную рыбу, каши на воде, яйца
- 2) бобовые, черный хлеб, жирные, жареные, копченые блюда, фрукты, овощи
- 3) воду и соки
- 4) кисломолочные продукты

**ПАЦИЕНТ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА ПО ПОВОДУ ГЕПАТИТА В НАБЛЮДАЕТСЯ У ВРАЧА**

- 1) педиатра
- 2) инфекциониста
- 3) гастроэнтеролога
- 4) терапевта

**ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ В ПОКОЕ ПРОВОДИТСЯ ГРАЖДАНАМ 35 ЛЕТ И СТАРШЕ 1 РАЗ В \_\_\_\_\_ ГОД(А)**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ФИБРОЭНДОСКОПИИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дивертикул пищевода
- 2) рак кардии
- 3) варикозное расширение вен пищевода
- 4) астматическое состояние

**ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) создание необходимого резерва потенциальных кандидатов на все должности в организации
- 2) разработку программы для обучения трудовым навыкам, требующихся для эффективного выполнения работы
- 3) профориентацию и адаптацию персонала
- 4) разработку методик оценки трудовой деятельности и доведение ее до работников

**УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ**

- 1) 2 раза в день
- 2) утром
- 3) 1 раз в день
- 4) 2 раза в день и после каждого приёма пищи

**ПЕРВОЕ МЕСТО ПО АКТУАЛЬНОСТИ В РОССИИ ИЗ ЧИСЛА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАНИМАЕТ**

- 1) ишемическая болезнь сердца
- 2) тромбоз вен

- 3) порок сердца
- 4) заболевание периферических сосудов

### **ВЕРБАЛЬНЫМ СПОСОБОМ КОММУНИКАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) внешний вид коммуникаторов
- 2) жесты, мимика, прикосновение
- 3) устная речь
- 4) тон и темп речи

### **РЕСНИЦЫ И ВЕКИ ВЗРОСЛОМУ ПАЦИЕНТУ, НЕ СПОСОБНОМУ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЛИЧНУЮ ГИГИЕНУ, СЛЕДУЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ**

- 1) круговыми движениями
- 2) от внутреннего угла глаза к наружному
- 3) сверху вниз
- 4) от наружного угла глаза к внутреннему

### **КАШЕЛЬ ПРИ ТРАХЕОБРОНХИТЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ БОЛЯМИ**

- 1) в горле
- 2) за грудиной
- 3) в носоглотке
- 4) в боку

### **ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ХАРАКТЕРНО**

- 1) диспепсический синдром
- 2) диарея
- 3) спастический стул
- 4) умеренный лейкоцитоз

### **ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ БРОНХОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ СЕКРЕЦИИ, КАШЕЛЬ, ОДЫШКА НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ**

- 1) острым ларингите
- 2) острым бронхите
- 3) острым фиброзирующем альвеолите
- 4) острой пневмонии

### **ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ИЗМЕНИТЬ МНЕНИЕ СОБЕСЕДНИКА В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ, ТО ПРИБЕГАЕМ К ТЕХНИКЕ**

- 1) обратной связи
- 2) контраргументации
- 3) аргументации
- 4) активного слушания

### **К ОСНОВНЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) рациональное питание, профилактика атеросклероза

- 2) рациональное питание, физическая активность
- 3) рациональное питание, физическая активность, предупреждение ожирения и его лечение
- 4) предупреждение ожирения и его лечение

**ПРИЗНАКОМ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рвота пищей, съеденной накануне
- 2) изжога
- 3) рвота в виде кофейной гущи
- 4) дегтеобразный стул

**ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ ПАЦИЕНТУ МОЮТ ГОЛОВУ В СТАЦИОНАРЕ**

- 1) ежедневно
- 2) еженедельно
- 3) раз в две недели
- 4) два раза в неделю

**АКДС-ВАКЦИНУ ВВОДЯТ В ДОЗЕ \_\_\_\_\_ МЛ**

- 1) 3,0
- 2) 5,0
- 3) 1,0
- 4) 0,5

**ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА РЕКОМЕНДУЮТ СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ**

- 1) с пониженной калорийностью
- 2) с пониженным содержанием белка
- 3) с повышенным содержанием белка
- 4) основной вариант стандартной диеты

**ДНЕВНИК В МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО ЗАПОЛНЯЕТ**

- 1) постовая медицинская сестра
- 2) лечащий врач
- 3) заведующий отделением
- 4) старшая медицинская сестра

**ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ \_\_\_\_\_ ПОКАЗАТЕЛЯМИ**

- 1) интенсивными
- 2) экстенсивными
- 3) абсолютными
- 4) средними

**ОТХОДЫ ЛАБОРАТОРИЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, РАБОТАЮЩИХ С МИКРООРГАНИЗМАМИ 1-2 ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ**

- 1) В
- 2) Б
- 3) Г
- 4) Д

### **СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНУЮ РЕАНИМАЦИЮ НАЧИНАЮТ**

- 1) с введения медикаментов
- 2) с искусственной вентиляции легких
- 3) с непрямого массажа сердца
- 4) с обеспечения проходимости дыхательных путей

### **САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА, ПОСТУПАЮЩЕГО В СТАЦИОНАР, ПРОВОДИТСЯ**

- 1) до регистрации пациента
- 2) после регистрации пациента
- 3) до врачебного осмотра
- 4) после врачебного осмотра

### **КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ СТВОЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ, МУСОРОСБОРНЫХ КАМЕР СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) ежедневно
- 2) не реже 1 раза в месяц
- 3) еженедельно
- 4) один раз в смену

### **НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ ПРОВОДЯТ**

- 1) кистью одной руки
- 2) пальцами одной руки
- 3) кистями двух рук
- 4) пальцами двух рук

### **ДО НАЧАЛА ПРОВЕРКИ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ИМУЩЕСТВА ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

- 1) надлежит получить последние приходные и расходные документы на момент инвентаризации или отчеты
- 2) следует самостоятельно составить отчеты и приложить все приходные и расходные документы
- 3) нет необходимости составлять или получать отчеты
- 4) рекомендуется составить докладную руководителю о начале проведения инвентаризации

### **ДИАГНОСТИЧЕСКИ ИНФОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) уробилиногенурия
- 2) амилазурия



- 3) кристаллурия
- 4) протеинурия

### **СЕРДЕЧНЫЙ ВЫБРОС ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) величины температурного градиента
- 2) сократительной способности сердечной мышцы
- 3) насыщения гемоглобина кислородом в артериальной крови
- 4) диффузионной способности легких

### **КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗА ОДНУ МИНУТУ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ**

- 1) 10-12
- 2) 22-28
- 3) 16-20
- 4) 30-40

### **ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 17 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В \_\_\_\_\_ ГОД(А)**

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 3

### **ПОДГОТОВКУ МАТЕРИАЛОВ НА ЛИЦ, ОФОРМЛЯЕМЫХ НА РАБОТУ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- 1) лицо, оформляемое на работу
- 2) руководитель медицинской организации
- 3) отдел кадров
- 4) главная медицинская сестра

### **МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ПЕРЕД РАБОТНИКОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА В СВЯЗИ С**

- 1) лишением возможности трудиться
- 2) причиненным ущербом в результате несчастного случая на производстве
- 3) лишением возможности получать премию
- 4) лишением возможности установить неполный рабочий день

### **МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) дарсонвализацию
- 2) массаж грудной клетки
- 3) хвойные ванны
- 4) УФ-облучение

**ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫМИ КОЙКАМИ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: (ЧИСЛО КОЕК) /**

- 1) (среднегодовая численность врачей) × 10000
- 2) (среднегодовая численность населения) × 10000
- 3) (численность населения на 01 января текущего года) × 10000
- 4) (число больниц)

**ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ЯВЛЕНИЙ ОТЕКА ЛЕГКИХ БОЛЬНЫМ ПОКАЗАНА ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ С**

- 1) небулайзерной терапией
- 2) масляными растворами
- 3) раствором спирта этилового 96%
- 4) содовым раствором

**КОЛИЧЕСТВО КОЕК ОПРЕДЕЛЯЕТ**

- 1) категорию поликлиники
- 2) эффективность стационарной помощи
- 3) удовлетворенность населения медицинской помощью
- 4) мощность стационара

**ВРЕМЯ, ЗАТРАЧИВАЕМОЕ НА ОДИН ИСКУССТВЕННЫЙ ВДОХ, ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ (СЕК)**

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 3

**НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ БЕЛЬЕВОГО РЕЖИМА В ОТДЕЛЕНИИ НЕСЕТ**

- 1) главная медицинская сестра организации
- 2) старшая медицинская сестра отделения
- 3) сестра-хозяйка
- 4) старшая медицинская сестра филиала организации

**ПРИЗНАКОМ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сохранение одышки
- 2) появление продуктивного кашля
- 3) уменьшение пиковой скорости выдоха
- 4) усиление цианоза

**ПОНЯТИЕ «РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ» ЖЕНЩИНЫ В ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ РАСЧЁТАХ В РОССИИ СООТВЕТСТВУЕТ ВОЗРАСТНОМУ ПЕРИОДУ (ЛЕТ)**

- 1) 15-49
- 2) 20-50
- 3) 20-45

4) 15-45

### **НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ НАЧИНАЕТ**

- 1) в отделении реанимации
- 2) в процедурном кабинете
- 3) в палате интенсивной терапии
- 4) на месте развития

### **РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА КАПЕЛЬ ПРИ ЗАКАПЫВАНИИ В ГЛАЗ СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)**

- 1) 36– 37
- 2) 42 – 45
- 3) 24 – 30
- 4) 20 – 24

### **ДЛЯ ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОЧИ ТРЕБУЕТСЯ**

- 1) 2-3 мл средней порции дневной мочи
- 2) 50 мл средней порции утренней мочи
- 3) 100-200 мл утренней свежесобранной мочи
- 4) 100-200 мл последней порции вечерней мочи

### **К ОСЛОЖНЕНИЯМ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ НЕ ОТНОСЯТ**

- 1) острую гипертоническую энцефалопатию, отек легких
- 2) миокардит, перикардит
- 3) острое нарушение мозгового кровообращения
- 4) инфаркт миокарда, острый коронарный синдром

### **ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ «СТЕРОИДНОГО ДИАБЕТА» У БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ ИЦЕНКО-КУШИНГА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) активация глюконеогенеза в печени
- 2) стимуляция липолиза
- 3) катаболизм белка в скелетной мускулатуре
- 4) аутоиммунное разрушение бета-клеток

### **ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ НА САХАР В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ЕЕ СОБИРАЮТ В**

- 1) стерильные пробирки
- 2) в отдельные чистые емкости в зависимости от времени суток
- 3) стерильную банку объемом 200 мл
- 4) чистую банку объемом 3 литра

### **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ В ОТНОСЯТСЯ**

- 1) палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных
- 2) помещения дезинфекционных камер
- 3) палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений

4) комнаты управления рентгеновских кабинетов и радиологических отделений, фотолаборатории

**ВО ВТОРОЙ ГРАФЕ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УКАЗЫВАЮТ**

- 1) номер операции по приходу
- 2) остаток на первый рабочий день месяца
- 3) расход за месяц - всего
- 4) приход с остатками за месяц

**К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия
- 2) УЗИ, бронхоскопия
- 3) холецистография, ирригоскопия, гастроскопия
- 4) бронхография, томография, флюорография

**ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ С ЛИХОРАДКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рентгенография легких
- 2) общий анализ мокроты
- 3) исследование функции внешнего дыхания
- 4) ЭКГ

**КОНЦЕНТРАЦИЯ СПИРТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ ПАЦИЕНТА ПЕРЕД ИНЪЕКЦИЕЙ, СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_%**

- 1) 45
- 2) 60
- 3) 96
- 4) 70

**ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ**

- 1) по окончании первого трудового дня
- 2) по распоряжению руководителя медицинской организации
- 3) после прохождения работником испытательного срока
- 4) непосредственно на рабочем месте до начала исполнения работником своих профессиональных обязанностей

**ДЕТИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ ПОДЛЕЖАТ**

- 1) лечению на домашнем режиме
- 2) лечению на амбулаторном режиме
- 3) госпитализация на усмотрение родителей или самого несовершеннолетнего старше 15 лет
- 4) обязательной госпитализации в стационар

## **ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ИЗ ВОДЫ ПРИ УТОПЛЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) удаление воды из дыхательных путей, проверка дыхания, если его нет – проведение искусственного дыхания
- 2) удаление воды из дыхательных путей, проверка дыхания, если его нет – проведение сердечно-легочной реанимации
- 3) проверка сознания и дыхания, при их отсутствии – выполнение мероприятий сердечно-легочной реанимации
- 4) проверка пульса, если его нет – проведение искусственного дыхания

## **ДИФфуЗНЫЙ ПНЕВМОСКЛЕРОЗ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ У БОЛЬНЫХ**

- 1) ХОБЛ
- 2) бронхоэктатической болезнью
- 3) тяжелой пневмонией
- 4) абсцессом легких

## **ПРОТИВопоКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА**

- 1) сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы
- 2) все триместры беременности
- 3) отсутствуют
- 4) возраст до 6 месяцев

## **ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ ОКАЗЫВАЮТ ПРИКРЕПЛЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ \_\_\_\_\_ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ**

- 1) первичную медико-санитарную
- 2) высокотехнологическую
- 3) скорую
- 4) экстренную

## **ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ СВОДИТСЯ К**

- 1) коррекции гипертонии
- 2) контролю уровня гликемии
- 3) назначению малобелковой диеты
- 4) назначению инсулина

## **КОРРИГИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) возраст
- 2) дислипидемия
- 3) пол
- 4) гиперурикемия

**КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ У МУЖЧИН В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 140-170 г/л
- 2) 100-110 г/л
- 3) 120-140 г/л
- 4) 130-160 г/л

**ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ НА ДОВРАЧЕБНОМ ЭТАПЕ РАСТВОР ГЛЮКОЗЫ 40% ВВОДИТСЯ БОЛЬНОМУ В КОЛИЧЕСТВЕ \_\_\_\_\_ МЛ**

- 1) 100-150
- 2) не более 60
- 3) 180-200
- 4) 70-80

**С ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕНА**

- 1) в процессе работы
- 2) при поступлении на работу
- 3) по требованию
- 4) в случае возникновения конфликтной ситуации

**ФОРМОЙ АНГИНЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) геморрагическая
- 2) некротическая
- 3) катаральная
- 4) агранулоцитарная

**ТРЕХСЛОЙНОСТЬ МОКРОТЫ ПОСЛЕ ОТСТАИВАНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- 1) экзогенного аллергического альвеолита
- 2) хронический обструктивный бронхит
- 3) саркоидоза
- 4) абсцесса легкого и бронхоэктазов

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТРОНАЖНОГО ПОСЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ УЧАСТКОВОЙ ФИКСИРУЮТСЯ В «\_\_\_\_\_ УЧЕТА РАБОТЫ НА ДОМУ УЧАСТКОВОЙ (ПАТРОНАЖНОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ (АКУШЕРКИ)»**

- 1) книге
- 2) журнале
- 3) тетради
- 4) дневнике

**ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖИТ БОЛЬНОЙ**

- 1) скарлатиной
- 2) дизентерией
- 3) чесоткой
- 4) генерализованной формой менингококковой инфекции

### **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Г ОТНОСЯТСЯ**

- 1) «чистая» и «стерильная» зоны стерилизационного отделения
- 2) палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений
- 3) шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений
- 4) диспетчерские, комнаты персонала, комнаты отдыха пациентов после процедур

### **ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ III СТЕПЕНИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) сине-багровая кожа, выраженный отек, геморрагические пузыри
- 2) прозрачные пузыри, обрывки самопроизвольно вскрывшихся пузырей
- 3) сине-багровая кожа, выраженный отек, струпы
- 4) на фоне бледной кожи геморрагические пузыри, резкая боль

### **ДОСТОВЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА В ОНКОЛОГИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ ИССЛЕДОВАНИЕМ**

- 1) радиоизотопным
- 2) ультразвуковым
- 3) рентгенологическим
- 4) гистологическим

### **ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ПРОИЗВЕЛИ НАЛОЖЕНИЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА, ТРАВМИРОВАННУЮ КОНЕЧНОСТЬ НЕОБХОДИМО**

- 1) охладить
- 2) обездвижить и укутать (жгут при этом должен остаться на виду)
- 3) опустить ниже уровня сердца
- 4) приподнять выше уровня сердца

### **ДУОДЕНО-ГАСТРАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ**

- 1) перегиба желудка
- 2) антрального гастрита
- 3) эзофагеальной рефлюксной болезни
- 4) дивертикула желудка

### **ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В В КРОВИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- 1) анти- HBs и наличие анти-HBcor
- 2) анти- HBs и отсутствие анти-HBcor
- 3) HBs антигена и отсутствие анти-HBe
- 4) анти-HBcor и отсутствие анти- HBs

### **НА ВВЕДЕНИЕ ЖИВОЙ КОРЕВОЙ ВАКЦИНЫ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ В ВИДЕ**

- 1) энцефалита
- 2) судорог
- 3) повышения температуры на 6-11 день, гиперемии зева, небольшого насморка,

конъюнктивита

4) повышения температуры на 3-й день до 39,5°C с выраженными респираторными явлениями (насморк, боль в горле, кашель) и сыпью

**ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ, ЛОКАЛИЗУЮЩИХСЯ В НАДПОЧЕЧНИКАХ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) первичный гиперальдостеронизм
- 2) параганглиома
- 3) ренинсекретирующая опухоль
- 4) болезнь Кушинга

**СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ КАБИНЕТА ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ИЗ РАСЧЕТА \_\_\_\_\_ ДОЛЖНОСТЬ(И) НА ОДНУ ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 1,5

**ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ВО II СТАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) резкое прогрессивное снижение давления
- 2) постепенное, в течение нескольких часов снижение давления
- 3) кратковременный подъем давления с последующим его снижением
- 4) снижение давления с последующей его стабилизацией

**СООТВЕТСТВИЕ ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫБОРОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДАННЫМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ НАЗЫВАЮТ**

- 1) альтернативностью
- 2) доказательностью
- 3) репрезентативностью
- 4) валидностью

**НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) создание покоя
- 2) назначение сокращающих средств
- 3) введение прогестерона, вызов врача
- 4) проведение катетеризации

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ПОЗДНЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) осложнение острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ)
- 2) осложнение респираторного дистресс-синдрома (РДС)



- 3) внутриутробное инфицирование
- 4) аспирация в родах

### **ПИТОРАКС ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ПНЕВМОНИИ**

- 1) легионеллезной
- 2) пневмококковой
- 3) пневмоцистной
- 4) стафилококковой

### **ПРИ ОКАЗАНИИ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО**

- 1) дать сладкий чай
- 2) ввести инсулин
- 3) ввести внутривенно физиологический раствор
- 4) ввести внутривенно капельно 5% раствор глюкозы

### **ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЁНКА С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ, ВКЛЮЧАЮТ**

- 1) небулайзерную терапию, спелеотерапию, амплипульс
- 2) спелеотерапию, амплипульс, дыхательную гимнастику
- 3) спелеотерапию, дыхательную гимнастику, небулайзерную терапию
- 4) дыхательную гимнастику, амплипульс, небулайзерную терапию

### **ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ**

- 1) дотаций, выделяемых образовательной организации
- 2) программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
- 3) средств спонсоров и благотворительных фондов
- 4) средств родителей (законных представителей) ребенка

### **В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПЕРВОМ ПРОХОЖДЕНИИ ОСМОТРА И ДАЛЕЕ В ВОЗРАСТЕ \_\_\_\_\_ ЛЕТ И СТАРШЕ \_\_\_\_ РАЗ В ГОД**

- 1) 30; 2
- 2) 40; 1
- 3) 25; 3
- 4) 55; 1

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) иммуносупрессия
- 2) гиперчувствительность к яичному белку
- 3) сахарный диабет I типа

4) дисфункция почек

**К ОСНОВНЫМ ФИЗИКАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ ОСТРОГО БРОНХИТА ОТНОСЯТ ХРИПЫ**

- 1) локальные мелкопузырчатые влажные
- 2) рассеянные сухие, крупно- и среднепузырчатые
- 3) локальные сухие
- 4) рассеянные мелкопузырчатые

**НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ В КЛИНИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) затрудненный вдох
- 2) асимметричные влажные хрипы в легких
- 3) ослабление дыхания при аускультации легких
- 4) затрудненный выдох

**ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проба с препаратом Диаскинтест
- 2) иммунизация вакциной БЦЖ и БЦЖ-М
- 3) проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л
- 4) прием изониазида в течение 2 месяцев

**ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ УПАКОВКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) упаковочным материалом
- 2) вспомогательным средством
- 3) укупорочным средством
- 4) тарой

**РЕЗИНОВЫЕ ПРОБКИ МНОГОДОЗОВЫХ ФЛАКОНОВ ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ИГЛЫ ВО ФЛАКОН ОБРАБАТЫВАЮТ**

- 1) протаргола раствором
- 2) кожным антисептиком
- 3) этилового спирта раствором 70%
- 4) этилового спирта раствором 40%

**«ПОЗА ПРОСИТЕЛЯ» НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- 1) прогрессирующего супрануклеарного паралича
- 2) болезни диффузных телец Леви
- 3) болезни Паркинсона
- 4) мультисистемной атрофии

**ФИБРОБРОНХОСКОП ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК**

- 1) трахеобронхиального дерева

- 2) пищевода и желудка
- 3) тонкого кишечника
- 4) толстого кишечника

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) содержанием отходов в объектах размещения отходов
- 2) потреблением в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки
- 3) применением отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии
- 4) приемом или поступлением отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования

### **ИНСОЛЯЦИОННЫЙ РЕЖИМ ПАЛАТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) ориентации окон по сторонам горизонта
- 2) размера окон
- 3) цвета стен, пола, оборудования
- 4) типа светильников

### **СОГЛАСНО ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОДНА ДОЛЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ВРАЧА-ПЕДИАТРА УЧАСТКОВОГО УСТАНОВЛИВАЕТСЯ**

- 1) из расчета 1 должность на 900 человек прикрепленного детского населения
- 2) из расчета 1 должность на 1 штатную единицу врача-педиатра участкового
- 3) из расчета 1 должность на 500 обучающихся в образовательных организациях
- 4) в зависимости от объема работы

### **ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОСПАЗМА С ПОМОЩЬЮ СПИРОГРАФИИ, ПНЕВМОТАХОГРАФИИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРОБУ С ИНГАЛ**

- 1) глюкокортикостероида
- 2)  $\beta_2$ -адреностимулятора
- 3)  $\beta_2$ -адреностимулятора
- 4) смеси кислорода и оксида азота

### **К ФАКТОРАМ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ОТНОСЯТ**

- 1) гипергликемию
- 2) неправильный образ жизни
- 3) нарушения липидного обмена
- 4) инсулинорезистентность

### **ПРИЗНАКОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) протеинурия
- 2) высокий показатель систолического АД выше 220 мм рт.ст.
- 3) ретинопатия или нейроретинопатия

4) снижение скорости клубочковой фильтрации

### **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПОНЕНТОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ**

- 1) бронхоспазм
- 2) задержка мокроты
- 3) ларингоспазм
- 4) воспаление бронхов

### **СОСУДИСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, СВЯЗАННЫМ ТОЛЬКО С АГ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) инфаркт миокарда
- 2) ишемический инсульт
- 3) фибрилляция предсердий
- 4) нефросклероз

### **ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ ПОКАЗАН ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С**

- 1) остеохондрозом позвоночника
- 2) внебольничной пневмонией
- 3) бронхиальной астмой
- 4) миозитом

### **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Г ОТНОСЯТСЯ**

- 1) «чистая» и «стерильная» зоны стерилизационного отделения
- 2) помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые
- 3) процедурные и асептические перевязочные
- 4) послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных

### **НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ НЕОТЛОЖНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ РАЗВИТИИ КЛИНИЧЕСКИ ВЫРАЖЕННОЙ ГИПЕРКАПНИИ У БОЛЬНОГО В АСТМАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) усиление регидратационной терапии
- 2) перевод на искусственную вентиляцию лёгких
- 3) назначение гидрокарбоната натрия в/в
- 4) назначение дыхательных analeптиков

### **К ПОМЕЩЕНИЯМ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ**

- 1) кабинеты главных и старших медицинских сестер
- 2) склады оптовых организаций
- 3) помещения аптечных организаций
- 4) сестринские посты в отделениях

### **ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) ингибиторы циклооксигеназы
- 2) антигистаминные препараты

- 3) ингаляционные глюкокортикоиды
- 4) бета-адреноблокаторы

**ПОВЯЗКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ДОВРАЧЕБНОМ ЭТАПЕ ПРИ ОЖОГАХ II СТЕПЕНИ**

- 1) спирт-фурацилиновые
- 2) сухие асептические
- 3) гелевые
- 4) мазевые

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДЯТ**

- 1) 2 раза в год
- 2) в индивидуальном порядке
- 3) 1 раз в 2 года
- 4) 1 раз в год

**В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К РЕКТОРОМАНОСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПАЦИЕНТУ, СТРАДАЮЩЕМУ ЗАПОРАМИ, ОЧИСТИТЕЛЬНУЮ КЛИЗМУ СТАВЯТ**

- 1) за день до исследования
- 2) только вечером накануне исследования
- 3) накануне вечером и за 2 часа до исследования
- 4) непосредственно перед исследованием

**СРОК РАССМОТРЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ РАБОТНИКА О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ИМУЩЕСТВУ РАБОТНИКА СО ДНЯ ЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ, СОСТАВЛЯЕТ (В ДНЯХ)**

- 1) 10
- 2) 15
- 3) 20
- 4) 30

**ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ ДО 7 ЛЕТ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ МАКСИМАЛЬНО ВЫДАЕТСЯ НА**

- 1) 15 дней
- 2) 30 дней
- 3) 10 дней
- 4) весь срок

**РЕДКОЕ РАЗВИТИЕ СИНУСИТОВ, РЕДКОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ВЫРАЖЕННЫХ РАССТРОЙСТВ ДЫХАНИЯ ПРИ РИНИТАХ, ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБЕННОСТЬЮ СТРОЕНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ**

- 1) подростков
- 2) старшего возраста

- 3) раннего возраста
- 4) младшего школьного возраста

**ВЗЫСКАНИЕ УЩЕРБА, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕГО СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ, ПРОИЗВОДИТСЯ ПО**

- 1) решению суда
- 2) распоряжению администрации организации с разрешения профсоюза
- 3) распоряжению работодателя
- 4) решению комиссии по трудовым спорам

**К ВЕРБАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ ОТНОСИТСЯ**

- 1) речевое, словесное
- 2) жесты, мимика
- 3) позы
- 4) взгляд

**ИНДЕКС АЛГОВЕРА НЕОБХОДИМ ДЛЯ**

- 1) определения уровня кровопотери
- 2) измерения остроты зрения
- 3) определения группы крови
- 4) измерения количества эритроцитов

**ПРИ ПРИНЯТИИ ИМУЩЕСТВА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ В ПОЛНУЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОФОРМЛЯЕТСЯ**

- 1) договор о полной индивидуальной материальной ответственности
- 2) расписка о принятии имущества
- 3) обязательство старшей медицинской сестры
- 4) приказ руководителя учреждения

**НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВЫСЫПАНИЙ НА КОЖЕ ПРИ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) элементы, сходные с узловатой эритемой
- 2) розеолезно-папулезные высыпания
- 3) геморрагическая сыпь звездчатой формы
- 4) элементы в виде пузырей с геморрагическим содержимым

**ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хронический пиелонефрит
- 2) гиперкальциемия
- 3) избыточная масса тела
- 4) ранняя менопауза

**ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОТХОДОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ ИХ**

- 1) дезинфекцию

- 2) дезинсекцию
- 3) дефрагментацию
- 4) дератизацию

**О ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ОТПУСКА МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗВЕЩЕН ПОД РОСПИСЬ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА \_\_\_\_\_ НЕДЕЛИ ДО ЕГО НАЧАЛА**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 2,5

**ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ**

- 1) системой автоматического слежения
- 2) радиосигнализацией
- 3) системой видеонаблюдения
- 4) охранной сигнализацией

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ВРАЧАМИ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРИМЕНЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ – ЭТО**

- 1) скрининг
- 2) исследование
- 3) профилактика
- 4) диспансеризация

**ЕСЛИ ПРИ ПОПЫТКЕ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ, ЕГО ПОВЕДЕНИЕ УГРОЖАЕТ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СЛЕДУЕТ**

- 1) отойти от него на безопасное расстояние, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и ждать ее прибытия
- 2) постараться усмирить его, чтобы предотвратить нанесение вам травмы
- 3) попытаться его успокоить, взяв за руку, и обратившись к нему тихим спокойным голосом
- 4) говорить с пострадавшим властно, чтобы он вам подчинился

**ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ**

- 1) резкое падение артериального давления
- 2) резкое повышение артериального давления
- 3) отсутствие сознания
- 4) отсутствие сознания, дыхания и сердечной деятельности

**АКЦЕНТ 2 ТОНА НАД АОРТОЙ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ**

- 1) хроническом легочном сердце
- 2) тромбозах легочной артерии
- 3) митральном стенозе

4) артериальной гипертонии

**ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИЙ ВНЕЗАПНО ПОБЛЕДНЕЛ, ПЕРЕСТАЛ РЕАГИРОВАТЬ НА ОКРУЖАЮЩЕЕ, ТО НАЧИНАТЬ ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМО С**

- 1) привлечения помощника
- 2) проверки признаков дыхания
- 3) проведения оценки обстановки и обеспечения безопасных условий для оказания первой помощи
- 4) открытия дыхательных путей

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В (ГОДАХ)**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**РАЗВЕДЕННАЯ КОРЕВАЯ ВАКЦИНА**

- 1) может храниться в холодильнике три дня
- 2) должна быть уничтожена в конце рабочего дня
- 3) может храниться в морозильной камере неделю
- 4) может храниться в шкафу два дня

**ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПИЩЕБЛОКОВ, А ТАКЖЕ ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КРОМЕ ИНФЕКЦИОННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ**

- 1) Г
- 2) В
- 3) Б
- 4) А

**НЕМЕДЛЕННОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖИТ РЕБЕНОК С ИНФЕКЦИЕЙ**

- 1) острой кишечной
- 2) менингококковой
- 3) герпетической
- 4) респираторно-вирусной

**ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ С НАЛИЧИЕМ ПОСТРАДАВШИХ И ГОТОВ ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ, ПЕРВОЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ЭТО**

- 1) осмотреть пострадавшего на наличие опасных для жизни состояний
- 2) осмотреть место происшествия на наличие возможных опасностей для него и пострадавшего
- 3) вызвать экстренные службы
- 4) позвать помощника



### **ОСНОВНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хламидия
- 2) микоплазма
- 3) легионелла
- 4) респираторный вирус

### **СИНДРОМОМ, ОТЛИЧАЮЩИМ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) цитолитический синдром
- 2) гепатомегалия
- 3) портальная гипертензия
- 4) внепеченочные знаки

### **ПРИСТУП БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) болью в грудной клетке
- 2) экспираторной одышкой
- 3) кашлем с мокротой
- 4) инспираторной одышкой

### **ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПЫ (УСТАНОВКИ) ЗАПОЛНЯЮТ**

- 1) 1 раз в неделю
- 2) 1 раз в месяц
- 3) ежедневно
- 4) при каждом включении

### **НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА БОЛЬНОГО РЕВМАТИЗМОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лечебная физкультура
- 2) талассотерапия
- 3) фототерапия
- 4) бальнеотерапия

### **ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРИПАДОК У РЕБЕНКА НАЧИНАЕТСЯ С**

- 1) локализованных судорог
- 2) клонических судорог
- 3) тонических судорог
- 4) гиперкинезов

### **ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА С ЕГО СОТРУДНИКАМИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ \_\_\_\_\_ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 1) внеплановый
- 2) первичный
- 3) повторный

4) целевой

**МЕРОПРИЯТИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (СЛАБОГО РАСТВОРА УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ)**

**ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В ПРОМЫВАНИИ \_\_\_\_\_ И НАЛОЖЕНИИ \_\_\_\_\_ ПОВЯЗКИ**

- 1) слабым нейтрализующим (содовым) раствором; гидрокортизоновой
- 2) дистиллированной водой; фурацилиновой
- 3) горячей кипяченой водой, затем - слабым нейтрализующим раствором (содой); маевой
- 4) холодной проточной водой; сухой асептической

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ТРЕТЬЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 3
- 2) 6
- 3) 12
- 4) 9

**ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ МОГУТ БЫТЬ**

- 1) грибки
- 2) простейшие
- 3) вирусы
- 4) бактерии

**ЭФФЕКТИВНОМУ ОБЩЕНИЮ И ОБУЧЕНИЮ СПОСОБСТВУЕТ**

- 1) положительная обратная связь
- 2) постоянная оценка действий и личности
- 3) наставления, упреки
- 4) замечания

**АСИСТОЛИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ ТРЕБУЕТ**

- 1) в/в введения Мезатона
- 2) в/в введения Верапамила
- 3) электроимпульсной терапии
- 4) закрытого массажа сердца

**К ПРИЧИНАМ ВТОРИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ОТНОСИТСЯ СИНДРОМ**

- 1) Золлингера-Эллисона
- 2) Эйзенменгера
- 3) Рейтера
- 4) Кушинга

**ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) цель общения - самообщение

- 2) неформальная обстановка
- 3) стремление субъектов общения получить эмоциональное удовлетворение от общения
- 4) направленность на решение определённой проблемы

### **ХАРАКТЕР И ЛОКАЛИЗАЦИЯ БОЛЕЙ ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ**

- 1) опоясывающие, тупые боли
- 2) «кинжальные» боли в эпигастрии
- 3) постоянные, сильные боли в правой подвздошной области
- 4) постоянные, сильные боли в правом подреберье

### **БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ЭТИОЛОГИЮ ГЕПАТИТА, ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ**

- 1) билирубина
- 2) щелочной фосфатазы
- 3) аминотрансфераз
- 4) десахарированного трансферрина

### **В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА ПРИМЕНЯЕТСЯ ВАКЦИНА**

- 1) моновалентная полисахаридная инактивированная
- 2) живая культуральная концентрированная очищенная антирабическая
- 3) сухая культуральная инактивированная концентрированная очищенная антирабическая
- 4) поливалентная инактивированная конъюгированная

### **СУХИЕ СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ НАД ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ФЕНОМЕНОМ**

- 1) нарушения бронхиальной проходимости
- 2) наличия жидкости в плевральной полости
- 3) повышения воздушности лёгочной ткани
- 4) уплотнения лёгочной ткани

### **МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ С УЧЁТОМ АНАМНЕЗА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВАКЦИНИРОВАНЫ ПРОТИВ КОРИ И**

- 1) пневмококковой инфекции
- 2) брюшного тифа
- 3) дифтерии
- 4) клещевого энцефалита

### **ТЕМПЕРАТУРА ПИЩИ ПРИ КОРМЛЕНИИ ЧЕРЕЗ ЗОНД \_\_\_\_\_ (°C)**

- 1) 15-20
- 2) 25-30
- 3) 35- 40

4) 45-50

**АДС-АНАТОКСИН ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ У ДЕТЕЙ ДО 6-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА**

- 1) ранее привитым против дифтерии и столбняка
- 2) переболевших коклюшем
- 3) переболевших корью
- 4) имеющих аллергические реакции

**ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б ДОПУСКАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ТАРА**

- 1) твердая картонная
- 2) одноразовые пакеты и твердые непрокальваемые емкости
- 3) мягкая бумажная
- 4) мягкая полимерная

**ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В \_\_\_\_\_ УПАКОВКЕ**

- 1) промышленной
- 2) транспортной
- 3) вакуумной
- 4) пергаментной

**КЛИНИКА НОРМАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ НА ПРИВИВКУ ПРОТИВ КОРИ**

- 1) повышение температуры тела на 3-й день
- 2) конъюнктивит
- 3) повышение температуры тела на 6-11 день, гиперемия зева, небольшой насморк,
- 4) судороги

**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ПРИЁМОМ ПРИ МАССАЖЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) поглаживание
- 2) растирание
- 3) вибрация
- 4) разминание

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЦЕЛЯХ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОВОДИТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В \_\_\_\_\_ ЭТАПА**

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 1
- 4) 2

**СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ РЕЖЕ 1**

**РАЗА В (В ДНЯХ)**

- 1) 10
- 2) 7
- 3) 3
- 4) 14

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ МЕТОДОМ «РОТ В РОТ»**

- 1) свободной рукой необходимо плотно зажимать нос пострадавшего
- 2) обеспечить пассивный выдох пострадавшего через нос
- 3) зажимать нос пострадавшего необходимо только, если носовые ходы свободны
- 4) зажимать нос нет необходимости

**ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОТУ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР СОСТАВЛЯЕТСЯ  
(ВЭКЗЕМПЛЯРАХ)**

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 4

**ПРИ СБОРЕ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ**

- 1) сухой пробиркой
- 2) сухой банкой
- 3) стерильной пробиркой
- 4) стерильной банкой

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК  
ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НАЧИНАЮТ В ВОЗРАСТЕ (В  
МЕСЯЦАХ)**

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

**В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В РОССИИ  
ВХОДИТ ПРИВИВКА ПРОТИВ**

- 1) желтой лихорадки
- 2) сыпного тифа
- 3) пневмококковой инфекции
- 4) брюшного тифа

**ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТОВ ИЗ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ В ТРЕТЬЮ  
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О(ОБ)**

- 1) своевременности охвата диспансерным наблюдением больных
- 2) полноту охвата диспансерным наблюдением
- 3) индексе здоровья населения

4) низкой эффективности диспансерного наблюдения

**С ПОМОЩЬЮ МУСОРОПРОВОДА ИЛИ ПНЕВМОТРАНСПОРТА МОГУТ УДАЛЯТЬСЯ ИЗ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА**

- 1) Б
- 2) А
- 3) Г
- 4) В

**АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА ПЕКАРСКИЕ ДРОЖЖИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ**

- 1) живой коревой вакцины
- 2) БЦЖ
- 3) вакцины против вирусного гепатита В
- 4) АКДС

**ПЕРИОД СОБСТВЕННО КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА ПРЕКРАЩЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ДЛИТСЯ**

- 1) до 1,5 часов
- 2) 2-3 минуты
- 3) 4-5 минут
- 4) 10-15 минут

**НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ ШЕСТИДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ (В ЧАС)**

- 1) 6
- 2) 6,5
- 3) 4
- 4) 5

**ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ПАТОЛОГИЮ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ БОЛЬНОЙ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ**

- 1) только в положении лежа на спине
- 2) в положении сидя или полусидя
- 3) только в положении лежа на боку
- 4) в любом удобном для него положении

**ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ПОДКОЖНЫХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ I СТЕПЕНИ**

- 1) стойкий длительный спазм
- 2) стойкое длительное расширение сосудов
- 3) кратковременное расширение сосудов, сменяющееся спазмом
- 4) нестойкий кратковременный спазм

**ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМУЩЕСТВА НА ПОЛНУЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ**

## **МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- 1) осмотр принимаемого имущества старшей медицинской сестрой без его пересчета
- 2) приемку имущества в результате его инвентаризации с личным его осмотром и пересчетом новой старшей медицинской сестрой
- 3) простую договоренность между прежней и вновь назначенной старшей медицинской сестрой
- 4) приемку ключей от помещения и шкафов, в которых находится принимаемое имущество

## **НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) высокий уровень амилазы в крови (диастазы в моче)
- 2) боль опоясывающего характера
- 3) гипергликемия
- 4) стеаторея

## **КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ УРОВНЯ**

- 1) трансаминаз крови
- 2) амилазы в крови и моче
- 3) мочевой кислоты
- 4) щелочной фосфотазы

## **НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ ФОРМОЙ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ПРЕОДОЛЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ НЕДОСТАТКОВ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обучение медицинской сестры на цикле повышения квалификации
- 2) проведение индивидуальной беседы с проверяемой медицинской сестрой
- 3) подготовка докладной записки на имя главного врача с изложением недостатков в работе медицинской сестры
- 4) проведение собрания сестринского коллектива с публичной оценкой выявленных недостатков действий

## **ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЯМ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ \_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 15
- 2) 7
- 3) 13
- 4) 10

## **К ВИДУ КОНТРОЛЯ, КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ, ОТНОСЯТ**

- 1) текущий
- 2) предварительный
- 3) заключительный

4) стратегический

### **ФАКТОРЫ РИСКА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ**

- 1) рациональное питание
- 2) здоровый образ жизни
- 3) частые прогулки
- 4) аллергическая настроенность

### **К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ**

- 1) отягощенная наследственность
- 2) мужской пол
- 3) возраст
- 4) сахарный диабет 2 типа

### **ЕСЛИ НОГУ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИДАВИЛО ОБРУШИВШЕЙСЯ КОНСТРУКЦИЕЙ И ИЗВЛЕЧЬ ЕГО СВОИМИ СИЛАМИ НЕВОЗМОЖНО, ТО НЕОБХОДИМО**

- 1) вызвать экстренные службы по телефону 112, при наличии болей у пострадавшего дать ему обезболивающее средство
- 2) рекомендовать пострадавшему аккуратно выбраться самостоятельно
- 3) наложить на конечность кровоостанавливающий жгут, вызвать экстренные службы по телефону 112
- 4) оценить собственную безопасность, вызвать экстренные службы по телефону 112, контролировать до их приезда состояние пострадавшего и оказывать ему психологическую поддержку

### **ПОД ТЕРМИНОМ «ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» ПРИНЯТО ПОНИМАТЬ НАРУШЕНИЕ**

- 1) тканевого метаболизма кислорода
- 2) бронхиальной проходимости
- 3) газотранспортной функции крови
- 4) вентиляции, транспорта и утилизации кислорода в легких

### **ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) длительность обследования пациентов
- 2) среднегодовая занятость койки
- 3) своевременность постановки диагноза
- 4) число госпитализированных больных

### **К ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ \_\_\_\_\_ ЗАПАСА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

- 1) трехдневного
- 2) месячного



- 3) трехмесячного
- 4) полугодового

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРА МОЧИ НА ОБЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ПОДГОТОВИТЬ**

- 1) сухую чистую банку с крышкой объемом не менее 200 мл
- 2) стерильную пробирку объемом 10 мл
- 3) стерильную банку объемом не менее 200 мл
- 4) 8-10 чистых банок

**ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧЕНИЯ СТАТИСТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ СТАТИСТИЧЕСКИЕ**

- 1) совокупности
- 2) единицы
- 3) показатели
- 4) таблицы

**СЖИМАЮЩИЕ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ, ИРРАДИИРУЮЩИЕ ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ,  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 5-10 МИНУТ, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) инфаркта миокарда
- 2) стенокардии
- 3) инфекционного эндокардита
- 4) гипертонического криза

**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) прием больших доз аскорбиновой кислоты
- 2) прием поливитаминных препаратов
- 3) закаливание организма
- 4) введение гриппозных вакцин

**ПИЩЕВОЙ РАЦИОН ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ**

- 1) большое количество углеводов
- 2) ограниченное количество углеводов
- 3) ограниченное количество белков
- 4) большое количество белка

**КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛЮКОЗЫ В ЦЕЛЬНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ В НОРМЕ НАТОЩАК  
\_\_\_\_\_ ММОЛЬ/Л**

- 1) 2,6
- 2) 5,4
- 3) 7,8
- 4) 6,1

**КОЛИЧЕСТВО МОЧИ ДЛЯ ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (В МЛ)**

- 1) 500
- 2) 100-200

- 3) 250-300
- 4) 50-100

**К ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ РИСКА ДЛЯ ДИАБЕТА 2 ТИПА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) подростки 10-14 лет
- 2) молодежь 15-29 лет
- 3) дети 0-4 года
- 4) взрослые старше 40 лет

**УСИЛЕНИЕ 1 ТОНА НА ВЕРХУШКЕ СЕРДЦА ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ**

- 1) митральной недостаточности
- 2) гипертонической болезни
- 3) тромбоэмболии легочной артерии
- 4) хроническом легочном сердце

**СИНДРОМ УВЕЛИЧЕННОГО КРОВОТОКА ЧЕРЕЗ ЛЁГКИЕ (ГИПЕРВОЛЕМИИ МАЛОГО КРУГА) ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) стойкой артериальной гипертонией
- 2) ослаблением II тона на лёгочной артерии
- 3) одышечно-цианотическими приступами
- 4) повторными бронхитами, пневмониями

**ОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ ТЕХНИКИ СТЕРИЛЬНОСТИ ОТНОСЯТ К КАТЕГОРИИ**

- 1) условно чистых
- 2) грязных
- 3) загрязненных
- 4) чистых

**ГРУППОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В АКУШЕРСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ \_\_\_\_\_ И БОЛЕЕ СЛУЧАЕВ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ И ОБЩИМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ**

- 1) 2
- 2) 5
- 3) 1
- 4) 3

**ВОЗБУДИТЕЛЕМ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СЧИТАЕТСЯ**

- 1) *Streptococcus pneumoniae*
- 2) *Moraxellacatarrhalis*
- 3) *Staphylococcus aureus*
- 4) *Legionella*

**ИЗДЕЛИЯ ИЗ РЕЗИНЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ «МАКАНИЯ», НАЗЫВАЮТ**

- 1) выдавленными с помощью шприц-машин
- 2) листовыми
- 3) прессованными
- 4) бесшовными

**МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (ТЕРМОМЕТРИЯ, ОСМОТР НОСОГЛОТКИ И КОЖНОГО ПОКРОВА) В ОЧАГЕ ПОСЛЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМОЙ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА (ДЕНЬ)**

- 1) 3
- 2) 10
- 3) 45
- 4) 30

**ОТХОДЫ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ (ДИСПАНСЕРОВ), ЗАГРЯЗНЕННЫЕ МОКРОТОЙ ПАЦИЕНТОВ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ**

- 1) Д
- 2) Б
- 3) В
- 4) Г

**В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СТАРШИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, КАК ПРАВИЛО, ВОЗЛАГАЕТСЯ \_\_\_\_\_ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 1) полная индивидуальная
- 2) полная коллективная
- 3) ограниченная индивидуальная
- 4) частичная индивидуальная

**ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ ИЗМЕРЯЕТСЯ ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 1 РАЗ В \_\_\_\_\_ ГОД(А)**

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 1

**ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО СГИБАНИЯ КОНЕЧНОСТИ В СУСТАВЕ НЕОБХОДИМО**

- 1) наложить на рану давящую повязку, после чего согнуть конечность в суставе и зафиксировать
- 2) согнуть конечность в суставе, зафиксировать табельными или подручными средствами, для усиления эффекта вложить в область сустава твердый предмет (металлическую трубу, кусок дерева и т. д.)
- 3) наложить кровоостанавливающий жгут на область сустава, после чего согнуть конечность в суставе и зафиксировать вручную или другим способом (бинтом,

брючным ремнем и т. д.)

4) вложить в область сустава 1-2 бинта или свернутую валиком одежду, конечность согнуть и зафиксировать руками, жгутом, несколькими турами бинта или подручными средствами

### **НА ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА РАБОТНИКАМИ, ОБЯЗАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ ПРОХОДИТЬ ТАКОЙ ОСМОТР,**

- 1) проводится оплата в размере 50 % от среднего заработка
- 2) предоставляется отпуск без сохранения заработной платы
- 3) сохраняется средний заработок
- 4) предоставляется отпуск с сохранением заработной платы

### **ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО НАЗНАЧАЮТ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- 1) функционального состояния почек
- 2) количества форменных элементов осадка мочи
- 3) микрофлоры мочи
- 4) суточного диуреза

### **ПРИ ЯВЛЕНИЯХ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) может быть произведена только после успешного проведения реанимационных мероприятий
- 2) осуществляется только после прибытия на место происшествия сотрудников полиции
- 3) должна производиться до начала реанимационных мероприятий
- 4) может проводиться одновременно с проведением сердечно-легочной реанимации

### **В ОСНОВЕ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ЛЕЖИТ**

- 1) диетотерапия
- 2) лечебная физкультура
- 3) прием пероральных сахароснижающих препаратов
- 4) инсулинотерапия

### **ДЕЗИНФЕКЦИЮ ОБОРОТНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА «А» ПРОИЗВОДЯТ**

- 1) согласно условиям договора
- 2) специализированные организации, вывозящие отходы
- 3) сотрудники медицинской организации
- 4) клининговая компания

### **В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ**

- 1) количество препарата и концентрацию введенного раствора

- 2) диагноз пациента
- 3) фамилию, имя, отчество пациента и номер истории болезни
- 4) путь введения препарата

**ПОСЛЕ ИММУНИЗАЦИИ В МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ ВОЗНИКЛА ГИПЕРЕМИЯ В ДИАМЕТРЕ 4 ММ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНА КАК**

- 1) аллергическая реакция
- 2) общая поствакцинальная реакция
- 3) местная поствакцинальная реакция
- 4) поствакцинальное осложнение

**ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ФЕЛЬДШЕРСКОГО УЧАСТКА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО(ИМ) ПУНКТА(ОМ)**

- 1) медицинская сестра
- 2) заведующий
- 3) акушерка
- 4) фельдшер

**ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) вечером на ногах
- 2) утром на лице
- 3) вечером на лице
- 4) утром на ногах

**ФУНГИЦИДНОЕ СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ**

- 1) инактивацию вирусов
- 2) гибель спор микроорганизмов
- 3) уничтожение грибов
- 4) гибель бактерий в вегетативной форме

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- 1) область лопаток, крестца, локтей, пяточной кости
- 2) ладони и подошвы
- 3) живот, колени
- 4) бёдра ступни

**ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ПРОВОДИТ**

- 1) хирург
- 2) терапевт
- 3) уролог
- 4) онколог

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ С ВЫРАЖЕННОЙ СЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НАБЛЮДАЕТСЯ**

- 1) горечь во рту
- 2) изжога
- 3) склонность к запорам
- 4) тошнота

### **ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНИХ ВЕЛИЧИН ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СПОСОБЕ**

- 1) изучения структуры неоднородных элементов совокупности
- 2) обобщения индивидуальных значений показателя
- 3) изучения структуры однородных элементов совокупности
- 4) стратегического анализа показателей

### **ДИНАМОМЕТРИЯ ОЦЕНИВАЕТ СИЛУ МЫШЦ**

- 1) ног
- 2) туловища
- 3) спины
- 4) кисти

### **ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- 1) повышенной активности эластазы в кале
- 2) кальцинатов в головке поджелудочной железы
- 3) большого количества жира в кале
- 4) пониженной активности диастазы мочи

### **ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ КАТЕГОРИИ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

### **РАБОТНИКИ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА (5 ЛЕТ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ПЕНСИИ) ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ ОДИН РАЗ В ГОД НА \_\_\_\_\_ РАБОЧИХ ДНЯ**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

### **ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ, ЭКВИВАЛЕНТНОМ СТОИМОСТИ МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ**

### **УСЛОВИЯМИ ТРУДА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ**

- 1) Минтрудом России
- 2) Минздравом России
- 3) руководителем медицинской организации
- 4) Правительством Российской Федерации

### **ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ПРОВОДЯТ**

- 1) ежегодно
- 2) при приеме на работу
- 3) 1 раз в 6 месяцев
- 4) при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями

### **ДЛЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В НЕОБХОДИМО**

- 1) использовать одноразовые инструменты
- 2) проводить надзор за пищеблоками
- 3) проводить надзор за водоснабжением населения
- 4) осуществлять дезинфекцию фекалий

### **ОСНОВНЫМ ЭКГ -ПРИЗНАКОМ НЕКРОЗА СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) снижение сегмента ST
- 2) широкий и глубокий зубец Q
- 3) уменьшение зубца R
- 4) подъем сегмента ST

### **ФАКТОРОМ РИСКА, ПОВЫШАЮЩИМ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В ЦЕЛЬНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ \_\_\_\_\_ ММОЛЬ/Л**

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 5,6
- 4) 4,5

### **НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ИЗ СПИСКА I ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кетамин
- 2) метадон
- 3) апрофен
- 4) пиперидин

### **МОКРОТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КАТАРАЛЬНОМ БРОНХИТЕ БЫВАЕТ**

- 1) «ржавой»
- 2) слизистой
- 3) стекловидной
- 4) розовой пенистой

### **ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕОБХОДИМО**

## **ОБЕСПЕЧИТЬ**

- 1) безопасность пациента
- 2) рациональное питание пациента
- 3) проведение мероприятий личной гигиены
- 4) сохранение социальных контактов

## **ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ СЕРДЦА ВЛЕВО И ВНИЗ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ДИЛАТАЦИИ**

- 1) правого желудочка
- 2) левого предсердия
- 3) правого предсердия
- 4) левого желудочка

## **КЛОНИЧЕСКИЕ СУДОРОГИ ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИСТУПЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- 1) упорядоченным сокращением мышц
- 2) хаотичным сокращением мышц
- 3) опистотонусом
- 4) сокращением мышц только одной половины туловища

## **ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) снижение аппетита
- 2) кожный зуд
- 3) желтуха
- 4) пищеводное кровотечение

## **ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ИРРИГОСКОПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ**

- 1) постановка очистительной клизмы вечером
- 2) прием активированного угля
- 3) постановка очистительной клизмы вечером и утром
- 4) исключение из рациона продуктов, содержащих железо

## **ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СЛЕДУЕТ**

- 1) прокипятить и отправить в мусорный контейнер
- 2) обработать в автоклаве, затем выбросить с бытовым мусором
- 3) удалить вместе с бытовым мусором
- 4) дезинфицировать и затем удалить как медицинские отходы

## **К СТИМУЛЯТОРАМ СЕКРЕЦИИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В ЖЕЛУДКЕ ОТНОСЯТ**

- 1) секретин
- 2) гастрин
- 3) простогландин
- 4) глюкагон

## **ДОНОРСТВО ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ НАЛИЧИИ В АНАМНЕЗЕ**

- 1) пневмонии



- 2) отита
- 3) вирусного гепатита
- 4) аппендицита

**ДЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИНГАЛЯЦИОННЫМИ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ ПОКАЗАНА БОЛЬНЫМ ХОБЛ ПРИ**

- 1) легком течении
- 2) любой степени тяжести
- 3) крайне тяжелом течении
- 4) тяжелом течении частых обострениях

**ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) придание пациенту положения на спине, при этом его нижняя челюсть должна быть прижата к верхней
- 2) устойчивое боковое положение, кислородотерапию
- 3) воздуховоды, интубацию трахеи, устойчивое боковое положение
- 4) языкодержатель

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО ОТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) синусит
- 2) невринома
- 3) менингит
- 4) тубоотит

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ И ОПЕРАЦИЙ С ВЫРАЖЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА И ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ТРУДА ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) II
- 2) IV
- 3) I
- 4) V

**ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ АТИПИЧНЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) защищенные пенициллины
- 2) аминогликозиды
- 3) карбапенемы
- 4) макролиды

**ПРИ НАРУШЕНИИ МОТОРИКИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ультразвуковая динамическая холецистография
- 2) эндоскопия

- 3) ультразвуковое исследование органов брюшной полости
- 4) желудочное зондирование

**МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 12
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 1

**К ПРИЧИНАМ СИНКОПАЛЬНОГО УТОПЛЕНИЯ ОТНОСЯТ**

- 1) судороги
- 2) переохлаждение
- 3) рефлекторную остановку сердца, крио-шок
- 4) хронические заболевания, фобии

**ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ЗА СБОР И ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ НАЗНАЧАЕТ**

- 1) заведующий подразделением
- 2) главная медицинская сестра
- 3) руководитель организации
- 4) врач-эпидемиолог

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ЗА ДЕТЬМИ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) до 18 лет
- 2) 1 год
- 3) 5 лет
- 4) 3 года

**В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ \_\_\_\_\_ ЗАПАС ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И НАЗНАЧЕНИЯ**

- 1) месячный
- 2) недельный
- 3) двухнедельный
- 4) трехмесячный

**В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ, ХРАНЕНИЕ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В**

- 1) специальной зоне, отделенной от основного места хранения наркотических лекарственных препаратов металлической решеткой
- 2) контейнерах, помещенных в закрывающиеся емкости
- 3) запирающихся холодильных камерах

4) термоконтейнерах, размещенных в сейфах

**ТЕКУЩУЮ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДЯТ РАСТВОРОМ**

- 1) перекиси водорода
- 2) аламинола
- 3) хлоргексидина биглюконата
- 4) фурацилина

**КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИКВОРЕ ОТМЕЧАЮТСЯ ПРИ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ МЕНИНГИТАХ?**

- 1) появление эритроцитов
- 2) нейтрофильный плеоцитоз
- 3) лимфоцитарный плеоцитоз
- 4) нормальный ликвор

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ТРЕТЬЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 10
- 2) 6
- 3) 12
- 4) 9

**СИНЕРГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТАБАКА И АЛКОГОЛЯ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ**

- 1) лейкемии
- 2) рака поджелудочной железы
- 3) рака молочной железы
- 4) рака языка

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА ОТ ПОВТОРНОГО ВВЕДЕНИЯ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В-АДРЕНО МИМЕТИКОВ ЧЕРЕЗ 15-30 МИНУТ СЛЕДУЕТ ПРИСТУПИТЬ К ВНУТРИВЕННОМУ ВВЕДЕНИЮ**

- 1) папаверина
- 2) преднизолона
- 3) супрастина
- 4) но-шпы

**ВОЗМОЖНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ  $\beta$ -АГОНИСТОВ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) брадикардия, гипергликемия
- 2) гипокалиемия, бронхоспазм
- 3) тахикардия, нарушения ритма
- 4) гиперкалиемия, сонливость

**УСИЛЕНИЕ ГОЛОСОВОГО ДРОЖАНИЯ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ**

- 1) пневмонии
- 2) плеврите

- 3) пневмотораксе
- 4) эмфиземе

**ПО ОЦЕНКАМ ВОЗ ОПАСНЫМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЧИСТОГО АЛКОГОЛЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ ЛИТРОВ В ГОД**

- 1) 2
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 4

**ОСТРОМУ ХОЛЕЦИСТИТУ СООТВЕТСТВУЕТ СИМПТОМОКОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЮЩИЙ**

- 1) желтуху, гепатоспленомегалию, умеренное повышение сывороточного уровня трансаминаз, гипергаммаглобулинемию, положительную реакцию на антитела к гладкой мускулатуре
- 2) желтуху, зуд, ксантомы, гепатоспленомегалию, высокий сывороточный уровень щелочной фосфатазы и холестерина
- 3) желтуху (не всегда), боль в правом верхнем квадранте живота, мягкий живот, лихорадку, лейкоцитоз
- 4) желтуху, анорексию, тошноту, мягкую печень, высокую активность трансаминаз и нормальную активность щелочной фосфатазы

**ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- 1) количества форменных элементов осадка мочи
- 2) функционального состояния почек
- 3) суточной глюкозурии
- 4) микрофлоры мочи

**ДЕЗИНФЕКЦИЯ СПОСОБОМ ПРОТИРАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ**

- 1) не соприкасаются непосредственно с пациентом
- 2) впервые вводятся в обращение
- 3) имеют высокую балансовую стоимость
- 4) имеют менее 10 каналов и полостей

**ОСНОВНОЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) - ОТКАЗ ОТ**

- 1) легкоусвояемой и высококалорийной пищи
- 2) курения и профилактика инфекционных болезней легких
- 3) вакцинации
- 4) применения медикаментозной терапии

**НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВОЗБУДИТЕЛИ**

- 1) вирусного гепатита В
- 2) дизентерии

- 3) холеры
- 4) сальмонеллеза

**СБОР, ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ФАПОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ**

- 1) СанПиН 3.5.2.3472-17
- 2) СанПиН 2.1.7.2790-10
- 3) СП 3.5.3.3223-14
- 4) СП 1.3.2322-08

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ СПЕЦИФИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нефрит
- 2) миокардит
- 3) миелит
- 4) менингоэнцефалит

**ПОКАЗАТЕЛЬ НАГЛЯДНОСТИ ИСПОЛЬЗУТ ДЛЯ**

- 1) обобщения результатов
- 2) характеристики структуры
- 3) сравнения показателей
- 4) определения удельного веса

**ПОКАЗАТЕЛЬ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ДЕФИЦИТЕ МАССЫ ТЕЛА ПРИ ЗНАЧЕНИИ**

- 1) 15,0 кг/м<sup>2</sup> -16,9 кг/м<sup>2</sup>
- 2) 18,5 кг/м<sup>2</sup> -24,9 кг/м<sup>2</sup>
- 3) 25,0 кг/м<sup>2</sup> -29,9 кг/м<sup>2</sup>
- 4) 30,0 кг/м<sup>2</sup> -34,9 кг/м<sup>2</sup>

**ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ ПРОВОДЯТ**

- 1) днем и перед врачебным обходом
- 2) в соответствии с установленным в отделении графиком
- 3) вечером и после посещения пациента родственниками
- 4) утром, после приема пищи и при загрязнении тела

**НА САМОЙ НИЖНЕЙ ПОЛКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА С ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ РАЗМЕЩАЮТСЯ**

- 1) емкости с водой
- 2) живые вакцины
- 3) анатоксины
- 4) растворители

## **ЖУРНАЛ ЗАПИСИ АМБУЛАТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ (Ф 069/У) ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

- 1) медицинской сестрой
- 2) врачом
- 3) старшей медицинской сестрой
- 4) заведующим структурным подразделением

## **ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ РАНЫ В ОБЛАСТИ КРУПНОГО СУСТАВА НЕОБХОДИМО**

- 1) максимально разогнуть конечность в этом суставе и зафиксировать в таком положении
- 2) максимально согнуть конечность в этом суставе и зафиксировать в таком положении
- 3) оставить конечность в том положении, в котором она находится, рану закрыть повязкой
- 4) придать конечности функциональное положение в этом суставе и зафиксировать в таком положении

## **ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДУША ШАРКО СТРУЮ ВОДЫ НЕЛЬЗЯ НАПРАВЛЯТЬ НА**

- 1) ноги
- 2) половые органы
- 3) боковые поверхности тела
- 4) заднюю поверхность тела

## **ПРИ ОСТРОМ ПРОСТОМ БРОНХИТЕ ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ВЫСЛУШИВАЮТСЯ ХРИПЫ В ЛЁГКИХ**

- 1) локальные крепитирующие
- 2) диффузные сухие, свистящие
- 3) диффузные мелкопузырчатые
- 4) диффузные разнокалиберные

## **ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ:**

- 1) СП 3.1.2825-10
- 2) СП 3.1.1.2341-08
- 3) СП 3.1.3112-13
- 4) СП 3.1.5.2826-10

## **ПРИ ПОПАДАНИИ ОТРАВЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО**

- 1) вынести или вывести пострадавшего на свежий воздух
- 2) начать сердечно-легочную реанимацию
- 3) начать искусственное дыхание
- 4) начать ингаляции кислорода, увлажненного спиртом

## **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Г ОТНОСЯТСЯ**

- 1) помещения дезинфекционных камер
- 2) «чистая» и «стерильная» зоны стерилизационного отделения
- 3) шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений
- 4) стерилизационные при операционных

**41-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЕ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ И ПОВЫШЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНУЮ ТЕРАПИЮ, НЕОБХОДИМО РЕКОМЕНДОВАТЬ**

- 1) ограничить физическую активность
- 2) снизить вес
- 3) ограничить белки в диете
- 4) пить 3 литра воды ежедневно

**ПРИ АСТМАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ В СТАДИИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ВЫСЛУШИВАЮТ**

- 1) жесткое дыхание
- 2) везикулярное дыхание
- 3) ослабленное дыхание
- 4) «немое лёгкое»

**АСЦИТ ПОЯВЛЯЕТСЯ РАНЬШЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОТЕКОВ ПРИ**

- 1) циррозе печени
- 2) митральных пороках сердца
- 3) декомпенсированном хроническом легочном сердце
- 4) дилатационной кардиомиопатии

**ПЕРЕЧНИ РАБОТ И КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, С КОТОРЫМИ МОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ДОГОВОРЫ О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИЛИ КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УТВЕРЖДАЮТСЯ**

- 1) министерством труда и социального развития
- 2) органами местного самоуправления
- 3) работодателем
- 4) профсоюзной организацией

**У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ В ПОКОЕ НОРМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ (В МИН)**

- 1) 120
- 2) 80
- 3) 100
- 4) 60

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА НАЧИНАЮТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 6
- 2) 9

- 3) 5
- 4) 3

**ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ РИСКА ТРАВМАТИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) закаливание
- 2) злоупотребление алкоголем
- 3) пассивное курение
- 4) низкая физическая активность

**ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ НА САХАР ТРЕБУЕТСЯ**

- 1) 2-3 мл мочи, собранной в любое время суток
- 2) 150-200 мл от общего количества мочи, собранной в течение суток и перемешанной
- 3) 100-200 мл утренней свежесобранной мочи
- 4) 5-10 мл теплой, свежесобранной мочи

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОРИ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)**

- 1) 12
- 2) 8
- 3) 6
- 4) 9

**ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) бактериурия
- 2) глюкозурия
- 3) гематурия
- 4) пиурия

**ВЕДУЩИМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ В РАЗВИТИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) окислительный стресс
- 2) первичное поражение нервных волокон
- 3) нарушение кровотока
- 4) образование тромбов

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ИРРИГОСКОПИИ НЕОБХОДИМО**

- 1) соблюдать бесшлаковую диету в течение одного дня до исследования и принимать много жидкости
- 2) соблюдать гипоаллергенную диету в течение одной недели до исследования
- 3) осуществить последний прием пищи не позднее 21 часа накануне исследования
- 4) ограничить потребление жидкости

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВЕ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ЭНДОСКОПОВ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**



- 1) объем раствора средства для полного погружения эндоскопа
- 2) количество процедур обеззараживания в расчетном периоде
- 3) норму расхода дезинфицирующего раствора
- 4) объем контейнера, в котором происходит очистка эндоскопов

#### **КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ У ЖЕНЩИН В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 130-160 г/л
- 2) 100-110 г/л
- 3) 140-170 г/л
- 4) 120-140 г/л

#### **ОБЩЕНИЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА С ДРУГИМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕДАЧИ**

- 1) товаров
- 2) ценностей
- 3) информации, чувств, мыслей, идей, переживаний
- 4) предметов

#### **ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) добровольной
- 2) желательной
- 3) обязательной
- 4) рекомендательной

#### **КАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ И ПРОСТЕЙШИЕ НАПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ**

- 1) радиоизотопной диагностики
- 2) бактериологическую
- 3) клиническую
- 4) иммунологическую

#### **ПОРЯДОК ОТПУСКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ УСТАНОВЛИВАЕТ**

- 1) Министерство здравоохранения Российской Федерации
- 2) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
- 3) Правительство Российской Федерации
- 4) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

#### **ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РЕЧЕВЫХ СИНДРОМОВ ИСКЛЮЧАЕТ**

- 1) заикание
- 2) амнезию
- 3) дислалию
- 4) афазию

## **СЕРОЗНЫЙ МЕНИНГИТ В СОЧЕТАНИИ С ДВУХСТОРОННЕЙ ПРИПУХЛОСТЬЮ В ОКОЛОУШНЫХ ОБЛАСТЯХ УКАЗЫВАЕТ НА**

- 1) лептоспироз
- 2) инфекционный мононуклеоз
- 3) туберкулёз
- 4) паротитную инфекцию

## **ПРИ ПНЕВМОНИИ ЛЁГКОГО ТЕЧЕНИЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН \_\_\_\_\_ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ**

- 1) внутримышечный
- 2) пероральный
- 3) сочетанный (внутримышечный и пероральный)
- 4) внутривенный

## **ДИАГНОЗ МЕНИНГИТА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ**

- 1) спинномозговой пункции
- 2) анализа крови
- 3) анализа мочи
- 4) стерильной пункции

## **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ МОНОНИТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) надежность в узле
- 2) низкая вероятность разволокнения нити
- 3) хорошее манипуляционное свойство
- 4) отсутствие «пилящих» и фитильных свойств

## **В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ВНУТРЕННИХ СТОРОНАХ ДВЕРЕЦ СЕЙФОВ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ДОЛЖНЫ ВЫВЕШИВАТЬСЯ**

- 1) списки хранящихся наркотических и психотропных лекарственных средств с указанием их высших разовых и высших суточных доз
- 2) таблица оказания первой помощи при отравлении хранящимися в сейфе лекарственными средствами
- 3) перечень противопоказаний к назначению хранящихся наркотических и психотропных лекарственных средств
- 4) таблица с описанием органолептических свойств хранящихся наркотических и психотропных лекарственных средств

## **ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗАНЫ С**

- 1) повышением уровня стояния диафрагмы
- 2) понижением уровня стояния диафрагмы
- 3) только с имеющимися хроническими процессами со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы

4) реакцией организма на боль

**ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА ПЕРЕД КОЛОНОСКОПИЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЪЕМОМ \_\_\_\_\_ ЛИТРА/ЛИТРОВ И ТЕМПЕРАТУРОЙ \_\_\_\_\_ ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ**

- 1) 3-4; 37-38
- 2) 2-3; 33-34
- 3) 5-6; 27-28
- 4) 1-2; 23-24

**ПОД СКРИНИНГОМ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН ПОНИМАЮТ**

- 1) пальпацию простаты
- 2) ультразвуковое исследование предстательной железы
- 3) определение простат-специфического антигена в крови
- 4) рентгенографию органов малого таза

**ОТЗЫВ ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ИЗ ОТПУСКА ДОПУСКАЕТСЯ**

- 1) по представлению выборного органа первичной профсоюзной организации
- 2) с согласия работника
- 3) по распоряжению вышестоящей организации
- 4) по распоряжению руководителя организации

**ОТПУСК ЗА ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ МЕСЯЦЕВ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ**

- 1) 6
- 2) 9
- 3) 11
- 4) 10

**УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СТЕРИЛЬНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ**

- 1) раз в месяц
- 2) в конце рабочего дня
- 3) после каждого вмешательства
- 4) раз в неделю

**К АССОЦИИРОВАННОМУ СОСТОЯНИЮ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) пульсовое АД > 60 мм рт. ст. (у пожилого и старческого контингента)
- 2) транзиторная ишемическая атака
- 3) ХБП с рСКФ 30-60 мл/мин/1,73 м<sup>2</sup>
- 4) гипертрофия левого желудочка

**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КИШЕЧНУЮ НЕПРОХОДИМОСТЬ ОТМЕЧАЮТСЯ**

- 1) резкие «кинжальные» боли, интенсивность которых постоянно нарастает

- 2) схваткообразные боли, усиливающиеся синхронно с перистальтикой кишечника
- 3) постоянные боли, не зависящие от перистальтики кишечника
- 4) периодические боли, которые ослабевают при появлении перистальтики кишечника

### **В ПРОЦЕССЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОПРЕДЕЛЯЮТ УРОВЕНЬ**

- 1) постпрандиальной гликемии
- 2) гликированного гемоглобина
- 3) глюкозурии
- 4) гликемии натощак

### **ИНСТРУКТАЖИ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЫВАЮТ**

- 1) профильными, профессиональными
- 2) заключительными, профилактическими
- 3) вторичными, начальными
- 4) вводными, первичными, повторными

### **ПАЛЬЦЫ В ВИДЕ "БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК" И НОГТИ В ВИДЕ "ЧАСОВЫХ СТЕКОЛ" ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ**

- 1) хронических заболеваниях дыхательной системы
- 2) острых заболеваниях дыхательной системы
- 3) острых заболеваниях пищеварительной системы
- 4) хронических заболеваниях пищеварительной системы

### **ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

- 1) фактического наличия имущества в подразделении или организации
- 2) потребности подразделения или организации в конкретных видах ресурсов
- 3) соответствия фактического наличия имущества данным записей руководителя подразделения
- 4) соответствия фактического наличия имущества данным бухгалтерского учета

### **ТЕПЛОВОЙ УДАР ВОЗНИКАЕТ ПРИ**

- 1) накопление тепла в организме, в связи с длительным воздействием высокой температуры
- 2) длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову или обнаженное тело
- 3) накопление тепла в организме, в связи с длительным воздействием низкой температуры
- 4) длительном воздействии высокой температуры на организм человека

### **САМЫМ РАННИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ РАБОТЫ ПОЧЕК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) артериосклероз
- 2) гиперфльтрация

- 3) протеинурия
- 4) микроальбуминурия

**ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОТУ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР СОСТАВЛЯЕТСЯ (В ЭКЗЕМПЛЯРАХ)**

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 4

**МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ УЧАСТКОВОЙ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОТКАЗАНО В ПРИЕМЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ЛАБОРАНТА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ**

- 1) необходимого стажа работы
- 2) профессиональной переподготовки по специальности «Бактериология»
- 3) базового образования, соответствующего должности лаборанта
- 4) документов о повышении квалификации по специальности «Бактериология»

**КОЛИЧЕСТВО МОЧИ ДЛЯ ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (В МЛ)**

- 1) 250-300
- 2) 500
- 3) 20-50
- 4) 100

**ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА СВЯЗИ МЕЖДУ ПРИЗНАКАМИ НЕОБХОДИМО ВЫЧИСЛИТЬ**

- 1) стандартную ошибку среднего
- 2) критерий Стьюдента
- 3) коэффициент корреляции
- 4) стандартизованные показатели

**МОКРОТА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ**

- 1) зловонная
- 2) «ржавая»
- 3) стекловидная
- 4) гнойная

**К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Б ОТНОСЯТСЯ**

- 1) процедурные и асептические перевязочные
- 2) кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов
- 3) помещения дезинфекционных камер
- 4) операционные, послеоперационные палаты

**ЕСЛИ ДАВЯЩАЯ ПОВЯЗКА, НАЛОЖЕННАЯ ПОСТРАДАВШЕМУ С РАНЕНИЕМ ПЛЕЧА И СИЛЬНЫМ ВЕНОЗНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, СПУСТЯ 15 МИНУТ ПРОПИТАЛАСЬ**

### **КРОВЬЮ, ТО НЕОБХОДИМО**

- 1) удалить старую повязку, наложив на ее место новую
- 2) наложить дополнительную давящую повязку поверх старой
- 3) сняв старую повязку, плотно затампонировать рану марлевыми салфетками, после чего повторно наложить давящую повязку
- 4) не трогая старую повязку, наложить кровоостанавливающий жгут

### **ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА ВДОХА ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ КОНТРОЛИРУЕТСЯ ПО**

- 1) появлению сопротивления при выполнении вдоха искусственного дыхания
- 2) началу подъема живота
- 3) началу подъема грудной клетки
- 4) максимальному раздуванию грудной клетки

### **РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ И ХРАНИТСЯ КАК \_\_\_\_\_ ДОКУМЕНТ**

- 1) организационный
- 2) финансово-расчетный
- 3) информационный
- 4) распорядительный

### **ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАЗНАЧАЕТ**

- 1) руководитель медицинской организации
- 2) заместитель руководителя по эпидемиологической работе
- 3) заместитель руководителя по экономическим вопросам
- 4) заместитель руководителя по хозяйственной части

### **ЗАМЕНУ ОДНОРАЗОВЫХ ПАКЕТОВ ПО СБОРУ ОТХОДОВ КЛАССА «Б» НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПО МЕРЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, НО НЕ РЕЖЕ**

- 1) 72 часов
- 2) 24 часов
- 3) одного раза в смену
- 4) 48 часов

### **НАИБОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) оценка отдаленных результатов
- 2) экономическая оценка преодоления ущерба от нетрудоспособности
- 3) комплексная оценка с включением критериев качества жизни
- 4) самооценка пациента

### **ДО НАЧАЛА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С КАЖДЫМ НОВЫМ РАБОТНИКОМ НА ЕГО РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ \_\_\_\_\_ ИНСТРУКТАЖ**

- 1) вводный

- 2) первичный
- 3) внеплановый
- 4) повторный

**К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ**

- 1) нерациональное питание
- 2) ожирение
- 3) наследственность
- 4) гиподинамия

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЮЩИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА И ВЫЗЫВАЮЩИЕ ТРАВМУ, ОСТРОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ, ОПРЕДЕЛЯЮТ, КАК \_\_\_\_\_ УСЛОВИЯ ТРУДА**

- 1) опасные
- 2) плохие
- 3) вредные
- 4) нежелательные

**ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ ИММУНИЗАЦИИ У РЕБЁНКА ПОДНЯЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА ДО 37,5°C, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНА КАК**

- 1) присоединение интеркуррентного заболевания
- 2) местная поствакцинальная реакция
- 3) поствакцинальное осложнение
- 4) общая (системная) поствакцинальная реакция

**ПРОМЫВАНИЕ ВОДЫ ПОСЛЕ ЭТАПОВ ОЧИСТКИ И ОПОЛАСКИВАНИЯ ЭНДОСКОПОВ ДОЛЖНЫ СЛИВАТЬСЯ В**

- 1) емкость для кипячения
- 2) централизованную канализацию без предварительного обеззараживания
- 3) емкость с дезинфицирующим средством
- 4) централизованную канализацию с предварительным обеззараживанием

**НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОБСЛЕДОВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИЮ (УЧЕТНАЯ ФОРМА № 057/У-04) ПОДПИСЫВАЕТ**

- 1) заместитель главного врача по лечебной работе
- 2) председатель врачебной комиссии
- 3) главный врач
- 4) заведующий отделением

**ОСНОВОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИММУНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) мониторинг коллективного иммунитета
- 2) проведение серологического мониторинга
- 3) обеспечение «холодовой цепи»

4) соблюдение правил асептики

### **ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ**

- 1) шума трения плевры
- 2) звонких влажных мелкопузырчатых хрипов
- 3) сухих хрипов
- 4) крепитации

### **ЗАПОЛНЕННЫЙ (ЗАКОНЧЕННЫЙ) ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ В(У)**

- 1) руководителя структурного подразделения
- 2) материально ответственного лица
- 3) архиве юридического лица
- 4) секретариате организации

### **ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ БЫТОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) отключение участка электрической цепи или оборудования (рубильником или другим выключающим аппаратом), определение наличия признаков жизни, вызов скорой медицинской помощи
- 2) отключение участка электрической цепи или оборудования (рубильником или другим выключающим аппаратом), вызов скорой медицинской помощи, определение наличия признаков жизни
- 3) вызов скорой медицинской помощи, отключение участка электрической цепи или оборудования (рубильником или другим выключающим аппаратом), определение наличия признаков жизни
- 4) определение наличия признаков жизни, отключение участка электрической цепи или оборудования (рубильником или другим выключающим аппаратом), вызов скорой медицинской помощи

### **ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- 1) рентгенологически подтвержденного легочного инфильтрата
- 2) температуры тела пациента выше 38 °С
- 3) гнойной мокроты
- 4) лейкоцитоза

### **ПОВЫШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- 1) дисметаболической нефропатии
- 2) тубулопатии
- 3) пиелонефрита
- 4) гломерулонефрита



**В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА РАЗРЕШАЕТСЯ ХРАНИТЬ ВМЕСТЕ С ВАКЦИНАМИ**

- 1) пищевые продукты
- 2) преднизолон
- 3) адреналин
- 4) растворители для вакцин

**ФАКТОРОМ, УМЕНЬШАЮЩИМ РИСК РАЗВИТИЯ ИБС, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наследственная отягощенность
- 2) сахарный диабет
- 3) повышение уровня липопротеидов высокой плотности
- 4) артериальная гипертония

**СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОГО СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ**

- 1) (общее число дней нетрудоспособности) / (число пациентов, которым были оформлены листки нетрудоспособности)
- 2) (общее число дней нетрудоспособности) / (число случаев нетрудоспособности) × 1000
- 3) (общее число дней нетрудоспособности) / (число случаев нетрудоспособности)
- 4) (общее число дней нетрудоспособности) / (число выданных листков нетрудоспособности)

**ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ПРОВОДЯТ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ РАЗ В \_\_\_\_\_**

- 1) 1; день
- 2) 2; день
- 3) 1; неделю
- 4) 1; 2 дня

**ОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ, ПРОНИКАЮЩИЕ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, ОТНОСЯТ К КАТЕГОРИИ**

- 1) загрязненных
- 2) условно чистых
- 3) чистых
- 4) грязных

**ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ СОСТАВЛЯЕТСЯ КАК МИНИМУМ В \_\_\_\_\_ ЭКЗЕМПЛЯРАХ**

- 1) 4-х
- 2) 5-ти
- 3) 3-х
- 4) 2-х

**СБОР ОТХОДОВ ПОДРАЗУМЕВАЕТ**

- 1) содержание отходов в объектах размещения отходов
- 2) прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц
- 3) перемещение отходов с помощью транспортных средств
- 4) использование отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки

### **СОЕДИНЕНИЯ МАРГАНЦА В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ**

- 1) дерматиты, экзему
- 2) паркинсонизм
- 3) пневмокониоз
- 4) вегетативные дисфункции (потливость, саливацию)

### **МЕХАНИЗМ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ИСТИННОМ УТОПЛЕНИИ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ**

- 1) непроизвольных вдохов под водой и аспирации воды в легкие
- 2) остановки дыхания при падении пострадавшего в воду
- 3) возникновения рвоты и аспирации рвотных масс в легкие
- 4) рефлекторной остановки дыхания в результате раздражения каротидных синусов

### **ПОСТОЯННЫМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) перфорация барабанной перепонки
- 2) боль в ухе
- 3) повышение температуры тела
- 4) нарушение фланговой походки

### **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНФУЗИИ ПАЦИЕНТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

- 1) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
- 2) журнал регистрации переливания трансфузионных сред
- 3) статистическая карта выбывшего из стационара
- 4) журнал записи оперативных вмешательств

### **ЕСЛИ ЯВЛЕНИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА РАЗВИВАЛИСЬ НА ФОНЕ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, ТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО**

- 1) иглу из места инъекции убрать
- 2) введение препарата прекратить, из вены не выходить
- 3) приложить холод к месту инъекции
- 4) обеспечить доступ к другому месту введения препарата

### **КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ IV СТЕПЕНИ**

- 1) темно-коричневый плотный струп, кожа вокруг темная, просвечивают тромбированные подкожные вены, сильная боль
- 2) темно-коричневый плотный струп, кожа вокруг струпа практически не изменена, боль умеренная
- 3) кожа темная, до черного цвета, мумификация пораженного участка, чувствительности в пораженном участке нет

4) беловатый, рыхлый струп, кожа вокруг струпа гиперемирована, боль умеренная

#### **ПЕРЕД КАКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ДЕЛАЕТСЯ ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ КЛИЗМА**

- 1) УЗИ печени
- 2) ФГДС
- 3) ректороманоскопия
- 4) рентгеноскопия желудка

#### **НАЗНАЧЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- 1) заместитель руководителя медицинской организации по эпидемиологической работе
- 2) руководитель медицинской организации (главный врач)
- 3) главная медицинская сестра
- 4) заместитель руководителя медицинской организации по экономическим вопросам

#### **ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ» УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ**

- 1) кашля, не проходящего в течение двух лет
- 2) кашля с мокротой на протяжении, по крайней мере, 1 месяца в году в течение 3 лет и более
- 3) кашля с мокротой на протяжении, по крайней мере, 3 месяцев в году в течение 2 лет и более
- 4) факторов риска: курения, поллютантов

#### **ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ ЧАЩЕ 1 РАЗА В**

- 1) полугодие
- 2) квартал
- 3) год
- 4) месяц

#### **ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ СОБРАННЫХ ПРОБ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО В ЛАБОРАТОРИЮ ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)**

- 1) +10-+14
- 2) +2-+8
- 3) +26-+36
- 4) +20-+24

#### **ДИАГНОЗ «МОНОЦИТАРНАЯ АНГИНА» УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

- 1) цитологического
- 2) мочи
- 3) крови
- 4) бактериологического

### **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ МЕРФИ ПАТОГНОМОНИЧЕН ДЛЯ**

- 1) холецистита
- 2) дуоденита
- 3) гастрита
- 4) язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

### **ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРИЖИГАЮЩИМИ ЯДАМИ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ПРОВОДЯТ ПОРЦИЯМИ ПО \_\_\_\_\_ МЛ ВОДЫ**

- 1) 300-500
- 2) 250
- 3) 50
- 4) 750-1000

### **МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА КАБИНЕТА ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ДОЛЖНА ПРОЙТИ УЧЕБУ ПО ТЕМЕ**

- 1) организации сестринского дела
- 2) вакцинопрофилактики
- 3) психологии и педагогики
- 4) фармацевтический порядок

### **ИЗ ДОКУМЕНТОВ, В КОТОРЫЕ ВНОСЯТ СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ, У ПАЦИЕНТА ХРАНИТСЯ**

- 1) история развития ребёнка (форма № 112/у)
- 2) статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (форма № 025-2/у)
- 3) карта профилактических прививок (форма № 063/у)
- 4) сертификат профилактических прививок (форма № 156/у-93)

### **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ДАВЛЕНИЕ РУКАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА**

- 1) нижнюю часть грудины
- 2) верхнюю половину грудины
- 3) центр грудной клетки
- 4) левую половину грудной клетки

### **ИНДИКАТОРОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) восстановление слуха, исчезновение болей, нормализация температуры тела
- 2) наличие головокружения
- 3) восстановление голосовой функции
- 4) нистагм

### **ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ БЕДРЕННАЯ АРТЕРИЯ ПРИЖИМАЕТСЯ К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЕТВИ ЛОБКОВОЙ КОСТИ НА СЕРЕДИНЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ**

- 1) верхней подвздошной остью слева и справа
- 2) верхней подвздошной остью и симфизом
- 3) верхней подвздошной остью и большим вертелом бедренной кости
- 4) большим вертелом бедренной кости и симфизом

#### **К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ГЕПАТИТА В ОТНОСЯТ**

- 1) сезонность
- 2) хронизацию процесса
- 3) нестойкий иммунитет
- 4) отсутствие возрастных особенностей

#### **ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) постановка горчичников на область затылка
- 2) введение дибазола
- 3) проведение оксигенотерапии
- 4) введение лазикса

#### **АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ ПРИ**

- 1) нарастании слабости
- 2) упорном кашле
- 3) появлении кровохарканья
- 4) выделении гнойной мокроты

#### **ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ГЕПАТИТА В СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 60-180 дней
- 2) 6-12 месяцев
- 3) 3-6 месяца
- 4) 10-40 дней

#### **ПРОЦЕНТ УМЕРШИХ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: (ЧИСЛО УМЕРШИХ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ) /**

- 1) (общее число заболевших за год)
- 2) (общее число умерших за год) ? 100
- 3) (общее число заболевших за год) ? 1000
- 4) (общее число заболевших за год) ? 100

#### **ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТНОСЯТ К ОТХОДАМ КЛАССА**

- 1) Г
- 2) Б
- 3) А
- 4) В

**ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ В МОМЕНТ СУДОРОГ СЛЕДУЕТ УДЕРЖИВАТЬ ПАЦИЕНТА ТАК, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАВМУ**

- 1) живота
- 2) головы
- 3) грудной клетки
- 4) конечностей

**В ПОМЕЩЕНИИ УЧАСТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССОВ Б И В ОЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКОВ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ 1 РАЗ В**

- 1) год
- 2) квартал
- 3) полгода
- 4) месяц

**САМОЙ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ишемическая болезнь сердца
- 2) артериальная гипертензия
- 3) фибрилляция предсердий
- 4) миокардит

**ЖУРНАЛ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ВЕДУТ В КАБИНЕТЕ**

- 1) врача-инфекциониста
- 2) здорового ребенка
- 3) вакцинопрофилактики
- 4) врача -эпидемиолога

**МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА ПЕРЕД РАБОТОДАТЕЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕННОЙ И**

- 1) полной
- 2) долевой
- 3) солидарной
- 4) субсидиарная

**К СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГРУППЕ «А» ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ (III ГРУППА) ОТНОСЯТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

- 1) имеющих нарушения состояния здоровья постоянного характера (хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации)
- 2) имеющих морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленных
- 3) с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет
- 4) с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических нагрузок

## **ПРИ ЗАБОРЕ КРОВИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА НЕЛЬЗЯ**

- 1) использовать вакуумные системы с колпачками голубого цвета
- 2) обрабатывать место прокола спиртом 70%
- 3) использовать силиконированные пробирки с цитратом натрия
- 4) накладывать жгут более 60 секунд

## **ПРОГРАММА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ХОБЛ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) спирометрию
- 2) рентгенографию легких
- 3) цитологическое исследование мокроты
- 4) определение газового состава крови

## **КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ I СТЕПЕНИ**

- 1) гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные пузыри
- 2) гиперемия обожженного участка, чувство боли и жжения
- 3) гиперемия обожженного участка, чувствительность резко снижена, боли нет
- 4) кожа бледная, беспокоит чувство боли или жжения

## **АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ВОЗНИКАЕТ, В МОМЕНТ СОКРАЩЕНИЯ СЕРДЦА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) пульсовым
- 2) артериальным
- 3) диастолическим
- 4) систолическим

## **ОСНОВНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТОМ СТАЦИОНАРА, КОТОРЫЙ СОСТАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДОГО ПОСТУПИВШЕГО В СТАЦИОНАР, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) медицинская карта стационарного больного (ф 003/у)
- 2) контрольная карта диспансерного наблюдения (ф 030/у)
- 3) карта учета диспансеризации (ф 131/у)
- 4) статистическая карта выбывшего из стационара круглосуточного пребывания (ф 066/у-02)

## **ДЕТЯМ С ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ**

- 1) ингаляционной терапии бета2-агонистами
- 2) антибактериальной терапии
- 3) ингаляционной терапии с альфа-адреномиметиками
- 4) базисной терапии глюкокортикостероидами

## **К МЕРОПРИЯТИЯМ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА I ТИПА ОТНОСЯТ**

- 1) ангиопластика сосудов нижних конечностей
- 2) ангиопластика сосудов верхних конечностей
- 3) назначение лекарственных препаратов, направленных на устранение инсулинорезистентности
- 4) назначение инсулина

**В ЧИСЛО СПОСОБОВ ДОБРОВОЛЬНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРИЧИНЕННОГО РАБОТОДАТЕЛЮ УЩЕРБА НЕ ВХОДИТ**

- 1) возмещение ущерба с рассрочкой платежа
- 2) внесение денежных средств в кассу работодателя
- 3) взыскание в судебном порядке
- 4) передача работодателю равноценного имущества

**ОСНОВНЫМ ПУТЁМ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА Е ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) парентеральный
- 2) пищевой
- 3) водный
- 4) контактно-бытовой

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩИХ УБОРОК НА УЧАСТКЕ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б И В СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ РАЗ В \_\_\_\_\_**

- 1) 1; месяц
- 2) 1; 2 дня
- 3) 1; день
- 4) 2; неделю

**ПРИ РАНЕНИЯХ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ НАКЛАДЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПОВЯЗКА**

- 1) чепец
- 2) восьмиобразная
- 3) т-образная
- 4) уздечка

**ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВРАЧАМИ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: (ЧИСЛО ВРАЧЕЙ) /**

- 1) (среднегодовая численность коек)
- 2) (среднегодовая численность медицинских организаций)
- 3) (численность населения на 01 января текущего года) ? 10000
- 4) (среднегодовая численность населения)? 10000

**ПАЦИЕНТА С АСТМАТИЧЕСКИМ СТАТУСОМ ТРАНСПОРТИРУЮТ В СТАЦИОНАР В ПОЛОЖЕНИИ**

- 1) лежа с приподнятым головным концом
- 2) лежа с приподнятыми ногами
- 3) лежа горизонтально



4) сидя

**В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИХ ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ЗАПОЛНЯЕТ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДЕ**

- 1) еженедельно
- 2) ежемесячно
- 3) ежедневно
- 4) после каждого их применения

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) электрокардиография
- 2) обзорная рентгенография легких
- 3) пикфлоуметрия
- 4) бронхография

**ОСНОВНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) энтерококк
- 2) стафилококк
- 3) пневмококк
- 4) стрептококк

**ЦЕЛЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отказ от употребления алкоголя
- 2) предупреждение рецидивов
- 3) предупреждение употребления алкоголя
- 4) лечение заболеваний

**ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ХАРАКТЕРНО**

- 1) выявление инсулинорезистентности
- 2) острое начало заболевания
- 3) отсутствие склонности к кетоацидозу
- 4) снижение потребности в инсулине при травме

**ПЛАНОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ, СТЕРИЛИЗУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ, СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ И КОЖНЫМИ АНТИСЕПТИКАМИ ПРОВОДИТ**

- 1) заместитель руководителя медицинской организации по эпидемиологической работе
- 2) главная медицинская сестра
- 3) заведующий структурным подразделением

4) руководитель медицинской организации (главный врач)

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И СТЕРИЛИЗУЮЩИХ СРЕДСТВ, СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ И КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТ**

- 1) руководитель медицинской организации
- 2) заместитель руководителя по экономическим вопросам
- 3) заместитель руководителя по эпидемиологической работе
- 4) главная медицинская сестра

**К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ИДУЩИМ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШЕЛКА ХИРУРГИЧЕСКОГО, ОТНОСЯТ**

- 1) кожу мелкого рогатого скота
- 2) кишки мелкого и крупного рогатого скота
- 3) высокомолекулярные соединения
- 4) натуральный шелк-сырец

**К АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ**

- 1) аутоаллергические реакции
- 2) контактный дерматит
- 3) реакция отторжения трансплантата
- 4) атопическая бронхиальная астма

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ВОЗЛОЖНА НА**

- 1) главную медицинскую сестру
- 2) начальника отдела кадров
- 3) руководителя медицинской организации
- 4) заведующего структурным подразделением

**ВСЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДВЕРГАЮТСЯ ОСМОТРУ**

- 1) врачом (фельдшером)
- 2) медицинской сестрой прививочного кабинета
- 3) медицинской сестрой участковой
- 4) заведующим отделением профилактики

**РЕГИСТРАЦИЮ ПОКАЗАНИЙ ТЕРМОИНДИКАТОРА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДЯТ**

- 1) ежедневно
- 2) только в рабочие дни
- 3) только в выходные дни
- 4) два раза в неделю

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЦЕЛЯХ РАННЕГО**

**ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОВОДИТСЯ В ОТНОШЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 9
- 2) 15
- 3) 13
- 4) 11

**ПОД МЕСТОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПОНИМАЮТ МЕСТО**

- 1) обработки статистических данных
- 2) сбора статистических данных
- 3) анализа полученных данных
- 4) расположения статистического органа

**«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) биопсия печени
- 2) спленопортометрия
- 3) сцинтиграфия печени
- 4) УЗИ органов брюшной полости

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АРОМАТИЧЕСКИХ ВАНН**

- 1) лихорадка
- 2) мокнущие дерматиты
- 3) заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата
- 4) кровотечение

**ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ**

- 1) форму материального вознаграждения за труд
- 2) форму материального вознаграждения за высокие показатели в труде
- 3) компенсацию материальных потерь, возникших в процессе работы
- 4) компенсацию за потраченное в процессе работы время

**К КОНЦУ 1-2-ГО ДНЯ ПНЕВМОНИИ НА ВЫСОТЕ ВДОХА МОЖНО ПРОСЛУШАТЬ**

- 1) сухие хрипы
- 2) бронхиальное дыхание
- 3) жесткое дыхание
- 4) крепитацию

**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО ВЫБОРА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В**

- 1) пять лет
- 2) месяц
- 3) год
- 4) полгода

### **ОПАСНОСТЬ ПРИ УКУСЕ ЧЕЛОВЕКА БЕШЕНЫМ ЖИВОТНЫМ**

- 1) заражение бешенством
- 2) заражение туберкулезом
- 3) развитие вирусной инфекции
- 4) перелом костей

### **В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ИМУЩЕСТВА УЧЁТНЫМ ДАННЫМ СОСТАВЛЯЕТСЯ**

- 1) инвентаризационная опись
- 2) сличительная ведомость
- 3) накладная
- 4) акт

### **РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫДАВАТЬ МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ, ИМЕЮЩЕМУ ПРАВО НАЗНАЧАТЬ НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ЕДИНОВРЕМЕННО НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ ФОРМЫ 107/У-НП**

- 1) 30
- 2) 20
- 3) 50
- 4) 40

### **УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ОДНУ МИНУТУ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА**

- 1) 16-20
- 2) 30-36
- 3) 22-28
- 4) 10-12

### **ДЛЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) бактериофаг
- 2) живую вакцину
- 3) анатоксин
- 4) химическую вакцину

### **ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хронический гепатит
- 2) каротиновая желтуха
- 3) гастрит
- 4) синдром Жильбера

### **ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВРАЧАМИ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: (ЧИСЛО ВРАЧЕЙ) /**

- 1) (среднегодовая численность коек)
- 2) (среднегодовая численность медицинских организаций)

- 3) (численность населения на 01 января текущего года) × 10000
- 4) (среднегодовая численность населения) × 10000

### **ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ПОДРАЗУМЕВАЕТ**

- 1) назначение бигуанидов взрослым с индексом массы тела >25,0 кг/м<sup>2</sup>
- 2) гиперкалорийное питание у детей, подростков и взрослого населения
- 3) рациональное питание и достаточную физическую активность у детей, подростков и взрослого населения
- 4) ограничение двигательной активности у детей, подростков и взрослого населения

### **ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА «МЕНИНГИТ» РЕШАЮЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) общий анализ мочи
- 2) исследование ликвора
- 3) бактериологическое исследование слизи из носоглотки
- 4) общий анализ крови

### **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПАРАКЛИНИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ПНЕВМОНИЮ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) спирография
- 2) рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях
- 3) пикфлоуметрия
- 4) компьютерная томография лёгких

### **В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХОЛЕЦИСТИТАХ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) сульфаниламидные препараты
- 2) препараты фурадоинового ряда
- 3) антибиотики широкого спектра действия
- 4) препараты налидиксовой кислоты

### **СОКРАЩЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ**

- 1) 38
- 2) 39
- 3) 36
- 4) 37

### **ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕМ СРЕДСТВЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ БЕЛЬЯ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) количество процедур обеззараживания в расчетном периоде
- 2) объем дезинфицирующего раствора
- 3) количество обрабатываемого белья в сутки
- 4) фактический срок годности раствора в сутках

## **АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО ТИПА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) узелковом полиартериите
- 2) синдроме Иценко-Кушинга
- 3) альдостероме
- 4) феохромоцитоме

## **ЖИРОВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ ПЕЧЕНИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- 1) сахарного диабета
- 2) хронической сердечной недостаточности
- 3) системной красной волчанки
- 4) саркоидоза с поражением печени

## **МОЧА, СОБРАННАЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИАСТАЗУ, ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТАВЛЕНА В ЛАБОРАТОРИЮ \_\_\_\_\_ ПОСЛЕ СБОРА**

- 1) теплой, сразу
- 2) в течение дня
- 3) в замороженном виде
- 4) на следующий день

## **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПАРАКЛИНИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ПНЕВМОНИЮ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) спирография
- 2) рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях
- 3) пикфлоуметрия
- 4) компьютерная томография легких

## **ДЛЯ ГРИППА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ**

- 1) фарингита
- 2) трахеита
- 3) бронхит
- 4) ларингита

## **ПРИ НАЛИЧИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕНТГЕНОЛОГИЯ» ДОЛЖНОСТЬ РЕНТГЕНЛАБОРАНТА МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ЛИЦО СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) стоматология ортопедическая
- 2) медицинский массаж
- 3) медицинская оптика
- 4) фармация

## **ОСОБЕННОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА НА НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ИЛИ ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) использование шрифта Times New Roman
- 2) защищенность уровня «А»
- 3) размер формата А4

4) на бумаге розового цвета

**ПРЕКУРСОРОМ ИЗ СПИСКА IV ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) перманганат калия
- 2) альфапродин
- 3) бензилморфин
- 4) мескалин

**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ КОСТЕЙ ТАЗА ПОСТРАДАВШИЙ УКЛАДЫВАЕТСЯ НА**

- 1) любые носилки в положении «лягушки»
- 2) щит на живот
- 3) щит с плотной фиксацией тазового пояса к щиту
- 4) щит в положение «лягушки»

**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА, БЕДРЕННОЙ КОСТИ ИЛИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ НАЛОЖЕНИИ ШИНЫ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ФИКСИРУЕТСЯ**

- 1) только под углом в 45 градусов
- 2) в том положении, в котором он находится
- 3) только под прямым углом
- 4) в положении подошвенного сгибания

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПЕРВУЮ РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОКЛЮША ПРОВОДЯТСЯ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 13
- 2) 3
- 3) 18
- 4) 19

**МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССА V ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности
- 2) эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твёрдым бытовым отходам
- 3) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы
- 4) эпидемиологически опасные отходы

**ДЛЯ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРЕН ПЕРИОД**

- 1) осенне-зимний
- 2) весенне-летний
- 3) летне-осенний
- 4) зимне-весенний

**ОБСТРУКТИВНЫМ ЛЕГОЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) экзогенный аллергический альвеолит
- 2) эозинофильная пневмония
- 3) бронхиальная астма
- 4) фиброзирующий альвеолит

**ПРИЧИНОЙ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ГОРМОНА**

- 1) дефицит соматотропного (СТГ)
- 2) дефицит антидуретического (АДГ)
- 3) избыток соматотропного (СТГ)
- 4) избыток антидиуретического (АДГ)

**ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО**

- 1) снижение сердечного выброса
- 2) повышение сердечного выброса
- 3) увеличение центрального венозного давления
- 4) снижение общего периферического сопротивления

**ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ**

- 1) только удаление воздуха и жидкости из плевральной полости
- 2) только удаление жидкости из плевральной полости и взятие ее на бактериологическое исследование
- 3) удаление жидкости из плевральной полости, взятие ее на бактериологическое исследование, введения лекарственных препаратов
- 4) только удаление жидкости из плевральной полости и введение лекарственных препаратов

**В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДВЕРИ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ ДОЛЖНЫ ОТКРЫВАТЬСЯ**

- 1) вращающимися движениями
- 2) свободно, по направлению входа в здание
- 3) свободно, по направлению выхода из здания
- 4) электронным ключом

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ РАБОЧИХ ДНЕЙ**

- 1) 20
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 15

**ПРИ ЗАБОРЕ КРОВИ НА ГЕМОКУЛЬТУРУ НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ**

- 1) вирусологическую
- 2) бактериологическую
- 3) биохимическую



4) клиническую

**ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ, ОТЯГОЩЕННОМ МУЧИТЕЛЬНЫМ НЕПРОДУКТИВНЫМ КАШЛЕМ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДОЗРЕНИЯ НА КОКЛЮШ), НЕ ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) бронходилататоров
- 2) антибиотиков
- 3) пареоингаляций
- 4) муколитиков

**СТЕРИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В НЕУПАКОВАННОМ ВИДЕ (В ОТКРЫТЫХ ЛОТКАХ) ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ \_\_\_\_\_ МЕТОДЕ**

- 1) паровом
- 2) воздушном
- 3) плазменном
- 4) газовом

**ДЛЯ АУТОИММУННОГО ГАСТРИТА НЕ ХАРАКТЕРНО**

- 1) преимущественное поражение антрального отдела желудка
- 2) наличие антител к париетальным клеткам желудка
- 3) наличие гипогастринемии
- 4) наличие ахлоргидрии

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕМ СРЕДСТВЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЕМКОСТЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) норму расхода средства для обеззараживания
- 2) объем раствора, необходимый для заполнения емкостей
- 3) количество обрабатываемого материала
- 4) фактический срок годности раствора в сутках

**ЧАЩЕ ВСЕГО ГЕПАТИТ В ВОЗНИКАЕТ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ**

- 1) урологических
- 2) кардиологических
- 3) гастроэнтерологических
- 4) гемодиализа

**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРИ ОСТАНОВКЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЕ**

- 1) сердечных гликозидов
- 2) атропина
- 3) преднизолона
- 4) адреналина

**ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК ЗАПОЛНЯЮТ**

- 1) 1 раз в 10 дней

- 2) 1 раз в месяц
- 3) после каждой генеральной уборки
- 4) ежедневно

**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) фиброэластометрия
- 2) панкреатохолангиография
- 3) гепатобилисцинтиграфия
- 4) ангиография

**РАЗНОВИДНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) пищевые отходы из инфекционных отделений
- 2) патологоанатомические отходы
- 3) живые вакцины, непригодные к использованию
- 4) непригодные к использованию реактивы из клинично-диагностических лабораторий

**ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ ФЛЮОРОГРАФИЯ ЛЕГКИХ ПРОВОДИТСЯ ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 1 РАЗ В \_\_\_\_\_ ГОДА (ЛЕТ)**

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 4

**ПРИ ОСЛОЖНЕНИИ ГЕМОРРОЯ ТРОМБОФЛЕБИТОМ ОТМЕЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ**

- 1) тенезмы, повышение температуры тела
- 2) повышение температуры тела, болезненные узлы
- 3) диарея, тошнота
- 4) анемия, запоры

**СОГЛАСНО ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ «ТЕРАПИЯ» ДОЛЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ИЗ РАСЧЕТА 1 НА**

- 1) 1 врача-терапевта участкового
- 2) 1800 человек прикрепленного взрослого населения
- 3) 3 должности врача-терапевта участкового
- 4) 1300 человек прикрепленного взрослого населения

**ОСТРЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) притуплением перкуторного звука
- 2) влажными мелкопузырчатыми хрипами
- 3) свистящими хрипами

4) инспираторной одышкой

**МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» ОБУСЛОВЛЕНО**

- 1) развитием цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы
- 2) преобладанием бессимптомных и стертых форм инфекции
- 3) высокой летальностью пациентов в остром периоде заболевания
- 4) формированием длительного антигеноносительства после перенесенного заболевания

**ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ПРИ ПОМОЩИ ТОЛСТОГО ЗОНДА НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ ВОДУ В КОЛИЧЕСТВЕ (В Л)**

- 1) 7 - 9
- 2) 1,5 - 2
- 3) 3 - 5
- 4) 10 – 12

**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫМ И ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) взвешивание
- 2) дистанция 6-минутной ходьбы
- 3) велоэргометрия
- 4) Эхо-КГ

**ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ КВАРЦЕВАНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕЛАЮТ**

- 1) после каждого кварцевания
- 2) в конце рабочей смены
- 3) перед началом рабочей смены
- 4) 1 раз в неделю

**ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ МАССАЖА ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО**

- 1) выполнить лечебную гимнастику
- 2) принять гигиенический душ
- 3) поставить очистительную клизму
- 4) провести физиотерапию

**ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) употребление алкоголя членами семьи
- 2) позитивные коммуникации в семье
- 3) положительное поведение окружающих сверстников
- 4) эмоциональная близость к матери

**ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) слабость

- 2) головная боль
- 3) одышка
- 4) лихорадка

**КАБИНЕТ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНАЩЕН**

- 1) креслом-каталкой
- 2) сухожаровым шкафом
- 3) функциональной кроватью
- 4) пеленальным столиком

**ВЛАЖНУЮ УБОРКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ПАЛАТ АКУШЕРСКИХ СТАЦИОНАРОВ ПРОВОДЯТ \_\_\_\_ РАЗ(А) В СУТКИ**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**ПРИ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКЕ**

- 1) затруднен и вдох, и выдох
- 2) меняется только частота дыхания
- 3) затруднен вдох
- 4) затруднен выдох

**ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЕТ**

- 1) заведующий отделением
- 2) старшая медицинская сестра
- 3) главный врач
- 4) главная медицинская сестра

**КУРС ВАКЦИНАЦИИ ДС-М-АНАТОКСИНОМ СОСТОИТ ИЗ \_\_\_\_\_ ПРИВИВОК С ИНТЕРВАЛОМ \_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 3; 45
- 2) 2; 45
- 3) 3; 60
- 4) 2; 60

**НАРАСТАНИЕ АМИЛАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО СОКА И СЛЮНЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ПРОИСХОДИТ**

- 1) с первого месяца жизни
- 2) после введения прикорма
- 3) с третьего месяца жизни
- 4) к концу первого года жизни

### **НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ**

- 1) внутрь
- 2) сублингвально
- 3) ректально
- 4) подкожно

### **ЭТАПЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ**

- 1) проведение анализа статистической информации и получение выводов
- 2) статистическое наблюдение, сводку, группировку и анализ данных
- 3) подведение итогов и построение статистических графиков
- 4) сбор статистической информации и ее обобщение

### **ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В (ГОДАХ)**

- 1) 6
- 2) 5
- 3) 8
- 4) 7

### **ОСМОТР ВРАЧОМ-ОФТАЛЬМОЛОГОМ ПРОВОДИТСЯ НА \_\_\_\_\_ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

### **ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ПРИСТУП ПРИ ЭПИЛЕПСИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) импульсивным влечением
- 2) нарушением сознания
- 3) генерализованными сенсорными эквивалентами
- 4) отсутствием судорожного компонента

### **НАИБОЛЬШИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЗАНИМАЕТ**

- 1) инсульт
- 2) инфаркт миокарда
- 3) ишемическая болезнь сердца
- 4) стенокардия

### **БАЗОВЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ ЛАБОРАНТА В БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) медико-профилактическое дело
- 2) лабораторное дело
- 3) бактериология

4) гистология

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОСТРОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ИХ ЗАПОЛНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)**

- 1) 5
- 2) 6
- 3) 4
- 4) 3

**КОПРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- 1) изучения степени усвоения различных компонентов пищи
- 2) обнаружения гельминтов
- 3) обнаружения слизи в кале
- 4) изучения перистальтики кишечника

**ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО НАИМЕНОВАНИЙ НАРКОТИЧЕСКОГО (ПСИХОТРОПНОГО) ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, ВЫПИСЫВАЕМОГО НА СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 5
- 4) 3

**ПРИЧИНОЙ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) дисбактериоз
- 2) стеноз гортани
- 3) инфекционно-токсический шок
- 4) гидроцефалия

**ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА МЕДСЕСТРЕ 28 ЛЕТ, КОТОРОЙ ПРИ УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМ ГИДРОФОБИЕЙ СЛУЧАЙНО ПОПАЛА В ГЛАЗА СЛЮНА БОЛЬНОГО, ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМЕ**

- 1) иммунобиологические препараты вводить не надо
- 2) введение только антирабического иммуноглобулина
- 3) введение антирабического иммуноглобулина и проведение курса антирабической вакцины КОКАВ
- 4) проведение только курса антирабической вакцины КОКАВ

**НА ЭТАПЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОСНОВНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕРОЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИНФИЦИРОВАНИЯ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наложение повязки из чистой ткани
- 2) смазывание краев раны жировым веществом
- 3) иссечение краев раны
- 4) наложение жгута выше раны

**НА ДОВРАЧЕБНОМ ЭТАПЕ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭКГ) МОЖНО ДУМАТЬ О НАЧАВШЕМСЯ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА, ЕСЛИ ПРИСТУП СТЕНОКАРДИИ НЕ КУПИРУЕТСЯ ПРИЕМОМ НИТРОГЛИЦЕРИНА В ТЕЧЕНИЕ**

- 1) 30 минут - 1 часа
- 2) 20-30 минут
- 3) суток
- 4) 1,5-2 часов

**ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАССЧИТЫВАЕТСЯ НА \_\_\_\_\_ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ**

- 1) 100
- 2) 1000
- 3) 10000
- 4) 1000000

**ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) курение
- 2) алкоголизм
- 3) ожирение
- 4) гиподинамия

**ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В \_\_\_\_\_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 5
- 2) 6
- 3) 9
- 4) 7

**БОЛЬНОМУ В СОСТОЯНИИ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧИТЬ**

- 1) ингаляционные  $\beta$ 2 агонисты
- 2) глюкокортикостероиды
- 3) защищенные пенициллины
- 4) периферические вазодилататоры

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И/ ИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЗДАЕТСЯ**

- 1) постоянно действующая врачебная комиссия
- 2) передвижная фельдшерская бригада
- 3) временный коллектив медицинских работников
- 4) врачебный консилиум

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДЯТ**

- 1) 1 раз в 3 года
- 2) 1 раз в год
- 3) в индивидуальном порядке
- 4) 2 раза в год

### **ПРИ НАЛИЧИИ МЕНИНГЕАЛЬНОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМО**

- 1) определить остроту зрения и исследовать глазное дно
- 2) сделать электроэнцефалографию
- 3) сделать рентгенографию черепа
- 4) выполнить спинномозговую пункцию

### **ПОД ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ ПОДРАЗУМЕВАЕТ**

- 1) дезинфекцию отходов
- 2) обработку отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов
- 3) содержание отходов в объектах размещения отходов
- 4) использование отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов

### **ПАЦИЕНТА В СОСТОЯНИИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ**

- 1) не госпитализируют
- 2) необходимо госпитализировать
- 3) выводят из состояния в машине скорой помощи, затем отпускают домой
- 4) необходимо активно наблюдать на дому

### **МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 320
- 2) 504
- 3) 216
- 4) 250

### **ДЛЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА \_\_\_\_\_ ЭТИОЛОГИЯ ПНЕВМОНИИ**

- 1) пневмоцистная
- 2) пневмококковая
- 3) стафилококковая
- 4) вирусная

### **ИСТОЧНИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ БЕШЕНСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) иксодовые клещи
- 2) полевые мыши
- 3) утки, гуси
- 4) собаки, лисы, кошки, волки



**ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ РАБОЧИХ ДНЕЙ**

- 1) 45
- 2) 60
- 3) 50
- 4) 55

**ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ НА САХАР ЕЕ СОБИРАЮТ В ТЕЧЕНИЕ (В ЧАСАХ)**

- 1) 24
- 2) 10
- 3) 12
- 4) 48

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК  
ВТОРУЮ РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В  
МЕСЯЦАХ)**

- 1) 20
- 2) 18
- 3) 19
- 4) 12

**ВАЖНЕЙШИМ ПРИЗНАКОМ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА II СТАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пульсация шейных вен
- 2) тахикардия
- 3) выраженность цианоза
- 4) отсутствие дыхательных шумов над легкими

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ПОДЛЕЖАТ РАБОТНИКИ**

- 1) проводящие отлов животных
- 2) предприятий общественного питания и торговли
- 3) мясокомбината
- 4) птицефабрик

**В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ ОПЛАТА ТРУДА В МЕДИЦИНСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В \_\_\_\_\_**

- 1) 2 недели
- 2) 1 месяц
- 3) 3 недели
- 4) 10 дней

**ГРАЖДАН, У КОТОРЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОТСУТСТВУЮТ  
ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТ К  
\_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) IIIБ

- 2) II
- 3) I
- 4) IIIa

**КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР?**

- 1) самостоятельно на личном транспорте
- 2) на машине скорой помощи с обязательным сопровождением врача
- 3) на машине скорой помощи без сопровождения врача
- 4) самостоятельно на общественном транспорте

**ДАнные О ПРОВЕДЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВНОСИТ В ЖУРНАЛ**

- 1) контроля стерилизации инструментов и мягкого инвентаря
- 2) учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб
- 3) кварцевания кабинета
- 4) генеральных уборок

**ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ВЕРХНЯЯ ПЕТЛЯ ТОКА ПРОХОДИТ ОТ \_\_\_\_\_ К \_\_\_\_\_**

- 1) руки; руке
- 2) ноги; ноге
- 3) ноги; руке
- 4) головы; руке и ноге

**ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВОМ ИЗ СПИСКА I ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) мидазолам
- 2) дигидрокодеин
- 3) амфетамин и его производные
- 4) просидол

**НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ В КЛИНИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) затрудненный выдох
- 2) ослабление дыхания при аускультации лёгких
- 3) затрудненный вдох
- 4) асимметричные влажные хрипы в лёгких

**К СУБЪЕКТАМ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ОТНОСЯТ**

- 1) динамику индекса цен на медицинские товары
- 2) потребительские свойства медицинских товаров
- 3) потребителей медицинских товаров
- 4) товароведческие характеристики медицинских товаров

**УЧЕТНАЯ ФОРМА «КАРТА УЧЁТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ» ИМЕЕТ КОД**

- 1) 143/у

- 2) 156/у
- 3) 131/у
- 4) 124/у

**СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ВЕЖЛИВОСТИ, ПЕРВЫМ ПРИВЕТСТВУЕТ**

- 1) женщина – мужчину
- 2) старший – младшего
- 3) входящий – находящихся в помещении
- 4) стоящий – проходящего

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) антибиотики
- 2) антирабическую вакцину + антирабический иммуноглобулин
- 3) интерфероны
- 4) антитоксическую сыворотку

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) симптом хвостика
- 2) подострый период
- 3) отсутствие активных движений мимической мускулатуры
- 4) температура тела 37,3°C

**ПОД ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДОЙ ДЛЯ СБОРА МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПОНИМАЮТ**

- 1) чашку Петри
- 2) широкогорлый флакон ёмкостью 100-150 мл
- 3) лоток ёмкостью 250-300 мл
- 4) пробирку

**ПРИ ХОБЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ \_\_\_\_\_ ВАКЦИНОЙ**

- 1) противокклюшной
- 2) противогриппозной
- 3) противодифтерийной
- 4) противоменингококковой

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВВЕДЕНИЮ ЖИВЫХ ВИРУСНЫХ ВАКЦИН**

- 1) тяжелые формы аллергических реакций на аминогликозиды
- 2) дисбактериоз
- 3) врожденные пороки развития
- 4) неблагоприятный семейный анамнез

**В ОТНОШЕНИЯХ РУКОВОДИТЕЛЯ И ПОДЧИНЕННЫХ НЕДОПУСТИМА**

- 1) фамильярность
- 2) уважение

- 3) спокойствие
- 4) тактичность

**ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОГО КЕТОАЦИДОЗА НЕ ХАРАКТЕРНО**

- 1) повышение рН крови
- 2) снижение распада жиров
- 3) наличие гипергликемии
- 4) появление ацетона в моче

**МЕДИЦИНСКУЮ ОДЕЖДУ, ЗАГРЯЗНЕННУЮ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, НЕОБХОДИМО**

- 1) подвергнуть дезинфекции
- 2) выстирать
- 3) выбросить
- 4) стерилизовать

**ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) лейкоцитоз+лимфоцитоз
- 2) лейкоцитоз+нейтрофилез
- 3) эозинофилия
- 4) лейкопения+лимфоцитоз

**В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ РАБОТНИКУ ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА СРОК ДО (В КАЛЕНДАРНЫХ ДНЯХ)**

- 1) 10
- 2) 6
- 3) 5
- 4) 7

**ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ С ЦЕЛЬЮ**

- 1) более удобного приема пищи
- 2) облегчения своего состояния
- 3) облегчения медперсоналу выполнения функций по уходу
- 4) уменьшение опасности возникновения пролежней

**ПОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЙ, ЖЖЕНИЯ, ОНЕМЕНИЯ, «ПОЛЗАНИЯ МУРАШЕК» В ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, НЕРЕДКО В ПАЛЬЦАХ, СНИЖЕНИЕ АХИЛЛОВА И КОЛЕННОГО РЕФЛЕКСОВ, ОСЛАБЛЕНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ И БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О**

- 1) микроангиопатии
- 2) диабетической нейропатии
- 3) «перемежающейся хромоте»
- 4) поражении ЦНС

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДЕЗАГРЕГАНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нестабильная стенокардия
- 2) острый инфаркт миокарда
- 3) стенокардия напряжения
- 4) неконтролируемая АГ

### **РЕНТГЕНОЛАБОРАНТУ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОТКАЗАНО В ЗАНЯТИИ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ УЧАСТКОВОЙ ТОЙ ЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ**

- 1) профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское дело в педиатрии»
- 2) профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское дело»
- 3) документов о повышении квалификации по специальности «Сестринское дело в педиатрии»
- 4) необходимого стажа работы

### **ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ «ХОЛОДНЫХ» И «ГОРЯЧИХ» УЗЛОВ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) пальпацию
- 2) термографию
- 3) рентгенографию
- 4) сцинтиграфию

### **ЗАПАХ АЦЕТОНА ИЗО РТА ХАРАКТЕРЕН**

- 1) для мозговой комы
- 2) для гипогликемической комы
- 3) для гипергликемической комы
- 4) для уремии комы

### **ИСТОЧНИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИИ ПРИ БЕШЕНСТВЕ МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) больная бешенством собака
- 2) человек через 10 дней после введения культуральной инактивированной концентрированной очищенной антирабической вакцины
- 3) больная бешенством утка
- 4) человек через 10 дней после введения мозговой антирабической вакцины

### **ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН ПИЩЕВОДА И КАРДИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ**

- 1) болезни Кароли
- 2) вирусном гепатите
- 3) циррозе печени
- 4) метастатическом поражении печени

### **ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ СЛЕДУЕТ КЛИНИЧЕСКИ ОЦЕНИВАТЬ ЧЕРЕЗ**

- 1) 12 часов
- 2) 2-3 дня
- 3) 5-6 дней
- 4) 24 часа

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРА МОЧИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИАСТАЗУ  
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ПОДГОТОВИТЬ**

- 1) сухую чистую банку с крышкой объемом до 200 мл
- 2) стерильную пробирку объемом 20 мл
- 3) стерильную банку с крышкой объемом 200 мл
- 4) чистую банку объемом 3 литра

**СТУДЕНТ 5 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО», УСПЕШНО СДАВШИЙ ЭКЗАМЕН ПО  
ДОПУСКУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МОЖЕТ РАБОТАТЬ  
В ДОЛЖНОСТИ**

- 1) медицинской сестры стерилизационной
- 2) медицинского дезинфектора
- 3) инструктора по лечебной физкультуре
- 4) медицинской сестры процедурной

**НА ОСНОВАНИИ ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПО  
СТАРОСТИ (ПО ВОЗРАСТУ) РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ОТПУСК БЕЗ  
СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДО \_\_\_\_\_ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ В ГОДУ**

- 1) 35
- 2) 14
- 3) 90
- 4) 60

**МНОГОРАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРУЖАЮТ В**

- 1) дезинфицирующий раствор
- 2) моющий раствор
- 3) воду
- 4) азопирамовый раствор

**В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ  
ЭВАКУАЦИОННЫМИ ВЫХОДАМИ**

- 1) выходы из помещений первого этажа наружу через коридор и лестничную клетку
- 2) выходы, в которых установлены подъемно-опускные двери
- 3) все выходы являются эвакуационными по умолчанию
- 4) вращающиеся двери и турникеты

**РАБОТНИКИ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ НЕСУТ ПОЛНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИШЬ ЗА**

- 1) умышленное причинение ущерба
- 2) возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы
- 3) ущерб, возникший в случае крайней необходимости
- 4) ущерб, возникший при необходимости обороны

### **ПРИ ПРИЗНАКАХ ЧАСТИЧНОГО НАРУШЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ**

- 1) выполнить пять резких толчков в верхнюю часть живота пострадавшего
- 2) нанести удары по спине
- 3) предложить пострадавшему попить воды
- 4) предложить пострадавшему откашляться

### **ПАЦИЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ХРОНИЧЕСКОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВИТЫ ПРОТИВ**

- 1) столбняка
- 2) гепатита В
- 3) менингококковой инфекции
- 4) дифтерии

### **ПАЦИЕНТА С АНГИНОЙ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В \_\_\_\_\_ ОТДЕЛЕНИЕ**

- 1) инфекционное
- 2) оториноларингологическое
- 3) терапевтическое
- 4) хирургическое

### **ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ДОЛЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПАТРОНАЖНОЙ НА ДОЛЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ КАБИНЕТА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ДАННОГО СПЕЦИАЛИСТА НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА**

- 1) первичную специализацию по лучевой диагностике
- 2) профессиональную переподготовку по лучевой диагностике
- 3) профессиональную переподготовку по специальности «Сестринское дело в педиатрии»
- 4) цикл повышения квалификации «Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия»

### **ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ТЕЛА ДЛЯ ПОСТРАДАВШЕГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТРАВМУ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) полусидя с наклоном в поврежденную сторону
- 2) лежа на спине с приподнятыми ногами
- 3) лежа на менее травмированном боку
- 4) лежа на боку с приведенными к туловищу ногами

### **ПРИ ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТОМ В СТАДИИ ГНЕВА НЕОБХОДИМО**

- 1) дать седативное средство

- 2) направить пациента к психиатру
- 3) указать на недопустимость агрессивных реакций
- 4) принять гнев пациента без ответного гнева и осуждения

### **К ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ (I ГРУППА) ОТНОСЯТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

- 1) имеющих нарушения состояния здоровья постоянного характера (хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации)
- 2) входящих в группы риска по возникновению заболеваний (патологических состояний)
- 3) без нарушений состояния здоровья и физического развития
- 4) имеющих врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или временного характера

### **В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ВЗРОСЛЫМ ПРОВОДЯТ**

- 1) флюорографию легких или рентгенографию органов грудной клетки (легких)
- 2) исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии
- 3) иммунодиагностику с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении
- 4) компьютерную томографию

### **ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кодирование
- 2) унификация
- 3) классификация
- 4) стратификация

### **В СЛУЧАЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТИНЪЕКЦИОННОГО ИНФИЛЬТРАТА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ИНФОРМИРОВАТЬ**

- 1) врача и сделать запись в журнал регистрации постинъекционных осложнений
- 2) старшую медицинскую сестру и обработать инфильтрат раствором йода
- 3) врача-хирурга и направить пациента на УВЧ-терапию
- 4) родственников пациента и отменить последующие инъекции

### **ЗА ТРИ ДНЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ**

- 1) гречневую кашу, помидоры, гранаты
- 2) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб
- 3) яйца, белый хлеб, сладости
- 4) мясо, рыбу, консервы



## **ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРИ РОЖИСТОМ ВОСПАЛЕНИИ**

- 1) разлитое покраснение кожи
- 2) ограниченный инфильтрат кожи
- 3) подергивание мышц
- 4) гиперемия кожи с четкими границами

## **РАЗВИТИЕ АБСОЛЮТНОЙ ИНСУЛИНОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ТИПА 1 СВЯЗАНО С**

- 1) аутоиммунной деструкцией В-клеток
- 2) резистентностью инсулинозависимых тканей
- 3) снижением массы тела
- 4) панкреатэктомией

## **АУСКУЛЬТАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ**

- 1) влажные хрипы
- 2) шум трения плевры
- 3) сухие свистящие хрипы
- 4) крепитация

## **ПРИ ОСМОТРЕ ПАЦИЕНТА УСТАНОВЛЕНО: СОПОР, ЛЕЖИТНА БОКУ С ЗАПРОКИНУТОЙ ГОЛОВОЙ, НОГИ ПОДТЯНУТЫ К ЖИВОТУ, РИГИДНОСТЬ МЫШЦ ЗАТЫЛКА, СИМПТОМ КЕРНИГА С ОБЕИХ СТОРОН. УКАЖИТЕ СИНДРОМ**

- 1) гиперкинетический
- 2) общемозговой
- 3) менингеальный
- 4) коматозный

## **ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА С НЕОСЛОЖНЕННОЙ АГ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) коронароангиографии
- 2) суточного мониторирования ЭКГ
- 3) ЭХО-КГ
- 4) сцинтиграфии миокарда

## **ДИЕТА ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) больше белков и меньше витаминов
- 2) больше жиров и меньше углеводов
- 3) больше витаминов и меньше жиров
- 4) больше углеводов и меньше белков

## **ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО В ПОЗЕ «РУЖЕЙНОГО КУРКА» НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) аэроотите
- 2) отосклерозе
- 3) менингите
- 4) лабиринтите

**МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОКАЗАНО, ЕСЛИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ ОСЛОЖНЯЕТСЯ**

- 1) острым коронарным синдромом
- 2) нарушением ритма сердца
- 3) ишемическим инсультом
- 4) расслаивающей аневризмой аорты

**К ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ СЛУЧАЙ**

- 1) инфекции, вызванной вирусом гепатита А, через 2 месяца после выписки из стационара
- 2) инфекции, вызванной вирусом гепатита В через 2 месяца после гемотрансфузии
- 3) норовирусной инфекции, манифестировавшей у ребёнка через 3 часа после госпитализации
- 4) бешенства у госпитализированного пациента

**В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЗВЕНЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ НА**

- 1) сцинтиграфию миокарда
- 2) СМАД
- 3) ЭКГ
- 4) эхокардиографию

**ЕДИНСТВЕННЫМ МАРКЕРОМ, ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ У ЗДОРОВЫХ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ ГЕПАТИТА В, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) анти-HAVIg M
- 2) анти-HBсog-суммарный
- 3) HBS-Ag
- 4) анти-HAVIg G

**СПРАВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ФОРМА №070/У), ВЫДАВАЕМАЯ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЗАВЕРЯЕТСЯ ПОДПИСЬЮ**

- 1) главного врача
- 2) заместителя главного врача по организационно-методической работе
- 3) лечащего врача
- 4) председателя врачебной комиссии

**ВЕДУЩИМ ПУТЁМ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) парентеральный
- 2) воздушно-капельный
- 3) пищевой
- 4) трансмиссивный

**ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ \_\_\_\_\_ ПРОБЫ**

- 1) ортотолуидиновой
- 2) азопирамовой
- 3) озоновой
- 4) бензидиновой

**МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ, ИМЕЮЩЕЙ ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ», ОТКАЗАНО В ЗАНЯТИИ ДОЛЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО СТАТИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ**

- 1) профессиональной переподготовки по специальности «Медицинская статистика»
- 2) базового образования, соответствующего должности медицинского статистика
- 3) необходимого стажа работы
- 4) документов о повышении квалификации по специальности «Медицинская статистика»

**ФИБРОЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ (ФГДС) МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ НА \_\_\_\_\_ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

**К ПРИЗНАКУ, НЕ ХАРАКТЕРНОМУ ДЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ОТНОСЯТ**

- 1) гиперпродукцию вязкой прозрачной мокроты
- 2) рассеянные непостоянные сухие свистящие хрипы
- 3) жесткое дыхание
- 4) повышение хлоридов в поте и моче

**НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) биохимический анализ крови
- 2) общий анализ крови
- 3) общий анализ мочи
- 4) копрограмма

**У ПАЦИЕНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ НАБЛЮДАЕТСЯ**

- 1) саливация
- 2) гипергидроз
- 3) обезвоживание
- 4) мышечный гипертонус

**КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ТРЕМОРА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА**

- 1) постуральный
- 2) кинетический
- 3) покоя
- 4) интенционный

**ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОЙ ДИСКИНЕЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бронхография
- 2) рентгенография грудной клетки
- 3) фибробронхоскопия
- 4) спирография

**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У НОВОРОЖДЕННОГО ПРЯМОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ**

- 1) гемолитическую болезнь новорожденных
- 2) лактазную недостаточность
- 3) муковисцидоз
- 4) вирусные гепатиты

**КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕ СЛЕДУЕТ ПРЕРЫВАТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА (СЕК)**

- 1) 20
- 2) 35
- 3) 15
- 4) 10

**ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНАЯ СЫПЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- 1) менингококковой инфекции
- 2) стафилококковой инфекции
- 3) ветряной оспы
- 4) кори

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ**

- 1) клетчатку
- 2) железо
- 3) углеводы
- 4) белки

**УСЛОВИЯ ПОСТАНОВКИ ПОСЛАБЛЯЮЩЕЙ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ**

- 1) масло вазелиновое, эффект ожидается через 8 - 10 часов
- 2) масло растительное, эффект ожидается через 30 - 40 минут
- 3) масло касторовое, эффект ожидается через 10 - 15 минут
- 4) масло оливковое, эффект ожидается через 2 - 3 часа

## **МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) физиотерапевтический
- 2) санаторно-курортный
- 3) хирургический
- 4) консервативный

## **ПРИ РАНЕНИИ ВЕН ШЕИ НЕОБХОДИМО**

- 1) применить пальцевое прижатие сосуда
- 2) затампонировать рану подручными средствами
- 3) использовать кровоостанавливающий зажим
- 4) наложить тугую давящую повязку с противоупором со здоровой стороны

## **К ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ СЛУЧАЙ**

- 1) норовирусной инфекции, манифестировавшей у ребёнка через 3 часа после госпитализации
- 2) инфекции, вызванной вирусом гепатита А, через 2 месяца после выписки из стационара
- 3) инфекции, вызванной вирусом гепатита В после гемотрансфузии
- 4) бешенства у госпитализированного пациента

## **АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ**

- 1) повышает ригидность мышц шеи
- 2) углубляет нарушение сознания
- 3) вызывает анизокорию
- 4) способствует появлению очаговых симптомов

## **ФЕНОМЕН «ВОЗОБНОВЛЯЮЩЕГОСЯ ТРЕМОРА» ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- 1) дистонического тремора
- 2) тремора при атипичном паркинсонизме
- 3) эссенциального тремора
- 4) болезни Паркинсона

## **ОТХОДЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, РАБОТАЮЩИХ С МИКРООРГАНИЗМАМИ 3-4 ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ**

- 1) Б
- 2) В
- 3) Г
- 4) Д

## **К ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ВЕЛИЧИНАМ, ПОЛУЧАЕМЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧАСТЬЮ И ЦЕЛЫМ, ОТНОСЯТ**

- 1) показатели абсолютного и относительного прироста
- 2) интенсивные коэффициенты

- 3) экстенсивные коэффициенты
- 4) показатели соотношения

### **СБОР, ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ КЛАССА «Г» ПОСЛЕ ДЕЗАКТИВАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ**

- 1) в специально отведенном вспомогательном помещении
- 2) в изолированном помещении медицинского корпуса, совместно с отходами класса «А»
- 3) на открытой площадке
- 4) совместно с отходами класса «Б»

### **БОЛЬНЫМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ**

- 1) инфекциониста
- 2) аллерголога
- 3) хирурга
- 4) терапевта

### **МНОГОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТХОДОВ КЛАССА Б ПОДЛЕЖАТ МЫТЬЮ И ДЕЗИНФЕКЦИИ**

- 1) еженедельно
- 2) ежедневно
- 3) по мере загрязнения
- 4) после каждого опорожнения

### **КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нормализация показателей периферической крови
- 2) срок 8-10 дней после нормализации температуры
- 3) срок 3-4 дня после нормализации температуры
- 4) рассасывание пневмонической инфильтрации

### **ПРИ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ НА РЕНТГЕНОГРАММАХ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНА**

- 1) инфильтрация в форме треугольника с верхушкой, направленной к корню
- 2) интенсивная гомогенная долевая инфильтрация
- 3) прикорневая инфильтрация с полициклическим контуром
- 4) инфильтрация с ранним формированием полостей распада

### **НАПРАВЛЕНИЕ НА АНАЛИЗ ПО ФОРМЕ 200/У МОЖЕТ БЫТЬ ОФОРМЛЕНО**

- 1) медицинской сестрой отделения доврачебного приема
- 2) медицинским регистратором
- 3) медицинской сестрой терапевтического отделения
- 4) медицинской сестрой отделения профилактики

### **СТЕНОЗИРУЮЩИЙ ЛАРИНГОТРАХЕИТ ЧАЩЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ У ДЕТЕЙ С**

- 1) анемией
- 2) гипотрофией
- 3) рахитом
- 4) аллергическим диатезом

**МАТЕРИАЛЫ, КОНТАКТИРОВАВШИЕ С БОЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯТ К ОТХОДАМ КЛАССА**

- 1) Б
- 2) В
- 3) Д
- 4) Г

**ДНК ИМЕЕТ ВИРУС ГЕПАТИТА**

- 1) HCV
- 2) HDV
- 3) HAV
- 4) HBV

**СТОРОНОЙ ОБЩЕНИЯ, ИЗУЧАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОММУНИКАТОРОВ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) перцептивная
- 2) интерактивная
- 3) аффективная
- 4) коммуникативная

**ТЕРМИН «ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ» ОТРАЖАЕТ**

- 1) условия, в которых произошло инфицирование
- 2) выраженность изменений на рентгенограмме
- 3) отсутствие необходимости в госпитализации больного
- 4) тяжесть состояния больного

**ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НАЗНАЧАЕТСЯ**

- 1) приказом главного врача медицинской организации
- 2) распоряжением главного бухгалтера
- 3) служебной запиской главной медицинской сестры
- 4) распоряжением заведующего отделением

**ФАКТОРОМ РИСКА, ПОВЫШАЮЩИМ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА \_\_\_\_\_ ММОЛЬ/Л**

- 1) 5
- 2) 3

3) 4,5

4) 4

### **СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ**

1) обтереть кожу 40% спиртовым раствором

2) дать жаропонижающие средства

3) напоить тёплым чаем, согреть

4) поставить клизму с холодной водой

### **СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ ПОКАЗЫВАЕТ, СКОЛЬКО, В СРЕДНЕМ, ДЕТЕЙ**

1) реально родила каждая женщина популяции на протяжении всей своей жизни

2) родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода своей жизни при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости исследуемого года

3) родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода своей жизни

4) может родить каждая женщина, исходя из особенностей своего здоровья

### **КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 1 ВОЗНИКАЮТ НА СТАДИИ**

1) инициации иммунных процессов

2) полной деструкции  $\beta$ -клеток

3) 90% деструкции  $\beta$ -клеток

4) прогрессивного снижения 1 фазы секреции инсулина

### **ТЕКУЩУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ А В ПАЛАТАХ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ \_\_\_\_\_ РАЗ(А) В \_\_\_\_\_**

1) 1; день

2) 2; день

3) 1; час

4) 1; 2 дня

### **АУТОИММУННАЯ ДЕСТРУКЦИЯ $\beta$ -КЛЕТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ**

1) сахарного диабета 2 типа

2) сахарного диабета 1 типа

3) генетических форм сахарного диабета (mody и др.)

4) гестационного сахарного диабета

### **КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ И СРОКОВ ГОДНОСТИ (ХРАНЕНИЯ) ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ХОЛОДИЛЬНИКАХ ОТДЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ**

1) через день

2) ежемесячно

3) еженедельно

4) ежедневно



**КРАТКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  
ПРОВОДИТСЯ НА \_\_\_\_\_ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ**

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 3

**ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ НА ПРЯМОЙ КИШКЕ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) очистительные клизмы накануне и в день операции
- 2) легкий завтрак
- 3) промывание желудка
- 4) очистительная клизма накануне операции

**НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ  
СЖИМАЮЩЕЙ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ**

- 1) кордиамин внутрь
- 2) нитроглицерин под язык
- 3) мезатон в/в
- 4) папаверин в/м

**ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН К НОЧНЫМ, СВЕРХУРОЧНЫМ, РАБОТАМ В  
ВЫХОДНЫЕ, НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, НАПРАВЛЕНИЕ В КОМАНДИРОВКИ**

- 1) разрешается только с согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
- 2) разрешается только с согласия беременных женщин
- 3) запрещается
- 4) разрешается только в связи с производственной необходимостью

**ПРИЧИНОЙ ПИЩЕВОДНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) высокая вирусная нагрузка
- 2) желтуха
- 3) снижение гемоглобина крови
- 4) повышение давления в портальной вене

**ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ  
КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) желательной
- 2) обязательной
- 3) добровольной
- 4) рекомендательной

**В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ УШИБАХ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) иммобилизация места ушиба
- 2) растирание обезболивающими мазями

- 3) тугая повязка на место ушиба
- 4) холод к месту ушиба

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДРОМАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ МЕНИНГИТЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) до 3-х недель
- 2) несколько часов
- 3) до 2-3-х суток
- 4) около одного часа

**В НАЗРЕВАЮЩЕЙ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕЖДЕ ВСЕГО**

- 1) касаться партнера рукой в процессе диалога
- 2) не избегать взгляда партнера
- 3) дать пациенту (коллеге) выговориться
- 4) подчеркнуть общность взглядов

**ДЛЯ ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОЧИ ТРЕБУЕТСЯ**

- 1) 100-200 мл утренней свежесобранной мочи
- 2) 50 мл средней порции утренней мочи
- 3) 2-3 мл средней порции дневной мочи
- 4) 100-200 мл последней порции вечерней мочи

**ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТОВ ИЗ ВТОРОЙ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ В ТРЕТЬЮ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О(ОБ)**

- 1) низкой эффективности диспансерного наблюдения
- 2) индексе здоровья населения
- 3) своевременности охвата диспансерным наблюдением больных
- 4) полноту охвата диспансерным наблюдением

**ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ РАССЧИТЫВАЮТ КАК \_\_\_\_\_ ЧИСЛА ПРИБЫВШИХ И ВЫБЫВШИХ ГРАЖДАН**

- 1) отношение
- 2) сумму
- 3) произведение
- 4) разность

**ПРЕКУРСОРОМ ИЗ СПИСКА IV ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) мескалин
- 2) альфапродин
- 3) перманганат калия
- 4) бензилморфин

**РАНАМИ, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫМИ ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ, СЧИТАЮТСЯ**

- 1) укушенные (неглубокие)

- 2) колотые
- 3) поверхностные скальпированные
- 4) резаные

**ПОНЯТИЕ «ЗДОРОВЬЕ» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- 1) отсутствие физических и психических нарушений
- 2) отсутствие заболеваний
- 3) отсутствие хронических заболеваний и функциональных нарушений
- 4) полное физическое, духовное и социальное благополучие

**СВЕДЕНИЯ О РАСХОЖДЕНИЯХ В БАЛАНСЕ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИИ ДАННЫХ БАЛАНСА РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ДОВОДЯТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В \_\_\_\_\_-ДНЕВНЫЙ СРОК ПОСЛЕ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ**

- 1) 14
- 2) 7
- 3) 3
- 4) 10

**ГРАЖДАН, У КОТОРЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕНО ОЖИРЕНИЕ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) IIIб
- 2) I
- 3) IIIа
- 4) II

**ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВПОКАЗАНЫ**

- 1) неселективные  $\beta$ -адреноблокаторы
- 2) антибиотики
- 3) метилксантины
- 4) симпатомиметики

**РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ АВТОКЛАВИРОВАНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ \_\_\_\_\_ $^{\circ}$ C СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 132; 20
- 2) 120; 45
- 3) 160; 120
- 4) 180; 60

**ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ**

- 1) нормализацию веса тела
- 2) восстановление моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря
- 3) восстановление свойств желчи

4) улучшение аппетита

**ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НАТОЩАК ПРОВОДИТСЯ ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 1 РАЗ В \_\_\_\_\_ ГОД(А)**

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 3

**СПИД-ИНДИКАТОРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПНЕВМОНИЯ, ВЫЗВАННАЯ**

- 1) Haemophilus influenzae
- 2) Streptococcus pneumoniae
- 3) Pneumocystis jirovecii
- 4) Klebsiella pneumoniae

**ПРИ ОСТРОМ СТЕНОЗИРУЮЩЕМ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) сухой кашель ночью
- 2) продуктивный кашель с большим количеством мокроты
- 3) удлинение выдоха
- 4) грубый «лающий кашель» с изменением голоса

**В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА У НОВОРОЖДЕННЫХ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ СИМПТОМ**

- 1) диареи
- 2) геморрагический
- 3) рвоты
- 4) анорексии

**НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СПИСОК II ПЕРЕЧНЯ, В ВИДЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ**

- 1) 107/у-НП
- 2) 148-1/у-88
- 3) 148/у
- 4) 117/у-НП

**В НОРМЕ В МОЧЕ ПРИСУТСТВУЮТ**

- 1) белок
- 2) соли
- 3) кетоновые тела
- 4) глюкоза

**ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ ЛАРИНГИТЕ (КРУПЕ) У ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) антибиотики

- 2) глюкокортикостероиды
- 3) ксантины
- 4) антигистаминные

### **ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С ТОГО, ЧТО**

- 1) вызвать сотрудников полиции
- 2) вызвать скорую медицинскую помощь
- 3) позвать помощников
- 4) убедиться в отсутствии опасности на месте происшествия

### **В ОБЩЕНИИ НА УРОВНЕ «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА» НЕДОПУСТИМЫ**

- 1) грубость и неуважительное отношение
- 2) вежливость и уважительное отношение
- 3) внимательность и отзывчивость
- 4) тактичность и корректность

### **НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫМ ТЕМПОМ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ**

- 1) хроническом вирусном гепатите В
- 2) аутоиммунном (люпоидном) гепатите
- 3) алкогольной интоксикации
- 4) хроническом вирусном гепатите С

### **В СЛУЧАЕ НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ РАБОТНИКА ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДИТЬСЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ВОЗМЕСТИТЬ РАБОТНИКУ**

- 1) компенсацию в пределах минимальной заработной платы, установленной в РФ
- 2) компенсацию в размере не менее прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ
- 3) моральный ущерб
- 4) неполученный им заработок

### **ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ СВЕДЕНИЙ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ ВЕДЕТСЯ В ФОРМЕ**

- 1) регистра бухгалтерского учета
- 2) протокола
- 3) регистра налогового учета
- 4) единого регистра

### **НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ РАЗДАЧУ ПИЩИ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТАМ СОГЛАСНО ДИЕТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- 1) старшая медсестра отделения
- 2) лечащий врач
- 3) палатная медсестра
- 4) буфетчица

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО АДЕНОИДИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ангина
- 2) эпиглоттит
- 3) острый средний отит
- 4) острый фронтит

**ОСЛОЖНЕНИЕМ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) инфекционно-токсический шок
- 2) отек головного мозга
- 3) гиперпродукция ликвора
- 4) тромбогеморрагический синдром

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВТОРУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 6
- 2) 4,5
- 3) 12
- 4) 14

**ПРИ ГИПЕРСЕКРЕТОРНОМ ГАСТРИТЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) натриево-сульфатно-гидрокарбонатные
- 2) натриево-хлоридные
- 3) натриево-гидрокарбонатные
- 4) натриево-хлоридно-гидрокарбонатные

**К МЕТОДУ ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ ОТНОСИТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ УРОВНЯ**

- 1) общего белка
- 2) амилазы
- 3) гематокрита
- 4) мочевины

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОПУСКА ЛИЦА К РАБОТЕ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ (В ГОДАХ)**

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 7

**К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ МЕНИНГЕАЛЬНОМУ СИМПТОМУ ОТНОСИТСЯ**

- 1) нижний рефлекс Ландау
- 2) гипотония шейных мышц
- 3) западение родничка

4) ригидность мышц затылка

**ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА СРЕДНЕТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) ОФВ1 от 60% до 80% от должных величин
- 2) вариабельностью ПСВ < 20%
- 3) ночными приступами удушья реже 1 раза в неделю
- 4) ежедневными ночными приступами удушья

**В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СБОРОМ, ВРЕМЕННЫМ ХРАНЕНИЕМ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ВИЗУАЛЬНАЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В**

- 1) квартал
- 2) полгода
- 3) неделю
- 4) месяц

**ИЗ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СПИСОК IV ВКЛЮЧЕНЫ ПРЕКУРСОРЫ, ОБОРОТ КОТОРЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \_\_\_\_\_ И В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ \_\_\_\_\_**

- 1) обязателен; допускается исключение некоторых мер контроля
- 2) запрещен; запретительные процедуры
- 3) разрешен; специальные разрешительные процедуры
- 4) ограничен; меры контроля

**ДЛЯ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА ХАРАКТЕРНО**

- 1) гипертермия
- 2) влажный кашель
- 3) «лающий» кашель
- 4) экспираторная одышка

**ПРИЗНАКОМ ОТЕКА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) головная боль
- 2) набухшие сосуды
- 3) судороги, рвотные движения
- 4) клочущее дыхание

**ПОКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

- 1) диспансера
- 2) родильного дома
- 3) стационара
- 4) поликлиники

**ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО**

**ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ, СОСТАВА И РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ, СВЯЗАННОЕ С ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) статикой
- 2) миграцией
- 3) естественным приростом
- 4) воспроизводством

**ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лихорадка
- 2) кровохарканье
- 3) отек Квинке
- 4) экспираторная одышка

**МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ**

- 1) увольняют
- 2) направляют на принудительное обследование
- 3) штрафуют
- 4) не допускают к работе

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕМ СРЕДСТВЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) фактический срок годности моющего раствора в сутках
- 2) объем раствора дезинфицирующего средства
- 3) количество процедур обеззараживания в расчетном периоде
- 4) норму расхода дезинфицирующего раствора на изделие/комплект

**НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СПИСОК II ПЕРЕЧНЯ, ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ**

- 1) 117/у-НП
- 2) 107/у-НП
- 3) 148/у
- 4) 148-1/у-88

**ЕСЛИ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ ДЫХАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ, ТО НЕОБХОДИМО ПЛОТНО ПРИЖАТЬ МАСКУ К ЛИЦУ ПОСТРАДАВШЕГО, ТОГДА**

- 1) выдох пострадавшего производится без отрыва маски от его лица
- 2) на время выдоха пострадавшего необходимо отодвинуть маску от его лица
- 3) на время вдоха пострадавшего необходимо отодвинуть маску от его лица
- 4) маску необходимо отодвигать каждый четный выдох

**СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА ВНОСЯТСЯ В**



- 1) карту обратившегося за антирабической помощью (форма № 045/у)
- 2) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку (форма № 058/у)
- 3) карту профилактических прививок (форма № 063/у)
- 4) журнал регистрации микробиологических и паразитологических исследований (форма № 252/у)

### **ЦЕЛЮ ПРИДАНИЯ ПОСТРАДАВШЕМУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЕГО ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) предупреждение или снижение риска самопроизвольного перемещения тела пострадавшего
- 2) обеспечение безопасности как пострадавшего, так и оказывающего ему первую помощь
- 3) повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь
- 4) придание удобного положения, обеспечивающего ему комфорт, уменьшающего степень его страданий и не усугубляющего нарушения жизненно важных функций

### **ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- 1) пневмонии
- 2) простого бронхита
- 3) крупа
- 4) бронхиальной астмы

### **К ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЯЖЕСТИ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ**

- 1) кашель
- 2) локализованные хрипы
- 3) температуру
- 4) степень дыхательной недостаточности

### **В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПОРЯДКОМ И СРОКАМИ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПРИЗНАЕТСЯ ПРОЙДЕННЫМ ПРИ УСЛОВИИ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ % ОБЩЕГО ОБЪЕМА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ**

- 1) 30
- 2) 50
- 3) 60
- 4) 70

### **ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОТХОДОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего обезвреживания
- 2) обработку отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов
- 3) дезинфекцию отходов в целях устранения их эпидемиологической опасности

4) содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения

**К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА Е НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОТНОСЯТ**

- 1) обеззараживание воды
- 2) изоляцию больных из очага
- 3) вакцинопрофилактику
- 4) режимно-ограничительные мероприятия

**ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ**

- 1) капусту
- 2) макаронные изделия
- 3) обезжиренный творог
- 4) кабачки

**НАИБОЛЬШУЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕДСТАВЛЯЮТ**

- 1) больные острым гепатитом В
- 2) хронические вирусносители при наличии анти-НВе
- 3) больные хроническим гепатитом В при наличии анти-НВе
- 4) больные хроническим гепатитом В при наличии НВеАg

**ЛИЦО, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) страхователем
- 2) перестрахованным
- 3) застрахованным
- 4) страховщиком

**ПРИ МЕНИНГИТЕ ПАРОТИТНОЙ ЭТИОЛОГИИ В ЛИКВОРЕ ПРЕОБЛАДАЮТ**

- 1) эозинофилы
- 2) моноциты
- 3) эритроциты
- 4) лимфоциты

**ДИЕТА ПРИ ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) ограничение жидкости и соли
- 2) увеличение потребления жиров и минералов
- 3) увеличение потребления жидкости и белков
- 4) ограничение жиров и углеводов

**СЫПЬ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ КОРИ И КРАСНУХИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ПОСЛЕ 7 ДНЯ НА**

- 1) ладонях и подошвах

- 2) груди и спине
- 3) носогубном треугольнике
- 4) волосистой части головы

### **ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО ХОБЛ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ**

- 1) непрерывно
- 2) в период обострения заболевания
- 3) в период обострения заболевания и в виде профилактических курсов весной и осенью
- 4) в виде профилактических курсов весной и осенью

### **СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МИКРОБНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БАНАЛЬНЫХ АНГИН ОСНОВНАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ**

- 1) гемофильной палочке
- 2) аденовирусам
- 3) бета-гемолитическому стрептококку группы А
- 4) стафилококкам

### **К КЛАССУ "В" ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные
- 2) диспетчерские, комнаты персонала, комнаты отдыха пациентов после процедур
- 3) шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений
- 4) палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных

### **СТУДЕНТ 3 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», УСПЕШНО СДАВШИЙ ЭКЗАМЕН ПО ДОПУСКУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МОЖЕТ РАБОТАТЬ В ДОЛЖНОСТИ**

- 1) медицинской сестры по массажу
- 2) медицинской сестры участковой
- 3) операционной медицинской сестры
- 4) медицинской статистика

### **ВЕРОЯТНЫМ ПРИЗНАКОМ ДИФТЕРИИ ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛАРИНГИТ С**

- 1) осиплостью голоса и грубым лающим кашлем
- 2) афонией при нормальной или субфебрильной температуре тела
- 3) конъюнктивитом и пятнисто-папулезной сыпью
- 4) высокой температурой и интоксикацией

### **ОБЩЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ КАК**

- 1) осознаваемый психологический или физиологический дефицит чего-либо, отражаемый в восприятии человека
- 2) восприятие внешних признаков человека, соотнесение их с его личностными характеристиками

- 3) процесс прогнозирования поступков человека на основе особенностей его личности
- 4) сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности

### **ПРЕРЫВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- 1) использованием механических средств контрацепции
- 2) обследованием доноров перед каждой дачей крови
- 3) соблюдением режима стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения
- 4) обеззараживанием мочи, кала, рвотных масс инфекционного больного

### **О ПРОИСШЕДШЕМ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ РАБОТНИК ОБЯЗАН СООБЩИТЬ**

- 1) в государственную инспекцию труда
- 2) работодателю
- 3) в территориальный орган исполнительной власти
- 4) в прокуратуру

### **ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 40 ЛЕТ И СТАРШЕ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В (ГОДАХ)**

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 1

### **ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ БРОНХИТОМ ЧАЩЕ ВСЕГО МОЖНО ВЫСЛУШАТЬ**

- 1) шум трения плевры
- 2) крепитацию
- 3) влажные хрипы
- 4) сухие хрипы

### **ПАЦИЕНТ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В**

- 1) палату интенсивной терапии
- 2) дневной стационар
- 3) хирургическое отделение
- 4) профилакторий

### **ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КАКОГО-ЛИБО ЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПРИЗНАКА ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) поправочный коэффициент
- 2) интенсивный показатель
- 3) среднюю арифметическую величину
- 4) показатель соотношения

**ПРИ БРОНХИТЕ, ВЫЗВАННОМ МИКОПЛАЗМОЙ, РЕБЕНКУ В КАЧЕСТВЕ ТЕРАПИИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ НАЗНАЧАЕТСЯ ПРЕПАРАТ ИЗ**

- 1) аминопенициллинов
- 2) аминогликозидов
- 3) цефалоспоринов 2 поколения
- 4) макролидов

**ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ГЛУБОКОМ ОЖОГЕ МЕСТО ПОРАЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО**

- 1) обработать пероксидом водорода, вызвать скорую медицинскую помощь
- 2) накрыть влажной салфеткой, вызвать скорую медицинскую помощь, дать пострадавшему обезболивающее
- 3) наложить сухую асептическую повязку, вызвать скорую медицинскую помощь
- 4) охладить, обработать пантенолом, вызвать скорую медицинскую помощь

**НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) флюорография легких
- 2) маммография
- 3) осмотр врачом-неврологом
- 4) анкетирование

**К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ**

- 1) аневризма межпредсердной перегородки
- 2) сеть Хиари
- 3) открытое овальное окно
- 4) открытый артериальный проток

**СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ**

- 1) желание вскрыть недостатки и оказать помощь в их преодолении
- 2) строгость к нарушителям порядка
- 3) неотвратимость наказания нарушителя трудовой дисциплины
- 4) намерение предать публичной оценке выявленные недостатки

**С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ ПО СТАНДАРТУ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ**

- 1) каждые 3 часа
- 2) чем чаще – тем лучше
- 3) каждый час
- 4) каждые 2 часа

**ПОКАЗАТЕЛЕМ, НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНО ОТРАЖАЮЩИМ СТЕПЕНЬ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) постпрандиальная гликемия
- 2) глюкозурия
- 3) гликемия натощак
- 4) гликозилированный гемоглобин

### **ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВОМ ИЗ СПИСКА III ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) псилоцин
- 2) кодоксим
- 3) фенobarбитал
- 4) метопон

### **ОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ, В КОТОРЫХ МИКРООРГАНИЗМЫ, ВЫЗВАВШИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННУЮ ИНФЕКЦИЮ, ПРИСУТСТВОВАЛИ В ОПЕРАЦИОННОМ ПОЛЕ ДО НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ, ОТНОСЯТ К КАТЕГОРИИ**

- 1) чистых
- 2) грязных
- 3) загрязненных
- 4) условно чистых

### **ПРОЯВЛЕНИЕ СУБОРДИНАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ОЗНАЧАЕТ**

- 1) сохранение сведений о пациенте
- 2) выполнение указаний старшего по должности и уважительное руководство деятельностью младшего по должности
- 3) четкое выполнение медицинской сестрой своих профессиональных обязанностей
- 4) организацию условий, способствующих выздоровлению пациента

### **АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИИ «ШКОЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ» МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ**

- 1) лекцию о правилах питания при бронхиальной астме
- 2) рекомендации по фитотерапии заболевания
- 3) обучение технике применения дозированных ингаляторов, спейсера
- 4) просмотр видеофильма по профилактике обострений бронхиальной астмы

### **ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ С КРОВОТЕЧЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) добровольной
- 2) желательной
- 3) обязательной
- 4) рекомендательной

### **УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) использование отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки
- 2) изоляцию отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах

- 3) содержание отходов в объектах размещения отходов
- 4) хранение и захоронение отходов

**ПОД СКРИНИНГОМ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА И ПРЯМОЙ КИШКИ ПОНИМАЮТ**

- 1) исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом
- 2) ультразвуковое исследование органов брюшной полости
- 3) ректороманоскопию
- 4) колоноскопию

**ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ФАКТ ОТСУТСТВИЯ У МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ, ТО РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАН**

- 1) вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания
- 2) отстранить медицинского работника от работы
- 3) информировать учредителя медицинской организации
- 4) сообщить в Росздравнадзор

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ УЧИТЫВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО НЕСНИЖАЕМОГО ЗАПАСА В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ %ОТ ГОДОВОГО РАСХОДА**

- 1) 20
- 2) 25
- 3) 10
- 4) 30

**НЕОБРАТИМЫЙ ЭТАП УМИРАНИЯ ОРГАНИЗМА**

- 1) агония
- 2) предагония
- 3) клиническая смерть
- 4) биологическая смерть

**УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ СО СПИДОМ ПРИ ТОШНОТЕ И РВОТЕ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) кормление по часам
- 2) кормление по требованию
- 3) голод
- 4) частое кормление малыми порциями

**ПУЗЫРЬ СО ЛЬДОМ ПРИКЛАДЫВАЮТ К ГОЛОВЕ МАКСИМАЛЬНО НА**

- 1) 30 минут
- 2) 15 минут
- 3) 10 минут
- 4) 2 часа

**ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К СБОРУ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРИ**

### **ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОЛОСКАНИЕ РТА**

- 1) раствором гидрокарбоната натрия
- 2) спиртом
- 3) кипяченой водой
- 4) раствором фурацилина

### **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ ДОЛЖНА БЫТЬ (ВРЕМЯ В МИНУТАХ)**

- 1) 25 - 30
- 2) 15
- 3) 20 – 25
- 4) 10

### **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Г ОТНОСЯТСЯ**

- 1) санитарные комнаты, помещения сортировки и временного хранения грязного белья
- 2) залы лечебной физкультуры
- 3) стерилизационные при операционных
- 4) операционные, послеоперационные палаты

### **ПРАВИЛА РАСЧЕТА ДОЗЫ ИНСУЛИНА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ**

- 1) 40-50 ЕД внутривенно на растворе глюкозы 5%
- 2) 0,22-0,3 ЕД на кг веса больного на изотоническом растворе натрия хлорида
- 3) 20-40 ЕД на кг веса больного на изотоническом растворе натрия хлорида
- 4) 40-50 ЕД на кг веса больного на изотоническом растворе натрия хлорида

### **ЛИХОРАДКА, ФАРИНГИТ, КОНЪЮНКТИВИТ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ АНГИНЫ**

- 1) герпетической
- 2) аденовирусной
- 3) коревой
- 4) скарлатинозной

### **ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ**

- 1) гречневую кашу
- 2) молоко
- 3) мясо
- 4) рыбу

### **КОСВЕННЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГИПЕРТРОФИЯ**

- 1) левого желудочка
- 2) правого желудочка
- 3) правого предсердия



4) левого предсердия

**ОБЩИЙ РАЗМЕР ВСЕХ УДЕРЖАНИЙ ПРИ КАЖДОЙ ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ (В ПРОЦЕНТАХ)**

- 1) 70
- 2) 30
- 3) 20
- 4) 50

**УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНОГО САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ**

- 1) сердечной недостаточности
- 2) диабетической нефропатии
- 3) цирроза
- 4) жирового гепатоза

**ВЫПУСКНИК МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА, УСПЕШНО ПРОШЕДШИЙ ПЕРВИЧНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ», МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К РАБОТЕ В ДОЛЖНОСТИ \_\_\_\_\_**

- 1) зубной техник
- 2) старший зубной техник
- 3) зубной врач
- 4) гигиенист стоматологический

**ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ТЕРАПИИ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) ингибиторы АПФ и бета-адреноблокаторы
- 2) диуретики и антагонисты кальция
- 3) бета-адреноблокаторы и препараты центрального действия
- 4) антагонисты рецепторов ангиотензина 2 и препараты центрального действия

**ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА**

- 1) узловая эритема
- 2) ногти в виде «часовых стекол», пальцы в виде «барабанных палочек»
- 3) лакированный язык
- 4) сосудистые звездочки

**ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЫСОКИЙ РИСК ИНФИЦИРОВАНИЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ ГЕПАТИТАМИ ВНЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАБЛЮДАЕТСЯ У**

- 1) клиентов парикмахерских салонов
- 2) работников организаций по утилизации отходов медицинского назначения
- 3) потребителей инъекционных наркотических средств
- 4) посетителей фитнес клубов

**ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ**

**НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ИЗМЕНЯЮТСЯ ИХ КОЛИЧЕСТВО И СОСТОЯНИЕ, ПОДЛЕЖАТ РЕГИСТРАЦИИ В(НА)**

- 1) бланках строгой отчетности лицами, которые расходуют наркотические и психотропные средства
- 2) учетной книге главной медицинской сестры
- 3) специальной компьютерной программе, разработанной сертифицированным производителем
- 4) специальном журнале лицами, на которых эта обязанность возложена приказом руководителя юридического лица

**ИСТОЧНИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИИ ПРИ БЕШЕНСТВЕ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ**

- 1) летучие мыши
- 2) клещи
- 3) домашние птицы
- 4) омары

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ НАЛОЖЕННОГО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА НА КОНЕЧНОСТИ ПОСТРАДАВШЕГО НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_\_ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА, \_\_\_\_ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА**

- 1) 3 часов; 1 часа
- 2) 2 часов; 1 часа
- 3) 1 часа; 0,5 часа
- 4) 1,5 часов; 1 часа

**ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ В КРОВИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ**

- 1) холестерина
- 2) калия
- 3) белка
- 4) амилазы

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА ОТ ПОВТОРНОГО ВВЕДЕНИЯ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ  $\beta$ -АДРЕНО МИМЕТИКОВ ЧЕРЕЗ 15-30 МИНУТ СЛЕДУЕТ ПРИСТУПИТЬ К ВНУТРИВЕННОМУ ВВЕДЕНИЮ**

- 1) преднизолона
- 2) папаверина
- 3) но-шпы
- 4) супрастина

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА - ЭТО**

- 1) реабилитация
- 2) реформация
- 3) транслокация

4) трансплантация

**ПОСТАНОВКА АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО  
\_\_\_\_\_ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

- 1) дезинфекции
- 2) предстерилизационной очистки
- 3) пастеризации
- 4) стерилизации

**БАЗОВЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) медицинская профилактика (профессиональная переподготовка)
- 2) сестринское дело (среднее профессиональное образование)
- 3) сестринское дело (бакалавриат)
- 4) стоматология профилактическая (среднее профессиональное образование)

**ДЛЯ СИНДРОМА ЖЕЛТУХИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ ХАРАКТЕРНЫМ  
ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ускорение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
- 2) гемолиз
- 3) повышения прямого билирубина
- 4) повышение непрямого билирубина

**ДИАГНОЗ «РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ БРОНХИТ» ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ**

- 1) повторных эпизодах обструктивного бронхита
- 2) приступах бронхиальной астмы 1-2 раза в неделю
- 3) обострениях хронического воспаления бронхов 2-3 и более раз в год на протяжении 2 и более лет подряд
- 4) повторных эпизодах острого бронхита 2-3 и более раз в год на фоне респираторных вирусных инфекций

**ПРОВЕТРИВАНИЕ ПАЛАТ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ**

- 1) 2 раза по 60 минут
- 2) 6 раз по 15 минут
- 3) 4 раза по 30 минут
- 4) 3 раза по 40 минут

**НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ II СТЕПЕНИ**

- 1) термоизолирующие повязки
- 2) сухие асептические повязки, при необходимости утеплить сверху ватой
- 3) обработка пораженного участка 70% спиртом
- 4) обработка пораженного участка растворами антисептиков

**КОНТЕЙНЕРЫ И ЛОТКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЭНДОСКОПОВ ДОЛЖНЫ**

### **ПОДВЕРГАТЬСЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ**

- 1) раз в неделю
- 2) раз в месяц
- 3) после окончания рабочего дня
- 4) после каждого использования

### **ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ ИЗ ИНФЕКЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОТНОСЯТ К КЛАССУ**

- 1) Д
- 2) В
- 3) Б
- 4) Г

### **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ВЫПОЛНЯЕТСЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДЛЯ**

- 1) доставки пострадавшего в медицинскую организацию
- 2) удаления пострадавшего с места происшествия
- 3) обеспечения более удобных условий для пострадавшего и людей, оказывающих помощь
- 4) обеспечения безопасных условий для оказания первой помощи

### **ПРИ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ГИПЕРПРОДУКЦИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА**

- 1) Е
- 2) А
- 3) М
- 4) G

### **ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ» СТАВИТСЯ ПРИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ (МЕС.)**

- 1) 3
- 2) 9
- 3) 1
- 4) 6

### **ДИАСКИНТЕСТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ**

- 1) во всех возрастных группах
- 2) только у взрослых
- 3) только у детей
- 4) только в группах риска

### **ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИДКОМ МЫЛЕ - КОЖНОМ АНТИСЕПТИКЕ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ЧЛЕНОВ ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ БРИГАДЫ ПЕРЕД ПЕРЕВЯЗКАМИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) количество операций
- 2) количество суток в расчетном периоде
- 3) среднее число операций в сутки

4) среднее число перевязок в год

**ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ  
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ**

- 1) после консультации фтизиатра
- 2) после идентификации возбудителя
- 3) сразу после постановки диагноза
- 4) после консультации инфекциониста

**СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ПРИ ОБЩЕНИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ  
СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)**

- 1) 400-550
- 2) 120-400
- 3) 45-120
- 4) 400-750

**АУТОИММУННЫЙ ГАСТРИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) гиперхлоргидрией
- 2) отсутствием антител к париетальным клеткам желудка
- 3) преимущественным поражением фундального отдела желудка
- 4) отсутствием гипргастринемии

**ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПИЩЕВОДА,  
ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ**

- 1) вечером - очистительная клизма
- 2) вечером - легкий ужин, утром - натощак
- 3) утром - сифонная клизма
- 4) вечером и утром - очистительная клизма

**ДЛЯ СБОРА МОЧИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПО МЕТОДУ ЗИМНИЦКОГО МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА ДОЛЖНА ПРИГОТОВИТЬ ЕМКОСТИ В КОЛИЧЕСТВЕ \_\_\_\_\_ ШТУК**

- 1) 4
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 10

**ОСВОЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ ЗАВЕРШАЕТСЯ**

- 1) итоговой аттестацией
- 2) итоговой государственной аттестацией
- 3) сертификационным экзаменом
- 4) аттестационным экзаменом

**ВЫПУСКНИЦА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА, ИМЕЮЩАЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО О  
ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», МОЖЕТ**

**ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЗАНЯТИЕ В ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ДОЛЖНОСТИ  
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ**

- 1) по физиотерапии
- 2) участковой
- 3) медико-социальной помощи
- 4) по реабилитации

**ОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ УТЕЧКОЙ СОДЕРЖИМОГО ИЗ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ОТНОСЯТ К КАТЕГОРИИ**

- 1) загрязненных
- 2) грязных
- 3) чистых
- 4) условно чистых

**ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ  
РАССЧИТЫВАЕТСЯ НА \_\_\_\_\_ РАБОТАЮЩИХ**

- 1) 10000
- 2) 10
- 3) 100
- 4) 1000

**НАЛИЧИЕ НА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ЩЕЛОЧНЫХ  
КОМПОНЕНТОВ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПОСТАНОВКИ \_\_\_\_\_  
ПРОБЫ**

- 1) азопирамовой
- 2) фенолфталеиновой
- 3) бензидиновой
- 4) амидопириновой

**ДЛЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ КОРИ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) бактериофаг
- 2) химическую вакцину
- 3) живую вакцину
- 4) анатоксин

**ЧЕТВЕРТЫМ ЭТАПОМ СИСТЕМЫ СБОРА, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И  
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность
- 2) захоронение или уничтожение медицинских отходов
- 3) транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы
- 4) перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОДРОСТКОВ**

**ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) коарктация аорты
- 2) тромбоз почечных артерий и вен
- 3) эссенциальная артериальная гипертензия
- 4) паренхиматозное заболевание почек

**НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ «ЛАЮЩЕГО» КАШЛЯ, ОСИПЛОСТИ ГОЛОСА, УДЛИНЕННОГО ВДОХА – ЭТО**

- 1) острый стенозирующий ларингит
- 2) острая пневмония
- 3) острый бронхит
- 4) бронхиальная астма

**К ОСНОВНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ СИМПТОМАМ ПРИ ХОБЛ ОТНОСЯТ**

- 1) влажные крупнопузырчатые хрипы
- 2) крепитацию
- 3) сухие свистящие хрипы
- 4) влажные мелкопузырчатые хрипы

**ПРЕДЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОКАРДИЕЙ СОСТАВЛЯЕТ (ММ РТ.СТ.)**

- 1) 180
- 2) 160
- 3) 220
- 4) 170

**В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В**

- 1) таблицу 2 списка IV
- 2) список I
- 3) списки II и III
- 4) таблицу 1 списка IV

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА ХРАНИТЬСЯ**

- 1) в кадровой службе и у работника
- 2) на рабочем месте работника и у главного врача
- 3) у главной медицинской сестры
- 4) у старшей медицинской сестры структурного подразделения

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ СО ДНЯ ЕГО ВЫНЕСЕНИЯ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_\_\_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 9
- 2) 12
- 3) 5

4) 6

**ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТОВ ИЗ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ ВО ВТОРУЮ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О(ОБ)**

- 1) полноту охвата диспансерным наблюдением
- 2) индексе здоровья населения
- 3) эффективности диспансерного наблюдения
- 4) своевременности охвата диспансерным наблюдением больных

**ПРИ ОБМОРОКЕ ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) горизонтальное, с приподнятым головным концом
- 2) горизонтальное, без подушки
- 3) горизонтальное, с приподнятым ножным концом
- 4) сидя с опущенными ногами

**ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ И ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЫЧИСЛЯЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ИЗ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ №**

- 1) 14
- 2) 12
- 3) 47
- 4) 19

**ПРИМЕНЕНИЕ ПОРЯДКОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ**

- 1) доступность и качество медицинской помощи
- 2) выполнение функции врачебной должности
- 3) высокий рейтинг медицинской организации
- 4) удовлетворенность населения медицинской помощью

**ЕСЛИ ЯВЛЕНИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА У РЕБЕНКА РАЗВИВАЛИСЬ НА ФОНЕ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, ТО НЕОБХОДИМО**

- 1) инъекцию прекратить, иглу из места инъекции убрать, обеспечить венозный доступ
- 2) инъекцию прекратить, иглу из места инъекции убрать
- 3) инъекцию прекратить, иглу из места инъекции убрать, вызвать врача, провести измерение АД, пульса
- 4) введение препарата прекратить, иглу из места инъекции не убирать для последующего введения лекарственных препаратов

**ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ**

- 1) симпатомиметики
- 2) антибиотики
- 3) неселективные  $\beta$ -адреноблокаторы
- 4) метилксантины



### **К ПРИЗНАКАМ ИСТИННОГО УТОПЛЕНИЯ ОТНОСЯТ**

- 1) отсутствие всех жизненных функций
- 2) посинение лица и шеи, набухание шейных вен, обильные розовые выделения из верхних дыхательных путей
- 3) бледность кожных покровов, сухую пену из верхних дыхательных путей
- 4) легкое расстройство сознания, рвоту, набухание шейных вен

### **ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СИЛИКОНОВОЙ РЕЗИНЫ ИСПОЛЬЗУЮТ \_\_\_\_\_ МЕТОД**

- 1) газовый
- 2) паровой
- 3) воздушный
- 4) химический

### **ПРИ БОЛИ В ЖИВОТЕ, ТОШНОТЕ, ИЗЖОГЕ, ОТРЫЖКЕ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ**

- 1) эзофагогастродуоденоскопию
- 2) клинический анализ крови
- 3) УЗИ брюшной полости
- 4) компьютерную томографию органов брюшной полости

### **СОЦИОПАТИЧЕСКОЙ СЧИТАЮТ СЕМЬЮ**

- 1) с ребенком-инвалидом, нуждающимся в социальном обеспечении
- 2) с низким материальным достатком, нуждающуюся в социальной поддержке
- 3) в которой один или оба родителя страдают алкоголизмом, наркоманией или находятся в заключении
- 4) один из членов которой болен туберкулезом или другим хроническим заболеванием

### **СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВТОРУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЕТЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ГРУППАМ РИСКА, ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 4,5
- 2) 7
- 3) 8
- 4) 12

### **ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ПОСЛЕ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) плавание
- 2) занятия в основной группе по физической культуре
- 3) постановку кожных аллергических проб
- 4) лечебную физкультуру (ЛФК)

### **МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТОМ, В КОТОРОМ ХРАНИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ,**

## **СВЯЗАННАЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ЕЕ ВЛИЯНИЕМ НА ЗДОРОВЬЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы
- 2) медицинская карта стационарного больного
- 3) паспорт здоровья
- 4) карта диспансерного наблюдения

## **ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) увеличение сердечного выброса
- 2) повышение тонуса артериол
- 3) увеличение эластичности стенки аорты
- 4) снижение эластичности стенки аорты

## **БИОХИМИЧЕСКИМ ТЕСТОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) АЛТ
- 2) протромбиновый индекс
- 3) белковые фракции крови
- 4) уровень холестерина

## **КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ**

- 1) бледные, влажные
- 2) цианотичные, сухие
- 3) бледные, сухие.
- 4) розовые, влажные.

## **В ОТЛИЧИЕ ОТ ОСТРОГО СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА ПРИ БРОНХООБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ ВЫЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) осиплость голоса
- 2) отсутствие хрипов в легких при аускультации
- 3) цианоз кожных покровов и слизистых
- 4) экспираторная одышка

## **МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ И ШТАММЫ, ВАКЦИНЫ, ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОДЛЕЖАТ СБОРУ В**

- 1) одноразовые пакеты
- 2) одноразовую твердую упаковку
- 3) многоразовые емкости
- 4) одноразовую твердую герметичную упаковку

## **СТУДЕНТ 4 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», УСПЕШНО СДАВШИЙ ЭКЗАМЕН ПО ДОПУСКУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МОЖЕТ РАБОТАТЬ В ДОЛЖНОСТИ**

- 1) медицинской сестры диетической

- 2) инструктора по гигиеническому воспитанию
- 3) медицинской сестры перевязочной
- 4) медицинской сестры по косметологии

**ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССОВ Б И В ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗОПАСНОГО СБОРА В НИХ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ КГ ОТХОДОВ**

- 1) 20
- 2) 25
- 3) 15
- 4) 10

**ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ОТНОСЯТ К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА**

- 1) В
- 2) Д
- 3) Г
- 4) Б

**ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, РАБОТАЮЩИХ С ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЕМЕ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ \_\_\_\_\_ ВРАЧА(ЕЙ)-СПЕЦИАЛИСТА(ОВ)**

- 1) планового числа посещений у
- 2) числа должностей
- 3) фактической нагрузки медицинской сестры на приеме у
- 4) фактической нагрузки на приеме у

**ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ \_\_\_\_\_ МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРОСТУПКА**

- 1) 10
- 2) 12
- 3) 8
- 4) 6

**ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА МОЖЕТ БЫТЬ СПРОВОЦИРОВАНО**

- 1) острой респираторной вирусной инфекцией
- 2) приемом жирной пищи
- 3) переохлаждением
- 4) приемом углеводов

**ЦЕЛЬЮ АНКЕТИРОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) определения факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
- 2) своевременное выявление инфекционных заболеваний

- 3) формирование групп здоровья
- 4) выявление ранних стадий заболеваний, препятствующих занятиям физкультурой и спортом

**ТЕМПЕРАТУРА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТВОРА ПРИ ЗАКАПЫВАНИИ В УХО (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ):**

- 1) 42 - 45
- 2) 24 - 30
- 3) 37 – 38
- 4) 20 - 22

**ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМО**

- 1) приподнять голову с поддержкой шеи
- 2) придать голове нейтральное положение с фиксацией подбородка
- 3) запрокинуть голову, положив руку под шею
- 4) запрокинуть голову с подъемом подбородка

**ПАЦИЕНТЫ ПОСЛЕ КУПИРОВАНИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА**

- 1) направляются в дневной стационар
- 2) госпитализации не подлежат
- 3) должны быть обязательно госпитализированы
- 4) при полном купировании явлений шока могут быть оставлены под наблюдением участкового врача

**НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АГ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сахарный диабет
- 2) курение
- 3) ожирение
- 4) возраст

**ОСНОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИММУНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проведение эпидемиологического мониторинга
- 2) проведение радиационного мониторинга
- 3) проведение серологического мониторинга
- 4) обеспечение «холодовой цепи»

**К ОСНОВНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЯМ ГОСПИТАЛЬНОЙ (НОЗОКОМИАЛЬНОЙ) ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ**

- 1) атипичную флору
- 2) респираторные вирусы
- 3) грибковую инфекцию
- 4) грамотрицательную флору

### **КУПИРОВАНИЕ ПРИСТУПА УДУШЬЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) горчичники на затылочную область
- 2) гипотензивный препарат
- 3) нитроглицерин под язык
- 4) ингаляция бронхолитического препарата

### **В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПОРЯДКОМ И СРОКАМИ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ДОЛЖНА ИМЕТЬ СТАЖ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 3

### **К МЕРОПРИЯТИЯМ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) сердечные гликозиды
- 2) нитроглицерин под язык
- 3) 40 капель валерьяновой настойки
- 4) горчичник на затылок и икроножные мышцы

### **АЛКОГОЛИЗМ - ЭТО ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ**

- 1) развитием патологического влечения к спиртным напиткам, формированием абстинентного синдрома при прекращении употребления алкоголя
- 2) наличием бреда
- 3) развитием галлюцинаций
- 4) спастическим параличом конечностей

### **ПОСЛЕРОДОВЫЕ ПАЛАТЫ ОТНОСЯТ К ПОМЕЩЕНИЯМ КЛАССА ЧИСТОТЫ**

- 1) А
- 2) Б
- 3) Г
- 4) В

### **КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) уменьшение интенсивности кашля
- 2) появление ржавой мокроты
- 3) исчезновение инфильтрации легочной ткани
- 4) снижение температуры тела

### **ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОБЫЧНОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ДАННОМ НАСЕЛЁННОМ**

**ПУНКТЕ ИЛИ НА ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОТНОСЯТСЯ К \_\_\_\_\_ НАСЕЛЕНИЮ**

- 1) постоянному
- 2) наличному
- 3) активному
- 4) фактическому

**ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ, ВЫЗВАННОМ ВНУТРИВЕННЫМ**

- 1) пероральный прием антигистаминных препаратов
- 2) снять капельницу
- 3) перекрыть капельницу, сохранив доступ в вену
- 4) создание психического покоя

**КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПОПАДАНИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) постепенное развитие дыхательной недостаточности
- 2) внезапный кашель, одышка на фоне полного здоровья
- 3) отсутствие слюны
- 4) отставание одной половины грудной клетки при дыхании

**СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖНА ПОВЫШАТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) сестринское дело
- 2) медицинская профилактика
- 3) гигиеническое воспитание
- 4) организация сестринского дела

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ С ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ХАРАКТЕР СТУЛА**

- 1) обильный, кашицеобразный, блестящий
- 2) скудный, фрагментированный
- 3) водянистый с хлопьями
- 4) жидкий, с примесью алой крови

**ПРИ АЛЬВЕОЛЯРНОМ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ ОТМЕЧАЕТСЯ КАШЕЛЬ С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОКРОТЫ**

- 1) вязкой стекловидной
- 2) «ржавой»
- 3) обильной жидкой
- 4) пенистой розовой

**ДЛЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ХАРАКТЕРНА**

- 1) гиперсаливация
- 2) гипертермия
- 3) анемия
- 4) гипергликемия

**КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нормализация температуры через 48-72 часа
- 2) нормализация всех лабораторных показателей
- 3) полное рассасывание инфильтрата в легочной ткани
- 4) появление влажного кашля в утренние часы

**ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НЕЛЬЗЯ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ, ПОТОМУ ЧТО БОЛЬШИНСТВО ЗУБНЫХ ПАСТ СОДЕРЖАТ**

- 1) фтор
- 2) сахар
- 3) красящие пигменты
- 4) кальций

**ВНЕЗАПНОЕ НАЧАЛО, УТРАТА СОЗНАНИЯ, ГИПЕРЕМИЯ ЛИЦА, СТРИДОРНОЕ ДЫХАНИЕ, БРАДИКАРДИЯ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ, ГЕМИПЛЕГИЯ, ПАРАЛИЧ ВЗОРА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ**

- 1) менингоэнцефалита
- 2) субарахноидального кровоизлияния
- 3) эмболии мозговых сосудов
- 4) кровоизлияния в головной мозг

**К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) компьютерная томография
- 2) ультразвуковое исследование
- 3) спирография
- 4) электрокардиография

**УРОВЕНЬ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА \_\_\_\_\_ УДАРОВ В МИНУТУ**

- 1) 50- 80
- 2) 60-80
- 3) 85-90
- 4) 80-85

**ЗАЩИТИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ ВОЗМОЖНО С ПОМОЩЬЮ**

- 1) регулярного автоклавирования
- 2) плотной укладки в ящики
- 3) регулярного кипячения
- 4) консервации

**ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТАМИ ПО АНГИНЕ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 1-ГО (-ОЙ)**

- 1) года
- 2) недели
- 3) месяца
- 4) квартала

**К НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ НА МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ВПЕРВЫЕ, ОТНОСЯТ**

- 1) ГОСТ
- 2) ТУ
- 3) ФС
- 4) ОСТ

**ДЛЯ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ**

- 1) гастродуоденита
- 2) ларингита
- 3) менингоэнцефалита
- 4) энтерита

**ПОД БИОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ У БОЛЬНОГО С КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ПОНИМАЮТ**

- 1) кал
- 2) кровь
- 3) мочу
- 4) слюну

**К ОПАСНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ БЕШЕНСТВОМ ОТНОСЯТ УКУСЫ В**

- 1) голень, ступни
- 2) голову, шею, пальцы рук
- 3) плечо, предплечье
- 4) бедро, ягодицы

**ДЛЯ ПРОТИРАНИЯ РЕСНИЦ И ВЕК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР**

- 1) 3% перекиси водорода
- 2) 5% калия перманганата
- 3) 1% салицилового спирта
- 4) 0,02% фурацилина

**К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Б ОТНОСЯТСЯ**

- 1) ваннные залы (кроме радоновых), помещения подогрева парафина и озокерита
- 2) послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка, палаты для недоношенных
- 3) шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений
- 4) операционные, послеоперационные палаты

**БЕШЕНСТВО ОТНОСЯТ К**



- 1) природно-очаговым сапронозам
- 2) трансмиссивным зоонозам
- 3) нетрансмиссивным зоонозам
- 4) трансмиссивным антропонозам

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК  
ВТОРУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ СТОБНЯКА ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 9
- 2) 12
- 3) 7
- 4) 4,5

**ФАКТОРОМ РИСКА, ПОВЫШАЮЩИМ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ  
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНОЕ ВЫКУРИВАНИЕ \_\_\_\_\_  
СИГАРЕТ(Ы)**

- 1) 10
- 2) 15
- 3) 5
- 4) 1

**ЦЕЛЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА И ОБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРАЧОМ-ГИНЕКОЛОГОМ, ВРАЧОМ-  
УРОЛОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) разработка программ оздоровления, лечения и реабилитации с учетом выявленных заболеваний
- 2) раннее выявление и профилактика развития заболеваний, которые приводят к нарушениям репродуктивной сферы
- 3) раннее выявление групп риска по развитию
- 4) динамическое диспансерное наблюдение за детьми группы риска

**СОЛНЕЧНЫЙ УДАР ВОЗНИКАЕТ ПРИ**

- 1) накоплении тепла в организме, в связи с длительным воздействием высокой температуры
- 2) длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову или обнаженное тело
- 3) длительном воздействии высокой температуры на организм человека
- 4) накоплении тепла в организме, в связи с длительным воздействием низкой температуры

**РЕБЁНКУ, РОЖДЕННОМУ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ МАТЕРЬЮ, БЕЗ ПРИЗНАКОВ  
ВЫРАЖЕННОГО И ТЯЖЁЛОГО ИММУНОДЕФИЦИТА, ИММУНИЗАЦИЯ**

- 1) проводится препаратами, создающими пассивный иммунитет
- 2) запрещена любыми иммунобиологическими лекарственными препаратами
- 3) проводится в рамках национального календаря профилактических прививок в соответствии с инструкциями по применению вакцин и анатоксинов
- 4) проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок

только анатоксинами

### **ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ**

- 1) при смене материально ответственных лиц
- 2) после составления годовой бухгалтерской отчетности
- 3) в рамках текущего контроля
- 4) после годового отчета организации

### **ЖУРНАЛ ЗАПИСИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В СТАЦИОНАРЕ (Ф 008/У) ЗАПОЛНЯЕТ**

- 1) заведующий структурным подразделением
- 2) операционная медицинская сестра
- 3) врач
- 4) старшая медицинская сестра операционного блока

### **ПРИ ПРИНЯТИИ ИМУЩЕСТВА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ В МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОФОРМЛЯЕТСЯ**

- 1) приказ руководителя медицинской организации
- 2) обязательство старшей медицинской сестры
- 3) расписка о принятии имущества
- 4) договор о полной индивидуальной материальной ответственности

### **ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ ЗА СБОР И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОТХОДОВ, УЧАСТВУЕТ В СБОРЕ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ОТХОДОВ КЛАССА Б И В**

- 1) врач отделения
- 2) главная медицинская сестра
- 3) заведующий структурным подразделением
- 4) младший медицинский персонал

### **ПРИ АУТОИММУННОМ ГЕПАТИТЕ В КРОВИ ПОВЫШЕНО СОДЕРЖАНИЕ**

- 1) альфа2-глобулина и IgM
- 2) альфа1-глобулина и IgE
- 3) бета-глобулина и IgA
- 4) гамма-глобулина и IgG

### **ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА НА ДОВРАЧЕБНОМ ЭТАПЕ НЕОБХОДИМО \_\_\_\_\_ ЛИТРОВ ВОДЫ**

- 1) 3-4
- 2) 1-2
- 3) 6-8
- 4) 12-15

### **КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА**

## **ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) острая боль в ухе, головокружение
- 2) стойкая перфорация барабанной перепонки и оторрея
- 3) нарушение равновесия и снижение слуха
- 4) шум в ушах и головокружение

## **СИМПТОМ «ПРИЛИПШЕЙ» ПЯТКИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ПЕРЕЛОМА**

- 1) костей голени
- 2) костей стопы
- 3) позвоночника
- 4) шейки бедра

## **ПОД ПОКАЗАТЕЛЕМ СООТНОШЕНИЯ ПОНИМАЮТ**

- 1) распределение целого на части
- 2) структуру и состав явления
- 3) соотношение двух разнородных совокупностей
- 4) частоту явления в своей среде

## **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФОСМОТРОВ КРИТЕРИЯМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ \_\_\_\_\_ ММ РТ.СТ. И ВЫШЕ И/ИЛИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ \_\_\_\_\_ ММ РТ.СТ. И ВЫШЕ**

- 1) 160 / 95
- 2) 160 / 90
- 3) 130 / 80
- 4) 140 / 90

## **ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СТАЦИОНАРОВ (ОТДЕЛЕНИЙ) ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРОВОДЯТ**

- 1) ежегодно
- 2) 2 раза в год
- 3) 1 раз в 3 года
- 4) по показаниям

## **ПРИ ХРАНЕНИИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМОРАЖИВАНИЕ**

- 1) вакцин против гепатита А и В
- 2) растворителей для вакцин
- 3) живой оральной полиомиелитной вакцины
- 4) дифтерийно-столбнячного анатоксина

## **ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НЕПРИЖИГАЮЩИМИ ЯДАМИ**

- 1) прием активированного угля, промывание желудка, дача слабительных средств, постановка очистительной клизмы
- 2) промывание желудка, прием активированного угля, постановка очистительной

клизмы, дача слабительных средств

3) промывание желудка, дача слабительных средств, постановка очистительной клизмы, прием активированного угля

4) прием активированного угля, промывание желудка, постановка очистительной клизмы или дача слабительных средств

### **ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ПОДКОЖНЫХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ II СТЕПЕНИ:**

1) спазм, сменяющийся стойким расширением сосудов

2) кратковременный спазм, нестойкое расширение сосудов, вторичный спазм

3) может возникать или спазм сосудов, или расширение сосудов

4) кратковременное расширение сосудов, сменяющееся стойким спазмом

### **ЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ**

1) закапывание капель в нос

2) подготовка материалов и инструментов для передней тампонады

3) холод на область носа

4) наложение пращевидной повязки

### **ОСНОВНЫМ ПРАВИЛОМ ПРИ ОБЩЕНИИ С АГРЕССИВНЫМИ ЛЮДЬМИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ТАКТИКА**

1) отвечать так же агрессивно

2) угрожать наказанием

3) настаивать на своем решении

4) не поддаваться чувству гнева, оценить ситуацию, оставаться вежливыми и спокойными

### **СРОК ДЕЙСТВИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КАРТЫ (ФОРМА № 072/У) СОСТАВЛЯЕТ (В МЕСЯЦАХ)**

1) 12

2) 3

3) 2

4) 6

### **ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО БЕСКАМЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА ХАРАКТЕРНО**

1) преобладание заболевания среди мужчин

2) частое сочетание с язвенным колитом

3) хроническое воспаление желчного пузыря

4) образование конкрементов в просвете желчного пузыря

### **САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ПРОТЕКАЮЩИЙ С АБСОЛЮТНОЙ ИНСУЛИНОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ К**

1) стероидному

2) 2 типу

- 3) 1 типу
- 4) гестационному

**HBsAg ВПЕРВЫЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ В КРОВИ У БОЛЬНОГО ОСТРЫМ ГЕПАТИТОМ В ПЕРИОД**

- 1) реконвалесценции
- 2) продромы
- 3) разгара болезни
- 4) инкубации

**НА ЛИЦО, ПРОХОДЯЩЕЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР, В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОФОРМЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА**

- 1) вредных условий труда
- 2) обследуемого
- 3) амбулаторного больного
- 4) пациента стационара

**ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВОМ ИЗ СПИСКА III ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) диазепам
- 2) никоморфин
- 3) фолькоин
- 4) эскодол

**ПРОЦЕНТ УМЕРШИХ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) экстенсивным показателем
- 2) интенсивным показателем
- 3) абсолютной величиной
- 4) показателем соотношения

**ПОД ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ ПОНИМАЮТ ПРОВЕРКУ**

- 1) готовности персонала, оборудования к работе
- 2) обоснованности использования лекарственных средств и изделий медицинского назначения
- 3) полноты выполнения медицинскими сестрами врачебных назначений
- 4) результатов деятельности сестринского персонала

**ВЕРОЯТНЫМ ПРИЗНАКОМ ДИФТЕРИИ ГОРТАНИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛАРИНГИТ**

- 1) без афонии
- 2) при нормальной или субфебрильной температуре тела
- 3) с внезапно развившимся стенозом в первые часы болезни и с выраженными катаральными явлениями
- 4) с высокой температурой и интоксикацией

**ПАЦИЕНТУ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) ограничить употребление солей

- 2) усилить питание
- 3) ограничить употребление рафинированных углеводов
- 4) ограничить употребление жидкости

**КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТХОДОВ КЛАССА А ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗОНЫ НА РАССТОЯНИИ ОТ ЛЕЧЕБНЫХ КОРПУСОВ И ПИЩЕБЛОКА НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ (В МЕТРАХ)**

- 1) 25
- 2) 30
- 3) 15
- 4) 20

**ЛИСТ УЧЕТА ВОДНОГО БАЛАНСА ЗАПОЛНЯЕТ**

- 1) санитарка
- 2) пациент
- 3) медицинская сестра
- 4) лечащий врач

**ПРАВО УСТАНАВЛИВАТЬ КОНКРЕТНЫЕ НОРМЫ НАГРУЗКИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНО**

- 1) главной медицинской сестре
- 2) первичной профсоюзной организации
- 3) Министерству здравоохранения РФ
- 4) руководителю медицинской организации

**ВОЗБУДИТЕЛЕМ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СЧИТАЕТСЯ**

- 1) *Streptococcus pneumoniae*
- 2) *Moraxella catarrhalis*
- 3) *Staphylococcus aureus*
- 4) *Legionella*

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) ополаскивание в воде–высушивание –дезинфекцию
- 2) дезинфекцию – высушивание –ополаскивание в воде
- 3) дезинфекцию – ополаскивание в воде – высушивание
- 4) ополаскивание в воде–дезинфекцию –высушивание

**ЗАКАПЫВАНИЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ПРОИЗВОДЯТ**

- 1) в наружный угол глаза
- 2) не имеет значение область глаза
- 3) во внутренний угол глаза
- 4) в нижнюю конъюнктивальную складку

## **СТУПЕНЧАТЫЕ И МОСТОВИДНЫЕ НЕКРОЗЫ ПЕЧЕНИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ**

- 1) гемохроматозе
- 2) хроническом гепатите выраженной степени активности
- 3) жировой дистрофии печени
- 4) желчнокаменной болезни

## **БОЛЬНОМУ В СОСТОЯНИИ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧИТЬ**

- 1) ингаляционные  $\beta_2$  агонисты
- 2) глюкокортикостероиды
- 3) защищенные пенициллины
- 4) периферические вазодилататоры

## **ПРИ НЕСТЕРПИМЫХ -КИНЖАЛЬНЫХ БОЛЯХ В ЖИВОТЕ У РЕБЕНКА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ**

- 1) можно вводить только ненаркотические анальгетики по назначению врача
- 2) анальгетики не вводить
- 3) можно давать таблетки, содержащие анальгетики и спазмолитики одновременно
- 4) анальгетики можно давать таблетированно

## **ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ РАК ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ НА ФОНЕ**

- 1) эрозивного гастрита
- 2) гипертрофического гастрита
- 3) хронической язвы
- 4) острой язвы

## **ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗУЮТ \_\_\_\_\_ МЕТОД**

- 1) паровой
- 2) воздушный
- 3) химический
- 4) газовый

## **ГРАЖДАН, У КОТОРЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕНА ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ С УРОВНЕМ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА 8 ММОЛЬ/Л И БОЛЕЕ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) II
- 2) IIIa
- 3) IIIб
- 4) I

## **ОБЩИМИ ПРИЗНАКАМИ КРОВОПОТЕРИ**

- 1) розовая кожа
- 2) брадикардия
- 3) тахикардия
- 4) потеря сознания

### **ДЛЯ АБДОМИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНЫ**

- 1) боли за грудиной, иррадиирующие в плечо и эпигастральную область
- 2) боли за грудиной, иррадиирующие в голову и эпигастральную область
- 3) острые боли в животе, «доскообразное» напряжение мышц живота, положительные симптомы раздражения брюшины.
- 4) острые боли в животе, часто с тошнотой, иногда с рвотой, резкая слабость

### **ОПЕРАЦИОННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ, НАХОДИВШУЮСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ТЕЧЕНИЕ 6-ТИ ЛЕТ И ПЛАНИРУЮЩУЮ ВЕРНУТЬСЯ НА РАБОТУ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА**

- 1) аттестацию специалистов по специальности «Операционное дело»
- 2) сертификационный цикл по специальности «Операционное дело»
- 3) цикл повышения квалификации по специальности «Операционное дело»
- 4) профессиональную переподготовку по специальности «Операционное дело»

### **ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПИСЫВАЕМОГО НА СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ НАРКОТИЧЕСКОГО (ПСИХОТРОПНОГО) ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 1

### **СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОГО СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ**

- 1) (общее число дней нетрудоспособности) / (число пациентов, которым были оформлены листки нетрудоспособности)
- 2) (общее число дней нетрудоспособности) / (число случаев нетрудоспособности) ? 1000
- 3) (общее число дней нетрудоспособности) / (число случаев нетрудоспособности)
- 4) (общее число дней нетрудоспособности) / (число выданных листов нетрудоспособности)

### **НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ПРИ ГАСТРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рентгеноконтрастное исследование
- 2) эндоскопия с биопсией
- 3) копрограмма
- 4) иридодиагностика

### **КЛЮЧЕВЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) фибробронхоскопия
- 2) рентгенография органов грудной клетки
- 3) исследование функции внешнего дыхания
- 4) компьютерная томография



**ВЛАЖНУЮ УБОРКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ РОДИЛЬНОГО ЗАЛА ПРИ ОТСУТСТВИИ РОДОВ ПРОВОДЯТ \_\_\_\_ РАЗ(А) В СУТКИ**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТАЮЩИХ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ**

- 1) заключений профсоюзной организации и работодателя о необоснованных льготах работающими
- 2) постановления прокуратуры
- 3) заключений территориальных органов Роспотребнадзора с обоснованием причины досрочного осмотра (обследования)
- 4) медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте

**РЕКОМЕНДАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПАЦИЕНТУ С ОТЕКАМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ СЕРДЦА**

- 1) увеличить прием жидкости и соли
- 2) ограничить прием жидкости и соли
- 3) увеличить прием белков и жиров
- 4) ограничить прием белков и жиров

**ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЕ ДЛЯ СБОРА МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ**

- 1) продезинфицированная
- 2) охлажденная
- 3) стерильная
- 4) механически и химически чистая

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛЧЕГОННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТЫ БЫЧЬЕЙ ЖЕЛЧИ, ПОКАЗАНО ПРИ**

- 1) обострении хронического панкреатита
- 2) секреторной диарее
- 3) хроническом бескаменном холецистите
- 4) язвенной болезни в фазе обострения

**ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ВЫСЛУШИВАЮТ \_\_\_\_\_ ХРИПЫ**

- 1) диффузные сухие свистящие
- 2) диффузные мелкопузырчатые влажные
- 3) локальные мелкопузырчатые влажные
- 4) диффузные разнокалиберные влажные

**ПЕРСОНАЛ, ПРИВЛЕЧЕННЫЙ К РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ, ПРОХОДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С**

### **ОТХОДАМИ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В**

- 1) квартал
- 2) полгода
- 3) месяц
- 4) год

### **ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА С НОСОВЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ**

- 1) горизонтальное положение на спине
- 2) сидя, слегка наклонив голову вперед
- 3) лежа с валиком под лопатки
- 4) сидя, запрокинув голову

### **ОСТРЫЙ ПРОСТОЙ БРОНХИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) сухими хрипами с обеих сторон
- 2) притуплением перкуторного звука с одной стороны
- 3) мелкопузырчатыми хрипами локально
- 4) тимпаническим перкуторным звуком с одной стороны

### **ПО СВОЕМУ ОСНОВНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) прямым
- 2) опосредованным
- 3) конвенциональным
- 4) вербальным

### **СТАФИЛОКОККОВАЯ ДЕСТРУКТИВНАЯ ПНЕВМОНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) сухими хрипами
- 2) лимфоцитозом с атипичными мононуклеарами
- 3) отсутствием кашля
- 4) выраженной интоксикацией

### **ОСНОВУ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ СОСТАВЛЯЮТ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА**

- 1) устранение контакта со значимыми аллергенами
- 2) предотвращение развития аллергической сенсibilизации
- 3) исключение воздействия табачного дыма как в пренатальном, так и в постнатальном периодах
- 4) укрепление иммунитета

### **СТЕПЕНЬ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ МОЖНО ОЦЕНИТЬ НА ОСНОВАНИИ**

- 1) уровня контринсулярных гормонов в крови
- 2) среднесуточной гликемии
- 3) гликолизированного гемоглобина
- 4) глюкозы крови натощак

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ПРОВОДЯТ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИМЕЮЩИХ**

- 1) медицинскую лицензию на право проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
- 2) справку органа государственного пожарного надзора о подтверждении соответствия в области пожарной безопасности
- 3) санитарно-эпидемиологическое заключение на право проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
- 4) договор с промышленным предприятием на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров

**ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С**

- 1) парентеральный
- 2) фекально-оральный
- 3) воздушно-капельный
- 4) трансмиссивный

**ИЗ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СПИСОК I ВКЛЮЧЕНЫ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ ПРЕКУРСОРЫ, ОБОРОТ КОТОРЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

- 1) обязателен
- 2) ограничен
- 3) запрещен
- 4) разрешен

**ВЫБЕРИТЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ММ РТ. СТ.**

- 1) 120-130
- 2) 60-90
- 3) 40-50
- 4) 100-110

**ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО АУТОИММУННОГО АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА (ТИП А) ХАРАКТЕРНО**

- 1) наличие антител к бокаловидным клеткам
- 2) преимущественное поражение антрального отдела желудка
- 3) преимущественное поражение дна и тела желудка
- 4) наличие гиперацидности

**ГЛАВНЫМ ВОПРОСОМ, НА КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОТВЕТИТЬ НАГРУЗОЧНЫЙ ТЕСТ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) верификация ИБС
- 2) вероятность наличия ИБС

- 3) наличие клапанной патологии
- 4) наличие перенесенного в прошлом инфаркта миокарда

### **ПЕРВЫЙ ЭТАП ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ**

- 1) решение ситуационных задач
- 2) оценку портфолио
- 3) оценку практических навыков (умений)
- 4) тестирование

### **ПЕРЕЧЕНЬ СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) острые инфекционные заболевания
- 2) эпилепсию
- 3) инсульт
- 4) инородные тела верхних дыхательных путей

### **ТИП ОДЫШКИ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ**

- 1) смешанная
- 2) стридорозная
- 3) инспираторная
- 4) экспираторная

### **ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ**

- 1) (число умерших в течение года) / (число живущих)
- 2) (число умерших) / (численность населения на 01 января данного года) × 1000
- 3) (число умерших за год) / (среднегодовая численность населения) × 1000
- 4) (число умерших в течение межпереписного периода) / (среднегодовая численность населения) × 1000

### **ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНИКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ МЕНЕЕ ДВУХ ЧАСОВ**

- 1) положить вакцины в холодильник на пищеблоке
- 2) иммунобиологические лекарственные препараты необходимо переместить в термоконтейнер
- 3) положить в холодильник дополнительные хладоэлементы
- 4) не открывать холодильник до устранения неисправности

### **ОШИБКИ В ОПИСЯХ, ОБНАРУЖЕННЫЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ИСПРАВЛЯЮТСЯ**

- 1) заведующий складом
- 2) главным бухгалтером
- 3) инвентаризационной комиссией
- 4) материально ответственным лицом

## **ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ**

- 1) провести заднюю тампонаду носа
- 2) запрокинуть голову назад
- 3) наклонить голову кпереди, прижать крылья носа к переносице
- 4) провести переднюю тампонаду носа

## **ПРИКАЗ О ПРИМЕНЕНИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ ПОД РОСПИСЬ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ИЗДАНИЯ**

- 1) 3
- 2) 7
- 3) 10
- 4) 14

## **БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) дизурией
- 2) афонией
- 3) экспираторной одышкой
- 4) инспираторной одышкой

## **ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОСТАТКИ ОБОРВАННОЙ ОДЕЖДЫ ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) снять, обработать дезинфектантом
- 2) можно снять
- 3) нельзя снимать
- 4) не снимая, обработать антисептиком

## **ПРИ КОРМЛЕНИИ ПАЦИЕНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ, ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) на спине
- 2) на животе
- 3) на правом боку
- 4) Фаулера

## **МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОПРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРЕТСЯ**

- 1) свежесвыделенный кал, шпателем из разных участков, 5-10 г, в чистую посуду
- 2) свежесвыделенный кал, шпателем из разных участков, 5-10 г, без примесей воды и мочи, в сухую чистую стеклянную посуду
- 3) стерильным деревянным шпателем свежесвыделенный кал из нескольких мест последней порции в стерильную пробирку
- 4) непосредственно после дефекации, шпателем из нескольких участков, 5-10 г, без примесей воды и мочи, в чистый сухой спичечный коробок

## **ПОСТРАДАВШИХ ПРИ УСПЕШНОЙ РЕАНИМАЦИИ ПОСЛЕ УТОПЛЕНИЯ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ПОЛОЖЕНИИ**

- 1) лежа на боку с опущенным подголовником носилок
- 2) лежа на боку с приподнятым подголовником носилок
- 3) лежа на спине на жестких (щитовых) носилках
- 4) лежа на животе на жестких (щитовых) носилках

**НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЕПАТИТОМ Е ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ**

- 1) детей дошкольного возраста
- 2) беременных
- 3) лиц старше 60 лет
- 4) детей школьного возраста

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СЛЕДУЕТ КЛИНИЧЕСКИ ОЦЕНИВАТЬ ЧЕРЕЗ**

- 1) 12 часов
- 2) 2-3 дня
- 3) 5 дней
- 4) 1 сутки

**В ТЕРАПИЮ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ АНТИБИОТИКИ ПРИ НАЛИЧИИ**

- 1) кашля
- 2) приступа удушья
- 3) одышки
- 4) интоксикации

**ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА КАК ФАКТОРУ РИСКА, ПОВЫШАЮЩЕМУ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СООТВЕТСТВУЕТ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА, РАВНЫЙ \_\_\_\_\_ КГ/М<sup>2</sup>**

- 1) 23-24,9
- 2) 25-29,9
- 3) 35-39,9
- 4) 30-34,9

**ПРИ ТОРПИДНОЙ ФАЗЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА ОТМЕЧАЮТ**

- 1) болтливость
- 2) мраморность кожи, апатию
- 3) двигательное возбуждение
- 4) повышенный уровень артериального давления

**УЧЕТНАЯ ФОРМА «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА» ИМЕЕТ КОД**

- 1) 066/У
- 2) 112/У
- 3) 025/У
- 4) 004/У

**К ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) синдром неязвенной диспепсии
- 2) субфебрильная температура
- 3) умеренный лейкоцитоз
- 4) «спастический» стул

**ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И УДАЛЕННЫХ ОТ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МЕСТНОСТЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЕСТИМЕСЯЧНОГО ЗАПАСА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ КАТЕГОРИИ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 4

**В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ ПОДОЗРЕНИЯ НА ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ В ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР, НАПРАВЛЯЮТ**

- 1) статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (форма № 025-2/у)
- 2) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку (форма № 058/у)
- 3) сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения (форма № 12)
- 4) сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях (форма № 1)

**ФАКТОР, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКИМ КОЛИТОМ**

- 1) бальнеотерапия
- 2) двигательный режим
- 3) светолечение
- 4) респираторная терапия

**ПЕРВЫМ ЭТАПОМ СИСТЕМЫ СБОРА, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обеззараживание отходов
- 2) транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы
- 3) перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы
- 4) сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность

**НЕДОСТАЧА ИМУЩЕСТВА, ВЫЯВЛЕННАЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ**

- 1) списывается с учета структурного подразделения
- 2) относится на виновных лиц по рыночной стоимости и взыскивается с них
- 3) пополняется за счет других структурных подразделений
- 4) пополняется за счет общебольничных фондов

**ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ**

- 1) глюкозы мочи
- 2) глюкозы крови
- 3) кетоновых тел крови
- 4) инсулина крови

**ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРЕН КАШЕЛЬ С МОКРОТОЙ В ТЕЧЕНИЕ**

- 1) 3 месяцев не менее 3-х лет
- 2) 4 месяцев не менее 3-х лет
- 3) 2 месяцев не менее 3-х лет
- 4) 3 месяцев не менее 2-х лет

**В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ШКОЛЬНИК ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В**

- 1) специальной группе (подгруппа Б)
- 2) основной группе
- 3) подготовительной группе
- 4) специальной группе (подгруппа А)

**РАССТРОЙСТВО ПАМЯТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ УТРАТОЙ ПАМЯТИ НА СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ПОТЕРЕ СОЗНАНИЯ**

- 1) ретардированная амнезия
- 2) антероградная амнезия
- 3) кататимная амнезия
- 4) ретроградная амнезия

**ВЫПЛАТА СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ СРЕДСТВ**

- 1) федерального фонда обязательного медицинского страхования
- 2) пенсионного фонда
- 3) фонда занятости
- 4) фонда социального страхования

**ПОСТРАДАВШЕМУ С ПРИЗНАКАМИ ТРАВМЫ ТАЗА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) на спине с полусогнутыми в коленях и разведенными ногами
- 2) на спине с приподнятыми ногами
- 3) устойчивое боковое
- 4) полусидячее с наклоном вперед



**ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ОБНАРУЖЕНИИ В НЕМ**

- 1) железа
- 2) тромбоцитов
- 3) лейкоцитов
- 4) эритроцитов

**АКУШЕРСКИЙ СТАЦИОНАР (ОТДЕЛЕНИЕ) ДОЛЖЕН ЗАКРЫВАТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 1 РАЗ В \_\_\_\_\_**

- 1) три года
- 2) пять лет
- 3) полгода
- 4) год

**ПРИ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ КРЕПИТАЦИЯ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ**

- 1) лучше в стадии серого опеченения
- 2) хорошо во всех стадиях
- 3) лучше в стадии красного опеченения
- 4) лучше в стадиях прилива и разрешения

**ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АМПУЛЫ, ШПРИЦЫ И ИГЛЫ ПОСЛЕ ЦИТОСТАТИКОВ НЕОБХОДИМО**

- 1) собрать в контейнер, запечатать, промаркировать и отправить на сжигание
- 2) собрать в емкость и отправить в мусоросборник
- 3) залить дезинфектантом
- 4) выбросить в мусорный бак

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 15
- 2) 6
- 3) 9
- 4) 12

**СЫПЬ ПРИ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ**

- 1) носит геморрагический характер
- 2) характеризуется этапностью высыпания (лицо, туловище, конечности)
- 3) сопровождается зудом
- 4) имеет правильную округлую форму и возвышается над поверхностью кожи

**У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЧАЩЕ ВСЕГО БЫВАЕТ**

- 1) хроническое раздражение слизистой дыхательных путей поллютантами (аэрозоли промышленных выбросов, табачный дым и т.д.)

- 2) рецидивирующая или хроническая бактериальная инфекция верхних дыхательных путей
- 3) наследственная недостаточность альфа-1-антитрипсина
- 4) гиперреактивность бронхов

**ПРИ АНАЛИЗЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИМЕЕТ ЦЕЛЬ**

- 1) общественную
- 2) исследовательскую
- 3) административно-правовую
- 4) научную

**ПРИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ОТХОДОВ КЛАССА Б ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИХ ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОДНОРАЗОВЫЕ ЕМКОСТИ С ОТХОДАМИ МАРКИРУЮТСЯ НАДПИСЬЮ: «ОТХОДЫ. КЛАСС Б» И УКАЗАНИЕМ ФАМИЛИИ**

- 1) старшей медицинской сестры
- 2) руководителя медицинской организации
- 3) заведующего структурным подразделением
- 4) ответственного за сбор отходов лица

**КОМПЛЕКС НЕОБХОДИМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА**

- 1) бронхография
- 2) общий анализ крови
- 3) общий анализ крови, рентгенография грудной клетки и бронхоскопия
- 4) рентгенография грудной клетки

**ПРИ НАЛИЧИИ ОСТРОЙ ЛАКУНАРНОЙ АНГИНЫ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ**

- 1) паратонзиллярный абсцесс
- 2) грипп
- 3) дифтерию
- 4) парагрипп

**У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ, ВОЗРАСТАЕТ ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПНЕВМОНИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ**

- 1) стафилококком
- 2) стрептококком
- 3) пневмококком
- 4) клебсиеллой

**В ТЕРАПИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА С СЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ВКЛЮЧАЮТСЯ**

- 1) ингибиторы АПФ
- 2) кортикостероиды
- 3) ферменты (панкреатин)

4) сосудистые препараты

**ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) экспираторная одышка
- 2) одышка смешанного характера
- 3) инспираторная одышка
- 4) кашель с выделением пенистой мокроты

**ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, ГЕНЕРИРУЮЩИЕ УРОВНИ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ СТЕПЕНИ РИСКА**

- 1) умеренной
- 2) высокой
- 3) средней
- 4) низкой

**ПОЛИНОЗ ЧАСТО СОЧЕТАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ**

- 1) язвой желудка
- 2) бронхиальной астмой
- 3) панкреатитом
- 4) стенокардией

**ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ АНТИСЕПТИКОМ ПОЛОСТИ РТА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ГУБЫ И ЯЗЫК НЕОБХОДИМО СМАЗЫВАТЬ**

- 1) физиологическим раствором
- 2) масляным раствором
- 3) раствором хлоргексидина
- 4) раствором бриллиантовой зелени

**ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ПОДКЛЮЧИЧНУЮ АРТЕРИЮ ПРИЖИМАЮТ К**

- 1) 1 ребру
- 2) на середине яремной вырезки грудины
- 3) ключице
- 4) рукоятке грудины

**ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ СЧИТАЕТСЯ ОСЛОЖНЕННЫМ ПРИ НАЛИЧИИ**

- 1) инфаркта легкого
- 2) тромбоза легочной артерии
- 3) гипертрофической кардиомиопатии
- 4) острого нарушения мозгового кровообращения

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 39 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В (ГОДАХ)**

- 1) 1
- 2) 3

3) 4

4) 2

**КОНФЛИКТЫ С ПАЦИЕНТАМИ У ПЕРСОНАЛА ВОЗНИКАЮТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО**

- 1) больной отказывается от обследования и лечения
- 2) пациента выслушивают доброжелательно
- 3) нарушается санитарно-противоэпидемический режим
- 4) не учитываются эмоции и мнение пациента

**ЗНАЧИМЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ С ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пневмококк
- 2) микоплазма
- 3) гемофильная палочка
- 4) золотистый стафилококк

**СИМПТОМ КЕРНИГА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) менингите
- 2) лабиринтите
- 3) арахноидите
- 4) сифилисе

**ЦИТОЛИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ**

- 1) портопеченочной недостаточности
- 2) мезенхимального воспаления
- 3) активности патологического процесса
- 4) печеночно-клеточной недостаточности

**ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЮ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ И СТАТИСТИЧЕСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕСЁТ**

- 1) главный врач
- 2) заместитель главного врача по экспертизе
- 3) заместитель главного врача по лечебной работе
- 4) заведующий отделением поликлиники

**СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА**

- 1) дать внутрь тавегил
- 2) обеспечить доступ свежего воздуха, успокоить, провести отвлекающую терапию
- 3) провести ингаляцию 0,9% физиологическим раствором
- 4) уложить в постель без подушки

**ДЛЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ГЕПАТИТА В ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) бактериофаг

- 2) анатоксин
- 3) рекомбинантную вакцину
- 4) живую вакцину

**ПЕРВИЧНОЙ ФИЗИОПРОФИЛАКТИКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- 1) заболеваний
- 2) рецидивов
- 3) обострений заболеваний
- 4) осложнений

**ДЛЯ УРЕЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- 1) сердечные гликозиды
- 2) Пропафенон
- 3) ивабрадин
- 4) бета-блокаторы

**К ВУЛЬГАРНЫМ АНГИНАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) моноцитарная
- 2) фолликулярная
- 3) септическая
- 4) агранулоцитарная

**ТАБЕЛЬ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

- 1) содержит информацию о фактически отработанном времени и количестве неявок за месяц по каждому сотруднику организации
- 2) закрепляет время начала и окончания работы, продолжительность рабочего дня
- 3) устанавливает численный состав работников структурного подразделения
- 4) устанавливает порядок чередования работников по сменам, дни работы и отдыха

**СОЛИ ЙОДИСТО- И БРОМИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТ, ГАЛОГЕНЗАМЕЩЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, НИТРАТЫ, НИТРИТЫ, ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ГАЛЕНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТНОСЯТСЯ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ТРЕБУЮЩИМ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ**

- 1) повышенных температур
- 2) пониженных температур
- 3) газов, содержащихся в окружающей среде
- 4) света

**В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАПАС РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_\_\_-МЕСЯЧНОЙ ПОТРЕБНОСТИ**

- 1) 6
- 2) 9

3) 12

4) 10

### **ПРИ ПОЛНОМ НАРУШЕНИИ ПРОХОДИМОСТИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО**

- 1) встать сбоку от пострадавшего, наклонить его вперёд, и нанести 5 резких ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего
- 2) встать сзади пострадавшего, обхватить его руками, попытаться удалить инородное тело резкими надавливаниями на верхнюю часть живота
- 3) очистить ротовую полость пострадавшего пальцами, обернутыми бинтом
- 4) рекомендовать пострадавшему откашляться, вызвать скорую медицинскую помощь, контролировать состояние пострадавшего до ее прибытия

### **ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬСЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ**

- 1) пиелонефритом и циститом
- 2) пневмонией и бронхитом
- 3) серозным менингитом и миокардитом
- 4) отоанtritом и мастоидитом

### **НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ**

- 1) применение ингаляторов с бронхолитиками
- 2) создание вынужденного положения в постели
- 3) проведение щелочно-масляных ингаляций
- 4) применение горчичных обертываний

### **К СИМПТОМАМ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) осиплость голоса
- 2) наличие рецидивирующих носовых кровотечений
- 3) наличие отделяемого из носа гнойного характера
- 4) ринорея

### **В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА ПРОВЕТРИВАНИЕ ПАЛАТ ПРОВОДЯТ НЕ РЕЖЕ ЧЕМ**

- 1) 2-3 раза в день
- 2) 1 раз в день
- 3) каждые три часа
- 4) каждый час

### **ПОЛОЖЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ**

- 1) то, в котором он был обнаружен
- 2) на спине с согнутыми коленями
- 3) на спине на кровати
- 4) на спине на ровной непрогибающейся поверхности

## **НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ**

- 1) применение горчичных обертываний
- 2) создание вынужденного положения в постели
- 3) применение ингаляторов с бронхолитиками
- 4) проведение щелочно-масляных ингаляций

## **ПОКАЗАТЕЛЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЕЧНОЙ МОЩНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) среднее число дней работы койки в году
- 2) число коек на конец года
- 3) доля плановой госпитализации
- 4) доля экстренной госпитализации

## **ПРИ УГРОЗЕ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У РЕБЕНКА СЛАРИНГОТРАХЕИТОМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ**

- 1) выполнение физиотерапевтических процедур
- 2) направление в поликлинику
- 3) срочная госпитализация
- 4) проведение оксигенотерапии

## **КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОЧИЩЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТ СЛИЗИ И МОКРОТЫ**

- 1) постуральный дренаж
- 2) лечебная физкультура
- 3) проведение ингаляций
- 4) постановка горчичников на грудную клетку

## **К ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ (II ГРУППА) ОТНОСЯТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ**

- 1) имеющих морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленных
- 2) с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности
- 3) с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания) характера
- 4) с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических нагрузок

## **В КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ, ГДЕ У ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ДИАГНОСТИРОВАНА ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) вакцинация не болевших и не привитых контактных лиц
- 2) изоляция контактных лиц
- 3) заключительная дезинфекция после изоляции пациента

4) назначение интерферона контактными лицам

### **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Б ОТНОСЯТСЯ**

- 1) послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных
- 2) операционные, послеоперационные палаты
- 3) диспетчерские, комнаты персонала, комнаты отдыха пациентов после процедур
- 4) палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений

### **ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ В КРОВИ**

- 1) гемоглобин, цветовой показатель
- 2) гормоны Т3, Т4, ТТГ
- 3) инсулин, глюкагон
- 4) лейкоциты, СОЭ

### **УХУДШЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ПРИ АСТМАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ВОЗМОЖНО ВСЛЕДСТВИИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1) мембранстабилизаторов
- 2) глюкокортикостероидов
- 3) адреномиметиков
- 4) холиноблокаторов

### **НЕМЕДЛЕННОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖИТ РЕБЕНОК СИНФЕКЦИЕЙ**

- 1) менингококковой
- 2) острой кишечной
- 3) респираторно-вирусной
- 4) герпетической

### **МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ ВРАЧАМИ- ТЕРАПЕВТАМИ, ВРАЧАМИ- ТЕРАПЕВТАМИ УЧАСТКОВЫМИ, ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ, ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ И ВРАЧАМИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ, ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПОМОЩЬЮ**

- 1) высокотехнологичной
- 2) скорой
- 3) специализированной
- 4) первичной медико-санитарной

### **ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ СТАЦИОНАРА РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ \_\_\_\_\_ ПОКАЗАТЕЛЯМИ**

- 1) экстенсивными
- 2) интенсивными
- 3) абсолютными
- 4) средними



## **ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) температура воздуха в помещении ?10°С
- 2) влажность воздуха в помещении ?30%
- 3) отсутствие в воздухе закрытого помещения углекислоты и аммиака
- 4) защита от действия прямого солнечного света

## **ДЛЯ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРЕН \_\_\_\_\_ ПЕРКУТОРНЫЙ ЗВУК**

- 1) притупленный
- 2) легочный
- 3) коробочный
- 4) укороченный легочный

## **ЖУРНАЛ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ДЕЖУРСТВ СОДЕРЖИТ**

- 1) отказы от госпитализации
- 2) температурный лист
- 3) перечень срочных назначений
- 4) паспортные данные пациента

## **МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА КАБИНЕТА ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ДОЛЖНА ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО**

- 1) вакцинопрофилактики
- 2) организации сестринского дела
- 3) фармацевтическому порядку
- 4) психологии и педагогики

## **ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ**

- 1) акцент 2 тона над аортой
- 2) усиление 1 тона у основания мечевидного отростка
- 3) акцент 2 тона над легочной артерией
- 4) ослабление 1 тона на верхушке

## **ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО МОЧУ СОБИРАЮТ**

- 1) отдельными порциями в течение 3 часов
- 2) в течение 3 суток
- 3) одномоментно
- 4) в течение 10 часов

## **ПРИЧИНАМИ СНИЖЕНИЯ ОБОНЯНИЯ МОГУТ БЫТЬ**

- 1) затруднение носового дыхания, травма или опухоль мозга
- 2) учащение носового дыхания или парез лицевого нерва
- 3) особенности питания и эндокринная патология
- 4) избыточно влажный или загрязненный воздух, болезни крови

## **КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ В**

**СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПРОВОДЯТ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В**

- 1) месяц
- 2) 2 дня
- 3) день
- 4) неделю

**КАКОЙ ИЗ СИМПТОМОВ МЕНИНГИТА МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ У РЕБЕНКА ГРУДНОГО ВОЗРАСТА?**

- 1) положительный симптом Бабинского
- 2) положительный симптом Моро
- 3) выбухание большого родничка
- 4) парез нижних конечностей

**СОГЛАСНО ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ «ГЕРИАТРИЯ» В ГЕРИАТРИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПЕРСОНАЛ, ИМЕЮЩИЙ СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО И**

- 1) лечебное дело
- 2) диетология
- 3) медицинская статистика
- 4) организация сестринского дела

**ПРИЗНАКОМ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА У ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) анурия на фоне гипертермии
- 2) появление ночной потливости и интоксикации
- 3) усиление одышки и выделения мокроты
- 4) полиурия на фоне гипертермии

**НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц
- 2) временное складирование отходов
- 3) хранение и захоронение отходов
- 4) изоляцию отходов, не подлежащих дальнейшему использованию

**РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О СНЯТИИ РЕБЁНКА С ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА ИЛИ ОФОРМЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) врачом-педиатром участковым
- 2) комиссионно
- 3) главным врачом детской поликлиники
- 4) родителями самостоятельно

**ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО У РЕБЕНКА ДОСТАТОЧНО СОБРАТЬ \_\_\_\_\_ МЛ**

- 1) 10
- 2) 20

- 3) 30
- 4) 40

### **ДИАСКИНТЕСТ ВВОДИТСЯ**

- 1) внутримышечно
- 2) внутрикожно
- 3) внутривенно
- 4) подкожно

### **ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСТАНОВОК ПОД РУКОВОДСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ОТДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТ**

- 1) сестра-хозяйка
- 2) заведующий структурным подразделением
- 3) средний медицинский персонал
- 4) младший медицинский персонал

### **ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В СЕМЬЕ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) однократный посев из носоглотки на менингококк у членов семьи
- 2) госпитализация детей этой семьи
- 3) осмотр врача-невролога членов семьи
- 4) однократный посев крови на менингококк у всех членов семьи

### **В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 ДО 17 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ**

- 1) компьютерная томография
- 2) иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении
- 3) иммунодиагностика с применением аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми единицами очищенного туберкулина в стандартном разведении
- 4) исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии

### **СКРИНИНГ НА МИКРОАЛЬБУМИУРИЮ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (СД) 2 ТИПА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ**

- 1) через 5 лет после установления диагноза «сахарный диабет»
- 2) при установлении диагноза «сахарный диабет»
- 3) через 10 лет после установления диагноза «сахарный диабет»
- 4) через 1 год после установления диагноза «сахарный диабет»

### **ОПОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ» ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обнаружение маркеров вирусных гепатитов
- 2) определение уровня общего билирубина и его фракций
- 3) определение активности АЛТ
- 4) исследование мочи на желчные пигменты

**УКАЖИТЕ ВРЕМЯ ПОДСЧЕТА ПУЛЬСА ПРИ АРИТМИИ В СЕК.**

- 1) 60
- 2) 45
- 3) 30
- 4) 15

**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХОБЛ СТРОИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ**

- 1) рентгенографии грудной клетки
- 2) IgE в сыворотке крови
- 3) анализа мокроты
- 4) функции внешнего дыхания

**АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К РЕВАКЦИНАЦИИ БЦЖ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- 1) туберкулеза в анамнезе
- 2) субфебрильной температуры
- 3) аллергического заболевания
- 4) кожного заболевания

**КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ГИПЕРТЕНЗИВНОГО КРИЗА 1 ВИДА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) сухость кожных покровов
- 2) апатия
- 3) заторможенность
- 4) головная боль, тошнота

**ПРИЗНАКОМ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кровь, вытекающая из раны по капле
- 2) алая пульсирующая струя крови
- 3) медленное выделение темной крови со всей поверхности раны
- 4) струя крови темно-вишневого цвета разной интенсивности

**ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- 1) жидкое мыло в дозаторе (диспенсере)
- 2) индивидуальное мыло
- 3) мыльницу с решеткой
- 4) губки с моющим раствором

**«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) воспалительные изменения в общем анализе крови

- 2) повышение температуры, влажный кашель, интоксикация
- 3) разнокалиберные влажные хрипы при аускультации
- 4) инфильтративные изменения в легких на рентгенограмме

### **ДИАГНОСТИКА ПЫЛЕВОГО БРОНХИТА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) общий анализ мокроты, исследования функции внешнего дыхания, обзорную рентгенографию легких
- 2) общий анализ мокроты, аллергопробы, исследование функции внешнего дыхания
- 3) бронхоскопию, исследования функции внешнего дыхания, обзорную рентгенографию легких
- 4) посев мокроты с определением антибиотикочувствительности, общий анализ мокроты, обзорную рентгенографию органов грудной клетки

### **ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЗНАНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО СЛЕДУЕТ**

- 1) поднести к носу пострадавшего ватку с аммиаком раствором 10%
- 2) похлопать пострадавшего по щекам, надавить на болевые точки
- 3) потормозить пострадавшего за плечи, спросить, что с ним и нужна ли ему помощь
- 4) окликнуть пострадавшего громким голосом

### **ДЛЯ ПРИСТУПА ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМ**

- 1) Ситковского
- 2) Мейо-Робсона
- 3) Бартомье-Михельсона
- 4) Грекова-Ортнера-Рашбы

### **ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К КОЛОНОСКОПИИ НЕОБХОДИМО**

- 1) за день до обследования не употреблять кисло-молочные продукты
- 2) осуществить последний прием пищи не позднее 21 часа накануне исследования
- 3) в день исследования не пить, не есть
- 4) на протяжении двух дней до обследования принимать любое слабительное

### **СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ В ПАСПОРТЕ ОГнетушителя**

- 1) дата изготовления
- 2) место изготовления и приобретения огнетушителя
- 3) дата последней зарядки (проверки) и вес заряда
- 4) дата последнего использования (если было)

### **ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРЕТЕНДЕНТУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) управление сестринской деятельностью
- 2) сестринское дело в педиатрии
- 3) реабилитационное сестринское дело

4) организация сестринского дела

**ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА ФИНАНСИРУЕТСЯ \_\_\_\_\_ СТРАХОВАНИЕ**

- 1) смешанное
- 2) ипотечное
- 3) добровольное медицинское
- 4) обязательное медицинское

**СХЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБАТЫВАЕТ**

- 1) лицо, ответственное по приказу за организацию обращения с медицинскими отходами
- 2) главный врач
- 3) главная медицинская сестра
- 4) врач-эпидемиолог

**ГЕПАТИТНУЮ ВАКЦИНУ НОВОРОЖДЕННЫМ И ГРУДНЫМ ДЕТЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВОДИТЬ В**

- 1) переднебоковую поверхность бедра
- 2) ягодицу
- 3) дельтовидную мышцу плеча
- 4) подлопаточную область

**ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НОРМАЛЬНОЙ МАССЕ ТЕЛА**

- 1) 18,5 кг/м<sup>2</sup> -24,9 кг/м<sup>2</sup>
- 2) 25,0 кг/м<sup>2</sup> -29,9 кг/м<sup>2</sup>
- 3) 30,0 кг/м<sup>2</sup> -34,9 кг/м<sup>2</sup>
- 4) 35,0 кг/м<sup>2</sup> -39,9 кг/м<sup>2</sup>

**ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ**

- 1) подкожный
- 2) ингаляционный
- 3) внутримышечный
- 4) внутривенный

**К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) жажда, кожный зуд
- 2) от?ки, боли в пояснице
- 3) снижение памяти, запоры
- 4) сухой кашель, одышка

**ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ**

- 1) печени
- 2) почек
- 3) желудочно-кишечного тракта
- 4) селезенки

**СРЕДСТВОМ ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) настаивание на своем, перебивая собеседника
- 2) вступление в спор и выяснение ситуации
- 3) исключение суждений и оценок, ущемляющих честь и достоинство собеседника
- 4) применение словесных формул учтивости

**ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОНЫ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ПРИЧИНИВШЕЙ УЩЕРБ ДРУГОЙ СТОРОНЕ, ВОЗМЕСТИТЬ ЕГО В РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК \_\_\_\_\_-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 1) материальная
- 2) дисциплинарная
- 3) административная
- 4) гражданско-правовая

**К ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ РИСКА ДЛЯ ДИАБЕТА 1 ТИПА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) подростки 10-14 лет
- 2) дети 0-4 года
- 3) взрослые старше 45 лет
- 4) молодежь 15-29 лет

**НАИБОЛЕЕ РАННИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70%
- 2) ЖЕЛ менее 50%
- 3) ОФВ1/ФЖЕЛ менее 90%
- 4) ОФВ1 менее 60%

**ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА «ПНЕВМОНИЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наличие очагово-инфильтративных изменений по результатам рентгенологического исследования
- 2) наличие фебрильной температуры тела
- 3) аускультативное определение влажных мелкопузырчатых хрипов или крепитации
- 4) наличие лейкоцитоза или лейкопении в общем клиническом анализе крови

**К ПРИЗНАКАМ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ**

- 1) приступы бронхоспазма на определенные аллергены
- 2) возникновение бронхиальной астмы в пожилом возрасте
- 3) приступы удушья при обострении хронического бронхита
- 4) частые ночные приступы бронхоспазма

**КАТЕТЕРЫ УРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ**

- 1) 40X
- 2) У7А
- 3) Л62
- 4) 30X

**УСТАНОВКА КИПЯТИЛЬНИКОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И ТИТАНОВ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ РАЗОГРЕВ ПАРАФИНА И ОЗОКЕРИТА ДОПУСКАЮТСЯ**

- 1) в подвальных помещениях
- 2) только в процедурных
- 3) только в помещениях, предназначенных для этих целей
- 4) в любых помещениях

**ВОПРОС О НАПРАВЛЕНИИ РЕБЕНКА НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ РЕШАЕТ**

- 1) законный представитель ребенка
- 2) главный врач детской поликлиники
- 3) врач-педиатр участковый
- 4) врачебная комиссия

**ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОСТРАДАВШЕМУ БЕЗ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМО**

- 1) приподнять голову, поддерживая шею
- 2) запрокинуть голову, приподняв подбородок
- 3) запрокинуть голову, подложить под шею импровизированный валик
- 4) дыхательные пути открывать не обязательно

**ОСНОВНЫМ СРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) взгляд
- 2) мимика
- 3) жесты
- 4) речь

**ПОСЛЕ СМЕНЫ БЕЛЬЯ В ПАЛАТАХ ПРОВОДЯТ**

- 1) влажную уборку с использованием дезинфицирующих растворов
- 2) генеральную уборку
- 3) заключительную дезинфекцию
- 4) проветривание помещения

**УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) медицинская карта амбулаторного больного
- 2) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку
- 3) статистический талон уточненных диагнозов
- 4) медицинская карта стационарного больного



### **ДЛЯ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ ХАРАКТЕРНО**

- 1) артериальное давление на ногах выше, чем на руках
- 2) артериальное давление на ногах ниже, чем на руках
- 3) снижение в моче уровня катехоламинов
- 4) повышение в моче альдостерона

### **ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ (В ЧАСАХ)**

- 1) 36
- 2) 72
- 3) 48
- 4) 24

### **УНИЧТОЖЕНИЕ ПУСТЫХ АМПУЛ ИЗ-ПОД НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДЯТ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 28
- 2) 15
- 3) 10
- 4) 21

### **КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРОВОДЯТ \_\_\_\_\_ РАЗ В**

- 
- 1) 1; день
  - 2) 1; неделю
  - 3) 1; 2 дня
  - 4) 2; неделю

### **СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ЖИВОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ**

- 1) внутрикожно
- 2) через рот
- 3) внутримышечно
- 4) подкожно

### **ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТХОДЫ КЛАССА «Б» (ОРГАНЫ, ТКАНИ И Т.П.) МОГУТ ВЫВОЗИТЬСЯ**

- 1) без предварительного обеззараживания
- 2) после обеззараживания химическим методом
- 3) после обеззараживания аппаратными методами
- 4) после обеззараживания любым методом

### **ОБЯЗАННОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА**

- 1) уполномоченное лицо страховой медицинской организации

- 2) руководителя медицинской организации
- 3) работодателя
- 4) самого работника

**СРОКОМ ПЕРЕКОНСЕРВАЦИИ ИГЛ ИНЪЕКЦИОННЫХ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДИН РАЗ (В ГОДАХ)**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 2

**ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАССЧИТЫВАЕТСЯ НА \_\_\_\_\_ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ**

- 1) 1000
- 2) 100
- 3) 1000000
- 4) 10000

**СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА НЕ НОРМИРУЕТСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КЛАССА/КЛАССОВ ЧИСТОТЫ**

- 1) Б
- 2) Д
- 3) А
- 4) В и Г

**К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ А ОТНОСЯТСЯ**

- 1) послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных
- 2) помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях
- 3) кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов
- 4) стерилизационные при операционных

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ АНГИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) паратонзиллит
- 2) острый средний отит
- 3) острый шейный лимфаденит
- 4) кровотечение из миндаины

**ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ**

- 1) артроз височно-нижнечелюстного сустава
- 2) нагноившаяся атерома мочки уха
- 3) живое инородное тело наружного слухового прохода
- 4) попадание воды в ухо

**ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ДЛЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) изжога
- 2) рвота
- 3) зуд кожи
- 4) запор

**ПОКАЗАНИЯМИ К НЕОТЛОЖНОМУ ПЕРЕВОДУ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР БОЛЬНОГО С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) его непосредственная опасность для себя и окружающих
- 2) галлюцинации, бред и нарушение сознания
- 3) снижение интеллекта, нарушение памяти
- 4) астения, навязчивые состояния

**ИНФИЦИРОВАНИЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ СОПРОВОЖДАЕТСЯ**

- 1) снижением секреции гастрина
- 2) ахлоргидрией
- 3) диффузной атрофией главных желез желудка
- 4) развитием активного антрального гастрита

**К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСЯТ**

- 1) медицинскую карту пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях
- 2) медицинскую карту стационарного больного
- 3) статистическую карту выбывшего из стационара
- 4) направление на лечение в стационарных условиях

**ХАРАКТЕРНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ СИМПТОМОМ БРОНХИОЛИТА ЯВЛЯЮТСЯ ДИФФУЗНЫЕ \_\_\_\_\_ ХРИПЫ**

- 1) мелкопузырчатые влажные
- 2) сухие свистящие
- 3) крупнопузырчатые влажные
- 4) разнокалиберные влажные

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гемофильная палочка
- 2) пневмококк
- 3) стафилококк
- 4) микопlasма

**ПРИ АСТМАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ В СТАДИИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ВЫСЛУШИВАЮТ**

- 1) жесткое дыхание
- 2) везикулярное дыхание
- 3) ослабленное дыхание
- 4) «немое легкое»

**ВЛАЖНУЮ УБОРКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА ПРОВОДЯТ \_\_\_\_ РАЗ(А) В СУТКИ**

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

**РАЗМЕР ПАПУЛЫ ПОСЛЕ РЕАКЦИИ МАНТУ, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА ИНФИЦИРОВАННОСТЬ**

- 1) усиление положительной реакции менее чем на 5 мм
- 2) нарастание размера папулы на 6 мм и более за год
- 3) размер папулы 7-9 мм с инфильтратом
- 4) размер папулы 11-13 мм без инфильтрата

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РЫХЛОГО ОСАДКА В ХИМИЧЕСКОЙ СОРБИРОВАННОЙ БРЮШНОТИФОЗНОЙ ВАКЦИНЕ ПРЕПАРАТ НЕОБХОДИМО**

- 1) использовать, набрав в шприц только осадок
- 2) использовать, встряхнув перед введением
- 3) утилизировать
- 4) использовать, набрав в шприц прозрачный надосадочный слой

**ДЛЯ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ ХАРАКТЕРНА СЫПЬ**

- 1) везикулезная
- 2) уртикарная
- 3) геморрагическая с некрозом
- 4) папулезная

**СТАТИСТИКА КАК НАУКА ИЗУЧАЕТ \_\_\_\_\_ ЯВЛЕНИЯ**

- 1) текущие
- 2) единичные
- 3) массовые
- 4) периодические

**МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ДОЛЖНЫ НАДЕВАТЬ ПЕРЧАТКИ ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ МАНИПУЛЯЦИЯМИ У ПАЦИЕНТА В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ \_\_\_\_\_ ИНФЕКЦИЙ**

- 1) кишечных
- 2) гемоконтактных
- 3) вирусных
- 4) паразитарных

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ДЕТИ 14 ЛЕТ ПОДЛЕЖАТ**

- 1) вакцинации против пневмококковой инфекции
- 2) третьей ревакцинации против дифтерии, столбняка
- 3) ревакцинации против вирусного гепатита В
- 4) второй вакцинации против полиомиелита

**ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ В КРОВИ УРОВЕНЬ**

- 1) липазы и амилазы после пробного завтрака
- 2) глюкозы и инсулина натощак
- 3) железа и витамина В12 после пробного завтрака
- 4) холестерина и триглицеридов натощак

**ЛЮМБАЛЬНУЮ ПУНКЦИЮ ПРОВОДЯТ В ПОЛОЖЕНИИ БОЛЬНОГО**

- 1) сидя
- 2) стоя
- 3) лежа на животе
- 4) лежа на боку

**ПРИ НАЛИЧИИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИЗНАКОВ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАПЯСТЬЯ НЕОБХОДИМО**

- 1) наложить кровоостанавливающий жгут ближе к ране
- 2) выполнить прямое давление на рану, наложить давящую повязку
- 3) обработать рану антисептиком, наложить давящую повязку
- 4) наложить антисептическую повязку, поднять конечность вверх

**ТЯЖЕЛУЮ ТРАВМУ, КАК ПРАВИЛО, СОПРОВОЖДАЕТ ОБЩАЯ РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА В ВИДЕ**

- 1) слабости
- 2) апатии
- 3) повышенной раздражительности
- 4) шока

**ПОД ТЕРМИНОМ «АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ» ПОНИМАЮТ**

- 1) вирусную бронхопневмонию
- 2) эозинофильный инфильтрат
- 3) пневмококковую пневмонию верхнедолевой локализации
- 4) пневмонию, вызванную легионеллами, хламидиями или микоплазмами

**ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ СУБСТРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) слюна
- 2) моча
- 3) кровь
- 4) пот

**ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОСТОИТ В ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА ВОЗМЕСТИТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ**

- 1) утраченное имущество полностью
- 2) прямой ущерб и упущенную выгоду
- 3) материальные потери
- 4) причиненный ущерб в полном объеме

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ТРЕТЬЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 6
- 2) 13
- 3) 9
- 4) 12

**ОТОСКОПИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ КАТАРАЛЬНОГО ОТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) перфорация барабанной перепонки и гноетечение
- 2) неизменная барабанная перепонка при жалобах на заложенность носа и ушей
- 3) гиперемия барабанной перепонки с выбуханием и гноем в полость среднего уха
- 4) гиперемия барабанной перепонки без выбухания и гноя

**ГАСТРИТ, АССОЦИИРОВАННЫЙ С HELICOBACTER PYLORI, ОТНОСИТСЯ К**

- 1) аутоиммунному (тип А)
- 2) бактериально обусловленному (тип В)
- 3) химико-токсическому (тип С)
- 4) смешанному (тип А и В)

**РЕБЁНКУ С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА, ЧАСТО БОЛЕЮЩЕМУ РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ, МОЖЕТ БЫТЬ РЕКОМЕНДОВАНА ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ**

- 1) клещевого энцефалита
- 2) вируса папилломы человека
- 3) пневмококковой инфекции
- 4) гепатита А

**СВЕДЕНИЯ О ЗАСТРАХОВАННОМ ЛИЦЕ И ОКАЗАННОЙ ЕМУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСЯТСЯ К ИНФОРМАЦИИ \_\_\_\_\_ ДОСТУПА**

- 1) широкого
- 2) ограниченного
- 3) продолжительного
- 4) свободного

**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПЕРЕЛОМ РЕБЕР ТУГИЕ ПОВЯЗКИ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ**

- 1) не накладывают ни в каком случае
- 2) накладываются в случае подозрения на перелом нескольких ребер

- 3) накладываются в случае окончательного перелома
- 4) накладываются обязательно на время транспортировки в медицинскую организацию

**ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТДЕЛЕНИИ ГЛАВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ**

- 1) сестра-хозяйка
- 2) старшая медицинская сестра отделения
- 3) заведующий структурным подразделением
- 4) средний медицинский персонал

**СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ, В КОТОРОЙ УЧАСТНИК ОРИЕНТИРОВАН НА СОВМЕСТНЫЙ ПОИСК РЕШЕНИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ ИНТЕРЕСАМ ВСЕХ СТОРОН, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- 1) приспособление
- 2) компромисс
- 3) сотрудничество
- 4) мобилизация

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА РЕАНИМАТОР ПРОИЗВОДИТ НАДАВЛИВАНИЕ НА**

- 1) грудину пострадавшего
- 2) всю грудную клетку пострадавшего
- 3) левую половину грудной клетки пострадавшего
- 4) диафрагму

**ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ОБЗОРНОГО ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обнаружение явных признаков наружного кровотечения (прежде всего, артериального)
- 2) оценка общего состояния пострадавшего
- 3) попытка обнаружить ранения различных областей тела
- 4) определение необходимости оказания первой помощи

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ГРЕЛКИ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)**

- 1) 38 – 40
- 2) 60 – 65
- 3) 80 – 90
- 4) 36 – 37

**НАЛИЧИЕ В СОСТАВЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ ОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА**

- 1) Б
- 2) В
- 3) Д

4) Г

**ИНДИКАТОРОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГОГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) восстановление слуха, исчезновение болей, нормализация температуры тела
- 2) наличие головокружения
- 3) восстановление голосовой функции
- 4) нистагм

**УЧАСТОК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ \_\_\_\_\_ СПОСОБЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОТХОДОВ**

- 1) централизованном
- 2) децентрализованном
- 3) функциональном
- 4) сетевом

**ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ХАРАКТЕРНА МОКРОТА**

- 1) темная, со сгустками
- 2) алая, пенистая
- 3) вязкая, стекловидная
- 4) цвета \"кофейной гущи\"

**НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отсутствие пульса на сонной артерии
- 2) отсутствие признаков эффективности закрытого массажа сердца в течение 1 минуты
- 3) регистрация фибрилляции сердца на ЭКГ
- 4) мерцание предсердий на ЭКГ

**АУСКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОСТРОГО БРОНХИТА**

- 1) шум трения плевры
- 2) бронхиальное дыхание
- 3) сухие хрипы
- 4) крепитация

**ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ СОБИРАЮТСЯ В**

- 1) маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного)
- 2) одноразовую твердую упаковку
- 3) многоразовые емкости
- 4) бумажные пакеты



## **ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) руки
- 2) препараты крови
- 3) предметы обихода
- 4) пылевые частицы

## **АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- 1) дисметаболической нефропатии
- 2) тубулопатии
- 3) пиелонефрита
- 4) гломерулонефрита

## **КЛИНИКА НОРМАЛЬНОЙ ВАКЦИНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ НА ПРИВИВКУ ПРОТИВ КОРИ**

- 1) повышение температуры на 3-й день до 37,80С с респираторными явлениями
- 2) повышение температуры до 380С, папулезная сыпь на лице и туловище на 2-й
- 3) повышение температуры на 6-11 день, гиперемия зева, небольшой насморк
- 4) день

## **ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ПУЛЬС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА**

- 1) сонной артерии
- 2) на локтевом сгибе
- 3) аорте
- 4) лучевой артерии

## **РАВНОПРАВИЕ УЧАСТНИКОВ, СВОБОДНЫЙ ОБМЕН МНЕНИЯМИ И ВЗГЛЯДАМИ ПОДРАЗУМЕВАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ ЗА \_\_\_\_\_ СТОЛОМ**

- 1) квадратным
- 2) журнальным
- 3) «Т»-образным
- 4) круглым

## **ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ХАРАКТЕРНА**

- 1) гипербилирубинемия
- 2) гипопропротеинемия
- 3) гипергликемия
- 4) гиперпротеинемия

## **СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВТОРУЮ РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)**

- 1) 6-7
- 2) 8-9
- 3) 10-11
- 4) 12-13

## **ПЛАЗМЕННЫЙ МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРИЛИЗУЮЩИХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ**

- 1) озона
- 2) окиси этилена
- 3) перекиси водорода
- 4) формальдегида

## **ПРИЧИНАМИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) несоблюдение предписаний врача
- 2) передозировка инсулина, нарушение диеты
- 3) пропуск инъекций инсулина
- 4) самостоятельная отмена лекарств

## **К ПРИЧИНАМ ВТОРИЧНОЙ ДИСЛИПИДЕМИИ ОТНОСЯТ**

- 1) сахарный диабет, тип 2
- 2) гипертиреоз
- 3) гипертоническую болезнь
- 4) хронический пиелонефрит

## **ПРИ ГИПЕРАЦИДНОМ ГАСТРИТЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) натриево-хлоридно-гидрокарбонатные
- 2) натриево-гидрокарбонатные
- 3) натриево-хлоридные
- 4) воды с высоким содержанием органических веществ

## **ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОНУМЕРОВАНЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНО РАЗДЕЛЕНА С УЧЕТОМ**

- 1) количества проводимых операций
- 2) степени чистоты оперативного вмешательства
- 3) параметров приточно-вытяжной вентиляции
- 4) мнения старшей медицинской сестры операционного блока

## **КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ (В %)**

- 1) 96,5
- 2) 70
- 3) 30
- 4) 45

## **ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ПРИСУТСТВИИ БОЛЬНЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ МАЛООПАСНЫЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА \_\_\_\_\_ КЛАССА ОПАСНОСТИ**

- 1) I
- 2) IV

- 3) III
- 4) II

**МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
КОНКРЕТИЗИРОВАНА В**

- 1) трудовом договоре
- 2) служебной записке
- 3) приказеглавноговрача
- 4) положении о материальной ответственности

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК  
ТРЕТЬЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОКЛЮША ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 12
- 2) 5
- 3) 6
- 4) 11

**\_\_\_\_\_ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ПРИЕМОМ МАССАЖА**

- 1) вытяжение
- 2) поглаживание
- 3) растирание
- 4) разминание

**В ДИЕТЕ БОЛЬНОГО С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ МОЖНО В НЕОГРАНИЧЕННОМ  
КОЛИЧЕСТВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

- 1) огурцы
- 2) картофель
- 3) сливочное масло
- 4) молоко

**ПРИ ОБШИРНЫХ ОТМОРОЖЕНИЯХ КОНЕЧНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ПОВЯЗКУ**

- 1) «рыцарскую перчатку»
- 2) термоизолирующую
- 3) «асептическую»
- 4) «варежку»

**ОШИБКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ НАБЛЮДЕНИЮ**

- 1) выборочному
- 2) сплошному
- 3) текущему
- 4) единовременному

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЧЕК И  
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДЯТ**

- 1) прием углеводовных продуктов вечером и утром перед исследованием

- 2) водную нагрузку перед исследованием
- 3) психологическую подготовку
- 4) обязательный прием активированного угля и ферментных препаратов

**300 ДОЗ ВАКЦИНЫ АДС-М, СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТОРЫХ ИСТЕК 2 ДНЯ НАЗАД, НЕОБХОДИМО**

- 1) утилизировать
- 2) использовать в ближайшее время
- 3) отправить на контроль иммуногенности
- 4) использовать для проведения прививки ограниченному контингенту

**РАБОТНИКИ В ВОЗРАСТЕ ДО 21 ГОДА ПРОХОДЯТ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В \_\_\_\_\_ ГОД(А)**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 1,5

**НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ СЛЕПОТЫ У БОЛЬНОГО, ДЛИТЕЛЬНО СТРАДАЮЩЕГО САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) автономная нейропатия
- 2) глаукома
- 3) пролиферирующая ретинопатия
- 4) атрофия зрительных нервов

**СОКРАЩЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ II ГРУППЫ, И СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ**

- 1) 37
- 2) 38
- 3) 36
- 4) 35

**ЧАСТОТА СРЕДНИХ ОТИТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБУСЛОВЛЕНА**

- 1) отсутствием мерцательного эпителия в слуховой трубе
- 2) широкой и короткой слуховой трубой
- 3) отсутствием костного отдела слуховой трубы
- 4) недоразвитием слуховой трубы

**ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) anti-HBs
- 2) anti-HBcore IgM
- 3) anti-HBcore IgG
- 4) anti-HBe

### **ХАРАКТЕР СЫПИ ПРИ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ**

- 1) уртикарная
- 2) мелкоточечная
- 3) геморрагическая
- 4) папулезная

### **БОЛЬНЫЕ ДЕТИ С ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ МАНИФЕСТАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ЖАЛОБЫ НА**

- 1) жажду
- 2) прибавку в весе
- 3) боли в суставах
- 4) повышение аппетита

### **ИЗЛИШНЕЕ ИМУЩЕСТВО, ВЫЯВЛЕННОЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ**

- 1) уничтожается
- 2) передается в собственность материально ответственных лиц
- 3) изымается и сдается на общепольничный склад
- 4) приходится по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации

### **ПОЯВЛЕНИЕ У ЮНОШИ 18 ЛЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЖАЖДЫ, ПОЛИУРИИ, ОБЩЕЙ СЛАБОСТИ, ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ ДО 16 ММОЛЬ/Л, НАЛИЧИЯ АЦЕТОНА В МОЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О**

- 1) MODY-диабете
- 2) сахарном диабете 2 типа
- 3) сахарном диабете 1 типа
- 4) сахарном диабете вследствие болезни экзокринной части поджелудочной железы

### **ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОГО БРОНХИТА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) кларитромицин, бромгексин
- 2) преднизолон, эуфиллин
- 3) теофедрин, фуросемид
- 4) пентамин, дигоксин

### **ВЛАЖНУЮ УБОРКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ПАЛАТ ИНФЕКЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПРОВОДЯТ \_\_\_\_ РАЗ(А) В СУТКИ**

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

### **В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НА КАЖДОЕНАИМЕНОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА ОТДЕЛЬНО ОТВОДИТСЯ ОДИН/ОДНА**

- 1) тетрадь
- 2) графа
- 3) лист
- 4) строка

### **ДНЕМ УВОЛЬНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СЧИТАЕТСЯ**

- 1) последний день работы
- 2) день издания приказа главного врача об увольнении
- 3) день выдачи разрешения на увольнение органом федеральной инспекции труда
- 4) следующий после прекращения работы день

### **КОНТРОЛЬ, ПРОВОДИМЫЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) плановым
- 2) заключительным
- 3) предварительным
- 4) текущим

### **ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕМ СРЕДСТВЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) норму расхода дезинфицирующего раствора
- 2) объем дезинфицирующего раствора
- 3) фактический срок годности раствора в сутках
- 4) периметр обрабатываемой поверхности

### **К ПРИЗНАКАМ ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ОТНОСЯТ**

- 1) изжогу, рвоту кислым содержимым
- 2) появление прожилок крови в кале
- 3) выраженный болевой синдром в эпигастральной области, возникающий в ночное время
- 4) наличие гиперхромной анемии в общем анализе крови

### **К ТЕКУЩЕМУ СТАТИСТИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ОТНОСЯТ РЕГИСТРАЦИЮ**

- 1) профилактического осмотра
- 2) медицинского осмотра
- 3) случая рождения живого ребенка
- 4) факта диспансеризации

### **ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ ПОДОЗРЕНИИ НА НЕГО ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

- 1) экстренное извещение об инфекционном заболевании
- 2) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного образования
- 3) направление на госпитализацию

4) листок нетрудоспособности

**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ МАЗОК ИЗ ЗЕВА И НОСА НА ВЛ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ**

- 1) клиническую
- 2) бактериологическую
- 3) вирусологическую
- 4) биохимическую

**ОБЪЕМ ФОРСИРОВАННОГО ВЫДОХА ЗА ПЕРВУЮ СЕКУНДУ (ОФВ1) ПРИ ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ МЕНЕЕ (%)**

- 1) 70
- 2) 60
- 3) 90
- 4) 80

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ РИСК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ У ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ**

- 1) 18-39 лет включительно
- 2) 40-52 года
- 3) 53-64 года включительно
- 4) 65 лет и старше

**В ЛАБОРАТОРИЯХ, ОТДЕЛЕНИЯХ И КАБИНЕТАХ ВРАЧЕЙ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ И РЕАКТИВОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМСЯ И ГОРЮЧИМ ЖИДКОСТЯМ (СПИРТ, ЭФИР И ДР.), С УЧЕТОМ ИХ СОВМЕСТИМОСТИ В ЗАКРЫВАЮЩИХСЯ НА ЗАМОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФАХ, ОБЩИМ ВЕСОМ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ КИЛОГРАММ**

- 1) 7
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 3

**К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ КОРИ ОТНОСЯТ**

- 1) энцефалит, менингоэнцефалит, менингит
- 2) колит, энтерит
- 3) эндокардит, миокардит
- 4) орхит, паротит

**РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ КОМЕ, НАБЛЮДАЕТСЯ**

- 1) на стороне пораженного полушария
- 2) на стороне, противоположной пораженному полушарию
- 3) ассиметрично с обеих сторон
- 4) симметрично с обеих сторон

**ОЖИРЕНИЮ КАК ФАКТОРУ РИСКА, ПОВЫШАЮЩЕМУ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СООТВЕТСТВУЕТ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА РАВНЫЙ \_\_\_\_\_ КГ/М<sup>2</sup>**

- 1) 23-24,9
- 2) 30-34,9
- 3) 20-22,9
- 4) 25-29,9

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВТОРУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 9,5
- 2) 12
- 3) 5,5
- 4) 4,5

**ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННОМУ С АСФИКСИЕЙ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА НАЧНЕТ С**

- 1) дачи кислорода
- 2) отсасывания слизи из верхних дыхательных путей
- 3) массажа сердца
- 4) искусственной вентиляции легких

**АУТОИММУННЫЙ ГЕПАТИТ ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТСЯ**

- 1) Панкреатином
- 2) Преднизолоном
- 3) Интерфероном
- 4) Рибавирином

**ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА А ДОПУСКАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ТАРА**

- 1) одноразовые пакеты
- 2) хозяйственные сумки с ручками
- 3) ведра
- 4) бумажные мешки

**НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ СТРЕПТОКОККОВОЙ АНГИНЫ И ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ У ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ ЛИЦ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ АУТОИММУННОГО ОТВЕТА НА АНТИГЕНЫ СТРЕПТОКОККА И ПЕРЕКРЕСТНОЙ РЕАКТИВНОСТЬЮ СО СХОДНЫМИ ЭПИТОПАМИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА (В КОЖЕ, СУСТАВАХ, СЕРДЦЕ, МОЗГЕ) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ревматическая болезнь
- 2) склерома
- 3) дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка
- 4) лихорадка Эбола-Заир



**БЕЛЫЙ ИЛИ СЕРЫЙ ЦВЕТ ПЕНЫ, ВЫДЕЛЯЮЩЕЙСЯ ИЗ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ АСФИКСИЧЕСКОМ УТОПЛЕНИИ, ОБУСЛОВЛЕН**

- 1) раскоординацией дыхания в процессе утопления
- 2) диффузией в альвеолы крови
- 3) угнетением центральной нервной системы
- 4) диффузией в альвеолы белков и воды из кровеносного русла

**ОСТАНОВКУ ДЫХАНИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ОТСУТСТВИЮ**

- 1) движения крыльев носа
- 2) дыхательных движений грудной клетки
- 3) отклонения ворсин ваты, поднесенной ко рту или носу
- 4) дыхательных шумов

**ПЛАНОВЫМ ПРИВИВКАМ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ПОДЛЕЖАТ**

- 1) члены семей охотников
- 2) охотники
- 3) энтомологи
- 4) люди, проживающие в сельской местности

**ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ В ОДИН ЭТАП ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ \_\_\_\_\_ДЕЙСТВИЯМИ**

- 1) дезинфицирующим и моющим
- 2) дезинсекционным и дератизационным
- 3) стерилизующим и пастеризующим
- 4) ультрастерилизующим и дезодорирующим

**АДЕНОИДЫ ПРИВОДЯТ К**

- 1) нарушению равновесия и умственного развития
- 2) нарушению носового дыхания и деформации лицевого скелета
- 3) нарушению питания и деформации лицевого скелета
- 4) деформации лицевого скелета и перегородки носа

**СОГЛАСНО КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПОДЛЕЖАТ**

- 1) студенты первых курсов средних и высших учебных заведений
- 2) дети 1-8 лет включительно
- 3) лица, подлежащие призыву на военную службу
- 4) учащиеся 3-11 классов

**ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ ПРИ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ГАСТРИТА В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (ДЕНЬ)**

- 1) 12-14

- 2) 3-4
- 3) 6-7
- 4) 16-18

**СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ К ГРУППЕ ВЫСОКОГО РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ГЕПАТИТОМ В ОТНОСЯТ ПЕРСОНАЛ**

- 1) физиотерапевтических кабинетов
- 2) клинических и биохимических лабораторий
- 3) центральных стерилизационных отделений
- 4) гастроэнтерологических отделений

**ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ**

- 1) спирометра
- 2) спиртометра
- 3) динамометра
- 4) кардиографа

**АНАЛИЗ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО ПРОВОДИТСЯ В \_\_\_\_\_ ЛАБОРАТОРИИ**

- 1) биохимической
- 2) клинической
- 3) бактериологической
- 4) цитологической

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ**

- 1) острая дыхательная недостаточность
- 2) острая надпочечниковая недостаточность
- 3) отек легких
- 4) острая почечная недостаточность

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) промывание желудка
- 2) искусственная вентиляция лёгких
- 3) дезинтоксикация
- 4) внутривенное введение 40% раствора глюкозы и витаминотерапия

**БРОНХОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ХОБЛ**

- 1) является дополнительным методом при диагностике для исключения других заболеваний и состояний, протекающих с аналогичными симптомами
- 2) является основным методом диагностики ХОБЛ
- 3) для диагностики не применяется
- 4) применяется только вместе с биопсией бронхов

**ДЛЯ ОСТРОГО ПРОСТОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРНО**

- 1) свистящие хрипы
- 2) мелкие очаговые тени по всем легочным полям
- 3) притупление перкуторного звука
- 4) отсутствие экспираторной одышки, сухие хрипы

**ОБЪЕМ ИСКУССТВЕННОГО ВДОХА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ (МЛ)**

- 1) 1000-1100
- 2) 700-800
- 3) 500-600
- 4) 300-400

**МАММОГРАФ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ**

- 1) внутренних органов грудной клетки
- 2) центральной нервной системы
- 3) молочных желез
- 4) внутренних органов брюшной полости

**В ТЕРАПИИ ХОБЛ СРЕДНЕТЕЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) антибактериальные препараты
- 2) отхаркивающие препараты
- 3) ингаляционные глюкокортикостероиды
- 4) бронходилататоры

**К ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ОТНОСЯТ ЧИСЛО ЛИЦ**

- 1) общее число лиц, признанных инвалидами в данном году
- 2) которым впервые назначена пенсия по инвалидности в течение года
- 3) впервые признанных инвалидами в бюро медико-социальной экспертизы в течение года
- 4) число лиц, направленных в бюро медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности в течение года

**ПАЛАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ОТНОСЯТ К ПОМЕЩЕНИЯМ КЛАССА ЧИСТОТЫ**

- 1) Б
- 2) А
- 3) В
- 4) Г

**ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ПАЦИЕНТА С ИНФЕКЦИЕЙ ЛЮБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ВЫЗВАННОЙ ЗОЛОТИСТЫМ СТАФИЛОКОККОМ, ПРОВОДИТСЯ**

- 1) влажная уборка
- 2) текущая дезинфекция
- 3) генеральная уборка

4) заключительная дезинфекция

**КАЗЕОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ \_\_\_\_\_ ВЫДЕЛЕНИЕМ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЁЗА**

- 1) обильным
- 2) скудным
- 3) редким
- 4) однократным

**ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ОТЕКА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эмфизема легких
- 2) набухшие вены
- 3) клопочущее дыхание, кашель с розовой пенистой мокротой
- 4) систолические шумы

**ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) проведение дыхательной гимнастики
- 2) проведение постурального дренажа
- 3) использование карманного ингалятора
- 4) введение преднизалона

**МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

- 1) 3 часа
- 2) 1 час
- 3) 3 минуты
- 4) 30 минут

**ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ БЦЖ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) повышение температуры тела до 37°C
- 2) повышенная утомляемость
- 3) небольшая гиперемия в месте введения препарата
- 4) регионарный БЦЖ-лимфаденит

**ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА**

- 1) ингаляционный
- 2) внутривенный
- 3) наружный
- 4) внутримышечный

**ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ МЕТОДОМ «РОТ КО РТУ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ, ЕСЛИ ГОЛОВА ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) запрокинута, подбородок поднят, нос зажат
- 2) в нейтральном положении, нос зажат

- 3) запрокинута, ротовая полость очищена
- 4) находится в любом положении, нос зажат

### **К ОСЛОЖНЕНИЯМ ХОБЛ ОТНОСИТСЯ**

- 1) экссудативный плеврит
- 2) хроническое легочное сердце
- 3) астматический статус
- 4) пневмоторакс

### **ОКОННЫЕ ПРОЁМЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ МОЖНО ОБОРУДОВАТЬ**

- 1) декоративными занавесями
- 2) мягкими занавесками
- 3) стеклопакетами
- 4) декоративными решетками (жалюзи), если по прочности они не уступают металлическим решеткам

### **ДЛЯ ОСТРОГО ПРОСТОГО БРОНХИТА ХАРАКТЕРЕН \_\_\_\_\_ ПЕРКУТОРНЫЙ ЗВУК**

- 1) укороченный л?гочный
- 2) притупленный
- 3) коробочный
- 4) л?гочный

### **В ФАЗЕ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БЕСКАМЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ**

- 1) желчегонных препаратов
- 2) анальгетиков
- 3) панкреатических ферментов
- 4) антибиотиков и спазмолитиков

### **ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ИВЛ ДЕТЯМ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ РАЗ В МИНУТУ**

- 1) 25
- 2) 40
- 3) 16-18
- 4) 30

### **ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ:**

- 1) гипокортицизма
- 2) альдостеронизма
- 3) болезни Аддисона
- 4) гипопаратиреоза

### **АУТОИММУННАЯ ДЕСТРУКЦИЯ $\beta$ -КЛЕТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ**

- 1) сахарного диабета 2 типа
- 2) сахарного диабета 1 типа
- 3) генетических форм сахарного диабета (mody и др.)
- 4) гестационного сахарного диабета

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (СОСТОЯНИЯМИ) В СТАДИИ СТОЙКОЙ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ РЕМИССИИ, ДЛЯЩЕЙСЯ НЕ МЕНЕЕ 3-5 ЛЕТ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ**

- 1) специальной подгруппе «А»
- 2) специальной подгруппе «Б»
- 3) основной
- 4) подготовительной

**БОЛЬНЫМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ВЫСОКИМ И ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ РИСКОМ СЧИТАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ СИНДРОМА**

- 1) метаболического
- 2) астено-вегетативного
- 3) диспептического
- 4) постхолецистэктомического

**ДЕТИ, ПОСТУПАЮЩИЕ НА СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ КОНТАКТОВ С ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЬНЫМИ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_ ДНЯ (ЕЙ) ДО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ**

- 1) 21
- 2) 30
- 3) 14
- 4) 7

**ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ У РЕБЕНКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕОБХОДИМО**

- 1) вызвать скорую медицинскую помощь
- 2) ввести инсулин
- 3) вызвать врача, дать сладкий чай, сахар
- 4) не кормить

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВТОРУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 3
- 2) 14
- 3) 2
- 4) 1

**ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФАКТОРА НА РАБОТНИКА МОЖЕТ**

## **ПРИВЕСТИ К**

- 1) травме
- 2) простудному заболеванию
- 3) снижению производительности труда
- 4) производственному конфликту

## **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ ВНОСЯТСЯ В**

- 1) маршрутную карту
- 2) карту учета диспансеризации
- 3) медицинскую карту стационарного больного
- 4) паспорт здоровья

## **РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ КОНТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ - ЭТО**

- 1) экскреторная урография
- 2) ирригоскопия
- 3) томография
- 4) хромоцистоскопия

## **НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ИЗ СПИСКА I ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эрготамин
- 2) мезокарб
- 3) клоназепам
- 4) метамфетамин

## **НЕВЕРБАЛЬНЫМ ОБЩЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) общение между двумя или более людьми
- 2) словесное общение
- 3) общение с использованием мимики и жестов, позы, взгляда
- 4) передача письменной информации

## **ЕСЛИ СОБЕСЕДНИК ЭМОЦИОНАЛЕН, ВОЗБУЖДЕН ИЛИ ЗАТРУДНЯЕТСЯ В ФОРМУЛИРОВКЕ МЫСЛЕЙ, ТО ВАЖНО СЛУШАТЬ**

- 1) задавая наводящие вопросы
- 2) и попутно выяснить причину возбуждения
- 3) и выражать свое неудовольствие
- 4) молча, доброжелательно, не перебивать замечаниями

## **СРОКИ ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ (ДЕНЬ)**

- 1) 21-42
- 2) 7-10
- 3) 10-14
- 4) 14-21

### **ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА РЕАНИМАТОР ВСТАЕТ**

- 1) справа от пострадавшего
- 2) слева от пострадавшего
- 3) то слева, то справа от пострадавшего
- 4) в удобное для себя положение

### **РЕЦЕПТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 148-1/У-04(Л), ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ СО ДНЯ ОФОРМЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 60
- 2) 90
- 3) 45
- 4) 30

### **ПРИ НАЛИЧИИ СОЗНАНИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ**

- 1) попытаться успокоить пострадавшего, предложить ему воды
- 2) опросить пострадавшего и выяснить обстоятельства травмы
- 3) произвести обзорный осмотр на наличие кровотечения и произвести его остановку
- 4) дать понюхать пострадавшему аммиака водный раствор 10% для предупреждения потери сознания

### **К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Г ОТНОСЯТСЯ**

- 1) рентгенооперационные, в том числе ангиографические
- 2) кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов
- 3) комнаты управления рентгеновских кабинетов и радиологических отделений, фотолаборатории
- 4) послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных

### **ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ ОТРАЖЕНИЕМ ЦИТОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА В БИОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) содержание билирубина
- 2) активность щелочной фосфатазы
- 3) активность аланинаминотрансферазы
- 4) активность гаммаглутамилтранспептидазы

### **ЛИЦАМ, УСПЕШНО ОСВОИВШИМ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ВЫДАЕТСЯ**

- 1) сертификат
- 2) диплом
- 3) удостоверение
- 4) свидетельство

### **ПРИ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЗАСТОЙ КРОВИ**



**РАЗВИВАЕТСЯ В**

- 1) портальной системе
- 2) большом и малом кругах кровообращения
- 3) большом круге кровообращения
- 4) малом круге кровообращения

**ПРИ УВОЛЬНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО РЕГИСТРАТОРА РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ВЫДАТЬ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ \_\_\_\_\_ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА**

- 1) через 3 дня после
- 2) за 7 дней до
- 3) за 2 дня до
- 4) в день

**РЕБЕНОК 2-Х ЛЕТ ВНЕЗАПНО ЗАКАШЛЯЛ, ПОСИНЕЛ, КАШЕЛЬ ПРОДОЛЖАЛСЯ ОКОЛО 10 МИНУТ И БОЛЬШЕ НЕ ВОЗОБНОВЛЯ**

- 1) острая пневмония
- 2) стеноз гортани
- 3) инородное тело бронхов
- 4) обструктивный бронхит

**ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ ВЕДУТСЯ В ОТДЕЛЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ (В ГОДАХ)**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ЗАПОЛНЯЕТ ЖУРНАЛ**

- 1) отказа от госпитализации
- 2) учета работы бактерицидной лампы
- 3) перевязок
- 4) учета санитарно-просветительской работы

**РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОЗНАКОМИТЬ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ, С КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА \_\_\_\_\_ ДНЕЙ ДО СОГЛАСОВАННОЙ С МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДАТЫ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА**

- 1) 21
- 2) 10
- 3) 28
- 4) 14

**ПРИ ОЖОГАХ II-IV СТЕПЕНИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРОФИЛАКТИКУ**

- 1) кори
- 2) дифтерии
- 3) бешенства
- 4) столбняка

### **СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ И ДЫХАНИЙ НА ГРУДИНУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ**

- 1) на 5 компрессий - 1 вдох
- 2) на 6 компрессий - 3 вдоха
- 3) на 15 компрессий - 2 вдоха
- 4) на 30 компрессий - 2 вдоха

### **ЗАФИКСИРОВАТЬ ПОВРЕЖДЕННУЮ ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ, СОГНУТОЙ К ТУЛОВИЩУ, МОЖНО С ПОМОЩЬЮ \_\_\_\_\_ ПОВЯЗКИ**

- 1) косыночной
- 2) пращевидной
- 3) спиральной
- 4) круговой

### **КЕТГУТ В АМПУЛАХ ХРАНИТСЯ В РАСТВОРЕ**

- 1) спирта с глицерином
- 2) Люголя
- 3) йода
- 4) йода с глицерином

### **КОЛИЧЕСТВО СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ЗА ОДНУ МИНУТУ В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 60-80
- 2) 90-100
- 3) 40-60
- 4) 50-60

### **ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В СПИРТСОДЕРЖАЩИХ АНТИСЕПТИКАХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ПЕРЕД ОПЕРАТИВНЫМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) количество операций
- 2) количество суток в расчетном периоде
- 3) среднее число операций в сутки
- 4) среднее число операций в год

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ОТНОСИТСЯ К ПРОФИЛАКТИКЕ**

- 1) первичной
- 2) вторичной
- 3) третичной

4) специфической

**ЕСЛИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕВОЗМОЖНО НАЛОЖИТЬ ЖГУТ, ТО**

- 1) тампонирование раны позволяет избежать пальцевого прижатия артерий
- 2) необходимо введение непосредственно в рану раствора аминокaproновой кислоты
- 3) применяют пальцевое прижатие артерий
- 4) применение гемостатических губок или гемостатических салфеток позволяет избежать пальцевого прижатия артерии

**СКОРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕТСЯ ГРАЖДАНАМ В ФОРМЕ**

- 1) плановой и внеплановой
- 2) экстренной и неотложной
- 3) первичной и вторичной
- 4) круглосуточной

**В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ КОНТАМИНАЦИИ УСЛОВНО ЧИСТЫЕ РАНЫ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ КАК**

- 1) операционные раны со значительным нарушением техники стерильности или со значительной утечкой содержимого из желудочно-кишечного тракта
- 2) неинфицированные операционные раны без признаков воспаления
- 3) операционные раны, проникающие в дыхательные пути, пищеварительный тракт, половые или мочевыводящие пути при отсутствии необычного заражения
- 4) операционные раны, в которых микроорганизмы, вызвавшие послеоперационную инфекцию, присутствовали в операционном плане до начала операции

**СОТРУДНИКИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕНИИ ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИП**

- 1) грубости
- 2) снисхождения
- 3) высокомерия
- 4) взаимоуважения

**РЕКТОМАНОСКОПИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ**

- 1) эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишки
- 2) рентгенологическое исследование толстой кишки
- 3) эндоскопическое исследование толстой кишки
- 4) рентгенологическое исследование прямой и сигмовидной кишки

**АСТМА ФИЗИЧЕСКОГО УСИЛИЯ ВОЗНИКАЕТ**

- 1) после физической нагрузки
- 2) во время физической нагрузки
- 3) на фоне длительного приема НПВП

4) с сезонной периодичностью

**ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДИАГНОЗ «ПНЕВМОНИЯ» ПОДТВЕРЖДАЕТ**

- 1) усиление легочного рисунка
- 2) расширение корней легких
- 3) эмфизема легких
- 4) наличие инфильтративных теней

**ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА НОВООБРАЗОВАНИЕ НАЧИНАЮТ С**

- 1) флюорографии
- 2) маммографии
- 3) пункционной биопсии
- 4) рентгенографии

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВТОРУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 12
- 2) 8
- 3) 4,5
- 4) 9

**ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛИЦА**

- 1) административно-хозяйственной части
- 2) отдела кадров
- 3) ответственного за работу по профилактике ВБИ
- 4) планово-финансового отдела

**ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТНОСЯТ К ПОМЕЩЕНИЯМ КЛАССА ЧИСТОТЫ**

- 1) В
- 2) Г
- 3) Б
- 4) А

**ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРТОПНОЭ ПАЦИЕНТЫ ПРИНИМАЮТ**

- 1) при почечной колике
- 2) при застое в малом круге кровообращения, сердечной астме
- 3) при обострении язвенной болезни
- 4) при приступе аппендицита

**ОПТИМАЛЬНЫМ СПОСОБОМ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) внутривенное введение адреналина

- 2) ингаляция кислорода
- 3) ингаляторное введение глюкокортикостероида
- 4) внутривенное введение эуфиллина

**ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА ТУБЕРКУЛИН У БОЛЬНЫХ КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) плохим прогностическим признаком
- 2) признаком хорошей переносимости препаратов
- 3) проявлением вторичного иммунодефицита
- 4) хорошим прогностическим признаком

**В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК \_\_\_\_\_ ПРЕКУРСОРОВ**

- 1) I
- 2) II
- 3) III
- 4) IV

**КАРДИОГЕННЫЙ ШОК ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ**

- 1) при первом инфаркте миокарда
- 2) при повторном инфаркте
- 3) четкой закономерности не выявляется
- 4) частота возникновения этого осложнения одинакова при первом и при повторном инфаркте миокарда

**ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТОВ ИЗ ВТОРОЙ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ В ПЕРВУЮ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О(ОБ)**

- 1) эффективности диспансерного наблюдения
- 2) индексе здоровья населения
- 3) своевременности охвата диспансерным наблюдением больных
- 4) полноту охвата диспансерным наблюдением

**ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЫДАЧУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ, СТЕРИЛИЗУЮЩИХ СРЕДСТВ В ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТ**

- 1) главная медицинская сестра
- 2) лицо, ответственное за хранение дезинфицирующих средств
- 3) заместитель руководителя по экономическим вопросам
- 4) заместитель руководителя по эпидемиологической работе

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) НАЗНАЧАЮТ ПРИ**

- 1) появлении кровохарканья
- 2) нарастании одышки

- 3) усилении кашля
- 4) гнойной мокроте

**ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СТАЦИОНАРОВ (ОТДЕЛЕНИЙ) ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ПРОВОДЯТ**

- 1) 1 раз в 3 года
- 2) по показаниям
- 3) 2 раза в год
- 4) ежегодно

**К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) морозильник
- 2) шкаф
- 3) холодильник
- 4) термоконтейнер

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА, ПРОВОДЯТ ПО**

- 1) инициативе работодателя
- 2) приказу Минздрава РФ
- 3) решению профсоюзной организации
- 4) инициативе работника

**ГОТОВНОСТЬ СТОРОН К ПОИСКУ ВЗАИМОВЫГОДНОГО ИЛИ ВЗАИМОПРИЕМЛЕМОГО РЕШЕНИЯ С УЧЁТОМ ИНТЕРЕСОВ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ЭТАПА**

- 1) взаимной ориентации в проблеме
- 2) подготовки установления контакта
- 3) поиска решения
- 4) заключения соглашения

**ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ У ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО**

- 1) положить грелку на живот
- 2) положить пузырь со льдом на живот
- 3) поставить масляную клизму
- 4) промыть желудок

**ПРЕКУРСОРОМ ИЗ СПИСКА IV ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дезоморфин
- 2) эфедрин
- 3) петидин
- 4) метадона промежуточный продукт

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) микоплазма
- 2) стрептококк
- 3) клебсиелла пневмонии
- 4) гемофильная палочка

#### **У ДЕТЕЙ АНАТОМИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА ПРОИСХОДИТ**

- 1) к 12 месяцам жизни
- 2) к рождению
- 3) к 2 месяцам жизни
- 4) к 6 месяцам жизни

#### **ИНФИЦИРОВАННЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНФИЦИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ ОТНОСЯТ К КЛАССУ**

- 1) Д
- 2) В
- 3) Б
- 4) Г

#### **НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ИЗ СПИСКА I ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) омнопон
- 2) бупренорфин
- 3) ацетиллированный опий
- 4) дигидрокодеин

#### **ДЕЗИНФЕКЦИЯ МНОГОРАЗОВЫХ ЕМКостей ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ**

- 1) 1 раз в 2 дня
- 2) еженедельно
- 3) каждые 8 часов
- 4) ежедневно

#### **ПОДКЛАДНОЕ СУДНО ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ПОГРУЖЕНИЕМ В РАСТВОР**

- 1) этилового спирта
- 2) моющий
- 3) дезинфицирующий
- 4) перекиси водорода

#### **ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЗЯТИЯ КРОВИ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ЗАПОЛНЯЕТ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА**

- 1) операционная
- 2) палатная
- 3) процедурная
- 4) старшая

#### **ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) диазепам
- 2) феназепам
- 3) налоксон
- 4) афобазол

### **ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) боль за грудиной продолжительностью более 20 минут
- 2) низкое артериальное давление
- 3) брадикардия или тахикардия
- 4) холодный пот и резкая слабость

### **КОММУНИКАТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) восприятием друг друга
- 2) познанием друг друга
- 3) обменом действиями
- 4) обменом информацией

### **ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ПРИСТУП ПРИ ЭПИЛЕПСИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) отсутствием судорожного компонента
- 2) генерализованными сенсорными эквивалентами
- 3) импульсивным влечением
- 4) нарушением сознания

### **КРИТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ**

- 1) острой дыхательной недостаточности
- 2) кишечной непроходимости
- 3) коллапса
- 4) острого коронарного синдрома

### **ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО**

- 1) уложить на ровную поверхность с возвышенным головным концом
- 2) усадить, запрокинув голову назад
- 3) усадить, слегка наклонив голову вперед
- 4) уложить на бок

### **СИНДРОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- 1) заболеваний почечных артерий
- 2) нейрогенного мочевого пузыря
- 3) камня мочевого пузыря
- 4) пузырно-мочеточникового рефлюкса

### **РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) массивное затемнение легочной ткани, состоящее из очагов, фокусов, сливающихся между собой, неоднородная структура тени за счет участков распада
- 2) уменьшенная в объеме, гомогенно затемненная доля легкого, выраженная



реакция плевры, единичные очаги в окружающей легочной ткани

3) тень с размытыми контурами, малой интенсивности, однородной структуры, неизмен?нная окружающая легочная ткань

4) тень высокой интенсивности в пределах одного-двух сегментов с участками просветления и расширенная тень средостения

### **ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ**

1) горизонтальное

2) полусидя, с опущенными вниз ногами

3) горизонтальное с приподнятым головным концом

4) горизонтальное с приподнятым ножным концом

### **В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА**

1) С

2) D

3) E

4) B

### **ГЕМОСТАЗ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

1) склонностью к спонтанным кровотечениям

2) активацией факторов гипокоагуляции

3) активацией факторов фибринолиза

4) высокой адгезивностью и агрегацией тромбоцитов

### **ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ**

1) могут отсутствовать симптомы со стороны кожных покровов

2) всегда имеются уртикарные высыпания

3) всегда имеются ангиоотеки

4) всегда имеется гиперемия кожи лица

### **ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ КАЛ БЫВАЕТ**

1) кровянистый

2) жирный

3) дегтеобразный

4) обесцвеченный

### **ПО СТЕПЕНИ НОРМИРУЕМОГО МИКРОБНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ КЛАССЫ ЧИСТОТЫ А ОТМЕЧАЕТСЯ КАК**

1) «грязное» помещение, количество микроорганизмов не нормируется

2) условно чистое помещение, количество микроорганизмов не нормируется

3) особо чистое помещение

4) чистое помещение

### **МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ПЕРЕД РАБОТНИКОМ НЕ**

### **ПРЕДУСМОТРЕНА В СЛУЧАЕ**

- 1) задержки выплаты заработной платы
- 2) ущерба, причиненного работнику при следовании на работу на транспорте, представленном организацией
- 3) ущерба, причиненного работнику при следовании на работу на общественном транспорте
- 4) возмещения морального вреда, причиненного работнику

### **ТЕРМИН «ДЕЛОВАЯ СУБОРДИНАЦИЯ» ОЗНАЧАЕТ**

- 1) демократизм в отношении коллег
- 2) распоряжения старшего по должности являются обязательными для подчиненных
- 3) неподчинение старшему по должности
- 4) подчинение коллегам

### **ПОЛНУЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕСЕТ**

- 1) буфетчица
- 2) сестра-хозяйка
- 3) процедурная медицинская сестра
- 4) палатная медицинская сестра

### **К АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ**

- 1) свистящие хрипы на выдохе
- 2) бронхиальное дыхание
- 3) амфорическое дыхание
- 4) влажные звонкие мелкопузырчатые хрипы

### **НА ЭТАПЕ ЗАБОРА КРОВИ К ГЕМОЛИЗУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ**

- 1) неправильный порядок заполнения вакуумных пробирок кровью
- 2) обработка места венепункции спиртом
- 3) длительное наложение жгута
- 4) использование вакуумных пробирок

### **ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО К РАЗДЕЛАМИ ДЕМОГРАФИИ ОТНОСЯТ**

- 1) кинетику и механику
- 2) динамику и статику
- 3) генетику и физику
- 4) тектонику и геномику

### **ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К СДАЧЕ АНАЛИЗА КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ НЕОБХОДИМО**

- 1) исключить из пищи железосодержащие продукты, не чистить зубы при кровоточивости десен в течение 3-х дней до исследования
- 2) исключить специальную подготовку

- 3) накануне исследования съесть легкий ужин
- 4) накануне исследования вечером сделать очистительную клизму

### **ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКИМ ОРГАНОМ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) Федеральное агентство по статистике
- 2) Счетная палата
- 3) Государственный комитет статистики
- 4) Федеральная служба государственной статистики

### **ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ ПОРЦИОННИК НА ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ (№ 1-84)**

- 1) 2 раза в день
- 2) 1 раз в неделю
- 3) перед каждым приемом пищи
- 4) ежедневно

### **ТАКТИКА МЕДРАБОТНИКА ПРИ ВЫПАДЕНИИ СЛИЗИСТОЙ ПРЯМОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТА**

- 1) примочки с теплым раствором фурацилина
- 2) введение прозерина
- 3) введение спазмолитиков
- 4) вправление слизистой прямой кишки

### **ОСОБЕННОСТЬЮ АУСКУЛЬТАТИВНОЙ КАРТИНЫ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) акцент II тона на аорте
- 2) физиологическая брадикардия
- 3) приглушенность тонов
- 4) физиологическая тахикардия

### **ВЕДУЩИМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) pH-метрия
- 2) УЗИ брюшной полости
- 3) рентгеноскопия
- 4) эндоскопия

### **СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ**

- 1) экспираторная одышка
- 2) инспираторная одышка
- 3) уменьшение одышки в горизонтальном положении
- 4) кашель

### **ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В МЕЖПРИСТУПНЫЙ ПЕРИОД ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) электросонтерапия
- 2) дарсонвализация

- 3) климатотерапия
- 4) аэрофитотерапия

**ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ С ТРАВМОЙ КОНЕЧНОСТИ, В РАНЕ КОТОРОГО – ТОРЧАЩИЙ ОБЛОМОК СТЕКЛА, НЕОБХОДИМО**

- 1) наложение повязки из чистой ткани поверх обломка
- 2) срочное извлечение обломка
- 3) принятие мер по обездвиживанию пораженной конечности
- 4) дать пострадавшему обезболивающее лекарство

**ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

- 1) функционального состояния почек
- 2) количества форменных элементов осадка мочи
- 3) микрофлоры мочи
- 4) суточной глюкозурии

**ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) биологическая смерть
- 2) отсутствие сознания
- 3) клиническая смерть
- 4) анафилаксия

**ПРИ ПОДСЧЕТЕ ХЛЕБНЫХ ЕДИНИЦ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ УЧИТЫВАЕТСЯ**

- 1) капуста
- 2) сливочное масло
- 3) кефир
- 4) творог

**ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЕ ВЕДОМОСТИ ПОДПИСЫВАЮТ**

- 1) только члены инвентаризационной комиссии
- 2) только материально-ответственные лица
- 3) члены инвентаризационной комиссии и материально-ответственные лица
- 4) заведующий отделением

**ПРЕДЕЛОМ ОГРАНИЧЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКА ПЕРЕД РАБОТОДАТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) средний месячный заработок
- 2) 100 минимальных размеров оплаты труда
- 3) 60 000 рублей
- 4) величина прожиточного минимума в регионе

**ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ В ОДНУ СМЕНУ ОПРЕДЕЛЯЕТ**

- 1) удовлетворенность населения медицинской помощью
- 2) мощность поликлиники

- 3) эффективность первичной медико-санитарной помощи
- 4) категорию стационара

### **ТВЕРДЫЙ, НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) гипертоническом кризе
- 2) кардиогенном шоке
- 3) коллапсе
- 4) обмороке

### **В ОРГАНЫ ЗАГС ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ СМЕРТИ РЕБЕНКА, НАСТУПИВШЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 168 ЧАСОВ ЖИЗНИ, МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОФОРМЛЯЮТ**

- 1) свидетельство о смерти
- 2) медицинское свидетельство о перинатальной смерти
- 3) историю болезни новорожденного
- 4) выписку из истории болезни новорожденного

### **ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ПЕРВОЙ СТАДИИ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ОТ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рефрактерность к использованию ингаляционных  $\beta_2$ -агонистов
- 2) появление цианоза носогубного треугольника
- 3) аускультация свистящих хрипов
- 4) изменение гемодинамических показателей

### **ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) лейкоцитурия, протеинурия, бактериурия
- 2) гематурия, глюкозурия, цилиндрурия
- 3) гематурия, протеинурия, цилиндрурия
- 4) лейкоцитурия, протеинурия, цилиндрурия

### **ПОД РОТАЦИЕЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ПОНИМАЮТ**

- 1) замену дезинфицирующего средства на препарат другой группы
- 2) смену дезинфицирующего средства в пределах группы
- 3) переход от химической дезинфекции к аппаратным методам обеззараживания
- 4) одновременное использование дезинфицирующих средств нескольких групп

### **ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АНЕВРИЗМЫ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) длительный подъем ST выше изолинии («застывшая» ЭКГ)
- 2) коронарный зубец T в соответствующих отведениях
- 3) снижение амплитуды зубца R в соответствующих отведениях
- 4) появление зубца Q в соответствующих отведениях

### **КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ КОЛЛАПСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гиперемия кожи
- 2) артериальная гипертония
- 3) артериальная гипотония

4) гиперкинез

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКОГО АНТРАЛЬНОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дуоденогастральный рефлюкс
- 2) хеликобактериоз
- 3) анацидность
- 4) травма слизистой оболочки желудка

**ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ И ПАЦИЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ**

- 1) докладом
- 2) сообщением
- 3) выступлением
- 4) общением (коммуникацией)

**НАИБОЛЕЕ ОПАСЕН \_\_\_\_\_ ТОК ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 500 ВОЛЬТ**

- 1) постоянный
- 2) переменный
- 3) индуктивный
- 4) импульсный

**НЕЗАВИСИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ**

- 1) введение антибиотиков
- 2) проведение оксигенотерапии
- 3) введение эуфиллина
- 4) в проведении отвлекающих процедур

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА КАЖДЫЕ**

- 1) 24 часа
- 2) 12 часов
- 3) 2 часа
- 4) 6 часов

**ДЛЯ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА НЕ ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ**

- 1) лихорадки
- 2) менингеальных симптомов
- 3) пареза конечностей
- 4) рвоты

**ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В МЕЖПРИСТУПНОМ ПЕРИОДЕ ПРОВОДЯТ**

- 1) бронхоскопию

- 2) кожные пробы
- 3) бронхографию
- 4) компьютерную томографию

**МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ (АЛКОГОЛИЗМ, НАРКОМАНИЯ) ВКЛЮЧАЕТ РАБОТУ**

- 1) нарколога, психолога, социального работника
- 2) терапевта, медицинской сестры, врача-инфекциониста
- 3) клинического психолога, фельдшера ФАП
- 4) главного врача психиатрического стационара, социального работника

**ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ, СТЕРИЛИЗУЮЩИХ СРЕДСТВ ПРОВОДИТ**

- 1) заведующий структурным подразделением
- 2) заместитель руководителя медицинской организации по эпидемиологической работе
- 3) главная медицинская сестра
- 4) старшая медицинская сестра структурного подразделения

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ УЧИТЫВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО НЕСНИЖАЕМОГО ЗАПАСА В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_ % ОТ ГОДОВОГО РАСХОДА**

- 1) 30
- 2) 10
- 3) 20
- 4) 25

**ПЛАНОВЫМ ПРИВИВКАМ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА ПОДЛЕЖАТ**

- 1) люди, проживающие в сельской местности
- 2) члены семей охотников
- 3) население территорий энзоотичных по бешенству
- 4) ветеринары

**АМПУЛУ С ЖИВОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНОЙ, НАХОДИВШУЮСЯ НА ПРИВИВОЧНОМ СТОЛЕ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ +25°C НЕОБХОДИМО**

- 1) использовать после исследования ее иммуногенных свойств
- 2) использовать после охлаждения в холодильнике
- 3) использовать после проведения бракеража
- 4) утилизировать

**САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) атеросклероз коронарных артерий
- 2) «мышечный» мостик
- 3) коронариит

4) гипертрофия левого желудочка

**ПРИЧИНОЙ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОЗДУХА В РАНУ ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ РАНЕНИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) зияние раны грудной клетки
- 2) выход воздуха в рану из поврежденного легкого
- 3) создание в плевральной полости на вдохе отрицательного (по отношению к атмосферному) давления
- 4) создание в плевральной полости на вдохе положительного (по отношению к атмосферному) давления

**ПРИ НАЛОЖЕНИИ ТУГИХ ПОВЯЗОК СУСТАВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ФИКСИРУЮТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ**

- 1) в том положении, в котором находится пораженный сустав
- 2) только в положении максимального сгибания сустава
- 3) разгибания
- 4) сгибания

**ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ**

- 1) секреции инсулина
- 2) секреции глюкагона
- 3) синтеза антидиуретического гормона в задней доле гипофиза
- 4) синтеза антидиуретического гормона в ядрах гипоталамуса

**ЭОЗИНОФИЛИЯ В МОКРОТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**

- 1) пневмонии
- 2) острого бронхита
- 3) бронхиальной астмы
- 4) хронического бронхита

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ БЦЖ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) аллергическая реакция на пекарские дрожжи
- 2) недоношенность
- 3) дисбактериоз
- 4) анемия

**ПРИ МЕНИНГОКОККОВОМ МЕНИНГИТЕ В СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) нейтрофильный плеоцитоз
- 2) лимфоцитарный плеоцитоз
- 3) повышенное содержание эритроцитов
- 4) смешанный плеоцитоз

**РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ РАБОТНИКА ОБ УВОЛЬНЕНИИ В СВЯЗИ С СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА \_\_\_\_\_ МЕСЯЦА ДО**



## **УВОЛЬНЕНИЯ**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 6
- 4) 4

## **В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТРАВМУ ПОЗВОНОЧНИКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛУЧШЕ ВЫПОЛНЯТЬ**

- 1) волоком, с фиксацией головы и шеи руками
- 2) на мягких носилках
- 3) на твердой ровной поверхности (на табельном или импровизированном щите)
- 4) силами двух участников оказания первой помощи – пострадавший сидит на замке из четырех их рук

## **ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ**

- 1) рентгенологически подтвержденного легочного инфильтрата
- 2) температуры тела пациента выше 38 °С
- 3) гнойной мокроты
- 4) лейкоцитоза

## **ГНОЙНЫЙ МЕНИНГИТ НЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ**

- 1) энтеровирусной инфекции
- 2) брюшном тифе
- 3) сальмонеллезе
- 4) стафилококковом сепсисе

## **ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОП ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК**

- 1) пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
- 2) тонкой кишки, восходящего и нисходящего отделов поперечно-ободочной толстой кишки
- 3) сигмовидной кишки, прямой кишки и ануса
- 4) почечных лоханок, мочеточников и мочевого пузыря

## **ПРАВИЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ БУКВЫ «С» ИЗ ТРЕХ БУКВ - АВС, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РЕАНИМАЦИИ ПО САФАРУ**

- 1) «circulation» - обеспечение циркуляции крови по сосудам
- 2) «callanambulance» - вызвать службу «скорой помощи»
- 3) «close» - закрыть чистой тканью раневые и ожоговые поверхности
- 4) «check» - определение пульса на сонной артерии

## **ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗВИВАЕТСЯ**

- 1) желудочковая экстрасистолия
- 2) синусовая брадикардия

- 3) мерцательная аритмия
- 4) фибрилляция желудочков

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ ПАЛАТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В**

- 1) 2 месяца
- 2) полугодие
- 3) квартал
- 4) 1 месяц

**БАЗОВЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ ИНСТРУКТОРА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) медико-профилактическое дело
- 2) лабораторное дело
- 3) гигиеническое воспитание
- 4) гигиена и санитария

**ГРЕЛКУ ЗАПОЛНЯЮТ ВОДОЙ НА (ЧАСТЬ ОБЪЕМА)**

- 1) 1/3
- 2) 3/4
- 3) 2/3
- 4) 1/2

**К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» ОТНОСИТСЯ**

- 1) термоиндикатор
- 2) хладоэлемент
- 3) гигрометр
- 4) пульсоксиметр

**К РАБОТАМ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССОВ Б И В ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРСОНАЛ, ИММУНИЗИРОВАННЫЙ ПРОТИВ**

- 1) дифтерии
- 2) гепатита В
- 3) кори
- 4) туберкулеза

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПЕРВУЮ РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 3
- 2) 18
- 3) 12
- 4) 19

### **СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИ РАНЕНИИ В ЗАТЫЛОК –**

- 1) лежа на животе
- 2) в полусидящем положении
- 3) лежа на спине
- 4) лежа на боку

### **ИСПРАВЛЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ФОРМЕ № 025/У «МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ» ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ**

- 1) подписью врача, заполняющего карту
- 2) подписью главного врача
- 3) подписью заведующего отделением
- 4) решением врачебной комиссии

### **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ СИСТЕМНЫХ (ПЕРОРАЛЬНЫХ) ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ПРИ ХОБЛ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 3 дня
- 2) 10-14 дней
- 3) 1 год
- 4) 1-3 месяца

### **ПРИ ОЦЕНКЕ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО К ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТ**

- 1) региональный внутренний продукт
- 2) прожиточный минимум
- 3) средний доход на душу населения
- 4) качество жизни населения

### **КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ДОЛЕВОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) одышка
- 2) коробочный оттенок перкуторного звука
- 3) сухие хрипы с обеих сторон
- 4) регионарный лимфаденит

### **ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ**

- 1) легочное кровотечение
- 2) печеночная кома
- 3) остеопороз
- 4) потеря зрения

### **ПОД ПРИЗНАКАМИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ПОНИМАЮТ**

- 1) зрачок не реагирует на свет
- 2) резкое снижение мышечного тонуса, расширение зрачка
- 3) остановка дыхания и сердечной деятельности

4) трупное окоченение, трупные пятна, «кошачий глаз»

### **ОСНОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИММУНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проведение серологического мониторинга
- 2) обеспечение «холодовой цепи»
- 3) проведение радиационного мониторинга
- 4) проведение эпидемиологического мониторинга

### **ПОВТОРНОСТЬ ОБРАЩЕНИЙ ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ ЗАБОЛЕВАНИЮ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ**

- 1) (общее число обращений в медицинскую организацию с данным диагнозом) / (число всех зарегистрированных заболеваний)
- 2) (общее число обращений) / (число всех зарегистрированных больных)
- 3) (общее число посещений медицинской организации с данным диагнозом) / (число заболеваний с этим же диагнозом)
- 4) (общее число обращений в медицинскую организацию с данным диагнозом) / (число заболеваний с этим же диагнозом)

### **К НЕЙРОИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ**

- 1) энтеровирусную экзантему
- 2) энтеровирусную миалгию
- 3) энтеровирусную лихорадку
- 4) энтеровирусный менингит

### **ДЛЯ МЕНИНГИТА ХАРАКТЕРЕН СИМПТОМ**

- 1) Грефе
- 2) Филатова-Коплика
- 3) Падалки
- 4) Кернига

### **ПОСТРАДАВШЕМУ С ТРАВМОЙ ГРУДИ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) полусидячее с наклоном в пораженную сторону
- 2) на спине с приподнятыми ногами
- 3) устойчивое боковое
- 4) на спине с полусогнутыми и разведенными ногами

### **БИОЛОГИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЛИЧИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кровь
- 2) моча
- 3) слюна
- 4) кал

**ОСТРЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) инспираторной одышкой
- 2) экспираторной одышкой
- 3) притуплением перкуторного звука
- 4) влажными мелкопузырчатыми хрипами

**ПОЛЫМ РЕЗИНОВЫМ ИЗДЕЛИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кружка резиновая ирригаторная
- 2) пузырь формовой для льда, диаметром 250 мм
- 3) пузырь для льда для горла
- 4) перчатки резиновые хирургические №8

**ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К КИСЛОРОДНОМУ БАЛЛОНУ ОДЕЖДОЙ ИЛИ РУКАМИ С**

- 1) водой с мылом
- 2) хлорамином и формалином
- 3) маслом и спиртом
- 4) водой

**РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАМКАХ ПЕРВОГО ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ**

- 1) колоноскопия
- 2) ректороманоскопия
- 3) компьютерная томография легких
- 4) взятие мазка с шейки матки у женщин

**ОПРЕДЕЛИТЕ СТЕПЕНЬ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА, ЕСЛИ НА ОБОЖЖЕННОМ УЧАСТКЕ НА ФОНЕ ГИПЕРЕМИИ КОЖИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ МУТНЫЕ ГЕМОМРАГИЧЕСКИЕ ПУЗЫРИ, ОБРЫВКИ ВСКРЫВШИХСЯ ПУЗЫРЕЙ, СТРУПЫ, ПОСТРАДАВШИЙ ЖАЛУЕТСЯ НА БОЛЬ**

- 1) III
- 2) II
- 3) I
- 4) IV

**ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ МАЛОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ГИПЕРТРОФИЯ**

- 1) левого желудочка
- 2) правого желудочка
- 3) правого предсердия
- 4) левого предсердия

**НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ИЗ СПИСКА II ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) этиламфетамин
- 2) фенетиллин

- 3) лоразепам
- 4) кодеин

**МОЧУ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО СОБИРАЮТ В**

- 1) отдельные чистые емкости в зависимости от времени суток
- 2) стерильную пробирку объемом 10 мл
- 3) контейнер для мочи
- 4) чистую пробирку объемом 10 мл

**В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПОРЯДКОМ И СРОКАМИ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ДОЛЖНА ИМЕТЬ СТАЖ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ (В ГОДАХ)**

- 1) 1,5
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 3

**ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ПРОВОДЯТ С РАБОТНИКАМИ**

- 1) временными командировочными
- 2) при введении новых правил или стандартов
- 3) принятыми впервые
- 4) при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями

**ОСАНКА – ЭТО**

- 1) искривление позвоночника вперед
- 2) искривление позвоночника вправо или влево
- 3) искривление позвоночника назад
- 4) привычная поза человека

**ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА ПРОВОДЯТ**

- 1) рентгенологическое исследование
- 2) антропометрию
- 3) эндоскопическое исследование
- 4) ультразвуковое исследование

**ДИАГНОЗ «ВНУТРИУТРОБНАЯ ПНЕВМОНИЯ» ПРАВОМОЧЕН ТОЛЬКО ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ЖИЗНИ РЕБЕНКА**

- 1) первых трех суток
- 2) первых двух часов
- 3) первых суток
- 4) первой недели

**В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПАРАЗИТОЗА МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАПРАВЛЯЮТ ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ТЕЧЕНИЕ (В ЧАСАХ)**

- 1) 24
- 2) 12
- 3) 72
- 4) 48

**ЖИЗНЕННАЯ ЁМКОСТЬ ЛЁГКИХ ИЗМЕРЯЕТСЯ**

- 1) спирометром
- 2) тонометром
- 3) барометром
- 4) анемометром

**К РАЗВИТИЮ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ**

- 1) психоэмоциональный стресс
- 2) физическое переутомление
- 3) постельный режим
- 4) перегревание

**СВОЙСТВО ПУЛЬСА, КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВОМ ПУЛЬСОВЫХ ВОЛН В 1 МИНУТУ**

- 1) напряжение
- 2) ритм
- 3) наполнение
- 4) частота

**ДЛЯ АНАЛИЗА МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ**

- 1) среднюю часть струи мочи
- 2) за сутки – 8 порций
- 3) всю утреннюю мочу
- 4) всю суточную мочу в одну емкость

**СОГЛАСНО П.4 СТ. 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.11.2011 ГОДА № 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ \_\_\_\_\_, ПРОШЕДШИЙ ОБУЧЕНИЕ И(ИЛИ) ИМЕЮЩИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАВЫКИ**

- 1) имеет право только медицинский работник
- 2) имеет право любой гражданин
- 3) обязан любой гражданин
- 4) только взрослым пострадавшим имеет право любой гражданин

## **ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПОСТРАДАВШЕГО НЕОБХОДИМО**

- 1) повернуть его голову набок, открыть ему рот
- 2) очистить его ротовую полость пальцами, обмотанными платком или бинтом
- 3) запрокинуть его голову, положив одну руку на лоб и подняв подбородок двумя пальцами другой руки
- 4) открыть его рот и аккуратно извлечь язык из ротовой полости

## **КАБИНЕТЫ ВРАЧЕЙ, ПОМЕЩЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ОТНОСЯТ К ПОМЕЩЕНИЯМ КЛАССА ЧИСТОТЫ**

- 1) А
- 2) В
- 3) Г
- 4) Б

## **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

- 1) бронхография
- 2) бронхоскопия
- 3) спирография
- 4) флюорография

## **К ПОМЕЩЕНИЯМ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ**

- 1) производственные помещения аптечных организаций
- 2) сестринские посты в отделениях
- 3) кабинеты главных и старших медицинских сестер
- 4) помещения производителей наркотических средств

## **ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ПИЩЕЙ ВОРОНКИ, СОЕДИНЕННОЙ С ЗОНДОМ, ВОРОНКУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПУСКАЮТ НА УРОВЕНЬ**

- 1) груди
- 2) лица
- 3) пупка
- 4) желудка

## **ПРИТУПЛЕНИЕ ПЕРКУТОРНОГО ЗВУКА И УСИЛЕНИЕ ГОЛОСОВОГО ДРОЖАНИЯ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ**

- 1) бронхиальной астмы
- 2) экссудативного плеврита
- 3) острого бронхита
- 4) долевой пневмонии

## **КОНТРАСТНОЕ ВЕЩЕСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ**

- 1) колоноскопии
- 2) УЗИ органов брюшной полости



- 3) холецистографии
- 4) фиброгастродуоденоскопии

**ПЕРЕД ЛЕКАРСТВЕННОЙ КЛИЗМОЙ ЗА 20-30 МИНУТ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ КЛИЗМУ**

- 1) масляную
- 2) очистительную
- 3) гипертоническую
- 4) сифонную

**ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НАРУШЕНА ЭНДОКРИННАЯ ФУНКЦИЯ**

- 1) поджелудочной железы
- 2) печени
- 3) гипофиза
- 4) щитовидной железы

**ДОПУСК ЛИЦ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СВОИМИ ТРУДОВЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ДОСТУП К НАРКОТИЧЕСКИМ И ПСИХОТРОПНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- 1) территориальный орган Росздравнадзора
- 2) органы государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья
- 3) руководитель медицинской организации
- 4) лицензионная комиссия

**ЛИЦАМ, УСПЕШНО ОСВОИВШИМ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ВЫДАЕТСЯ**

- 1) свидетельство
- 2) сертификат
- 3) удостоверение
- 4) диплом

**ТЕСТ-ПОЛОСКИ НА НАЛИЧИЕ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ В МОЧЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА**

- 1) мочекаменную болезнь
- 2) сахарный диабет
- 3) гломерулонефрит
- 4) цистит и уретрит

**ВТОРЫМ ЭТАПОМ СИСТЕМЫ СБОРА, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы
- 2) захоронение или уничтожение медицинских отходов
- 3) обеззараживание отходов
- 4) перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на

территории организации, образующей отходы

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ИМЕЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, НЕ ПОВЛЕКШИЕ ОТСТАВАНИЕ ОТ СВЕРСТНИКОВ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ**

- 1) специальной подгруппе «А»
- 2) специальной подгруппе «Б»
- 3) подготовительной
- 4) основной

**ПАЦИЕНТА С АСТМАТИЧЕСКИМ СТАТУСОМ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В**

- 1) плановом порядке в пульмонологическое отделение
- 2) экстренном порядке в отделение реанимации
- 3) плановом порядке в терапевтическое отделение
- 4) экстренном порядке в отделение пульмонологии

**ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) ингаляционный кортикостероид
- 2) бета-2-агонист короткого действия
- 3) оральный кортикостероид
- 4) теофиллин короткого действия

**К ФИЗИКАЛЬНЫМ СИМПТОМАМ ХОБЛ ОТНОСЯТ**

- 1) крепитацию
- 2) сухие хрипы
- 3) притупление перкуторного звука в проекции доли легкого
- 4) шум трения плевры

**ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ПРОВОДЯТ**

- 1) ежегодно
- 2) при приеме на работу
- 3) 1 раз в 6 месяцев
- 4) при введении новых стандартов и изменении технических процессов

**МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПРИСВОЕНИЕ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ ГОД/ГОДА СО ДНЯ ИЗДАНИЯ ПРИКАЗА О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ**

- 1) 2
- 2) 1,5
- 3) 1
- 4) 3

## **ВИРУС ГЕПАТИТА В - ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА**

- 1) печени
- 2) желудка
- 3) пищевода
- 4) яичников

## **КОММУНИКАТИВНОЙ ПОЗИЦИЕЙ, ПОВЫШАЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ, СЧИТАЕТСЯ**

- 1) расслабленная
- 2) закрытая
- 3) открытая
- 4) отстранённая

## **«ЗОЛОТЫМ» СТАНДАРТОМ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) водные
- 2) спиртовые
- 3) анионные
- 4) гелеобразные

## **ВОЗБУДИТЕЛЕМ СЕРОЗНОГО МЕНИНГИТА МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) менингококк
- 2) энтеровирус
- 3) коклюшная палочка
- 4) вирус гепатита А

## **МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССА А ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы
- 2) токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности
- 3) эпидемиологически опасные отходы
- 4) эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твёрдым бытовым отходам

## **ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ УРОВНЯ**

- 1) альбумина
- 2) аланинаминотрансферазы
- 3) холестерина
- 4) щелочной фосфатазы

## **ВЫПУСКНИК МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА, УСПЕШНО ПРОШЕДШИЙ ПЕРВИЧНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ», МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К РАБОТЕ В ДОЛЖНОСТИ \_\_\_\_\_**

- 1) зубной техник
- 2) старший зубной техник
- 3) гигиенист стоматологический

4) зубной врач

**НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ КРАСНУХЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) менингоэнцефалит
- 2) пневмония
- 3) миокардит
- 4) артрит

**ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДЕТ УЧЕТНО-ОТЧЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПОЛУЧЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ, СТЕРИЛИЗУЮЩИХ СРЕДСТВ, СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ И КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ**

- 1) заведующий структурным подразделением
- 2) медицинская сестра, ответственная за хранение дезинфицирующих средств
- 3) руководитель медицинской организации
- 4) старшая медицинская сестра структурного подразделения

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ДЕКОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 1, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) инфекция
- 2) несоответствие дозы инсулина уровню гликемии
- 3) физическая нагрузка
- 4) эмоциональный стресс

**К ВОЗБУДИТЕЛЯМ СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ ОТНОСЯТ**

- 1) синегнойную палочку
- 2) сальмонеллы
- 3) энтеровирусы
- 4) стафилококки

**СРОК ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (В ДНЯХ)**

- 1) 21-42
- 2) 7-10
- 3) 10-14
- 4) 14-21

**ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «МЕНИНГОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- 1) копрограмма
- 2) бактериологический анализ кала
- 3) бактериологический анализ ликвора
- 4) общий анализ мочи

**НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ПНЕВМОНИЮ, ВОЗНИКШУЮ**

- 1) у ранее не леченного человека
- 2) позднее 48 часов после госпитализации человека
- 3) у беременной женщины после 20 недель беременности
- 4) у больного, лечившегося в домашних условиях от другого заболевания

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (ВОЗ) МОЖНО НАЙТИ В**

- 1) справочнике лекарственных средств
- 2) регистре лекарственных средств
- 3) классификаторе лекарственных средств
- 4) общероссийском классификаторе продукции

**ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМА БОЛЬНЫХ И ОТКАЗОВ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ВЕДЕТСЯ В**

- 1) приемном отделении
- 2) каждом диагностическом отделении
- 3) каждом кабинете
- 4) поликлинике

**ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЭГДС (ГАСТРОСКОПИЯ) РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

- 1) чистить зубы
- 2) принимать лекарственные средства
- 3) провести очистительную клизму накануне вечером
- 4) не есть и не пить

**СБОР ОТХОДОВ В МЕСТАХ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ**

- 1) трех часов
- 2) рабочей смены
- 3) двух суток
- 4) суток

**СРОК ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ В (МЕСЯЦАХ)**

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 6
- 4) 5

**ПОД ДЕЙСТВИЯМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОТОВЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И (ИЛИ) ПОТРЕБЛЕНИЮ ПРЕКУРСОРОВ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И (ИЛИ) РАСТЕНИЙ, ПОНИМАЮТ**

- 1) оборот прекурсоров
- 2) производство прекурсоров
- 3) переработку наркотических средств
- 4) незаконное потребление наркотических средств

**О НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПЯТНА**

**\_\_\_\_\_ ЦВЕТА ПРИ ПОСТАНОВКЕ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ**

- 1) синего или темно-зеленого
- 2) желтого или оранжевого
- 3) фиолетового или лилового
- 4) розово-сиреневого или буроватого

**ЖУРНАЛ НАЗНАЧЕНИЙ ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ**

- 1) после каждой выполненной манипуляции
- 2) ежедневно
- 3) 1 раз в неделю
- 4) 2 раза в день

**ОСНОВНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ**

- 1) инспираторная одышка
- 2) кашель с выделением пенистой мокроты
- 3) приступ удушья с затрудненным выдохом
- 4) одышка смешанного характера

**ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУСЛОВЛЕНО**

- 1) пониженным уровнем инсулина в крови
- 2) снижением уровня глюкозы в крови
- 3) сопутствующим инфекционным заболеванием
- 4) гиперлипидемией

**РЕБЕНКА НАДО ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ ОБМОРОКА, РАЗВИВШЕГОСЯ ВСЛЕДСТВИЕ**

- 1) переутомления
- 2) страха
- 3) зубной боли, головной боли
- 4) интоксикации при инфекции, эпилепсии

**ФАКТОРОМ РИСКА, ПОВЫШАЮЩИМ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ \_\_\_\_\_ ММ РТ СТ**

- 1) 110/70
- 2) 130/85
- 3) 140/90
- 4) 120/80

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССОВ Б И В ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В**

- 1) полгода

- 2) год
- 3) квартал
- 4) месяц

### **К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ**

- 1) пневмоторакс
- 2) нормальную температуру тела
- 3) мелкопузырчатые влажные хрипы в легких
- 4) выраженную одышку

### **ГЕПАТИТ Е НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНО ПРОТЕКАЕТ У**

- 1) детей раннего возраста
- 2) беременных женщин
- 3) подростков
- 4) детей дошкольного возраста

### **КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ АСЦИТА У ПАЦИЕНТА С ДИАГНОЗОМ «ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ» ИГРАЕТ**

- 1) снижение коллоидно-осмотического давления плазмы
- 2) портальная гипертензия
- 3) гиперэстрогемия
- 4) вторичный гиперальдостеронизм

### **ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОЧИ ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ МОЧИ**

- 1) по методу Нечипоренко
- 2) по методу Зимницкого
- 3) общий клинический
- 4) по методу Каковского-Аддиса

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ «ОСТРАЯ ПНЕВМОНИЯ» У РЕБЕНКА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бронхоскопия
- 2) рентгенограмма грудной клетки
- 3) общий анализ крови
- 4) биохимический анализ крови

### **КЛИНИКА НОРМАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ НА ВАКЦИНУ ПРОТИВ ПАРОТИТА**

- 1) увеличение слюнных желез
- 2) повышение температуры на 8-10-й день, вялость, ухудшение аппетита,
- 3) боли в животе, рвота, увеличение слюнных желез на 2-й неделе
- 4) повышение температуры на 2-й день

### **ДЕФИБРИЛЛЯТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ**

- 1) ультразвуковых исследований сердца и его клапанного аппарата

- 2) регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работесердца
- 3) исследования работы головного мозга
- 4) электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма

### **ЕСЛИ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО НАРУШИЛО ПРОХОДИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННОЙ, ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) надавливаниях на верхнюю часть живота
- 2) надавливании на корень языка для вызывания у пострадавшей рвоты
- 3) попытке извлечения инородного тела с помощью пинцета
- 4) ударах по спине и надавливаниях на нижнюю часть грудной клетки

### **ВТОРОЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) проведение корректирующих мероприятий
- 2) разработку стандартов и критериев
- 3) измерение достигнутых результатов
- 4) сравнение результатов работы подчиненных между собой

### **ЛИЦ, ОБЩАВШИХСЯ С БОЛЬНЫМ ОСТРЫМ ГЕПАТИТОМ В, ОТСТРАНЯЮТ ОТ СДАЧИ КРОВИ**

- 1) на 6 месяцев
- 2) до прекращения контакта с больным гепатитом В
- 3) пожизненно
- 4) на 1 месяц

### **САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ОТНОСИТСЯ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ**

- 1) социально обусловленным
- 2) моногенным наследственным
- 3) полигенным
- 4) экологически обусловленным

### **НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫМ СПОСОБОМ ОСТАНОВКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наложение окклюзионной повязки
- 2) пальцевое прижатие сосуда
- 3) наложение тугой давящей повязки
- 4) использование венозного жгута

### **МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ**

- 1) 1 месяц
- 2) 6 месяцев
- 3) 1 год
- 4) 4 месяца



**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕМ СРЕДСТВЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКЕ С КРАТНОСТЬЮ ОБРАБОТКИ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) периметр обрабатываемой поверхности
- 2) объем дезинфицирующего раствора
- 3) площадь обрабатываемых внутренних поверхностей
- 4) фактический срок годности раствора в сутках

**ПРОВОЦИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА I ТИПА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) скарлатина
- 2) вирусные инфекции
- 3) дифтерия
- 4) коклюш

**ПРИ ДИФFUЗНО – ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ**

- 1) цитологическую
- 2) клиническую
- 3) биохимическую
- 4) бактериологическую

**ПРОЯВЛЕНИЕМ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА III СТАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) амфорическое дыхание
- 2) немое легкое
- 3) свистящее дыхание
- 4) гипоксическая кома

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ИЗ РАЦИОНА ИСКЛЮЧАЮТ**

- 1) молочные продукты
- 2) жирную, жареную пищу
- 3) отварные овощи
- 4) кашу

**К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ЛАРИНГИТА ОТНОСЯТ**

- 1) приступообразный кашель, сопровождающийся рвотой
- 2) сухой, звонкий кашель и экспираторную одышку
- 3) «лающий кашель», сиплый голос и инспираторную одышку
- 4) насморк, влажный кашель

**ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В**

- 1) полугодие
- 2) 9 месяцев

- 3) 10 месяцев
- 4) год

**ПРИ СМЕНЕ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, СБРОС ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ ПРОИЗВОДЯТ**

- 1) в тканевой мешок
- 2) в корзину для белья
- 3) на пол
- 4) в клеенчатый мешок

**В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ВРАЧ - АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ ОСМАТРИВАЕТ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ**

- 1) 65 лет и старше
- 2) 40-50 лет
- 3) от 18 до 39 лет
- 4) 55-65 лет

**У ПАЦИЕНТА С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ЭТИОЛОГИЯ ПНЕВМОНИИ ЧАЩЕ ОБУСЛОВЛЕНА**

- 1) стафилококками
- 2) пневмоцистами
- 3) вирусами
- 4) пневмококками

**СПОРОЦИДНОЕ СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ**

- 1) гибель спор микроорганизмов
- 2) снижение вирулентности микроорганизмов
- 3) инактивацию вирусов
- 4) гибель бактерий в вегетативной форме

**К ПРЕДОБМОРОЧНЫМ СИМПТОМАМ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) сухость кожных покровов
- 2) обострение слуха и зрения
- 3) слабость, тошнота
- 4) гиперемия лица

**ПРАВИЛА СНЯТИЯ НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ У ПАЦИЕНТА С ТРАВМОЙ ОДНОЙ РУКИ**

- 1) со здоровой руки, с больной руки, затем через голову
- 2) через голову со здоровой руки, затем с больной руки
- 3) со здоровой руки через голову, затем с больной руки
- 4) с руки, получившей травму, через голову со здоровой руки

**ПРИ ПОРАЖЕНИИ СВЯЗОК ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ФИКСИРУЕТСЯ 8-ОБРАЗНОЙ ПОВЯЗКОЙ**

- 1) только под прямым углом
- 2) в присогнутом состоянии
- 3) в том положении, в котором находится пораженный сустав

4) только под углом 45 градусов

**У ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО СОКА (Л)**

- 1) 2,1-2,5
- 2) 0,3-0,5
- 3) 0,5-1,0
- 4) 1,5-2,0

**К МЕТОДАМ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) сосудистая пластика
- 2) наложение кровоостанавливающего зажима
- 3) перевязка сосуда в ране
- 4) перевязка сосуда на протяжении всей раны

**РИСК ПАГУБНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ**

- 1) медицинского осмотра
- 2) биохимического анализа крови
- 3) опроса (анкетирование)
- 4) клинического анализа крови и мочи

**РУКОВОДИТЕЛЮ НЕДОПУСТИМО ДЕЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЕ ПОДЧИНЕННОМУ В ПРИСУТСТВИИ**

- 1) сестры-хозяйки
- 2) старшей медицинской сестры
- 3) третьих лиц
- 4) пациентов и посетителей

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ НАЧИНАЮТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 9
- 4) 5

**В ПОМЕЩЕНИИ, ОТНОСЯЩЕМСЯ К ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ, НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТ В ЗАПИРАЮЩИХСЯ НАСЫПНЫХ ИЛИ ПРИКРЕПЛЕННЫХ К ПОЛУ (СТЕНЕ) СЕЙФАХ НЕ НИЖЕ \_\_\_\_\_ КЛАССА УСТОЙЧИВОСТИ К ВЗЛОМУ**

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 9

**МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) дыхательную гимнастику
- 2) грязевые обертывания
- 3) УФ-облучение
- 4) радоновые ванны

**ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ**

- 1) инспираторной одышки
- 2) экспираторной одышки
- 3) смешанной одышки
- 4) навязчивого кашля

**ГРАЖДАН, НЕ ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НО ТРЕБУЮЩИХ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПОВОДУ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) I
- 2) IIIб
- 3) IIIа
- 4) II

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ НЕОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ**

- 1) обструкция воздухоносных путей не выявляется ни клинически, ни при спирографии, как в период обострения, так и в период ремиссии заболевания
- 2) обструкция воздухоносных путей может выявляться только в период обострения
- 3) обструкция воздухоносных путей постоянная
- 4) обструкция выявляется вне связи с обострением

**ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА, ПЕРЕНЕСШЕГО ИНФАРКТ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) электротерапия
- 2) двигательный режим и кинезотерапия
- 3) бальнеотерапия
- 4) диета

**ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТХОДЫ (ОРГАНЫ, ТКАНИ И ТАК ДАЛЕЕ) ОТНОСЯТ К КЛАССУ**

- 1) Г
- 2) Д
- 3) В
- 4) Б

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) ширину стороны предмета мебели

- 2) количество суток в расчетном периоде
- 3) длину стороны предмета мебели
- 4) общую площадь внутренней поверхности помещения

**РЕЗУЛЬТАТ ДИАСКИНТЕСТА ОЦЕНИВАЮТ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)**

- 1) 6
- 2) 24
- 3) 72
- 4) 36

**РЕЦЕПТ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, СОДЕРЖАЩИЙ НАЗНАЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОФОРМЛЯЮТ С СОГЛАСИЯ**

- 1) пациента
- 2) заведующего структурным подразделением
- 3) руководителя медицинской организации
- 4) лица, ответственного за хранение, учет рецептурных бланков

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВОЗМОЖЕН ПРИ**

- 1) вирусном гепатите В
- 2) дифтерии
- 3) скарлатине
- 4) дизентерии

**«СОСУДИСТЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ», «ПАЛЬМАРНАЯ ЭРИТЕМА» ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ**

- 1) синдрома холестаза
- 2) синдрома Жильбера
- 3) острой печёночной энцефалопатии
- 4) хронического гепатита

**В КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ, ГДЕ У ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ДИАГНОСТИРОВАН САЛЬМОНЕЛЛЕЗ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) заключительная дезинфекция после изоляции пациента
- 2) Постэкспозиционная антибиотикопрофилактика контактным лицам
- 3) назначение интерферона контактным лицам
- 4) вакцинация не болевших и не привитых контактных лиц

**ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА СИФИЛИС У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СТАЦИОНАРОВ (ОТДЕЛЕНИЙ) ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРОВОДЯТ**

- 1) 1 раз в 3 года
- 2) ежегодно
- 3) по показаниям
- 4) 2 раза в год

**ОДНОВРЕМЕННАЯ ИММУНИЗАЦИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА И**

- 1) туберкулеза, пневмококковой инфекции
- 2) гепатита, туберкулеза
- 3) дифтерии, кори, паротита, туберкулеза
- 4) дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита В

**ИЗ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СПИСОК II ВКЛЮЧЕНЫ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБОРОТ КОТОРЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \_\_\_\_\_, И В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ \_\_\_\_\_**

- 1) разрешен; общие меры контроля
- 2) запрещен; запретительные процедуры
- 3) ограничен; меры контроля
- 4) обязателен; особые меры контроля

**К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ В ОТНОСЯТСЯ**

- 1) кабинеты функциональной диагностики, процедурные эндоскопии
- 2) процедурные и асептические перевязочные
- 3) ваннные залы (кроме радоновых), помещения подогрева парафина и озокерита
- 4) регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные

**ПОВОРАЧИВАТЬСЯ И ПРИСАЖИВАТЬСЯ НА КРАЮ КРОВАТИ РАЗРЕШАЕТСЯ БОЛЬНОМУ НА РЕЖИМЕ**

- 1) общем
- 2) строгом постельном
- 3) постельном
- 4) палатном

**ЕСЛИ ПРИ ХРАНЕНИИ КАТЕТЕРОВ ЭЛАСТИЧНЫХ С ЛАКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ НАБЛЮДАЕТСЯ ИХ ЧАСТИЧНОЕ РАЗМЯГЧЕНИЕ, ТО ИХ**

- 1) восстанавливают, погружая сначала в раствор нашатырного спирта, а затем в раствор глицерина
- 2) восстанавливают, смазывая вазелиновым маслом
- 3) бракуют
- 4) восстанавливают, погружая в кипящее вазелиновое масло

**ОСМОТР ВРАЧОМ-НЕВРОЛОГОМ ПРОВОДИТСЯ НА \_\_\_\_\_ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ**

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

**ПОКАЗАНИЕМ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) средне тяжелый приступ с хорошим ответом на бронходилататоры

- 2) легкий приступ с хорошим ответом на бронходилататоры
- 3) тяжелый приступ с хорошим ответом на бронходилататоры
- 4) тяжелый приступ с плохим ответом на бронходилататоры

### **БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛИЗИ ИЗ НОСА ПРОВОДЯТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ**

- 1) дифтерии
- 2) краснухи
- 3) кори
- 4) ветряной оспы

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) симптом хвостека
- 2) подострый период
- 3) отсутствие активных движений мимической мускулатуры
- 4) температура тела 37,3°C

### **ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) применением отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии
- 2) использованием отходов производства и потреблением в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки
- 3) изоляцией отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах
- 4) содержанием отходов в объектах размещения отходов

### **В КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ, ГДЕ У ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ДИАГНОСТИРОВАН САЛЬМОНЕЛЛЕЗ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) назначение интерферона контактными лицам
- 2) вакцинация не болевших и не привитых контактных лиц
- 3) постэкспозиционная антибиотикопрофилактика
- 4) заключительная дезинфекция после изоляции пациента

### **КУРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА**

- 1) гепатита
- 2) ожирения
- 3) гастрита
- 4) бронхита

### **ПРИ ОСТРОМ НЕОСЛОЖНЕННОМ БРОНХИТЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) в санатории
- 2) в терапевтическом отделении стационара
- 3) в амбулаторных условиях

4) в пульмонологическом отделении стационара

### **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ**

- 1) временное складирование отходов в местах (на площадках) в целях их дальнейшего использования
- 2) прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц
- 3) перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка
- 4) содержание отходов в объектах размещения отходов

### **ДЛЯ Фолликулярной ангины характерна симптоматика в виде**

- 1) расширения лакун небных миндалин
- 2) гиперемии небных дужек и небных миндалин
- 3) белых или светло-желтых налетов в лакунах небных миндалин
- 4) нагноившихся фолликулов на поверхности небных миндалин

### **Медицинский работник, имеющий диплом бакалавра по направлению подготовки «Сестринское дело» и получивший допуск к осуществлению медицинской деятельности на основании выписки из протокола экзамена по допуску к осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала может быть допущен работать на должности медицинской сестры**

- 1) стерилизационной
- 2) врача общей практики
- 3) приемного отделения
- 4) по косметологии

### **При общении с пациентом вопросы следует задавать**

- 1) тактично, давая пациенту время на ответы
- 2) быстро, чтобы за короткое время принять как можно больше пациентов
- 3) строго по протоколу
- 4) настойчиво и резко

### **Показателем, наиболее надежно отражающим степень компенсации сахарного диабета при динамическом наблюдении, является**

- 1) глюкозурия
- 2) гликемия натощак
- 3) гликированный (гликозилированный) гемоглобин
- 4) постпрандиальная гликемия

### **Экспираторный характер одышки характерен для**

- 1) бронхиальной астмы
- 2) крупозной пневмонии
- 3) абсцесса легкого
- 4) отека легких



### **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ МЕТОДОМ «РОТ В НОС»**

- 1) необходимо свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть пострадавшего, чтобы его рот был закрыт
- 2) необходимо свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения выдоха
- 3) нижнюю челюсть пострадавшего можно не удерживать
- 4) зажимать рот нет необходимости

### **В СЛУЧАЕ ОТМОРОЖЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ НЕОБХОДИМО**

- 1) наложить на конечность термоизолирующую повязку
- 2) растереть конечность снегом
- 3) как можно скорее поместить конечность в теплую воду
- 4) интенсивно растереть конечность шерстяной тканью

### **ЗА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ**

- 1) доплаты должностному окладу
- 2) компенсационные выплаты
- 3) надбавки к окладу
- 4) стимулирующие выплаты

### **ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРОБОЙ МАНТУ И ВАКЦИНАЦИЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ И НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 5; 3
- 2) 7; 4
- 3) 2; 5
- 4) 3; 2

### **ИЗ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СПИСОК III ВКЛЮЧЕНЫ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОБОРОТ КОТОРЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \_\_\_\_\_ И В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ \_\_\_\_\_**

- 1) запрещен; меры контроля не устанавливаются
- 2) разрешен; устанавливаются специальные разрешительные процедуры
- 3) обязателен; устанавливаются меры контроля
- 4) ограничен; допускается исключение некоторых мер контроля

### **ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- 1) нарушения психомоторной активности
- 2) применение горчичников
- 3) применение пузыря со льдом
- 4) частая смена положения

### **МИНИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В МИНУТУ ПРИ**

## **ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 100
- 2) 90
- 3) 80
- 4) 70

## **ПОД КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОНИМАЮТ**

- 1) отрицательные результаты посевов проб со всех объектов внутрибольничной среды
- 2) 95% отрицательных результатов азопирамовой пробы
- 3) 90% отрицательных результатов фенолфталеиновой пробы
- 4) единичные показатели обсемененности воздуха, превышающие установленные нормативы

## **ДЛЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) бактериофаг
- 2) химическую вакцину
- 3) анатоксин
- 4) живую вакцину

## **ОБЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ДЛЯ ЭМФИЗЕМАТОЗНОГО И БРОНХИТИЧЕСКОГО ТИПОВ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) одышка
- 2) положительная реакция на бронходилататоры
- 3) полицитемия
- 4) хронический кашель

## **ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ**

- 1) мочевого пузыря
- 2) пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
- 3) толстой кишки
- 4) прямой кишки

## **МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ИНФЕКЦИИ ПРИ ГЕПАТИТАХ С ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ МАЛО ЭФФЕКТИВНЫ, ПОТОМУ ЧТО НЕВОЗМОЖНО**

- 1) своевременное и полное выявление больных
- 2) своевременное и полное выявление носителей
- 3) обеспечить медицинское наблюдение за всеми контактными лицами в течении максимального инкубационного периода
- 4) охватить всех контактных лиц необходимыми лабораторными исследованиями

**К ПОКАЗАТЕЛЮ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕМУ СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, ОТНОСЯТ СМЕРТНОСТЬ**

- 1) детскую
- 2) младенческую
- 3) неонатальную
- 4) перинатальную

**ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОТХОЖДЕНИЯ МОКРОТЫ ПРИ ПНЕВМОНИИ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) антибиотик
- 2) витамин С
- 3) ультрафиолетовое облучение
- 4) вибрационный массаж

**ОЖИВЛЕНИЕ С ПОЛНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВОЗМОЖНО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ \_\_\_\_\_ МИН**

- 1) 10-15
- 2) 1-2
- 3) 5-7
- 4) 3-4

**ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ НАЗНАЧАЮТСЯ ПРИ**

- 1) I-II степени тяжести и частых обострениях
- 2) III-IV степени тяжести и частых обострениях
- 3) I-II степени тяжести и редких обострениях
- 4) III-IV степени тяжести и редких обострениях

**ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КИСЛОТАМИ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КИСЛОТЫ В ЖЕЛУДКЕ РАСТВОРОМ ГИДРОКАРБОНАТА НАТРИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНА ИЗ-ЗА ОПАСНОСТИ**

- 1) перфорации желудка, вызванной применением гидрокарбоната натрия
- 2) расширения желудка образующимся углекислым газом
- 3) отравления неправильно подобранной концентрацией гидрокарбоната натрия
- 4) интоксикации организма образующимся углекислым газом

**ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОМИССИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРЯЕТ СОСТОЯНИЕ ХРАНЕНИЯ, УЧЕТА, ФАКТИЧЕСКОЕ НАЛИЧИЕ И РАСХОД РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ 1 РАЗ В**

- 1) месяц
- 2) квартал
- 3) неделю
- 4) год

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ БРОНХИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) аллергическая реакция
- 2) бактериальная инфекция

- 3) вирусная инфекция
- 4) грибковая инфекция

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ (СУТКИ)**

- 1) 10-21
- 2) 7-14
- 3) 1-3
- 4) 3-10

**ЛЕГОЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ДЕСТРУКТИВНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) туберкулез
- 2) ателектаз
- 3) абсцесс легкого
- 4) гемоторакс

**ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ПОДРАЗУМЕВАЕТ**

- 1) обработку отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов
- 2) изменение внешнего вида отходов, исключающее возможность их повторного использования
- 3) уничтожение всех патогенных и условно патогенных микроорганизмов
- 4) захоронение в местах, установленных действующим законодательством

**ПОЛКИ ХОЛОДИЛЬНИКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ**

- 1) заклеены
- 2) пронумерованы
- 3) промаркированы
- 4) опечатаны

**ГРАЖДАН, У КОТОРЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕНА ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ВЫСОКОМ ИЛИ ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ АБСОЛЮТНОМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОМ РИСКЕ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) II
- 2) IIIa
- 3) IIIб
- 4) I

**ПОЯВЛЕНИЕ РИГИДНОСТИ ЗАТЫЛОЧНЫХ МЫШЦ У РЕБЕНКА С ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О**

- 1) параличе плечевого пояса
- 2) менингите
- 3) септикококкемии

4) гидроцефалии

**ПРИ КОДИРОВАНИИ ТОВАРОВ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД**

- 1) математический
- 2) регистрационный
- 3) экспертных оценок
- 4) перечисления факторов

**ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОФОРМЛЕННЫЕ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ СБРОШЮРОВАНЫ, ПРОНУМЕРОВАНЫ И СКРЕПЛЕНЫ ПОДПИСЬЮ \_\_\_\_\_ И ПЕЧАТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

- 1) главной медицинской сестры
- 2) заведующего отделением
- 3) заместителя главного врача по лечебной работе
- 4) руководителя медицинской организации

**ЛЕВАЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА РАСШИРЕНА ПРИ**

- 1) митральном стенозе
- 2) артериальной гипертонии
- 3) тромбоэмболии легочной артерии
- 4) хроническом легочном сердце

**ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) профилактика
- 2) диагностика
- 3) реабилитация
- 4) социальная помощь

**ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНОГО С ПОЛИСЕГМЕНТАРНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СНИЖАЕТСЯ**

- 1) индекс Тиффно
- 2) объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1)
- 3) жизненная емкость лёгких (ЖЕЛ)
- 4) максимальная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 25-75 % (МОС25-75)

**ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ ТИП ПНЕВМОНИИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- 1) пневмококковой инфекции
- 2) хламидиоза
- 3) цитомегаловирусной инфекции
- 4) муковисцидоза

**ЭКСТЕНСИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ**

- 1) характеристику ряда, состоящего из однородных сопоставляемых величин
- 2) частоту явления в динамике

- 3) доли частей в целом (структуру)
- 4) различия сравниваемых показателей

**РАЗОВАЯ ДОЗА ИПРАТРОПИЯ БРОМИДА ДЛЯ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНО**

- 1) 0,1-0,4
- 2) 0,5-1,0
- 3) 2,1-2,5
- 4) 1,1-2,0

**ПРИ ОЦЕНКЕ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО К ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТ**

- 1) средний доход на душу населения
- 2) заболеваемость
- 3) прожиточный минимум
- 4) региональный внутренний продукт

**ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ, ПОПАВШЕГО В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, ПЕРЕВЕРНУВШЕГОСЯ НЕСКОЛЬКО РАЗ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ В СВЯЗИ С РИСКОМ ВОЗГОРАНИЯ АВТОМОБИЛЯ, СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО**

- 1) пострадавшего не следует извлекать, следует дождаться бригады скорой медицинской помощи или спасателей
- 2) извлекать пострадавшего необходимо только после иммобилизации конечностей и шеи подручными средствами
- 3) при извлечении необходимо обязательно фиксировать голову и шею пострадавшего своими руками
- 4) необходимо предложить пострадавшему попытаться выбраться самостоятельно

**К ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОТНОСИТСЯ ХРОНИЧЕСКИЙ \_\_\_\_\_ ГАСТРИТ**

- 1) неатрофический
- 2) атрофический
- 3) эозинофильный
- 4) лимфоцитарный

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА УРОВЕНЬ АБСОЛЮТНОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПО ШКАЛЕ SCORE НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ И РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ У ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ**

- 1) отек Квинке в анамнезе
- 2) хронический бронхит
- 3) туберкулез легких
- 4) сахарный диабет второго типа

**ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ - ЭТО**

- 1) выделения из уха

- 2) боль в ухе
- 3) диарея
- 4) повышение температуры тела

**ПОСТВАКЦИНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПО ТИПУ КАТАРАЛЬНОГО СИНДРОМА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ НА ВВЕДЕНИЕ**

- 1) БЦЖ-вакцины
- 2) АКДС-вакцины
- 3) полиомиелитной вакцины
- 4) коревой вакцины

**ПРИ РАСЧЕТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО К ЕСТЕСТВЕННОМУ ДВИЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСЯТ**

- 1) повозрастную смертность
- 2) численность населения
- 3) челночную миграцию
- 4) маятниковую миграцию

**КЛИМАТ, НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАННЫЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК**

- 1) пустынный
- 2) субтропический
- 3) горный
- 4) морской

**ВЕДУЩЕЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЖАЛОБОЙ ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кашель с мокротой
- 2) сухой кашель
- 3) одышка
- 4) боль в грудной клетке

**ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО БИЛИАРНОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ СПЕЦИФИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) повышение титра антител к цитруллину
- 2) увеличение уровня антител к кардиолипину
- 3) наличие антител к цитоплазме нейтрофилов
- 4) повышение уровня антимитохондриальных антител

**ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ У БОЛЬНОГО ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) дегтеобразный стул
- 2) рвота пищей, съеденной накануне
- 3) изжога
- 4) рвота в виде кофейной гущи

**ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) постановку очистительной клизмы и ограничение пищевого режима
- 2) проведение промывания желудка
- 3) рекомендации пациенту по отказу от курения перед исследованием
- 4) введение газоотводной трубки

### **ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО ВЫБОР СПОСОБА ЗАВИСИТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОТ**

- 1) наличия средств перемещения (носилки, строп, щитов)
- 2) количества участников оказания первой помощи, их физических возможностей и характера травм у пострадавшего
- 3) желания пострадавшего
- 4) предполагаемой дальности перемещения

### **ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пропуск введения инсулина
- 2) избыточная физическая нагрузка
- 3) передозировка инсулина
- 4) отсутствие в рационе высококалорийной пищи

### **НЕОБХОДИМО ЭКСТРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С**

- 1) нарушением мозгового кровообращения
- 2) прогрессирующей почечной недостаточностью
- 3) гипертонической ангиопатией сетчатки глаза
- 4) расслаивающей аневризмой аорты

### **ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРАПИЯ**

- 1) антирефлюксная
- 2) антисекреторная
- 3) эрадикационная
- 4) заместительная

### **ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА - ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА**

- 1) почечного
- 2) фосфатного
- 3) несахарного
- 4) сахарного

### **ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ КАШЛЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 2 месяца в течение 2 лет подряд
- 2) 3 месяца в течение 2 лет подряд
- 3) 1 месяц в течение 1 года
- 4) 3 месяца в течение 1 года



**НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ РИСКЕ РАЗВИТИЯ  
ЗАСТОЙНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА**

- 1) проведение оксигенотерапии
- 2) применение антибиотиков
- 3) применение отхаркивающих средств
- 4) проведение дыхательной гимнастики

**К ПРИЗНАКАМ ВНУТРИСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ ОТНОСЯТ**

- 1) снижение массы тела
- 2) гипергликемию
- 3) дефицит жирорастворимых витаминов
- 4) стеаторею

**СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ В МЯГКОЙ БЯЗЕВОЙ УПАКОВКЕ СОХРАНЯЕТСЯ (В  
СУТКАХ)**

- 1) 6
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 4

**СОКРАЩЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ,  
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ I И II ГРУППЫ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_  
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ**

- 1) 35
- 2) 36
- 3) 37
- 4) 39

**ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ ФЕЛЬДШЕРА-НАРКОЛОГА НАРКОЛОГИЧЕСКОГО  
ДИСПАНСЕРА ПРЕТЕНДЕНТУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ \_\_\_\_\_ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ПО  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ \_\_\_\_\_**

- 1) акушерское дело; наркология
- 2) сестринское дело; наркология
- 3) лечебное дело; наркология
- 4) сестринское дело; лечебное дело

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК  
ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА НАЧИНАЮТ В ВОЗРАСТЕ (В  
МЕСЯЦАХ)**

- 1) 12
- 2) 18
- 3) 14

4) 15

**НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ИЗ СПИСКА I ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) псевдоэфедрин
- 2) аминорекс
- 3) гашиш
- 4) бромазепам

**ПОЯВЛЕНИЕ РИГИДНОСТИ ЗАТЫЛОЧНЫХ МЫШЦ У РЕБЕНКА С ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О**

- 1) параличе плечевого пояса
- 2) менингите
- 3) септикококцемии
- 4) гидроцефалии

**ОТХОДЫ КЛАССА В ОБЕЗЗАРАЖИВАЮТСЯ ТОЛЬКО \_\_\_\_\_ СПОСОБОМ**

- 1) централизованным
- 2) децентрализованным
- 3) дивизиональным
- 4) сетевым

**НА УРОВНЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ОТРАЖАЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ОТХОДОВ КЛАССОВ**

- 1) Б и В
- 2) А
- 3) Г
- 4) Д

**К КОЛОНОСКОПИИ ПАЦИЕНТ, НЕ СТРАДАЮЩИЙ ЗАПОРАМИ, ГОТОВИТСЯ**

- 1) 1 день
- 2) 2 дня
- 3) 3-5 дней
- 4) в соответствии с рекомендацией врача

**ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УНИЧТОЖАЮТ ПУТЕМ**

- 1) дробления
- 2) разрезания
- 3) раздавливания первичной упаковки
- 4) сжигания

**СОГЛАСНО ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕНЕЕ 500 ЧЕЛОВЕКА ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ**

- 1) 1 должность социального работника
- 2) 0,25 должности врача по гигиене детей и подростков
- 3) 0,5 штатной единицы врача-педиатра
- 4) 1 штатная единица медицинской сестры или фельдшера

#### **К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТ**

- 1) излишнюю физическую активность
- 2) ожирение
- 3) избыток пищевых волокон в рационе
- 4) употребление алкоголя

#### **ПОКАЗАТЕЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ АКТИВНОСТЬ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) щелочная фосфатаза
- 2) АЛТ
- 3) холестерин
- 4) альбумин

#### **СЕРОЗНЫЙ МЕНИНГИТ МОЖЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ ПРИ**

- 1) шигеллезах
- 2) энтеровирусной инфекции
- 3) ротавирусной инфекции
- 4) норовирусной инфекции

#### **ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОДЛЕН ИЛИ ПЕРЕНЕСЕН НА ДРУГОЙ СРОК, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЕМ С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ РАБОТНИКА, В СЛУЧАЕ**

- 1) решения выборного органа первичной профсоюзной организации
- 2) замены неиспользованной части отпуска денежной компенсацией
- 3) временной нетрудоспособности работника
- 4) разделения отпуска на части

#### **В ОТВЕТ НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В В ОРГАНИЗМЕ ПРОИСХОДИТ ВЫРАБОТКА АНТИ-**

- 1) HBcore
- 2) HCV
- 3) HAV
- 4) HBs

#### **ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ТРЕБУЕТСЯ \_\_\_\_\_ МОЧИ**

- 1) 8 отдельных порций
- 2) 100 мл теплой свежесвыпущенной
- 3) 100-200 мл утренней
- 4) 100 мл от суточного количества

**РЕЦЕПТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 148-1/У-04(Л) И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИНВАЛИДАМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ СО ДНЯ ОФОРМЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 120
- 2) 90
- 3) 180
- 4) 150

**ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПАЦИЕНТУ ДАЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО**

- 1) виду увлечений
- 2) профессии
- 3) диете
- 4) режиму отдыха

**ДЛЯ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ ЛЮБОЙ ЭТИОЛОГИИ ХАРАКТЕРНО ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ**

- 1) трансаминаз
- 2) щелочной фосфатазы
- 3) холестерина
- 4) прямого билирубина

**ПОМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 15-ДНЕВНОГО ЗАПАСА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК II ПЕРЕЧНЯ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ КАТЕГОРИИ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 1

**ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ КЕРНИГА ПРИ МЕНИНГИТЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сгибанием головы с приведением подбородка к груди
- 2) невозможностью разогнуть ногу больного в коленном суставе, когда она согнута в тазобедренном
- 3) поднятием выпрямленной в коленном суставе ноги
- 4) надавливанием на лонное сочленение

**К ОСНОВНЫМ ФИЗИКАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ БРОНХИОЛИТА ОТНОСЯТ ХРИПЫ**

- 1) рассеянные мелкопузырчатые
- 2) рассеянные сухие
- 3) локальные мелкопузырчатые
- 4) локальные сухие

**К АТИПИЧНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЯМ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ**

- 1) аденовирусы
- 2) коронавирусы
- 3) риновирусы
- 4) микоплазму

**У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА, БОЛЬНЫХ МЕНИНГОКОККОВЫМ МЕНИНГИТОМ, ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ**

- 1) парезов и параличей
- 2) анурии
- 3) гиперестезии
- 4) обезвоживания

**ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЛЕЖНЕЙ СПОСОБСТВУЕТ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ**

- 1) питьевой режим
- 2) правильное питание
- 3) смена положения тела
- 4) неподвижность пациента

**НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ**

- 1) выдвинута вперед, только если введен воздуховод
- 2) плотно прижата к верхней челюсти
- 3) выдвинута вперед
- 4) в том положении, в котором обнаружен пострадавший

**ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) снижение температуры после физических методов охлаждения
- 2) нормализация поведения ребенка
- 3) появление сухого кашля после горчичного обертывания
- 4) появление звонкого голоса после щелочной ингаляции

**В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПОРЯДКОМ И СРОКАМИ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ НОСИТ \_\_\_\_\_ ХАРАКТЕР**

- 1) запрещающий
- 2) обязательный
- 3) рекомендательный
- 4) совещательный

**ЦИТОЛИЗ ПЕЧЕНОЧНЫХ КЛЕТОК ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ ОТРАЖАЕТ УРОВЕНЬ**

- 1) общего белка и белковые фракции крови
- 2) аланинаминотрансферазы и аспарагинаминотрансферазы
- 3) щелочной фосфатазы

4) холестерина

**АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) патологическая подвижность костных отломков
- 2) отек
- 3) деформация сустава
- 4) деформация мягких тканей

**С МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ, ПЕРЕВЕДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ИЗ ДРУГОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, НА НОВОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРОВОДИТСЯ \_\_\_\_\_ ИНСТРУКТАЖ**

- 1) целевой
- 2) повторный
- 3) вводный
- 4) первичный

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПО СТАНДАРТУ РЕАБИЛИТАЦИИ**

- 1) стационар - поликлиника - санаторий
- 2) стационар - санаторий – поликлиника
- 3) поликлиника - санаторий - стационар
- 4) поликлиника - стационар - санаторий

**ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО В МОКРОТЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ**

- 1) атипичные клетки
- 2) микобактерии
- 3) пневмококки
- 4) эозинофилы

**ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ УТРАТЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- 1) самим работником
- 2) работодателем
- 3) Федеральной службой безопасности
- 4) вышестоящей организацией

**ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОЛУЧЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ, СТЕРИЛИЗУЮЩИХ СРЕДСТВ, СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ, КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ ЗАПОЛНЯЕТСЯ**

- 1) заместителем руководителя медицинской организации по эпидемиологической работе
- 2) заведующим клиническим структурным подразделением
- 3) руководителем медицинской организации
- 4) лицом, ответственным в организации за прием и выдачу дезинфекционных средств

**ПАЦИЕНТЫ С ИНФЕКЦИЕЙ ЛЮБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ВЫЗВАННОЙ МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТНЫМ ЗОЛОТИСТЫМ СТАФИЛОКОККОМ, ПОДЛЕЖАТ ИЗОЛЯЦИИ В ПАЛАТЫ**

- 1) с повышенным уровнем комфортности
- 2) двухместные
- 3) однокоечные
- 4) боксированные

**ПОЛОЖЕНИЕ РУК РЕАНИМАТОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА**

- 1) локтевые суставы разогнуты, лучезапястные - согнуты
- 2) лучезапястные и локтевые суставы максимально согнуты
- 3) лучезапястные и локтевые суставы максимально разогнуты
- 4) локтевые суставы согнуты, лучезапястные - разогнуты

**ОДЫШЕЧНО-ЦИАНОТИЧЕСКИЕ ПРИСТУПЫ ЧАЩЕ ВОЗНИКАЮТ ПРИ**

- 1) аскаридозе
- 2) пилороспазме
- 3) аномалии почек
- 4) пороке сердца

**ДЛЯ ХОБЛ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ (GOLD) ХАРАКТЕРНО ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 (%)**

- 1) 30-50
- 2) < 30
- 3) 50-80
- 4) > 80

**ВОСПРИИМЧИВЫМИ К ДЕЛЬТА-ИНФЕКЦИИ (ГЕПАТИТ D) ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЬНЫЕ ГЕПАТИТОМ**

- 1) С
- 2) В
- 3) Е
- 4) А

**СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) увеличением АД в утренние часы
- 2) увеличением вариабельности АД
- 3) уменьшением вариабельности АД
- 4) снижением АД во время ночного сна

**СНИЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЧИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ**

- 1) сахарном диабете

- 2) несахарном диабете
- 3) мочекаменной болезни
- 4) остром цистите

**К ХАРАКТЕРНОМУ ПРИЗНАКУ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) сочетание ринофарингита и конъюнктивита с лимфоаденопатией
- 2) ангина
- 3) стоматит
- 4) отит

**КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ АДАПТАЦИИ НОВОГО СОТРУДНИКА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) составление плана наставничества и обучения нового сотрудника на рабочем месте
- 2) проведение индивидуальных бесед старшей медицинской сестрой с новым сотрудником и проведение индивидуальных обучающих занятий
- 3) составление психологического плана адаптации сотрудника
- 4) составление индивидуального плана подготовки молодого специалиста и прикрепление к нему опытного наставника

**ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) менингитом
- 2) энцефалитом
- 3) полинейропатией
- 4) менингоэнцефалитом

**НОРМЫ И УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ МОЛОКА РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, УСТАНОВЛИВАЮТСЯ**

- 1) Правительством Российской Федерации
- 2) Минтрудом России
- 3) Минздравом России
- 4) Трудовым кодексом Российской Федерации

**ИНСТРУКТАЖ ПО УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДЯТ 1 РАЗ В**

- 1) три года
- 2) шесть месяцев
- 3) год
- 4) месяц

**СТЕПЕНЬ ВИНЫ КАЖДОГО РАБОТНИКА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ВЗЫСКАНИИ УЩЕРБА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) работодателем
- 2) судом



- 3) специальной комиссией
- 4) Министерством труда и социального развития РФ

### **УХУДШЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ПРИ АСТМАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ВОЗМОЖНО ОТ**

- 1) повторного введения гормонов
- 2) введения атропина
- 3) повторного назначения симпатомиметиков
- 4) введения гормонов

### **СИСТОЛИЧЕСКАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНΙΑ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) признаком доброкачественного течения артериальной гипертензии
- 2) фактором риска развития мозгового инсульта
- 3) вариантом нормы
- 4) причиной развития хронической сердечной недостаточности

### **БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА С ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ ПРИСТУПАМИ ВЕСНОЙ ОБУСЛОВЛЕНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ К АЛЛЕРГЕНАМ**

- 1) пыльцевым
- 2) пищевым
- 3) грибковым
- 4) эпидермальным

### **ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНАЯ БОЛЬ**

- 1) иррадиирующая в правое надплечье
- 2) «кинжальная»
- 3) опоясывающая
- 4) иррадиирующая в паховую область

### **ВЫПУСКНИЦА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА, УСПЕШНО ПРОШЕДШАЯ ПЕРВИЧНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО», МОЖЕТ РАБОТАТЬ В ДОЛЖНОСТИ \_\_\_\_\_ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ**

- 1) медицинского статистика
- 2) медицинской сестры
- 3) акушерки
- 4) медицинской сестры стерилизационной

### **СИМПТОМОМ МЕНИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) невнятная речь
- 2) западение родничка
- 3) рвота на фоне головной боли
- 4) уртикарная сыпь

### **ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТУ ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 1) сидя с упором наклонившись вперед

- 2) лежа на боку
- 3) с приподнятым головным концом
- 4) горизонтальное

**ТРОМБОЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ СЕТЧАТКИ ИЛИ ЕЕ ВЕТВЕЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕМ**

- 1) хронического пиелонефрита
- 2) бронхиальной астмы
- 3) сахарного диабета
- 4) гипертонической болезни

**В ФАЗЕ ЗАТУХАЮЩЕГО ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БЕСКАМЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ**

- 1) панкреатических ферментов
- 2) желчегонных и спазмолитиков
- 3) анальгетиков
- 4) антибиотиков

**ЧАСТОТА ВДУВАНИЙ ВОЗДУХА В МИНУТУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ**

- 1) 6-8
- 2) 12-18
- 3) 60-80
- 4) 20-25

**МОЧА НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ**

- 1) вирусологическую
- 2) бактериологическую
- 3) клиническую
- 4) иммунологическую

**ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОМЕТРИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАНОСИТ В**

- 1) историю болезни
- 2) температурный лист
- 3) дневник наблюдений
- 4) лист назначений

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ УСЛОВИИ КОМПЕНСАЦИИ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА, СТЕПЕНЬ КОТОРОЙ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ТРУДА, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) III
- 2) IV
- 3) I
- 4) II

**К ОСНОВНОМУ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМУ МЕХАНИЗМУ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ОТНОСИТСЯ**

- 1) деструкция В-клеток
- 2) инсулинорезистентность и гиперинсулинемия
- 3) инсулинопения
- 4) ожирение

**ОКИСЛИТЕЛЕМ В РЕАКЦИИ ИНДИКАЦИИ ПРИ ПОСТАНОВКЕ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) этиловый спирт
- 2) анилин солянокислый
- 3) амидопирин в порошке
- 4) перекись водорода

**УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТЫЛОЧНЫХ И ЗАДНЕСЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ - ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ**

- 1) ангины
- 2) хронического тонзиллита
- 3) краснухи
- 4) ветряной оспы

**ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРИЗВАНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ**

- 1) оплату независимо от вложенного труда
- 2) равную оплату труда всем работникам
- 3) соответствие уровня оплаты труда объемам и качеству вложенного труда
- 4) компенсацию материальных издержек вложенного труда

**ПЕРВОЕ МЕСТО ПО РАСПРОСТРАНЁННОСТИ СРЕДИ БОЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИМИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ЗАНИМАЮТ БОЛЬНЫЕ**

- 1) психопатией
- 2) наркоманиями
- 3) алкоголизмом, алкогольными психозами
- 4) токсикоманиями

**ТЯЖЕЛЫЙ ПРИСТУП БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПИКОВОЙ СКОРОСТИ ВЫДОХА (В %)**

- 1) 80-90
- 2) 90-100
- 3) 55-75
- 4) < 50

**ВЕРОЯТНЫМ ПРИЗНАКОМ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ (ЛОКАЛИЗОВАННАЯ ФОРМА) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) выраженный катаральный синдром

- 2) пневмония
- 3) плотные малоблезненные паховые лимфоузлы
- 4) ангина (острый тонзиллит с налетами)

**ПРИ ОЦЕНКЕ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО К ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТ**

- 1) средний доход на душу населения
- 2) инвалидность
- 3) прожиточный минимум
- 4) региональный внутренний продукт

**КРИТЕРИЕМ ДИАГНОСТИКИ АТОПИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) LE-клетки
- 2) лейкоцитоз
- 3) высокий уровень IgE
- 4) ускоренное СОЭ

**ЗАВЕДУЮЩЕМУ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИМ ПУНКТОМ – ФЕЛЬДШЕРУ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДОЛЖНОСТЬ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ**

- 1) сестринское дело
- 2) сестринское дело в хирургии
- 3) сестринское дело в педиатрии
- 4) лечебное дело

**ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМ**

- 1) Мерфи
- 2) Пастернацкого
- 3) Щеткина-Блюмберга
- 4) Мейо-Робсона

**СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕД КОПРОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ПАЦИЕНТУ ПРИНИМАТЬ**

- 1) можно в сочетании со строгой гипоаллергенной диетой
- 2) можно в сочетании с ферментными препаратами
- 3) не следует
- 4) можно в сочетании с биопрепаратами

**СОКРАЩЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ**

- 1) 45
- 2) 24
- 3) 40

**ПОСЛЕ ОБЗОРНОГО ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО И ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО**

- 1) доставить пострадавшего в медицинскую организацию, контролируя состояние и оказывая психологическую поддержку
- 2) дожидаться прибытия скорой медицинской помощи, контролируя состояние и оказывая психологическую поддержку пострадавшему
- 3) осуществить подробный осмотр в определенной последовательности для выявления травм различных областей тела и других состояний, требующих оказания первой помощи
- 4) опросить пострадавшего об обстоятельствах происшествия, предложить воды

**ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА**

- 1) полулёжа и полусидя
- 2) лёжа на спине
- 3) промежуточное между положением лёжа на животе и лёжа на боку
- 4) лёжа на животе

**К ЗАБОЛЕВАНИЯМ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) пневмония
- 2) туберкулез
- 3) бронхиальная астма
- 4) легочный протеиноз

**ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДИАГНОЗ «ПНЕВМОНИЯ» ПОДТВЕРЖДАЕТ**

- 1) усиление лёгочного рисунка
- 2) расширение корней лёгких
- 3) эмфизема лёгких
- 4) наличие инфильтративных теней

**ПРИ ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА «ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЁГКИХ» ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) спирометрии
- 2) коронарографии
- 3) эхокардиографии
- 4) полисомнографии

**СИМПТОМОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫВИХА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) боль
- 2) гиперемия
- 3) нарушение функции
- 4) пружинящая фиксация

**СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ КРОВИ И ЦИТРАТА НАТРИЯ ПРИ ЗАБОРЕ КРОВИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛЯЦИИ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 4:1
- 2) 10:2
- 3) 7:2
- 4) 9:1

**НАИБОЛЬШИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ГЕПАТИТА «D» ОТМЕЧАЕТСЯ У**

- 1) лиц с персистирующей HBs-антигемией
- 2) лиц, страдающих алкоголизмом
- 3) больных хроническим гепатитом С
- 4) переболевших гепатитом Е

**НАИБОЛЕЕ ГРОЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ РАНЕНИИ ВЕН ШЕИ, СЧИТАЕТСЯ**

- 1) тромбоз
- 2) тромбоз
- 3) воздушная эмболия
- 4) флебит

**ОСТРЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ (ИГЛЫ, ПЕРЬЯ) СОБИРАЕТСЯ В**

- 1) одноразовые пакеты
- 2) многоразовые емкости
- 3) одноразовую твердую (непрокальваемую) упаковку с плотно прилегающей крышкой
- 4) картонные коробки

**ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА В БОЛЕЗНЬ НЕ РАЗВИВАЕТСЯ В СЛУЧАЯХ ОБНАРУЖЕНИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ В ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ**

- 1) анти – HCV
- 2) анти - HBc
- 3) анти - HBs
- 4) анти - HBe

**ПРИКАЗ РАБОТОДАТЕЛЯ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ РАБОТНИКУ ПОД ПОДПИСЬ В \_\_\_\_\_ ДНЕВНЫЙ СРОК СО ДНЯ НАЧАЛА РАБОТЫ**

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 7

**ОСЛОЖНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) паркинсонизм
- 2) нарушение психики и интеллекта
- 3) остановка сердца

4) хроническая почечная недостаточность

**ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ II СТЕПЕНИ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) багрово-синюшная окраска кожи, появление прозрачных пузырей
- 2) появление геморрагических пузырей,
- 3) гиперестезии
- 4) на фоне кожи обычной окраски имеется струп

**ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ - ИНФЕКЦИИ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ:**

- 1) СП 3.1.5.2826-10
- 2) СП 3.1.1.2341-08
- 3) СП 3.1.3112-13
- 4) СП 3.1.2825-10

**СОГЛАСНО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В \_\_\_\_\_ ЭТАПА**

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 1
- 4) 2

**В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ВНЕСЕННЫМИ В СПИСОК**

- 1) III
- 2) II
- 3) IV
- 4) I

**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЖЕЛУДОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ У ПАЦИЕНТА МЕДСЕСТРА ДОЛЖНА**

- 1) положить пузырь со льдом на живот
- 2) положить грелку на живот
- 3) поставить масляную клизму
- 4) промыть желудок

**ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОГО РЯДА МОГУТ БЫТЬ**

- 1) целыми и дробными
- 2) однородными и разнородными
- 3) полными и частичными
- 4) положительными и отрицательными

**ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ТРЕБУЮТ**

- 1) темное вентилируемое помещение с относительной влажностью 65%
- 2) хорошо проветриваемое помещение с вариативной влажностью
- 3) установку стеллажей на расстоянии 1 метра от пола
- 4) установку стеллажей на расстоянии 0,5 метра от отопительных систем

### **СПИСАНИЕ ПОДЛЕЖАЩИХ УНИЧТОЖЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОИЗВОДЯТ**

- 1) в день, указанный главной медицинской сестрой
- 2) в первые 3 дня месяца, следующего за отчетным
- 3) в день, установленный приказом руководителя медицинской организации
- 4) не позднее последнего рабочего дня календарного месяца

### **ПРИ УГРОЗЕ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У РЕБЕНКА С ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ**

- 1) проведение оксигенотерапии
- 2) выполнение физиотерапевтических процедур
- 3) направление в поликлинику
- 4) срочная госпитализация

### **В ОТДЕЛЕНИИ ГЕМОДИАЛИЗА, ГДЕ ДИАГНОСТИРОВАН САЛЬМОНЕЛЛЕЗ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) изоляция заболевшего
- 2) назначение антибиотика контактным лицам
- 3) назначение интерферона контактным лицам
- 4) вакцинация не болевших и не привитых контактных лиц

### **К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ, ОТНОСИТСЯ РАБОТА**

- 1) в неблагоприятных климатических условиях
- 2) в ночное время
- 3) руководителя структурного подразделения
- 4) с вредными и опасными веществами в постоянном режиме

### **НАИБОЛЕЕ РАННИМ СПЕЦИФИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У БОЛЬНЫХ РАКОМ БИЛИОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) частая рвота
- 2) потеря веса
- 3) боль в эпигастрии и спине
- 4) механическая желтуха

### **РАБОЧИЙ РАСТВОР АЗОПИРАМА ПРИГОДЕН В ТЕЧЕНИЕ (В ЧАСАХ)**

- 1) 24
- 2) 1-2
- 3) 12
- 4) 6



## **К АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ ИЗМЕРЕНИЯ**

- 1) ЧСС, АД
- 2) массы тела, роста
- 3) динамометрии, спирометрии
- 4) спирометрии, ЭКГ

## **ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СТРАДАЮЩИХ**

- 1) хроническим гломерулонефритом
- 2) хроническим бронхитом
- 3) сахарным диабетом
- 4) блефаритом

## **ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГУЛИРУЕТ**

- 1) Этический кодекс медицинской сестры России
- 2) Конституция РФ
- 3) Трудовой Кодекс РФ
- 4) Гражданский кодекс РФ

## **90% ВСЕХ СЛУЧАЕВ АСЕПТИЧЕСКОГО МЕНИНГИТА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ И 50% У СТАРШИХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ВЫЗЫВАЕТ**

- 1) *Haemophilus influenzae* тип В
- 2) вирус клещевого энцефалита
- 3) энтеровирус
- 4) вирус эпидемического паротита

## **ДЛЯ КАТАРАЛЬНОЙ АНГИНЫ ХАРАКТЕРНА СИМПТОМАТИКА В ВИДЕ**

- 1) белых или светло-желтых налетов в лакунах небных миндалин
- 2) нагноившихся фолликулов на поверхности небных миндалин
- 3) расширения лакун небных миндалин
- 4) гиперемии небных дужек и небных миндалин

## **ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ, ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ СТЕНОКАРДИИ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ**

- 1) папаверин внутримышечно
- 2) мезатон внутривенно
- 3) кордиамин внутрь
- 4) нитроглицерин под язык

## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТУРНЫЕ БЛАНКИ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ В**

- 1) ящике рабочего стола
- 2) шкафу рабочего кабинета
- 3) запираемом металлическом сейфе

4) переносном чемодане

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ЛЕЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ВЕДЕТ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА**

- 1) приемного отделения
- 2) процедурного кабинета
- 3) старшая
- 4) постовая

**В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) ПРОВОДЯТ**

- 1) исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии
- 2) иммунодиагностику с применением аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми единицами очищенного туберкулина в стандартном разведении
- 3) флюорографию легких или рентгенографию органов грудной клетки (легких)
- 4) иммунодиагностику с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении

**ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 70 ЧЕЛОВЕК, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ**

- 1) не менее двух
- 2) достаточно одного
- 3) минимум три выхода
- 4) нормативными документами не регламентируется

**ТКАНЕВОЙ САЛФЕТКОЙ, СМОЧЕННОЙ РАСТВОРОМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ДЕЗИНФИЦИРУЮТ**

- 1) тазики эмалированные
- 2) резиновые клизмы
- 3) рожки от кислородной подушки
- 4) подкладные клеенки

**ВЫВОЗ ОТХОДОВ КЛАССА «Г» (ФЛАКОНЫ, АМПУЛЫ ОТ ЦИТОСТАТИКОВ И ГЕНОТОКСИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ) ПОСЛЕ ДЕЗАКТИВАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

- 1) имеющие лицензию на данный вид деятельности
- 2) вывозящие бытовой мусор
- 3) вывозящие медицинские отходы класса «А»
- 4) вывозящие медицинские отходы класса «Б»

**ПОКАЗАНИЯ К ПРЕКРАЩЕНИЮ РЕАНИМАЦИИ**

- 1) появление признаков биологической смерти
- 2) отсутствие признаков эффективного кровообращения

- 3) отсутствие самостоятельного дыхания
- 4) широкие зрачки

### **ДЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНО В МОКРОТЕ НАЛИЧИЕ**

- 1) атипичных клеток
- 2) эритроцитов
- 3) спиралей Куршмана, эозинофилов
- 4) лейкоцитов

### **ФЛАКОН С ДИАСКИНТЕСТОМ ХРАНИТСЯ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ НЕ БОЛЕЕ**

- 1) двух часов
- 2) одних суток
- 3) шести часов
- 4) недели

### **К КАТЕГОРИЯМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ИНФИЦИРОВАНИЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ ГЕПАТИТАМИ ОТНОСЯТ**

- 1) персонал центральных стерилизационных отделов (отделений)
- 2) медицинских регистраторов
- 3) хирургов, акушеров-гинекологов
- 4) персонал физиотерапевтических кабинетов

### **В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ**

- 1) картофель, хлеб
- 2) помидоры, огурцы, листья салата
- 3) молоко и молочные продукты
- 4) любые фрукты

### **ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИОННОМ БОЛЬНОМ НУЖНО ЗАПОЛНЯТЬ**

- 1) при подозрении на инфекционное заболевание
- 2) после консультации с врачом-инфекционистом
- 3) в случае лабораторного подтверждения диагноза
- 4) после выписки из стационара

### **ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДЯТ \_\_\_\_\_ РАЗ В \_\_\_\_\_**

- 1) 2; месяц
- 2) 2; неделю
- 3) 1; неделю
- 4) 1; месяц

### **ОДНА МАССАЖНАЯ ЕДИНИЦА СООТВЕТСТВУЕТ**

- 1) 10 мин
- 2) 12 мин
- 3) 15 мин

4) 20 мин

**ВЫБЕРИТЕ ОДНО ИЗ СВОЙСТВ ПУЛЬСА**

- 1) тахипноэ
- 2) атония
- 3) гипотония
- 4) напряжение

**ОСНОВНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДЕСТРУКТИВНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) клебсиелла
- 2) стафилококк
- 3) стрептококк
- 4) протей

**ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 1 РАЗ В \_\_\_\_\_ ГОД(А)**

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

**ДОЗУ ИНСУЛИНА ПО КОЛИЧЕСТВУ ХЛЕБНЫХ ЕДИНИЦ В РАЦИОНЕ РАСЧИТЫВАЮТ ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА**

- 1) тип 2
- 2) тип 1
- 3) любого типа
- 4) тип MODY

**СДАВЛЕННЫЙ "ПЕТУШИНЫЙ" КРИК НА ВДОХЕ У РЕБЕНКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) ларингоспазме
- 2) бронхиальной астме
- 3) бронхите
- 4) фарингите

**ЭКГ-ПРИЗНАКОМ ГИПЕРКАЛИЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) инверсия зубца Т
- 2) тахикардия
- 3) депрессия сегмента ST
- 4) высокий остроконечный зубец Т

**НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ИЗ СПИСКА II ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) норморфин
- 2) пиперидин
- 3) оксазепам

4) омнопон

**ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ РАНЕНИИ ГРУДИ ПРИОРИТЕТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) наложение на рану повязки, не пропускающей воздух
- 2) наложение на рану давящей повязки
- 3) наложение на рану стерильной повязки
- 4) своевременная дача пострадавшему обезболивающего

**МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ ВЕНОЗНОЙ ПЛАЗМЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМА ПИЩИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЕ В ПОЛЬЗУ ДИАГНОЗА «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ», СОСТАВЛЯЕТ (ММОЛЬ/Л)**

- 1) 6,1
- 2) 11,1
- 3) 15
- 4) 9,7

**ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ**

- 1) глаукома
- 2) катаракта
- 3) халязион
- 4) миопия

**УЧЕТНАЯ ФОРМА № 025/У «МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ»**

- 1) заполняется на каждого впервые обратившегося за медицинской помощью в амбулаторных условиях пациента
- 2) ведется на пациентов, обращающихся за медицинской помощью в амбулаторных условиях в специализированные медицинские организации или их структурные подразделения
- 3) заводится отдельно каждым из врачей, проводящим лечение
- 4) заполняется только при завершающем посещении пациента

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК НА УЧАСТКЕ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ РАЗ В \_\_\_\_\_**

- 1) 1; месяц
- 2) 2; месяц
- 3) 1; 2 недели
- 4) 1; неделю

**МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОСТОЯНИЯХ, ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БЕЗ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) реабилитационной
- 2) экстренной
- 3) неотложной

4) плановой

**МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ПЛАНИРУЕТ ЗАНЯТЬ ДОЛЖНОСТЬ СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ, ДЛЯ ЭТОГО ЕЙ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДИПЛОМ О \_\_\_\_\_ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ \_\_\_\_\_**

- 1) профессиональной переподготовке; организация сестринского дела
- 2) среднем профессиональном образовании; сестринское дело
- 3) окончании интернатуры; управление сестринской деятельностью
- 4) высшем образовании; сестринское дело

**ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДОВРАЧЕБНОГО ЭТАПА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМ ПРИПАДКОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) введение противосудорожных препаратов
- 2) предотвращение травмы головы
- 3) прерывание развивающегося припадка
- 4) предотвращение травмы опорно-двигательного аппарата

**ТРЕМОР ПОКОЯ ПО ТИПУ «СЧЕТА МОНЕТ» ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ**

- 1) болезни Паркинсона
- 2) болезни диффузных телец Леви
- 3) мультисистемной атрофии
- 4) кортико-базальной дегенерации

**К ФАКТОРАМ РИСКА ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) хронический гепатит
- 2) сахарный диабет
- 3) рассеянный склероз
- 4) хронический пиелонефрит

**К ПРОЯВЛЕНИЯМ ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ ОТНОСЯТ**

- 1) реактивный гастрит
- 2) асцит
- 3) кольцевидную эритему
- 4) артралгию

**ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ТИПИЧНОГО ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) артериальная гипотония
- 2) загрудинная боль продолжительностью более 20 минут
- 3) нарушение ритма сердца
- 4) артериальная гипертензия

**К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТ**

- 1) запах ацетона в выдыхаемом воздухе
- 2) полидипсию и полиурию
- 3) повышение АД
- 4) одышку

**ИНФИЦИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ МИКРООРГАНИЗМАМИ 3-4 ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ ОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА**

- 1) Б
- 2) В
- 3) Г
- 4) Д

**ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ**

- 1) грелка на живот
- 2) обезболивающее
- 3) холод на живот, госпитализация
- 4) антибактериальные средства

**ПРИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ОРГАНИЗМОМ ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ**

- 1) анти-HBs
- 2) анти-HBcor суммарный
- 3) анти-HBe
- 4) анти-HAVIgM

**ПО СПИРОГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ \_\_\_\_\_ СТАДИИ ХОБЛ**

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 2

**ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ГОЛЕНОСТОПНЫХ СВЯЗОК НАКЛАДЫВАЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПОВЯЗКА**

- 1) колосовидная
- 2) черепашья
- 3) восьмиобразная
- 4) уздечка

**НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ОСТРОГО СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) вирус герпеса 6 типа
- 2)  $\beta$ -гемолитический стрептококк группы А
- 3) цитомегаловирус
- 4) вирус парагриппа

### **ЗАКРЫТЫЙ ТИП ВОПРОСА ПОЗВОЛЯЕТ**

- 1) собрать необходимую информацию
- 2) вызвать новые вопросы и указать на нерешённые проблемы
- 3) сообщить собеседнику об ожидаемом ответе
- 4) получить или уточнить конкретную информацию

### **ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ СЧИТАЮТ**

- 1) гипергликемию, впервые выявленную во время беременности, но не соответствующую критериям «манифестного» сахарного диабета
- 2) любое значение гликемии, превышающее нормальный уровень глюкозы во время беременности
- 3) гипергликемию, впервые выявленную во время беременности или в течение года после родов
- 4) гипергликемию, обусловленную сниженной продукцией кортизола у беременной женщины

### **У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ**

- 1) идиопатический легочный фиброз
- 2) хроническая обструктивная болезнь легких
- 3) бронхиальная астма
- 4) экзогенный аллергический альвеолит

### **СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА НАЧИНАЮТ В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)**

- 1) 7
- 2) 9
- 3) 4
- 4) 3

### **В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ КОНТАМИНАЦИИ ЧИСТЫЕ РАНЫ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ КАК**

- 1) операционные раны со значительным нарушением техники стерильности или со значительной утечкой содержимого из желудочно-кишечного тракта
- 2) неинфицированные операционные раны без признаков воспаления
- 3) операционные раны, в которых микроорганизмы, вызвавшие послеоперационную инфекцию, присутствовали в операционном плане до начала операции
- 4) операционные раны, проникающие в дыхательные пути, пищеварительный тракт, половые или мочевыводящие пути при отсутствии необычного заражения

### **ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЙ ПЛОЩАДЬ СТЕН РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ \_\_\_\_\_, ГДЕ А – ДЛИНА ПОЛА, В – ШИРИНА ПОЛА, Н – ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ**

- 1)  $2 b (h + a)$



- 2)  $b(a + 2h)$
- 3)  $a(h + b)$
- 4)  $2h(a + b)$

### **ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭЛАСТАЗЫ КАЛА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СЛУЖИТ ДЛЯ**

- 1) дифференциальной диагностики опухолевых заболеваний и хронического панкреатита
- 2) оценки степени внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы
- 3) диагностики повреждения островкового аппарата поджелудочной железы
- 4) оценки степени инкреторной недостаточности поджелудочной железы

### **ОСТРЫЙ ГЕПАТИТ ПЕРЕХОДИТ В ХРОНИЧЕСКИЙ ПРИ СОХРАНЕНИИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЕЕ (МЕС.)**

- 1) 1
- 2) 6
- 3) 3
- 4) 12

### **ПОД КЛАССИФИКАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ПОНИМАЮТ**

- 1) процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в данной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон
- 2) распределение множества объектов на группы и другие подразделения по определенному, общему для каждого из них, признаку
- 3) разделение рынка на четко выраженные группы покупателей, каждая из которых может приобрести определенные товары
- 4) деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного и многократного использования для упорядоченности в сфере производства, обращения и потребления товара, а также повышение его безопасности, экономичности и конкурентоспособности

### **ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУЗЫРЯ СО ЛЬДОМ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)**

- 1) 40 – 42
- 2) 20 – 24
- 3) 12 - 15
- 4) 36 – 37

### **КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ II СТЕПЕНИ**

- 1) кожа пораженного участка багрово-синюшная, определяются прозрачные пузыри
- 2) имеется сухая раневая поверхность, окруженная струпом
- 3) гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются геморрагические пузыри и обрывки вскрывшихся пузырей
- 4) гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные

пузыри

**ПСИХОТРОПНЫЙ ВЕЩЕСТВОМ ИЗ СПИСКА III ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) барбитал
- 2) норметадон
- 3) эфедрон
- 4) гидроморфон

**РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕЖДУ ИБС И ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ ИМЕЕТ**

- 1) коронарография
- 2) возраст и пол больного
- 3) высокий уровень липидов в плазме
- 4) эхокардиография

**ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТ К \_\_\_\_\_ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) I
- 2) II
- 3) IIIб
- 4) IIIа

**ДЛЯ РАЗМЯГЧЕНИЯ КОРОЧЕК В НОСОВОЙ ПОЛОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

- 1) 3% раствор перекиси водорода
- 2) 10% раствор камфорного спирта
- 3) 70<sup>0</sup> этиловый спирт
- 4) вазелиновое масло

**ЧИСЛО ДНЕЙ ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ НА \_\_\_\_\_ РАБОТАЮЩИХ**

- 1) 100
- 2) 10000
- 3) 10
- 4) 1000

**ПЛАН УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ ПРИ БЕШЕНСТВЕ**

- 1) организация индивидуального медицинского поста
- 2) помещение пациента в общую палату
- 3) иссечение краев раны
- 4) обеспечение физического метода охлаждения

**«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) разнокалиберные влажные хрипы при аускультации
- 2) инфильтративные изменения в лёгких на рентгенограмме
- 3) повышение температуры, влажный кашель, интоксикация
- 4) воспалительные изменения в общем анализе крови

### **НАБОР СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОЗНАЧАЕТ**

- 1) оценку трудовой деятельности кандидатов
- 2) разработку методик оценки трудовой деятельности и доведение ее до работников
- 3) оценку кандидатов на рабочие места и отбор лучших из резерва
- 4) создание необходимого резерва потенциальных кандидатов на все сестринские должности в организации

### **РЕЗКО ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ И ГАММАГЛУТАМИНТРАНСПЕПТИДАЗЫ ПРИ**

- 1) описторхозе
- 2) гемахроматозе
- 3) хроническом гепатите с явлениями холестаза и билиарном циррозе печени
- 4) болезни Вильсона – Коновалова

### **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УБОРОЧНЫЕ (КЛИНИНГОВЫЕ) КОМПАНИИ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КРОМЕ ПОМЕЩЕНИЙ КЛАССА**

- 1) Б
- 2) А
- 3) Г
- 4) В

### **ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ ПОДРАЗУМЕВАЕТ**

- 1) временное складирование отходов в местах (на площадках)
- 2) содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования
- 3) изоляцию отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах
- 4) использование отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов

### **ХАРАКТЕР КАШЛЯ ПРИ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ**

- 1) грубый, «лающий»
- 2) продуктивный, влажный
- 3) сухой, навязчивый
- 4) приступообразный

### **ПОМИМО БОЛИ В ГОРЛЕ У ПАЦИЕНТОВ С АНГИНОЙ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ ПОЯВИТСЯ**

- 1) усиление боли при поворотах головы
- 2) резкое усиление боли при продувании слуховых труб
- 3) тризм жевательной мускулатуры
- 4) резкое усиление боли при высовывании языка

#### **ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ТИП В ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЛЕЧЕНИИ**

- 1) семейного хеликобактериоза
- 2) заболеваний поджелудочной железы
- 3) очагов хронической инфекции
- 4) кишечных инфекций

#### **РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПАЦИЕНТУ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ ПРИНИМАЕТ**

- 1) участковый врач
- 2) медико-социальная экспертная комиссия
- 3) заведующий отделением
- 4) клинико-экспертная комиссия медицинской организации

#### **ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ БЦЖ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПРОВОДИТСЯ**

- 1) подкожно в верхнюю треть плеча
- 2) внутрикожно в верхнюю треть плеча
- 3) внутрикожно в верхнюю треть предплечья
- 4) внутримышечно в верхнюю треть предплечья

#### **ЕСЛИ В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ НЕ ОГОВОРЕН ДЕНЬ НАЧАЛА РАБОТЫ, ТО СПЕЦИАЛИСТ, ПРИНЯТЫЙ НА ДОЛЖНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРА ЗДРАВПУНКТА, ДОЛЖЕН ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ**

- 1) на следующий рабочий день после вступления договора в силу
- 2) в день подписания договора
- 3) в день вступления договора в силу
- 4) через 3 рабочих дня после вступления договора в силу

#### **СНИЖЕНИЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ**

- 1) гемолитической анемии
- 2) стенозе почечных артерий
- 3) коарктации аорты
- 4) аортальной недостаточности

#### **ПРОБОЙ ЗИМНИЦКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В МОЧЕ**

- 1) количество форменных элементов и бактерий
- 2) наличие уробилина и желчных пигментов
- 3) количество сахара и ацетона
- 4) плотность и диурез

#### **СПОСОБОМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОСУДЫ (СТОЛОВОЙ, ЧАЙНОЙ) БОЛЬНОГО ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) погружение в раствор дезинфицирующего средства
- 2) автоклавирование
- 3) засыпание сухим дезинфицирующим средством
- 4) камерная дезинфекция

#### **ПРИ ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТОМ В КРИЗИСЕ БУДЕТ ПОЛЕЗНЫМ**

- 1) запрещать пациенту выражать чувства
- 2) говорить «все будет хорошо»
- 3) сочувствовать пациенту
- 4) употреблять незнакомые пациенту медицинские термины

#### **УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА В 1 МИН. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НА 1 ГРАД. (В УДАРАХ)**

- 1) 20
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 50

#### **ДЕЗИНФЕКЦИЮ ОБОРОТНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА «Б» ПРОИЗВОДЯТ**

- 1) специализированные организации, вывозящие отходы
- 2) сотрудники медицинской организации
- 3) клининговая компания
- 4) сотрудники хозяйственного отдела

#### **ПЯТЫМ ЭТАПОМ СИСТЕМЫ СБОРА, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы
- 2) перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы
- 3) захоронение или уничтожение медицинских отходов
- 4) сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность

#### **СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ДЕТИ 6-7 ЛЕТ ПОДЛЕЖАТ**

- 1) ревакцинации против пневмококковой инфекции
- 2) ревакцинации против туберкулеза
- 3) вакцинации против вирусного гепатита В
- 4) второй вакцинации против полиомиелита

#### **ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДИАГНОСТИРОВАТЬ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫЕ ГЕМОРОИДАЛЬНЫЕ ВЕНЫ**

- 1) ректороманоскопия
- 2) фиброгастродуоденоскопия

- 3) ирригоскопия
- 4) ангиография

**В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ВБИ) РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЙ УТВЕРЖДАЕТСЯ**

- 1) руководителем организации
- 2) эпидемиологом организации
- 3) главной сестрой организации
- 4) экономистом организации

**ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬШИНСТВА ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ (ММ РТ.СТ.)**

- 1) 150/90
- 2) 120/70
- 3) 140/90
- 4) 130/80

**В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПОРЯДКОМ И СРОКАМИ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОТОВИТ**

- 1) отчет за последний год работы
- 2) служебную записку с результатами профессиональной деятельности
- 3) отчет за период работы, определенный главной медицинской сестрой
- 4) презентацию с результатами профессиональной деятельности

**К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ОТНОСЯТ**

- 1) кишечный токсикоз
- 2) дыхательную недостаточность
- 3) судорожный синдром
- 4) надпочечниковую недостаточность

**ПОСТРАДАВШЕМУ С ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕЛОМОМ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТРАВМА ПОЛУЧЕНА В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СЛЕДУЕТ**

- 1) доставить пострадавшего в травмпункт
- 2) зафиксировать голень транспортными шинами
- 3) зафиксировать голень подручными средствами, дать пострадавшему обезболивающее средство (при отсутствии аллергии)
- 4) помочь принять удобное положение, вызвать скорую медицинскую помощь

**ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПАЦИЕНТА ПРИ РВОТЕ СЧИТАЕТСЯ**

- 1) сидя

- 2) стоя
- 3) лежа на спине
- 4) лежа на боку

**ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОМИССИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРЯЕТ СОСТОЯНИЕ ХРАНЕНИЯ, УЧЕТА, ФАКТИЧЕСКОЕ НАЛИЧИЕ И РАСХОД СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ НА НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО И ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО 1 РАЗ В**

- 1) квартал
- 2) месяц
- 3) неделю
- 4) год

**К КЛАССУ ЧИСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ Г ОТНОСЯТСЯ**

- 1) палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных
- 2) кабинеты функциональной диагностики, процедурные эндоскопии
- 3) рентгенооперационные, в том числе ангиографические
- 4) регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ ОПРЕДЕЛЯЮТ**

- 1) уровень кортизола
- 2) уровень ванилилминдальной кислоты
- 3) функциональное состояние почек
- 4) цвет, прозрачность, реакцию, относительную плотность

**ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ОЧАГЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЧТО ВОЗБУДИТЕЛЬ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ МОЖЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ВНЕ ОРГАНИЗМА**

- 1) дни
- 2) минуты, часы
- 3) годы
- 4) месяцы

**ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПОЛИСА ОМС МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО \_\_\_\_\_ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ**

- 1) плановую
- 2) экстренную
- 3) консультативно-диагностическую
- 4) стационарную

**ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В**

- 1) фекально-оральный
- 2) парентеральный
- 3) трансмиссивный

4) воздушно-капельный

**СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ДЕТИ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ ПОДЛЕЖАТ**

- 1) первой вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка
- 2) первой вакцинации против пневмококковой инфекции
- 3) второй вакцинации против вирусного гепатита В
- 4) второй вакцинации против полиомиелита

**ТОТАЛЬНЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ ВСЕХ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ НАЗЫВАЮТ**

- 1) пансинусит
- 2) обострение хронического синусита
- 3) сфеноидит
- 4) острый синусит

**ПАЛЬЦЕВОЕ ПРИЖАТИЕ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) к плечевой кости с наружной стороны плеча с помощью четырех пальцев кисти, обхватывающей плечо пострадавшего
- 2) большим пальцем нижней трети плеча с усилием, достаточным для остановки кровотечения
- 3) к плечевой кости с внутренней стороны между бицепсом и трицепсом в средней трети плеча с помощью четырех пальцев кисти, обхватывающей плечо пострадавшего
- 4) указательным и средним пальцами посередине наружной поверхности плеча

**В ПОМЕЩЕНИЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ, ХРАНЕНИЕ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В**

- 1) термоконтейнерах, размещенных в сейфах
- 2) специальной зоне для размещения холодильников, отделенной от основного места хранения металлической решеткой с запирающейся решетчатой дверью
- 3) контейнерах, помещенных в закрывающиеся емкости
- 4) запирающихся холодильных камерах

**КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отсутствие сознания, бледность, влажность кожных покровов, повышение тонуса мышц
- 2) отсутствие сознания, сухость и землистый цвет кожных покровов, запах мочевины изо рта
- 3) отсутствие сознания, бледность кожных покровов, одышка, анизокария
- 4) отсутствие сознания, сухость и гиперемия кожных покровов, дыхание шумное типа Куссмауля

**РЕБЕНОК В ВОЗРАСТЕ 1 ГОДА, ГОЛОВА ЗАПРОКИНУТА, ТУЛОВИЩЕ ВЫГНУТОЕ, ЖИВОТ ВТЯНУТ, РУКИ ПРИЖАТЫ К ГРУДИ, НОГИ ПОДТЯНУТЫ К ЖИВОТУ. ТАКАЯ ПОЗА РЕБЕНКА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ**



- 1) менингеального синдрома
- 2) мышечной гипотонии
- 3) акушерского пареза
- 4) опистотонуса

**ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ГРУДНОГО РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО**

- 1) перевернуть ребенка за ноги вниз головой
- 2) вызвать рвоту
- 3) надавить на корень языка
- 4) положить ребенка на живот на колено, похлопать между лопатками

**ОТХОДЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ТУБЕРКУЛЁЗА, ОТНОСЯТ К КЛАССУ**

- 1) Г
- 2) Д
- 3) Б
- 4) В

**ДЛЯ АУСКУЛЬТАТИВНОЙ КАРТИНЫ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ**

- 1) крепитации
- 2) влажных мелкопузырчатых хрипов
- 3) сухих свистящих хрипов
- 4) шума трения плевры

**К АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ ИЗМЕРЕНИЯ**

- 1) динамометрии, спирометрии
- 2) частоты сердечных сокращений, артериального давления
- 3) массы тела, роста
- 4) спирометрии, ЭКГ

**АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИИ «ШКОЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА» МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ**

- 1) просмотр популярной медицинской программы
- 2) лекцию о правилах питания при наследственной предрасположенности к заболеванию
- 3) рекомендации по применению сахароснижающих средств
- 4) обучение технике расчета индекса массы тела