

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» для аккредитации

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:

https://medik-otvet.ru/product/med_ekspert/

**РЕЗЕКЦИЮ ЧАСТИ КОПЧИКА, ВЫПОЛНЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО ТРАВМЫ И
ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%,
КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

НАЛИЧИЕ ОЧАГА ГОНА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1) вторичном туберкулезе
- 2) течении бактериальной пневмонии
- 3) гематогенном туберкулезе
- 4) перенесенном первичном туберкулезе

К НЕОБРАТИМОЙ ПОТЕРЕ СПОСОБНОСТИ ВЫРАЖАТЬ МЫСЛИ

ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНЫМИ ЗВУКАМИ, ПОНЯТНЫМИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, ОТНОСЯТ

- 1) персеверацию
- 2) парафазию
- 3) потерю речи
- 4) алалию

**КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ
ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

КО ВТОРИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) бронхопневмонию
- 2) септическую
- 3) паренхиматозную
- 4) интерстициальную

ЦЕННЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ БОТУЛОТОКСИНА ПРИ ____ ИССЛЕДОВАНИИ

- 1) спектральном
- 2) химическом
- 3) биологическом
- 4) газохроматографическом

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ ХОЛОСТЫМИ ПАТРОНАМИ ОБРАЗУЮТСЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) продуктов взрыва капсюля
- 2) пламени
- 3) огнестрельного снаряда
- 4) металлических частиц

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ УТОЛЩЕНИЕ СТЕНКИ БРОНХОВ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ ИНФИЛЬТРАЦИИ ЕЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) нейтрофилами
- 2) эритроцитами
- 3) макрофагами
- 4) тромбоцитами

ПЛОЩАДЬ И ГЛУБИНУ ОТМОРОЖЕНИЙ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ЧЕРЕЗ (В СУТКАХ)

- 1) 5-7
- 2) 2-3
- 3) 1-2
- 4) 9-10

ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОВОРОЖДЕННОСТИ ИМЕЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ В КРОВИ ИЗ ТРУПА

- 1) фетального гемоглобина
- 2) карбоксигемоглобина
- 3) гемоцианина
- 4) метгемоглобина

ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ НАДРЫВЫ КОЖИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО НАПРАВЛЕНИЮ ПЕРЕЕЗДА, ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) Русакова – Шкаравского
- 2) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа
- 3) Оливье – Данжера
- 4) Станиславского

ПЕРЕЛОМ, ВОЗНИКШИЙ ОТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФОНЕ СТРУКТУРНЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ, СНИЖАЮЩИХ ЕЕ ПРОЧНОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) травматическим
- 2) патологическим
- 3) атипичным
- 4) осложненным

ОТ УДАРА ТУПЫМ ТВЁРДЫМ ПРЕДМЕТОМ С НЕОГРАНИЧЕННОЙ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ НА КОСТЯХ ЧЕРЕПА ОБРАЗУЮТСЯ ПЕРЕЛОМЫ

- 1) террасовидные
- 2) многооскольчатые
- 3) винтообразные
- 4) вколоченные

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ МЕТАНОЛОМ НА СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ ГОЛОВНОЙ МОЗГ, ОБЪЕМОМ (В ГРАММАХ)

- 1) 50
- 2) 100
- 3) 200
- 4) 150

ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ПОЛОВОГО АКТА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТИ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ОБЪЕКТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

- 1) о монорхизме
- 2) об анорхизме
- 3) о максимальной величине окружности полового члена подозреваемого в состоянии эрекции
- 4) об агенезии

ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) арефлексия
- 2) адинамия
- 3) аутолиз
- 4) асистолия

СМЕРТЬ ОТ АСПИРАЦИИ СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ К _____ АСФИКСИИ

- 1) быстрой компрессионной
- 2) странгуляционной
- 3) обтурационной
- 4) медленной компрессионной

МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА МОГУТ ВЫДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕМУ ЭКСПЕРТИЗУ, ПО

- 1) доверенности
- 2) устной договоренности
- 3) письменному заявлению

4) желанию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА МОГУТ ВЫДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕМУ ЭКСПЕРТИЗУ, ПО

- 1) письменному заявлению
- 2) желанию
- 3) устной договоренности
- 4) доверенности

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ ПРОВОДЯТ ____ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1) серологическое
- 2) генетическое
- 3) гистологическое
- 4) микробиологическое

ИССЛЕДОВАНИЮ ПОДЛЕЖИТ ПАЗУХА ОСНОВНОЙ КОСТИ ТРУПОВ, ИЗВЛЕЧЕННЫХ ИЗ

- 1) воды
- 2) петли
- 3) мест захоронений
- 4) салона автомобиля

К ПЕРВИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТНОСЯТ

- 1) газовую гангрену
- 2) анаэробную инфекцию
- 3) асептическое воспаление
- 4) кровотечение

ВМЯТИНА В МЕСТЕ УДАРА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ ПО ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЕ ПЛЕЧА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ДО (В ЧАСАХ) (ПО БИЛКУНУ В.В., 1986)

- 1) 3
- 2) 11
- 3) 6
- 4) 5

ЗАКРЫТУЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ КОМОЙ III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ РАНЫ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПРОСВЕТ ГОРТАНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСЕРВИРУЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ

- 1) едкими ядами
- 2) сердечными гликозидами
- 3) фосфорорганическими соединениями
- 4) метанолом

ПОЛОСЧАТЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ ПОД ЭНДОКАРДОМ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА ЯВЛЯЮТСЯ ПЯТНАМИ

- 1) Минакова
- 2) Вишневского
- 3) Тардые
- 4) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА С ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ПРАВОЙ КИСТИ, РАВНОЕ 30% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ПРИ НЕКРОЗЕ РАСПАДОМ ЯДРА НА ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кариолизис

- 2) кариорексис
- 3) кариопикноз
- 4) плазморексис

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) УФ-спектрометрии
- 2) ИК-спектроскопии
- 3) флюориметрии
- 4) газовой хроматографии

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА РЕШЕТЧАТОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ЗРАЧОК ТРУПА РЕАГИРУЕТ НА ВВЕДЕНИЕ ТОЛЬКО ОДНОГО ПРЕПАРАТА СПУСТЯ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1) 2-4
- 2) 9-10
- 3) 20-24
- 4) 15-18

НАРУЖНЫЙ ОСМОТР ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧАСТИЕМ

- 1) санитара
- 2) врача-специалиста в области судебной медицины
- 3) работника бюро ритуальных услуг
- 4) среднего медицинского работника

ФЕРМЕНТ АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗУ ОПРЕДЕЛЯЮТ В КРОВИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА

- 1) синдром длительного сдавления
- 2) острое отравление этанолом
- 3) острое отравление стрихнином
- 4) гипогликемическую кому

ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ КЕССОННОЙ БОЛЕЗНИ ОБЪЯСНЯЕТСЯ

- 1) кислородным отравлением
- 2) развитием газовой эмболии
- 3) баротравмой легких
- 4) азотным отравлением

ТИП ГИПОКСИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ПРИ СНИЖЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ИЛИ

ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В КРОВИ, ОТНОСЯТ К _____ ГИПОКСИИ

- 1) гемической
- 2) гипоксической
- 3) тканевой
- 4) циркуляторной

К ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ НОВорожденного МЛАДЕНЦА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСЯТ

- 1) механическую асфиксию
- 2) болезнь гиалиновых мембран
- 3) гемолитическую болезнь новорожденных
- 4) патологические переломы костей скелета

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ДРОБОВОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ АОРТЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПОВЫШЕННАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ, НАРУШЕНИЯ КООРДИНАЦИИ МЕЛКИХ ДВИЖЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ _____ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

- 1) легкой
- 2) средней
- 3) сильной
- 4) тяжелой

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ УРЕМИЧЕСКОЙ КОМОЙ II-III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕЛОВЫХ СИМПТОМОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ПРИ НЕОБОСНОВАННОСТИ ИЛИ СОМНЕНИИ В ПРАВИЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОГО ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАЗНАЧАЮТ ЭКСПЕРТИЗУ

- 1) повторную
- 2) комиссионную
- 3) комплексную
- 4) дополнительную

ПРИ МОНОЛОБУЛЯРНОМ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ

- 1) 3 печеночных долики
- 2) 4 печеночных долики
- 3) 2 печеночных долики
- 4) 1 печеночная доляка

ПОВЫШЕННОЕ СКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ СМЕРТИ ОТ УТОПЛЕНИЯ В ВОДЕ ЗА СЧЕТ ПОСМЕРТНОГО ТРАНССУДИРОВАНИЯ ВОДЫ ОПИСАН

- 1) Моро
- 2) Крушевским
- 3) Каспером
- 4) Свешниковым

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЛЕТУЧИМИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ДЛЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЫМАЮТ

- 1) волосы, ногти и плоски кости
- 2) фрагмент печени с невскрытым желчным пузырем
- 3) глотку, трахею и пищевод
- 4) сальник, головной мозг

ТРАВМАТИЧЕСКУЮ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЮ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ДАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО СТАТЬЕ 310 УК РФ НАСТУПАЕТ В СЛУЧАЕ

- 1) предварительного предупреждения эксперта или специалиста
- 2) предварительного разъяснения эксперту его прав и обязанностей руководителем государственного судебно-экспертного учреждения
- 3) нарушения экспертом требований о неразглашении сведений в соответствии со статьей 16 «Обязанности эксперта» ФЗ «О ГСЭД в РФ»
- 4) нарушения экспертом требования части 2 статьи 85 «Обязанности и права эксперта» ГПК РФ о неразглашении сведений

ОБЛАСТЯМИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ТИПУ ПРОТИВОУДАРА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТРАВМИРУЮЩЕЙ СИЛЫ В ОБЛАСТЬ ЗАТЫЛКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) полушария мозжечка
- 2) миндаины мозжечка
- 3) полюсы затылочных долей
- 4) полюсы лобных долей

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ МАЛЯРИИ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) печень
- 2) аммонов рог
- 3) кусочки селезенки
- 4) легкие

СПИРАЛЕВИДНЫЙ (ВИНТООБРАЗНЫЙ) ПЕРЕЛОМ ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЗУЕТСЯ ОТ

- 1) действия травмирующей силы по направлению продольной оси диафиза
- 2) удара по типу механизма образования «бампер-перелома»
- 3) прямого перпендикулярного удара тупого твердого предмета
- 4) непрямого действия травмирующей силы в область фиксированной части диафиза

РАНУ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПРОСВЕТ ГЛОТКИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПОДДЕРЖАНИЕ БОЛЕЗНЕННОГО ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК ____ БОЛЕЗНИ

- 1) неврологические
- 2) притворные
- 3) искусственные
- 4) психическими

В СЛУЧАЕ НЕСМЕРТЕЛЬНОГО ОТРАВЛЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ

- 1) сбора анамнеза заболевания
- 2) оценки степени тяжести вреда здоровью
- 3) установления степени вины подозреваемого
- 4) направления объектов на лабораторные исследования

ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНСЕРВАЦИЕЙ ТЕЛ УМЕРШИХ ПРИ ИХ ДЛИТЕЛЬНОМ НАХОЖДЕНИИ В ПОЧВЕ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ

- 1) омыления
- 2) аутолиза

- 3) гниения
- 4) торфяного дубления

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО И ДВУХ СУСТАВОВ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

НЕРАВЕНСТВО ЗРАЧКОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) анизокорией
- 2) катарактой
- 3) близорукостью
- 4) дальнозоркостью

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА С IV ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ЛЕВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) угрожающий жизни

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) гломерулонефрита с субтотальным блоком кровотока по клубочковым капиллярам
- 2) однослойного призматического эпителия собирательной трубочки
- 3) кубического эпителия дистального извитого канальца
- 4) мезангиальных клеток почечного тельца

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

«ПАУТИНООБРАЗНЫЙ» ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА ФОРМИРУЮТ ПРЕДМЕТЫ С

- 1) ограниченной травмирующей поверхностью воздействующие под острым углом

- 2) сферической формы
- 3) ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под прямым углом
- 4) преобладающей травмирующей поверхностью

ОТРАВЛЕНИЕ АКОНИТОМ ОТНОСИТСЯ К ОТРАВЛЕНИЯМ

- 1) пищевым
- 2) ядохимикатами
- 3) гемотропными ядами
- 4) ядами общефункционального действия

ОСВИДЕТЕЛЬСТВУЕМЫЙ ПРИ АГГРАВАЦИИ _____ СИМПТОМЫ

- 1) категорически отрицает существующие
- 2) демонстрирует несуществующие
- 3) преувеличивает существующие
- 4) значительно преуменьшает имеющиеся

СГУЩЕНИЕ КРОВИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 40-42°C РАЗВИВАЕТСЯ К КОНЦУ (В ЧАСАХ)

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ В ВЫПРЯМЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ПО КОЛИЧЕСТВУ РЯДОВ ПЕТЛИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК

- 1) одинарные и многорядные
- 2) однооборотные и многооборотные
- 3) замкнутые и незамкнутые
- 4) затягивающиеся и незатягивающиеся

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ РАЗВИТИЕ БОЛЕВОГО

СИНДРОМА И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ТРАНСДЕРМАЛЬНЫМ ПУТЕМ ПОПАДАНИЯ В ОРГАНИЗМ ОБЛАДАЕТ

- 1) фенол
- 2) этанол
- 3) марихуана
- 4) героин

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) легкий

ПРИ ВЕТреной СУХОЙ ПОГОДЕ ПРИЗНАКИ ПОМУТНЕНИЯ РОГОВИЦЫ НА ОТКРЫТЫХ ГЛАЗАХ ОТМЕЧАЮТСЯ СПУСТЯ ____ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1) 3 часа
- 2) 1 час
- 3) 5 часов
- 4) 4 часа

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЛЕГКОГО ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ТРАНСПОРТИРОВКУ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ СРЕДСТВАМИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- 1) врач
- 2) орган или лицо, назначившее экспертизу
- 3) лаборант
- 4) страховой агент

НИЖНИЕ ВЕТВИ ЛОННЫХ КОСТЕЙ ЖЕНСКОГО ТАЗОВОГО КОЛЬЦА СХОДЯТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- 1) 45-50
- 2) 60-65
- 3) 70-75
- 4) 90-100

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ БОЛИ ЩИПАНИЕМ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК

- 1) побои
- 2) извращение
- 3) мучение
- 4) истязание

ЗАКРЫТАЯ ТУПАЯ ТРАВМА ПРАВОГО БЕДРА С РАЗРЫВОМ БЕДРЕННОЙ ВЕНЫ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

ЯДРО ОКОСТЕНЕНИЯ В ДИСТАЛЬНОМ ЭПИФИЗЕ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ПОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) до рождения
- 2) в возрасте от 3 до 5 лет
- 3) в первый месяц после рождения
- 4) в возрасте от 6 месяцев до 2 лет

К НЕМЕДИЦИНСКИМ МАРКЕРАМ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОТНОСЯТ

- 1) трупное высыхание
- 2) трупные пятна
- 3) характер одежды пострадавшего
- 4) пятна Лярше

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ В ХОДЕ СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повторным
- 2) первоначальным
- 3) судебным
- 4) дополнительным

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) средней тяжести

ДИСТАНЦИЯ ВЫСТРЕЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) комплексом причинивших в конкретном случае огнестрельную травму повреждающих компонентов выстрела
- 2) расстоянием между дульным срезом оружия и поверхностью повреждаемой части тела
- 3) кинетической энергией пули
- 4) максимальной дальностью полета пули

К ОБЪЕКТАМ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СПИД ОТНОСЯТ

- 1) надпочечники
- 2) мазки-отпечатки слизистых оболочек дыхательных путей
- 3) яичники
- 4) головной и спинной мозг

ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ СТАДИЮ

- 1) нефротическую
- 2) начальную шоковую
- 3) протеинемическую
- 4) азотемическую

ВОЛОС ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) паренхимой
- 2) соединительнотканным образованием
- 3) кератиновым эпидермальным образованием
- 4) продуктом особой волосяной ткани

ТУПАЯ ТРАВМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ В ОТДАЛЁННОМ

**ПЕРИОДЕ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ IV СТЕПЕНИ,
КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

**ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
РАЗВИВАЕТСЯ**

- 1) миелит
- 2) менингит
- 3) токсическая энцефалопатия
- 4) энцефалит

**МЕХАНИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ, ПРИЧИНЯЮЩИМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭКИПАЖУ ПРИ
КАТАПУЛЬТИРОВАНИИ, МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) встречный поток воздуха
- 2) низкая температура
- 3) монооксид углерода
- 4) световое излучение

**ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОТСУТСТВИЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РЕЗКОЕ НАРУШЕНИЕ ТРОФИКИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ
УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК
ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ КОЛОТОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СВОДА ЧЕРЕПА ФОРМИРУЕТСЯ ПЕРЕЛОМ

- 1) паутинообразный
- 2) оскольчато-фрагментарный
- 3) террасовидный
- 4) дырчатый

**ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА В ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ СО
СДАВЛЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ,
ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ**

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА НАПРАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С

- 1) легковоспламеняющимися веществами
- 2) оружием
- 3) материалами дела
- 4) наркотическими средствами

К ВОЗМОЖНОСТИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТНОСЯТ

- 1) обезображение
- 2) аномалию развития
- 3) неизгладимость
- 4) изгладимость

ПРИ АВТОТРАВМЕ РАЗРЫВЫ ПЕЧЕНИ ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА НА

- 1) левом боку
- 2) правом боку
- 3) животе
- 4) спине

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ДОСТАВЛЯЮТ

- 1) материалы уголовных дел
- 2) специальную литературу
- 3) нормативно-правовые акты
- 4) подзаконные акты

МИКРОСКОПИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ РАК ПЕЧЕНИ

- 1) массивный
- 2) мультилобулярный
- 3) монолобулярный
- 4) крупноузловой

СТЕПЕНЬ ЗИЯНИЯ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ЗАВИСИТ ОТ

- 1) глубины её раневого канала
- 2) её ориентации к линиям Лангера
- 3) формы резьбы хвостовика ножа
- 4) конструкции затыльника ножа

СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- 1) бесцветную жидкость с запахом горького миндаля
- 2) аморфный порошок с запахом горького миндаля
- 3) газ без цвета и запаха
- 4) жидкость с резким запахом ацетона

ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ III СТЕПЕНИ ПРОИСХОДИТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ

- 1) отека и покраснения

- 2) некроза мышц и костей
- 3) пузырей с серозным содержимым
- 4) некроза эпидермиса и дермы

ПРОИЗВОДНЫЕ D-ЛИЗЕРГИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ТРИПТАМИНА В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ОБНАРУЖИВАЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) рентгенфлюоресценции
- 2) метода цветных отпечатков
- 3) эмиссионного спектрального анализа
- 4) УФ-спектрофотометрии

НЕОБХОДИМОСТЬ В УСТАНОВЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ К ОПЛОДОТВОРЕНИЮ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ВОЗНИКАЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ

- 1) монорхизме
- 2) анорхизме
- 3) рассмотрении дел о спорном отцовстве
- 4) агенезии

ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ ИСХОДНОГО МАКРОСКОПИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОДНИМ ИЗ ЭТАПОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАБОТКА ФРАГМЕНТА ТКАНИ ПРИ ПОМОЩИ _____ ПРОВОДКИ

- 1) формалиновой
- 2) ацетоновой
- 3) глицериновой
- 4) спиртовой

ТИП ГИПОКСИИ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ВСЛЕДСТВИЕ УМЕНЬШЕНИЯ КИСЛОРОДНОЙ ЕМКОСТИ КРОВИ ПРИ НАРУШЕНИИ СПОСОБНОСТИ ГЕМОГЛОБИНА СВЯЗЫВАТЬ, ТРАНСПОРТИРОВАТЬ И ОТДАВАТЬ ТКАНЯМ КИСЛОРОД, ОТНОСЯТ К _____ ГИПОКСИИ

- 1) гипоксической
- 2) циркуляторной
- 3) гемической
- 4) тканевой

ЛИЧИНКИ ПАДАЛЬНЫХ МУХ СОХРАНЯЮТ В УМЕРЕННО ХОЛОДНОЙ СРЕДЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1) 9-10
- 2) 1-2
- 3) 7-8
- 4) 2-6

ПРИ НАРУЖНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРЫВЫ КОЖИ

- 1) груди

- 2) нижних конечностей
- 3) живота
- 4) лица

ДЕЙСТВИЕ М-ХОЛИНОЛИТИКОВ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышением секреции желез
- 2) снижением секреции желез
- 3) параличом дыхательного центра
- 4) комой

НЕСРОСШИЙСЯ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ В ОБЛАСТИ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕТАФИЗА ЛЕВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ОТКРЫТЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫВИХ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ АСИНКЛИТИЧЕСКОМ ВСТАВЛЕНИИ ГОЛОВЫ ПЛОДА ПРОИСХОДИТ ЗАХОЖДЕНИЕ

- 1) затылочной кости на лобную кость
- 2) затылочной кости на теменные кости
- 3) лобной кости на затылочную кость
- 4) теменных костей друг на друга

У ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА МАССА СЕРДЦА СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)

- 1) 23-24
- 2) 59-60
- 3) 11-12
- 4) 38-39

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПИАТОВ В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ПРОВОДИТСЯ ____ МЕТОДОМ

- 1) колориметрическим
- 2) флюориметрическим

- 3) газохроматографическим
- 4) иммуноферментным

УСИЛЕННОЕ ПОТООТДЕЛЕНИЕ ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ ВОДЫ ДО _____ ЛИТРОВ В СУТКИ

- 1) 20
- 2) 16
- 3) 12
- 4) 19

СТАДИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУПНОГО ПЯТНА, СОПРОВОЖДАЮЩАЯСЯ ПОСТЕПЕННЫМ СГУЩЕНИЕМ КРОВИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ДИФфуЗИИ ПЛАЗМЫ ИЗ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ В ПЕРИВАСКУЛЯРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В СОСУДАХ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) трупным стазом
- 2) гипостазом
- 3) имбибицией
- 4) аутолизом

ВИРУС ГЕПАТИТА «В» ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РЕПЛИЦИРУЕТСЯ В

- 1) нейронах
- 2) энтероцитах
- 3) астроцитах
- 4) гепатоцитах

ГИСТОЛОГИЧЕСКИ РАК ПЕЧЕНИ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) крупноузловым
- 2) недифференцированным
- 3) плоскоклеточным
- 4) светлоклеточным

РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЕЙ

- 1) метаболической
- 2) прижизненной
- 3) посмертной
- 4) химической

РАЗЛИЧАЮТ _____ ОЖОГОВ

- 1) 3 степени
- 2) 4 степени
- 3) 6 степеней
- 4) 5 степеней

ПРИ ОЖОГЕ 2 СТЕПЕНИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗУЮТСЯ В

- 1) печени

- 2) мышцах
- 3) коже
- 4) костях

ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА КОМИССИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОВОДИМЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, ИЗЛОЖЕНЫ В ПРИКАЗЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ №

- 1) 388н
- 2) 194н
- 3) 346н
- 4) 782н

В СЛУЧАЕ БЫСТРО НАСТУПИВШЕЙ СМЕРТИ ОБНАРУЖИВАЮТ

- 1) пятна Вишневского
- 2) признак Десятова
- 3) признак Пупарева
- 4) пятна Тардье

УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАННОЕ ЕГО ВОЗРАСТОМ, КАК ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

- 1) не рассматривается у лиц после 60 лет
- 2) рассматривается в случае смерти
- 3) рассматривается всегда
- 4) никогда не рассматривается

ПРИЛАГАЕМЫЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА, ПРИНИМАЮТСЯ В ____ ВИДЕ

- 1) изолированном
- 2) опечатанном
- 3) разложенном
- 4) развернутом

ПРИ РЕКТАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, РАВНОЙ 33,9 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ, ДАВНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОРИЕНТИРОВОЧНО МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В ЧАСАХ) (ПО В.В. БИЛКУНУ, 1985)

- 1) 4
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 10

СМЕРТЬ ОТ АСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО ОТНОСЯТ К _____ АСФИКСИИ

- 1) медленной компрессионной
- 2) быстрой компрессионной
- 3) странгуляционной

4) обтурационной

ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ У ВХОДНОЙ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОБРАЗУЕТСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ

- 1) острия клинка
- 2) только обушка ножа при ретракции клинка с упором на лезвие
- 3) режущего края клинка обычно при ретракции его с поворотом
- 4) боковой поверхности клинка под острым углом

ВЕЛИЧИНА ПОСМЕРТНОГО ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ (В МИЛЛИЛИТРАХ РТУТНОГО СТОЛБА)

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 0,5
- 4) 2

ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАНОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ С РАССЕЧЕНИЕМ АОРТЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОЧАГОВОГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТВОЛОВЫХ СИМПТОМОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ ФАЗ ТЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ФАЗА

- 1) септикотоксемии
- 2) острой плазмопотери
- 3) торпидная
- 4) токсемии

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ДЫХАНИЯ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

КОМПЕНСАТОРНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НАБЛЮДАЕТСЯ НА ____ СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

- 1) атероматозной
- 2) атеросклеротической
- 3) доклинической
- 4) липоидозной

ТИП ГИПОКСИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ СПОСОБНОСТИ ТКАНЕЙ ВОСПРИНИМАТЬ И УСВАИВАТЬ КИСЛОРОД ИЗ КРОВИ, ОТНОСЯТ К _____ ГИПОКСИИ

- 1) гемической
- 2) циркуляторной
- 3) гипоксической
- 4) тканевой

К АЗОТСОДЕРЖАЩИМ ОРГАНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ ПРИРОДНОГО, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ОТНОСЯТ

- 1) мышьяк
- 2) цианиды
- 3) алкалоиды
- 4) бертолетову соль

КОМИССИОННЫЙ ИЛИ КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР ЭКСПЕРТИЗЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1) начальник Бюро
- 2) врач – судебно-медицинский эксперт
- 3) руководитель органа управления здравоохранением
- 4) орган или лицо, назначившее экспертизу

ИЗМЕНЕНИЯ ТРУПА В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДЕЛЯТСЯ НА ____ ПОДГРУППЫ/ПОДГРУПП

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

ПРИ ВСКРЫТИИ СКАЛЬПЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1) пересечения хрящевой ткани ребер
- 2) препаровки
- 3) рассечения кожи и эвисцерации органокомплекса
- 4) исследования органов эвисцерированного органокомплекса

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛИКОГЕНА В ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) хронический бронхит
- 2) хронический холецистит
- 3) общее переохлаждение организма
- 4) острое отравление цианидами

ОТДЕЛЕНИЕ КУЛЬТИ ПУПОВИНЫ У НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ПОСЛЕ ЕЕ ОБРАБОТКИ ПРОИСХОДИТ НА (В СУТКАХ)

- 1) 12-14
- 2) 4-7
- 3) 17-19
- 4) 15-16

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ШЕИ, ГРУДИ И ЖИВОТА III СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 15% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА ПЕРСТНЕВИДНОГО ХРЯЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ДОСТАВЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) трупы
- 2) живых лиц
- 3) части трупа
- 4) материалы арбитражных дел

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) плоские кости
- 2) ногти

- 3) костный мозг
- 4) головной мозг

НАРУШЕНИЕМ ПРОХОДИМОСТИ ПОЛОВОГО КАНАЛА НАЗЫВАЮТ

- 1) гинатрезию
- 2) атрезию
- 3) стеноз
- 4) аплазию

ПОСЛЕ СМЕРТИ НАЧИНАЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ ГНИЛОСТНАЯ ФЛОРА, НАХОДЯЩАЯСЯ В

- 1) двенадцатиперстной кишке
- 2) желудке
- 3) тонкой кишке
- 4) толстом кишечнике

К ХАРАКТЕРНЫМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ НЕГРОИДНОЙ РАСЫ ОТНОСЯТ

- 1) эмалевый «затек» в межкорневом пространстве
- 2) выраженный альвеолярный прогнатизм с резким выступанием вперед резцов верхней челюсти
- 3) значительное недоразвитие зубов мудрости
- 4) лопатообразную форму лингвальной поверхности верхних резцов

ТРАВМУ ШЕИ С РАЗРЫВОМ ПРАВОЙ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПО ВРЕМЕНИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ ВЫВИХИ

- 1) привычные
- 2) отдаленные
- 3) свежие
- 4) локальные

ТРАВМУ ШЕИ С РАЗРЫВОМ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАВШУЮСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) длительный
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА И ГРУДИ III-IV СТЕПЕНИ, СОСТАВИВШЕГО 14,5% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РЕФЛЕКСОВ С ГИПОТРОФИЕЙ МЫШЦ, ЛЕГКИМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦА ПРОВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1) осаднению
- 2) плотности
- 3) кровоподтечности краев
- 4) воспалительной реакции

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННУЮ КОНТРАКТУРУ ЛЕВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (РАЗГИБАНИЕ 20°-25°), РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

СРАЩЕНИЕ ШВА МЕЖДУ КЛИНОВИДНОЙ И ЗАТЫЛОЧНОЙ КОСТЯМИ ЧЕРЕПА НАСТУПАЕТ В (В ГОДАХ)

- 1) 50-55
- 2) 25-30
- 3) 16-18
- 4) 30-35

«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ» ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ДО (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 20
- 2) 10

- 3) 5
- 4) 15

К ПРИЧИНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) возникновение напряжения шага
- 2) прикосновение к токоведущим проводникам низкого напряжения руками в резиновых перчатках
- 3) касание включенных электроприборов сухими руками
- 4) касание отключенных электроприборов мокрыми руками

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА НОВОРОЖДЕННЫХ В ОТЛИЧИЕ ОТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВИВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 30
- 4) 10

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЭПИДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕЛОВЫХ СИМПТОМОВ) КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

К ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ОТНОСЯТ

- 1) объективность содержания
- 2) краткость изложения
- 3) бессистемность описания объектов
- 4) отсутствие реквизитов

ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ВАЛ ПРИ ТРАВМЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, В СРЕДНЕМ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1) 6-8
- 2) 24-36
- 3) 1-3
- 4) 12-15

СМЯТИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЕЕ СЖАТИИ С ФОРМИРОВАНИЕМ ВЫПАЧИВАНИЯ В ВИДЕ ВАЛИКА ИЛИ МУФТЫ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЕРЕЛОМА ПО ТИПУ

- 1) «зеленой веточки»
- 2) «бочкообразного вспучивания»
- 3) «желеобразного смятия»
- 4) «валикообразного спучивания»

СЛУЧАИ С СОДЕРЖАНИЕМ СПЕРМАТОЗОИДОВ 10-19 МЛН/МЛ ОТНОСЯТ К

- 1) олигоспермии 1 степени
- 2) азооспермии
- 3) астеноспермии
- 4) некроспермии

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ВЫРАЖЕННЫЙ МОНОПАРЕЗ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

К НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ПРОДУКТАМ РАСПАДА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ОТНОСЯТ

- 1) щавелевую кислоту
- 2) формальдегид
- 3) уксусную кислоту
- 4) муравьиную кислоту

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ДОСТАТОЧНО НАЛИЧИЯ

- 1) 4 медицинских критериев
- 2) 2 медицинских критериев
- 3) 1 медицинского критерия
- 4) 3 медицинских критериев

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ____ ВАСКУЛИТА ЛЕЖИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ АСЕПТИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СТенок МИКРОСОСУДОВ

- 1) криоглобулинемического
- 2) геморрагического
- 3) волчаночного
- 4) лейкоцитокластического

В СЛУЧАЯХ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ОКРАСКУ ПО

- 1) Шабадашу
- 2) Ниссю
- 3) Вейгерту
- 4) Бесту

КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА АСТЕРИОН РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1) в месте схождения стреловидного и затылочного швов
- 2) на переднем крае большого затылочного отверстия
- 3) в месте схождения стреловидного и венечного швов
- 4) в месте схождения лямбдовидного, затылочно-сосцевидного и теменно-сосцевидного швов

ЭКСПЕРТИЗУ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ПРОВОДЯТ НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ

- 1) копии документов, заверенные потерпевшим
- 2) копии документов, заверенные лечащим врачом
- 3) незаверенных копий документов
- 4) подлинных документов

РУБЕЦ В ПЕРИОД С МОМЕНТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ДО 1 МЕСЯЦА БЫВАЕТ ____ ЦВЕТА

- 1) розового
- 2) темно-красного
- 3) коричневого
- 4) белесоватого

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОСТНОГО ВОЗРАСТА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ УЧИТЫВАЮТ СТЕПЕНЬ

- 1) развития ядер окостенения
- 2) зарастания швов черепа
- 3) роста хрящевой ткани
- 4) зарастания родничков

ВАРИАНТОМ ТАНАТОГЕНЕЗА СМЕРТИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ЦИКУТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) легочный
- 2) сердечный
- 3) мозговой
- 4) печеночный

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТАМИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ОТНОСИТСЯ К НАЗНАЧЕНИЮ _____ ЭКСПЕРТИЗЫ

- 1) повторной
- 2) комиссионной
- 3) комплексной
- 4) дополнительной

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОГУТ ОБРАЗОВАТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫСТРЕЛА ИЗ

- 1) метательного стрелкового оружия
- 2) строительно-монтажного пистолета
- 3) газового ствольного оружия
- 4) пневматического пулевого ружья

К НАРУЖНЫМ ПРИЗНАКАМ АСФИКСИИ ОТНОСЯТ

- 1) переполнение кровью правой половины сердца
- 2) подплевральные и подэпикардальные кровоизлияния
- 3) субконъюнктивальные кровоизлияния
- 4) полнокровие внутренних органов

СТОЙКАЯ МЕЛКОПУЗЫРЧАТАЯ ПЕНА У РТА, НОСА И В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) Крушевского
- 2) Свешникова
- 3) Пупарева
- 4) Фабрикантова

К ПРИЧИНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) касание включенных электроприборов сухими руками
- 2) касание отключенных электроприборов мокрыми руками
- 3) прикосновение к токоведущим проводникам низкого напряжения руками в резиновых перчатках
- 4) появление напряжения на отключенных токоведущих частях

ПРИ СТАТИЧЕСКОМ КОНТАКТЕ СЛЕДООБРАЗУЮЩЕГО ОКРОВАВЛЕННОГО ПРЕДМЕТА СО СЛЕДОВОСПРИНИМАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДРУГОГО ОБЪЕКТА ОБРАЗУЮТСЯ

- 1) брызги
- 2) затеки
- 3) отпечатки
- 4) потеки

ГЕПАТОЦИТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДОЛЕК ПРИ ОБЩЕМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА МОГУТ ИМЕТЬ ЦВЕТ

- 1) карминовый
- 2) «вареного мяса»
- 3) «свекольный»
- 4) «глины»

В МОРФОГЕНЕЗЕ НЕКРОЗА РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) паранекроз
- 2) альтерацию

- 3) пролиферацию
- 4) экссудацию

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ДРОВОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ ПРОВОДИТ

- 1) врач - судебно-медицинский эксперт
- 2) врач-психиатр-нарколог
- 3) врач-реаниматолог
- 4) врач - медико-социальный эксперт

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ДИАФРАГМЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней степени тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГНИЛОСТНОИЗМЕНЕННОГО ТРУПА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТОМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИАТОМОВЫЙ ПЛАНКТОН (АЛЬГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТОПЛЕНИЯ В ВОДЕ СОГЛАСНО ПРИКАЗА ОТ 12 МАЯ 2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ребро
- 2) ключица
- 3) затылочная кость
- 4) трубчатая кость с костным мозгом

ЗАКРЫТЫЙ КОСО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ БЕЗ СМЕЩЕНИЯ ОТЛОМКОВ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

К КОНСТИТУЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО

ОБНАРУЖЕНИЯ ОТНОСЯТ

- 1) половую принадлежность
- 2) рубцы
- 3) родимые пятна
- 4) татуировки

ДЕЙСТВИЕ ГОРЯЩИХ СМОЛ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ ОЖОГОВ ____ СТЕПЕНИ

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 1
- 4) 4

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ВО ВНИМАНИЕ

- 1) принимается только по специальному указанию суда
- 2) всегда принимается
- 3) не принимается
- 4) принимается только по ходатайству потерпевших

К ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ СТРЕССОВЫХ (МАРШЕВЫХ) ПЕРЕЛОМОВ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) диафиз плечевой кости
- 2) шейку бедра
- 3) кубовидную кость
- 4) таранную кость

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ УМЕРЕННЫЕ ВЕГЕТАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ ТРУПА ЯВЛЯЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ

- 1) карбогенизацией
- 2) мацерацией
- 3) мумификацией
- 4) сапонификацией

ДИСТАНЦИЮ ВЫСТРЕЛА ДРОБЬЮ ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА УСТАНОВЛИВАЮТ ПУТЁМ

- 1) подсчета количества попавших в тело дробинок

- 2) определения степени рассеивания дроби
- 3) подсчета общего числа ранений на пораженной части тела
- 4) вычисления средней длины раневых каналов

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ НАЗНАЧАЕТСЯ

- 1) следователем
- 2) адвокатом
- 3) руководителем ГСЭУ
- 4) потерпевшим

В МОРФОГЕНЕЗЕ НЕКРОЗА РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) экссудацию
- 2) альтерацию
- 3) смерть клетки
- 4) пролиферацию

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВЫХ ЛОКТЕВОМ И ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВАХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ПЕРВИЧНОЕ ТРАВМИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ У ВХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ В УПОР ОКАЗЫВАЕТ

- 1) пыж-контейнер
- 2) огнестрельный снаряд
- 3) предпулевой воздух
- 4) дульный конец оружия

К ПОВОДАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) установление повреждение половых органов
- 2) определение эректильных дисфункций
- 3) бракоразводные дела
- 4) фертильность

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью

4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

РОДИМЫЕ ПЯТНА ОТНОСЯТ К ____ ПРИЗНАКАМ

- 1) антропологическим
- 2) соматическим
- 3) конституционным
- 4) индивидуальным

СУБДУРАЛЬНЫЕ ГЕМАТОМЫ ВЫЗЫВАЮТ НАСТУПЛЕНИЕ СМЕРТИ ПРИ ОБЪЁМЕ ____ МЛ

- 1) 40-60
- 2) 60-70
- 3) 20-40
- 4) 80-120

СТАДИЯ ДИФфуЗИИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН НАСТУПАЕТ СПУСТЯ ____ ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1) 36-48
- 2) 2-6
- 3) 12-18
- 4) 22-24

К ДИФфуЗНОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ ОПОРНОГО АППАРАТА ЗУБОВ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ РЕЗОРБЦИЕЙ КОСТНОЙ ТКАНИ ЗУБНЫХ АЛЬВЕОЛ ОТНОСЯТ

- 1) стоматит
- 2) пульпит
- 3) пародонтоз
- 4) гингивит

НИКОТИНОПОДОБНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) комой
- 2) миозом
- 3) миофибрилляцией
- 4) гипергидрозом

ТЕРМОМЕТРИЮ ТРУПА ОПТИМАЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ____ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА

- 1) четырёхкратно
- 2) восьмикратно
- 3) трёхкратно
- 4) двукратно

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

**ПРИ ОБВАРИВАНИИ ГОРЯЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ ИЛИ ПАРОМ В ПРОТОКОЛЕ
ОСМОТРА ОТРАЖАЮТ**

- 1) отсутствие закопчения
- 2) розовый цвет трупных пятен
- 3) наличие характерного запаха
- 4) копоть в носовых ходах

**К ПРИЗНАКАМ ОТКРЫТОЙ НЕПРОНИКАЮЩЕЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
ОТНОСЯТ ПОВРЕЖДЕНИЯ _____ В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ**

- 1) мягких тканей головы, костей черепа и мозговых оболочек
- 2) мягких тканей головы и костей черепа
- 3) костей черепа и твёрдой мозговой оболочки
- 4) кожи, подкожно-жировой клетчатки, поверхностной фасции

**ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И
ЕГО КАПСУЛЫ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК
ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

**ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО БЕРУТ МАТЕРИАЛ В СЛУЧАЯХ ПОДОЗРЕНИЯ НА СМЕРТЬ ОТ**

- 1) механической асфиксии
- 2) анафилактического шока
- 3) инфекционного заболевания
- 4) черепно-мозговой травмы

ОЖИРЕНИЕ ГЕПАТОЦИТОВ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) гомогенным
- 2) газообразным
- 3) пылевидным
- 4) сотообразным

СМЕРТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БОЛИГОЛОВОМ ПЯТНИСТЫМ НАСТУПАЕТ ОТ

- 1) прекращения сердечной деятельности
- 2) дегидратации
- 3) обтурационной асфиксии
- 4) ДВС-синдрома

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛА ПРОВОДЯТ

- 1) тонкослойной хроматографией
- 2) УФ-спектрометрией
- 3) объемным барометрическим титрованием
- 4) ИК-спектроскопией

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ, ОБЫЧНО ВЫЯВЛЯЮТ ____ ОКРАСКУ ЛИЦА И ШЕИ

- 1) синюшно-розовую
- 2) буро-серую
- 3) желтушную
- 4) розовую

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА НАДГОРТАННИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ЯД ЗМЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБЛАДАЕТ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) деструктивным
- 2) гемолитическим
- 3) общефункциональным
- 4) нейротропным

ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ ЛИБО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПОМОЩНОГО СОСТОЯНИЯ ПОТЕРПЕВШЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) насильственными действиями сексуального характера
- 2) изнасилованием
- 3) развратными действиями
- 4) понуждением к действиям сексуального характера

К НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СТЕРЕОМИКРОСКОПИИ ОТНОСЯТ

- 1) изучение макро- и микроскопических свойств объектов в видимой области спектра
- 2) определение механической прочности костной, зубной и других тканей
- 3) установление спектральных характеристик объектов
- 4) установление относительных оптических плотностей макро- и микрорентгеновских изображений

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ ПРИ ПОЛОЖЕНИИ ТРУПА НА ЖИВОТЕ МЕСТОМ ВВЕДЕНИЯ ТЕРМОЩУПА ЯВЛЯЕТСЯ 11 МЕЖРЕБЕРЬЕ ПО ПРАВОЙ ____ ЛИНИИ

- 1) передней подмышечной

- 2) средней подмышечной
- 3) подключичной
- 4) околопозвоночной

СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТВЕРДОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАЗЛИЧАЮТ ДИСТРОФИИ

- 1) водные
- 2) паренхиматозные
- 3) углеводные
- 4) минеральные

ПО ЛИНЕЙНОМУ ПЕРЕЛОМУ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА МОЖНО УСТАНОВИТЬ

- 1) форму и размеры травмирующего предмета
- 2) место приложения травмирующего предмета
- 3) энергию воздействия травмирующего предмет
- 4) направление воздействий травмирующего предмета

К ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ БАРОТРАВМЫ ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) поражения ацинусов легких
- 2) кровоизлияния в области легочной плевры
- 3) интерстициальное воспаление сосудистой стенки альвеол
- 4) фиброз интерстициальной ткани

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН С КРОВОПОДТЕКАМИ ПРОИЗВОДЯТ _____ НАДРЕЗЫ КОЖИ

- 1) крестообразные
- 2) линейные
- 3) дуговые
- 4) круговые

ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) размозжение краёв
- 2) дополнительный разрез
- 3) наличие дефекта «минус-ткань»
- 4) наличие тканевых перемычек

ВЕЛИЧИНА ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1) давности наступления смерти в раннем посмертном периоде
- 2) причины смерти
- 3) танатогенеза
- 4) обстоятельств наступления смерти

ПРИЗНАКИ ВЫСЫХАНИЯ ТРУПА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ОСМОТРЕ

- 1) ногтей
- 2) костей
- 3) нижних конечностей
- 4) головки полового члена

ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 10-11
- 2) 36-39
- 3) 32-34
- 4) 12-13

АЛОПЕЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ

- 1) цинком
- 2) марганцем
- 3) таллием
- 4) свинцом

НАЛИЧИЕ В БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СЛИЗИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗДУХА СЧИТАЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ

- 1) живорожденности
- 2) новорожденности
- 3) мертворожденности
- 4) жизнеспособности

ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СТОЙКОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ____ БОЛЕЗНЬ

- 1) цереброваскулярная
- 2) ишемическая
- 3) вегето-сосудистая
- 4) гипертоническая

ССАДИНАМИ В ПРОЕКЦИИ КРОВОПОДТЕКА БЕЗ ДЕФЕКТА ЭПИДЕРМИСА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) царапинами
- 2) «штамп-ссадинами»
- 3) «штанцмаркой»
- 4) ранами

К ТОКСИЧНЫМ ПРОДУКТАМ БИОТРАНСФОРМАЦИИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ОТНОСЯТ

- 1) муравьиную кислоту
- 2) щавелевую кислоту
- 3) глюкуронид
- 4) формальдегид

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГРУДНОГО ПРОТОКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

НАЛИЧИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ (ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ) РЕАКЦИИ В ТКАНЯХ ПУПОВИНЫ И ПУПОЧНОГО КОЛЬЦА ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ

- 1) зрелости плода
- 2) мертворожденности
- 3) живорожденности
- 4) доношенности

СВОБОДНО ЛЕЖАЩИЕ В ОБЛАСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОДЕЖДЫ И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ТРУПА ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ИЗЫМАЮТСЯ ВРАЧОМ–СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ЭКСПЕРТОМ И ПЕРЕДАЮТСЯ

- 1) адвокату
- 2) следователю
- 3) судье
- 4) технику-лаборанту

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

НАИБОЛЬШУЮ ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА ПУЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ____ ОРУЖИЕ

- 1) нарезное короткоствольное
- 2) нарезное длинноствольное
- 3) гладкоствольное длинноствольное
- 4) гладкоствольное короткоствольное

**ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОИЗВОДИТСЯ
ОКРАСКА СРЕЗОВ**

- 1) генциановым фиолетовым
- 2) метиленовым синим
- 3) конго красным
- 4) гематоксилином и эозином

**ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ЛОГИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ПРАВИЛЬНЫХ ВЫВОДОВ ИЗ УЖЕ ИЗВЕСТНЫХ ГИПОТЕЗ
ЛИБО АКСИОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дедукцией
- 2) индукцией
- 3) сравнением
- 4) вычислением

К ПРИЗНАКАМ ПРИЖИЗНЕННОГО СДАВЛЕНИЯ ШЕИ ОТНОСЯТ

- 1) анизокорию
- 2) экзофтальм
- 3) лагофтальм
- 4) иридоциклит

**ГИДРЕМИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ
РАЗВИВАЕТСЯ ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)**

- 1) 60
- 2) 12
- 3) 24
- 4) 48

**ДАВЛЕНИЕ ГНИЛОСТНЫХ ГАЗОВ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТАТОЧНО
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ И ДОСТИГАТЬ (В АТМОСФЕРАХ)**

- 1) 6-7
- 2) 3-4
- 3) 1-2
- 4) 4-5

**СЕРОЗНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПУЗЫРЕЙ С СЕРОЗНЫМ СОДЕРЖИМЫМ
НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ОЖОГАХ ____ СТЕПЕНИ**

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 1
- 4) 2

**ОТРАВЛЕНИЕ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ С РАЗВИТИЕМ ОСТРОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА
КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ГОНОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) гной и экссудаты в пораженных тканях и органах
- 2) кусочки ткани из области ран и пораженных тканей и органов
- 3) отделяемое уретры, влагалища, шейки матки, прямой кишки
- 4) кусочки селезенки, печени, легких, почек, молочных желез

В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ ОТ

- 1) сдавления груди и живота
- 2) утопления
- 3) удушения петлей
- 4) повешения

ДИФфузное аксональное повреждение по тяжести вреда, причиненного здоровью, квалифицируется как _____ вред здоровью

- 1) тяжкий
- 2) легкий
- 3) не причинившее
- 4) средней тяжести

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ДОСТАВЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) содержимое желудка
- 2) трупную кровь
- 3) материалы гражданских дел
- 4) трупы

ПРИЗНАКИ ВЫСЫХАНИЯ ТРУПА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ОСМОТРЕ

- 1) глаз
- 2) волос
- 3) ногтей
- 4) костей

ПРЕРВАННАЯ АСФИКСИЯ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ГИПОКСИЧЕСКОЙ КОМОЙ II-III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) временный

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ БЫСТРЕЕ ВСЕГО ЗАЖИВАЮТ НА

- 1) спине
- 2) лице
- 3) животе
- 4) груди

ЦВЕТ СТРУПА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЕДКИМИ ЩЕЛОЧАМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) кислым гематином
- 2) щелочным гематином
- 3) метгемоглобином
- 4) карбоксигемоглобином

ОЖОГОВЫЙ ШОК III СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

К НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ПРОДУКТАМ БИОТРАНСФОРМАЦИИ ЭТАНОЛА ОТНОСЯТ

- 1) ацетальдегид
- 2) уксусную кислоту
- 3) формальдегид
- 4) щавелевую кислоту

ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ТИПУ ФОР-1 ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ

- 1) корень носа, глазницу, нижнюю глазничную щель к скуловой дуге
- 2) основание альвеолярного отростка к крыльям основной кости
- 3) лобно-скуловые швы и скуловые дуги на чешую височных костей
- 4) носовые кости, внутренние стенки и дно глазниц к основной кости

ТЕМНО-КРАСНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В МЕСТЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ К ГРУДИНЕ ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНЫХ МЫШЦ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) Вальхера
- 2) Свешникова
- 3) Пупарева
- 4) Фабрикантова

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТЕК УСИЛИВАЕТСЯ К ____ ДНЮ

- 1) 3-4
- 2) 1-2
- 3) 5-6
- 4) 7-8

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) об уничтоженных в процессе производства экспертизы объектах с указанием их количества
- 2) о выводах эксперта
- 3) о результатах лабораторных исследований
- 4) об обстоятельствах дела

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) тяжкий

ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПОВ, ЭКСПЕРТИЗЫ ПОТЕРПЕВШИХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ДРУГИХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА: 1 ДОЛЖНОСТЬ НА ____ ЭКСПЕРТИЗ ТРУПОВ В ГОД

- 1) 70
- 2) 60
- 3) 80
- 4) 90

ОБНАРУЖЕНИЕ ЗИЯЮЩИХ ПУПОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПУПОЧНОГО КОЛЬЦА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1) мертворожденности
- 2) жизнеспособности
- 3) доношенности
- 4) живорожденности

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СЕКЦИОННЫЙ РАЗРЕЗ КОЖИ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ДЕЛАЮТ ПО ____ ЛИНИИ

- 1) подмышечной
- 2) срединной
- 3) среднеключичной
- 4) околопозвоночной

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ БОЛЬШОГО САЛЬНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

К ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ ПО БИОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ ОТНОСЯТ

- 1) антропонозы и антропозоонозы
- 2) вирусы
- 3) бактерии
- 4) грибы

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ВЫВИХА I-II ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

СТОЙКАЯ МЕЛКОПУЗЫРЧАТАЯ ПЕНА У РТА, НОСА И В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ _____ ТИПЕ УТОПЛЕНИЯ

- 1) рефлексном
- 2) спастическом
- 3) аспирационном
- 4) асфиктическом

ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА ЖЕЛУДОК И ТОНКАЯ КИШКА ЗАПОЛНЯЮТСЯ ВОЗДУХОМ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1) 5-6
- 2) 1-2
- 3) 10-12
- 4) 12-24

РАЗВИТИЕ ГЕМОЛИЗА ЭРИТРОЦИТОВ И ЖЕЛТУШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) шампиньонами
- 2) лисичками
- 3) строчками
- 4) мухоморами

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С ПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО

МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОМ ВВЕДЕНИИ ОПИАТЫ НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ (В МИНУТАХ)

- 1) 50-60
- 2) 20-25
- 3) 5-10
- 4) 30-40

К ПРОЦЕССУ РАЗРУШЕНИЯ КЛЕТКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ СОБСТВЕННЫХ СТРУКТУР ОТНОСЯТ

- 1) пролиферацию
- 2) экссудацию
- 3) альтерацию
- 4) аутолиз

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГРУДНОГО ПРОТОКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ВЫВИХА L1 ПОЗВОНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

БОЛЕЕ БЫСТРОМУ РАЗВИТИЮ ГНИЕНИЯ СПОСОБСТВУЕТ

- 1) приём антибиотиков
- 2) кахексия
- 3) сепсис
- 4) обильная кровопотеря

ЭКСПЕРТ ВПРАВЕ

- 1) разглашать данные предварительного расследования
- 2) знакомиться с материалами уголовного дела
- 3) давать заведомо ложное заключение

4) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ АНЕВРИЗМЫ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ НЕОСЛОЖНЁННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

В НОРМЕ ТЕМПЕРАТУРА В ПРЯМОЙ КИШКЕ РАВНА (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1) 36,6
- 2) 37,0
- 3) 35,5
- 4) 36,0

К ВАСКУЛИТАМ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АОРТЫ И ЕЕ КРУПНЫХ ВЕТВЕЙ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) узелковый периартериит
- 2) неспецифический аортоартериит
- 3) аллергический грануломатоз
- 4) облитерирующий тромбангит

ЭЛЕКТРОМЕТКА НА ОЩУПЬ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) плотноватая
- 2) мягкая
- 3) тестоватая
- 4) рыхлая

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ МЫШЕЧНОГО ВАЛИКА, ВЫСОТОЙ 2-1,5 САНТИМЕТРА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ (В ЧАСАХ) (ПО БИЛКУНУ В.В., 1986)

- 1) 3-6
- 2) 1-3
- 3) 10-11
- 4) 6-9

РАВНОМЕРНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ВСЕХ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ АЦИНУСА ОБРАЗУЕТ ____ ЭМФИЗЕМУ

- 1) буллезную
- 2) центролобулярную
- 3) панацинарную
- 4) периацинарную

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЗАПЯСТЬЯ, ВЫЗВАВШЕЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ВОЛОСА КУТИКУЛА ИМЕЕТ ЦВЕТ

- 1) черный
- 2) сероватый
- 3) белый
- 4) рыжий

ДИАМЕТР ЯДЕР ОКОСТЕНЕНИЯ В ГОЛОВКЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 1
- 2) 0,7
- 3) 0,34
- 4) 0,5

ИЗМЕНЕНИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ НА ОРГАНИЗМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ДЕЙСТВИЕ

- 1) биологическое
- 2) тепловое
- 3) химическое
- 4) ударное

ИСТОЧНИКОМ УГЛЕРОДА ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) порох
- 2) пуля
- 3) ствол
- 4) капсюль

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

К ГОРМОНАМ, СТИМУЛИРУЮЩИМ ПРОЛИФЕРАЦИЮ И АКТИВНУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ ТКАНЕЙ, ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) В-лимфоциты
- 2) лейкоциты
- 3) глюкокортикостероиды
- 4) соматотропный гормон гипофиза

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФАЗЫ РЕЗОРБЦИИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

- 1) 1-3
- 2) 4-5
- 3) 6-8
- 4) 10-12

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ НИСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

КОЛЮЩИМ ПРЕДМЕТОМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНЕН _____ ПЕРЕЛОМ ПЛОСКОЙ КОСТИ

- 1) дырчатый
- 2) винтообразный
- 3) поперечный
- 4) паутинообразный

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА, С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ №

- 1) 503н
- 2) 194н
- 3) 522н
- 4) 707н

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ОТ ТРУПА НА ОБЩЕЕ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ

- 1) сердце, костный мозг, кожу, плевральный экссудат

- 2) селезенку, надпочечники, щитовидную железу
- 3) органы и ткани по усмотрению врача – судебно-медицинского эксперта
- 4) желудок и начальную часть тонкого кишечника с содержимым, часть толстой кишки с содержимым, почку и мочу, печень и желчный пузырь, головной мозг, легкое

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 12.05.2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОБЪЕМ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОТОЖДЕСТВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) экономической целесообразностью
- 2) временными затратами
- 3) умениями и навыками врача – судебно-медицинского эксперта
- 4) характером и набором представленных объектов

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

- 1) следователем
- 2) группой экспертов одного профиля
- 3) судом
- 4) прокурором

В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ

- 1) допросы понятых
- 2) допросы свидетелей
- 3) предложения понятых по алгоритму осмотра
- 4) замечания участников следственного действия

ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ С НЕПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

ПРИ ВСКРЫТИИ ПИЛА ЛИСТОВАЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАСПИЛА

- 1) хрящевой ткани ребер
- 2) дужек позвонков
- 3) костей черепа
- 4) длинных и других костей

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КЛИНОВИДНОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ПРИ СУДЕБНО-БИОХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ОПИАТАМИ, ВЫЯВЛЯЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ

- 1) глюкозы
- 2) тропонина
- 3) активности сывороточных амилаз
- 4) гемина

ПРИЗНАК АМЮССА ОБНАРУЖИВАЮТ ПРИ

- 1) обтурации сыпучими веществами
- 2) удавлении руками
- 3) повешении в петле
- 4) обтурации жидкостями

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА СОСТАВЛЯЕТСЯ В ____ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 6

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ МЕТОДОМ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ТРАНСПАЛЬПЕБРАЛЬНЫМ ТОНОМЕТРОМ ТИПА ТГДЦ-01 «ПРА» РАЗНИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОБОИХ ГЛАЗАХ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ (В ММ РТ. СТ.)

- 1) 2
- 2) 10
- 3) 4
- 4) 5

С ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ НЕПОЛНОГО ПИРОЛИЗА МАСЛА ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ БЕРУТ

- 1) стенку трахеи, бронхов, кусочки легких, содержимое желудка
- 2) кусочки миокарда, печени, стенку мочевого пузыря
- 3) кусочки головного мозга, почки, содержимое мочевого пузыря
- 4) стенку слепой кишки, кусочки скелетной мышцы, печени

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БРЮШНОЙ ТИФ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

- 1) паховые
- 2) легких

- 3) кишечника
- 4) шейные

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦА ПРОВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1) осаднению
- 2) цвету
- 3) кровоподтечности краев
- 4) воспалительной реакции

ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА В СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА: 1 ДОЛЖНОСТЬ НА _____ ЭКСПЕРТИЗ В ГОД

- 1) 400
- 2) 300
- 3) 600
- 4) 500

КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА ДАКРИОН ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, КАК ТОЧКА

- 1) наиболее выступающая кнаружи на скуловой дуге
- 2) наиболее выступающая вперед между надбровными дугами
- 3) схождения швов между лобной, слезной и верхнечелюстной костями
- 4) на нижнем крае нижней челюсти в месте пересечения его медиально-сагиттальной плоскостью

КРОВЬ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖНО ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1) 18
- 2) 14
- 3) 10
- 4) 16

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ДИФфуЗНОГО АКСОНАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ОКИСИ УГЛЕРОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) перевод атома железа в геме в неактивное состояние
- 2) связывание гемоглобина (СОНb)
- 3) паралич дыхательного и сосудистого центров
- 4) связывание железа в молекуле миоглобина

ПОЯСОК ОБТИРАНИЯ В ОБЛАСТИ ВХОДНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1) повреждения дульным срезом оружия
- 2) контузионного действия пороховых газов
- 3) отслоения эпидермиса по краям раны боковыми поверхностями пули
- 4) наслоения металлов с поверхности пули, копоти, смазки

НЕСРОСШИЙСЯ КОСО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ЛЕВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИЗ ИНФИЦИРОВАННЫХ ТРУПОВ И ЖИВЫХ ЛИЦ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛЕДУЕТ

- 1) делать особые пометки на контейнерах и в сопроводительных документах
- 2) информировать руководителю подразделения
- 3) информировать следователя
- 4) печатывать объекты полиэтиленовой пленкой

ПОЛНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ДИАФИЗА ЛЕВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ВИД МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ, ПРИ КОТОРОЙ ПРИЧИНОЙ ПОЛНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО, ОКАЗАВШЕЕСЯ В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ, КЛАССИФИЦИРУЮТ КАК

- 1) странгуляционную
- 2) обтурационную
- 3) аспирационную
- 4) компрессионную

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА В СЛУЧАЕ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРОТОКОЛЕ НЕОБХОДИМО ОПИСАТЬ

- 1) степень ожогов
- 2) наличие характерных запахов

- 3) позу боксера
- 4) состояние лежа трупа

СТАДИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ОМЫЛЕНИЕ И РАСПАД ЛИПИДОВ С ОБРАЗОВАНИЕМ КРИСТАЛЛОВ ХОЛЕСТЕРИНА В ЦЕНТРЕ БЛЯШКИ И РАЗРУШЕНИЕМ ПРИЛЕЖАЩИХ КОЛАГЕНОВЫХ И ЭЛАСТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- 1) кальциноза
- 2) атероматоза
- 3) липосклероза
- 4) изъязвления

ПЕРЕЛОМ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сочетанным
- 2) компрессионным
- 3) конструктивным
- 4) торсионным

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОЖГОВОЙ БОЛЕЗНИ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ И СУТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) интоксикация с сопутствующим воспалением легких
- 2) ожоговый шок
- 3) сепсис
- 4) гнойные осложнения со стороны почек

КУСОЧКИ МАТКИ, МАТОЧНЫХ ТРУБ, ЯИЧНИКОВ И СОСУДОВ ОКОЛОМАТОЧНОЙ КЛЕТЧАТКИ ИЗЫМАЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ

- 1) инфекционных заболеваний
- 2) утопления
- 3) сердечной недостаточности
- 4) внебольничного аборта

ОТРАВЛЕНИЕ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ III-IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЛЕТ, ЕСЛИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ИНЫЕ СРОКИ

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 6
- 4) 5

В ПАТОГЕНЕЗЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА СТАДИЯ _____ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АТЕРОМАТОЗНОЙ ЯЗВЫ

- 1) липосклероза
- 2) осложненных поражений
- 3) фиброзных бляшек
- 4) липоидоза

К ПЕРВИЧНЫМ ПНЕВМОНИЯМ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПНЕВМОНИЮ

- 1) септическую
- 2) паренхиматозную
- 3) аспирационную
- 4) гипостатическую

ПЕРЕЛОМ НЕСКОЛЬКИХ ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней степени тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ОЖОГИ ГОРЯЧЕЙ ИЛИ КИПАЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРИ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ ПОРАЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) окопчением поверхности с темно-серым налетом
- 2) преобладанием пузырей
- 3) колбообразным вздутием кончиков волос
- 4) формой контактировавшей поверхности действовавшего предмета

НЕПРОХОДИМОСТЬ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 90%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ПАДЕНИЯ СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) переломы бедренных костей
- 2) компрессионные переломы тел позвонков
- 3) кровоизлияния в подвешивающий аппарат внутренних органов
- 4) переломы костей голеней

ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА УСТОЙЧИВ К

- 1) действию этилового спирта 70%

- 2) действию пероксида водорода раствора 6%
- 3) нагреванию до 70-80°C
- 4) замораживанию

**В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗАНО**

- 1) начало времени осмотра криминалиста
- 2) время прибытия понятых
- 3) время прибытия следователя
- 4) точное время фиксации трупных изменений

**ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОГО ПЛЕЧЕВОГО
СУСТАВА С ВЫРАЖЕННОЙ АТРОФИЕЙ МЫШЦ, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ
ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД
ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

**ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ БЕДРА КОЛЕСОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБРАЗУЕТСЯ
ДЕФЕКТ ТКАНИ**

- 1) клиновидный
- 2) трапецевидный
- 3) цилиндрический
- 4) параллелограммовидный

**ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ОТРАВЛЕНИЯ НАШАТЫРНЫМ СПИРТОМ
ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ____ ОКРАСКИ СТРУПА**

- 1) вишнево-синюшной
- 2) алой
- 3) оранжево-бурой
- 4) синюшно-серой

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СИМПТОМОВ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дезагgravацией
- 2) диссимуляцией
- 3) симуляцией
- 4) аггравацией

**К ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ ВОЛОС, ИЗУЧАЕМЫМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ,
ОТНОСЯТ**

- 1) химические
- 2) физические
- 3) только морфологические

4) морфологические и биологические

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УТОПЛЕНИЯ НА АЛЬГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЮТ

- 1) костный мозг
- 2) вскрытую почку
- 3) желчный пузырь
- 4) невскрытый желудок

В СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПОТЕРПЕВШИХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ДРУГИХ ЛИЦ ВХОДИТ

- 1) бокс ламинарный
- 2) набор слесарных инструментов
- 3) стол секционный штампованный
- 4) кресло гинекологическое

СЕКЦИОННЫМ РАЗРЕЗОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ГОЛОВЫ НОЖОМ В ПОЛОЖЕНИИ ЗАТОЧКИ ЛЕЗВИЯ ВВЕРХ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕЗ ПО

- 1) Лешке
- 2) Самсонову
- 3) Рихтеру – Сунцову
- 4) Фишеру

К ПРИЖИЗНЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТЕЛО ОТНОСЯТ

- 1) отсутствие ожогов дыхательных путей
- 2) позу «боксера»
- 3) ожоги I-II степени
- 4) отсутствие карбоксигемоглобина в крови

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ЛЕГКОГО КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

РАСПАД ЖИРОБЕЛКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ

- 1) атером
- 2) пятен
- 3) полосок
- 4) полипов

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПАРАЛИЧ АККОМОДАЦИИ ОДНОГО ГЛАЗА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) угрожающий жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ К СИНДРОМАМ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТ

- 1) острое психотическое состояние
- 2) бронхоспазм
- 3) миастенический синдром
- 4) гипотонию

НЕПРОХОДИМОСТЬ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 90%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ ФАЗ ТЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ФАЗА

- 1) некробиотических изменений
- 2) острой плазмопотери
- 3) токсемии
- 4) септикотоксемии

К ДЕЙСТВИЯМ, ПРИЧИНЯЮЩИМ СТРАДАНИЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУТЕМ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛИШЕНИЯ ПИЩИ, ОТНОСЯТ

- 1) мучения
- 2) истязания
- 3) побои
- 4) стресс

К МНОЖЕСТВЕННЫМ ПУЛЕВЫМ РАНЕНИЯМ ОДИНОЧНЫМИ ВЫСТРЕЛАМИ ОТНОСЯТ

- 1) строгую параллельность раневых каналов
- 2) пересекающиеся раневые каналы
- 3) расположение входных отверстий цепочкой
- 4) непересекающиеся раневые каналы

ПОД РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОНИМАЮТ

- 1) нарушения регенерации с развитием ограниченной клеточной и тканевой атипии
- 2) восстановление всех элементов, гибнущих в процессе повседневной жизнедеятельности

- 3) воссоздание утраченного в результате патологических процессов
- 4) процесс перестройки, с формированием ткани с нарушенной функцией

СМЕРТЬ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫМИ АМФЕТАМИНА МОЖЕТ НАСТУПИТЬ ОТ

- 1) тампонады сердца
- 2) легочного кровотечения
- 3) внутричерепных кровоизлияний
- 4) сепсиса

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА ЗУБА II ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МЕДИАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ С ЛИНИЕЙ, СОЕДИНЯЮЩЕЙ ВЫСТУПАЮЩИЕ ТОЧКИ ЛОБНЫХ БУГРОВ, ЛЕЖИТ КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

- 1) порион
- 2) обелион
- 3) метопион
- 4) лямбда

КРИТЕРИЕМ ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) миопия сильной степени
- 2) полная стойкая слепота на оба глаза
- 3) астигматизм смешанный
- 4) гиперметропия средней степени

РЕКТАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 20 ЧАСОВ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ) (ПО В.В. БИЛКУНУ, 1985)

- 1) 34,6
- 2) 25,0
- 3) 37,1
- 4) 36,6

ПРИ ВЗЛЕТЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА В СИЛУ БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ У ЛИЦ, ОКАЗАВШИХСЯ НА ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЕ, ОТ УДАРА КРЫЛОМ МОГУТ БЫТЬ

- 1) компрессионные переломы грудных позвонков
- 2) глубокие рублено-ушибленные раны
- 3) обширные разрушения верхней половины тела
- 4) множественные резаные раны головы и груди

ЗЕРНИСТАЯ ДИСТРОФИЯ ПОРАЖАЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) костный мозг
- 2) спинной мозг
- 3) селезенку
- 4) печень

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СУБДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕЛОВЫХ СИМПТОМОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ДЛЯ «ЛЕГОЧНОЙ» СМЕРТИ ЗНАЧИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1) жировой эмболии сосудов легких
- 2) ателектазов с вовлечением значительной доли альвеол
- 3) острой эмфиземы легких
- 4) гиалиновых мембран

ЭЛЕКТРООЖОГИ СОПРОВОЖДАЮТСЯ ____ ОТЕКОМ

- 1) гидродинамическим
- 2) электрогенным
- 3) осмотическим
- 4) онкотическим

К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ, ВЕДУЩЕМУ К ОЧАГОВОМУ УПЛОТНЕНИЮ СОСУДОВ В СВЯЗИ С ИЗБЫТОЧНЫМ РАЗРАСТАНИЕМ ЗРЕЛОЙ ПЛОТНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТ

- 1) регенерация
- 2) некроз
- 3) склероз
- 4) инфаркт

ДЛИНА ЛИЧИНКИ ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ТРЕТЬЕЙ СТАДИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИМЕТРАХ)

- 1) 4
- 2) 10
- 3) 17
- 4) 5

ДЛИНА ЛИЧИНКИ ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ВТОРОЙ СТАДИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИМЕТРАХ)

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 10

4) 3

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ РАН, ПРИЧИНЕННЫХ ПИЛЕНИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ____ ФОРМА

- 1) веретенообразная
- 2) древовидная
- 3) прямолинейная
- 4) трапецевидная

К ДЕЙСТВИЯМ, ПРИЧИНЯЮЩИМ СТРАДАНИЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУТЕМ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛИШЕНИЯ ПИТЬЯ, ОТНОСЯТ

- 1) истязания
- 2) мучения
- 3) стресс
- 4) побои

ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИПТОМОМ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) головная боль
- 2) снижение остроты зрения
- 3) головокружение
- 4) снижение остроты слуха

ОБЪЕКТЫ, ЗАЛИТЫЕ В ПАРАФИН, ПОСЛЕ СНЯТИЯ С БЛОКОВ СОХРАНЯЮТ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЛЕТ, ЕСЛИ ИНЫЕ СРОКИ НЕ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОРГАНОМ ИЛИ ЛИЦОМ, НАЗНАЧИВШИМ ЭКСПЕРТИЗУ

- 1) 5
- 2) 6
- 3) 4
- 4) 3

СТРОМАЛЬНО-СОСУДИСТАЯ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ СОСТАВЛЯЕТ МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ

- 1) ишемии
- 2) атеросклероза
- 3) гангрены
- 4) некроза

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ В ГСМЭУ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НИМ ОБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛАХ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В ____ ГСМЭУ

- 1) тетради
- 2) записной книжке
- 3) блокноте
- 4) журнале

ПОЛНАЯ МУМИФИКАЦИЯ ТРУПА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ПРОЙТИ ЗА (В МЕСЯЦАХ)

- 1) 1-2
- 2) 6-12
- 3) 48-52
- 4) 24-36

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ (ПРОИСШЕСТВИЯ) ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ ВРАЧУ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ЭКСПЕРТУ НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ

- 1) кровоизлияния в коже
- 2) цвет кожи и трупных пятен
- 3) положение трупа по отношению к частям дороги
- 4) цвет и одутловатость лица

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ЭЯКУЛЯТА СПЕРМУ БЕРУТ

- 1) стеклянной палочкой
- 2) ватным шариком
- 3) ушной палочкой
- 4) марлевым тампоном

ТРАВМА, ВЫЗВАННАЯ НАРУШЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) спортивной
- 2) бытовой
- 3) производственной
- 4) гусеничной

ЛОКАЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ ОБРАЗУЕТСЯ

- 1) в смежной области к месту приложения травмирующей силы
- 2) на отдалении от места приложения травмирующей силы
- 3) в месте приложения травмирующей силы
- 4) на противоположной повреждению поверхности тела

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ ПОЧКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ОТ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) эритема
- 2) металлизация

- 3) наличие копоти
- 4) серозное воспаление

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АКТИВНОМ ГЕПАТИТЕ РАЗВИВАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ГЕПАТОЦИТОВ

- 1) деструкция
- 2) ишемия
- 3) атрофия
- 4) некроз

ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 2 ЧАСА ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В СЕКУНДАХ) (ПО В.В.ЖАРОВУ, Ю.Л. МЕЛЬНИКОВУ, 1978)

- 1) 1-2
- 2) 50-60
- 3) 30-40
- 4) 5-10

ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ КЛИНИЧЕСКИ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА _____ СТАДИИ/СТАДИЙ

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 5

ОРГАНИЗМ, ОБЛАДАЮЩИЙ ПРИЗНАКАМИ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОЛА, ОТНОСЯТ К

- 1) транссексуализму
- 2) гермафродитизму
- 3) бисексуализму
- 4) гетеросексизму

В ОБЛАСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ СЖИМАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ В КОСТИ ОБРАЗУЕТСЯ ЗОНА

- 1) разрыва
- 2) распространения
- 3) надлома
- 4) долома

ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ НАКОПЛЕНИЕ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ НАБЛЮДАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА СТАДИИ

- 1) атероматоза
- 2) липоидозной
- 3) долипидной
- 4) липосклероза

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ НЕПРОХОДИМОСТЬ МОЧЕТОЧНИКА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 50%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЖИ ИЗ ОБЛАСТИ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ

- 1) количество оборотов петли на шее
- 2) характер материала петли
- 3) причину смерти
- 4) прижизненность образования

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

В ТИПИЧНОМ СЛУЧАЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

- 1) обильного кровотечения
- 2) ярко-красной окраски
- 3) западающего дна
- 4) мягкой поверхности

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) опасность для жизни
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) длительное расстройство здоровья

ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДМЕТА, ПРОЦЕССА ИЛИ ЯВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО С ПОМОЩЬЮ НЕВООРУЖЕННОГО ОРГАНА ЗРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ

- 1) измерения
- 2) моделирования
- 3) описания
- 4) наблюдения

ДЛЯ ОМЫЛЕНИЯ ТРУПА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В СРЕДНЕМ ТРЕБУЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ _____ МЕСЯЦЕВ

- 1) 24
- 2) 12
- 3) 60
- 4) 48

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЭКСГУМИРОВАННОГО ТРУПА НА СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ НАПРАВЛЯЮТ ОБРАЗЦЫ

- 1) воды
- 2) грунта
- 3) воздуха
- 4) флоры

ПРЯМОЙ РАЗМЕР ГОЛОВЫ ПЛОДА СООТВЕТСТВУЕТ РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ _____ И ЗАТЫЛОЧНЫМ БУГРОМ

- 1) подбородком
- 2) переносицей
- 3) подзатылочной ямкой
- 4) кончиком носа

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) продольной линией в области собственно ветви
- 2) ровными краями излома на наружной костной пластинке
- 3) ровными краями излома на внутренней костной пластинке
- 4) образованием костного отломка

ОЧАГОВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ ИНТИМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЛКАМИ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ, ХАРАКТЕРИЗУЕТ СТАДИЮ

- 1) долипидную
- 2) липосклероза
- 3) липоидозную
- 4) атероматоза

НЕСРОСШИЕСЯ ПОЛНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ПРАВЫХ ЛОКТЕВОЙ И ЛУЧЕВОЙ КОСТЕЙ, ОСЛОЖНИВШИЕСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШЕГО СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) легкий

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ УПАКОВКИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА УКАЗЫВАЮТ В ____ ВСКРЫТИЯ УПАКОВКИ

- 1) выписке
- 2) заключении
- 3) справке
- 4) акте

ОСОБЕННОСТЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ УТОПЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проведение пробы на пневмоторакс
- 2) вскрытие пазухи основной кости
- 3) проведение пробы Бокариуса
- 4) вскрытие вен нижних конечностей

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПРЯМОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней степени тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) развившееся угрожающее жизни состояние
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ОБУГЛИВАНИЕ ТКАНЕЙ ОБНАРУЖИВАЮТ ПРИ _____ СТЕПЕНИ ОЖОГОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 1
- 4) 2

ОСНОВНЫМ В МЕХАНИЗМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗАНОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) расслоение ткани клинком режущего орудия
- 2) рассечение тканей лезвием клинка
- 3) размятие ткани клинком режущего орудия
- 4) трение «щечек» клинка о края раны и осаднение кожи

ПЕРЕХОД ИНДИФФЕРЕНТНЫХ ГАЗОВ КРОВИ И ТКАНЕЙ ПРИ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ФОРМИРУЕТ ____ ЭМБОЛИЮ

- 1) газовую
- 2) воздушную
- 3) жировую
- 4) тканевую

ПРЕОБЛАДАНИЕ РАСШИРЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ БРОНХИОЛ И АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ХОДОВ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНО СОХРАНЕННЫХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОТДЕЛАХ ЛЕГОЧНЫХ ДОЛЕК ХАРАКТЕРНО ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ____ ЭМФИЗЕМЫ

- 1) буллезной
- 2) панацинарной
- 3) центролобулярной
- 4) периацинарной

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

УСЛОВИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА (II) ЯВЛЯЕТСЯ ГОРЕНИЕ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ

- 1) низких температур
- 2) недостатка кислорода
- 3) действия атмосферного электричества
- 4) высоких температур

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА IV СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) опасность для жизни

- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) длительное расстройство здоровья

ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ РАЗВИТИЕМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА III-IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный\"
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПЕРЕЛОМ-ВЫВИХ ГАЛЕАЦЦИ КАК ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ ПО ПРИЗНАКУ СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ СВЫШЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 20
- 2) 25
- 3) 10
- 4) 30

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЖИВОГО ЛИЦА И ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАРАЖЕНИЕ ОБСЛЕДУЕМОГО ВЕНЕРИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И / ИЛИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ

- 1) руководство инфекционной больницы
- 2) родственников подэкспертного
- 3) орган или лицо, назначившее экспертизу
- 4) начальника БСМЭ

ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ ДЛЯ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ИЗЪЯТЬ

- 1) выпиленный фрагмент
- 2) проксимальный отломок
- 3) дистальный отломок
- 4) кость целиком

РАЗРАСТАНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) атеросклероз
- 2) кардиосклероз
- 3) гиалиноз
- 4) некроз

КРОВЯНЫЕ ЯДЫ ВЫЗЫВАЮТ

- 1) гемолиз
- 2) гемобластоз
- 3) миелоидный лейкоз
- 4) гемоконцентрацию

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ

- 1) следы мочеиспускания
- 2) особенности ложа трупа
- 3) диаметр зрачков
- 4) признаки ухода за младенцем

ПЯТНА ПАЛЬТАУФА – РАССКАЗОВА – ЛУКОМСКОГО ПОД ЛЕГОЧНОЙ ПЛЕВРОЙ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ _____ ТИПЕ УТОПЛЕНИЯ

- 1) спастическом
- 2) сухом
- 3) рефлекторном
- 4) аспирационном

СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЖИДКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) легкий

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ТОНКОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

РАНУ ЖИВОТА, ПРОНИКАЮЩУЮ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

У ВДАВЛЕННОГО ПЕРЕЛОМА СВОДА ЧЕРЕПА ПРИ УДАРЕ РЕБРОМ ПРЕДМЕТА ПОД УГЛОМ ОКОЛО 90° ПРИЗНАКИ СЖАТИЯ НА НАРУЖНОЙ ПЛАСТИНКЕ ФОРМИРУЮТСЯ В ОБЛАСТИ _____ ЛИНИИ

- 1) радиональной
- 2) меридиональной
- 3) концентрической
- 4) поперечной

ПО ВИДУ ОБМЕНА РАЗЛИЧАЮТ ДИСТРОФИИ

- 1) паренхиматозные
- 2) белковые
- 3) смешанные
- 4) мезенхимальные

ОЖОГИ ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СПИНЫ, ПОЯСНИЧНОЙ И ЯГОДИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПО «ПРАВИЛАМ ДЕВЯТОК» СОСТАВЛЯЮТ ПЛОЩАДЬ, РАВНУЮ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 27
- 2) 30
- 3) 9
- 4) 18

ПОЛОСТЬ, ЗАПОЛНЕННАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭКССУДАТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) инфарктом
- 2) гангреной
- 3) абсцессом
- 4) кистой

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СУБДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТОЛОВЫХ СИМПТОМОВ) КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

СОДЕРЖИМОЕ ЖЕЛУДКА ПОСЛЕ ПРИЁМА ПИЩИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОПАДАЕТ В ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНУЮ КИШКУ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1) 15-20
- 2) 6-12
- 3) 2-4
- 4) 12-15

ОТ ПОЛОСТЕЙ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ СЕРОВОДОРОДА ОЩАЩАЕТСЯ ЗАПАХ

- 1) тухлых яиц

- 2) нашатырного спирта
- 3) пергидроля
- 4) прелых яблок

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ОТ УДАВЛЕНИЯ РУКАМИ ОБНАРУЖИВАЮТ

- 1) кровоизлияния в межпозвонковые диски
- 2) ссадины на шее полулунной формы
- 3) переломы шейного отдела позвоночника
- 4) надрывы интимы сонных артерий

ПЕРЕЛОМ-ВЫВИХ МОНТЕДЖА КАК ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ ПО ПРИЗНАКУ СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ СВЫШЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 20
- 2) 25
- 3) 10
- 4) 30

ПОСЛЕ СОЗРЕВАНИЯ ЯЙЦА ЛИЧИНКА ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ПЕРВОЙ СТАДИИ ВЫЛУПЛЯЕТСЯ СПУСТЯ (В СУТКАХ)

- 1) 7
- 2) 3
- 3) 1
- 4) 5

ССАДИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ОБРАЗОВАННОЕ

- 1) по механизму сжатия
- 2) по механизму растяжения
- 3) не глубже сосочкового слоя дермы
- 4) глубже сосочкового слоя дермы

ОТКРЫТЫЙ КОСО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ ОТЛОМКОВ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА, ВЫЗВАННОЕ ПРИЧИНЕННЫМ ВРЕДОМ ЗДОРОВЬЮ, С РАЗВИТИЕМ ВЫКИДЫША, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий

4) лёгкий

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ СПАСТИЧЕСКОГО ПАРЕЗА И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

1) опасный для жизни

2) легкий

3) тяжкий

4) средней тяжести

СПОСОБНОСТЬ ОДНИХ ВЕЩЕСТВ ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬСЯ В ДРУГИЕ, ИМЕЮЩИЕ СХОДНОЕ СТРОЕНИЕ И СОСТАВ ЯВЛЯЕТСЯ

1) трансформацией

2) инфильтрацией

3) декомпозицией

4) извращенным синтезом

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БЕШЕНСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

1) волосы

2) продолговатый мозг

3) мышечную ткань

4) простату

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЛЕТ, ЕСЛИ ИНЫЕ СРОКИ НЕ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОРГАНОМ ИЛИ ЛИЦОМ, НАЗНАЧИВШИМ ЭКСПЕРТИЗУ

1) двух

2) трех

3) пяти

4) четырех

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЖИВЫХ ЛИЦ ДОСТАВЛЯЮТ

1) документы, в том числе медицинские

2) части трупа

3) трупы

4) образцы для сравнительного исследования

ВСКРЫТИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА В СЛУЧАЯХ ОТСУТСТВИЯ ПОДОЗРЕНИЯ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ОЧАГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО СПОСОБУ

1) Питре

2) Попову

3) Флексига

4) Вирхова

ГЕМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЯД

- 1) скорпионов
- 2) тараканов
- 3) пауков
- 4) муравьев

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ (СГИБАНИЕ – 30°-40°), ВЫЗВАВШЕЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ВЕЩЕСТВ НАРКОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) токсическое поражение сердца
- 2) гемолиз эритроцитов
- 3) поражение периферической нервной системы
- 4) угнетение функций центральной нервной системы

ВЫВИХ НЕСКОЛЬКИХ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ СПИНОГО МОЗГА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ДРОБОВОЕ РАНЕНИЕ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ОБЩЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ С ОТРЫВОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) временный
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

ПРИЗНАКОМ МАССИВНОГО ГЕМОЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) уремия
- 2) дистрофия печени
- 3) бледность кожи
- 4) желтуха

К ПРИЗНАКАМ М.И. РАЙСКОГО ПРИ ОБЩЕМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА ОТНОСЯТ

- 1) образование точечных кровоизлияний на слизистой оболочке почечных лоханок
- 2) резкое сокращение мошонки и подтягивание яичек ко входу в паховый канал
- 3) обнаружение пустого, уменьшенного в размерах желудка
- 4) наличие у отверстий рта и носа сосулек, на ресницах – инея

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ХВАТАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ИОНЫ КАЛЬЦИЯ, НАКАПЛИВАЯСЬ В ОКОЛОФИБРИЛЛЯРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, НАСЫЩАЮТ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ЦЕНТРЫ ТРОПОНИНА

- 1) I
- 2) C
- 3) L
- 4) T

К ПУТЯМ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА «В» ОТНОСЯТ

- 1) трансмиссивный
- 2) пищевой
- 3) искусственный
- 4) воздушно-пылевой

ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНЫМ СОДЕРЖИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ПИЩЕВЫХ МАСС В

- 1) полости глотки
- 2) ротовой полости
- 3) мелких бронхах
- 4) носовых ходах

ПРИ ВСКРЫТИИ ПИЛА ДУГОВАЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАСПИЛА

- 1) хрящевой ткани ребер
- 2) дужек позвонков
- 3) длинных трубчатых костей
- 4) костей черепа

ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

К НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ПРОДУКТАМ БИОТРАНСФОРМАЦИИ МЕТАНОЛА ОТНОСЯТ

- 1) ацетальдегид
- 2) силикат калия
- 3) щавелевую кислоту
- 4) формальдегид

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ВЫДАЕТСЯ ВМЕСТЕ

- 1) со вторым экземпляром заключения
- 2) с журналом регистрации
- 3) с гистологическим архивом
- 4) с материалами дела

ЛЕТАЛЬНАЯ ДОЗА МЕТИЛОВОГО СПИРТА ПРИ ПРИЕМЕ ВНУТРЬ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 100
- 2) 200
- 3) 300
- 4) 500

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛОДЫЖЕК ОБЕИХ БЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ПЕРЕЛОМОМ СУСТАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ И РАЗРЫВОМ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА С ПОДВЫВИХОМ И ВЫВИХОМ СТОПЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

ПРИЧИНОЙ ОСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ ПРИ СМЕРТИ ОТ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) тоническое сокращение мышц голосовой щели
- 2) обтурация дыхательных путей
- 3) сдавление продолговатого мозга
- 4) гиповентиляция ствола мозга

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРООЖОГОВ СВЯЗАН С _____ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) ударным
- 2) световым
- 3) механическим
- 4) тепловым

ХАРАКТЕР ПЛАМЕНИ ВЫСТРЕЛА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЗАВИСИТ ОТ

- 1) калибра оружия
- 2) количества пороха
- 3) большой начальной скорости пули
- 4) длины канала ствола

ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТ ПЕРЕГИБА ПРОИСХОДИТ, КАК ПРАВИЛО, В ТАК НАЗЫВАЕМЫХ МЕСТАХ СЛАБОСТИ - ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ, НА УРОВНЕ КЛЫКОВ ИЛИ

- 1) нижнечелюстного канала
- 2) альвеолярного отростка
- 3) подбородочных отверстий
- 4) венечного отростка

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ СЕРДЦА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЯТНА

- 1) Тардые
- 2) Вишневого
- 3) Минакова
- 4) Рассказова – Лукомского

ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРЕЛОМЫ МОГУТ БЫТЬ

- 1) метафизарными
- 2) вколоченными
- 3) оскольчатыми
- 4) одиночными

ПРИ УДАВЛЕНИИ РУКАМИ ПЕРЕЛОМЫ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1) в области основания больших рожков
- 2) в области тела по средней линии
- 3) у вершин малых рожков
- 4) в области больших и малых рожков с одной стороны

ПЕРИОД ОТ 22 НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ ДО 6 ДНЕЙ 23 ЧАСОВ 59 МИНУТ ЖИЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ранним
- 2) промежуточным
- 3) неонатальным
- 4) перинатальным

РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПОСМЕРТНОЙ СЕКРЕЦИЕЙ В ОТВЕТ НА ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ

- 1) крахмала
- 2) атропина
- 3) адреналина
- 4) пилокарпина

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ (В МИНУТАХ)

- 1) 7-10
- 2) 11-13
- 3) 5-6
- 4) 15-20

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) применение следокопировальной пленки
- 2) масштабирование
- 3) фотографирование
- 4) граффити

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА И С ЦЕЛЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОДЭКСПЕРТНОГО НАПРАВЛЯЮТ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ В

- 1) специализированные организации здравоохранения
- 2) поликлинику по месту регистрации
- 3) травматологический пункт
- 4) поликлинику по месту жительства

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОБСТАНОВКИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) аудиозапись
- 2) фотосъемку
- 3) граффити
- 4) масштабирование

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦА ОСНОВАНО НА ОБНАРУЖЕНИИ ИОНОВ

- 1) калия
- 2) хлора
- 3) свинца
- 4) йода

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ВЫРАЖЕННЫЙ ПАРЕЗ ПРАВОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛЕПТОСПИРОЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1) спинномозговую жидкость
- 2) волосы
- 3) ногти
- 4) зубы

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ НАПРАВИТЬ КРОВЬ И МОЧУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТАНОЛА ОТ ТРУПА БЕРУТ

- 1) селезенку
- 2) надпочечник
- 3) костный мозг
- 4) мышечную ткань

ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ СТИМУЛИРУЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) глюкокортикостероиды
- 2) минералокортикоиды

- 3) лейкоциты
- 4) В-лимфоциты

ЗАКРЫТЫЙ МЕЖВЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

К НЕОБРАТИМОЙ ДЕНАТУРАЦИИ БЕЛКОВ И ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ ОТНОСЯТ

- 1) сладж
- 2) эмболия
- 3) тромбоз
- 4) стаз

ПЕРЕЛОМ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1) острую
- 2) красного опеченения
- 3) рубцевания
- 4) подострую

ОДИНОЧНОЕ СЛЕПОЕ КОЛОТОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В КЛЕТЧАТКУ СРЕДОСТЕНИЯ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинившее
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

МЕХАНИЗМОМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ

- 1) гиперкапнии
- 2) гипекалиемии
- 3) асфиксии

4) гипоксемии

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 5-10
- 2) 5-20
- 3) 50-60
- 4) 30-40

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ СВЯЗАНО, В ТОМ ЧИСЛЕ С

- 1) повышением давления в зоне разряда атмосферы
- 2) резким перепадом давления
- 3) изменением парциального давления газов
- 4) мощным световым импульсом

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВЫХ ЛОКТЕВОМ И ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВАХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

К ОДНОМУ ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ОПЬЯНЕНИЯ, СВЯЗАННОМУ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯТ

- 1) попытку диссимуляции
- 2) мраморность кожных покровов
- 3) двигательное возбуждение
- 4) дизартрию

КРИТЕРИИ СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЖИВОГО ЛИЦА ПРИМЕНЯЮТСЯ В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ДИАГНОЗ «СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА» ПОДТВЕРЖДЕН

- 1) показаниями пострадавшего
- 2) данными очевидцев происшествия
- 3) субъективными симптомами
- 4) объективными данными

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СУЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 1-2
- 2) 50-60
- 3) 100
- 4) 3

У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 20-30 ЛЕТ ПРОЦЕСС ОБЛИТЕРАЦИИ ШВОВ ЧЕРЕПА НАБЛЮДАЕТСЯ В

- 1) нижней части затылочно-сосцевидного шва
- 2) срединной части затылочного шва с обеих сторон
- 3) верхушечной и задней частях стреловидного шва
- 4) обелионной части стреловидного шва и частично в височной части венечного шва

ТУПУЮ ТРАВМУ ШЕИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ ГОРТАНИ (С НАЛИЧИЕМ КЛИНИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ) КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ЛАКУНЫ С НАХОДЯЩИМИСЯ В НИХ ОСТЕОЦИТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ КОСТНЫМИ

- 1) пластинками
- 2) канальцами
- 3) тельцами
- 4) балками

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, РЕЗКОЕ НАРУШЕНИЕ ТРОФИКИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ОБЫЧНО УСТАНОВЛИВАЮТ ПРИЗНАКИ

- 1) транссексуализма
- 2) лесбиянства
- 3) мужеложства
- 4) гермафродитизма

В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ

- 1) четыре раза
- 2) пять раз
- 3) трижды
- 4) дважды

РАЗРЕШЕНИЕ НА ФОТОГРАФИРОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА НА МЕСТЕ

ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ НАХОДИТСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ

- 1) адвоката
- 2) следователя
- 3) врача – судебно-медицинского эксперта
- 4) понятых

ОСНОВНЫМ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ГЕПАТОЦИТОВ

- 1) атрофия
- 2) некроз
- 3) ишемия
- 4) гиперемия

В НОРМЕ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1) 37,0-37,1
- 2) 36,4-36,9
- 3) 35,0-35,5
- 4) 36,0-36,3

К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ, СВЯЗАННЫМ С МЕХАНИЗМОМ СДАВЛЕНИЯ ШЕИ ПЕТЛЕЙ, ОТНОСЯТ

- 1) форму и рельеф
- 2) локализацию и направление борозды на шее
- 3) замкнутость и незамкнутость
- 4) ширину и глубину

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ ХОЛОСТЫМИ ПАТРОНАМИ ОБРАЗУЮТСЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) дробы
- 2) пороховых газов
- 3) пули
- 4) картечи

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ЖЕЛУДКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ИССЛЕДОВАНИЕ ВХОДНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ В ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ

- 1) разрывов ткани
- 2) пояски осаднения

- 3) снаряда
- 4) смазки

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасный для жизни

К ОБЩИМ ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ХОД РЕГЕНЕРАЦИИ, ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) состояние сосудов
- 2) интенсивность обменных процессов
- 3) состояние нейротрофики
- 4) объем повреждения

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ СВЯЗАНО, В ТОМ ЧИСЛЕ С

- 1) мощным световым импульсом
- 2) повышением давления в зоне разряда атмосферы
- 3) изменением парциального давления газов
- 4) резким перепадом давления

НАИБОЛЬШЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ

- 1) костная ткань
- 2) жировая ткань
- 3) сальник
- 4) ликвор

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ РЕЗАНОЙ И КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАН ОСНОВЫВАЮТ НА

- 1) локализации повреждений
- 2) особенностях заживления
- 3) выявлении тканевых перемычек
- 4) соотношении длины и глубины

НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ПРИ

РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ СИЛЬВЕРМАНА В ____ БАЛЛОВ

- 1) 10
- 2) 0-2
- 3) 4-5
- 4) 6-7

ВЫВИХ ШЕСТОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ТРАВМА ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С ПЕШЕХОДОМ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 6
- 4) 5

ПРИ ГНИЕНИИ ТРУПА АКТИВИЗАЦИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ГНИЛОСТНОЙ ФЛОРЫ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ ГАЗОВ И НАКОПЛЕНИЮ ИХ В КИШЕЧНИКЕ И ____ ПОЛОСТИ

- 1) маточной
- 2) перикардиальной
- 3) плевральной
- 4) брюшной

ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ НАЧАВШЕГОСЯ ГНИЕНИЯ ТРУПА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАК

- 1) Пухнаревича
- 2) Белоглазова
- 3) Икара
- 4) Десятова

К МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ГЕЛЬВЕЛЛОВЫЙ КИСЛОТЫ В ОРГАНИЗМЕ ОТНОСЯТ

- 1) тотальное разрушение эритроцитов
- 2) образование карбоксигемоглобина
- 3) развитие метгемоглобинемии
- 4) ингибирование холинэстеразы

ПЕРЕЛОМ ДУГИ НЕСКОЛЬКИХ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни

- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

ТУПАЯ ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДИ В ВИДЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО РАЗРЫВА МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА НА УРОВНЕ Th₇-Th₈ СО СДАВЛЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И КОРЕШКОВОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДО (В НЕДЕЛЯХ)

- 1) 22
- 2) 12
- 3) 34
- 4) 28

ПРИ НЕБОЛЬШОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРОЯВЛЯЕТСЯ _____ ДЕЙСТВИЕ ПУЛИ

- 1) гидродинамическое
- 2) клиновидное
- 3) ушибающее
- 4) пробивное

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРТ БЕРЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) отделяемое молочных желез
- 2) лимфу
- 3) мочу
- 4) слюну

СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОГЕНА В ПЕЧЕНИ ПРИ ОБЩЕМ ДЕЙСТВИИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- 1) изменяется волнообразно
- 2) изменяется хаотично
- 3) повышается
- 4) снижается

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) угрожающий жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ ПОДАВЛЯЕТ В ОРГАНИЗМЕ

- 1) процессы пищеварения
- 2) липидный обмен
- 3) иммунитет
- 4) выработку гормонов

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ В СЛУЧАЕ

- 1) использования консервирующих средств
- 2) поступления токсического вещества без развития симптомов отравления
- 3) образования токсического вещества вследствие заболевания
- 4) отсутствия токсического вещества в организме

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

НАИБОЛЕЕ ВЫСТУПАЮЩЕЙ КНАРУЖИ ТОЧКОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ ЧЕРЕПА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) обелион
- 2) эурион
- 3) базион
- 4) астерион

ФОРМОЙ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯМИ МЫШЬЯКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) легочная
- 2) желудочно-кишечная
- 3) геморрагическая
- 4) почечная

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ БРЮШНОГО ТИФА/ПАРАТИФА ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) головной мозг
- 2) содержимое толстого и тонкого кишечника
- 3) кусочки тканей в области поражения
- 4) кровь, мочу

ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ ТИП МИОКАРДИТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ____ ОТЕКОМ

- 1) кахектическим
- 2) онкотическим
- 3) серозным
- 4) аллергическим

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ ЯЗЫКА НА УРОВНЕ КОРНЯ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) легкий

К ЖИДКИМ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТ

- 1) гексоген
- 2) тринитрофенол
- 3) нитроглицерин
- 4) аммонал

ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ УДАРА ТУПЫМ ТВЕРДЫМ ПРЕДМЕТОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ НА КОСТЯХ ЧЕРЕПА ОБРАЗУЮТСЯ ____ ПЕРЕЛОМЫ

- 1) многооскольчатые
- 2) вдавленные
- 3) винтообразные
- 4) конструкционные

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ НАБЛЮДАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ____ ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1) 24
- 2) 20
- 3) 48
- 4) 36

ХРЯЩ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО МИКРОТРАСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ СОХРАНЯТЬ В

- 1) глицерине
- 2) этаноле
- 3) воде
- 4) растворе формалина

К СПОСОБНОСТИ ПОЛОВОЗРЕЛОГО ОРГАНИЗМА ПРОИЗВОДИТЬ ЖИЗНЕСПОСОБНОЕ ПОТОМСТВО ОТНОСЯТ

- 1) фертильность
- 2) анорхизм
- 3) монорхизм
- 4) крипторхизм

СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПРИКАЗУ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 12.05.2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ МИКРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НАЧИНАЮТ С

- 1) идентифицируемых объектов
- 2) анализа образцов
- 3) сравнительного исследования
- 4) проведения эксперимента

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее легкий вред здоровью
- 2) не причинившее вред здоровью
- 3) причинившее тяжкий вред здоровью
- 4) причинившее вред здоровью средней тяжести

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ БРЫЖЕЙКИ ТОНКОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней степени тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние

- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

К КРОВОИЗЛИЯНИЯМ В КОЖУ ИЛИ СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ, ДИАМЕТР КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 3 ММ, ОТНОСЯТ

- 1) петехии
- 2) экхимозы
- 3) вибексы
- 4) кровоподтеки

ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЯИЧЕК В МОШОНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) крипторхизмом
- 2) эктопией
- 3) монорхизмом
- 4) анорхизмом

ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) постановление или определение руководителя Департамента здравоохранения
- 2) приказ или распоряжение представителя следственных органов
- 3) распоряжение или определение начальника Бюро
- 4) определение суда, постановление судьи, дознавателя или следователя

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СУПИНАЦИИ И ПРОНАЦИИ В ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ И ЛОКТЕВОМ СУСТАВАХ ОТ 45° ДО 60°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НИТРИТОВ НА ОРГАНИЗМ ОБУСЛОВЛЕНО ОБРАЗОВАНИЕМ

- 1) карбоксигемоглобина
- 2) метгемоглобина
- 3) метмиоглобина
- 4) карбоксимиоглобина

МЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КАКОЙ-ЛИБО УЧАСТОК ТЕЛА ВЫЗЫВАЕТ

- 1) озноб
- 2) отморожение
- 3) гипоксию
- 4) гиперемию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ НА КОЖЕ ФОРМИРУЕТСЯ КЛИНКОМ ПРИ

- 1) взаимодействии с подлежащей костью
- 2) погружении
- 3) извлечении
- 4) трении боковых поверхностей

ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ БАЗАЛЬНАЯ МЕМБРАНА ДИСТАЛЬНЫХ КАНАЛЬЦЕВ В ОЛИГОАНУРИЧЕСКОЙ СТАДИИ ПОДВЕРГАЕТСЯ

- 1) гипертрофии
- 2) гипотрофии
- 3) тубулорексису
- 4) атрофии

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ РЕФЛЕКСОВ БЕЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, АТРОФИИ, ПАРЕЗОВ, КОНТРАКТУР, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающий жизни
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ГРУДИ И ЖИВОТА III СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 15% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАННОЕ ПОЗДНИМИ СРОКАМИ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ , КАК ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

- 1) рассматривается во всех возрастных группах
- 2) не рассматривается у лиц после 60 лет
- 3) не рассматривается во всех возрастных группах
- 4) рассматривается у лиц после 18 лет

90-93% СМЕРТЕЛЬНОЙ РОДОВОЙ ТРАВМЫ ПРИХОДИТСЯ НА

- 1) подкапсульные гематомы печени
- 2) переломы позвоночника
- 3) разрыв мозжечкового намета
- 4) разрывы спинного мозга

АГОНАЛЬНАЯ СМЕРТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕМ

- 1) субсерозных геморрагий
- 2) белых кровяных свертков в сосудах
- 3) венозного полнокровия внутренних органов
- 4) темной жидкой крови

В ТРУПНЫХ ПЯТНАХ КРОВЬ

- 1) образует неограниченные свертки
- 2) отсутствует
- 3) образует ограниченные свертки
- 4) диффузно пропитывает клетчатку

УШИБЛЕННАЯ РАНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) соединительнотканых перемычек
- 2) ровных неосажденных краев
- 3) неразможенных ровных стенок
- 4) чистого зияющего просвета раны

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ ЕГО РАЗГИБАНИИ - 10°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

СПОСОБНОСТЬ К ТРУДУ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ

- 1) общая
- 2) профессиональная
- 3) временная
- 4) специальная

СМЕРТЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ

- 1) угнетения органов эндокринной системы
- 2) тромбоэмболии легочной артерии
- 3) поражения головного мозга
- 4) первичной остановки сердца

ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ, РЕЗКОЕ РАССТРОЙСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) легкий

- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ПРИ ВЫБОРЕ СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ С НИМИ, СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

- 1) учебных пособий
- 2) методических рекомендаций
- 3) санитарных правил
- 4) национальных руководств

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ МИЗИНЦА С V ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ЛЕВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

ОТСУТСТВИЕ ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ЛЕВОЙ ЛОПАТКИ (КАК СЛЕДСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ), ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 75%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ДИАМЕТРА ЧЕРЕПА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РАССТОЯНИЕ

- 1) от точки базион до точки брегма
- 2) между точками эурион
- 3) от глабеллы до опистокраниона
- 4) между точками базион и назион

УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

- 1) ч. 2 ст. 85 ГПК РФ
- 2) ст. 111 УК РФ
- 3) ст. 161 УПК РФ
- 4) ст. 106 УК РФ

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДЪЯЗЫЧНОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ УМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД

ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБЫЕ РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

СУДАН-III ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ ОКРАШИВАТЬ ЖИР В _____ ЦВЕТ

- 1) фиолетовый
- 2) оранжево-красный
- 3) синий
- 4) черный

ОТРАВЛЕНИЕ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившее
- 4) средней тяжести

СМЕРТЬ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОБЫЧНО НАСТУПАЕТ ПРИ СНИЖЕНИИ ОБЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1) 28-30
- 2) 20-25
- 3) 31-33
- 4) 34-36

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СЕРОВОДОРОДОМ ИЗ ПОЛОСТЕЙ И ОТ ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ЗАПАХ

- 1) горького миндаля
- 2) прелых яблок
- 3) тухлых яиц
- 4) чеснока

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАЗЛИЧАЮТ ДИСТРОФИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) углеводные

- 2) водные
- 3) смешанные
- 4) минеральные

ПЕРЕЛОМ ВИСОЧНОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ФОРМИРОВАНИЕ НА КОЖЕ ПУЗЫРЕЙ С КРОВЯНИСТЫМ СОДЕРЖИМЫМ БЕЗ НЕКРОЗА МЯГКИХ ТКАНЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О _____ СТЕПЕНИ ОБМОРОЖЕНИЯ

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ ОБЩЕЙ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ (В ГРЕЯХ)

- 1) 2,0-4,0
- 2) 0,5-1,5
- 3) 5,0-7,0
- 4) 7,5-9,5

ПОВОДОМ ДЛЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) установление истязания
- 2) определение обезображения лица
- 3) осуждение к исправительно-трудовым работам
- 4) определение факта побоев

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ, РАВНОЕ 5% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВЫДЕЛЯЮТ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) склерозирующий
- 2) нисходящий
- 3) диффузный

4) восходящий

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ПЕЧЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАНое РАНЕНИЕ ГРУДИ С РАССЕЧЕНИЕМ ЛЕВОЙ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПОСЛЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ СТРОЧКОВ ОТРАВЛЕНИЕ ОБЫЧНО РАЗВИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1) 12-24
- 2) 24-48
- 3) 1-2
- 4) 6-10

В ОТВЕТ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ В 4 ФАЗЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1) первичный спазм сосудов
- 2) ретракция тромба
- 3) необратимая агрегация тромбоцитов
- 4) адгезия тромбоцитов

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ БРЫЗЖЕЙКИ ТОНКОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПОТЕРЯ РЕЧИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившая
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГАЛИЩНОГО СОДЕРЖИМОГО НА НАЛИЧИЕ

СПЕРМАТОЗОИДОВ ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ПОЛОВОГО АКТА ЧЕРЕЗ (В ДНЯХ)

- 1) 4-5
- 2) 2-3
- 3) 1
- 4) 6-7

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА В ЖЕЛУДОЧНОМ СОДЕРЖИМОМ ПРИ ЕГО НИЗКОМ УРОВНЕ В КРОВИ И ОТСУТСТВИИ В МОЧЕ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ЧЕРЕЗ (В МИНУТАХ)

- 1) 90-120
- 2) 120-180
- 3) 60-90
- 4) 30-50

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТИЗЕ НЕСКОЛЬКИХ ВРАЧЕЙ ОДНОЙ ИЛИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ЭКСПЕРТИЗОЙ

- 1) дополнительной
- 2) первичной
- 3) комплексной
- 4) комиссионной

ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА МОГУТ НАХОДИТЬСЯ В СКЛАДКАХ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА В ТЕЧЕНИЕ (В ЧАСАХ)

- 1) 1-2
- 2) 24-48
- 3) 5-7
- 4) 4-12

СТАДИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИУРЕЗА ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) венозным полнокровием
- 2) деструкцией канальцев
- 3) некротическими процессами
- 4) уменьшением отека

ЗАКРЫТЫЙ КОСО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ФРАГМЕНТАРНО-ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ

ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

**ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

**ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ЦВЕТНЫХ ОТПЕЧАТКОВ КРАСНО-
ФИОЛЕТОВАЯ ОКРАСКА СООТВЕТСТВУЕТ**

- 1) кобальту
- 2) алюминию
- 3) никелю
- 4) свинцу

**ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ
ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ
ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

СЕРДЦЕ БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ВСКРЫВАЮТ ПО МЕТОДУ

- 1) Фишера
- 2) Абрикосова
- 3) Автандилова
- 4) Вирхова

**ПРОБА ГАЛЕНА-ШРЕЙЕРА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ _____
НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА**

- 1) живорожденности
- 2) переносенности
- 3) зрелости
- 4) жизнеспособности

**МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР ПО ДВУМ
АНАТОМИЧЕСКИМ ЛИНИЯМ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНОГО УЧАСТКА ГРУДНОЙ**

СТЕНКИ ПО ТИПУ «РЕБЕРНОГО КЛАПАНА» КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ОБНАРУЖЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И ТАХИКАРДИИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ОТРАВЛЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СВЯЗАНО С ИЗБЫТОЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

- 1) кониина
- 2) серотонина
- 3) аконитина
- 4) ацетилхолина

ИСКУССТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ВЫЗВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК _____ БОЛЕЗНИ

- 1) неврологические
- 2) притворные
- 3) искусственные
- 4) психические

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ III-IV СТЕПЕНИ С ПЛОЩАДЬЮ ПОРАЖЕНИЯ 15% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА КВАЛИФИЦИРУЮТ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасности для жизни
- 2) длительности расстройства здоровья
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты профессиональной трудоспособности

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТЕПЛОВОМ ПОРАЖЕНИИ РАЗЛИЧАЮТ _____ СИНДРОМ

- 1) невротенический
- 2) почечный
- 3) печеночный
- 4) эндокринный

ХРОНИЧЕСКАЯ ФОРМА ГЕПАТИТА ПРЕДСТАВЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ГЕПАТИТОМ

- 1) подострым
- 2) острым
- 3) активным
- 4) затяжным

В СЛУЧАЕ, КОГДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ БЫЛО УПАКОВАНО ВМЕСТЕ С ОБЪЕКТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛАМИ ДЕЛА, ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО

- 1) медицинским регистратором
- 2) санитаром
- 3) лаборантом
- 4) руководителем ГСМЭУ

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К

- 1) баротравме придаточных полостей носа
- 2) кислородному голоданию
- 3) отравлению углекислым газом
- 4) отравлению кислородом

ПРОЯВЛЕНИЕМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРОВОДОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дистрофия печени
- 2) паралич ЦНС
- 3) блокирование тканевых дыхательных ферментов
- 4) уремия

К ТЕХНИКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЖИВОРОЖДЕННОСТИ ОТНОСЯТ

- 1) спектральное исследование
- 2) гидростатические пробы
- 3) ультразвуковое исследование
- 4) дифениламиновую пробу

ФОРМА И РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ КОЛЮЩЕГО ПРЕДМЕТА ОТРАЖАЮТСЯ В ПОВРЕЖДЕНИИ

- 1) стенки желудка
- 2) перикарда
- 3) большого сальника
- 4) стенки кишечника

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПОЧКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕДНИЙ ВЫВИХ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий

4) тяжкий

ПРИ СДАВЛЕНИИ ПАЛЬЦАМИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА С БОКОВ ЗРАЧОК ПРИОБРЕТАЕТ _____ ФОРМУ

- 1) щелевидную
- 2) треугольную
- 3) прямоугольную
- 4) квадратную

К ИНВОЛЮТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ СОХРАНИВШИХСЯ ПОСЛЕ КРЕМАЦИИ ФРАГМЕНТОВ ДИАФИЗОВ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 46-60 ЛЕТ ОТНОСЯТ

- 1) полости остеопороза на боковых поверхностях
- 2) наружные общие пластины в виде участков сильной и средней степени минерализации
- 3) вторичные остеоны сильной степени минерализации
- 4) пестроту тона теней в эндостальном отделе

К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОТНОСЯТ

- 1) хирургический костюм
- 2) халат медицинский одноразовый
- 3) хлопчатобумажные перчатки
- 4) калоши резиновые

СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ ПРАВОГО ПЛЕЧА НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

К ВНУТРЕННИМ ФАКТОРАМ ПЕРЕГРЕВАНИЯ ОРГАНИЗМА ОТНОСЯТ

- 1) высокую температуру окружающей среды
- 2) небольшую скорость ветра
- 3) индивидуальные особенности организма
- 4) нерациональную одежду

ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни

- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

К НАРУШЕНИЯМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРИ ОПЬЯНЕНИИ ОТНОСЯТ

- 1) сонливость
- 2) неадекватность поведения
- 3) неустойчивость в позе Ромберга
- 4) замедление темпа мышления

ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) акт судебно-медицинского освидетельствования
- 2) протокол освидетельствования
- 3) эпикриз
- 4) заключение эксперта

К ПРИЗНАКАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАЗРЕЗА КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОТНОСЯТ

- 1) разможжённые края
- 2) П-образный конец
- 3) острый конец
- 4) осаднённые края

ЗАПАХ СУШЕНЫХ ГРИБОВ ОТ ВСКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ И ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) дихлорэтаном
- 2) сероводородом
- 3) цианидами
- 4) мышьяком

МИКРОСКОПИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ РАК ПЕЧЕНИ

- 1) монолобулярный
- 2) крупноузловой
- 3) мультилобулярный
- 4) узловой

ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ СТАДИЮ

- 1) нефротическую
- 2) олигоанурическую
- 3) протеинемическую
- 4) азотемическую

К ТРЕТЬЕЙ НЕДЕЛЕ ГЕПАТОЗА РАЗВИВАЕТСЯ СТАДИЯ ____ ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНИ

- 1) красной
- 2) желтой
- 3) серой

4) смешанной

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ОДНОЙ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) длительный\
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ДАВЛЕНИЕ НА ТРУПНОЕ ПЯТНО ЖЕЛАТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ДИНАМОМЕТРА ТРУПНОГО НА ПЛОЩАДИ (В КВАДРАТНЫХ САНТИМЕТРАХ)

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 5
- 4) 4

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУ ВТОРОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОЙ ПОЛОВИНЫ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) делипоидизации коры
- 2) атрофии коры
- 3) атрофии лимфоидных фолликул
- 4) кровоизлияний большей части паренхимы

ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кровотечение
- 2) кровопотеря
- 3) тканевая эмболия
- 4) воздушная эмболия

В ТЕЧЕНИИ АМИЛОИДОЗА ПОЧЕК РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ СТАДИЮ

- 1) нефротическую
- 2) острую
- 3) хроническую
- 4) рецидивирующую

ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ УТОЛЩЕНИЕ СТЕНКИ БРОНХОВ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ

ИНФИЛЬТРАЦИИ ЕЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) лейкоцитами
- 2) эритроцитами
- 3) лимфоцитами
- 4) тромбоцитами

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ III-IV СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) опасность для жизни
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) длительное расстройство здоровья

ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗВИТИЕМ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ЭЛЕКТРООЖОГИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВЫРАЖЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ НА ОТДАЛЕНИИ ОТ ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

- 1) лимфатических узлов
- 2) костной ткани
- 3) нервных стволов
- 4) артерий

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИОГЛОБИНА ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА

- 1) острое отравление этанолом
- 2) сахарный диабет
- 3) острый инфаркт миокарда
- 4) хронический гепатит

О ПРИЖИЗНЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) гемолиза эритроцитов
- 2) некрозов жировых
- 3) лейкоцитарной инфильтрации
- 4) некрозов мышечных волокон

БЕНЗОЛ И ЕГО ГОМОЛОГИ ОТНОСЯТСЯ, В ОСНОВНОМ, К _____ ЯДАМ

- 1) функциональным

- 2) резорбтивным
- 3) гемолитическим
- 4) деструктивным

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ РЕЗКИЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ МАЦЕРАЦИИ НА РУКАХ И НОГАХ У ТРУПА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ 14-16°C ВОЗМОЖНО В ТЕЧЕНИЕ (В ЧАСАХ)

- 1) 12-24
- 2) 6-8
- 3) 0,5-1
- 4) 24-48

ПРИ РАЗВИТИИ ГНИЛОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОТСЛОЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА ВМЕСТЕ С НОГТЯМИ И ВОЛОСАМИ МОЖЕТ БЫТЬ НА ____ СУТКИ ПОСЛЕ СМЕРТИ

- 1) 6-10
- 2) 1-2
- 3) 3-4
- 4) 4-5

СМЕРТЬ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫМИ АМФЕТАМИНА НАСТУПАЕТ, КАК ПРАВИЛО, ОТ

- 1) анафилактического шока
- 2) пневмопатии
- 3) внезапной остановки сердца
- 4) цирроза печени

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ЛЁГКИЕ РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

ВЫДАЧА ОДЕЖДЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ТРУПА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) с письменного разрешения следственных органов
- 2) по письменному требованию близких родственников
- 3) с письменного разрешения эксперта, проводившего аутопсию
- 4) с письменного разрешения руководителя экспертного учреждения

У ДЫШАВШЕГО МЛАДЕНЦА КУПОЛ ДИАФРАГМЫ ОПУЩЕН ДО _____ МЕЖРЕБЕРЬЯ

- 1) VIII
- 2) IV
- 3) VI
- 4) V

ТУПАЯ ТРАВМА ГРУДИ У СПОРТСМЕНОВ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившая
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ НЕПОДВИЖНОСТЬ ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО, ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО И МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВОВ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНУЮ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) отсутствием сомнений в правильности выводов экспертизы
- 2) неудовлетворенностью следователя результатами экспертизы
- 3) объективно обоснованными жалобами потерпевших
- 4) неудовлетворенностью руководителя ГСЭУ результатами экспертизы

К ПРИЗНАКАМ ПРЕБЫВАНИЯ ТРУПА В ВОДЕ ОТНОСЯТ

- 1) стойкую мелкопузырчатую пену у рта
- 2) пятна Пальтауфа – Рассказова – Лукомского
- 3) спазм голосовой щели
- 4) мацерацию кожи

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) постановление
- 2) протокол
- 3) письменное отношение
- 4) личное заявление гражданина

ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ С ОЧЕНЬ БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ ОБЛАДАЮТ _____ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) механическим
- 2) световым
- 3) ионизирующим
- 4) охлаждающим

УШИБ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С НАРУШЕНИЕМ ЕГО ФУНКЦИИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТ ПЕРЕГИБА ПРОИСХОДИТ, КАК ПРАВИЛО, В ТАК НАЗЫВАЕМЫХ МЕСТАХ СЛАБОСТИ - ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ, В ОБЛАСТИ _____ И УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

- 1) нижнечелюстного канала
- 2) альвеолярного отростка
- 3) нижнего восьмого зуба
- 4) венечного отростка

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ПРИ ПОЛЁТЕ НА ВЫСОТЕ 6-9 ТЫСЯЧ МЕТРОВ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ

- 1) кататравма
- 2) баротравма
- 3) акутравма
- 4) электротравма

СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ НА УРОВНЕ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее легкий вред здоровью
- 2) не причинившее вред здоровью
- 3) причинившее тяжкий вред здоровью
- 4) причинившее вред здоровью средней тяжести

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВЫХ ЛОКТЕВОМ И ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВАХ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПЛЕЧА,

ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ПРИ АУТОПСИИ ТРУПОВ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ РАЗРЕЗ НАЧИНАЮТ С СЕРЕДИНЫ НИЖНЕЙ ГУБЫ ДЛЯ

- 1) осмотра сосудов шеи
- 2) исследования пищевода
- 3) поиска инородных предметов
- 4) исследования лимфатических узлов шеи

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ О

- 1) выводах эксперта
- 2) выполненном заключении эксперта
- 3) обстоятельствах дела
- 4) результатах лабораторных исследований

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ ГОППЕ – ЗЕЙЛЕРА КРОВЬ, СОДЕРЖАЩАЯ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН, ОСТАЕТСЯ

- 1) коричневатой-черной
- 2) бурой-зеленоватой
- 3) красной
- 4) серо-коричневой

К МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЮ СУБТОКСИЧНЫХ ДОЗ АМФЕТАМИНОВ ОТНОСЯТ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ

- 1) адреналина
- 2) серотонина
- 3) катехоламина
- 4) гистамина

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕБЛОВЫХ СИМПТОМОВ) КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ВСКРЫТИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РАНЕВЫХ КАНАЛОВ, ОПУХОЛЕЙ, КРОВОИЗЛИЯНИЙ ПРОВОДИТСЯ ПО СПОСОБУ

- 1) Фингерланда

- 2) Флексига
- 3) Эйдлина
- 4) Бернарда

ПЕРЕЛОМ КЛИНОВИДНОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ БОЛЬШИХ ДОЗАХ СУЛЕМЫ В ОРГАНИЗМЕ СМЕРТЬ НАСТУПАЕТ ОТ

- 1) дифтерического колита
- 2) дыхательной недостаточности
- 3) паралича сосудодвигательного центра
- 4) язвенного стоматита

КОМИССИОННЫЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОВОДЯТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1) комитете по охране здоровья граждан
- 2) экспертно-криминалистическом центре
- 3) городских клинических больницах
- 4) Российском центре судебно-медицинской экспертизы

ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВКИ ДОНОШЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 9-9,5
- 2) 8-8,5
- 3) 42-45
- 4) 34-35

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУПОВИНЫ НА СЕРЕДИНЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ МЕЧЕВИДНЫМ ОТРОСТКОМ И ЛОННЫМ СОЧЛЕНЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) жизнеспособности
- 2) новорожденности
- 3) доношенности
- 4) зрелости

ПОД ПОТЕРЕЙ ОРГАНИЗМОМ ЧАСТИ КРОВИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУЖНОГО И/ИЛИ ВНУТРЕННЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОНИМАЮТ

- 1) кровотечение
- 2) кровопотерю
- 3) кровоподтек
- 4) кровоизлияние

К КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ОТНОСЯТ, В ТОМ

ЧИСЛЕ

- 1) холестатическую
- 2) гепатоцеллюлярную
- 3) гепатоканаликулярную
- 4) каналикулярную

ФОНОМ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) инфаркт
- 2) ишемическая болезнь сердца
- 3) атеросклероз
- 4) артериальная гипотензия

КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА БРЕГМА НАХОДИТСЯ

- 1) в месте схождения стреловидного и затылочного швов
- 2) в месте схождения венечного и стреловидного швов
- 3) на переднем крае большого затылочного отверстия
- 4) на середине края большого затылочного отверстия

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ДВИЖЕНИЙ В КОНЕЧНОСТЯХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) легкий в
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ДЕГИДРАТАЦИЕЙ КОЖИ И ПОВЕРХНОСТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ СЛИЗИСТЫХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ИСПАРЕНИЕМ ВЛАГИ С ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА УМЕРШЕГО, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трупное окоченение
- 2) высыхание трупа
- 3) трупный аутолиз
- 4) охлаждение трупа

ПОЯСОК КОНТУЗИИ (ПОЯСОК ОСАДНЕНИЯ) ПО КРАЯМ ВЫХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ ОБРАЗУЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ

- 1) разрыве пули внутри тела
- 2) термическом действии пороховых газов
- 3) контузионном действии пороховых газов
- 4) прилегании к области выхода пули твердого предмета

К РАССТРОЙСТВУ ЗДОРОВЬЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЯДОВИТЫХ ИЛИ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ОРГАНИЗМ ИЗВНЕ, ОТНОСЯТ

- 1) отравление

- 2) интоксикацию
- 3) болезнь
- 4) патологическое состояние

УДАЛЕНИЕ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА С ОСТРОТОЙ ЗРЕНИЯ ДО ТРАВМЫ 0,05, ПО ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившее
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ, ПРИВЛЕКАЕМЫЙ К ОСМОТРУ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, РАБОТАЕТ В КОНТАКТЕ С

- 1) адвокатом
- 2) экспертом-криминалистом
- 3) свидетелем
- 4) соседями

В ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАДИИ ОСМОТРА ТРУПА ДОПУСКАЕТСЯ

- 1) исследование раневого канала
- 2) переворачивание трупа
- 3) изъятие крови из крупных сосудов
- 4) вскрытие головного мозга

К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ, ВЕДУЩЕМУ К ДИФFUЗНОМУ УПЛОТНЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ В СВЯЗИ С ИЗБЫТОЧНЫМ РАЗРАСТАНИЕМ ЗРЕЛОЙ ПЛОТНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТ

- 1) регенерация
- 2) некроз
- 3) склероз
- 4) инфаркт

МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ КАРДИОСКЛЕРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) диффузная
- 2) заместительная
- 3) постинфарктная
- 4) атеросклеротическая

НАРУШЕНИЕМ ПРОХОДИМОСТИ ПОЛОВОГО КАНАЛА В ОБЛАСТИ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) аплазия
- 2) атрезия
- 3) гинатрезия
- 4) стеноз

**ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ДИАФРАГМЫ
КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
ПО ПРИЗНАКУ**

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

**ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ БЕДРА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОК И КАПСУЛЫ СУСТАВА
КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинивший
- 4) средней тяжести

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ СМЕРТЬ НАСТУПАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1) угнетения сосудодвигательного центра
- 2) угнетения дыхательного центра
- 3) развития острой почечной недостаточности
- 4) нарушения водно-солевого обмена

ПЛОХИМ ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) кожа
- 2) тканевая жидкость
- 3) кровеносный сосуд
- 4) лимфатический сосуд

ПРИ УТОПЛЕНИИ В СОЛЁНОЙ ВОДЕ ПО АСПИРАЦИОННОМУ ТИПУ ВОЗНИКАЕТ

- 1) гидремия
- 2) гиповолемия
- 3) гиперкалиемия
- 4) гемолиз

**ФОРМИРОВАНИЕ НА КОЖЕ УЧАСТКОВ ГИПЕРЕМИИ БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПУЗЫРЕЙ
И НЕКРОЗА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О _____ СТЕПЕНИ ОБМОРОЖЕНИЯ**

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 3

**ОТДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА ОТ МОЗГОВОГО ПО ЛОБНО-СКУЛОВОМУ ШВУ,
ГЛАЗНИЦАМ, ЛОБНОМУ ОТРОСТКУ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ФОРМИРУЕТ ПЕРЕЛОМ,
ИЗВЕСТНЫЙ КАК - ФОР**

- 1) III

- 2) I
- 3) II
- 4) IV

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ВТОРОЙ СТАДИЕЙ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЯ

- 1) гидремическая
- 2) коллапса
- 3) ретикулярного криза
- 4) восстановления

СМЕРТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СНОТВОРНЫХ ВЕЩЕСТВ ОБЫЧНО НАСТУПАЕТ ОТ

- 1) гипогликемии
- 2) отека головного мозга
- 3) асфиксии
- 4) коллапса

К ОБЩИМ ПРИЗНАКАМ ЛИЧНОСТИ ОТНОСЯТ

- 1) индивидуальные особенности строения скелета
- 2) состояние половой зрелости
- 3) аномалии развития организма
- 4) половую принадлежность

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ТРОФИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) легкий

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РЕЗАННОЙ РАНЫ ШЕИ ВСКРЫТИЕ ТРУПА НАЧИНАЮТ С ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ

- 1) Гоппе – Зейлера
- 2) Сунцова
- 3) Галена – Шрейера
- 4) Владимирского

ЯДРА ОКОСТЕНЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ В КОСТЯХ ЗАПЯСТЬЯХ (КРЮЧКОВОЙ И ГОЛОВЧАТОЙ) В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)

- 1) 10-12
- 2) 24-36
- 3) 0-1
- 4) 2-5

КРОВОПОДТЁК ПРИОБРЕТАЕТ ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЗОВАНИЯ

- 1) гемосидерина
- 2) биливердина
- 3) уробилиногена
- 4) стеркобилина

СЕРОВАТО-КОРИЧНЕВАЯ ОКРАСКА ТРУПНЫХ ПЯТЕН ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ _____ ЯДАМИ

- 1) едкими
- 2) функциональными
- 3) деструктивными
- 4) метгемоглобинообразующими

К ОСТРЫМ РАССТРОЙСТВАМ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ С ПРИЗНАКАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ В ВИДЕ ФРАГМЕНТАЦИИ КОНТРАКТУРНО ИЗМЕНЕННЫХ КАРДИОМИОЦИТОВ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ОТНОСЯТ ПРИЗНАК

- 1) токсического тромбоэндокардита
- 2) токсической дистрофии миокарда
- 3) токсической кардиомиопатии
- 4) токсического идиопатического миокардита Абрамова-Фидлера

НАРУШЕНИЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ, ЦВЕТОВ, ЛИЦ И ПРОСТРАНСТВ ЯВЛЯЕТСЯ АГНОЗИЯ

- 1) зрительная
- 2) акустическая
- 3) сенсорная
- 4) обонятельная

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К ПОЛОВОМУ СНОШЕНИЮ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВКИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА ОПРЕДЕЛЯЮТ В ОБЛАСТИ

- 1) уретры
- 2) короны
- 3) крайней плоти
- 4) верхушки

ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ВЫДЕЛЯЮТ _____ СТАДИИ/СТАДИЙ

- 1) 6

- 2) 5
- 3) 3
- 4) 4

ВЫВОД О НАХОЖДЕНИИ ПАЦИЕНТА В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ДЕЛАЕТСЯ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА В КРОВИ (В МИЛЛИГРАММ/ЛИТР)

- 1) 1
- 2) 0,5
- 3) 2
- 4) 0,16

«ЭКСТАЗИ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДНОЕ

- 1) амфетамина
- 2) кокаина
- 3) эфедрина
- 4) амитриптилина

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНАЯ ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПРОБА БРЕСЛАУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ _____ НОВОРОЖДЕННОГО

- 1) живорожденности
- 2) зрелости
- 3) жизнеспособности
- 4) новорожденности

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ, ОБЫЧНО ВЫЯВЛЯЮТ

- 1) уменьшение размеров почек
- 2) «синюху» мозга
- 3) бледность слизистых оболочек
- 4) выраженное венозное малокровие органов

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ ВЫДАЮТ ПОД РОСПИСЬ

- 1) органу или лицу, назначившему экспертизу
- 2) врачу
- 3) страховому агенту
- 4) лаборанту

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ

- 1) неорганические соединения фосфорной кислоты
- 2) органические соединения ароматического ряда
- 3) соли фосфора
- 4) органические эфиры фосфорной кислоты

ЭЛЕКТРОМЕТКА МОЖЕТ ИМЕТЬ ВИД, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) раны
- 2) ожога
- 3) ушиба
- 4) некроза

**НАРУШЕНИЯ ЖИРОВОГО ОБМЕНА МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
_____ ДИСТРОФИЕЙ**

- 1) белковой
- 2) гиалиново-капельной
- 3) углеводной
- 4) клеточной

**ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ ВО
ВЛАГАЛИЩЕ БЕРУТ НА ИССЛЕДОВАНИЕ**

- 1) мазок с уретры
- 2) смыв со слизистой оболочки прямой кишки
- 3) содержимое влагалища
- 4) смыв с уретры

МЕХАНИЗМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЩЕЛОЧЕЙ ОБУСЛОВЛЕН СПОСОБНОСТЬЮ

- 1) ингибировать ацетилхолинэстеразу
- 2) ингибировать сульфгидрильные группы тиоловых ферментов
- 3) вызывать омыление жиров и гидролиз белков
- 4) трансформировать гемоглобин в карбоксигемоглобин

**ПРИ ПОГРУЖЕНИИ КЛИНКА КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА ПОД УГЛОМ,
ОСАДНЕНИЕ ПО КРАЮ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОБЫЧНО ХОРОШО ВЫРАЖЕНО**

- 1) по линии «подрытого» края раны
- 2) со стороны тупого угла наклона клинка
- 3) в области острого конца раны
- 4) со стороны острого угла наклона клинка

**ОЖОГИ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТУЛОВИЩА ПО «ПРАВИЛУ ДЕВЯТОК» СОСТАВЛЯЮТ
ПЛОЩАДЬ, РАВНУЮ (В ПРОЦЕНТАХ)**

- 1) 9
- 2) 18
- 3) 30
- 4) 27

**РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ХВАТАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРАВОЙ КИСТИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) средней тяжести

- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГРИБАМИ И ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ

- 1) головной мозг
- 2) плоские кости
- 3) рвотные массы
- 4) печень

КОЛОТО-РЕЗАНУЮ РАНУ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА, ПРОНИКАЮЩУЮ В КЛЕТЧАТКУ МАЛОГО ТАЗА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

КОЛОТОЕ РАНЕНИЕ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ НА УРОВНЕ 4-5 ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинившее
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ДАВЛЕНИЕ НА ТРУПНОЕ ПЯТНО ЖЕЛАТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ДИНАМОМЕТРА ТРУПНОГО НА ПЛОЩАДИ 1 см^2 В ТЕЧЕНИЕ (В СЕКУНДАХ)

- 1) 9
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 7

ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАНОЕ РАНЕНИЕ ЛЕВОЙ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ С РАССЕЧЕНИЕМ НАРУЖНОЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ЩЕЛОЧЕЙ В ТКАНЯХ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1) коагуляционный некроз
- 2) колликативный некроз
- 3) продуктивное воспаление
- 4) гнойное воспаление

ХАРАКТЕР ПЛАМЕНИ ВЫСТРЕЛА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЗАВИСИТ ОТ

- 1) длины канала ствола
- 2) большой начальной скорости пули
- 3) калибра оружия
- 4) вида пороха

ПРИ ОБЫЧНЫХ КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ ПЯТНА ЛЯРШЕ СТАНОВЯТСЯ ЗАМЕТНЫМИ ЧЕРЕЗ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1) 4-5
- 2) 2-3
- 3) 6-7
- 4) 5-6

ПРИ КРОВОПОТЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 10% ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ РАЗВИВАЕТСЯ ____ ШОК

- 1) инфекционно-токсический
- 2) болевой
- 3) гиповолемический
- 4) травматический

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЭПИДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕЛОВЫХ СИМПТОМОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасный для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

СНИЖЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ОДНОГО ГЛАЗА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ОТ 1,0 (ДО ТРАВМЫ) ДО 0,01 (ПОСЛЕ ТРАВМЫ) КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) утраты профессиональной трудоспособности
- 3) развития угрожающего жизни состояния
- 4) длительности расстройства здоровья

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ РАНЫ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПРОСВЕТ ГЛОТКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ С ФОРМИРОВАНИЕМ РЕЗКО ВЫРАЖЕННОГО ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ К ПОЛОВОМУ СНОШЕНИЮ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ОПРЕДЕЛЯЮТ ШИРИНУ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ, В

- 1) области уретры
- 2) области крайней плоти
- 3) области корня
- 4) средней трети

СТАДИЯ КРАСНОЙ ДИСТРОФИИ ПРИ ГЕПАТОЗЕ РАЗВИВАЕТСЯ К ____ НЕДЕЛИ

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 4

К ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ОБЖИМА ТЕЛА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЗНАКИ _____ АСФИКСИИ

- 1) аспирационной
- 2) обтурационной
- 3) компрессионной
- 4) странгуляционной

ЯДРА БАЗАЛЬНОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВЕ МОГУТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ

- 1) «снежинок»

- 2) «метелок»
- 3) «гирлянд»
- 4) «бус»

ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОВОДИМЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, ИЗЛОЖЕНЫ В ПРИКАЗЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ №

- 1) 782н
- 2) 388н
- 3) 194н
- 4) 346н

СТАДИЯ ПРИЛИВА КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РЕЗКОЙ

- 1) атрофией
- 2) дегидратацией
- 3) гипотрофией
- 4) гиперемией

В СОКЕ ВЕХА ЯДОВИТОГО СОДЕРЖИТСЯ

- 1) цитизин
- 2) скополамин
- 3) цикутотоксин
- 4) гиосциамин

ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ

- 1) наличия костного вещества в смеси зол в случаях криминального сожжения трупа
- 2) последовательности причинения огнестрельных повреждений
- 3) повышенного содержания «металлических» ядов в органах человека
- 4) изменений соотношения концентрации электролитов (калия к натрию и др.) в миокарде

В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПОЛНОГО НАРУШЕНИЯ АНАТОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТИ КОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ

- 1) трещина
- 2) перелом
- 3) отрыв эпифиза
- 4) отрыв апофиза

ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ШЕЙНЫХ С4-С5 ПОЗВОНКОВ С ПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПРИ ПОТЕРЕ СПОСОБНОСТИ ЗАПОМИНАТЬ СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ, ДИАГНОСТИРУЕТСЯ АМНЕЗИЯ

- 1) ретроградная
- 2) диссоциативная
- 3) фиксационная
- 4) антероградная

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ В ПОЛУСОГНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ СВЫШЕ 30%, НЕЗАВИСИМО ОТ ИСХОДА И ОКАЗАНИЯ (НЕОКАЗАНИЯ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТ К ВРЕДУ ЗДОРОВЬЯ

- 1) тяжкому
- 2) лёгкому
- 3) средней тяжести
- 4) опасному для жизни

К ХАРАКТЕРНЫМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ МОНГОЛОИДНОЙ РАСЫ ОТНОСЯТ

- 1) относительно длинные корни при небольшой коронке моляров
- 2) недоразвитие зубов мудрости
- 3) высокие индексы коронки второго и третьего верхних моляров
- 4) «ореховидные вздутия» в области альвеолярного края внутренней поверхности нижней челюсти в месте расположения моляров

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СУПИНАЦИИ И ПРОНАЦИИ В ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ И ЛОКТЕВОМ СУСТАВАХ ОТ 45° ДО 60°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) длительный

ПОЛОВЫМ ВЛЕЧЕНИЕМ ЖЕНЩИНЫ К ЖЕНЩИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) мужеложство
- 2) лесбиянство

- 3) транссексуализм
- 4) гермафродитизм

УЧАСТКОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ЗАМЕЩАЮЩИЙ ДЕФЕКТ КОЖИ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рубец
- 2) невус
- 3) папиллома
- 4) комедон

НАРУШЕНИЯ ЖИРОВОГО ОБМЕНА МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ДИСТРОФИЕЙ

- 1) углеводной
- 2) паренхиматозной
- 3) гиалиново-капельной
- 4) белковой

БЫСТРЕЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ПОСМЕРТНОМУ АУТОЛИЗУ ОРГАНЫ И ТКАНИ

- 1) гиперстеников
- 2) астеников
- 3) нормостеников
- 4) атлетиков

В ОТВЕТ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ В 3 ФАЗУ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1) обратимая агрегация тромбоцитов
- 2) ретракция тромба
- 3) адгезия тромбоцитов
- 4) первичный спазм сосудов

НОЖНИЦЫ КИШЕЧНЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ

- 1) мягких тканей
- 2) внутренних органов и крупных сосудов
- 3) тонкого и толстого кишечника
- 4) протоков и малых сосудов

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТА СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ДОСТАТОЧНО НАЛИЧИЯ _____ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

- 1) 1 остаточного явления
- 2) 2 остаточных явлений
- 3) 3 остаточных явлений
- 4) 4 остаточных явлений

ВСКРЫТИЕ ОРГАНОВ НА МЕСТЕ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ В ТРУПЕ ВЫПОЛНЯЮТ ПРИ АУТОПСИИ ПО МЕТОДУ

- 1) Лютеля

- 2) Киари-Мариша
- 3) Абрикосова
- 4) Вирхова

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕДНИЙ ВЫВИХ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ ЧАСТОТЕ ТОКА (В ГЕРЦАХ)

- 1) 200
- 2) 50
- 3) 100
- 4) 10

КОЛЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) фальшлезвия
- 2) режущей кромки
- 3) острого конца
- 4) П-образного обуха

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОТ ТРУПОВ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗЫМАЮТСЯ В ПРЕДЕЛАХ _____ ЧАСОВ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1) 48
- 2) 24
- 3) 94
- 4) 72

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННЫМ СКЛЕРОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) регенерация
- 2) некроз
- 3) фиброз
- 4) инфаркт

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛОДЫЖЕК ОБЕИХ БЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ПЕРЕЛОМОМ СУСТАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ И РАЗРЫВОМ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА С ПОДВЫВИХОМ И ВЫВИХОМ СТОПЫ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий

- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ОПРЕДЕЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕМУ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА, ПРИНИМАЕТСЯ

- 1) лаборантом
- 2) непосредственно руководителем ГСМЭУ
- 3) медицинским регистратором
- 4) фельдшером

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ГИПОТРОФИЮ МЫШЦ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В КОНЕЧНОСТЯХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

СМЕРТЕЛЬНОЙ ДОЗОЙ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО НАШАТЫРНОГО СПИРТА ЯВЛЯЕТСЯ ДОЗА (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 2-4
- 2) 5-6
- 3) 1-2
- 4) 10-15

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) оружие
- 2) акт проверки
- 3) заключение эксперта
- 4) материалы дела

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ РАСПИЛ ПО

- 1) Свешникову
- 2) Солохину
- 3) Обысову
- 4) Флексигу

РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ГОЛОВЫ, ШЕИ И ИХ ЦИАНОЗ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- 1) баротравмы легких
- 2) обжима водолаза
- 3) синдрома изобарической контрдифузии
- 4) декомпрессионной болезни

К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ВОЗНИКАЮЩИМ У ПАРАШЮТИСТОВ ПРИ НЕУДАЧНОМ ПРИЗЕМЛЕНИИ, ОТНОСЯТ

- 1) винтообразные переломы обеих бедренных костей
- 2) множественные ушибленно-рубленые повреждения
- 3) обширные ожоги различных поверхностей тела
- 4) неполную ампутацию обеих верхних конечностей

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

- 1) прокурором
- 2) судом
- 3) следователем
- 4) экспертом единолично

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ ПОЧКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ГНИЕНИЮ, ХРАНЯТ В

- 1) полиэтиленовых пакетах
- 2) пластиковых контейнерах
- 3) герметически закрытой посуде
- 4) бумажных упаковках

РАЗЛИЧАЮТ _____ СТЕПЕНИ/СТЕПЕНЕЙ ОТМОРОЖЕНИЯ

- 1) три
- 2) четыре
- 3) две
- 4) пять

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В МИНУТАХ)

- 1) 7-8
- 2) 5-6
- 3) 11-12
- 4) 9-10

В СЛУЧАЕ, КОГДА В ПРОЦЕССЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОСМОТРЕНЫ НЕДОСТАТОЧНО ПОДРОБНО, ПРОВОДИТСЯ ____ ОСМОТР

- 1) дополнительный
- 2) повторный
- 3) первоначальный
- 4) подготовительный

ПОЯСОК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО КРАЯМ ВХОДНОГО ПУЛЕВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ОДЕЖДЫ И КОЖИ ОБРАЗУЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1) обтирания боковых поверхностей пули
- 2) действия кончика пули
- 3) придавливания одежды к телу
- 4) химического действия пороховых газов

МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА РЕГЛАМЕНТИРОВАН

- 1) ст. 18 Гражданского процессуального кодекса РФ
- 2) ст. 45 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- 3) ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- 4) ст. 57 Уголовно-процессуального кодекса РФ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ОФОРМЛЯЕТ

- 1) протокол
- 2) заключение эксперта
- 3) справку
- 4) эпикриз

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) отоскоп
- 2) акушерский стетоскоп
- 3) стетофонендоскоп
- 4) офтальмоскоп

ПЕРВОЙ СТАДИЕЙ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЯ

- 1) ретикулярного криза
- 2) восстановления
- 3) гидремическая
- 4) коллапса

МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фекально-оральный

- 2) гемоконтактный
- 3) трансмиссивный
- 4) аэрозольно-аэрогенный

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ПРАВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 30% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ЭЛЕКТРОМЕТКА МОЖЕТ ИМЕТЬ ВИД, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) колликационного некроза
- 2) ушиба мягких тканей
- 3) ушибленной раны
- 4) пергаментного пятна

ЗРЕЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ КАК ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОМЕЩАЮТСЯ ВО ФРИЗЕР ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1) –20
- 2) –10
- 3) –30
- 4) –40

ПРИ ДЕЙСТВИИ ТРАВМИРУЮЩЕЙ СИЛЫ ОБРАЗУЕТСЯ ЛОКАЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ НА _____ ПОВЕРХНОСТИ КЛЮЧИЦЫ

- 1) задней
- 2) концевой
- 3) нижней
- 4) передней

К ЧЕТВЕРТОМУ ПЕРИОДУ ОЖГОВОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- 1) шок
- 2) инфекцию
- 3) токсемию
- 4) ожоговое истощение

ОТКРЫТЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ ВЫВИХ БЕДРА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий

- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ МЫШЕЧНОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) амитриптилином
- 2) морфином
- 3) стрихнином
- 4) фенобарбиталом

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ОБНАРУЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ВИДЕ ОПТИЧЕСКИХ ПРОСВЕТЛЕНИЙ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОТ ЯДРА КАРДИОМИОЦИТОВ ОТНОСИТСЯ К ____ ДИСТРОФИИ

- 1) зернистой
- 2) вакуольной
- 3) углеводной
- 4) жировой

МАССА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)

- 1) 500-550
- 2) 128-150
- 3) 673-700
- 4) 380-390

СОПОСТАВЛЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ОДЕЖДЕ И ТЕЛЕ ПОСТРАДАВШЕГО ПРОВОДЯТ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ

- 1) вида оружия
- 2) соответствия количества повреждений на одежде и теле
- 3) пробивного действия снаряда
- 4) разрывного действия пули

У НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СКЕЛЕТ СОСТОИТ ИЗ ____ КОСТЕЙ

- 1) 240
- 2) 226
- 3) 206
- 4) 300

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ЖИВОТА, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ОСТРОЙ ПЕЧЁНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) опасность для жизни
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) длительное расстройство здоровья

ПРИЧИНОЙ ВНЕЗАПНОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ АСФИКСИИ МОЖЕТ ЯВИТСЯ ОПУХОЛЬ

- 1) пищевода
- 2) трахеи
- 3) щитовидной железы
- 4) средостения

КОЖА В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ПРИ КОНТАКТЕ СО СВИНЦОВЫМ ПРОВОДНИКОМ ПРИОБРЕТАЕТ ОТТЕНОК

- 1) серо-жёлтый
- 2) серо-чёрный
- 3) жёлто-коричневый
- 4) сине-зелёный

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ПЕЧЕНИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ У ТЕННИСИСТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ____ СУСТАВ

- 1) голеностопный
- 2) коленный
- 3) плечевой
- 4) локтевой

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ОТРАВЛЕНИЯ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ

- 1) панцирей диатомей
- 2) кристаллов оксалата кальция
- 3) бронхоспазма
- 4) белковой дистрофии кардиомиоцитов

К ХАРАКТЕРНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ПРИ СМЕРТЕЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗУЮЩИМИ ЯДАМИ ОТНОСЯТ ОБНАРУЖЕНИЕ _____ ЦВЕТА КРОВИ, ТКАНЕЙ, ТРУПНЫХ ПЯТЕН

- 1) карминового
- 2) синюшно-фиолетового
- 3) вишнево-розового
- 4) буровато-коричневого

В ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ ЛЕЖИТ

- 1) реакция преципитации
- 2) реакция агглютинации
- 3) реакция дезаминирования
- 4) ШИК-реакция

ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА ПОВТОРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОВОДИМЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, ИЗЛОЖЕНЫ В ПРИКАЗЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ №

- 1) 388н
- 2) 194н
- 3) 346н
- 4) 782н

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К

- 1) кислородному голоданию
- 2) обжиму тела (водолаза)
- 3) отравлению кислородом
- 4) отравлению углекислым газом

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ДИАФРАГМЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасный для жизни

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) серологический анализ
- 2) изготовление макропрепаратов

- 3) репераж
- 4) установление размеров костей

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ

- 1) гистологии
- 2) баллистике
- 3) фрактологии
- 4) трасологии

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ОРУЖИЯ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) мышечной ткани
- 2) внутренних органов
- 3) на тканях одежды
- 4) связочного аппарата

ПОТЕРЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ У МУЖЧИН, ВЫРАЖАЮЩУЮСЯ В СПОСОБНОСТИ К СОВОКУПЛЕНИЮ ИЛИ ОПЛОДОТВОРЕНИЮ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

К ДОКУМЕНТАМ, СБРОШЮРОВАННЫМ В ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ТОМОВ, НАЧИНАЮЩИХСЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА С ЧЕТКО ПОСТАВЛЕННЫМИ ВОПРОСАМИ, ОТНОСЯТ

- 1) судебно-медицинскую экспертизу трупа
- 2) протокол осмотра места происшествия
- 3) материалы дела
- 4) судебно-медицинское исследование трупа

В СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕЖУРНЫХ (ОПЕРАТИВНЫХ) ЭКСПЕРТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И БРИГАД ВХОДИТ

- 1) муляж скелета человека
- 2) набор слесарных инструментов
- 3) чемодан-укладка врача – судебно-медицинского эксперта
- 4) манекен портняжного

ПРИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ УДАРОМ ПО ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, КРОВОИЗЛИЯНИЯ НЕОБХОДИМО ИСКАТЬ В ОБЛАСТИ _____ СИНУСА

- 1) каротидного
- 2) коронарного

- 3) сигмовидного
- 4) нижнего сагиттального

ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ В СТАДИЮ СЕРОГО ОПЕЧЕНЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ И ПРИОБРЕТАЮТ ____ ОКРАСКУ

- 1) буро-коричневую
- 2) темно-красную
- 3) бело-розовую
- 4) черную

СДАВЛЕНИЕ ОРГАНОВ ШЕИ ТВЁРДЫМ ТУПЫМ ПРЕДМЕТОМ ОТНОСИТСЯ К _____ АСФИКСИИ

- 1) обтурационной
- 2) странгуляционной
- 3) медленной компрессионной
- 4) быстрой компрессионной

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) рентгенфлюоресценции
- 2) фотометрии
- 3) микрокристаллоскопических реакций
- 4) эмиссионного спектрального анализа

ПЕРЕСТРОЙКОЙ КОСТНОЙ СТРУКТУРЫ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЧИСЛА КОСТНЫХ БАЛОК, ИХ УТОЛЩЕНИЕМ, ДЕФОРМАЦИЕЙ И УМЕНЬШЕНИЕМ КОСТНО-МОЗГОВЫХ ПОЛОСТЕЙ ВПЛОТЬ ДО ИХ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) остеосклероз
- 2) остеопороз
- 3) остеохондроз
- 4) остеодистрофия

ПРИЧИНОЙ ОСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ ПРИ СМЕРТИ ОТ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) обтурация дыхательных путей
- 2) угнетение дыхательного центра
- 3) гиповентиляция ствола мозга
- 4) сдавление продолговатого мозга

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА ПО ТИПУ "БАБОЧКИ" КВАЛИФИЦИРУЮТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный\

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДЪЯЗЫЧНОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

ПОВРЕЖДЕНИЕ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, У ДЕТЕЙ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинившее
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ЭТИЛОВЫМ АЛКОГОЛЕМ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ КОМОЙ II СТЕПЕНИ, ПО ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) причинившее лёгкий
- 2) причинившее тяжкий
- 3) не причинившее
- 4) причинившее средней тяжести

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ МИЗИНЦА С V ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ КОСТНОГО ВЕЩЕСТВА ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ В ВИДЕ ЖЕМЧУЖНЫХ БУС СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ДЕЙСТВИИ НА ТЕЛО

- 1) повышенного атмосферного давления
- 2) ионизирующего излучения
- 3) электрического тока
- 4) ультрафиолетового излучения

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ЦИАНИДАМИ СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ _____ ЦВЕТА ТРУПНЫХ ПЯТЕН

- 1) вишневого
- 2) синюшно-фиолетового

- 3) алого
- 4) буро-коричневого

ВЫВИХ ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

РАСШИРЕНИЕ ВСТАВОЧНЫХ ДИСКОВ ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО РАЗЪЕДИНЕНИЯ СМЕЖНЫХ ВОЛОКОН ЯВЛЯЕТСЯ _____ КАРДИОМИОЦИТОВ

- 1) зернистым распадом
- 2) миоцитолизисом
- 3) глыбчатым распадом
- 4) диссоциацией

ОДЕЖДУ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ И ДРУГИМИ СЛЕДАМИ ДЛЯ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕОБХОДИМО

- 1) промыть под водой
- 2) высушить при комнатной температуре
- 3) упаковать в полиэтиленовый пакет
- 4) выдержать в консервирующем растворе

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ БЫВАЮТ

- 1) закрытые
- 2) многооскольчатые
- 3) открытые
- 4) приобретенные

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О

- 1) выводах эксперта
- 2) наличии упаковки прилагаемых материалов исследования
- 3) обстоятельствах дела
- 4) результатах лабораторных исследований

ДЕМАРКАЦИОННОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ВОКРУГ ПУПОЧНОГО КОЛЬЦА НОВОРОЖДЕННОГО ОБРАЗУЕТСЯ К КОНЦУ (В СУТКАХ)

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 7
- 4) 4

ПОДДЕРЖАНИЕ БОЛЕЗНЕННОГО ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКИМ РАЗДРАЖЕНИЕМ РАН

МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК ____ БОЛЕЗНИ

- 1) неврологические
- 2) притворные
- 3) искусственные
- 4) инфекционные

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗА СОБОЙ РЕЗКОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ГРУДИ И ЖИВОТА III-IV СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 10% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ РЕЗКО ВЫРАЖЕННУЮ КОНТРАКТУРУ ЛЕВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (СГИБАНИЕ ? 0?-15? И РАЗГИБАНИЕ ? 0?-15?), РАВНУЮ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ПИЩЕВОД НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ВСКРЫВАЮТ

- 1) мозговым ножом
- 2) скальпелем брюшистым большим
- 3) ампутационным большим ножом
- 4) анатомическими кишечными ножницами

ЖИРЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНЫХ, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НИЛЬСКОЙ

ГОЛУБОЙ ПРИОБРЕТАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ЦВЕТ

- 1) красный
- 2) голубой
- 3) черный
- 4) фиолетовый

ПРИ НАРУШЕНИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЗАПАХОВ РАЗВИВАЕТСЯ АГНОЗИЯ

- 1) обонятельная
- 2) зрительная
- 3) акустическая
- 4) сенсорная

ЛЕГОЧНАЯ ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПРОБА МОЖЕТ БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПРИ

- 1) гемолитической болезни
- 2) гнилостной трансформации трупа
- 3) замерзании трупа младенца
- 4) внутриутробном обвитии пуповины

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ СЕЛЕЗЕНКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

ЗРАЧКОВАЯ ПЕРЕПОНКА ИСЧЕЗАЕТ В СРЕДНЕМ НА _____ МЕСЯЦЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ЖИЗНИ

- 1) 6
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 8

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БРОНХОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ЖИДКОСТЬ ИЗ ПАЗУХИ ОСНОВНОЙ КОСТИ, НЕВСКРЫТУЮ ПОЧКУ ЛИБО КОСТНЫЙ МОЗГ БЕДРЕННОЙ ИЛИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТЕЙ ИЗЫМАЮТ ПРИ

- 1) утоплении
- 2) повешении
- 3) скоропостижной смерти

4) краш-синдроме

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РАЗРУБА КОСТИ И ХРЯЩА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛЕДОВОСПРИНИМАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА ИССЛЕДОВАНИЕ РУБЯЩИМ ОРУДИЕМ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ

- 1) групповые свойства рубящего орудия
- 2) конкретный экземпляр рубящего орудия
- 3) причину смерти
- 4) степень тяжести вреда здоровью

ОБ УТОПЛЕНИИ В ВОДЕ ПО АСПИРАЦИОННОМУ ТИПУ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1) большое количество воды в лёгких
- 2) мацерация кожи кистей и стоп
- 3) отсутствие воды в трахее и лёгких
- 4) резкий спазм голосовой щели

ОСНОВНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ (ЗАБОЛЕВАНИЕМ), ПРИВЕДШИМ К СМЕРТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ ЧЕРЕЗ СВОИ ОСЛОЖНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сопутствующая патология
- 2) конкурирующая патология
- 3) генеза смерти
- 4) причина смерти

ТЕПЛОВОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ ФОРМИРУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) действия высокой температуры
- 2) общего перегревания организма
- 3) наступления смерти в горячей воде
- 4) прямого воздействия солнечных лучей

К ОТОЖДЕСТВЛЯЮЩИМ ОБЪЕКТАМ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ТРАСОЛОГИИ ОТНОСЯТ

- 1) кусочки внутренних органов
- 2) биологические жидкости
- 3) следы-наложения на теле человека
- 4) микрочастицы на поврежденных тканях

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОБЫ БРЕСЛАУ НЕОБХОДИМО НАЛОЖИТЬ ЛИГАТУРЫ НА ВХОД И ВЫХОД ИЗ

- 1) желудка
- 2) пищевода
- 3) мочевого пузыря
- 4) желчного пузыря

ЛЕГОЧНАЯ ТКАНЬ ПРИ ГАНГРЕНЕ ИМЕЕТ ЗАПАХ

- 1) чеснока
- 2) зловонный
- 3) сушеных грибов
- 4) прелых яблок

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ОТРАВЛЕНИЯ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ НАСТУПАЕТ, КАК ПРАВИЛО, ОТ ОСТРОЙ _____ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- 1) печеночной
- 2) полиорганной
- 3) сердечно-сосудистой
- 4) почечной

ПРИ ОСТРОМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ НЕФРИТЕ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ НЕФРИТ

- 1) склерозирующий
- 2) лейкоцитарный
- 3) эритроцитарный
- 4) эозинофильный

ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА СИЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

АНТЕНАТАЛЬНАЯ СМЕРТЬ ПЛОДА НАСТУПАЕТ

- 1) сразу после родов
- 2) в первую неделю после родов
- 3) во время родов
- 4) до начала родов

ДВУХМОМЕНТНЫЕ РАЗРЫВЫ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ВОЗНИКАЮТ

- 1) только при повторных воздействиях тупого твердого предмета на область передней брюшной стенки
- 2) тотчас после многократных ударных воздействий тупым твердым предметом в область передней брюшной стенки
- 3) в отдаленные сроки после момента причинения травматического воздействия в область передней брюшной стенки
- 4) тотчас при однократном ударном воздействии тупого твердого предмета в область передней брюшной стенки

ДЛЯ «МОЗГОВОЙ» СМЕРТИ ЗНАЧИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) высокого содержания фибрина в экссудате
- 2) тяжелых изменений магнитоцитов гигантоклеточного ядра ствола
- 3) повреждений эндотелия сосудов
- 4) тромбоза сосудов

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней степени тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

СМЕРТЬ ОТ СДАВЛЕНИЯ ГРУДИ И ЖИВОТА ОТНОСИТСЯ К АСФИКСИИ

- 1) компрессионной
- 2) странгуляционной
- 3) обтурационной
- 4) аспирационной

СМЕРТЬ ПЛОДА ПОСЛЕ 20, НО РАНЕЕ 28 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ СЧИТАЮТ

- 1) отсроченной
- 2) ранней
- 3) поздней
- 4) промежуточной

ПРОБА В.А. ТАРАНУХИНА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ

- 1) зрелости
- 2) недоношенности
- 3) минимального количества воздуха в легких
- 4) жизнеспособности

БОЛТАЮЩИЙСЯ ПРАВЫЙ ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМОВ ХРЯЩЕВЫХ КОЛЕЦ ТРАХЕИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни

- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ МИЗИНЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) средней тяжести

ПЕРЕЛОМ ДУГИ ОДНОГО ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКА С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней степени тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ОТ ВЗРЫВНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лучевая травма
- 2) акустическая травма
- 3) тканевая гипоксия
- 4) газовая эмболия

ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ТЕЛА ПОЗВОНКА Th₅ С РАЗВИТИЕМ ДВУСТОРОННЕГО НИЖНЕГО ПАРАПАРЕЗА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

НАЛИЧИЕ СРЕДЫ УТОПЛЕНИЯ В ПАЗУХЕ КЛИНОВИДНОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) Фабрикантова
- 2) Крушевского
- 3) Быстрова
- 4) Свешникова

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СВЕДЕНИЯ О

- 1) проведении секционного исследования
- 2) патологических изменениях внутренних органов
- 3) времени прибытия следователя
- 4) ректальной температуре

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ПРИВЕДШУЮ К РЕЗЕКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

«ЭЛЕКТРОГЕННАЯ» АСФИКСИЯ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ВСЛЕДСТВИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) торможения сосудодвигательного центра
- 2) расслабления дыхательной мускулатуры
- 3) клонических судорог дыхательной мускулатуры
- 4) возбуждения дыхательного центра

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) однослойного призматического эпителия собирательной трубочки
- 2) воспалительных изменений
- 3) мезангиальных клеток почечного тельца
- 4) кубического эпителия дистального извитого канальца

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ АЦЕТОНОМ КРОВЬ ИМЕЕТ, КАК ПРАВИЛО, ВИД

- 1) рыхлых белых свертков
- 2) «хлопьев»
- 3) темно-красных свертков
- 4) «дегтеобразный»

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ЭТАНОЛОМ ОТ ТРУПА БЕРУТ

- 1) глотку, трахею
- 2) плоские кости, селезенку
- 3) волосы, ногти
- 4) кровь, мочу

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней степени тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

ГЕПАТИТ «D» МОЖЕТ РЕПЛИЦИРОВАТЬСЯ В ОРГАНИЗМЕ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ

- 1) туберкулеза

- 2) СПИД
- 3) гепатита В
- 4) ВИЧ-инфекции

ТРУПНЫЕ ПЯТНА ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В СРЕДНЕМ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ _____ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1) 10 часов
- 2) 6 часов
- 3) 2 часа
- 4) 8 часов

ВОЛОСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЫМАЮТ

- 1) ножом
- 2) скальпелем
- 3) пальцами
- 4) ножницами

К ПРИЗНАКАМ ПРИЖИЗНЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В АТМОСФЕРЕ ПОЖАРА НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА, ОТНОСЯТ

- 1) ожоги дыхательных путей
- 2) снижение концентрации гликогена
- 3) позу «калачиком»
- 4) позу «боксера»

ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ КЛИНИЧЕСКИ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА

- 1) 2 фазы (периода)
- 2) 5 фаз (периода)
- 3) 3 фазы (периода)
- 4) 4 фазы (периода)

ТИОФОС ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ НАКАПЛИВАТЬСЯ В

- 1) костном мозге
- 2) легких
- 3) селезенке
- 4) слюнных железах

РОДОВАЯ ОПУХОЛЬ ОБЫЧНО РАССАСЫВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В ДНЯХ)

- 1) 12-14
- 2) 5-7
- 3) 2-3
- 4) 8-10

ОДИНОЧНУЮ РАНУ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПОЛОСТЬ ПЕРИКАРДА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий

- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ С ПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

МЕРИДИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМОВ СВОДА И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ПРИ СДАВЛЕНИИ ГОЛОВЫ В ПЕРЕДНЕ-ЗАДНЕМ НАПРАВЛЕНИИ РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1) циркулярно
- 2) поперечно
- 3) продольно
- 4) диагонально

ПЕРВИЧНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) асистолией желудочков
- 2) прекращением передачи процессов возбуждения
- 3) уменьшением объема циркулирующей крови
- 4) пароксизмальной желудочковой тахикардией

К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 3 СТЕПЕНИ ОТНОСЯТ

- 1) обугливание костей
- 2) некроз кожи
- 3) образование пузырей
- 4) гиперемию кожи

ОБНАРУЖЕНИЕ ВОЛОС НА ГОЛОВКЕ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ДЛИНОЙ ОКОЛО 2-3 САНТИМЕТРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ

- 1) зрелости
- 2) жизнеспособности
- 3) живорожденности
- 4) новорожденности

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ БОЛТАЮЩИЙСЯ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗЕКЦИИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МИКОЗЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1) образцы буккального эпителия
- 2) слюну
- 3) гнойное содержимое
- 4) волосы

РАЗРЫВ ОПЕРИРОВАННОЙ В ПРОШЛОМ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УДАРА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) не причинившее

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ РЕЗКОЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ДВУСТОРОННИЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР С НАРУШЕНИЕМ АНАТОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТИ КАРКАСА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ТРУПНОМУ ВЫСЫХАНИЮ ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) жевательные мышцы
- 2) мышцы шеи
- 3) ушные раковины
- 4) кончики пальцев

К НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСЯТ

- 1) сулиндак
- 2) пропанол
- 3) этанол
- 4) морфин

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ

ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

К НАРУЖНЫМ ПРИЗНАКАМ НОВОРОЖДЕННОСТИ ОТНОСЯТ

- 1) сыровидную смазку в естественных складках кожи тела
- 2) пушковые волосы в области плеч
- 3) упругость хрящей носа
- 4) расположение яичек в мошонке

ТУПУЮ ТРАВМУ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) лёгкий

ПРИ БЫСТРОМ ТЕМПЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОБНАРУЖИВАЮТ ТРУПНЫЕ ПЯТНА _____ ЦВЕТА

- 1) коричневого
- 2) красного
- 3) тёмно-фиолетового
- 4) серо-коричневого

ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД ПРИ ЛУЧЕВОМ ПОРАЖЕНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) клинической стабилизацией
- 2) нарастающим лейкоцитозом
- 3) активизацией костного мозга
- 4) множественными тромбозами

СМЕРТЕЛЬНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ДОЗА ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ПРИЕМЕ ТРИХЛОРЭТИЛЕНА СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 100
- 2) 50
- 3) 350
- 4) 400

ВОЗБУЖДЕНИЕ М-ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) расширением зрачков
- 2) тахикардией
- 3) понижением секреции слюнных и потовых желез
- 4) гиперсекрецией слюнных и потовых желез

ВТОРАЯ ЗОНА БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ЗОНОЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- 1) действия пороховых газов
- 2) действия пламени выстрела
- 3) отложения пороха
- 4) отложения копоти

ПРИЛАГАЕМЫЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА, ПРИНИМАЮТСЯ В ____ ВИДЕ

- 1) опечатанном
- 2) изолированном
- 3) развернутом
- 4) разложенном

К ИЗМЕНЕНИЯМ ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ОПЬЯНЕНИИ ОТНОСЯТ

- 1) тремор век
- 2) инъектированность склер
- 3) демонстративные реакции
- 4) эмоциональную неустойчивость

ОБРАЗОВАНИЕ СГИБАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СВЯЗАНО С

- 1) уменьшением выпуклости нижнечелюстной дуги
- 2) окклюзионным взаимоотношением зубных рядов
- 3) увеличением выпуклости нижнечелюстной дуги
- 4) тягой мышц костных фрагментов

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ СЛЕПОГО ГЛАЗА, УСТАНОВЛИВАЕМЫМ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ЭКСПЕРТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) неизгладимое обезображивание
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительность расстройства здоровья
- 4) опасность для жизни

ТУПАЯ ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ГНОЙНЫМ ПЛЕВРИТОМ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившая
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ТРАВМУ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) средней тяжести

- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

ПРИ НАГНОЕНИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ОБЛАСТИ ЛИЦА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДИТ НА СИНУСЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧАЩЕ ПО

- 1) лицевой артерии
- 2) поперечной артерии лица
- 3) поперечной вене
- 4) анастомозам лицевых вен

КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА БАЗИОН РАСПОЛОЖЕНА

- 1) в месте схождения стреловидного и венечного швов
- 2) в месте схождения стреловидного и затылочного швов
- 3) на середине переднего края большого затылочного отверстия
- 4) на середине заднего края большого затылочного отверстия

В СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ГНИЕНИЕ ПРОТЕКАЕТ НЕЗАМЕТНО И НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

- 1) 12-16
- 2) 1-2
- 3) 3-4
- 4) 8-10

ИЗУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЛИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЕТЕНЦИЕЙ СУДЕБНОЙ

- 1) медицины
- 2) баллистики
- 3) трасологии
- 4) психологии

К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ АТРЕЗИИ ВАГИНЫ ОТНОСЯТ

- 1) аменорею
- 2) дисменорею
- 3) инфекции органов малого таза
- 4) гормональные нарушения

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ КОЛОТОГО РАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) массивное наружное кровотечение
- 2) наличие тканевых перемычек
- 3) кольцевидное осаднение краёв раны
- 4) преобладание длины раны над глубиной

ПЕРЕЛОМ ВИСОЧНОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПЕРЕЛОМЕ ДУГИ I ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА - ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ НИСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ АОРТЫ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПЕРВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ЭКСПЕРТНОГО ДОКУМЕНТА ВЫДАЕТСЯ

- 1) адвокату
- 2) главному врачу лечебного учреждения
- 3) органу или лицу, назначившему экспертизу
- 4) руководителю Департамента здравоохранения

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ ЕГО РАЗГИБАНИИ - 10°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) угрожающий жизни

В СЛУЧАЕ, КОГДА ПОДЭКСПЕРТНЫЙ ЗАБЫВАЕТ ФАКТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ПРИ СОХРАНЕНИИ ПАМЯТИ НА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, РАЗВИВАЕТСЯ АМНЕЗИЯ

- 1) антероградная

- 2) диссоциативная
- 3) ретроградная
- 4) фиксационная

ПЕРЕЛОМ ТЕЛА ОДНОГО ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКА С РАЗВИТИЕМ «СИНДРОМА КОНСКОГО ХВОСТА» КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ОПИАТОВ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гиперкератозом
- 2) гипергидрозом
- 3) ожирением
- 4) резким падением массы тела

МАЗКИ-ОТПЕЧАТКИ ОРГАНОВ НАПРАВЛЯЮТ НА ____ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1) биохимическое
- 2) медико-криминалистическое
- 3) бактериологическое
- 4) судебно-химическое

О ВЫСТРЕЛЕ С БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ЧЕРЕЗ ПРЕГРАДУ, КАК ПРАВИЛО, СУДЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1) отложению копоти на преграде
- 2) крестообразной форме входной раны
- 3) форме раневого канала
- 4) штанцмарке

ВТОРАЯ ЗОНА БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ЗОНОЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- 1) действия предпулевого воздуха
- 2) отложения копоти, пороховых зерен, металлических частиц
- 3) действия пламени выстрела
- 4) действия пороховых газов

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ МАТКИ, ПОЛУЧЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ МОТОЦИКЛЕТНОЙ ТРАВМЫ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

СТИРАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБОВ К 40 ГОДАМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) обнажением дентина резцов, стиранием бугров жевательных зубов
- 2) резким снижением высоты резцов до половины своей высоты, выравниванием выраженной стертости жевательных зубов
- 3) углублением центрального отдела жевательных зубов, выравниванием поверхности жевательных зубов
- 4) уменьшением высоты резцов за счет их стирания, обнажением дентина жевательных зубов

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ РАНЫ ГРУДИ (БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ПРИ ОСТРОМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ НЕФРИТЕ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ НЕФРИТ

- 1) нисходящий
- 2) лимфогистиоцитарный
- 3) склерозирующий
- 4) восходящий

ПОЛНАЯ УТРАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

ОБРАЗОВАНИЕ ССАДИНЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИМСЯ ГЛУБЖЕ

- 1) рогового слоя эпидермиса
- 2) подкожно-жировой клетчатки
- 3) базального слоя эпидермиса
- 4) сосочкового слоя дермы

ВОЗБУЖДЕНИЕ М-ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тахикардией
- 2) гипосекрецией слюнных желез
- 3) миозом
- 4) мидриазом

ПРИЗНАКОМ НОВОРОЖДЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бочкообразная грудная клетка

- 2) родовая опухоль
- 3) незаращение овального отверстия
- 4) масса тела не менее 2500 г

ПОВОДОМ ДЛЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) определение факта побоев
- 2) установление истязания
- 3) определение обезображения лица
- 4) подозрение на притворные болезни

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ ДАННЫЕ О

- 1) допросах понятых
- 2) течении патологического процесса
- 3) осмотре места происшествия
- 4) допросах свидетелей

К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ТОКУ, НАИБОЛЕЕ ОПАСНОМУ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСИТСЯ ____ ТОК

- 1) постоянный
- 2) синусоидальный
- 3) переменный
- 4) квазистационарный

МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ ВЫДАЮТ ПОД РОСПИСЬ

- 1) страховому агенту
- 2) лаборанту
- 3) врачу
- 4) органу или лицу, назначившему экспертизу

К ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТАМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЯ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ОТНОСЯТ

- 1) клитор
- 2) промежность
- 3) молочные железы
- 4) девственную плеву

РАЗРЕЗЫ БОЛЬШИХ ПОЯСНИЧНЫХ И ПОДВЗДОШНЫХ МЫШЦ ПРОИЗВОДЯТ ПО МЕТОДУ

- 1) Рихтера – Сунцова
- 2) Лешке
- 3) Солохина

4) Фишера

ОЖОГИ ОТ ПЛАМЕНИ, ОСЛОЖНИВШИЕСЯ ОЖГОВЫМ ШОКОМ IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

СМЕРТЬ ОТ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ОПИАТАМИ ОБЫЧНО НАСТУПАЕТ ОТ

- 1) пареза сосудов
- 2) ортостатического коллапса
- 3) блокировки блуждающего нерва
- 4) угнетения дыхательного центра

ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ТРУПА СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ) В ЧАС

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 3

ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖИВОТА СО СЛЕДОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЯ РУКОЯТКИ ДЛИНА КЛИНКА НОЖА ОБЫЧНО

- 1) длиннее раневого канала
- 2) короче раневого канала
- 3) рассчитывается по формуле
- 4) соответствует раневому каналу

РУБЛЕНАЯ ПРОВОЛОКА ЯВЛЯЕТСЯ СНАРЯДОМ

- 1) специальным
- 2) искусственным
- 3) вторичным
- 4) атипичным

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «С»

СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1) 2
- 2) 26
- 3) 1
- 4) 6

ДЛЯ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ФЛЮОРЕСЦИРУЮЩИХ АНТИТЕЛ МАЗКИ-ОТПЕЧАТКИ СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТРАХЕИ, БРОНХОВ И С ПОВЕРХНОСТИ РАЗРЕЗОВ ЛЕГКИХ ФИКСИРУЮТ В ЭТАНОЛЕ 96%, ОХЛАЖДЕННОМ ДО (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1) +10
- 2) +15
- 3) +8
- 4) +4

ЧАСТЬЮ ОТЪЕДИНИВШЕГОСЯ КОНЦЕВОГО ОТДЕЛА КОСТИ (ДИСТАЛЬНОГО ИЛИ ПРОКСИМАЛЬНОГО) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трещина
- 2) фрагмент
- 3) отломок
- 4) осколок

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) угрожающий жизни

ПРИ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ВЫПОЛНЯЕТ

- 1) любой судебно-медицинский эксперт
- 2) судебно-медицинский эксперт того же пола
- 3) судебно-медицинский эксперт противоположного пола
- 4) судебно-медицинский эксперт только с высшей квалификационной категорией

АСПЕРМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ

- 1) атрофии канальцев яичек
- 2) анорхизма
- 3) агенезии
- 4) монорхизма

ДЛИНА ПУПОВИНЫ У ЖИВОГО ДОНОШЕННОГО И ЗРЕЛОГО МЛАДЕНЦА В СРЕДНЕМ

СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 65
- 2) 50
- 3) 25
- 4) 30

КАК ПРАВИЛО, СМЕРТЬ ПОСТРАДАВШЕГО НАСТУПАЕТ, ЕСЛИ СОДЕРЖАНИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ПРЕВЫШАЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 20
- 2) 10
- 3) 60
- 4) 15

ХЛОРЗАМЕЩЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ ОБЛАДАЮТ СПОСОБНОСТЬЮ

- 1) стабилизировать цитохромоксидазу
- 2) разрушать строю эритроцитов
- 3) блокировать сульфгидридные группировки ферментов
- 4) ингибировать цитохром

СТАДИЕЙ МОРФОГЕНЕЗА АТЕРОСКЛЕРОЗА, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОЧАГОВОЙ ИНФИЛЬТРАЦИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ АРТЕРИЙ ХОЛЕСТЕРИНОМ, БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ И КСАНТОМНЫМИ КЛЕТКАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЯ

- 1) липоидоза
- 2) липосклероза
- 3) осложненных поражений
- 4) атероматоза

К ПРИЗНАКАМ ВЗРЫВНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ОТНОСЯТ

- 1) жировую эмболию
- 2) субарахноидальные кровоизлияния
- 3) отчленение конечностей
- 4) множественные экхимозы на коже лица

ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ____ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1) судебно-химические
- 2) баллистические
- 3) биологические
- 4) физико-технические

СОЕДИНЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ С СЕРОВОДОРОДОМ ГНИЛОСТНЫХ ГАЗОВ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ

- 1) сульфгемоглобина
- 2) метгемоглобина
- 3) карбоксигемоглобина

4) солянокислого гематина

СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛЕВОГО ПЛЕЧА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

К СТАДИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙСЯ ДЛЯ МУЖЧИН СПОСОБНОСТЬЮ К ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ И ОПЛОДОТВОРЕНИЮ, ОТНОСЯТ

- 1) эмоциональное состояние
- 2) взросление
- 3) половую зрелость
- 4) физическое здоровье

НАПРАВЛЕНИЕ ТРАВМИРУЮЩЕГО ДВИЖЕНИЯ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО

- 1) количеству раневых каналов
- 2) форме концов раны
- 3) направлению раневого канала
- 4) следам крови вокруг раны

ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ПРИЧИНЁННЫЙ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОСКОЛОЧНЫМ РАНЕНИЕМ БЕДРА С ОТРЫВОМ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ, ОСЛОЖНИВШИМСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, ОЦЕНИВАЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ОБНАРУЖЕНИЕ В ПРОСВЕТЕ КРУПНЫХ СОСУДОВ РЫХЛЫХ КРАСНЫХ СВЕРТКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1) длительной агонии
- 2) коротком агональном периоде
- 3) смерти от сепсиса
- 4) смерти без агонального периода

ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ: АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

К ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ БАРОТРАВМЫ ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) поражения ацинусов легких
- 2) разрывы в области терминальных отделов бронхиального дерева
- 3) интерстициальное воспаление сосудистой стенки альвеол
- 4) фиброз интерстициальной ткани

К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ, ВЕДУЩЕМУ К ОЧАГОВОМУ УПЛОТНЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ В СВЯЗИ С ИЗБЫТОЧНЫМ РАЗРАСТАНИЕМ ЗРЕЛОЙ ПЛОТНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТ

- 1) некроз
- 2) склероз
- 3) регенерация
- 4) инфаркт

К СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ ОТНОСЯТ АСФИКСИЮ ОТ

- 1) закрытия отверстий рта и носа
- 2) сдавления груди и живота
- 3) удушения петлей
- 4) закрытия просвета дыхательных путей

НЕПРЕМЕННЫМ УСЛОВИЕМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУБЛЕННОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) удар обухом топора
- 2) протягивание острого края по повреждаемой поверхности тела
- 3) прямой или близкий к нему удар лезвийной частью топора по поверхности тела
- 4) сдавление «лопастью» повреждаемой части тела

УШИБ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С НАРУШЕНИЕМ ЕГО ФУНКЦИИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасный для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ДЛИНА ПУПОВИНЫ У ПЛОДА К 7 ЛУННОМУ МЕСЯЦУ РАВНА (В СМ)

- 1) 30
- 2) 35
- 3) 50
- 4) 42

К МЕСТНОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ ОРГАНИЗМА ПРИ ДЕЙСТВИИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТНОСЯТ

- 1) холодную водную среду
- 2) контакт с сильно охлажденным предметом
- 3) затруднение кровообращения
- 4) повышенную влажность воздуха

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВЫХ ЛОКТЕВОМ И ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВАХ, РАВНОЕ 35% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА С III ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающий жизни
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

РАССТОЯНИЕ ОТ ПУПКА ДО ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 17,2-17,3
- 2) 9-10
- 3) 6,7-6,8
- 4) 12-13

РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 40% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающий жизни
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) тяжкий

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СЖАТИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ РЕБРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ОТ ДЕФОРМАЦИИ ИЗГИБА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) ровными, хорошо сопоставимыми краями переломов
- 2) неровными, с выкрашиванием, плотно не сопоставляющимися краями переломов

- 3) одинарной линией перелома
- 4) отвесной плоскостью перелома

ПРЕПАРАТ КОЖИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ СОХРАНЯТЬ В

- 1) высушенном виде
- 2) растворе спирта
- 3) полимерном пакете
- 4) растворе формалина

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НАДПОЧЕЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

ДОНОШЕННОСТЬ МЛАДЕНЦА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) отсутствием грубых пороков развития
- 2) сроком беременности матери на момент рождения плода
- 3) способностью продолжить жить вне организма матери
- 4) сроком нахождения плода в организме матери

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ БЕДРА НА УРОВНЕ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) легкий

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ОТМЕЧАЮТ

- 1) правильность развития наружных половых органов
- 2) признаки возможной профессиональной принадлежности
- 3) наличие следов термического воздействия
- 4) увеличение размеров живота

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ОЖОГОВОГО ШОКА IV СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) опасность для жизни
- 4) угрожающее жизни состояние

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ УМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ЩЕЛЕВИДНАЯ ФОРМА ЗРАЧКА ПРИ СДАВЛЕНИИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА С БОКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) Белоглазова
- 2) Шавиньи
- 3) Икара
- 4) Райского

ВНУТРИУТРОБНЫЙ ВОЗРАСТ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ПО МАССЕ

- 1) пищевода
- 2) мочеочника
- 3) червеобразного отростка
- 4) сердца

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МОЛНИЕНОСНУЮ ФОРМУ ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА НА ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ КРОВЬ ИЗ

- 1) полости левого желудочка сердца
- 2) периферических сосудов
- 3) нижней полой вены
- 4) сосудов головного мозга

БОЛТАЮЩИЙСЯ ЛЕВЫЙ ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ, СФОРМИРОВАВШИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 50%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) легкий

ЭКЗОГЕННОЕ ИЛИ ЭНДОГЕННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ МИКОБАКТЕРИЙ В РАНЕЕ НЕПОВРЕЖДЕННУЮ ЛЕГОЧНУЮ ДОЛЬКУ ЯВЛЯЕТСЯ ОЧАГОМ

- 1) Гона
- 2) Абрикосова
- 3) Манту
- 4) Коха

ОТКРЫТЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ПРИЗНАКОМ ЗРЕЛОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) плацента, массой не менее 400 грамм
- 2) выступание ногтей за край ногтевых фаланг
- 3) наличие пушковых волос на всем теле
- 4) положительная плавательная проба

УШИБЛЕННАЯ РАНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) ровных краев
- 2) неповрежденных луковиц волос
- 3) неровных, осадненных краев
- 4) неосадненных краев

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ ОБЕИХ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ III-IV СТЕПЕНИ, СОСТАВИВШИЙ 18% ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

РАНУ ЖИВОТА, ПРОНИКАЮЩУЮ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ САПЕНИФИКАЦИИ НА ТРУПАХ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТМЕЧАЮТСЯ ЧЕРЕЗ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1) 5-6
- 2) 10-12
- 3) 1-2
- 4) 3-4

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ КОНТРАКТУРЫ ПРАВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА, РАВНОЕ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ К ПОТЕРПЕВШЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) развратными действиями
- 2) насильственными действиями сексуального характера
- 3) изнасилованием
- 4) понуждением к действиям сексуального характера

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНОЙ ЖИЗНИ ПЛОДА ПРИ ЕГО ВОЗРАСТЕ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТОД, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ

- 1) Бальтазаром и Дервьё
- 2) Диллоном Я.Г. и Бреслау Б.
- 3) Галеном К. и Раутером К.
- 4) Дементьевой Г.М. и Короткой Е.В.

ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ВАЗИНОЙ И.Р. В ПРЕДЕЛАХ 0,5-1,0 СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ

- 1) воздушной эмболии
- 2) обильной кровопотери
- 3) перитонита
- 4) шока

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) заявления пострадавшего
- 2) направления следователя
- 3) ходатайства адвоката
- 4) определения суда

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЛЕВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 35% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

ОДИНОЧНАЯ НЕПРОНИКАЮЩАЯ КОЛОТО-РЕЗАНАЯ РАНА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ

ЖИВОТА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ФЛЕГМОНОЙ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившая
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ СФОРМИРОВАННАЯ КУЛЬТА СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 5% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ ЕГО РАЗГИБАНИИ ОТ 0° ДО 5°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДОСТАВЛЯЮТ

- 1) специальную литературу
- 2) вещественные доказательства, в том числе биологического происхождения
- 3) живых лиц
- 4) трупы

К ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ ОПУХОЛЯМ ПОЧЕК ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) почечно-клеточный рак
- 2) переходную папиллomu
- 3) переходноклеточный рак лоханки
- 4) плоскоклеточный рак лоханки

ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ОБЩЕЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЕ ОБЛУЧЕНИЯ (В ГРЕЯХ)

- 1) 3-6
- 2) 12-20
- 3) 1-2
- 4) 4-10

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ АВИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) определение групповой принадлежности крови
- 2) установление положения тел членов экипажа в момент авиакатастрофы
- 3) выявление токсических веществ в крови пострадавших
- 4) установление половой принадлежности

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ

- 1) реквизиты следователя
- 2) паспортные данные руководителя ГСМЭУ
- 3) реквизиты ГСМЭУ
- 4) персональные данные эксперта

ОБ УТОПЛЕНИИ В ПРЕСНОЙ ВОДЕ ПО АСПИРАЦИОННОМУ ТИПУ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ НАЛИЧИЕ

- 1) мацерации кожи на кистях и стопах
- 2) стойкой пены в дыхательных путях
- 3) бледности кожи в области лица
- 4) отторжения ногтевых пластин

ПОДНАКОСТНИЧНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ГЕМАТОМА

- 1) субарахноидальная
- 2) эпидуральная
- 3) кефало
- 4) субдуральная

ПРИМЕНЕНИЕ СУДЕБНО-БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ

- 1) нейротропными ядами
- 2) фосфорорганическими ядохимикатами
- 3) соединениями мышьяка
- 4) ртутьорганическими ядохимикатами

ПРИ ПОВЕШЕНИИ СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ БОРОЗДА В ТИПИЧНОМ СЛУЧАЕ БЫВАЕТ

- 1) множественная
- 2) косонисходящая
- 3) горизонтальная
- 4) косовосходящая

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГРУДНОГО ПРОТОКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

К ГЕСТАЦИОННОМУ ВОЗРАСТУ ОТНОСЯТ

- 1) 28 полных дней после рождения
- 2) истинный внутриутробный возраст ребенка с момента его зачатия
- 3) период после рождения до отпадения пуповины
- 4) период эмбриогенеза и ранний плодный период

МИКОТОКСИКОЗЫ ОТНОСЯТСЯ К ОТРАВЛЕНИЯМ

- 1) гемотропными ядами
- 2) ядами общефункционального действия
- 3) ядохимикатами
- 4) пищевым

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) однослойного призматического эпителия собирательной трубочки
- 2) механических повреждений
- 3) мезангиальных клеток почечного тельца
- 4) кубического эпителия дистального извитого канальца

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней степени тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕЛЕЗЕНКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

УМЫШЛЕННОЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НО НЕ СОПРОВОЖДАЕМОЕ ДЕЙСТВИЯМИ, МЕШАЮЩИМИ ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕЧЕНИЯ, ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ АГГРАВАЦИИ

- 1) патологической
- 2) пассивной
- 3) активной
- 4) подсознательной

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БРЫЖЕЙКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью

- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней степени тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1) волосы
- 2) спинномозговую жидкость
- 3) ногти
- 4) плевральный экссудат

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ КОМПОНЕНТЫ ВЫСТРЕЛА ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) ионизирующим
- 2) охлаждающим
- 3) световым
- 4) термическим

В МОРФОГЕНЕЗЕ НЕКРОЗА РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) пролиферацию
- 2) экссудацию
- 3) альтерацию
- 4) аутолиз

ДОСТОВЕРНЫМ КРИТЕРИЕМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ ЭМБОЛИИ ПРИ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1) вклинения ствола головного мозга в большое затылочное отверстие
- 2) разлитых темно-красного цвета трупных пятен
- 3) газа в капиллярах сосудистых сплетений
- 4) кислорода в артериолах сосудистых сплетений

В ПРОЦЕССЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТИЛОВОГО АЛКОГОЛЯ В КРОВИ

- 1) не изменяется
- 2) изменяется хаотично
- 3) повышается
- 4) понижается

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) заключение эксперта
- 2) материалы дела
- 3) объекты исследования

4) сильнодействующие средства

К ГРУППЕ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТ

- 1) снотворные
- 2) нейролептики
- 3) психодислептики
- 4) наркотики

НА МЕСТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ДОЛЖЕН ЗАФИКСИРОВАТЬ

- 1) повреждение частей транспортного средства
- 2) взаиморасположение отдельных транспортных средств
- 3) положение трупа по отношению к автомобилю и его следам
- 4) допрос очевидцев происшествия

«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА «С» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ЭГДС
- 2) КТ органов брюшной полости
- 3) УЗИ гепатобилиарной зоны
- 4) пункционная биопсия печени

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННЫМ ПАРАПАРЕЗОМ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРИЧИНЁННОГО ВРЕДА В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ С НЕПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) значительная стойкая утрата общей трудоспособности
- 2) незначительная стойкая утрата общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние

4) опасность для жизни

ТОКСОДОЗА (Ct) ХАРАКТЕРИЗУЕТ ТОКСИЧНОСТЬ ВЕЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В

- 1) кристалле
- 2) твёрдом теле
- 3) жидкости
- 4) воздухе

У ЛИЦ СТАРШЕ 18-25 ЛЕТ ВОЗРАСТ УСТАНАВЛИВАЮТ ПО

- 1) степени стираемости жевательных поверхностей и режущих краев зубов
- 2) признакам прорезывания постоянных зубов
- 3) признакам обызвествления зубов
- 4) признакам прорезывания молочных зубов

ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, КРОВЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕЕ ВЗЯТИЯ МОЖНО ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1) 12-14
- 2) 9-10
- 3) 4-8
- 4) 10-12

К ОТДАЧЕ ТЕПЛА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПУТЕМ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТИЦАМИ ВОЗДУХА И/ИЛИ ВОДЫ ОТНОСЯТ СПОСОБ

- 1) конвекционный
- 2) кондукционный
- 3) испарения
- 4) радиационный

В СЛУЧАЯХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПОГРУЖЕНИЯ НОСКА ТОПОРА РУБЛЕНАЯ РАНА ИМЕЕТ ФОРМУ

- 1) щелевидную с острыми концами
- 2) вытянутого треугольника с одним тупым и с другим острым концом
- 3) звездчатую
- 4) щелевидную с тупыми П-образными концами

К ХИМИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ВОЛОС ОТНОСЯТ

- 1) прозрачность
- 2) относительную плотность
- 3) характер пигмента коркового вещества
- 4) элементный состав коркового вещества

ЯДРА БАЗАЛЬНОГО, ШИПОВАТОГО И ЗЕРНИСТОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ ВИД

- 1) «гирлянд»

- 2) «снежинок»
- 3) «завихрений»
- 4) «бус»

СИНОСТОЗ В ДИСТАЛЬНОМ ЭПИФИЗЕ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ У ДЕВУШЕК НАСТУПАЕТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1) 25-30
- 2) 22-25
- 3) 12-17
- 4) 10-12

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СТРУКТУРЫ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНОВИТЬ _____ ВОЗРАСТ

- 1) календарный
- 2) паспортный
- 3) биологический
- 4) хронологический

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ОТРАВЛЕНИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ _____ ОКРАШИВАНИЯ КОЖИ И СКЛЕР

- 1) буро-коричневого
- 2) вишневого
- 3) желтушного
- 4) серо-синюшного

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ В ЯДРАХ СЕГМЕНТОЯДЕРНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ, В КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ ПОЛОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОТРОСТКИ ТИПОВ А И

- 1) Е
- 2) С
- 3) Б
- 4) Д

ПОД ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ СИНДРОМОМ, СВЯЗАННЫМ СО СТОЙКИМ РАСШИРЕНИЕМ ТЕРМИНАЛЬНЫХ БРОНХИОЛ И ЛЕГОЧНЫХ АЛЬВЕОЛ С НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК, ПОНИМАЮТ

- 1) ателектаз
- 2) пневмонию
- 3) эмфизему
- 4) отек

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ КОНТРАКТУРЫ ЛЕВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ОЖОГОВ ПЛАМЕНЕМ, ОСЛОЖНИВШИХСЯ ОЖОГОВЫМ ШОКОМ III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) опасность для жизни
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) длительное расстройство здоровья

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) не причинившее

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КАННАБИНОИДОВ ИСПОЛЬЗУЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) рентгенфлюоресценцию
- 2) эмиссионный спектральный анализ
- 3) метод цветных отпечатков
- 4) УФ-спектрометрию

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающий жизни
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) тяжкий

ОБРАЗОВАНИЕ СУХОЙ ГАНГРЕНЫ ПОРАЖЕННЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА ПРИ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ _____ СТЕПЕНИ ОТМОРОЖЕНИЯ

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПРАВОГО

ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ ДВУХ И БОЛЕЕ СМЕЖНЫХ ПОЗВОНКОВ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА И ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МЫШЦ ШЕИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) тяжкий

К ПРИЗНАКАМ ДЕЙСТВИЯ НА ТКАНЬ ОДЕЖДЫ ИДЕАЛЬНО ЗАТОЧЕННОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ОРУДИЯ ОТНОСЯТ

- 1) разрыхление нити по длине без прерывания
- 2) спрессованность волокон в конгломерат
- 3) отсутствие остаточных деформаций нитей
- 4) расщепление и истончение концов волокон

В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНИЕ НА РАЗЪЯСНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТУ ЕГО ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ____ СТАТЬЕЙ УПК РФ

- 1) 60
- 2) 57
- 3) 58
- 4) 117

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести

- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ В УПОР ОБЛАДАЮТ ____ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) ионизирующим
- 2) охлаждающим
- 3) световым
- 4) механическим

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ ОФОРМЛЯЮТСЯ В ВИДЕ

- 1) акта
- 2) справки
- 3) заключения
- 4) эпикриза

В ПРОМЕЖУТКЕ ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ РУБЕЦ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) красноватым
- 2) розовым
- 3) белесоватым
- 4) коричневым

ПЕРВЫЕ ЕДВА ЗАМЕТНЫЕ ТРУПНЫЕ ПЯТНА ПОЯВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ____ МИНУТ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1) 10-15
- 2) 20-25
- 3) 10-20
- 4) 30-50

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ДИХЛОРЭТАНОМ ВЫЯВЛЯЮТ

- 1) уменьшение размеров почек
- 2) «мускатную» пестроту печени
- 3) малокровие внутренних органов
- 4) розоватую окраску кожи

ПЕРЕЛОМ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ОБЪЕКТОМ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) верхняя челюсть

- 2) костный мозг
- 3) мозжечок
- 4) твердая мозговая оболочка

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБЫЕ РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЧАСТЕЙ РАСЧЛЕНЕННОГО ТРУПА В ПРОТОКОЛЕ НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) отсутствующие части тела
- 2) признаки возможной профессиональной деятельности
- 3) механизм наступления смерти
- 4) судебно-медицинский диагноз

ЗАКРЫТЫЙ ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

ЗАКРЫТЫЙ ВИНТООБРАЗНЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ ТЕПЛОВОМ ОКОЧЕНЕНИИ ФОРМИРУЕТСЯ ПОЗА

- 1) легавой собаки
- 2) курка
- 3) боксера
- 4) эмбриона

К НАРУШЕНИЮ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА И ПОВЫШЕНИЮ ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЯ ОТНОСЯТ

- 1) лихорадку
- 2) перегревание

- 3) озноб
- 4) гипотермию

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ЛЁГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ КРАТКОВРЕМЕННОЕ РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ НЕ БОЛЕЕ (В ДНЯХ)

- 1) 22
- 2) 21
- 3) 42
- 4) 41

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛОДЫЖЕК ОБЕИХ БЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ПЕРЕЛОМОМ СУСТАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ И РАЗРЫВОМ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА С ПОДВЫВИХОМ И ВЫВИХОМ СТОПЫ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

НАИБОЛЕЕ ПОЛНО МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОТИВОУДАРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ТРАВМЕ ГОЛОВЫ С УСКОРЕНИЕМ ОБЪЯСНЯЕТ ТЕОРИЯ

- 1) кавитации
- 2) вибрационная
- 3) смещения мозга
- 4) ротации мозга

ПРИ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫЙ ____ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ОСАДОК ОКСАЛАТА КАЛЬЦИЯ

- 1) красный
- 2) белый
- 3) черный
- 4) зеленый

ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАГМЕНТ КИШКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ (В САНТИМЕТРАХ)

- 1) 15-20
- 2) 30-35
- 3) 40-45
- 4) 50-55

ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С НЕПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ШЕИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОМЕРЗАНИЕМ ГОЛОВЫ НА АУТОПСИИ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ

- 1) скопление крови в желудочковой системе головного мозга
- 2) вклинение продолговатого мозга в большое затылочное отверстие при сохраненной целостности костей черепа
- 3) экхимотическую маску
- 4) расхождение швов черепа

ПОПЕРЕЧНЫЕ РАЗРЫВЫ ПОДОШВЫ ОБУВИ У ПИЛОТОВ С ВОЗМОЖНЫМ ОБНАРУЖЕНИЕМ КОНТУРОВ ПЕДАЛИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ УДАРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА О ЗЕМЛЮ СРЕДНЕЙ СИЛЫ ПРИ СКОРОСТИ (В КМ/Ч)

- 1) 600-800
- 2) 100-200
- 3) 70-80
- 4) 40-50

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ ПРОКОПА ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ _____ МЫШЦА

- 1) трапецевидная
- 2) ягодичная
- 3) дельтовидная
- 4) двуглавая

ПЕРЕЛОМ ДЖЕФФЕРСОНА ФОРМИРУЕТСЯ В _____ ШЕЙНОМ ПОЗВОНКЕ

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 6

ПОТ СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ НА (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 50
- 2) 99

- 3) 1
- 4) 10

ОДНИМ ИЗ СЛОЕВ ЭПИДЕРМИСА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) блестящий
- 2) сосочковый
- 3) сетчатый
- 4) подкожно-жировая клетчатка

РАСПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ ВЫЗЫВАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ОЖОГОВ

- 1) 1 степени
- 2) 2 степени
- 3) поверхностных неглубоких
- 4) глубоких локальных

ОПАЛЕНИЕ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЕ ФОРМИРУЕТСЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ

- 1) дульного среза ствола
- 2) огнестрельного снаряда
- 3) предпулевого воздуха
- 4) порошинок

В ОСНОВЕ РАЗГИБАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЛЕЖИТ

- 1) окклюзионное взаимоотношение зубных рядов
- 2) уменьшение выпуклости нижнечелюстной дуги
- 3) увеличение выпуклости нижнечелюстной дуги
- 4) тяга мышц костных фрагментов

В ПЕРВУЮ ФАЗУ ТРАВМИРОВАНИЯ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ДВИЖУЩЕГОСЯ ПОЕЗДА С ЧЕЛОВЕКОМ ПРОИСХОДИТ

- 1) отбрасывание тела
- 2) продвижение тела
- 3) размятие
- 4) удар

ПРИ ВЗРЫВЕ С НЕБЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ

- 1) осколки взрывного устройства
- 2) продукты детонации
- 3) ударная волна и пламя взрыва
- 4) продукты горения

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ МОЧЕТОЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние

- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

ЦАРАПИНЫ ОБРАЗУЮТСЯ ОТ

- 1) скользящего действия твердого предмета с шероховатой поверхностью
- 2) реализации механизма образования «штапм-ссадины»
- 3) тангенциального удара тупого твердого предмета с преобладающей гладкой повреждающей поверхностью
- 4) удара обухом топора

ОДИНОЧНОЕ КОЛОТО-РЕЗАНое РАНЕНИЕ ГРУДИ С РАССЕЧЕНИЕМ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинившее
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ, РЕЗКОЕ РАССТРОЙСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В МОМЕНТ ПЕРВИЧНОГО УДАРА И РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ В МЕСТЕ УДАРА, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) первичными непрямыми
- 2) вторичными непрямыми
- 3) вторичными прямыми
- 4) первичными прямыми

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЯЗАН ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ СЛЕДОВАТЕЛЮ В

- 1) уничтожении вещественных доказательств
- 2) проведении бальзамации трупа
- 3) обнаружении биологических следов
- 4) изъятии предметов из раны

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА ЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 250-300
- 2) 20-30
- 3) 10-15

4) 100-200

**КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СРОКОВ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- 1) прокурор
- 2) судья
- 3) следователь
- 4) руководитель государственного судебно-экспертного учреждения

**ЗАКРЫТАЯ ТУПАЯ ТРАВМА ШЕИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ПЕРЕЛОМ ДВУХ ХРЯЩЕЙ
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) средней тяжести
- 2) не причинившая
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

**МНОЖЕСТВЕННЫЕ РАНЕНИЯ, ПРИЧИНЕННЫЕ ПУЛЯМИ НЕСКОЛЬКИХ ОДИНОЧНЫХ
ВЫСТРЕЛОВ, ИМЕЮТ БЕСПОРЯДОЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА
ТЕЛЕ И**

- 1) непересекающиеся раневые каналы
- 2) секторальные раневые каналы
- 3) строгую параллельность раневых каналов
- 4) пересекающиеся раневые каналы

**ОБЯЗАННОСТИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ЭКСПЕРТНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА,
РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ СТАТЬЕЙ**

- 1) 16 «Обязанности эксперта» ФЗ «О ГСЭД в РФ»
- 2) 57 «Эксперт» УПК РФ
- 3) 58 «Специалист» УПК РФ
- 4) 13 «Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту» ФЗ «О ГСЭД в РФ»

**ТРАВМУ ШЕИ С ОТРЫВОМ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ
ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

ПЕРЕЛОМ ТИПА ДЮПЮИТРЕНА ФОРМИРУЕТСЯ В СУСТАВЕ

- 1) крестцово-подвздошном
- 2) таранно-голеностопном
- 3) лучезапястном

4) голеностопном

ПЛОЩАДЬ ПОРАЖЕНИЯ ТЕЛА ПРИ ОЖОГАХ ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СПИНЫ И ПОЯСНИЦЫ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 45
- 2) 9
- 3) 18
- 4) 27

СЛУЧАЙНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ СНОТВОРНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившее
- 4) средней тяжести

ПРИ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИМЕНЯЮТ _____ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1) биохимическое
- 2) фрактологическое
- 3) газохроматографическое
- 4) спектрофотометрическое

ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОЧАГОВЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В ВЕЩЕСТВО

- 1) селезенки
- 2) печени
- 3) почек
- 4) головного мозга

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ ВИДОМ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ АСФИКСИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) удаление руками
- 2) закрытие рта и носа
- 3) сдавление петель
- 4) повешение

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ НАНЕСЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ШЕИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) опасность для жизни
- 3) угрожающее жизни состояние

4) длительное расстройство здоровья

ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ ПРИ СТЕНОЗЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

- 1) сужается
- 2) расширяется
- 3) остается неизмененным
- 4) уменьшается

КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ («R») ЗАВИСИТ ОТ

- 1) температуры окружающей среды
- 2) степени привыкания к алкоголю
- 3) содержания жидкости в организме
- 4) массы человека

РЕАКЦИЮ ЗРАЧКОВ НА ВВЕДЕНИЕ ВЕГЕТОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ (В ЧАСАХ)

- 1) 1-2
- 2) 20-24
- 3) 6-8
- 4) 15-18

ПОДНАДКОСТНИЧНЫЙ ПЕРОЛОМ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ ФОРМИРУЕТСЯ ПО ТИПУ

- 1) «бочкообразного вспучивания»
- 2) «валикообразного спучивания»
- 3) «желеобразного смятия»
- 4) «зеленой веточки»

К ДИСТРОФИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В КОСТНОЙ И ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ

- 1) остеосклероз
- 2) остеохондроз
- 3) остеодистрофию
- 4) остеопороз

К ЧАСТНЫМ ПРИЗНАКАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОТНОСЯТ

- 1) возраст
- 2) расовую принадлежность
- 3) следы зубоврачебного вмешательства
- 4) половую принадлежность

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО ДИАМЕТРА ЧЕРЕПА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РАССТОЯНИЕ

- 1) между точками зуррион
- 2) от глабеллы до опистокраниона

- 3) между точками базион и назион
- 4) от точки базион до точки брегма

**ПОТЕРЮ СПОСОБНОСТИ К ВЫНАШИВАНИЮ ИЛИ ДЕТОРОЖДЕНИЮ
КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

**ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА В ВИДЕ ДИФFUЗНОГО АКСОНАЛЬНОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

**ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РЕЗОРБТИВНОМ ДЕЙСТВИИ ЕДКОГО
ЯДА МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) перитонит
- 2) паралич дыхательного и сосудистого центров
- 3) асфиксия в результате спазма голосовой щели
- 4) печеночно-почечная недостаточность

**К ОТГРАНИЧЕННОМУ СКОПЛЕНИЮ ГНОЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ И ТКАНЯХ
ОТНОСЯТ**

- 1) сепсис
- 2) абсцесс
- 3) фурункул
- 4) флегмону

**ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВЫХ ЛОКТЕВОМ
И ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВАХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД
ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

**СОДЕРЖИМОЕ ПОЛОСТИ МАТКИ И ЧАСТЬ ЕЕ СТЕНКИ ИЗЫМАЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
НА СМЕРТЬ ОТ**

- 1) утопления
- 2) сердечной недостаточности
- 3) внебольничного аборта

4) токсикоинфекции

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНЬЮ С ОБЫЗВЕЩВЛЕННЫМ МЕЖКЛЕТОЧНЫМ ВЕЩЕСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ КОСТНАЯ

- 1) балка
- 2) пластинка
- 3) лакуна
- 4) ткань

ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ БРАНШЕЙ НОЖНИЦ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ В ТЕМЕННУЮ ОБЛАСТЬ СЛЕВА ФОРМИРУЕТСЯ ПЕРЕЛОМ

- 1) паутинообразный
- 2) оскольчато-фрагментарный
- 3) террасовидный
- 4) дырчатый

СТАТИСТИЧЕСКИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ОПЬЯНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА В КРОВИ (В ПРОМИЛЛЯХ)

- 1) 3,5-4
- 2) 1,5-2,5
- 3) 0,5-1,5
- 4) 4,5-5

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА, КАК ПРАВИЛО, БЫВАЕТ

- 1) суховатой в виде хрупкой пленки
- 2) набухшей, тусклой
- 3) отечной, с участками отслоения
- 4) серо-бурого цвета с зеленоватыми участками

ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ ТЯЖЕСТЬ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО КРИТЕРИЮ, КОТОРЫЙ

- 1) соответствует большей степени тяжести вреда
- 2) менее выражен по клиническому проявлению
- 3) более выражен по клиническому проявлению
- 4) соответствует меньшей степени тяжести вреда

ЖИРОВЫЕ ПОЛОСКИ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ, КАК ПРАВИЛО, ИМЕЮТ ____ ЦВЕТ

- 1) черный
- 2) желто-серый
- 3) синюшно-серый
- 4) коричневый

ЭКСПЕРТ ОБЯЗАН СОСТАВИТЬ МОТИВИРОВАННОЕ ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ДАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЕСЛИ ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ ВЫХОДЯТ

ЗА ПРЕДЕЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЕГО ЗНАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ ____ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1) 74
- 2) 57
- 3) 199
- 4) 56

РАЗВИТИЕ ПНЕВМОТОРАКСА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) криминального аборта
- 2) проникающего ранения груди
- 3) гнилостного изменения трупа
- 4) утопления

МУЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

- 1) судебно-медицинскими экспертами
- 2) судебно-следственными органами
- 3) органами социальных служб
- 4) судебно-психиатрическими экспертами

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕФЕКТА КОЖИ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ С ПРОТЯЖЕННЫМИ РАДИАЛЬНЫМИ РАЗРЫВАМИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ____ ДЕЙСТВИИ ПУЛИ

- 1) разрывном
- 2) пробивном
- 3) клиновидном
- 4) ушибающем

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

ГИСТОГЕНЕТИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ РАК

- 1) экспансивный
- 2) холангиоцеллюлярный
- 3) мономультилобулярный
- 4) инфильтрирующий

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О

- 1) обстоятельствах дела
- 2) выводах эксперта

- 3) прилагаемых материалах исследования
- 4) результатах лабораторных исследований

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ОЖОГА III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) опасность для жизни
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) длительное расстройство здоровья

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ДИХЛОРЭТАНОМ ИЗ ПОЛОСТЕЙ И ОТ ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ЗАПАХ

- 1) прелых яблок
- 2) чеснока
- 3) сушеных грибов
- 4) горького миндаля

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КУСОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА СЛЕДУЕТ ВЫРЕЗАТЬ ДО

- 1) извлечения мозга из полости черепа
- 2) проведения эвисцерации
- 3) прижигания поверхности мозга
- 4) рассечения твердой мозговой оболочки

ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ ФОРМИРУЕТСЯ ПРИЗНАК

- 1) Русакова – Шкаравского
- 2) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа
- 3) Оливье – Данжера
- 4) Станиславского

ГИСТОЛОГИЧЕСКИ РАК ПЕЧЕНИ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) недифференцированным
- 2) плоскоклеточным
- 3) тубулярным
- 4) ацинарно-клеточным

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НАДПОЧЕЧНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ

ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 10%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПОЗА ПОСТРАДАВШЕГО В МОМЕНТ ВЗРЫВА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ

- 1) цветных отпечатков
- 2) визирования раневых каналов
- 3) спектральным
- 4) рентгенологическим

СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ПЕРЕГРЕВАНИЮ ОРГАНИЗМА СПОСОБСТВУЕТ

- 1) высокая влажность
- 2) обильное питье
- 3) низкая влажность
- 4) отсутствие физической нагрузки

ПРИ ПОРАЖЕНИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЧИСТЫМ КИСЛОРОДОМ НАБЛЮДАЮТ

- 1) двусторонний пневмосклероз
- 2) геморрагический отек легких
- 3) множественные очаги некроза черного цвета в трахее
- 4) тромбоэмболию крупных ветвей легочной артерии

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ПУТЯМИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ЯВЛЯЮТСЯ ПЕТЛИ

- 1) рука – рука
- 2) нога – нога
- 3) рука – нога
- 4) рука – таз

ПРИ СРАВНИТЕЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ВОЛОС-УЛИК, ИХ НУЖНО СРАВНИВАТЬ С ВОЛОСАМИ ОБРАЗЦАМИ ИЗ __ ОБЛАСТЕЙ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

- 1) четырех
- 2) пяти
- 3) одной-двух

4) трех

ОСНОВУ ТАНАТОГЕНЕЗА ГОРНОЙ БОЛЕЗНИ ФОРМИРУЕТ

- 1) гипоксия
- 2) анафилаксия
- 3) гемическая анемия
- 4) аутоиммунное воспаление

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ГАЗОВОЙ ГАНГРЕНЫ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) гной, легкие и другие органы в зависимости от характера поражения
- 2) спинномозговую жидкость, мочу, кусочки почек
- 3) кусочки ткани из области ран и пораженных тканей и органов
- 4) кусочки селезенки, печени, легких, почек, молочных желез

ИНИЦИИРУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ В КАПСЮЛЕ ПАТРОНА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) динамит
- 2) антимоний
- 3) гремучая ртуть
- 4) бертолетова соль

КРАСЯЩИЙ ПИГМЕНТ ВОЛОС ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ПОДВЕРГАЕТСЯ

- 1) коагуляции
- 2) денатурации
- 3) выщелачиванию
- 4) окислению

О БЛАГОПРИЯТНОМ ТЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО КОМПЛЕКСА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1) усиление перифокального воспаления
- 2) появление признаков милиаризации
- 3) развитие казеозной пневмонии
- 4) наличие очага Гона

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЯМ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДО (В НЕДЕЛЯХ)

- 1) 12
- 2) 22
- 3) 34
- 4) 28

СТАДИЯ ПРИЛИВА КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ____ ОТЕКОМ ПОРАЖЕННОЙ ДОЛИ

- 1) кахектическим

- 2) микробным
- 3) лимфогенным
- 4) токсическим

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ МИЗИНЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

О ПРИЖИЗНЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОЖОГ

- 1) кожи лица
- 2) красной каймы губ
- 3) роговицы
- 4) трахеи

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ II-III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) опасность для жизни
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) длительное расстройство здоровья

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГЕМОПНЕВМОТОРАКС ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

В ПРОЦЕССЕ КУМУЛЯЦИИ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1) накопление яда в неизмененном виде
- 2) видоизменение яда в более токсичное вещество
- 3) синергизм веществ
- 4) потенцирование действия нескольких веществ

К ОБЪЕКТАМ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗМЕРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ОТНОСЯТ

- 1) сердце
- 2) легкое

- 3) кусочки коры головного мозга с мягкими мозговыми оболочками
- 4) гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему

ГИСТОЛОГИЧЕСКИ РАК ПЕЧЕНИ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) плоскоклеточным
- 2) трабекулярным
- 3) недифференцированным
- 4) ацинарно-клеточным

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) ядовитые вещества
- 2) объекты исследования
- 3) заключение эксперта
- 4) материалы дела

МАЦЕРАЦИЯ КОЖИ ТРУПА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЕГО НАХОЖДЕНИИ В/ВО

- 1) влажной среде
- 2) безвоздушной среде
- 3) условиях пониженного барометрического давления
- 4) условиях повышенного барометрического давления

С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ АКОНИТИНА ДО НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОБЫЧНО ПРОХОДИТ (В ЧАСАХ)

- 1) 12-24
- 2) 24-48
- 3) 6-10
- 4) 2-4

СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ ПРИ АВИАЦИОННОЙ ТРАВМЕ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ В НЕЙ

- 1) этиленгликоля
- 2) карбоксигемоглобина
- 3) формальдегида
- 4) метанола

ОБНАРУЖЕНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ В СИНУСАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ

- 1) прижизненности повреждения
- 2) посмертного образования
- 3) отсутствия диагностической значимости
- 4) патологических изменения

СЕРДЦЕ ВСКРЫВАЮТ

- 1) реберным ножом
- 2) тупоконечными ножницами
- 3) скальпелем
- 4) мозговым ножом

ОДНОСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ II ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасный для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАНОЕ РАНЕНИЕ ЖИВОТА С РАССЕЧЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПНУЮ КРОВЬ БЕРУТ ИЗ СЕРДЦА

- 1) до извлечения головного мозга
- 2) после извлечения головного мозга
- 3) после эвисцерации органов
- 4) после вскрытия

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ НАЗНАЧАЕТСЯ

- 1) адвокатом
- 2) судом
- 3) потерпевшим
- 4) руководителем ГСЭУ

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР ПО НЕСКОЛЬКИМ АНАТОМИЧЕСКИМ ЛИНИЯМ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНОГО УЧАСТКА ГРУДНОЙ СТЕНКИ ПО ТИПУ «РЕБЕРНОГО КЛАПАНА» КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВНУТРЬ ЭТАНОЛ В НЕИЗМЕНЕННОМ ВИДЕ ВСАСЫВАЕТСЯ В

- 1) желудочное содержимое
- 2) мочу
- 3) ликвор
- 4) кровь

СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ ЛЕВОГО ПЛЕЧА НА УРОВНЕ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ПЕРЕЛОМ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО, НАРЯДУ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ И ТКАНЯМИ, ПРОВЕСТИ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1) кожи
- 2) сетчатки глаза
- 3) языка
- 4) странгуляционной борозды

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ЛИЦА, ШЕИ, ГРУДИ И ЛЕВОГО ПЛЕЧА III СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ 15% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ-ВЫВИХ ГАЛЕАЦЦИИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПЕРЕЛОМ ЛЕВОЙ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ С НАРУШЕНИЕМ НЕПРЕРЫВНОСТИ

ТАЗОВОГО КОЛЬЦА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДНА ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ СО СМЕЩЕНИЕМ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ОДНИМ ИЗ ВИДОВ РАЗВОДОВ ПИЛ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) прямой
- 2) специальный
- 3) простой
- 4) зигзагообразный

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА В ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ СО СДАВЛЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней степени тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающий жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

СМЕРТЕЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ О ПРИЖИЗНЕННОМ ДЕЙСТВИИ ПЛАМЕНИ, МОЖЕТ БЫТЬ КОНЦЕНТРАЦИЯ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 99
- 2) 5
- 3) 50
- 4) 80

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ МЛАДЕНЦА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО

- 1) результатам гидростатических проб
- 2) степени физического развития к моменту родов
- 3) отсутствию пороков развития и заболеваний, несовместимых с жизнью
- 4) продолжительности жизни плода вне организма матери

ТРАВМА ПОЧКИ, ПРИВЕДШАЯ К ЕЁ РЕЗЕКЦИИ И ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

ДЛЯ «ЛЕГОЧНОЙ» СМЕРТИ ЗНАЧИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) жировой эмболии сосудов легких
- 2) обструкции верхних дыхательных путей
- 3) острой эмфиземы легких
- 4) гиалиновых мембран

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ДВУСТОРОННЕГО ПЕРЕЛОМА ДУГИ ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА (БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ПРИЧИНОЙ ОСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ ПРИ СМЕРТИ ОТ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) тоническое сокращение диафрагмы
- 2) обтурация дыхательных путей
- 3) сдавление продолговатого мозга
- 4) гиповентиляция ствола мозга

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЭКСПЕРТУ УНИЧТОЖАТЬ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ, РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ СТАТЬЕЙ

- 1) 26.6 «Вещественные доказательства» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
- 2) 57 «Эксперт» Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
- 3) 16 «Обязанности эксперта» Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
- 4) 85 «Обязанности и права эксперта» Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЩЕГО ПЕРЕГРЕВАНИЯ ОРГАНИЗМА ОБНАРУЖИВАЮТ

- 1) множественные участки размягчения в спинном мозге
- 2) уменьшенные в объеме «сухие» паренхиматозные органы
- 3) расхождение стреловидного шва костей свода черепа
- 4) нарушение реологических свойств крови

К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ МИОКАРДИТА ОТНОСЯТ ДИСТРОФИЧЕСКУЮ ИЛИ

- 1) крупноочаговую
- 2) трансмуральную
- 3) дегенеративную
- 4) деструктивную

К ЕДКИМ ЯДАМ ОТНОСЯТ

- 1) цианистый калий
- 2) фенол
- 3) мышьяковистый ангидрид
- 4) каломель

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее легкий вред здоровью
- 2) не причинившее вред здоровью
- 3) причинившее тяжкий вред здоровью
- 4) причинившее вред здоровью средней тяжести

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОТ ТРУПА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) ногти
- 2) плевральный экссудат
- 3) желчь
- 4) глотку

ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ УТОЛЩЕНИЕ СТЕНКИ БРОНХОВ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ ИНФИЛЬТРАЦИИ ЕЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) плазматическими клетками
- 2) эритроцитами
- 3) тромбоцитами
- 4) лейкоцитами

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ДОСТАТОЧНО ЧАСТО ВЫЯВЛЯЮТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 2) сотообразные пустоты в роговом слое эпидермиса
- 3) некрозы мышечных волокон
- 4) некрозы жировых клеток

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) лёгкий

ЗАКРЫТАЯ ТУПАЯ ТРАВМА ГРУДИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ПЕРЕЛОМ ОДНОГО РЕБРА ПО ОДНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ЛИНИИ И ГЕМОТОРАКС В ОБЪЁМЕ 100 МЛ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

ДИФФУЗНОЕ АКСОНАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ИСХОДОМ НЕСМЕРТЕЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЕДКИМИ ЯДАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) простатит
- 2) спленомегалия
- 3) стеноз пищевода
- 4) артериальная гипертензия

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) рыхлой волокнистой соединительной ткани стромы

- 2) фибротических процессов, ведущих к недостаточности эндокринной паренхимы
- 3) кубического эпителия межацинных выводных протоков
- 4) однослойного плоского эпителия вставочных выводных протоков

В ОСНОВЕ ДИАГНОСТИКИ СМЕРТИ ОТ КЕССОННОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕЖИТ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ

- 1) жировой эмболии
- 2) воздушной (газовой) эмболии
- 3) эмболии околоплодными водами
- 4) тромбоэмболии

ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТ ПЕРЕГИБА ПРОИСХОДИТ, КАК ПРАВИЛО, В ТАК НАЗЫВАЕМЫХ МЕСТАХ СЛАБОСТИ - ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ, НА УРОВНЕ ПОДБОРОДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ ИЛИ

- 1) клыков
- 2) акромиального отростка
- 3) клювовидного отростка
- 4) нижнечелюстного канала

КУСОЧКИ ОРГАНОВ, ВЗЯТЫЕ ОТ ТРУПА НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМО

- 1) высушить перед помещением в консервирующую жидкость
- 2) промыть в проточной воде перед помещением в консервирующую жидкость
- 3) поместить в кислый раствор формальдегида
- 4) поместить в нейтральный формалин

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА РАНЕВШЕГО СНАРЯДА ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) альгологического
- 2) гистологического
- 3) рентгенологического
- 4) иммуногистохимического

УСТАНОВЛЕНИЕ НЕИЗГЛАДИМОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ВРАЧА

- 1) челюстно-лицевого хирурга
- 2) по медико-социальной экспертизе
- 3) судебно-медицинского эксперта
- 4) по медицинской реабилитации

ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ СТИМУЛИРУЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) гормоны щитовидной железы
- 2) глюкокортикостероиды
- 3) В-лимфоциты
- 4) лейкоциты

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ НАЛИЧИЕ ВОЗДУХА В ЛЕГКИХ И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

- 1) причины смерти
- 2) продолжительности внутриутробной жизни младенца
- 3) зрелости
- 4) живорожденности

МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ КАРМИНОВОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАСТОЙ ОБОГАЩЕННОЙ ____ КРОВИ В ЛЁГКИХ

- 1) O₂
- 2) CO
- 3) NO
- 4) H₂

ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ ОТ

- 1) сдавления груди
- 2) сдавления живота
- 3) удушения
- 4) повешения

В НАИБОЛЕЕ ТОНКИХ ИЛИ ИЗОГНУТЫХ МЕСТАХ НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ИСПЫТЫВАЕТ НАИБОЛЬШЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ И ЛОМАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1) кручения
- 2) перегиба
- 3) перемещения
- 4) вращения

НОЖ БОЛЬШОЙ АМПУТАЦИОННЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

- 1) исследования головного мозга
- 2) рассечения кожи
- 3) разделения хрящевой ткани ребер
- 4) препаровки

ОБЯЗАННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЕГО ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА ЧАСТЬЮ

- 1) 2 статьи 199 УПК РФ
- 2) 2 статьи 80 «Содержание определения суда о назначении экспертизы» ГПК РФ
- 3) 2 статьи 26.4. «Экспертиза» КоАП РФ
- 4) 1 статьи 14 «Обязанности руководителя ГСЭД» ФЗ «О ГСЭД в РФ»

К АТИПИЧНЫМ СНАРЯДАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) соль
- 2) пуля
- 3) дробь
- 4) картечь

СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОСТНОЙ ТКАНИ ЭЛЕКТРОТОКОМ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

- 1) «жумчужных» бус
- 2) «метелки»
- 3) «щетки»
- 4) «завихрений»

МЕСТНО НЕКРОТИЗИРУЮЩИМ И ОДНОВРЕМЕННО ГЕМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ____ КИСЛОТА

- 1) карболовая
- 2) уксусная
- 3) соляная
- 4) азотная

РОДОВАЯ ОПУХОЛЬ, КАК ПРАВИЛО, ПОЛНОСТЬЮ РАССАСЫВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1) 10-14
- 2) 14-28
- 3) 5-9
- 4) 1-4

ТЕЛА ОСТЕОЦИТОВ РАСПОЛАГАЮТСЯ В ПОЛОСТЯХ ОСНОВНОГО ВЕЩЕСТВА КОСТИ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) фолькмановскими каналами
- 2) костными канальцами
- 3) гаверсовыми каналами
- 4) костными лакунами

ОБЩИМ МЕТОДОМ ИЗВЛЕЧЕНИЯ «ЛЕТУЧИХ ЯДОВ» ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) диализ
- 2) минерализация
- 3) перегонка с водяным паром
- 4) экстракция в органический растворитель

РЕЗКОЕ СОКРАЩЕНИЕ МОШОНКИ И ПОДТЯГИВАНИЕ ЯИЧЕК КО ВХОДУ В ПАХОВЫЙ КАНАЛ ВПЕРВЫЕ ОПИСАНО

- 1) Десятовым
- 2) Пупаревым
- 3) Вишневым

4) Касьяновым

ПОГИБШИХ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОБЫЧНО НАХОДЯТ В ПОЗЕ

- 1) «зябнувшего человека»
- 2) «боксера»
- 3) «лягушки»
- 4) Ромберга

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗНУЮ ИНФЕКЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1) зубы
- 2) волосы
- 3) мокроту
- 4) ногти

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ АНАТОМИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

СМЕРТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ДИГИДРОКСИЛЬНЫМИ ВЫСШИМИ СПИРТАМИ НАСТУПАЕТ ОТ ОСТРОЙ _____ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- 1) почечной
- 2) эндокринной
- 3) полиорганной
- 4) сердечной

К АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА У ДЕТЕЙ ОТНОСЯТ

- 1) длину волос
- 2) рост (длину) тела
- 3) высоту ушной раковины
- 4) длину ногтей

ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЛОМЫ

- 1) бедренной кости
- 2) костей таза
- 3) плечевой кости
- 4) ребер

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ СЕРДЦА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК

ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОСТОВЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ СМЕРТИ У ПОСТРАДАВШЕГО ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОБЯЗАН

- 1) оказать первую помощь
- 2) осмотреть место происшествия
- 3) вызвать участкового врача
- 4) опросить родственников пострадавшего

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) лёгкий

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гемолитическая болезнь
- 2) кефалогематома
- 3) асфиксия
- 4) сепсис

В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВНЫХ ГАЗОВ ФОРМИРУЮТСЯ

- 1) химические ожоги
- 2) осколочные ранения
- 3) разрывы кожи
- 4) термические ожоги

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ СЕЛЕЗЕНКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни

- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ПРИ ВСКРЫТИИ, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ДИМЕТИЛКЕТОНОМ, ОТ СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДКА ОЩУЩАЕТСЯ ЗАПАХ

- 1) сушеных грибов
- 2) формалина
- 3) ацетона
- 4) чеснока

В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ СЧИТАЕТСЯ РАВНОЙ ____ СУТКАМ С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ

- 1) 1
- 2) 7
- 3) 10
- 4) 28

ГЕМОМРАГИЧЕСКИЙ ШОК III СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ КУТИКУЛЫ ВОЛОС ОБУСЛОВЛЕН ОТПЕЧАТКОМ

- 1) краев непокрытых частей клеток кутикулы
- 2) полных контуров краев клеток кутикулы
- 3) сердцевины
- 4) повреждений волоса

НЕПРОХОДИМОСТЬ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 90%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БРОНХОВ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

К ЯДАМ «ЛЕТАЛЬНОГО СИНТЕЗА» ОТНОСЯТ

- 1) ботулотоксин
- 2) этиленгликоль
- 3) азотную кислоту
- 4) оксид углерода

ИСТОЧНИКОМ УГЛЕРОДА ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пуля
- 2) порох
- 3) капсуль
- 4) ствол

РАЗЛОЖЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ТРУПА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФЕРМЕНТНЫХ СИСТЕМ МИКРООРГАНИЗМОВ С ОБРАЗОВАНИЕМ КОНЕЧНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) мацерация
- 2) сапонификация
- 3) трупный аутолиз
- 4) путрификация трупа

ВОКРУГ ЗОНЫ ФИБРИНОИДНОГО НАБУХАНИЯ СКАПЛИВАЮТСЯ

- 1) макрофаги
- 2) базофилы
- 3) лимфоциты
- 4) моноциты

ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕПИЩЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВОДЫ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ, ЗАГЛАТЫВАЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ УТОПЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОБА НА НЕФТЬ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ

- 1) Чертовских
- 2) Бокариусом
- 3) Быстровым
- 4) Свешниковым

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ БОЛЬШОГО САЛЬНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЯДОМ ИССЛЕДУЮТ

- 1) концентрацию глюкозы и гликогена
- 2) активность холинэстеразы, глутаматдегидрогеназы
- 3) концентрацию гликолизированного гемоглобина, креатинина
- 4) активность аспарагиновой и аланиновой трансаминаз

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ ПРОИСХОДИТ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕФОРМАЦИИ

- 1) изгиба
- 2) сжатия
- 3) кручения
- 4) сдвига

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ШЕИ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ (БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ КРОВОПОТЕРИ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАННИХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ «ОСТРОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» У БОЛЬНЫХ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1) 7-8
- 2) 3-4
- 3) 1-2
- 4) 5-6

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ТРУПОВ ВКЛЮЧАЕТ НАЛИЧИЕ СЕКЦИОННОГО НАБОРА НЕ МЕНЕЕ 1 НА _____ ВРАЧЕЙ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ

- 1) трех
- 2) двух
- 3) пяти
- 4) четырех

ПО ХАРАКТЕРУ ВОСПАЛЕНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) нисходящий
- 2) экссудативный
- 3) склерозирующий

4) восходящий

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) дополнительной
- 2) процессуальной
- 3) административной
- 4) уголовной

ПО ПАТОГЕНЕЗУ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ КРОВОПОТЕРИ ВЫДЕЛЯЮТ ____ СТАДИЮ/СТАДИИ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 2

РАССАСЫВАНИЕ КЕФАЛОГЕМАТОМЫ, КАК ПРАВИЛО, ПРОИСХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1) 12-10
- 2) 14 и более
- 3) 5 и менее
- 4) 9-7

НЕСРОСШИЙСЯ ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ПРАВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) лёгкий

К ОБЪЕКТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ (ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ) ИССЛЕДОВАНИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ НА БЕШЕНСТВО ОТНОСЯТ

- 1) аммонов рог
- 2) желчь
- 3) кусочки почек
- 4) перитонеальную жидкость

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ АЦЕТОНА В КРОВИ И МОЧЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

- 1) печеночной недостаточности
- 2) отравлении дихлорэтаном
- 3) сахарном диабете
- 4) феохромоцитоме

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРОФИКИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИАНИДОВ ПРОВОДЯТ ____ МЕТОДОМ

- 1) микроскопическим
- 2) флюориметрическим
- 3) микробиологическим
- 4) серологическим

ПОВРЕЖДЕНИЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ТЯЖЁЛЫМ СПИНАЛЬНЫМ ШОКОМ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) стойкой утраты профессиональной трудоспособности
- 3) длительности расстройства здоровья
- 4) опасности для жизни

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- 1) после осмотра трупа
- 2) после проведения осмотра
- 3) в ходе следственного действия
- 4) перед началом осмотра

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ ЯИЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

К ИЗМЕНЕНИЯМ ТРУПА ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НЕБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ФАКТОРЫ

- 1) химические
- 2) вирусологические
- 3) бактериальные
- 4) психические

В СЛУЧАЯХ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ ЗАХОРОНЕНИЕ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО

ПИСЬМЕННОМУ РАЗРЕШЕНИЮ

- 1) руководителя экспертного учреждения
- 2) судебно-медицинского эксперта, проводившего аутопсию
- 3) близких родственников погибшего
- 4) органов следствия

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГЕМОПЕРИКАРД ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней степени тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ПАКЕТЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ КЛАССА «Б» ИМЕЮТ ____ ЦВЕТ

- 1) белый
- 2) зеленый
- 3) желтый
- 4) красный

В СРЕДНЕМ СТАДИЯ ПРИЛИВА ПРИ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ДЛИТСЯ (В СУТКАХ)

- 1) 5
- 2) 7
- 3) 3
- 4) 1

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ, ШАТКАЯ ПОХОДКА, НЕЯСНАЯ РЕЧЬ, НАРУШЕНИЯ ПСИХИКИ И ОРИЕНТИРОВКИ, СОНЛИВОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ____ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

- 1) тяжелой
- 2) легкой
- 3) средней
- 4) сильной

РАЗЛИЧАЮТ ____ СТЕПЕНИ/СТЕПЕНЕЙ ОТМОРОЖЕНИЙ

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 5

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ УЧИТЫВАЮТ

- 1) степень дифференциации скелета
- 2) синостоз швов
- 3) остеопоретические изменения
- 4) наличие экзостозов

К ПРИЗНАКАМ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА НЕГРОИДНОЙ РАСЫ ОТНОСЯТ

- 1) уплощенный лицевой отдел
- 2) выступающий узкий нос с глубоким корнем
- 3) широкий, мало углубленный и слабо выступающий корень носа
- 4) сильно- или среднеразвитые клыковые ямки

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ЯИЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) длительный
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

КЕФАЛОГЕМАТОМА, КАК ПРАВИЛО, ПОЛНОСТЬЮ РАССАСЫВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1) 2-3
- 2) 8-9
- 3) 1-3
- 4) 4-6

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее легкий вред здоровью
- 2) не причинившее вред здоровью
- 3) причинившее тяжкий вред здоровью
- 4) причинившее вред здоровью средней тяжести

КОЛОТО-РЕЗАНУЮ РАНУ ШЕИ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

**ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА
СРАВНИТЕЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ СНАЧАЛА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ _____
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ФРАГМЕНТА**

- 1) анатомическая
- 2) видовая
- 3) половая
- 4) расовая

**КОЖА ИЗ ОБЛАСТИ «ПЕРГАМЕНТНОГО» ПЯТНА МОЖЕТ БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНА
ПУТЕМ ПОГРУЖЕНИЯ В**

- 1) ацетон
- 2) формалин
- 3) жидкость Ратневского
- 4) спирт

**ПРИ КАТАПУЛЬТИРОВАНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФОРМИРУЮТСЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ**

- 1) выхлопных газов
- 2) высокой температуры
- 3) атмосферного электричества
- 4) ударных перегрузок

**ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ МИЗИНЦА ЛЕВОЙ КИСТИ
НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

БОТУЛИЗМ ОТНОСИТСЯ К

- 1) микотоксикозам
- 2) токсикоинфекциям
- 3) пищевым токсикозам
- 4) заболеваниям дыхательных путей

ПО ВИДУ РАЗЛИЧАЮТ ВЫВИХИ

- 1) локальные
- 2) привычные
- 3) отдаленные
- 4) открытые

**РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ В
ПОЛУСОГНУТОМ ЕГО ПОЛОЖЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В**

СУСТАВАХ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ОЖГОВОЙ ТРАВМЫ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ОЖГОВЫМ ШОКОМ III-IV СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ПРОВОДИТСЯ В ОТДЕЛЕ

- 1) исследования вещественных доказательств
- 2) организационно-методическом
- 3) экспертизы живых лиц
- 4) сложных комиссионных и комплексных экспертиз

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ 1 СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЮТ В

- 1) подкожной жировой клетчатке
- 2) дерме
- 3) эпидермисе
- 4) глубоких тканях

НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫМ ФИБРИЛЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЭЛЕКТРОТОК ЧАСТОТОЙ (В ГЕРЦАХ)

- 1) 50
- 2) 10
- 3) 20
- 4) 30

К ДИСТРОФИИ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ НАРУШЕНИЕМ ПРОЦЕССОВ ВНУТРИКАНЕВОГО ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, ОТНОСЯТ

- 1) остеодистрофию
- 2) остеолиз
- 3) остеомалацию
- 4) остеоклазию

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ПОЛНОЕ ОКОСТЕНЕНИЕ СКЕЛЕТА СТОПЫ (ПО ДАННЫМ С.А. ЖДАНОВОЙ) НАСТУПАЕТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1) 14-16
- 2) 18-20
- 3) 30-32
- 4) 25-27

К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 35°C ОТНОСЯТ

- 1) отсутствие речевого общения
- 2) интенсивную мышечную дрожь
- 3) брадипноэ
- 4) брадикардию

КО ВТОРИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) интерстициальную
- 2) паренхиматозную
- 3) бронхопневмонию
- 4) аспирационную

ОБРАЗОВАНИЕ ВКОЛОЧЕННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) резком мышечном сокращении
- 2) воздействии в продольном направлении
- 3) скручивании по продольной оси кости
- 4) перпендикулярном воздействии тупого предмета

ПЛОД ПРИ МАССЕ МЕНЕЕ 1000 ГРАММ И ДЛИНОЙ МЕНЕЕ 35 СМ СЧИТАЕТСЯ

- 1) недоношенным
- 2) доношенным
- 3) зрелым
- 4) нежизнеспособным

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ДВИЖЕНИЙ В КОНЕЧНОСТЯХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий

- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ЛЁГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ КРАКОВРЕМЕННОЕ РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ НЕ БОЛЕЕ (В ДНЯХ)

- 1) 22
- 2) 21
- 3) 42
- 4) 41

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ВЫРАЖЕННЫМ МОНОПАРЕЗОМ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ОБНАРУЖЕНИЕ У НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ГРУБОГО ПОРОКА РАЗВИТИЯ НЕСОВМЕСТИМОГО С ЖИЗНЬЮ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1) мертворожденности
- 2) нежизнеспособности
- 3) незрелости
- 4) недоношенности

НАРУШЕНИЕ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДСТВИЕМ

- 1) развратных действий
- 2) отсутствия девственной плевы при рождении
- 3) сальпингоофарита
- 4) вульвовагинита

К НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ ИЗ ИНДИЙСКОЙ КОНОПЛИ, ОТНОСЯТ

- 1) марихуану
- 2) кокаин
- 3) героин
- 4) кодеин

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ БРОНХОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

4) стойкой утраты общей трудоспособности

ЯДАМИ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) коррозионные
- 2) едкие
- 3) деструктивные
- 4) функциональные

ЗЕРНИСТАЯ ДИСТРОФИЯ ПОРАЖАЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) костный мозг
- 2) спинной мозг
- 3) селезенку
- 4) сердце

УШИБ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА С РАЗВИТИЕМ ОСТРОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

К МИКРОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ЖИВОРОЖДЕННОСТИ ОТНОСЯТ

- 1) эластические волокна в виде спиралей
- 2) кубический альвеолярный эпителий
- 3) расправленные альвеолы
- 4) бронхоспазм

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЗАТЫЛОЧНОГО ШВА СО СТРЕЛОВИДНЫМ РАСПОЛАГАЕТСЯ КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

- 1) ламбда
- 2) астрион
- 3) базион
- 4) брегма

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РАН ОТ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД

- 1) исследования в ультрафиолетовых лучах
- 2) трасологический
- 3) контактно-диффузионный
- 4) обработки в уксусно-спиртовом растворе

ТУПУЮ ТРАВМУ БЕДРА, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЛЁГКИХ С РАЗВИТИЕМ УГРОЖАЮЩЕГО ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ _____ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ

- 1) общую
- 2) профессиональную
- 3) специальную
- 4) временную

ОТСУТСТВИЕ ОРУЖИЯ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ РАНЕНИИ ОТ ВЫСТРЕЛА В УПОР МОЖЕТ БЫТЬ РАССМОТРЕНО, КАК _____ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

- 1) субъективное
- 2) объективное
- 3) «позитивное»
- 4) «негативное»

ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ ТЕПЛОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) непроницаемость для паров воды одежда
- 2) усиленное питание
- 3) высокая влажность воздуха
- 4) неподвижность воздуха

ДЫРЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ПРАВОЙ ТЕМЕННОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАННОЕ ХАРАКТЕРОМ И ТЯЖЕСТЬЮ ТРАВМЫ, КАК ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

- 1) рассматривается иногда
- 2) рассматривается после смерти
- 3) рассматривается всегда

4) не рассматривается

ДВОЙНАЯ ПИЛА ЛЮЭРА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ

- 1) перепиливания задних дужек позвонков
- 2) распила костей черепа
- 3) разреза хрящевой ткани ребер
- 4) распила длинных и других костей

ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАНОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ С РАССЕЧЕНИЕМ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ МУЖЕЛОЖСТВА ПРОИЗВОДЯТ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ

- 1) женщин
- 2) мужчин
- 3) транссексуалов
- 4) гермафродитов

ОСНОВНЫЕ МЕРИДИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ СВОДА И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ПРИ СДАВЛЕНИИ ГОЛОВЫ В ПЕРЕДНЕ-ЗАДНЕМ НАПРАВЛЕНИИ РАСПОЛАГАЮТСЯ _____ ОТНОСИТЕЛЬНО САГИТТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

- 1) диагонально
- 2) кольцевидно
- 3) поперечно
- 4) продольно

ШОК ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ТОРПИДНОЙ ФАЗЫ СООТВЕТСТВУЕТ ТЯЖЕСТИ ШОКА

- 1) претерминальной
- 2) тяжёлой
- 3) средней
- 4) терминальной

ДЛИНА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО ПЛОДА НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ (В СМ)

- 1) 35-40
- 2) 38-57
- 3) 47-62
- 4) 50-55

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ (РАЗОГНУТОМ) ПОЛОЖЕНИИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 45%, КВАЛИФИЦИРУЮТ

КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОРОШИНОК В ОКРУЖНОСТИ РАНЫ НА ТЕЛЕ, НЕ ПРИКРЫТОМ ОДЕЖДОЙ, МОЖНО РЕШИТЬ ВОПРОС О

- 1) количестве выстрелов
- 2) дистанции выстрела
- 3) взаиморасположении пострадавшего и нападавшего
- 4) виде оружия

К ЯДАМ, ПОРАЖАЮЩИМ ОБЛАСТЬ ПЕРВИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОТНОСЯТ

- 1) деструктивные
- 2) функциональные
- 3) резорбтивные
- 4) едкие

КОЛИЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ, ДОСТАТОЧНОЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

ВАРИАНТОМ ТАНАТОГЕНЕЗА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗУЮЩИМИ ЯДАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гемическая аноксия
- 2) тканевая гипоксия
- 3) паралич дыхательного центра
- 4) периваскулярный отек головного мозга

ДЛЯ «СЕРДЕЧНОЙ» СМЕРТИ ЗНАЧИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1) выраженной гипертрофии миокарда
- 2) некроза миокарда
- 3) наличия крупных полей фиброзной ткани
- 4) инфарктирования кардиомиоцитов

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ЛЕВОЙ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни

- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА В КРОВИ ПРИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОМИЛЛЯХ)

- 1) 1,5-2,5
- 2) 0,5-1,5
- 3) 2,5-3,0
- 4) 2,0-2,5

К ОБЩЕГРУППОВЫМ ПРИЗНАКАМ ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОТНОСЯТ

- 1) пол, возраст, рост, расу
- 2) родимые пятна, цвет глаз
- 3) татуировки, следы скарификации
- 4) послеоперационные рубцы, врожденные дефекты

РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТМОРОЖЕНИЯ ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 15% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ У ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ЛОБОВОМ СТОЛКНОВЕНИИ ОТ УДАРА О

- 1) рулевое колесо
- 2) багажник
- 3) решетку радиатора
- 4) крышу салона

ЕСЛИ ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ОБУСЛОВИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ, ТО ЭТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ И НАСТУПИВШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОЦЕНИВАЮТСЯ КАК, ПРИЧИНИВШИЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) массивных лобулярных некрозов любого происхождения
- 2) плотной волокнистой соединительной ткани капсулы

- 3) междольковой соединительная ткани
- 4) клеток Ито печеночных долек

ЖЕЛТОВАТО-БУРЫЕ УЧАСТКИ НА КОНЬЮНКТИВЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЯТНАМИ

- 1) Вишневского
- 2) Минакова
- 3) Лярше
- 4) Тардые

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ СЕЛЕЗЕНКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ (СГИБАНИЕ ОТ 50° ДО 60°), ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 10%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ КОКАИНА ПРИВОДИТ К

- 1) гипергидрозу
- 2) летаргии
- 3) снижению интеллекта
- 4) ожирению

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ДВУСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ ВТОРОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий

4) тяжкий

К ПОВОДАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) неправильное его установление при рождении
- 2) определение эректильных дисфункций
- 3) фертильность
- 4) установление повреждения половых органов

ЗАКРЫТАЯ ТУПАЯ ТРАВМА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЖИВОТА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ ЛЁГКИХ СИЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившая
- 4) средней тяжести

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ПЕРВИЧНЫМ И НЕОТЛОЖНЫМ СЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) определение давности наступления смерти
- 2) допрос эксперта
- 3) осмотр места происшествия
- 4) составление протокола осмотра места происшествия

ОДИНОЧНОЕ СЛЕПОЕ КОЛОТОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЛОСТЬ ПЕРИКАРДА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЦА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР ПО НЕСКОЛЬКИМ АНАТОМИЧЕСКИМ ЛИНИЯМ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНОГО УЧАСТКА ГРУДНОЙ СТЕНКИ ПО ТИПУ «РЕБЕРНОГО КЛАПАНА» ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней степени тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью

- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

ПЕРЕЛОМ ЩИТОВИДНОГО ХРЯЩА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМОВ ПОЗИЦИОННОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЙ РАЗВИВАЕТСЯ СИНДРОМ

- 1) вестибуло-атаксический
- 2) кататонический
- 3) миоренальный
- 4) астено-вегетативный

РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПОСМЕРТНОЙ СЕКРЕЦИЕЙ В ОТВЕТ НА _____ ВВЕДЕНИЕ АДРЕНАЛИНА

- 1) подкожное
- 2) внутримышечное
- 3) внутривенное
- 4) ректальное

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ СЕЛЕЗЕНКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРИЖИЗНЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ ВЫПОЛНЯЮТ ПРОБУ

- 1) Галена – Шрейера
- 2) Гоппе – Зейлера
- 3) Бокариуса
- 4) Владимирского

ПОЯСОК МЕТАЛЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ВХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ

- 1) в 1 зоне близкой дистанции
- 2) во 2 зоне близкой дистанции
- 3) в упор
- 4) через преграду

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДЭКСПЕРТНЫХ, С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ, В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ВРАЧОМ-СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ЭКСПЕРТОМ В

- 1) протокол допроса потерпевшего
- 2) медицинскую справку
- 3) заключение эксперта
- 4) протокол допроса врача

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №

- 1) 463
- 2) 225
- 3) 522
- 4) 346

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА В СОСТОЯНИИ ЖИРОВΟΣКА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ

- 1) механизм наступления смерти
- 2) давность наступления смерти
- 3) причину смерти
- 4) ориентировочный срок пребывания во влажной среде

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОТ ТРЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ

- 1) размозжение
- 2) кровоподтёк
- 3) ссадина (царапина)
- 4) ушибленная рана

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ ОТНОСИТСЯ К

- 1) микотоксикозам
- 2) пищевым интоксикациям
- 3) пищевым токсикоинфекциям
- 4) стафилококковой интоксикации

КОЛОТУЮ РАНУ СТЕНКИ ПРЯМОЙ КИШКИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПОЛОСТЬ МАЛОГО ТАЗА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ТАК НАЗЫВАЕМЫМ «ВРАЧЕБНЫМ ДЕЛАМ» СОСТАВЛЯЕТ КОМИССИЯ

- 1) экспертов Бюро судебно-медицинской экспертизы
- 2) Министерства здравоохранения Российской Федерации
- 3) медицинского учреждения
- 4) фонда обязательного медицинского страхования

КРОВОИЗЛИЯНИЯ В СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ЖЕЛУДКА ПРИ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ПРИОБРЕТАЮТ БУРО-КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ

- 1) соляной кислоты
- 2) гнилостной флоры
- 3) пепсина
- 4) амилазы

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТНОГО ДИАМЕТРА ЧЕРЕПА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РАССТОЯНИЕ

- 1) между точками базион и назион
- 2) между точками эурион
- 3) от глабеллы до опистокраниона
- 4) от точки базион до точки брегма

СОВОКУПНОСТЬ ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ УЗОРОВ ГРЕБНЕЙ ПАЛЬЦЕВ, ЛАДОНЕЙ И ПОДОШВ ЧЕЛОВЕКА И ПРИМАТОВ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1) дерматология
- 2) дерматоглифика
- 3) морфология
- 4) антропология

ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ОПИАТЫ НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ (В МИНУТАХ)

- 1) 20-25
- 2) 10-15
- 3) 50-60
- 4) 30-40

ИЗМЕНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ВИДА ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) обезображением
- 2) изгладимостью
- 3) неизгладимостью
- 4) аномалией развития

ПОД СПОСОБНОСТЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО СУЩЕСТВОВАТЬ ВНЕ ОРГАНИЗМА МАТЕРИ БЕЗ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОНИМАЮТ

- 1) живорожденность
- 2) доношенность
- 3) зрелость

4) жизнеспособность

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО И ДВУХ СУСТАВОВ I ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) лёгкий

КОЛОТО-РЕЗАНое ПРОНИКАЮЩЕЕ РАНЕНИЕ ЖИВОТА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И КРУПНЫХ СОСУДОВ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившее
- 4) средней тяжести в

ОСНОВНОЙ МИШЕНЬЮ ДЛЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) лимфоциты
- 2) гепатоциты
- 3) энтероциты
- 4) эпителиоциты

ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПА ПО МЕТОДУ ВИРХОВА

- 1) каждый орган извлекается и исследуется отдельно
- 2) внутренние органы исследуются в пяти топографических комплексах
- 3) внутренние органы исследуются без извлечения из трупа
- 4) внутренние органы исследуются без отделения от органокомплекса

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГЕМОТОРАКС КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

ПЕРЕЛОМ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ МАГИСТРАЛЬНОГО СОСУДА И/ ИЛИ НЕРВА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) осложненным
- 2) патологическим
- 3) травматическим
- 4) атипичным

ВЫПОЛНИВ ЭКСПЕРТИЗУ, ПЕРСОНАЛЬНО УПАКОВЫВАЕТ ВСЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗВРАЩЕНИЮ ОБЪЕКТЫ

- 1) следователь
- 2) руководитель ГСМЭУ
- 3) эксперт ГСМЭУ
- 4) санитар

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОГУТ ОБРАЗОВАТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫСТРЕЛА ИЗ

- 1) водного электрического пистолета
- 2) газового ствольного оружия
- 3) метательного стрелкового оружия
- 4) пневматического пулевого ружья

РАЗЛИЧАЮТ _____ КОСТНОЙ МОЗОЛИ

- 1) 5 видов
- 2) 2 вида
- 3) 4 вида
- 4) 3 вида

К СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА НА 40 НЕДЕЛЕ ЕГО ВНУТРИУТРОБНОЙ ЖИЗНИ С ПРОЯВЛЕНИЕМ ПРИЗНАКОВ ЗРЕЛОСТИ ОТНОСЯТ

- 1) доношенность
- 2) живорожденность
- 3) новорожденность
- 4) жизнеспособность

ПЕРЕЛОМ ОДНОЙ КОСТИ С ОБРАЗОВАНИЕМ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ОТЛОМКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) полным
- 2) простым
- 3) типичным
- 4) сочетанным

БЕРТОЛЕТОВА СОЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ЯДОМ

- 1) гемолитическим
- 2) функциональным
- 3) деструктивным
- 4) метгемоглобинообразующим

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий

- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

ГИДРОЛИТИЧЕСКИМ РАСЩЕПЛЕНИЕМ ЖИРА ТКАНЕЙ ТРУПА, ЕГО ОКИСЛЕНИЕМ И ОБРАЗОВАНИЕМ СОЛЕЙ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гнилостная трансформация
- 2) мацерация
- 3) сапонификация
- 4) мумификация

ТРУПНОЕ ПЯТНО НАЧИНАЕТ СВОЁ РАЗВИТИЕ СО СТАДИИ

- 1) ингибиции
- 2) имбибиции
- 3) диффузии
- 4) гипостаза

ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ГНИЕНИЮ, ПО ОКОНЧАНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ХРАНЯТ В МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕРАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) -2°C
- 2) -18°C
- 3) -4°C
- 4) -1°C

ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ЛЕВОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ГИСТОЛОГИЧЕСКИ РАК ПЕЧЕНИ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) плоскоклеточным
- 2) солидным
- 3) недифференцированным
- 4) крупноузловым

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЬ

- 1) селезенку
- 2) трахею
- 3) головной мозг
- 4) надпочечники

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЕКОМЫХ И ДРУГИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ В ХОДЕ КРИМИНАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ОТНОСЯТ К СУДЕБНОЙ

- 1) зоологии
- 2) энтомологии
- 3) альгологии
- 4) микологии

МИНИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ О ПРИЖИЗНЕННОМ ПРЕБЫВАНИИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА, ЯВЛЯЕТСЯ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 50
- 2) 30
- 3) 40
- 4) 20

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ (СОГНУТОМ) ПОЛОЖЕНИИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) лёгкий

ОТКРЫТЫЙ ЗАПИРАТЕЛЬНЫЙ ВЫВИХ БЕДРА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

В СОСТАВ СМЕСИ НИКИФОРОВА ВХОДЯТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ И

- 1) перекись водорода
- 2) вода
- 3) ацетон
- 4) безводный серный эфир

НОРМАТИВНЫМ АКТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.12.2015 № 933н
- 2) приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.01.2006 № 40
- 3) приказ Министерства здравоохранения РФ от 12.05.2010 № 346н
- 4) Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2001 № 73-ФЗ

ПОВОДОМ ДЛЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) отказ живого лица явиться на судебное заседание
- 2) определение обезображения лица
- 3) определение факта побоев
- 4) установление истязания

ВЫРАЖЕННЫЙ ПАРЕЗ ОДНОЙ ИЛИ ОБЕИХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ «КОНСКОГО ХВОСТА», ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

РАЗРЕШЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ОКОЧЕНЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ С

- 1) перикарда
- 2) миокарда
- 3) мышц нижних конечностей
- 4) мышц верхних конечностей

К НАРКОТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) налоксон
- 2) промедол
- 3) морфин
- 4) налорфин

К МЕХАНИЗМАМ ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) блокирование сульфгидрильных групп
- 2) угнетение холинэстеразы
- 3) образование свободных радикалов
- 4) ингибирование цитохромоксидаз

ТЕПЛОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

- 1) латентные
- 2) подострые

- 3) тяжелые
- 4) легкие

К ПОВРЕЖДЕНИЯМ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО СГИБАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) фрагментарные переломы остистых отростков
- 2) фрагментарные переломы поперечных отростков
- 3) клиновидные уплощения тел в задних отделах
- 4) клиновидные уплощения тел в передних отделах

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТРУПНЫХ ПЯТЕН ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) возрастом
- 2) позой
- 3) наличием одежды
- 4) причиной смерти

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВЬ ИЗ ТРУПА НЕОБХОДИМО БРАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ _____ ЧАСОВ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1) 52
- 2) 36
- 3) 24
- 4) 48

РАССТОЯНИЕ ВЫСТРЕЛА ДРОБЬЮ С НЕБЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПО

- 1) обнаружению частиц металла вокруг входной раны
- 2) присутствию копоти вокруг входной раны
- 3) наличию порошинок вокруг раны
- 4) морфологическим особенностям входного повреждения

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ДРОВОЕ РАНЕНИЕ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ С РАЗРЫВОМ НАРУЖНОЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, ПРОИЗВЕДЁННОЕ С БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИИ У ТРУПА ПРИЗНАКОВ СМЕРТИ ОТ ОСОБО

ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ СООБЩАЕТ

- 1) лаборанту
- 2) главному врачу лечебного учреждения
- 3) начальнику следственных органов
- 4) руководителю государственного судебно-экспертного учреждения

К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ ПЕРЕГРЕВАНИЯ ОРГАНИЗМА ОТНОСЯТ

- 1) физическая нагрузка
- 2) высокую влажность воздуха
- 3) функциональное состояние организма
- 4) ограниченный прием жидкости

ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА (СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА) МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА: 1 ДОЛЖНОСТЬ НА _____ УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ УЧЕТА ИССЛЕДОВАНИЙ В ГОД

- 1) 15000
- 2) 2300
- 3) 2000
- 4) 10000

К КОАГУЛЯЦИОННОМУ НЕКРОЗУ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ДЕРМЫ С ЧАСТИЧНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ РОСТКОВОГО СЛОЯ ОТНОСЯТ ОЖОГИ _____ СТЕПЕНИ

- 1) 2
- 2) 3а
- 3) 4
- 4) 3б

ДИАМЕТР ЯДЕР ОКОСТЕНЕНИЯ В ПЯТОЧНОЙ КОСТИ СОСТАВЛЯЕТ (В ММ)

- 1) 3-4
- 2) 6,5-9
- 3) 8-10,5
- 4) 5-7

ПРИЗНАКОМ РУБЛЕННОЙ РАНЫ, ПРИЧИНЕННОЙ ОСТРОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ЛЕЗВИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- 1) ровно пересеченных волос
- 2) непересеченных волос
- 3) вывернутых волосяных луковиц
- 4) фрагментов волос на поверхности орудия

О ПРИЖИЗНЕННОМ НАХОЖДЕНИИ В ОЧАГЕ ВОЗГОРАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ ЧАСТИЦ КОПОТИ В

- 1) складках одежды
- 2) клетках печени

- 3) наружных слуховых ходах
- 4) полости рта и носа

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БОЛЬШИМИ ВЕРТЕЛАМИ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 13-14
- 2) 9-10
- 3) 6,7-6,8
- 4) 7,2-7,3

В ПРОТЕИНУРИЧЕСКУЮ СТАДИЮ АМИЛОИД ПОЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1) почечной лоханке
- 2) капсуле почек
- 3) корковом слое
- 4) клубочках почек

ДИАГНОСТИКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ КЛЕТОК ИЗ ПЕЧЕНИ ОСНОВАНА НА ОБНАРУЖЕНИИ

- 1) альвеолоцитов
- 2) гепатоцитов
- 3) хондроцитов
- 4) остеоцитов

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ПУТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ЧЕРЕЗ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА

- 1) рука-рука
- 2) рука-ноги
- 3) рука-нога
- 4) нога-нога

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В СОГНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее тяжкий вред здоровью
- 2) причинившее вред здоровью средней тяжести
- 3) не причинившее вред здоровью
- 4) причинившее легкий вред здоровью

ТУПАЯ ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ЖИВОТА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ РАЗВИТИЕМ СЕПСИСА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившая
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ НАРУЖНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА

- 1) груди
- 2) нижних конечностей
- 3) живота
- 4) головы и шеи

В ПРОМЕЖУТКЕ ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ РУБЕЦ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) тестоватым
- 2) пористым
- 3) мягким
- 4) плотным

ПО КАТЕГОРИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАЗЛИЧАЮТ СМЕРТЬ

- 1) физиологическую
- 2) насильственную
- 3) скоропостижную
- 4) клиническую

К ДЕСТРУКТИВНЫМ ЯДАМ ОТНОСЯТ

- 1) щелочи
- 2) окислители
- 3) кислоты
- 4) соединения мышьяка

ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ДВИЖЕНИЙ В НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПЯСТИ, ВЫЗВАВШАЯ РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОЙ КИСТИ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ПРИ ПЕРЕГРЕВАНИИ ОРГАНИЗМА НАБЛЮДАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ ГАЗОВОГО СОСТАВА КРОВИ В ВИДЕ НАРАСТАЮЩЕЙ

- 1) гипероксигенации
- 2) гипоксигенации
- 3) гиперкапнии
- 4) гипокapнии

ТИП ГИПОКСИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ КРОВΟΣНАБЖЕНИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ КИСЛОРОДОМ ВСЛЕДСТВИЕ ГИПОВОЛЕМИИ ИЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА, ОТНОСЯТ К _____ ГИПОКСИИ

- 1) циркуляторной
- 2) тканевой
- 3) гипоксической
- 4) гемической

ОБТУРАЦИОННО-АСПИРАЦИОННАЯ ФОРМА НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ОБУСЛОВЛЕНА

- 1) бронхоспазмом
- 2) стенозом гортани
- 3) пневмонией
- 4) плевритом

ПИНЦЕТОМ С ШИРОКИМИ ЗУБЧАТЫМИ ЛАПКАМИ ДЛЯ ЗАХВАТЫВАНИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПИНЦЕТ

- 1) медицинский
- 2) анатомический
- 3) Шора
- 4) хирургический

УШИБ ГРУДНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С РАЗВИТИЕМ НИЖНЕГО ПАРАПАРЕЗА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

РУБЯЩИЙ ПРЕДМЕТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) полозка и острого конца
- 2) острого края и удлинённого клинка
- 3) острого края и большой массы
- 4) полозка и острого края

К ВОССТАНОВЛЕНИЮ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТКАНИ ВЗАМЕН ПОГИБШИХ ОТНОСЯТ

- 1) фибриноз
- 2) склероз

- 3) регенерацию
- 4) цирроз

К ПОВРЕЖДЕНИЯМ У ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАБОТАЮЩЕЙ ТУРБИНЫ НА ЗЕМЛЕ ОТНОСЯТ

- 1) компрессионные переломы грудного отдела позвоночника
- 2) расчленение тела
- 3) переломы плечевых и бедренных костей
- 4) компрессионные переломы шейного отдела позвоночника

ШИРИНА ПОГРУЖЕННОЙ ЧАСТИ КЛИНКА КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО ДЛИНЕ

- 1) разреза от скоса обуха
- 2) зияющей раны
- 3) основного разреза
- 4) дополнительного разреза

ПРИ ГНИЕНИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СВЯЗЫВАНИЯ СУЛЬФИДА ВОДОРОДА С ЖЕЛЕЗОМ ОБРАЗУЕТСЯ

- 1) сероводород
- 2) сульфгемоглобин
- 3) сульфид железа
- 4) сульфмиоглобин

ПОНИЖЕНИЕ РЕФЛЕКСОВ, СНИЖЕНИЕ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВПЛОТЬ ДО ЕЕ ПОТЕРИ, ГИПОТЕРМИЯ, БРАДИКАРДИЯ И БРАДИПНОЭ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ____ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

- 1) тяжелой
- 2) легкой
- 3) сильной
- 4) средней

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТКАННЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОТСУТСТВИЕМ _____ КОНЦОВ

- 1) осыпанных
- 2) остроугольных
- 3) закругленных
- 4) распушенных

ЧЕТВЕРТОЙ СТАДИЕЙ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЯ

- 1) коллапса
- 2) ретикулярного криза
- 3) гидремическая
- 4) восстановления

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ «КОНСКОГО ХВОСТА», КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

- 1) центробежно
- 2) беспорядочно
- 3) обзорно
- 4) ориентировочно

К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

- 1) мышечное окоченение
- 2) пятна Лярше
- 3) асистолию
- 4) признак Белоглазова

НЕИЗГЛАДИМОЕ ОБЕЗОБРАЖИВАНИЕ ЛИЦА ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ЛЕВОЙ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

СОГЛАСНО МКБ-10 ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В ДНЯХ)

- 1) 56
- 2) 32
- 3) 28
- 4) 44

ОТКРЫТЫЙ ЗАДНИЙ ВЫВИХ ГОЛЕНСТОПНОГО СУСТАВА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ПЕРЕЛОМ ТЕЛА С III ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ЯЙЦА ЖИВЫХ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ УКЛАДЫВАЮТ В ПРОБИРКИ НА

- 1) лигнин
- 2) перфорированные крышки
- 3) фильтровальную бумагу
- 4) марлевую салфетку

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ МУМИФИКАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ЧЕРЕЗ ____ МЕСЯЦА/МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

- 1) 7-8
- 2) 3-4
- 3) 1-2
- 4) 5-6

КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ Th₅-Th₈ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА И ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ УШИБА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКСПЕРТАМИ ОДНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ В

- 1) частичном объеме в рамках задания
- 2) полном объеме в рамках поставленного задания
- 3) пределах только своей компетенции
- 4) рамках одного вопроса

ПРОЦЕСС ОМЫЛЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ В

- 1) связках
- 2) сухожилиях
- 3) мышцах
- 4) подкожной жировой клетчатке

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЛОМА ВОЛЮМЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ, С МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- 1) лобарную пневмонию
- 2) очаг казеозной пневмонии
- 3) очаг неоплазмы
- 4) межуточную пневмонию

УЗЕЛ ОТСУТСТВУЕТ У ПЕТЛИ

- 1) открытой
- 2) замкнутой
- 3) скользящей
- 4) множественной

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ БРОНХОВ В ВИДЕ ЦИЛИНДРА ИЛИ МЕШКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) спазмом
- 2) бронхоэктазом
- 3) фиброзом
- 4) эмфиземой

ЯДРА ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ОБЩЕМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА, В ОСНОВНОМ

- 1) матовые
- 2) прозрачные
- 3) темные
- 4) светлые

СОПРОТИВЛЕНИЕ КОЖИ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА СВЯЗАНО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЛЩИНОЙ

- 1) мышечной ткани
- 2) дермы
- 3) рогового слоя эпидермиса
- 4) подкожной клетчатки

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТЕЛ ПОГИБШИХ ПРИЗНАКИ ВЗРЫВНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ В УСЛОВИЯХ БЫСТРОЙ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ВЫСОТЕ (ТЫСЯЧ МЕТРОВ)

- 1) 3-2
- 2) 1,5-1
- 3) 5-4
- 4) 6-9

ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ В МЕСТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛЫ В ОСНОВНОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) химическими элементами поверхности травмирующего предмета
- 2) конструктивными особенностями травмирующего предмета
- 3) свойствами травмирующей поверхности тупого предмета: размер, форма и рельеф
- 4) упруго-эластическими свойствами травмирующего предмета

ЖИРЫ МИКРОСКОПИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) конго красным
- 2) гематоксилином
- 3) суданом III
- 4) эозином

К УМЫШЛЕННОМУ ПРИЧИНЕНИЮ ВРЕДА СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ С ЦЕЛЬЮ УКЛОНЕНИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОТНОСЯТ

- 1) симуляцию
- 2) членовредительство
- 3) диссимуляцию
- 4) аггравацию

СОДЕРЖИМОЕ ЖЕЛУДКА ПОСЛЕ ПРИЁМА ЖИРНОЙ ПИЩИ ПОПАДАЕТ В ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНУЮ КИШКУ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1) 0,5-1,5
- 2) 6-10
- 3) 2-3
- 4) 1,5-2

**ПРИ КАСАТЕЛЬНОМ ПУЛЕВОМ РАНЕНИИ НАИБОЛЬШАЯ ГЛУБИНА РАНЫ
ЛОКАЛИЗОВАНА**

- 1) у выходного конца
- 2) у входного конца
- 3) в третьей четверти
- 4) в центральной части

**КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ
НАНЕСЕНИЯ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА, ПРОНИКАЮЩЕЙ В
ПОЛОСТЬ МАЛОГО ТАЗА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

КОСТНЫЙ ВОЗРАСТ У РЕБЕНКА ДО 3 ЛЕТ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО СТЕПЕНИ

- 1) увеличения родничков
- 2) дифференциации костного скелета
- 3) истерченности ногтевых пластинок
- 4) закрытия височного шва

**СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ТРУПОВ ВКЛЮЧАЕТ НАЛИЧИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУПОВ НЕ
МЕНЕЕ**

- 1) 8
- 2) 10
- 3) 2
- 4) 4

**ТРАВМА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ ИЗ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ В
КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ**

- 1) 9
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 7

**КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ
ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) длительное расстройство здоровья

- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

НАЧАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ РАЗВИТИЯ ТРУПНЫХ ПЯТЕН ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) аутолиз
- 2) стаз
- 3) трупный натек
- 4) имбибиция

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОЛИОМИЕЛИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1) капсулу почки
- 2) кожу
- 3) лимфатические узлы
- 4) продолговатый и спинной мозг

ПЕРЕЛОМ НАДГОРТАННИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ КОЛОТОЙ РАНЫ СТЕНКИ ПРЯМОЙ КИШКИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В КЛЕТЧАТКУ МАЛОГО ТАЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ЗАКРЫТАЯ ТУПАЯ ТРАВМА ЖИВОТА И ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ УШИБ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА», КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившая
- 4) средней тяжести

1 ФАЗОЙ КЛЕТОЧНОЙ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фибробластическая
- 2) тромбоцитарная
- 3) макрофагическая
- 4) лейкоцитарная

ПЕРИОД ПОЯВЛЕНИЯ ОКОСТЕНЕНИЯ ГОЛОВКИ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА НАСТУПАЕТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1) 18-20
- 2) 3-5
- 3) 14-16
- 4) 8-9

БЫСТРО ПОДВЕРГАЮТСЯ ВЫСЫХАНИЮ УЧАСТКИ КОЖИ ТРУПА, ЛИШЕННЫЕ

- 1) дермы
- 2) эпидермиса
- 3) мышц
- 4) подкожной основы

ЛОЖНЫЙ СУСТАВ, СФОРМИРОВАВШИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАРАЩЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ ДИАФИЗОВ ЛЕВЫХ ЛОКТЕВОЙ И ЛУЧЕВОЙ КОСТЕЙ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НАДПОЧЕЧНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

ПРИЧИНАМИ НЕДОСТАТКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МОГУТ БЫТЬ

- 1) анатомо-физиологические пороки развития
- 2) болезни системы пищеварения
- 3) поражения центральной нервной системы
- 4) повреждения жизненно важных органов

РАЗРУШЕНИЕ (СМЯТИЕ) КРАЕВ ПЕРЕЛОМА И СКОЛ КОМПАКТНОГО СЛОЯ ОБРАЗУЮТСЯ В ЗОНЕ

- 1) изгиба
- 2) кручения
- 3) растяжения
- 4) повторной травматизации

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА» СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ

ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ РЕЗКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, АТРОФИЯ МЫШЦ ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающий жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

СВОБОДНОЕ И СТУПЕНЧАТОЕ ПАДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ВИДАМИ ПАДЕНИЯ

- 1) на лестничном марше
- 2) на лестничной площадке
- 3) на плоскости
- 4) с высоты

ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ГРУДНЫХ Th3-Th4 ПОЗВОНКОВ С ПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

- 1) основания для производства экспертизы
- 2) исчерпывающие ответы на поставленные вопросы
- 3) вопросы, подлежащие разрешению
- 4) результаты предшествующих экспертиз

ПОСТЕПЕННОЕ КРАТЕРООБРАЗНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ ОБРАЗУЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1) 50
- 2) 45
- 3) 40
- 4) 35

ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ СЕРДЦА СВЯЗАНО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОРАЖЕНИЕМ

- 1) аорты
- 2) коронарных артерий
- 3) верхней полой вены
- 4) сонных артерий

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ПЛОЩАДЬ ПОРАЖЕНИЯ ТЕЛА ПРИ ОЖОГАХ ПЕРЕДНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУДИ, ОБОИХ БЕДЕР, ЖИВОТА СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 27
- 2) 18
- 3) 45
- 4) 54

НЕОСОЗНАННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ПОДЭКСПЕРТНОГО ВЫЗВАТЬ СОЧУВСТВИЕ ОКРУЖАЮЩИХ ЯВЛЯЕТСЯ АГГРАВАЦИЕЙ

- 1) пассивной
- 2) патологической
- 3) активной
- 4) подсознательной

ВЫСТРЕЛ С БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- 1) дистанцию с проявлением действия дополнительных факторов выстрела
- 2) выстрел с расстояния 10 м
- 3) выстрел с расстояния вытянутой руки
- 4) дистанцию с отложением копоты на внутреннем слое преграды

ПРИ КАСАТЕЛЬНОМ ПУЛЕВОМ РАНЕНИИ В ТИПИЧНЫХ СЛУЧАЯХ НАИБОЛЬШАЯ ГЛУБИНА РАНЫ НА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ТЕЛА ЛОКАЛИЗОВАНА

- 1) в третьей четверти
- 2) у выходного конца
- 3) у входного конца
- 4) в центральной части

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ЭТАНОЛОМ ОТМЕЧАЮТ ИНТЕНСИВНУЮ ____ ОКРАСКУ ТРУПНЫХ ПЯТЕН

- 1) вишнево-синюшную
- 2) сине-багровую
- 3) розоватую
- 4) серо-синюшную

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ (СГИБАНИЕ ОТ 50° ДО 60°), ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 10%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ БРОНХОВ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ПРИКУСА И АКТА ЖЕВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА В ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ ОТДЕЛЕ С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

**ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ПЕЧЕНИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ**

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

**К ОБЩИМ ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ХОД РЕГЕНЕРАЦИИ, ОТНОСЯТ, В ТОМ
ЧИСЛЕ**

- 1) объем повреждения
- 2) состояние нейротрофики
- 3) состояние сосудов
- 4) возраст

**БРОНХОРЕЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
ОБУСЛОВЛЕНА**

- 1) возбуждением М-холинореактивных структур
- 2) возбуждением Н-холинореактивных структур
- 3) повышением проницаемости мембран
- 4) гемодинамическими расстройствами

**В СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ ВХОДИТ**

- 1) камера электрофоретическая вертикальная
- 2) автомат для окрашивания гистологических срезов и мазков
- 3) распылитель компрессорный
- 4) денситометр для анализа пластин

**СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ЖИДКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) легкий

ВЕЛИЧИНА ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ НАПРЯМУЮ КОРРЕЛИРУЕТ С

- 1) содержанием этанола в крови
- 2) половой принадлежностью
- 3) темпом умирания
- 4) возрастом

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ
ОФОРМЛЯЕТСЯ**

- 1) заключение эксперта

- 2) протокол комиссионной судебно-медицинской экспертизы
- 3) акт комиссионной судебно-медицинской экспертизы
- 4) акт комплексной судебно-медицинской экспертизы

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) наличием противоречия между результатами первичной экспертизы и данными следствия
- 2) личной заинтересованностью следователя результатами экспертизы
- 3) неудовлетворенностью руководителя ГСЭУ результатами экспертизы
- 4) отсутствием сомнений в правильности выводов экспертизы

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГРУДНОГО ПРОТОКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ТКАНИ ИЗ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ГЛИКОЗИДАМИ НЕОБХОДИМО

- 1) законсервировать этанолом
- 2) промыть водой
- 3) зафиксировать в формалине
- 4) выдержать в ацетоне

ПРИ ТЕПЛОВОМ РАВНОВЕСИИ ОТДАЧА ТЕПЛА ИСПАРЕНИЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 10-15
- 2) 40-46
- 3) 30-38
- 4) 20-25

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ДВУХСТОРОННИМИ ПОЛНЫМИ РАЗРЫВАМИ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ СИСТЕМЫ РЕЗУС В ЖИДКОЙ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) блокирующий тест

- 2) непрямая проба Кумбса
- 3) реакция агглютинации
- 4) реакция конгломинации

ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РЕЗОРБТИВНОМ ДЕЙСТВИИ ЕДКОГО ЯДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) печеночно-почечная недостаточность
- 2) паралич дыхательного и сосудистого центров
- 3) шок
- 4) асфиксия в результате спазма голосовой щели

РАЗРЕШЕНИЕ ТРУПНОГО ОКОЧЕНЕНИЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРОИСХОДИТ В

- 1) ягодичных мышцах
- 2) сердце
- 3) гладкой мускулатуре
- 4) мышцах спины

К ИСКУССТВЕННЫМ БОЛЕЗНЯМ ОТНОСЯТ

- 1) диссимуляцию
- 2) аггравацию
- 3) членовредительство
- 4) дезаггравацию

ПРИЗНАКОМ ПРИЖИЗНЕННОСТИ ПРИ ТРАВМЕ ГРУДИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) подкожная эмфизема
- 2) сгибательный перелом грудины
- 3) разрыв медиастинальной плевры
- 4) повреждение легких концами отломков ребер

ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ДИХЛОРЕТАНОМ, ВЫЯВЛЯЮТ

- 1) ишемию
- 2) тигролиз
- 3) сладж эритроцитов
- 4) кровоизлияния

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ АНЕВРИЗМЫ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ВНУТРИКАНЕВЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПРИЗНАКОВ КРОВОПОТЕРИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ДЛЯ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТО ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ВЫЕЗЖАЕТ ____ ГРУППА

- 1) оперативно-следственная
- 2) поисковая
- 3) волонтерская
- 4) спасательная

НАРУШЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повреждением
- 2) угрожающим жизни
- 3) утратой трудоспособности
- 4) расстройством здоровья

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ МИЗИНЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ БОЛТАЮЩИЙСЯ ЛЕВЫЙ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗЕКЦИИ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕВЫХ ПЛЕЧЕВОЙ И ЛОКТЕВОЙ КОСТЕЙ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПРЕДПОЛОЖИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПУЛЕЙ, ПРОШЕДШЕЙ ЧЕРЕЗ КАКУЮ-ЛИБО ПРЕГРАДУ ПЕРЕД ПОПАДАНИЕМ В ТЕЛО, МОЖНО ПО

- 1) локализации огнестрельных ранений
- 2) направлению раневого канала
- 3) расположению огнестрельных ран от подошвенной поверхности
- 4) обнаружению инородных частиц в раневом канале

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

КРОВОИЗЛИЯНИЯ В АДВЕНТИЦИЮ СОННЫХ АРТЕРИЙ (ПРИЗНАК МАРТИНА) ВЫЯВЛЯЮТ ПРИ

- 1) повешении
- 2) аспирации
- 3) компрессионной асфиксии
- 4) асфиксии в замкнутом пространстве

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ (КОЖА, ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ, ВЫДЕЛЕНИЯ И ДР.), ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ _____ СУТОК ПОСЛЕ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ

- 1) трех
- 2) четырех
- 3) двух
- 4) одних

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА ОПРЕДЕЛЯЮТ _____ ИССЛЕДОВАНИЕМ

- 1) гистологическим
- 2) иммуногистохимическим
- 3) газохроматографическим
- 4) морфометрическим

ГЛАВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАНЕНИЯ ФРАГМЕНТИРОВАВШЕЙСЯ ПУЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гистологический
- 2) газохроматографический
- 3) рентгенологический
- 4) стереомикроскопический

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ 1 СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В

- 1) глубоких тканях
- 2) дерме
- 3) эпидермисе
- 4) подкожно-жировой клетчатке

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА В ЖЕЛУДОЧНОМ СОДЕРЖИМОМ, БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В КРОВИ ПО ОТНОШЕНИЮ К МОЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО ОТ ПРИЕМА СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПРОШЛО НЕ БОЛЕЕ (В ЧАСАХ)

- 1) 0,5
- 2) 2
- 3) 1,5

4) 5

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОСТКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» ПОСЛЕ КОНТАКТА С КРОВЬЮ ОГРАНИЧЕНЫ (В ЧАСАХ)

- 1) 24
- 2) 12
- 3) 48
- 4) 72

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ КИСЛОТАМИ И ЕДКИМИ ЩЕЛОЧАМИ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) $\frac{1}{2}$ печени с невскрытым желчным пузырем
- 2) пищевод
- 3) печень
- 4) плоские кости

АНИЗОКОРИЯ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ

- 1) инфаркте миокарда
- 2) нейросифилисе
- 3) язвенной болезни желудка
- 4) атипичной пневмонии

РУБЦОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ УТРАТЫ СПОСОБНОСТИ К

- 1) зачатию
- 2) оплодотворению
- 3) рождению
- 4) вынашиванию

В СРОКИ ОТ ОДНОГО ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ РУБЦЫ ИМЕЮТ ____ ЦВЕТ

- 1) белесоватый
- 2) коричневый
- 3) розовый
- 4) красновато-фиолетовый

ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ НА СТАДИИ КРАСНОГО ОПЕЧЕНЕНИЯ УСИЛИВАЕТСЯ ____ ЭРИТРОЦИТОВ

- 1) стаз
- 2) диапедез
- 3) адгезия
- 4) сладж

ПРИ ФИБРИНОИДНОМ НАБУХАНИИ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА, ПРОПИТАННЫЕ БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ, ОКРАШИВАЮТСЯ В ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ

- 1) конго красным

- 2) гематоксилином
- 3) пирюфуксином
- 4) эозином

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКЕЛЕТИРОВАННЫХ ОСТАНКОВ В ГРУНТЕ ОТМЕЧАЮТ

- 1) особенности одежды на частях тела
- 2) особенности краев кожи
- 3) глубину и способ захоронения
- 4) наличие и степень выраженности трупных изменений

ОТЛОЖЕНИЕМ ИЗВЕСТИ В АТЕРОМАТОЗНЫЕ МАССЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) атероматоз
- 2) изъязвление
- 3) липосклероз
- 4) атерокальциноз

ДОКУМЕНТОМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ В СЛУЧАЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ ГРУППОЙ ЭКСПЕРТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) протокол комиссионной судебно-медицинской экспертизы
- 2) заключение эксперта
- 3) акт комплексной судебно-медицинской экспертизы
- 4) акт комиссионной судебно-медицинской экспертизы

ПРЕДОТВРАТИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЦИАНИДАМИ УДАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕМ

- 1) глюкозы
- 2) лактозы
- 3) амилазы
- 4) пептидазы

Т-ОБРАЗНЫМ СЕКЦИОННЫМ РАЗРЕЗОМ, ПРИ КОТОРОМ ДУГООБРАЗНЫЙ РАЗРЕЗ ПРОХОДИТ НА УРОВНЕ КЛЮЧИЦ ИЛИ В НАДКЛЮЧИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕЗ ПО

- 1) Абрикосову
- 2) Лешке
- 3) Мак – Коллум – Мэллори
- 4) Фишеру

ЯДОМ «ЛЕТАЛЬНОГО СИНТЕЗА» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) цианистый калий
- 2) мышьяковистый водород
- 3) этиленгликоль
- 4) оксид углерода

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННАЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ КОНТРАКТУРА ЛЕВОГО ЛОКТЕВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 10%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПРИЧИНИВШАЯ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА, СВЯЗАННОЕ С ДЕЙСТВИЕМ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬЮ

- 1) Минаматы
- 2) итай-итай
- 3) ожоговой
- 4) лучевой

В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ

- 1) целостности костных структур
- 2) мягких тканей
- 3) структуры и функции организма
- 4) кожных покровов

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОЙ КРОВИ ПОД ВЛИЯНИЕМ СИЛЫ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ В ЩЕЛЬ МЕЖДУ ДВУМЯ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ОБРАЗУЮТСЯ

- 1) потеки
- 2) затеки
- 3) лужи
- 4) брызги

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

ПУЛЯ С ВЫСОКОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОКАЗЫВАЕТ _____ ВОЗДЕЙСТВИЕ

- 1) клиновидное
- 2) контузионное
- 3) пробивное
- 4) разрывное

ЗАКРЫТЫЙ НЕОСЛОЖНЁННЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛЕВОЙ КЛЮЧИЦЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ

КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) средней тяжести

ПРИ ВСКРЫТИИ НОЖ МАЛЫЙ АМПУТАЦИОННЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАЗРЕЗА

- 1) органов эвисцерированного органокомплекса
- 2) кожи и эвисцерации органокомплекса
- 3) головного мозга
- 4) хрящевой ткани ребер

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ УЧАСТКА ПОСМЕРТНОГО ПОДСЫХАНИЯ (ПЕРГАМЕНТНОГО ПЯТНА) И ССАДИНЫ ПО КРАЯМ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ВХОДНОЙ РАНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1) гистологическое
- 2) сцинтиграфическое
- 3) рентгенологическое
- 4) цитологическое

ВСКРЫТИЕ СПИННОМОЗГОВОГО КАНАЛА С ПРОВЕДЕНИЕМ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РАСПИЛОВ ПО БОКАМ ДУЖЕК ПРОВОДИТСЯ ПО МЕТОДУ

- 1) Обысова
- 2) Солохина
- 3) Флексига
- 4) Вирхова

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ДРОБОВОГО РАНЕНИЯ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ПРАВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПРИЗНАКИ ВЫСЫХАНИЯ ТРУПА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ОСМОТРЕ

- 1) костей
- 2) волос

- 3) переходной каймы губ
- 4) ногтей

НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ НАЛОЖЕНИЯ С КОЖИ ШЕИ ПО ХОДУ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ СНИМАЮТ

- 1) ватным диском
- 2) соскобом
- 3) марлевым тампоном
- 4) липкой лентой

МЫШЕЧНОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШАЕТСЯ СПУСТЯ (В СУТКАХ)

- 1) 1-2
- 2) 3-4
- 3) 10-12
- 4) 5-7

КОЛОТУЮ РАНУ СТЕНКИ ПРЯМОЙ КИШКИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В КЛЕТЧАТКУ МАЛОГО ТАЗА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) временный
- 4) лёгкий

ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РЕЗОРБЦИИ ДО 30 ПРОЦЕНТОВ ПОСТУПИВШЕГО В ОРГАНИЗМ ЭТАНОЛА РАЗВИВАЕТСЯ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ

- 1) каталазный путь окисления
- 2) безвозвратный алкоголь
- 3) «временный дефицит алкоголя»
- 4) угнетенный метаболизм

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЬ

- 1) кожу
- 2) желудок
- 3) яичник
- 4) почку

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ III СТЕПЕНИ 9% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА С РАЗВИТИЕМ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинивший
- 4) средней тяжести

ЗАДАЧЕЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ОСМОТРЕ

МЕСТА АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проведение секционного исследования
- 2) формулирование судебно-медицинского диагноза
- 3) определение механизма травмы
- 4) осмотр трупов

УШИБ ГРУДНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ ПО ТИПУ ЗАДЕРЖКИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

УДАЛЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА НЕ ОБЛАДАВШЕГО ЗРЕНИЕМ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) легкий

ИДИОМУСКУЛЯРНАЯ ОПУХОЛЬ В УСЛОВИЯХ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОБРАЗУЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ (В ЧАСАХ)

- 1) 8-9
- 2) 4-5
- 3) 5-6
- 4) 6-7

ДЛЯ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ФЛЮОРЕСЦИРУЮЩИХ АНТИТЕЛ МАЗКИ-ОТПЕЧАТКИ СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТРАХЕИ ФИКСИРУЮТ ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ НА ВОЗДУХЕ В

- 1) глицерине
- 2) растворе перманганата калия
- 3) ацетоне
- 4) 96% этаноле

ТКАНЕВАЯ ГИПОКСИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) оксидом углерода
- 2) цианидами
- 3) сулемой
- 4) марихуаной

ТАМПОНЫ И МАЗКИ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ВЛАГАЛИЩА И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ИЗЫМАЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ

- 1) сердечной недостаточности

- 2) внебольничного аборта
- 3) утопления
- 4) токсикоинфекции

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ СОХРАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ В МАТЕРИАЛАХ, НАПРАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, НЕОБХОДИМО

- 1) принять к производству судебную экспертизу и провести полное исследование, не разглашая при этом сведения, составляющие государственную тайну
- 2) инициировать предупреждение эксперта следователем
- 3) обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденциальности исследования и их результатов
- 4) использовать право возврата без исполнения постановления и объектов

К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СУПИНАЦИОННОГО ПЕРЕЛОМА (ПЕРЕЛОМА МАЛЬГЕНЯ) ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) перелом обеих лодыжек
- 2) вывих (подвывих) головки пятой плюсневой кости
- 3) перелом таранной кости
- 4) перелом лучевой кости в типичном месте

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУПА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ТЕРМОМЕТР ВВОДЯТ В ПРЯМУЮ КИШКУ НА (В МИНУТАХ)

- 1) 15
- 2) 10
- 3) 20
- 4) 5

ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОТОЖДЕСТВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) части тела от неопознанных трупов людей на любой стадии трупных изменений
- 2) следы-наложения на теле человека
- 3) следы-повреждения на теле человека
- 4) микропрепараты внутренних органов

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРТ БЕРЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОДЕРЖИМОЕ

- 1) толстой кишки
- 2) желудка
- 3) влагалища
- 4) тонкой кишки

ПОД СТЕРЕОМИКРОСКОПИЕЙ ПОНИМАЮТ

- 1) исследование в ультрафиолетовой области спектра
- 2) установление спектральных характеристик объектов

- 3) изучение макро- и микроскопических свойств объектов в видимой области спектра
- 4) определение удельной плотности костной ткани

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ОФОРМЛЯЕТСЯ В ____ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

- 1) двух
- 2) пяти
- 3) трех
- 4) четырех

ПО ТЕМПУ НАСТУПЛЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ СМЕРТЬ

- 1) агональную
- 2) терминальную
- 3) клиническую
- 4) биологическую

АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗА – ЭТО

- 1) ядохимикат кишечного действия
- 2) фермент, окисляющий этанол до уксусного альдегида
- 3) фермент, расщепляющий ацетилхолин
- 4) продукт метаболизма ацетилхолина

ПОЛНАЯ СТОЙКАЯ ГЛУХОТА НА ОБА УША КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК

- 1) тугоухость
- 2) потеря слуха
- 3) когнитивная тугоухость
- 4) слуховая агнозия

РАНЕНИЕ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

СИНОСТОЗ В ВЕРХНЕМ ЭПИФИЗЕ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ У ДЕВУШЕК НАСТУПАЕТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1) 13-18
- 2) 10-12
- 3) 22-25
- 4) 19-21

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА ПЕТЛИ ОТРАЖАЕТ ____ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ

- 1) рельеф дна

- 2) верхний валик
- 3) нижний валик
- 4) направление

КЕФАЛОГЕМАТОМА ПОДВЕРГАЕТСЯ СПОНТАННОМУ РАССАСЫВАНИЮ В ТЕЧЕНИЕ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1) 2-3
- 2) 6-8
- 3) 12-13
- 4) 2-4

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МЕРТВЫХ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) формалин
- 2) спирт этиловый 95%
- 3) глицерин
- 4) ацетон

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛЕВОЙ КЛЮЧИЦЫ ОТНОСЯТ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ПРИЧИНИВШИМ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАССТРОЙСТВА ЗДОРОВЬЯ НА СРОК СВЫШЕ (В ДНЯХ)

- 1) 21
- 2) 10
- 3) 14
- 4) 20

ЭНДОКАРД ПРИ СТЕНОЗЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА СТАНОВИТСЯ

- 1) красноватым
- 2) розоватым
- 3) белесоватым
- 4) синюшным

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА ТЕЛ ДВУХ СМЕЖНЫХ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С НЕПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

В ОСНОВЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ ССАДИНЫ ЛЕЖИТ РЕАКЦИЯ

- 1) раздражимости
- 2) компенсации
- 3) воспаления
- 4) возбудимости

НЕОПУЩЕНИЕ ЯИЧКА В МОШОНКУ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) крипторхизмом
- 2) анорхизмом
- 3) монокрихизмом
- 4) эктопией

НИЖНИЕ ВЕТВИ ЛОННЫХ КОСТЕЙ МУЖСКОГО ТАЗОВОГО КОЛЬЦА СХОДЯТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- 1) 70-75
- 2) 90-100
- 3) 45-50
- 4) 100-130

ТУПУЮ ТРАВМУ БЕДРА, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЛЁГКИХ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ФОТОГРАФИИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТРУПОМ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ СЛЕДАМИ, СЛЕДОВАТЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ

- 1) адвокату
- 2) понятым
- 3) криминалисту
- 4) врачу – судебно-медицинскому эксперту

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННЫЙ ПАРАПАРЕЗ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ФАЛЛОПИЕВОЙ ТРУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

АНАЛИЗ ЖИДКИХ СРЕД И ВЫДЕЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ И КОНЦЕНТРАЦИИ В НИХ ЭТАНОЛА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ____ МЕТОДОМ

- 1) микроскопическим
- 2) спектральным
- 3) биохимическим
- 4) фотометрическим

ЛИЧИНКИ ПАДАЛЬНЫХ МУХ СОБИРАЮТ И УКЛАДЫВАЮТ В ПРОБИРКИ НА

- 1) лигнин
- 2) фильтровальную бумагу
- 3) марлевую салфетку
- 4) ватный тампон

КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ ТРЁХ СМЕЖНЫХ ПОЗВОНКОВ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА И ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПНЫХ ЯВЛЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯЮТ НАЛИЧИЕ (ИЛИ ОТСУТСТВИЕ) ПРИЗНАКА

- 1) Белоглазова
- 2) Фабрикантова
- 3) Крушевского
- 4) Свешникова

РАНУ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПРАВУЮ ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА С ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ С

- 1) пальпации ран
- 2) зондирования раневого канала
- 3) установления метрической локализации повреждений
- 4) обмывания загрязнений вокруг ран

ТУПАЯ ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕЛЕЗЕНКИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СПЛЕНЭКТОМИЕЙ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившая
- 4) средней тяжести

ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ЖИРОВОГО И БЕЛКОВОГО ОБМЕНА И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ ЭЛАСТИЧЕСКОГО ТИПА В ВИДЕ ОЧАГОВОГО ОТЛОЖЕНИЯ В ИНТИМЕ БЕЛКОВ И ЛИПИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) инсульт
- 2) некроз
- 3) атеросклероз
- 4) инфаркт

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И/ИЛИ ТКАНЕЙ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С СОГЛАСИЯ

- 1) главного врача лечебного учреждения
- 2) родственника реципиента
- 3) живого донора
- 4) следователя

КОМИССИОННЫЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОВОДЯТСЯ В

- 1) комитете по охране здоровья граждан
- 2) экспертно-криминалистическом центре
- 3) городских клинических больницах
- 4) Бюро судебно-медицинской экспертизы

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ОБЫЧНО НАСТУПАЕТ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ОБЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1) 40
- 2) 42
- 3) 38
- 4) 39

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

МИНИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА,

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ О ПРИЖИЗНЕННОМ ПРЕБЫВАНИИ В АТМОСФЕРЕ ПОЖАРА, ЯВЛЯЕТСЯ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 60
- 2) 40
- 3) 20
- 4) 50

ПРИ ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ (БОЛЕЕ 1000 В) ЭЛЕКТРОТОК НА РАССТОЯНИИ МОЖЕТ ПОРАЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА ПОСТРЕДСТВОМ ____ ДУГИ

- 1) вихревой
- 2) вольтовой
- 3) синусоидальной
- 4) электромагнитной

ПРИМЕРОМ ИНФЕКЦИИ, КОТОРАЯ ПРОВОЦИРУЕТ ЖИРОВУЮ ДИСТРОФИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) оспа
- 2) дифтерия
- 3) лепра
- 4) чума

ПРИ ПРИЕМЕ ВНУТРЬ ЯДОВИТОЕ ДЕЙСТВИЕ КЛЕЯ БФ ОБУСЛОВЛЕНО

- 1) нитробензолом
- 2) толуолом
- 3) фенолформальдегидной смолой
- 4) ксилолом

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОМЫ II-III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ОДНОЙ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ СО СМЕЩЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинивший
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТДЕЛА ПОВРЕЖДЕННОЙ КОСТИ ПЕРЕЛОМЫ МОГУТ БЫТЬ

- 1) надмыщелковыми
- 2) венечными
- 3) диафизарными

4) шиловидными

ПЕРЕЛОМ МАЛЬГЕНЯ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинивший
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

НАИБОЛЬШАЯ ТОЧНОСТЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗРАСТА ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ СТАТУСУ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТА В _____ ВОЗРАСТЕ

- 1) детском
- 2) среднем
- 3) пожилом
- 4) старческом

ТРАВМАТИЧЕСКУЮ РАДИКУЛОПАТИЮ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающей жизни
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) тяжкий

ПИГМЕНТ МЕЛАНИНА В ВОЛОСЕ ИМЕЕТ _____ ЦВЕТ

- 1) желтоватый
- 2) темно-желтый
- 3) черный
- 4) светло-желтый

ПОТЕРЕЙ ПАМЯТИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ КАК СЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ ИЛИ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) амнезия
- 2) афазия
- 3) апраксия
- 4) агнозия

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ СО СМЕЩЕНИЕМ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ПРИЗНАКОМ НЕЗРЕЛОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отсутствие яичек в мошонке
- 2) наличие ателектазов легких
- 3) сыровидная смазка
- 4) отсутствие пушковых волос на всем теле

СРЕДНИМ ДЛЯ МУЖЧИНЫ СЧИТАЕТСЯ РОСТ (В САНТИМЕТРАХ)

- 1) 180-185
- 2) 188-193
- 3) 160-164
- 4) 168-175

ОТВЕСНОСТЬ СТЕНОК УШИБЛЕННОЙ РАНЫ ГОЛОВЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТРАВМИРУЮЩЕГО ПРЕДМЕТА ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- 1) 45
- 2) 30
- 3) 60
- 4) 90

ВЫРАЖЕННЫЙ МИДРИАЗ ХАРАКТЕРЕН ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) барбитуратами
- 2) дихлофосом
- 3) сулемой
- 4) соляной кислотой

ГЕСТАЦИОННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОД

- 1) грудной
- 2) дошкольный
- 3) новорожденности
- 4) внутриутробный

ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившая
- 4) средней тяжести

ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ГНИЕНИЮ, ПОМЕЩАЮТ В

- 1) холодильник
- 2) центрифугу
- 3) сухожаровой шкаф
- 4) боксы

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ СО СМЕЩЕНИЕМ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

ПОПЕРЕЧНЫЕ РАЗРЫВЫ ПОДОШВЫ ОБУВИ У ПИЛОТОВ В ОДНОМ-ДВУХ МЕСТАХ С ВОЗМОЖНЫМ ОБНАРУЖЕНИЕМ КОНТУРОВ ПЕДАЛИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ УДАРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА СИЛОЙ, РАВНОЙ СКОРОСТИ (В КМ/Ч)

- 1) 250-350
- 2) 400-500
- 3) 100-200
- 4) 600-800

СТАДИЯ ИМБИБИЦИИ ТРУПНОГО ПЯТНА ОБЫЧНО ФОРМИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ _____ ЧАСОВ

- 1) 12-20
- 2) 24-30
- 3) 5-10
- 4) 10-15

К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОТНОСЯТ

- 1) преобладание длины раны над длиной раневого канала
- 2) осаднённые края и неповреждённые волосы
- 3) кровоподтёчные края и вывернутые луковички волос
- 4) наличие остроугольного и П-образного концов

ДЕЙСТВИЕ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лезвийным разрезом
- 2) обушковым разрезом
- 3) П-образным концом
- 4) закруглённым концом

ПРОВОЦИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ВЫЗВАННОЕ УМЫШЛЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕРМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК _____ БОЛЕЗНИ

- 1) неврологические
- 2) притворные
- 3) искусственные
- 4) психические

ЗАПОЛНЕНИЕ ВОЗДУХОМ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА В СРЕДНЕМ ПРОИСХОДИТ К _____ ЧАСАМ ЖИЗНИ

- 1) 36
- 2) 24
- 3) 12

ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕК В МЯГКИЕ ТКАНИ

- 1) нижних конечностей
- 2) живота
- 3) головы и шеи
- 4) груди

К ПРИЗНАКУ КОМПРЕССИОННОЙ АСФИКСИИ ОТНОСЯТ

- 1) отёк ложа желчного пузыря
- 2) микседематозный отёк
- 3) карминовый отёк лёгких
- 4) ангионевротический отёк

ТЕПЛОВОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ ФОРМИРУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) коагуляции белка
- 2) липолиза жировой ткани
- 3) склероза соединительной ткани
- 4) нарушения вегетативной регуляции

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОФОРМЛЯЕТ

- 1) криминалист
- 2) следователь
- 3) фельдшер
- 4) свидетель

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

КОЛОТЫЕ РАНЫ ОБРАЗУЮТСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ

- 1) клинок с одним тупым и острым краями
- 2) клинок с острым концом и режущими краями
- 3) клинок с острым концом и поперечным сечением округлой или граненой формы
- 4) большую массу и острый край

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни

- 3) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ПРИ СНИЖЕНИИ ОБЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО ____ °С НАСТУПАЕТ СМЕРТЬ

- 1) 25
- 2) 20
- 3) 10
- 4) 30

ПОТЕРЮ СПОСОБНОСТИ У ЖЕНЩИН К СОВОКУПЛЕНИЮ ИЛИ ЗАЧАТИЮ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНЕНИЕ _____ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасного для жизни
- 3) лёгкого
- 4) тяжкого

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ УСТАНОВЛИВАЮТ ____ ВОЗРАСТ

- 1) биологический
- 2) паспортный
- 3) календарный
- 4) полового созревания

ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ РЕФЛЕКСОВ БЕЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, АТРОФИИ, ПАРЕЗОВ, КОНТРАКТУР, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОЛУЧЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЫ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести

- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ЯИЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ БЕДРА С РАЗРЫВОМ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

В ПАТОГЕНЕЗЕ ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ВЫДЕЛЯЮТ

- 1) 2 стадии
- 2) 3 стадии
- 3) 1 стадию
- 4) 4 стадии

К ТЕРМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ АВИАЦИОННОЙ ТРАВМЫ ОТНОСЯТ

- 1) привязные ремни
- 2) инерционные перегрузки
- 3) продукты пиролиза
- 4) горячие жидкости

ЗОНА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ВЫСТРЕЛА

- 1) второй зоной близкой дистанции
- 2) первой зоной близкой дистанции
- 3) неблизкой дистанцией
- 4) третьей зоной близкой дистанции

УШИБ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗВИТИЕМ ТЕТРАПАРЕЗА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинивший
- 4) средней тяжести

К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА ОТНОСИТСЯ

- 1) дефект лезвия
- 2) форма лезвия
- 3) толщина обуха
- 4) ширина лезвия

ЭЛЕКТРОМЕТКА МОЖЕТ ИМЕТЬ ВИД, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) ушиба
- 2) раны
- 3) ссадины
- 4) некроза

ПО ДИАГОНАЛИ ДЛИНА ТЕМЕННОЙ КОСТИ У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 4,5
- 2) 7,6
- 3) 15,2
- 4) 3,5

АНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) векторно-графический анализ
- 2) остеометрическое исследование
- 3) спектральный анализ
- 4) установление спектральных характеристик объектов

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

К ВИДАМ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСЯТ ДЕФОРМАЦИЮ

- 1) сдвига
- 2) кручения
- 3) сжатия
- 4) растяжения

В СЛУЧАЕ ПОРАЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПЕЧЕНОЧНЫХ ДОЛЕК РЕЧЬ ИДЕТ О ____ ЦИРРОЗЕ

- 1) мультилобулярном
- 2) монолобулярном
- 3) мелкоузловом
- 4) крупноузловом

НАНЕСЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТУПЫМИ ПРЕДМЕТАМИ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК

- 1) истязание
- 2) мучение
- 3) побои
- 4) извращение

К ОСТРОМУ ОРУЖИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) стамеска
- 2) кинжал
- 3) долото
- 4) ножовка

К ОЦЕНКЕ РЕАКЦИИ ЗРАЧКА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ В ПЕРЕДНЮЮ КАМЕРУ ГЛАЗА УМЕРШЕГО ВЕГЕТОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТ

- 1) измерение диаметра радужки
- 2) феномен «кошачьего глаза»
- 3) зрачковую пробу
- 4) пятна Лярше

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

НА МЕСТО ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА ВЫЕЗЖАЕТ ОПЕРАТИВНО-СЛЕДСТВЕННАЯ ГРУППА В СОСТАВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) эксперта-криминалиста
- 2) фотографа
- 3) адвоката

4) волонтера

ТРАВМУ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПЯТНОМ НА КОЖЕ ИЛИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТРОМ 1-2 ММ, ОБУСЛОВЛЕННЫМ КАПИЛЛЯРНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) петехия
- 2) экхимоз
- 3) вибекс
- 4) кровоподтек

ЖИРЫ МИКРОСКОПИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) эозином
- 2) конго красным
- 3) гематоксилином
- 4) суданом IV

НАРАСТАНИЕ СКОПЛЕНИЯ ГНИЛОСТНЫХ ГАЗОВ В ПОДКОЖНОЙ ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКЕ ПРИВОДИТ К РАЗИТИЮ

- 1) трупной эмфиземы
- 2) трупной зелени
- 3) гигантизма
- 4) венозной сети

НА СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ РЕАКЦИИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЛИЯЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) степень упитанности
- 2) содержание углекислого газа в воздухе
- 3) эмоциональное состояние потерпевшего
- 4) алкогольная интоксикация

«КРЕКОМ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДНОЕ

- 1) кокаина
- 2) эфедрина
- 3) амитриптилина
- 4) метамфетамина

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАРДИОМИОЦИТОВ, ВЫЗВАННЫЕ ГИПОКСИЕЙ, МОЖНО ВЫЯВИТЬ ЧЕРЕЗ (В МИНУТАХ)

- 1) 20-30

- 2) 60-80
- 3) 80-100
- 4) 80-120

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОЗДУХОМ ВСЕЙ ТОНКОЙ КИШКИ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ТРЕБУЕТСЯ ОКОЛО (В ЧАСАХ)

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 8
- 4) 1

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ЦВЕТНЫХ ОТПЕЧАТКОВ ТЕМНО-ЗЕЛЕНАЯ ОКРАСКА СООТВЕТСТВУЕТ НАЛИЧИЮ

- 1) меди
- 2) никеля
- 3) кобальта
- 4) свинца

ИНФЕКЦИОННО-АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, В ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖИТ ДВУСТОРОННЕЕ ДИФFUЗНОЕ НЕГНОЙНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ КЛУБОЧКОВОГО АППАРАТА ПОЧЕК С НАЛИЧИЕМ ПОЧЕЧНЫХ И ВНЕПОЧЕЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гломерулонефрит
- 2) пиелонефрит
- 3) нефролитиаз
- 4) нефросклероз

ДЕЙСТВИЕ Н-ХОЛИНОЛИТИКОВ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) миорелаксацией
- 2) судорогами
- 3) мидриазом
- 4) галлюцинациями

НА ВЕРШИНЕ СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА РАСПОЛАГАЕТСЯ КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

- 1) астрион
- 2) базион
- 3) ламбда
- 4) мастоидале

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести

- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ ЛЕВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ НА УРОВНЕ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

МЕТАЛЛИЗАЦИЮ КРАЕВ РАНЫ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ

- 1) контактно-диффузионным методом
- 2) биологическим исследованием
- 3) трасологическим анализом
- 4) морфологическим исследованием

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ УШИБА ГОЛОВНОГО МОЗГА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕЛОВЫХ СИМПТОМОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ВЛАЖНЫЙ АРХИВ КУСОЧКОВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ХРАНЯТ В 10% РАСТВОРЕ ФОРМАЛИНА В ТЕЧЕНИЕ _____, ЕСЛИ ИНЫЕ СРОКИ НЕ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

- 1) 3 лет
- 2) 4 лет
- 3) 2 лет
- 4) 1 года

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ УСТАНОВЛИВАЕТ

- 1) порядок привлечения к проведению экспертизы экспертов
- 2) алгоритм проведения секционного исследования
- 3) порядок определения лабораторных исследований
- 4) причину смерти

К ПРИЧИНЕНИЮ ПСИХИЧЕСКИХ СТРАДАНИЙ НАСИЛЬСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОТНОСЯТ

- 1) мучение

- 2) истязание
- 3) извращение
- 4) побои

ИСКУССТВЕННЫЕ ДЕРМАТИТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЗУЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ _____ ФАКТОРА

- 1) химического
- 2) термического
- 3) механического
- 4) психогенного

ПРИ ПОДОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ РТУТНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1) синусит
- 2) фарингит
- 3) стоматит
- 4) фронтит

ЖЕЛТОВАТО-СЕРАЯ ОКРАСКА С ПОЛОСЧАТЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ В КОРКОВОМ СЛОЕ И ОТГРАНИЧЕНИЕ КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА ОТ ТЕМНО-КРАСНЫХ ПИРАМИД ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ _____ ПОЧКИ

- 1) сулемовой
- 2) шоковой
- 3) амилоидной
- 4) кистозной

ВСЛЕДСТВИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ГНИЛОСТНЫХ ГАЗОВ В МЯГКИЕ ТКАНИ ОБРАЗУЕТСЯ

- 1) трупная зелень
- 2) эмфизема
- 3) трупный гигантизм
- 4) гнилостная венозная сеть

РЕЗОРБЦИЕЙ ОБЫЗВЕШТВЛЕННОГО ХРЯЩА И МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА КОСТНОЙ ТКАНИ ОСТЕОКЛАСТАМИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ И ПЕРЕСТРОЙКИ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) остеолиз
- 2) остеомалация
- 3) остеодистрофия
- 4) остеоклазия

К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ, ОБУСЛОВЛЕННОМУ ПОНИЖЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, УМЕНЬШЕНИЕМ ПОТРЕБНОСТИ ТКАНЕЙ В КИСЛОРОДЕ И СНИЖЕНИЕМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА, ОТНОСЯТ

- 1) оледенение
- 2) отморожение

- 3) ознобление
- 4) переохлаждение организма

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ЛОЖНЫЕ СУСТАВЫ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШИЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ СТАДИЯ СЕРОГО ОПЕЧЕНЕНИЯ ВОЗНИКАЕТ НА _____ ДЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1) 7-8
- 2) 9-10
- 3) 1-2
- 4) 4-6

СТАДИЯ КОЛЛАПСА ПРИ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ КРОВОПОТЕРИ И ДЛИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 1

ПЕРЕЛОМ ДУГИ ОДНОГО ГРУДНОГО ПОЗВОНКА С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

ИССЛЕДОВАНИЕ РАНЕВЫХ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТ

- 1) с помощью деревянных зондов
- 2) с помощью металлических зондов
- 3) отсекая раневой канал
- 4) послойно препарируя

ОБ УДАРЕ ПО СПИНЕ ТВЁРДЫМ ТУПЫМ ПРЕДМЕТОМ С КРУГЛОЙ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ МОЖНО СУДИТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ССАДИНЫ _____ ФОРМЫ

- 1) полукруглой
- 2) звёздчатой

- 3) дуговидной
- 4) кольцевидной

**БОЛЬШОЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ У ДОНОШЕННОГО ЗРЕЛОГО
НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)**

- 1) 34-35
- 2) 9-9,5
- 3) 12-13,5
- 4) 10-11

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИВОГО ЛИЦА НАЧИНАЕТСЯ С

- 1) проведения исследований
- 2) опроса
- 3) оформления заключения
- 4) формулирования выводов

**ОТСУТСТВИЕ МИГАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕПОНКИ (ТРЕТЬЕГО ВЕКА) У ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ**

- 1) жизнеспособности
- 2) доношенности
- 3) зрелости
- 4) живорожденности

**ТРАВМАТИЧЕСКУЮ АНЕВРИЗМУ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ
НАРУЖНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ,
ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) лёгкий

**ЭКСПЕРТ ВПРАВЕ УЧАСТВОВАТЬ С РАЗРЕШЕНИЯ ИНИЦИАТОРА В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЯХ НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ ____ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

- 1) 156
- 2) 56
- 3) 57
- 4) 58

**ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ СТАДИЯ КРАСНОГО ОПЕЧЕНЕНИЯ ФОРМИРУЕТСЯ
НА ____ ДЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ**

- 1) 5
- 2) 7
- 3) 1
- 4) 2

РАНУ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПОЛОСТЬ ПЕРИКАРДА (БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ), КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ЗНАЧЕНИЕ ПУЛИ, ИЗВЛЕЧЕННОЙ ИЗ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ

- 1) скорости полета пули
- 2) идентификации конкретного экземпляра оружия
- 3) дистанции выстрела
- 4) расстояния выстрела

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ ЕГО СГИБАНИИ ОТ 55° ДО 70°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ДЛЯ ФИКСАЦИИ НЕРВНОЙ ТКАНИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОКРАСОК ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) нейтральный раствор формалина
- 2) этанол 96%
- 3) ацетон
- 4) глицерин

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ХВАТАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее легкий вред здоровью
- 2) не причинившее вред здоровью
- 3) причинившее тяжкий вред здоровью
- 4) причинившее вред здоровью средней тяжести

ОТКРЫТЫЙ СЕДАЛИЩНЫЙ ВЫВИХ БЕДРА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий

4) средней тяжести

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ, ПОДПИСАННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГСМЭУ, МОГУТ ВЫДАТЬ ПОД РОСПИСЬ

- 1) представителю органа или лица, назначившему экспертизу
- 2) врачу
- 3) страховому агенту
- 4) лаборанту

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ДИОКСИНА СВЯЗАНО С

- 1) индукцией микросомальных оксидаз
- 2) антихолинэстеразным действием
- 3) гемолизом
- 4) ингибированием тиоловых ферментов

К КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) безжелтушную
- 2) гепатоцеллюлярную
- 3) гепатоканаликулярную
- 4) каналикулярную

ПОДЛЕЖАЩИЙ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ УЧАСТОК КОЖИ ОТСЕКАЮТ НА ____ СМ ОТ ГРАНИЦ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- 1) 1-2
- 2) 5-6
- 3) 10-15
- 4) 9-10

ШИРИНА ПЛЕЧИКОВ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 12-13
- 2) 32-34
- 3) 36-39
- 4) 20-24

ПОЛНОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ ОЖОГОВ 2 СТЕПЕНИ НАСТУПАЕТ К (В ДНЯХ)

- 1) 30-35
- 2) 3-4
- 3) 8-9
- 4) 12-14

СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ЧЕЛОВЕК ЛИШЕН ВОЗМОЖНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) беспомощностью

- 2) безысходностью
- 3) симуляцией
- 4) ограниченностью

ЭПИДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ СЕРПОВИДНОЙ ФОРМЫ ПОСМЕРТНО ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ

- 1) обгорании
- 2) декомпрессии
- 3) огнестрельной травме
- 4) механической асфиксии

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ПЕЧЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ГЕПАТИТА В СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1) 12
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 6

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ В РАННЕМ ПОСМЕРТНОМ ПЕРИОДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ____ ОБОИХ ГЛАЗ УМЕРШЕГО

- 1) спектроскопии
- 2) термометрии
- 3) тонометрии
- 4) морфометрии

В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ МОРГ ДОСТАВЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) части трупа
- 2) живых лиц
- 3) образцы для сравнительного исследования
- 4) материалы уголовных дел

СУЖЕНИЕ ЗРАЧКА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ РАСТВОРА ПИЛОКАРПИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (В МИНУТАХ)

- 1) 10
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 8

ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРАСКИ ТРУПНОГО ПЯТНА В СТАДИЮ ГИПОСТАЗА

ДЛИТСЯ НЕ БОЛЕЕ (В МИНУТАХ)

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЯГКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) легкий

МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ РАСТЯЖЕНИЯ (РАЗРЫВА) КРАЯ ПЕРЕЛОМА КОСТНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) смятие компакты в виде валикообразного вспучивания или желобовидные углубления
- 2) неровная линия излома, смятие или выкрашивание компактного слоя
- 3) ровная линия излома и отвесные стенки, сопоставимые края
- 4) края со сколом и истончением компактного вещества, отгибанием его поверхностных слоев

В СЛУЧАЕ НЕКАЧЕСТВЕННО ПРОВЕДЕННОГО ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ _____ ОСМОТР

- 1) повторный
- 2) дополнительный
- 3) подготовительный
- 4) заключительный

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

ОДНОСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ II ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ С ПРИЗНАКАМИ КОМПРЕССИИ В ЗАДНИХ ОТДЕЛАХ ВОЗНИКАЮТ ПРИ

- 1) резком повороте
- 2) чрезмерном сгибании
- 3) чрезмерном разгибании
- 4) наклоне в сторону

ОБРАЗОВАНИЕ ТОЧЕЧНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЧЕЧНЫХ ЛОХАНОК ОПИСАНО

- 1) Фабрикантовым
- 2) Пухнаревичем
- 3) Вишневским
- 4) Пупаревым

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГЛИКОЗИДАМИ ИЗЪЯТЫЕ ОТ ТРУПА ТКАНИ КОНСЕРВИРУЮТ В

- 1) этаноле
- 2) глицерине
- 3) формалине
- 4) соляной кислоте

ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ОЖГОВОЙ РАНЫ У ДЕТЕЙ ДО ОДНОГО ГОДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД

- 1) Постникова
- 2) Ленда – Броудера
- 3) Медведева
- 4) Бреслау

В ХОДЕ СТАТИЧЕСКОЙ СТАДИИ В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА ФИКСИРУЮТ

- 1) место расположения трупа
- 2) стадии развития трупных пятен
- 3) степень мышечного окоченения
- 4) температуру тела

ПОЛНОЕ РАСТВОРЕНИЕ ОРГАНЕЛЛ В ЦИТОПЛАЗМЕ ПРИ НЕКРОЗЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) кариопикнозом
- 2) цитолизом
- 3) кариорексисом
- 4) плазмолизисом

К ДЕЙСТВИЯМ, ПРИЧИНЯЮЩИМ СТРАДАНИЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУТЕМ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛИШЕНИЯ ТЕПЛА, ОТНОСЯТ

- 1) истязания
- 2) мучения
- 3) стресс

4) побои

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ МОЧЕТОЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ДЛЯ МЕХАНИЗМА «УДАР» ХАРАКТЕРНЫ

- 1) двусторонность, центростремительность
- 2) односторонность, центробежность
- 3) односторонность, центростремительность
- 4) двусторонность, центробежность

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О

- 1) результатах лабораторных исследований
- 2) обстоятельствах дела
- 3) выводах эксперта
- 4) количестве прилагаемых материалов исследования

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА ОБРАЗУЕТ _____ ТОКА

- 1) извилину
- 2) закрутку
- 3) петлю
- 4) излучину

О ВЫСТРЕЛЕ С БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ЧЕРЕЗ ПРЕГРАДУ, КАК ПРАВИЛО, СУДЯТ ПО

- 1) форме траектории движения пули в теле
- 2) штанцмарке
- 3) виду огнестрельного ранения кожи
- 4) отложению порошинок на преграде

ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООЖОГОВ ФОРМИРУЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1) органах
- 2) костях

- 3) сосудах
- 4) нервных стволах

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЭКСПЕРТ ДОЛЖЕН

- 1) составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дачи заключения
- 2) произвести исследование в полном объеме
- 3) произвести исследование частично
- 4) передать в производство более опытному эксперту

ПРИ ДОКУМЕНТИРОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УКАЗЫВАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) жалобы потерпевшей
- 2) показания понятых
- 3) данные допроса подозреваемого
- 4) показания свидетелей

ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПОВ ЛЮДЕЙ, ПОГИБШИХ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ, ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКИ

- 1) компрессии
- 2) странгуляции
- 3) общеасфиктические
- 4) обтурации

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В СОДЕРЖИМОМ ЖЕЛУДКА КРУПИНОК, КРИСТАЛЛОВ, ТАБЛЕТОК КАКОГО-ЛИБО ВЕЩЕСТВА ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ

- 1) медико-криминалистическую
- 2) судебно-гистологическую
- 3) судебно-химическую
- 4) молекулярно-генетическую

ПРЯМОЕ И СТУПЕНЧАТОЕ ПАДЕНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ

- 1) возможностью координации
- 2) возможностью придать предшествующее ускорение
- 3) высотой падения
- 4) фазами

ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООЖОГОВ ФОРМИРУЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1) костях
- 2) мышечной ткани
- 3) органах
- 4) нервных стволах

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ПРАВОГО ЛОКТЕВОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ СПЕРМЫ ВО ВЛАГАЛИЩЕ СОДЕРЖИМОЕ ВЛАГАЛИЩА И НАРУЖНОГО ЗЕВА ШЕЙКИ МАТКИ БЕРУТ В ВИДЕ

- 1) соскоба
- 2) биоптата
- 3) смыва
- 4) мазков

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕРДЦА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ III СТЕПЕНИ 20% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПОГРУЖЁННОЙ ЧАСТИ КЛИНКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ДЛИНЕ

- 1) раны на коже
- 2) раневого канала
- 3) дополнительного разреза
- 4) раны концевой отдела раневого канала

В МОРФОГЕНЕЗЕ НЕКРОЗА РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) альтерацию
- 2) некробиоз
- 3) экссудацию
- 4) пролиферацию

ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ ОБРАЗУЕТСЯ ОЧАГ ____ РАЗМЯГЧЕНИЯ МОЗГА

- 1) серого

- 2) ржавого
- 3) красного
- 4) глиняного

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 2) некрозы клеток шиповатого слоя эпидермиса с возникновением пузырей
- 3) некрозы мышечных волокон
- 4) некрозы жировых клеток

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ «УДАРА» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) двусторонность, центробежность
- 2) двусторонность, центростремительность
- 3) односторонность, центробежность
- 4) односторонность, центростремительность

К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ, ВЕДУЩЕМУ К ДИФфуЗНОМУ И ОЧАГОВОМУ УПЛОТНЕНИЮ СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННЫХ СТРУКТУР В СВЯЗИ С ИЗБЫТОЧНЫМ РАЗРАСТАНИЕМ ЗРЕЛОЙ ПЛОТНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТ

- 1) регенерация
- 2) некроз
- 3) склероз
- 4) инфаркт

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ДИАФРАГМЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней степени тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННУЮ СПАСТИЧНОСТЬ В КОНЕЧНОСТЯХ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ПИЩЕВЫЕ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ БУРНЫМ РАЗВИТИЕМ

- 1) холецистита
- 2) дуоденита
- 3) панкреатита
- 4) гастроэнтероколита

ЗАЖИВЛЕНИЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦА ПУТЕМ ЭПИТЕЛИЗАЦИИ ПРОИСХОДИТ ПРИ ОЖОГАХ _____ СТЕПЕНИ

- 1) 1
- 2) 3а
- 3) 3б
- 4) 4

ДЛЯ «ЛЕГОЧНОЙ» СМЕРТИ ЗНАЧИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1) жировой эмболии сосудов легких
- 2) рестриктивных процессов большей распространенности
- 3) острой эмфиземы легких
- 4) гиалиновых мембран

К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СУПИНАЦИОННОГО ПЕРЕЛОМА (ПЕРЕЛОМА МАЛЬГЕНЯ) ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) перелом пяточной кости
- 2) перелом лучевой кости в типичном месте
- 3) вывих (подвывих) головки пятой плюсневой кости
- 4) перелом наружной лодыжки малоберцовой кости

СОКРАЩЕННЫЕ ПУПОЧНЫЕ АРТЕРИИ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ИНВОЛЮЦИИ ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПУПОЧНОГО КОЛЬЦА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О

- 1) мертворожденности
- 2) живорожденности
- 3) продолжительности внутриутробной жизни младенца
- 4) зрелости

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НАЛИЧИЕ

- 1) набора гинекологических инструментов
- 2) секвенатора
- 3) амплификатора
- 4) манекена портняжного

ПОКАЗАТЕЛЬ ИНДЕКСА АЛЬГОВЕРА 1,5-2 СООТВЕТСТВУЕТ СТЕПЕНИ ШОКА

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 2

К РУБЛЕННЫМ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ РАНЫ, ПРИЧИНЕННЫЕ

- 1) обухом топора
- 2) лезвием сабли
- 3) ребром граненого предмета
- 4) рукояткой палаша

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) нарушения ионного равновесия
- 2) отравления парами расплавленных частей установок
- 3) изменения поляризации клеточных мембран
- 4) наркотического действия индифферентных газов

ПРИ ВСТРЕЧНОМ ИММУНОЭЛЕКТРОФЕРЕЗЕ АНТИГЕНЫ И АНТИТЕЛА ДВИЖУТСЯ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ИЗ-ЗА

- 1) электроэндоосмоса
- 2) различного электрического заряда
- 3) различной величины молекул
- 4) одинакового электрического заряда

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) административной
- 2) уголовной
- 3) процессуальной
- 4) повторной

РУБЛЕННЫЕ РАНЫ ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ УДАРЕ

- 1) обухом топора
- 2) лезвием сабли
- 3) рукояткой палаша
- 4) ножами сабли

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ПРАВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 40% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести

- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

**ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКУЮ ГИПЕРОСМОЛЯРНУЮ КОМУ II-III СТЕПЕНИ
КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

**ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ПРИВЕДШУЮ К РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ И
ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%,
КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

**АБОРТ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ВНЕ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЛИЦОМ, НЕ
ИМЕЮЩИМ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ПРОФИЛЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) криминальным
- 2) медикаментозным
- 3) вакуумным
- 4) хирургическим

**В СЛУЧАЕ, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,
РАЗРЕШЕНИЕ НА ИЗЪЯТИЕ ОРГАНОВ И/ИЛИ ТКАНЕЙ У ТРУПА ДОЛЖНО БЫТЬ ДАНО**

- 1) следователем
- 2) руководителем управления здравоохранением
- 3) врачом-патологоанатомом
- 4) врачом – судебно-медицинским экспертом с уведомлением прокурора

**КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ
ТРАВМЫ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СПИННОГО
МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

**ПРИ ОБЖИМЕ ТЕЛА В ГЕНЕЗЕ СМЕРТИ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ**

- 1) костей нижних конечностей
- 2) тканевой эмболии

- 3) костей верхних конечностей
- 4) спинного мозга

ПЕРВИЧНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) фибрилляцией желудочков
- 2) фибрилляцией предсердий
- 3) пароксизмальной желудочковой тахикардией
- 4) уменьшением объема циркулирующей крови

МЫШЕЧНОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ МОЖЕТ ПОЯВЛЯТЬСЯ В БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ СРОКИ ПРИ СМЕРТИ ОТ

- 1) общего переохлаждения организма
- 2) ожоговой травмы
- 3) электротравмы
- 4) острой кровопотери

СПОСОБНОСТЬ К ТРУДУ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СФЕРЕ НАЗЫВАЕТСЯ _____ ТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ

- 1) временной
- 2) общей
- 3) профессиональной
- 4) специальной

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ОРУДИЯ ТРАВМЫ ПО ПОВРЕЖДЕНИЯМ НА ТЕЛЕ И ОДЕЖДЕ ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ РАЗДЕЛ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЕДИЦИНЫ

- 1) «Судебно-медицинская баллистика»
- 2) «Судебно-медицинская трасология»
- 3) «Судебно-медицинская генетика»
- 4) «Судебно-медицинская гистология»

НЕКРОЗ ДЕРМЫ НА ВСЮ ГЛУБИНУ С РАЗРУШЕНИЕМ САЛЬНЫХ И ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ ОЖОГОВ _____ СТЕПЕНИ

- 1) 3б
- 2) 3а
- 3) 2
- 4) 4

К ВТОРИЧНЫМ СНАРЯДАМ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ИЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ОТНОСЯТ

- 1) осколки преграды
- 2) фрагменты пули
- 3) пороховые пыжи
- 4) гильзы патронов

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ

ПРИ ЕГО СГИБАНИИ ОТ 70? ДО 80?, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающий жизни
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ЭТИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮТ КАРДИОСКЛЕРОЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) диффузный
- 2) постмиокардитический
- 3) гипотрофический
- 4) очаговый

СИМУЛЯЦИЯ РВОТЫ ДОСТИГАЕТСЯ ПУТЕМ

- 1) приема противорвотных препаратов
- 2) раздражения мягкого неба
- 3) употребления крепкого чая
- 4) применения акрихина

ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА ВРАЧ ? СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ОБЯЗАН УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ЛИЧНОСТИ

- 1) обвиняемого
- 2) подозреваемого
- 3) обследуемого
- 4) свидетеля

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ БОЛЬШОГО И УКАЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦЕВ ЛЕВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

ЮРИДИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ ____ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1) 222
- 2) 122
- 3) 22
- 4) 322

ЭТАНОЛ ОКИСЛЯЕТСЯ

- 1) амилазой
- 2) энтеропептидазой

- 3) липазой
- 4) алкогольдегидрогеназой

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинивший
- 4) средней тяжести

ПРИ БЫСТРОМ КРОВОТОКЕ В АРТЕРИЯХ ОБРАЗУЮТСЯ ____ ТРОМБЫ

- 1) белые
- 2) красные
- 3) гиалиновые
- 4) смешанные

СМЕРТЕЛЬНОЙ ДОЗОЙ БЕНЗИНА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ПРИЕМЕ ЯВЛЯЕТСЯ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 200
- 2) 10
- 3) 50
- 4) 100

ЧАСТО У ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ РТУТЬЮ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1) пигментный нефроз
- 2) ртутный эритизм
- 3) ларингоспазм
- 4) тризм жевательной мускулатуры

ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПИЙСОДЕРЖАЩИМИ НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ

- 1) метаболизма
- 2) гемодинамики
- 3) дыхания
- 4) сердечного ритма

ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НЕЗАВИСИМО ОТ ЕЁ СРОКА, ВЫЗВАННОЕ ПРИЧИНЕННЫМ ВРЕДОМ ЗДОРОВЬЮ И ВЫРАЗИВШЕЕСЯ ВО ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

К КРОВЯНЫМ ЯДАМ ОТНОСЯТСЯ ВЕЩЕСТВА

- 1) нарушающие микроциркуляцию крови
- 2) повышающие проницаемость сосудистых стенок
- 3) нарушающие секрецию желчи
- 4) вызывающие гемолиз

ИНИЦИИРУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ В КАПСЮЛЕ ОХОТНИЧЬЕГО ПАТРОНА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) антимоний (сурьма)
- 2) гремучая ртуть (изоцианат ртути)
- 3) динамит
- 4) бертолетова соль (хлорат калия)

ДЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КОМПАКТНОГО ДЕЙСТВИЯ ДРОБИ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

- 1) закопчения кожи вокруг раны
- 2) одной крупной раны и ряда мелких входных ран вокруг нее
- 3) обширной зоны сплошной металлизации по краям раны
- 4) обширного кольца осаднения вокруг раны

В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ ПРИ ПОЛОЖЕНИИ ТРУПА НА СПИНЕ ТЕРМОЩУП ВВОДЯТ В ОБЛАСТЬ

- 1) 8 ребра по средней подмышечной линии
- 2) вершины эпигастрального угла, слева от мечевидного отростка
- 3) вершины эпигастрального угла, справа от мечевидного отростка
- 4) 11 ребра по окологрудной линии

ПЕРВОЙ ФАЗОЙ ОЖОГОВОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) латентная
- 2) подострая
- 3) торпидная
- 4) эректильная

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБЫЕ РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) плотной волокнистой соединительной ткани капсулы
- 2) первичных опухолевых поражений
- 3) клеток Ито печеночных долек
- 4) междольковой соединительная ткани

ЭКСПЕРТИЗУ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ МОГУТ ПРОВОДИТЬ НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ

- 1) копии документов, заверенных следователем
- 2) незаверенных копий документов
- 3) копии документов, заверенных потерпевшим
- 4) копии документов, заверенных лечащим врачом

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

- 1) желтушность
- 2) мраморность
- 3) цианоз
- 4) бледность

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

В ПЕРВЫЕ ДНИ ГЕПАТОЗА ОТМЕЧАЕТСЯ ____ ДИСТРОФИЯ ГЕПАТОЦИТОВ ЦЕНТРОВ ДОЛЕК

- 1) углеводная
- 2) минеральная
- 3) белковая
- 4) жировая

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)

- 1) 15-20
- 2) 1-2
- 3) 3-4
- 4) 5-6

СУДАН-IV (ОСМИЕВАЯ КИСЛОТА) ОКРАШИВАЕТ ЖИР В ____ ЦВЕТ

- 1) фиолетовый
- 2) розовый
- 3) оранжево-красный
- 4) черный

РОДОВАЯ ОПУХОЛЬ ПОДВЕРГАЕТСЯ СПОНТАННОМУ РАССАСЫВАНИЮ ЧЕРЕЗ (В ДНЯХ)

- 1) 30-35
- 2) 7-8
- 3) 2-3
- 4) 12-16

ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАК

- 1) Пухнаревича
- 2) Фабрикантова
- 3) Белоглазова
- 4) Райского

РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТМОРОЖЕНИЯ ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 30% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) угрожающий жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ДЕЙСТВИЕ М-ХОЛИНОЛИТИКОВ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) комой
- 2) параличом дыхательного центра
- 3) гиперсекцией желез
- 4) психомоторным возбуждением

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К

- 1) кислородному голоданию
- 2) декомпрессионной болезни
- 3) отравлению кислородом
- 4) отравлению углекислым газом

ПОЯСОК ОБТИРАНИЯ В ОБЛАСТИ ВХОДНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1) термического действия пороховых газов
- 2) механического действия пороховых газов

- 3) отслоения эпидермиса по краям раны боковыми поверхностями пули
- 4) наслоения загрязнения с поверхности пули

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА С ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ С

- 1) зондирования раневого канала
- 2) установления анатомической локализации повреждений
- 3) пальпации ран
- 4) обмывания загрязнений вокруг ран

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ЦИАНОЗ ЛИЦА И ОТЕЧНОСТЬ ВЕК ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ОБ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) этиловым спиртом
- 2) синильной кислотой
- 3) окисью углерода
- 4) соляной кислотой

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) клеток Ито печеночных долек
- 2) плотной волокнистой соединительной ткани капсулы
- 3) вторичных опухолевых поражений
- 4) междольковой соединительная ткани

ЭКСПЕРТ НЕ ВПРАВЕ

- 1) знакомиться с материалами уголовного дела
- 2) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний
- 3) вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства
- 4) задавать вопросы участникам следственного действия

ПРИ ЯВЛЕНИИ ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИИ МИОКАРД СТАНОВИТСЯ ДРЯБЛЫМ, БЛЕДНО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА С УЧАСТКАМИ ЖЕЛТО-БЕЛОЙ ИСЧЕРЧЕННОСТИ, ЧТО ДАЛО ОСНОВАНИЕ НАЗВАТЬ ТАКОЕ СЕРДЦЕ

- 1) «глиняным»
- 2) «гусиным»
- 3) «тигровым»

4) «бычьим»

МОРФОЛОГИЯ ТУПОГО КОНЦА КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ЗАВИСИТ В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТ

- 1) угла заточки режущего края клинка
- 2) величины толщины обушка клинка
- 3) конфигурации острого конца клинка
- 4) ширины клинка ножа

К КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) гепатоканаликулярную
- 2) каналикулярную
- 3) гепатоцеллюлярную
- 4) острую циклическую

ДЛЯ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ КОКАИНА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ _____ КРОВОТЕЧЕНИЕ

- 1) венозного
- 2) легочного
- 3) носового
- 4) желудочного

ПРИ ОЖОГЕ КОЖИ 2 СТЕПЕНИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗНИКАЮТ В

- 1) глубоких тканях
- 2) мышцах
- 3) дерме и подкожно-жировой клетчатке
- 4) толще дермы

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) об обстоятельствах дела
- 2) о выводах эксперта
- 3) об объектах, оставленных на хранение в архиве ГСМЭУ
- 4) о результатах лабораторных исследований

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СУБДУРАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) мешотчатой аневризмы Велизиева круга
- 2) средней артерии мягкой мозговой оболочки
- 3) поперечных мостовых вен
- 4) намета мозжечка

ПОСМЕРТНАЯ РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТЕН _____ ЦВЕТА

- 1) зеленого
- 2) синего
- 3) охряного
- 4) желтого

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ШЕЕК СУСТАВНЫХ ОТРОСТКОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОГУТ СФОРМИРОВАТЬСЯ ПРИ УДАРАХ

- 1) сбоку в область угла нижней челюсти при сомкнутых челюстях
- 2) спереди в область подбородка при сомкнутых челюстях
- 3) спереди в среднюю часть угла нижней челюсти при разомкнутых челюстях
- 4) сбоку в область угла нижней челюсти при разомкнутых челюстях

ПРИ ОЖОГЕ 1 СТЕПЕНИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗНИКАЮТ В

- 1) подкожной жировой основе
- 2) мышцах
- 3) дерме
- 4) эпидермисе

УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ДЕФЕКТОМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КАК ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

- 1) рассматривается
- 2) не рассматривается
- 3) рассматривается только в случае смерти пациента
- 4) рассматривается только при наличии тяжкого вреда

ЧАСТИЧНЫМ РАЗЪЕДИНЕНИЕМ КОСТИ С ОБРАЗОВАНИЕМ ДВУХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, НЕ СУЩЕСТВОВАВШИХ РАНЕЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трещина
- 2) надлом
- 3) отломок
- 4) перелом

ОТКРЫТЫЙ ФРАГМЕНТАРНО-ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ПРАВОЙ ГОЛЕНИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ЛИЧИНКА ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ПРОХОДИТ ВТОРУЮ СТАДИЮ СПУСТЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО (В ЧАСАХ)

- 1) 120-130
- 2) 50-60
- 3) 24-48

4) 70-80

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТУПОЙ ТРАВМЫ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ РАЗВИТИЕМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) опасность для жизни
- 4) угрожающее жизни состояние

РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 30% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ЛЕГКИЕ РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, СУХОЖИЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) средней тяжести

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННУЮ КОНТРАКТУРУ ПРАВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА ПРИ СГИБАНИИ 20?-25?, РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) не причинившее вред здоровью
- 2) причинившее легкий вред здоровью
- 3) причинившее вред здоровью средней тяжести

4) причинившее тяжкий вред здоровью

ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАВНОЙ +20°C, ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ ТРУПНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛИТСЯ ДО (В ЧАСАХ)

- 1) 20-24
- 2) 24-30
- 3) 10-15
- 4) 15-20

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ РЕЗКОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ВЫРАЖЕННЫЙ МИОЗ ХАРАКТЕРЕН ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) беленой
- 2) опиумом
- 3) наперстянкой
- 4) дурманом

К ПОДОСТРОЙ ФОРМЕ ТЕПЛОВОЙ ТРАВМЫ ОТНОСЯТ

- 1) дегидратационную
- 2) латентную
- 3) среднюю
- 4) тяжелую

ОСНОВНОЙ ГЕНЕЗ СМЕРТИ ПРИ ПОВЕШЕНИИ ОБУСЛОВЛЕН

- 1) сдавлением трахеи
- 2) сдавлением яремных вен
- 3) повреждением спинного мозга
- 4) спазмом гортани

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ ПРИЗНАКОВ

**НЕРАСПОЗНАННЫХ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА КАРАНТИННЫХ И ДРУГИХ
ИНФЕКЦИЙ ИНФОРМИРУЮТ**

- 1) следователя
- 2) родственников подэкспертного
- 3) руководителя инфекционной больницы
- 4) орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТ,
В ТОМ ЧИСЛЕ**

- 1) длиномер
- 2) тазомер
- 3) штангенрейсмус
- 4) штангенглубиномер

**ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ НЕПОДВИЖНОСТЬ ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО, ПЯСТНО-
ФАЛАНГОВОГО И МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВОВ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ
КИСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНУЮ 25% СТОЙКОЙ
УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ,
ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней степени
- 4) лёгкий

КЛИНОК КИНЖАЛА ОБЛАДАЕТ _____ЛЕЗВИЯМИ

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 4

**МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВЕЩЕСТВА, ВЫЗЫВАЮЩИМ В ОРГАНИЗМЕ
БОЛЕЗНЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ДОЗА**

- 1) летальная
- 2) токсическая
- 3) вводная
- 4) терапевтическая

**К ПРИЗНАКАМ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ КАННАБИНОИДАМИ ОТНОСЯТ, В ТОМ
ЧИСЛЕ**

- 1) дезориентацию в месте и времени
- 2) кому
- 3) миоз
- 4) гиперрефлексию

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ДИССЕМИНИРОВАННЫХ МИКОЗОВ ОТ ТРУПА

БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) гной
- 2) аммонов рог
- 3) мочу
- 4) желчь

ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПОСТУПЛЕНИИ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1) ринит
- 2) бронхоспазм
- 3) ларингит
- 4) трахеит

ПРИ ВНЕСЕНИИ В ПРОТОКОЛ ОСМОТРА ДАННЫХ О ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ

- 1) группу крови
- 2) глубину обнаруженных повреждений
- 3) результаты химического исследования
- 4) точное время проведения осмотра

ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ РЕЗАНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ШЕИ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) анафилактический шок
- 2) апоплексия головного мозга
- 3) странгуляционная асфиксия
- 4) воздушная эмболия

ПОЛНЫМ ЗАРАЩЕНИЕМ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) аплазия
- 2) гинатрезия
- 3) атрезия
- 4) стеноз

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ НА

- 1) 3 степени
- 2) 4 степени
- 3) 6 степеней
- 4) 5 степеней

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) цветных реакций
- 2) фотометрии
- 3) эмиссионного спектрального анализа
- 4) рентгенфлюоресценции

НА СИМУЛЯЦИЮ ПОВЕШЕНИЯ УКАЗЫВАЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1) зажатых пальцев между материалом петли
- 2) чистых рук при загрязненной петле
- 3) косовосходящей странгуляционной борозды
- 4) множественной странгуляционной борозды

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ХВАТАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) лёгкий

ДЛЯ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ФЛЮОРЕСЦИРУЮЩИХ АНТИТЕЛ МАЗКИ-ОТПЕЧАТКИ СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТРАХЕИ ФИКСИРУЮТ В

- 1) формалине
- 2) спирте 96%
- 3) воде
- 4) глицерине

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МОГУТ ВЫДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕМОУ ЭКСПЕРТИЗУ, ПО

- 1) устной договоренности
- 2) доверенности
- 3) желанию
- 4) письменному заявлению

ВЗДУТИЕ КИШЕЧНИКА, УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЖИВОТА И НЕКОТОРОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ СПУСТЯ ____ ЧАСОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

- 1) 4-8
- 2) 6-12
- 3) 20-48
- 4) 15-18

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА ПРИ СДАВЛЕНИИ ГОЛОВЫ В НАПРАВЛЕНИИ СВЕРХУ-ВНИЗ И НАКЛОНЕ ЕЕ К ПЕРЕДИ ОБРАЗУЮТСЯ В _____ ОБЛАСТИ

- 1) височной
- 2) теменной
- 3) лобной
- 4) затылочной

ЗАКРЫТАЯ ТУПАЯ СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА ГРУДИ И ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ АОРТЫ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЯИЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТА ПОСТОЯННОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ НЕ МЕНЕЕ ____ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПАРАЛИЧ АККОМОДАЦИИ ОБОИХ ГЛАЗ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

К ВТОРОМУ ПЕРИОДУ ОЖГОВОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- 1) ожоговую токсемию
- 2) шок
- 3) инфекцию
- 4) истощение

В СЛУЧАЯХ ПОРЧИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО АРХИВА ИЛИ ЕГО НЕПРИГОДНОСТИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ХРАНЕНИЮ СОСТАВЛЯЮТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ

- 1) протокол
- 2) справку
- 3) заключение
- 4) акт

СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ВХОДЯТ В ГРУППУ ____ ЯДОВ

- 1) деструктивных
- 2) функциональных
- 3) едких

4) гемолитических

К УТОПЛЕНИЮ С ПРИЗНАКАМИ ПРОНИКНОВЕНИЯ СРЕДЫ ВОДОЕМА В ЛЕГКИЕ И СОСУДИСТОЕ РУСЛО ОТНОСЯТ _____ ТИП

- 1) аспирационный
- 2) спастический
- 3) рефлекторный
- 4) сухой

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПРИКАЗОМ

- 1) Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н
- 2) Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н
- 3) Минздрава России от 24.03.2016 № 179н
- 4) Минздрава России от 07.07.2015 № 422ан

ПРИ РЕКТАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, РАВНОЙ 27,0 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ, ДАВНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОРИЕНТИРОВОЧНО МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В ЧАСАХ) (ПО В.В. БИЛКУНУ, 1985)

- 1) 10
- 2) 6
- 3) 16
- 4) 8

СТАДИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ДЛИТСЯ ДО _____ МЕСЯЦА/МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ КРОВОПОТЕРИ

- 1) 5
- 2) 7
- 3) 2
- 4) 1

РЕЗОРБТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) парализующим действием на дыхательный и сосудистый центры
- 2) ожогами слизистой оболочки пищеварительного тракта
- 3) нарушением кислотно-щелочного равновесия в тканях и жидких средах организма
- 4) прямым действием на структуры клеток и тканей

АНТАГОНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЯДОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) взаимном усилении действия
- 2) комбинации действия ядов
- 3) накоплении ядов
- 4) ослаблении действия одного за счет действия другого

ПРИ УДАРЕ «НОСКОМ» ИЛИ «ПЯТКОЙ» ТОПОРА ОБРАЗУЕТСЯ РУБЛЕННАЯ РАНА,

КОТОРАЯ ИМЕЕТ ФОРМУ

- 1) звездчатую
- 2) щелевидную с острыми концами
- 3) вытянутого треугольника с одним тупым и с другим острым концом
- 4) щелевидную с тупыми П-образными концами

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

К ПРИЗНАКАМ ОТКРЫТОЙ ПРОНИКАЮЩЕЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ОТНОСЯТ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ

- 1) мягких тканей, мозговых оболочек и ткани головного мозга
- 2) костей черепа, твердой и мягких мозговых оболочек
- 3) мягких тканей, костей черепа и твердой мозговой оболочки
- 4) мягких тканей, костей черепа и мягких мозговых оболочек

НАЛИЧИЕ ВОЗДУХА В ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВНЕУТРОБНОЙ ЖИЗНИ (В ЧАСАХ)

- 1) 1-4
- 2) 0,5-1
- 3) 4-6
- 4) 6-12

СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ЛЕВОГО ПЛЕЧА ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ КОЛОТОЙ РАНЫ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ПРОЯВЛЕНИЕМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРОВОДОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ ИНГИБИРОВАНИЕ

- 1) моноаминоксидазы
- 2) сульфгидрильных групп тиоловых ферментов
- 3) цитохромоксидазы
- 4) ацетилхолинэстеразы

ПРИ УДАРЕ ПО СПИНЕ ТОРЦЕВОЙ ЧАСТЬЮ ПРЕДМЕТА ТРУБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПОД УГЛОМ ОТ 90 ДО 75 ГРАДУСОВ ОБРАЗУЮТСЯ «ШТАМПОВАННЫЕ» ССАДИНЫ _____ ФОРМЫ

- 1) кольцевидной
- 2) дуговидной
- 3) полукруглой
- 4) звёздчатой

ПРИ ОБЩЕМ ТЕПЛОВОМ ПОРАЖЕНИИ ПРИЧИНОЙ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) нарушение ферментной регуляции
- 2) общее запредельное торможение нервной системы
- 3) нарушение гормональной регуляции
- 4) паралич дыхательного центра

ПРИ ГИСТОХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ В СЛУЧАЯХ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В ПЕЧЕНИ

- 1) изменяется хаотично
- 2) повышается
- 3) понижается
- 4) не изменяется

ОБНАРУЖЕНИЕ В КРОВИ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КОНЦЕНТРАЦИИ ДО 5 ПРОЦЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВАРИАНТОМ

- 1) нормы
- 2) легкого отравления
- 3) сильного отравления
- 4) смерти

ОБНАРУЖЕНИЕ В МОКРОТЕ ОДНОВРЕМЕННО ОБЫЗВЕЩВЛЕННЫХ ЭЛАСТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА, КРИСТАЛЛОВ ХОЛЕСТЕРИНА И АМОРФНОЙ ИЗВЕСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕТРАДОЙ

- 1) Гейла
- 2) Фалло
- 3) Эрлиха
- 4) Коха

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ

КОЛОТОЙ РАНЫ СТЕНКИ ПРЯМОЙ КИШКИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПОЛОСТЬ МАЛОГО ТАЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) развитие угрожающего жизни состояния
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ПО ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившее
- 2) причинившее лёгкий
- 3) причинившее тяжкий
- 4) причинившее средней тяжести

СМЕРТЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ

- 1) первичной остановки дыхания
- 2) поражения головного мозга
- 3) угнетения органов эндокринной системы
- 4) тромбоэмболии легочной артерии

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВЫХ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ И ЛОКТЕВОМ СУСТАВАХ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее легкий вред здоровью
- 2) не причинившее вред здоровью
- 3) причинившее тяжкий вред здоровью
- 4) причинившее вред здоровью средней тяжести

К НЕМЕДИЦИНСКИМ МАРКЕРАМ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОТНОСЯТ

- 1) трупное окоченение
- 2) трупное высыхание
- 3) трупные пятна
- 4) информацию по сотовому телефону

РАЗМОЗЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК

ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА С III ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ЛЕВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

К ОБЯЗАННОСТЯМ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) определение патологических изменений органов
- 2) установление давности наступления смерти
- 3) проведение внутреннего исследования
- 4) формулирование судебно-медицинского диагноза

ПРИЗНАКОМ, ИСКЛЮЧАЮЩИМ ВЫВОД О МГНОВЕННОЙ СМЕРТИ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ АВИАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наличие поздних трупных изменений частей тел погибших
- 2) отсутствие трупного окоченения в частях тела и конечностей
- 3) обнаружение крови в желудке, бронхиолах, альвеолах
- 4) наличие трупного окоченения в частях тела и конечностей

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ КРАЕВ РАНЫ, НАНЕСЕННОЙ ЗА 1-2 ЧАСА ДО НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ, НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1) краевое стояние лейкоцитов в сосудах
- 2) скопление гемосидерофагов
- 3) лейкоцитарный вал
- 4) обнаружение макрофагов

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ, ВСЛЕДСТВИЕ РЕЗКО ВЫРАЖЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ (В ВЫПРЯМЛЕННОМ) ЕГО ПОЛОЖЕНИИ, ВЛЕКУЩЕЕ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

ПРИ ПРЯМОЙ ТРАВМЕ ОТ УДАРА ПО ЛУЧЕВОЙ СТОРОНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ОБРАЗУЕТСЯ ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХ ГАЛЕАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ ПЕРЕЛОМОМ

- 1) лучевой кости в нижней трети с разрывом дистального лучелоктевого сустава и вывихом в этом суставе
- 2) бедренной кости с разрывом связок коленного сустава и вывихом в этом суставе
- 3) лучевой кости в типичном месте с вывихом ладьевидной кости
- 4) плечевой кости и вывихом ключицы

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА ПРИОБРЕТАЕТ ВИД СТРУПА ____ ЦВЕТА

- 1) желтого
- 2) красного
- 3) синего
- 4) голубого

ПЕРЕЛОМ ТЕЛА КРЕСТЦОВЫХ ПОЗВОНКОВ С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

МЕХАНИЧЕСКОЕ НАНЕСЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТУПЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ПРИВОДИТ К

- 1) членовредительству
- 2) симуляции
- 3) аггравации
- 4) дезаггравации

РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 30% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

СМЯТИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЕЕ СЖАТИИ С ФОРМИРОВАНИЕМ ЖЕЛОБОВИДНОГО УГЛУБЛЕНИЯ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЕРЕЛОМА ПО ТИПУ

- 1) «зеленой веточки»
- 2) «бочкообразного вспучивания»
- 3) «желеобразного смятия»
- 4) «валикообразного спучивания»

ОТВЕРСТИЕ В ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЕ ИЗМЕРЯЮТ

- 1) стеклянной палочкой
- 2) динамометром
- 3) гиенометром
- 4) штангенциркулем

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПОГРУЖЁННОЙ ЧАСТИ КЛИНКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ДЛИНЕ

- 1) раны концевой отдела раневого канала
- 2) раневого канала
- 3) основного разреза
- 4) дополнительного разреза

ПАЛЬПАТОРНО ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗМЯГЧЕНИЯ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК МОЖНО ОТМЕТИТЬ К КОНЦУ ____ СУТОК ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 1

ПО МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОМУ СОСТАВУ КОСТИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ _____ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

- 1) расовую
- 2) родственную
- 3) видовую
- 4) половую

РЕКТАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 15 ЧАСОВ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИЮ) (ПО В.В. БИЛКУНУ, 1985)

- 1) 37,1
- 2) 34,6
- 3) 27,6
- 4) 36,6

ФОРМИРОВАНИЕ НЕКРОЗА МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ СКЕЛЕТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ____ СТЕПЕНИ ОБМОРОЖЕНИЯ

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 2

ПРИ ОСТРОМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ НЕФРИТЕ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ НЕФРИТ

- 1) склерозирующий
- 2) нисходящий

- 3) плазмоцитарный
- 4) восходящий

ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ОПИАТЫ НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ (В МИНУТАХ)

- 1) 5-10
- 2) 15-30
- 3) 60-90
- 4) 30-60

УГОЛЬНО-ЧЕРНАЯ ОКРАСКА СТРУПА МОЖЕТ БЫТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ _____ КИСЛОТОЙ

- 1) уксусной
- 2) серной
- 3) плавиковой
- 4) азотной

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ

- 1) заключение эксперта
- 2) медицинские документы
- 3) легковоспламеняющиеся вещества
- 4) тома уголовного дела

С ЦЕЛЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИЖИЗНЕННЫХ И ПОСМЕРТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ОПРЕДЕЛЯЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

- 1) карбоксигемоглобина
- 2) гемина
- 3) глюкозы
- 4) гликогена

ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРА ПОРАЖЕНИЯ СПИНЫ ПО ПРАВИЛУ «ДЕВЯТКИ» СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 9
- 2) 18
- 3) 14
- 4) 1

ПРИ ФОРМУЛИРОВКЕ ЭКСПЕРТНЫХ ВЫВОДОВ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ БЕЗ ОТВЕТА ОСТАВЛЯЮТ ВОПРОСЫ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ВОПРОСЫ

- 1) относятся к определению давности наступления смерти
- 2) отражают факт употребления алкоголя
- 3) касаются характера и механизма причинения повреждений
- 4) выходят за пределы специальных познаний эксперта

ПРЕБЫВАНИЕ ТРУПА В УВЛАЖНЕННОЙ ИЛИ ГНИЛОСТНОЙ ПОЧВЕ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ

- 1) гниения
- 2) состояния торфяного дубления
- 3) мумификации
- 4) жировоска

ТИПИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНФАРКТОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ МОЗГОВЫХ АРТЕРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) мозолистое тело
- 2) продолговатый мозг
- 3) кора больших полушарий мозга
- 4) белое вещество больших полушарий

ПРЕДАГОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) угнетением коры мозга
- 2) прогрессирующим снижением артериального давления
- 3) полным угнетением рефлексов
- 4) отсутствием дыхания

В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭКСПЕРТА МАТЕРИАЛОВ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА В НЕДОСТАТОЧНОМ ОБЪЕМЕ НЕОБХОДИМО

- 1) ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов
- 2) произвести исследование в полном объеме
- 3) произвести исследование частично
- 4) передать в производство более опытному эксперту

К НЕМЕДИЦИНСКИМ МАРКЕРАМ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОТНОСЯТ

- 1) трупное высыхание
- 2) трупные пятна
- 3) характер остатков пищи
- 4) охлаждение

ЗРЕЛОСТЬ ПЛОДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) степенью физического развития к моменту родов
- 2) способностью продолжать жить вне организма матери
- 3) сроком нахождения плода в организме матери
- 4) продолжительностью жизни плода вне организма матери

ГИДРОЛИТИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ ЖИРА В ТКАНЯХ ТРУПА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕГО ОКИСЛЕНИЕМ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- 1) гумификации

- 2) карбогенизации
- 3) мумификации
- 4) омыления

УЧАСТКОМ КЛЮЧИЦЫ ПРИ ПРИЛОЖЕНИИ СИЛЫ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ОТ ДЕФОРМАЦИИ КРУЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) грудинный конец
- 2) верхняя поверхность
- 3) передняя поверхность
- 4) акромиальный конец

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ТЕТРАПЛЕГИЮ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

НОЖНИЦЫ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ

- 1) тонкого и толстого кишечника
- 2) связок
- 3) внутренних органов и крупных сосудов
- 4) протоков и малых сосудов

ПРИЗНАК ПРОЗОРОВСКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ

- 1) утоплении в пресной воде
- 2) огнестрельной травме
- 3) действии низкой температуры
- 4) закрытии полости рта и носа

ПО КОНСТРУКЦИИ ПРЕДМЕТЫ СТРАНГУЛЯЦИИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

- 1) незатягивающиеся и затягивающиеся
- 2) двойные и множественные
- 3) полумягкие и комбинированные
- 4) домашнего обихода и открытой местности

ПРОСТЫЕ КИСТЫ ПОЧЕК ВЫСТЛАНЫ _____ ЭПИТЕЛИЕМ

- 1) плоским ороговевающим
- 2) призматическим
- 3) кубическим
- 4) цилиндрическим

НОВОРОЖДЕННЫМ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ СЧИТАЮТ МЛАДЕНЦА, ПРОЖИВШЕГО

(В СУТКАХ)

- 1) 7
- 2) 3
- 3) 1
- 4) 5

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ОСЯЗАТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ РАЗВИВАЕТСЯ АГНОЗИЯ

- 1) зрительная
- 2) акустическая
- 3) обонятельная
- 4) сенсорная

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ГЕМОЛИТИЧЕСКИМ И ГЕПАТОТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ОТРАВЛЕНИЕ

- 1) шампиньонами
- 2) мухоморами
- 3) строчками
- 4) бледной поганкой

ПРИЧИНОЙ НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ НОВОРОЖДЕННОГО МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) переохлаждение
- 2) гемолитическая болезнь
- 3) обвитие шеи пуповиной
- 4) удушение руками

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

ОТРАВЛЕНИЕ СНОТВОРНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ВЫЗЫВАЕТ ПОРАЖЕНИЕ

- 1) селезенки
- 2) почек
- 3) матки
- 4) костного мозга

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

СТАЛО:ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОСТНОГО МОЗГА С ПОРАЖЕНИЕМ НАДКОСТНИЦЫ, ГУБЧАТОГО И КОМПАКТНОГО ВЕЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) остеопороз
- 2) остеонекроз
- 3) остеодистрофия
- 4) остеомиелит

АВТОРОМ ОПИСАНИЯ КАРМИНОВОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) Лакассань
- 2) Быстров
- 3) Фабрикантов
- 4) Крушевский

ПАЛЬПАТОРНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ МЫШЕЧНЫЙ ВАЛИК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ (В ЧАСАХ) (ПО БИЛКУНУ В.В., 1986)

- 1) 10-11
- 2) 6-9
- 3) 3-6
- 4) 1-3

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ НА МИКРОСКОПИЧЕСКОМ УРОВНЕ ВОЗМОЖНО РАЗРАСТАНИЕ ГРАНУЛЯЦИОННОЙ ТКАНИ В ВИДЕ

- 1) бляшек
- 2) пятен
- 3) кист
- 4) полипов

ТРУПНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СВЯЗАНО С

- 1) испарением влаги с поверхности тела
- 2) денатурацией белка
- 3) пропитыванием плазмой мягких тканей
- 4) ресинтезом аденозинтрифосфорной кислоты

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ У ФУТБОЛИСТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ____ СУСТАВ

- 1) голеностопный

- 2) плечевой
- 3) коленный
- 4) локтевой

К ПРИЗНАКАМ РЕЗАНОЙ РАНЫ ОТНОСЯТ _____ КРАЯ

- 1) неровные осаднённые
- 2) ровные неосаднённые
- 3) кровоподтёчные осаднённые
- 4) размозжённые неровные

ВДАВЛЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА ОТНОСЯТСЯ К

- 1) конструкционным
- 2) локальным
- 3) паутинообразным
- 4) неполным

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 2) вытягивание клеток эндотелия капилляров сосочкового слоя дермы
- 3) образование микротромбов
- 4) геморрагическое пропитывание

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА АПТЕЧНЫМ НАШАТЫРНЫМ СПИРТОМ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 30-40
- 2) 50-100
- 3) 25-50
- 4) 5-10

ПОКАЗАТЕЛЬ ИНДЕКСА АЛЬГОВЕРА ДО 0,8 СООТВЕТСТВУЕТ СТЕПЕНИ ШОКА

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

ПЕРЕЛОМ ДУГИ ОДНОГО ГРУДНОГО ПОЗВОНКА С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

ПОТЕРЯ ОДНОГО ЯИЧКА ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

МАЛЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ДОНОШЕННОГО ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 11
- 2) 10
- 3) 8
- 4) 9,5

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АМИЛОВЫМИ СПИРТАМИ ИЗ ПОЛОСТЕЙ И ОТ ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ЗАПАХ

- 1) ацетона
- 2) сивушных масел
- 3) чеснока
- 4) формалина

СУЛЬФИД ЖЕЛЕЗА ПРИДАЕТ МЯГКИМ ТКАНЯМ И ПАРЕНХИМЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ____ ОКРАСКУ

- 1) грязно-зеленую
- 2) черную
- 3) серо-синюшную
- 4) грязно-изумрудную

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ, РАВНОЕ 60% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЙ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ЭМБОЛИЯ

- 1) воздушная
- 2) газовая
- 3) тканевая
- 4) жировая

ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООЖОГОВ ФОРМИРУЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1) органах

- 2) костях
- 3) коже
- 4) нервных стволах

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ ПРОВОДИТ

- 1) врач – медико-социальный эксперт
- 2) врач-реаниматолог
- 3) врач – судебно-медицинский эксперт
- 4) врач – психиатр-нарколог

ПЕРЕДОЗИРОВКУ ИНСУЛИНОМ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМОЙ II-III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

- 1) запросу органов социальной защиты
- 2) направлению органов управления здравоохранением
- 3) направлению адвоката
- 4) определению суда

ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ПУТРИФИКАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧАСТИЧНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ БЕЛКОВ И ДЕКАРБОКСИЛИРОВАНИЯ ИХ АМИНОКИСЛОТ БИОГЕННЫЕ ДИАМИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) трупным аутолизом
- 2) «посмертной рвотой»
- 3) «трупным ядом»
- 4) «могильными родами»

ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБОРОТОВ ПЕТЛИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК

- 1) одинарные и многорядные
- 2) однооборотные и многооборотные
- 3) затягивающиеся и незатягивающиеся
- 4) замкнутые и незамкнутые

ОЖОГ ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ РАЗВИТИЕМ ШОКА III-IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) клеток Ито печеночных долек
- 2) плотной волокнистой соединительной ткани капсулы
- 3) холестаза со значительными площадями повреждения гепатоцитов
- 4) междольковой соединительная ткани

УКСУСНАЯ КИСЛОТА ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- 1) панкреатита
- 2) цирроза печени
- 3) пигментного нефроза
- 4) цистита

ПРИ ПОВЕШЕНИИ СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ БОРОЗДА В ТИПИЧНОМ СЛУЧАЕ

- 1) прерывистая
- 2) косовосходящая
- 3) горизонтальная
- 4) множественная

ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗВИТИЕМ ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

СДАВЛЕНИЕ ПРЕДЛЕЖАЩЕЙ ЧАСТИ ПЛОДА В РОДОВЫХ ПУТЯХ С ПРОПИТЫВАНИЕМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ СЕРОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ

- 1) подапоневротической гематомы
- 2) кефалогематомы
- 3) родовой опухоли
- 4) идиомускулярной опухоли

В МЕСТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТРЕЛОВИДНОГО ШВА С ЛИНИЕЙ, СОЕДИНЯЮЩЕЙ ЦЕНТРЫ ТЕМЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОТВЕРСТИЙ, РАСПОЛАГАЕТСЯ КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

- 1) лямбда
- 2) обелион
- 3) базион
- 4) астрион

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУ НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

КРОВОИЗЛИЯНИЯ В СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ЖЕЛУДКА, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРИ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ ПЯТНАМИ

- 1) Рассказова – Лукомского
- 2) Шершевского – Тернера
- 3) Тардые
- 4) Вишневского

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА С ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ЛЕВОЙ КИСТИ, РАВНОЕ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) средней тяжести

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ГИПЕРОСМОЛЯРНОЙ КОМОЙ II-III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) опасность для жизни
- 4) угрожающее жизни состояние

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ВЫДАЕТСЯ ВМЕСТЕ

- 1) с гистологическим архивом
- 2) с объектами исследований
- 3) с журналом регистрации
- 4) со вторым экземпляром заключения

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

В ПАТОГЕНЕЗЕ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ ВЕДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖИТ

- 1) гистамину
- 2) эфедрину
- 3) брадикинину
- 4) аманитину

ОБРАЗОВАНИЕ ССАДИНЫ ИЛИ КРОВОПОДТЕКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ _____ ДЕЙСТВИИ ПУЛИ

- 1) ушибающем
- 2) пробивном
- 3) клиновидном
- 4) разрывном

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ МАТКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) боеприпасы
- 2) акт проверки
- 3) заключение эксперта
- 4) материалы дела

ВЕЛИЧИНА КРОВОПОТЕРИ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ (В МЛ)

- 1) 500-1000
- 2) 300-500
- 3) 2500-3000
- 4) 800-1400

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) заключение эксперта
- 2) материалы дела
- 3) объекты исследования
- 4) взрывчатые вещества

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ МИЗИНЦА ЛЕВОЙ КИСТИ

НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) угрожающий жизни
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ НОРМОЙ ДЛЯ ОТВОДА ЭКСПЕРТА ПО ПРИЧИНЕ «ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОГО-ЛИБО ИЗ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» ЯВЛЯЕТСЯ СТАТЬЯ ____ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1) 10 «Гласность судебного разбирательства»
- 2) 18 «Основания для отвода прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика»
- 3) 19 «Заявления о самоотводах и отводах»
- 4) 16 «Основания для отвода судьи»

ТРУПНЫЙ СТАЗ ДЛИТСЯ ОКОЛО (В ЧАСАХ)

- 1) 10-14
- 2) 2-6
- 3) 22-24
- 4) 36-48

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ТАЛЛИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ненадлежащее оказание медицинской помощи
- 2) разовое употребление большого количества морепродуктов
- 3) получение удовольствия
- 4) достижение криминальной цели

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦА ПРОВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1) кровоподтечности краев
- 2) осаднению
- 3) поверхности
- 4) реактивному воспалению

ИССЛЕДОВАНИЕ ВХОДНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ В ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ

- 1) снаряда
- 2) копоти и порошинок
- 3) пояска осаднения
- 4) горюче-смазочных материалов

УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ДЕФЕКТОМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КАК ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- 1) квалифицируется
- 2) не квалифицируется
- 3) квалифицируется только в случае наступления смерти пациента
- 4) квалифицируется в случае наличия признаков тяжкого вреда

К ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ В ЛЕГКИХ ПРИ АСФИКСИИ НОВорожденного ОТНОСЯТ

- 1) сочетание ателектаза с отеком и гиалиновыми мембранами
- 2) наличие в бронхах и альвеолах роговых чешуек
- 3) везикулярную эмфизему
- 4) венозный застой

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) изменения поляризации клеточных мембран
- 2) отравления кислородом
- 3) отравления парами расплавленных частей установок
- 4) нарушения ионного равновесия

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

МЕТОДОМ, НАЧИНАЮЩИМСЯ С АНАЛИЗА И СРАВНЕНИЯ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) индукция
- 2) дедукция
- 3) измерение
- 4) наблюдение

ПРИЗНАКАМИ ВЗРЫВНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙНОЙ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ САЛОНА ВОЗДУШНОГО СУДНА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) повреждения слуховых косточек
- 2) осколочные ранения
- 3) термические ожоги
- 4) компрессионные переломы позвонков

УМЕНЬШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ С ПОВЫШЕНИЕМ ПОТЕРИ ЕЕ НАД ПОСТУПЛЕНИЕМ И ЭНДОГЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гипотермия
- 2) отек
- 3) лихорадка

4) дегидратация

ЦИРКУЛЯТОРНАЯ ГИПОКСИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1) отравлении цианидами
- 2) острой кровопотери
- 3) разрыва селезенки
- 4) отравлении барбитуратами

К ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ БАРОТРАВМЫ ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ЭМБОЛИЮ

- 1) жировую
- 2) тканевую
- 3) воздушную
- 4) газовую артериальную

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИНОВ ГРИБОВ ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) иммуногистохимии
- 2) ИК-спектроскопии
- 3) УФ-спектрометрии
- 4) тонкослойной хроматографии

ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ СИНДРОМОМ, ОБУСЛОВЛЕННЫМ ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИЕЙ ПЕЧЕНОЧНЫХ КЛЕТОК В ВИДЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВНУТРИ– И/ИЛИ ВНЕКЛЕТОЧНОГО ОТЛОЖЕНИЯ ЖИРОВЫХ КАПЕЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гепатит
- 2) стеатогепатоз
- 3) холестаз
- 4) холангит

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СОЖЖЕНИЯ ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО НА КОСТРЕ, СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

- 1) 15-18
- 2) 30-35
- 3) 10-15
- 4) 2-2,5

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ДВУСТОРОННЕГО ПЕРЕЛОМА ДУГИ ОДНОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО

МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) неудовлетворенностью руководителя ГСЭУ результатами экспертизы
- 2) отсутствием сомнений в правильности выводов экспертизы
- 3) личной заинтересованностью следователя результатами экспертизы
- 4) отсутствием первичной экспертизы

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ДЛЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЫМАЮТ

- 1) глотку, трахею и пищевод
- 2) кровь, мышечную ткань
- 3) одну треть головного мозга
- 4) спинномозговую жидкость

МАТЕРИАЛ ПЕТЛИ ПО СВОЕЙ СТРУКТУРЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК

- 1) волокнистый и неволокнистый
- 2) эластичный и неэластичный
- 3) мягкий и твердый гибкий
- 4) однородный и разнородный

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ СУРРОГАТАМИ АЛКОГОЛЯ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившее
- 4) средней тяжести

ВРАЧ, УЧАСТВОВАВШИЙ В ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАН В СУД В КАЧЕСТВЕ

- 1) свидетеля
- 2) эксперта
- 3) специалиста
- 4) понятого

АНОМАЛИЯ РАЗВИТИЯ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ С ХАРАКТЕРНЫМ НЕПРАВИЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОТВЕРСТИЯ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гипоспадией
- 2) гермафродитизмом
- 3) агениезией
- 4) врожденной гипоплазией

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОТНОСЯТ

- 1) осаднённые края и неповреждённые волосы
- 2) кровоподтёчные края и вывернутые луковички волос
- 3) наличие остроугольного и тупого концов
- 4) преобладание длины раневого канала над длиной раны

ТРАВМАТИЧЕСКУЮ РАДИКУЛОПАТИЮ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ОКРАШИВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА В КРАСНОВАТЫЙ ЦВЕТ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БОЛЬШИМИ ДОЗАМИ ЦИАНИДОВ ОБУСЛОВЛЕНО ОБРАЗОВАНИЕМ

- 1) карбоксигемоглобина
- 2) метгемоглобина
- 3) солянокислого гематина
- 4) циангематина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ФЕРМЕНТА ЛЕЙЦИНАМИНОПЕТИДАЗЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ

- 1) установлении групповых свойств крови плода
- 2) определении регионарного происхождения крови
- 3) определении половой принадлежности новорожденного
- 4) дифференцировании крови плода и матери

ПРЕДВЕСТНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ТРАВМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) носовое кровотечение
- 2) гиперкинезия
- 3) гипертония
- 4) гипотермия

ХАРАКТЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ У ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ВОЗНИКАЮТ ОТ УДАРА О

- 1) панель багажника
- 2) рулевое колесо
- 3) боковую панель крыши
- 4) решетку радиатора

К ОБЪЕКТАМ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАПРАВЛЯТЬ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ, ОТНОСЯТ

- 1) волосы
- 2) сальник
- 3) селезёнку
- 4) пищевод

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) некрозы жировых клеток
- 2) некрозы мышечных волокон
- 3) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 4) металлизацию эпидермиса с гнездным расположением частиц металла в глубжележащих слоях кожи

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 35°C И СРЕДНЕЙ ВЛАЖНОСТИ ЧЕЛОВЕК ВЫДЕЛЯЕТ ДО _____ ЛИТРОВ ПОТА В ЧАС

- 1) 1-2
- 2) 2-3
- 3) 3-4
- 4) 4-5

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

- 1) судом
- 2) следователем
- 3) группой экспертов разных медицинских специальностей
- 4) прокурором

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ТОКСИНОВ ГРИБОВ ПРИМЕНЯЮТ _____ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1) гистологическое
- 2) хромато-масс-спектрометрическое
- 3) ИК-спектроскопическое
- 4) вирусологическое

ОТКРЫТЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий

4) средней тяжести

МЕХАНИЗМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ ЯДОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СПОСОБНОСТИ

- 1) стабилизировать цитохромоксидазу
- 2) ингибировать цитохром
- 3) угнетать ЦНС
- 4) разрушать строу эритроцитов

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 28-30°C И 100% ВЛАЖНОСТИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

- 1) озноб
- 2) лихорадка
- 3) перегревание организма
- 4) ожоговая болезнь

О ПРИЖИЗНЕННОСТИ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРИЗНАК

- 1) Фабрикантова
- 2) Крушевского
- 3) Крюкова
- 4) Бокариуса

СОВОКУПНОСТЬ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА К ДЕЙСТВИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО РЕЗУЛЬТАТА В ВИДЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРОДУКТА, ИЗДЕЛИЯ ИЛИ УСЛУГИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трудоспособностью
- 2) категорией
- 3) квалификацией
- 4) компетентностью

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АКТИВНОМ ГЕПАТИТЕ РАЗВИВАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ГЕПАТОЦИТОВ

- 1) ишемия
- 2) атрофия
- 3) дистрофия
- 4) деструкция

ПЕРЕЛОМ ТЕЛА ОДНОГО ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ (РАЗГИБАНИЕ/РАЗГИБАНИЕ – 30?-40?),

ВЫЗВАВШЕЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ПЕРЕЛОМ ДУГИ НЕСКОЛЬКИХ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ЗЕРНИСТАЯ ДИСТРОФИЯ ПОРАЖАЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) спинной мозг
- 2) селезенку
- 3) почки
- 4) костный мозг

ОДНОЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ТЕРАТОСПЕРМИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТРАВМА

- 1) органов малого таза
- 2) паховой области
- 3) промежности
- 4) мошонки

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА НАСТУПАЕТ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ОБЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1) 45
- 2) 43
- 3) 42
- 4) 44

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) внесено исправление в соответствии с комментарием эксперта
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ С НАРУШЕНИЕМ НЕПРЕРЫВНОСТИ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА В ЗАДНЕМ ОТДЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья

- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ПРИЛАГАЕМЫЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА, ПРИНИМАЮТСЯ В ____ ВИДЕ

- 1) упакованном
- 2) расфасованном
- 3) развернутом
- 4) разложенном

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ, ПОДПИСАННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГСМЭУ, ВЫДАЮТ ПОД РОСПИСЬ

- 1) органу или лицу, назначившему экспертизу
- 2) врачу
- 3) страховому агенту
- 4) лаборанту

ХРАНЕНИЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗУЕТ

- 1) руководитель ГСМЭУ
- 2) эксперт
- 3) санитар
- 4) регистратор

ТРАВМА ПРИ ВЫПАДЕНИИ ИЗ ДВИЖУЩЕГОСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

СУЩНОСТЬ «ЛЕТАЛЬНОГО СИНТЕЗА» ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ____ ЯДОВ

- 1) функциональной нейтрализации токсического действия
- 2) потенцировании
- 3) образовании в организме более токсичного вещества из введенных
- 4) синергическом действии

УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАННОЕ ХАРАКТЕРОМ И ТЯЖЕСТЬЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КАК ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

- 1) рассматривается в случае смерти
- 2) рассматривается всегда
- 3) никогда не рассматривается
- 4) не рассматривается у лиц после 60 лет

ВРОЖДЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ ОДНОГО ЯИЧКА В МОШОНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) монорхизмом
- 2) крипторхизмом
- 3) анорхизмом
- 4) эктопией

ТОЧКАМИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) ацетил КоА
- 2) супероксиддисмутаза
- 3) гексокиназа
- 4) фосфолипаза A2

СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННЫЕ ПЕРЕМОЧКИ ОБРАЗУЮТСЯ МЕЖДУ КРАЯМИ ____ РАН

- 1) резаных
- 2) ушибленных
- 3) колотых
- 4) огнестрельных

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ОГНЕСТРЕЛЬНУЮ РАНУ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В КЛЕТЧАТКУ СРЕДОСТЕНИЯ (БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ), КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПУТЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ КИСЛОТ В ОРГАНИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пероральный
- 2) трансдермальный
- 3) ректальный
- 4) внутривенный

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ОБРАЗУЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) укушенное
- 2) сверленное
- 3) огнестрельное
- 4) ушибленное

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ БОТУЛИЗМЕ СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

- 1) 12-24
- 2) 6-10
- 3) 40-48
- 4) 60-72

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОЖОГИ КОНЕЧНОСТЕЙ И ЖИВОТА III-IV СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ 10% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

В СРОКИ ОТ ОДНОГО ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ РУБЦЫ БЫВАЮТ ____ КОНСИСТЕНЦИИ

- 1) мягкой
- 2) тестоватой
- 3) пористой
- 4) плотноватой

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающий жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ ПОЛОВОГО СНОШЕНИЯ С ЖЕНЩИНАМИ, РАНЕЕ ЖИВШИМИ ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ, ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ____ ВО ВЛАГАЛИЩЕ

- 1) слюны
- 2) крови
- 3) спермы
- 4) мочи

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) средней тяжести

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ РАНЫ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПРОСВЕТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

СКРЫТЫЙ ПЕРИОД ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ДИОКСИНОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1) 3-4
- 2) 1-2
- 3) 10-12
- 4) 5-6

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА СО СДАВЛЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ОТ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) гиперемия
- 2) эритема
- 3) опаление волос
- 4) серозное воспаление

ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ АЛКОГОЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) вязкое состояние крови в сосудах
- 2) гипертрофия слизистой оболочки желудка
- 3) обесцвечивание содержимого двенадцатиперстной кишки
- 4) холероподобное содержимое кишечника

ПРИ РАЗВИТИИ ЭКССУДАТИВНОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ЗОНЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ ПЕРВЫМ

- 1) геморрагический экссудат
- 2) фибринстабилизирующий фактор
- 3) гнойный экссудат
- 4) фибрин

ПУПАРИИ СЛЕДУЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1) 1

- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

О КАТАПУЛЬТИРОВАНИИ ВВЕРХ МОЖНО СУДИТЬ ПРИ НАЛИЧИИ У ПИЛОТА ВОЗДУШНОГО СУДНА

- 1) двухсторонних сгибательных переломов рёбер
- 2) переломов свода и основания черепа
- 3) разгибательного перелома грудины
- 4) винтообразных переломов бедренных костей

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ НЕПОДВИЖНОСТЬ ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО, МЕЖФАЛАНГОВОГО И ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО СУСТАВОВ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее легкий вред здоровью
- 2) не причинившее вред здоровью
- 3) причинившее тяжкий вред здоровью
- 4) причинившее вред здоровью средней тяжести

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ЛИЦА, ГРУДИ И ЖИВОТА III СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ 15% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) лёгкий

ПРИ ОЖОГЕ КОЖИ 1 СТЕПЕНИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗНИКАЮТ В

- 1) толще дермы
- 2) глубоких тканях
- 3) подкожно-жировой клетчатке
- 4) эпидермисе

ПОСМЕРТНОЕ САМОПЕРИВАРИВАНИЕ ТКАНЕЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СОБСТВЕННЫХ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ БЕЗ УЧАСТИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ

- 1) карбогенизации
- 2) окоченения
- 3) аутолиза
- 4) сапонификации

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КАЖДОГО ВОЛОСА С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВОГО ОКУЛЯРНОГО МИКРОМЕТРА ИЗМЕРЯЮТ _____ ТОЛЩИНУ

- 1) минимальную
- 2) максимальную
- 3) среднюю минимальную
- 4) среднюю максимальную

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСОБО ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИИ МАТЕРИАЛ УПАКОВЫВАЮТ В

- 1) флаконы
- 2) стеклянные банки
- 3) металлические контейнеры
- 4) пластиковые пеналы

ОБЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЯДА НАИБОЛЕЕ БЫСТРО И ИНТЕНСИВНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕГО

- 1) перорально
- 2) подкожно
- 3) через легкие
- 4) внутривенно

ОДНОСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ I ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИЗГОТОВОЧНОЙ ПОЗЫ У ПИЛОТА ПЕРЕД КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕМ МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НА ТРУПЕ

- 1) обширных ожогов нижних конечностей
- 2) множественных рубленых ран
- 3) обширных ожогов головы и груди
- 4) отрывов верхних конечностей

ПУЛЮ ИЗ ТРУПА СЛЕДУЕТ ИЗВЛЕКАТЬ

- 1) корнцангом
- 2) рукой
- 3) пинцетом
- 4) зондом

ФИБРОБЛАСТИЧЕСКАЯ ФАЗА НАЧИНАЕТСЯ НА ____ СУТКИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ

- 1) 1-2
- 2) 3-4
- 3) 7-8
- 4) 5-6

ПРИ УДАРЕ ТУПЫМ ТВЕРДЫМ ПРЕДМЕТОМ С НЕОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ НА КОСТЯХ ЧЕРЕПА ОБРАЗУЮТСЯ ____ ПЕРЕЛОМЫ

- 1) винтообразные
- 2) террасовидные
- 3) многооскольчатые
- 4) вдавленные

ПЕРЕЛОМ ВОЛЛЮМЬЕ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ УСТАНОВЛЕНИИ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гистохимический
- 2) гистологический
- 3) иммуногистохимический
- 4) морфометрический

К ДИСТРОФИИ КОСТНОЙ ТКАНИ С ПЕРЕСТРОЙКОЙ ЕЕ СТРУКТУРЫ, УМЕНЬШЕНИЕМ ЧИСЛА КОСТНЫХ БАЛОК, ИСТОНЧЕНИЕМ, ИСКРИВЛЕНИЕМ И ПОЛНЫМ РАССАСЫВАНИЕМ ОТНОСЯТ

- 1) остеопороз
- 2) остеохондроз
- 3) остеодистрофию
- 4) остеонекроз

ОТСЛОЕНИЕ КРАЕВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ РАНЫ

- 1) ушибленной
- 2) колото-резаной
- 3) отравленной
- 4) колото-рубленной

УПЛОТНЕНИЕ ВОРСА ОДЕЖДЫ ВОКРУГ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СУДИТЬ О

- 1) глубине погружения клинка
- 2) прижизненности повреждения
- 3) продолжительности нахождения клинка в теле
- 4) биометрических характеристиках нападавшего

ПРИ МЕЛКОУЗЛОВОМ ЦИРРОЗЕ УЗЛЫ-РЕГЕНЕРАТЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕРОМ НЕ БОЛЕЕ (В САНТИМЕТРАХ)

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 5

4) 3

ВРАЧАМ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ЭКСПЕРТАМ, СРЕДНЕМУ И МЛАДШЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ, ПРИНИМАЮЩЕМУ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПА, ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГЕПАТИТА

- 1) А
- 2) Е
- 3) С
- 4) В

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

О ВЫСТРЕЛЕ С БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ИЗ БОЕВОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1) поясок осаднения на коже
- 2) отложение порошинок вокруг раны
- 3) поясок загрязнения на преграде
- 4) дефект «минус-ткань» в ране

ТУПАЯ СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинившая
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ ПОЧКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ СЕРДЦА, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ДИХЛОРЭТАНОМ, ВЫЯВЛЯЮТ ЯВЛЕНИЯ

- 1) фрагментации кардиомиоцитов
- 2) кардиомиопатии
- 3) токсического миокардита
- 4) диффузного кардиосклероза

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО РАЗРЫВА МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА СО СДАВЛЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ПРОИЗВОДСТВО ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ

- 1) заключения специалиста
- 2) заключения с обоснованными ответами
- 3) акта судебно-медицинского исследования
- 4) акта судебно-медицинской экспертизы

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ТЕЛ УМЕРШИХ ОТ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) специалистами органа управления здравоохранением
- 2) санитарами
- 3) уборщицей
- 4) организациями государственного санитарно-эпидемиологического надзора

В ЦЕЛЯХ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ БСМЭ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИМЕТЬ АПТЕЧКУ

- 1) анти-ВИЧ
- 2) анти-корь
- 3) анти-грипп
- 4) анти-туберкулез

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦА ПРОВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1) подвижности
- 2) осаднению
- 3) воспалительной реакции
- 4) кровоподтечности краев

ПРИ ПРИЖИЗНЕННОМ ПОВЕШЕНИИ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИЗНАК

- 1) Оливье – Данжера
- 2) Тучика – Чертовских
- 3) Гоппе – Зейлера
- 4) Русакова – Шкаравского

К ВЫПОЛНЕНИЮ ОПРЕДЕЛЁННОГО ОБЪЁМА И КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПО КОНКРЕТНОЙ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ВИДЕ ОСНОВНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯТ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ

- 1) общепрофессиональную
- 2) общеквалифицированную
- 3) квалифицированную
- 4) профессиональную

ТРАВМУ ШЕИ С ОТРЫВОМ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

ПЕРЕЛОМ СРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ОТЛИЧИЕМ ССАДИНЫ ОТ ПОВЕРХНОСТНОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) заживление без рубца
- 2) продолжительность заживления
- 3) наличие наружного кровотечения
- 4) формирование от тангенциального воздействия предмета

ОБРАЗОВАНИЕ В КЛЕТКЕ АНОМАЛЬНЫХ ЧУЖЕРОДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) декомпозицией
- 2) трансформацией
- 3) извращенным синтезом
- 4) инфильтрацией

ПЕРЕЛОМ, ПРИ КОТОРОМ НЕПОВРЕЖДЕННАЯ НАДКОСТНИЦА УДЕРЖИВАЕТ КОСТНЫЕ ОТЛОМКИ В СОПРИКОСНОВЕНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) поднадкостничным
- 2) пластическим

- 3) полным
- 4) простым

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НАДПОЧЕЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ГРАНИЦЫ БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- 1) конструкцией гильзы
- 2) пламенем выстрела
- 3) распространением частиц продуктов выстрела
- 4) действием огнестрельного снаряда

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ РЕЗКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, АТРОФИЯ МЫШЦ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА СЛЕВА, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

ДЛИНА БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ БЕРЦОВОЙ КОСТЕЙ У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ СООТВЕТСТВЕННО (В СМ)

- 1) 7,9 и 7,7
- 2) 13,4 и 13,2
- 3) 10 и 8
- 4) 6,6 и 8,7

ПО МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ТАЛЛИЙ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- 1) нейротоксических, гепато- и нефротоксических ядов
- 2) веществ кожно-нарывного действия
- 3) пульмонотоксических веществ
- 4) веществ раздражающего действия

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ПРИВЕДШУЮ К ХОЛИЦИСТЭКТОМИИ И ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающей жизни
- 4) легкий

ВНУТРЕННЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПОВ НОВорожденных Младенцев ВСЕГДА НАЧИНАЕТСЯ С ВСКРЫТИЯ

- 1) грудной и брюшной полостей
- 2) головы
- 3) спинного мозга
- 4) нижнего эпифиза бедра

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛОДЫЖЕК ОБЕИХ БЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ПЕРЕЛОМОМ СУСТАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ И РАЗРЫВОМ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА С ПОДВЫВИХОМ И ВЫВИХОМ СТОПЫ ПРАВОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ТУПУЮ ТРАВМУ ШЕИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ АНЕВРИЗМЫ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) длительный
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ С ПОТОКОМ ВДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА ПРИВОДИТ К

- 1) аспирации
- 2) асфиксии
- 3) адсорбции
- 4) вентиляции

ЗНАЧЕНИЕ ПУЛИ, ИЗВЛЕЧЕННОЙ ИЗ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ

- 1) скорости полета пули
- 2) расстояния выстрела
- 3) дистанции выстрела
- 4) калибра оружия

ДЛИНА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЗРЕЛОГО НОВорожденного Младенца СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 8,7
- 2) 7,5
- 3) 7

4) 6,6

ДЛИНА КЛЮЧИЦЫ У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

1) 3,4

2) 5,5

3) 4,5

4) 7,6

МАКРОСКОПИЧЕСКИ ЖЕЛТОВАТАЯ ОКРАСКА МИОКАРДА В ЗОНЕ ИНФАРКТА ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ____ СУТОК ПОСЛЕ ЕГО РАЗВИТИЯ

1) 7-10

2) 1-3

3) 15-30

4) 12-14

СМЕЩЕНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ И РОСТ ТРЕЩИНЫ ПОПЕРЕЁК ЕЁ ФРОНТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ФОРМИРОВАНИИ _____ СДВИГА

1) диагонального

2) секторального

3) продольного

4) поперечного

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ С₂ ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

1) средней тяжести

2) не причинивший

3) лёгкий

4) тяжкий

БОЛЕЕ БЫСТРОМУ РАЗВИТИЮ ГНИЕНИЯ СПОСОБСТВУЕТ

1) алиментарное истощение

2) слабо выраженная подкожно-жировая клетчатка

3) обильная кровопотеря

4) флегмона

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

2) вред здоровью средней степени тяжести

3) тяжкий вред здоровью

4) легкий вред здоровью

НАРУШЕНИЕМ ПРОХОДИМОСТИ ПОЛОВОГО КАНАЛА В ОБЛАСТИ ДЕВСТВЕННОЙ

ПЛЕВЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) аплазия
- 2) атрезия
- 3) гинатрезия
- 4) стеноз

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЯСТИ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ УМЕНЬШЕНИЕМ ВЫСОТЫ ПОЗВОНКОВ ПО ЗАДНЕЙ ИХ ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ

- 1) наклонах головы вбок
- 2) сгибании шейного отдела позвоночника
- 3) кручении шейного отдела позвоночника
- 4) резком разгибании шейного отдела позвоночника

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ СКОРОПОСТИЖНОЙ СМЕРТИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ____ СИСТЕМЫ

- 1) сердечно-сосудистой
- 2) дыхательной
- 3) мочевыделительной
- 4) пищеварительной

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТВЁРДЫМ ТУПЫМ ПРЕДМЕТОМ ОБРАЗУЮТСЯ РАНЫ

- 1) пиленые
- 2) огнестрельные
- 3) резаные
- 4) рваные

РАЗГИБАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) повешении
- 2) истинном утоплении
- 3) рефлекторном утоплении
- 4) закрытии отверстий рта и носа

ОТРАВЛЕНИЕ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ ВЫЗЫВАЕТ

- 1) гемоконцентрацию

- 2) сладж-синдром
- 3) гемолиз
- 4) сенсibilизацию

ГЕМИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

- 1) острой кровопотере
- 2) отравлении угарным газом
- 3) кардиогенном шоке
- 4) отравлении барбитуратами

ИНФЕКЦИЕЙ, ВОЗБУДИТЕЛЬ КОТОРОЙ СПОСОБЕН НАХОДИТЬСЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТОЛЬКО В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) антропозоонозной
- 2) антропонозной
- 3) сапронозной
- 4) зоонозной

ПЕРЕЛОМ ЧЕРПАЛОВИДНОГО ХРЯЩА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПОВ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВЗЯТИЮ ПОДЛЕЖИТ

- 1) желчь
- 2) кровь
- 3) сперма
- 4) лимфа

К ПРОЦЕССУ ПОСМЕРТНОГО РАЗРУШЕНИЯ КЛЕТКИ ДЕЙСТВИЕМ СОБСТВЕННЫХ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ОТНОСЯТ

- 1) аутолиз
- 2) альтерацию
- 3) пролиферацию
- 4) экссудацию

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЯГКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ БОЛТАЮЩИЙСЯ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗЕКЦИИ ГОЛОВКИ БЕДРА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ ПРОВОДЯТ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДИСТОГО СПЛЕТЕНИЯ МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) бензидина
- 2) анилина
- 3) судана
- 4) метиленового синего

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТАВЛЯЮТ В

- 1) двух экземплярах
- 2) одном экземпляре
- 3) трёх экземплярах
- 4) четырёх экземплярах

К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

- 1) брадикардию
- 2) арефлексию
- 3) гипотензию
- 4) брадипноэ

К АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ ОТНОСЯТ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ

- 1) падении на стоящий автомобиль
- 2) сдавлении тела между движущимися транспортными средствами (автомобилями)
- 3) ударе о предметы стоящего автомобиля
- 4) падении человека на проезжую часть дороги

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЦЕТОНА ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) фотометрии

- 2) метода микродиффузии
- 3) рентгенфлюоресценции
- 4) эмиссионного спектрального анализа

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СОЕДИНЕНИЯМИ МЫШЬЯКА РАЗВИВАЕТСЯ ____ ДИАРЕЯ

- 1) секреторная
- 2) инвазивная
- 3) жировая
- 4) холероподобная

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЛЕГКОГО КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПОД НЕОБРАТИМЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ (ГИБЕЛЬЮ) КЛЕТОК И ТКАНЕЙ В ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ, ВЫЗВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ, ПОНИМАЮТ

- 1) некроз
- 2) апаптоз
- 3) аутолиз
- 4) регенерацию

ЦИАНИСТЫЙ КАЛИЙ В ПОЛОСТЯХ И ОРГАНАХ ТРУПА ФОРМИРУЕТ ЗАПАХ

- 1) чеснока
- 2) горького миндаля
- 3) ацетона
- 4) прелых яблок

ТРАВМА ПОЧКИ, ПРИВЕДШАЯ К ЕЁ ЧАСТИЧНОЙ РЕЗЕКЦИИ И ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) легкий

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЖИВОРОЖДЕННОСТИ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) методику исследования сосудов пуповины
- 2) пробу Мохова-Шинкаренко
- 3) пробу Бокаруса
- 4) ядерный магнитный резонанс

К СОДРУЖЕСТВЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ ДВУХ И БОЛЕЕ ЯДОВ, ПРИ КОТОРОМ ОБЩИЙ ЭФФЕКТ ПРЕВЫШАЕТ СУММУ ДЕЙСТВИЙ КАЖДОГО ИЗ НИХ В ОТДЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯТ

- 1) синергизм
- 2) антагонизм
- 3) кумуляцию
- 4) потенцирование

О ПРИЖИЗНЕННОМ ПРЕБЫВАНИИ ЧЕЛОВЕКА В ОЧАГЕ ПОЖАРА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1) поза взведённого курка
- 2) тепловое ооченение
- 3) копотъ в бронхиолах
- 4) ожог ротовой полости

К ПРИЗНАКАМ ОСНОВНОГО РАЗРЕЗА КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОТНОСЯТ

- 1) осаднённость
- 2) кровоточивость
- 3) прямолинейность
- 4) криволинейность

ГАЗОВАЯ ЭМБОЛИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ

- 1) щелочами
- 2) фосфорорганическими соединениями
- 3) перекисью водорода
- 4) кислотами

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ МОЧЕТОЧНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

ОТСУТСТВИЕ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ ВСЛЕДСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ИЗМЕНЕНИЯ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА, ОБНАРУЖЕННЫЕ ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ СВЯЗАНЫ С ТОКСИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) нестероидных противовоспалительных препаратов
- 2) ингибиторов протонной помпы
- 3) фторурацила
- 4) колхицина

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ОДНОГО ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА, ОБЛАДАВШЕГО ЗРЕНИЕМ ДО ТРАВМЫ, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) опасности для жизни
- 3) развития угрожающего жизни состояния
- 4) длительности расстройства здоровья

РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 15% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

ТРЕУГОЛЬНЫЕ СЕРОВАТО-ЖЕЛТОВАТЫЕ УЧАСТКИ НА ФОНЕ ПРОЗРАЧНОЙ И БЛЕСТЯЩЕЙ РОГОВИЦЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПЯТНАМИ

- 1) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа
- 2) Вишневского
- 3) Тардые
- 4) Лярше

ПРИ ТЕПЛОМ РАВНОВЕСИИ ОТДАЧА ТЕПЛА КОНВЕКЦИЕЙ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 20-25
- 2) 10-15
- 3) 40-46
- 4) 30-38

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИССЛЕДУЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

- 1) гликолизированного гемоглобина, креатинина
- 2) карбоксигемоглобина и гемина
- 3) ионов калия и натрия
- 4) мочевины, креатинина, средних молекул

СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛЕВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ,

ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК III СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК РАССТРОЙСТВО, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

УХУДШЕНИЕ ДИНАМИКИ БОЛЕЗНЕННОГО ПРОЦЕССА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК ____ БОЛЕЗНИ

- 1) притворные
- 2) искусственные
- 3) неврологические
- 4) инфекционные

К ПРИЧИНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ СТРАДАНИЙ ПУТЕМ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТНОСЯТ

- 1) извращение
- 2) мучение
- 3) истязание
- 4) побои

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА ПРИ СДАВЛЕНИИ ГОЛОВЫ В НАПРАВЛЕНИИ СВЕРХУ-ВНИЗ ПО ОСИ ПОЗВОНОЧНИКА ОБРАЗУЮТСЯ В _____ ОБЛАСТИ

- 1) височной
- 2) теменной
- 3) затылочной
- 4) лобной

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОЖОГ ТЕЛА II СТЕПЕНИ 25% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинивший
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

К ПРОЦЕССУ САМОПЕРЕВАРИВАНИЯ КЛЕТКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ЛЕЙКОЦИТОВ И МАКРОФАГОВ ОТНОСЯТ

- 1) альтерацию
- 2) аутолиз

- 3) экссудацию
- 4) пролиферацию

К СНИЖЕНИЮ УПРУГОСТИ ОБОЛОЧЕК И УМЕНЬШЕНИЮ ОБЪЕМА ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК ОТНОСЯТ

- 1) пятна Минакова
- 2) признак Белоглазова
- 3) посмертное размягчение глаз
- 4) пятна Ларше

ПРИЗНАКИ ПРИЖИЗНЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛОМА ХОРОШО ФОРМИРУЮТСЯ НА

- 1) малоберцовых костях
- 2) лучевых костях
- 3) ключицах
- 4) локтевых костях

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ИНФЕКЦИОННУЮ ПАТОЛОГИЮ, ОЧИЩАЮТ, ВЫСУШИВАЮТ И

- 1) протирают ацетоном
- 2) укладывают в биксы
- 3) дезинфицируют
- 4) протирают спиртом

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СТРУКТУРЫ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНОВИТЬ _____ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

- 1) половую
- 2) родственную
- 3) расовую
- 4) видовую

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1) слюну
- 2) плевральный экссудат
- 3) спинномозговую жидкость
- 4) гной

К ДОКАЗАТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ СМЕРТИ ОТ АСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ОТНОСЯТ

- 1) рвотные массы у отверстий рта и носа
- 2) рвотные массы в полости рта
- 3) пищевые массы в глотке и пищеводе
- 4) пищевые массы в альвеолах и мелких бронхах

**ЗА ДАЧУ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТ (СПЕЦИАЛИСТ)
ПРЕДУПРЕЖДАЕТСЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ _____
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

- 1) 307
- 2) 310
- 3) 124
- 4) 125

**НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УПОТРЕБЛЕНИЕ В ПИЩУ РЫБ,
СОДЕРЖАЩИХ**

- 1) нуклеопротеиды
- 2) тетродотоксин
- 3) глютин
- 4) фосфопротеиды

ВОДНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТРАВМА ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- 1) ударе частями плавучего транспорта
- 2) падении автомобиля в водоем с моста
- 3) падении воздушного судна с высоты в водоём
- 4) падении автотранспортного средства в водоем

**КОСТНЫЕ ОТЛОМКИ, ОСКОЛКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДОЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ
ОБРАЗУЮТСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ, ПОДВЕРГШЕЙСЯ
ДЕФОРМАЦИИ**

- 1) растяжения
- 2) сжатия
- 3) кручения
- 4) изгиба

**КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ
ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ
ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) развитие угрожающего жизни состояния
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ПОДПИСЫВАЕТСЯ

- 1) руководителем ГСМЭУ
- 2) санитаром
- 3) лаборантом
- 4) медицинским регистратором

В ПЛОДОВОМ ТЕЛЕ СТРОЧКОВ СОДЕРЖИТСЯ _____ КИСЛОТА

- 1) муравьиная
- 2) гельвелловая
- 3) молочная
- 4) щавелевая

ЦЕНТР ОССИФИКАЦИИ ГОРОХОВИДНОЙ КОСТИ ЗАПЯСТЬЯ У ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПОЯВЛЯЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1) 3
- 2) 10
- 3) 16
- 4) 18

ГЕМАТОМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СКОПЛЕНИЕМ КРОВИ В

- 1) брюшной полости
- 2) мышцах
- 3) полости сердечной сумки
- 4) плевральных полостях

СМЕРТЬ ПЛОДА ДО ОКОНЧАНИЯ 20 ПОЛНЫХ НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ СЧИТАЮТ

- 1) ранней
- 2) промежуточной
- 3) поздней
- 4) отсроченной

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА СРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ФОТОГРАФИИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОРУДИЯМИ ТРАВМЫ, СЛЕДОВАТЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ

- 1) криминалисту
- 2) врачу – судебно-медицинскому эксперту
- 3) понятым
- 4) адвокату

К ПРИЗНАКАМ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА ЕВРОПЕОИДНОЙ РАСЫ ОТНОСЯТ

- 1) умеренно выступающие скулы
- 2) выраженный альвеолярный прогнатизм
- 3) значительно выступающий в горизонтальной плоскости лицевой скелет
- 4) вертикальную профилировку орбит

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ

ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ГРУДНЫХ Th1-Th3 ПОЗВОНКОВ С НЕПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

К ОТДАЧЕ ТЕПЛА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПУТЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ОТНОСЯТ СПОСОБ

- 1) конвекционный
- 2) радиационный
- 3) испарения
- 4) кондукционный

ПЕРВИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ГНОЙНОГО ОЧАГА ПРИ ФЛЕГМОНЕ ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ БЫВАЕТ АБСЦЕСС В

- 1) подбородочной области
- 2) крылонебной ямке
- 3) клыковой ямке
- 4) щечной области

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 10%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

В СЛУЧАЕ, КОГДА ПОДЭКСПЕРТНЫЙ НЕ ПОМНИТ СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДИВШИЕ ДО НАЧАЛА ПОТЕРИ ПАМЯТИ, РАЗВИВАЕТСЯ АМНЕЗИЯ

- 1) фиксационная
- 2) антероградная
- 3) ретроградная
- 4) диссоциативная

ЖИРНОЕ ПИЩЕВОЕ СОДЕРЖИМОЕ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ ПОПАДАЕТ ИЗ ЖЕЛУДКА В ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНУЮ КИШКУ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1) 4-6
- 2) 10-15
- 3) 2-4
- 4) 6-10

ЗАКРЫТУЮ НЕПРОНИКАЮЩУЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ

ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНЬЮ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ПОЛНЫМ РАСТВОРЕНИЕМ ЯДРА ПРИ НЕКРОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) плазморея
- 2) кариопикноз
- 3) кариорексис
- 4) кариолизис

ДЕТОУБИЙСТВО КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ПРИ УБИЙСТВЕ НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЕНКА

- 1) несовершеннолетним
- 2) отцом
- 3) матерью
- 4) совершеннолетним

ВТОРОЙ ФАЗОЙ ОЖОГОВОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) торпидная
- 2) эректильная
- 3) латентная
- 4) подострая

ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА, И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ ЭЛАСТИЧЕСКОГО ТИПА В ВИДЕ ОЧАГОВОГО ОТЛОЖЕНИЯ В ИНТИМЕ ЛИПИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) инфаркт
- 2) инсульт
- 3) некроз
- 4) атеросклероз

ОБНАРУЖЕНИЕ АЦЕТОНА В КРОВИ И МОЧЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) цирроза печени
- 2) холецистопанкреатита
- 3) отравления высшими спиртами
- 4) сахарного диабета

В ОСНОВЕ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЛЕЖИТ ЕГО СПОСОБНОСТЬ ВЫЗЫВАТЬ УГНЕТЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1) щитовидной железы
- 2) надпочечников
- 3) головного мозга

4) селезенки

РАЗВИТИЕ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) 2 стадии
- 2) 5 стадий
- 3) 3 стадии
- 4) 4 стадии

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА РОЖКОВИДНОГО ХРЯЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

К МЕХАНИЗМУ ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТЕН ВИШНЕВСКОГО ОТНОСЯТ

- 1) деструктивное воздействие желудочного сока
- 2) выход плазмы за стенки сосудов
- 3) образование гипостазов в слизистой желудка
- 4) расстройство нервной регуляции сосудов стенки желудка

ЭТИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮТ КАРДИОСКЛЕРОЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) атеросклеротический
- 2) диффузный
- 3) очаговый
- 4) гипотрофический

МАССА СЕЛЕЗЕНКИ ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)

- 1) 50
- 2) 33
- 3) 80
- 4) 11

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ БЕДРА НА УРОВНЕ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) легкий

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УПАВШИМИ ЧАСТЯМИ РАЗРУШЕННОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ТРАВМ

- 1) вне воздушного судна
- 2) внутри летательного аппарата
- 3) при катапультировании
- 4) при прыжках с парашютом

О КОМБИНИРОВАННОЙ ТРАВМЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) многократное одним повреждающим фактором
- 2) различными повреждающими факторами
- 3) одежды и тела человека в одной проекции
- 4) нескольких различных анатомических областей

В ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) экстрасистолией
- 2) асистолией
- 3) фибрилляцией сердца
- 4) аритмией

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О

- 1) количестве прилагаемых объектов исследования
- 2) выводах эксперта
- 3) результатах лабораторных исследований
- 4) обстоятельствах дела

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПНУЮ КРОВЬ БЕРУТ ИЗ СЕРДЦА В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 50
- 2) 1
- 3) 5
- 4) 2

ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ ОБРАЗУЮТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- 1) двух органов разных полостей
- 2) одной части тела
- 3) смежных областей
- 4) нескольких частей тела

ФОРМА И РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ КЛИНКА ОТРАЖАЮТСЯ В ПОВРЕЖДЕНИЯХ

- 1) стенки толстого кишечника
- 2) большого сальника
- 3) плоских костей
- 4) стенки тонкого кишечника

**КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ
ВЕРХНЕЙ СТЕНКИ ГЛАЗНИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

**РЕЗЕКЦИЮ КОПЧИКА, ВЫПОЛНЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО ТРАВМЫ И ВЫЗВАВШУЮ
СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ
КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

ПЕРВЫЕ ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ГНИЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЗАМЕТНЫМИ В ОБЛАСТИ

- 1) боковых поверхностей шеи
- 2) передней брюшной стенки
- 3) подколенных ямок
- 4) подмышечных впадин

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СЛУЧАЕ
АВИАЦИОННОЙ ТРАВМЫ К КОМПЕТЕНЦИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА
ОТНОСИТСЯ**

- 1) изучение технического состояния воздушного судна
- 2) установление причины авиационного происшествия
- 3) опрос очевидцев авиационного происшествия
- 4) изучение протокола осмотра места происшествия

**ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБЫЕ РАССТРОЙСТВА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ,
РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) легкий

**К НАСИЛЬСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ОТНОСЯТ, В ТОМ
ЧИСЛЕ**

- 1) изнасилование
- 2) лесбиянство
- 3) понуждение к половому сношению
- 4) развратные действия

ПО ВИДУ ОБМЕНА РАЗЛИЧАЮТ ДИСТРОФИИ

- 1) мезенхимальные
- 2) смешанные
- 3) паренхиматозные
- 4) углеводные

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БРЫЖЕЙКИ ТОНКОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ (ОГРАНИЧЕНИЕ СГИБАНИЯ И РАЗГИБАНИЯ ОТ 30° ДО 40°), ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 10%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЛЕВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) средней тяжести

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРИЧИНЁННОГО ВРЕДА В СЛУЧАЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КРЕСТЦА С НАРУШЕНИЕМ НЕПРЕРЫВНОСТИ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

К ПЕРВИЧНЫМ ПНЕВМОНИЯМ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) аспирационную
- 2) септическую
- 3) бронхопневмонию
- 4) гипостатическую

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ О

- 1) результатах лабораторных исследований
- 2) обстоятельствах дела
- 3) выводах эксперта
- 4) наличии упаковки прилагаемых объектов исследования

СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТВЕРДОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) угрожающий жизни
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ПАТОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ, ВЫЗВАННЫМ ОБЩИМ ДЕЙСТВИЕМ НА ОРГАНИЗМ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ЭНДОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) болезнь
- 2) дисфункция
- 3) интоксикация
- 4) некроз

СОЧЕТАННУЮ ТРАВМУ ТЕЛА, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ОБИЛЬНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ ДАВНОСТИ 4-6 МЕСЯЦЕВ РУБЕЦ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) плоским
- 2) выпуклым
- 3) втянутым
- 4) вогнутым

СЛУЧАЙНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинившее
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

КОЛОТО-РЕЗАНУЮ РАНУ ШЕИ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ОДНОЙ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК В ВИДЕ ЗАКУПОРКИ КАНАЛЬЦЕВ НЕРАСТВОРИМЫМИ КРИСТАЛЛАМИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ

- 1) этиленгликолем
- 2) сулемой
- 3) четыреххлористым углеродом
- 4) фенолом

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА ПОДПИСЫВАЕТСЯ

- 1) врачом – судебно-медицинским экспертом, производившим экспертизу
- 2) лицом, назначившим экспертизу
- 3) понятыми
- 4) свидетелями, проходящими по данному делу

ФОРМУ ТУПОГО КОНЦА КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1) ширина клинка ножа
- 2) конфигурация острого конца клинка
- 3) угол заточки режущего края клинка
- 4) выраженность ребер обуха ножа

ПРЯМОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ДОНОШЕННОГО ЗРЕЛОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 9-9,5
- 2) 11-12
- 3) 34-35
- 4) 8-8,5

СМЕРТЬ ОТ УДАВЛЕНИЯ РУКАМИ ОТНОСЯТ К _____ АСФИКСИИ

- 1) странгуляционной
- 2) обтурационной
- 3) быстрой компрессионной
- 4) медленной компрессионной

ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ В БРОНХИАЛЬНОМ СЕКРЕТЕ ОБНАРУЖИВАЮТ ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ

- 1) мегакариоцитов
- 2) эритроцитов
- 3) лимфобластов
- 4) эозинофилов

ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ОРГАНОМ ИЛИ

ЛИЦОМ, НАЗНАЧИВШИМ ЭКСПЕРТИЗУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЗЯТИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) содержимого желудка
- 2) соскобов со слизистой оболочки зева
- 3) лимфатических узлов кишечника
- 4) смывов с головки полового члена

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ ГЕМИАНОПСИЮ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ПРИ ГНИЛОСТНОМ РАСПАДЕ ТРУПА ПЕПТИДЫ РАЗЛАГАЮТСЯ С ОБРАЗОВАНИЕМ

- 1) меркаптанов
- 2) диаминов
- 3) гельвеловой кислоты
- 4) катепсинов

ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В МЯГКИЕ ТКАНИ

- 1) нижних конечностей
- 2) живота
- 3) головы и шеи
- 4) груди

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ВНУТРИМОЗГОВОГО ЛАТЕРАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ НА КОЖЕ

- 1) петехии
- 2) эритемы
- 3) экхимозы
- 4) кровоподтеки

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ТКАНЕЙ В КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ ВЫДЕЛЯЮТ _____ ОЖОГОВ

- 1) 2 степени
- 2) 5 степеней
- 3) 3 степени
- 4) 4 степени

ОТКРЫТЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ ВЫВИХ БЕДРА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) первичной
- 2) процессуальной
- 3) административной
- 4) уголовной

ПО КОНСТРУКЦИИ ПЕТЛИ РАЗДЕЛЯЮТ НА

- 1) широкие
- 2) полужесткие
- 3) жесткие
- 4) двойные

НЕОПОЗНАННЫЕ ТРУПЫ НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ

- 1) захоронению
- 2) фотографированию
- 3) взвешиванию
- 4) вскрытию

ПО ФОРМУЛЕ ГААЗЕ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) зрелость младенца
- 2) температуру трупа новорожденного
- 3) продолжительность внутриутробной жизни плода
- 4) давность наступления смерти

ДЛЯ «СЕРДЕЧНОЙ» СМЕРТИ ЗНАЧИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1) наличия крупных полей фиброзной ткани
- 2) зоны гиперрелаксации кардиомиоцитов
- 3) некроза миокарда
- 4) выраженной гипертрофии миокарда

**ФИБРОБЛАСТИЧЕСКАЯ ФАЗА КЛЕТОЧНОЙ РЕАКЦИИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ
ВЫРАЖАЕТСЯ В ПОЯВЛЕНИИ ФИБРОБЛАСТОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ____ ТКАНЬ**

- 1) жировую
- 2) грануляционную
- 3) костную
- 4) хрящевую

**РЕЗАНЫЕ РАНЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ОСЛОЖНИВШИЕСЯ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ,
КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) длительный
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

**КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ПРОВОДЯТ
МЕТОДОМ**

- 1) колориметрии
- 2) газожидкостной хроматографии
- 3) иммуногистохимии
- 4) спектрофотометрии

**ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ СЛЕДУЕТ
НАЧИНАТЬ С**

- 1) обнаружения и извлечения пули
- 2) осмотра внутренних органов до извлечения и их выделения единым комплексом
- 3) описания входной огнестрельной раны
- 4) выделения внутренних органов в отдельности

**ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, ВЫЗВАВШЕЕ
СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ
КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) угрожающий жизни

**ХРАНЕНИЕ ТРУПОВ В МОРГЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)**

- 1) +1
- 2) +2

3) +4

4) +3

СПИРАЛЕВИДНЫЙ (ВИНТООБРАЗНЫЙ) ПЕРЕЛОМ ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЗУЕТСЯ ОТ

- 1) вращательного механизма воздействия травмирующей силы на периферический фрагмент диафиза при фиксации его центральной части
- 2) прямого перпендикулярного удара тупого твердого предмета
- 3) действия травмирующей силы по направлению продольной оси диафиза
- 4) удара по типу механизма образования «бампер-перелома»

ПОД ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ТКАНИ И КАНАЛЬЦЕВ ПОЧЕК, ПОНИМАЮТ

- 1) гломерулонефрит
- 2) нефросклероз
- 3) пиелонефрит
- 4) тубулоинтерстициальный нефрит

К ПОЛОВОЙ АБЕРРАЦИИ ОТНОСЯТ

- 1) физическое здоровье
- 2) половую зрелость
- 3) нарушение направленности полового влечения
- 4) эмоциональное состояние

НЕПРОХОДИМОСТЬ ПИЩЕВОДА (ПРИ НАЛИЧИИ ГАСТРОСТОМЫ), СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 90%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

К КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) гепатоцеллюлярную
- 2) молниеносную
- 3) каналикулярную
- 4) гепатоканаликулярную

ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ АЛКОГОЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) холероподобное содержимое кишечника
- 2) вязкое состояние крови в сосудах
- 3) гипертрофия слизистой оболочки желудка

4) обесцвеченность содержимого двенадцатиперстной кишки

К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ КРАЕВ ПЕРЕЛОМА В ЗОНЕ ДОЛОМА ОТНОСЯТ

- 1) выкрашивание и отщеп компактного вещества
- 2) ровные, хорошо сопоставимые края
- 3) отвесные, хорошо сопоставимые края
- 4) зернистую поверхность

ПО ВИДУ ОБМЕНА РАЗЛИЧАЮТ ДИСТРОФИИ

- 1) паренхиматозные
- 2) водные
- 3) смешанные
- 4) мезенхимальные

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЛЕГОЧНАЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ПРОБА МОЖЕТ БЫТЬ ПРИ

- 1) врожденном ателектазе
- 2) смерти от аспирации
- 3) утоплении
- 4) гнилостной трансформации

ЦВЕТ ТРУПНЫХ ПЯТЕН ПРИ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

- 1) фиолетово-синюшный
- 2) розово-красный
- 3) серовато-синюшный
- 4) темно-коричневый

БОЛЬШОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ДОНОШЕННОГО ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 7-7,5
- 2) 9-9,5
- 3) 30-30,5
- 4) 11-11,5

РАНУ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В КЛЕТЧАТКУ СРЕДОСТЕНИЯ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ВСКРЫТИЕ ТРУПА НАЧИНАЮТ С ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОБЫ СУНЦОВА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РЕЗАННЫХ РАН НА

- 1) пояснице
- 2) предплечьях

- 3) кистях
- 4) шее

К ПОВОДАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) установление повреждение половых органов
- 2) определение эректильных дисфункций
- 3) половые преступления
- 4) фертильность

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РЕФЛЕКСОВ С ГИПОТРОФИЕЙ МЫШЦ, ЛЕГКИМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ТРАВМИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

- 1) двустороннее центробежное
- 2) двустороннее центростремительное
- 3) одностороннее центробежное
- 4) одностороннее центростремительное

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛА В ДИАЛИЗАТЕ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА ИЗ ПОДЛЕЖАЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТА ПРОВОДЯТ

- 1) иммуногистохимией
- 2) ИК-спектроскопией
- 3) цветными реакциями
- 4) тонкослойной хроматографией

ОБ ОТСУТСТВИИ НАДЛЕЖАЩЕГО УХОДА ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ МЛАДЕНЦЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1) наличие помарок крови на теле младенца
- 2) присутствие младенческой одежды
- 3) отсутствие сыровидной смазки
- 4) наличие в желудке молозива

ДО ВСКРЫТИЯ ТРУПЫ ХРАНЯТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1) +2
- 2) +4
- 3) -2
- 4) -4

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ АНАТОМИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ВЫДЕЛЕНИЕ СМЕСИ ГАЗОВ ИЗ ЖИДКИХ СРЕД ПРОИСХОДИТ ПРИ СНИЖЕНИИ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ДО ____ ММ РТ. СТ. И НИЖЕ

- 1) 45
- 2) 55
- 3) 65
- 4) 75

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ИЗВЛЕКАЮТ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ ____ ЛИГАТУР НА ПИЩЕВОД, ЖЕЛУДОК, КИШЕЧНИК

- 1) тройных
- 2) двойных
- 3) восьми
- 4) одинарных

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ, РЕЗКОЕ РАССТРОЙСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛОЩАДИ ОБШИРНЫХ ОЖОГОВ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) правило «девятки»
- 2) правило «сотни»
- 3) индекс Франка
- 4) метод ладони

РЕЗАНЫЕ РАНЫ ОБРАЗУЮТСЯ ОБЫЧНО ВСЛЕДСТВИЕ

- 1) вращательного воздействия режущего предмета
- 2) давления и протягивания предмета с острым режущим краем
- 3) сжатия тканей
- 4) тычкового действия острым концом колюще-режущего предмета

ДЛЯ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) стерильный
- 2) чистый
- 3) новый
- 4) влажный

ПРИЗНАКОМ УТОПЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наличие жидкости в верхних дыхательных путях
- 2) воздушная эмболия правых отделов сердца
- 3) наличие жидкости в пазухе основной кости
- 4) сгущение крови

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗВИТИЯ ТРУПНОГО ОКОЧЕНЕНИЯ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПРОИСХОДИТ НАКОПЛЕНИЕ КИСЛОТЫ

- 1) муравьиной
- 2) молочной
- 3) метафосфорной
- 4) марганцовой

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ТРАСОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТАНОВЛИВАЮТ

- 1) наличие патологических изменений в органах и тканях, обусловленных заболеваниями
- 2) наличие следов, их вид, механизм и условия образования
- 3) наличие следов биологического происхождения (слюны, спермы)
- 4) присутствие крови, ее видовую и групповую принадлежность

СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ В КРОВИ НЕ МЕНЕЕ ____% МЕТГЕМОГЛОБИНА

- 1) 50
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 15

ПРИ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫХ (ОСОБЕННО БАЗАЛЬНЫХ) КРОВОИЗЛИЯНИЯХ НЕОБХОДИМО НА СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯТЬ

- 1) артерии основания головного мозга различного калибра
- 2) кусочки головного мозга с мягкими мозговыми оболочками
- 3) твердую мозговую оболочку
- 4) гипофиз

НАИБОЛЬШАЯ ГЛУБИНА РЕЗАНОЙ РАНЫ МОЖЕТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНА

- 1) в средней и ближе к начальному отрезкам
- 2) равномерно по всей длине

- 3) по ходу раневого канала
- 4) у слепого ее конца

БРЕГМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ____ ШВА

- 1) чешуйчатого
- 2) венечного
- 3) метопического
- 4) лямбдовидного

ЭКСПЕРТ (СПЕЦИАЛИСТ) ПРЕДУПРЕЖДАЕТСЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 310 УК РФ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ДАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТАТЬЕЙ 161 УПК РФ

- 1) судом
- 2) начальником следственного органа
- 3) следователем
- 4) начальником органа дознания

ОКОНЧАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДНЕМ

- 1) получения результатов лабораторных и инструментальных методов исследования
- 2) завершения секционного исследования трупа
- 3) окончания оформления экспертного заключения и его подписания исполнителем
- 4) окончания формулировки выводов экспертного заключения

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВТОРИЧНОГО АТЕЛЕКТАЗА ЛЕГКИХ ПРИ АУТОПСИИ ТРУПОВ НОВОРОЖДЕННЫХ И ПЛОДОВ ПРОВОДЯТ ПРОБУ

- 1) Владимирского
- 2) Галена – Шрейера
- 3) Бушу – Габерды
- 4) Таранухина

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННУЮ КОНТРАКТУРУ ЛЕВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (РАЗГИБАНИЕ 20°-25°), РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) средней тяжести

К ГОМОСЕКСУАЛЬНЫМ ПОЛОВЫМ КОНТАКТАМ МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ ОТНОСЯТ

- 1) транссексуализм
- 2) лесбиянство
- 3) мужеложство
- 4) гермафродитизм

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ С ЦЕЛЬЮ КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) формалина раствор
- 2) этанол
- 3) метанол
- 4) глицерин

ПЕРЕЛОМ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 2) вытягивание ядер шиповатого слоя эпидермиса с образованием «щеток»
- 3) некрозы мышечных волокон
- 4) некрозы жировых клеток

В СЛУЧАЯХ, КОГДА ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСЛЕДОВАТЬ ПОДЭКСПЕРТНОГО, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОВОДЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1) запросу адвоката
- 2) материалам дела
- 3) личному заявлению пострадавшего
- 4) распоряжению руководителя органа управления здравоохранением

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ЛЕВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ЯДРА БАЗАЛЬНОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВЕ МОГУТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ

- 1) «завихрений»
- 2) «снежинок»
- 3) «бус»
- 4) «гирлянд»

ТРУПНЫЕ ПЯТНА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ПРИОБРЕТАЮТ ЦВЕТ

- 1) фиолетовый
- 2) оранжевый
- 3) розовый
- 4) коричневый

ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЗОНА НЕКРОЗА ЗАМЕЩАЕТСЯ ____ ТКАНЬЮ

- 1) нервной
- 2) мышечной
- 3) соединительной
- 4) эпителиальной

ПРИ ПОВЕШЕНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1) анизокория
- 2) коллапс легких
- 3) кровоизлияние в брыжейку
- 4) острая дилатация левого желудочка

ДЛИНА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 8,7
- 2) 7
- 3) 7,5
- 4) 6,6

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ОПРЕДЕЛЯЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

- 1) гликогена
- 2) метгемоглобина
- 3) карбоксигемоглобина
- 4) гемина

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ ПОЧКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

В СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРВЫЕ ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ГНИЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЗАМЕТНЫМИ К ____ СУТКАМ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1) 5-6
- 2) 10-12
- 3) 1-2
- 4) 2-3

**ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА С РАЗРЫВОМ КАПСУЛЫ СУСТАВА
КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинивший
- 4) средней тяжести

**ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ
ОЧАГОВЫХ И СТОЛОВЫХ СИМПТОМОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ,
ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

**К МЕСТНЫМ ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ХОД РЕГЕНЕРАЦИИ, ОТНОСЯТ, В ТОМ
ЧИСЛЕ**

- 1) изменения скорости кровотока
- 2) интенсивность обменных процессов
- 3) объем повреждения
- 4) возраст

ОБ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) смежных анатомических областей
- 2) двух органов в различных полостях
- 3) одним травмирующим фактором
- 4) одной части тела

**ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ТРАСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) изолированные клетки, частицы органов и тканей, кровь, выделения
- 2) следы-повреждения, следы-наложения на теле человека и связанные с ними по происхождению аналогичные следы на одежде
- 3) части тела и другие объекты от неопознанных трупов людей
- 4) гистологические препараты

**ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 10-12 ЧАСОВ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В МИНУТАХ)
(ПО В.В.ЖАРОВУ, Ю.Л. МЕЛЬНИКОВУ, 1978)**

- 1) 1-2
- 2) 50-60
- 3) 30-40
- 4) 10-12

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ БРУЦЕЛЛЕЗА ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) головной мозг
- 2) кусочки молочных желез
- 3) лимфатические узлы кишечника
- 4) гной

СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУЮ НА УРОВНЕ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПЕРЕЛОМЫ ОБЕИХ ЛОБКОВЫХ И ОБЕИХ СЕДАЛИЩНЫХ КОСТЕЙ ТИПА «БАБОЧКИ» КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПОВЕРХНОСТНОЙ И ОБРАТИМОЙ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) мукоидное набухание
- 2) стромально-сосудистая дистрофия
- 3) трансформация
- 4) извращенный синтез

ИССЛЕДОВАНИЕМ, ПРОВОДИМЫМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ ЦИАНИДАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) судебно-биологическое
- 2) гистологическое
- 3) судебно-химическое
- 4) судебно-цитологическое

ОТГИБАНИЕ КРАЕВ ПЕРЕЛОМА И ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН КОМПАКТНОГО СЛОЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСНОВНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМА ВОЗНИКАЮТ В ЗОНЕ

- 1) кручения
- 2) растяжения
- 3) сжатия
- 4) изгиба

ВЫВЕДЕНИЕ ЭТАНОЛА ИЗ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) резорбцией

- 2) элиминацией
- 3) окислением
- 4) диффузным равновесием

ПРИ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ФИБРИНОЗНЫЙ ЭКССУДАТ НА СТАДИИ РАЗРЕШЕНИЯ ВЫВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) со слюной
- 2) мочой
- 3) с потом
- 4) через мокроту

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЯ ТРОФИКИ И ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

ПРИ ЗЕРНИСТОЙ ДИСТРОФИИ ТКАНЬ ПЕЧЕНИ НА РАЗРЕЗЕ ИМЕЕТ

- 1) тусклый вид, как бы ошпарена кипятком
- 2) мускатный цвет
- 3) восковидную окраску, как бы сальный вид
- 4) карминовый цвет

ТРАВМА СПИННОГО МОЗГА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ НЕЙРОГЕННЫМ ШОКОМ IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ СТИМУЛИРУЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) В-лимфоциты
- 2) лейкоциты
- 3) глюкокортикостероиды
- 4) Т-лимфоциты

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПОМЕЩАЮТ В

- 1) бумажные пакеты
- 2) стерильные банки или пробирки
- 3) питательную среду
- 4) пластиковые контейнеры

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПИАТОВ В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ПРОВОДИТСЯ МЕТОДОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) цветных отпечатков
- 2) рентгенфлюоресценции
- 3) фотометрии
- 4) хромато-масс-спектрометрии

ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КУСОЧКИ ЛЕГКИХ, ПЕЧЕНИ, ГОЛОВНОГО МОЗГА И ДРУГИХ ОРГАНОВ ВЫРЕЗАЮТ РАЗМЕРОМ (В САНТИМЕТРАХ)

- 1) 3,0×3,0×4,0
- 2) 4,0×4,0×5,0
- 3) 2,0×2,0×3,0
- 4) 1,0×1,0×2,0

ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ ИСХОДНОГО МАКРОСКОПИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПОСЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ ОБРАБОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ _____ СРЕЗОВ ТКАНЕЙ

- 1) обеззараживание
- 2) центрифугирование
- 3) замораживание
- 4) фильтрация

К ПРИЗНАКАМ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НИЖЕ 32°C ОТНОСЯТ

- 1) отсутствие двигательных и волевых функций
- 2) прекращение мышечной дрожи
- 3) судороги
- 4) нарушение памяти

ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА В СУДЕБНО-БИОХИМИЧЕСКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА: 1 ДОЛЖНОСТЬ НА КАЖДЫЕ _____ ПОЛНЫХ АНАЛИЗОВ В ГОД

- 1) 60
- 2) 50
- 3) 70
- 4) 80

К ПОРАЖАЮЩИМ ОБЛАСТЬ ПЕРВИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТ _____ ЯДЫ

- 1) резорбтивные
- 2) едкие
- 3) функциональные
- 4) деструктивные

ОГРАНИЧЕННЫМ СКОПЛЕНИЕМ КРОВИ В ПОЛОСТЯХ ПРИ ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ С РАЗРЫВОМ (РАНЕНИЕМ) СОСУДОВ

ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кровоподтек
- 2) гематома
- 3) кровотечение
- 4) кровоизлияние

К ВИДАМ ПРИЖИЗНЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТНОСЯТ

- 1) длительное
- 2) местное
- 3) хроническое
- 4) кратковременное

К ОПАСНОМУ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОТНОСЯТ

- 1) проникающее ранение черепа
- 2) открытый вывих плеча
- 3) открытый перелом скуловой кости
- 4) изолированный перелом нёбной кости

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА IV СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЯГКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) легкий

К ГРУППЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ АБСОЛЮТНОЙ ИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КОРОНАРНОГО КРОВотоКА, ОТНОСЯТ

- 1) вегето-сосудистую дистонию
- 2) гипертоническую болезнь
- 3) ишемическую болезнь сердца
- 4) цереброваскулярную болезнь

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) симуляцией
- 2) членовредительством

- 3) дезагgravацией
- 4) агgravацией

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В.В. ХОХЛОВ (2009) ВЫДЕЛЯЕТ _____ МАРКЕРЫ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1) немедицинские
- 2) медицинские
- 3) биохимические
- 4) биофизические

РЕШЕНИЕ ОБ ИМЕВШЕМСЯ ОБЕЗОБРАЖИВАНИИ ПРИНИМАЕТ

- 1) суд
- 2) следователь
- 3) дознаватель
- 4) врач судебно-медицинский эксперт

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ МОГУТ ВЫДАТЬ ПОД РОСПИСЬ

- 1) врачу
- 2) представителю органа или лица, назначившему экспертизу
- 3) лаборанту
- 4) страховому агенту

ПО ФОРМЕ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕТЛИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК

- 1) гладкие или шероховатые
- 2) эластичные и неэластичные
- 3) гигроскопичные и негигроскопичные
- 4) плоские или выпуклые

ГИПЕРЕМИЯ ПЕЧЕНИ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕЕ ОБЪЕМА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) хроническом венозном застое
- 2) жировом гепатозе
- 3) пелиозном гепатите
- 4) алкогольном циррозе

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) изменения поляризации клеточных мембран
- 2) отравления углекислым газом
- 3) отравления парами расплавленных частей установок
- 4) нарушения ионного равновесия

СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУ ПРАВОГО ПЛЕЧА НА УРОВНЕ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД

ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ХЛОРЗАМЕЩЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, ПОПАДАЯ НА КОЖУ, ВЫЗЫВАЮТ

- 1) эритему
- 2) ожог
- 3) дерматит
- 4) язву

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СОЛЯМИ РТУТИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ

- 1) легкие
- 2) почки
- 3) яичники
- 4) надпочечники

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ БРЫЖЕЙКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА В ЖЕЛУДОЧНОМ СОДЕРЖИМОМ, БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В КРОВИ ПО ОТНОШЕНИЮ К МОЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПРИЕМЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ НЕ БОЛЕЕ (В ЧАСАХ)

- 1) 5
- 2) 0,5
- 3) 2
- 4) 1,5

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ ГОРТАНИ С ЯВЛЕНИЕМ ОТЁКА И СУЖЕНИЕМ ГОЛОСОВОЙ ЩЕЛИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

РАНУ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ЛЕВУЮ ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий

- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

МЕХАНИЗМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СНОТВОРНЫХ ВЕЩЕСТВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) стабилизации цитохромоксидазы
- 2) разрушении стромы эритроцитов
- 3) глубоком угнетении ЦНС
- 4) ингибировании цитохрома

В СЛУЧАЯХ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ ЗАХОРОНЕНИЕ ТРУПОВ ДОПУСКАЕТСЯ ПО

- 1) письменному разрешению органов полиции или прокуратуры
- 2) устному разрешению органов полиции или прокуратуры
- 3) устному запросу родственников
- 4) письменному запросу родственников

В НОРМЕ ОБЪЕМ ЭЯКУЛЯТА СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 10-11
- 2) 14-15
- 3) 7-8
- 4) 2-5

ТОЧКИ ОКОСТЕНЕНИЯ ЭПИФИЗОВ ПЯТСНЫХ КОСТЕЙ И ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ ПОЯВЛЯЮТСЯ В (В ГОДАХ)

- 1) 10
- 2) 2
- 3) 6
- 4) 18

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПРАВОГО ПЛЕЧА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 75%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПОВ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ ОТМЕЧАЮТ, КАК ПРАВИЛО, ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ

- 1) трупного высыхания
- 2) трупных пятен
- 3) мышечного окоченения
- 4) аутолиза

ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1) острую

- 2) прилива
- 3) рубцевания
- 4) подострую

**ПЕРЕЛОМ ТРАХЕАЛЬНЫХ ХРЯЩЕЙ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ**

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

МЫШЬЯКОВИСТЫЙ ВОДОРОД ВЫЗЫВАЕТ

- 1) гемолиз
- 2) гемобластоз
- 3) паралич дыхательного центра
- 4) паралич сосудодвигательного центра

ДЛЯ ОПЬЯНЕНИЯ СИЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРНО, В ТОМ ЧИСЛЕ СОСТОЯНИЕ

- 1) агрессивности
- 2) эйфории
- 3) ступора
- 4) дезориентации

**ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО
ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЛОМЫ**

- 1) плечевой кости
- 2) лопаток
- 3) костей таза
- 4) бедренной кости

ПРИЗНАКИ ВЫСЫХАНИЯ ТРУПА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ОСМОТРЕ

- 1) живота
- 2) передней поверхности мошонки
- 3) спины
- 4) ягодиц

ПЯТНА ЛЯРШЕ ОБРАЗУЮТСЯ НА

- 1) склерах глаз
- 2) мошонке
- 3) слизистой оболочке полости рта
- 4) крайней плоти

**СЕКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОБЫ**

- 1) Бокариуса

- 2) Сунцова
- 3) Гоппе – Зейлера
- 4) Шенбейна

ПРИ ДЕЙСТВИИ СИЛЫ В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ОТ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ К СУСТАВНОЙ ЯМКЕ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПЕРЕЛОМ ОТ

- 1) кручения
- 2) растяжения
- 3) сжатия
- 4) сдвига

УХУДШЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕННОГО ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКИМ РАЗДРАЖЕНИЕМ РАН МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК ____ БОЛЕЗНИ

- 1) искусственные
- 2) притворные
- 3) инфекционные
- 4) неврологические

РАНА СПИНЫ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО, С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОЧКИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) стойкой утраты профессиональной трудоспособности
- 3) длительности расстройства здоровья
- 4) опасности для жизни

К СТАДИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙСЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН СПОСОБНОСТЬЮ К ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ, ЗАЧАТИЮ И РОДАМ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ОТНОСЯТ

- 1) физическое здоровье
- 2) социальное здоровье
- 3) эмоциональное состояние
- 4) половую зрелость

ХАРАКТЕРНОЙ ДЛЯ ПИЛЕННОЙ РАНЫ ФОРМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) прямолинейная
- 2) древовидная
- 3) трапецевидная
- 4) веретенообразная

ТРАВМАТИЧЕСКУЮ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЮ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью

4) не причинившее вред здоровью

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) аггравацией
- 2) дезаггравацией
- 3) симуляцией
- 4) членовредительством

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГРУДНОГО ПРОТОКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

НЕКРОЗ КОЖИ И ГЛУБЖЕЛЕЖАЩИХ ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ ОЖОГОВ ____ СТЕПЕНИ

- 1) 4
- 2) 3б
- 3) 3а
- 4) 2

ПЛАМЕННАЯ ФОТОМЕТРИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ

- 1) определении давности наступления смерти по динамике содержания калия в стекловидном теле глаза и спинномозговой жидкости трупа
- 2) установлении наличия костного вещества в смеси зол в случаях криминального сожжения трупа
- 3) обнаружении на теле и одежде трупов металлизации от воздействия деталей транспортных средств
- 4) установлении факта причинения огнестрельных повреждений пулями специального назначения

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЫШЬЯКОМ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) первичная остановка сердца
- 2) острая печеночная недостаточность
- 3) уремия
- 4) паралич дыхательного центра

ЗАКРЫТЫЙ ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий

- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕТУЧИМИ ХЛОРООРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) рвотные массы
- 2) глотку
- 3) часть сальника
- 4) промывные воды

СЕРДЦЕ ВСКРЫВАЮТ

- 1) с верхушки по правому желудочку
- 2) по межжелудочковой перегородке
- 3) против направления тока крови
- 4) по току крови

РАНУ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПРОСВЕТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ВЫРАЗИВШЕГОСЯ В НЕИЗГЛАДИМОМ ОБЕЗОБРАЖИВАНИИ ЛИЦА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) судом
- 2) врачом
- 3) следователем
- 4) прокурором

ПРИ ТИПИЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПЕТЛИ УЗЕЛ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ШЕЕ

- 1) сбоку слева
- 2) сбоку справа
- 3) спереди
- 4) сзади

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАССЛОЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ АНЕВРИЗМЫ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ОБНАРУЖИВАЮТ В РАНАХ

- 1) ушибленных
- 2) огнестрельных
- 3) колото-резаных
- 4) рублено-резаных

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫРАЖЕННОСТИ ПОЗДНИХ ТРУПНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ НАЛИЧИЕ НА ТРУПЕ

- 1) грунта
- 2) насекомых
- 3) следов выделений
- 4) следов крови

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ЖЕЛУДКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ КОМОЙ II-III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ЭЛЕКТРООЖОГИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМ СОСУДИСТЫМ КОМПОНЕНТОМ С ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ И ____ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И НА ОТДАЛЕНИИ

- 1) вен
- 2) нервных стволов
- 3) лимфатических узлов
- 4) костной ткани

РАНУ ЖИВОТА, ПРОНИКАЮЩУЮ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ, ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА НАЗНАЧАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ

- 1) факта обращения за медицинской помощью
- 2) количества родов у подозреваемой в детоубийстве
- 3) личности находящегося в коме пострадавшего
- 4) степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека

КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ L₂-L₃ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА И ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПОМЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ УСЛОВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) симуляцией
- 2) побоями
- 3) истязанием
- 4) мучением

МЕСТО ПРОНИКНОВЕНИЯ В ТЕЛО ПУЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕРСТИЕМ

- 1) входным
- 2) выходным
- 3) слепым
- 4) сквозным

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

ИЗУЧЕНИЕ СМЕРТИ КАК БИОЛОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ, МЕТОДОВ ЕЕ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСИТСЯ К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ

- 1) танатологии
- 2) антропологии
- 3) геронтологии
- 4) энтомологии

ТРАВМА, ПРИВЕДШАЯ К НЕФРЭКТОМИИ И ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) опасный для жизни
- 3) средней тяжести

4) тяжкий

КО ВТОРИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) бронхопневмонию
- 2) гипостатическую
- 3) паренхиматозную
- 4) интерстициальную

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ХВАТАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ЗАТЫЛОЧНАЯ ПЛАГИОЦЕФАЛИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ СИНОСТОЗИРОВАНИЕМ

- 1) венечного шва черепа с одной стороны
- 2) сагиттального шва черепа
- 3) ламбдовидного шва черепа с одной стороны
- 4) лобного шва черепа

О ПРИЖИЗНЕННОМ НАХОЖДЕНИИ В ОЧАГЕ ВОЗГОРАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ ЧАСТИЦ КОПОТИ В

- 1) полости рта и носа
- 2) наружных слуховых проходах
- 3) складках одежды
- 4) мелких бронхах

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стрептококковый сепсис
- 2) генерализованный туберкулез
- 3) отравление токсинами
- 4) менингококцемия

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) физической нагрузке
- 2) адинамией
- 3) высокой влажности
- 4) затруднении кровообращения

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕЛЕЗЕНКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

- 1) следователем
- 2) группой экспертов разного профиля
- 3) судом
- 4) прокурором

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ ПЛЕЧА С РАЗРЫВОМ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ: АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

КО ВТОРИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) иммунодефицитную
- 2) бронхопневмонию
- 3) интерстициальную
- 4) паренхиматозную

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЯДАМИ ЛЕТАЛЬНОГО СИНТЕЗА _____ ОБРАЗОВАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

- 1) предотвращает
- 2) замедляет

- 3) ускоряет
- 4) не изменяет

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ КРОВИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +4 ДО +8 ГРАДУСОВ СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

- 1) 24
- 2) 48
- 3) 72
- 4) 1

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) легкий

К НАСИЛЬСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) развратные действия
- 2) понуждение к половому сношению
- 3) изнасилование
- 4) мужеложство

РАЗРЫВЫ ОБОИХ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ИЗМЕНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ВИДА ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) изгладимостью
- 2) обезображением
- 3) дефектом
- 4) неизгладимостью

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние

- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

МЕХАНИЗМ «СДАВЛЕНИЕ» ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) тангенциальностью
- 2) центробежностью
- 3) центростремительностью
- 4) односторонностью

К ПРИЧИНАМ ВНУТРИУТРОБНОЙ АСФИКСИИ ПЛОДА ОТНОСЯТ

- 1) гидроцефалию
- 2) отслойку плаценты
- 3) поздние роды
- 4) атрезию анального отверстия

ВЕЛИЧИНА ПЛАМЕНИ ВЫСТРЕЛА ЗАВИСИТ ОТ

- 1) длины канала ствола
- 2) большой начальной скорости пули
- 3) калибра оружия
- 4) количества пороха

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ К ПОЛОВОМУ СНОШЕНИЮ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ШИРИНУ ГОЛОВКИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА ОПРЕДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ, В

- 1) теле
- 2) области короны
- 3) наиболее широкой ее части
- 4) области уретры

К СВОЙСТВАМ ПУЛИ, ВЛИЯЮЩИМ НА ХАРАКТЕР РАНЕНИЯ, ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) поля нарезов
- 2) наличие пороха
- 3) массу
- 4) наличие капсюля

К АСПИРАЦИОННОЙ ОТНОСЯТ АСФИКСИЮ ОТ ЗАКРЫТИЯ

- 1) просвета дыхательных путей предметом
- 2) просвета дыхательных путей жидкостями
- 3) отверстий дыхательных путей сыпучим веществом
- 4) отверстий дыхательных путей предметом

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЖИВЫХ ЛИЦ ДОСТАВЛЯЮТ

- 1) трупы
- 2) образцы для сравнительного исследования
- 3) части трупа
- 4) живых лиц

К ОСТРОМУ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕМУ ХОЛОДНОМУ ОРУЖИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) кинжал
- 2) стамеска
- 3) ножовка
- 4) долото

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ НАЗНАЧАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ

- 1) особых примет
- 2) следов преступления
- 3) степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека
- 4) негативных обстоятельств

ПЕРЕЛОМ ТЕЛА НЕСКОЛЬКИХ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

К ПРИТВОРНЫМ БОЛЕЗНЯМ ОТНОСЯТ

- 1) членовредительство
- 2) диссимуляцию
- 3) наркоманию
- 4) психические расстройства

ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ В КРОВОИЗЛИЯНИЯХ ПРИ ТРАВМЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, В СРЕДНЕМ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1) 5-6
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 12

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

СТАДИЯ ГИПОСТАЗА ОБЫЧНО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ (В ЧАСАХ)

- 1) 2-8
- 2) 8-12
- 3) 12-20
- 4) 20-24

ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ОБЩЕЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЕ ОБЛУЧЕНИЯ (В ГРЕЯХ)

- 1) 0,5-1,5
- 2) 2,0-4,0
- 3) 7,5-9,5
- 4) 5,0-7,0

ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, РЕЗКОЕ НАРУШЕНИЕ ТРОФИКИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

ВО ВТОРОЙ ФАЗЕ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРОИСХОДИТ

- 1) полное восстановление анатомо-физиологического строения кости
- 2) пролиферация клеточных элементов
- 3) образование и дифференцировка тканевых структур
- 4) образование ангиогенной костной структуры

ПО ШИРИНЕ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕТЛИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК

- 1) открытые, закрытые
- 2) замкнутые, незамкнутые
- 3) одиночные, двойные, множественные
- 4) тонкие, толстые, широкие

КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА ГНАТИОН ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, КАК ТОЧКА

- 1) соединения лобной, верхне-челюстной и слезной костей
- 2) наиболее выступающая кнаружи на скуловой дуге

- 3) наиболее выступающая вперед между надбровными дугами
- 4) на нижнем крае нижней челюсти в месте пересечения его медиально-сагиттальной плоскостью

К МЕСТНЫМ ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ХОД РЕГЕНЕРАЦИИ, ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) изменения скорости кровотока
- 2) интенсивность обменных процессов
- 3) состояние нейротрофики
- 4) возраст

РУБЕЦ В ПЕРИОД С МОМЕНТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ДО ОДНОГО МЕСЯЦА БЫВАЕТ ____ КОНСИСТЕНЦИИ

- 1) тестоватой
- 2) желеобразной
- 3) плотной
- 4) мягкой

ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ПРОИЗВОДИТ ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИСУТСТВИИ

- 1) следователя
- 2) родственников подэкспертного
- 3) начальника БСМЭ
- 4) специалиста бактериологической лаборатории

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КРЕСТЦА С НАРУШЕНИЕМ НЕПРЕРЫВНОСТИ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

К ПРИЗНАКАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАЗРЕЗА КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОТНОСЯТ

- 1) размозжённые края
- 2) П-образный конец
- 3) остроугольный конец
- 4) осаднённые края

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ КОМОЙ II СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ПЕРЕЛОМ ТЕЛ ДВУХ ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

ОБНАРУЖЕНИЕ В ПРОСВЕТЕ КРУПНЫХ СОСУДОВ БЕЛЫХ СВЁРТКОВ КРОВИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1) длительной агонии
- 2) кратковременной агонии
- 3) отсутствию агонального периода
- 4) выполнении реанимационных мероприятий

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В ВЫПРЯМЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее легкий вред здоровью
- 2) не причинившее вред здоровью
- 3) причинившее тяжкий вред здоровью
- 4) причинившее вред здоровью средней тяжести

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий

- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ЦВЕТ КРОВОПОДТЕКА В ПЕРВЫЕ 30-60 МИНУТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ____ ИЗЛИВШЕЙСЯ КРОВИ

- 1) билирубином
- 2) карбоксигемоглобином
- 3) оксигемоглобином
- 4) метгемоглобином

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ, ОСЛОЖНИВШИМСЯ ОСТРЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) опасность для жизни
- 4) угрожающее жизни состояние

КОМАТОЗНАЯ ФОРМА ИНТОКСИКАЦИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) массивной бронхореей
- 2) сонливостью
- 3) слюнотечением
- 4) потоотделением

ПРИЛАГАЕМЫЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА, ПРИНИМАЮТСЯ В ____ ВИДЕ

- 1) упакованном
- 2) расфасованном
- 3) развернутом
- 4) разложенном

РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) повреждения вен шеи
- 2) утопления
- 3) проникающего ранения груди
- 4) гнилостного изменения трупа

ДЛЯ МЕХАНИЗМА «РАСТЯЖЕНИЕ» ХАРАКТЕРНЫ

- 1) односторонность, центростремительность
- 2) двусторонность, центробежность
- 3) двусторонность, центростремительность
- 4) односторонность, центробежность

**СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ**

- 1) угрожающее жизни
- 2) опасное для жизни
- 3) повлекшее стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) причинившее легкий вред здоровью

**СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ О**

- 1) прилагаемых объектах исследования
- 2) выводах эксперта
- 3) результатах лабораторных исследований
- 4) обстоятельствах дела

**ТУПАЯ ТРАВМА ГОРТАНИ С КРОВОИЗЛИЯНИЕМ В ГОЛОСОВЫЕ СВЯЗКИ, РАЗВИТИЕМ
ИХ ОТЁКА И СУЖЕНИЕМ ГОЛОСОВОЙ ЩЕЛИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД
ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

**КРОВОПОДТЁК В ЛОБНОЙ ОБЛАСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО
ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ**

- 1) вызвавшее расстройство жизненных функций
- 2) вызвавшее длительное расстройство здоровья
- 3) причинившее лёгкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гинатрезия
- 2) стеноз
- 3) атрезия
- 4) аплазия

**СМЕРТЬ, ПРИ КОТОРОЙ НАСТУПАЮТ НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, КРОВООБРАЩЕНИЯ И ДЫХАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) мозговой
- 2) агональной
- 3) клинической
- 4) биологической

**В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ПАЦИЕНТОМ МЕР ПО УХУДШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ СВОЕГО
ЗДОРОВЬЯ ИЛИ ЗАТЯГИВАНИЮ БОЛЕЗНИ, РАЗВИВАЕТСЯ АГГРАВАЦИЯ**

- 1) пассивная

- 2) активная
- 3) подсознательная
- 4) патологическая

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ЛЁГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) расстройство здоровья более 21 дня
- 2) расстройство здоровья более 31 дня
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ПЕРЕЛОМ ЗУБА II ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ОТКАЗ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА НАПРАВЛЯЕТСЯ

- 1) любым подтвержденным способом
- 2) в виде устного сообщения следователя
- 3) постановлением следователя
- 4) в виде письменного сообщения следователя

ДЛИНА ЛОКТЕВОЙ И ЛУЧЕВОЙ КОСТЕЙ У ЗРЕЛОГО НОВорожденного Младенца СОСТАВЛЯЕТ СООТВЕТСТВЕННО(В СМ)

- 1) 7 и 6,6
- 2) 3,4 и 3,2
- 3) 7,7 и 7,6
- 4) 6,6 и 8,7

НЕГЛУБОКАЯ РАНА С РОВНЫМИ НЕОСАДНЁННЫМИ КРАЯМИ И ДВУМЯ ОСТРОУГОЛЬНЫМИ КОНЦАМИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЕЁ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) строгания
- 2) пиления
- 3) резания
- 4) сверления

СИМУЛЯЦИЯ ПОДЪЕМА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ ПРИЕМА

- 1) нолипрела
- 2) энапа
- 3) эфедрина
- 4) престариума

К ОБЪЕКТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ (ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ) ИССЛЕДОВАНИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ НА АКТИНОМИКОЗ, БЛАСТОМИКОЗЫ И ДРУГИЕ ДИССЕМНИРОВАННЫЕ МИКОЗЫ ОТНОСЯТ

- 1) гной
- 2) продолговатый мозг
- 3) аппендикс
- 4) брюшину

ПРИ КОМПРЕССИОННОЙ АСФИКСИИ УСТАНОВЛИВАЮТ ПРИЗНАК

- 1) Никифорова
- 2) Лакассаня
- 3) Русакова – Шкаравского
- 4) Гиммельштирна

МЕХАНИЗМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЫШЬЯКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1) ингибировании сульфгидрильных групп тиоловых ферментов
- 2) трансформации гемоглобина в карбоксигемоглобин
- 3) ингибировании ацетилхолинэстеразы
- 4) расщеплении до щавелевой кислоты

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПНЫХ ЯВЛЕНИЙ УСТАНОВЛИВАЮТ ПЯТНА

- 1) Тардые
- 2) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа
- 3) Лярше
- 4) Вишневого

ПРИ НАРУШЕНИИ ПАМЯТИ НА ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ РАЗВИВАЕТСЯ АМНЕЗИЯ

- 1) диссоциативная
- 2) ретроградная
- 3) фиксационная
- 4) антероградная

ЭТИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮТ КАРДИОСКЛЕРОЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) постинфарктный
- 2) диффузный
- 3) очаговый
- 4) гипотрофический

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИВОРОЖДЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОБЫ

- 1) Таранухина В.А.
- 2) Диллона Я.Г.
- 3) Гаазе К.

4) Бреслау Б.

ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И ОТЛОЖЕНИЙ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ВЕЩЕСТВ ДИСТРОФИИ МОГУТ БЫТЬ

- 1) углеводными
- 2) водными
- 3) стромально-сосудистыми
- 4) минеральными

СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ НА УРОВНЕ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЦИАНИДОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА СОСТОИТ В

- 1) нарушении кислотно-щелочного равновесия в крови
- 2) развитии паралича дыхательного центра
- 3) переводе гемоглобина в метгемоглобин
- 4) блокировании цитохромоксидазы клеток

В КРОВОПОДТЕКАХ КРОВЬ

- 1) образует ограниченные свертки
- 2) диффузно пропитывает клетчатку
- 3) образует неограниченные свертки
- 4) отсутствует

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО РАЗРЫВА МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ЛОПАСТИ ВИНТА ВОЗДУШНОГО СУДНА СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ, СРАВНИТЕЛЬНО ОСТРЫМ КРАЕМ И БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ, ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИЧИНЯЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- 1) колото-рубленные
- 2) ушибленно-рубленные
- 3) ушибленно-пиленые
- 4) колото-резаные

ПРИ ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНЬ, КАК ПРАВИЛО, ОБРЕТАЕТ ____ ЦВЕТ

- 1) красно-коричневый
- 2) ярко-желтый
- 3) карминовый
- 4) темно-красный

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

В МЕХАНИЗМЕ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ОПИАТОВ ВЫДЕЛЯЮТ РАЗВИТИЕ ОТЕКА

- 1) Квинке
- 2) мягких мозговых оболочек
- 3) легких
- 4) мозга

МЕТАЛЛИЗАЦИЮ КРАЕВ РАНЫ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ

- 1) биологическим исследованием
- 2) спектральным методом
- 3) биохимическим методом
- 4) трасологическим анализом

ОДНОСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ I ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

СРОК НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ ИСЧИСЛЯЕТСЯ

- 1) с момента утверждения состава экспертной группы

- 2) с дня предоставления всех необходимых для экспертизы документов
- 3) со следующего после дня назначения экспертизы
- 4) с дня поступления в экспертное учреждение постановления или определения о назначении экспертизы

СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ОТРАВЛЕНИЯ ЦИАНИДАМИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ _____ ЦВЕТА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

- 1) розоватого
- 2) синюшного
- 3) коричневого
- 4) серого

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ЭКСПЕРТУ ОБЪЕКТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) врачом-терапевтом участковым
- 2) лицом, назначившим экспертизу
- 3) представителем потерпевшего
- 4) защитником обвиняемого

ТРАВМА ВНУТРИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 8
- 4) 6

ОТСУТСТВИЕ ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ПРАВОЙ ЛОПАТКИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 80%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ D-ЛИЗЕРГИНОВОЙ КИСЛОТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) рентгенфлюоресценции
- 2) фотометрии
- 3) хромато-масс-спектрометрии
- 4) цветных отпечатков

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ

ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ, ВЛЕКУЩИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ВОДНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТРАВМА ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- 1) падении воздушного судна с высоты в водоём
- 2) столкновении водного и воздушного транспортных средств
- 3) падении автомобиля в водоем с моста
- 4) ударе частями плавучего транспорта

ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

РВАНО-УШИБЛЕННАЯ РАНА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) повлекшее стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) причинившее легкий вред здоровью
- 3) опасное для жизни
- 4) угрожающее жизни

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННУЮ КОНТРАКТУРУ ПРАВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА ПРИ СГИБАНИИ 20°-25°, РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее легкий вред здоровью
- 2) причинившее вред здоровью средней тяжести
- 3) не причинившее вред здоровью
- 4) причинившее тяжкий вред здоровью

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СОЛЕЙ ОКИСИ ЖЕЛЕЗА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ ПО

- 1) Маллори
- 2) Рего
- 3) Ван-Гизону
- 4) Перлсу

ОТЧЕТЛИВО РАЗЛИЧИМЫЕ ПРИЗНАКИ ГНИЛОСТНОЙ ВЕНОЗНОЙ СЕТИ НАБЛЮДАЮТСЯ НА ____ СУТКИ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1) 3-4
- 2) 1-2
- 3) 6-8
- 4) 10-12

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ МАТКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) длительный
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ ТРУПОВ ПРИ АВИАЦИОННОЙ ТРАВМЕ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ В НЕЙ

- 1) этилового спирта
- 2) этиленгликоля
- 3) поливинилбутираля
- 4) формальдегида

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ ПРАВОГО ПЛЕЧА С ОТРЫВОМ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ЖИВОГО ЛИЦА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ УСТАНОВЛИВАЕТ

- 1) наличие повреждений
- 2) факт мучений и истязаний
- 3) факт борьбы и самообороны
- 4) причину возникновения конфликтной ситуации

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ИССЛЕДУЮТ

АКТИВНОСТЬ

- 1) тропонина Т, лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
- 2) холинэстеразы, глутаматдегидрогеназы
- 3) глутамилтранспептидазы, мочевины
- 4) креатинина, глюкозы

К НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ПРОДУКТАМ РАСПАДА МЕТАНОЛА ОТНОСЯТ

- 1) ацетальдегид
- 2) формальдегид
- 3) щавелевую кислоту
- 4) уксусную кислоту

ДЕЙСТВИЕ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) брадикардией
- 2) угнетением сознания
- 3) повышением артериального давления
- 4) снижением артериального давления

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

РЕФЛЕКСОМ, ПРИВОДЯЩИМ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ «ГУСИНОЙ КОЖИ» ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) экстероцептивный
- 2) пиломоторный
- 3) статокинетический
- 4) соматический

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) размозжение
- 2) ссадина
- 3) отрыв конечности
- 4) перелом костей

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) механических повреждений с разрушением паренхимы
- 2) плотной волокнистой соединительной ткани капсулы
- 3) междольковой соединительная ткани
- 4) клеток Ито печеночных долек

ЭКСПРЕССИЯ САРКОМЕРНОГО АКТИНА В МЫШЦАХ РАНЕВОГО КАНАЛА

- 1) извращается
- 2) повышается
- 3) понижается
- 4) не изменяется

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ МОЧЕТОЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ ЯИЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ НАКОПЛЕНИЕ ВО ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКЕ СОСУДОВ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИБРИНОГЕНА, НАБЛЮДАЕТСЯ НА СТАДИИ

- 1) долипидной
- 2) липоидозной
- 3) липосклероза
- 4) атероматоза

К НИБОЛЕЕ РАННИМ РЕАКЦИЯМ В ОТВЕТ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) регенеративные
- 2) репаративные
- 3) некротические
- 4) сосудистые

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕЛА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ КАК ПРАВИЛО ПРОИЗВОДЯТ ПО

- 1) костям таза

- 2) длинным трубчатым костям
- 3) черепу
- 4) поясничным позвонкам

ВЫРЕЗАННЫЕ ДЛЯ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КУСОЧКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ТОЛЩИНУ НЕ БОЛЕЕ (В СМ)

- 1) 0,8
- 2) 1,0
- 3) 1,5
- 4) 2,0

УШИБ СЕРДЦА, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ РАЗВИТИЕМ ИНФАРКТА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

МАЦЕРАЦИЯ КОЖИ КИСТЕЙ И СТОП ТРУПА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1) возрастной морфологии
- 2) смерти от утопления
- 3) длительности пребывания в воде
- 4) патологических изменениях кожи

ГНИЕНИЕ КРОВИ С ОБРАЗОВАНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА СУЛЬФГЕМОГЛОБИНА ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ

- 1) гнилостной венозной сети
- 2) гнилостной имбибиции
- 3) трупной эмфиземы
- 4) трупного гигантизма

РАЗЛИЧАЮТ ____ СТЕПЕНИ/СТЕПЕНЕЙ ОЖОГОВ

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 3

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЖИЗНЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТКАНИ С РАНОЙ

НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ В ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) спектральную
- 2) химическую
- 3) гистологическую
- 4) генетическую

ГЕНЕТИЧЕСКИ ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ ГИБЕЛЬЮ КЛЕТКИ В ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фагоцитоз
- 2) некроз
- 3) апоптоз
- 4) анабиоз

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ЛОЖНЫЕ СУСТАВЫ КОСТЕЙ ПРАВОГО ЗАПЯСТЬЯ, РАВНЫЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

ПРИ ВХОЖДЕНИИ ПУЛИ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ ФОРМА ВХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ НА КОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) круглой
- 2) щелевидной
- 3) веретенообразной
- 4) овальной

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ДЛЯ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ БЕРУТ

- 1) артерии основания головного мозга
- 2) сухожильный шлем
- 3) мышцы лица
- 4) кусочки головного мозга с мягкими мозговыми оболочками из контузионного очага и пограничной зоны

К ДЕЙСТВИЯМ, ПРИЧИНИВШИМ ФИЗИЧЕСКУЮ БОЛЬ БЕЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОТНОСЯТ

- 1) истязания
- 2) симуляцию
- 3) мучения
- 4) побои

ГЛАВНЫМ АСПЕКТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- 1) давности наступления смерти
- 2) причины смерти
- 3) механизма наступления смерти
- 4) срока захоронения

УСТАНОВЛЕНИЕ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ ПРОИЗВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- 1) реакции преципитации
- 2) ШИК-реакции
- 3) суправитальной реакции
- 4) иммуноцитохимической реакции

ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ТОЛЩИНУ НЕ БОЛЕЕ (В МИКРОМЕТРАХ)

- 1) 20-25
- 2) 10-15
- 3) 30-35
- 4) 25-30

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ВОПРОС О НАЛИЧИИ НА ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

- 1) клеток органов и тканей человека
- 2) следов крови
- 3) следов выделений
- 4) волос

НАМЕРЕННОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинившее
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ

**ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

**МНОЖЕСТВЕННЫЕ ДВУСТОРОННИЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР С НАРУШЕНИЕМ
АНАТОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТИ КАРКАСА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК
ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ**

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

**ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ
ЖИВОГО ЛИЦА И С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПОДЭКСПЕРТНОГО
НАПРАВЛЯЮТ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ В**

- 1) поликлинику по месту жительства
- 2) поликлинику по месту регистрации
- 3) специализированные организации здравоохранения
- 4) травматологический пункт

РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) 5 стадий
- 2) 3 стадии
- 3) 4 стадии
- 4) 2 стадии

**ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ
МЫШЕЧНОГО ВАЛИКА, ВЫСОТОЙ 1,5-1 САНТИМЕТРА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О
ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ (В ЧАСАХ) (ПО БИЛКУНУ В.В., 1986)**

- 1) 10-11
- 2) 1-3
- 3) 6-9
- 4) 3-6

**ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ПО СТЕПЕНИ
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД
ЗДОРОВЬЮ**

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННУЮ КОНТРАКТУРУ ПРАВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (РАЗГИБАНИЕ – 20°-25°), РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

МОДЕЛИРОВАНИЕ, КАК ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВКЛЮЧАЕТ

- 1) определение параметров объектов и процессов
- 2) сопоставление, скольжение (совмещение), наложение, репераж признаков на изображениях объектов
- 3) изготовление объемных слепков с поверхности следов-повреждений, анатомических образований (маски), слепков раневых каналов
- 4) установление количества, механизма и последовательности образования следов-повреждений

НЕСРОСШИЙСЯ ФРАГМЕНТАРНЫЙ ПЕРЕЛОМ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ДИАФИЗА ПРАВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ВЕЛИЧИНА ПЛАМЕНИ ВЫСТРЕЛА ЗАВИСИТ ОТ

- 1) калибра оружия
- 2) вида пороха
- 3) большой начальной скорости пули
- 4) длины канала ствола

СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ АСФИКСИИ ОБЫЧНО НАСТУПАЕТ В ТЕЧЕНИЕ (В МИНУТАХ)

- 1) 14-18
- 2) 1-2
- 3) 4-8
- 4) 10-12

ДЛЯ «ЛЕГОЧНОЙ» СМЕРТИ ЗНАЧИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) острой эмфиземы легких
- 2) жировой эмболии сосудов легких
- 3) отека с вовлечением более половины альвеол
- 4) гиалиновых мембран

ОЧЕРЕДНОСТЬ ОПИСАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ НА ТРУПЕ ОБЫЧНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРАВИЛОМ

- 1) снизу вверх
- 2) сверху вниз
- 3) снаружи внутрь
- 4) изнутри наружу

РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) руководитель органа управления здравоохранением
- 2) следователь
- 3) адвокат
- 4) криминалист

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА ЩИТОВИДНОГО ХРЯЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ПАРАМИ РТУТИ НА ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАПРАВЛЯЮТ

- 1) тимус
- 2) одежду
- 3) головной мозг
- 4) кровь и мочу

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИИ У ТРУПА ПРИЗНАКОВ СМЕРТИ ОТ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ СООБЩАЕТ

- 1) родственникам подэкспертного
- 2) врачу-инфекционисту
- 3) коллегам
- 4) руководителю Бюро судебно-медицинской экспертизы

СТАДИЯ РЕТИКУЛОЦИТАРНОГО КРИЗА ПРИ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ДЛИТСЯ ДО ____ НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ КРОВОПОТЕРИ

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГРУДНОГО ПРОТОКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

ДЛЯ «СЕРДЕЧНОЙ» СМЕРТИ ЗНАЧИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1) некроза миокарда
- 2) наличия крупных полей фиброзной ткани
- 3) зоны глыбчатого распада кардиомиоцитов
- 4) выраженной гипертрофии миокарда

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К

- 1) кислородному голоданию
- 2) баротравме уха
- 3) отравлению кислородом
- 4) отравлению углекислым газом

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ С ПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ПЕРВИЧНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) уменьшением объема циркулирующей крови
- 2) асистолией желудочков
- 3) параличом сосудодвигательного центра

4) пароксизмальной желудочковой тахикардией

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАННОЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПО ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) причинившее средней тяжести
- 2) не причинившее
- 3) причинившее лёгкий
- 4) причинившее тяжкий

СРОК ХРАНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ОБРАЗЦА ОБЪЕКТОВ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТАВЛЯЕТ (В МЕСЯЦАХ)

- 1) 6
- 2) 12
- 3) 10
- 4) 2

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЯЗЫКА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ОТКРЫТЫЙ ПЕРИЛАДЬЕВИДНО-ЛУНАРНЫЙ ВЫВИХ КИСТИ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ

- 1) свидетели происшествия
- 2) специалисты соответствующего профиля
- 3) понятые
- 4) представители органа управления здравоохранением

ПЫЖ ОКАЗЫВАЕТ НА ТКАНИ ДЕЙСТВИЕ

- 1) механическое
- 2) термическое
- 3) химическое
- 4) комбинированное

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА, ПОСТУПИВШИЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ, ХРАНЯТ В

- 1) бумажных упаковках
- 2) металлических шкафах экспертов
- 3) ящиках рабочего стола эксперта
- 4) полиэтиленовых пакетах

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) избыточной
- 2) физиологической
- 3) репаративной
- 4) клеточной

В ПРОЦЕССЕ ОЖИРЕНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1) дисморфоманическую
- 2) простого ожирения
- 3) кахектическую
- 4) аноректическую

УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ПРОЦЕСС САМОПРОИЗВОЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЫШЕЧНОГО ОКочЕНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕН РАЗВИТИЕМ

- 1) мацерации
- 2) гниения
- 3) аутолиза
- 4) мумификации

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

О КАТАПУЛЬТИРОВАНИИ ВВЕРХ МОЖНО СУДИТЬ ПРИ НАЛИЧИИ У ПИЛОТА ВОЗДУШНОГО СУДНА

- 1) перелома лопатки
- 2) разгибательного перелома грудины
- 3) двухсторонних сгибательных переломов рёбер
- 4) переломов свода и основания черепа

В ТРЕТЬЕЙ ЗОНЕ БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ВЫСТРЕЛА ИЗ БОЕВОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ

- 1) огнестрельный снаряд и пороховые газы
- 2) пороховые зёрна и металлические частицы
- 3) пламя выстрела и огнестрельный снаряд
- 4) пороховые газы и металлические частицы

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННУЮ КОНТРАКТУРУ ПРАВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (РАЗГИБАНИЕ – 20°-25°), РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ОТРАВЛЕНИЕ НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ВЕЩЕСТВОМ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ТОКСИЧЕСКОЙ КОМОЙ III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившее
- 4) средней тяжести

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) угрожающий жизни

ВИД МЕТАЛЛА И ТОПОГРАФИЮ МЕТАЛЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ВХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ МОЖНО УСТАНОВИТЬ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА

- 1) «цветных отпечатков»
- 2) электронно-микроскопического
- 3) биохимического
- 4) иммуногистохимического

ПРИЧИНОЙ ВНЕЗАПНОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ АСФИКСИИ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ОПУХОЛЬ

- 1) средостения
- 2) щитовидной железы
- 3) пищевода
- 4) трахеи

НАЛИЧИЕ У ОТВЕРСТИЙ НОСА И РТА СОСУЛЕК, НА РЕСНИЦАХ И НЕЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ, ОПИСАННЫМ

- 1) Касьяновым М.И.
- 2) Пухнаревичем В.А.
- 3) Райским М.И.
- 4) Десятовым В.П.

ОТРАВЛЕНИЕ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ РАЗВИТИЕМ ПЕЧЁНОЧНОЙ КОМЫ II-III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- 1) калиемии
- 2) натриемии
- 3) гемоглобинурии
- 4) олигурии

СНАБЖЕНИЕ ТКАНЕЙ КИСЛОРОДОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЗАВИСИТ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, ОТ

- 1) содержания кислорода в крови
- 2) кислородной емкости крови
- 3) напряжения кислорода в плазме
- 4) насыщения гемоглобина кислородом

ОСНОВНЫМ ПОВРЕЖДАЮЩИМ ФАКТОРОМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА ГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА В ТОПЛИВНЫХ БАКАХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) встречный поток воздуха

- 2) динамическая перегрузка
- 3) взрывная декомпрессия
- 4) взрывная волна

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ ЕГО СГИБАНИИ ОТ 55° ДО 70°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

К ОБЩЕАСФИКТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ОТНОСЯТ

- 1) красный цвет трупных пятен
- 2) переполненный мочевого пузырь
- 3) пятна Рассказова – Лукомского
- 4) темную жидкую кровь в сосудах

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ПЕРЕЛОМ ТЕЛА ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней тяжести

- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА, СВОБОДНО ЛЕЖАЩИЕ В ОБЛАСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОДЕЖДЫ И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ТРУПА, ПОСЛЕ ИХ ОПИСАНИЯ И ДЕТАЛЬНОЙ ФОТОСЪЕМКИ ИЗЫМАЮТСЯ

- 1) криминалистом
- 2) врачом–судебно-медицинским экспертом
- 3) адвокатом
- 4) следователем

ЭРОЗИВНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК НАБЛЮДАЮТСЯ

- 1) в месте приложения силы
- 2) в зоне противоудара
- 3) в области переломов костей черепа
- 4) по направлению воздействия

ОГНЕСТРЕЛЬНУЮ ТРАВМУ ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ШОКОМ IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ДЕМАРКАЦИОННОЕ КОЛЬЦО У ОСНОВАНИЯ ПУПОВИНЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ У НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА В СРЕДНЕМ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1) 54-56
- 2) 28-30
- 3) 6-12
- 4) 48-50

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней степени тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОСТА ПО ДЛИННЫМ ТРУБЧАТЫМ КОСТЯМ НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ (В САНТИМЕТРАХ)

- 1) 2-4
- 2) 9-10

- 3) 6-8
- 4) 3-5

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ УПАКОВКИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА УКАЗЫВАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1) заключении эксперта
- 2) справке вскрытия упаковки
- 3) выписке
- 4) протоколе

ДЛЯ НЕБЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ВЗРЫВА ХАРАКТЕРНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) осколочные повреждения
- 2) термические ожоги
- 3) химические ожоги
- 4) обширные разрывы кожи

ОКОСТЕНЕНИЕ НЁБНОГО ШВА НАЧИНАЕТСЯ С (В ГОДАХ)

- 1) 50
- 2) 16
- 3) 25
- 4) 30

К ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

- 1) обморожение
- 2) окоченение
- 3) отсутствие сердцебиения
- 4) отсутствие дыхания

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА ВОЗМОЖНА ПРИ НАЛИЧИИ

- 1) сходного по общим признакам предмета
- 2) отображения предмета на следовоспринимающей поверхности
- 3) следообразующего предмета
- 4) предмета и его отображения

«ГОФРИРОВАНИЕ» ОДЕЖДЫ ПРИ ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЕ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) сжатия
- 2) растяжения
- 3) кручения
- 4) трения

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) разрастание соединительной ткани
- 2) жировую эмболию сосудов

- 3) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 4) вытягивание ядер зернистого слоя эпидермиса с образованием «щеток»

В СЛУЧАЕ, КОГДА ПОТЕРПЕВШАЯ В СВЯЗИ С СОБЫТИЕМ, ПО ПОВОДУ КОТОРОГО НАЗНАЧЕНА ЭКСПЕРТИЗА, ОБРАЩАЛАСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, ЗАПРАШИВАЕТСЯ

- 1) разрешение присутствия лечащего врача потерпевшей
- 2) протокол осмотра места происшествия
- 3) медицинская документация
- 4) протокол допроса свидетеля

МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ МОГУТ ВЫДАТЬ ПОД РОСПИСЬ

- 1) лаборанту
- 2) врачу
- 3) представителю органа или лица, назначившему экспертизу
- 4) страховому агенту

В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛОСКИХ КОСТЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) расстояние выстрела
- 2) позу пострадавшего в момент ранения
- 3) направление раневого канала
- 4) конкретный образец оружия

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ КОКАИНОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бледностью лица
- 2) «кокаиновым психозом»
- 3) арефлексией
- 4) кожным зудом

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ТКАНИ И ЖИДКОСТИ ИЗ ТРУПА НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ ____ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1) вирусологического
- 2) биохимического
- 3) спектрального
- 4) микроскопического

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТМОРТАЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСЕКОМЫХ СУЩЕСТВУЕТ ____ ОСНОВНЫХ ПОДХОДА/ПОДХОДОВ

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 2

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРОФИКИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) средней тяжести

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРОВОДИТСЯ СОВМЕСТНО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМИ ЭКСПЕРТАМИ

- 1) клиническими врачами и комиссией Минздрава России
- 2) лицом, назначившим экспертизу и комиссией Минздрава России
- 3) и лицом, назначившим экспертизу
- 4) и клиническими врачами

ПОЯСОК ОСАДНЕНИЯ ПО КРАЯМ ВЫХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ ОБРАЗУЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ

- 1) разрыве пули внутри тела
- 2) контузионном ранении
- 3) малой кинетической энергии пули
- 4) прилегании к области выхода пули плотной ткани

К ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ ПРИЗНАКАМ НОВОРОЖДЕННОСТИ ОТНОСЯТ

- 1) наличие ядер окостенения
- 2) отсутствие замкнутого демаркационного кольца у основания пуповины
- 3) помарки крови на теле при отсутствии повреждений
- 4) «недышавшие легкие»

НЕСРОСШИЙСЯ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ В ОБЛАСТИ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАФИЗА ПРАВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести

- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

К ВИДАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТНОСЯТ

- 1) периодическое
- 2) кратковременное
- 3) местное
- 4) длительное

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ПОРАЖЕНИЕ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ С ОБРАЗОВАНИЕМ МЕЛКИХ ДЕФЕКТОВ И ТУСКЛО-ЖЕЛТОВАТОЕ ЕЕ ОКРАШИВАНИЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ ____ КИСЛОТОЙ

- 1) плавиковой
- 2) серной
- 3) уксусной
- 4) азотной

ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТ ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ В ПРИСУТСТВИИ

- 1) руководителя экспертного учреждения
- 2) адвоката
- 3) следователя
- 4) специалиста бактериологической лаборатории учреждения государственного санитарно-эпидемиологического надзора

СОГЛАСНО СТ. 178 УПК РФ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТ ОСМОТР ТРУПА С УЧАСТИЕМ

- 1) руководителя экспертного учреждения
- 2) руководителя органом управления здравоохранения
- 3) лаборанта
- 4) судебно-медицинского эксперта

ПОВЫШЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В ПРЕДЕЛАХ 37,1-38,0 °С ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) озноб
- 2) гипотермия
- 3) перегревание
- 4) субфебрильная лихорадка

В СЛУЧАЯХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ШЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗРЕЗ ПО

- 1) Мак – Коллум – Мэллори
- 2) Медведеву
- 3) Фишеру
- 4) Лешке

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЖИРОВУЮ ЭМБОЛИЮ ЛЕГКИХ НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗЫМАТЬ

- 1) 3 кусочка (из верхних и средней долей легких)
- 2) 2 кусочка из прикорневой зоны обоих легких
- 3) 10 кусочков из разных отделов легких
- 4) 3 кусочка (из нижних и средней долей легких)

БОЛИГОЛОВ ПЯТНИСТЫЙ СОДЕРЖИТ АЛКАЛОИД

- 1) скополамин
- 2) аконитин
- 3) кониин
- 4) цитизин

КРАТКОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОРГАНИЗМ ПРИВОДИТ К

- 1) падению артериального давления
- 2) адинамии
- 3) повышенному потреблению кислорода
- 4) сужению периферических сосудов

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОК III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

НАСТУПЛЕНИЕ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРОДУКТАМИ ЯДОВИТЫХ РЫБ ОБУСЛОВЛЕНО

- 1) параличом дыхательного центра
- 2) угнетением сердечной деятельности

- 3) острой печеночной недостаточностью
- 4) ДВС-синдромом

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКЕЛЕТИРОВАННОГО ТРУПА НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ

- 1) взаимное расположение костей на местности
- 2) следы инъекций
- 3) диаметр зрачков
- 4) наличие «гусиной кожи»

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЛЕКУЩИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРБИТУРАТОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) иммунохимических тестов
- 2) фотометрии
- 3) цветных отпечатков
- 4) рентгенфлюоресценции

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ НЕПРОНИКАЮЩЕЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

НАРУШЕНИЕ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДСТВИЕМ

- 1) полового акта
- 2) острого цистита
- 3) отсутствия девственной плевы при рождении
- 4) вульвовагинита

КОМПЛЕКС ПОВРЕЖДЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРИ АВИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФАХ, НАЗЫВАЮТ

- 1) авиационной травмой
- 2) авиационной аварией
- 3) авиационным случаем

4) авиационным инцидентом

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТУПОЙ ТРАВМЫ ГОЛОВЫ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ПЕРИОД ОТ МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ ДО 28 ДНЕЙ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) перинатальным
- 2) неонатальным
- 3) антенатальным
- 4) промежуточным

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГЕМОПЕРИКАРД КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

МАКРОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АМИЛОИДОЗА ЯВЛЯЕТСЯ _____ ВИД ОРГАНА

- 1) глиняный
- 2) мутный
- 3) восковидный
- 4) сальный

О ПРИЖИЗНЕННОЙ АСПИРАЦИИ РВОТНЫХ МАСС СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ НАЛИЧИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО В

- 1) пищеводе
- 2) носовых ходах
- 3) трахее
- 4) бронхиолах

СМЕРТЬ ОТ СДАВЛЕНИЯ ГРУДИ И ЖИВОТА ОТНОСЯТ К _____ АСФИКСИИ

- 1) компрессионной
- 2) странгуляционной
- 3) обтурационной
- 4) аспирационной

ОБУГЛИВАНИЕ ТКАНЕЙ В МЕСТАХ КОНТАКТА С ТОКОНЕСУЩИМ ПРОВОДНИКОМ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА (В ВОЛЬТАХ)

- 1) 500
- 2) 220

- 3) 1000
- 4) 380

У НЕДЫШАВШЕГО МЛАДЕНЦА КУПОЛ ДИАФРАГМЫ ОПУЩЕН ДО _____ МЕЖРЕБЕРЬЯ

- 1) IV
- 2) III
- 3) VI
- 4) II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕМУ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА, ПРИНИМАЕТСЯ

- 1) непосредственно руководителем ГСМЭУ
- 2) лаборантом
- 3) фельдшером
- 4) медицинским регистратором

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ПО ШКАЛЕ АПГАР ПРОВОДИТСЯ В _____ МИНУТУ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

- 1) 8
- 2) 9
- 3) 7
- 4) 1

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) рыхлой волокнистой соединительной ткани стромы
- 2) фибротических процессов, ведущих к недостаточности экзокринной паренхимы
- 3) кубического эпителия межациназных выводных протоков
- 4) однослойного плоского эпителия вставочных выводных протоков

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ СО СМЕЩЕНИЕМ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЛОМЫ

- 1) ключиц
- 2) плечевой кости

- 3) бедренной кости
- 4) костей таза

ПРЕОБЛАДАНИЕ ГЛУБИНЫ РАНЫ НАД ЕЁ ДЛИНОЙ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ У РАН

- 1) ушибленных
- 2) ушибленно-рваных
- 3) стриженных
- 4) колотых

СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее легкий вред здоровью
- 2) не причинившее вред здоровью
- 3) причинившее тяжкий вред здоровью
- 4) причинившее вред здоровью средней тяжести

ЗАЖИВЛЕНИЕ ОЖОГОВ 1 СТЕПЕНИ ПРОИСХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ (В ДНЯХ)

- 1) 12-14
- 2) 30-35
- 3) 8-9
- 4) 3-4

ОСТЫВАНИЕ ТРУПА ЗАМЕДЛЯЕТ

- 1) кахексия
- 2) одежда
- 3) острое отравление этанолом
- 4) кровопотеря

ПРИМЕНЕНИЕ СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ

- 1) солями тяжелых металлов
- 2) соединениями мышьяка
- 3) едкими ядами
- 4) алкалоидами

«КАДДИЛАКОМ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДНОЕ

- 1) амфетамина
- 2) кокаина
- 3) амитриптилина
- 4) эфедрина

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАНЕНИЙ ГРУДИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПРИЗНАКА

- 1) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа

- 2) Сабинского
- 3) Деменчака
- 4) Никифорова – Шавиньи

ВЫВИХ С₇ ПОЗВОНКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИЛЫ С ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ИЗЪЯТЬ

- 1) мягкие ткани, отделившиеся во время распила
- 2) мышцы с поверхности распила
- 3) костные опилки
- 4) фрагменты внутренних органов

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ ПРИ ПОЛОЖЕНИИ ТРУПА НА БОКУ ТЕРМОЩУП ВВОДЯТ В ОБЛАСТЬ 8 МЕЖРЕБЕРЬЯ ПО ____ ЛИНИИ

- 1) подключичной
- 2) передней подмышечной
- 3) околопозвоночной
- 4) средней подмышечной

СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ УСТАНОВЛИВАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАССТРОЙСТВА ЗДОРОВЬЯ СВЫШЕ ____ ДНЕЙ

- 1) 160
- 2) 200
- 3) 140
- 4) 120

В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛОСКИХ КОСТЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) дистанцию выстрела
- 2) позу пострадавшего в момент ранения
- 3) калибр пули
- 4) конкретный образец оружия

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННЫМ ПАРАПАРЕЗОМ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни

- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗВИТИЯ РАННИХ ТРУПНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ОБНАРУЖИВАЮТ

- 1) охлаждение
- 2) промерзание
- 3) сапонификацию
- 4) карбогенизацию

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ДЫРЧАТОГО ПЕРЕЛОМА ПРАВОЙ ТЕМЕННОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ПОТЕРЯ СЛУХА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) причинившее тяжкий
- 2) причинившее лёгкий
- 3) причинившее средней тяжести
- 4) не причинившее

НАИБОЛЕЕ ЯДОВИТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ РТУТЬ

- 1) одновалентная
- 2) двухвалентная
- 3) пятивалентная
- 4) трехвалентная

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ПАРАПЛЕГИЮ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ТУПАЯ ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДИ В ВИДЕ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ 8-12 ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ НА ЭТОМ УРОВНЕ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий

- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

ПРИ ДЕЙСТВИИ ТРАВМИРУЮЩЕЙ СИЛЫ ОБРАЗУЕТСЯ ПЕРЕЛОМ ОТ ДЕФОРМАЦИИ КРУЧЕНИЯ НА _____ КЛЮЧИЦЫ

- 1) грудинном конце
- 2) акромиальном конце
- 3) нижней поверхности
- 4) передней (наружной) поверхности

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ПРАВОГО ЛОКТЕВОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ОТКРЫТЫЙ ПЕРИЛУНАРНЫЙ ВЫВИХ КИСТИ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ССАДИНЫ МОЖНО СУДИТЬ О

- 1) скорости движения травмирующего предмета по поверхности тела
- 2) химическом составе материала травмирующего предмета
- 3) направлении движения травмирующего предмета
- 4) положении тела нападавшего относительно пострадавшего

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЙ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАРОТРАВМА

- 1) головного мозга
- 2) сердца
- 3) легких
- 4) почек

ВЫДАЧА ОДЕЖДЫ, СНЯТОЙ С ТРУПА, ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

- 1) согласованию со следственными органами
- 2) устному запросу родственников

- 3) устному запросу эксперта
- 4) направлению руководителя ГСМЭУ

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ, ВСЛЕДСТВИЕ РЕЗКО ВЫРАЖЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ (РЕЗКО СОГНУТОМ) ПОЛОЖЕНИИ, ВЛЕКУЩЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

СЛИЯНИЕ 1-2 СЕГМЕНТОВ ТЕЛА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ СИНОСТОЗИРОВАНИЯ, КАК ПРАВИЛО, НАБЛЮДАЕТСЯ В ЖЕНСКИХ ГРУДИНАХ ДО (В ГОДАХ)

- 1) 45
- 2) 5
- 3) 12
- 4) 21

ПРИЗНАКОМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) значительная стойкая утрата общей трудоспособности свыше 30%
- 2) потеря зрения, речи, какого-либо органа или утрата органом функции
- 3) прерывание беременности на сроке до 14 недель
- 4) отсутствие опасности для жизни

ПО ВЫРАЖЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТКАНЕЙ ВЫДЕЛЯЮТ КОЛИЧЕСТВО СТЕПЕНЕЙ ОЖОГОВ

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 5

ПЕРЕЛОМ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасный для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПРИ ЛИНЕЙНОМ ОДНООСНОМ СЖАТИИ ПЛОСКОЙ КОСТИ С КОМПРЕССИОННЫМ СДВИГОМ, ВНЕДРЕНИЕМ ОДНОЙ ЧАСТИ КОСТИ В ДРУГУЮ И РАСТРЕСКИВАНИЕМ ПЛАСТИНОК ПАРАЛЛЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИМ СИЛАМ ОБРАЗУЕТСЯ ПЕРЕЛОМ ПО ТИПУ

- 1) «зеленой веточки»
- 2) «валикообразного спучивания»
- 3) «бочкообразного вспучивания»
- 4) «желеобразного смятия»

ОТЛОЖЕНИЕ КОПОТИ ВОКРУГ РАНЫ И ПО ХОДУ РАНЕВОГО КАНАЛА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ВЫСТРЕЛА

- 1) с близкой дистанции
- 2) с плотным упором
- 3) через преграду
- 4) с неблизкой дистанции

ПРИ ОБЖИМЕ ТЕЛА В ГЕНЕЗЕ СМЕРТИ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ГИПЕРТЕНЗИЯ

- 1) внутричерепная
- 2) артериальная
- 3) капиллярная
- 4) внутриглазная

ПЕРЕЛОМ ДУГИ ОДНОГО ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

РАЗРЫВЫ СВЯЗОК ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ ФОРМИРУЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФОРМАЦИИ

- 1) растяжения
- 2) изгиба
- 3) кручения
- 4) сдвига

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОЖГОВОЙ ТРАВМЕ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ПРИВОДЯТ К РАЗВИТИЮ ОЖГОВОЙ

- 1) инфекции
- 2) интоксикации
- 3) токсемии
- 4) болезни

МЕСТО ВЫХОЖДЕНИЯ ПУЛИ, ОСКОЛКА ИЛИ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПРЕДМЕТА ИЗ ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕРСТИЕМ

- 1) слепым
- 2) пробивным
- 3) входным

4) выходным

МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДОМ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ОБРАЗОВАНИЕ ____ СТРУПА

- 1) охряно-желтого
- 2) угольно-черного
- 3) беловато-серого
- 4) буро-коричневого

СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ____ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ

- 1) общая
- 2) профессиональная
- 3) специальная
- 4) временная

ТРУПНАЯ ИМБИБИЦИЯ НАСТУПАЕТ СПУСТЯ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1) 18
- 2) 12
- 3) 24
- 4) 6

В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УКАЗЫВАТЬ

- 1) наличие встречного потока воздуха
- 2) температуру окружающего воздуха
- 3) глубину обнаруженных повреждений
- 4) группу крови

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ПОВРЕЖДЕНИЕ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ КРОВОПОТЕРЕЙ С РАЗВИТИЕМ ГЕМОРАГИЧЕСКОГО ШОКА 4 СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившее
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

К МОРФОЛОГИИ ПЕРЕЛОМОВЫВИХА ОТ УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТУПОГО ТВЕРДОГО ПРЕДМЕТА ПО ТЫЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

(ПЕРЕЛОМОВЫИХА МОНТЕДЖА) ОТНОСЯТ ПЕРЕЛОМ

- 1) диафиза лучевой кости в нижней трети с вывихом головки локтевой кости в лучезапястном суставе
- 2) диафиза на границе верхней и средней трети локтевой кости с разрывом кольцевидной связки и вывихом головки лучевой кости в локтевом суставе
- 3) лучевой кости
- 4) лучевой кости в типичном месте с вывихом ладьевидной кости

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ

- 1) гликогена печени
- 2) окиси углерода в моче
- 3) карбоксигемоглобина в крови
- 4) активности холинэстеразы

ОБЯЗАННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ РАЗЪЯСНЕНИЯ ЭКСПЕРТУ ЕГО ОБЯЗАННОСТЕЙ И ПРАВ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА ЧАСТЬЮ

- 1) 2 статьи 199 УПК РФ
- 2) 2 статьи 80 «Содержание определения суда о назначении экспертизы» ГПК РФ
- 3) 2 статьи 26.4. «Экспертиза» КоАП РФ
- 4) 1 статьи 14 «Обязанности руководителя ГСЭД» ФЗ «О ГСЭД в РФ»

СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЖИДКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В УСЛОВИЯ ПОНИЖЕННОГО БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ И ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ _____ БОЛЕЗНИ

- 1) лучевой
- 2) Меньера
- 3) кессонной
- 4) горной

В КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ОЖГОВОЙ БОЛЕЗНИ РАЗЛИЧАЮТ _____ ПЕРИОДА/ПЕРИОДОВ

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 3

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПНЕВМОТОРАКС КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

К УПЛОЩЕНИЮ И ДЕФОРМАЦИИ ПОЧЕК ВСЛЕДСТВИЕ РАЗРАСТАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ

- 1) тубулоинтерстициальный нефрит
- 2) нефросклероз
- 3) гломерулонефрит
- 4) пиелонефрит

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ЛЁГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РВАНО-УШИБЕННОЙ РАНЫ НА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) опасность для жизни

ПЕРВИЧНЫЕ ВНУТРИСТВОЛОВЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) размытыми границами
- 2) беспорядочным расположением
- 3) полиморфностью
- 4) четкими границами

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОГО ШОКА МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) холодовая аллергия с локализацией высыпаний на коже лица и рук
- 2) механическая травма с нарушением целостности магистральных сосудов
- 3) пищевая аллергия с повышенной чувствительностью организма к цитрусовым
- 4) полиноз с аллергической реакцией на пыльцу растений в виде конъюнктивита

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОЖЕ В ВИДЕ ПЕНИСТЫХ БЕЛКОВЫХ СТРУКТУР В ДЕРМЕ, ПРОТОКАХ ЖЕЛЕЗ И В КАНАЛЬЦАХ ЯИЧЕК ПРИ ДЕЙСТВИИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ СПЕЦИФИЧНЫМ ДЛЯ

- 1) переохлаждения
- 2) оледенения
- 3) отморожения
- 4) озноба

ФОРМОЙ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯМИ МЫШЬЯКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) геморрагическая
- 2) легочная

- 3) паралитическая
- 4) почечная

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ-ВЫВИХ МОНТЕДЖА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинивший
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ПЕРВИЧНОЕ ТРАВМИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ В ОБЛАСТИ ВХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ В УПОР ОКАЗЫВАЕТ

- 1) дульный конец оружия
- 2) пыж-контейнер
- 3) огнестрельный снаряд
- 4) предпулевой воздух

В СРОКИ ОТ 7 ДО 18 МЕСЯЦЕВ РУБЕЦ СТАНОВИТСЯ

- 1) красно-фиолетовым
- 2) коричневым
- 3) бледно-розовым
- 4) темно-красным

ПОСМЕРТНОЙ КОНТРАКТУРОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фростация
- 2) мышечное окоченение
- 3) карбогенизация
- 4) мумификация

О МАТЕРИАЛАХ ВЫПОЛНЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, НЕ ВОСТРЕБОВАННОЙ ОРГАНом ИЛИ ЛИЦом, НАЗНАЧИВШИМ ЭКСПЕРТИЗУ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГСМЭУ ПИСЬМЕННО ИЗВЕЩАЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА, СОТРУДНИК КОТОРОГО ЕЕ НАЗНАЧИЛ ПО ИСТЕЧЕНИЮ ____ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ИМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ

- 1) 5
- 2) 10

3) 14

4) 3

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

2) вред здоровью средней степени тяжести

3) тяжкий вред здоровью

4) легкий вред здоровью

В СЛУЧАЕ УТОПЛЕНИЯ МЕЛКОПУЗЫРЧАТАЯ ПЕНА ВОКРУГ ОТВЕРСТИЙ РТА И НОСА ТРУПА СОХРАНЯЕТСЯ ОБЫЧНО НА ПРОТЯЖЕНИИ (В СУТКАХ)

1) 4-5

2) 6-7

3) 8-10

4) 2-3

ПЕРЕЛОМ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

1) стойкой утраты общей трудоспособности

2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

3) угрожающее жизни состояние

4) опасный для жизни

ТЕХНИКУ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ ПРОВОДЯТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ____ ТРУПА

1) положения

2) позы

3) пола

4) возраста

ОБНАРУЖЕНИЕ КОКАИНА В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПОСРЕДСТВОМ

1) фотометрии

2) тонкослойной хроматографии

3) рентгенфлюоресценции

4) метода цветных отпечатков

ОСОБЕННОСТЬЮ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА «С» ЯВЛЯЕТСЯ

1) отсутствие РНК вируса в сыворотке крови

2) тяжелое течение

3) латентное течение

4) обязательное наличие желтухи

ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ ИЛИ С УГРОЗОЙ ЕГО

ПРИМЕНЕНИЯ К ПОТЕРПЕВШЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) понуждением к действиям сексуального характера
- 2) развратными действиями
- 3) насильственными действиями сексуального характера
- 4) изнасилованием

ПУТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вихрем
- 2) шагом
- 3) кругом
- 4) петлей

ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) фотоиллюстрации
- 2) биоманекены животного
- 3) аудиозаписи
- 4) биоманекены человека

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

К МЕДИЦИНСКИМ КРИТЕРИЯМ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ В ОТНОШЕНИИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ОТНОСЯТ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) заболевание токсикоманией

К КОМПРЕССИОННОЙ ОТНОСЯТ АСФИКСИЮ ОТ СДАВЛЕНИЯ

- 1) шеи
- 2) живота
- 3) таза
- 4) головы

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающий жизни
- 2) легкий
- 3) тяжкий

4) средней тяжести

РАНУ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПРОСВЕТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА БЫВШИХ РОДОВ, СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ НИХ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ПО СОСТОЯНИЮ РОДОВЫХ ПУТЕЙ У ПОВТОРНОРОДЯЩИХ ВОЗМОЖНО В ПРЕДЕЛАХ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1) 7-8
- 2) 9-10
- 3) 5-6
- 4) 3-4

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОМ СИМПТОМОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЮЩЕГОСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИВОДИТ К

- 1) аггравации
- 2) дезаггравации
- 3) симуляции
- 4) диссимуляции

ПЕТЛЮ, ПРИЛЕЖАЩУЮ К ОДНОЙ, ДВУМ ИЛИ ТРЕМ СМЕЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ШЕИ, ОТНОСЯТ К

- 1) неподвижной
- 2) закрытой
- 3) открытой
- 4) скользящей

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА У ЖИВЫХ ЛИЦ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЕ ____ ИССЛЕДОВАНИЙ

- 1) рентгенологических
- 2) ультразвуковых
- 3) эндоскопических
- 4) функциональных

ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) слюна
- 2) кровь
- 3) слезная жидкость
- 4) фекалии

ПРИМЕНЕНИЕ ЭМИССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ

- 1) щелочами
- 2) алкалоидами
- 3) кислотами
- 4) грибами

К НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ПРОДУКТАМ РАСПАДА ЭТАНОЛА ОТНОСЯТ

- 1) ацетальдегид
- 2) формальдегид
- 3) уксусную кислоту
- 4) щавелевую кислоту

В СОСТАВ ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ ВХОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) вольфрам
- 2) медь
- 3) оксид углерода
- 4) цинк

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ГИПОТРОФИЮ МЫШЦ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

ОБУГЛИВАНИЕ ТКАНЕЙ ОБНАРУЖИВАЮТ ПРИ _____ СТЕПЕНИ ОЖОГОВ

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 1

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ КУСОЧКИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ВЫРЕЗАЮТ ТОЛЩИНОЙ (В СМ)

- 1) 1,5-2

- 2) 0,5-1
- 3) 3,5-4
- 4) 2,5-3

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМИССИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКСПЕРТАМИ ОДНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ В

- 1) полном объеме в рамках поставленного задания
- 2) рамках одного вопроса
- 3) частичном объеме в рамках задания
- 4) пределах только своей компетенции

КОЖНЫЙ ПОКРОВ ТРУПА В ПРОЦЕССЕ ТОРФЯНОГО ДУБЛЕНИЯ ПРИОБРЕТАЕТ ВЫРАЖЕННЫЙ ____ ОТТЕНОК

- 1) коричневый
- 2) желтоватый
- 3) серо-синюшный
- 4) вишневый

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ЛЁГКИЕ РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ РЕФЛЕКСОВ И ДВИЖЕНИЙ В НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) средней тяжести

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БРЫЖЕЙКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТУПЫМ ТВЁРДЫМ ПРЕДМЕТОМ ХАРАКТЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ РАН

- 1) колотых
- 2) резаных
- 3) ушибленных
- 4) рубленых

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА, ПРОНИКАЮЩЕЙ В КЛЕТЧАТКУ МАЛОГО ТАЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИВОГО ЛИЦА НАЧИНАЕТСЯ С ОПРОСА О

- 1) жалобах на состояние здоровья на момент обследования
- 2) бездействии врачей
- 3) действиях следователя
- 4) состоянии здоровья родственников

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПОЧКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

УРЕМИЧЕСКУЮ КОМУ II-III СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ТРУПНОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ СОХРАНЯЕТСЯ ПОЧТИ (В СУТКАХ)

- 1) 7
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 5

МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ КАРДИОСКЛЕРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) очаговая
- 2) заместительная
- 3) постинфарктная
- 4) атеросклеротическая

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ВСЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАНЫ С ПОМОЩЬЮ _____ ФОТОСЪЕМКИ

- 1) ориентирующей
- 2) линейной панорамной
- 3) обзорной
- 4) узловой

РВОТНЫЕ МАССЫ МОГУТ ОКРАШИВАТЬСЯ В ЗЕЛЕНОВАТЫЙ ИЛИ СИНЕ-

ЗЕЛЕНОВАТЫЙ ЦВЕТ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) ртутью
- 2) медьсодержащими ядохимикатами
- 3) дихлорэтаном
- 4) фосфорорганическими соединениями

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ЭЛЕКТРООЖОГИ СОПРОВОЖДАЮТСЯ _____ НЕКРОЗОМ

- 1) восковидным
- 2) колликвационным
- 3) электрогенным
- 4) трофоневротическим

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ПРЯМОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ВСКРЫТИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА С РАЗРЕЗАМИ ВО ФРОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ СО СТОРОНЫ ЕГО ОСНОВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ СПОСОБОМ

- 1) Науменко
- 2) Фишера
- 3) Вирхова
- 4) Флексига

К РУБЛЕНЫМ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ РАНЫ, ПРИЧИНЕННЫЕ

- 1) обухом топора
- 2) лезвием сабли
- 3) черенком лопаты
- 4) рукояткой палаша

СТРОГО ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ТОЧКИ НА ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ ПОЗВОЛЯЕТ СУДИТЬ ОБ ОБЩИХ И ПАРЦИАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ТЕЛА, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) морфологическими
- 2) соматическими

- 3) антропометрическими
- 4) морфометрическими

К ВАСКУЛИТАМ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АОРТЫ И ЕЕ КРУПНЫХ ВЕТВЕЙ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) височный артериит
- 2) узелковый периартериит
- 3) облитерирующий тромбангит
- 4) аллергический грануломатоз

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ГНИЛОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОТМЕЧАЮТ

- 1) наличие аутолиза
- 2) цвет трупных пятен
- 3) степень выраженности трупной зелени
- 4) степень развития трупного окоченения

ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ СО СТОРОНЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1) спазм аккомодации
- 2) снижение сухожильных рефлексов
- 3) горизонтальный нистагм
- 4) резкая заторможенность

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В ВЫПРЯМЛЕННОМ ЕГО ПОЛОЖЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ И ВЫЗВАВШЕЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА И ГРУДИ III-IV СТЕПЕНИ, СОСТАВИВШЕГО 14,5% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья

4) кратковременное расстройство здоровья

СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ АСФИКСИЕЙ ОТ СДАВЛЕНИЯ ШЕИ ПЕТЛЁЙ, ЗАТЯГИВАЕМОЙ ВЕСОМ ТЕЛА ПОГИБШЕГО, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) удушение
- 2) повешение
- 3) обтурация
- 4) сдавление

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ СФОРМИРОВАННАЯ КУЛЬТА СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 10%, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ НЕКРОЗЕ РАЗРЫВОМ ЦИТОПЛАЗМЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) плазмолизис
- 2) плазморексис
- 3) кариорексис
- 4) кариолизис

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) некрозы жировых клеток
- 2) некрозы мышечных волокон
- 3) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 4) металлизацию эпидермиса с гнездным расположением частиц металла на поверхности

СМЕРТЕЛЬНОЙ ДОЗОЙ СТОЛОВОГО УКСУСА ЯВЛЯЕТСЯ ДОЗА, СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРИМЕРНО (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 20
- 2) 10
- 3) 200
- 4) 50

ПРИ РЕКТАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, РАВНОЙ 38,2 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ, ДАВНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОРИЕНТИРОВОЧНО МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В ЧАСАХ) (ПО В.В. БИЛКУНУ, 1985)

- 1) 18
- 2) 10
- 3) 16
- 4) 24

ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВЫДЕЛЯЮТ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) нисходящий
- 2) очаговый
- 3) склерозирующий
- 4) восходящий

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИВОГО ЛИЦА НАЧИНАЕТСЯ С

- 1) формулировки экспертных выводов
- 2) описания повреждения
- 3) опроса живого лица
- 4) оформления исследовательской части

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ ФАЗ ТЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ФАЗА

- 1) геморрагического шока
- 2) острой плазмопотери
- 3) токсемии
- 4) септикотоксемии

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 41-42°C ЭРИТРОЦИТЫ ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) частичному сладжу
- 2) частичному гемолизу
- 3) частичной гидратации
- 4) частичному стазу

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ОТ 12.05.2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОСНОВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИАТОМОВЫЙ ПЛАНКТОН (АЛЬГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТОПЛЕНИЯ В ВОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) яичник, щитовидная железа, лимфатический узел
- 2) моча, матка, влагалище
- 3) печень, надпочечник, желудок

4) почка в капсуле, жидкость из пазухи основной кости, плечевая или бедренная кость с костным мозгом

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ В ГСМЭУ ПОСТАНОВЛЕНИЯХ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НИМ ОБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛАХ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В ____ ГСМЭУ

- 1) журнале
- 2) блокноте
- 3) тетради
- 4) записной книжке

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ, РАВНОЕ 5% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) не причинившее вред здоровью
- 3) причинившее тяжкий вред здоровью
- 4) причинившее легкий вред здоровью

К ПОТЕРЕ СЛУХА ОТНОСИТСЯ НЕОБРАТИМОЕ СОСТОЯНИЕ НЕСПОСОБНОСТИ СЛЫШАТЬ РАЗГОВОРНУЮ РЕЧЬ НА РАССТОЯНИИ ____ СМ ОТ УШНОЙ РАКОВИНЫ

- 1) 7-9
- 2) 10-15
- 3) 1-2
- 4) 3-5

КРОВОИЗЛИЯНИЯ ПОД КАПСУЛУ И НОЖКУ ГИПОФИЗА ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРИЖИЗНЕННОСТИ ПРИ

- 1) утоплении
- 2) отравлении
- 3) сжигании
- 4) повешении

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние

- 2) опасное для жизни
- 3) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЖИРОВОГО ОБМЕНА, И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ МЫШЕЧНОЭЛАСТИЧЕСКОГО ТИПА В ВИДЕ ОЧАГОВОГО ОТЛОЖЕНИЯ В ИНТИМЕ БЕЛКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) атеросклероз
- 2) некроз
- 3) инфаркт
- 4) инсульт

ДЛЯ УНИФИКАЦИИ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗАБОР ТРУПНОЙ КРОВИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ПРОИЗВОДИТЬ ИЗ

- 1) сонной артерии
- 2) полостей трупа
- 3) бедренной вены
- 4) локтевой вены

К ДОКУМЕНТАМ, СБРОШЮРОВАННЫМ В ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ТОМОВ, СОДЕРЖАЩИМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ЧЕТКО ПОСТАВЛЕННЫМИ ВОПРОСАМИ, ОТНОСЯТ

- 1) протокол осмотра места происшествия
- 2) материалы дела
- 3) судебно-медицинскую экспертизу трупа
- 4) судебно-медицинское исследование трупа

НАЧАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРУПНОГО ОКОЧЕНЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЗАМЕТНЫМИ СПУСТЯ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1) 1-2
- 2) 4-5
- 3) 2-3
- 4) 6-7

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья

- 2) длительность расстройства здоровья менее 21 дня
- 3) отсутствие опасности для жизни
- 4) прерывание беременности

ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ О ПРИЖИЗНЕННОМ ПОЛУЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ВЫЯВЛЕНИЕ В РАНЕ

- 1) железа
- 2) гликогена
- 3) фибриногена
- 4) карбоксигемоглобина

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРБИТУРАТОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) рентгенфлюоресценции
- 2) метода цветных отпечатков
- 3) эмиссионного спектрального анализа
- 4) УФ-ВИД-спектрофотометрии

ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ

- 1) описания
- 2) моделирования
- 3) дедукции
- 4) индукции

К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОТНОСЯТ

- 1) татуировки
- 2) половую принадлежность
- 3) возраст
- 4) рост

СТАДИЯ ИМБИБИЦИИ В ДИНАМИКЕ ТРУПНОГО ПЯТНА ОБЫЧНО ФОРМИРУЕТСЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ _____ ЧАСОВ

- 1) 18-20
- 2) 8-10
- 3) 24-30
- 4) 12-18

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) однослойного плоского эпителия вставочных выводных протоков
- 2) кубического эпителия межацинарных выводных протоков
- 3) рыхлой волокнистой соединительной ткани стромы
- 4) опухолевых процессов, ведущих к недостаточности эндокринной паренхимы

О ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО КОМПЛЕКСА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1) бронхогенная генерализация
- 2) гематогенная и лимфогенная генерализация
- 3) наличие метастазов в легких
- 4) наличие очага Гона

«ХЛЫСТООБРАЗНЫЙ» МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛОМА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ВОЗНИКАЕТ ОТ

- 1) компрессии по оси шейного отдела позвоночника при его гиперфлексии или гиперэкстензии
- 2) кручения в шейном отделе позвоночника
- 3) чрезмерной ротации на уровне первого шейного позвонка
- 4) компрессии зубовидного отростка аксиса

ОТСУТСТВИЕМ ПОДВИЖНЫХ СПЕРМАТОЗОИДОВ В ЭЯКУЛЯТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) астеноспермия
- 2) олигоспермия
- 3) некроспермия
- 4) аспермия

ТРАВМА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ПАССАЖИРА ИЗ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 9
- 4) 7

ВЫВИХ I-II ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ БРАНШЕЙ НОЖНИЦ В ТЕМЕННУЮ ОБЛАСТЬ СЛЕВА ФОРМИРУЕТСЯ ПЕРЕЛОМ

- 1) паутинообразный
- 2) оскольчато-фрагментарный
- 3) террасовидный
- 4) дырчатый

В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ

- 1) количественный показатель токсического вещества

- 2) групповую принадлежность крови
- 3) одежду на трупе
- 4) степень алкогольного опьянения

РАССТОЯНИЕМ ОТ ПЕРЕНОСИЦЫ ДО НАРУЖНОГО ЗАТЫЛОЧНОГО БУГРА ЯВЛЯЕТСЯ _____ РАЗМЕР

- 1) большой косой
- 2) прямой
- 3) поперечный
- 4) малый косой

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) о результатах лабораторных исследований
- 2) об обстоятельствах дела
- 3) о выводах эксперта
- 4) об израсходованных в процессе производства экспертизы объектах с указанием их наименования

СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАВИСИТ ОТ

- 1) пола погибшего
- 2) материала петли
- 3) возраста погибшего
- 4) конструкции петли

СОКРЫТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) аггравацией
- 2) диссимуляцией
- 3) дезаггравацией
- 4) симуляцией

ОДИНОЧНОЕ СЛЕПОЕ КОЛОТО-РЕЗАНОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ЛЕВУЮ ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКОГО, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившее
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ОТЕК И НАБУХАНИЕ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПОЛНОКРОВИЕМ МЯГКИХ МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК БЕЗ ИХ ОТЕКА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О _____ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

- 1) субкортикальной артериосклеротической
- 2) токсической

- 3) гипертонической дисциркуляторной
- 4) гипертонической мультиинфарктной

ЗРАЧКОВАЯ РЕАКЦИЯ НА ВВЕДЕНИЕ ВЕГЕТОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПОСЛЕ ____ ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1) 16
- 2) 20
- 3) 12
- 4) 24

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ ФАЛЛОПИЕВОЙ ТРУБЫ, ПОЛУЧЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЫ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

МЫШЕЧНЫЙ СЛОЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ

- 1) атрофируется
- 2) гипотрофируется
- 3) гипертрофируется
- 4) остается неизменным

ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА АМИЛОВЫХ СПИРТОВ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 10-15
- 2) 20-30
- 3) 50-100
- 4) 100-150

ПРИ СМЕРТИ ОТ ЗАКРЫТИЯ РТА И НОСА МЯГКИМИ ПРЕДМЕТАМИ ОБРАЗУЮТСЯ

- 1) не прямые переломы подъязычной кости
- 2) прямые переломы подъязычной кости
- 3) кровоизлияния в слизистую оболочку губ
- 4) кровоизлияния в интиму сонных артерий

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ БРОНХОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК

ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

УМЫШЛЕННОЕ ПРОВОЦИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИЛИ УСУГУБЛЕНИЯ

ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПУТЕМ ГОЛОДАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК

- 1) искусственное
- 2) притворное
- 3) психическое
- 4) неврологическое

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ВСПЕНЕННОЙ КРОВИ В ПЕЧЕНИ ПРИ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ПРОВОДИТСЯ ПРОБА

- 1) Пирогова
- 2) Бокариуса
- 3) Рихтера – Сунцова
- 4) Григорьевой

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ТРЕЩИНА СКУЛОВОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ЛЕГКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) кратковременное расстройство здоровья продолжительностью до трех недель (до 21 дня включительно)
- 4) длительное расстройство здоровья продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня)

ПРИ ВСКРЫТИИ, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДОМ, ОТ СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДКА ОЩУЩАЕТСЯ ЗАПАХ

- 1) прелых яблок
- 2) формалина
- 3) сушеных грибов
- 4) чеснока

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) об обстоятельствах дела
- 2) о выводах эксперта
- 3) об уничтоженных в процессе производства экспертизы объектах с указанием их наименования
- 4) о результатах лабораторных исследований

К ОБТУРАЦИОННОЙ ОТНОСЯТ АСФИКСИЮ ОТ

- 1) удушения неподвижной жёсткой петлёй
- 2) удушения невооружёнными руками
- 3) медленного сдавления груди и живота
- 4) закрытия отверстий дыхательных путей

ПО ОКОНЧАНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ГНИЕНИЮ, ХРАНЯТ В МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕРАХ ПРИ -18 °С В ТЕЧЕНИЕ _____, ЕСЛИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ИНЫЕ СРОКИ

- 1) 1 года
- 2) 2 лет
- 3) 3 лет
- 4) 4 лет

ПРЕУМЕНЬШЕНИЕ ПАЦИЕНТОМ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ИМЕЮЩЕГОСЯ БОЛЕЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дезагgravацией
- 2) агgravацией
- 3) симуляцией
- 4) диссимуляцией

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЛОМА МАЛЫША ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ДОСТАВЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) материалы дел об административных правонарушениях
- 2) специальную экспертную литературу

- 3) нормативно-правовые документы
- 4) подзаконные акты

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ОРИЕНТИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ В ОТНОШЕНИИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) след от инъекции
- 2) односторонний мидриаз
- 3) подкожная эмфизема груди
- 4) «голова медузы» на передней стенке живота

ВИДОМ ТРАВМИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рассечение
- 2) удар
- 3) раздвигание
- 4) расслаивание

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ ФАЗ ТЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ____ ФАЗА

- 1) септикотоксемии
- 2) острой плазмопотери
- 3) эректильная
- 4) токсемии

СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ МЕТГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ НЕ МЕНЕЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 5
- 2) 15
- 3) 10
- 4) 50

МЕТАЛЛИЗАЦИЮ КРАЕВ РАНЫ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ

- 1) фрактографическим методом
- 2) биохимическим методом
- 3) альгологическим исследованием
- 4) эмиссионно спектральным анализом

ЭЛЕКТРООЖОГИ ПО ГЛУБИНЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТЕРМИЧЕСКИМ ОЖОГАМ ____ СТЕПЕНИ

- 1) 1
- 2) 3б
- 3) 3а
- 4) 2

ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ПОЧЕК С РАЗВИТИЕМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

О ПРИЖИЗНЕННОМ СДАВЛЕНИИ ШЕИ ПЕТЛЁЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

- 1) множественные переломы подъязычной кости
- 2) множественные переломы хрящей гортани
- 3) кровоизлияния в области дна борозды
- 4) участки уплощения и истончения эпидермиса

КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР ЭКСПЕРТИЗЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1) орган или лицо, назначившее экспертизу
- 2) эксперт самостоятельно
- 3) комиссия экспертов
- 4) руководитель ГСМЭУ

МАЗКИ И ОТПЕЧАТКИ ОРГАНОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ (ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ) ИССЛЕДОВАНИЙ ФИКСИРУЮТ

- 1) формалином
- 2) этиловым спиртом 96%
- 3) глицерином
- 4) ацетоном

ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПА ПО МЕТОДУ КИАРИ – МАРЕША ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ

- 1) извлекаются и исследуются в пяти топографических комплексах
- 2) исследуются без отделения от органокомплекса
- 3) извлекаются и исследуются отдельно
- 4) вскрываются и исследуются на месте, без извлечения из трупа

ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1) нефротическую
- 2) восстановления диуреза
- 3) протеинемическую
- 4) азотемическую

ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ РЕЗОРБТИВНОГО ЯДА В ОРГАНИЗМЕ ОБУСЛОВЛЕН ФОРМИРОВАНИЕМ ОБРАТИМОЙ СВЯЗИ ЯДА С

- 1) микроэлементами
- 2) витаминами
- 3) углеводами
- 4) белками

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ДЛЯ «МОЗГОВОЙ» СМЕРТИ ЗНАЧИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) тромбоза сосудов
- 2) повреждений эндотелия сосудов
- 3) высокого содержания фибрина в экссудате
- 4) деструктивных процессов с разрушением важных отделов

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРИОД ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВЫЕ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1) 120
- 2) 48
- 3) 24
- 4) 72

ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЗНАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ШКАЛУ

- 1) Филатова
- 2) Федорова
- 3) Глазго
- 4) Монро

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШИЕ ДЕФОРМАЦИЮ ФАЛАНГИ И РАВНЫЕ 5% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЯ

- 1) причинившие тяжкий вред здоровью
- 2) причинившие легкий вред здоровью
- 3) не причинившие вред здоровью
- 4) причинившие вред здоровью средней тяжести

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) волосы
- 2) плевральный экссудат
- 3) ткани из места инъекции
- 4) пищевод

К НАРКОТИКАМ ОПИЙНОЙ ГРУППЫ ОТНОСЯТ

- 1) налоксон
- 2) опий
- 3) клозапин
- 4) первитин

ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 18-20 ЧАСОВ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В МИНУТАХ) (ПО В.В.ЖАРОВУ, Ю.Л. МЕЛЬНИКОВУ, 1978)

- 1) 15-18
- 2) 30-40
- 3) 1-2
- 4) 50-60

К ОТДАЧЕ ТЕПЛА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПУТЕМ ПЕРЕХОДА ЕГО К СОПРИКАСАЮЩИМСЯ С ТЕЛОМ ПРЕДМЕТАМ ОТНОСЯТ СПОСОБ

- 1) радиационный
- 2) кондукционный
- 3) конвекционный
- 4) испарения

К НИБОЛЕЕ РАННИМ РЕАКЦИЯМ В ОТВЕТ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) продуктивные
- 2) альтеративные
- 3) репаративные
- 4) экссудативные

К ПРИЗНАКАМ БЫСТРО НАСТУПИВШЕЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

- 1) полнокровие внутренних органов
- 2) очаговые бледные трупные пятна
- 3) малокровие внутренних органов
- 4) светло-красные трупные пятна

В ТЕЧЕНИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ НА ФАЗЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ _____ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

- 1) хрящевая
- 2) грануляционная
- 3) рубцовая
- 4) волокнистая

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БОЛЬШОГО САЛЬНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью

4) легкий вред здоровью

МАССА ПЕЧЕНИ ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)

1) 600

2) 380

3) 150

4) 540

К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ЭМФИЗЕМУ

1) генерализованную

2) панлобулярную

3) буллезную

4) подкожную

РОД СМЕРТИ УСТАНОВЛИВАЕТ

1) комиссия судебно-медицинских экспертов

2) судебный эксперт

3) следователь

4) судебно-медицинский эксперт

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

1) опасное для жизни

2) угрожающее жизни состояние

3) стойкой утраты общей трудоспособности

4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

ЗДОРОВЫЕ НОВОРОЖДЕННЫЕ МЛАДЕНЦЫ ПО ШКАЛЕ АПГАР ИМЕЮТ ОЦЕНКУ _____ БАЛЛОВ

1) 10-7

2) 3-2

3) 5-4

4) 16-15

ОБЪЕМ, СПОСОБЫ, ПРИЕМЫ, МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПА ОПРЕДЕЛЯЕТ

1) врач – судебно-медицинский эксперт

2) следователь

3) руководитель ГСЭУ

4) судья

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) запрос адвоката
- 2) распоряжение руководителя управления здравоохранением
- 3) направление правоохранительных органов
- 4) заявление свидетеля происшествия

ИЗМЕНЕНИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ НА ОРГАНИЗМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ДЕЙСТВИЕ

- 1) механическое
- 2) тепловое
- 3) химическое
- 4) ударное

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ II СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) образованием пузырей с серозным содержимым
- 2) быстропроходящим покраснением и отеком кожи
- 3) некрозом дермы
- 4) некрозом эпидермиса

К ПРИЗНАКАМ МУЖСКОГО ПОЛА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА ОТНОСЯТ

- 1) большую седалищную вырезку в виде острого угла
- 2) горизонтальное положение крыльев подвздошных костей
- 3) остроугольную большую седалищную вырезку
- 4) треугольное запирающее отверстие

ПРИ ГЕМОРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ ОБРАЗУЕТСЯ ОЧАГ ____ РАЗМЯГЧЕНИЯ МОЗГА

- 1) красного
- 2) серого
- 3) ржавого
- 4) глиняного

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЖИЗНЕННОГО (ПОСМЕРТНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ РАН ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТКАНИ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ В ЛАБОРАТОРИЮ

- 1) химическую
- 2) физико-техническую
- 3) гистологическую
- 4) спектральную

ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ В УПОР ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) ионизирующим
- 2) литическим
- 3) резорбтивным
- 4) химическим

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К

- 1) кислородному голоданию
- 2) «закипанию» жидкостных сред организма
- 3) отравлению кислородом
- 4) отравлению углекислым газом

К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ, ВЕДУЩЕМУ К ДИФфуЗНОМУ УПЛОТНЕНИЮ СОСУДОВ В СВЯЗИ С ИЗБЫТОЧНЫМ РАЗРАСТАНИЕМ ЗРЕЛОЙ ПЛОТНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТ

- 1) регенерация
- 2) некроз
- 3) склероз
- 4) инфаркт

НАРУШЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАННОЕ ТРАВМОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающим жизни
- 2) утратой трудоспособности
- 3) расстройством здоровья
- 4) повреждением

ЛИЧИНКА ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ПЕРЕХОДИТ В ТРЕТЬЮ СТАДИЮ ЧЕРЕЗ (В СУТКАХ)

- 1) 10-12
- 2) 1-2
- 3) 4-6
- 4) 2-3

ФОРМИРОВАНИЕ НА КОЖЕ ПУЗЫРЕЙ С РАЗВИТИЕМ НЕКРОЗА МЯГКИХ ТКАНЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О _____ СТЕПЕНИ ОЖОГА

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 1

ПОД СПОСОБНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА К НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ТРУДУ, ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОСТЕЙШИХ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ И САМООБСЛУЖИВАНИЮ ПОНИМАЮТ _____ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ

- 1) временную
- 2) профессиональную
- 3) общую
- 4) специальную

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ РЕФЛЕКСОВ БЕЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, АТРОФИИ, ПАРЕЗОВ, КОНТРАКТУР, ВЫЗВАВШЕЕ

СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающий жизни
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) тяжкий

К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ МИОКАРДИТА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ТИП

- 1) трансмуральный
- 2) дегенеративный
- 3) воспалительно-инфильтративный
- 4) крупноочаговый

МЕСТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТКАНЕЙ БОЛЕЕ 50°C ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- 1) ожога 1 степени
- 2) коагуляционного некроза
- 3) ожоговой гиперемии
- 4) коликвационного поражения тканей

ПЕРИОД ВСАСЫВАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ДИФфуЗНОГО РАВНОВЕСИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФАЗОЙ

- 1) депонирования в тканях
- 2) окисления
- 3) резорбции
- 4) выведения в неизмененном виде

КОЛОТО-РЕЗАНУЮ РАНУ БОКОВОЙ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПОЛОСТЬ МАЛОГО ТАЗА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОСТНОГО ВОЗРАСТА У ДЕТЕЙ УЧИТЫВАЮТ

- 1) наличие апиостозов на костях кисти
- 2) появление ядер окостенения
- 3) форму суставной поверхности фаланг кисти
- 4) форму основания концевых фаланг

ПРИ ТРЕНИИ ТРАВМИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАПРАВЛЕНО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- 1) центростремительно
- 2) тангенциально
- 3) центробежно без ускорения

4) центробежно с ускорением

ИСХОДОМ ЗАЖИВЛЕНИЯ КРОВОПОДТЁКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рубец на коже
- 2) участок депигментации на коже
- 3) неизменённая кожа
- 4) участок гиперпигментации на коже

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ, МАТЕРИАЛЫ КОТОРОЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ СРЕДСТВАМИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГСМЭУ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРУЕТ ОБ ЭТОМ

- 1) страхового агента
- 2) лаборанта
- 3) врача
- 4) орган или лицо, назначившее экспертизу

ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЁГКОЙ СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ОБЩЕЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЕ ОБЛУЧЕНИЯ (В ГРЕЯХ)

- 1) 7-8
- 2) 3-4
- 3) 1-2
- 4) 5-6

ПОТЕРЯ СЛУХА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившая
- 4) средней тяжести

К ТРЕТЬЕМУ ПЕРИОДУ ОЖГОВОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- 1) истощение
- 2) токсемию
- 3) ожоговую инфекцию
- 4) шок

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗРЫВА ПРАВОГО КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ И ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА С НАРУШЕНИЕМ НЕПРЕРЫВНОСТИ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА В ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ОТДЕЛАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) развитие угрожающего жизни состояния
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ОБ ОБЩЕМ СОТРЯСЕНИИ ТЕЛА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

- 1) множественные ушибленные раны на коже
- 2) компрессионные переломы грудных позвонков
- 3) переломы диафизов обеих бедренных костей
- 4) кровоизлияния в корни лёгких

ПРИ НАРУЖНОМ ОСМОТРЕ ТРУПА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ТОКСИКОМАНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА

- 1) цвет трупных пятен
- 2) позу трупа
- 3) положение трупа
- 4) степень развития трупного окоченения

К АНТРОПОСКОПИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ОТНОСЯТ

- 1) рост
- 2) степень выраженности вторичных половых признаков
- 3) размеры головы
- 4) дистрофические изменения костной ткани

МЕЛКИЕ ОКРУГЛЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В ВЕРХУШКАХ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЮТСЯ ПЯТНАМИ

- 1) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа
- 2) Тардые
- 3) Вишневского
- 4) Минакова

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЮТ _____ БУМАГУ

- 1) пергаментную
- 2) цветную
- 3) сантиметровую
- 4) миллиметровую

ЛАТЕНТНЫМ ПЕРИОДОМ В РАЗВИТИИ ОБЩЕГО ПЕРЕГРЕВАНИЯ ОРГАНИЗМА СЧИТАЮТ ПЕРИОД

- 1) истощения
- 2) адинамии
- 3) возбуждения
- 4) безразличия

ВСКРЫТИЕ СПИННОМОЗГОВОГО КАНАЛА С ОДНИМ РАСПИЛОМ ПО КРАЮ ДУЖЕК ПОЗВОНКОВ ПРОВОДИТСЯ ПО МЕТОДУ

- 1) Флексига
- 2) Вирхова
- 3) Обысова

4) Солохина

К ВОЗМОЖНОСТИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ НЕХИРУРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОТНОСЯТ

- 1) неизгладимость
- 2) изгладимость
- 3) аномалию развития
- 4) обезображение

ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С ПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) лёгкий

К ДЕСТРУКТИВНЫМ ЯДАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) формальдегид
- 2) пероксид водорода
- 3) ртуть и ее соединения
- 4) перманганат калия

ПУСКОВОЙ ПРИЧИНОЙ ЭЛЕКТРОШОКА ЯВЛЯЕТСЯ ____ ФАКТОР

- 1) нервно-болевого
- 2) вегето-сосудистый
- 3) нервно-мышечный
- 4) гуморальный

УПАКОВКА С ОБЪЕКТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛАМИ ДЕЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ

- 1) схематические изображения
- 2) фотоиллюстрации
- 3) графические изображения
- 4) пояснительные надписи

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ПРАВОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

«ЛЕТАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ» ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ

СОЕДИНЕНИЯМИ, В ОСНОВНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В

- 1) кишечнике
- 2) головном мозге
- 3) печени
- 4) почках

ПРИ РАНЕНИЯХ ЧЕРЕЗ ОДЕЖДУ ПОЯСОК ОСАДНЕНИЯ ВОКРУГ ВХОДНОЙ РАНЫ, ПО СРАВНЕНИЮ С РАНЕНИЕМ ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ ТЕЛА, ОБЫЧНО БЫВАЕТ

- 1) уже
- 2) шире
- 3) мягче
- 4) глубже

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЛЕВОГО ЛОКТЕВОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) средней тяжести

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ НА УРОВНЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 75%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ДЕФИЦИТ ГЛОБУЛЯРНОГО ОБЪЕМА БОЛЕЕ 30% И ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕМАТОКРИТА МЕНЕЕ 25% ХАРАКТЕРИЗУЕТ ____ КРОВОПОТЕРИ

- 1) степень средней тяжести
- 2) тяжелую
- 3) летальную
- 4) легкую

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ТРУПОВ В ЖИРОВОСК ПРОИСХОДИТ, В СРЕДНЕМ, ЧЕРЕЗ _____ МЕСЯЦА/МЕСЯЦЕВ И БОЛЕЕ

- 1) 6-7
- 2) 1-2
- 3) 10-12
- 4) 3-4

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) неполнотой ранее проведенной экспертизы
- 2) неудовлетворенностью следователя результатами экспертизы
- 3) неудовлетворенностью руководителя ГСЭУ результатами экспертизы
- 4) отсутствием сомнений в правильности выводов экспертизы

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ВОЗВРАТНОГО ТИФА ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) экссудаты в пораженных тканях и органах
- 2) органы в зависимости от характера поражения
- 3) подкорковые ядра головного мозга
- 4) селезенку

ТУПАЯ ТРАВМА ШЕИ В ВИДЕ КРОВОПОДТЁКА В ПРОЕКЦИИ ЛЕВОГО КАРОТИДНОГО СИНУСА, КРОВОИЗЛИЯНИЯ В ОКРУЖАЮЩИЕ ЕГО МЯГКИЕ ТКАНИ С ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШИМ НАРУШЕНИЕМ РИТМА СЕРДЦА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинившая
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СМЕРТИ ОТ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В БИОХИМИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ НАПРАВЛЯЮТ

- 1) цельную кровь
- 2) кусочки легочного ствола и аорты
- 3) правую долю печени около круглой связки
- 4) кусочки миокарда из левого желудочка

ЗАКРЫТАЯ ТУПАЯ ТРАВМА ЖИВОТА, ПРИВЕДШАЯ К ГАСТРЭКТОМИИ И ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 80%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

К ОДНОМУ ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОПОТИ ВЫСТРЕЛА ДЫМНЫМ ПОРОХОМ ОТНОСИТСЯ

- 1) углерод
- 2) водород
- 3) кислород
- 4) криптон

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, ОТНОСЯТ К

- 1) ишемическим
- 2) гипертоническим
- 3) цереброваскулярным
- 4) вегето-сосудистым

К ХАРАКТЕРНЫМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ЕВРОПЕОИДНОЙ РАСЫ ОТНОСЯТ

- 1) эмалевый «затек» в межкорневом пространстве
- 2) значительное недоразвитие зубов мудрости
- 3) вытянутую форму 2 и 3 моляров
- 4) выступание вперед резцов верхней челюсти

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗА СОБОЙ РЕЗКО ВЫРАЖЕННУЮ СПАСТИЧНОСТЬ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ТИПУ ФОР-III ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ

- 1) корень носа, глазницу, нижнюю глазничную щель к скуловой дуге
- 2) основание альвеолярного отростка к крыльям основной кости
- 3) лобно-скуловой шов и скуловую дугу
- 4) носовые кости, внутреннюю стенку и дно глазницы

ТЕТРАЭТИЛСВИНЕЦ МОЖЕТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕН В КРОВИ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ

- 1) 24
- 2) 72
- 3) 36
- 4) 12

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУПА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ТЕРМОМЕТР

ВВОДЯТ В ПРЯМУЮ КИШКУ НА ГЛУБИНУ (В САНТИМЕТРАХ)

- 1) 5
- 2) 10
- 3) 3
- 4) 15

К НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПРИ КРОВЕТВОРНОЙ ФОРМЕ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ ЧАСТО ОТНОСЯТ _____ С РАЗВИТИЕМ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

- 1) нарушение мнестических функций
- 2) мышечные дистрофии
- 3) нарастающую гипоплазию органов кроветворения
- 4) метаболические нарушения

ПОРАЖЕНИЕ ЗРЕНИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ____ СПИРТОМ

- 1) пропиловым
- 2) этиловым
- 3) метиловым
- 4) амиловым

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОБЫ ПРОКОПА ОЦЕНИВАЮТ

- 1) количество гликогена и сахара в печени трупа
- 2) локальное сокращение мышечных волокон
- 3) наличие пузырьков воздуха в свертках крови из полостей сердца
- 4) наличие среды утопления в пазухе клиновидной кости

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР ПО ДВУМ АНАТОМИЧЕСКИМ ЛИНИЯМ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНОГО УЧАСТКА ГРУДНОЙ СТЕНКИ ПО ТИПУ «РЕБЕРНОГО КЛАПАНА» ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЯДЕР БЕКЛЯРА НЕОБХОДИМО ВСКРЫТЬ

- 1) верхний эпифиз большеберцовой кости
- 2) верхний эпифиз бедренной кости
- 3) нижний эпифиз бедренной кости
- 4) нижний эпифиз большеберцовой кости

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ С ОТРЫВОМ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние

- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ЛЕГОЧНАЯ ТКАНЬ ПРИ ГАНГРЕНЕ СТАНОВИТСЯ

- 1) карминовой
- 2) глиняной
- 3) серо-грязной
- 4) вареной

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

АНТИГЕНАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) белковые субстанции, не способные вызывать образование антител
- 2) белковые субстанции, способные вызывать образование антител
- 3) полисахаридные субстанции, не способные вызывать образование антител
- 4) полисахаридные субстанции, способные вызывать образование антител

К ПОВОДАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) фертильность
- 2) установление повреждение половых органов
- 3) определение эректильных дисфункций
- 4) призыв на военную службу

ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ, ОБУСЛОВИВШИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЁМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫСКАБЛИВАНИЯ МАТКИ, ОЦЕНИВАЮТСЯ КАК ПРИЧИНИВШИЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее легкий вред здоровью
- 2) не причинившее вред здоровью
- 3) причинившее тяжкий вред здоровью
- 4) причинившее вред здоровью средней тяжести

НЕПРОХОДИМОСТЬ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 90%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ НИЖНЕГО СПАСТИЧЕСКОГО ПАРАПАРЕЗА И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ЗАКРЫТЫЙ ВНУТРИСУСТАВНОЙ ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ ЛЕГКИХ ФОРМАХ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СО СТОРОНЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НАБЛЮДАЮТ

- 1) диплопию
- 2) снижение сухожильных рефлексов
- 3) паралич поперечнополосатой мускулатуры
- 4) мышечные подергивания

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ МИОПИЯ ОДНОГО ГЛАЗА СО СНИЖЕНИЕМ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ОТ 1,0 (ДО ТРАВМЫ) ДО 0,01 (ПОСЛЕ ТРАВМЫ) КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБУЮ АТРОФИЮ МЫШЦ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни

4) легкий

МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДЯТ

- 1) с целью решения диагностических, идентификационных и ситуационных экспертных задач
- 2) для определения индивидуализирующих признаков биологических объектов на уровне геномной ДНК
- 3) с целью установления наличия и оценки патологических изменений в органах и тканях, обусловленных насильственными воздействиями
- 4) для обнаружения и идентификации химических и лекарственных веществ

ГЛАБЕЛЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, КАК ТОЧКА

- 1) соединения лобной, верхне-челюстной и слезной костей
- 2) наиболее выступающая наружу на скуловой дуге
- 3) на нижнем крае нижней челюсти в месте пересечения его медиально-сагиттальной плоскостью
- 4) на носовом отростке лобной кости, наиболее выступающая вперед в медиальносагиттальном сечении

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ (ОГРАНИЧЕНИЕ СГИБАНИЯ И РАЗГИБАНИЯ ОТ 30° ДО 40°), ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 10%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ПРЯМОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней степени тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦОМ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК

- 1) шишковидной железы
- 2) продолговатого мозга
- 3) мозжечка
- 4) таламо-гипофизарной области

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ РЕШАЕТСЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ

- 1) стереомикроскопии
- 2) спектрофотометрии
- 3) микротвердомерии
- 4) денсиметрии

УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ПРИ НАЛИЧИИ СИМПТОМОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕЛОВЫХ ОТДЕЛОВ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинивший
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ МИОКАРДИТА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ТИП

- 1) дистрофический
- 2) дегенеративный
- 3) крупноочаговый
- 4) трансмуральный

ЗАХОРОНЕНИЕ ТРУПОВ ЛЮДЕЙ, УМЕРШИХ ОТ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) в специальных местах
- 2) на общественных кладбищах
- 3) в колумбариях после кремации
- 4) в местах подводного захоронения

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТУПОЙ ТРАВМЫ ШЕИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ КАРОТИДНЫХ СИНУСОВ (ПРИ НАЛИЧИИ КЛИНИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ТРАВМА ОТ ПЕРЕЕЗДА КОЛЁСАМИ АВТОМОБИЛЯ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ _____ ФАЗ

- 1) 5
- 2) 6
- 3) 7
- 4) 8

ОТКРЫТЫЙ ЧРЕЗВЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий

- 3) не причинивший
- 4) средней тяжести

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФЕНОЛОМ ОСТАВЛЕННАЯ В ОТКРЫТОМ ФЛАКОНЕ МОЧА ПРИОБРЕТАЕТ ____ ОКРАСКУ

- 1) темно-желтую
- 2) красную
- 3) светло-желтую
- 4) коричнево-зеленую

МЕХАНИЗМОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛОМОВЫВИХА МОНТЕДЖА ЯВЛЯЕТСЯ УДАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУПОГО ТВЕРДОГО ПРЕДМЕТА ПО

- 1) среднему отделу стопы с повреждением одного или более из предплюсневых суставов
- 2) тыльной поверхности верхней трети предплечья
- 3) диафизу лучевой кости
- 4) тыльной поверхности голени в нижней трети

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ТОНКОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

СОКРЫТИЕ ФАКТА ПЕРЕНЕСЕННОЙ РАНЕЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дезагgravацией
- 2) диссимуляцией
- 3) патологической симуляцией
- 4) истинной симуляцией

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ 2 СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1) эпидермисе
- 2) мышцах
- 3) подкожно-жировой клетчатке
- 4) глубоких тканях

МЕХАНИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ, ПРИЧИНЯЮЩИМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭКИПАЖУ ПРИ КАТАПУЛЬТИРОВАНИИ, МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) встречный поток воздуха
- 2) атмосферное электричество
- 3) монооксид углерода
- 4) световое излучение

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЫ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III-IV СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) опасность для жизни
- 4) угрожающее жизни состояние

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАН, ПРИЧИНЁННЫХ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ПРЕДМЕТОМ, ДЛИНА КЛИНКА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО

- 1) средней величине длин всех раневых каналов
- 2) максимальной длине раневого канала
- 3) сумме максимально длинного раневого канала и общего количества ран
- 4) максимальной длине раневого канала умноженного на количество ран

ПОД МНОГОКРАТНЫМ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНЕНИЕМ БОЛИ ЩИПАНИЕМ, СЕЧЕНИЕМ, МНОЖЕСТВЕННЫМИ УКОЛАМИ В ОСОБО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА, ДЛИТЕЛЬНЫМ ЛОКАЛЬНЫМ ТЕРМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОНИМАЮТ

- 1) истязания
- 2) побои
- 3) мучения
- 4) симуляцию

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРТ БЕРЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СОДЕРЖИМОЕ

- 1) носовых ходов
- 2) желудка
- 3) наружного зева шейки матки
- 4) тонкой кишки

ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ПО ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ МИЗИНЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающий жизни
- 2) легкий
- 3) тяжкий

4) средней тяжести

**ПРИ ОСТРОМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ НЕФРИТЕ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ
___ НЕФРИТ**

- 1) гранулематозный
- 2) эритроцитарный
- 3) склерозирующий
- 4) лейкоцитарный

СМЕРТЬ РЕБЁНКА КАК ДЕТОУБИЙСТВО КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ

- 1) судебно-медицинским экспертом
- 2) комиссией судебно-медицинских экспертов
- 3) судебным экспертом
- 4) следователем

ПЛАН МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- 1) адвокатом
- 2) специалистом в области судебной медицины
- 3) следователем
- 4) понятыми

**КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ
ПЕРЕЛОМА ЧЕРПАЛОВИДНОГО ХРЯЩА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ПО ХАРАКТЕРУ ВОСПАЛЕНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) склерозирующий
- 2) нисходящий
- 3) пролиферативный
- 4) восходящий

**ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЫШЬЯКОМ ИЗ ПОЛОСТЕЙ И ОТ ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ
ОЩУЩАТЬСЯ ЗАПАХ**

- 1) прелых яблок
- 2) сушеных грибов
- 3) чеснока
- 4) горького миндаля

**КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ ТРЁХ СМЕЖНЫХ ПОЗВОНКОВ ПОЯСНИЧНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА И
ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК**

ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РЕФЛЕКСОВ С ГИПОТРОФИЕЙ МЫШЦ, ЛЕГКИМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЫСТРЕЛА ПРИ ПЛОТНОМ УПОРЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБНАРУЖИВАЮТСЯ

- 1) по ходу раневого канала
- 2) на внутренней поверхности одежды
- 3) на коже
- 4) между слоями одежды

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ МОТОЦИКЛЕТНОЙ ТРАВМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ПЕРЕЛОМ НЕСКОЛЬКИХ ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

К ИЗМЕНЕНИЯМ ТРУПА ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) гумификацию
- 2) сапонификацию
- 3) мумификацию
- 4) мацерацию

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) лёгкий

ПОВРЕЖДАЮЩИМ ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) состояние алкогольного опьянения
- 2) состояние здоровья
- 3) любое материальное тело или явление
- 4) сопутствующие заболевание

ПРИЧИНЕНИЕ БОЛИ СЕЧЕНИЕМ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК

- 1) извращение
- 2) мучение
- 3) истязание
- 4) побои

ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, РАЗВИВШАЯСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕРВАННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившая
- 4) средней тяжести

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ТКАНЕЙ СДЕРЖИВАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) минералокортикоиды
- 2) глюкокортикостероиды
- 3) Т-лимфоциты
- 4) соматотропный гормон гипофиза

СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОЗЫ В МЫШЦАХ ПРИ ОБЩЕМ ДЕЙСТВИИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- 1) снижается
- 2) повышается
- 3) изменяется волнообразно
- 4) изменяется хаотично

ОЛЕДЕНЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА СОПРОВОЖДАЕТСЯ

- 1) образованием эпидуральных гематом серповидной формы
- 2) расхождением швов черепа

- 3) наличием мелких периваскулярных кровоизлияний
- 4) уплощением борозд

ДЛЯ КОЛОТЫХ РАН ХАРАКТЕРНО

- 1) преобладание длины раны над шириной
- 2) обильное наружное кровотечение
- 3) наличие прямолинейной формы ран
- 4) обильное внутреннее кровотечение

К ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ НОВОРОЖДЕННОСТИ ОТНОСЯТ

- 1) сочную влажную пуповину без демаркационного кольца
- 2) анэнцефалию
- 3) синдактилию
- 4) кефалогематому

ПО СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ЖИРОВΟΣКА НА ТРУПЕ МОЖНО ОРИЕНТИРОВОЧНО СУДИТЬ О

- 1) механизме наступления смерти
- 2) давности наступления смерти
- 3) давности захоронения
- 4) причине смерти

В ТРЕТЬЕЙ ФАЗЕ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРОИСХОДИТ

- 1) образование и дифференцировка тканевых структур
- 2) полное восстановление анатомо-физиологического строения кости
- 3) пролиферация клеточных элементов
- 4) образование ангиогенной костной структуры

МЕТОДОМ, НЕ ИЗМЕНЯЮЩИМ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) визуальный стереомикроскопический
- 2) контактно-диффузионный
- 3) гистологический
- 4) хроматографический

РЕЗАНАЯ РАНА ШЕИ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившая
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

РУСЫМИ НАЗЫВАЮТ ВОЛОСЫ ПРИ МАКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

- 1) волос животных в пучке

- 2) одиночных волос человека
- 3) волос человека в пучке
- 4) одиночных волос животных

ОТРАВЛЕНИЕ ЦИТИЗИНОМ ОТНОСИТСЯ К ОТРАВЛЕНИЯМ

- 1) наркотическими средствами
- 2) ядами общефункционального действия
- 3) гемотропными ядами
- 4) пищевым

РАНУ ЖИВОТА, ПРОНИКАЮЩУЮ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ, КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасное для жизни
- 3) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЖИРОВОГО ОБМЕНА, И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ ЭЛАСТИЧЕСКОГО ТИПА В ВИДЕ ОЧАГОВОГО ОТЛОЖЕНИЯ В ИНТИМЕ ЛИПИДОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) атеросклероз
- 2) некроз
- 3) инфаркт
- 4) инсульт

ТЯЖЁЛАЯ КРОВОПОТЕРЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОТЕРЕЙ ____% ОБЪЁМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ

- 1) 35-50
- 2) 25-35
- 3) 15-25
- 4) 10-15

ДЛИННЫЕ ОТРОСТКИ ОСТЕОЦИТОВ РАСПОЛАГАЮТСЯ В

- 1) канальцах
- 2) гаверсовом канале
- 3) балках
- 4) остеобластах

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НАЛИЧИЯ СМАЗКИ В ОБЛАСТИ ВХОДНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД

- 1) физический
- 2) биологический
- 3) биохимический
- 4) иммуногистохимический

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ВЫДАЧЕ ТРУПОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) натуральная оспа, чума, сап, сибирская язва
- 2) инфекционные заболевания (исключая особо опасные инфекции)
- 3) насильственные действия
- 4) суицидальные действия

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЧАСТЕЙ РАСЧЛЕНЕННОГО ТРУПА ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) цвет каждой кости
- 2) отсутствующие части тела
- 3) наличие растений в области ложа трупа
- 4) состояние эмали зубов

КОЛОТО-РЕЗАНАЯ РАНА ПРОМЕЖНОСТИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЛОСТЬ МАЛОГО ТАЗА, ПО ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) причинившее лёгкий
- 2) причинившее тяжкий
- 3) не причинившее
- 4) причинившее средней тяжести

К МЕДИЦИНСКИМ КРИТЕРИЯМ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ В ОТНОШЕНИИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ОТНОСЯТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

- 1) более чем на две трети
- 2) более чем на одну треть
- 3) менее чем на одну треть
- 4) менее чем на две трети

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ НАДПОЧЕЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) лёгкий

НА ТАНАТОГЕНЕЗ ПРИ ПОВЕШЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЕТ

- 1) возраст пострадавшего
- 2) положение петли на шее
- 3) количество оборотов петли
- 4) концентрация алкоголя в крови

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ЛЕГКОГО ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

ТРАВМАТИЧЕСКУЮ РАДИКУЛОПАТИЮ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ВЫРАЖЕННЫМ МОНОПАРЕЗОМ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, ВЫРАЖЕННАЯ АТРОФИЯ МЫШЦ ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) угрожающий жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ОТРАВЛЕНИЯ

- 1) этиленгликолем
- 2) мышьяковистым водородом
- 3) цианистым калием
- 4) бертолетовой солью

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

МЕТОДИКУ, ОБЪЕМ И СПОСОБ АУТОПСИИ В КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1) руководитель экспертного учреждения
- 2) судебно-медицинский эксперт
- 3) лицо, назначившее судебно-медицинскую экспертизу
- 4) заведующий танатологическим отделением

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ВНУТРИМОЗГОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ КРАЕВ РАНЫ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ ЗА 1-2 ЧАСА ДО СМЕРТИ, ХАРАКТЕРНО ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1) краевого стояние лейкоцитов в сосудах микроциркуляторного русла
- 2) фибробластов, формирующих грануляционную ткань
- 3) выраженного распада лейкоцитов
- 4) новообразованных тонкостенных капилляров

ДИАМЕТР ЯДЕР ОКОСТЕНЕНИЯ В НИЖНИХ ЭПИФИЗАХ БЕДЕР У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 0,2-0,3
- 2) 0,5-0,6
- 3) 0,7-0,8
- 4) 1,0-1,1

ПРИ АМИЛОИДОЗЕ ПОЧЕК ЦИТОПЛАЗМА ЭПИТЕЛИЯ КАНАЛЬЦЕВ В ЛАТЕНТНУЮ СТАДИЮ ПРОПИТАНА ____ ГРАНУЛАМИ

- 1) жировыми
- 2) белковыми
- 3) минеральными
- 4) углеводными

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

К ОТДЕЛИВШЕЙСЯ ЧАСТИ КОСТИ С НАИБОЛЬШИМ РАЗМЕРОМ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ ДИАМЕТР ТРУБЧАТОЙ КОСТИ, ОТНОСЯТ

- 1) надлом
- 2) отломок
- 3) осколок
- 4) фрагмент

ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРА ПОРАЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРУДИ И ЖИВОТА ПО ПРАВИЛУ «ДЕВЯТКИ» СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 1
- 2) 14
- 3) 9
- 4) 18

В ОБЛАСТИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ПОСМЕРТНЫЕ

- 1) петехии
- 2) экхимозы
- 3) пустулы
- 4) папулы

ДО 90 ПРОЦЕНТОВ ПОСТУПИВШЕГО В ОРГАНИЗМ ЭТАНОЛА ОКИСЛЯЕТСЯ В

- 1) почках
- 2) печени
- 3) селезенке
- 4) сердце

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРОФИКИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий

4) лёгкий

**ТРАВМАТИЧЕСКУЮ АНЕВРИЗМУ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

**В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМОВ ПОЗИЦИОННОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЙ
ОРГАНОМ МИШЕНЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лёгкое
- 2) селезёнка
- 3) сердце
- 4) почка

**НЕСРОСШИЙСЯ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ПРАВОЙ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ,
ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ
СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 45%, КВАЛИФИЦИРУЮТ
КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) длительный
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

**ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ**

- 1) вред здоровью средней степени тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

**ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ,
КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

**УСТАНОВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ И МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ КРОВЯНЫХ СЛЕДОВ
ПРОВОДИТСЯ В _____ ОТДЕЛЕНИИ**

- 1) биохимическом
- 2) судебно-гистологическом
- 3) медико-криминалистическом
- 4) химико-токсикологическом

РАНЕНИЕ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ С РАССЕЧЕНИЕМ ВНУТРЕННЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПОЧКИ ПРИ ПОЛИКИСТОЗЕ НАПОМИНАЮТ

- 1) грозди винограда
- 2) каштан
- 3) метелку
- 4) снежинку

БЫСТРАЯ СМЕРТЬ ПРИ ГЕМОТАМПОНАДЕ СЕРДЦА ОБУСЛОВЛЕНА

- 1) рефлекторным спазмом коронарных артерий
- 2) асистолией
- 3) сдавлением левого желудочка
- 4) сдавлением правых отделов сердца и магистральных вен

ВЫВИХ ГРУДНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) воспалительный инфильтрат
- 2) гипертрофию мышечной ткани
- 3) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 4) спиралевидное скручивание мышечных волокон

ЛЕТАЛЬНАЯ ДОЗА ПРИ ПЕРОРАЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ДИХЛОРЭТАНОМ КОЛЕБЛЕТСЯ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 150-200
- 2) 200-250
- 3) 5-10
- 4) 10-100

РАСПАД СЛОЖНЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КЛЕТОЧНЫЕ ИЛИ МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ, И НАКОПЛЕНИЕ ИХ В КЛЕТКАХ ИЛИ ТКАНЯХ НАЗЫВАЮТ

- 1) трансформацией
- 2) инфильтрацией
- 3) декомпозицией
- 4) извращенным синтезом

К КОЛЮЩЕМУ ОРУЖИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) рапира
- 2) арматура
- 3) шило
- 4) спица

ВЫРАЖЕННЫЙ МИОЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ

- 1) беленой
- 2) опиумом
- 3) этанолом
- 4) дурманом

МИОКАРД ПРИ ЗЕРНИСТОЙ ДИСТРОФИИ НА РАЗРЕЗЕ НАПОМИНАЕТ

- 1) апельсиновую корку
- 2) вареное мясо
- 3) карминовое легкое
- 4) глину

ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 6-8 ЧАСОВ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В МИНУТАХ) (ПО В.В.ЖАРОВУ, Ю.Л. МЕЛЬНИКОВУ, 1978)

- 1) 5-10
- 2) 50-60
- 3) 30-40
- 4) 1-2

В ОСНОВЕ АСФИКСИИ ОТ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СНОТВОРНЫХ ВЕЩЕСТВ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) компрессия груди
- 2) угнетение дыхательного центра
- 3) пребывание в замкнутом пространстве
- 4) странгуляция органов шеи

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) постановление судьи
- 2) заявление прокурора
- 3) направление следователя
- 4) заявление пострадавшего

К ПЕРВИЧНЫМ ПНЕВМОНИЯМ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПНЕВМОНИЮ

- 1) аспирационную
- 2) септическую
- 3) интерстициальную
- 4) гипостатическую

К ДЕСТРУКТИВНЫМ ЯДАМ ОТНОСЯТ

- 1) высшие спирты и растворители органических веществ
- 2) кислоты и щелочи
- 3) органические и неорганические соединения ртути
- 4) органические и неорганические окислители

РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ АТРОПИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (В МИНУТАХ)

- 1) 5-7
- 2) 1-2
- 3) 3-5
- 4) 10-12

СМЕРТЬ ОТ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ ОТ УГНЕТЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

- 1) гипофиза
- 2) среднего мозга
- 3) мозжечка
- 4) продолговатого мозга

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ АБСОЛЮТНОГО СПИРТА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ БОЛЕЕ (В МИЛЛИГРАММ/ЛИТР)

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 0,5
- 4) 0,16

ПЕРЕЛОМ ТЕЛА КРЕСТЦОВЫХ ПОЗВОНКОВ С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕН

- 1) разрушением и (или) выделением вещества из организма до наступления смерти
- 2) разрушением токсического вещества во время вскрытия трупа
- 3) эндогенным образованием токсического вещества при заболеваниях

4) нарушением изъятия объектов исследования

НАПРАВЛЕНИЕ УДАРА КОЛЮЩИМ ПРЕДМЕТОМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО

- 1) направлению длинника раны
- 2) направлению раневого канала
- 3) количеству лучей раны
- 4) размеру раны на коже

ТУПУЮ ТРАВМУ ШЕИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ КАРОТИДНЫХ СИНУСОВ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

В СЛУЧАЯХ, КОГДА ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСЛЕДОВАТЬ ПОДЭКСПЕРТНОГО, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОВОДЯТ ПО

- 1) запросу адвоката
- 2) предоставленным оригиналам медицинских документов
- 3) личному заявлению пострадавшего
- 4) распоряжению руководителя органа управления здравоохранением

К ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ СТРЕССОВЫХ (МАРШЕВЫХ) ПЕРЕЛОМОВ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) диафизы и шейки плюсневых костей
- 2) диафиз плечевой кости
- 3) таранную кость
- 4) кубовидную кость

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ВЫВИХА ТРЁХ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИКАМИ НАРЯДУ С ОБЩЕАСФИКТИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ВКЛЮЧАЮТ, КАК ПРАВИЛО, ПРОЯВЛЕНИЯ

- 1) простатита
- 2) ринита
- 3) токсической энцефалопатии
- 4) уретрита

ИСХОДОМ ЗАЖИВЛЕНИЯ ССАДИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) неизменённая кожа
- 2) нормотрофический рубец
- 3) атрофический рубец
- 4) келоидный рубец кожи и подлежащих тканей

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ ГРУДИ И ЖИВОТА III-IV СТЕПЕНИ, СОСТАВИВШИЙ 18% ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

НАДРЫВЫ ИНТИМЫ ОБЩИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ (ПРИЗНАК АМЮССА) ВОЗНИКАЮТ ПРИ

- 1) аспирации инородных тел
- 2) удушении петлей
- 3) повешении в петле
- 4) удушении руками

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДЪЯЗЫЧНОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ РЕЗКОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) угрожающий жизни
- 4) тяжкий

ВЫРЕЗАННЫЕ ДЛЯ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КУСОЧКИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПОМЕЩАЮТ В

- 1) глицерина раствор 25%
- 2) спирт 96%
- 3) формалина раствор 10%
- 4) перекиси водорода раствор 3%

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ЖЕЛУДКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

К ОБЪЕКТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ

(ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ) ИССЛЕДОВАНИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ НА БРЮШНОЙ ТИФ, ПАРАТИФ ОТНОСЯТ

- 1) лимфатические узлы кишечника
- 2) продолговатый мозг
- 3) спинномозговую жидкость
- 4) мезентериальные железы

ПРИ МЕТАПЛАЗИИ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ ПРОИСХОДИТ ЕЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ В

- 1) костную
- 2) мышечную
- 3) нервную
- 4) жировую

В УСЛОВИЯХ МЕДЛЕННОГО КРОВОТОКА, ЧАЩЕ ВСЕГО В ВЕНАХ, ОБРАЗУЮТСЯ _____ ТРОМБЫ

- 1) гиалиновые
- 2) смешанные
- 3) белые
- 4) красные

ПЫЖ ОКАЗЫВАЕТ НА ТКАНИ ДЕЙСТВИЕ

- 1) биологическое
- 2) механическое
- 3) комбинированное
- 4) химическое

К ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ СУРЬМЫ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ОТНОСЯТ

- 1) корпус гильзы
- 2) стенки ствола
- 3) пороховой пыж
- 4) капсюльный состав

ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ СОЕДИНЕНИЯМИ ФОСФОРА ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) первичная остановка сердца
- 2) паралич дыхательного центра
- 3) острая печеночно-почечная недостаточность
- 4) паралич сосудистого центра

КОЛОТО-РЕЗАНУЮ РАНУ ШЕИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ РАЗВИТИЕМ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести

4) длительный

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОГО ПЛЕЧА, ВЫЗВАННОЕ УМЕРЕННЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) отсутствием сомнений в правильности выводов экспертизы
- 2) неудовлетворенностью следователя результатами экспертизы
- 3) сомнением в правильности выводов ранее проведенной экспертизы
- 4) неудовлетворенностью руководителя ГСЭУ результатами экспертизы

К СОСТОЯНИЮ, ПРИ КОТОРОМ СОЗНАНИЕ УТРАЧЕНО, НО ЭПИЗОДИЧЕСКИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ, ОТНОСЯТ

- 1) агонию
- 2) предагонию
- 3) терминальную паузу
- 4) клиническую смерть

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, В СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ХРАНЯТ В

- 1) отдельном специально оборудованном помещении
- 2) сейфе, в кабинете заведующего отделением
- 3) рабочем столе химика-эксперта в закрытом ящике
- 4) общем хранилище вещественных доказательств

К ПРИЗНАКАМ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НИЖЕ 29-31°C ОТНОСЯТ

- 1) ознобление кожи
- 2) отморожения I-II степени
- 3) дизартрию
- 4) брадикардию

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БРЫЖЕЙКИ ТОНКОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

ПРОИЗВОДНЫЕ АМФЕТАМИНА В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ОБНАРУЖИВАЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) метода цветных отпечатков
- 2) эмиссионного спектрального анализа
- 3) Фурье-ИК-спектрофотометрии
- 4) рентгенфлюоресценции

ФОТОГРАФИИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТРУПОМ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ СЛЕДАМИ, ВРАЧУ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ЭКСПЕРТУ НАПРАВЛЯЕТ

- 1) следователь
- 2) криминалист
- 3) адвокат
- 4) техник-лаборант

ЗОНА ИНФАРКТА МИОКАРДА ЗАМЕЩАЕТСЯ ФИБРОЗНЫМ РУБЦОМ ЧЕРЕЗ

- 1) 3-4 суток
- 2) 3-4 месяца
- 3) 48-36 часов
- 4) 3-4 недели

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАКОПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ТЕПЛА СОСТАВЛЯЕТ (В КИЛОКАЛОРИЯХ)

- 1) 40-50
- 2) 50-60
- 3) 20-30
- 4) 65-100

В МОЧЕ КАННАБИНОИДЫ ВЫЯВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) рентгенфлюоресценции
- 2) метода цветных отпечатков
- 3) эмиссионного спектрального анализа
- 4) методов иммуноферментного анализа

ПЕРЕЛОМ ОДНОЙ КОСТИ В ДВУХ И БОЛЕЕ МЕСТАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) поднадкостничным
- 2) полным
- 3) пластическим
- 4) полифокальным

ЭКСПЕРТ ВПРАВЕ ВОЗВРАТИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ

___ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1) 200 «Комиссионная судебная экспертиза»
- 2) 199 «Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы»
- 3) 204 «Заключение эксперта»
- 4) 201 «Комплексная судебная экспертиза»

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИНОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПРОИЗВОДСТВО ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

- 1) ошибок технического характера в исследовательской части первичного заключения
- 2) субъективных противоречий между результатами первичной экспертизы и данными следствия
- 3) объективных противоречий между результатами первичной экспертизы и данными следствия
- 4) отсутствия противоречий между результатами первичной экспертизы и данными следствия

ЦЕПЬЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВОЗНИКАЮЩИХ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СОБОЙ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОСНОВНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ (ЗАБОЛЕВАНИЯ), ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сопутствующая патология
- 2) конкурирующая патология
- 3) причина смерти
- 4) генез смерти

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЛОМ РОЖКОВИДНОГО ХРЯЩА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ОСНОВНЫМ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ГЕПАТОЦИТОВ

- 1) ишемия
- 2) атрофия

- 3) дистрофия
- 4) деструкция

ПРИ СМЕРТИ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ ИЛИ ИНЫХ СТРЕССОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАРЯДУ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ БЕРУТ

- 1) желудок
- 2) печень
- 3) органы иммуногенеза
- 4) почку

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ГИПЕРАЛГЕЗИЮ, НАРУШЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) опасный для жизни
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ЗАКРЫТЫЙ ФРАГМЕНТАРНО-ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ ГЕМАТОМ ОПРЕДЕЛЯЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

- 1) гемина
- 2) метгемоглобина
- 3) креатинина
- 4) карбоксигемоглобина

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ, КРОВЬ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) жидкая темно-красная
- 2) «дегтеобразная»
- 3) розоватая
- 4) алая

ПРИ ОЖОГЕ 2 СТЕПЕНИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗНИКАЮТ В

- 1) дерме
- 2) подкожной жировой основе

- 3) мышцах
- 4) эпидермисе

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ КЛЯПА В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ НЕОБХОДИМО

- 1) утилизировать
- 2) извлечь из ротовой полости
- 3) зафиксировать липкой лентой
- 4) передать следователю

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЛОСТЬ ПЕРИКАРДА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

К ИСТОЧНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ ОТНОСЯТ РАЗРЫВ

- 1) базилярной артерии
- 2) передней спинномозговой артерии
- 3) синуса твердой мозговой оболочки
- 4) сосудов подпаутинного пространства и (или) корковых сосудов

ДЛИНА РАНЕВОГО КАНАЛА МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНУ КЛИНКА ПРИ УДАРЕ В

- 1) живот
- 2) голову
- 3) лопаточную область
- 4) поясничную область

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА

- 1) количество глюкозы
- 2) содержание метгемоглобина
- 3) активность эритроцитарной холинэстеразы
- 4) концентрацию мочевины

ОБРАЗОВАНИЕ ВКОЛОЧЕННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) скручивании по продольной оси кости
- 2) резком мышечном сокращении
- 3) воздействии (сжатии кости) в продольном направлении
- 4) перпендикулярном воздействии тупого предмета на кость

СОГЛАСНО ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАЗЛИЧАЮТ РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ИЗ ЭПИТЕЛИЯ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ _____ РАК ПЕЧЕНИ

- 1) инфильтрирующий
- 2) мономультилобулярный
- 3) экспансивный
- 4) холангиоцеллюлярный

ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ЖИВОГО ЛИЦА МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ

- 1) возраста
- 2) вменяемости
- 3) дееспособности
- 4) повреждений

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ РЕЗКО ВЫРАЖЕННЫЙ СПАСТИЧЕСКИЙ ПАРЕЗ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) материалы дела
- 2) расписку эксперта
- 3) наркотические средства
- 4) заключение эксперта

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ БОЛЬШОГО И УКАЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦЕВ ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 45%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) угрожающий жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА С ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ С

- 1) обмывания загрязнений вокруг ран
- 2) пальпации ран

- 3) зондирования раневого канала
- 4) фотографирования повреждений

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПНЫХ ЯВЛЕНИЙ ИЗМЕРЯЮТ ТЕМПЕРАТУРУ В

- 1) полости рта
- 2) селезенке
- 3) подмышечной области
- 4) прямой кишке

СМЕРТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 20
- 2) 40
- 3) 60
- 4) 30

ПРИ ТЕПЛОВОЙ ТРАВМЕ СОСТОЯНИЕ МОЩНОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

- 1) интенсивным потоотделением
- 2) температурой центральной нервной системы
- 3) повышенной рефлекторной возбудимостью
- 4) в пределах термонеutralной зоны

ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

ХРЯЩ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СЛЕДУЕТ СОХРАНЯТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО МИКРОТРАСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РАСТВОРЕ

- 1) гидроперита
- 2) формалина
- 3) глицерина
- 4) этанола

УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАННОЕ ХАРАКТЕРОМ И ТЯЖЕСТЬЮ ОТРАВЛЕНИЯ, КАК ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

- 1) не рассматривается
- 2) рассматривается всегда
- 3) рассматривается иногда
- 4) рассматривается после смерти

**ОСОБЕННОСТИ НАДРЫВОВ В ОБЛАСТИ ТУПОГО КОНЦА КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ
ПОЗВОЛЯЕТ РЕШИТЬ ВОПРОС О**

- 1) наличию дола
- 2) наличию гарды
- 3) форме обуха
- 4) форме тыльника

К ПРИЧИНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) касание включенных электроприборов сухими руками
- 2) прикосновение к токоведущим проводникам низкого напряжения руками в резиновых перчатках
- 3) касание отключенных электроприборов мокрыми руками
- 4) случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением

**КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ПЕРЕЛОМА ДУГИ II ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА БЕЗ
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

**ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ НАДПОЧЕЧНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ**

- 1) вред здоровью средней степени тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

МОЩНОСТЬ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) количеством частиц взрывчатого вещества
- 2) количеством углерода в составе копоти
- 3) интенсивностью копоти
- 4) относительным объемом повреждения

**ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГЕМОПНЕВМОТОРАКС КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ,
ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ**

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасный для жизни

**ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ ХОЛОСТЫМИ ПАТРОНАМИ ОБРАЗУЮТСЯ ОТ
ДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ**

- 1) продуктов взрыва капсуля
- 2) пыжа
- 3) огнестрельного снаряда
- 4) металлических частиц

ТУПАЯ ТРАВМА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ПОТЕРЕЙ ОДНОГО ЯИЧКА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) не причинившая
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ЖИРЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНЫХ, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НИЛЬСКОЙ ГОЛУБОЙ ПРИОБРЕТАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ЦВЕТ

- 1) фиолетовый
- 2) черный
- 3) красный
- 4) синий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) опасность для жизни
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) длительное расстройство здоровья

К ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ БАРОТРАВМЫ ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) кровоизлияния в области межальвеолярных перегородок
- 2) поражения ацинусов легких
- 3) фиброз интерстициальной ткани
- 4) интерстициальное воспаление сосудистой стенки альвеол

ГИПОКСИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИОКАРДЕ ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ЭТАНОЛОМ ХОРОШО ДИАГНОСТИРУЮТСЯ ПРИ ОКРАСКЕ ПРЕПАРАТОВ ПО

- 1) Перлсу
- 2) Маллори
- 3) Нисслю
- 4) Бесту

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья

- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД

- 1) трасологический
- 2) контактно-диффузионный
- 3) баллистический
- 4) тонкослойной хроматографии

ЯДРА ШИПОВАТОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВЕ МОГУТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ

- 1) «бус»
- 2) «гирлянд»
- 3) «снежинок»
- 4) «завихрений»

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней степени тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

БОЛТАЮЩИЙСЯ ПРАВЫЙ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРАВЫХ ПЛЕЧЕВОЙ И ЛОКТЕВОЙ КОСТЕЙ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 50%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

К СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ПЕРЕГРЕВАНИЮ И ПЕРЕНОСИТЬ НАСТУПИВШЕЕ ПЕРЕГРЕВАНИЕ ОТНОСЯТ

- 1) солнечный удар
- 2) лихорадку
- 3) тепловой удар
- 4) тепловую устойчивость

ТРУПНАЯ ЗЕЛЕНЬ РАЗВИВАЕТСЯ НА ____ СУТКИ ПОСЛЕ СМЕРТИ

- 1) 8-10
- 2) 1-2
- 3) 4-5

4) 3-4

РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 40% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

РАЗРАСТАНИЕ В ИНТИМЕ АРТЕРИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ВОКРУГ ОЧАГА ОТЛОЖЕНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА, ЛИПИДОВ, ЛИПРОПРОТЕИДОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕЕ СОЗРЕВАНИЕМ И ФОРМИРОВАНИЕМ ФИБРОЗНОЙ БЛЯШКИ ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЕЙ

- 1) липосклероза
- 2) атероматоза
- 3) липоидозная
- 4) долипидной

В ТЕЧЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ РАЗЛИЧАЮТ

- 1) 4 этапа
- 2) 3 этапа
- 3) 5 этапов
- 4) 2 этапа

ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ОПИАТАМИ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ

- 1) диплопия
- 2) миоз
- 3) мидриаз
- 4) астигматизм

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ДИАБЕТА, ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ИССЛЕДУЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

- 1) карбоксигемоглобина и гемина
- 2) мочевины, креатинина, средних молекул
- 3) глюкозы, гликолизированного гемоглобина, креатинина
- 4) ионов калия и натрия

В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ В (В ЧАСАХ)

- 1) четыре
- 2) два
- 3) один
- 4) три

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ МОЧЕТОЧНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШИЕ ЕЕ ДЕФОРМАЦИЮ, РАВНЫЕ 5% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее легкий вред здоровью
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее вред здоровью средней тяжести
- 4) не причинившее вред здоровью

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ ОДНОЙ ФАЛЛОПИЕВОЙ ТРУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) освидетельствованием
- 2) экспертизой трупа
- 3) первоначальным следственным действием
- 4) судебно-медицинским исследованием

В НАРЕЗНОМ ОРУЖИИ ПУЛЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГАЗОВ ПРИОБРЕТАЕТ ДВИЖЕНИЕ

- 1) поступательно-вращательное
- 2) кувыркательное
- 3) тангенциально-восходящее
- 4) импульсное

ДЛЯ РАНЕНИЙ ОДНОЙ КОРОТКОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДЬЮ ХАРАКТЕРНО

- 1) беспорядочное расположение входных отверстий
- 2) расположение входных отверстий цепочкой
- 3) наличие признаков выстрела с разной дистанции
- 4) наличие пересекающихся раневых каналов

ПОСТИНФАРКТНЫЙ КАРДИОСКЛЕРОЗ, КАК ПРАВИЛО, РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО

- 1) инфаркта миокарда
- 2) миокардита
- 3) эндокардита
- 4) васкулита

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВЫХ ЛОКТЕВОМ И ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВАХ, ВЛЕКУЩЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ МОРГ ДОСТАВЛЯЮТ

- 1) боеприпасы
- 2) живых лиц
- 3) трупы
- 4) образцы для сравнительного исследования

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ТОКСИЧЕСКОЙ КОМЫ II-III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

НА ЖИВОРОЖДЕННОСТЬ МЛАДЕНЦА УКАЗЫВАЕТ

- 1) расправленность альвеол
- 2) развитость подкожно-жирового слоя
- 3) наличие ателектазов легких
- 4) отсутствие пушковых волос

ВСКРЫВАТЬ УПАКОВКУ С ПОСТУПИВШИМИ В ГСМЭУ ОБЪЕКТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛАМИ ДЕЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИМЕЕТ ПРАВО ТОЛЬКО

- 1) медицинский регистратор

- 2) санитар
- 3) лаборант
- 4) эксперт

ЭФЕДРИНОВАЯ НАРКОМАНИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ КОКАИНОМ

- 1) бледностью лица
- 2) быстрой социальной деградацией личности
- 3) арефлексией
- 4) кожным зудом

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) однослойного плоского эпителия вставочных выводных протоков
- 2) кубического эпителия межациннозных выводных протоков
- 3) рыхлой волокнистой соединительной ткани стромы
- 4) воспалительных изменений, занимающих большую площадь паренхимы

В ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ШОКОМ

- 1) болевым
- 2) электрогенным
- 3) инфекционно-токсическим
- 4) геморрагическим

К ПРИЗНАКАМ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПАУЗЫ ОТНОСЯТ

- 1) выраженную активность подкорковых центров
- 2) снижение реакции на раздражители
- 3) отсутствие пульса
- 4) полным угнетением сердечной деятельности

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ПРИ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОРГАНИЗМА СНИЖАЕТСЯ УРОВЕНЬ

- 1) гликогена
- 2) миоглобина
- 3) тропонина
- 4) креатинфосфокиназы

К ОСОБЕННОСТЯМ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ УТОПЛЕНИЯ ОТНОСЯТ

- 1) измерение длины тела с вытянутой рукой
- 2) постановку пробы на пневмоторакс
- 3) вскрытие пазухи основной кости
- 4) постановку дифениламиновой пробы

В СООТВЕТСТВИИ С П.3 Ч.6 СТ.66 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.11.2011 ГОДА №323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ» ПРИ ОТСУТСТВИИ У НОВОРОЖДЕННОГО СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕКРАЩАЮТ ПОСЛЕ _____ МИНУТ ОТ ИХ НАЧАЛА

- 1) 30
- 2) 10
- 3) 15
- 4) 45

ВЗЯТЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕПАРАТЫ КОЖИ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ТУПЫМИ И ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМ

- 1) упаковывают в пакет
- 2) фиксируют на картонной подложке
- 3) заливают водой
- 4) вымачивают в растворе ацетона

ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА В ЖЕЛУДОЧНОМ СОДЕРЖИМОМ, БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ В МОЧЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К КРОВИ ОЗНАЧАЕТ О ТОМ, ЧТО ОТ ПРИЕМА СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПРОШЛО НЕ МЕНЕЕ (В ЧАСАХ)

- 1) 9
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 7

ПРИ ОКУКЛИВАНИИ ЛИЧИНКИ ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ПРОИСХОДИТ СОКРАЩЕНИЕ ТЕЛА, И ДЛИНА ЕЕ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИМЕТРАХ)

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 12
- 4) 4

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ИМЕЕТ ПРАВО

- 1) вести переговоры с родственниками покойного по вопросам экспертизы
- 2) уничтожать объекты исследования
- 3) разглашать данные предварительного расследования
- 4) знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы

ПРИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОМ ПОРАЖЕНИИ ПИЩЕВОДА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОБНАРУЖИВАЮТ ЭРОЗИИ

- 1) линейные
- 2) кольцевидные
- 3) спиралевидные
- 4) кратерообразные

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ С ЦЕЛЮ ПОЛУЧЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ВЫГОД ОТНОСЯТ К АГГРАВАЦИИ

- 1) пассивной
- 2) патологической
- 3) активной
- 4) умышленной

ЭЛЕКТРООЖОГИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВЫРАЖЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

- 1) лимфатических узлов
- 2) костной ткани
- 3) нервных стволов
- 4) артерий

ЗАДАЧЕЙ ВРАЧА - СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ОСМОТРЕ МЕСТА АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) решение вопросов о состоянии здоровья членов экипажа
- 2) составление судебно-медицинского диагноза
- 3) формулировка мотивированных выводов
- 4) оказание методической помощи следственным органам

НАСТУПЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ВОЗМОЖНО ОТ

- 1) болезней сердечно-сосудистой системы
- 2) механической травмы
- 3) полного исчезновения физиологических ресурсов
- 4) отравления наркотическими средствами

«ЭЛЕКТРОГЕННАЯ» АСФИКСИЯ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ВСЛЕДСТВИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) обтурации слизию
- 2) отека дыхательных путей
- 3) расслабления дыхательной мускулатуры
- 4) спазма голосовой щели

СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЖИДКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни

4) тяжкий

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 12.05.2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» СРАВНЕНИЕ МЕТОДАМИ ФОТОСОВМЕЩЕНИЯ, СКОЛЬЖЕНИЯ И РЕПЕРАЖА ВЫПОЛНЯЮТ ПРИ _____ РЕЗУЛЬТАТЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПО ОБЩЕГРУППОВЫМ И ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ

1) ложноположительном

2) неопределенном

3) положительном

4) отрицательном

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВОЙСТВ ПРОВОДНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ _____ МЕТОД

1) трасологический

2) электрофоретический

3) контактно-диффузионный

4) биохимический

ЛОКАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН В ВИДЕ ВАЛИКА УПЛОТНЕННОЙ ТКАНИ, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ПРИ УДАРЕ УЗКИМ ПРЕДМЕТОМ ПО МЫШЦЕ ТРУПА, ЯВЛЯЕТСЯ

1) окоченением

2) сухожильным рефлексом

3) трупным аутолизом

4) идиомускулярной опухолью

К ПРИЗНАКАМ РУБЛЕННОЙ РАНЫ ПРИ ПОЛНОМ ПОГРУЖЕНИИ КЛИНА ТОПОРА ОТНОСЯТ

1) веретенообразную форму и острые концы

2) ровные края и М-образные концы

3) круглую форму и размозжённые края

4) треугольную форму и дефект «минус-ткань»

ТУПАЯ ТРАВМА ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

1) лёгкий

2) тяжкий

3) не причинившая

4) средней тяжести

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТАНОЛОМ, ОСЛОЖНИВШИМСЯ ЛАКТАЦИДЕМИЧЕСКОЙ КОМОЙ II-III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) опасность для жизни
- 4) угрожающее жизни состояние

МЫШЕЧНОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, РАЗВИВАЕТСЯ В

- 1) миокарде левого желудочка
- 2) мимической мускулатуре
- 3) мышцах верхних конечностей
- 4) икроножных мышцах

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ КРОМЕ СТАНДАРТНОГО РЕКОМЕНДУЕМОГО ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СЛЕДУЕТ ИЗЪЯТЬ

- 1) мозговые оболочки
- 2) легкие
- 3) почки
- 4) лимфатические узлы

ПРОБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 33% РАСТВОРА ГИДРОКСИДА НАТРИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ В КРОВИ

- 1) метгемоглобина
- 2) карбоксигемоглобина
- 3) метмиоглобина
- 4) карбоксимиоглобина

ТРАВМУ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПРОБУ НА ПНЕВМОТОРАКС ВЫПОЛНЯЮТ

- 1) до вскрытия грудной полости
- 2) после вскрытия полости черепа
- 3) после вскрытия грудной полости
- 4) до вскрытия мягких тканей груди

ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РЕФЛЕКСОВ С ГИПОТРОФИЕЙ МЫШЦ, ЛЕГКИМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий

- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

SPEED BALL СЧИТАЕТСЯ СМЕСЬЮ

- 1) кокаина и героина
- 2) кокаина и димедрола
- 3) героина и димедрола
- 4) кокаина и этанола

ПИРАМИДЫ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ ВСКРЫВАЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1) полости черепа
- 2) аппарата внутреннего уха
- 3) головного мозга
- 4) твердой мозговой оболочки

К МЕСТНЫМ ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ХОД РЕГЕНЕРАЦИИ, ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) структурно-функциональные особенности тканей
- 2) интенсивность обменных процессов
- 3) возраст
- 4) изменения скорости кровотока

ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1) разрешения
- 2) острую
- 3) подострую
- 4) рубцевания

ДЛЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ ИЗЫМАЮТ В ОТДЕЛЬНУЮ ШИРОКОГОРЛУЮ ПЛОТНО ЗАКРЫВАЮЩУЮСЯ _____ СТЕКЛЯННУЮ БАНКУ

- 1) обработанную хромпиком
- 2) стерильную
- 3) химически чистую
- 4) промытую изотоническим раствором хлорида натрия

ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ОБНАРУЖЕНИЯ ГАЗОВЫХ ЭМБОЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) биохимический
- 2) гистологический
- 3) рентгенографический
- 4) судебно-химический

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ОРУЖИЯ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) внутренних органов
- 2) плоских костей
- 3) мышечной ткани
- 4) связочного аппарата

КОМПОНЕНТОМ ДЕЙСТВИЯ КЛЕЯ БФ ПРИ ПРИЕМЕ ВНУТРЬ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ СПИРТ

- 1) бутиловый
- 2) пропиловый
- 3) метиловый
- 4) этиловый

НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ РАЗВИВАЮТСЯ

- 1) аллергические реакции
- 2) оппортунистические инфекции
- 3) патологические переломы
- 4) полиартриты

К ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ СУРЬМЫ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ОТНОСЯТ

- 1) стенки ствола
- 2) пороховой пыж
- 3) капсульный состав
- 4) корпус гильзы

КРИТЕРИИ ЖИВОРОЖДЕНИЯ И МЕРТВОРОЖДЕНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ В

- 1) приказе Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 г. № 194н
- 2) приказе Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 г. № 346н
- 3) ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ
- 4) приказе Минздрава России от 04.12.1992 г. № 318

СЕРО-КОРИЧНЕВАТЫЙ ЦВЕТ ТРУПНЫХ ПЯТЕН НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) оксидом углерода
- 2) этиленгликолем
- 3) цианистым калием
- 4) азотистокислым натрием

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОХОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ЧЕРЕЗ

- 1) печень
- 2) головной мозг
- 3) легкие
- 4) почки

ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЛОМЫ

- 1) костей таза
- 2) плечевой кости
- 3) шейного отдела позвоночника
- 4) бедренной кости

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНФЕКЦИЮ ГЕМОФИЛАМИ АФАНАСЬЕВА-ПФЕЙФФЕРА НА ВИРУСОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ

- 1) костный мозг
- 2) плевральный экссудат
- 3) аммонов рог
- 4) желчь

К ВАСКУЛИТАМ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ СРЕДНЕГО КАЛИБРА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) височный артериит
- 2) узелковый периартериит
- 3) болезнь Бюргера
- 4) неспецифический аортоартериит

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ ОТ 12 МАЯ 2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТОМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИАТОМОВЫЙ ПЛАНКТОН (АЛЬГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТОПЛЕНИЯ В ВОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) поджелудочная железа
- 2) яичник
- 3) моча
- 4) не вскрытая почка в капсуле с перевязанной «ножкой»

ДЫРЧАТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КРЫЛА ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ ОБРАЗУЮТСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ _____ ПРЕДМЕТА

- 1) колющего
- 2) режущего
- 3) пилящего
- 4) рубящего

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ЛЁГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стойкая утрата общей трудоспособности менее 10%
- 2) стойкая утрата общей трудоспособности более 10%
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) расстройство здоровья более 21 дня

К МЕРОПРИЯТИЯМ В СЛУЧАЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ УМЕРШИХ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ

- 1) вакцинацию сотрудников
- 2) заключительную дезинфекцию всех помещений
- 3) оповещение руководства инфекционной больницы
- 4) внеочередной медицинский осмотр персонала

МЕХАНИЗМ «ТРЕНИЕ» ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) двусторонностью, центростремительностью
- 2) односторонностью, центростремительностью
- 3) действием травмирующей силы по касательной
- 4) односторонностью, центробежностью

ДЕМАРКАЦИОННОЕ КОЛЬЦО В МЕСТЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПУПОВИНЫ К БРЮШНОЙ СТЕНКЕ ОБЫЧНО ХОРОШО ВЫРАЖЕНО ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ МЛАДЕНЦА ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1) 1-2
- 2) 12-24
- 3) 48-72
- 4) 3-4

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВЫХ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ И ЛОКТЕВОМ СУСТАВАХ, РАВНОЕ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

ИСТОЧНИКОМ КРОВОТЕЧЕНИЯ В СУБДУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) переходные вены
- 2) артерии Виллизиева круга
- 3) нижние каменистые синусы
- 4) сосуды паренхимы головного мозга

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ГНИЛОСТНОГО РАСПАДА БЕЛКОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) пептоны
- 2) биогенные диамины
- 3) тиоспирты
- 4) тиофенолы

ТАНАТОГЕНЕЗ УТОПЛЕНИЯ В ПРЕСНОЙ ВОДЕ ПО АСПИРАЦИОННОМУ ТИПУ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) гиперволемией
- 2) гиповолемией
- 3) гиперпротеинемией
- 4) гипокалиемией

НОРМА, ЗАПРЕЩАЮЩАЯ ЭКСПЕРТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО СОБИРАТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ, СОДЕРЖИТСЯ В

- 1) части 4 статьи 57 «Эксперт» УПК РФ
- 2) статье 26.5 «Взятие проб и образцов» КоАП РФ
- 3) статье 16 «Обязанности эксперта» ФЗ «О ГСЭД в РФ»
- 4) части 2 статьи 85 «Обязанности и права эксперта» ГПК РФ

ВТОРОЙ ЭКЗЕМПЛЯР ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ

- 1) адвокату
- 2) судебно-медицинскому эксперту
- 3) криминалисту
- 4) понятым

ПРИ АНАЛИЗЕ СМЫВОВ С ПАЛЬЦЕВ РУК, ЛАДОНЕЙ, ГУБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАННАБИНОИДОВ ПРОВОДЯТ

- 1) эмиссионный спектральный анализ
- 2) ИК-спектрометрию
- 3) рентгенфлюоресценцию
- 4) высокоэффективную жидкостную хроматографию

СИМУЛЯЦИЯ ЖЕЛТУХИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ ПРИЕМА

- 1) имодиума
- 2) аллохола
- 3) акрихина
- 4) иммунала

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТ _____ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1) биохимическое
- 2) трасологическое
- 3) медико-криминалистическое
- 4) микробиологическое (вирусологическое)

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ, ПОЛУЧЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДНОГО УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ НЕПРОНИКАЮЩЕЙ ТРАВМЫ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

В ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЯХ ОТРАВЛЕНИЯ КАННАБИНОИДАМИ СМЕРТЬ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ

- 1) плеврита
- 2) отека Квинке
- 3) гастроэнтероколита
- 4) реактивного коллапса

В ЗОНЕ КОНТАКТА С ТРАВМИРУЮЩИМ ПРЕДМЕТОМ ФОРМИРУЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) не прямое
- 2) прямое
- 3) конструкционное
- 4) опосредованное

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ПРИВЕДШУЮ К СПЛЕНЭКТОМИИ И ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА И ЯИЧЕК УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) штангенциркуль
- 2) масштабную линейку
- 3) малый акушерский циркуль
- 4) сантиметровую ленту

О ПРИЖИЗНЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОЖОГ

- 1) слизистой оболочки губ
- 2) роговицы
- 3) трахеи
- 4) кожи лица

К ОСОБЕННОСТЯМ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ ПРИ УДАВЛЕНИИ ПЕТЛЕЙ

ОТНОСЯТ

- 1) замкнутость, равномерность, горизонтальное направление
- 2) косовосходящее направление, равномерность
- 3) незамкнутость, неравномерность
- 4) буро-коричневый цвет

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) опасность для жизни
- 4) угрожающее жизни состояние

УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ ЕГО СГИБАНИИ ОТ 70° ДО 80°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ УМЕРЕННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА СПРАВА С ГИПОТРОФИЕЙ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕМ СИЛЫ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающий жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ II-III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) опасность для жизни
- 3) угрожающее жизни состояние

4) длительное расстройство здоровья

НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ ОТ ДЕЙСТВИЯ ТУПЫХ ПРЕДМЕТОВ, В ПРОТОКОЛЕ НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) положение трупа по отношению к частям дороги
- 2) особенности краев повреждений
- 3) положение оружия
- 4) односторонность повреждений

ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРОТЕКАЕТ ПО ТИПУ

- 1) кистозного поражения
- 2) цирроза
- 3) токсического гепатита
- 4) стеатоза

СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЯГКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООЖОГОВ ФОРМИРУЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1) органах
- 2) костях
- 3) подкожной жировой клетчатке
- 4) нервных стволах

ПО ПРИБЫТИЮ НА МЕСТО ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН

- 1) убедиться в достоверности наступления биологической смерти
- 2) провести секционное исследование
- 3) измерить длину раневого канала
- 4) очистить одежду и тело трупа от загрязнений

В ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ АСФИКСИЕЙ

- 1) странгуляционной
- 2) «электрогенной»
- 3) обтурационной
- 4) компрессионной

В ДИАГНОСТИКЕ СМЕРТИ В СЛУЧАЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ДОНОРА УМЕРШЕГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ УЧАСТИЕ

- 1) врача-торакального хирурга
- 2) врача-анестезиолога-реаниматолога
- 3) лечащего врача
- 4) врача отделения трансплантации

К УСЛОВИЯМ, ЗАТРУДНЯЮЩИМ ТЕПЛООТДАЧУ, ОТНОСЯТ

- 1) неподвижность воздуха
- 2) усиленное питание
- 3) выполнение мышечной работы
- 4) стрессорные реакции

ФРОНТАЛЬНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ ПЕШЕХОДА С ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1) 10
- 2) 6
- 3) 4
- 4) 8

СТОЙКАЯ МЕЛКОПУЗЫРЧАТАЯ ПЕНА В ОБЛАСТИ РТА И НОСА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О/ОБ

- 1) удушении руками
- 2) утоплении в воде
- 3) сдавлении груди и живота
- 4) пребывании трупа в воде

МЕДИЦИНСКИМ КРИТЕРИЕМ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) временная нетрудоспособность более 21 дня
- 2) вред здоровью, опасный для жизни
- 3) временная нетрудоспособность до 3 недель
- 4) кратковременное расстройство здоровья

ПРОЛИФЕРАЦИЯ И НЕКРОБИОТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК ЭПИТЕЛИЯ КАНАЛЬЦЕВ ПОЧЕК ОПИСАНЫ

- 1) Райским
- 2) Десятовым
- 3) Касьяновым
- 4) Пухнаревичем

ВСКРЫВАТЬ УПАКОВКУ С ПОСТУПИВШИМИ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИМЕЕТ ПРАВО

- 1) лаборант
- 2) представитель службы безопасности

- 3) руководитель экспертного учреждения
- 4) врач – судебно-медицинский эксперт, которому поручено производство экспертизы

К ПОВЕРХНОСТНЫМ НЕГЛУБОКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ СТРУКТУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ

- 1) липоидоз
- 2) гиалиноз
- 3) мукоидное набухание
- 4) амилоидоз

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СПОРНЫХ ПОЛОВЫХ СОСТОЯНИЙ ОТНОСИТСЯ К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ

- 1) трасологии
- 2) травматологии
- 3) гинекологии
- 4) криминалистике

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ МОЧЕТОЧНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЖИДКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) легкий

К ОПАСНОМУ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОТНОСЯТ

- 1) открытый вывих кисти
- 2) открытый вывих плеча
- 3) проникающее ранение черепа

4) закрытый перелом лодыжки малоберцовой кости

ПРИ СВЕЖИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЛАГАЛИЩА МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ НЕ РАНЕЕ ____ СУТОК

- 1) 1-2
- 2) 10-12
- 3) 5-6
- 4) 3-4

УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЕМ, ОБУСЛОВЛЕННЫМ МНОЖЕСТВЕННОЙ ОККЛЮЗИЕЙ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ КАПЛЯМИ ЖИРА, ЯВЛЯЕТСЯ СИНДРОМ ____ ЭМБОЛИИ

- 1) пузырьной
- 2) воздушной
- 3) жировой
- 4) газовой

ЗАКРЫТЫЙ НАДБУГОРКОВЫЙ ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ДЛЯ УДОБСТВА ВСКРЫТИЯ А.И. АБРИКОСОВ РЕКОМЕНДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ ПРАВОЕ ЛЕГКОЕ ____ К ВСКРЫВАЮЩЕМУ

- 1) реберным краем
- 2) верхней долей
- 3) диафрагмальной поверхностью
- 4) верхушкой

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

ТРУПНУЮ КРОВЬ ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРУТ ИЗ

- 1) сердца
- 2) аорты

- 3) нижней полой вены
- 4) подключичной артерии

ФОРМА КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОБЫЧНО ЩЕЛЕВИДНАЯ ИЛИ ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ, ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ КРАЕВ ЧАЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) криволинейной
- 2) округлой
- 3) осаднённой
- 4) прямолинейной

ПРИ ОСТРОЙ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1) красного опеченения
- 2) выздоровления
- 3) ожирения
- 4) серого опеченения

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТУПОЙ ТРАВМЫ ШЕИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ ГОРТАНИ ПРИ НАЛИЧИИ КЛИНИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

РАССАСЫВАНИЕМ ОГРАНИЧЕННОГО УЧАСТКА КОСТНОЙ ТКАНИ БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАМЕЩЕНИЯ ДРУГОЙ ТКАНЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) остеомалация
- 2) остеоклазия
- 3) остеолиз
- 4) остеодистрофия

ЭМБРИОНАЛЬНАЯ СМЕНА ВОЛОС ПРОИСХОДИТ В

- 1) ранний плодный период внутриутробного развития плода
- 2) период эмбриогенеза
- 3) течение первых трех суток жизни
- 4) первые три месяца

ШОК ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ТОРПИДНОЙ ФАЗЫ СООТВЕТСТВУЕТ ТЯЖЕСТИ

- 1) лёгкой
- 2) средней
- 3) тяжёлой
- 4) терминальной

ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРИОБРЕТАЕМЫМИ В ПРОЦЕССЕ

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) карантинными
- 2) конвенционными
- 3) оппортунистическими
- 4) внутрибольничными

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ХОЛОСТОМ ВЫСТРЕЛЕ, ВЫПОЛНЕННОМ В ПРЕДЕЛАХ I ЗОНЫ БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ, ОКАЗЫВАЕТ

- 1) пламя
- 2) пуля
- 3) пыж
- 4) дуло

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛЕВОЙ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПРИ ТЕПЛОВОМ РАВНОВЕСИИ ОТДАЧА ТЕПЛА ИЗЛУЧЕНИЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 20-25
- 2) 40-46
- 3) 10-15
- 4) 30-38

СМЕРТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СТРОЧКАМИ ОБЫЧНО НАСТУПАЕТ ОТ ____ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- 1) почечной
- 2) печеночной
- 3) дыхательной
- 4) церебральной

НАПРАВЛЕНИЕ РАНЕВОГО ПУЛЕВОГО КАНАЛА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО

- 1) направлению начального отрезка раневого канала
- 2) локализации повреждений одежды
- 3) форме повреждения фасций
- 4) локализации повреждений кожных покровов

ПРИ ВЫСТРЕЛЕ С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ В ТРЕТЬЕЙ ЗОНЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЕЙСТВУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЫСТРЕЛА

- 1) зёрна пороха и металлические частицы

- 2) пламя и металлические частицы
- 3) зёрна пороха и пороховые газы
- 4) копоть выстрела и металлические частицы

ОТСУТСТВИЕ ВЕРХНЕЙ ПРАВОЙ КОНЕЧНОСТИ И ПРАВОЙ ЛОПАТКИ ВСЛЕДСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 80%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ОТКРЫТЫЙ ЛОННЫЙ ВЫВИХ БЕДРА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ЛОСКУТНЫЕ КРАЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РАН

- 1) колото-рубленых
- 2) ушибленных
- 3) укушенных
- 4) колото-резаных

СМЕЩЕНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ И РОСТ ТРЕЩИНЫ ПОПЕРЁК ЕЁ ФРОНТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ФОРМИРОВАНИИ СДВИГА

- 1) продольного
- 2) поперечного
- 3) секторального
- 4) диагонального

ОБРАЗОВАНИЕ ПЯТЕН ВИШНЕВСКОГО ОБУСЛОВЛЕНО

- 1) резкими колебаниями артериального давления
- 2) острым нарушением трофики стенки желудка
- 3) токсическим действием окиси углерода
- 4) понижением проницаемости сосудистой стенки

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА ПРИ СДАВЛЕНИИ ГОЛОВЫ В НАПРАВЛЕНИИ СВЕРХУ-ВНИЗ ЗАВИСИТ ОТ

- 1) положения тела
- 2) положения головы по отношению к позвоночнику
- 3) формы тела

4) позы тела

К ОСТРЫМ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ

- 1) пневмонию
- 2) бронхит
- 3) альвеолит
- 4) трахеит

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ (ПРОИСШЕСТВИЯ) ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТУПЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ОТМЕЧАЕТ

- 1) особенности ложа трупа
- 2) повреждения на теле
- 3) следы волочения на одежде и теле
- 4) состояние одежды и обуви

СМЕРТЬ ПРИ ОБЩЕМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА НАСТУПАЕТ ОТ _____ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- 1) почечной
- 2) дыхательной
- 3) надпочечниковой
- 4) печеночной

ВЫРАЖЕННЫМ ГЕМОЛИЗОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ОТРАВЛЕНИЕ

- 1) этиленгликолем
- 2) четырёххлористым углеродом
- 3) атропином
- 4) строчками

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЛИ НА ШЕЕ (ПРИ ОТСУТСТВИИ НА НЕЙ УЗЛА) СЧИТАЮТ «АТИПИЧНЫМ», ЕСЛИ ОНА

- 1) сдавливает в основном правую или левую поверхность шеи
- 2) сдавливает заднюю и частично боковые поверхности
- 3) располагается между подбородком и ртом, через рот, ниже носа
- 4) сдавливает переднюю и в меньшей степени боковые поверхности

НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПРОИСХОДЯЩЕЕ ПРИ ПОРАЖЕНИИ КОРКОВЫХ СТРУКТУР МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) афазией
- 2) апраксией
- 3) амнезией
- 4) агнозией

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗКО СОГНУТОМ ЕГО ПОЛОЖЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В

СУСТАВАХ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

ДЛЯ МЕХАНИЗМА «СДАВЛЕНИЕ» ХАРАКТЕРНЫ

- 1) двусторонность, центростремительность
- 2) односторонность, центростремительность
- 3) односторонность, центробежность
- 4) двусторонность, центробежность

К ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ПЯТНАМ В ВИДЕ ПОЛОС ОТНОСЯТ

- 1) кровоподтек
- 2) петехию
- 3) вибекс
- 4) экхимозы

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГЕМОТОРАКС ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ЖИЗНЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРОТЕКАЮТ В ПРЕДЕЛАХ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1) 38-39
- 2) 40-41
- 3) 33-34
- 4) 36-37

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ПРИКУСА И АКТА ЖЕВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ОТРАВЛЕНИЕ НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ВЕЩЕСТВОМ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ, У ДЕТЕЙ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившее
- 2) лёгкий

- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 12.05.2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ОТОЖДЕСТВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПРОВОДИТСЯ

- 1) сравнение по общегрупповым признакам
- 2) исследование представленного сравнительного материала
- 3) раздельное анатомо-морфологическое исследование идентифицируемых объектов
- 4) сравнение методами фотосовмещения

ГЛУБИНА РАНЕВОГО КАНАЛА МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНУ КЛИНКА ПРИ УДАРЕ НОЖОМ В ОБЛАСТЬ

- 1) живота
- 2) головы
- 3) лопатки
- 4) бедра

ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПА ПО МЕТОДУ ШОРА ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ

- 1) извлекаются единым целым и исследуются без отделения от органокомплекса
- 2) извлекаются и исследуются отдельно
- 3) извлекаются и исследуются в пяти топографических комплексах
- 4) вскрываются и исследуются на месте, без извлечения из трупа

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) некрозы мышечных волокон
- 2) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 3) спиралевидное скручивание мышечных волокон и ядер в мышечном слое
- 4) некрозы жировых клеток

ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) биологические выделения
- 2) огнестрельные повреждения тела человека
- 3) следы крови на одежде
- 4) волосы

В УСТАНОВЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ К ОПЛОДОТВОРЕНИЮ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1) крови

- 2) эякулята
- 3) слюны
- 4) мочи

ДРЕВЕСНЫМ СПИРТОМ НАЗЫВАЕТСЯ СПИРТ

- 1) изоамиловый
- 2) бутиловый
- 3) метиловый
- 4) пропиловый

**РЕКТАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 10 ЧАСОВ
МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ) (ПО В.В. БИЛКУНУ, 1985)**

- 1) 36,6
- 2) 37,1
- 3) 34,6
- 4) 30,1

**КОЛОТО-РЕЗАНУЮ РАНУ ШЕИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА С РАЗВИТИЕМ УГРОЖАЮЩЕГО ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯ,
КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

**ОБИЛЬНАЯ КРОВОПОТЕРЯ ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ КРОВОПОТЕРЕ _____% ОБЪЁМА
ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ**

- 1) 35
- 2) 40
- 3) 50
- 4) 45

КЛИНОК ФИНСКОГО НОЖА ОБЛАДАЕТ

- 1) 2 лезвиями
- 2) 1 лезвием
- 3) 4 лезвиями
- 4) 3 лезвиями

**СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА
ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ**

- 1) приказа Министра здравоохранения
- 2) приказа руководителя экспертного учреждения
- 3) распоряжения главного врача
- 4) постановления следователя

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) очагов панкреонекроза значительной протяженности
- 2) рыхлой волокнистой соединительной ткани стромы
- 3) однослойного плоского эпителия вставочных выводных протоков
- 4) кубического эпителия межацинарных выводных протоков

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУПА РЕБЕНКА ТЕРМОМЕТР ВВОДЯТ В ПРЯМУЮ КИШКУ НА ГЛУБИНУ (В САНТИМЕТРАХ)

- 1) 15
- 2) 3
- 3) 10
- 4) 5

ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАНое РАНЕНИЕ ЛЕВОГО БЕДРА С РАССЕЧЕНИЕМ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ПОВРЕЖДАЮЩИМ ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) иммунный статус
- 2) возраст потерпевшего
- 3) материальное тело
- 4) пол потерпевшего

НАЛИЧИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОБ

- 1) Гоппе – Зейлера
- 2) Бокариуса
- 3) Шинкаренко – Мохова
- 4) Галена – Шрейера

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКЕЛЕТИРОВАННОГО ТРУПА В ПРОТОКОЛЕ НЕОБХОДИМО ОПИСАТЬ

- 1) механизм наступления смерти
- 2) расстояние между отдельными костями и костными конгломератами
- 3) степень мышечного окоченения
- 4) признаки возможной профессиональной деятельности

К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ КОПОТИ ВЫСТРЕЛА БЕЗДЫМНЫМ ПОРОХОМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) актиноиды

- 2) галогены
- 3) газы
- 4) металлы

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ПРИВЕДШУЮ К ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ И ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) угрожающей жизни
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

СТОЙКАЯ УТРАТА ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ПРОЦЕНТАХ КРАТНО

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 6

У ВДАВЛЕННОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА ПРИЗНАКИ РАСТЯЖЕНИЯ НА НАРУЖНОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИНКЕ ФОРМИРУЮТСЯ В ОБЛАСТИ _____ ЛИНИИ

- 1) поперечной
- 2) радиальной
- 3) концентрической
- 4) меридиональной

ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА 1 ДОЛЖНОСТЬ НА ____ ЭКСПЕРТИЗ В ГОД

- 1) 20
- 2) 30
- 3) 40
- 4) 50

К ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫМ ОБЪЕКТАМ ОТНОСЯТ

- 1) скелетируемые останки
- 2) прижизненную видеосъемку
- 3) биопсийные гистологические материалы
- 4) выпавшие при жизни зубы

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ ФАЗ ТЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ФАЗА

- 1) острой плазмопотери
- 2) травматического шока

- 3) септикотоксемии
- 4) токсемии

ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ТИПУ ФОР-II ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ

- 1) основание альвеолярного отростка к крыльям основной кости
- 2) носовые кости, внутреннюю стенку и дно глазницы к крыловидным отросткам основной кости
- 3) корень носа, глазницу, нижнюю глазничную щель к скуловой дуге
- 4) лобно-скуловой шов и скуловую дугу на чешую височной кости к височно-теменному шву

ОТЕК ЛЕГКИХ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ВЫРАЖЕННОЙ ГИПЕРЕМИЕЙ, ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ТРАВМЫ

- 1) электрической
- 2) термической
- 3) химической
- 4) механической

УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ (ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТОЛОВЫХ СИМПТОМОВ) КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ В СЛУЧАЯХ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ УТОЧНЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ____ ОБСЛЕДУЕМОГО

- 1) осмотра
- 2) допроса
- 3) опроса
- 4) исследования

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ (В ГОДАХ)

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 1

ОТ ДЕЙСТВИЯ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ЛЕЗВИЯ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА ОБРАЗУЕТСЯ

- 1) Т-образный конец раны
- 2) обушковый разрез

- 3) лезвийная часть основного разреза
- 4) П-образный конец раны

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ КРУПНЫХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРОБУ НА

- 1) воздушную эмболию
- 2) гемоторакс
- 3) гемоперикард
- 4) перитонит

ОЖОГИ ОБОИХ БЁДЕР И ЖИВОТА ПО «ПРАВИЛОМ ДЕВЯТОК» СОСТАВЛЯЮТ ПЛОЩАДЬ, РАВНУЮ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 27
- 2) 45
- 3) 63
- 4) 18

ПРИ ТЕПЛОВОЙ ТРАВМЕ СМЕРТЬ НАСТУПАЕТ ОТ

- 1) фибрилляции желудочков сердца
- 2) паралича дыхательного центра
- 3) почечной недостаточности
- 4) отека головного мозга

ИССЛЕДУЯ ТРУП НОВОРОЖДЕННОГО, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ДОЛЖЕН ПРОВЕСТИ ПЛАВАТЕЛЬНУЮ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНУЮ ПРОБУ

- 1) Бреслау
- 2) Бокариуса
- 3) Сунцова
- 4) Мишина

ПЕРИОД СЕРОНЕГАТИВНОГО ОКНА У ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МЕСЯЦАХ)

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 14

ПО МЕТОДУ АБРИКОСОВА ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ ИЗВЛЕКАЮТСЯ И ИССЛЕДУЮТСЯ В _____ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 9
- 4) 7

К НЕМЕДИЦИНСКИМ МАРКЕРАМ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОТНОСЯТ

- 1) трупное высыхание
- 2) трупные пятна
- 3) информацию соседей и других лиц
- 4) трупное окоченение

КОЛЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) П-образного обуха
- 2) фальш лезвия
- 3) режущей кромки
- 4) острого конца

ДЛЯ РАНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДЬЮ ВЫСТРЕЛОВ ХАРАКТЕРНО

- 1) наличие пересекающихся раневых каналов
- 2) наличие признаков выстрела с разной дистанции
- 3) беспорядочное расположение входных отверстий
- 4) расположение входных отверстий цепочкой

ТРЕТЬЕЙ СТАДИЕЙ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЯ

- 1) гидремическая
- 2) ретикулярного криза
- 3) восстановления
- 4) коллапса

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЦИКУТОЙ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ботанический
- 2) химико-токсикологический
- 3) иммуногистохимический
- 4) биохимический

СМЕРТЬ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ТОКОМ СИЛОЙ (В АМПЕРАХ)

- 1) 0,001-0,002
- 2) 0,01-0,05
- 3) 0,004-0,005
- 4) 0,002-0,003

ТУПУЮ ТРАВМУ ШЕИ С РАЗРЫВОМ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ПЯСТНЫХ

КОСТЕЙ, РАВНОЕ 65% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПЕРЕЛОМ ТЕЛА НЕСКОЛЬКИХ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

РАНУ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В КЛЕТЧАТКУ СРЕДОСТЕНИЯ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИЖИЗНЕННОСТИ ОЖГОВОЙ ТРАВМЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ ОСНОВАНО НА ОБНАРУЖЕНИИ

- 1) карбоксигемоглобина в концентрации менее 10%
- 2) «позы боксера»
- 3) копоты в глубоких отделах дыхательных путей и альвеолах
- 4) обширных эпидуральных гематом

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА ТЕЛА ЧЕТВЁРТОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВНЕУТРОБНОЙ ЖИЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО

- 1) распространенности воздуха в желудочно-кишечном тракте
- 2) массе тела
- 3) гистологической картине печени
- 4) длине тела

ПРИ КОЛОТОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ПЛОСКОЙ КОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ ПЕРЕЛОМ

- 1) вдавленный
- 2) дырчатый
- 3) паутинообразный
- 4) террасовидный

В МЕСТЕ КОНТАКТА С ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ОБРАЗУЮТСЯ

- 1) электроожоги
- 2) раны
- 3) кровоподтеки
- 4) гематомы

НЕОНАТАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОД

- 1) внутриутробный
- 2) грудной
- 3) новорожденности
- 4) дошкольный

К ПОСМЕРТНОМУ РАЗЛОЖЕНИЮ БЕЛКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ ЭНДОФЕРМЕНТОВ ОТНОСЯТ

- 1) стаз
- 2) имбибицию
- 3) гипостаз
- 4) трупный аутолиз

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ ЕГО РАЗГИБАНИИ ОТ 0° ДО 5°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ НА ОДИН ГЛАЗ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) длительности расстройства здоровья
- 2) опасности для жизни
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) развития угрожающего жизни состояния

ОБНАРУЖЕНИЕ В ПРОСВЕТЕ КРУПНЫХ СОСУДОВ КРАСНЫХ, СМЕШАННЫХ ИЛИ БЕЛЫХ СВЕРТКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1) коротком агональном периоде
- 2) смерти без агонального периода
- 3) длительной агонии
- 4) смерти от сепсиса

РВАНАЯ РАНА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ПРЯМОЙ КИШКИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В КЛЕТЧАТКУ МАЛОГО ТАЗА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившая
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

РАССТОЯНИЕ ОТ ПУПКА ДО МЕЧЕВИДНОГО ОТРОСТКА ГРУДИНЫ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1) 9-10
- 2) 12-13
- 3) 5,7-5,8
- 4) 7,2-7,3

РАНУ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПРОСВЕТ ГОРТАНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТНУЮ КОМИССИЮ ИМЕЕТ ПРАВО ВОЗГЛАВЛЯТЬ

- 1) главный врач
- 2) начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы
- 3) судья
- 4) следователь

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ КАРДИОСКЛЕРОЗ, КАК ПРАВИЛО, РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) эндокардита
- 2) васкулита
- 3) миокардита
- 4) атеросклероза коронарных артерий

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) нарушения ионного равновесия
- 2) отравления парами расплавленных частей установок
- 3) изменения поляризации клеточных мембран
- 4) кислородного голодания

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОДИНОЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ТЕТРАПЛЕГИЮ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

МИКРОСКОПИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ РАК ПЕЧЕНИ

- 1) монолобулярный
- 2) крупноузловой
- 3) мультилобулярный
- 4) диффузный

ОТСУТСТВИЕМ В ЭЯКУЛЯТЕ СЕМЕННЫХ НИТЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) азооспермия
- 2) астеноспермия
- 3) некроспермия
- 4) олигоспермия

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМА ВЫДЕЛЯЮТ

- 1) неполные
- 2) поднадкостничные
- 3) поперечные
- 4) патологические

ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ТАЗА ПО ТИПУ «БАБОЧКИ» КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинивший
- 4) средней тяжести

ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЛЕВОЙ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ В УПОР ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) ионизирующим
- 2) охлаждающим
- 3) световым
- 4) термическим

СУЛЬФГЕМОГЛОБИН И СУЛЬФМИОГЛОБИН ПРИДАЮТ КОЖНЫМ ПОКРОВАМ И ВНУТРЕННИМ ОРГАНАМ ____ ЦВЕТ

- 1) грязно-зеленый
- 2) ярко-красный
- 3) сине-фиолетовый
- 4) темно-коричневый

УРЕМИЧЕСКАЯ КОМА РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ НАКОПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ

- 1) нуклеиновых кислот
- 2) азотистых метаболитов
- 3) биофлавоноидов
- 4) ретиноловых эфиров

ОТСУТСТВИЕ ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ КОНЕЧНОСТИ И ЛЕВОЙ ЛОПАТКИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 75%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

В ОСНОВЕ ТРУПНОГО ВЫСЫХАНИЯ ЛЕЖИТ

- 1) испарение влаги после прекращения выделительной функции потовых желез
- 2) распад аденозинтрифосфорной кислоты
- 3) стекание крови под действием силы тяжести
- 4) действие протеолитических ферментов

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВСКРЫТИЕ МИНИМУМ ____ ПОЛОСТИ/ПОЛОСТЕЙ

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 3

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НАКОПЛЕНИИ

- 1) гистамина
- 2) катехоламина
- 3) адреналина

4) ацетилхолина

ПРИ ТРЕНИИ ТРАВМИРУЮЩАЯ СИЛА ДЕЙСТВУЕТ В НАПРАВЛЕНИИ

- 1) центростремительном
- 2) тангенциальном
- 3) перпендикулярном
- 4) центробежном

КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ ДВУХ И БОЛЕЕ СМЕЖНЫХ ПОЗВОНКОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА И ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

О ПОЯВЛЕНИИ ПОЗДНИХ ТРУПНЫХ ЯВЛЕНИЙ СУДЯТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ

- 1) мышечного окоченения
- 2) трупной зелени
- 3) участков высыхания слизистых оболочек
- 4) идиомускулярной опухоли

ПРОБА ВЕНТА-ВРЕДЕНА ОСНОВАНА НА ЯВЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОЗДУХА В

- 1) желудок
- 2) легкие
- 3) гайморову пазуху
- 4) слуховую трубу

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ ОДНОГО СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

РЕЗУЛЬТАТЫ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРПЕВШЕЙ ИЛЛЮСТРИРУЮТ ФОТОГРАФИЯМИ ИЛИ СХЕМАМИ ПРИ НАЛИЧИИ

- 1) распоряжения главного врача
- 2) разрешения следователя
- 3) добровольного согласия обследуемой
- 4) разрешения адвоката

К ПРИЧИНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) появление напряжения на металлических частях электрооборудования, не

находящихся под напряжением

- 2) прикосновение к токоведущим проводникам низкого напряжения руками в резиновых перчатках
- 3) касание включенных электроприборов сухими руками
- 4) касание отключенных электроприборов мокрыми руками

ДЛЯ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФИКСАЦИЮ КУСОЧКОВ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ В ФОРМАЛИНЕ ПРОВОДЯТ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1) 2-4
- 2) 1-2
- 3) 5-6
- 4) 4-5

ПРИ ФИБРИНОИДНОМ НАБУХАНИИ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА, ПРОПИТАННЫЕ БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ, ОКРАШИВАЮТСЯ ПИКРОФУКСИНОМ В _____ ЦВЕТ

- 1) желтый
- 2) красный
- 3) синий
- 4) черный

СУЖЕНИЕ ИЛИ РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, В СРЕДНЕМ, ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ДО ____ ЧАСОВ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1) 10
- 2) 24
- 3) 6
- 4) 15

ПРИ УДАРЕ КЛИНКОМ ФИНСКОГО НОЖА В ПРАВУЮ ТЕМЕННУЮ ОБЛАСТЬ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ ФОРМИРУЕТСЯ ПЕРЕЛОМ

- 1) террасовидный
- 2) дырчатый
- 3) фрагментарно-оскольчатый
- 4) паутинообразный

ПОД ЭНДОКАРДОМ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ ОБНАРУЖИВАЮТ ПЯТНА

- 1) Мантойфеля – Ленье – Левастина
- 2) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа
- 3) Мондора
- 4) Минакова

ЗАКРЫТЫЙ ЧРЕЗВЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

_____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

**СЕРДЦЕ ПРИ ВСКРЫТИИ ПО ТОКУ КРОВИ КЛАДУТ НА СТОЛИК _____ К
ВСКРЫВАЮЩЕМУ**

- 1) левым желудочком
- 2) верхушкой
- 3) основанием
- 4) правым желудочком

КЛИНОК КОРТИКА ОБЛАДАЕТ _____ЛЕЗВИЯМИ

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 4

**ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В
ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ (СГИБАНИЕ – 30°-40°), ВЫЗВАВШЕЕ 10%
СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК
ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОД, РОЖДЕННЫЙ НА _____ НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ

- 1) 44-46
- 2) 26-28
- 3) 37-42
- 4) 34-36

КО 2 НЕДЕЛИ ГЕПАТОЗА РАЗВИВАЕТСЯ СТАДИЯ _____ ДИСТРОФИИ

- 1) желтой
- 2) красной
- 3) серой
- 4) смешанной

**ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ РЕЗКУЮ ДЕФОРМАЦИЮ, АТРОФИЮ МЫШЦ ПРАВОГО
ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ,
РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести

- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ УМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) угрожающий жизни
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ИСТОЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА ПРИ ПЕРЕГРЕВАНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗВИТИЕМ

- 1) сильной головной боли
- 2) рефлекторной возбудимости
- 3) сердечно-сосудистой недостаточности
- 4) предагонального состояния

ЗАКРЫТЫЙ ОКОЛОСУСТАВНОЙ ПЕРЕЛОМ АНАТОМИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ОСМОТР ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С УЧАСТИЕМ

- 1) нотариуса
- 2) фотографа
- 3) понятых
- 4) руководителя органа управления здравоохранением

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ЛЕГКОГО КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 2) вытягивание ядер базального слоя эпидермиса с образованием «щеток»
- 3) некрозы мышечных волокон
- 4) некрозы жировых клеток

ПЕРЕЛОМ В ФОРМЕ ИЗОГНУТОГО СТЕРЖНЯ ИЛИ БРУСА ПРИ РАЗГИБАНИИ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) разгибательным
- 2) сгибательным
- 3) сколоченным
- 4) спиральным

СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТВЕРДОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) угрожающий жизни
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

ПРИ КОЛОТОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СВОДА ЧЕРЕПА, ПРИЧИНЕННЫМ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ, ФОРМИРУЕТСЯ ПЕРЕЛОМ

- 1) паутинообразный
- 2) оскольчато-фрагментарный
- 3) террасовидный
- 4) дырчатый

ПО НАЛИЧИЮ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ РАЗЛИЧАЮТ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- 1) винтообразные
- 2) проникающие
- 3) открытые
- 4) непроникающие

ТРАВМУ ШЕИ С ОТРЫВОМ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) временный
- 4) лёгкий

ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ОРГАНОМ ИЛИ ЛИЦОМ, НАЗНАЧИВШИМ ЭКСПЕРТИЗУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЗЯТИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) лимфатических узлов кишечника
- 2) семенной жидкости
- 3) соскобов со слизистой оболочки зева
- 4) содержимого желудка

ОБЪЕМ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1) врач – судебно-медицинский эксперт
- 2) прокурор
- 3) дознаватель
- 4) адвокат

ТРУПНЫЙ АУТОЛИЗ НАЧИНАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ В

- 1) легких
- 2) головном мозге
- 3) поджелудочной железе
- 4) сердце

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ (РАЗГИБАНИЕ/РАЗГИБАНИЕ – 30°-40°), ВЫЗВАВШЕЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ОБЫЧНО УСТАНОВЛИВАЮТ СПОСОБНОСТЬ К

- 1) зачатию ребенка
- 2) половому сношению
- 3) рождению ребенка
- 4) вынашиванию ребенка

ЗАБОР КРОВИ ИЗ ТРУПА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ

- 1) поверхностных вен
- 2) полостей сердца
- 3) поверхностных артерий
- 4) полостей трупа

УШИБЛЕННАЯ РАНА МОРФОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) отсутствием тканевых перемычек

- 2) ровными неосаждёнными краями
- 3) ровным пересечением стержней волос
- 4) неровными осаждёнными краями

В СЛУЧАЕ, КОГДА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ОБНАРУЖЕНО ДЕЙСТВИЕ ТОЛЬКО ПУЛИ, ВЕРОЯТНО ВЫСТРЕЛ ПРОИЗВЕДЕН

- 1) с близкого расстояния
- 2) с дистанции, превышающей расстояние действия дополнительных факторов выстрела
- 3) в герметичный упор
- 4) в неплотный упор

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ МЕТАНОЛОМ НА СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ КРОВЬ ИЗ СИНУСОВ ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ НЕ МЕНЕЕ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 70
- 2) 100
- 3) 50
- 4) 10

К СТАЦИОНАРНОЙ АМНЕЗИИ ОТНОСЯТ

- 1) способность забывать факты из личной жизни
- 2) стойкую потерю памяти
- 3) нарушение памяти на текущие события
- 4) способность сохранять память на универсальные знания

К ОБЯЗАННОСТЯМ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) проведение внутреннего исследования
- 2) вскрытие головного мозга
- 3) определение наличия телесных повреждений
- 4) формулирование судебно-медицинского диагноза

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ НЕПОДВИЖНОСТЬ ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО, ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО И МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВОВ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНУЮ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

ПРИЗНАКОМ НОВОРОЖДЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сыровидная смазка

- 2) длина пуповины 50 см
- 3) эластичность хрящей носа
- 4) кефалогематома

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 60% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

В БЕЛЕНЕ ЧЕРНОЙ, ДУРМАНЕ И БЕЛЛАДОННЕ СОДЕРЖАТСЯ АЛКАЛОИДЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ____ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) кардиотоксическим
- 2) нефротропным
- 3) нейротропным
- 4) гепатотоксическим

ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ СТЕНКИ ПРАВОЙ ГЛАЗНИЦЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ПЛОХИМ ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) мышечное волокно
- 2) нервный ствол
- 3) тканевая жидкость
- 4) кость

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

КЕФАЛОГЕМАТОМА, КАК ПРАВИЛО, ПОЛНОСТЬЮ РАССАСЫВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1) 0,5-1
- 2) 1-1,5
- 3) 2-12

4) 20-24

УЧАСТОК СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ЗАМЕЩАЮЩИЙ ДЕФЕКТ КОЖИ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТУПОЙ ТРАВМЫ, НАЗЫВАЮТ

- 1) невусом
- 2) рубцом
- 3) комедоном
- 4) папилломой

ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ОГНЕСТРЕЛЬНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сквозной характер ранения
- 2) порох в раневом канале
- 3) дефект «минус-ткань»
- 4) дырчатый перелом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА НАПРАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С

- 1) оружием
- 2) объектами исследований
- 3) легковоспламеняющимися веществами
- 4) наркотическими средствами

НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ ХОРОШО РАЗЛИЧИМЫ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1) 45
- 2) 25
- 3) 35
- 4) 40

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ СКОРОПОСТИЖНОЙ СМЕРТИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ____ СИСТЕМЫ

- 1) мочевыделительной
- 2) дыхательной
- 3) сердечно-сосудистой
- 4) пищеварительной

ДЛИТЕЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВРЕМЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ И/ИЛИ СИСТЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ (В ДНЯХ)

- 1) 14
- 2) 12
- 3) 21
- 4) 10

ПРИ ОСТРОЙ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1) разгара

- 2) красного опеченения
- 3) серого опеченения
- 4) ожирения

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ОРИЕНТИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ В ОТНОШЕНИИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) подкожная эмфизема груди
- 2) «голова медузы» на передней стенке живота
- 3) односторонний миоз
- 4) желтушность кожи

ПИЩЕВОЕ СОДЕРЖИМОЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОПАДАЕТ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ ИЗ ЖЕЛУДКА В 12-ПЕРСТНУЮ КИШКУ В ТЕЧЕНИЕ (В ЧАСАХ)

- 1) 2-4
- 2) 1-2
- 3) 4-6
- 4) 6-10

ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРОСВЕТЫ КАНАЛЬЦЕВ В НАЧАЛЬНОЙ ШОКОВОЙ СТАДИИ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ КРИСТАЛЛЫ

- 1) креатинина
- 2) миоглобина
- 3) мочевины
- 4) карбоксигемоглобина

НЕСРОСШИЙСЯ ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ В ОБЛАСТИ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАФИЗА ПРАВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) временный
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ОФОРМЛЯЕТ

- 1) акт судебно-медицинской экспертизы
- 2) справку о проведении освидетельствования
- 3) справку о вреде здоровья
- 4) заключение эксперта

МЕРИДИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМОВ СВОДА И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ПРИ СДАВЛЕНИИ ГОЛОВЫ С БОКОВ РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1) продольно

- 2) поперечно
- 3) циркулярно
- 4) диагонально

ПО ХАРАКТЕРУ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТИ ПЕРЕЛОМЫ МОГУТ БЫТЬ

- 1) закрытыми
- 2) полными
- 3) травматическими
- 4) проникающими

БОЛЬШОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВЫ ПЛОДА СООТВЕТСТВУЕТ РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ

- 1) центром большого родничка и затылочным бугром
- 2) лобными буграми
- 3) теменными буграми
- 4) переносицей и затылочным бугром

ХИМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ОКАЗЫВАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- 1) металлические частицы
- 2) зёрна пороха
- 3) пороховые газы
- 4) частицы копоти

КОЛОТО-РЕЗАННОЕ ПРОНИКАЮЩЕЕ РАНЕНИЕ ЖИВОТА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И КРУПНЫХ СОСУДОВ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ПО ВИДУ ОБМЕНА РАЗЛИЧАЮТ ДИСТРОФИИ

- 1) паренхиматозные
- 2) минеральные
- 3) смешанные
- 4) мезенхимальные

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, НАЗНАЧАЮТ ЭКСПЕРТИЗУ

- 1) дополнительную
- 2) повторную
- 3) комиссионную
- 4) комплексную

КАПСЮЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

- 1) придания движения пуле
- 2) подачи следующего патрона
- 3) создания высокой температуры внутри канала ствола
- 4) воспламенения пороха

ПРИ ВСКРЫТИИ РЕБЕРНЫЙ НОЖ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

- 1) препаровки
- 2) исследования органов эвисцерированного органокомплекса
- 3) разреза хрящевой ткани ребер
- 4) рассечения кожи и эвисцерации органокомплекса

**ОСМОТР И ОПИСАНИЕ ОДЕЖДЫ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ПРОВОДИТСЯ В _____
СТАДИЮ**

- 1) заключительную
- 2) динамическую
- 3) статическую
- 4) судебную

ПОСМЕРТНЫЕ ЭКХИМОЗЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В

- 1) эпидермисе
- 2) дерме
- 3) подкожной клетчатке
- 4) мышечной ткани

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ДВУХЛЕЗВИЙНОГО КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА НА
ТКАНИ И ОРГАНЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) расщеплении и раздвигании
- 2) рассечении и раздвигании
- 3) раздвигании и размозжении
- 4) размозжении и расщеплении

**ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ РЕЗКО ВЫРАЖЕННУЮ КОНТРАКТУРУ ЛЕВОГО
ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (СГИБАНИЕ – 0°-15° И РАЗГИБАНИЕ – 0°-15°), РАВНУЮ
20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК
ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

**ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ,
ПОЛУЧЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК
ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ**

- 1) тяжкий

- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

ПОВОДОМ ДЛЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) определение факта побоев
- 2) установление истязания
- 3) определение обезображения лица
- 4) подозрение на искусственные болезни

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) угрожающий жизни

ЯДРА ШИПОВАТОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВЕ МОГУТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ

- 1) «снежинок»
- 2) «метелок»
- 3) «гирлянд»
- 4) «бус»

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТУПОЙ ТРАВМЫ ПАХА С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (ПРИ НАЛИЧИИ КЛИНИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

МИОМАЛЯЦИЯ В ИСХОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В СУТКАХ)

- 1) 7-10
- 2) 14-24
- 3) 3-6
- 4) 1-2

ВЕЛИЧИНА ПОСМЕРТНОГО ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ (В МИЛЛИЛИТРАХ РТУТНОГО СТОЛБА)

- 1) 0,5
- 2) 1

3) 21

4) 2

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

1) опасный для жизни

2) тяжкий

3) средней тяжести

4) лёгкий

ПОВТОРНЫЙ ПРИЁМ ЯДА В СУБТОКСИЧЕСКИХ ДОЗАХ В КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ПРИВОДИТ К ФОРМИРОВАНИЮ

1) сенсibilизации

2) аутоиммунизации

3) брадикинезии

4) тахифилаксии

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К

1) отравлению углекислым газом

2) отравлению кислородом

3) кислородному голоданию

4) баротравме легких

В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВНЫХ ГАЗОВ ФОРМИРУЮТСЯ

1) химические ожоги

2) осколочные ранения

3) отрывы конечностей

4) термические ожоги

ПЕРВИЧНЫЕ ВНУТРИСТВОЛОВЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

1) беспорядочным расположением только в продолговатом мозге

2) множественной локализацией только в пределах моста

3) локализацией на ограниченном участке

4) множественной локализацией на обширных участках

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ВЫВИХА ОДНОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА ЯВЛЯЕТСЯ

1) угрожающее жизни состояние

2) опасность для жизни

3) кратковременное расстройство здоровья

4) длительное расстройство здоровья

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЛЕВОГО ЛОКТЕВОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ РАЗВИТИЕМ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ СОСУДОВ ЛЁГКИХ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТИ ПРИ РАННЕЙ СМЕРТИ ОТ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ СИНДРОМ

- 1) метаболический
- 2) холемиический
- 3) парафренный
- 4) геморрагический

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ СЕРДЦА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОВОДИМЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, ИЗЛОЖЕНЫ В ПРИКАЗЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ №

- 1) 194н
- 2) 346н
- 3) 388н
- 4) 782н

ДЕРМА СОСТОИТ ИЗ _____ СЛОЯ

- 1) шиповатого
- 2) зернистого
- 3) блестящего

4) сосочкового

ВСКРЫТИЕ СЕРДЦА ПО ТОКУ КРОВИ НАЧИНАЮТ С

- 1) левого желудочка
- 2) левого предсердия
- 3) правого предсердия
- 4) правого желудочка

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПУТЕМ НА ЖИВОТНЫХ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 42°C УСИЛИВАЕТСЯ ДО (В УДАРАХ В МИНУТУ)

- 1) 140
- 2) 220
- 3) 180
- 4) 160

ОБОЮДООСТРЫМ НОЖОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) мозговой нож Вирхова
- 2) малый ампутационный
- 3) большой ампутационный
- 4) реберный

ОБИЛЬНАЯ КРОВОПОТЕРЯ ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ ПОТЕРЕ _____% ОБЪЁМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ

- 1) 35
- 2) 40
- 3) 50
- 4) 45

СРЕДИННЫЙ РАЗРЕЗ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО ВЫПОЛНЯЮТ ОТ

- 1) ярёмной вырезки
- 2) нижней губы
- 3) мечевидного отростка
- 4) щитовидного хряща

МАЛОКАЛИБЕРНЫМ СЧИТАЮТ ОРУЖИЕ С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ КАНАЛА СТВОЛА (В ММ)

- 1) 12,7
- 2) 7,62
- 3) 5,45
- 4) 9,00

ДОСТУП К ПАХОВЫМ ОБЛАСТЯМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗРЕЗ ПО

- 1) Мак – Коллум – Мэллори

- 2) Самсонову
- 3) Лешке
- 4) Фишеру

ОБРАЗОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ С РАЗДВОЕНИЕМ ЛИНИИ ПРОИСХОДИТ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕФОРМАЦИИ

- 1) изгиба
- 2) сдвига
- 3) кручения
- 4) сжатия

ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, РАЗВИВШАЯСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИЁМА НЕЛЕТАЛЬНОЙ ДОЗЫ ОТРАВЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившая
- 4) средней тяжести

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ВОЗНИКАЮТ, КОГДА СОДЕРЖАНИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ДОСТИГАЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 30
- 2) 5
- 3) 60
- 4) 80

ДЕЙСТВИЕ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) снижением артериального давления
- 2) брадикардией
- 3) комой
- 4) галлюцинациями

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ БЕШЕНСТВА ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) кусочки тканей в области поражения
- 2) продолговатый мозг
- 3) кровь из сердца
- 4) кусочки селезенки

КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ПРОБЕ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

- 1) УФ-спектрометрии
- 2) ИК-спектроскопии
- 3) флюориметрии
- 4) газовой хроматографии

ОТСУТСТВИЕ ЛЕВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) лёгкий

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

ОТСУТСТВИЕ В ЭЯКУЛЯТЕ СЕМЕННЫХ НИТЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) астеноспермии
- 2) аспермии
- 3) олигоспермии
- 4) некроспермии

МЕХАНИЗМОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛОМОВЫВИХА ГАЛЕАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ УДАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУПОГО ТВЕРДОГО ПРЕДМЕТА ПО

- 1) тыльной поверхности верхней трети плеча
- 2) диафизу бедренной кости
- 3) среднему отделу стопы с повреждением одного или более из предплюсневых суставов
- 4) лучевой поверхности предплечья в нижней трети

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ 2 СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) образованием пузырей кожи
- 2) обугливанием костей
- 3) некрозом скелетных мышц
- 4) влажным некрозом кожи

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЦЕСС МУМИФИКАЦИИ ТРУПА ЧЕЛОВЕКА СРЕДНЕГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ МОЖЕТ ЗАВЕРШИТЬСЯ В СРОК ДО (В МЕСЯЦАХ)

- 1) 2
- 2) 12
- 3) 24
- 4) 3

ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ КАСАНИИ ОБЕИМИ НОГАМИ ЗЕМЛИ НА РАССТОЯНИИ _____ СМ ДРУГ ОТ ДРУГА

- 1) 60-80
- 2) 95-120
- 3) 120-145
- 4) 150-170

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ХОЛЕРУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1) лимфатические узлы
- 2) мозговые оболочки
- 3) продолговатый и спинной мозг
- 4) отрезки тонкой кишки

ОТКРЫТЫЙ ЗАПИРАТЕЛЬНЫЙ ВЫВИХ БЕДРА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ПОТЕРЯ РЕЧИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЯЗЫКА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

К ПРЕПАРАТАМ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВОГО РЯДА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) нитразепам
- 2) фенobarбитал
- 3) циклобарбитал
- 4) ноксирон

ЭКСПЕРТ ОБЯЗАН ИЗЛОЖИТЬ В ВЫВОДАХ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ И УСТАНОВЛЕННЫЕ В ПОРЯДКЕ ЕГО ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ДЕЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЕМ ПУНКТА

___ ПРИКАЗА МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 12.05.2010 № 346Н

- 1) 40
- 2) 48
- 3) 33
- 4) 29

ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ДВИЖЕНИЙ В КОНЕЧНОСТЯХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ЛЕВОЙ ОБЩЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ НАРУЖНОМ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА РЕБЕНКА, ПОГИБШЕГО ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗНЫМ ХЛОРОМ (В УСЛОВИЯХ КАТАСТРОФЫ), МОГУТ ОБНАРУЖИВАТЬСЯ

- 1) вишнево-красные трупные пятна, близкая окраска лица и ушных раковин
- 2) зеленоватый оттенок кожи, зеленовато-серая окраска легких
- 3) разлитые, интенсивно синюшно-фиолетовые трупные пятна с петехиальными кровоизлияниями
- 4) буровато-красный оттенок трупных пятен, «шоколадный» цвет крови

К УТРАТЕ АНАТОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ КОСТИ БЕЗ МАКРОСКОПИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ ЕЕ СПЛОШНОСТИ ОТНОСЯТ ПЕРЕЛОМ

- 1) раздробленный
- 2) поднадкостничный
- 3) пластический
- 4) полифокальный

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние

4) опасность для жизни

В ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ПОРАЖЕНИЯМИ

- 1) сосудистыми
- 2) нейрогуморальными
- 3) мышечными
- 4) органами

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

СОЧЕТАННОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА ОДНОВРЕМЕННО РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ВИРУСОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) суперинфекцией
- 2) коинфекцией
- 3) хронизацией
- 4) реактивацией

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) некротический нефроз со значительной площадью поражения канальцев
- 2) однослойного призматического эпителия собирательной трубочки
- 3) кубического эпителия дистального извитого канальца
- 4) мезангиальных клеток почечного тельца

ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕК И ПОЛНОКРОВИЕ

- 1) слизистой пищевода
- 2) надпочечников
- 3) головного мозга
- 4) селезенки

ДЛЯ ДЕЦЕЛЕРАЦИОННОЙ ТРАВМЫ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ____ АОРТЫ

- 1) нисходящей части
- 2) грудного отдела
- 3) дуги
- 4) брюшного отдела

РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЯСТИ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ОТМЕЧАЕТСЯ БРОНХОСПАЗМ, ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ВОЗБУЖДЕНИЯ ____ ОТДЕЛА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- 1) вегетативного
- 2) симпатического
- 3) парасимпатического
- 4) центрального

К ПРИЗНАКАМ БЫСТРОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

- 1) неравномерное кровенаполнение внутренних органов
- 2) резкое венозное полнокровие внутренних органов
- 3) смешанные кровяные свертки в сосудах
- 4) умеренные бледно-фиолетовые трупные пятна

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА С ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

- 1) зондирования раневого канала
- 2) описания повреждений
- 3) пальпации ран
- 4) обмывания загрязнений вокруг ран

УШИБ ГРУДНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С НАРУШЕНИЕМ ЕГО ФУНКЦИИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПЕРЕЛОМ-ВЫВИХ ГАЛЕАЦЦИИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

ТРУПНЫЕ ПЯТНА ПРИ ОБЩЕМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА, КАК ПРАВИЛО, БЫВАЮТ

- 1) розоватыми

- 2) красными
- 3) синюшно-фиолетовыми
- 4) синюшно-серыми

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ТОНКОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней степени тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

К ПРИТВОРНЫМ БОЛЕЗНЯМ ОТНОСЯТ

- 1) членовредительство
- 2) аггравацию
- 3) наркоманию
- 4) психические расстройства

ПЕРЕЛОМ ТЕЛА ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасный для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ОЖОГИ ПЛАМЕНЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ

- 1) формой контактировавшей поверхности действовавшего предмета
- 2) отсутствием копоти в дыхательных путях
- 3) значительной глубиной и поражением обширных участков поверхности тела
- 4) наличием сохранившихся частиц действовавшего агента

ОБЩЕЕ СОТЯСЕНИЕ ТЕЛА ФОРМИРУЕТСЯ ОТ

- 1) двустороннего центростремительного воздействия
- 2) двустороннего центробежного воздействия
- 3) удара предметом с ограниченной травмирующей поверхностью
- 4) удара о неограниченную травмирующую поверхность

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПРЯМОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ, НАХОДИВШИЕСЯ НА ПОТЕРПЕВШЕЙ И ПОДОЗРЕВАЕМОМ В МОМЕНТ ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОДЛЕЖАТ

- 1) химической обработке
- 2) уничтожению
- 3) лабораторному исследованию
- 4) хранению

МИКРОСКОПИЧЕСКИ ПРИЗНАКИ РАННЕЙ СТАДИИ ТРУПНОГО АУТОЛИЗА НАБЛЮДАЮТСЯ СПУСТЯ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1) 10-12
- 2) 2-4
- 3) 12-16
- 4) 6-8

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ЛИЦА, ШЕИ, ГРУДИ И ЛЕВОГО ПЛЕЧА III СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ 15% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ОБЫЧНО УСТАНОВЛИВАЮТ СПОСОБНОСТЬ К

- 1) вынашиванию ребенка
- 2) рождению ребенка
- 3) зачатию ребенка
- 4) оплодотворению

ОТКРЫТЫЙ НАРУЖНЫЙ ВЫВИХ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ЖИРОВЫЕ ПЯТНА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ОКРАШИВАЮТСЯ В ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ

- 1) конго красным
- 2) гематоксилином
- 3) суданом
- 4) эозином

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ В СЛУЧАЕ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА АБОРТА НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ

- 1) наличие характерных запахов в помещении
- 2) наличие повреждений на одежде

- 3) необычный цвет трупных пятен
- 4) характер выделений из половой щели

К ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 36-40 ЛЕТ ИНВОЛЮТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ В СОХРАНИВШИХСЯ ПОСЛЕ КРЕМАЦИИ ФРАГМЕНТАХ ДИАФИЗОВ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ, ОТНОСЯТ

- 1) перестройку большей части бесстеночных сосудистых ходов
- 2) полости остеопороза на боковых поверхностях
- 3) наружные общие пластины в виде участков сильной и средней степени минерализации
- 4) процесс резорбции пластинчатой костной ткани по периостальному краю

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РЕФЛЕКСОВ С ГИПОТРОФИЕЙ МЫШЦ, ЛЕГКИМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ПО СОЕДИНЕНИЮ КОНЦОВ ПЕТЛИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК

- 1) замкнутые и незамкнутые
- 2) однооборотные и многооборотные
- 3) одинарные и многорядные
- 4) затягивающиеся и незатягивающиеся

ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ В ЭЯКУЛЯТЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ФОРМ СПЕРМАТОЗОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) аспермия
- 2) некроспермия
- 3) тератоспермия
- 4) олигоспермия

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБ/О

- 1) израсходованных в процессе производства экспертизы объектах с указанием их количества
- 2) выводах эксперта
- 3) результатах лабораторных исследований
- 4) обстоятельствах дела

К ВАСКУЛИТАМ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ СРЕДНЕГО КАЛИБРА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) височный артериит
- 2) гранулематоз Вегенера
- 3) болезнь Бюргера
- 4) неспецифический аортоартериит

ТРАВМА ОТ ПЕРЕЕЗДА КОЛЁСАМИ ДВИЖУЩЕГОСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1) 5
- 2) 4
- 3) 7
- 4) 6

ПО ВИДУ ОБМЕНА РАЗЛИЧАЮТ ДИСТРОФИИ

- 1) жировые
- 2) паренхиматозные
- 3) мезенхимальные
- 4) смешанные

ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ С НЕПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) лёгкий

ЭЛЕКТРОМЕТКА МОЖЕТ ИМЕТЬ _____ ВОЗВЫШЕНИЕ ПО КРАЯМ

- 1) валикообразное
- 2) мелкофестончатое
- 3) крупнофестончатое
- 4) волнистое

ДИАМЕТР ЯДЕР ОКОСТЕНЕНИЯ В ТАРАННОЙ КОСТИ ДОНОШЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В ММ)

- 1) 6,5-9
- 2) 10,5-011,5
- 3) 1-2
- 4) 3-4

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КРИМИНАЛЬНОЕ СОЖЖЕНИЕ ТРУПА УСТАНОВЛИВАЮТ

- 1) позу «боксера»
- 2) наличие жирной копоти на стенках очага
- 3) состояние эмали зубов
- 4) присутствие характерного запаха

РАЗДЕЛЬНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАЖДОГО ОРГАНА ВЫПОЛНЯЮТ ПРИ АУТОПСИИ ПО

МЕТОДУ

- 1) Лютеля
- 2) Вирхова
- 3) Киари-Мариша
- 4) Абрикосова

ПОД ДЕЙСТВИЕМ КРАСЯЩЕГО ПИГМЕНТА ВОЛОСЫ ТРУПА В УСЛОВИЯХ ПРЕБЫВАНИЯ В ПОЧВЕ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ ПРИОБРЕТАЮТ ____ ОТТЕНОК

- 1) зеленоватый
- 2) рыжеватый
- 3) фиолетовый
- 4) розоватый

ПРИ ДАВНОСТИ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ ЦВЕТ РУБЦА ОБЫЧНО

- 1) темно-красный
- 2) красно-фиолетовый
- 3) бордовый
- 4) белесый

ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ, ТЯЖЕСТЬ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО

- 1) разности критериев
- 2) совокупности критериев
- 3) наиболее лёгкому
- 4) более тяжёлому

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТА ЗА ДАЧУ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) профессиональной
- 2) уголовной
- 3) моральной
- 4) материальной

ДИСТРОФИЧЕСКИЙ ТИП МИОКАРДИТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ _____ ДИСТРОФИЕЙ

- 1) паренхиматозной
- 2) зернистой
- 3) гидropической
- 4) жировой

ПРИ МЕТАПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРОИСХОДИТ ЕЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ В

- 1) мышечную
- 2) хрящевую
- 3) жировую
- 4) нервную

ПЕРВИЧНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) уменьшением объема циркулирующей крови
- 2) асистолией желудочков
- 3) рефлекторным спазмом венечных артерий
- 4) пароксизмальной желудочковой тахикардией

ДЛЯ «ЛЕГОЧНОЙ» СМЕРТИ ЗНАЧИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) острой эмфиземы легких
- 2) жировой эмболии сосудов легких
- 3) экссудации в альвеолы
- 4) гиалиновых мембран

ВСКРЫТИЕ ЧЕРЕПА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА НОВорожденного ПРОИЗВОДЯТ ПО МЕТОДУ

- 1) Фишера
- 2) Лешке
- 3) Абрикосова
- 4) Медведева

МЯГКИЕ МОЗГОВЫЕ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЭТИЛОВЫМ СПИРТом

- 1) с серозно-фибринозным экссудатом по всей поверхности
- 2) сухие, блестящие, малокровные
- 3) отекающие, тусклые, полнокровные
- 4) с мелкими эрозиями в проекции лобных долей

КОНСТРУКЦИОННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ГУБЧАТОГО ВЕЩЕСТВА КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ КОСТНАЯ

- 1) пластинка
- 2) ткань
- 3) лакуна
- 4) балка

В ОТВЕТ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВО 2 ФАЗЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1) обратимая агрегация тромбоцитов
- 2) первичный спазм сосудов
- 3) ретракция тромба
- 4) адгезия тромбоцитов

БОЛЬШОЙ КОСЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВЫ ПЛОДА СООТВЕТСТВУЕТ РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ

- 1) центром большого родничка и подзатылочной ямкой
- 2) переносицей и затылочным бугром
- 3) подбородком и затылочным бугром
- 4) подзатылочной ямкой и затылочным бугром

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ В ОТСРОЧЕННЫЙ ПЕРИОД ОТРАВЛЕНИЯ

ХЛОРЗАМЕЩЕННЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ НАСТУПАЕТ, КАК ПРАВИЛО, ОТ ОСТРОЙ _____ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- 1) дыхательной
- 2) сердечно-сосудистой
- 3) полиорганной
- 4) почечной

СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОГЕНА В ПЕЧЕНИ, ГЛЮКОЗЫ И МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В МЫШЦАХ ПРИ ОБЩЕМ ДЕЙСТВИИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОРГАНИЗМ

- 1) колеблется
- 2) повышается
- 3) снижается
- 4) не изменяется

ПАТОЛОГИЕЙ, ДИАГНОСТИРУЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕВОД-ДЕФИЦИТНОГО ТРАНСФЕРРИНА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сахарный диабет
- 2) хронический гастрит
- 3) инфаркт миокарда
- 4) хронический алкоголизм

ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гемическая гипоксия головного мозга
- 2) острая дыхательная недостаточность
- 3) острая тканевая гипоксия
- 4) нарушение кислотно-щелочного состава тканей

КОНУС ГЕРЦА ОБРАЗУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ ПУЛИ НА

- 1) коллабированное легкое
- 2) наполненный мочевого пузырь
- 3) трубчатые кости
- 4) плоские кости

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ «КОНСКОГО ХВОСТА», ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ВРАЧ, ПРОВОДИВШИЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ТРУПА, МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАН В СУД В КАЧЕСТВЕ

- 1) понятого

- 2) эксперта
- 3) свидетеля
- 4) специалиста

О НАЛИЧИИ ПЯТЕН ВИШНЕВСКОГО ПОЗВОЛЯЕТ СУДИТЬ ОБНАРУЖЕНИЕ КРОВОИЗЛИЯНИЙ В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

- 1) тощей кишки
- 2) желудка
- 3) желчного пузыря
- 4) толстой кишки

УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАННОЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ, КАК ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

- 1) рассматривается иногда
- 2) рассматривается после смерти
- 3) рассматривается всегда
- 4) не рассматривается

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

К УТОПЛЕНИЮ БЕЗ ВЫРАЖЕННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ОТНОСЯТ _____ ТИП

- 1) рефлекторный
- 2) истинный
- 3) аспирационный
- 4) смешанный

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) материалы дела
- 2) гистологические препараты
- 3) драгоценные металлы и камни
- 4) заключение эксперта

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий

- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ТОРФЯНОЕ ДУБЛЕНИЕ ОБРАЗУЕТСЯ

- 1) в сырых помещениях и под водой
- 2) при разложении тканей микроорганизмами
- 3) при высокой температуре и хорошей вентиляции
- 4) под воздействием гумусовых кислот и других дубящих веществ

СМЕЩЕНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ И РОСТ ТРЕЩИНЫ ВДОЛЬ ЕЁ ФРОНТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ФОРМИРОВАНИИ СДВИГА

- 1) поперечного
- 2) продольного
- 3) секторального
- 4) диагонального

РУБЛЕННЫЕ РАНЫ МОГУТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ ОТ УДАРА

- 1) боковой поверхностью клинка колющего предмета
- 2) тупым предметом с повреждающей поверхностью в виде узкой грани
- 3) тупым предметом с ограниченной повреждающей поверхностью
- 4) предметом, имеющим острый край и значительную массу

УДАВЛЕНИЕ ПЕТЛЕЙ ОТНОСЯТ К _____ АСФИКСИИ

- 1) странгуляционной
- 2) обтурационной
- 3) быстрой компрессионной
- 4) медленной компрессионной

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ НА ОБНАЖЕННУЮ ГОЛОВУ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- 1) лихорадки
- 2) озноба
- 3) гипотермии
- 4) солнечного удара

СТАДИЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУПНЫХ ПЯТЕН, НАСТУПАЮЩАЯ, КАК ПРАВИЛО, СПУСТЯ 24-36 ЧАСОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трупная имбибиция
- 2) гипостаз
- 3) стаз
- 4) аутолиз

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ОБИЛЬНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) опасность для жизни
- 4) угрожающее жизни состояние

ПРИ ВЗРЫВЕ НА ОЧЕНЬ БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ

- 1) продукты детонации
- 2) осколки взрывного устройства
- 3) ударная волна и осколки устройства
- 4) вторичные снаряды

ВЫХОДОМ КРОВИ ИЗ ПОВРЕЖДЕННОГО СОСУДА В КАКИЕ-ЛИБО ОБОЛОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кровотечение
- 2) гематома
- 3) кровоизлияние
- 4) кровоподтек

ПОТЕРЯ СЛУХА НА ОДНО УХО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) длительности расстройства здоровья
- 2) опасности для жизни
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) развития угрожающего жизни состояния

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ПОЛНЫЙ ПАРАЛИЧ ДИСТАЛЬНЫХ И ГЛУБОКИЙ ПАРАЛИЧ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ОБЕИХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ЙОД ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ НАКАПЛИВАТЬСЯ В

- 1) щитовидной железе
- 2) надпочечниках
- 3) почках
- 4) слюнных железах

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ЛЕГКОЕ РАССТРОЙСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) опасный для жизни

- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

К ОБЪЕКТАМ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ТРАСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОСЯТ

- 1) пищевые массы из желудка
- 2) кусочки внутренних органов
- 3) следы-повреждения
- 4) жидкие биологические среды

РОДОВАЯ ТРАВМА НОВорожденного Младенца Сопровождается Чаще Всего

- 1) скальпированными ранами головы
- 2) паутинообразным переломом свода черепа
- 3) радиальными трещинами теменных костей
- 4) ушибом головного мозга легкой степени

ЭЛЕКТРООЖОГИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВЫРАЖЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ НА ОТДАЛЕНИИ ОТ ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

- 1) вен
- 2) нервных стволов
- 3) лимфатических узлов
- 4) костной ткани

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЛОЖНЫЙ СУСТАВ, СФОРМИРОВАВШИЙСЯ В ИСХОДЕ ПЕРЕЛОМА СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ДИАФИЗА ЛЕВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ПАДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НИЖЕ 24°C ОТНОСЯТ

- 1) исчезновение электрической активности головного мозга
- 2) судороги
- 3) дизартрию
- 4) интенсивную мышечную дрожь

ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЛОМЫ

- 1) черепа
- 2) плечевой кости
- 3) бедренной кости

4) костей таза

К ТЕРМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ОТНОСЯТ

- 1) инерционные перегрузки
- 2) продукты пиролиза
- 3) горячие жидкости
- 4) привязные ремни

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА И ВЫРАЗИВШЕЕСЯ В ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТВЕРДОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

К ХАРАКТЕРНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СМЕРТЕЛЬНОГО ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ОТНОСЯТ ОБНАРУЖЕНИЕ _____ ОКРАСКИ КРОВИ, ТКАНЕЙ, ТРУПНЫХ ПЯТЕН

- 1) синюшно-фиолетовой
- 2) вишнево-синюшной
- 3) ярко-розовой
- 4) сиренево-серой

К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СУПИНАЦИОННОГО ПЕРЕЛОМА (ПЕРЕЛОМА МАЛЬГЕНЯ) ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) перелом таранной кости
- 2) перелом лучевой кости в типичном месте
- 3) перелом клювовидного отростка
- 4) вывих (подвывих) стопы кнутри

К ОСНОВНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРЫХ БЫТОВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ОТНОСЯТ

- 1) алкоголизм и токсикомании
- 2) бесконтрольное использование лекарственных препаратов
- 3) слабую информированность населения
- 4) профессиональную деятельность

К ГЕМОТРОПНЫМ ЯДАМ ОТНОСЯТ

- 1) окись углерода
- 2) цианид калия
- 3) опиаты
- 4) уксусную кислоту

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ЭТАНОЛОМ КРОВЬ И МОЧУ БЕРУТ В КОЛИЧЕСТВЕ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 100-200
- 2) 10-20
- 3) 150-170
- 4) 50-70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НИМ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ

- 1) лаборантом
- 2) санитаром
- 3) непосредственно руководителем государственного судебно-экспертного учреждения
- 4) экспертом

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ЗРАЧКА ПРИ НАДАВЛИВАНИИ НА ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО С БОКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ПОСМЕРТНОЙ РЕЛАКСАЦИИ МЫШЦ И СНИЖЕНИЯ ТУРГОРА РОГОВИЦЫ НАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) Инце
- 2) Руднева
- 3) Икара
- 4) Белоглазова

К ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ СКОПЛЕНИЮ ЖИДКОЙ ИЛИ СВЕРНУВШЕЙСЯ КРОВИ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ НА НЕВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ОТНОСЯТ ____ КРОВИ

- 1) лужу
- 2) мазок
- 3) пятна
- 4) брызги

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) угрожающий жизни
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РАССТОЯНИЕ

- 1) между точками зурин
- 2) от глабеллы до опистокраниона
- 3) между точками базион и назион
- 4) от точки базион до точки брегма

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦОМ ИЗ ПОЛОСТЕЙ И ОТ ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ЗАПАХ

- 1) чеснока
- 2) прелых яблок
- 3) сушеных грибов
- 4) горького миндаля

ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЁГКОЙ СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ ОБЩЕЙ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ (В ГРЕЯХ)

- 1) 3-4
- 2) 1-2
- 3) 7-8
- 4) 5-6

КИНЖАЛ ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩИМ ОРУЖИЕМ, ИМЕЮЩИМ КЛИНОК С

- 1) двумя острыми режущими краями и острым концом
- 2) одним тупым и одним острым краем
- 3) двумя острыми режущими краями и закругленным концом
- 4) «носком» и «пяткой»

РАЗРЫВЫ ВНУТРЕННИХ СВЯЗОК ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ ФОРМИРУЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФОРМАЦИИ

- 1) изгиба
- 2) растяжения
- 3) сдвига
- 4) кручения

ПРИ ОПИСАНИИ ЗУБОВ В СЛУЧАЕ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

- 1) внутриротовой рентгенографией
- 2) ортопантомографией

- 3) аналитическим тестером пульпы
- 4) зубной формулой

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ НЕУСТАНОВЛЕННЫМ НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ КОМОЙ II СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившее
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТМОРОЖЕНИЯ ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 40% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

ХЛОРОФОРМ ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ НАКАПЛИВАТЬСЯ В

- 1) слюнных железах
- 2) волосах
- 3) надпочечниках
- 4) ногтях

ОТКРЫТЫЙ НАРУЖНЫЙ ВЫВИХ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) вред здоровью, опасный для жизни
- 4) вред здоровью средней тяжести

НАЛИЧИЕ ГИАЛИНОВЫХ МЕМБРАН ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТКАНИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ

- 1) ателектаза
- 2) эмфиземы
- 3) аплазии легких
- 4) рака легких

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРОНИКАЮЩЕГО КОЛОТО-РЕЗАНОГО РАНЕНИЯ ГРУДИ С РАССЕЧЕНИЕМ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние

4) опасность для жизни

НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ

- 1) внутренних органов и крупных сосудов
- 2) протоков и малых сосудов
- 3) тонкого и толстого кишечника
- 4) связок

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ КОЖИ О ПРИЖИЗНЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1) отслойка эпидермиса
- 2) уплощение дермы
- 3) отсутствие гиперемии
- 4) малокровие сосудов дна

СМЕРТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СНОТВОРНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НАСТУПАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) острой почечной недостаточности
- 2) паралича сосудодвигательного центра
- 3) паралича дыхательного центра
- 4) блокирования блуждающего нерва

ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ УГНЕТАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) макрофаги
- 2) лейкоциты
- 3) В-лимфоциты
- 4) Т-лимфоциты

НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) частичным сходством строения гема у человека и различных животных
- 2) абсолютно одинаковым строением гема у человека и различных животных
- 3) частичным сходством строения гема у человека и приматов
- 4) полным отличием в строении гема у человека и различных животных

В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ ЯДОМ СЧИТАЮТСЯ ВЕЩЕСТВА

- 1) введенные в организм в малых количествах, вызывающие смерть
- 2) введенные в организм в малых количествах, вызывающие расстройство здоровья
- 3) сильнодействующие
- 4) введенные в организм в малых количествах и вызывающие расстройство здоровья или смерть

ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ОБЯЗАН УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ЛИЧНОСТИ

- 1) подозреваемого

- 2) обследуемого
- 3) обвиняемого
- 4) свидетеля

К ПОВРЕЖДЕНИЯМ В ВИДЕ ЭРИТЕМЫ И ОТЕКА КОЖИ ОТНОСЯТ ОЖОГИ _____ СТЕПЕНИ

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 3

К ВЕЩЕСТВАМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ПОРОХОВЫХ ГАЗАХ, ОТНОСЯТ

- 1) цинк
- 2) вольфрам
- 3) сероводород
- 4) газообразные соединения азота

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 65% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ОСНОВНЫМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, ОТРАЖАЮЩИМ ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) эпикриз
- 2) протокол
- 3) справка
- 4) заключение

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СМЕРТИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ ПОЧЕК ДО (В ГРАММАХ)

- 1) 700
- 2) 800
- 3) 600

4) 750

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ЛЕГКОГО ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЯИЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) длительный
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) рыхлой волокнистой соединительной ткани стромы
- 2) опухолевых процессов, ведущих к недостаточности экзокринной паренхимы
- 3) кубического эпителия межацинарных выводных протоков
- 4) однослойного плоского эпителия вставочных выводных протоков

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1) волосы
- 2) капсулу почки
- 3) мозговые оболочки
- 4) ногти

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРИЖИЗНЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ССАДИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ _____ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1) цитологическое
- 2) морфометрическое
- 3) рентгенологическое
- 4) гистологическое

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ТОНКОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ,

СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

КОЛОТО-РЕЗАННОЕ РАНЕНИЕ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ НА УРОВНЕ 3-4 ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ «КОНСКОГО ХВОСТА» И СПИННОГО МОЗГА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившее
- 4) средней тяжести

ВТОРОЙ ФАЗОЙ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ ЯВЛЯЕТСЯ ФАЗА

- 1) кратковременной остановки дыхания
- 2) инспираторной одышки
- 3) экспираторной одышки
- 4) терминального дыхания

ВОЗБУЖДЕНИЕ М-ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) брадикардией
- 2) понижением секреции слюнных и потовых желез
- 3) расширением зрачков
- 4) тахикардией

ПРИ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ПРОТЕЕМ, НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ

- 1) содержимое тонкой и толстой кишки
- 2) ногти
- 3) слюну
- 4) буккальный эпителий

ИСКУССТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК ____ БОЛЕЗНИ

- 1) искусственные
- 2) притворные
- 3) психические
- 4) инфекционные

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ

30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

СОНЛИВОСТЬ, СТУПОР, НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ И ДЫХАНИЯ, КОМА I СТЕПЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ____ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

- 1) легкой
- 2) тяжелой
- 3) сильной
- 4) средней

В ТЕЧЕНИИ РЕГЕНЕРАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ФАЗЕ ПРОЛИФЕРАЦИИ ОБРАЗУЕТСЯ _____ ТКАНЬ

- 1) грануляционная
- 2) грубая волокнистая
- 3) рубцовая
- 4) хрящевая

К ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВАНИИ ВНЕШНОСТИ ПО ФОТО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ

- 1) трасологию
- 2) габитоскопию
- 3) фрактологию
- 4) баллистику

ПРИ ГИСТОХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ В СЛУЧАЯХ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ГЛИКОГЕНА В ПЕЧЕНИ

- 1) понижается
- 2) повышается
- 3) не изменяется
- 4) изменяется хаотично

РАЗЛИЧАЮТ _____ ОТМОРОЖЕНИЯ

- 1) 1 степень
- 2) 3 степени
- 3) 4 степени
- 4) 5 степеней

ПАТОЛОГИЕЙ, ДИАГНОСТИРУЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕРОД-ДЕФИЦИТНОГО ТРАНСФЕРРИНА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) хронический гастрит
- 2) инфаркт миокарда

- 3) хронический алкоголизм
- 4) сахарный диабет

ВЫЯВЛЕНИЕ СХОДНЫХ И РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАССМАТРИВАЕМЫХ ЯВЛЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вычислением
- 2) описанием
- 3) измерением
- 4) сравнением

РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ОБОИХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) криминального аборта
- 2) декомпрессии
- 3) гнилостного изменения трупа
- 4) утопления

ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ГСЭУ) ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ УСТАНОВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА: 1 ДОЛЖНОСТЬ НА ГСЭУ ПРИ НАЛИЧИИ В ЕГО ШТАТЕ БОЛЕЕ ____ ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

- 1) 10
- 2) 30
- 3) 40
- 4) 20

РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 15% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) опасный для жизни
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА В СОСТОЯНИИ ЭРЕКЦИИ СЛЕДУЕТ ИЗМЕРИТЬ ОКРУЖНОСТЬ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА В СПОКОЙНОМ СОСТОЯНИИ В ОБЛАСТИ КОРОНЫ ГОЛОВКИ И К ЭТОЙ ЦИФРЕ ПРИБАВИТЬ ____ САНТИМЕТРОВ

- 1) 2,5
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

ЭТИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮТ КАРДИОСКЛЕРОЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) диффузный
- 2) врожденный
- 3) гипотрофический
- 4) очаговый

К МЕСТНЫМ ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ХОД РЕГЕНЕРАЦИИ, ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) состояние сосудов
- 2) интенсивность обменных процессов
- 3) возраст
- 4) изменения скорости кровотока

ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКИСИ УГЛЕРОДА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ СВЫШЕ 1 ПРОЦЕНТА ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ____ ФОРМЫ ОТРАВЛЕНИЯ

- 1) легкой
- 2) несмертельной
- 3) отдаленной
- 4) молниеносной

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) лёгкий

К ПРИЧИНЕ СКОРОПОСТИЖНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСЯТ

- 1) кровоизлияние в синоатриальный узел
- 2) кровоизлияние в четвёртый желудочек
- 3) миоренальный синдром
- 4) анафилактический шок

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ МУЖЕЛОЖСТВА ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ

- 1) морфометрии
- 2) сфинктерометрии
- 3) ультразвуковой дефектоскопии
- 4) ректальной термометрии

К ВАСКУЛИТАМ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ СРЕДНЕГО КАЛИБРА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) болезнь Бюргера
- 2) височный артериит

- 3) системный некротизирующий васкулит
- 4) неспецифический аортоартериит

К ПРИЗНАКАМ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТ

- 1) цирротическую перестройку
- 2) эмфизематозное вздутие
- 3) диффузный фиброз стромы
- 4) демиелинизирующие изменения

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОТИВОУДАРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ТРАВМЕ ГОЛОВЫ С УСКОРЕНИЕМ ОБЪЯСНЯЕТ ТЕОРИЯ

- 1) ротации мозга
- 2) вибрационная
- 3) кавитации
- 4) смещения мозга

ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ ФРАГМЕНТОВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) водный раствор глицерина
- 2) формалина
- 3) ацетона
- 4) спирта

О ВЗРЫВНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ПРИ АВАРИЙНОЙ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ КАБИНЫ ВОЗДУШНОГО СУДНА МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

- 1) полное разрушение тела
- 2) разрыв барабанной перепонки
- 3) перелом основания черепа
- 4) коллапс обоих лёгких

КЕСОННАЯ БОЛЕЗНЬ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ РАЗВИТИЕМ ГАЗОВОЙ ЭМБОЛИИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЛЁГКИХ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившая
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСККУСТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТАТЬЕ ____ УК РФ

- 1) 112
- 2) 115
- 3) 111
- 4) 123

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, У ЖЕНЩИН КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинившее
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА С IV ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасной для жизни

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЮТСЯ _____ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ

- 1) физиологической
- 2) биологической
- 3) медицинской
- 4) биофизической

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЖЕЛУДКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

СЛАДКОВАТЫЙ ФРУКТОВЫЙ ЗАПАХ ОТ ВСКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ И ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) амиловым спиртом
- 2) тетраэтилсвинцом
- 3) мышьяком
- 4) цианидами

К НАРУШЕНИЯМ РАСПОЗНАВАНИЯ ЗВУКОВ И РЕЧИ ОТНОСЯТ АГНОЗИЮ

- 1) зрительную
- 2) акустическую
- 3) вкусовую
- 4) сенсорную

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БОЛЬШОГО САЛЬНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

НА СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВНЕБОЛЬНИЧНЫЙ АБОРТ НАПРАВЛЯЮТ

- 1) матку
- 2) мочевого пузыря
- 3) прямую кишку
- 4) мочеточник

ПРИ РАЗВИТИИ ЭКССУДАТИВНОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ЗОНЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) фибринстабилизирующий фактор
- 2) гнойный экссудат
- 3) плазма
- 4) геморрагический экссудат

ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ, РЕЗКОЕ РАССТРОЙСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗЪЯТЫЕ ОТ ТРУПА ХРЯЩИ ПОМЕЩАЮТ В

- 1) уксусно-спиртовой раствор Ратневского
- 2) концентрированный раствор этилового спирта
- 3) 10% забуференный раствор формалина
- 4) 50% водный раствор глицерина

ЗАКРЫТЫЙ МЕЖВЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД

ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ВЫРАЖЕННЫМ СКЛЕРОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) некроз
- 2) цирроз
- 3) регенерация
- 4) инфаркт

ГИДРЕМИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА И ДЛИТСЯ ДО ____ ДНЕЙ ПОСЛЕ КРОВОПОТЕРИ

- 1) 8-9
- 2) 1-2
- 3) 4-5
- 4) 6-7

К КРОВЯНЫМ ЯДАМ ОТНОСЯТСЯ ВЕЩЕСТВА

- 1) повышающие проницаемость сосудистых стенок
- 2) нарушающие процессы кроветворения
- 3) изменяющие свойства гемоглобина
- 4) нарушающие микроциркуляцию крови

НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ ГЕМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ____ КИСЛОТА

- 1) уксусная
- 2) соляная
- 3) азотная
- 4) карболовая

СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ДАВНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) отдельно для каждого повреждения с применением дополнительных коэффициентов
- 2) отдельно для каждого повреждения с применением дополнительных коэффициентов, результаты суммируются
- 3) отдельно для каждого повреждения и суммируется
- 4) отдельно для каждого повреждения

ГАСПИНГ-ДЫХАНИЕ ФОРМИРУЕТСЯ В СТАДИЮ

- 1) инспираторной одышки

- 2) кратковременной остановки дыхания
- 3) экспираторной одышки
- 4) терминальных дыхательных движений

ВСКРЫТИЕ ПОЛОСТИ ЧЕРЕПА ТРУПОВ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ ПРОИЗВОДЯТ С ПРИМЕНЕНИЕМ

- 1) ступенчатого распила по Калитеевскому
- 2) метода Абрикосова
- 3) метода Фишера
- 4) комбинированного углового распила

РАЗДЕЛЕНИЕ БЕЛКОВЫХ МОЛЕКУЛ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) под действием внешнего электрического поля
- 2) в зависимости от их изоэлектрической точки
- 3) в зависимости от их молекулярного веса
- 4) в зависимости от их строения

В ЗОНЕ КОНТАКТА С ТРАВМИРУЮЩИМ ПРЕДМЕТОМ ФОРМИРУЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) опосредованное
- 2) конструкционное
- 3) дистанционное
- 4) локальное

КРАТКОВРЕМЕННЫМ РАССТРОЙСТВОМ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВРЕМЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И/ИЛИ СИСТЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО _____ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ МОМЕНТА ПРИЧИНЕНИЯ ТРАВМЫ

- 1) 48 дней
- 2) 28 дней
- 3) 21 дня
- 4) 32 дней

ОТ ДЕФОРМАЦИИ ИЗГИБА ПРИ УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРЕДМЕТА С ПЛОСКОЙ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБРАЗУЮТСЯ _____ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СВОДА И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

- 1) вдавленные
- 2) террасовидные
- 3) фрагментарно-оскольчатые
- 4) оскольчатые

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ЖЕЛУДКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью

4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

ОТРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫМИ АМФЕТАМИНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) гипотремией
- 2) апатией
- 3) арефлексией
- 4) резким психомоторным возбуждением

УТОЛЩЕНИЕ СТВОРОК МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИ ЕГО СТЕНОЗЕ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ ДИФFUЗНОГО РАЗРАСТАНИЯ ____ ТКАНИ

- 1) мышечной
- 2) костной
- 3) жировой
- 4) фиброзной

КОЛОТАЯ РАНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) неровными краями
- 2) ровными краями
- 3) наличием тканевых перемычек
- 4) преобладанием длины над глубиной

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАВМИРУЮЩЕГО ПРЕДМЕТА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УШИБЛЕННОЙ РАНЫ УСТАНАВЛИВАЮТ ПО

- 1) размерам раны
- 2) стенкам раны
- 3) сформировавшемуся рубцу
- 4) признакам заживления

ЗАКРЫТЫЙ ЧРЕЗВЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

ОДЕЖДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕЕ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ МОЖЕТ

- 1) отображать позитивный отпечаток элементов одежды на коже
- 2) увеличить глубину раневого канала
- 3) кардинально искажать морфологию ран
- 4) заметно ослаблять эффективность воздействия на тело

ХРОНИЧЕСКИЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ НЕФРИТ ГИСТОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫРАЖЕННЫМ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ ФИБРОЗОМ И ____

КАНАЛЬЦЕВ

- 1) воспалением
- 2) гипертрофией
- 3) атрофией
- 4) гипотрофией

ПРИ ПРЕБЫВАНИИ В ВОДЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ТРУПА ПРИОБРЕТАЮТ ____ ЦВЕТ

- 1) серо-белый
- 2) грязно-желтый
- 3) угольно-коричневый
- 4) темно-зеленый

СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ОБНАРУЖИВАЮТ В РАНАХ

- 1) ушибленных
- 2) огнестрельных
- 3) колото-резаных
- 4) резаных

ДЛЯ РОДОВОЙ ТРАВМЫ МЛАДЕНЦА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кефалогематома
- 2) микоплазмоз
- 3) спинномозговая грыжа
- 4) внутриутробная асфиксия

К ОТДЕЛАМ ГОЛОВНОГО МОЗГА ДЛЯ СУЖДЕНИЯ О СОХРАННОСТИ ФУНКЦИИ ДЫХАНИЯ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) таламус
- 2) мозжечок
- 3) кору мозга
- 4) ретикулярную формацию ствола мозга

ПРИ НЕБЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ВЫСТРЕЛА ИЗ БОЕВОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ

- 1) огнестрельный снаряд
- 2) предпулевой воздух
- 3) пороховые газы
- 4) пламя выстрела

ЗАПАХ ЧЕСНОКА ОТ ВСКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ И ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) сероводородом
- 2) этанолом
- 3) цианидами
- 4) мышьяком

ТЕПЛОПРОДУКЦИЮ ПОВЫШАЕТ

- 1) усиленное питание
- 2) неподвижность воздуха
- 3) непроницаемость для паров воды одежда
- 4) высокая влажность воздуха

ОКОЛО 10 ПРОЦЕНТОВ ПОСТУПИВШЕГО В ОРГАНИЗМ АЛКОГОЛЯ В НЕИЗМЕНЕННОМ ВИДЕ ВЫВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С

- 1) калом
- 2) слюной
- 3) кровью
- 4) мочой

РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1) повреждения вен шеи
- 2) утопления
- 3) гнилостного изменения трупа
- 4) понижающего ранения груди

К СТОЙКОМУ ОТСУТСТВИЮ СВЕТООЩУЩЕНИЯ НА ОБА ГЛАЗА ОТНОСЯТ

- 1) анизокорию
- 2) катаракту
- 3) слепоту
- 4) глаукому

СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВОЗНИКШИХ ОТ НЕОДНОКРАТНЫХ ТРАВМИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) по критерию, соответствующему большей степени тяжести
- 2) суммарно по областям локализации повреждений
- 3) по их совокупности критериев всех повреждений
- 4) отдельно в отношении каждого воздействия

ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ДОСТАТОЧНО ЧАСТО ВЫЯВЛЯЮТСЯ

- 1) некрозы клеток шиповатого слоя эпидермиса с образованием пустот
- 2) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 3) некрозы жировых клеток
- 4) некрозы мышечных волокон

К ГРУППЕ ПСИХОАНАЛЕПТИКОВ ОТНОСЯТ

- 1) фенobarбитал
- 2) кофеин
- 3) ноксирон

4) циклобарбитал

ТРЕТЬЕЙ ФАЗОЙ КЛЕТОЧНОЙ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лейкоцитарная
- 2) фибробластическая
- 3) тромбоцитарная
- 4) макрофагическая

НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ СЛЕДЫ ПРОДОЛГОВАТОЙ ФОРМЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ СТЕКАНИИ КРОВИ ПО НАКЛОННОЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОД ВЛИЯНИЕМ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) затеками
- 2) потеками
- 3) лужами
- 4) отпечатками

ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА (СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА) МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ НЕАВТОМАТИЗИРОВАННОМ ТИПИРОВАНИИ УСТАНОВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА: 1 ДОЛЖНОСТЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ _____ УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ УЧЕТА ИССЛЕДОВАНИЙ В ГОД

- 1) 500
- 2) 550
- 3) 450
- 4) 400

ДЕТОУБИЙСТВО КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ПРИ УБИЙСТВЕ РЕБЕНКА

- 1) преддошкольного возраста
- 2) младшего школьного возраста
- 3) грудного возраста
- 4) новорожденного

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ СЕРДЦА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

НАЛИЧИЕ ЯДЕР ОКОСТЕНЕНИЯ В ПЯТОЧНОЙ КОСТИ, ДИАМЕТРОМ 8-10,5 ММ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) зрелости
- 2) жизнеспособности
- 3) доношенности
- 4) новорожденности

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЫ С ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ ТРАКТОМ МОЖНО УСТАНОВИТЬ

- 1) продолжительность внеутробной жизни
- 2) зрелость
- 3) причину смерти
- 4) доношенность

ПРИЗНАКОМ ПРИЖИЗНЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НА ТЕЛО ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) серповидное эпидуральное кровоизлияние
- 2) копоть в купферовских клетках печени
- 3) наличие копоты в ротовой полости
- 4) растрескивание кожного покрова

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ БРЫЗЖЕЙКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИДАВЛИВАНИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА МАССИВНЫМИ ТЯЖЁЛЫМИ ПРЕДМЕТАМИ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1) синдром Кандинского-Клерамбо
- 2) корешковый синдром
- 3) краш-синдром
- 4) кататонический синдром

ТЕРМИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ

- 1) в третьей зоне близкой дистанции
- 2) в упор
- 3) во второй зоне близкой дистанции
- 4) с неблизкой дистанции

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) метода цветных отпечатков
- 2) эмиссионного спектрального анализа
- 3) УФ-спектрофотометрии
- 4) рентгенфлюоресценции

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЗАБОРА КРОВИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ДОЛЖЕН ПРОИЗВЕСТИ ЗАБОР

- 1) скелетных мышц
- 2) костного мозга
- 3) мочи
- 4) цереброспинальной жидкости

ДВУСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

РАЗРАБОТКОЙ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ НОВорожденности, доношенности и зрелости плода в судебно-медицинском аспекте занимается

- 1) акушерство
- 2) микробиология
- 3) травматология
- 4) иммуногистохимия

НАКОПЛЕНИЕ ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ НАБЛЮДАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА СТАДИИ

- 1) долипидной
- 2) липоидозной
- 3) липосклероза
- 4) атероматоза

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ХВАТАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1) причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

С АЛИМЕНТАРНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ОТНОСИТСЯ ГЕПАТИТ

- 1) G
- 2) B
- 3) A
- 4) C

К ПЕРВОМУ ПЕРИОДУ ОЖоговой БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- 1) истощение
- 2) токсемию
- 3) ожоговый шок
- 4) инфекцию

К МАКСИМАЛЬНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА В БОРЬБЕ С ПЕРЕГРЕВАНИЕМ ОТНОСЯТ

- 1) интенсивное потоотделение
- 2) температуру центральной нервной системы
- 3) отклонение термонеutralной зоны
- 4) двигательную возбудимость

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОЖОГИ КОНЕЧНОСТЕЙ, ГРУДИ И ЖИВОТА III СТЕПЕНИ 30% ПЛОЩАДИ ТЕЛА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ПОСТУПЛЕНИИ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ РАЗВИВАЕТСЯ ОСТРЫЙ

- 1) дуоденит
- 2) гастроэнтероколит
- 3) холецистит
- 4) панкреатит

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ДВИЖЕНИЙ В ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

СОЗНАТЕЛЬНОЕ СОКРЫТИЕ ПРИВЫЧНОГО ВЫВИХА ПЛЕЧА ПРИ ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) членовредительство
- 2) искусственная болезнь
- 3) дезагравация
- 4) диссимуляция

К ПОВРЕЖДАЮЩИМ ФАКТОРАМ ОТНОСЯТ

- 1) возраст
- 2) любое материальное тело или явление
- 3) состояние благополучия
- 4) состояние здоровья

ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЖУРСТВ, С ЦЕЛЬЮ УЧАСТИЯ В ОСМОТРЕ ТРУПОВ НА МЕСТАХ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ (ПРОИСШЕСТВИЯ), УСТАНАВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА НЕ МЕНЕЕ ____ ДОЛЖНОСТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

- 1) 3
- 2) 6
- 3) 5
- 4) 4

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ПРЯМОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ СОЛЕЙ СВИНЦА И ЦИНКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1) параличом дыхательного центра
- 2) некрозами желудочно-кишечного тракта
- 3) гемолизом
- 4) параличом сосудистого центра

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ПРИКУСА И АКТА ЖЕВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) легкий
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) угрожающий жизни

ИЗОБРАЖЕНИЕМ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ С ПОМОЩЬЮ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ОПРЕДЕЛЕННОМ МАСШТАБЕ ИЛИ СХЕМАТИЧЕСКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) план места происшествия
- 2) видеосъемка
- 3) аудиозапись
- 4) слепок места происшествия

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА КРОВЬ И МЫШЦЫ ПРИОБРЕТАЮТ ____ ЦВЕТ

- 1) красный
- 2) фиолетовый
- 3) зеленый
- 4) желтый

В ТЕЧЕНИИ АМИЛОИДОЗА ПОЧЕК РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ СТАДИЮ

- 1) хроническую
- 2) рецидивирующую
- 3) острую
- 4) азотемическую

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ У БАСКЕТБОЛИСТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ____ СУСТАВ

- 1) локтевой
- 2) плечевой
- 3) коленный
- 4) голеностопный

К ВТОРИЧНОМУ ТУБЕРКУЛЕЗУ ОТНОСИТСЯ

- 1) казеозная пневмония
- 2) милиарный туберкулез легких
- 3) туберкулезный плеврит
- 4) туберкулезный полисерозит

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИВШЕЙСЯ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ, ОСЛОЖНИВШЕЙ РЕЗАНЫЕ РАНЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) опасность для жизни
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) длительное расстройство здоровья

ДЛИНА ПУПОВИНЫ У ПЛОДА К 10 ЛУННОМУ МЕСЯЦУ РАВНА (В СМ)

- 1) 50
- 2) 40
- 3) 30
- 4) 55

К МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ОКИСИ УГЛЕРОДА ОТНОСЯТ

- 1) связывание железа в молекуле миоглобина
- 2) нарушение дыхательной функции клеток
- 3) связывание гемоглобина
- 4) перевод атома железа в неактивное состояние

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУП ПРИНИМАЕТ ПОЗУ

- 1) боксёра
- 2) эмбриона
- 3) взведенного курка
- 4) бегущего человека

ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ТОНКОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) вред здоровью средней степени тяжести
- 2) тяжкий вред здоровью
- 3) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 4) легкий вред здоровью

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ТОНКОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасное для жизни

ГИСТОЛОГИЧЕСКИ РАК ПЕЧЕНИ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) недифференцированным
- 2) плоскоклеточным
- 3) ацинозным
- 4) крупноузловым

ЭКСПЕРТНЫМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПО ВСКРЫТИЮ ТРУПА НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА, ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ, ПРОКУРОРА ИЛИ ДОЗНАВАТЕЛЯ С ОФОРМЛЕНИЕМ «ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА» ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ____ ТРУПА

- 1) судебно-медицинской экспертизы
- 2) судебно-медицинского исследования
- 3) патологоанатомического исследования
- 4) патологоанатомической экспертизы

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫМ СОСТОЯНИЕМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ____ КОЖА

- 1) мацерированная
- 2) мозолистая
- 3) сухая
- 4) влажная

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ ЯЗЫКА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) легкий

ТУПУЮ ТРАВМУ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (ПРИ НАЛИЧИИ КЛИНИЧЕСКИХ И

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ) КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

О ПРИЧИНЕ СМЕРТИ - УТОПЛЕНИИ В ПРЕСНОЙ ВОДЕ ПО АСФИКТИЧЕСКОМУ ТИПУ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1) воздуха в левой половине сердца
- 2) диатомового планктона в почке
- 3) пены в дыхательных путях
- 4) субплевральных очаговых кровоизлияний

ДЛИНА ЛИЧИНКИ ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ПЕРВОЙ СТАДИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИМЕТРАХ)

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 3

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДНОГО ОБЗОРА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СКЕЛЕТА ТУЛОВИЩА ПРИМЕНЯЕТСЯ СЕКЦИОННЫЙ РАЗРЕЗ ПО

- 1) Фишеру
- 2) Мак – Коллум – Мэллори
- 3) Соколову
- 4) Лешке

К ВИДАМ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСЯТ ДЕФОРМАЦИЮ

- 1) компрессии
- 2) сдвига
- 3) изгиба
- 4) кручения

ПРИ СМЕРТИ ОТ АСФИКСИИ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1) густое состояние крови в сосудах
- 2) гиперемия кожных покровов
- 3) непроизвольная дефекация
- 4) серый оттенок трупных пятен

ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЖИЗНЕННОГО ИЛИ ПОСМЕРТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ «ПЕРГАМЕНТНОГО» ПЯТНА НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ _____ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1) биологического

- 2) микробиологического
- 3) спектрального
- 4) гистологического

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ БРОНХОВ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней степени тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

К ОТДАЧЕ ТЕПЛА ПУТЕМ ЕГО ЗАТРАТЫ НА ИСПАРЕНИЕ ПОТА ИЛИ ВЛАГИ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И ВЛАГИ СО СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТНОСЯТ СПОСОБ

- 1) кондукционный
- 2) радиационный
- 3) конвекционный
- 4) испарения

КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА ОПИСТИОН РАСПОЛОЖЕНА

- 1) в месте схождения стреловидного и затылочного швов
- 2) на середине заднего края большого затылочного отверстия
- 3) в месте схождения стреловидного и венечного швов
- 4) на переднем края большого затылочного отверстия

К ДИАГНОСТИКЕ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ОТНОСЯТ ПРОБУ

- 1) Винслова
- 2) Пирогова
- 3) Сунцова
- 4) Бокариуса

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАНЫ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В КЛЕТЧАТКУ СРЕДОСТЕНИЯ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

В СЛУЧАЯХ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОИСШЕСТВИЯ ПОЛУЧАЕТ ИЗ

- 1) постановления о назначении экспертизы
- 2) выписного эпикриза
- 3) заключения уролога
- 4) справки венеролога

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ДРОВОЕ РАНЕНИЕ ПРАВОЙ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ С ОДНОСТОРОННИМ РАЗРЫВОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

К ХОЛОСТЫМ ПАТРОНАМ ОТНОСЯТ ПАТРОНЫ БЕЗ

- 1) огнестрельного снаряда
- 2) порохового заряда
- 3) иницирующего устройства
- 4) пыжа-контейнера

РАСТРЕСКИВАНИЕ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА ПРИ ОЛЕДЕНЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕГО ОБЪЕМА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) Райского
- 2) Касьянова
- 3) Пупарева
- 4) Краевского

МЕКОНИЙ УДАЛЯЕТСЯ ОБЫЧНО ИЗ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ (В ДНЯХ)

- 1) 8-10
- 2) 12-14
- 3) 5-7
- 4) 1-4

КУСОЧКИ ОТ МУМИФИЦИРОВАННЫХ ТРУПОВ И ТРУПОВ В СОСТОЯНИИ ТОРФЯНОГО ДУБЛЕНИЯ ИЛИ ЖИРОВОСКА НАПРАВЛЯЮТ В СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В

- 1) растворе формалина
- 2) нефиксированном виде
- 3) дистиллированной воде
- 4) ацетоне

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД

- 1) контактно-диффузионный
- 2) микроскопический
- 3) трасологический
- 4) рентгенологический

ПРОБА СУНЦОВА НАПРАВЛЕНА НА ВЫЯВЛЕНИЕ

- 1) перитонита
- 2) пневмоторакса
- 3) воздушной эмболии
- 4) гемоперикарда

СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЯГКОЙ ПИЩИ (ДИАМЕТР ПРОСВЕТА В ОБЛАСТИ СУЖЕНИЯ 0,3-0,5 СМ), ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

К ИССЛЕДОВАНИЯМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНОГО ОТРАВЛЕНИЯ ЦИАНИДАМИ ОТНОСЯТ

- 1) гистологическое
- 2) судебно-химическое
- 3) цитологическое
- 4) гистохимическое

К РАЗМЯГЧЕНИЮ КОСТЕЙ С РАЗВИТИЕМ ДЕФОРМАЦИИ СКЕЛЕТА ВСЛЕДСТВИЕ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ

- 1) остеолиз
- 2) остеоклазию
- 3) остеодистрофию
- 4) остеомалацию

ТРАВМУ ПОЗВОНОЧНИКА, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III-IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ОСНОВНЫМ ПОВРЕЖДАЮЩИМ ФАКТОРОМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА ГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА В ТОПЛИВНЫХ БАКАХ, ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) взрывная декомпрессия
- 2) взрывная волна
- 3) динамическая перегрузка
- 4) встречный поток воздуха

МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ БЕЗ ПОТЕРИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ (В МЕСЯЦАХ)

- 1) 7
- 2) 2
- 3) 12
- 4) 5

ЭКСПЕРТ ВПРАВЕ ДАВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВОПРОСАМ, НЕ ПОСТАВЛЕННЫМ В ПОСТАНОВЛЕНИИ О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, НО ИМЕЮЩИМ ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДМЕТУ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С

- 1) пунктом 4 части 3 статьи 57 «Эксперт» УПК РФ
- 2) статьей 17 «Права эксперта» ФЗ «О ГСЭД в РФ»
- 3) частью 3 статьи 85 «Обязанности и права эксперта» ГПК РФ
- 4) пунктом 2 части 2 статьи 25.9 «Эксперт» КоАП РФ

ПОСМЕРТНЫМ ПРИЗНАКОМ ДЕЙСТВИЯ ХОЛОДОВОГО ФАКТОРА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) «гусиная кожа»
- 2) признак Пупарева
- 3) «поза калачиком»
- 4) оледенение головного мозга

ЦЕЛЕСООБРАЗНО БРАТЬ ЭЯКУЛЯТ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕ РАНЕЕ ____ СУТОК ПОСЛЕ ПРЕДШЕСТВОВАВШЕГО СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЯ

- 1) 10-12
- 2) 14-16
- 3) 1-2
- 4) 3-4

ПРИ ПРЕБЫВАНИИ В ГЛИНИСТЫХ ПОЧВАХ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ТРУПА ПРИОБРЕТАЮТ ____ ЦВЕТ

- 1) серо-белый
- 2) желтовато-коричневый
- 3) темно-зеленый
- 4) угольно-коричневый

КОКАИН ЯВЛЯЕТСЯ НАРКОТИКОМ _____ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- 1) биохимического
- 2) химического
- 3) растительного
- 4) синтетического

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОЖГОВОЙ БОЛЕЗНИ НА 4-10 СУТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) интоксикация с сопутствующим воспалением легких

- 2) ожоговый шок
- 3) гнойные осложнения со стороны почек
- 4) сепсис

ПЕРЕЛОМ РЕШЕТЧАТОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

РАНЕНИЕ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ РАНЫ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПРОСВЕТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

К ПРИТВОРНЫМ БОЛЕЗНЯМ ОТНОСЯТ

- 1) психические расстройства
- 2) наркоманию
- 3) членовредительство
- 4) симуляцию

ЯДРА ЗЕРНИСТОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВЕ МОГУТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ

- 1) «снежинок»
- 2) «метелок»
- 3) «гирлянд»
- 4) «бус»

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА С СОСТАВЛЕНИЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА ЯВЛЯЕТСЯ _____ ЭКСПЕРТИЗОЙ

- 1) первичной
- 2) дополнительной
- 3) повторной
- 4) единоличной

ДОСТАВКА ОБЪЕКТОВ И МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГСМЭУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) курьером
- 2) органом или лицом, назначившим экспертизу
- 3) лаборантом
- 4) медицинским представителем

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОДНОСТОРОННЕГО ПЕРЕЛОМА ДУГИ I ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительное расстройство здоровья
- 2) кратковременное расстройство здоровья
- 3) угрожающее жизни состояние
- 4) опасность для жизни

КАЛОМЕЛЬ ОТНОСИТСЯ К ____ СРЕДСТВАМ

- 1) гипотензивным
- 2) спазмолитическим
- 3) жаропонижающим
- 4) слабительным

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА ПРОПИЛОВЫХ И БУТИЛОВЫХ СПИРТОВ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1) 200-300
- 2) 10-15
- 3) 100-150
- 4) 50-100

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ (ПРОИСШЕСТВИЯ) ПРИ ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ ВРАЧУ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ЭКСПЕРТУ НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ

- 1) дефекты телосложения
- 2) цвет и одутловатость лица
- 3) положение трупа по отношению к объекту предполагаемого места падения человека
- 4) положение языка

УШИБ ГРУДНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С НАРУШЕНИЕМ ЕГО ФУНКЦИИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) тяжкий вред здоровью
- 4) легкий вред здоровью

В РЕЗУЛЬТАТЕ СДАВЛЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ ТЯЖЕСТЬЮ ТЕЛА ФОРМИРУЕТСЯ СИНДРОМ

- 1) позиционного сдавления
- 2) высвобождения цитокинов
- 3) длительного раздавливания
- 4) альтернирующий экстрацеребральный

РЕЗАНАЯ РАНА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

РАСПИСКУ О ПОЛУЧЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА ВЫПОЛНЯЮТ НА КОПИИ

- 1) протокола
- 2) справки
- 3) акта
- 4) сопроводительного письма руководителя ГМСЭУ

ЛОБНАЯ ПЛАГИОЦЕФАЛИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ СИНОСТОЗИРОВАНИЕМ

- 1) затылочно-сосцевидного шва черепа с одной стороны
- 2) височно-скулового шва с одной стороны
- 3) венечного шва черепа с одной стороны
- 4) венечного шва черепа с двух сторон

ПОДСЧЕТ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРОВОДЯТ ИЗ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА _____ ПРЕПАРАТОВ В ГОД НА ОДНУ ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА

- 1) 750
- 2) 500
- 3) 600
- 4) 700

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОКРАСКИ НА ТРУПНОЕ ПЯТНО НАДАВЛИВАЮТ ДИНАМОМЕТРОМ С СИЛОЙ (КГС/СМ²)

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 4

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) эмиссионного спектрального анализа
- 2) рентгенфлюоресценции
- 3) фотометрии
- 4) осадительных реакций

ПЕРЕЛОМ ПЕРСТНЕВИДНОГО ХРЯЩА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) длительный
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) описание вещественных доказательств
- 2) констатация биологической смерти
- 3) описание окружающей обстановки
- 4) фотографирование трупа

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАЦИЕНТАМИ С ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ АГГРАВАЦИИ

- 1) патологической
- 2) подсознательной
- 3) активной
- 4) пассивной

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОТРАЖЕНИЮ В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖИТ ОПИСАНИЕ

- 1) глубины раны
- 2) внутренних органов
- 3) направления раневого канала
- 4) позы трупа

ДЕЙСТВИЕ ОПИАТОВ ОБУСЛОВЛЕНО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО

- 1) гемолизом
- 2) ингибированием тиоловых ферментов
- 3) антихолинэстеразной реакцией
- 4) понижением чувствительности сосудистых рецепторов

ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТОВ, ВЗЯТЫХ ДЛЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ

- 1) метанол
- 2) глицерин
- 3) формалин
- 4) этанол

ПОЛНОКРОВИЕ И СВЕТЛО-КРАСНЫЙ ЦВЕТ ТКАНИ ЛЕГКИХ ПРИ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ВПЕРВЫЕ ОПИСАНО

- 1) Краевским
- 2) Касьяновым
- 3) Десятовым
- 4) Фабрикантовым

ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) выраженное вытягивание клеток и ядер мальпигиевого слоя
- 2) утолщение зернистого и шиповатого слоя
- 3) отсутствие пустот в роговом слое эпидермиса
- 4) уплотнение эпидермиса и дермы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОРГАНИЗМ ПРИВОДИТ К

- 1) сужению периферических сосудов
- 2) повышению мышечного тонуса
- 3) снижению интенсивности обмена веществ
- 4) усилению обмена веществ

ДЛЯ ПЕРИОДА ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ РАЗВИТИИ ОБЩЕГО ПЕРЕГРЕВАНИЯ ОРГАНИЗМА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) теплоотдача с повышением температуры тела
- 2) ступор
- 3) адинамия
- 4) сопор

ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО, РАЗВИВШЕЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) опасный для жизни
- 3) средней тяжести
- 4) тяжкий

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЖЕЛУДКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасное для жизни
- 4) стойкой утраты общей трудоспособности

ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ЛЕГКОЕ РАССТРОЙСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, СУХОЖИЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ, НЕЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ГИПОТРОФИЮ МЫШЦ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В КОНЕЧНОСТЯХ, ВЫЗВАВШЕЕ

СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) малокровие внутренних органов
- 2) отек ложа желчного пузыря
- 3) гипертрофия левого желудочка
- 4) бледность слизистой оболочки трахеи

ОДНОСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ II ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) средней тяжести

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПНЕВМОТОРАКС ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

СЕПСИС РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на $\frac{1}{3}$
- 3) временное нарушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью свыше трёх недель
- 4) незначительная стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 30% включительно

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) длительное расстройство здоровья

О ПОЯВЛЕНИИ ПОЗДНИХ ТРУПНЫХ ЯВЛЕНИЙ СУДЯТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ

- 1) идиомускулярной опухоли
- 2) участков высыхания кожи
- 3) мышечного окоченения
- 4) трупной эмфиземы

ПРИ ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНЬ ПРИОБРЕТАЕТ ВИД

- 1) «гусиной»
- 2) «тигровой»
- 3) «вареной»
- 4) «бурой»

СМЕРТЬ ОТ АСПИРАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ ОТНОСЯТ К _____ АСФИКСИИ

- 1) странгуляционной
- 2) обтурационной
- 3) быстрой компрессионной
- 4) медленной компрессионной

ДАТА НАЧАЛА ЭКСПЕРТИЗЫ (ИССЛЕДОВАНИЯ) ИСЧИСЛЯЕТСЯ СО ДНЯ

- 1) начала исследования
- 2) назначения конкретного эксперта для проведения экспертизы
- 3) поступления в ГСЭУ постановления, объектов и материалов
- 4) назначения конкретной комиссии для проведения экспертизы

НОВорожденный младенец, имеющий признаки самостоятельного дыхания, сердцебиения, пульсации пуповины и произвольных движений считается

- 1) новорожденным
- 2) живорожденным
- 3) зрелым
- 4) жизнеспособным

ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ СЧИТАЮТ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНЕННОЕ

- 1) прикладом автомата
- 2) пороховыми газами
- 3) рукояткой пистолета
- 4) штыком винтовки

ИНДЕКС ВАЗИНОЙ И.Р. ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

- 1) перитонита
- 2) пневмонии
- 3) эмболии
- 4) шока

КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ

ПРИЧИНЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) длительное расстройство здоровья

ПОД ИСТЕЧЕНИЕМ КРОВИ В РЕЗУЛЬТАТЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ИЛИ ВЫЗВАННОГО ТРАВМОЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ КРОВЕНОСНОГО СОСУДА ПОНИМАЮТ

- 1) кровотечение
- 2) кровоизлияние
- 3) кровоподтек
- 4) кровопотерю

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

СПЕЦИФИЧЕСКИМ КРАСИТЕЛЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМОМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОГО ЖИРА В КЛЕТКАХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гематоксилин-эозин
- 2) судан III
- 3) азан
- 4) орсеин

ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ СЛЕДОВАТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРИВЛЕЧЬ

- 1) лаборанта
- 2) фармацевта
- 3) врача любой специальности
- 4) санитаря

ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

ПЕРЕЛОМ-ВЫВИХ МОНТЕДЖА ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести

- 2) опасный для жизни
- 3) лёгкий
- 4) тяжкий

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЕТ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ (В ВОЛЬТАХ)

- 1) 10-20
- 2) 220-380
- 3) 5-10
- 4) 100-150

СОГЛАСНО ПОРЯДКУ ПРОИЗВОДСТВА БИОХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИКОЛИЗИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА, МЕТГЕМОГЛОБИНА, ФИБРИНОГЕНА И ПРОДУКТОВ ДЕГРАДАЦИИ ФИБРИНА (ПДФ) НЕОБХОДИМО НАПРАВЛЯТЬ

- 1) правую долю печени
- 2) цельную кровь
- 3) стенку левого желудочка сердца
- 4) подвздошную мышцу

К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ (СПЕЦИФИЧЕСКИМ) ПРИЗНАКАМ ПЕРЕЕЗДА ЧЕРЕЗ ТЕЛО КОЛЕСА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ОТНОСЯТ

- 1) односторонние переломы костей таза
- 2) переломы костей нижних конечностей
- 3) отпечаток протектора колеса на коже
- 4) полосовидные ссадины на коже

ГЛУБИНА РАНЕВОГО КАНАЛА МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНУ КЛИНКА ПРИ УДАРЕ НОЖОМ В ОБЛАСТЬ

- 1) головы
- 2) живота
- 3) сердца
- 4) лопатки

ЗАКРЫТУЙ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ПРИВЕДШУЮ К РЕЗЕКЦИИ БРЫЖЕЙКИ И ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) опасный для жизни
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

ДЕКОМПРЕССИОННЫЕ РАССТРОЙСТВА ВОЗНИКАЮТ ПРИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА ВЫСОТЕ (В МЕТРАХ)

- 1) 4000-2000

- 2) 6000-8000
- 3) 1000-500
- 4) 2000-1500

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОТРАЖЕНИЮ В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖИТ ОПИСАНИЕ

- 1) трупных пятен
- 2) направления раневого канала
- 3) глубины обнаруженных повреждений
- 4) внутренних органов

ПРИ НАРУЖНОМ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ, ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ НА _____ ЛИЦА

- 1) желтушность
- 2) сухость
- 3) бледность
- 4) одутловатость

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТВЕРДОГО ТУПОГО ПРЕДМЕТА НА ОБЛАСТЬ

- 1) диафиза бедренной кости
- 2) большого вертела бедренной кости
- 3) коленного сустава по оси бедра в положении сгибания его в тазобедренном суставе
- 4) коленного сустава при прямом положении бедра

СМЕРТЬ НАСТУПАЕТ ПРИ СНИЖЕНИИ ОБЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСΙΑ)

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 20

К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 3 СТЕПЕНИ ОТНОСЯТ

- 1) обугливание костей
- 2) некроз кожи
- 3) обугливание мышц
- 4) гиперемию кожи

ЭЛЕКТРОМЕТКА МОЖЕТ ИМЕТЬ _____ ДНО

- 1) вогнутое
- 2) выпуклое
- 3) западающее
- 4) мелкозернистое

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ 3 СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЮТ В

- 1) глубоких тканях
- 2) подкожной жировой клетчатке
- 3) эпидермисе
- 4) дерме

МИОЦИТОЛИЗИС ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ _____, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) этанолом
- 2) грибными ядами
- 3) угарным газом
- 4) нитритами

КОМИССИОННЫЙ ХАРАКТЕР ЭКСПЕРТИЗЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1) комиссия экспертов
- 2) руководитель ГСМЭУ
- 3) эксперт самостоятельно
- 4) орган или лицо, назначившее экспертизу

ДОНОШЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ ИМЕЕТ МАССУ ТЕЛА (В КГ)

- 1) 3,5
- 2) 2,0
- 3) 4,0
- 4) 4,5

ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА И.Р. ВАЗИНОЙ В ПРЕДЕЛАХ 0,5-1,0 СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ

- 1) обильной кровопотери
- 2) перитонита
- 3) шока
- 4) воздушной эмболии

ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕРДЦА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1) опасный для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИИ У ТРУПА ПРИЗНАКОВ СМЕРТИ ОТ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (БСМЭ) ИНФОРМИРУЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) главного врача инфекционной больницы
- 2) руководителей органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- 3) родственников

4) следователя

ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ ОБЩЕЙ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ (В ГРЕЯХ)

- 1) 4-10
- 2) 1-2
- 3) 3-6
- 4) 12-20

ОТСУТСТВИЕ ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ КОНЕЧНОСТИ ПОСЛЕ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ В ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ ВСЛЕДСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) длительный
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕМ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 10-20
- 2) 40-50
- 3) 5-10
- 4) до 5

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕФЕКТА КОЖИ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ С ПРОТЯЖЕННЫМИ РАДИАЛЬНЫМИ РАЗРЫВАМИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ _____ ДЕЙСТВИИ ПУЛИ

- 1) разрывном
- 2) гидродинамическом
- 3) клиновидном
- 4) ушибающем

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ СПИДА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИССЛЕДУЮТ

- 1) кожу
- 2) щитовидную железу
- 3) надпочечники
- 4) органы иммуногенеза

СОДЕРЖИМОЕ ВЛАГАЛИЩА НА НАЛИЧИЕ СПЕРМЫ СЛЕДУЕТ БРАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ____ СУТОК ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ПОЛОВОГО АКТА, ПО ПОВОДУ КОТОРОГО ПРОИЗВОДЯТ ЭКСПЕРТИЗУ

- 1) 18
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 15

ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАНОЕ РАНЕНИЕ ПЛЕЧА С РАССЕЧЕНИЕМ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) длительный
- 4) лёгкий

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНА СЛУХА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗВУКА ЧРЕЗМЕРНОЙ СИЛЫ ИЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ ТРАВМЫ

- 1) авиационной
- 2) барометрической
- 3) акустической
- 4) радиационной

ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРА ПОРАЖЕНИЯ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПО ПРАВИЛУ «ДЕВЯТКИ» СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 9
- 2) 14
- 3) 18
- 4) 1

КРОВОИЗЛИЯНИЕ В МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ДИСКИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1) сдавлении груди и живота
- 2) удавлении руками
- 3) повешении
- 4) истинном утоплении

РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ С ПЕРВЫХ ____ МИНУТ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1) 30
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 15

ОТЛОЖЕНИЕМ В ФИБРОЗНЫЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ БЛЯШКИ СОЛЕЙ КАЛЬЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фиброз
- 2) кальциноз
- 3) пятно
- 4) атерома

ТЕПЛОВОЙ УДАР, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ РАЗВИТИЕМ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОГО ШОКА III

СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) не причинивший
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) средней тяжести

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ ТРУПА БЕРУТ

- 1) язык, пищевод, верхние дыхательные пути
- 2) кровь, мочу, печень, легкое
- 3) желудок и начальную часть тонкого кишечника с содержимым, часть толстой кишки с содержимым, почку и мочу, печень и желчный пузырь, головной мозг, легкое
- 4) сердце, легкое, почки, печень, мозг, кровь

КОМПЛЕКС ПОВРЕЖДЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРИ АВИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФАХ, НАЗЫВАЮТ АВИАЦИОННОЙ

- 1) смертью
- 2) аварией
- 3) травмой
- 4) трагедией

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ОРИЕНТИРОВОЧНО СНИЖАЕТСЯ НА 1°С ЗА 1 ЧАС В ПЕРВЫЕ (В ЧАСАХ)

- 1) 6-7
- 2) 2-3
- 3) 3-4
- 4) 5-6

ВЫВИХ ГРУДНОГО ПОЗВОНКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1) легкий вред здоровью
- 2) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) тяжкий вред здоровью

СПОСОБНОСТЬ КЛЕТОК ИЛИ ТКАНЕЙ НАПОЛНЯТЬСЯ ИЗБЫТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ РАЗНООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) декомпозицией
- 2) инфильтрацией
- 3) трансформацией
- 4) извращенным синтезом

РЕЗУЛЬТАТОМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ОКИСИ УГЛЕРОДА ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ ОСТРОЙ

- 1) почечной недостаточности

- 2) дыхательной недостаточности
- 3) гемической гипоксии
- 4) тканевой гипоксии

К ПРОИЗВОДНЫМ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1) фенobarбитал
- 2) пиридин
- 3) нитразепам
- 4) тетридин

ИЗМЕНЕНИЯ ТРУПА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ВНЕ УСЛОВИЙ ЗАХОРОНЕНИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) мацерацией
- 2) карбогенизацией
- 3) собственно трупными изменениями
- 4) фростацией

ПРИ ПРИЖИЗНЕННОМ УДАВЛЕНИИ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ

- 1) кровоизлияния в голосовые связки
- 2) пластинчатую эпидуральную гематому
- 3) разлитые трупные пятна розового цвета
- 4) множественные жировые эмболы в сосудах головного мозга

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ИЛИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АБОРТ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРОБУ НА

- 1) гемоперикард
- 2) перитонит
- 3) гемоторакс
- 4) воздушную эмболию

ПРИ ТЕПЛОВОЙ ТРАВМЕ СОСТОЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОМФОРТА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

- 1) интенсивным потоотделением
- 2) в пределах термонеutralной зоны
- 3) повышенной рефлекторной возбудимостью
- 4) температурой центральной нервной системы

ТУПАЯ ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ТАЗА С ОТРЫВОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ОТ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1) лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) не причинившая
- 4) средней тяжести

**ПОВЕРХНОСТНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОЖИ
ОТТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ТРАВМИРУЮЩЕГО ПРЕДМЕТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) рана
- 2) эритема
- 3) кровоподтек
- 4) ссадина