

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Психиатрия-наркология» (Высшая категория) для аттестации

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:

<https://medik-akkreditacia.ru/product/psihiatr-narkolog/>

Полезные ссылки:

1) Тесты для аккредитации «Психиатрия-наркология» (4000 вопросов)

https://medik-akkreditacia.ru/product/psihiatriya_narkologiya/

2) Тесты для аккредитации «Наркология (ПСА)» (500 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/narkologiya/>

Одним из основных индикаторов алкогольной ситуации и в России и во всем мире, является

Показатель обращаемости за медицинской помощью лиц с наркологическими расстройствами

ДТП, совершенные в состоянии опьянения

Рост числа правонарушений в состоянии алкогольного опьянения

Уровень потребления алкоголя на душу населения

Рост числа заболеваний, связанных с употреблением алкоголя

У умерших в состоянии острой интоксикации алкоголем чаще всего выявляется

Жировая инфильтрация клеток

Микроскопически обнаруживаемые микроциркуляторные расстройства

Гиперемия и отек мозга

Разной степени выраженности признаки токсической энцефалопатии

Кистообразное расширение саркоплазматического ретикулула

Чаще всего острая (токсическая) гепатопатия протекает с цитолитическим синдромом, под которым понимают

Нарушения проницаемости клеточных и нутриклеточных мембран гепатоцитов

Дистрофические изменения паренхимы печени

Снижение синтетической функции печени

Некротические изменения паренхимы печени

Снижение детоксицирующей функции печени

Одним из самых чувствительных показателей состояния конкретного больного с зависимостью в данное время является компонент патологического влечения

Поведенческий

Идеаторный

Эмоциональный

Вегетативный

Сенсорный

Нейрофизиологические механизмы зависимости от ПАВ реализуются в

Областях стволовых и мезолимбических структур мозга, где располагается т.н.

«система подкрепления»

Стволовых структурах мозга

Мезолимбических структурах мозга

Подкорковых структурах мозга

Диэнцефальных структурах мозга

Основным медиатором, обеспечивающим функции «системы подкрепления» является

Дофамин

Серотонин

Опиаты

ГАМК

Норадреналин

Различия в скорости окисления алкоголя в организме женщины в отличие от мужчин, обусловлены тем, что у них

Скорость окисления алкоголя в слизистой желудка выше, а относительное содержание воды в организме ниже

Скорость окисления алкоголя в слизистой желудка ниже, а относительное содержание воды в организме выше

Скорость окисления алкоголя в слизистой желудка и относительное содержание воды в организме выше

Скорость окисления алкоголя в слизистой желудка и относительное содержание воды в организме ниже

Алкоголь окисляется не в слизистой желудка, а в слизистой кишечника

Маркёром употребления героина и отличия от морфина и кодеина является метаболит

А. Морфин-6-глюкуронид

Б. 6-моноацетилморфин

В. Норморфин

Г. Морфин

Д. Морфин-3-глюкуронид

Метамфетамин выводится из организма

- Г. Быстрее, чем кокаин
- Б. Быстрее, чем амфетамин
- А. Медленнее, чем амфетамин
- В. С одинаковой с амфетамином скоростью
- Д. С одинаковой с кокаином скоростью

Онейроидная кататония проявляется

- Б. Гебефреническим возбуждением
- В. Ступором с явлениями восковой гибкости, ступорозными состояниями
- А. Экстатическим, импульсивным возбуждением
- Д. Всем перечисленным
- Г. Онейроидным помрачением сознания

Нарушение обмена липидов при интоксикации алкоголем обусловлено

- Б. Перекисным окислением их, нарушением всасывания их в желудочно-кишечном тракте, мобилизацией жира из жировых депо в связи с возбуждающим действием алкоголя на симпатoadреналовую систему
- В. Нарушением всасывания их в желудочно-кишечном тракте и мобилизацией жира из жировых депо в связи с возбуждающим действием алкоголя на симпатoadреналовую систему
- А. Перекисным окислением их
- Г. Перекисным окислением их и мобилизацией жира из жировых депо в связи с возбуждающим действием алкоголя на симпатoadреналовую систему
- Д. Нарушением всасывания их в желудочно-кишечном тракте

Неотложная помощь при кататоническом возбуждении включает

- А. Неотложную госпитализацию
- Г. Применение антидепрессантов
- Б. Инъекционное введение нейролептиков преимущественно седативного действия (аминазин, тизерцин, хлорпротиксен)
- В. Применение мощных нейролептиков-антипсихотиков (галоперидол и др.)
- Д. Применение ЭСТ

Ориентированный онейроид проявляется

- Г. Легким изменением фантастических бредовых построений под влиянием изменений окружающего мира, нарушением чувства времени
- А. Возникновением непроизвольного фантазирования с яркими представлениями о войнах, мировых катастрофах, полетах на луну и т.д.
- В. Наплывом истинных зрительных галлюцинаций
- Б. Сосуществованием такого фантазирования с восприятием реального мира и ориентировкой в окружающем
- Д. Преобладанием растерянно-патетического возбуждения или субступора

К персекуторному бреду относится

- Г. Бред изобретательства
- Б. Бред виновности, самообвинения
- А. Бред преследования
- В. Бред ревности
- Д. Манихейский бред

При дифференциальной диагностике сумеречного помрачения сознания с продуктивными расстройствами («психотическая» форма) от классического сумеречного состояния, следует учитывать, что оно проявляется

- А. Сопровождается галлюцинациями, бредом и измененным аффектом
- Д. Грёзоподобным бредом с преобладанием визуализированных фантастических представлений
- Б. Относительно постепенным возникновением
- В. Восприятием больным окружающего в соответствии с существующими бредовыми расстройствами
- Г. Отражением в словах и действиях больного существующих патологических переживаний

Нарушения иммунной системы при хронической интоксикации алкоголем проявляются

- Г. Повышением активности Т-лимфоцитов
- Б. Высокой инфицированностью стрептококком
- А. Снижением способности организма к освобождению от продуктов, образующихся при разрушении тканей
- В. Снижением фагоцитарной активности нейтрофилов
- Д. Повышенной заболеваемостью больных алкоголизмом и более тяжелым протеканием заболеваний

К характерным для хронической интоксикации алкоголем изменениям крови относится

- Г. Миелоидная реакция
- А. Тромбоцитопения
- Б. Изменение функции лейкоцитов (ослабление способности к фагоцитозу)
- В. Гемолитическая анемия
- Д. Изменение среднего корпускулярного объема эритроцитов

Для неврологических расстройств в рамках алкогольной энцефалопатии типа коркового ламинарного склероза (болезнь Мореля) характерно

- В. Глазные симптомы
- А. Астазия-абазия
- Г. Сухожильная гиперрефлексия
- Б. Оппозиционная гипертония
- Д. Мышечная гипотония

Для неврологических расстройств при алкогольной энцефалопатии типа

Маркиафава-Биньями характерно

- Б. Офтальмоплегия, достигающая степени тотальной
- А. Генерализованная мышечная гипертония
- В. Дизартрия
- Г. Астази-абазия
- Д. Гипотония

Барбитуровый делирий отличается от алкогольного

- Г. Менее глубокой степенью помрачения сознания и меньшим двигательным возбуждением
- А. Меньшим двигательным возбуждением, но более глубоким помрачением сознания
- В. Отсутствием «скачущего» аффекта и более глубокой степенью помрачения сознания, интенсивностью цветовой окрашенности галлюцинаторных образов
- Б. Интенсивностью цветовой окрашенности галлюцинаторных образов и преобладанием красного и синего цветов
- Д. Эпилептиформными припадками

В формировании конституциональных психопатий в подростковом возрасте имеют значение

- Б. Аномалии сферы инстинктов и влечений
- В. Элементарные психопатические реакции (злость, агрессия и др.)
- А. Аномалии темперамента
- Д. Все перечисленные утверждения
- Г. Ситуационные личностные реакции протеста, отказа, интеркомпенсации и др.

В отличие от пубертатного криза, пубертатная декомпенсация психопатии у подростков проявляется

- Б. Состоянием, приближающимся по своему внешнему оформлению к метафизической интоксикации
- В. Огульным, бездумным отрицанием общепринятых авторитетов и норм поведения
- А. Гротескным характером
- Д. Всем перечисленным
- Г. Крайней эмоциональной лабильностью с неуправляемым поведением

В отличие от психопатии, для шизофрении с психопатоподобными (гебоидными) проявлениями, характерны

- В. Эмоциональное снижение
- А. Смена настроения от безразлично-вялого к веселому со склонностью к шутливости, дурашливости
- Д. Все перечисленные признаки
- Б. Нерезкое падение психической активности
- Г. Ослабление способности к концентрации внимания

Основные особенности симптома психического автоматизма в структуре

хронического алкогольного галлюциноза с психическими автоматизмами и парафренным изменением бреда, характеризуются

- А. Возникновением с самого начала заболевания
- Г. Верно А, Б и В
- Б. Сложностью сенсорного компонента
- В. Более редким возникновением идеаторного компонента
- Д. Верно А

Основными клиническими дифференциально-диагностическими признаками, отличающими острые интоксикационные гашишные психозы от кокаиновых, являются

- А. Резкое чувство голода
- Г. Активизация интеллектуальной деятельности
- Б. Повышенная жажда
- В. Нарушение сознания
- Д. Снижение нейромускуляторной функции

Дифференциации хронических гашишных психозов помогает

- В. Отсутствие аппетита
- А. Гиперемия кожи, покраснение склер
- Б. Учащение пульса, дыхания
- Г. Сухость во рту, жажда
- Д. Тремор пальцев рук, неустойчивость в позе Ромберга, жалобы на головную боль, головокружение

Острые интоксикационные психозы у больных эфедроновой наркоманией характеризуются

- Д. Внезапностью развития
- А. Длительностью от нескольких часов до нескольких дней и месяцев
- Б. Повторяемостью и однотипностью клинической картины (по типу клише)
- В. Бредовыми идеями отношения, преследования
- Г. Сохранением бредовой настроенности после купирования острых расстройств в течение одной-двух недель

Не имеющее аналогов при других формах зависимости явление – взаимозаменяемость опиатов, эфедрона и транквилизаторов – наблюдается при

- В. Токсикомании транквилизаторами
- А. Эфедроновой наркомании
- Г. Верно А
- Б. Опийной наркомании
- Д. Верно А, Б и В

В стандарт оснащения отделения неотложной наркологической помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 929н "Об утверждении порядка оказания медицинской

помощи по профилю "наркология", не входит

- В. дефибриллятор кардиосинхронизированный
- Г. автоматические дозаторы лекарственных средств шприцевые
- А. аппарат для искусственной вентиляции легких
- Б. централизованная система подводки кислорода к каждой кровати или концентраторы кислорода
- Д. анализатор наркотических и сильнодействующих лекарственных средств

Практическое значение демографических показателей сводится к:

- А. Планированию социально-экономического развития страны
- Б. Планированию сети учреждений здравоохранения
- В. Оценке здоровья населения
- Г. Оценке качества медицинской помощи
- Д. Планирование лекарственного обеспечения населения

Общее усовершенствование врачей психиатров-наркологов проводится не реже 1 раза в

- А. 2 года
- В. 5 лет
- Б. 3 года
- Г. 7 лет

Малый истерический припадок характеризуется состоянием, при котором наблюдаются

- Б. Внезапная потеря сознания
- В. Массивная тоническая судорога с изгибанием тела в дугу
- А. Тонические и клонические судороги
- Г. Приступы рыдания, хохота
- Д. Секундная потеря сознания с судорожными подергиваниями отдельных групп мышц

К кататимному бреду относят бред

- Г. Самообвинения, виновности
- А. Преследования
- Б. Воздействия
- В. Отравления
- Д. Интерметаморфозы

Понятию «комплексной» в наибольшей степени отвечает терапия, которая включает в себя

- Б. Несколько препаратов разных групп
- Г. Комбинацию психотерапевтических методик
- А. Несколько видов лекарственных средств вне зависимости от их групповой принадлежности
- В. Лекарственные средства и психотерапевтические методики

Д. Комплекс психокоррекционных и реабилитационных мероприятий

Понятию «адекватная» наиболее отвечает терапия

А. Комплексная

Д. При которой спектр действия лекарств соответствует статусу больного

Б. Интенсивная

В. Специфическая

Г. Эффективная

Положительным результатом пробы А.М. Раппопорта является

Г. Изменение окраски обеих пробирок

А. Частичное изменение цвета одной из пробирок

Б. Полное обесцвечивание одной из пробирок

В. Отсутствие изменений окраски в обеих пробирках

Клинические признаки алкогольного опьянения начинают отчетливо проявляться при концентрации алкоголя в крови

В. 0,5 промилле

А. 0,2 промилле

Г. 1,0 промилле

Б. 0,3 промилле

Д. 2,0 промилле

Анамнестические сведения собирают, соблюдая принцип получения данных

Б. О настоящем состоянии больного

В. О родственниках больного

А. От настоящего к прошлому

Г. От прошлого к настоящему

Д. Не только о болезни, но и о жизни больного

Как называется наука о трезвости

А. Наркология

Г. Собриология

Б. Теология

В. Этимология

Д. Петрология

В каком году советское правительство сделало попытку восстановить «сухой закон» в стране

Б. в 1919 году

А. в 1917 году

В. в 1921 году

Г. в 1923 году

Д. в 1925 году

Внутренняя картина болезни включает в себя

- Г. данные рентгенологического исследования
- Б. результаты биохимического исследования
- А. объективные знания больного о своей болезни, а также субъективно переживаемые болезненные и тягостные ощущения
- В. симптомы, выявляемые у больного
- Д. клинику внутренних болезней

Автор методики коллективной эмоционально-стрессовой гипнотерапии

- Б. И.М. Виш
- В. С.С. Либих
- А. В.М. Бехтерев
- Г. В.Е. Рожнов
- Д. А.Р. Довженко

Ассертивное поведение

- Б. присуще большинству пациентов до развития болезни
- Г. даёт возможность управлять другими людьми
- А. позволяет добиться цели любой ценой
- В. учитывает интересы всех участников взаимодействия
- Д. свойственно, преимущественно, представителям власти

Буквальный перевод термина «аддикт» означает

- А. Алкоголик
- Б. Наркоман
- В. Токсикоман
- Г. Игрок
- Д. Трудоголик

Кто ввёл в употребление в России термин «аддикция»

- В. Карпов А.М.
- А. Иванец Н.Н.
- Г. Короленко Ц.П.
- Б. Москаленко В.Д.
- Д. Менделевич В.Д.

Форма эмоционального стресса

- Д. генерализованная
- А. импульсивная
- Б. тормозная
- В. интерактивная
- Г. сверхценная

В клинической картине классического варианта острого алкогольного (металкогольного) психоза истинные императивные вербальные галлюцинации

характерны при:

- Б. Алкогольном параноиде
- Г. Алкогольном делирии
- А. Энцефалопатии Гайе-Вернике
- В. Алкогольном галлюцинозе

Наиболее отличительной особенностью алкоголизма у женщин является

- Б. Раннее появление психотических форм заболевания
- В. Низкая курабельность
- А. Злокачественность течения
- Г. Аффективная окрашенность клинической симптоматики
- Д. Раннее появление и быстро нарастающая социальная дезадаптация

С учетом высокой летальности больных с ААС, осложненным пневмонией, главным условием терапии является

- В. Лечение нестероидными противовоспалительными препаратами
- Г. Назначение сердечно-сосудистых средств
- А. Назначение гепарина при обнаружении стафилококковой инфекции
- Б. Смена антибиотиков и других антибактериальных средств через каждые 5-7 дней
- Д. Лечение препаратами, улучшающими кровоток в тканях

При актуализации влечения к алкоголю и другим ПАВ патогенетически оправдано назначение антипсихотических средств

- В. Стимулирующих серотониновую и дофаминовую нейромедиацию в мезолимбических структурах мозга
- Г. Стимулирующих дофаминовые постсинаптические рецепторы в лимбической системе
- Б. Регулирующих серотониновую и дофаминовую нейромедиацию в мезолимбических структурах мозга
- А. Блокирующих дофаминовые постсинаптические рецепторы в лимбической системе
- Д. Стимулирующих дофаминовые пресинаптические рецепторы в лимбической системе

Наиболее важным звеном в развитии нарушений при остром отравлении алкоголем является

- А. Расстройства функциональных систем организма
- В. Формирование синдрома комплекса несостоятельности гомеостаза
- Б. Формирование синдрома эндогенной интоксикации
- Г. Расстройства функции дыхания
- Д. Расстройства функции сердечно-сосудистой системы

Нейрофизиологические механизмы зависимости от алкоголя и других ПАВ реализуются в

- В. Областях стволовых и мезолимбических структур мозга, где располагается т.н.

«система подкрепления»

- А. Стволовых структурах мозга
- Б. Мезолимбических структурах мозга
- Г. Подкорковых структурах мозга
- Д. Диэнцефальных структурах мозга

В основе действия стимуляторов на мозг лежит

- Б. Стимулирование высвобождения катехоламинов и торможение их обратного захвата
- А. Торможение высвобождения катехоламинов и стимулирование их обратного захвата
- В. Стимулирование высвобождения катехоламинов и активация их обратного захвата
- Г. Торможение высвобождения катехоламинов и подавление их обратного захвата
- Д. Стимулирование высвобождения катехоламинов

Основным нейромедиатором, обеспечивающим функции «системы подкрепления», является

- Г. ГАМК
- А. Серотонин
- В. Дофамин
- Б. Опиаты
- Д. Норадреналин

Основной задачей лечения больных наркоманией в 1-й стадии болезни является:

- А. Детоксикация
- Г. Поддержание реактивности организма
- Б. Купирование острых состояний
- В. Коррекция психических расстройств

Аддикция определяется как

- Г. Аффективное расстройство в виде смешения страха, злобы и тоски
- А. Пароксизмальные нарушения поведения в рамках здоровья
- Б. Систематическое повторение действий, лишенных целесообразности и реального приспособительного значения, возникающее у дефицитарных личностей, как свидетельство психологической декомпенсации и ведущее к снижению социальной адаптации или дезадаптации.
- В. Помрачение сознания на фоне органических повреждений головного мозга
- Д. Психологическая защита, которая активизируется при попадании в неблагоприятные жизненные условия.

Под дефицитарностью личности, предрасполагающей к формированию аддиктивных расстройств, подразумевается недостаточность или повреждения

- Г. На культурном уровне функционирования человека.
- А. В морально-этической сфере

В. На четырех уровнях функционирования человека: биологическом, психологическом, социальном и духовном

Б. В интеллектуальной сфере

Д. Резидуально-органические повреждения нервной системы.

Что является содержимым каждого личностного статуса?

Г. Комплексы

А. Оценочные суждения окружающих людей

Б. Определенные смыслы, ценности, установки и стереотипы восприятия и поведения, характерные для того социокультурального окружения, в котором человек живет

В. Архетипы

Д. Особенности эмоционально-волевого реагирования, приобретенные в процессе воспитания в родительской семье.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов: А-F11; Б-F16; В-F12; Г-F14; Д-F18.

1-В

1-Г

1-А

1-Б

1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных и снотворных средств: А-F11; Б-F10; В-F17; Г-F16; Д-F13.

1-Д

1-А

1-Б

1-В

1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов- острая интоксикация: А-F11.3; Б-F16.6; В-12.0; Г-

F14.2; Д-F18.5.

- 1-В
- 1-А
- 1-Б
- 1-Г
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина- абстинентное состояние с делирием: А-F11.5; Б-F16.7; В-12.1; Г-F14.4; Д-F18.6.

- 1-Г
- 1-А
- 1-Б
- 1-В
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1. Острый алкогольный галлюциноз: А-Спутанность сознания, глазодвигательные нарушения, атаксия; Б-Истинные зрительные галлюцинации; В-Истинные вербальные галлюцинации; Г-Бред преследования; Д-Конфабуляции, фиксационная амнезия.

- 1-В
- 1-А
- 1-Б
- 1-Г
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1. Необходимость употребить алкоголь для снятия тягостного психического и физического состояния: А-Психоорганический синдром; Б-Делириозный синдром; В-Психопатоподобный синдром; Г-Синдром отмены (ААС); Д-Невротический синдром.

- 1-Г
- 1-А
- 1-Б

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1. Наркотическая амнезия: А-Травматическое поражение головного мозга; Б-Корсаковский психоз; В-Алкоголизм 2ст.; Г-Церебральный атеросклероз; Д-Алкоголизм 1ст..

1-Д

1-А

1-Б

1-В

1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1. Средняя суточная доза Флувоксамина: А-5-10 мг.; Б-50-100 мг.; В-20 мг.; Г-200 мг.; Д-20-40 мг..

1-Г

1-А

1-Б

1-В

1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1. Аверсивные средства: А-Налтрексон; Б-Клонидин; В-Апоморфин, эметин, отвар баранца; Г-Дисульфирам, цианамид, метронидазол; Д-Бромкриптин.

1-Б

1-В

1-А

1-Г

1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1. Биохимическая концентрация калия: А-2,5-8,3 ммоль/л; Б-3,5-5,5 ммоль/л; В-135-145 ммоль/л; Г-0,7-1,2 ммоль/л; Д-55-115 мкмоль/л.

- 1-А
- 1-Б
- 1-В
- 1-Г
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Биохимическая концентрация натрия: А-3,4-17 мкмоль/л; Б-2,2-2,65 ммоль/л; В-135-145 ммоль/л; Г-3,6 до 5,2 ммоль/л; Д-2,5-8,3 ммоль/л.

- 1-Д
- 1-А
- 1-Б
- 1-В
- 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Срок формирования психической героиновой зависимости в подростковом возрасте: А-1-2 года; Б-2-3 недели; В-3-4 месяца; Г-1-2 недели; Д-6-8 месяцев

- 1-Г
- 1-А
- 1-Б
- 1-В
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Признаки патологии клеток головного мозга при острой интоксикации алкоголем: А-Растворение тигроидного вещества, изменение формы и окраски клеток, явления перинуклеарного отека ; Б-Очаги клеточного опустошения и явлений нейронофагии, множественные очаги выпадения нервных клеток.

- 1-А
- 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый

обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Морфологическая картина поражения головного мозга при хронической интоксикации алкоголем: А-Жировая дистрофия клетки, наличие кист и некрозов, обнаружение в клетке гистолимфоцитарных элементов; Б-Накопление в слизистой оболочке филаментов промежуточного типа, нарушение регенерации слизистой, набухание, гиперемия и отек слизистой; В-Очаги клеточного опустошения, явления перинуклеарного отека, растворение тигроидного вещества; Г-Атрофия ацинарных клеток, белковые массы и микрокальцинаты в протоках, очаги пролиферации, кисты, перии интралобулярный склероз; Д-Жировая инфильтрация клеток, большое число лизосом и липофусциновых гранул, атрофия фибрилл, кистообразное расширение саркоплазматического ретикулула

1-А

1-В

1-Б

1-Г

1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Эффекты взаимодействия ацетальдегида с гемоглобином: А-Образование тетрагидро-бета-карболинов выступающих в качестве естественных лигандо бензодиазепиновых и опиатных рецепторов ; Б-Утрата сродства к кислороду; В-Утрата специфичности; Г-Образование производных тетрагидроизохинолино, причастных к формированию зависимости

1-А

1-Б

1-В

1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Морфологическая картина жировой дистрофии печени: А-Выраженная жировая дистрофия гепатоцитов, инфильтрация склерозированной портальной стромы, формирование внутри печеночных доле кист, обнаружение в гепатоцитах гистолимфоцитарных элементов с примесью полиморфноядерных лейкоцитов ; Б-Крупная капля жира в цитоплазме, сдвигающая ядро к периферии, увеличение клетки в объеме, мелкозернистая жировая инфильтрация; В-Некроз, атрофия, гипертрофия и регенерация гепатоцитов, наличие клеток с 2-3-мя ядрами, перипортальное и интрабулярное разрастание соединительной ткани, обилие ложных долек; Г-Некроз гепатоцитов, алкогольный гиалиноз в клетках,

воспалительный инфильтрат, состоящий преимущественно из полиморфноядерных лейкоцитов.

- 1-В
- 1-Г
- 1-А
- 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Таблица Шульте: А-Изучение опосредованного запоминания, целенаправленности мышления, продуктивности ассоциаций; Б-Исследование характерологических особенностей личности; В-Определение уровня интеллектуального развития; Г-Объем, распределение и устойчивость внимания; Д-Изучение расстройств поведения, профорientации испытуемого.

- 1-Б
- 1-В
- 1-А
- 1-Г
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Классификация алкоголизма: α -алкоголизм, β -алкоголизм, γ -алкоголизм, δ -алкоголизм, ϵ -алкоголизм. Кто автор?: А-Н.Н. Иванец; Б-И.В. Стрельчук; В-М. Шакит; Г-Е. Джеллинек; Д-Р. Клонигер.

- 1-Г
- 1-А
- 1-Б
- 1-В
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Тревожно-параноидная установка : А-Галлюцинаторно-параноидный синдром; Б-Психоорганический синдром; В-Психопатоподобный синдром; Г-Алкогольный абстинентный синдром; Д-Невротический синдром.

- 1-В
- 1-Г

- 1-Б
- 1-А
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Классификация патологического влечения к алкоголю: Обсессивное и компульсивное. Кто автор?: А-Е. Джеллинек; Б-Н.Н. Иванец; В-В.Б. Альтшулер; Г-А.А. Портнов; Д-И.Н. Пятницкая.

- 1-Б
- 1-В
- 1-А
- 1-Г
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Толерантность к алкоголю: Максимальные дозы алкоголя, не вызывающие выраженного опьянения. Кто автор?: А-Е. Джеллинек; Б-Н.Н. Иванец; В-Н.К. Фруентов; Г-DSM-III-R; Д-А.А. Портнов, И.Н. Пятницкая.

- 1-Г
- 1-А
- 1-Б
- 1-В
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Форма злоупотребления алкоголем: псевдозапой: А-II ст.; Б-II-III ст.; В-I ст.; Г-III ст.; Д-Бытовое пьянство.

- 1-А
- 1-Б
- 1-В
- 1-Г
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый

обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Период полужизни в плазме морфина: А-3,6 часа; Б-5,1 часа; В-2-3 часа; Г-около 20 часов; Д-7-16 часов.

- 1-А
- 1-В
- 1-Б
- 1-Г
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Период полужизни в плазме кокаина: А-8-12 часов; Б-14-55 часов; В-7,6 часа; Г-9 минут; Д-36-67 минут.

- 1-А
- 1-Г
- 1-Б
- 1-В
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Стимуляторы (кокаин, амфетамины): А-Блокада обратного захвата дофамина и увеличение его выделения; блокада обратного захвата норадреналина и серотонина; Б-Агонисты мю-рецепторов; В-Усиление эффектов сигма-рецепторов, нарушение обмена ацетилхолина; Г-Усиление эффектов ГАМК-А-рецепторов; Д-Влияние на NMDA-рецепторы, блокада обратного захвата серотонина.

- 1-А
- 1-Б
- 1-В
- 1-Г
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Влияние опиатов (морфин, героин). Острое отравление: А-Гомогенные изменения нервных клеток; хроматолиз, острое набухание; Б-Вакуолизация, сморщивание клеток; липидная дистрофия; расплавление и распад клеточных элементов мозговой ткани.

1-А

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 мю-рецептор-эффекты: А-Аналгезия, угнетение дыхания; эйфория, зависимость, седативный эффект; миоз, угнетение кашлевого рефлекса, запор, брадикардия. Б-Мидриаз, стимуляция дыхания, тахикардия; дисфория, психозомиметические эффекты (галлюцинации и др.)

1-А

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Симптомы острой интоксикации опиумом: А-Ощущение волн тепла по телу, сухость во рту, сужение зрачков, зуд кожи лица; повышенный фон настроения; ощущение общей умиротворенности, лени и покоя. Б- Психомоторное возбуждение; резко и грубо выраженное ощущение «толчка» или удара в голове.

1-А

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Защитные биологические реакции при барбитуровой наркомании: А- Ощущение рези в глазах, слюнотечение, головокружение, тошнота, рвота. Б- Профузный пот, икота, слюнотечение, тошнота, рвота. В-«Меловая» бледность кожных покровов, сужение зрачков, зуд кожи лица. Г-Инъекция сосудов склер. Д- Брадипное, тахипное.

1-Г

1-А

1-Б

1-В

1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый

обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Какая эйфория соответствует II ст. наркомании: А-Стимулирующая. Б-Нетрансформированная. В-Тонизирующая.

1-Б

1-А

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Критерии I ст. наркомании: А-Синдром измененной реактивности; синдром психической зависимости. Б-Синдром измененной реактивности; синдром физической зависимости. В-Синдром измененной реактивности; нарастание истощения систем, определяющих симптоматику болезни; Г-Нарастание последствий хронической наркотизации

1-В

1-Г

1-Б

1-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Симптомы II фазы состояния отмены при опийной наркомании: А-Тоскливо-злобное настроение, двигательное беспокойство, интенсивные боли в мышцах, бессонница. Б-Отсутствие аппетита и рвота, спазмы и боли кишечника. В-Чувство неудовлетворенности, напряженности беспокойства, слезотечение, насморк, чихание. Г-Переменяющееся состояние жара и озноба «гусиная кожа», приступы чихания, чувство напряженности и влечение к наркотику.

1-Г

1-А

1-Б

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Симптомы комы при остром отравлении барбитуратами: А-«Игра» зрачков, паралич дыхания только на фоне арефлексии. Б-Мраморность кожи, тахикардия, паралич дыхательного центра. В-Мидриаз, гиперкинезы хореоформного типа сухость кожи и слизистых, тахикардия, паралич дыхания только на фоне арефлексии. Г-Миоз, паралич дыхания при сохраненных

рефлексах. Д-«Игра» зрачков, фибрилляция мышц, паралич дыхания на фоне арефлексии.

- 1-А
- 1-Б
- 1-В
- 1-Г
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Быстро нарастающие эффекты: А-Седативный, противосудорожный, снотворный, детоксикационный. Б-Антидепрессивный, корригирующий поведение, антибредовый. В-Профилактический.

- 1-Б
- 1-А
- 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Укажите вид действия транквилизаторов: А-Седативный, антибредовый, антигаллюциноторный, снотворный. Б-Седативный, транквилизирующий, противосудорожный, снотворный. В-Антидепрессивный, снотворный.

- 1-В
- 1-А
- 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Какие препараты оказывают детоксикационный эффект: А-Унитиол, тиосульфат натрия, витамины группы "В", пирацетам. Б-Витамины группы "В", пирацетам. В-Седуксен, аминазин.

- 1-В
- 1-Б
- 1-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый

обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Бутирофеноны: А-Трифтазин, этаперазин. Б-Галоперидол, дроперидол. В-Эглонил, клопиксол, хлорпротиксен.

1-Б

1-А

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 К трициклическим антидепрессантам относятся: А-Мелипрамин, amitриптилин. Б-Нуредад. В-Пиразидол. Г-Прозак.

1-Б

1-А

1-В

1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Укажите состояния при которых используются ноотропы: А-Интоксикация, мнестические расстройства. Б-Расстройства поведения, актуализация патологического влечения. В-Мания, нарушения сна.

1-В

1-Б

1-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 В.Е. Рожнов автор метода: А-Психодрамма. Б-Методика репродуктивной тренировки. В-Психотерапевтическая триада. Г-Эмоционально-стрессовая психотерапия. Д-Фракционный метод.

1-Г

1-А

1-Б

1-В

1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый

обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 3. Фрейд автор метода: А-Психоанализ. Б-Имаготерапия. В-Прогрессирующая мышечная релаксация. Г-Наркогипноз. Д-Психотерапия, "центрированная" на клиенте.

1-В

1-Г

1-Б

1-А

1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Вторичная профилактика: А-Универсальная. Б-Селективная. В-Индикаторная.

1-Б

1-А

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Цель первичной профилактики: А-Восстановление нормативного медицинского, психологического и социального статуса, позволяющего пациенту ресоциализироваться в обществе на основе отказа от ПАВ. Б-Нормализация биологического, психологического и социального статуса зависимого от ПАВ посредством дезактуализации наркологических расстройств. В-Предупреждение приобщения к ПАВ и формирование здорового образа жизни.

1-Б

1-А

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Антинаркотическая деятельность: А-Построение социокультурного пространства, которое предполагает вовлечение в профилактику разнообразных ресурсов – личностных, интеллектуальных, нравственно-волевых, культурно-ценностных и профессиональных. Б-Система привития полезных навыков на основе знания правил здорового образа жизни и убежденности в необходимости их соблюдения. В-Совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья и трудоспособности людей, продление их активной жизни.

1-Б

1-А

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Цель санитарно-просветительской работы: А-Улучшение здоровья и социального статуса потребителей наркотиков. Б-Выработка убеждения в необходимости соблюдения правил здорового образа жизни на основе знаний о причинах заболевания, методах их предупреждения и поддержания организма в здоровом состоянии. В-Формирование активного адаптивного функционального копинг-поведения, направленного на продвижение к здоровью, уменьшение числа лиц с психологическими факторами риска возникновения психосоциальных расстройств, формирование невосприимчивости к дисфункциональным паттернам поведения. Г-Выявление и нейтрализация психотравмирующих факторов, которые негативным образом влияют на психическое состояние человека.

1-А

1-Б

1-В

1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 В каком случае лучше использовать групповую психотерапию?: А- Семейный конфликт, стресс. Б-Нарушение режима терапии, недостаточная критик. В-Интеллектуально-мнестический дефект, актуализация патологического влечения.

1-Б

1-А

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Эффективность экспрессивной психодинамической психотерапии в наркологической сфере дает наибольшие результаты: А-У пациентов с истерическими акцентуациями характера; у пациентов с психастеническими акцентуациями характера; у пациентов с ананкастными акцентуациями характера. Б-У пациентов с диссоциальными свойствами личности; у пациентов с

паранойяльными свойствами личности; у пациентов с признаками гипертимии и склонностью к псевдологии; у пациентов с аутодеструктивными тенденциями. В-У пациентов с признаками шизоидного расстройства личности.

1-В

1-Б

1-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Поведенческая психотерапия больных с зависимостью от ПАВ: А-Структурированная обучающая программа, формирующая навыки социального поведения, необходимые для создания сети социальных контактов и уменьшения стресса. Б-Комплекс психотерапевтических мероприятий, в основу которых заложена определённая концепция личности и её система отношений. В-Процесс направленного формирования желаемых, адаптивных форм поведения на основе принципов теории обучения.

1-В

1-А

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Когнитивно-поведенческий подход: А-Выработка негативной реакции на приём алкоголя и наркотиков. Б-Усиление реальных свойств манипуляций и процедур, назначенных больному. В-Закладка в наркологического больного новой программы на основе развития существующих функциональных возможностей, для чего необходимо многократное повторение и закрепление необходимых реакций.

1-Б

1-А

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Тактика психотерапевтического воздействия. Компенсаторные методы: А-Для больных с импульсивным характером употребления ПАВ. Б-Для больных со стеническими, эксплозивными чертами. В-Для больных с астеническими и тревожно-сензитивными особенностями

1-Б

1-А

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Индивидуальная (личностная) психогигиена: А-Психогигиена умственного труда; психогигиена детства. Б-Психогигиена общественных отношений; психогигиена семейных отношений.

1-А

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Предреабилитационный этап реабилитации: А-Консультативный; диагностический, лечебный. Б-Адаптационный; интеграционный; стабилизационный. В-Профилактический.

1-В

1-Б

1-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Цель интеграционного этапа реабилитации: А-Приобретение личностной устойчивости и определённой зрелости, позволяющей функционировать в обществе без употребления ПАВ. Б-Максимально быстрое функциональное физическое и психическое восстановление, вовлечение больных в реабилитационную программу, приспособление к условиям реабилитационной среды и режиму работы учреждения. В-Максимальное восстановление физического и психического состояния больных, коррекция или формирование нормативных личностных и социальных качеств, нормализация семейных отношений.

1-А

1-В

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран

ОДИН РАЗ. 1 Характеристика профессионального типа реабилитационной программы: А-Полное воздержание от ПАВ; заместительная терапия; обучение контролю над употреблением ПАВ. Б-Конфессиональная; трудовая; семейная.

1-А

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран

ОДИН РАЗ. 1 Высокоструктурированные реабилитационные структуры: А-

Реабилитационные центры; терапевтические общины. Б-Группы само и взаимопомощи; комунны; поселения наркоманов.

1-А

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран

ОДИН РАЗ. 1 Движение "12 шагов" АН: А-Программа для родственников лиц, зависимых от ПАВ. Б-Программа для детей лиц, зависимых от ПАВ. В-Программа для лиц, зависимых от наркотиков. Г-Программа для лиц, зависимых от алкоголя.

1-А

1-В

1-Б

1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран

ОДИН РАЗ. 1 Психологические критерии эффективности реабилитации: А- Психическое расстройство наркологического профиля; психическое расстройство иного профиля; соматическое расстройство. Б-Нормативные личностные статусы; патологические личностные статусы; психологическая компетентность. В- Семейный статус; профессиональный (образовательный) статус; социальная компетентность.

1-А

1-Б

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый

обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Аддиктивный потенциал аддиктивного агента характеризуется: А-Способностью вызывать эйфорию и (или) прекращать страдание; доступностью; модой; терпимостью социума. Б-Генетической отягощенностью; коморбидными психическими расстройствами; недостаточностью самоконтроля и саморегуляции; возможным пристрастием к аддиктивным агентам в прошлом.

1-А

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Аддикции, связанные с использованием ПАВ: А-Опиоидная; алкогольная; каннабиноидная; табачная. Б-Шоппинг; компьютерная; гаджет; трудовая. В-Пищевая.

1-А

1-Б

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Скорая медицинская помощь: А-Оказывается медицинскими организациями независимо от их организационно-правовой формы бесплатно. Б-Медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается бесплатно. В-Оказывается в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг. Г-Оказывается в соответствии с договорами добровольного медицинского страхования. Д-Не оказывается.

1-А

1-Б

1-В

1-Г

1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Описательная группа эпидемиологических исследований наркологических заболеваний: А-Заболеваемость; потребность населения в наркологической помощи. Б-Условия, способствующие появлению и развитию наркозависимости; факторы, способствующие возникновению и развити

наркозаболеваний. В-Эффективность терапевтических мероприятий; эффективность профилактических мероприятий.

1-Б

1-А

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Сведения со слов родственников: А-Отношение в коллективе; отношение родственников; наследственность; особенности протекания кризовых периодов; проводимая терапия и ее результаты; репутация среди сослуживцев; отношение к болезни; характерологические особенности. Б-Отношение родственников; наследственность; особенности протекания кризовых периодов; проводимая терапия и ее результаты; отношение к болезни; характерологические особенности. В-Отношение в коллективе; репутация среди сослуживцев; характерологические особенности. Г-Данные лабораторных исследований; проводимая терапия и ее результаты; отношение к болезни.

1-Б

1-А

1-В

1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Тест Люшера: А-Дисинхронизация; сглаживание межполушарных различий; мозговая атрофия; межполушарная асимметрия. Б-Корково-подкорковые структуры; расширение желудочков мозга ; мозговая атрофия. В-Уровень правдивости; профиль личности. Г-Устойчивые черты личности; функциональное эмоциональное состояние. Д-Повышение ГГТ; повышение СКОЭ.

1-Г

1-А

1-Б

1-В

1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Глубокая межполушарная асимметрия. Показатели ЭЭГ: А-Арахноедиты; повышение внутричерепного давления; церебро-васкулярные

нарушения; алкоголизм. Б-Опухоли поверхностно расположенные; инсульты; депрессии; алкоголизм. В-Атрофические процессы; опухоли поверхностно расположенные; субдуральные гематомы; алкоголизм. Г-Эпилепсия.

1-Г

1-А

1-Б

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Тотальное (генерализованное) патологическое влечение к ПАВ: А-Инкапсулированность; меньшее постоянство и изменчивость; экзогенное состояние по отношению к психической структуре. Б-«Вырастает» на базе определенных общих патологических свойств психики; изменчивость и обратимость; отсутствие тенденции к саморазвитию.

1-А

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Опиаты: А-Анальгезия; замедление ритма дыхания; уменьшение секреции желчи; замедление ритма дыхания. Б-Бледность или покраснение кожных покровов; озноб. В-Колебания температуры тела; нарушение двигательных функций. Г-Сужение кровеносных сосудов; учащение ритма дыхания; повышение температуры тела.

1-Б

1-А

1-В

1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Период полужизни героина в плазме: А-9 минут. Б-2-3 часа. В-2-4 часа.

1-А

1-Б

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите

правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Эффекты от взаимодействия ацетальдегида с гемоглобином: А-утрата сродства к кислороду. Б-утрата специфичности действия. В-образование пролизованных тетрагидроизохинолинов – сальсолинола и др.. Г-образование тетрагидро-бета-карболинов.

1-Б

1-А

1-В

1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Плато толерантности: А-Состояние адаптации к ПАВ, уменьшенная реакция на введение того же количества ПАВ, необходимость более высоких доз для достижения прежнего эффекта. Б-Состояние адаптации достигает максимума и длительное время остается постоянным; прием наивысших для больного доз ПАВ; увеличение доз не вызывает эйфории и может привести к передозировке. В-Неспособность переносить прежние высокие дозы, вынужденное снижение их, явления передозировки при увеличении дозы. Г-Адаптация, возникающая при приеме одного вещества, распространяется на другие вещества, которые больной ранее не применял.

1-А

1-Б

1-В

1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Лечение АС, осложненного пневмонией: А-Не подлежат переводу из наркологического стационара; антибиотики и респираторная терапия. Б-Перевод в специализированный стационар; ИВЛ.

1-Б

1-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Центральная форма нарушения дыхания при остром отравлении алкоголем. Восстановление адекватной легочной вентиляции осуществляется: А-

Снижения саливации и бронхореи; туалета полости рта; отсасывания содержимого из верхних дыхательных путей в ходе терапевтических мероприятий. Б-Интубации трахеи; ИВЛ. В-ИВЛ; устранения аспирационно-обтурационных нарушений дыхания в начале терапевтических мероприятий.

1-Б

1-А

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Клиника пароксизмальных нарушений ритма сердца при алкогольном поражении: А-Замирение, перебои в области сердца; общая слабость, чувство нехватки воздуха. Б-Тахикардия, одышка, головокружение; боли в области сердца. В-Нарастающие явления острой сердечной недостаточности; отек легких.

1-В

1-А

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Методы борьбы с паркинсоноподобным синдромом: А-Циклодол; ноотропил; амизил; тремарал; атурбан. Б-Кофеин 20% - 2,0 мл п/к; панолид п/к; аминазин в/м. В-Отмена препарата; динезин (депаркин). Г-циклодол; ноотропил; амизил; атурбан. Д-вазотоники.

1-В

1-А

1-Г

1-Б

1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Изменения на ЭКГ при трепетании предсердий: А-Укорочение интервала P-Q; нерегулярные различные по форме желудочковые комплексы. Б-Измененный предсердный комплекс; отсутствие изменений желудочкового комплекса; частота желудочковых сокращений от 140 до 220 в мин. В-Волны трепетания одинаковой формы и правильного ритма; частота сокращений предсердий 220 – 450 в мин.. Г-Расширенные и деформированные желудочковые

комплексы; зубец Р не определяется; аритмичные и различные по форме волны мерцания. Д-Отсутствие зубцов Р; частота сокращений желудочков 90 – 160 в мин..

- 1-Б
- 1-Г
- 1-А
- 1-В
- 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Характеристика начальной (1) стадии наркомании: А-Отсутствие определенного ритма употребления ПАВ и изменения толерантности, возможность формирования психической зависимости. Б-Регулярный ритм приема ПАВ, рост толерантности. В-Рост толерантности, формирование физической зависимости, максимальная толерантность-плато толерантности, изменение качества эйфории. Г-Невозможность переносить прежние высокие дозы, снижение толерантности,исчезновение эйфории, введение ПАВ поддерживает организм в более или менее «комфортном» состоянии.

- 1-Б
- 1-А
- 1-В
- 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1Характеристика развернутой стадии наркомании: А-Желание получить удовольствие от наркотика (влечение к эйфории). Б-Влечение к психическому комфорту в интоксикации. В-Влечение, определяющееся желанием уйти от дискомфорта трезвости («уход от неудовольствия»).

- 1-А
- 1-В
- 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Особенности формирования зависимости от ПАВ у женщин: А-Употребление ПАВ по собственной инициативе или после знакомства с зависимым лицом; активность в получении наркотика; мотив употребления ПАВ - устранение

чувства одиночества, нервозности и депрессивности; мотив-благоприятный сдвиг в психическом и физическом самочувствии; употребление ПАВ на этапе систематического приема 1-2 раза в неделю; более низкая скорость формирования и более низкий темп прогрессивности заболевания в целом. Б-Мотивация первого употребления ПАВ и приобщения к ним под внешним влиянием; преимущественно ежедневная форма употребления ПАВ на этапе систематического приема; зависимая роль при получении наркотика; прием ПАВ как способ нивелировки низкой сексуальной привлекательности; мотив употребления ПАВ - устранение чувства одиночества, нервозности и депрессивности; минование этапа эпизодического употребления ПАВ.

1-А

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Характеристика второй стадии наркомании: А-Синдром измененной реактивности. Б-Синдром психической зависимости; синдром физической зависимости. В-Нарастание истощения систем, определяющих симптоматику зависимости; последствия наркотизации.

1-А

1-Б

1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Терапия состояния отмены седативно-снотворных препаратов: А-Агонист L2-адренорецепторов ЦНС (клонидин), атипичный нейролептик из группы замещенных бензаминов (тиаприд). Аналгетик центрального действия (трамадола гидрохлорид). Б-Симптоматическая терапия. В-Комбинация средств, влияющих на дофаминергические механизмы (бромокриптин) и антидепрессантов, влияющих на серотонинергическую систему (флувоксамин). Г-Литическое отнятие ПАВ или заместительная терапия, производные карбамазепина (финлепсин).

1-Б

1-В

1-А

1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый

обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1Клинические признаки передозировки опиатами: А-Сужение зрачков (симптом «точки») со снижением или полным отсутствием реакции на свет; угнетение ЦНС от стадии засыпания до расстройства сознания в виде комы; угнетение дыхания до брадипное с частотой до 4-6 в минуту или полной его остановкой; снижение сухожильных и периостальных рефлексов или арефлексия; снижение или отсутствие реакции на болевое раздражение, корнеальных, кашлевых и глоточных рефлексов. Б-Гипертензия и тахикардия; панические реакции; спутанность сознания; галлюцинаторные расстройства, обилие парестезий и сенестопатий; резко выраженное чувство голода.

1-А

1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1Клинические признаки острой интоксикации эфедром: А-Ускоренная речь, неусидчивость, подвижность, неумеренная жестикуляция; гипертензия и тахикардия; непоследовательность мышления, высказывание множества нереальных планов, переоценка собственных возможностей; отсутствие потребности в еде и сне; сухость слизистых, вследствие чего опьяневший постоянно облизывает губы. Б-Ощущение необыкновенной ясности и красочности окружающего, запаха лесных фиалок; ощущение полета, невесомости; подъем настроения с ощущением особых способностей, стремлением к различным видам творческой деятельности; усиление полового влечения и сексуальной потенции; ощущение ясности того, что раньше казалось запутанным и непонятным.

1-Б

1-А

Укажите начальные признаки классического алкогольного делирия

Полная бессонница.

Ложная ориентировка в месте.

Взбудараженность, неадекватная весёлость.

Истинные зрительные галлюцинации

Парейдолии.

Укажите начальную симптоматику при энцефалопатии Гайе-Вернике

Сопор

Кома

Астения разной степени выраженности

Тревога

Апатический ступор

Укажите конечные изменения личности у больных алкоголизмом

Алкогольная деградация с дезадаптацией
Умеренное заострение характерологических особенностей
Нивелировка преморбидных характерологических особенностей
Алкогольная деградация с социальной адаптацией
Карикатурное заострение характерологических особенностей

Укажите какой синдром как правило формируется раньше всех при алкоголизме.

Алкогольная деградация
Алкогольный абстинентный синдром
Синдром измененной реактивности
Синдром патологического влечения к алкоголю
Синдром рассеянного энцефаломиелита

Что происходит раньше всего при развитии синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови при острой алкогольной интоксикации

Выброс в сосудистое русло тканевого тромбопластина
Появление фибринолитической активности
Появление микротромбов
Замедление кровотока
Истощение факторов свертывания крови

Признаки II стадии алкогольной зависимости

Алкогольный абстинентный синдром
Алкогольная деградация
Синдром измененной реактивности

При каком пути введения кокаин оказывает минимальное токсическое действие на организм?

Интраназальное
Пероральное
Внутривенное
Ингаляционное

Какие действия необходимо произвести на первом этапе оказания помощи, при преобладании в картине анафилактического шока, явлений бронхоспазма или асфиксии?

Улучшение альвеолярной вентиляции и легочного газообмена
Венное введение лазикса (2 – 4 мл)
Восстановление и поддержание свободной проходимости дыхательных путей
Венное струйное введение 10 мл 2,4% раствора эуфиллина

Какие действия необходимо произвести на первом этапе при оказании неотложной медицинской помощи больному с острым отравлением алкоголем?

Постуральный дренаж и тяжелая перкуссия грудной клетки
Восстановление адекватной легочной вентиляции

Промывание желудка через зонд

Противошоковая терапия при тяжелых гемодинамических расстройствах

Экстренная санационная бронхоскопия при выраженных аспирационно-обтурационных нарушениях дыхания

Укажите первый блок в алгоритме санитарно-просветительской работы:

Убеждения

Знания

Информация

Поступки

Укажите III стадию гипноза по А. Форелю

Сонливость

Сомнамбулизм

Гипотаксия

Укажите III этап реабилитационного процесса

Реадаптация

Реинтеграция

Ресоциализация

Укажите вторую фазу в динамике формирования семейных отношений при созависимости

Фаза самозащиты

Фаза адаптации

Фаза озабоченности

Фаза истощения

Укажите II фазу динамики семейного реагирования на употребление ПАВ:

Гиперконтроля

Экстернализации

Индифферентная

Аффективная

К сложной мании относятся:

Мания с онейроидом

Спутанная мания

Веселая мания

Дурашливая мания

Экзальтированная мания

Мусситирующий делирий характеризуется:

Эпизодами кататонического возбуждения

Возбуждением с совершением профессиональных действий

Психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели и

Невнятным, бессвязным бормотанием и
Карфологическими нарушениями

Хроническую интоксикацию алкоголем верифицируют, определяя показатели:

ГГТ и
АСТ и
АСТ/АЛТ и
СКОЭ и
ЛВП

Для депрессивного варианта измененного простого алкогольного опьянения характерно:

Преобладание подавленного настроения различной выраженности и оттенков и
Появление идей самоуничужения и
Склонность к суицидальным попыткам
Тоскливо-злбное настроение
Моторная заторможенность

Соматогенная фаза острого отравления алкоголем может проявиться:

Нарушением функции внешнего дыхания
Острым поражением печени
Воспалительным поражением органов дыхания и
Психоневрологическими расстройствами и
Миоренальным синдромом

Участие гормональных систем в патогенезе алкоголизма подтверждается появлением у больных:

Гипогонадизма и
Дисфункции коры надпочечников и
Гипотиреоидизма и
Транзиторной гипертензии и
Реактивной гипогликемии

Катаболизм алкоголя в организме человека происходит при непосредственном участии:

Катехоламиновой системы
Серотониновой системы
Холецистокининовой системы
Системы МЭОС и
Альдегидокисляющих ферментов

К основным факторам, участвующим в симптомообразовании алкоголизма, относят:

Временной фактор
Фактор почвы и
Фактор фона и
Токсический фактор
Этнический фактор

Механизм роста толерантности к алкоголю у больных алкоголизмом обусловлен:

Напряжением и адаптацией стрессовых гормонов и
Адаптацией к алкоголю барбитуровых рецепторов мембраны клетки и
Адаптацией к алкоголю ГАМКА-рецепторов мембраны клетки и
Адаптацией к алкоголю бензодиазепиновых рецепторов мембраны клетки и
Активизацией альдегидокисляющих ферментов

У больных алкоголизмом нарушения в сфере памяти проявляются:

Нарушением фиксации молекулярных изменений, происходящих в системе
долговременной памяти
Интерференцией кодировки сырой информации в системе немедленной памяти на
селекцию и первичное обобщение информации в системе кратковременной памяти
и
Изменением скорости распада удерживаемых в системе кратковременной памяти
следов информации и
Нарушением фиксации молекулярных изменений, происходящих в системе
кратковременной памяти, в долговременные комплексы
Нарушением фиксации памяти на текущие события

Дифференциально-диагностическими критериями острого алкогольного гепатита в отличие от вирусного гепатита, являются:

Спленомегалия
Резко выраженная астения и
Отсутствие продрома и
Артериальная гипертензия
Увеличение активности ГГТ до 1000 и более ед/л

При постановке диагноза «Алкогольный цирроз печени» необходимо ориентироваться на такие клинические проявления, как:

Асцит и
Желтуха и
Увеличенная и плотная печень и
Повышение активности ГГТ и
Специфические соматические сопутствующие заболевания (язва желудка, сахарный диабет, панкреатит)

Нарушение иммунной системы у больных алкоголизмом проявляется:

Повышением активности моноцитов и макрофагов
Резким повышением В-клеток (лимфоцитов, продуцирующих антитела)
Появлением ацетальдегидных аддуктов и
Повышением уровня иммуноглобулинов
Повышением количества Т-лимфоцитов

При сравнительной оценке алкоголизма у женщин, в отличие от мужчин, следует ориентироваться на такие клинические проявления, как:

Выраженность идеаторной компоненты патологического влечения к алкоголю
Инкурабельность заболевания
Раннее появление циклических форм злоупотребления алкоголем и
Аффективную окрашенность основных симптомов и синдромов
Злокачественность течения заболевания

К биологическим патогенетическим факторам формирования зависимости от алкоголя относят:

Нарушение обмена катехоламинов и
Нарушения обмена серотонина и
Изменение функций эндогенной опиатной системы и
Нарушения обмена в системе эндогенный этанол/эндогенный ацетальдегид и
Нарушение обмена гормонов

Период становления зависимости от ПАВ у подростков отличается от такового у взрослых:

Направленностью влечения не на определенное ощущение от наркотика, а на недифференцированное состояние оглушения («балдение») и
Незрелостью чувственной сферы и
Преобладанием группового мотива употребления ПАВ и
Замедленным формированием влечения и
Предпочтением средств с галлюцинаторным эффектом

О нарастании компульсивного влечения к опиатам у больных опишной наркоманией судят по:

Неустойчивости АД с тенденцией к повышению его и
Лабильности пульса и дыхания и
Усилению звучности сердечных тонов и
Расширению зрачков и
Появлению жалоб на «зубную боль», аллергию (зуд в области вен)

Клиническая картина острого отравления опиатами характеризуется:

Сохранением корнеальных, кашлевых и глоточных рефлексов
Сохранением сухожильных и периостальных рефлексов

Угнетением ЦНС (сопор, кома) и
Угнетение дыхания с частотой до 4-6 в минуту или полной остановкой и
Сужением зрачков (симптом «точки») со снижением или полным отсутствием
реакции на свет

Состояние передозировки каннабиноидами проявляется:

Гипертензией и тахикардией и
Паническими реакциями и
Спутанностью сознания и
Обилием парестезий и сенестопатий и
Галлюцинаторными расстройствами

Специфичным осложнением гашишной наркомании является:

Брадипсихия
Хроническая эйфория
Анергия
Амотивационный синдром
Психоорганический синдром

При передозировке кокаина смерть наступает от:

Печеночной комы
Некронефроза
Эпистатуса и
Остановки сердца вследствие аритмии и
Остановки дыхания

Симптомами марганцевой интоксикации у больных эфедроновой наркоманией являются:

Хореоформные движения мышц плечевого пояса, верхних конечностей и
Парезы мягкого нёба, языка, лицевых мышц и
Параплегии и
Нарушения походки и
Буровато-зеленоватая окраска слизистой полости рта

Отмена наркотика при ятрогенной наркомании возможна в случаях:

Госпитализации больного в психиатрический или наркологический стационар
Достижения неустойчивой ремиссии основного соматического заболевания
Достижения устойчивой ремиссии основного соматического заболевания и
Возможности полного купирования болей ненаркотическими анальгетиками и
спазмолитиками и
Отсутствия угрозы ухудшения течения соматического заболевания

При злоупотреблении препаратами, содержащими фенилпропраноламин, быстро

развиваются следующие осложнения:

Поражение почек

Миокардиодистрофия с нарушением ритма сердца и

Трофические нарушения и

Паркинсоноподобный синдром, внутричерепная гипертензия

Поражение печени

Зависимость от бензодиазепинов развивается у тех больных алкоголизмом, преморбидный статус которых отличается:

Отягощенной наследственностью алкоголизмом или психическим заболеванием и

Наличием признаков минимальной мозговой дисфункции в первые годы жизни и

Психопатиями или акцентуациями характера возбудимого или неустойчивого круга

и

Патологически протекавшим пубертатным периодом и

Преобладанием в преморбидном периоде реакций группирования и имитации

Возрастная психогигиена включает в себя:

Вакцинацию населения

Систему мероприятий по первичной профилактике психических заболеваний

Изучение аномалий формирования личности и

Разработку социальных мер оздоровления условий жизни в пенсионном возрасте и

Рекомендации системы мероприятий по укреплению психического здоровья

школьников

Стационарная психотерапевтическая помощь показана контингентам больных:

Страдающих психосоматическими расстройствами

С невротическими расстройствами на фоне органической патологии ЦНС и

Лицам, для которых повседневное социальное окружение является источником декомпенсации

С невротическими реакциями

Лицам молодого возраста

Основными характеристиками группы развивающих методов психотерапии являются:

Адресованность к ресурсам психики и личности и

Партнерские отношения между психотерапевтом и пациентом и

Относительная стойкость полученных результатов

Авторитарная и доминирующая позиция психотерапевта

Поведенческие техники

Эффективность использования психотерапии для лечения больных алкоголизмом женщин оценивается с помощью следующих критериев:

Способность семьи отрешиться, отойти от всех употребляющих алкоголь семей

Больная алкоголизмом женщина способна во время праздников спокойно пить сок

или воду среди бутылок с вином и тостов

Муж и члены семьи принимают и отстаивают идеи трезвости

Успешное решение жизненных проблем на основе соблюдения трезвости

Способность больной неустанно искренне советовать своим детям жить совершенно трезво

Созависимость в семьях больных алкоголизмом проявляется в:

Характерных личностных изменениях и

Извлечении вторичных выгод из болезни

Совместном распитии спиртного

Патологических двигательных стереотипах

Уклонении от конфликтов

Обучение больных алкоголизмом аутогенной тренировке позволяет:

Развивать антиципацию

Устранить вторичное патологическое влечение к алкоголю

Ослабить (притупить) интенсивность первичного патологического влечения к алкоголю и

Уменьшить эмоциональное напряжение

Мобилизовать ресурсы значимых других лиц

Методика системной интервенции предназначена для:

Тренинга социальных умений

Применения санкций к больным, уклоняющимся от лечения

Формирования мотивации и

Стимуляции нормативных личностных структур у пациентов

Развития рефлексии

Основные модели наркологической реабилитации:

Классическая модель 12-шаговой программы и

Миннесотская модель стационарной и амбулаторной 12-шаговой программы и

Терапевтическое сообщество и

Организация терапевтических реабилитационных направлений в структуре разных конфессий и

Семейные клубы трезвости

Основные инструменты воздействия психокоррекционного компонента реабилитации:

Самоорганизация

Распорядок дня

Индивидуальная психотерапия и

Групповая психотерапия и

«Интерфаза»

Особенности реабилитации в амбулаторных условиях:

Активная ответственная позиция пациента и

Использование мотивационных стратегий всеми членами мультидисциплинарной команды на всех этапах реабилитации и

Значительный вклад (роль) социального компонента реабилитации и

Клиент-центрированный подход и

Взаимодействие в атмосфере доверия, ответственности и безопасности специалистов, пациента и его близкого окружения

Универсальные компоненты аддикций:

Изменение толерантности и

Синдром отмены и

Конфликт с нормативными значимыми другими лицами и

Особенность и

Эйфория

Основа феномена алекситимии у аддиктивной личности:

Нарушения самосознания идентичности «Я»

Недифференцированное телесное напряжение

Отчуждение в эмоциональной сфере

Недифференцированное душевное напряжение

Противоречивый характер самооценки

Типы семей с повышенным риском формирования аддиктивных расстройств у детей:

Нуклеарная семья

Функциональная семья

Семья с авторитарным родителем и

Неполная семья и

Отягощенная семья

Объектом санитарно-гигиенического воспитания являются:

Педагоги, преподаватели высших и средних специальных заведений и

Работники юстиции, прокуратуры, милиции и

Родители, родственники больных

Дошкольники, студенты, учащиеся школ, техникумов, колледжей

Дифференцированный подход в проведении антиалкогольной санитарно-гигиенической работы предполагает учет факторов:

Возраста слушателей и

Образования и

Профессии, вида деятельности

Вида предпочитаемого спиртного напитка

Санитарно-гигиеническая работа по профилактике табакокурения должна быть адресована к:

Детям и подросткам и
Лицам пробующим табак и
Недавно пробующим табак и
Родителям потенциальных курящих

В работе кабинета анонимного лечения медицинская документация на обратившегося:

Не заводится
Заводится медицинская карта под вымышленной фамилией и адресом
Заводится медицинская амбулаторная карта по общим правилам
Письменная документация заводится по усмотрению обратившегося

Клинико-экспертная комиссия наркодиспансеров решает задачи:

Экспертизы алкогольного или наркотического опьянения
Определение противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и
Направление наркологических больных на медико-социальную экспертизу и
Принятие экспертного решения в сложных, конфликтных случаях

В задачи стационарных наркологических отделений входит:

Оказание специализированной лечебно-диагностической помощи и
Купирование психозов, связанных с потреблением психоактивных веществ и
Недобровольное лечение наркологических больных в соответствующих случаях и
Ведение профилактической и реабилитационной работы

Механизм действия барбитуратов определяется

Стимулирующим влиянием на систему тормозного медиатора - ГАМК
Тормозящим эффектом на синаптическую передачу нервных импульсов в клетке
Блокадой эффектов ацетилхолина
Активизированием дофаминового цикла
Разрушением липидной мембраны нервных клеток

Какой основной механизм психологической защиты зависимых от ПАВ и созависимых лиц

Рационализация
Проекция
Отрицание
Агрессия
Девальвация

