

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Сексология» (II категория) для аттестации

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:
<https://medik-akkreditacia.ru/product/seksolog/>

Полезные ссылки:

1) Тесты для аккредитации «Сексология» (930 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/seksologiya/>

2) Тесты для аккредитации «Медицинский психолог» (2000 вопросов)

https://medik-akkreditacia.ru/product/medicinskii_psiholog/

Как называется парафилия, при которой сексуальное удовлетворение достигается путем трения гениталиями о не ждущих этого незнакомых людей:

Б. Трансвестистский фетишизм

Г. Фрикционизм

А. Псевдомастурбация

В. Фроттеризм (фроттаж)

Д. Петтинг

Диагноз расстройства половой идентификации у детей выставляется:

В. Не ранее 18-летнего возраста

Г. Не ранее индивидуального завершения пубертатного периода

Б. Не ранее 15-летнего возраста

А. До начала пубертатного периода

Д. Только после начала половой жизни

Какой из атипичных антипсихотиков Вы не назначите пациентам с кардиологическими проблемами:

В. Кветиапин

А. Амисульприд

Д. Сертиндол

Б. Оланзапин

Г. Рисперидон

Что из перечисленного НЕ является диагностическим критерием транссексуализма:

- В. Наличие опыта сексуальной жизни в роли представителя желаемого пола в течение не менее года
- А. Желание принадлежать к другому полу и быть принятым другими людьми в таком качестве, как правило, в сочетании со стремлением к изменению своего анатомического пола
- Б. Устойчивое сохранение транссексуальной идентичности в течение не менее двух лет
- Г. Отсутствие хромосомных нарушений и психических заболеваний, являющихся причиной состояния
- Д. Наличие желания собственной принадлежности к противоположному полу с раннего детства

Диспансерное наблюдение за лицом, страдающим психическим расстройством, предполагает:

- В. обязательные ежегодные курсы интенсивной терапии в дневном стационаре
- А. обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в месяц
- Г. наблюдение за состоянием психического здоровья лица путем регулярных осмотров врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и социальной помощи
- Б. обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в 3 месяца
- Д. оказание пациенту необходимой медицинской и социальной помощи без регулярных осмотров врачом-психиатром

Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к негативным (дефицитарным):

- Б. Астенический
- А. Амнестический
- В. Сумеречного помрачения сознания
- Г. Все перечисленные
- Д. Ни один из перечисленных.

Главной задачей массовых опросов А. Кинзи было:

- Г. Объективное изучение сексуального поведения
- А. Исследование мотивации сексуального поведения
- Б. Различение нормального и патологического сексуального поведения
- В. Изучение половозрастных особенностей сексуальных переживаний
- Д. Исследование культуральных особенностей сексуального поведения.

Какая из теорий ассоциирует проявления эксгибиционизма у мужчин с поведением самцов павлинов, демонстрирующих свой распущенный хвост:

- Б. Когнитивная
- В. Поведенческая
- А. Психоаналитическая
- Г. Социобиологическая

Д. Семиотическая

Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к позитивным (продуктивным):

В. Паралитический

Г. Все перечисленные

Б. Амнестический

А. Парафренный

Д. Ни один из перечисленных.

Что является предметом социальной психиатрии:

А. Индивидуальное психическое здоровье.

Г. Общественное психическое здоровье.

Б. Непсихотические расстройства.

В. Психотические расстройства.

Д. Деструктивное поведение.

Какой из приведенных факторов, по данным Н. Грота, в действительности НЕ входит в мотивы насилия:

Г. Садистическое влечение

Б. Ярость, озлобление, агрессия

А. Сила сексуального влечения

В. Жажда власти

Д. Стремление доминировать

Каковы особенности алкоголизма у женщин?

А. У женщин на фоне хронического алкоголизма наблюдаются атипичные формы опьянения.

В. Злокачественный темп развития, преобладание депрессивных расстройств в структуре патологического влечения к алкоголю, быстрое формирование абстинентного синдрома, возникновение атипичных форм опьянения.

Б. Никаких особенностей алкоголизма у женщин нет, алкогольная болезнь протекает одинаково у женщин и мужчин.

Г. У женщин заостряются присущие им личностные особенности, чаще всего истерические и эксплозивные.

Д. Женщины перестают следить за собой, не работают, не заботятся о своих детях, проводят время в асоциальных компаниях.

Каков возрастной период негативной фазы пубертатного криза:

В. 14-16 лет

Г. 15-18 лет

Б. 12-18 лет

А. 12-14 лет

Д. 16-18 лет

Этнокультуральная психиатрия – это:

- В. Раздел социальной психиатрии.
- А. Раздел этнологии.
- Б. Самостоятельная научная дисциплина.
- Г. Направление этнопсихологии.
- Д. Раздел культурологии.

Клинически расстройство адаптации характеризуется:

- А. Острой психотической симптоматикой.
- Д. Аффективно-невротической симптоматикой с нарушениями социального поведения
- Б. Судорожным синдромом.
- В. Ретроградной амнезией.
- Г. Псевдодеменцией.

На протяжении многих лет совместной жизни, несмотря на высокую потенцию и чрезвычайную изобретательность мужа, женщина не может достичь во время близости необходимого уровня сексуального возбуждения: "Чувствую себя холоднее лягушки и ничего не могу с этим поделать, как ни бьюсь. Все происходит вплоть до оргазма, но радости от этого никакой". Ее расстройство следует обозначить как:

- Вагинизм
- Сексуальное отвращение
- Отсутствие сексуального удовлетворения
- Диспареуния
- Оргазмическая дисфункция