

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Сестринское дело в педиатрии» (III категория) для аттестации

**Купить базу вопросов с ответами можно здесь:
<https://medik-akkreditacia.ru/product/ses-pediatr/>**

Полезные ссылки:

- 1) Тесты для аккредитации «Сестринское дело в педиатрии» (500 вопросов)
https://medik-akkreditacia.ru/product/medsestra_pediatriya/
- 2) Тесты для аккредитации «Сестринское дело» (2000 вопросов)
<https://medik-akkreditacia.ru/product/sestrinskoe-delo/>
- 3) Тесты по специальностям, связанными с детьми
<https://medik-akkreditacia.ru/katalog/akkreditacia/detskie/>

Соотнесите мероприятия профилактики ВБИ с объектами их проведения А) дезинфекция Б) стерилизация В) предстерилизационная очистка Г) дератизация Д) дезинсекция а) уничтожение вегетативных микроорганизмов на эпидемиологически значимых объектах больничной среды б) уничтожение всех микроорганизмов, в том числе, спор с изделий медицинского назначения в) удаление с изделий медицинского назначения биологических жидкостей, лекарственных средств, жировых загрязнений г) мероприятия в отношении грызунов- переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний д) мероприятий в отношении членистоногих насекомых - переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний

Ав, Ба, Вг, Гг, Дд

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд

Аа, Бб, Вв, Гг, Дв

Аа, Бб, Вг, Гг, Да

В этиологии ревматизма ведущая роль принадлежит

В. в) вирусам

Г. г) зеленающему стрептококку

А. а) золотистому стафилококку

Б. б) β -гемолитическому стрептококку группы А

Соотнесите поражающие факторы и чрезвычайные ситуации А) взрыва Б) пожара В) ядерного взрыва а) ударная волна б) осколочные поля в) токсичные продукты

горения, открытый огонь г) радиационное воздействие проникающей радиации и радиоактивного заражения д) тепловое воздействие светового излучения

Аг, Аб, Бв, Вв, Вг, Вд

Аа, Ав, Бг, Ва, Вг, Вв

Аа, Аб, Бв, Ва, Вг, Вд

Аа, Аг, Ба, Ва, Вг, Вд

Наиболее часто ревматизм развивается у детей в возрасте

Г. г) 15 – 17 лет

А. а) 1 - 3 лет

В. в) 7 – 15 лет

Б. б) 3 – 6 лет

Типичной локализацией сыпи при краснухе является

Б. б) боковые поверхности туловища, внутренняя поверхность бедер, сгибательные поверхности конечностей;

А. а) лицо, туловище, разгибательные поверхности конечностей, ягодицы;

В. в) поэтапное распространение сыпи на лице, туловище, конечностях;

Г. г) туловище, конечности с концентрацией элементов на стопах, кистях и вокруг суставов;

Д. д) типичная локализация не характерна.

Наиболее частой формой герпеса у старших детей и взрослых является

Б. б) поражение кожи и слизистых;

А. а) офтальмогерпес;

В. в) стоматит;

Г. г) энцефалит;

Д. д) генерализованная форма.

Лабораторная диагностика фенилкетонурии

Г. г) исследование крови на церуллооплазмин;

А. а) проба на ацетон;

Б. б) проба с треххлористым железом;

В. в) исследование белковых фракций

Д. д) содержание креатинфосфокиназы в крови и моче.

Причиной относительно низкого АД у детей является

В. в) большой объем левого желудочка, широкие артерии

Г. г) большой объем левого желудочка, узкие артерии

Б. б) малый объем левого желудочка, узкие артерии

А. а) малый объем левого желудочка, широкие артерии

Из диеты у детей, больных геморрагическим васкулитом, исключают

А. а) животные жиры

В. в) сенсibiliзирующие продукты

- Б. б) белковое питание
- Г. г) глюкозу и другие сахара

Тактика медицинской сестры при угрозе стеноза гортани у ребенка вне лечебного учреждения включает

- А. а) направление в поликлинику
- Б. б) срочную госпитализацию
- В. в) проведение оксигенотерапии
- Г. г) назначение физиотерапевтических процедур

При подкожном введении инсулин всасывается быстрее при инъекции в

- Б. б) плечо
- А. а) живот
- В. в) бедро
- Г. г) ягодицу

Независимое сестринское вмешательство при обмороке предполагает

- Б. б) применить горячие ручные ванны
- Г. г) уложить ребёнка с приподнятым изголовьем
- А. а) применить оксигенотерапию
- В. в) уложить ребёнка с приподнятыми ногами

Препарат для оказания первой помощи при судорогах у ребенка

- В. в) раствор седуксена
- А. а) раствор анальгина 50%
- Б. б) 3% раствор перекиси водорода
- Г. г) раствор супрастина

При «розовой» гипертермии у ребенка медсестра поступит правильно, если

- Г. г) сделает до прихода врача инъекцию с анальгином
- Б. б) разотрет кожу спиртом и тепло укутает ребенка
- А. а) разденет ребенка и оботрет кожу полуспиртовым раствором
- В. в) укутает одеялом ребенка

Тактика медицинской сестры при обнаружении у новорожденного ребенка мелены

- А. а) вызвать врача, пеленки с меленой сохранить
- Б. б) провести гемостатическую терапию, вызвать врача
- В. в) отсосать слизь, вызвать врача
- Г. г) промыть желудок, вызвать врача

Для мокнущего пупка у новорожденных характерны

- Б. б) отек и гиперемия вокруг пупочной ранки
- Г. г) отек и гиперемия пупочного кольца и гнойное отделяемое из пупочной ранки
- А. а) грибовидная опухоль на дне пупочной ранки

В. в) серозное отделяемое из пупочной ранки

Преджелтушный период при гепатите – это период

- А. а) разгара
- В. в) продромальный
- Б. б) инкубационный
- Г. г) реконвалесценции

Миграционная фаза аскаридоза протекает под маской

- Б. б) неврологических расстройств
- А. а) острого респираторного заболевания
- В. в) дизурических расстройств
- Г. г) диспепсических расстройств

Выполнение сестринских вмешательств по решению проблем больного ребенка - это этап сестринского процесса

- В. в) третий
- А. а) первый
- Г. г) четвертый
- Б. б) второй

Целями сестринского обследования ребенка является определение

- А. а) потребности пациента в уходе и
- В. в) реакция ребенка на состояние своего здоровья и
- Г. г) медико-санитарных потребностей и
- Д. д) существующих и потенциальных проблем пациента со здоровьем
- Б. б) основного и сопутствующего заболевания

Возникновение судорог у детей связано с

- В. в) пониженной судорожной готовностью
- Г. г) высокой дифференциацией коры головного мозга
- Б. б) недостаточным кровоснабжением мозга
- А. а) предрасположенностью мозга к генерализованным реакциям

У ребенка 10-ти лет боли в горле при глотании, температура 39,2 С, головные боли, налеты на миндалинах. Ваш предварительный диагноз

- В. в) заглоточный абсцесс;
- Г. г) фарингит;
- Б. б) аденоидит;
- А. а) ангина;
- Д. д) паратонзиллярный абсцесс.

Развитию кариеса зубов способствует избыток в диете пищевых компонентов, содержащих много

- В. в) жидкости;

- Г. г) поваренной соли;
- А. а) кальция;
- Б. б) сахара;
- Д. д) жиров.

Ребенка надо направлять к стоматологу

- Г. г) при выявлении разрушения зубов;
- А. а) в возрасте 1 года;
- В. в) при выявлении факторов риска;
- Б. б) к моменту прорезывания первых зубов;
- Д. д) при выраженном рахите.

Лечить косолапость необходимо обязательно с возраста

- Б. б) 1 года;
- Г. г) 3-х лет;
- А. а) 6-ти месяцев;
- В. в) первых дней жизни;
- Д. д) 5 лет.

Сестринский процесс при стоматиах

- А. 1. обучение правилам личной гигиены и
- В. 3. обработка полости рта по назначению врача и
- Г. 4. обучение адекватному питанию
- Б. 2. провидение оксигенотерапии
- Д. 5. обеспечить покой, пролонгированный сон
- Е. 6. взятие мазка из зева на флору у контактных

Редко вызывает пищевую аллергию мука

- В. в) овсяная;
- А. а) гречневая;
- Д. д) соевая.
- Б. б) рисовая;
- Г. г) манная;

После введения новорожденному ребенку вакцины БЦЖ в месте инъекции может появиться папула через

- Б. б) 2-3 недели;
- Г. г) 2-3 месяца;
- А. а) 1 неделю;
- В. в) 4-6 недель;
- Д. д) 4-6 месяцев.

Для непереносимости фруктозы верны перечисленные положения, кроме

- Г. г) больной отстает в психомоторном развитии;
- А. а) заболевание связано с дефектом энзима печени;

- Б. б) сопровождается гипергликемией;
- В. в) введение фруктозы вызывает быстрое ухудшение состояния;
- Д. д) лечебный эффект от применения лечебных смесей, не содержащих фруктозу.

Установите соответствие между потенциальными проблемами ребенка и причинами, связанными с нарушением питания

1. анемия 2. гипотрофия 3. ожирение 4. гиповитаминоз

а) недостаточное употребление свежих овощей и фруктов б) увеличение калорийности пищи в) уменьшение калорийности пищи г) недостаток железосодержащих продуктов питания

1ав, 2а, 3б, 4а

1аг, 2в, 3б, 4а

1аг, 2в, 3а, 4б

1ав, 2г, 3б, 4а

В рацион питания больных ревматизмом включают картофель, изюм, курагу и другие продукты, благодаря высокому содержанию

Г. г) йода

А. а) кальция

Б. б) калия

В. в) натрия

Наиболее важным методом диагностики пороков сердца является

А. а) общий анализ крови

Б. б) ультразвуковое исследование сердца

В. в) биохимический анализ крови

Г. г) велоэргометрия

Профилактика аскаридоза и трихоцефаллёза включает

А. а) ежегодную диспансеризацию

Б. б) правильную обработку овощей, фруктов, воды

В. в) соблюдение диеты, питьевого режима

Г. г) проветривание жилых помещений

Концентрационная способность почек у детей определяется результатом пробы

А. а) по Аддису-Каковскому

Г. г) по Зимницкому

Б. б) по Нечипоренко

В. в) ортостатической

Пупочная ранка в норме полностью эпителизируется

Г. г) на 2-м месяце жизни;

А. а) к концу 1-й недели жизни;

Б. б) к концу 2-й недели жизни;

В. в) к концу 1-го месяца жизни;

Д. д) на 3 месяце жизни.

Выраженным цианозом сразу после рождения проявляется

- Г. г) открытый артериальный проток;
- А. а) дефект межжелудочковой перегородки;
- В. в) транспозиция магистральных сосудов;
- Б. б) тетрада Фалло;
- Д. д) дефект межпредсердной перегородки.

Назовите клинические симптомы сепсиса у новорожденных детей

- В. в) гипертермия, угнетение сознания, диспепсические расстройства;
- А. а) наличие множества гнойных очагов;
- Г. г) нарушение терморегуляции, диспепсические расстройства, неврологические симптомы, нарушение свертываемости крови и ОЦК;
- Б. б) тяжелая сердечная недостаточность;
- Д. д) гипертермия, токсикоз.

Основная причина физиологической желтухи новорожденного

- Б. б) недостаточная глюкуронизация;
- А. а) гемолиз;
- В. в) сгущение крови;
- Г. г) холестаза;
- Д. д) гипогликемия.

При «белой» гипертермии у детей отмечаются

- Г. г) гиперемия кожных покровов
- А. а) мраморные кожные покровы
- Б. б) бледные кожные покровы
- В. в) холодные конечности

Когда можно снять с диспансерного учета ребенка с хроническим отитом при отсутствии обострений

- Б. б) через 2 года
- В. в) через 4 года
- А. а) через 1 год
- Г. г) с учета не снимать вообще

Патология, встречающаяся при диспансеризации среди подростков

- Б. б) привычный вывих
- А. а) плоскостопие
- В. в) вросший ноготь
- Г. г) гемофилия

К заболеваниям слезного аппарата относятся

- В. в) миопия, гиперметропия
- Г. г) нистагм, амблиопия

- Б. б) блефарит, ячмень, халазион
- А. а) дакриоцистит, дакриоаденит

Выявление потребностей ребенка, удовлетворение которых нарушено, - это этап сестринского процесса

- Г. г) четвертый
- А. а) первый
- Б. б) второй
- В. в) третий

основными задачами концепции развития здравоохранения и медицины в РФ являются

- А. А) увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний и
- Б. Б) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения и
- В. В) повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения и
- Г. Г) развитие государственного сектора в здравоохранении и
- Д. Д) повышение уровня квалификации медицинских работников

сестринскими рекомендациями родителям по уходу за ребенком с врожденным пороком сердца могут быть

- Г. 4. обеспечить обильным питьем
- А. 1. кормить часто, малыми порциями и
- Б. 2. избегать гиперопеки и
- В. 3. научиться оказывать помощь при одышно-цианотических приступах
- Д. 5. информировать о возможных причинах неблагоприятного исхода
- Е. 6. информировать о преимуществах лечения одного врача над другим

Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с острым гломерулонефритом после выписки из стационара могут быть

- А. 1. поощрять ребенка к самоконтролю, увеличению активности и
- В. 3. исключение калий-содержащих продуктов из диеты и
- Г. 4. контроль за поддерживающей терапией и
- Д. 5. научиться приемам психологической поддержки
- Б. 2. диета с увеличением животного белка, жира
- Е. 6. проводить плановую иммунопрофилактику

Для синдрома внезапной смерти у детей характерно

- А. а) синдром чаще встречается у детей старше 3 лет;
- Д. д) семейная предрасположенность к внезапной смерти.
- Б. б) смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка;
- В. в) всегда обнаруживают конкретную причину смерти;
- Г. г) всегда имеются клинко-морфологические признаки незрелости;

Сестринскими рекомендациями ребенку с пиелонефритом могут быть

обогащенные диеты углеводами, белком
ограничение объема вводимой жидкости
тщательный туалет половых органов и
режим и
увеличение объема вводимой жидкости и
проведение противорецидивной терапии

Установите соответствие между заболеванием и его признаками
1. стенозирующий ларингит
2. пневмония
а) грубый голос б) "бочкообразная" грудная клетка в)
влажный кашель г) носогубный цианоз

1бв, 2аг

1бг, 2ав

1аб, 2вг

1аг, 2вг

Целями сестринского обследования ребенка является определение

б) основного и сопутствующего заболевания

а) потребности пациента в уходе и

в) реакция ребенка на состояние своего здоровья и

г) медико-санитарных потребностей и

д) существующих и потенциальных проблем пациента со здоровьем

Установите соответствие между возрастом и числом дыханий у детей в минуту
1. новорожденный
2. 5 лет
3. 14 лет
а) 16-18 б) 20-25 в) 30-35 г) 40-60 д) 60-80 е) 80-100

1д, 2б, 3а

1д, 2б, 3а

1д, 2б, 3в

1д, 2б, 3е

Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с энтеробиозом могут быть

6. добавить в диету острые блюда

2. обеспечить обильным питьем

1. проглаживание нательного и постельного белья и

3. спать укладывать ребенка в тугих трусиках и

4. коротко стричь ногти и

5. тщательный туалет промежности

При контакте с детьми, инвазированными гельминтами, возможно заражение

А. а) аскаридозом

Г. г) энтеробиозом

Б. б) трихинеллёзом

В. в) трихоцефаллёзом

Системным инфекционно-аллергическим заболеванием соединительной ткани с преимущественным поражением сердца и сосудов является

- Г. г) гломерулонефрит
- А. а) приобретенный порок сердца
- В. в) ревматизм
- Б. б) вегето-сосудистая дистония

Количество мочеиспусканий у новорожденных детей в сутки составляет

- А. а) 10 – 20 раз
- Б. б) 20 - 25 раз
- В. в) 7 – 15 раз
- Г. г) 30 – 40 раз

Уменьшение мочеотделения – это

- В. в) олигурия
- А. а) анурия
- Б. б) полиурия
- Г. г) поллакиурия

Появление у детей одновременно с гематурией гипертензии, отеков характерно для

- Б. б) цистита
- А. а) гломерулонефрита
- В. в) пиелонефрита
- Г. г) нефроптоза

В клинической картине ботулизма обычно не наблюдается

- А. а) расстройства зрения (туман перед глазами, двоение)
- Г. г) гепатолиенального синдрома
- Б. б) нарушение глотания
- В. в) расстройство дыхания
- Д. д) миастении

Лечебное питание ребенка с пиелонефритом строится по принципу

- А. а) молочно-растительной диеты с умеренным ограничением белка и соли
- Б. б) усиленного белкового питания
- В. в) бессолевой диеты
- Г. г) молочно-растительной диеты с ограничением сахара

Маточные кровотечения у девочек старшего возраста отмечаются при

- А. а) алиментарных анемиях
- В. в) тромбоцитопенической пурпуре
- Б. б) гемофилии
- Г. г) геморрагическом васкулите

Наиболее часто вызывают пищевую аллергию

- А. а) черника;

- Б. б) клубника;
- В. в) смородина;
- Г. г) крыжовник;
- Д. д) ежевика.

У детей реже встречается форма бронхиальной астмы

- Б. б) неатопическая;
- В. в) астма напряжения;
- А. а) атопическая;
- Г. г) аспириновая астма;
- Д. д) инфекционно-аллергическая.

При анафилактическом шоке ребенка надо уложить

- Б. б) на спину
- Г. г) с приподнятым изголовьем
- А. а) на живот
- В. в) на бок с приподнятыми ногами

Ребенка перед оформлением в логопедическую группу направляют на консультацию к ЛОР-врачу с целью исключить

- Г. г) ларингит
- А. а) острое заболевание
- В. в) понижение слуха
- Б. б) хронический тонзилит

Жидкие лекарственные средства (настои, отвары) рекомендуется хранить в

- Б. б) холодильнике при температуре ниже 0°C
- Г. г) темном месте при комнатной температуре
- А. а) морозильном отделении холодильника
- В. в) холодильнике при температуре +2 - +6 °C

Ребенка надо приучать чистить зубы

- Б. б) с 2-х лет;
- А. а) с момента прорезывания первых временных (молочных) зубов;
- В. в) после прорезывания всех временных (молочных) зубов;
- Г. г) ко времени поступления в школу;
- Д. д) с 5 лет.

Этот симптом требует немедленной госпитализации ребенка в хирургический стационар

- Б. б) жидкий стул повторно;
- Г. г) температура 38 С;
- А. а) повторная рвота;
- В. в) напряжение мышц живота;
- Д. д) обморок.

Причиной приобретенного дакриоцистита является

- В. в) непроходимость слезоносового канала
- А. а) атония круговой мышцы лица
- Б. б) рубцевые изменения век
- Г. г) аномалия развития слезных путей

Приоритетное действие медицинской сестры при первой стадии белой лихорадки у детей предполагает

- Б. б) пузырь со льдом к голове
- В. в) банки на грудную клетку
- А. а) холодный компресс на голову
- Г. г) тщательное укрытие ребенка

Режим питания ребенка раннего возраста должен предусматривать

- Г. г) до 8 приемов пищи в день
- Б. б) 3 приема пищи в день
- А. а) не менее 4 приемов пищи в день
- В. в) не ограниченное количество приемов пищи

Механизм передачи инфекции при остром респираторном заболевании

- Б. б) контактно-бытовой
- А. а) воздушно-капельный
- В. в) пищевой
- Г. г) гематогенный

Установите соответствие между видом вскармливания и характером стула новорожденного 1. естественное 2. искусственное а) темно-коричневого цвета с гнилостным запахом б) ярко-желтого цвета с кислым запахом

- 1б, 2а
- 1а, 2б

К физиологическим состояниям новорожденных относят

- В) везикулопустулез
- А) мочекислый инфаркт и
- Б) желтуха и
- Г) гипертермия и
- Е) эритема
- Д) цианоз

Установите соответствие периода детского возраста с продолжительностью и возрастом 1. интранатальный 2. новорожденности 3. внутриутробный 4. грудной 5. преддошкольный 6. младший школьный 7. подростковый 8. юношеский 9. дошкольный а) 38-40 недель б) от начала родовой деятельности до рождения ребенка в) 28 дней г) 1-12 месяцев д) 1-3 года е) 3-7 лет ж) 7-11 лет з) 12-16 лет и) 17-

21 год

1а, 2в, 3б, 4г, 5д, 6ж, 7з, 8и, 9е

1б, 2в, 3а, 4г, 5д, 6ж, 7з, 8и, 9е

1б, 2г, 3а, 4в, 5д, 6ж, 7з, 8и, 9е

1б, 2в, 3е, 4г, 5д, 6ж, 7з, 8и, 9а

Сестринскими рекомендациями по диетотерапии ребенку с пиелонефритом могут быть

- ограничение поваренной соли и
- прием минеральной воды и
- увеличение молочно-кислых продуктов
- ограничение жидкости
- ограничение белка в диете

Установите соответствие между заболеванием и его симптомами 1. потница 2. опрелости 3. псевдофурункулез а) мокнущие эрозии б) пузырьки с просыное зерно с прозрачным содержимым в) плотные инфильтраты г) страдает общее состояние д) яркая гиперимия кожи

1б, 2аг, 3бг

1а, 2бд, 3вг

1а, 2ад, 3бв

1б, 2ад, 3вг

Возбудителем афтозного стоматита являются

- Г. г) простейшие
- А. а) грибы
- Б. б) вирусы
- В. в) бактерии

При хроническом гепатите ребенку назначают диету № 5 с

- Г. г) ограничением растительного белка
- Б. б) дополнительным введением растительного белка
- А. а) дополнительным введением животного белка
- В. в) ограничением животного белка

При пиелонефрите поражается

- А. а) соединительная ткань почек
- В. в) чашечно-лоханочная система
- Б. б) клубочки почек
- Г. г) мочевого пузыря

Представителем условно-патогенной флоры, вызывающей кишечные инфекции у детей, не является

- Г. г) стрептококк;
- А. а) клебсиелла;

- Б. б) протей;
- В. в) стафилококк;
- Д. д) гафний.

Большинство серозных менингитов имеет этиологию

- Б. б) гриппозную;
- В. в) туберкулезную;
- А. а) вирусно-бактериальную;
- Г. г) паротитную и энтеровирусную;
- Д. д) аденовирусную.

Наиболее частой клинической формой пищевой аллергии у детей раннего возраста является:

- А. а) атопический дерматит;
- Б. б) бронхообструктивный синдром;
- В. в) нефротический синдром;
- Г. г) гастроинтестинальный синдром;
- Д. д) крапивница и отек Квинке.

При лечении микоплазменной пневмонии целесообразно использовать

- В. в) полусинтетические пенициллины;
- Г. г) цефалоспорины 1-го поколения;
- А. а) природные пенициллины;
- Б. б) макролиды;
- Д. д) аминогликозиды.

Грудной тип дыхания характерен для детей

- А. а) до 1 года
- Г. г) с 8 лет у девочек
- Б. б) раннего возраста
- В. в) с 8 лет у мальчиков

Наиболее частыми источниками туберкулезной инфекции для человека являются домашние животные

- Б. б) крупный рогатый скот;
- А. а) козы;
- В. в) свиньи;
- Г. г) лошади;
- Д. д) собаки.

Типичными особенностями периода высыпания при кори являются следующие, кроме:

- Б. б) пятнисто-папулезной сыпи с тенденцией к слиянию;
- А. а) появления сыпи на фоне нормальной температуры;
- В. в) этапности при появлении и угасании сыпи;

- Г. г) наличия катаральных явлений;
- Д. д) усиления токсикоза и лихорадки при появлении сыпи.

Слабость, потливость, чувство голода, тремор конечностей наблюдается в начале развития

- Г. г) гипогликемической комы
- А. а) уремии комы
- Б. б) печеночной комы
- В. в) гипергликемической комы

При диарее и рвоте у ребенка медицинская сестра ставит целью ухода

- Б. б) поддержать водно-электролитный баланс
- А. а) сохранить массу тела пациента
- В. в) предупредить развитие коллапса
- Г. г) предотвратить развитие гипоксии

При каком хроническом заболевании уха показано наблюдение больного 4 раза в год

- Б. б) хронический мезотимпанит
- А. а) хронический эптитимпанит
- В. в) рецидивирующий отит
- Г. г) кохлеарный неврит

Здоровый ребенок начинает поворачиваться со спины на живот и сидеть при поддержке за руку в возрасте

- Г. г) 5 -6 месяцев;
- Б. б) 6 -7 месяцев;
- А. а) 4 -5 месяцев;
- В. в) 3 -4 месяцев;
- Д. д) 8-9 месяцев.

Неотложной помощью при опухоли глазницы является

- Б. б) срочная госпитализация
- В. в) применение антибиотиков
- А. а) применение антибиотиков, сульфаниламидов
- Г. г) амбулаторное лечение

Установите соответствие между видом ангины и симптомами 1. катаральная 2. лакунарная 3. фолликулярная а) гнойные налеты в криптах миндалин б) гноетечение из уха в) нагноение фолликулов миндалин г) "лающий" кашель д) гиперемия, отек миндалин

- 1б, 2гд, 3ад
- 1в, 2аб, 3вг
- 1а, 2бд, 3вд
- 1д, 2ад, 3вд

Установите соответствие между периодами пневмонии и симптомами 1. начальный 2. разгара 3. выздоровления а) сухой кашель б) чихание в) пенные выделения из рта г) улучшение общего состояния д) исчезновение клинических симптомов е) хрипы влажные, крепитирующие

1абг, 2де, 3вд

1абд, 2ге, 3вд

1абв, 2ве, 3гд

1абг, 2бе, 3вб

Наиболее частой причиной железодефицитной анемии у детей старшего возраста является

Б. б) нарушение всасывания железа;

А. а) глистная инвазия;

В. в) хроническая кровопотеря;

Г. г) авитаминоз;

Д. д) недостаточное поступление железа с пищей.

Соотнесите изделия медицинского назначения с методами их обработки А) гидрофильные прокладки Б) тубусы многократного применения В) тубусы однократного применения Г) контактные накожные излучатели (электроды) Д)аэрозольные наконечники а) дезинфекция б) предстерилизационная очистка в) стерилизация

Аа, Ба, Бб, Бв, Ва, Га, Да, Дб, Дв

Аб, Ба, Бв, Бв, Ва, Га, Да, Дб, Дг

Ребенка в возрасте 2-х лет можно считать часто болеющим, если

Д. д) острые респираторные заболевания отмечались 6 раз.

А. а) острые заболевания в течение второго года жизни отмечались 7 раз;

Б. б) обострения бронхиальной астмы наблюдались два раза в год и острые заболевания также два раза в год;

В. в) на фоне рахита в стадии реконвалесценции отмечались острые заболевания три раза в течение 2-го года жизни;

Г. г) у него имеется хронический отит с обострениями 3 раза в год;

Из отвлекающих процедур ребенку с приступом бронхиальной астмы медсестра порекомендует

А. а) ручные и ножные горячие ванны

Б. б) общую горячую ванну

В. в) лечебную ванну с морской солью

Г. г) воздушную ванну

Этиологическим лечением острого герпетического стоматита является

А. а) полоскание полости рта растворами антисептиков;

Б. б) противовирусное лечение;

- В. в) диета;
- Г. г) антибактериальные препараты;
- Д. д) жаропонижающие средства.

Типичными клиническими проявлениями краснухи не являются

- Б. б) мелкопятнистая сыпь;
- В. в) увеличение и болезненность заднешейных и затылочных лимфоузлов;
- А. а) субфебрильная лихорадка, легкие катаральные явления;
- Г. г) круп;
- Д. д) одновременное развитие всех симптомов.

Элементы ухода при возникновении потницы исключают

- Г. г) гигиенические ванны
- А. а) воздушные ванны
- Б. б) лечебные ванны с крахмалом
- В. в) устранение перегревания

Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с тромбоцитопенией могут быть

- А. 1. избегать приема антибиотиков и антиагрегантов и
- Б. 2. санировать очаги хронической инфекции и
- В. 3. гипоаллергенная диета с включением арахиса, шпината, крапивы, укропа и
- Д. 5. повторные курсы фитотерапии
- Г. 4. занятия физкультурой в основной группе
- Е. 6. солнечная инсоляция

Сестринскими рекомендациями по диетотерапии ребенку с пиелонефритом могут быть

- А. 1. ограничение поваренной соли и
- Г. 4. прием минеральной воды и
- Д. 5. увеличение молочно-кислых продуктов
- Б. 2. ограничение жидкости
- В. 3. ограничение белка в диете

Антибиотики при ветряной оспе назначают

- Г. г) с целью профилактики осложнений;
- А. а) при тяжелой форме;
- Б. б) при появлении гнойных осложнений;
- В. в) при энцефалите;
- Д. д) не назначают.

Наиболее часто вызывают пищевую аллергию овощи

- А. а) кабачки;
- Д. д) томаты.
- Б. б) огурцы;

- В. в) капуста цветная;
- Г. г) морковь;

Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни тяжелой формой атопического дерматита целесообразно проводить

- А. а) адаптированными смесями на основе коровьего молока;
- Д. д) высоко гидролизованными смесями.
- Б. б) соевыми смесями;
- В. в) смесями на основе частично гидролизованного белка сыворотки;
- Г. г) кисломолочными смесями;

Диагноз муковисцидоза подтверждает

- В. в) биопсия тонкого кишечника;
- А. а) рентгенограмма грудной клетки;
- Д. д) определение электролитов пота.
- Б. б) исследование костного мозга;
- Г. г) микроскопия осадка мочи;

Практически не встречается в раннем детском возрасте

- В. в) лобарная пневмония;
- А. а) бронхопневмония;
- Б. б) аспирационная пневмония;
- Г. г) абсцедирующая пневмония;
- Д. д) пневмоцистная пневмония.

Целиакия

- В. в) спонтанно излечивается после 2 года жизни;
- А. а) развивается в большинстве случаев в первые 3 месяца жизни;
- Г. г) сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника;
- Б. б) приводит за счет прогрессирующей бронхоэктазии к смерти;
- Д. д) не сопровождается развитием вторичной лактазной недостаточности.

Установите соответствие между элементами крови и функцией 1. эритроциты 2. лейкоциты 3. тромбоциты а) гемостаз б) транспорт кислорода в) иммунная

- 1а, 2в, 3б
- 1б, 2а, 3в
- 1а, 2в, 3в
- 1б, 2в, 3а

Соотнесите отравляющие вещества с механизмом их действия А) Синильная кислота Б) зарин В) фосген Г) иприт Д) люизит а)общееядовитое б) нервно-паралитическое в) удушающее г) кожно-нарывного

- Аа, Бв, Ва, Гб, Дб
- Ад, Бг, Вв, Гг, Дг
- Аа, Бб, Вв, Гг, Дг

Аа, Ба, Вв, Гг, Да

Соотнесите виды ЧС с причиненным ущербом А) локальные Б)местные В)территориальные Г) региональные Д) федеральные а)пострадало не более 10 человек, зона ЧС не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения б)пострадало свыше 10, но не более 50 человек, зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района в)пострадало от 50 до 500 человек, зона ЧС не выходит за пределы субъекта Российской Федерации г)пострадало от 50 до 500 человек, зона ЧС охватывает территорию двух субъектов РФ д)пострадало свыше 500 человек, ЧС зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух субъектов РФ или выходит за их пределы

Аа, Бб, Вв, Гв, Дв

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд

Аа, Бб, Вв, Га, Да

Ав, Бг, Вв, Гг, Дд

Самым характерным проявлением гемофилии, являющимся наиболее частой причиной инвалидизации у детей

Б. б) гемартрозы

А. а) кровоизлияние в мозг

В. в) гемоторакс

Г. г) геморрагическая сыпь

Характерным симптомом эпидемического паротита не является

А. а) лихорадка;

Д. д) ангина.

Б. б) увеличение околоушных слюнных желез;

В. в) увеличение подчелюстных слюнных желез;

Г. г) боли в животе;

Приоритетной причиной развития сахарного диабета у детей является

Б. б) генетическая предрасположенность

А. а) эмоциональные стрессы

В. в) вирусные инфекции

Г. г) переизбыток

Вакцинация БЦЖ противопоказана

Б. б) при иммунодефицитных состояниях;

В. в) при наличии активного туберкулеза у других детей в семье;

А. а) при врожденных ферментопатиях;

Г. г) во всех указанных случаях;

Д. д) при агаммаглобулинемии Bruton.

При обмороке необходимо

Г. г) уложить на живот

- А. а) придать положение с возвышенным изголовьем
- Б. б) уложить ребенка с приподнятыми ногами
- В. в) усадить ребенка

Медицинская сестра заподозрит развитие ларингоспазма у ребенка 1,5 лет по следующим симптомам

- Г. г) судороги конечностей
- Б. б) лающий кашель, осиплость голоса
- А. а) беспокойство, вдох со звуком с кратковременным апноэ
- В. в) появление пенистых выделений изо рта

Что следует сделать медицинской сестре при кровотечении из уха до осмотра врача

- Г. г) промыть ухо с раствором марганцовки
- А. а) почистить ухо ватным тампоном
- В. в) ввести стерильный тампон в слуховой проход
- Б. б) закапать капли в ухо

К физиологическим состояниям новорожденных относят

- А. А) мочекишный инфаркт и
- Б. Б) желтуха и
- Г. Г) гипертермия и
- Е. Е) эритема
- В. В) везикулопустулез
- Д. Д) цианоз

Сестринскими рекомендациями ребенку с пиелонефритом могут быть

- А. 1. ограничение объема вводимой жидкости
- Б. 2. тщательный туалет половых органов и
- Г. 4. режим \"принудительного\" мочеиспускания и
- Д. 5. увеличение объема вводимой жидкости и
- Е. 6. проведение противорецидивной терапии
- В. 3. обогащенные диеты углеводами, белком

Гибель недоношенных детей в раннем неонатальном периоде наиболее часто вызывают

- Б. б) асфиксия и пневмопатии;
- А. а) родовая травма;
- В. в) инфекции;
- Г. г) врожденные пороки развития;
- Д. д) сепсис.

Ведущий клинический симптом в диагностике пневмонии

- В. в) локальная крепитация;
- А. а) одышка;

- Б. б) ослабленное дыхание;
- Г. г) многочисленные мелкопузырчатые хрипы;
- Д. д) втяжение уступчивых мест грудной клетки.

Тактика медицинской сестры при обнаружении у новорожденного ребенка омфалита

- Г. г) перевод ребенка в отделение патологии новорожденных
- Б. б) вызов врача, обработка пупочной ранки
- А. а) вызов врача, изоляция ребенка
- В. в) изоляция ребенка, обработка пупочной ранки

Малая хорея возникает при ревматическом поражении

- В. в) кожи
- Г. г) дыхательной системы
- Б. б) костно-мышечной системы
- А. а) центральной нервной системы

Анафилактический шок у детей наиболее часто развивается после введения

- В. в) препаратов железа
- Г. г) препаратов кальция
- Б. б) витаминов
- А. а) антибиотиков

Наличие изжоги свидетельствует о

- В. в) диафрагмальной грыже;
- Г. г) язвенной болезни желудка;
- Б. б) повышение кислотности желудочного содержимого;
- А. а) забросе желудочного содержимого в пищевод;
- Д. д) гастродуодените.

Наиболее частым осложнением язвенной болезни у детей является

- В. в) пенетрация в поджелудочную железу;
- Г. г) малигнизация;
- Б. б) перфорация;
- А. а) кровотечение;
- Д. д) непроходимость.

Частые кровотечения у мальчиков характерны для

- В. в) гемолитической анемии
- А. а) тромбоцитопенической пурпуры
- Г. г) гемофилии
- Б. б) тромбоцитопатии

У ребенка с ограниченным нейродермитом прививки можно начинать от начала ремиссии не ранее чем через

- А. а) 1 месяц
- Б. б) 2 месяца от начала ремиссии
- В. в) 3 месяца от начала ремиссии
- Г. г) 6 месяцев от начала ремиссии
- Д. д) 1 год от начала ремиссии

Введение прикорма ребенку с пищевой аллергией рекомендуется в возрасте

- В. в) 2-х месяцев;
- Г. г) 4-х месяцев.
- А. а) 10 месяцев;
- Б. б) 6 месяцев;

Для бронхиальной астмы не характерен признак

- В. в) гиперпродукция вязкой прозрачной мокроты;
- Г. г) рассеянные непостоянные сухие, свистящие хрипы;
- А. а) приступы бронхоспазма с экспираторной одышкой;
- Б. б) повышение хлоридов в поте и моче;
- Д. д) жесткое дыхание.

При метеоризме ребенку ставят

- Г. г) сифонную клизму
- А. а) очистительную клизму
- Б. б) газоотводную трубку
- В. в) гипертоническую клизму

Количество водного раствора лекарственного средства в 1 чайной ложке

- Г. г) 15мл
- А. а) 1мл
- Б. б) 5мл
- В. в) 10мл

Оценка полученных результатов - это этап сестринского процесса

- Г. г) пятый
- А. а) второй
- Б. б) третий
- В. в) четвертый

Соотнесите механизмы и пути передачи инфекции А) алиментарный (фекально-оральный) Б)воздушно-капельный В)контактный Г)гемоконтактный (через кровь) а) пищевой, водный б) капельный, пылевой в)Прямой контактный г)Половой д)Контактно-бытовой е) Гемотрансфузионный ж) Вертикальный

- Аг, Бб, Вб, Вг, Вд, Ге, Гж, Га
- Аа, Бб, Вв, Вг, Вд, Ге, Гж, Гз

Какова причина затруднения дыхания при остром рините у детей

- Г. г) атрофия слизистой, гиперсекреция мокроты
- Б. б) отек слизистой, гиперсекреция мокроты
- А. а) отек слизистой, гиперсекреция слизи
- В. в) атрофия слизистой, гиперсекреция слизи

Проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему острое респираторное заболевание можно разрешить после выздоровления не ранее, чем через

- Г. г) 3 месяца
- Б. б) 1 месяц
- А. а) 2 недели
- В. в) 2 месяца
- Д. д) 3,5 месяца

Клиническими формами внутриутробной бактериальной инфекции могут быть

- Г. г) все перечисленные;
- А. а) аспирационная пневмония;
- Б. б) язвенно-некротический эзофагит, гастроэнтерит, перитонит;
- В. в) гнойный лептоменингит, остеомиелит;
- Д. д) сепсис.

Стул в виде «болотной тины» характерен для

- В. в) сальмонеллеза
- А. а) шигеллеза
- Б. б) эшерихиоза

Постановка цели и планирование сестринских вмешательств по решению проблем больного ребенка - это этап сестринского процесса

- В. в) третий
- А. а) первый
- Б. б) второй
- Г. г) четвертый

Оптимальные сроки назначения антибиотиков при пневмонии до

- А. а) нормализации температуры;
- Б. б) полного рассасывания инфильтрата в легком;
- В. в) нормализации СОЭ;
- Г. г) 4-5 дней стойкой нормальной температуры тела;
- Д. д) ликвидации токсикоза.

Установите соответствие между этапами системы и процедурой обращения с медицинскими отходами А) - сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую деятельность Б)перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы В)обеззараживание/обезвреживание Г)транспортирование отходов с территории

организации, образующей отходы Д)захоронение или уничтожение медицинских отходов а)Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо б)Процесс должен быть механизирован (тележки, лифты, подъемники, автокары и так далее) в)Не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами г)мероприятия следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации д)производится транспортом специализированных организаций к месту последующего обезвреживания, размещения медицинских отходов е) с учетом единой централизованной системы санитарной очистки данной административной территории

Аа, Ав, Аг, Ба, Бб, Бв, Бг, Вв, Вг, Гв, Гд, Де

Аб, Ав, Аг, Бб, Бб, Бв, Бг, Вб, Вг, Гв, Гд, Да

Установите соответствие физиологического состояния новорожденного с признаками 1. мастит 2. желтуха 3. меконий 4. половой криз а) иктеричность кожи б) зеленый замазкообразный стул в) увеличение молочных желез г) кровянистые выделения из влагалища у девочек

1б, 2а, 3в, 4г

1а, 2б, 3в, 4г

1в, 2а, 3б, 4г

1в, 2г, 3б, 4а

Для максимального эффекта при анафилактическом шоке лекарственные препараты вводят

Б. б) внутривенно

А. а) внутримышечно

В. в) подкожно

Г. г) внутрикожно

У детей для стимуляции секреции целесообразно использовать

В. в) хлеб с водой;

Г. г) кофеин;

А. а) гистамин;

Б. б) мясной бульон;

Д. д) овощной отвар.

Сыпь при ветряной оспе в течение болезни меняется следующим образом

В. в) пятно – пузырек – гнойничок – рубчик

Г. г) пузырек – папула – корочка

Б. б) пятно – пузырек – корочка

А. а) пятно – папула – пузырек – корочка

Медицинская сестра поступит правильно, если помощь ребенку при судорогах начнет с

Б. б) предотвращения западания языка и дачи кислорода

- А. а) искусственного дыхания и непрямого массажа сердца
- В. в) обеспечения возвышенного положения головы
- Г. г) введением седуксена до прихода врача

Планирование сестринского процесса при коклюше в спазмолитическом периоде

1. санация дыхательных путей от слизи и
2. аэротерапия и
4. обучение родителей помощи при приступе спазматического кашля и
6. обучить ингаляции с протеолитическими ферментами и
7. обеспечить гомогенной пищей
3. туалет кожи, слизистых
5. контроль за суточным водным балансом

Причиной экспираторной одышки является:

- Б. б) ларингит;
- Г. г) трахеит;
- А. а) фарингит;
- В. в) бронхиальная обструкция;
- Д. д) ничего из вышперечисленного.

Целесообразно применять для купирования развившегося приступа бронхиальной астмы

- А. а) ингаляционные кортикостероиды;
- Г. г) бета-2-адреномиметики;
- Б. б) кромогликат;
- В. в) недокромил;
- Д. д) задитен.

Установите соответствие между заболеванием и принципами ухода и тактики 1. конъюнктивит 2. молочница 3. пузырьчатка а) туалет глаз б) использовать стерильные пеленки в) изоляция в ДИО г) кипячение сосок д) обработка бутылок

- 1а, 2гд, 3бв
- 1в, 2гб, 3вб
- 1г, 2вг, 3ав
- 1б, 2вд, 3гв

Анализ мочи по Нечипоренко собирают

- Г. г) в течение суток через каждые 3 часа
- А. а) утром после туалета промежности в чистую посуду
- В. в) после туалета промежности, в чистую посуду, среднюю порцию струи мочи
- Б. б) в течении 3 часов в одну банку

Причиной срыгивания у грудных детей является

- Д. д) все перечисленное.
- А. а) незрелость эзофагокардиального отдела пищевода;

- Б. б) высокий тонус желудка в пилорическом отделе;
- В. в) высокое внутрибрюшное давление;
- Г. г) непостоянные расслабления нижнего пищеводного сфинкса;

К врожденным порокам сердца, протекающим с цианозом, относится

- А. а) дефект межпредсердной перегородки
- Г. г) «тетрада Фалло»
- Б. б) дефект межжелудочковой перегородки
- В. в) открытый артериальный проток

В каких случаях допустимо лечение острой пневмонии в домашних условиях

- В. в) неосложненная форма пневмонии у ребенка 4 лет;
- А. а) неосложненная форма у ребенка в возрасте до 1 года;
- Б. б) пневмония, осложненная кардиоваскулярным синдромом;
- Г. г) пневмония у ребенка из социально неблагополучной семьи;
- Д. д) затяжное течение пневмонии с ателектазом одного сегмента у ребенка 7 лет.

При лечении свободной гипербилирубинемии у новорожденных детей наиболее эффективен метод

- А. а) фототерапия;
- Б. б) лечение фенобарбиталом;
- В. в) инфузионная терапия;
- Г. г) комбинация перечисленных методов;
- Д. д) энтеросорбенты.

Внебольничную пневмонию у детей в возрасте старше 5 лет чаще вызывают

- В. в) пневмококки;
- А. а) стафилококки;
- Б. б) пневмоцисты;
- Г. г) грибы;
- Д. д) микоплазмы.

Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с тромбоцитопенией могут быть

избегать приема антибиотиков и антиагрегантов и
санировать очаги хронической инфекции и
гипоаллергенная диета с включением арахиса, шпината, крапивы, укропа и
повторные курсы фитотерапии
занятия физкультурой в основной группе
солнечная инсоляция

Соотнесите механизм действия отравляющих веществ с их действующим химическим веществом А) общеядовитое Б) нервно-паралитическое В) удушающее Г) кожно-нарывное а) Синильная кислота б) зарин в) фосген г) иприт д) люизит
Аа, Бв, Вг, Га, Гд

Ав, Бб, Вв, Гг, Га
Аа, Бб, Вв, Гг, Гд
Аа, Ба, Вв, Гд, Гв

Соотнесите методы дезинфекции со способами их проведения А) Физический Б) Химический В) Механический а) воздействие высокой температурой, паром под давлением, УФ излучением б) протирание дезраствором в) влажная уборка, стирка, мытье рук г) погружение в дезраствор д) орошение дезраствором

Аа, Бб, Ба, Ва, Вг
Аа, Бб, Бг, Бд, Вв
Аг, Бб, Ба, Бд, Вб
Ав, Ба, Бг, Бд, Вг

Причиной поллинозов является

В. в) пищевые продукты
Г. г) вирусы
Б. б) домашняя пыль
А. а) пыльца растений

Вторичная антибактериальная профилактика ревматизма проводится

Б. б) бициллином-5
А. а) пенициллином
В. в) вольтареном
Г. г) гентамицином

Для врожденного гипотиреоза не характерно

Б. б) пролонгированная желтуха;
В. в) склонность к гипотермии;
А. а) макроглоссия;
Г. г) преждевременное закрытие большого родничка;
Д. д) запор.

Медицинская сестра поступит правильно, если оказание неотложной помощи новорожденному с асфиксией начнет с

В. в) отсасывания слизи из верхних дыхательных путей
А. а) проведения оксигенотерапии
Б. б) проведения ИВЛ
Г. г) непрямого массажа сердца

Для острого аппендицита не характерно

В. в) температура в первые часы болезни невысокая, повышается по мере прогрессирования болезни;
Г. г) напряжение мышц и боль в правой подвздошной области отчетливо выявляется во время сна;
А. а) "расхождение" частоты пульса и температуры (температура 37,6 С, пульс - 130

в минуту);

Б. б) головная боль;

Д. д) рвота.

Срок карантина при кори

В. в) 21 день

А. а) 7 дней

Б. б) 14 дней

Г. г) 30 дней

Проблемами ребенка грудного возраста с врожденным пороком сердца могут быть

В. в) нарушение сна

А. а) снижение аппетита, плохая прибавка в весе

Д. д) снижение аппетита, плохая прибавка в весе, бледность и одышка при кормлении грудью

Б. б) повышение температуры тела

Г. г) бледность и одышка при кормлении грудью

Диетотерапия при гломерулонефрите предусматривает

Д. д) ограничение жидкости и соли, введение калийсодержащих продуктов

А. а) повышенное содержание белка

Б. б) обильное питье

В. в) ограничение жидкости и соли

Г. г) введение калийсодержащих продуктов

При остром отите у детей применяют

Г. г) согревающий компресс на область уха

А. а) горчичники

Б. б) банки

В. в) холодный компресс на область уха

Уровень резистентности организма ребенка определяется

А. а) кратностью острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру

Б. б) кратностью острых респираторных заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру

В. в) тяжестью острых заболеваний

Г. г) длительностью и тяжестью заболеваний

Д. д) числом обострений хронических заболеваний

Препарат для оказания первой помощи при носовом кровотечении

А. а) раствор анальгина 25%

Б. б) 3% раствор перекиси водорода

В. в) раствор седуксена

Г. г) раствор супрастина

В питании больных анемией ограничивают содержание

Б. б) фруктов, овощей

А. а) коровьего молока, злаковых продуктов

В. в) мясных и рыбных блюд

Г. г) жидкости и соли

Наиболее точно отражает состояние здравоохранения в стране

В. в) количество врачей на душу населения;

А. а) уровень рождаемости;

Г. г) младенческая смертность;

Б. б) уровень смертности;

Д. д) детская смертность.

Обструктивным легочным заболеванием является

Б. б) эозинофильная пневмония;

В. в) фиброзирующий альвеолит;

А. а) экзогенный аллергический альвеолит;

Г. г) бронхиальная астма;

Д. д) хроническая пневмония.

Какова приоритетная цель ухода за ребенком с обструктивным бронхитом

А. а) нормализация температуры тела

В. в) уменьшение одышки

Б. б) восстановление аппетита

Г. г) уменьшение головной боли

Приоритетная цель сестринских вмешательств при обмороке у ребенка

А. а) восстановление сознания

Б. б) нормализация пульса

В. в) повышение АД

Г. г) уменьшение одышки

Особенностью диеты при сахарном диабете является

В. в) исключение из рациона овощей и фруктов

Г. г) исключение из рациона мяса и рыбы

А. а) ограничение жидкости, белков и соли

Б. б) ограничение легкоусвояемых углеводов

При приступе ларингоспазма независимое сестринское вмешательство – приготовить всё необходимое для внутримышечного введения раствора

Г. г) седуксена

А. а) адреналина

Б. б) анальгина

В. в) пенициллина

Основные пути передачи внутрибольничной инфекции

- Б. б) через продукты питания;
- А. а) через руки персонала;
- В. в) через белье;
- Г. г) через предметы ухода;
- Д. д) через медицинский инструментарий.

Установите элементы развития сыпи при ветряной оспе

- 1. везикула и
- 2. папула и
- 3. макула и
- 4. корочка и
- 5. рубчик

Специальные занятия гимнастикой и массаж здоровому ребенку необходимо проводить

- А. а) с рождения
- В. в) с полутора месяцев
- Б. б) не нужны
- Г. г) с 2-х месяцев
- Д. д) с 6 месяцев

Ночью у ребенка, больного ОРВИ, появились лающий кашель, осиплость голоса, беспокойство, температура 38,0 С. Неотложное состояние, развившееся у ребенка

- Б. б) стенозирующий ларинготрахеит
- А. а) гипертермический синдром
- В. в) ларингоспазм
- Г. г) приступ бронхиальной астмы

Установите соответствие между возрастом ребенка и суточным объемом пищи
1. от 2х до 6 недель 2. от 6 недель до 4 месяцев 3 от 5 до 6 месяцев 4. от 7 до 9 месяцев а) 1/8 б) 1/7 в) 1/6 г) 1/5

- 1г, 2в, 3а, 4б
- 1в, 2г, 3б, 4а
- 1а, 2в, 3б, 4г
- 1г, 2в, 3б, 4а

Ребенку с декомпенсированным пороком сердца, находящемуся на строгом постельном режиме, полную санитарную обработку можно заменить

- В. в) гигиенической ванной
- А. а) лечебной ванной
- Г. г) обтиранием тела и подмыванием в постели

Б. б) душем

Каково приоритетное действие медицинской сестры при выделении у ребенка гнойной мокроты

В. в) поставить банки, горчичники

А. а) провести оксигенотерапию

Г. г) обеспечить индивидуальной плевательницей

Б. б) провести оксигенотерапию через пеногасители

Длительность применения сосудосуживающих капель в нос до

Б. б) 7 дней

А. б) 1 недели

В. в) 10 дней

Г. г) 1 месяца

Соотнесите методы контроля профилактических мероприятий и способы их проведения А) Бактериологический контроль стерильности изделий медицинского назначения Б) Контроль режимов стерилизации В) Эффективность стерилизации Г) контроль предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения Д)Контроль качества дезинфекции а) проводят с использованием биологических индикаторов б) проводят с использованием химических индикаторов в) оценивается на основании результатов бактериологических исследований г) проводят постановку азопирамовой и фенолфталеиновой проб д)визуально

Аа, Бб, Вв, Гг, Дб, Дв, Дд

Аб, Бб, Ва, Гг, Дб, Дв, Да

Для коклюша не типично

Г. г) выделение вязкой мокроты;

Б. б) одутловатость лица;

А. а) гипертермия;

В. в) толчкообразный кашель с судорожным вдохом;

Д. д) рвота при кашле.

Установите последовательность действий медсестры во время приступа бронхиальной астмы

А. 1. дать увлажняющий кислород и

Б. 2. сделать горячие ножные и ручные ванны и

В. 3) дать щелочное питье и

Г. 4) уложить с приподнятым головным концом и

Д. 5) дать ингалятор

Тактика медицинской сестры при приступе бронхиальной астмы у ребенка

Б) парентеральное введение бронхолитиков

А) создать психоэмоциональный комфорт и

- В) одно-двухкратная ингаляция бронхолитиков и
- Д) вызвать врача

Возникновению срыгиваний у новорожденных детей, находящихся на грудном вскармливании способствуют

- Г. г) все перечисленные;
- А. а) короткий пищевод;
- Б. б) недостаточное развитие кардиального отдела желудка;
- В. в) относительный гипертонус пилорического отдела желудка;
- Д. д) физиологический дефицит ферментов.

Наиболее информативным исследованием при гастрите является

- В. в) УЗИ;
- Г. г) иридодиагностика;
- Б. б) рентгеноконтрастное исследование;
- А. а) эндоскопия с биопсией;
- Д. д) копрограмма.

Особенности ухода при опрелостях

- Г. г) обработать кожу нистатиновой мазью
- А. а) согреть ребенка
- Б. б) провести воздушную ванну
- В. в) дать обильное питье

основными задачами концепции развития здравоохранения и медицины в РФ являются

- А) увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний и
- Б) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения и
- В) повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения и
- Г) развитие государственного сектора в здравоохранении и
- Д) повышение уровня квалификации медицинских работников

Пути распространения острого полиомиелита являются

- Г. г) воздушно-капельный и алиментарный;
- А. а) воздушно-капельный;
- Б. б) алиментарный;
- В. в) трансмиссивный;
- Д. д) все перечисленные.

Медицинская сестра должна знать, что при подкожном введении инсулина в одно и то же место может развиваться

- Б. б) абсцесс
- Г. г) отечность
- А. а) гематома

В. в) липодистрофия

Ребенок 2-х лет внезапно закашлялся, посинел; кашель продолжался около 10-ти минут и больше не возобновлялся. На следующий день вновь появился кашель (непреступнообразный), большое количество сухих хрипов больше справа. Ваш предварительный диагноз

Г. г) все перечисленное;

А. а) круп;

В. в) инородное тело бронхов;

Б. б) бронхиолит;

Д. д) обструктивный бронхит.

У ребенка 3-х лет 6 часов назад возникли острые, приступообразные боли в животе. Стул был кашицеобразный с кровью 1 раз, рвота 1 раз, температура 36,8 С. В первую очередь необходимо исключить

Г. г) аденовирусную инфекцию;

А. а) кишечную инфекцию;

Б. б) инвагинацию;

В. в) острый аппендицит;

Д. д) кишечное кровотечение.

Частота дыханий в минуту у ребенка 1-го года составляет

В. в) 30 – 35

А. а) 16 – 18

Б. б) 20 – 25

Г. г) 40 – 60

Злокачественное заболевание кроветворной ткани с первичной локализацией патологического процесса в костном мозге называется

А. а) гемофилия

В. в) лейкоз

Б. б) тромбоцитопеническая пурпура

Г. г) геморрагический васкулит