

## **Вопросы с вариантами ответов по специальности «Сестринское дело в педиатрии» (Высшая категория) для аттестации**

**Купить базу вопросов с ответами можно здесь:  
<https://medik-akkreditacia.ru/product/ses-pediatr/>**

### **Полезные ссылки:**

1) Тесты для аккредитации «Сестринское дело в педиатрии» (500 вопросов)

[https://medik-akkreditacia.ru/product/medsestra\\_pediatriya/](https://medik-akkreditacia.ru/product/medsestra_pediatriya/)

2) Тесты для аккредитации «Сестринское дело» (2000 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/sestrinskoe-delo/>

3) Тесты по специальностям, связанными с детьми

<https://medik-akkreditacia.ru/katalog/akkreditacia/detskie/>

**Установите соответствие между доношенностью и его признаками 1. доношенный ребенок 2. недоношенный ребенок а) крик слабый б) открытый малый родничок в) длина тела более 45 см г) ногти полностью закрывают ногтевое ложе д) масса тела более 2500 г е) кожа морщинистая**

1агд, 2вбе

1вгд, 2абе

1вге, 2абд

1бгд, 2аве

**Установите соответствие между периодом рахита и характерными клиническими признаками 1. начальный 2. разгар а) мышечная гипертония б) краниотабес в) отсутствие костных изменений г) потливость**

1г, 2б

1г, 2а

1в, 2б

1а, 2б

**Грудной тип дыхания характерен для детей**

В. в) с 8 лет у мальчиков

А. а) до 1 года

Г. г) с 8 лет у девочек

Б. б) раннего возраста

**Установите соответствие кислотности при гастрите и клиническими проявлениями**  
1. сохраненная 2. повышенная 3. пониженная а) снижен аппетит, отрыжка "тухлым",  
вздутие живота б) приступообразные боли через 1,5 - 2 часа после еды, тошнота в)  
отрыжка кислым, изжога, запоры

1б, 2в, 3а

1б, 2а, 3в

1в, 2в, 3б

1а, 2в, 3б

**Наиболее точно отражает состояние здравоохранения в стране**

Б. б) уровень смертности;

В. в) количество врачей на душу населения;

А. а) уровень рождаемости;

Г. г) младенческая смертность;

Д. д) детская смертность.

**Пупочная ранка в норме полностью эпителизируется**

Г. г) на 2-м месяце жизни;

А. а) к концу 1-й недели жизни;

Б. б) к концу 2-й недели жизни;

В. в) к концу 1-го месяца жизни;

Д. д) на 3 месяце жизни.

**Целями сестринского обследования ребенка является определение**

Б. б) основного и сопутствующего заболевания

А. а) потребности пациента в уходе и

В. в) реакция ребенка на состояние своего здоровья и

Г. г) медико-санитарных потребностей и

Д. д) существующих и потенциальных проблем пациента со здоровьем

**Сестринский процесс при стоматитах**

Е. 6. взятие мазка из зева на флору у контактных

Б. 2. проведение оксигенотерапии

А. 1. обучение правилам личной гигиены и

В. 3. обработка полости рта по назначению врача и

Г. 4. обучение адекватному питанию

Д. 5. обеспечить покой, пролонгированный сон

**В этиологии ревматизма ведущая роль принадлежит**

Г. г) зеленым стрептококкам

А. а) золотистому стафилококку

Б. б)  $\beta$ -гемолитическому стрептококку группы А

В. в) вирусам

**Системным инфекционно-аллергическим заболеванием соединительной ткани с преимущественным поражением сердца и сосудов является**

- В. в) ревматизм
- А. а) приобретенный порок сердца
- Б. б) вегето-сосудистая дистония
- Г. г) гломерулонефрит

**Планирование сестринского вмешательства включает**

1. определение потребности в уходе и
2. определение приоритетности проблем и
3. определение целей и
4. написание плана действий и
5. согласование с пациентом

**Наиболее частые проблемы семьи и ребенка, подлежащего хирургическому лечению**

5. комфортное состояние после операции
1. потребность в знаниях о процедурах до и после операции и
2. тревога, связанная с разлукой при госпитализации и
3. риск осложнений из-за ограничения подвижности и
4. вероятность задержки мочи в результате анестезии, страха, боли

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с энтеробиозом могут быть**

1. проглаживание нательного и постельного белья и
3. спать укладывать ребенка в тугих трусиках и
4. коротко стричь ногти и
5. тщательный туалет промежности
2. обеспечить обильным питьем
6. добавить в диету острые блюда

**Оцените состояние новорожденного по шкале Апгар: Громко кричит, на введение носового катетера – чихает, ЧСС- 110 в минуту, кожные покровы розовые, достаточная двигательная активность.**

- 2) 9 баллов
- 4) 11 баллов
- 1) 8 баллов
- 3) 10 баллов

**Для максимального эффекта при анафилактическом шоке лекарственные препараты вводят**

- Г. г) внутривенно
- А. а) внутримышечно
- Б. б) внутривенно
- В. в) подкожно

**Приоритетной причиной развития сахарного диабета у детей является**

- Г. г) перекармливание
- А. а) эмоциональные стрессы
- Б. б) генетическая предрасположенность
- В. в) вирусные инфекции

**При диарее и рвоте у ребенка медицинская сестра ставит целью ухода**

- В. в) предупредить развитие коллапса
- Г. г) предотвратить развитие гипоксии
- А. а) сохранить массу тела пациента
- Б. б) поддержать водно-электролитный баланс

**Элементы ухода при возникновении потницы исключают**

- Б. б) лечебные ванны с крахмалом
- А. а) воздушные ванны
- В. в) устранение перегревания
- Г. г) гигиенические ванны

**Сестринскими рекомендациями ребенку с пиелонефритом могут быть**

- ограничение объема вводимой жидкости
- тщательный туалет половых органов и
- увеличение объема вводимой жидкости и
- проведение противорецидивной терапии

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с тромбоцитопенией могут быть**

- 4. занятия физкультурой в основной группе
- 1. избегать приема антибиотиков и антиагрегантов и
- 2. санировать очаги хронической инфекции и
- 3. гипоаллергенная диета с включением арахиса, шпината, крапивы, укропа и
- 5. повторные курсы фитотерапии
- 6. солнечная инсоляция

**Установите соответствие физиологического состояния новорожденного с признаками 1. мастит 2. желтуха 3. меконий 4. половой криз а) иктеричность кожи б) зеленый замазкообразный стул в) увеличение молочных желез г) кровянистые выделения из влагалища у девочек**

- 1г, 2а, 3б, 4в
- 1а, 2в, 3б, 4г
- 1в, 2а, 3б, 4г
- 1в, 2а, 3г, 4б

**Установите соответствие между видом стоматита и изменениями слизистой рта 1. молочница 2. афтозный а) грануляции б) белый творожный налет в) бело-желтые**

**бляшки с красным ободком г) кровоизлияния**

1а, 2в

1б, 2в

1г, 2в

1б, 2г

**Установите соответствия между видами диабета и особенностями течения 1.**

**инсулинозависимый 2. инсулинонезависимый а) наследственный фактор б) начало в раннем возрасте в) развитие быстрое г) развитие постепенное д) ожирение е) диетотерапия эффективна ж) инсулинотерапия необходима з) сахароснижающие средства эффективны**

1агвж, 2гбез

1абвж, 2гдез

1абве, 2гджз

1абвз, 2гдеж

**Установите соответствие между заболеванием и сроком изоляции заболевших 1.**

**корь 2. ветряная оспа 3. эпидемический паротит 4. краснуха а) 4 дня с момента высыпания б) 7 дней в) 9 дней г) 10 дней**

1а, 2б, 3в, 4г

1б, 2г, 3в, 4а

1а, 2г, 3в, 4г

1а, 2г, 3в, 4а

**Установите соответствие между видом гельминтоза и возбудителем 1. аскаридоз 2.**

**энтеробиоз а) лямблии б) острицы в) трихинеллы г) аскариды**

1а, 2б

1г, 2б

1г, 2в

1в, 2б

**Планирование сестринского процесса при коклюше в спазмолитическом периоде**

5. контроль за суточным водным балансом

3. туалет кожи, слизистых

1. санация дыхательных путей от слизи и

2. аэротерапия и

4. обучение родителей первой помощи при приступе кашля и

6. обучить ингаляции с протеолитическими ферментами и

7. обеспечить гомогенной пищей

**Соотнесите требования к стажу специалистов, претендующих на присвоение**

**квалификационной категории А) вторая Б) первая В) высшая а)стаж работы по специальности не менее трех лет б)стаж работы по специальности не менее пяти лет в)стаж работы по специальности не менее семи лет**

Аб, Ба, Вв

Ав, Бб, Ва

Аа, Бб, Вв

Ав, Бб, Ва

**Установите соответствие между заболеванием и симптомами 1. дизентерия 2. колиинфекция 3. вирусный гепатит а) волнообразная лихорадка б) иктеричность кожи в) тенезмы**

1б, 2в, 3в

1г, 2а, 3в

1г, 2г, 3в

1г, 2а, 3б

**Соотнесите свойства дезинфицирующих средств и их действие в отношении возбудителей ВБИ А) бактерицидное Б)вирулицидное В)фунгицидное Г) бактериостатическое Д)спороцидное а) уничтожение бактерий б) уничтожение вирусов в) уничтожение грибов г) сдерживание роста микроорганизмов д) уничтожение спор**

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд

Аг, Бб, Вв, Га, Дд

Аа, Бб, Вд, Гг, Дв

Аг, Ба, Вв, Гб, Дд

**Установите соответствие между заболеванием и характером сыпи 1. геморрагический васкулит 2. тромбоцитопения а) асимметричность расположения на туловище, конечностях б) симметричностьвысыпаний на разгибательных поверхностях конечностей**

1а, 2б

1б, 2а

**Установите соответствие между гемодинамикой и пороками 1. пороки с обогащением малого круга кровообращения 2. пороки с обеднением малого круга кровообращения 3. пороки с обеднением большого круга кровообращения а) болезнь Фалло б) коарктация аорты в) дефекты межпредметной и межжелудочковой перегородок**

1а, 2в, 3б

1б, 2а, 3в

1в, 2а, 3б

1а, 2а, 3а

**Установите соответствие между заболеванием и морфологическими изменениями 1. ревматизм 2. системная красная волчанка 3. ревматоидный артрит а) ревматоидные узлы б) гранулёмы Ашоффа-Талалаева в) волчаночные клетки г) клетки Гоше**

1б, 2в, 3а

1а, 2в, 3б

1б, 2а, 3в

1а, 2в, 3а

**Постановка цели и планирование сестринских вмешательств по решению проблем больного ребенка - это этап сестринского процесса**

Б. б) второй

Г. г) четвертый

А. а) первый

В. в) третий

**Установите соответствие между заболеванием и личическими проявлениями 1. истинный круп 2. ложный круп а) начало постепенное б) внезапное начало в) выраженная афония г) звучность голоса д) выраженные катаральные явления е) отсутствие катаральных явлений**

1две, 2бга

1абе, 2вгд

1аве, 2бгд

1авд, 2бге

**Приоритетное действие медицинской сестры при первой стадии белой лихорадки у детей предполагает**

Г. г) тщательное укрытие ребенка

А. а) холодный компресс на голову

Б. б) пузырь со льдом к голове

В. в) банки на грудную клетку

**Причиной срыгивания у грудных детей является**

Б. б) высокий тонус желудка в пилорическом отделе;

В. в) высокое внутрибрюшное давление;

А. а) незрелость эзофагокардиального отдела пищевода;

Д. д) все перечисленное.

Г. г) непостоянные расслабления нижнего пищеводного сфинкса;

**В питании больных анемией ограничивают содержание**

Г. г) жидкости и соли

Б. б) фруктов, овощей

А. а) коровьего молока, злаковых продуктов

В. в) мясных и рыбных блюд

**Особенностью диеты при сахарном диабете является**

Г. г) исключение из рациона мяса и рыбы

А. а) ограничение жидкости, белков и соли

Б. б) ограничение легкоусвояемых углеводов

В. в) исключение из рациона овощей и фруктов

**Ночью у ребенка, больного ОРВИ, появились лающий кашель, осиплость голоса, беспокойство, температура 38,0 С. Неотложное состояние, развившееся у ребенка**

- Б. б) стенозирующий ларинготрахеит
- А. а) гипертермический синдром
- В. в) ларингоспазм
- Г. г) приступ бронхиальной астмы

**Патология, встречающаяся при диспансеризации среди подростков**

- А. а) плоскостопие
- Б. б) привычный вывих
- В. в) вросший ноготь
- Г. г) гемофилия

**Ребенка надо направлять к стоматологу**

- Б. б) к моменту прорезывания первых зубов;
- Г. г) при выявлении разрушения зубов;
- А. а) в возрасте 1 года;
- В. в) при выявлении факторов риска;
- Д. д) при выраженном рахите.

**Установите соответствие между кормлением ребенка и противопоказаниями к нему**

**1. противопоказания к кормлению грудью со стороны ребенка 2.**

**противопоказания к кормлению грудью со стороны матери а) внутричерепные кровоизлияния б) тяжелые формы дыхательных расстройств в) гемолитическая болезнь новорожденных г) глубокая недоношенность д) онкологические заболевания е) острые психические заболевания ж) заболевания почек с почечной недостаточностью**

- 1бвд, 2аже
- 1бвг, 2дже
- 1авд, 2гже
- 1жбг, 2вже

**Проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему острое респираторное заболевание можно разрешить после выздоровления не ранее, чем через**

- В. в) 2 месяца
- Г. г) 3 месяца
- Б. б) 1 месяц
- А. а) 2 недели
- Д. д) 3,5 месяца

**К видам предоставляемого ухода относят**

- А. а) самоуход и
- Б. б) взаимоуход и
- В. в) попечительский уход и



- Г. г) профессиональный и
- Д. д) спонсорский

**К физиологическим состояниям новорожденных относят**

- Д. Д) цианоз
- В. В) везикулопустулез
- А. А) мочекишный инфаркт и
- Б. Б) желтуха и
- Г. Г) гипертермия и
- Е. Е) эритема

**Назовите элементы развития сыпи при ветряной оспе**

1. везикула и
2. папула и
3. макула и
4. корочка и
5. рубчик

**К сестринским вмешательствам относят**

- Г) правомерные
- Б) обязательные
- А) независимые и
- В) зависимые и
- Д) взаимозависимые

**Сестринские вмешательства при одышечно-цианотическом приступе у ребенка**

2. положить ребенка на жесткое покрытие
1. не менять вынужденного положения и
3. освободить от стесняющей одежды и
5. провести оксигенотерапию
4. ввести дигоксин

**Установите соответствие характера кашля при пневмонии 1. пневмония у новорожденных 2. пневмония у старших детей а) лающий б) влажный в) приступообразный г) пена у рта без кашля**

- 1а, 2б
- 1г, 2б
- 1в, 2б
- 1г, 2а

**При организации обучения пациента медсестре необходимо определить**

- Д) продолжительность сна
- Г) частоту пульса и дыхания

- А) время и место занятий и
- Б) содержание занятий и
- В) цели и ожидаемый результат

**Сестринскими рекомендациями ребенку с сахарным диабетом могут быть**

- 1. обучаться в школе диабетиков и
- 3. добиться сбалансированной диеты и
- 5. выработать объем физических нагрузок и
- 6. научиться делать экспресс-анализ крови и мочи на сахар
- 2. заниматься физкультурой в основной группе
- 4. ввести дополнительные приемы пищи между основными кормлениями

**Установите соответствие между заболеванием и сроком карантина 1. корь 2. ветряная оспа 3. эпидемический паротит 4. краснуха а) не накладывают б) 7 дней в) 21 день г) 35 дней**

- 1в, 2г, 3б, 4а
- 1в, 2в, 3г, 4а
- 1в, 2в, 3в, 4а
- 1в, 2б, 3б, 4а

**Установите соответствие между болезнью и источниками инфекции 1. менингококковая инфекция 2. туберкулез а) молоко коров, больных туберкулезом б) носители, в) больные менингитом, г) больной туберкулезом д) постельное белье больного туберкулезом**

- 1бв, 2абгд
- 1ав, 2вбгд
- 1бг, 2авгд
- 1бд, 2абгв

**Установите соответствие между формами дискинезий желчного пузыря и симптомами 1. гипертоническая 2. гипотоническая а) ноющие тупые боли в правом подреберье б) приступообразные, кратковременные боли в правом подреберье в) утомляемость, раздражительность, потливость г) горечь во рту, отрыжка, тошнота, отвращение к жирной пище**

- 1ав, 2аг
- 1бг, 2ав
- 1бв, 2аг
- 1гв, 2бг

**Установите между видами осложнений при сахарном диабете и заболеваниями, симптомами 1. специфические 2. неспецифические а) диабетическая ангиопатия б) синдром Мориакса в) комы г) гнойные инфекции кожи д) пиелонефрит е) стоматит, кандидоз ж) вульвит, вульвовагинит**

- 1абж, 2гдев
- 1агв, 2бдеж

1абв, 2гдеж

1абе, 2гдвж

**Установите соответствие между формами тонзилита и его признаками 1. гипертрофическая 2. атрофическая а) миндалины сморщены, плотные, бугристые б) миндалины гиперемированы, в лакунах пробки**

1а, 2б

1б, 2а

**Установите соответствие между стадиями язвенной болезни желудка и клинко-эндоскопическими данными 1. I 2. II 3. III 4. IV а) заживление дефекта слизистой оболочки б) "свежая язва" в) клинико-эндоскопическая ремиссия г) начало эпителизации язвенного дефекта**

1б, 2г, 3в, 4а

1б, 2г, 3а, 4в

1г, 2б, 3а, 4в

1а, 2а, 3а, 4в

**Установите соответствие заболевание - экзантема 1. скарлатина 2. корь 3. ветряная оспа 4. брюшной тиф а) пятнисто-папулёзная б) везикулярная в) мелкоточечная г) анулярная д) розеолёзная**

1д, 2а, 3б, 4в

1в, 2а, 3б, 4д

1в, 2б, 3а, 4д

1б, 2а, 3в, 4д

**Основопологающими понятиями теории сестринского дела, определяющими суть сестринской практики, являются**

А. а) здоровье и

Б. б) пациент, личность и

В. в) сестринское дело и

Д. д) окружающая среда и общество

Г. г) диагностика и лечение

**Установите соответствие между формами тонзилита и клиническими проявлениями 1. компенсированная 2. субкомпенсированная 3. декомпенсированная а) боли в сердце, суставах б) боли в сердце, субфебрильная температура к вечеру в) покраснение миндалин**

1б, 2б, 3б

1в, 2в, 3б

1в, 2а, 3б

1б, 2в, 3а

**Специальные занятия гимнастикой и массаж здоровому ребенку необходимо проводить**

- А. а) с рождения
- В. в) с полутора месяцев
- Б. б) не нужны
- Г. г) с 2-х месяцев
- Д. д) с 6 месяцев

**Наиболее частой клинической формой пищевой аллергии у детей раннего возраста является:**

- А. а) атопический дерматит;
- Б. б) бронхообструктивный синдром;
- В. в) нефротический синдром;
- Г. г) гастроинтестинальный синдром;
- Д. д) крапивница и отек Квинке.

**Установите соответствие между видами прикорма и продуктами 1. прикорм 2. докорм а) молоко б) овощные пюре, каши**

1б, 2а

1а, 2б

**Для непереносимости фруктозы верны перечисленные положения, кроме**

- А. а) заболевание связано с дефектом энзима печени;
- Б. б) сопровождается гипергликемией;
- В. в) введение фруктозы вызывает быстрое ухудшение состояния;
- Г. г) больной отстает в психомоторном развитии;
- Д. д) лечебный эффект от применения лечебных смесей, не содержащих фруктозу.

**Механизм передачи инфекции при остром респираторном заболевании**

- Б. б) контактно-бытовой
- А. а) воздушно-капельный
- В. в) пищевой
- Г. г) гематогенный

**Наиболее часто ревматизм развивается у детей в возрасте**

- Г. г) 15 – 17 лет
- А. а) 1 - 3 лет
- В. в) 7 – 15 лет
- Б. б) 3 – 6 лет

**Появление у детей одновременно с гематурией гипертензии, отеков характерно для**

- Г. г) нефроптоза
- Б. б) цистита
- А. а) гломерулонефрита
- В. в) пиелонефрита

**Злокачественное заболевание кроветворной ткани с первичной локализацией патологического процесса в костном мозге называется**

- А. а) гемофилия
- В. в) лейкоз
- Б. б) тромбоцитопеническая пурпура
- Г. г) геморрагический васкулит

**При каком хроническом заболевании уха показано наблюдение больного 4 раза в год**

- В. в) рецидивирующий отит
- Г. г) кохлеарный неврит
- Б. б) хронический мезотимпанит
- А. а) хронический эптитимпанит

**Медицинская сестра поступит правильно, если оказание неотложной помощи новорожденному с асфиксией начнет с**

- Б. б) проведения ИВЛ
- Г. г) непрямого массажа сердца
- А. а) проведения оксигенотерапии
- В. в) отсасывания слизи из верхних дыхательных путей

**Сестринскими рекомендациями ребенку с сахарным диабетом могут быть**

- Г. 4. ввести дополнительные приемы пищи между основными кормлениями
- Б. 2. заниматься физкультурой в основной группе
- А. 1. обучаться в школе диабетиков и
- В. 3. добиться сбалансированной диеты и
- Д. 5. выработать объем физических нагрузок и
- Е. 6. научиться делать экспресс-анализ крови и мочи на сахар

**Установите соответствие между типом бронхиальной астмы и мерами профилактики 1. первичная 2. вторичная а) предупредить приступ б) предупредить заболевание в) предотвратить осложнение г) предотвратить астматический статус**

- 1б, 2авг
- 1а, 2бвг
- 1г, 2абв
- 1в, 2абг

**Установите соответствие между манипуляцией и средствами ухода за новорожденным 1. туалет пупочной ранки 2. туалет кожных складок 3. туалет глаз а) стерильное растительное масло б) 3% р-р нитрата серебра в) 3% р-р перекиси водорода г) 70% р-р этилового спирта д) кипяченая вода е) 96% р-р этилового спирта**

- 1бг, 2а, 3е
- 1вг, 2а, 3д
- 1вг, 2е, 3д

1вг, 2а, зб

**Установите соответствие между заболеванием и сроком изоляции заболевших 1. дифтерия 2. скарлатина 3. менингококковая инфекция 4. коклюш а) до отрицательного бактериологического исследования б) 4 дня в) 7 дней г) 10-22 дня**

1а, 2г, 3а, 4а

1б, 2г, 3в, 4а

1г, 2в, 3а, 4а

1а, 2г, 3а, 4б

**Установите соответствие между заболеванием и принципами ухода и тактики 1. конъюнктивит 2. молочница 3. пузырчатка а) туалет глаз б) использовать стерильные пеленки в) изоляция в ДИО г) кипячение сосок д) обработка бутылок**

1а, 2гд, 3бв

1б, 2гд, 3ав

1а, 2гв, 3бд

1г, 2ад, 3бв

**Установите соответствие между заболеванием и видом лабораторной диагностики 1. дизентерия 2. колиинфекция 3. вирусный гепатит а) биохимический анализ крови б) копрологический анализ в) бактериологическое исследование кала**

1бв, 2бв, 3а

1ав, 2бв, 3в

1ав, 2бв, 3б

1ав, 2ав, 3в

**Установите соответствие между вакциной и способом введения 1. БЦЖ 2. АКДС 3. ОПВ 4. ЖКВ 5. ЖПВ 6. гепатит В а) внутрикожно б) подкожно в) внутримышечнор г) через рот д) внутривенно е) скарификация**

1в, 2б, 3а, 4б, 5б, 6в

1а, 2в, 3г, 4б, 5б, 6в

1а, 2в, 3г, 4б, 5а, 6г

1а, 2в, 3г, 4б, 5а, 6б

**Установите соответствие между формой инфекции и симптомами 1. менингококкемия 2. менингит 3. назофарингит а) заложенность носа б) геморрагическая сыпь в) неукротимая рвота г) гиперестезия кожи д) судороги**

1ав, 2бгд, 3в

1ав, 2бгд, 3а

1бв, 2вгд, 3а

1бв, 2вгд, 3г

**Соотнесите мероприятия по предупреждению ВБИ с комплексом мер по их проведению А) деконтаминация Б) дезинфекция В) дератизация Г) стерилизация Д) предстерилизационная очистка а) уничтожение микроорганизмов в целях**

обеспечения инфекционной безопасности, включает дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию б) уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически значимых объектах больничной среды в) уничтожение грызунов- переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний г) уничтожение всех видов микробной флоры (в том числе споровых микроорганизмов) д) удаление с изделий медицинского назначения биологических жидкостей, лекарственных средств, жировых загрязнений

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд

Ад, Бб, Вв, Гг, Да

Аа, Бд, Вв, Гг, Дб

Аб, Ба, Вв, Гг, Дд

**Планирование сестринского вмешательства включает**

1. определение потребности в уходе и
2. определение приоритетности проблем и
3. определение целей и
4. написание плана действий и
5. согласование с пациентом

**Проблемы, возникающие у медицинских сестер, при выполнении сестринских вмешательств**

- А) вмешательства не способствуют достижению целей и
- Б) неправильное выполнение сестринских вмешательств и
- В) недостаточная или неправильная оценка реакции пациента
- Г) никаких проблем

**Наиболее частые проблемы семьи и ребенка, подлежащего хирургическому лечению**

- 5. комфортное состояние после операции
- 1. потребность в знаниях о процедурах до и после операции и
- 2. тревога, связанная с разлукой при госпитализации и
- 3. риск осложнений из-за ограничения подвижности и
- 4. вероятность задержки мочи в результате анестезии, страха, боли

**Проблемы, возникающие у медсестер при оценке предоставленного ухода**

- В) неточные или несоответствующие выводы
- А) не сделана оценка и
- Б) несоизмеримые цели и
- Г) неправильное использование результатов оценки

**Установите соответствие между документами и формой**  
1. контрольная карта диспансерного учета  
2. журнал учета инфекционных заболеваний  
3. рецептурные бланки  
4. талон амбулаторного пациента  
5. экстренные извещения об

инфекционном заболевании а) 058/у б) 107/у и 148-1/у-08 в) 025/у-96р г) 060/у д) 030/у

1а, 2д, 3б, 4в, 5г

1д, 2г, 3б, 4в, 5а

1в, 2г, 3б, 4д, 5а

1б, 2г, 3д, 4в, 5а

### **Лабораторная диагностика фенилкетонурии**

Г. г) исследование крови на церуллооплазмин;

А. а) проба на ацетон;

Б. б) проба с треххлористым железом;

В. в) исследование белковых фракций

Д. д) содержание креатинфосфокиназы в крови и моче.

### **Диагноз муковисцидоза подтверждает**

А. а) рентгенограмма грудной клетки;

Д. д) определение электролитов пота.

Б. б) исследование костного мозга;

В. в) биопсия тонкого кишечника;

Г. г) микроскопия осадка мочи;

**Установите соответствие между тапами и видами пороков 1. белые 2. синие а) ДМПП б) триада Фалло в) ДМЖП г) ОАП (баталов) д) полная трансозиозия сосудов**

1абг, 2вд

1бвг, 2ад

1авг, 2бд

1авд, 2бг

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с тромбоцитопенией могут быть**

Е. 6. солнечная инсоляция

Г. 4. занятия физкультурой в основной группе

А. 1. избегать приема антибиотиков и антиагрегантов и

Б. 2. санировать очаги хронической инфекции и

В. 3. гипоаллергенная диета с включением арахиса, шпината, крапивы, укропа и

Д. 5. повторные курсы фитотерапии

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с острым гломерулонефритом после выписки из стационара могут быть**

Е. 6. проводить плановую иммунопрофилактику

Б. 2. диета с увеличением животного белка, жира

А. 1. поощрять ребенка к самоконтролю, увеличению активности и

В. 3. исключение калий-содержащих продуктов из диеты и

Г. 4. контроль за поддерживающей терапией и

Д. 5. научиться приемам психологической поддержки



**Предположите заболевание. У ребёнка 7 лет поднялась температура 39,2 С, осиплость голоса, лающий мучительный кашель. В зеве на фоне гиперемии на миндалинах, на нёбных дужках, язычке задней стенке глотки фибриновые плёнки. При пальпации определяются болезненные и увеличенные подчелюстные лимфоузлы.**

- г) скарлатина
- а) ОРВИ. Ларингоспазм
- б) дифтерия
- в) ангина

**Цели сестринских вмешательств должны быть**

- А) любые
- Б) конкретные и
- В) измеряемые и проверяемые и
- Г) ориентированы на пациента и
- Д) с указанием срока их достижения

**При организации обучения пациента медсестре необходимо определить**

- А) время и место занятий и
- Б) содержание занятий и
- В) цели и ожидаемый результат
- Г) частоту пульса и дыхания
- Д) продолжительность сна

**Пути распространения острого полиомиелита являются**

- А. а) воздушно-капельный;
- Г. г) воздушно-капельный и алиментарный;
- Б. б) алиментарный;
- В. в) трансмиссивный;
- Д. д) все перечисленные.

**Установите соответствие между возрастом и числом дыханий у детей в минуту**  
**1. новорожденный 2. 5 лет 3. 14 лет а) 16-18 б) 20-25 в) 30-35 г) 40-60 д) 60-80 е) 80-100**

- 1в, 2б, 3а
- 1г, 2б, 3а
- 1д, 2б, 3е
- 1д, 2б, 3а

**Установите соответствие между возрастом ребенка и суточным объемом пищи**  
**1. от 2х до 6 недель 2. от 6 недель до 4 месяцев 3 от 5 до 6 месяцев 4. от 7 до 9 месяцев а) 1/8 б) 1/7 в) 1/6 г) 1/5**

- 1г, 2б, 3в, 4а
- 1б, 2в, 3б, 4г
- 1г, 2в, 3а, 4а

1г, 2в, 3б, 4а

**Тактика медицинской сестры при приступе бронхиальной астмы у ребенка**

- Б) парентеральное введение бронхолитиков
- А) создать психоэмоциональный комфорт и
- В) одно-двухкратная ингаляция бронхолитиков и
- Д) вызвать врача

**Установите соответствие между заболеванием и его симптомами 1. потница 2. опрелости 3. псевдофурункулез а) мокнущие эрозии б) пузырьки с просыпанное зерно с прозрачным содержимым в) плотные инфильтраты г) страдает общее состояние д) яркая гиперимия кожи**

1б, 2ад, 3вг

1г, 2ад, 3вг

1б, 2гд, 3вг

1в, 2ад, 3бг

**Выраженным цианозом сразу после рождения проявляется**

- А. а) дефект межжелудочковой перегородки;
- В. в) транспозиция магистральных сосудов;
- Б. б) тетрада Фалло;
- Г. г) открытый артериальный проток;
- Д. д) дефект межпредсердной перегородки.

**Тактика медицинской сестры при угрозе стеноза гортани у ребенка вне лечебного учреждения включает**

- Б. б) срочную госпитализацию
- А. а) направление в поликлинику
- В. в) проведение оксигенотерапии
- Г. г) назначение физиотерапевтических процедур

**Количество мочеиспусканий у новорожденных детей в сутки составляет**

- Г. г) 30 – 40 раз
- А. а) 10 – 20 раз
- Б. б) 20 - 25 раз
- В. в) 7 – 15 раз

**Типичной локализацией сыпи при краснухе является**

- В. в) поэтапное распространение сыпи на лице, туловище, конечностях;
- Г. г) туловище, конечности с концентрацией элементов на стопах, кистях и вокруг суставов;
- Б. б) боковые поверхности туловища, внутренняя поверхность бедер, сгибательные поверхности конечностей;
- А. а) лицо, туловище, разгибательные поверхности конечностей, ягодицы;
- Д. д) типичная локализация не характерна.

### **При анафилактическом шоке ребенка надо уложить**

- А. а) на живот
- В. в) на бок с приподнятыми ногами
- Б. б) на спину
- Г. г) с приподнятым изголовьем

### **Основные принципы охраны здоровья граждан**

- А. а) государственная гарантия и
- Б. б) приоритетность профилактических мер и
- В. в) доступность медико-социальной помощи и
- Д. д) ответственность государственной власти и учреждений
- Г. г) социальная защита в случае утраты здоровья

### **Проблемы, возникающие у медицинских сестер, при выполнении сестринских вмешательств**

- Г) никаких проблем
- А) вмешательства не способствуют достижению целей и
- Б) неправильное выполнение сестринских вмешательств и
- В) недостаточная или неправильная оценка реакции пациента

### **тактика медицинской сестры при критическом снижении температуры тела**

- 3. растереть кожу 40 % р-ром спирта
- 1. согреть пациента и
- 2. проводить частую смену белья и
- 4. напоить теплым чаем и
- 6. проводить мониторинг жизненно-важных функций организма
- 5. обеспечить высококалорийным питанием

### **Сестринские вмешательства при одышечно-цианотическом приступе у ребенка**

- 2. положить ребенка на жесткое покрытие
- 1. не менять вынужденного положения и
- 3. освободить от стесняющей одежды и
- 5. провести оксигенотерапию
- 4. ввести дигоксин

### **Установите соответствие между заболеванием и принципами ухода и лечения 1.**

**ларингит 2. отит 3. ангина 4. ринит а) щелочные ингаляции б) микроклимат в палате в) согревающий полуспиртовой компресс г) полоскание р-ром фурациллина 1:5000 д) диета механически, химически, термически щадящая е) р-р адреналина 1:1000 в виде капель**

- 1аб, 2в, 3гд, 4 е
- 1аб, 2е, 3гд, 4в
- 1ав, 2б, 3гд, 4 е
- 1ае, 2в, 3гд, 4 б

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с энтеробиозом могут быть**

- б. добавить в диету острые блюда
2. обеспечить обильным питьем
1. проглаживание нательного и постельного белья и
3. спать укладывать ребенка в тугих трусиках и
4. коротко стричь ногти и
5. тщательный туалет промежности

**Установите соответствие между видом гельминтоза и посудой для исследований 1. аскаридоз 2. энтеробиоз а) стерильная пробирка со средой б) чистая стеклянная посуда в) чашка Петри с питательной средой г) предметные стекла, скотч, шпатель**

- 1г, 2в  
1а, 2г  
1б, 2г  
1б, 2в

**Установите соответствие между заболеванием и вакциной для профилактики 1. корь 2. дифтерия 3. коклюш 4. туберкулез 5. полиомиелит 6. эпидемический паротит а) БЦЖ б) АКДС в) АДС-М г) ОПВ д) ЖКВ е) ЖПВ**

- 1а, 2бв, 3г, 4а, 5в, 6г  
1д, 2бв, 3б, 4а, 5г, 6е

**Установите соответствие между формами бронхита и симптомами 1. острая (простая) 2. обструктивная 3. бронхиолит а) удлиненный "свистящий выдох", хрипы б) сухой приступообразный кашель, усиливающийся ночью в) учащенное шумное "пытящее" дыхание**

- 1б, 2в, 3а  
1а, 2а, 3а  
1в, 2а, 3б  
1б, 2а, 3в

**Установите соответствие между документами и формой 1. история развития ребенка 2. журнал учета профилактических прививок 3. карта профилактических прививок 4. индивидуальная карта ребенка а) ф № 026/у б) ф № 112/у в) ф № 063/у г) ф № 064/у**

- 1а, 2б, 3в, 4а  
1б, 2г, 3в, 4а  
1б, 2в, 3г, 4а  
1а, 2г, 3в, 4а

**Установите соответствие между заболеванием и клиническими проявлениями 1. потница 2. опрелости 3. склеродема 4. омфалит а) синюшные очаги, уплотнения на голених и стопах б) воспаление кожи и подкожной клетчатки в области пупка в) мелкоточечная красная сыпь на туловище и шее г) краснота и мокнутие в паховых**

**складках**

1в, 2г, 3а, 4б

1в, 2г, 3а, 4а

1а, 2г, 3в, 4б

1б, 2г, 3в, 4б

**Предположите заболевание. У ребёнка 7 лет поднялась температура 39,2 С, осиплость голоса, лающий мучительный кашель. В зеве на фоне гиперемии на миндалинах, на нёбных дужках, язычке задней стенке глотки фибриновые плёнки. При пальпации определяются болезненные и увеличенные подчелюстные лимфоузлы.**

а) ОРВИ. Ларингоспазм

б) дифтерия

в) ангина

г) скарлатина

**Установите соответствие заболевание - экзантема 1. менингококковая инфекция 2. скарлатина 3. корь а) пятнисто-папулёзная б) везикулярная в) мелкоточечная г) геморрагическая д) розеолёзная**

1г, 2в, 3а

1г, 2б, 3а

1г, 2в, 3б

1б, 2в, 3а

**Установите соответствие между исследованием и его сущностью 1. проба по Шалкову 2. люмбальная пункция 3. реакция Грегерсеан 4. метод Ли-Уайта а) исследование спинномозговой жидкости б) определение частоты сердечных сокращений и АД у пациента в состоянии покоя в) кал на скрытую кровь г) определение свертывания крови**

1б, 2г, 3г, 4г

1а, 2б, 3в, 4г

1б, 2а, 3в, 4г

1б, 2а, 3а, 4а

**Для бронхиальной астмы не характерен признак**

А. а) приступы бронхоспазма с экспираторной одышкой;

Б. б) повышение хлоридов в поте и моче;

В. в) гиперпродукция вязкой прозрачной мокроты;

Г. г) рассеянные непостоянные сухие, свистящие хрипы;

Д. д) жесткое дыхание.

**Этиологическим лечением острого герпетического стоматита является**

А. а) полоскание полости рта растворами антисептиков;

Б. б) противовирусное лечение;

В. в) диета;

- Г. г) антибактериальные препараты;
- Д. д) жаропонижающие средства.

**У ребенка 3-х лет 6 часов назад возникли острые, приступообразные боли в животе. Стул был кашицеобразный с кровью 1 раз, рвота 1 раз, температура 36,8 С. В первую очередь необходимо исключить**

- А. а) кишечную инфекцию;
- Б. б) инвагинацию;
- В. в) острый аппендицит;
- Г. г) аденовирусную инфекцию;
- Д. д) кишечное кровотечение.

**Установите соответствие между элементами крови и функцией 1. эритроциты 2. лейкоциты 3. тромбоциты а) гемостаз б) транспорт кислорода в) иммунная**

- 1б, 2а, 3в
- 1в, 2б, 3а
- 1а, 2в, 3б
- 1б, 2в, 3а

**Сестринскими рекомендациями по диетотерапии ребенку с пиелонефритом могут быть**

- В. 3. ограничение белка в диете
- Б. 2. ограничение жидкости
- А. 1. ограничение поваренной соли и
- Г. 4. прием минеральной воды и
- Д. 5. увеличение молочно-кислых продуктов

**Оцените состояние новорожденного по шкале Апгар: Громко кричит, на введение носового катетера – гримаса, ЧСС- 105 в минуту, акроцианоз, мышечный тонус снижен – наблюдается слабое сгибание конечностей.**

- 2) 9 баллов
- 3) 8 баллов
- 1) 10 баллов
- 4) 7 баллов

**Назовите периоды развития инфекционного заболевания**

- 1. продромальный и
- 2. разгара и
- 3. инкубационный и
- 4. реконвалесценции

**Установите соответствие между периодами пневмонии и симптомами 1. начальный 2. разгара 3. выздоровления а) сухой кашель б) чихание в) пенистые выделения из рта г) улучшение общего состояния д) исчезновение клинических**

**симптомов е) хрипы влажные, крептирующие**

1абв, 2ве, 3гд

1агв, 2бе, 3гд

1абе, 2вг, 3гв

1абг, 2вд, 3ге

**Установите соответствие между диабетической комой и помощью 1.**

**кетоацидотическая 2. гипогликемическая а) введение инсулина б) внутривенное введение глюкозы в) противосудорожные средства г) сердечные гликозиды**

1абв, 2гв

1авг, 2гв

1абг, 2бв

1вбг, 2ав

**Соотнесите требования к подготовке специалистов, претендующих на присвоение квалификационной категории А) вторая Б) первая В) высшая а) должен иметь теоретическую подготовку и практические навыки в области осуществляемой профессиональной деятельности, использовать современные методы диагностики, профилактики, лечения, реабилитации, владеть навыками анализа количественных и качественных показателей работы б) должен иметь теоретическую подготовку и практические навыки в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин, использовать современные методы диагностики, профилактики, лечения, реабилитации, уметь квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности в) должен иметь высокую теоретическую подготовку и практические навыки в области осуществляемой профессиональной деятельности, знать смежные дисциплины, использовать современные методы диагностики, профилактики, лечения, реабилитации, ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности**

Аа, Бв, Вб

Аб, Ба, Вв

Аб, Бв, Ва

Аа, Бб, Вв

**Установите соответствие между двигательными умениями и возрастом ребенка 1.**

**держит головку 2. сидит 3. ползает 4. ходит а) 7 месяцев б) 10-12 месяцев в) 6 месяцев г) 2 месяца**

1а, 2г, 3а, 4б

1г, 2в, 3а, 4б

1г, 2б, 3а, 4в

1в, 2г, 3а, 4а

**Установите соответствие между синдромами при родовых травмах и симптомами 1.**

**астеноневротический 2. гипертензионный 3. гидроцефальный 4. синдром**

очагового поражения мозга 5. гипервозбудимости синдром 6. синдром угнетения  
а) тремор рук и подбородка, пронзительный крик б) вялость, гипотония, снижение рефлексов в) нистагм, птоз, асимметрия лица г) повышенная возбудимость, двигательные нарушения д) нарастание размеров головы, венозная сеть на голове е) повышенное внутричерепное давление, возбуждение

1е, 2г, 3д, 4в, 5а, 6д

1г, 2е, 3д, 4в, 5а, 6б

Установите соответствие между диатезами и клиническими проявлениями 1. экссудативно-катаральный 2. лимфатико-гипопластический 3. нервно-артрический  
а) повышенная возбудимость, плохой аппетит, головные боли б) зуд, мокнущая экзема, гнейс на бровях и волосистой части головы в) увеличение лимфатических узлов, большие рыхлые миндалины

1а, 2б, 3в

1в, 2б, 3а

1а, 2в, 3а

1б, 2в, 3а

**Редко вызывает пищевую аллергию мука**

А. а) гречневая;

Д. д) соевая.

Б. б) рисовая;

В. в) овсяная;

Г. г) манная;

**Сестринский процесс включает следующие этапы**

А. а) сестринское обследование и

Б. б) выявление проблем и потребности в уходе и

В. в) планирование и выполнение сестринских вмешательств и

Г. г) оценка эффективности сестринских вмешательств и

Д. д) лечение заболеваний

**Вторичная антибактериальная профилактика ревматизма проводится**

Б. б) бициллином-5

А. а) пенициллином

В. в) вольтареном

Г. г) гентамицином

**При лечении свободной гипербилирубинемии у новорожденных детей наиболее эффективен метод**

Б. б) лечение фенобарбиталом;

А. а) фототерапия;

В. в) инфузионная терапия;

Г. г) комбинация перечисленных методов;



Д. д) энтеросорбенты.

**Причиной относительно низкого АД у детей является**

- А. а) малый объем левого желудочка, широкие артерии
- Б. б) малый объем левого желудочка, узкие артерии
- В. в) большой объем левого желудочка, широкие артерии
- Г. г) большой объем левого желудочка, узкие артерии

**В клинической картине ботулизма обычно не наблюдается**

- Г. г) гепатолиенального синдрома
- А. а) расстройства зрения (туман перед глазами, двоение)
- Б. б) нарушение глотания
- В. в) расстройство дыхания
- Д. д) миастении

**Неотложной помощью при опухоли глазницы является**

- А. а) применение антибиотиков, сульфаниламидов
- Г. г) амбулаторное лечение
- Б. б) срочная госпитализация
- В. в) применение антибиотиков

**Миграционная фаза аскаридоза протекает под маской**

- В. в) дизурических расстройств
- Г. г) диспепсических расстройств
- Б. б) неврологических расстройств
- А. а) острого респираторного заболевания

**Установите соответствие между потенциальными проблемами ребенка и причинами, связанными с нарушением питания**  
1. анемия 2. гипотрофия 3. ожирение 4. гиповитаминоз  
а) недостаточное употребление свежих овощей и фруктов  
б) увеличение калорийности пищи  
в) уменьшение калорийности пищи  
г) недостаток желездефицитных продуктов питания

1аг, 2а, 3б, 4в

1аб, 2г, 3б, 4а

1аг, 2в, 3б, 4а

1аб, 2в, 3б, 4г

**1. стенозирующий ларингит 2. пневмония а) грубый голос б) "бочкообразная" грудная клетка в) влажный кашель г) носогубный цианоз**

1аг, 2вг

1бг, 2ва

1ав, 2вб

1вг, 2аг

**сестринскими рекомендациями родителям по уходу за ребенком с врожденным**

**пороком сердца могут быть**

обеспечить обильным питьем

кормить часто, малыми порциями и

избегать гиперопеки и

научиться оказывать помощь при одышно-цианотических приступах

информировать о преимуществах лечения одного врача над другим

**Установите соответствие периода развития с приоритетными факторами риска**

**1.внутриутробный 2. интранатальный 3. новорожденности 4.грудной 5.ясельный 6.**

**дошкольный 7. младший школьный 8. пубертатный а) эндокринные заболевания**

**б) родовые травмы в) синдром дыхательных расстройств г) рахит д) детские**

**инфекции е) нарушение осанки ж) тератогенные з) травматизм**

1и, 2б, 3б, 4г, 5д, 6дз, 7е, 8а

1а, 2б, 3б, 4г, 5б, 6дз, 7е, 8д

**Установите соответствие между типом анемии и симптомами 1. железодефицитная**

**2. гемолитическая а) иктеричность кожи б) бледность кожи в) гипотония мышц г)**

**снижение гемоглобина крови**

1бвг, 2аб

1абв, 2бг

1бвг, 2аг

1бвг, 2вг

**Установите соответствие между заболеванием и профилактическими**

**мероприятиями 1. гепатит А 2. гепатит В 3. гепатит С а) контроль за личной гигиеной**

**б) использование одноразового инструментария в) вакцинация г) проведение**

**текущей дезинфекции д) тестирование донорской крови е) механическая**

**контрацепция**

1б, 2авгде, 3бвгде

1а, 2бвгде, 3бвгде

**тактика медицинской сестры при критическом снижении температуры тела 1.**

**согреть пациента 2. проводить частую смену белья 3. растереть кожу 40 % р-ром**

**спирта 4. напоить теплым чаем 5. обеспечить высококалорийным питанием 6.**

**проводить мониторинг жизненно-важных функций организма**

2,3,4,5

1,2,4,5

1,2,4,6

1,2,3,4

**Установите соответствие между возрастом ребенка и критериями 1. 2-3 года 2. 3-4**

**года 3. 4-5 лет 4. 5-6 лет 5. 6-7 лет а) смена малых зубов б) период первого**

**вытягивания детей в) период "почемучек" у детей г) ребенок самостоятельно**

**одевается д) четкое признание слов**

1г, 2д, 3в, 4а, 5б

1а, 2г, 3в, 4а, 5б

1г, 2д, 3в, 4б, 5а

1а, 2д, 3в, 4г, 5б

**Предположите заболевание. У ребёнка 14 лет поднялась температура 39,8 С, озноб, сильная головная боль, многократная рвота, не приносящая облегчения. При осмотре кожные покровы бледные с «мраморным» рисунком, наблюдается ригидность затылочных мышц. АД 90/60мм.рт.ст. РS- 140 в мин.**

б) дифтерия

в) лептоспироз

а) ОРВИ. Грипп

г) менингит

**Какова приоритетная цель ухода за ребенком с обструктивным бронхитом**

А. а) нормализация температуры тела

В. в) уменьшение одышки

Б. б) восстановление аппетита

Г. г) уменьшение головной боли

**Вакцинация БЦЖ противопоказана**

В. в) при наличии активного туберкулеза у других детей в семье;

А. а) при врожденных ферментопатиях;

Г. г) во всех указанных случаях;

Б. б) при иммунодефицитных состояниях;

Д. д) при агаммаглобулинемии Bruton.

**Внебольничную пневмонию у детей в возрасте старше 5 лет чаще вызывают**

Г. г) грибы;

А. а) стафилококки;

В. в) пневмококки;

Б. б) пневмоцисты;

Д. д) микоплазмы.

**Количество водного раствора лекарственного средства в 1 чайной ложке**

Г. г) 15мл

А. а) 1мл

Б. б) 5мл

В. в) 10мл

**Планирование сестринского процесса при коклюше в спазмолитическом периоде**

1. санация дыхательных путей от слизи и

2. аэротерапия и

4. обучение родителей помощи при приступе спазматического кашля и

6. обучить ингаляции с протеолитическими ферментами и

7. обеспечить гомогенной пищей

3. туалет кожи, слизистых
5. контроль за суточным водным балансом

**Установите соответствие между видом вскармливания и характером стула новорожденного 1. естественное 2. искусственное а) темно-коричневого цвета с гнилостным запахом б) ярко-желтого цвета с кислым запахом**

1а, 2б

1б, 2а

**Программа реабилитации пациента с пиелонефритом включает следующие действия**

1. санация очагов хронической инфекции и
2. контроль за анализами мочи и
3. регулярное наблюдение урологом и
4. поддерживающая терапия уросептиками, фитотерапия

**Перечислите возможные действия медсестры во время приступа бронхиальной астмы**

дать увлажняющий кислород и  
сделать горячие ножные и ручные ванны и  
дать щелочное питье и  
уложить с приподнятым головным концом и  
дать ингалятор

**К функциям сестринского дела относят**

- В. в) лечение заболеваний
- А. а) укрепление здоровья и
- Б. б) профилактика заболеваний и
- Г. г) реабилитация пациентов и
- Д. д) облегчение страданий и уход

**При «белой» гипертермии у детей отмечаются**

- В. в) холодные конечности
- Г. г) гиперемия кожных покровов
- А. а) мраморные кожные покровы
- Б. б) бледные кожные покровы

**Возникновению срыгиваний у новорожденных детей, находящихся на грудном вскармливании способствуют**

- А. а) короткий пищевод;
- Г. г) все перечисленные;
- Б. б) недостаточное развитие кардиального отдела желудка;
- В. в) относительный гипертонус пилорического отдела желудка;

Д. д) физиологический дефицит ферментов.

**Установите соответствие между заболеванием и сроками карантина 1. гепатит А 2. гепатит В 3. дизентерия а) 7 дней б) 35 дней в) 180 дней**

1б, 2а, 3в

1в, 2б, 3а

1а, 2в, 3б

1б, 2в, 3а

**Соотнесите классы медицинских отходов с требованиями к их сбору А) медотходы класса А Б) медотходы класса Б В) медотходы класса В Г) медотходы класса Г Д) медотходы класса Д а) сбор осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты любого цвета, за исключением желтого и красного б) сбор осуществляется в одноразовую мягкую или твердую упаковку желтого цвета в) сбор осуществляется в одноразовую мягкую или твердую упаковку красного цвета г) сбор осуществляется в маркированные емкости в зависимости от класса опасности отходов д) сбор осуществляется в соответствии с требованиями к обращению с радиоактивными веществами**

Аа, Бб, Вд, Гг, Дв

Аа, Бб, Вв, Гд, Дг

Аб, Бв, Вв, Гг, Дд

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд

**Цели сестринских вмешательств должны быть**

А) любые

Б) конкретные и

В) измеряемые и проверяемые и

Г) ориентированы на пациента и

Д) с указанием срока их достижения

**Установите правильную последовательность появления симптомов столбняка а) скованность туловища и конечностей б) затруднение при сосании и глотании в) опистотонус г) тризм жевательных мышц д) судороги мимических мышц е) ригидность затылочных мышц**

1б, 2г, 3д, 4е, 5а, 6в

1е, 2г, 3д, 4г, 5б, 6в

**Уровень резистентности организма ребенка определяется**

А. а) кратностью острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру

Б. б) кратностью острых респираторных заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру

В. в) тяжестью острых заболеваний

Г. г) длительностью и тяжестью заболеваний

Д. д) числом обострений хронических заболеваний

**При контакте с детьми, инвазированными гельминтами, возможно заражение**

- А. а) аскаридозом
- Г. г) энтеробиозом
- Б. б) трихинеллёзом
- В. в) трихоцефаллёзом

**При хроническом гепатите ребенку назначают диету № 5 с**

- Г. г) ограничением растительного белка
- Б. б) дополнительным введением растительного белка
- А. а) дополнительным введением животного белка
- В. в) ограничением животного белка

**Установите соответствие периода детского возраста с продолжительностью и возрастом 1. интранатальный 2. новорожденности 3. внутриутробный 4. грудной 5. дошкольный 6. младший школьный 7. подростковый 8. юношеский 9. дошкольный а) 38-40 недель б) от начала родовой деятельности до рождения ребенка в) 28 дней г) 1-12 месяцев д) 1-3 года е) 3-7 лет ж) 7-11 лет з) 12-16 лет и) 17-21 год**  
1б, 2в, 3а, 4г, 5д, 6ж, 7з, 8и, 9е  
1а, 2в, 3г, 4г, 5д, 6ж, 7з, 8е, 9и

**Установите соответствие между заболеванием и путями передачи инфекции 1. дизентерия 2. гепатит А 3. гепатит В 4. колиинфекция 5. сальмонеллез а) воздушно-капельный б) парентеральный в) пищевой г) водный 1 д) контактно-бытовой**  
1агд, 2бгд, 3б, 4вгд, 5агд  
1вгд, 2вгд, 3б, 4вгд, 5вгд

**К сестринским вмешательствам относят**

- Г) правомерные
- Б) обязательные
- А) независимые и
- В) зависимые и
- Д) взаимозависимые

**Установите соответствие между заболеванием и причиной возникновения 1. простой контактный дерматит 2. аллергический контактный дерматит а) от чрезвычайного наружного раздражителя б) от приёма лекарственных средств внутрь в) при повторном наружном воздействии раздражителя**

- 1б, 2в
- 1в, 2б
- 1а, 2б
- 1а, 2в

**Установите соответствие между стадиями крупа и клиническими признаками 1. катаральная 2. стенотическая 3. асфиктическая а) затруднен вдох, афония голоса,**

**беззвучный кашель б) признаки сердечно-сосудистой недостаточности, серые кожные покровы, апатия в) осиплость голоса, грубый кашель, субфебрильная температура**

1а, 2а, 3а

1б, 2а, 3в

1в, 2б, 3б

1в, 2а, 3б

**Маточные кровотечения у девочек старшего возраста отмечаются при**

А. а) алиментарных анемиях

В. в) тромбоцитопенической пурпуре

Б. б) гемофилии

Г. г) геморрагическом васкулите

**Проблемы, возникающие у медицинских сестер, при планировании сестринского процесса**

А. а) поставлены слишком широкие цели и

Б. б) цели определены с позиций сестры, а не пациента и

В. в) сестринские требования не реалистичны и

Г. г) план не предусматривает вклада со стороны пациента и

Д. д) план не выполняется и не пересматривается

**Программа реабилитации пациента с пиелонефритом включает следующие действия**

Е. 6. контроль за динамикой АД

Д. 5. контроль за динамикой отеков

А. 1. санация очагов хронической инфекции и

Б. 2. контроль за анализами мочи и

В. 3. регулярное наблюдение урологом и

Г. 4. поддерживающая терапия уросептиками, фитотерапия

**Предположите заболевание. У ребёнка 14 лет поднялась температура 39,8 С, озноб, сильная головная боль, многократная рвота, не приносящая облегчения. При осмотре кожные покровы бледные с «мраморным» рисунком, наблюдается ригидность затылочных мышц. АД 90/60мм.рт.ст. PS- 140 в мин.**

в) лептоспироз

а) ОРВИ. Грипп

г) менингит

б) дифтерия

**Установите соответствие между комой и ее признаками 1. кетоацидотическая 2. гипогликемическая а) яркий румянец, "ветчинный язык" б) сухость кожи в) влажная кожа г) острое развитие д) постепенное развитие е) дыхание Куссмауля ж) дыхание ровное спокойное з) тремор, судороги**

1абге 2вджз  
1авде 2бгжз  
1абдз 2вгже  
1абде 2вгжз

**Установите соответствие между заболеванием и сроком карантина 1. дифтерия 2. скарлатина 3. менингококковая инфекция 4. коклюш а) не накладывают б) 7 дней в) 1 дней г) 14 дней**

1б, 2б, 3в, 4г  
1а, 2б, 3в, 4г  
1б, 2в, 3в, 4в  
1б, 2г, 3в, 4а

**Перечислите критерии развития двигательных умений ребенка**

лежит  
ползает и  
сидит и  
переворачивается на живот и  
ходит и  
держит голову

**Установите соответствие между видом стоматита и возбудителем 1. молочница 2. афтозный 3. кандидозный а) вирус б) грибок в) стафилококк**

1в, 2а, 3б  
1б, 2в, 3б  
1в, 2б, 3а  
1а, 2а, 3в

**Установите соответствие между заболеванием и клиническими проявлениями 1. ангина 2. дифтерия а) налет на миндалинах не распространяется за пределы дужек б) налет на миндалинах распространяется за пределы дужек небных в) налет снимается с трудом г) налет легко снимается д) высокая температура, боль в горле нарастает е) температура нормальная или субфебрильная, боль в горле уменьшается**

1агд, 2бве  
1агв, 2бвд  
1аге, 2бвг  
1бгд, 2аве

**Сестринскими рекомендациями ребенку с пиелонефритом могут быть**

Б. 2. тщательный туалет половых органов и  
Г. 4. режим \"принудительного\" мочеиспускания и  
Д. 5. увеличение объема вводимой жидкости и  
Е. 6. проведение противорецидивной терапии  
А. 1. ограничение объема вводимой жидкости



В. 3. обогащенные диеты углеводами, белком

### **Сестринский процесс при стоматитах**

1. обучение правилам личной гигиены и
3. обработка полости рта по назначению врача и
4. обучение адекватному питанию
2. проведение оксигенотерапии
5. обеспечить покой, пролонгированный сон

**Установите соответствие между внутриутробной инфекцией у новорожденного и клиническими проявлениями** 1. цитомегаловирусная 2. сифилитическая 3. краснушная а) пузырьчатка на ладонях и стопах, ринит б) глухота, катаракта, микроцефалия, врожденные пороки сердца в) гипотрофия, желтуха, гнойничковая сыпь на коже г) желтуха, анемия, тромбоцитопения, гепатоспленомегалия, геморрагическая сыпь д) синдром Дауна

1г, 2а, 3б

1в, 2а, 3б

1г, 2а, 3в

1г, 2в, 3б

**основными задачами концепции развития здравоохранения и медицины в РФ являются**

- А. А) увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний и
- Б. Б) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения и
- В. В) повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения и
- Г. Г) развитие государственного сектора в здравоохранении и
- Д. Д) повышение уровня квалификации медицинских работников

**Характерным симптомом эпидемического паротита не является**

Д. д) ангина.

А. а) лихорадка;

Б. б) увеличение околоушных слюнных желез;

В. в) увеличение подчелюстных слюнных желез;

Г. г) боли в животе;

**Проблемы, возникающие у медсестер при оценке предоставленного ухода**

В) неточные или несоответствующие выводы

А) не сделана оценка и

Б) несоизмеримые цели и

Г) неправильное использование результатов оценки

**Установите соответствие между видом ангины и симптомами** 1. катаральная 2. лакунарная 3. фолликулярная а) гнойные налеты в криптах миндалин б) гноетечение из уха в) нагноение фолликулов миндалин г) "лающий" кашель д)

**гиперемия, отек миндалин**

1а, 2аб, 3вд

1д, 2аг, 3вд

1д, 2ад, 3вд

1в, 2аг, 3вд

**Сестринскими рекомендациями по диетотерапии ребенку с пиелонефритом могут быть**

3. ограничение белка в диете

2. ограничение жидкости

1. ограничение поваренной соли и

4. прием минеральной воды и

5. увеличение молочно-кислых продуктов

**Соотнесите этапы обработки изделий медицинского назначения в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10**

**А) Использованные изделия медицинского назначения**

**многократного применения, соприкасающиеся с кровью пациента, подлежат Б)**

**Использованные изделия медицинского назначения однократного применения,**

**соприкасающиеся с кровью пациента, подлежат В) Использованные изделия**

**медицинского назначения многократного применения, не соприкасающиеся с**

**биологическими жидкостями пациента, подлежат Г) Использованные изделия**

**медицинского назначения однократного применения, не соприкасающиеся с**

**биологическими жидкостями пациента, подлежат а) дезинфекции**

**б) предстерилизационная очистка в) стерилизация г) утилизация**

Аа, Аб, Ав, Ба, Бг, Ва, Га, Гг

Ав, Аб, Аг, Ба, Бг, Ва, Гв, Гг

**Установите соответствие между степенью гипогалактией и дефицитом молока 1. I 2.**

**II 3. III 4. IV а) не выше 75 % б) не выше 25 % в) не выше 50 % г) более 75 %**

1а, 2а, 3а, 4г

1в, 2б, 3а, 4г

1б, 2б, 3г, 4г

1б, 2в, 3а, 4г

**Из отвлекающих процедур ребенку с приступом бронхиальной астмы медсестра порекомендует**

Б. б) общую горячую ванну

А. а) ручные и ножные горячие ванны

В. в) лечебную ванну с морской солью

Г. г) воздушную ванну

**К физиологическим состояниям новорожденных относят А) мочекишный инфаркт Б) желтуха В) везикулопустулез Г) гипертермия Д) цианоз Е) эритема**

Б,В,Г,Е

А,В,Г,Е

А,Б,В,Е

А,Б,Г,Е

**Установите соответствие между заболеванием и возбудителем 1. краснуха 2. корь 3. скарлатина 4. дифтерия 5. эпидемический паротит а) вирус б) микобактерия в) менингококк г) В-гемолитический стрептококк д) бактерия Леффлера**

1а, 2б, 3г, 4д, 5б

1а, 2а, 3г, 4д, 5а

1а, 2г, 3г, 4д, 5г

1б, 2а, 3г, 4д, 5в

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с острым гломерулонефритом после выписки из стационара могут быть**

б. проводить плановую иммунопрофилактику

2. диета с увеличением животного белка, жира

1. поощрять ребенка к самоконтролю, увеличению активности и

3. исключение калий-содержащих продуктов из диеты и

4. контроль за поддерживающей терапией и

5. научиться приемам психологической поддержки

**Установите соответствие между заболеванием и синдромами 1. пиелонефрит 2. гломерулонефрит а) отечный б) гипертензионный в) дизурический г) мочеволевой д) болевой е) общий интоксикационный**

1бгде, 2вбг

1вгде, 2абг

1вгдб, 2абе

1агде, 2вбг

**Наиболее информативным исследованием при гастрите является**

Г. г) иридодиагностика;

Б. б) рентгеноконтрастное исследование;

А. а) эндоскопия с биопсией;

В. в) УЗИ;

Д. д) копрограмма.

**Установите соответствие между формой омфалита и симптомами 1. катаральная 2. гнойная 3. гангренозная а) серозное, геморрагическое отделяемое б) некроз ткани в) серозно-гнойное отделяемое г) гнойно-геморрагическое отделяемое д) pupочные сосуды отечны**

1в, 2агд, 3бд

1а, 2вгд, 3бд

1б, 2вгд, 3ад

1д, 2бвг, 3бд

**сестринскими рекомендациями родителям по уходу за ребенком с врожденным**

### **пороком сердца могут быть**

информировать о преимуществах лечения одного врача над другим  
обеспечить обильным питьем  
кормить часто, малыми порциями и  
избегать гиперопеки и  
научиться оказывать помощь при одышечно-цианотических приступах

### **Срок карантина при кори**

- А. а) 7 дней
- В. в) 21 день
- Б. б) 14 дней
- Г. г) 30 дней

**Установит соответствие между продуктами прикорма и сроками введения 1. кефир  
2. каши 3. овощное пюре а) 6 месяцев б) 7 месяцев в) 8 месяцев**

- 1б, 2б, 3в
- 1а, 2б, 3в
- 1в, 2а, 3а
- 1в, 2б, 3а

**Установите соответствия между терапией ГН ( ) лекарственными средствами) и группой лекарственных препаратов 1. курантил, трентал 2. вольтарен, бруфен 3. гепарин 4. глюконат кальция 5. фуросемид верошпирон 6. допегит а) диуретики б) антикоагулянты в) нестероидные противовоспалительные г) гипотензивные д) антигистаминные е) улучшающие почечный кровоток**

- 1е, 2в, 3б, 4д, 5а, 6г
- 1а, 2в, 3е, 4д, 5а, 6б

**Обструктивным легочным заболеванием является**

- В. в) фиброзирующий альвеолит;
- А. а) экзогенный аллергический альвеолит;
- Г. г) бронхиальная астма;
- Б. б) эозинофильная пневмония;
- Д. д) хроническая пневмония.