

**Здесь последовательно представлены вопросы по специальности  
"Сестринское дело в педиатрии".**

**Сперва идёт первая категория, потом вторая, потом высшая.  
Сделано это для быстрого поиска нужного вам вопроса и ответа.**

**Купить базу вопросов с ответами можно здесь:  
<https://medik-akkreditacia.ru/product/ses-pediatr/>**

**Полезные ссылки:**

1) Тесты для аккредитации «Сестринское дело в педиатрии» (500 вопросов)

[https://medik-akkreditacia.ru/product/medsestra\\_pediatriya/](https://medik-akkreditacia.ru/product/medsestra_pediatriya/)

2) Тесты для аккредитации «Сестринское дело» (2000 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/sestrinskoe-delo/>

3) Тесты по специальностям, связанными с детьми

<https://medik-akkreditacia.ru/katalog/akkreditacia/detskie/>

**Целями сестринского обследования ребенка является определение**

б) основного и сопутствующего заболевания

а) потребности пациента в уходе и

в) реакции ребенка на состояние своего здоровья и

г) медико-санитарных потребностей и

д) существующих и потенциальных проблем пациента со здоровьем

**Установите соответствие между заболеванием и его симптомами 1. потница 2.**

**опрелости 3. псевдофурункулез а) мокнущие эрозии б) пузырьки с просыное зерно с  
прозрачным содержимым в) плотные инфильтраты г) страдает общее состояние д)  
яркая гиперимия кожи**

1а, 2бд, 3вг

1б, 2ад, 3вг

1б, 2аг, 3вд

1а, 2аб, 3вг

**Установите соответствие между заболеванием и принципами ухода и лечения 1.**

**ларингит 2. отит 3. ангина 4. ринит а) щелочные ингаляции б) микроклимат в палате**

**в) согревающий полуспиртовой компресс г) полоскание р-ром фурациллина 1:5000**

**д) диета механически, химически, термически щадящая е) р-р адреналина 1:1000 в  
виде капель**

1ав, 2б, 3га, 4 е

1ав, 2е, 3гд, 4 б

1аб, 2в, 3гд, 4 е

1аг, 2в, 3ге, 4 д

**Установите соответствие между периодами пневмонии и симптомами 1. начальный 2. разгара 3. выздоровления а) сухой кашель б) чихание в) пенистые выделения из рта г) улучшение общего состояния д) исчезновение клинических симптомов е) хрипы влажные, крепитирующие**

1вбд, 2ве, 3га

1абв, 2ве, 3гд

1абд, 2ге, 3гд

1абг, 2де, 3гв

**Сестринскими рекомендациями по диетотерапии ребенку с пиелонефритом могут быть**

2. ограничение жидкости

1. ограничение поваренной соли и

4. прием минеральной воды и

5. увеличение молочно-кислых продуктов

3. ограничение белка в диете

**Для врожденного гипотиреоза не характерно**

Г. г) преждевременное закрытие большого родничка;

А. а) макроглоссия;

Б. б) пролонгированная желтуха;

В. в) склонность к гипотермии;

Д. д) запор.

**Установите соответствие между заболеванием и профилактическими мероприятиями 1. гепатит А 2. гепатит В 3. гепатит С а) контроль за личной гигиеной б) использование одноразового инструментария в) вакцинация г) проведение текущей дезинфекции д) тестирование донорской крови е) механическая контрацепция**

1б, 2бвгде, 3абвгд

1в, 2багде, 3бвгде

1а, 2бвгде, 3бвгде

1д, 2бвгде, 3авгде

**Установите соответствие между заболеванием и возбудителем 1. краснуха 2. корь 3. скарлатина 4. дифтерия 5. эпидемический паротит а) вирус б) микобактерия в) менингококк г) В-гемолитический стрептококк д) бактерия Леффлера**

1б, 2а, 3г, 4д, 5г

1в, 2г, 3г, 4д, 5б

1д, 2а, 3г, 4д, 5в

1а, 2а, 3г, 4д, 5а

**Механизм передачи инфекции при остром респираторном заболевании**

- Б. б) контактно-бытовой
- А. а) воздушно-капельный
- В. в) пищевой
- Г. г) гематогенный

**Какова причина затруднения дыхания при остром рините у детей**

- Б. б) отек слизистой, гиперсекреция мокроты
- А. а) отек слизистой, гиперсекреция слизи
- В. в) атрофия слизистой, гиперсекреция слизи
- Г. г) атрофия слизистой, гиперсекреция мокроты

**Малая хорея возникает при ревматическом поражении**

- Г. г) дыхательной системы
- Б. б) костно-мышечной системы
- А. а) центральной нервной системы
- В. в) кожи

**Ребенку с декомпенсированным пороком сердца, находящемуся на строгом постельном режиме, полную санитарную обработку можно заменить**

- В. в) гигиенической ванной
- А. а) лечебной ванной
- Г. г) обтиранием тела и подмыванием в постели
- Б. б) душем

**Причиной относительно низкого АД у детей является**

- Г. г) большой объем левого желудочка, узкие артерии
- Б. б) малый объем левого желудочка, узкие артерии
- А. а) малый объем левого желудочка, широкие артерии
- В. в) большой объем левого желудочка, широкие артерии

**Причиной срыгивания у грудных детей является**

- Д. д) все перечисленное.
- А. а) незрелость эзофагокардиального отдела пищевода;
- Б. б) высокий тонус желудка в пилорическом отделе;
- В. в) высокое внутрибрюшное давление;
- Г. г) непостоянные расслабления нижнего пищеводного сфинкса;

**При анафилактическом шоке ребенка надо уложить**

- В. в) на бок с приподнятыми ногами
- А. а) на живот
- Б. б) на спину
- Г. г) с приподнятым изголовьем

**Жидкие лекарственные средства (настои, отвары) рекомендуется хранить в**

- Б. б) холодильнике при температуре ниже 0°C
- Г. г) тёмном месте при комнатной температуре
- А. а) морозильном отделении холодильника
- В. в) холодильнике при температуре +2 - +6 °С

**Этиологическим лечением острого герпетического стоматита является**

- А. а) полоскание полости рта растворами антисептиков;
- Б. б) противовирусное лечение;
- В. в) диета;
- Г. г) антибактериальные препараты;
- Д. д) жаропонижающие средства.

**Лечебное питание ребенка с пиелонефритом строится по принципу**

- Г. г) молочно-растительной диеты с ограничением сахара
- Б. б) усиленного белкового питания
- А. а) молочно-растительной диеты с умеренным ограничением белка и соли
- В. в) бессолевой диеты

**Типичными особенностями периода высыпания при кори являются следующие, кроме:**

- В. в) этапности при появлении и угасании сыпи;
- Г. г) наличия катаральных явлений;
- Б. б) пятнисто-папулезной сыпи с тенденцией к слиянию;
- А. а) появления сыпи на фоне нормальной температуры;
- Д. д) усиления токсикоза и лихорадки при появлении сыпи.

**Проблемы, возникающие у медицинских сестер, при планировании сестринского процесса**

- а) поставлены слишком широкие цели и
- б) цели определены с позиций сестры, а не пациента и
- в) сестринские требования не реалистичны и
- г) план не предусматривает вклада со стороны пациента и
- д) план не выполняется и не пересматривается

**К функциям сестринского дела относят**

- в) лечение заболеваний
- а) укрепление здоровья и
- б) профилактика заболеваний и
- г) реабилитация пациентов и
- д) облегчение страданий и уход

**Основные принципы охраны здоровья граждан**

- г) социальная защита в случае утраты здоровья

- а) государственная гарантия и
- б) приоритетность профилактических мер и
- в) доступность медико-социальной помощи и
- д) ответственность государственной власти и учреждений

#### **Лабораторная диагностика фенилкетонурии**

- Б. б) проба с треххлористым железом;
- А. а) проба на ацетон;
- В. в) исследование белковых фракций
- Г. г) исследование крови на церуллооплазмин;
- Д. д) содержание креатинфосфокиназы в крови и моче.

#### **Введение прикорма ребенку с пищевой аллергией рекомендуется в возрасте**

- Г. г) 4-х месяцев.
- А. а) 10 месяцев;
- Б. б) 6 месяцев;
- В. в) 2-х месяцев;

#### **Диагноз муковисцидоза подтверждает**

- Б. б) исследование костного мозга;
- В. в) биопсия тонкого кишечника;
- А. а) рентгенограмма грудной клетки;
- Д. д) определение электролитов пота.
- Г. г) микроскопия осадка мочи;

#### **Для бронхиальной астмы не характерен признак**

- Б. б) повышение хлоридов в поте и моче;
- А. а) приступы бронхоспазма с экспираторной одышкой;
- В. в) гиперпродукция вязкой прозрачной мокроты;
- Г. г) рассеянные непостоянные сухие, свистящие хрипы;
- Д. д) жесткое дыхание.

**Соотнесите виды ЧС с причиненным ущербом А) локальные Б)местные В)территориальные Г) региональные Д) федеральные а)пострадало не более 10 человек, зона ЧС не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения б)пострадало свыше 10, но не более 50 человек, зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района в)пострадало от 50 до 500 человек, зона ЧС не выходит за пределы субъекта Российской Федерации г)пострадало от 50 до 500 человек, зона ЧС охватывает территорию двух субъектов РФ д)пострадало свыше 500 человек, ЧС зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух субъектов РФ или выходит за их пределы**

- Аа, Бб, Вв, Гг, Дд
- Аб, Ба, Вв, Гг, Дд
- Аа, Бб, Вв, Гд, Дг
- Ав, Бб, Ва, Гг, Дд

**Соотнесите пути передачи возбудителей и особо опасные инфекции А) трансмиссивный Б) алиментарный В) контактный Г) воздушно-капельный Д) вертикальный а) чума б) холера в) сибирская язва г) натуральная оспа д) желтая лихорадка е) туляремия**

Аа, Ад, Ае, Бб, Бе, Ва, Вв, Ве, Га, Гг, Дг

Аа, Ав, Аг, Ба, Бе, Ва, Вв, Вг, Га, Гг, Дд

**Соотнесите методы обработки изделий медицинского назначения с их видом А) дезинфекция Б) предстерилизационная очистка В) стерилизация а) гидрофильные прокладки б) тубусы многократного применения в) тубусы однократного применения г) контактные кожные излучатели (электроды) д) аэрозольные наконечники**

Аа, Аб, Ав, Аг, Ад, Ба, Бд, Ва, Вд

Аа, Аб, Ав, Аг, Ад, Бб, Бд, Вб, Вд

**Установите соответствие между типом бронхиальной астмы и мерами профилактики 1. первичная 2. вторичная а) предупредить приступ б) предупредить заболевание в) предотвратить осложнения г) предотвратить астматический статус**

1а, 2бвг

1г, 2авб

1в, 2абг

1б, 2авг

**основные ценности философии сестринского дела**

забота и

здоровье и

сохранение достоинства и

высокий профессионализм

**Сестринский процесс включает следующие этапы**

д) лечение заболеваний

а) сестринское обследование и

б) выявление проблем и потребности в уходе и

в) планирование и выполнение сестринских вмешательств и

г) оценка эффективности сестринских вмешательств

**Срок карантина при кори**

В. в) 21 день

А. а) 7 дней

Б. б) 14 дней

Г. г) 30 дней

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с тромбоцитопенией могут**

## **быть**

1. избегать приема антибиотиков и антиагрегантов и
2. санировать очаги хронической инфекции и
3. гипоаллергенная диета с включением арахиса, шпината, крапивы, укропа и
5. повторные курсы фитотерапии
4. занятия физкультурой в основной группе
6. солнечная инсоляция

## **сестринскими рекомендациями родителям по уходу за ребенком с врожденным пороком сердца могут быть**

информировать о преимуществах лечения одного врача над другим  
обеспечить обильным питьем  
кормить часто, малыми порциями и  
избегать гиперопеки и  
научиться оказывать помощь при одышечно-цианотических приступах

## **Установите соответствие между типом анемии и симптомами 1. железодефицитная 2. гемолитическая а) иктеричность кожи б) бледность кожи в) гипотония мышц г) снижение гемоглобина крови**

- 1а, 2агб  
1бвг, 2аг  
1авг, 2бг  
1абв, 2ав

## **Установите соответствие между видом стоматита и возбудителем 1. молочница 2. афтозный 3. кандидозный а) вирус б) грибок в) стафилококк**

- 1а, 2а, 3а  
1в, 2а, 3б  
1б, 2а, 3в  
1а, 2в, 3б

## **Установите соответствие между видом гельминтоза и посудой для исследований 1. аскаридоз 2. энтеробиоз а) стерильная пробирка со средой б) чистая стеклянная посуда в) чашка Петри с питательной средой г) предметные стекла, скотч, шпатель**

- 1б, 2г  
1б, 2б  
1в, 2г  
1а, 2г

## **Внебольничную пневмонию у детей в возрасте старше 5 лет чаще вызывают**

- Г. г) грибы;  
А. а) стафилококки;  
В. в) пневмококки;  
Б. б) пневмоцисты;  
Д. д) микоплазмы.

**Установите соответствие между заболеванием и путями передачи инфекции 1. дизентерия 2. гепатит А 3. гепатит В 4. колиинфекция 5. сальмонеллез а) воздушно-капельный б) парентеральный в) пищевой г) водный 1 д) контактно-бытовой**

1вгд, 2вгд, 3б, 4вгд, 5вгд

1агд, 2бгд, 3в, 4вгд, 5вгд

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с энтеробиозом могут быть**

2. обеспечить обильным питьем

1. проглаживание нательного и постельного белья и

3. укладывать спать ребенка в тугих трусиках и

4. коротко стричь ногти и

5. тщательный туалет промежности

6. добавить в диету острые блюда

**Установите соответствие между заболеванием и симптомами 1. дизентерия 2. колиинфекция 3. вирусный гепатит а) волнообразная лихорадка б) иктеричность кожи в) тенезмы**

1г, 2в, 3г

1а, 2б, 3в

1г, 2а, 3в

1б, 2а, 3в

**В клинической картине ботулизма обычно не наблюдается**

А. а) расстройства зрения (туман перед глазами, двоение)

Г. г) гепатолиенального синдрома

Б. б) нарушение глотания

В. в) расстройство дыхания

Д. д) миастении

**У ребенка с ограниченным нейродермитом прививки можно начинать от начала ремиссии не ранее чем через**

А. а) 1 месяц

Б. б) 2 месяца от начала ремиссии

В. в) 3 месяца от начала ремиссии

Г. г) 6 месяцев от начала ремиссии

Д. д) 1 год от начала ремиссии

**В каких случаях допустимо лечение острой пневмонии в домашних условиях**

Б. б) пневмония, осложненная кардиоваскулярным синдромом;

Г. г) пневмония у ребенка из социально неблагополучной семьи;

А. а) неосложненная форма у ребенка в возрасте до 1 года;

В. в) неосложненная форма пневмонии у ребенка 4 лет;

Д. д) затяжное течение пневмонии с ателектазом одного сегмента у ребенка 7 лет.



**После введения новорожденному ребенку вакцины БЦЖ в месте инъекции может появиться папула через**

- Г. г) 2-3 месяца;
- А. а) 1 неделю;
- В. в) 4-6 недель;
- Б. б) 2-3 недели;
- Д. д) 4-6 месяцев.

**При обмороке необходимо**

- Б. б) уложить ребенка с приподнятыми ногами
- А. а) придать положение с возвышенным изголовьем
- В. в) усадить ребенка
- Г. г) уложить на живот

**У ребенка 3-х лет 6 часов назад возникли острые, приступообразные боли в животе. Стул был кашицеобразный с кровью 1 раз, рвота 1 раз, температура 36,8 С. В первую очередь необходимо исключить**

- В. в) острый аппендицит;
- Г. г) аденовирусную инфекцию;
- А. а) кишечную инфекцию;
- Б. б) инвагинацию;
- Д. д) кишечное кровотечение.

**Этот симптом требует немедленной госпитализации ребенка в хирургический стационар**

- Г. г) температура 38 С;
- А. а) повторная рвота;
- В. в) напряжение мышц живота;
- Б. б) жидкий стул повторно;
- Д. д) обморок.

**Для мокнущего пупка у новорожденных характерны**

- А. а) грибовидная опухоль на дне пупочной ранки
- В. в) серозное отделяемое из пупочной ранки
- Б. б) отек и гиперемия вокруг пупочной ранки
- Г. г) отек и гиперемия пупочного кольца и гнойное отделяемое из пупочной ранки

**К врожденным порокам сердца, протекающим с цианозом, относится**

- Б. б) дефект межжелудочковой перегородки
- В. в) открытый артериальный проток
- А. а) дефект межпредсердной перегородки
- Г. г) «тетрада Фалло»

**В этиологии ревматизма ведущая роль принадлежит**

- Б. б)  $\beta$ -гемолитическому стрептококку группы А

- А. а) золотистому стафилококку
- В. в) вирусам
- Г. г) зеленым стрептококкам

**Наличие изжоги свидетельствует о**

- Г. г) язвенной болезни желудка;
- Б. б) повышение кислотности желудочного содержимого;
- А. а) забросе желудочного содержимого в пищевод;
- В. в) диафрагмальной грыже;
- Д. д) гастродуодените.

**Анализ мочи по Нечипоренко собирают**

- А. а) утром после туалета промежности в чистую посуду
- В. в) после туалета промежности, в чистую посуду, среднюю порцию струи мочи
- Б. б) в течение 3 часов в одну банку
- Г. г) в течение суток через каждые 3 часа

**Уменьшение мочеотделения – это**

- Г. г) поллакиурия
- А. а) анурия
- В. в) олигурия
- Б. б) полиурия

**Соотнесите изделия медицинского назначения с методами их обработки А) гидрофильные прокладки Б) тубусы многократного применения В) тубусы однократного применения Г) контактные кожные излучатели (электроды) Д) аэрозольные наконечники а) дезинфекция б) предстерилизационная очистка в) стерилизация**

- Аб, Бд, Бб, Бв, Вг, Га, Да, Дб, Дв
- Аа, Ба, Бб, Бв, Ва, Га, Да, Дб, Дв

**Соотнесите отравляющие вещества с механизмом их действия А) Синильная кислота Б) зарин В) фосген Г) иприт Д) люизит а) общедовитое б) нервно-паралитическое в) удушающее г) кожно-нарывного**

- Аб, Бв, Вв, Гг, Дг
- Аа, Бб, Вд, Гг, Дв
- Аг, Бб, Вв, Га, Дг
- Аа, Бб, Вв, Гг, Дг

**Установите соответствие между способами и условиями обеззараживания медицинских отходов классов Б и В А) централизованный способ Б) децентрализованный способ а) термическое уничтожение обеззараженных медицинских отходов классов Б и В возможно таким способом б) участок по обращению с отходами располагается в пределах территории организации в) участок по обращению с медицинскими отходами располагается за пределами**

**территории организации г)транспортирование необеззараженных отходов класса Б возможно при таком способе д)обеззараживание отходов класса В исключительно таким способом**

Аа, Ад, Аг, Бд, Бб

Аб, Ав, Аг, Ба, Бд

Аа, Ав, Аг, Бд, Ба

Аа, Ав, Аг, Бб, Бб

**Основополагающими понятиями теории сестринского дела, определяющими суть сестринской практики, являются**

а) здоровье и

б) пациент, личность и

в) сестринское дело и

д) окружающая среда и общество

г) диагностика и лечение

**Проблемы, возникающие у медицинских сестер, при планировании сестринского процесса**

а) поставлены слишком широкие цели и

б) цели определены с позиций сестры, а не пациента и

в) сестринские требования не реалистичны и

г) план не предусматривает вклада со стороны пациента и

д) план не выполняется и не пересматривается

**Установите соответствие между формой омфалита и симптомами 1. катаральная 2. гнойная 3. гангренозная а) серозное, геморрагическое отделяемое б) некроз ткани в) серозно-гнойное отделяемое г) гнойно-геморрагическое отделяемое д)**

**пупочные сосисы отечны**

1в, 2агд, 3бд

1а, 2бгд, 3вд

1б, 2вгд, 3ад

1а, 2вгд, 3бд

**Установите соответствие между диабетической комой и помощью 1.**

**кетоацидотическая 2. гипогликемическая а) введение инсулина б) внутривенное введение глюкозы в) противосудорожные средства г) сердечные гликозиды**

1вбг, 2ав

1авг, 2гв

1абв, 2бг

1абг, 2бв

**Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни тяжелой формой атопического дерматита целесообразно проводить**

А. а) адаптированными смесями на основе коровьего молока;

- Д. д) высоко гидролизованными смесями.
- Б. б) соевыми смесями;
- В. в) смесями на основе частично гидролизованного белка сыворотки;
- Г. г) кисломолочными смесями;

**Возникновению срыгиваний у новорожденных детей, находящихся на грудном вскармливании способствуют**

- Г. г) все перечисленные;
- А. а) короткий пищевод;
- Б. б) недостаточное развитие кардиального отдела желудка;
- В. в) относительный гипертонус пилорического отдела желудка;
- Д. д) физиологический дефицит ферментов.

**Гибель недоношенных детей в раннем неонатальном периоде наиболее часто вызывают**

- Б. б) асфиксия и пневмопатии;
- А. а) родовая травма;
- В. в) инфекции;
- Г. г) врожденные пороки развития;
- Д. д) сепсис.

**При «белой» гипертермии у детей отмечаются**

- В. в) холодные конечности
- Г. г) гиперемия кожных покровов
- А. а) мраморные кожные покровы
- Б. б) бледные кожные покровы

**Ребенка перед оформлением в логопедическую группу направляют на консультацию к ЛОР-врачу с целью исключить**

- В. в) понижение слуха
- А. а) острое заболевание
- Б. б) хронический тонзилит
- Г. г) ларингит

**При каком хроническом заболевании уха показано наблюдение больного 4 раза в год**

- В. в) рецидивирующий отит
- Г. г) кохлеарный неврит
- Б. б) хронический мезотимпанит
- А. а) хронический эптитимпанит

**К видам предоставляемого ухода относят**

- а) самоуход и
- б) взаимоуход и
- в) попечительский уход и

- г) профессиональный и
- д) спонсорский

**Основополагающими понятиями теории сестринского дела, определяющими суть сестринской практики, являются**

- а) здоровье и
- б) пациент, личность и
- в) сестринское дело и
- д) окружающая среда и общество
- г) диагностика и лечение

**основными задачами концепции развития здравоохранения и медицины в РФ являются**

- А) увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний и
- Б) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения и
- В) повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения и
- Г) развитие государственного сектора в здравоохранении и
- Д) повышение уровня квалификации медицинских работников

**Вторичная антибактериальная профилактика ревматизма проводится**

- А. а) пенициллином
- Б. б) бициллином-5
- В. в) вольтареном
- Г. г) гентамицином

**Анафилактический шок у детей наиболее часто развивается после введения**

- А. а) антибиотиков
- Б. б) витаминов
- В. в) препаратов железа
- Г. г) препаратов кальция

**Наиболее частым осложнением язвенной болезни у детей является**

- Г. г) малигнизация;
- Б. б) перфорация;
- А. а) кровотечение;
- В. в) пенетрация в поджелудочную железу;
- Д. д) непроходимость.

**Установите соответствие между манипуляцией и средствами ухода за новорожденным**

1. туалет пупочной ранки 2. туалет кожных складок 3. туалет глаз

- а) стерильное растительное масло б) 3% р-р нитрата серебра в) 3% р-р перекиси водорода г) 70% р-р этилового спирта д) кипяченая вода е) 96% р-р этилового спирта

1вг, 2а, 3д  
1вд, 2а, 3а  
1вд, 2а, 3г  
1аг, 2в, 3д

**основными задачами концепции развития здравоохранения и медицины в РФ являются**

- А) увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний и
- Б) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения и
- В) повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения и
- Г) развитие государственного сектора в здравоохранении и
- Д) повышение уровня квалификации медицинских работников

**К видам предоставляемого ухода относят**

- а) самоуход и
- б) взаимоуход и
- в) попечительский уход и
- г) профессиональный и
- д) спонсорский

**Для коклюша не типично**

- Б. б) одутловатость лица;
- А. а) гипертермия;
- В. в) толчкообразный кашель с судорожным вдохом;
- Г. г) выделение вязкой мокроты;
- Д. д) рвота при кашле.

**Установите соответствие между заболеванием и сроком карантина 1. корь 2. ветряная оспа 3. эпидемический паротит 4. краснуха а) не накладывают б) 7 дней в) 21 день г) 35 дней**

1а, 2а, 3в, 4а  
1в, 2в, 3в, 4а  
1в, 2б, 3в, 4а  
1в, 2а, 3г, 4г

**Сестринскими рекомендациями ребенку с сахарным диабетом могут быть**

- 1. обучаться в школе диабетиков и
- 3. добиться сбалансированной диеты и
- 5. выработать объем физических нагрузок и
- 6. научиться делать экспресс-анализ крови и мочи на сахар
- 2. заниматься физкультурой в основной группе

**Установите соответствие между заболеванием и сроком изоляции заболевших 1.**

**дифтерия 2. скарлатина 3. менингококковая инфекция 4. коклюш а) до отрицательного бактериологического исследования б) 4 дня в) 7 дней г) 10-22 дня**  
1б, 2г, 3а, 4г  
1а, 2г, 3б, 4в  
1а, 2г, 3б, 4б  
1а, 2г, 3а, 4а

**Пути распространения острого полиомиелита являются**

В. в) трансмиссивный;  
А. а) воздушно-капельный;  
Г. г) воздушно-капельный и алиментарный;  
Б. б) алиментарный;  
Д. д) все перечисленные.

**Установите соответствие между заболеванием и сроком карантина 1. дифтерия 2. скарлатина 3. менингококковая инфекция 4. коклюш а) не накладывают б) 7 дней в) 14 дней г) 14 дней**

1г, 2г, 3в, 4г  
1а, 2а, 3а, 4г  
1б, 2б, 3в, 4г  
1в, 2б, 3а, 4г

**Установите соответствие между заболеванием и видом лабораторной диагностики 1. дизентерия 2. колиинфекция 3. вирусный гепатит а) биохимический анализ крови б) копрологический анализ в) бактериологическое исследование кала**

1ба, 2бв, 3в  
1бв, 2бв, 3а  
1бв, 2ба, 3в  
1ав, 2бв, 3б

**Установите соответствие между заболеванием и сроками карантина 1. гепатит А 2. гепатит В 3. дизентерия а) 7 дней б) 35 дней в) 180 дней**

1а, 2а, 3а  
1б, 2в, 3а  
1а, 2в, 3а  
1а, 2в, 3б

**Наиболее часто вызывают пищевую аллергию**

А. а) черника;  
Б. б) клубника;  
В. в) смородина;  
Г. г) крыжовник;  
Д. д) ежевика.

**Оптимальные сроки назначения антибиотиков при пневмонии до**

- В. в) нормализации СОЭ;
- Г. г) 4-5 дней стойкой нормальной температуры тела;
- А. а) нормализации температуры;
- Б. б) полного рассасывания инфильтрата в легком;
- Д. д) ликвидации токсикоза.

**В рацион питания больных ревматизмом включают картофель, изюм, курагу и другие продукты, благодаря высокому содержанию**

- Г. г) йода
- А. а) кальция
- Б. б) калия
- В. в) натрия

**Препарат для оказания первой помощи при носовом кровотечении**

- В. в) раствор седуксена
- Г. г) раствор супрастина
- А. а) раствор анальгина 25%
- Б. б) 3% раствор перекиси водорода

**Выраженным цианозом сразу после рождения проявляется**

- Б. б) тетрада Фалло;
- Г. г) открытый артериальный проток;
- А. а) дефект межжелудочковой перегородки;
- В. в) транспозиция магистральных сосудов;
- Д. д) дефект межпредсердной перегородки.

**Приоритетная цель сестринских вмешательств при обмороке у ребенка**

- Г. г) уменьшение одышки
- Б. б) нормализация пульса
- А. а) восстановление сознания
- В. в) повышение АД

**Сестринский процесс включает следующие этапы**

- а) сестринское обследование и
- б) выявление проблем и потребности в уходе и
- в) планирование и выполнение сестринских вмешательств и
- г) оценка эффективности сестринских вмешательств и
- д) лечение заболеваний

**Из диеты у детей, больных геморрагическим васкулитом, исключают**

- В. в) сенсibiliзирующие продукты
- А. а) животные жиры
- Б. б) белковое питание
- Г. г) глюкозу и другие сахара



Соотнесите мероприятия профилактики ВБИ с объектами их проведения А) дезинфекция Б) стерилизация В) предстерилизационная очистка Г) дератизация Д) дезинсекция а) уничтожение вегетативных микроорганизмов на эпидемиологически значимых объектах больничной среды б) уничтожение всех микроорганизмов, в том числе, спор с изделий медицинского назначения в) удаление с изделий медицинского назначения биологических жидкостей, лекарственных средств, жировых загрязнений г) мероприятия в отношении грызунов- переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний д) мероприятий в отношении членистоногих насекомых - переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний

Аа, Бб, Вг, Гв, Дд

Ад, Бб, Вг, Гг, Да

Аб, Ба, Вв, Гг, Дд

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд

Установите соответствие между видом вскармливания и характером стула новорожденного 1. естественное 2. искусственное а) темно-коричневого цвета с гнилостным запахом б) ярко-желтого цвета с кислым запахом

1а, 2б

1б, 2а

Установите соответствие между видом ангины и симптомами 1. катаральная 2. лакунарная 3. фолликулярная а) гнойные налеты в криптах миндалин б) гноетечение из уха в) нагноение фолликулов миндалин г) "лающий" кашель д) гиперемия, отек миндалин

1в, 2бд, 3вд

1д, 2ад, 3вд

1б, 2ад, 3вг

1а, 2ад, 3вд

Установите соответствие между элементами крови и функцией 1. эритроциты 2. лейкоциты 3. тромбоциты а) гемостаз б) транспорт кислорода в) иммунная

1а, 2в, 3в

1а, 2в, 3б

1б, 2в, 3а

1в, 2б, 3а

Установите соответствие между видом стоматита и изменениями слизистой рта 1. молочница 2. афтозный а) грануляции б) белый творожный налет в) бело-желтые бляшки с красным ободком г) кровоизлияния

1а, 2г

1а, 2в

1б, 2в

1б, 2г

1б, 2а

**Установите соответствия между видами диабета и особенностями течения 1. инсулинозависимый 2. инсулинонезависимый а) наследственный фактор б) начало в раннем возрасте в) развитие быстрое г) развитие постепенное д) ожирение е) диетотерапия эффективна ж) инсулинотерапия необходима з) сахароснижающие средства эффективны**

1абвг, 2гжез

1абвд, 2гдез

1абвз, 2гдеж

1абвж, 2гдез

**Установите соответствие между видом гельминтоза и возбудителем 1. аскаридоз 2. энтеробиоз а) лямблии б) острицы в) трихинеллы г) аскариды**

1б, 2в

1г, 2а

1а, 2б

1г, 2б

**Особенностью диеты при сахарном диабете является**

Г. г) исключение из рациона мяса и рыбы

А. а) ограничение жидкости, белков и соли

Б. б) ограничение легкоусвояемых углеводов

В. в) исключение из рациона овощей и фруктов

**При метеоризме ребенку ставят**

Г. г) сифонную клизму

А. а) очистительную клизму

Б. б) газоотводную трубку

В. в) гипертоническую клизму

**Проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему острое респираторное заболевание можно разрешить после выздоровления не ранее, чем через**

А. а) 2 недели

Б. б) 1 месяц

В. в) 2 месяца

Г. г) 3 месяца

Д. д) 3,5 месяца

**Ведущий клинический симптом в диагностике пневмонии**

Б. б) ослабленное дыхание;

Г. г) многочисленные мелкопузырчатые хрипы;

А. а) одышка;

В. в) локальная крепитация;

Д. д) втяжение уступчивых мест грудной клетки.

**Обструктивным легочным заболеванием является**

- В. в) фиброзирующий альвеолит;
- А. а) экзогенный аллергический альвеолит;
- Г. г) бронхиальная астма;
- Б. б) эозинофильная пневмония;
- Д. д) хроническая пневмония.

**Частота дыханий в минуту у ребенка 1-го года составляет**

- Б. б) 20 – 25
- Г. г) 40 – 60
- А. а) 16 – 18
- В. в) 30 – 35

**Профилактика аскаридоза и трихоцефаллёза включает**

- Г. г) проветривание жилых помещений
- А. а) ежегодную диспансеризацию
- Б. б) правильную обработку овощей, фруктов, воды
- В. в) соблюдение диеты, питьевого режима

**Возбудителем афтозного стоматита являются**

- А. а) грибы
- Б. б) вирусы
- В. в) бактерии
- Г. г) простейшие

**Что следует сделать медицинской сестре при кровотечении из уха до осмотра врача**

- Г. г) промыть ухо с раствором марганцовки
- А. а) почистить ухо ватным тампоном
- В. в) ввести стерильный тампон в слуховой проход
- Б. б) закапать капли в ухо

**Оценка полученных результатов - это этап сестринского процесса**

- Г. г) пятый
- А. а) второй
- Б. б) третий
- В. в) четвертый

**Установите соответствие между этапами системы и процедурой обращения с медицинскими отходами А) - сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую деятельность Б)перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы В)обеззараживание/обезвреживание Г)транспортирование отходов с территории**

организации, образующей отходы Д) захоронение или уничтожение медицинских отходов а) Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо б) Процесс должен быть механизирован (тележки, лифты, подъемники, автокары и так далее) в) Не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами г) Мероприятия следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации д) производится транспортом специализированных организаций к месту последующего обезвреживания, размещения медицинских отходов е) с учетом единой централизованной системы санитарной очистки данной административной территории

Аа, Ав, Аг, Ба, Бб, Бв, Бг, Вв, Вг, Гв, Гд, Де

Аа, Ав, Аг, Бд, Бб, Бв, Бг, Ва, Вг, Гг, Гд, Дд

### **Основные принципы охраны здоровья граждан**

г) социальная защита в случае утраты здоровья

а) государственная гарантия и

б) приоритетность профилактических мер и

в) доступность медико-социальной помощи и

д) ответственность государственной власти и учреждений

### **Тактика медицинской сестры при приступе бронхиальной астмы у ребенка**

А) создать психоэмоциональный комфорт и

В) одно-двухкратная ингаляция бронхолитиков и

Д) вызвать врача

Б) парентеральное введение бронхолитиков

### **Планирование сестринского процесса при коклюше в спазмолитическом периоде**

контроль за суточным водным балансом

санация дыхательных путей от слизи и

аэротерапия и

обучение родителей первой помощи при приступе спазматического кашля и

обучить ингаляции с протеолитическими ферментами

### **Причиной экспираторной одышки является:**

Б. б) ларингит;

Г. г) трахеит;

А. а) фарингит;

В. в) бронхиальная обструкция;

Д. д) ничего из вышеперечисленного.

### **Грудной тип дыхания характерен для детей**

В. в) с 8 лет у мальчиков

А. а) до 1 года

Г. г) с 8 лет у девочек

Б. б) раннего возраста

**При хроническом гепатите ребенку назначают диету № 5 с**

- Б. б) дополнительным введением растительного белка
- А. а) дополнительным введением животного белка
- В. в) ограничением животного белка
- Г. г) ограничением растительного белка

**Количество мочеиспусканий у новорожденных детей в сутки составляет**

- В. в) 7 – 15 раз
- Г. г) 30 – 40 раз
- А. а) 10 – 20 раз
- Б. б) 20 - 25 раз

**Появление у детей одновременно с гематурией гипертензии, отеков характерно для**

- Б. б) цистита
- А. а) гломерулонефрита
- В. в) пиелонефрита
- Г. г) нефроптоза

**Злокачественное заболевание кроветворной ткани с первичной локализацией патологического процесса в костном мозге называется**

- Г. г) геморрагический васкулит
- А. а) гемофилия
- В. в) лейкоз
- Б. б) тромбоцитопеническая пурпура

**Элементы ухода при возникновении потницы исключают**

- А. а) воздушные ванны
- Б. б) лечебные ванны с крахмалом
- В. в) устранение перегревания
- Г. г) гигиенические ванны

**Миграционная фаза аскаридоза протекает под маской**

- Г. г) диспепсических расстройств
- Б. б) неврологических расстройств
- А. а) острого респираторного заболевания
- В. в) дизурических расстройств

**Постановка цели и планирование сестринских вмешательств по решению проблем больного ребенка - это этап сестринского процесса**

- Г. г) четвертый
- А. а) первый
- В. в) третий
- Б. б) второй

Соотнесите механизмы передачи инфекции с применяемыми средствами профилактики инфекционных заболеваний А) воздушно-капельный Б) алиментарный В) контактный Г) гемоконтактный а) используются маски, проветривание, недопущение скопления большого количества людей в помещении б) личная гигиена, мытье рук, продуктов питания, соблюдение правил приготовления пищи в) качественная дезинфекция объектов больничной среды г) максимально возможное применение ИМН однократного применения, качественная обработка ИМН многократного применения

Аб, Ба, Вв, Гг

Аа, Бб, Вв, Гг

Аа, Бб, Вг, Гв

Аг, Бб, Вв, Га

Соотнесите поражающие факторы и чрезвычайные ситуации А) взрыва Б) пожара В) ядерного взрыва а) ударная волна б) осколочные поля в) токсичные продукты горения, открытый огонь г) радиационное воздействие проникающей радиации и радиоактивного заражения д) тепловое воздействие светового излучения

Аа, Аб, Бв, Ва, Вг, Вд

Аа, Аб, Бв, Вв, Вд, Вб

Ав, Аа, Бв, Вг, Вб, Вд

Аб, Аа, Бв, Ва, Вв, Вд

Установите соответствие между потенциальными проблемами ребенка и причинами, связанными с нарушением питания 1. анемия 2. гипотрофия 3. ожирение 4. гиповитаминоз а) недостаточное употребление свежих овощей и фруктов б) увеличение калорийности пищи в) уменьшение калорийности пищи г) недостаток железodefицитных продуктов питания

1аг, 2б, 3в, 4а

1аг, 2в, 3а, 4б

1ав, 2г, 3б, 4а

1аг, 2в, 3б, 4а

Установите соответствие между заболеванием и его признаками 1. стенозирующий ларингит 2. пневмония а) грубый голос б) "бочкообразная" грудная клетка в) влажный кашель г) носогубный цианоз

1ав, 2вб

1аб, 2вг

1аг, 2вг

1аг, 2бг

Специальные занятия гимнастикой и массаж здоровому ребенку необходимо проводить

Г. г) с 2-х месяцев

А. а) с рождения

- В. в) с полутора месяцев
- Б. б) не нужны
- Д. д) с 6 месяцев

**Целесообразно применять для купирования развившегося приступа бронхиальной астмы**

- А. а) ингаляционные кортикостероиды;
- Г. г) бета-2-адреномиметики;
- Б. б) кромогликат;
- В. в) недокромил;
- Д. д) задитен.

**Антибиотики при ветряной оспе назначают**

- Б. б) при появлении гнойных осложнений;
- А. а) при тяжелой форме;
- В. в) при энцефалите;
- Г. г) с целью профилактики осложнений;
- Д. д) не назначают.

**Наиболее частой клинической формой пищевой аллергии у детей раннего возраста является:**

- В. в) нефротический синдром;
- Г. г) гастроинтестинальный синдром;
- Б. б) бронхообструктивный синдром;
- А. а) атопический дерматит;
- Д. д) крапивница и отек Квинке.

**Наиболее часто вызывают пищевую аллергию овощи**

- В. в) капуста цветная;
- А. а) кабачки;
- Д. д) томаты.
- Б. б) огурцы;
- Г. г) морковь;

**Причиной поллинозов является**

- Б. б) домашняя пыль
- А. а) пыльца растений
- В. в) пищевые продукты
- Г. г) вирусы

**При «розовой» гипертермии у ребенка медсестра поступит правильно, если**

- В. в) укутает одеялом ребенка
- Г. г) сделает до прихода врача инъекцию с анальгином
- Б. б) разотрет кожу спиртом и тепло укутает ребенка
- А. а) разденет ребенка и оботрет кожу полуспиртовым раствором

**Развитию кариеса зубов способствует избыток в диете пищевых компонентов, содержащих много**

- А. а) кальция;
- Б. б) сахара;
- В. в) жидкости;
- Г. г) поваренной соли;
- Д. д) жиров.

**К заболеваниям слезного аппарата относятся**

- Г. г) нистагм, амблиопия
- Б. б) блефарит, ячмень, халазион
- А. а) дакриоцистит, дакриоаденит
- В. в) миопия, гиперметропия

**Установите соответствие физиологического состояния новорожденного с признаками 1. мастит 2. желтуха 3. меконий 4. половой криз а) иктеричность кожи б) зеленый замазкообразный стул в) увеличение молочных желез г) кровянистые выделения из влагалища у девочек**

- 1в, 2а, 3г, 4б
- 1г, 2а, 3б, 4в
- 1в, 2а, 3б, 4г
- 1а, 2в, 3б, 4г

**Ребенка в возрасте 2-х лет можно считать часто болеющим, если**

- Д. д) острые респираторные заболевания отмечались 6 раз.
- А. а) острые заболевания в течение второго года жизни отмечались 7 раз;
- Б. б) обострения бронхиальной астмы наблюдались два раза в год и острые заболевания также два раза в год;
- В. в) на фоне рахита в стадии реконвалесценции отмечались острые заболевания три раза в течение 2-го года жизни;
- Г. г) у него имеется хронический отит с обострениями 3 раза в год;

**Установите соответствие между заболеванием и сроком изоляции заболевших 1. корь 2. ветряная оспа 3. эпидемический паротит 4. краснуха а) 4 дня с момента высыпания б) 7 дней в) 9 дней г) 10 дней**

- 1а, 2б, 3в, 4г
- 1в, 2г, 3а, 4а
- 1а, 2г, 3в, 4а
- 1а, 2г, 3в, 4б

**Наиболее частой причиной железодефицитной анемии у детей старшего возраста является**

- Г. г) авитаминоз;
- А. а) глистная инвазия;



- Б. б) нарушение всасывания железа;
- В. в) хроническая кровопотеря;
- Д. д) недостаточное поступление железа с пищей.

**Тактика медицинской сестры при угрозе стеноза гортани у ребенка вне лечебного учреждения включает**

- А. а) направление в поликлинику
- Б. б) срочную госпитализацию
- В. в) проведение оксигенотерапии
- Г. г) назначение физиотерапевтических процедур

**Наиболее важным методом диагностики пороков сердца является**

- А. а) общий анализ крови
- Б. б) ультразвуковое исследование сердца
- В. в) биохимический анализ крови
- Г. г) велоэргометрия

**Вакцинация БЦЖ противопоказана**

- Г. г) во всех указанных случаях;
- А. а) при врожденных ферментопатиях;
- Б. б) при иммунодефицитных состояниях;
- В. в) при наличии активного туберкулеза у других детей в семье;
- Д. д) при агаммаглобулинемии Bruton.

**Для синдрома внезапной смерти у детей характерно**

- Б. б) смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка;
- В. в) всегда обнаруживают конкретную причину смерти;
- А. а) синдром чаще встречается у детей старше 3 лет;
- Д. д) семейная предрасположенность к внезапной смерти.
- Г. г) всегда имеются клиничко-морфологические признаки незрелости;

**К функциям сестринского дела относят**

- а) укрепление здоровья и
- б) профилактика заболеваний и
- г) реабилитация пациентов и
- д) облегчение страданий и уход
- в) лечение заболеваний

**При лечении микоплазменной пневмонии целесообразно использовать**

- Б. б) макролиды;
- А. а) природные пенициллины;
- В. в) полусинтетические пенициллины;
- Г. г) цефалоспорины 1-го поколения;
- Д. д) аминогликозиды.

**Приоритетное действие медицинской сестры при первой стадии белой лихорадки у детей предполагает**

- А. а) холодный компресс на голову
- Г. г) тщательное укрытие ребенка
- Б. б) пузырь со льдом к голове
- В. в) банки на грудную клетку

**Назовите клинические симптомы сепсиса у новорожденных детей**

- Б. б) тяжелая сердечная недостаточность;
- В. в) гипертермия, угнетение сознания, диспепсические расстройства;
- А. а) наличие множества гнойных очагов;
- Г. г) нарушение терморегуляции, диспепсические расстройства, неврологические симптомы, нарушение свертываемости крови и ОЦК;
- Д. д) гипертермия, токсикоз.

**Наиболее информативным исследованием при гастрите является**

- В. в) УЗИ;
- Г. г) иридодиагностика;
- Б. б) рентгеноконтрастное исследование;
- А. а) эндоскопия с биопсией;
- Д. д) копрограмма.

**Частые кровотечения у мальчиков характерны для**

- В. в) гемолитической анемии
- А. а) тромбоцитопенической пурпуры
- Г. г) гемофилии
- Б. б) тромбоцитопатии

**Целями сестринского обследования ребенка является определение**

- а) потребности пациента в уходе и
- в) реакция ребенка на состояние своего здоровья и
- г) медико-санитарных потребностей и
- д) существующих и потенциальных проблем пациента со здоровьем
- б) основного и сопутствующего заболевания

**Установите соответствие между заболеванием и принципами ухода и тактики 1. конъюнктивит 2. молочница 3. пузырьчатка а) туалет глаз б) использовать стерильные пеленки в) изоляция в ДИО г) кипячение сосок д) обработка бутылок**

- 1а, 2гд, 3бв
- 1в, 2гд, 3ба
- 1б, 2гд, 3ав
- 1д, 2га, 3бв

**Программа реабилитации пациента с пиелонефритом включает следующие действия**

1. санация очагов хронической инфекции и
2. контроль за анализами мочи и
3. регулярное наблюдение урологом и
4. поддерживающая терапия уросептиками, фитотерапия

**Редко вызывает пищевую аллергию мука**

- А. а) гречневая;
- Д. д) соевая.
- Б. б) рисовая;
- В. в) овсяная;
- Г. г) манная;

**Заражение вирусным гепатитом В (ВГВ) возможно при**

- А. а) нанесении татуировки
- Б. б) укусе кровососущих насекомых
- В. в) употреблении недоброкачественной воды
- Г. г) употреблении недоброкачественных продуктов

**Системным инфекционно-аллергическим заболеванием соединительной ткани с преимущественным поражением сердца и сосудов является**

- Б. б) вегето-сосудистая дистония
- Г. г) гломерулонефрит
- А. а) приобретенный порок сердца
- В. в) ревматизм

**При контакте с детьми, инвазированными гельминтами, возможно заражение**

- Г. г) энтеробиозом
- А. а) аскаридозом
- Б. б) трихинеллёзом
- В. в) трихоцефаллёзом

**При пиелонефрите поражается**

- А. а) соединительная ткань почек
- В. в) чашечно-лоханочная система
- Б. б) клубочки почек
- Г. г) мочевой пузырь

**Установите соответствие между заболеванием и вакциной для профилактики 1. корь 2. дифтерия 3. коклюш 4. туберкулез 5. полиомиелит 6. эпидемический паротит а) БЦЖ б) АКДС в) АДС-М г) ОПВ д) ЖКВ е) ЖПВ**

- 1д, 2бв, 3б, 4а, 5г, 6е
- 1а, 2бв, 3б, 4в, 5г, 6е
- 1б, 2бв, 3д, 4а, 5г, 6а

**Соотнесите методы контроля профилактических мероприятий и способы их проведения**

**А) Бактериологический контроль стерильности изделий медицинского назначения**  
**Б) Контроль режимов стерилизации**  
**В) Эффективность стерилизации**  
**Г) контроль предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения**  
**Д)Контроль качества дезинфекции**

**а) проводят с использованием биологических индикаторов**  
**б) проводят с использованием химических индикаторов**  
**в) оценивается на основании результатов бактериологических исследований**  
**г) проводят постановку азопирамовой и фенолфталеиновой проб**  
**д)визуально**

Аа, Бб, Вв, Гг, Дв, Да, Да  
Аа, Бб, Вв, Гг, Дб, Дв, Дд  
Аа, Бб, Вг, Гв, Дб, Дв, Дд  
Аб, Ба, Вв, Гг, Дб, Дв, Дд

**Наиболее частыми источниками туберкулезной инфекции для человека являются домашние животные**

Г. г) лошади;  
А. а) козы;  
Б. б) крупный рогатый скот;  
В. в) свиньи;  
Д. д) собаки.

**Для максимального эффекта при анафилактическом шоке лекарственные препараты вводят**

А. а) внутримышечно  
Б. б) внутривенно  
В. в) подкожно  
Г. г) внутрикожно

**Целиакия**

Б. б) приводит за счет прогрессирующей бронхоэктазии к смерти;  
В. в) спонтанно излечивается после 2 года жизни;  
А. а) развивается в большинстве случаев в первые 3 месяца жизни;  
Г. г) сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника;  
Д. д) не сопровождается развитием вторичной лактазной недостаточности.

**Соотнесите механизмы и пути передачи инфекции**

**А) алиментарный (фекально-оральный)**  
**Б)воздушно-капельный**  
**В)контактный**  
**Г)гемоконтактный (через кровь)**  
**а) пищевой, водный**  
**б) капельный, пылевой**  
**в)Прямой контактный**  
**г)Половой**  
**д)Контактно-бытовой**  
**е) Гемотрансфузионный**  
**ж) Вертикальный**

Аа, Бб, Вв, Вг, Вд, Ге, Гж, Гз  
Аж, Бб, Вв, Вг, Вд, Ге, Га, Гз  
Аа, Бб, Вв, Вб, Ва, Ге, Гж, Гз  
Ав, Бб, Ва, Вг, Вд, Ге, Гж, Гз

**Установите соответствие между возрастом ребенка и суточным объемом пищи 1. от**

**2х до 6 недель 2. от 6 недель до 4 месяцев 3 от 5 до 6 месяцев 4. от 7 до 9 месяцев а)  
1/8 б) 1/7 в) 1/6 г) 1/5**

1а, 2в, 3б, 4г

1а, 2г, 3б, 4а

1г, 2в, 3б, 4а

1г, 2б, 3в, 4а

**Клиническими формами внутриутробной бактериальной инфекции могут быть**

Г. г) все перечисленные;

А. а) аспирационная пневмония;

Б. б) язвенно-некротический эзофагит, гастроэнтерит, перитонит;

В. в) гнойный лептоменингит, остеомиелит;

Д. д) сепсис.

**Ночью у ребенка, больного ОРВИ, появились лающий кашель, осиплость голоса, беспокойство, температура 38,0 С. Неотложное состояние, развившееся у ребенка**

Б. б) стенозирующий ларинготрахеит

А. а) гипертермический синдром

В. в) ларингоспазм

Г. г) приступ бронхиальной астмы

**Стул в виде «болотной тины» характерен для**

А. а) шигеллеза

В. в) сальмонеллеза

Б. б) эшерихиоза

**У детей реже встречается форма бронхиальной астмы**

Г. г) аспириновая астма;

А. а) атопическая;

Б. б) неатопическая;

В. в) астма напряжения;

Д. д) инфекционно-аллергическая.

**Основная причина физиологической желтухи новорожденного**

В. в) сгущение крови;

Г. г) холестааз;

А. а) гемолиз;

Б. б) недостаточная глюкуронизация;

Д. д) гипогликемия.

**Наиболее точно отражает состояние здравоохранения в стране**

В. в) количество врачей на душу населения;

А. а) уровень рождаемости;

Г. г) младенческая смертность;

Б. б) уровень смертности;

Д. д) детская смертность.

**При лечении свободной гипербилирубинемии у новорожденных детей наиболее эффективен метод**

- В. в) инфузионная терапия;
- Г. г) комбинация перечисленных методов;
- Б. б) лечение фенобарбиталом;
- А. а) фототерапия;
- Д. д) энтеросорбенты.

**Независимое сестринское вмешательство при обмороке предполагает**

- Г. г) уложить ребёнка с приподнятым изголовьем
- А. а) применить оксигенотерапию
- В. в) уложить ребёнка с приподнятыми ногами
- Б. б) применить горячие ручные ванны

**Какова приоритетная цель ухода за ребенком с обструктивным бронхитом**

- Б. б) восстановление аппетита
- Г. г) уменьшение головной боли
- А. а) нормализация температуры тела
- В. в) уменьшение одышки

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с острым гломерулонефритом после выписки из стационара могут быть**

2. диета с увеличением животного белка, жира
1. поощрять ребенка к самоконтролю, увеличению активности и
3. исключение калий-содержащих продуктов из диеты и
4. контроль за поддерживающей терапией и
5. научиться приемам психологической поддержки

**Типичной локализацией сыпи при краснухе является**

- Г. г) туловище, конечности с концентрацией элементов на стопах, кистях и вокруг суставов;
- Б. б) боковые поверхности туловища, внутренняя поверхность бедер, сгибательные поверхности конечностей;
- А. а) лицо, туловище, разгибательные поверхности конечностей, ягодицы;
- В. в) поэтапное распространение сыпи на лице, туловище, конечностях;
- Д. д) типичная локализация не характерна.

**Соотнесите методы дезинфекции со способами их проведения А) Физический Б) Химический В) Механический а) воздействие высокой температурой, паром под давлением, УФ излучением б) протирание дезраствором в) влажная уборка, стирка, мытье рук г) погружение в дезраствор д) орошение дезраствором**

- Аа, Бб, Бг, Бд, Вв
- Аб, Ба, Бг, Бд, Вв

Аа, Бв, Бг, Бд, Вб  
Ав, Бб, Бг, Бд, Ва

**При остром отите у детей применяют**

- А. а) горчичники
- Г. г) согревающий компресс на область уха
- Б. б) банки
- В. в) холодный компресс на область уха

**Проблемами ребенка грудного возраста с врожденным пороком сердца могут быть**

- В. в) нарушение сна
- А. а) снижение аппетита, плохая прибавка в весе
- Д. д) снижение аппетита, плохая прибавка в весе, бледность и одышка при кормлении грудью
- Б. б) повышение температуры тела
- Г. г) бледность и одышка при кормлении грудью

**Пупочная ранка в норме полностью эпителизируется**

- Г. г) на 2-м месяце жизни;
- А. а) к концу 1-й недели жизни;
- Б. б) к концу 2-й недели жизни;
- В. в) к концу 1-го месяца жизни;
- Д. д) на 3 месяце жизни.

**Ребенок 2-х лет внезапно закашлялся, посинел; кашель продолжался около 10-ти минут и больше не возобновлялся. На следующий день вновь появился кашель (неприступнообразный), большое количество сухих хрипов больше справа. Ваш предварительный диагноз**

- Г. г) все перечисленное;
- А. а) круп;
- В. в) инородное тело бронхов;
- Б. б) бронхиолит;
- Д. д) обструктивный бронхит.

**Соотнесите понятия медицины катастроф с их значением А) Чрезвычайная ситуация Б) медицинская сортировка В)обсервация Г)Стихийное бедствие Д) Катастрофа а) обстановка, сложившаяся на территории, акватории или объекте, при которой возникает угроза жизни и здоровья для группы людей, наносится материальный ущерб б) распределение пораженных на группы по принципу нуждающихся в однородных лечебно - профилактических и эвакуационных мероприятиях в) специально организуемое медицинское наблюдение за населением в очаге бактериологического поражения г) происшествия, связанные со стихийными явлениями на Земле и приведшие к разрушению биосферы, техносферы, гибели людей д) событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким**

**уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы**

Аг, Бб, Вв, Гд, Да

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд

Аа, Бв, Вб, Гг, Дд

Аб, Ба, Вв, Гг, Дд

**Установите соответствие характера кашля при пневмонии 1. пневмония у новорожденных 2. пневмония у старших детей а) лающий б) влажный в) приступообразный г) пена у рта без кашля**

1а, 2б

1а, 2в

1г, 2б

1г, 2в

**Установите соответствие между комой и ее признаками 1. кетоацидотическая 2. гипогликемическая а) яркий румянец, "ветчинный язык" б) сухость кожи в) влажная кожа г) острое развитие д) постепенное развитие е) дыхание Куссмауля ж) дыхание ровное спокойное з) тремор, судороги**

1бвдеж 2егжз

1абвг 2абжз

1абде 2вгжз

1абжз 2вгде

**Уровень резистентности организма ребенка определяется**

В. в) тяжестью острых заболеваний

Г. г) длительностью и тяжестью заболеваний

Б. б) кратностью острых респираторных заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру

А. а) кратностью острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру

Д. д) числом обострений хронических заболеваний

**Тактика медицинской сестры при обнаружении у новорожденного ребенка мелены**

Г. г) промыть желудок, вызвать врача

Б. б) провести гемостатическую терапию, вызвать врача

А. а) вызвать врача, пеленки с меленой сохранить

В. в) отсосать слизь, вызвать врача

**У детей для стимуляции секреции целесообразно использовать**

В. в) хлеб с водой;

Г. г) кофеин;

А. а) гистамин;

Б. б) мясной бульон;

Д. д) овощной отвар.



**Соотнесите особо опасные инфекции в России с путями передачи возбудителей А) чума Б) холера В) сибирская язва Г) натуральная оспа Д) желтая лихорадка Е) туляремия а) трансмиссивный б) алиментарный в) контактный г) воздушно-капельный д) вертикальный**

Аа, Ав, Аг, Бб, Вв, Гг, Гд, Да, Ев, Еб, Еа

Аа, Ав, Аг, Бд, Ва, Гг, Гв, Дб, Ев, Еб, Ед

**Установите соответствие между возрастом и числом дыханий у детей в минуту 1. новорожденный 2. 5 лет 3. 14 лет а) 16-18 б) 20-25 в) 30-35 г) 40-60 д) 60-80 д) 80-100**

1д, 2б, 3а

1в, 2б, 3а

1д, 2б, 3в

1д, 2б, 3д

**Здоровый ребенок начинает поворачиваться со спины на живот и сидеть при поддержке за руку в возрасте**

Б. б) 6 -7 месяцев;

А. а) 4 -5 месяцев;

В. в) 3 -4 месяцев;

Г. г) 5 -6 месяцев;

Д. д) 8-9 месяцев.

**Сестринские вмешательства при одышечно-цианотическом приступе у ребенка**

1. не менять вынужденного положения и

3. освободить от стесняющей одежды и

5. провести оксигенотерапию

2. положить ребенка на жесткое покрытие

4. ввести дигоксин

**Сестринский процесс при стоматитах**

взятие мазка из зева на флору у контактных

проведение оксигенотерапии

обучение правилам личной гигиены и

обработка полости рта по назначению врача и

обучение адекватному питанию

**Практически не встречается в раннем детском возрасте**

Г. г) абсцедирующая пневмония;

А. а) бронхопневмония;

В. в) лобарная пневмония;

Б. б) аспирационная пневмония;

Д. д) пневмоцистная пневмония.

**Основные пути передачи внутрибольничной инфекции**

- Г. г) через предметы ухода;
- Б. б) через продукты питания;
- А. а) через руки персонала;
- В. в) через белье;
- Д. д) через медицинский инструментарий.

**Наиболее часто ревматизм развивается у детей в возрасте**

- А. а) 1 - 3 лет
- В. в) 7 – 15 лет
- Б. б) 3 – 6 лет
- Г. г) 15 – 17 лет

**Для непереносимости фруктозы верны перечисленные положения, кроме**

- Б. б) сопровождается гипергликемией;
- А. а) заболевание связано с дефектом энзима печени;
- В. в) введение фруктозы вызывает быстрое ухудшение состояния;
- Г. г) больной отстает в психомоторном развитии;
- Д. д) лечебный эффект от применения лечебных смесей, не содержащих фруктозу.

**Сестринскими рекомендациями ребенку с пиелонефритом могут быть**

1. ограничение объема вводимой жидкости
2. тщательный туалет половых органов и
4. режим и
5. увеличение объема вводимой жидкости и
6. проведение противорецидивной терапии
3. обогащенные диеты углеводами, белком

**Диетотерапия при гломерулонефрите предусматривает**

- Б. б) обильное питье
- В. в) ограничение жидкости и соли
- А. а) повышенное содержание белка
- Д. д) ограничение жидкости и соли, введение калийсодержащих продуктов
- Г. г) введение калийсодержащих продуктов

**Соотнесите механизм действия отравляющих веществ с их действующим химическим веществом А) общеядовитое Б) нервно-паралитическое В) удушающее Г) кожно-нарывное а) Синильная кислота б) зарин в) фосген г) иприт д) люизит**

- Аа, Бб, Ва, Гд, Гг
- Аг, Бб, Вв, Гг, Га
- Аа, Бб, Вв, Гг, Гд
- Аа, Бб, Вд, Гг, Гв

**Соотнесите мероприятия профилактики ВБИ с объектами их проведения А) дезинфекция Б) стерилизация В) предстерилизационная очистка Г) дератизация Д)**

**дезинсекция а) уничтожение вегетативных микроорганизмов на эпидемиологически значимых объектах больничной среды б) уничтожение всех микроорганизмов, в том числе, спор с изделий медицинского назначения в) удаление с изделий медицинского назначения биологических жидкостей, лекарственных средств, жировых загрязнений г) мероприятия в отношении грызунов- переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний д) мероприятий в отношении членистоногих насекомых - переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний**

Ав, Ба, Вг, Гг, Дд

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд

Аа, Бб, Вв, Гг, Дв

Аа, Бб, Вг, Гг, Да

**В этиологии ревматизма ведущая роль принадлежит**

В. в) вирусам

Г. г) зеленым стрептококкам

А. а) золотистому стафилококку

Б. б)  $\beta$ -гемолитическому стрептококку группы А

**Соотнесите поражающие факторы и чрезвычайные ситуации А) взрыва Б) пожара В) ядерного взрыва а) ударная волна б) осколочные поля в) токсичные продукты горения, открытый огонь г) радиационное воздействие проникающей радиации и радиоактивного заражения д) тепловое воздействие светового излучения**

Аг, Аб, Бв, Вв, Вг, Вд

Аа, Ав, Бг, Ва, Вг, Вв

Аа, Аб, Бв, Ва, Вг, Вд

Аа, Аг, Ба, Ва, Вг, Вд

**Наиболее часто ревматизм развивается у детей в возрасте**

Г. г) 15 – 17 лет

А. а) 1 - 3 лет

В. в) 7 – 15 лет

Б. б) 3 – 6 лет

**Типичной локализацией сыпи при краснухе является**

Б. б) боковые поверхности туловища, внутренняя поверхность бедер, сгибательные поверхности конечностей;

А. а) лицо, туловище, разгибательные поверхности конечностей, ягодицы;

В. в) поэтапное распространение сыпи на лице, туловище, конечностях;

Г. г) туловище, конечности с концентрацией элементов на стопах, кистях и вокруг суставов;

Д. д) типичная локализация не характерна.

**Наиболее частой формой герпеса у старших детей и взрослых является**

Б. б) поражение кожи и слизистых;

- А. а) офтальмогерпес;
- В. в) стоматит;
- Г. г) энцефалит;
- Д. д) генерализованная форма.

**Лабораторная диагностика фенилкетонурии**

- Г. г) исследование крови на церуллооплазмин;
- А. а) проба на ацетон;
- Б. б) проба с треххлористым железом;
- В. в) исследование белковых фракций
- Д. д) содержание креатинфосфокиназы в крови и моче.

**Причиной относительно низкого АД у детей является**

- В. в) большой объем левого желудочка, широкие артерии
- Г. г) большой объем левого желудочка, узкие артерии
- Б. б) малый объем левого желудочка, узкие артерии
- А. а) малый объем левого желудочка, широкие артерии

**Из диеты у детей, больных геморрагическим васкулитом, исключают**

- А. а) животные жиры
- В. в) сенсibiliзирующие продукты
- Б. б) белковое питание
- Г. г) глюкозу и другие сахара

**Тактика медицинской сестры при угрозе стеноза гортани у ребенка вне лечебного учреждения включает**

- А. а) направление в поликлинику
- Б. б) срочную госпитализацию
- В. в) проведение оксигенотерапии
- Г. г) назначение физиотерапевтических процедур

**При подкожном введении инсулин всасывается быстрее при инъекции в**

- Б. б) плечо
- А. а) живот
- В. в) бедро
- Г. г) ягодицу

**Независимое сестринское вмешательство при обмороке предполагает**

- Б. б) применить горячие ручные ванны
- Г. г) уложить ребёнка с приподнятым изголовьем
- А. а) применить оксигенотерапию
- В. в) уложить ребёнка с приподнятыми ногами

**Препарат для оказания первой помощи при судорогах у ребенка**

- В. в) раствор седуксена

- А. а) раствор анальгина 50%
- Б. б) 3% раствор перекиси водорода
- Г. г) раствор супрастина

**При «розовой» гипертермии у ребенка медсестра поступит правильно, если**

- Г. г) сделает до прихода врача инъекцию с анальгином
- Б. б) разотрет кожу спиртом и тепло укутает ребенка
- А. а) разденет ребенка и оботрет кожу полуспиртовым раствором
- В. в) укутает одеялом ребенка

**Тактика медицинской сестры при обнаружении у новорожденного ребенка мелены**

- А. а) вызвать врача, пеленки с меленой сохранить
- Б. б) провести гемостатическую терапию, вызвать врача
- В. в) отсосать слизь, вызвать врача
- Г. г) промыть желудок, вызвать врача

**Для мокнущего пупка у новорожденных характерны**

- Б. б) отек и гиперемия вокруг пупочной ранки
- Г. г) отек и гиперемия пупочного кольца и гнойное отделяемое из пупочной ранки
- А. а) грибовидная опухоль на дне пупочной ранки
- В. в) серозное отделяемое из пупочной ранки

**Преджелтушный период при гепатите – это период**

- А. а) разгара
- В. в) продромальный
- Б. б) инкубационный
- Г. г) реконвалесценции

**Миграционная фаза аскаридоза протекает под маской**

- Б. б) неврологических расстройств
- А. а) острого респираторного заболевания
- В. в) дизурических расстройств
- Г. г) диспепсических расстройств

**Выполнение сестринских вмешательств по решению проблем больного ребенка - это этап сестринского процесса**

- В. в) третий
- А. а) первый
- Г. г) четвертый
- Б. б) второй

**Целями сестринского обследования ребенка является определение**

- А. а) потребности пациента в уходе и
- В. в) реакция ребенка на состояние своего здоровья и

- Г. г) медико-санитарных потребностей и
- Д. д) существующих и потенциальных проблем пациента со здоровьем
- Б. б) основного и сопутствующего заболевания

**Возникновение судорог у детей связано с**

- В. в) пониженной судорожной готовностью
- Г. г) высокой дифференциацией коры головного мозга
- Б. б) недостаточным кровоснабжением мозга
- А. а) предрасположенностью мозга к генерализованным реакциям

**У ребенка 10-ти лет боли в горле при глотании, температура 39,2 С, головные боли, налеты на миндалинах. Ваш предварительный диагноз**

- В. в) заглоточный абсцесс;
- Г. г) фарингит;
- Б. б) аденоидит;
- А. а) ангина;
- Д. д) паратонзиллярный абсцесс.

**Развитию кариеса зубов способствует избыток в диете пищевых компонентов, содержащих много**

- В. в) жидкости;
- Г. г) поваренной соли;
- А. а) кальция;
- Б. б) сахара;
- Д. д) жиров.

**Ребенка надо направлять к стоматологу**

- Г. г) при выявлении разрушения зубов;
- А. а) в возрасте 1 года;
- В. в) при выявлении факторов риска;
- Б. б) к моменту прорезывания первых зубов;
- Д. д) при выраженном рахите.

**Лечить косолапость необходимо обязательно с возраста**

- Б. б) 1 года;
- Г. г) 3-х лет;
- А. а) 6-ти месяцев;
- В. в) первых дней жизни;
- Д. д) 5 лет.

**Сестринский процесс при стоматитах**

- А. 1. обучение правилам личной гигиены и
- В. 3. обработка полости рта по назначению врача и
- Г. 4. обучение адекватному питанию
- Б. 2. проведение оксигенотерапии

- Д. 5. обеспечить покой, пролонгированный сон
- Е. 6. взятие мазка из зева на флору у контактных

**Редко вызывает пищевую аллергию мука**

- В. в) овсяная;
- А. а) гречневая;
- Д. д) соевая.
- Б. б) рисовая;
- Г. г) манная;

**После введения новорожденному ребенку вакцины БЦЖ в месте инъекции может появиться папула через**

- Б. б) 2-3 недели;
- Г. г) 2-3 месяца;
- А. а) 1 неделю;
- В. в) 4-6 недель;
- Д. д) 4-6 месяцев.

**Для непереносимости фруктозы верны перечисленные положения, кроме**

- Г. г) больной отстаёт в психомоторном развитии;
- А. а) заболевание связано с дефектом энзима печени;
- Б. б) сопровождается гипергликемией;
- В. в) введение фруктозы вызывает быстрое ухудшение состояния;
- Д. д) лечебный эффект от применения лечебных смесей, не содержащих фруктозу.

**Установите соответствие между потенциальными проблемами ребенка и причинами, связанными с нарушением питания**  
**1. анемия 2. гипотрофия 3. ожирение 4. гиповитаминоз**  
а) недостаточное употребление свежих овощей и фруктов  
б) увеличение калорийности пищи  
в) уменьшение калорийности пищи  
г) недостаток железodefицитных продуктов питания

- 1ав, 2а, 3б, 4а
- 1аг, 2в, 3б, 4а
- 1аг, 2в, 3а, 4б
- 1ав, 2г, 3б, 4а

**В рацион питания больных ревматизмом включают картофель, изюм, курагу и другие продукты, благодаря высокому содержанию**

- Г. г) йода
- А. а) кальция
- Б. б) калия
- В. в) натрия

**Наиболее важным методом диагностики пороков сердца является**

- А. а) общий анализ крови
- Б. б) ультразвуковое исследование сердца

- В. в) биохимический анализ крови
- Г. г) велоэргометрия

**Профилактика аскаридоза и трихоцефаллёза включает**

- А. а) ежегодную диспансеризацию
- Б. б) правильную обработку овощей, фруктов, воды
- В. в) соблюдение диеты, питьевого режима
- Г. г) проветривание жилых помещений

**Концентрационная способность почек у детей определяется результатом пробы**

- А. а) по Аддису-Каковскому
- Г. г) по Зимницкому
- Б. б) по Нечипоренко
- В. в) ортостатической

**Пупочная ранка в норме полностью эпителизируется**

- Г. г) на 2-м месяце жизни;
- А. а) к концу 1-й недели жизни;
- Б. б) к концу 2-й недели жизни;
- В. в) к концу 1-го месяца жизни;
- Д. д) на 3 месяце жизни.

**Выраженным цианозом сразу после рождения проявляется**

- Г. г) открытый артериальный проток;
- А. а) дефект межжелудочковой перегородки;
- В. в) транспозиция магистральных сосудов;
- Б. б) тетрада Фалло;
- Д. д) дефект межпредсердной перегородки.

**Назовите клинические симптомы сепсиса у новорожденных детей**

- В. в) гипертермия, угнетение сознания, диспепсические расстройства;
- А. а) наличие множества гнойных очагов;
- Г. г) нарушение терморегуляции, диспепсические расстройства, неврологические симптомы, нарушение свертываемости крови и ОЦК;
- Б. б) тяжелая сердечная недостаточность;
- Д. д) гипертермия, токсикоз.

**Основная причина физиологической желтухи новорожденного**

- Б. б) недостаточная глюкуронизация;
- А. а) гемолиз;
- В. в) сгущение крови;
- Г. г) холестааз;
- Д. д) гипогликемия.

**При «белой» гипертермии у детей отмечаются**



- Г. г) гиперемия кожных покровов
- А. а) мраморные кожные покровы
- Б. б) бледные кожные покровы
- В. в) холодные конечности

**Когда можно снять с диспансерного учета ребенка с хроническим отитом при отсутствии обострений**

- Б. б) через 2 года
- В. в) через 4 года
- А. а) через 1 год
- Г. г) с учета не снимать вообще

**Патология, встречающаяся при диспансеризации среди подростков**

- Б. б) привычный вывих
- А. а) плоскостопие
- В. в) вросший ноготь
- Г. г) гемофилия

**К заболеваниям слезного аппарата относятся**

- В. в) миопия, гиперметропия
- Г. г) нистагм, амблиопия
- Б. б) блефарит, ячмень, халазион
- А. а) дакриоцистит, дакриоаденит

**Выявление потребностей ребенка, удовлетворение которых нарушено, - это этап сестринского процесса**

- Г. г) четвертый
- А. а) первый
- Б. б) второй
- В. в) третий

**основными задачами концепции развития здравоохранения и медицины в РФ являются**

- А. А) увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний и
- Б. Б) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения и
- В. В) повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения и
- Г. Г) развитие государственного сектора в здравоохранении и
- Д. Д) повышение уровня квалификации медицинских работников

**сестринскими рекомендациями родителям по уходу за ребенком с врожденным пороком сердца могут быть**

- Г. 4. обеспечить обильным питьем
- А. 1. кормить часто, малыми порциями и
- Б. 2. избегать гиперопеки и

- В. 3. научиться оказывать помощь при одышно-цианотических приступах
- Д. 5. информировать о возможных причинах неблагоприятного исхода
- Е. 6. информировать о преимуществах лечения одного врача над другим

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с острым гломерулонефритом после выписки из стационара могут быть**

- А. 1. поощрять ребенка к самоконтролю, увеличению активности и
- В. 3. исключение калий-содержащих продуктов из диеты и
- Г. 4. контроль за поддерживающей терапией и
- Д. 5. научиться приемам психологической поддержки
- Б. 2. диета с увеличением животного белка, жира
- Е. 6. проводить плановую иммунопрофилактику

**Для синдрома внезапной смерти у детей характерно**

- А. а) синдром чаще встречается у детей старше 3 лет;
- Д. д) семейная предрасположенность к внезапной смерти.
- Б. б) смерть наступает в дневной период бодрствования ребенка;
- В. в) всегда обнаруживают конкретную причину смерти;
- Г. г) всегда имеются клиничко-морфологические признаки незрелости;

**Сестринскими рекомендациями ребенку с пиелонефритом могут быть**

- обогащенные диеты углеводами, белком
- ограничение объема вводимой жидкости
- тщательный туалет половых органов и
- режим и
- увеличение объема вводимой жидкости и
- проведение противорецидивной терапии

**Установите соответствие между заболеванием и его признаками 1. стенозирующий ларингит 2. пневмония а) грубый голос б) "бочкообразная" грудная клетка в) влажный кашель г) носогубный цианоз**

- 1бв, 2аг
- 1бг, 2ав
- 1аб, 2вг
- 1аг, 2вг

**Целями сестринского обследования ребенка является определение**

- б) основного и сопутствующего заболевания
- а) потребности пациента в уходе и
- в) реакция ребенка на состояние своего здоровья и
- г) медико-санитарных потребностей и
- д) существующих и потенциальных проблем пациента со здоровьем

**Установите соответствие между возрастом и числом дыханий у детей в минуту 1. новорожденный 2. 5 лет 3. 14 лет а) 16-18 б) 20-25 в) 30-35 г) 40-60 д) 60-80 е) 80-100**

1д, 2б, 3а

1д, 2б, 3а

1д, 2б, 3в

1д, 2б, 3е

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с энтеробиозом могут быть**

- б. добавить в диету острые блюда
2. обеспечить обильным питьем
1. проглаживание нательного и постельного белья и
3. спать укладывать ребенка в тугих трусиках и
4. коротко стричь ногти и
5. тщательный туалет промежности

**При контакте с детьми, инвазированными гельминтами, возможно заражение**

- А. а) аскаридозом
- Г. г) энтеробиозом
- Б. б) трихинеллёзом
- В. в) трихоцефаллёзом

**Системным инфекционно-аллергическим заболеванием соединительной ткани с преимущественным поражением сердца и сосудов является**

- Г. г) гломерулонефрит
- А. а) приобретенный порок сердца
- В. в) ревматизм
- Б. б) вегето-сосудистая дистония

**Количество мочеиспусканий у новорожденных детей в сутки составляет**

- А. а) 10 – 20 раз
- Б. б) 20 - 25 раз
- В. в) 7 – 15 раз
- Г. г) 30 – 40 раз

**Уменьшение мочеотделения – это**

- В. в) олигурия
- А. а) анурия
- Б. б) полиурия
- Г. г) поллакиурия

**Появление у детей одновременно с гематурией гипертензии, отеков характерно для**

- Б. б) цистита
- А. а) гломерулонефрита
- В. в) пиелонефрита
- Г. г) нефроптоза

**В клинической картине ботулизма обычно не наблюдается**

- А. а) расстройства зрения (туман перед глазами, двоение)
- Г. г) гепатолиенального синдрома
- Б. б) нарушение глотания
- В. в) расстройство дыхания
- Д. д) миастении

**Лечебное питание ребенка с пиелонефритом строится по принципу**

- А. а) молочно-растительной диеты с умеренным ограничением белка и соли
- Б. б) усиленного белкового питания
- В. в) бессолевой диеты
- Г. г) молочно-растительной диеты с ограничением сахара

**Маточные кровотечения у девочек старшего возраста отмечаются при**

- А. а) алиментарных анемиях
- В. в) тромбоцитопенической пурпуре
- Б. б) гемофилии
- Г. г) геморрагическом васкулите

**Наиболее часто вызывают пищевую аллергию**

- А. а) черника;
- Б. б) клубника;
- В. в) смородина;
- Г. г) крыжовник;
- Д. д) ежевика.

**У детей реже встречается форма бронхиальной астмы**

- Б. б) неатопическая;
- В. в) астма напряжения;
- А. а) атопическая;
- Г. г) аспириновая астма;
- Д. д) инфекционно-аллергическая.

**При анафилактическом шоке ребенка надо уложить**

- Б. б) на спину
- Г. г) с приподнятым изголовьем
- А. а) на живот
- В. в) на бок с приподнятыми ногами

**Ребенка перед оформлением в логопедическую группу направляют на консультацию к ЛОР-врачу с целью исключить**

- Г. г) ларингит
- А. а) острое заболевание
- В. в) понижение слуха
- Б. б) хронический тонзилит

**Жидкие лекарственные средства (настои, отвары) рекомендуется хранить в**

- Б. б) холодильнике при температуре ниже 0°C
- Г. г) темном месте при комнатной температуре
- А. а) морозильном отделении холодильника
- В. в) холодильнике при температуре +2 - +6 °C

**Ребенка надо приучать чистить зубы**

- Б. б) с 2-х лет;
- А. а) с момента прорезывания первых временных (молочных) зубов;
- В. в) после прорезывания всех временных (молочных) зубов;
- Г. г) ко времени поступления в школу;
- Д. д) с 5 лет.

**Этот симптом требует немедленной госпитализации ребенка в хирургический стационар**

- Б. б) жидкий стул повторно;
- Г. г) температура 38 С;
- А. а) повторная рвота;
- В. в) напряжение мышц живота;
- Д. д) обморок.

**Причиной приобретенного дакриоцистита является**

- В. в) непроходимость слезоносового канала
- А. а) атония круговой мышцы лица
- Б. б) рубцевые изменения век
- Г. г) аномалия развития слезных путей

**Приоритетное действие медицинской сестры при первой стадии белой лихорадки у детей предполагает**

- Б. б) пузырь со льдом к голове
- В. в) банки на грудную клетку
- А. а) холодный компресс на голову
- Г. г) тщательное укрытие ребенка

**Режим питания ребенка раннего возраста должен предусматривать**

- Г. г) до 8 приемов пищи в день
- Б. б) 3 приема пищи в день
- А. а) не менее 4 приемов пищи в день
- В. в) не ограниченное количество приемов пищи

**Механизм передачи инфекции при остром респираторном заболевании**

- Б. б) контактно-бытовой
- А. а) воздушно-капельный
- В. в) пищевой

Г. г) гематогенный

**Установите соответствие между видом вскармливания и характером стула новорожденного 1. естественное 2. искусственное а) темно-коричневого цвета с гнилостным запахом б) ярко-желтого цвета с кислым запахом**

1б, 2а

1а, 2б

**К физиологическим состояниям новорожденных относят**

В) везикулопустулез

А) мочекислый инфаркт и

Б) желтуха и

Г) гипертермия и

Е) эритема

Д) цианоз

**Установите соответствие периода детского возраста с продолжительностью и возрастом 1. интранатальный 2. новорожденности 3. внутриутробный 4. грудной 5. преддошкольный 6. младший школьный 7. подростковый 8. юношеский 9. дошкольный а) 38-40 недель б) от начала родовой деятельности до рождения ребенка в) 28 дней г) 1-12 месяцев д) 1-3 года е) 3-7 лет ж) 7-11 лет з) 12-16 лет и) 17-21 год**

1а, 2в, 3б, 4г, 5д, 6ж, 7з, 8и, 9е

1б, 2в, 3а, 4г, 5д, 6ж, 7з, 8и, 9е

1б, 2г, 3а, 4в, 5д, 6ж, 7з, 8и, 9е

1б, 2в, 3е, 4г, 5д, 6ж, 7з, 8и, 9а

**Сестринскими рекомендациями по диетотерапии ребенку с пиелонефритом могут быть**

ограничение поваренной соли и

прием минеральной воды и

увеличение молочно-кислых продуктов

ограничение жидкости

ограничение белка в диете

**Установите соответствие между заболеванием и его симптомами 1. потница 2. опрелости 3. псевдофурункулез а) мокнущие эрозии б) пузырьки с просыпанное зерно с прозрачным содержимым в) плотные инфильтраты г) страдает общее состояние д) яркая гиперимия кожи**

1б, 2аг, 3бг

1а, 2бд, 3вг

1а, 2ад, 3бв

1б, 2ад, 3вг

**Возбудителем афтозного стоматита являются**

- Г. г) простейшие
- А. а) грибы
- Б. б) вирусы
- В. в) бактерии

**При хроническом гепатите ребенку назначают диету № 5 с**

- Г. г) ограничением растительного белка
- Б. б) дополнительным введением растительного белка
- А. а) дополнительным введением животного белка
- В. в) ограничением животного белка

**При пиелонефрите поражается**

- А. а) соединительная ткань почек
- В. в) чашечно-лоханочная система
- Б. б) клубочки почек
- Г. г) мочевого пузыря

**Представителем условно-патогенной флоры, вызывающей кишечные инфекции у детей, не является**

- Г. г) стрептококк;
- А. а) клебсиелла;
- Б. б) протей;
- В. в) стафилококк;
- Д. д) гафний.

**Большинство серозных менингитов имеет этиологию**

- Б. б) гриппозную;
- В. в) туберкулезную;
- А. а) вирусно-бактериальную;
- Г. г) паротитную и энтеровирусную;
- Д. д) аденовирусную.

**Наиболее частой клинической формой пищевой аллергии у детей раннего возраста является:**

- А. а) атопический дерматит;
- Б. б) бронхообструктивный синдром;
- В. в) нефротический синдром;
- Г. г) гастроинтестинальный синдром;
- Д. д) крапивница и отек Квинке.

**При лечении микоплазменной пневмонии целесообразно использовать**

- В. в) полусинтетические пенициллины;
- Г. г) цефалоспорины 1-го поколения;
- А. а) природные пенициллины;
- Б. б) макролиды;

Д. д) аминогликозиды.

**Грудной тип дыхания характерен для детей**

- А. а) до 1 года
- Г. г) с 8 лет у девочек
- Б. б) раннего возраста
- В. в) с 8 лет у мальчиков

**Наиболее частыми источниками туберкулезной инфекции для человека являются домашние животные**

- Б. б) крупный рогатый скот;
- А. а) козы;
- В. в) свиньи;
- Г. г) лошади;
- Д. д) собаки.

**Типичными особенностями периода высыпания при кори являются следующие, кроме:**

- Б. б) пятнисто-папулезной сыпи с тенденцией к слиянию;
- А. а) появления сыпи на фоне нормальной температуры;
- В. в) этапности при появлении и угасании сыпи;
- Г. г) наличия катаральных явлений;
- Д. д) усиления токсикоза и лихорадки при появлении сыпи.

**Слабость, потливость, чувство голода, тремор конечностей наблюдается в начале развития**

- Г. г) гипогликемической комы
- А. а) уремической комы
- Б. б) печеночной комы
- В. в) гипергликемической комы

**При диарее и рвоте у ребенка медицинская сестра ставит целью ухода**

- Б. б) поддержать водно-электролитный баланс
- А. а) сохранить массу тела пациента
- В. в) предупредить развитие коллапса
- Г. г) предотвратить развитие гипоксии

**При каком хроническом заболевании уха показано наблюдение больного 4 раза в год**

- Б. б) хронический мезотимпанит
- А. а) хронический эптитимпанит
- В. в) рецидивирующий отит
- Г. г) кохлеарный неврит

**Здоровый ребенок начинает поворачиваться со спины на живот и сидеть при**



**поддержке за руку в возрасте**

- Г. г) 5 -6 месяцев;
- Б. б) 6 -7 месяцев;
- А. а) 4 -5 месяцев;
- В. в) 3 -4 месяцев;
- Д. д) 8-9 месяцев.

**Неотложной помощью при опухоли глазницы является**

- Б. б) срочная госпитализация
- В. в) применение антибиотиков
- А. а) применение антибиотиков, сульфаниламидов
- Г. г) амбулаторное лечение

**Установите соответствие между видом ангины и симптомами 1. катаральная 2. лакунарная 3. фолликулярная а) гнойные налеты в криптах миндалин б) гноетечение из уха в) нагноение фолликулов миндалин г) "лающий" кашель д) гиперемия, отек миндалин**

- 1б, 2гд, 3ад
- 1в, 2аб, 3вг
- 1а, 2бд, 3вд
- 1д, 2ад, 3вд

**Установите соответствие между периодами пневмонии и симптомами 1. начальный 2. разгара 3. выздоровления а) сухой кашель б) чихание в) пенистые выделения из рта г) улучшение общего состояния д) исчезновение клинических симптомов е) хрипы влажные, крепитирующие**

- 1абг, 2де, 3вд
- 1абд, 2ге, 3вд
- 1абв, 2ве, 3гд
- 1абг, 2бе, 3вб

**Наиболее частой причиной железодефицитной анемии у детей старшего возраста является**

- Б. б) нарушение всасывания железа;
- А. а) глистная инвазия;
- В. в) хроническая кровопотеря;
- Г. г) авитаминоз;
- Д. д) недостаточное поступление железа с пищей.

**Соотнесите изделия медицинского назначения с методами их обработки А) гидрофильные прокладки Б) тубусы многократного применения В) тубусы однократного применения Г) контактные кожные излучатели (электроды) Д)аэрозольные наконечники а) дезинфекция б) предстерилизационная очистка в) стерилизация**

- Аа, Ба, Бб, Бв, Ва, Га, Да, Дб, Дв

Аб, Ба, Бв, Ва, Га, Да, Дб, Дг

**Ребенка в возрасте 2-х лет можно считать часто болеющим, если**

Д. д) острые респираторные заболевания отмечались 6 раз.

А. а) острые заболевания в течение второго года жизни отмечались 7 раз;

Б. б) обострения бронхиальной астмы наблюдались два раза в год и острые заболевания также два раза в год;

В. в) на фоне рахита в стадии реконвалесценции отмечались острые заболевания три раза в течение 2-го года жизни;

Г. г) у него имеется хронический отит с обострениями 3 раза в год;

**Из отвлекающих процедур ребенку с приступом бронхиальной астмы медсестра порекомендует**

А. а) ручные и ножные горячие ванны

Б. б) общую горячую ванну

В. в) лечебную ванну с морской солью

Г. г) воздушную ванну

**Этиологическим лечением острого герпетического стоматита является**

А. а) полоскание полости рта растворами антисептиков;

Б. б) противовирусное лечение;

В. в) диета;

Г. г) антибактериальные препараты;

Д. д) жаропонижающие средства.

**Типичными клиническими проявлениями краснухи не являются**

Б. б) мелкопятнистая сыпь;

В. в) увеличение и болезненность заднешейных и затылочных лимфоузлов;

А. а) субфебрильная лихорадка, легкие катаральные явления;

Г. г) круп;

Д. д) одновременное развитие всех симптомов.

**Элементы ухода при возникновении потницы исключают**

Г. г) гигиенические ванны

А. а) воздушные ванны

Б. б) лечебные ванны с крахмалом

В. в) устранение перегревания

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с тромбоцитопенией могут быть**

А. 1. избегать приема антибиотиков и антиагрегантов и

Б. 2. санировать очаги хронической инфекции и

В. 3. гипоаллергенная диета с включением арахиса, шпината, крапивы, укропа и

Д. 5. повторные курсы фитотерапии

Г. 4. занятия физкультурой в основной группе

Е. 6. солнечная инсоляция

**Сестринскими рекомендациями по диетотерапии ребенку с пиелонефритом могут быть**

- А. 1. ограничение поваренной соли и
- Г. 4. прием минеральной воды и
- Д. 5. увеличение молочно-кислых продуктов
- Б. 2. ограничение жидкости
- В. 3. ограничение белка в диете

**Антибиотики при ветряной оспе назначают**

- Г. г) с целью профилактики осложнений;
- А. а) при тяжелой форме;
- Б. б) при появлении гнойных осложнений;
- В. в) при энцефалите;
- Д. д) не назначают.

**Наиболее часто вызывают пищевую аллергию овощи**

- А. а) кабачки;
- Д. д) томаты.
- Б. б) огурцы;
- В. в) капуста цветная;
- Г. г) морковь;

**Искусственное вскармливание ребенка первого года жизни тяжелой формой атопического дерматита целесообразно проводить**

- А. а) адаптированными смесями на основе коровьего молока;
- Д. д) высоко гидролизованными смесями.
- Б. б) соевыми смесями;
- В. в) смесями на основе частично гидролизованного белка сыворотки;
- Г. г) кисломолочными смесями;

**Диагноз муковисцидоза подтверждает**

- В. в) биопсия тонкого кишечника;
- А. а) рентгенограмма грудной клетки;
- Д. д) определение электролитов пота.
- Б. б) исследование костного мозга;
- Г. г) микроскопия осадка мочи;

**Практически не встречается в раннем детском возрасте**

- В. в) лobarная пневмония;
- А. а) бронхопневмония;
- Б. б) аспирационная пневмония;
- Г. г) абсцедирующая пневмония;
- Д. д) пневмоцистная пневмония.

## **Целиакия**

- В. в) спонтанно излечивается после 2 года жизни;
- А. а) развивается в большинстве случаев в первые 3 месяца жизни;
- Г. г) сопровождается характерной атрофией ворсинок тонкого кишечника;
- Б. б) приводит за счет прогрессирующей бронхоэктазии к смерти;
- Д. д) не сопровождается развитием вторичной лактазной недостаточности.

**Установите соответствие между элементами крови и функцией 1. эритроциты 2. лейкоциты 3. тромбоциты а) гемостаз б) транспорт кислорода в) иммунная**

1а, 2в, 3б

1б, 2а, 3в

1а, 2в, 3в

1б, 2в, 3а

**Соотнесите отравляющие вещества с механизмом их действия А) Синильная кислота Б) зарин В) фосген Г) иприт Д) люизит а)общееядовитое б) нервно-паралитическое в) удушающее г) кожно-нарывного**

Аа, Бв, Ва, Гб, Дб

Ад, Бг, Вв, Гг, Дг

Аа, Бб, Вв, Гг, Дг

Аа, Ба, Вв, Гг, Да

**Соотнесите виды ЧС с причиненным ущербом А) локальные Б)местные В)территориальные Г) региональные Д) федеральные а)пострадало не более 10 человек, зона ЧС не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения б)пострадало свыше 10, но не более 50 человек, зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района в)пострадало от 50 до 500 человек, зона ЧС не выходит за пределы субъекта Российской Федерации г)пострадало от 50 до 500 человек, зона ЧС охватывает территорию двух субъектов РФ д)пострадало свыше 500 человек, ЧС зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух субъектов РФ или выходит за их пределы**

Аа, Бб, Вв, Гв, Дв

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд

Аа, Бб, Вв, Га, Да

Ав, Бг, Вв, Гг, Дд

**Самым характерным проявлением гемофилии, являющимся наиболее частой причиной инвалидизации у детей**

Б. б) гемартрозы

А. а) кровоизлияние в мозг

В. в) гемоторакс

Г. г) геморрагическая сыпь

**Характерным симптомом эпидемического паротита не является**

- А. а) лихорадка;
- Д. д) ангина.
- Б. б) увеличение околоушных слюнных желез;
- В. в) увеличение подчелюстных слюнных желез;
- Г. г) боли в животе;

**Приоритетной причиной развития сахарного диабета у детей является**

- Б. б) генетическая предрасположенность
- А. а) эмоциональные стрессы
- В. в) вирусные инфекции
- Г. г) перекармливание

**Вакцинация БЦЖ противопоказана**

- Б. б) при иммунодефицитных состояниях;
- В. в) при наличии активного туберкулеза у других детей в семье;
- А. а) при врожденных ферментопатиях;
- Г. г) во всех указанных случаях;
- Д. д) при агаммаглобулинемии Bruton.

**При обмороке необходимо**

- Г. г) уложить на живот
- А. а) придать положение с возвышенным изголовьем
- Б. б) уложить ребенка с приподнятыми ногами
- В. в) усадить ребенка

**Медицинская сестра заподозрит развитие ларингоспазма у ребенка 1,5 лет по следующим симптомам**

- Г. г) судороги конечностей
- Б. б) лающий кашель, осиплость голоса
- А. а) беспокойство, вдох со звуком с кратковременным апноэ
- В. в) появление пенистых выделений изо рта

**Что следует сделать медицинской сестре при кровотечении из уха до осмотра врача**

- Г. г) промыть ухо с раствором марганцовки
- А. а) почистить ухо ватным тампоном
- В. в) ввести стерильный тампон в слуховой проход
- Б. б) закапать капли в ухо

**К физиологическим состояниям новорожденных относят**

- А. А) мочекишный инфаркт и
- Б. Б) желтуха и
- Г. Г) гипертермия и
- Е. Е) эритема
- В. В) везикулопустулез

Д. Д) цианоз

**Сестринскими рекомендациями ребенку с пиелонефритом могут быть**

- А. 1. ограничение объема вводимой жидкости
- Б. 2. тщательный туалет половых органов и
- Г. 4. режим "\"принудительного\" мочеиспускания и
- Д. 5. увеличение объема вводимой жидкости и
- Е. 6. проведение противорецидивной терапии
- В. 3. обогащенные диеты углеводами, белком

**Гибель недоношенных детей в раннем неонатальном периоде наиболее часто вызывают**

- Б. б) асфиксия и пневмопатии;
- А. а) родовая травма;
- В. в) инфекции;
- Г. г) врожденные пороки развития;
- Д. д) сепсис.

**Ведущий клинический симптом в диагностике пневмонии**

- В. в) локальная крепитация;
- А. а) одышка;
- Б. б) ослабленное дыхание;
- Г. г) многочисленные мелкопузырчатые хрипы;
- Д. д) втяжение уступчивых мест грудной клетки.

**Тактика медицинской сестры при обнаружении у новорожденного ребенка омфалита**

- Г. г) перевод ребенка в отделение патологии новорожденных
- Б. б) вызов врача, обработка пупочной ранки
- А. а) вызов врача, изоляция ребенка
- В. в) изоляция ребенка, обработка пупочной ранки

**Малая хорея возникает при ревматическом поражении**

- В. в) кожи
- Г. г) дыхательной системы
- Б. б) костно-мышечной системы
- А. а) центральной нервной системы

**Анафилактический шок у детей наиболее часто развивается после введения**

- В. в) препаратов железа
- Г. г) препаратов кальция
- Б. б) витаминов
- А. а) антибиотиков

**Наличие изжоги свидетельствует о**

- В. в) диафрагмальной грыже;
- Г. г) язвенной болезни желудка;
- Б. б) повышение кислотности желудочного содержимого;
- А. а) забросе желудочного содержимого в пищевод;
- Д. д) гастродуодените.

**Наиболее частым осложнением язвенной болезни у детей является**

- В. в) пенетрация в поджелудочную железу;
- Г. г) малигнизация;
- Б. б) перфорация;
- А. а) кровотечение;
- Д. д) непроходимость.

**Частые кровотечения у мальчиков характерны для**

- В. в) гемолитической анемии
- А. а) тромбоцитопенической пурпуры
- Г. г) гемофилии
- Б. б) тромбоцитопатии

**У ребенка с ограниченным нейродермитом прививки можно начинать от начала ремиссии не ранее чем через**

- А. а) 1 месяц
- Б. б) 2 месяца от начала ремиссии
- В. в) 3 месяца от начала ремиссии
- Г. г) 6 месяцев от начала ремиссии
- Д. д) 1 год от начала ремиссии

**Введение прикорма ребенку с пищевой аллергией рекомендуется в возрасте**

- В. в) 2-х месяцев;
- Г. г) 4-х месяцев.
- А. а) 10 месяцев;
- Б. б) 6 месяцев;

**Для бронхиальной астмы не характерен признак**

- В. в) гиперпродукция вязкой прозрачной мокроты;
- Г. г) рассеянные непостоянные сухие, свистящие хрипы;
- А. а) приступы бронхоспазма с экспираторной одышкой;
- Б. б) повышение хлоридов в поте и моче;
- Д. д) жесткое дыхание.

**При метеоризме ребенку ставят**

- Г. г) сифонную клизму
- А. а) очистительную клизму
- Б. б) газоотводную трубку
- В. в) гипертоническую клизму

**Количество водного раствора лекарственного средства в 1 чайной ложке**

- Г. г) 15мл
- А. а) 1мл
- Б. б) 5мл
- В. в) 10мл

**Оценка полученных результатов - это этап сестринского процесса**

- Г. г) пятый
- А. а) второй
- Б. б) третий
- В. в) четвертый

**Соотнесите механизмы и пути передачи инфекции А) алиментарный (фекально-оральный) Б)воздушно-капельный В)контактный Г)гемоконтактный (через кровь) а) пищевой, водный б) капельный, пылевой в)Прямой контактный г)Половой д)Контактно-бытовой е) Гемотрансфузионный ж) Вертикальный**

- Аг, Бб, Вб, Вг, Вд, Ге, Гж, Га
- Аа, Бб, Вв, Вг, Вд, Ге, Гж, Гз

**Какова причина затруднения дыхания при остром рините у детей**

- Г. г) атрофия слизистой, гиперсекреция мокроты
- Б. б) отек слизистой, гиперсекреция мокроты
- А. а) отек слизистой, гиперсекреция слизи
- В. в) атрофия слизистой, гиперсекреция слизи

**Проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему острое респираторное заболевание можно разрешить после выздоровления не ранее, чем через**

- Г. г) 3 месяца
- Б. б) 1 месяц
- А. а) 2 недели
- В. в) 2 месяца
- Д. д) 3,5 месяца

**Клиническими формами внутриутробной бактериальной инфекции могут быть**

- Г. г) все перечисленные;
- А. а) аспирационная пневмония;
- Б. б) язвенно-некротический эзофагит, гастроэнтерит, перитонит;
- В. в) гнойный лептоменингит, остеомиелит;
- Д. д) сепсис.

**Стул в виде «болотной тины» характерен для**

- В. в) сальмонеллеза
- А. а) шигеллеза



Б. б) эшерихиоза

**Постановка цели и планирование сестринских вмешательств по решению проблем больного ребенка - это этап сестринского процесса**

В. в) третий

А. а) первый

Б. б) второй

Г. г) четвертый

**Оптимальные сроки назначения антибиотиков при пневмонии до**

А. а) нормализации температуры;

Б. б) полного рассасывания инфильтрата в легком;

В. в) нормализации СОЭ;

Г. г) 4-5 дней стойкой нормальной температуры тела;

Д. д) ликвидации токсикоза.

**Установите соответствие между этапами системы и процедурой обращения с медицинскими отходами А) - сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую деятельность Б)перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы В)обеззараживание/обезвреживание Г)транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы Д)захоронение или уничтожение медицинских отходов а)Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо б)Процесс должен быть механизирован (тележки, лифты, подъемники, автокары и так далее) в)Не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами г)мероприятия следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации д)производится транспортом специализированных организаций к месту последующего обезвреживания, размещения медицинских отходов е) с учетом единой централизованной системы санитарной очистки данной административной территории**

Аа, Ав, Аг, Ба, Бб, Бв, Бг, Вв, Вг, Гв, Гд, Де

Аб, Ав, Аг, Бб, Бб, Бв, Бг, Вб, Вг, Гв, Гд, Да

**Установите соответствие физиологического состояния новорожденного с признаками 1. мастит 2. желтуха 3. меконий 4. половой криз а) иктеричность кожи б) зеленый замазкообразный стул в) увеличение молочных желез г) кровянистые выделения из влагалища у девочек**

1б, 2а, 3в, 4г

1а, 2б, 3в, 4г

1в, 2а, 3б, 4г

1в, 2г, 3б, 4а

**Для максимального эффекта при анафилактическом шоке лекарственные препараты вводят**

- Б. б) внутривенно
- А. а) внутримышечно
- В. в) подкожно
- Г. г) внутрикожно

**У детей для стимуляции секреции целесообразно использовать**

- В. в) хлеб с водой;
- Г. г) кофеин;
- А. а) гистамин;
- Б. б) мясной бульон;
- Д. д) овощной отвар.

**Сыпь при ветряной оспе в течение болезни меняется следующим образом**

- В. в) пятно – пузырек – гнойничок – рубчик
- Г. г) пузырек – папула – корочка
- Б. б) пятно – пузырек – корочка
- А. а) пятно – папула – пузырек – корочка

**Медицинская сестра поступит правильно, если помощь ребенку при судорогах начнет с**

- Б. б) предотвращения западания языка и дачи кислорода
- А. а) искусственного дыхания и непрямого массажа сердца
- В. в) обеспечения возвышенного положения головы
- Г. г) введением седуксена до прихода врача

**Планирование сестринского процесса при коклюше в спазмолитическом периоде**

1. санация дыхательных путей от слизи и
2. аэротерапия и
4. обучение родителей помощи при приступе спазматического кашля и
6. обучить ингаляции с протеолитическими ферментами и
7. обеспечить гомогенной пищей
3. туалет кожи, слизистых
5. контроль за суточным водным балансом

**Причиной экспираторной одышки является:**

- Б. б) ларингит;
- Г. г) трахеит;
- А. а) фарингит;
- В. в) бронхиальная обструкция;
- Д. д) ничего из вышеперечисленного.

**Целесообразно применять для купирования развившегося приступа бронхиальной астмы**

- А. а) ингаляционные кортикостероиды;
- Г. г) бета-2-адреномиметики;

- Б. б) кромогликат;
- В. в) недокромил;
- Д. д) задитен.

**Установите соответствие между заболеванием и принципами ухода и тактики 1. конъюнктивит 2. молочница 3. пузырьчатка а) туалет глаз б) использовать стерильные пеленки в) изоляция в ДИО г) кипячение сосок д) обработка бутылок**

- 1а, 2гд, 3бв
- 1в, 2гб, 3вб
- 1г, 2вг, 3ав
- 1б, 2вд, 3гв

**Анализ мочи по Нечипоренко собирают**

- Г. г) в течение суток через каждые 3 часа
- А. а) утром после туалета промежности в чистую посуду
- В. в) после туалета промежности, в чистую посуду, среднюю порцию струи мочи
- Б. б) в течении 3 часов в одну банку

**Причиной срыгивания у грудных детей является**

- Д. д) все перечисленное.
- А. а) незрелость эзофагокардиального отдела пищевода;
- Б. б) высокий тонус желудка в пилорическом отделе;
- В. в) высокое внутрибрюшное давление;
- Г. г) непостоянные расслабления нижнего пищеводного сфинкса;

**К врожденным порокам сердца, протекающим с цианозом, относится**

- А. а) дефект межпредсердной перегородки
- Г. г) «тетрада Фалло»
- Б. б) дефект межжелудочковой перегородки
- В. в) открытый артериальный проток

**В каких случаях допустимо лечение острой пневмонии в домашних условиях**

- В. в) неосложненная форма пневмонии у ребенка 4 лет;
- А. а) неосложненная форма у ребенка в возрасте до 1 года;
- Б. б) пневмония, осложненная кардиоваскулярным синдромом;
- Г. г) пневмония у ребенка из социально неблагополучной семьи;
- Д. д) затяжное течение пневмонии с ателектазом одного сегмента у ребенка 7 лет.

**При лечении свободной гипербилирубинемии у новорожденных детей наиболее эффективен метод**

- А. а) фототерапия;
- Б. б) лечение фенобарбиталом;
- В. в) инфузионная терапия;
- Г. г) комбинация перечисленных методов;
- Д. д) энтеросорбенты.

**Внебольничную пневмонию у детей в возрасте старше 5 лет чаще вызывают**

- В. в) пневмококки;
- А. а) стафилококки;
- Б. б) пневмоцисты;
- Г. г) грибы;
- Д. д) микоплазмы.

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с тромбоцитопенией могут быть**

избегать приема антибиотиков и антиагрегантов и  
санировать очаги хронической инфекции и  
гипоаллергенная диета с включением арахиса, шпината, крапивы, укропа и  
повторные курсы фитотерапии  
занятия физкультурой в основной группе  
солнечная инсоляция

**Соотнесите механизм действия отравляющих веществ с их действующим химическим веществом А) общеядовитое Б) нервно-паралитическое В) удушающее Г) кожно-нарывное а) Синильная кислота б) зарин в) фосген г) иприт д) люизит**

- Аа, Бв, Вг, Га, Гд
- Ав, Бб, Вв, Гг, Га
- Аа, Бб, Вв, Гг, Гд
- Аа, Ба, Вв, Гд, Гв

**Соотнесите методы дезинфекции со способами их проведения А) Физический Б) Химический В) Механический а) воздействие высокой температурой, паром под давлением, УФ излучением б) протирание дезраствором в) влажная уборка, стирка, мытье рук г) погружение в дезраствор д) орошение дезраствором**

- Аа, Бб, Ба, Бв, Вг
- Аа, Бб, Бг, Бд, Вв
- Аг, Бб, Ба, Бд, Вб
- Ав, Ба, Бг, Бд, Вг

**Причиной поллинозов является**

- В. в) пищевые продукты
- Г. г) вирусы
- Б. б) домашняя пыль
- А. а) пыльца растений

**Вторичная антибактериальная профилактика ревматизма проводится**

- Б. б) бициллином-5
- А. а) пенициллином
- В. в) вольтареном
- Г. г) гентамицином

**Для врожденного гипотиреоза не характерно**

- Б. б) пролонгированная желтуха;
- В. в) склонность к гипотермии;
- А. а) макроглоссия;
- Г. г) преждевременное закрытие большого родничка;
- Д. д) запор.

**Медицинская сестра поступит правильно, если оказание неотложной помощи новорожденному с асфиксией начнет с**

- В. в) отсасывания слизи из верхних дыхательных путей
- А. а) проведения оксигенотерапии
- Б. б) проведения ИВЛ
- Г. г) непрямого массажа сердца

**Для острого аппендицита не характерно**

- В. в) температура в первые часы болезни невысокая, повышается по мере прогрессирования болезни;
- Г. г) напряжение мышц и боль в правой подвздошной области отчетливо выявляются во время сна;
- А. а) "расхождение" частоты пульса и температуры (температура 37,6 С, пульс - 130 в минуту);
- Б. б) головная боль;
- Д. д) рвота.

**Срок карантина при кори**

- В. в) 21 день
- А. а) 7 дней
- Б. б) 14 дней
- Г. г) 30 дней

**Проблемами ребенка грудного возраста с врожденным пороком сердца могут быть**

- В. в) нарушение сна
- А. а) снижение аппетита, плохая прибавка в весе
- Д. д) снижение аппетита, плохая прибавка в весе, бледность и одышка при кормлении грудью
- Б. б) повышение температуры тела
- Г. г) бледность и одышка при кормлении грудью

**Диетотерапия при гломерулонефрите предусматривает**

- Д. д) ограничение жидкости и соли, введение калийсодержащих продуктов
- А. а) повышенное содержание белка
- Б. б) обильное питье
- В. в) ограничение жидкости и соли

Г. г) введение калийсодержащих продуктов

**При остром отите у детей применяют**

Г. г) согревающий компресс на область уха

А. а) горчичники

Б. б) банки

В. в) холодный компресс на область уха

**Уровень резистентности организма ребенка определяется**

А. а) кратностью острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру

Б. б) кратностью острых респираторных заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру

В. в) тяжестью острых заболеваний

Г. г) длительностью и тяжестью заболеваний

Д. д) числом обострений хронических заболеваний

**Препарат для оказания первой помощи при носовом кровотечении**

А. а) раствор анальгина 25%

Б. б) 3% раствор перекиси водорода

В. в) раствор седуксена

Г. г) раствор супрастина

**В питании больных анемией ограничивают содержание**

Б. б) фруктов, овощей

А. а) коровьего молока, злаковых продуктов

В. в) мясных и рыбных блюд

Г. г) жидкости и соли

**Наиболее точно отражает состояние здравоохранения в стране**

В. в) количество врачей на душу населения;

А. а) уровень рождаемости;

Г. г) младенческая смертность;

Б. б) уровень смертности;

Д. д) детская смертность.

**Обструктивным легочным заболеванием является**

Б. б) эозинофильная пневмония;

В. в) фиброзирующий альвеолит;

А. а) экзогенный аллергический альвеолит;

Г. г) бронхиальная астма;

Д. д) хроническая пневмония.

**Какова приоритетная цель ухода за ребенком с обструктивным бронхитом**

А. а) нормализация температуры тела

- В. в) уменьшение одышки
- Б. б) восстановление аппетита
- Г. г) уменьшение головной боли

**Приоритетная цель сестринских вмешательств при обмороке у ребенка**

- А. а) восстановление сознания
- Б. б) нормализация пульса
- В. в) повышение АД
- Г. г) уменьшение одышки

**Особенностью диеты при сахарном диабете является**

- В. в) исключение из рациона овощей и фруктов
- Г. г) исключение из рациона мяса и рыбы
- А. а) ограничение жидкости, белков и соли
- Б. б) ограничение легкоусвояемых углеводов

**При приступе ларингоспазма независимое сестринское вмешательство – приготовить всё необходимое для внутримышечного введения раствора**

- Г. г) седуксена
- А. а) адреналина
- Б. б) анальгина
- В. в) пенициллина

**Основные пути передачи внутрибольничной инфекции**

- Б. б) через продукты питания;
- А. а) через руки персонала;
- В. в) через белье;
- Г. г) через предметы ухода;
- Д. д) через медицинский инструментарий.

**Установите элементы развития сыпи при ветряной оспе**

1. везикула и
2. папула и
3. макула и
4. корочка и
5. рубчик

**Специальные занятия гимнастикой и массаж здоровому ребенку необходимо проводить**

- А. а) с рождения
- В. в) с полутора месяцев
- Б. б) не нужны
- Г. г) с 2-х месяцев
- Д. д) с 6 месяцев

**Ночью у ребенка, больного ОРВИ, появились лающий кашель, осиплость голоса, беспокойство, температура 38,0 С. Неотложное состояние, развившееся у ребенка**

Б. б) стенозирующий ларинготрахеит

А. а) гипертермический синдром

В. в) ларингоспазм

Г. г) приступ бронхиальной астмы

**Установите соответствие между возрастом ребенка и суточным объемом пищи**  
1. от 2х до 6 недель 2. от 6 недель до 4 месяцев 3 от 5 до 6 месяцев 4. от 7 до 9 месяцев а) 1/8 б) 1/7 в) 1/6 г) 1/5

1г, 2в, 3а, 4б

1в, 2г, 3б, 4а

1а, 2в, 3б, 4г

1г, 2в, 3б, 4а

**Ребенку с декомпенсированным пороком сердца, находящемуся на строгом постельном режиме, полную санитарную обработку можно заменить**

В. в) гигиенической ванной

А. а) лечебной ванной

Г. г) обтиранием тела и подмыванием в постели

Б. б) душем

**Каково приоритетное действие медицинской сестры при выделении у ребенка гнойной мокроты**

В. в) поставить банки, горчичники

А. а) провести оксигенотерапию

Г. г) обеспечить индивидуальной плевательницей

Б. б) провести оксигенотерапию через пеногасители

**Длительность применения сосудосуживающих капель в нос до**

Б. б) 7 дней

А. б) 1 недели

В. в) 10 дней

Г. г) 1 месяца

**Соотнесите методы контроля профилактических мероприятий и способы их проведения**  
А) Бактериологический контроль стерильности изделий медицинского назначения  
Б) Контроль режимов стерилизации  
В) Эффективность стерилизации  
Г) контроль предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения  
Д)Контроль качества дезинфекции  
а) проводят с использованием биологических индикаторов  
б) проводят с использованием химических индикаторов  
в) оценивается на основании результатов бактериологических исследований  
г) проводят постановку азопирамовой и фенолфталеиновой проб  
д)визуально  
Аа, Бб, Вв, Гг, Дб, Дв, Дд



Аб, Бб, Ва, Гг, Дб, Дв, Да

**Для коклюша не типично**

- Г. г) выделение вязкой мокроты;
- Б. б) одутловатость лица;
- А. а) гипертермия;
- В. в) толчкообразный кашель с судорожным вдохом;
- Д. д) рвота при кашле.

**Установите последовательность действий медсестры во время приступа бронхиальной астмы**

- А. 1. дать увлажняющий кислород и
- Б. 2. сделать горячие ножные и ручные ванны и
- В. 3) дать щелочное питье и
- Г. 4) уложить с приподнятым головным концом и
- Д. 5) дать ингалятор

**Тактика медицинской сестры при приступе бронхиальной астмы у ребенка**

- Б) парентеральное введение бронхолитиков
- А) создать психоэмоциональный комфорт и
- В) одно-двухкратная ингаляция бронхолитиков и
- Д) вызвать врача

**Возникновению срыгиваний у новорожденных детей, находящихся на грудном вскармливании способствуют**

- Г. г) все перечисленные;
- А. а) короткий пищевод;
- Б. б) недостаточное развитие кардиального отдела желудка;
- В. в) относительный гипертонус пилорического отдела желудка;
- Д. д) физиологический дефицит ферментов.

**Наиболее информативным исследованием при гастрите является**

- В. в) УЗИ;
- Г. г) иридодиагностика;
- Б. б) рентгеноконтрастное исследование;
- А. а) эндоскопия с биопсией;
- Д. д) копрограмма.

**Особенности ухода при опрелостях**

- Г. г) обработать кожу нистатиновой мазью
- А. а) согреть ребенка
- Б. б) провести воздушную ванну
- В. в) дать обильное питье

**основными задачами концепции развития здравоохранения и медицины в РФ являются**

- А) увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний и
- Б) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения и
- В) повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения и
- Г) развитие государственного сектора в здравоохранении и
- Д) повышение уровня квалификации медицинских работников

**Пути распространения острого полиомиелита являются**

- Г. г) воздушно-капельный и алиментарный;
- А. а) воздушно-капельный;
- Б. б) алиментарный;
- В. в) трансмиссивный;
- Д. д) все перечисленные.

**Медицинская сестра должна знать, что при подкожном введении инсулина в одно и то же место может развиться**

- Б. б) абсцесс
- Г. г) отечность
- А. а) гематома
- В. в) липодистрофия

**Ребенок 2-х лет внезапно закашлялся, посинел; кашель продолжался около 10-ти минут и больше не возобновлялся. На следующий день вновь появился кашель (неприступнообразный), большое количество сухих хрипов больше справа. Ваш предварительный диагноз**

- Г. г) все перечисленное;
- А. а) круп;
- В. в) инородное тело бронхов;
- Б. б) бронхиолит;
- Д. д) обструктивный бронхит.

**У ребенка 3-х лет 6 часов назад возникли острые, приступообразные боли в животе. Стул был кашицеобразный с кровью 1 раз, рвота 1 раз, температура 36,8 С. В первую очередь необходимо исключить**

- Г. г) аденовирусную инфекцию;
- А. а) кишечную инфекцию;
- Б. б) инвагинацию;
- В. в) острый аппендицит;
- Д. д) кишечное кровотечение.

**Частота дыханий в минуту у ребенка 1-го года составляет**

- В. в) 30 – 35
- А. а) 16 – 18

Б. б) 20 – 25

Г. г) 40 – 60

**Злокачественное заболевание кроветворной ткани с первичной локализацией патологического процесса в костном мозге называется**

А. а) гемофилия

В. в) лейкоз

Б. б) тромбоцитопеническая пурпура

Г. г) геморрагический васкулит

**Установите соответствие между доношенностью и его признаками 1. доношенный ребенок 2. недоношенный ребенок а) крик слабый б) открытый малый родничок в) длина тела более 45 см г) ногти полностью закрывают ногтевое ложе д) масса тела более 2500 г е) кожа морщинистая**

1агд, 2вбе

1вгд, 2абе

1вге, 2абд

1бгд, 2аве

**Установите соответствие между периодом рахита и характерными клиническими признаками 1. начальный 2. разгар а) мышечная гипертония б) краниотабес в) отсутствие костных изменений г) потливость**

1г, 2б

1г, 2а

1в, 2б

1а, 2б

**Грудной тип дыхания характерен для детей**

В. в) с 8 лет у мальчиков

А. а) до 1 года

Г. г) с 8 лет у девочек

Б. б) раннего возраста

**Установите соответствие кислотности при гастрите и клиническими проявлениями 1. сохраненная 2. повышенная 3. пониженная а) снижен аппетит, отрыжка "тухлым", вздутие живота б) приступообразные боли через 1,5 - 2 часа после еды, тошнота в) отрыжка кислым, изжога, запоры**

1б, 2в, 3а

1б, 2а, 3в

1в, 2в, 3б

1а, 2в, 3б

**Наиболее точно отражает состояние здравоохранения в стране**

Б. б) уровень смертности;

- В. в) количество врачей на душу населения;
- А. а) уровень рождаемости;
- Г. г) младенческая смертность;
- Д. д) детская смертность.

**Пупочная ранка в норме полностью эпителизируется**

- Г. г) на 2-м месяце жизни;
- А. а) к концу 1-й недели жизни;
- Б. б) к концу 2-й недели жизни;
- В. в) к концу 1-го месяца жизни;
- Д. д) на 3 месяце жизни.

**Целями сестринского обследования ребенка является определение**

- Б. б) основного и сопутствующего заболевания
- А. а) потребности пациента в уходе и
- В. в) реакция ребенка на состояние своего здоровья и
- Г. г) медико-санитарных потребностей и
- Д. д) существующих и потенциальных проблем пациента со здоровьем

**Сестринский процесс при стоматитах**

- Е. 6. взятие мазка из зева на флору у контактных
- Б. 2. проведение оксигенотерапии
- А. 1. обучение правилам личной гигиены и
- В. 3. обработка полости рта по назначению врача и
- Г. 4. обучение адекватному питанию
- Д. 5. обеспечить покой, пролонгированный сон

**В этиологии ревматизма ведущая роль принадлежит**

- Г. г) зеленым стрептококкам
- А. а) золотистому стафилококку
- Б. б)  $\beta$ -гемолитическому стрептококку группы А
- В. в) вирусам

**Системным инфекционно-аллергическим заболеванием соединительной ткани с преимущественным поражением сердца и сосудов является**

- В. в) ревматизм
- А. а) приобретенный порок сердца
- Б. б) вегето-сосудистая дистония
- Г. г) гломерулонефрит

**Планирование сестринского вмешательства включает**

1. определение потребности в уходе и
2. определение приоритетности проблем и
3. определение целей и
4. написание плана действий и

## 5. согласование с пациентом

### **Наиболее частые проблемы семьи и ребенка, подлежащего хирургическому лечению**

5. комфортное состояние после операции
1. потребность в знаниях о процедурах до и после операции и
2. тревога, связанная с разлукой при госпитализации и
3. риск осложнений из-за ограничения подвижности и
4. вероятность задержки мочи в результате анестезии, страха, боли

### **Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с энтеробиозом могут быть**

1. проглаживание нательного и постельного белья и
3. спать укладывать ребенка в тугих трусиках и
4. коротко стричь ногти и
5. тщательный туалет промежности
2. обеспечить обильным питьем
6. добавить в диету острые блюда

### **Оцените состояние новорожденного по шкале Апгар: Громко кричит, на введение носового катетера – чихает, ЧСС- 110 в минуту, кожные покровы розовые, достаточная двигательная активность.**

- 2) 9 баллов
- 4) 11 баллов
- 1) 8 баллов
- 3) 10 баллов

### **Для максимального эффекта при анафилактическом шоке лекарственные препараты вводят**

- Г. г) внутривенно
- А. а) внутримышечно
- Б. б) внутривенно
- В. в) подкожно

### **Приоритетной причиной развития сахарного диабета у детей является**

- Г. г) перекармливание
- А. а) эмоциональные стрессы
- Б. б) генетическая предрасположенность
- В. в) вирусные инфекции

### **При диарее и рвоте у ребенка медицинская сестра ставит целью ухода**

- В. в) предупредить развитие коллапса
- Г. г) предотвратить развитие гипоксии
- А. а) сохранить массу тела пациента
- Б. б) поддержать водно-электролитный баланс

### **Элементы ухода при возникновении потницы исключают**

- Б. б) лечебные ванны с крахмалом
- А. а) воздушные ванны
- В. в) устранение перегревания
- Г. г) гигиенические ванны

### **Сестринскими рекомендациями ребенку с пиелонефритом могут быть**

- ограничение объема вводимой жидкости
- тщательный туалет половых органов и
- увеличение объема вводимой жидкости и
- проведение противорецидивной терапии

### **Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с тромбоцитопенией могут быть**

- 4. занятия физкультурой в основной группе
- 1. избегать приема антибиотиков и антиагрегантов и
- 2. санировать очаги хронической инфекции и
- 3. гипоаллергенная диета с включением арахиса, шпината, крапивы, укропа и
- 5. повторные курсы фитотерапии
- 6. солнечная инсоляция

### **Установите соответствие физиологического состояния новорожденного с признаками 1. мастит 2. желтуха 3. меконий 4. половой криз а) иктеричность кожи б) зеленый замазкообразный стул в) увеличение молочных желез г) кровянистые выделения из влагалища у девочек**

- 1г, 2а, 3б, 4в
- 1а, 2в, 3б, 4г
- 1в, 2а, 3б, 4г
- 1в, 2а, 3г, 4б

### **Установите соответствие между видом стоматита и изменениями слизистой рта 1. молочница 2. афтозный а) грануляции б) белый творожный налет в) бело-желтые бляшки с красным ободком г) кровоизлияния**

- 1а, 2в
- 1б, 2в
- 1г, 2в
- 1б, 2г

### **Установите соответствия между видами диабета и особенностями течения 1. инсулинозависимый 2. инсулинонезависимый а) наследственный фактор б) начало в раннем возрасте в) развитие быстрое г) развитие постепенное д) ожирение е) диетотерапия эффективна ж) инсулинотерапия необходима з) сахароснижающие средства эффективны**

- 1агвж, 2гбез

1абвж, 2гдез

1абве, 2гджз

1абвз, 2гдеж

**Установите соответствие между заболеванием и сроком изоляции заболевших 1. корь 2. ветряная оспа 3. эпидемический паротит 4. краснуха а) 4 дня с момента высыпания б) 7 дней в) 9 дней г) 10 дней**

1а, 2б, 3в, 4г

1б, 2г, 3в, 4а

1а, 2г, 3в, 4г

1а, 2г, 3в, 4а

**Установите соответствие между видом гельминтоза и возбудителем 1. аскаридоз 2. энтеробиоз а) лямблии б) острицы в) трихинеллы г) аскариды**

1а, 2б

1г, 2б

1г, 2в

1в, 2б

**Планирование сестринского процесса при коклюше в спазмолитическом периоде**

5. контроль за суточным водным балансом

3. туалет кожи, слизистых

1. санация дыхательных путей от слизи и

2. аэротерапия и

4. обучение родителей первой помощи при приступе кашля и

6. обучить ингаляции с протеолитическими ферментами и

7. обеспечить гомогенной пищей

**Соотнесите требования к стажу специалистов, претендующих на присвоение квалификационной категории А) вторая Б) первая В) высшая а) стаж работы по специальности не менее трех лет б) стаж работы по специальности не менее пяти лет в) стаж работы по специальности не менее семи лет**

Аб, Ба, Вв

Ав, Бб, Ва

Аа, Бб, Вв

Ав, Бб, Ва

**Установите соответствие между заболеванием и симптомами 1. дизентерия 2. колиинфекция 3. вирусный гепатит а) волнообразная лихорадка б) иктеричность кожи в) тенезмы**

1б, 2в, 3в

1г, 2а, 3в

1г, 2г, 3в

1г, 2а, 3б

Соотнесите свойства дезинфицирующих средств и их действие в отношении возбудителей ВБИ А) бактерицидное Б) вирулицидное В) фунгицидное Г) бактериостатическое Д) спороцидное а) уничтожение бактерий б) уничтожение вирусов в) уничтожение грибов г) сдерживание роста микроорганизмов д) уничтожение спор

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд

Аг, Бб, Вв, Га, Дд

Аа, Бб, Вд, Гг, Дв

Аг, Ба, Вв, Гб, Дд

Установите соответствие между заболеванием и характером сыпи 1. геморрагический васкулит 2. тромбоцитопения а) асимметричность расположения на туловище, конечностях б) симметричность высыпаний на разгибательных поверхностях конечностей

1а, 2б

1б, 2а

Установите соответствие между гемодинамикой и пороками 1. пороки с обогащением малого круга кровообращения 2. пороки с обеднением малого круга кровообращения 3. пороки с обеднением большого круга кровообращения а) болезнь Фалло б) коарктация аорты в) дефекты межпредметной и межжелудочковой перегородок

1а, 2в, 3б

1б, 2а, 3в

1в, 2а, 3б

1а, 2а, 3а

Установите соответствие между заболеванием и морфологическими изменениями 1. ревматизм 2. системная красная волчанка 3. ревматоидный артрит а) ревматоидные узлы б) гранулёмы Ашоффа-Талалаева в) волчаночные клетки г) клетки Гоше

1б, 2в, 3а

1а, 2в, 3б

1б, 2а, 3в

1а, 2в, 3а

Постановка цели и планирование сестринских вмешательств по решению проблем больного ребенка - это этап сестринского процесса

Б. б) второй

Г. г) четвертый

А. а) первый

В. в) третий

Установите соответствие между заболеванием и клиническими проявлениями 1. истинный круп 2. ложный круп а) начало постепенное б) внезапное начало в)



**выраженная афония г) звучность голоса д) выраженные катаральные явления е) отсутствие катаральных явлений**

1двe, 2бга

1абe, 2вгд

1авe, 2бгд

1авд, 2бге

**Приоритетное действие медицинской сестры при первой стадии белой лихорадки у детей предполагает**

Г. г) тщательное укрытие ребенка

А. а) холодный компресс на голову

Б. б) пузырь со льдом к голове

В. в) банки на грудную клетку

**Причиной срыгивания у грудных детей является**

Б. б) высокий тонус желудка в пилорическом отделе;

В. в) высокое внутрибрюшное давление;

А. а) незрелость эзофагокардиального отдела пищевода;

Д. д) все перечисленное.

Г. г) непостоянные расслабления нижнего пищеводного сфинкса;

**В питании больных анемией ограничивают содержание**

Г. г) жидкости и соли

Б. б) фруктов, овощей

А. а) коровьего молока, злаковых продуктов

В. в) мясных и рыбных блюд

**Особенностью диеты при сахарном диабете является**

Г. г) исключение из рациона мяса и рыбы

А. а) ограничение жидкости, белков и соли

Б. б) ограничение легкоусвояемых углеводов

В. в) исключение из рациона овощей и фруктов

**Ночью у ребенка, больного ОРВИ, появились лающий кашель, осиплость голоса, беспокойство, температура 38,0 С. Неотложное состояние, развившееся у ребенка**

Б. б) стенозирующий ларинготрахеит

А. а) гипертермический синдром

В. в) ларингоспазм

Г. г) приступ бронхиальной астмы

**Патология, встречающаяся при диспансеризации среди подростков**

А. а) плоскостопие

Б. б) привычный вывих

В. в) вросший ноготь

Г. г) гемофилия

### **Ребенка надо направлять к стоматологу**

- Б. б) к моменту прорезывания первых зубов;
- Г. г) при выявлении разрушения зубов;
- А. а) в возрасте 1 года;
- В. в) при выявлении факторов риска;
- Д. д) при выраженном рахите.

**Установите соответствие между кормлением ребенка и противопоказаниями к нему**

**1. противопоказания к кормлению грудью со стороны ребенка 2.**

**противопоказания к кормлению грудью со стороны матери а) внутричерепные кровоизлияния б) тяжелые формы дыхательных расстройств в) гемолитическая болезнь новорожденных г) глубокая недоношенность д) онкологические заболевания е) острые психические заболевания ж) заболевания почек с почечной недостаточностью**

1бвд, 2аже

1бвг, 2дже

1авд, 2гже

1жбг, 2вже

**Проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему острое респираторное заболевание можно разрешить после выздоровления не ранее, чем через**

- В. в) 2 месяца
- Г. г) 3 месяца
- Б. б) 1 месяц
- А. а) 2 недели
- Д. д) 3,5 месяца

**К видам предоставляемого ухода относят**

- А. а) самоуход и
- Б. б) взаимоуход и
- В. в) попечительский уход и
- Г. г) профессиональный и
- Д. д) спонсорский

**К физиологическим состояниям новорожденных относят**

- Д. Д) цианоз
- В. В) везикулопустулез
- А. А) мочекишный инфаркт и
- Б. Б) желтуха и
- Г. Г) гипертермия и
- Е. Е) эритема

### **Назовите элементы развития сыпи при ветряной оспе**

1. везикула и
2. папула и
3. макула и
4. корочка и
5. рубчик

### **К сестринским вмешательствам относят**

- Г) правомерные
- Б) обязательные
- А) независимые и
- В) зависимые и
- Д) взаимозависимые

### **Сестринские вмешательства при одышечно-цианотическом приступе у ребенка**

2. положить ребенка на жесткое покрытие
1. не менять вынужденного положения и
3. освободить от стесняющей одежды и
5. провести оксигенотерапию
4. ввести дигоксин

### **Установите соответствие характера кашля при пневмонии 1. пневмония у новорожденных 2. пневмония у старших детей а) лающий б) влажный в) приступообразный г) пена у рта без кашля**

- 1а, 2б
- 1г, 2б
- 1в, 2б
- 1г, 2а

### **При организации обучения пациента медсестре необходимо определить**

- Д) продолжительность сна
- Г) частоту пульса и дыхания
- А) время и место занятий и
- Б) содержание занятий и
- В) цели и ожидаемый результат

### **Сестринскими рекомендациями ребенку с сахарным диабетом могут быть**

1. обучаться в школе диабетиков и
3. добиться сбалансированной диеты и
5. выработать объем физических нагрузок и
6. научиться делать экспресс-анализ крови и мочи на сахар
2. заниматься физкультурой в основной группе
4. ввести дополнительные приемы пищи между основными кормлениями

**Установите соответствие между заболеванием и сроком карантина 1. корь 2. ветряная оспа 3. эпидемический паротит 4. краснуха а) не накладывают б) 7 дней в) 21 день г) 35 дней**

1в, 2г, 3б, 4а

1в, 2в, 3г, 4а

1в, 2в, 3в, 4а

1в, 2б, 3б, 4а

**Установите соответствие между болезнью и источниками инфекции 1.**

**менингококковая инфекция 2. туберкулез а) молоко коров, больных туберкулезом б) носители, в) больные менингитом, г) больной туберкулезом д) постельное белье больного туберкулезом**

1бв, 2абгд

1ав, 2вбгд

1бг, 2авгд

1бд, 2абгв

**Установите соответствие между формами дискинезий желчного пузыря и**

**симптомами 1. гипертоническая 2. гипотоническая а) ноющие тупые боли в правом подреберье б) приступообразные, кратковременные боли в правом подреберье в) утомляемость, раздражительность, потливость г) горечь во рту, отрыжка, тошнота, отвращение к жирной пище**

1ав, 2аг

1бг, 2ав

1бв, 2аг

1гв, 2бг

**Установите между видами осложнений при сахарном диабете и заболеваниями, симптомами 1. специфические 2. неспецифические а) диабетическая ангиопатия б) синдром Мориакса в) комы г) гнойные инфекции кожи д) пиелонефрит е) стоматит, кандидоз ж) вульвит, вульвовагинит**

1абж, 2гдев

1агв, 2бдеж

1абв, 2гдеж

1абе, 2гдвж

**Установите соответствие между формами тонзилита и его признаками 1.**

**гипертрофическая 2. атрофическая а) миндалины сморщены, плотные, бугристые б) миндалины гиперемированы, в лакунах пробки**

1а, 2б

1б, 2а

**Установите соответствие между стадиями язвенной болезни желудка и клинико-эндоскопическими данными 1. I 2. II 3. III 4. IV а) заживление дефекта слизистой оболочки б) "свежая язва" в) клинико-эндоскопическая ремиссия г) начало**

**эпителизации язвенного дефекта**

1б, 2г, 3в, 4а

1б, 2г, 3а, 4в

1г, 2б, 3а, 4в

1а, 2а, 3а, 4в

**Установите соответствие заболевание - экзантема 1. скарлатина 2. корь 3. ветряная оспа 4. брюшной тиф а) пятнисто-папулёзная б) везикулярная в) мелкоточечная г) анулярная д) розеолёзная**

1д, 2а, 3б, 4в

1в, 2а, 3б, 4д

1в, 2б, 3а, 4д

1б, 2а, 3в, 4д

**Основопологающими понятиями теории сестринского дела, определяющими суть сестринской практики, являются**

А. а) здоровье и

Б. б) пациент, личность и

В. в) сестринское дело и

Д. д) окружающая среда и общество

Г. г) диагностика и лечение

**Установите соответствие между формами тонзилита и клиническими проявлениями 1. компенсированная 2. субкомпенсированная 3. декомпенсированная а) боли в сердце, суставах б) боли в сердце, субфебрильная температура к вечеру в) покраснение миндалин**

1б, 2б, 3б

1в, 2в, 3б

1в, 2а, 3б

1б, 2в, 3а

**Специальные занятия гимнастикой и массаж здоровому ребенку необходимо проводить**

А. а) с рождения

В. в) с полутора месяцев

Б. б) не нужны

Г. г) с 2-х месяцев

Д. д) с 6 месяцев

**Наиболее частой клинической формой пищевой аллергии у детей раннего возраста является:**

А. а) атопический дерматит;

Б. б) бронхообструктивный синдром;

В. в) нефротический синдром;

Г. г) гастроинтестинальный синдром;

Д. д) крапивница и отек Квинке.

**Установите соответствие между видами прикорма и продуктами 1. прикорм 2. докорм а) молоко б) овощные пюре, каши**

1б, 2а

1а, 2б

**Для непереносимости фруктозы верны перечисленные положения, кроме**

А. а) заболевание связано с дефектом энзима печени;

Б. б) сопровождается гипергликемией;

В. в) введение фруктозы вызывает быстрое ухудшение состояния;

Г. г) больной отстает в психомоторном развитии;

Д. д) лечебный эффект от применения лечебных смесей, не содержащих фруктозу.

**Механизм передачи инфекции при остром респираторном заболевании**

Б. б) контактно-бытовой

А. а) воздушно-капельный

В. в) пищевой

Г. г) гематогенный

**Наиболее часто ревматизм развивается у детей в возрасте**

Г. г) 15 – 17 лет

А. а) 1 - 3 лет

В. в) 7 – 15 лет

Б. б) 3 – 6 лет

**Появление у детей одновременно с гематурией гипертензии, отеков характерно для**

Г. г) нефроптоза

Б. б) цистита

А. а) гломерулонефрита

В. в) пиелонефрита

**Злокачественное заболевание кроветворной ткани с первичной локализацией патологического процесса в костном мозге называется**

А. а) гемофилия

В. в) лейкоз

Б. б) тромбоцитопеническая пурпура

Г. г) геморрагический васкулит

**При каком хроническом заболевании уха показано наблюдение больного 4 раза в год**

В. в) рецидивирующий отит

Г. г) кохлеарный неврит

Б. б) хронический мезотимпанит

А. а) хронический эпителимпанит

**Медицинская сестра поступит правильно, если оказание неотложной помощи новорожденному с асфиксией начнет с**

Б. б) проведения ИВЛ

Г. г) непрямого массажа сердца

А. а) проведения оксигенотерапии

В. в) отсасывания слизи из верхних дыхательных путей

**Сестринскими рекомендациями ребенку с сахарным диабетом могут быть**

Г. 4. ввести дополнительные приемы пищи между основными кормлениями

Б. 2. заниматься физкультурой в основной группе

А. 1. обучаться в школе диабетиков и

В. 3. добиться сбалансированной диеты и

Д. 5. выработать объем физических нагрузок и

Е. 6. научиться делать экспресс-анализ крови и мочи на сахар

**Установите соответствие между типом бронхиальной астмы и мерами профилактики 1. первичная 2. вторичная а) предупредить приступ б) предупредить заболевание в) предотвратить осложнение г) предотвратить астматический статус**

1б, 2авг

1а, 2бвг

1г, 2абв

1в, 2абг

**Установите соответствие между манипуляцией и средствами ухода за новорожденным 1. туалет пупочной ранки 2. туалет кожных складок 3. туалет глаз а) стерильное растительное масло б) 3% р-р нитрата серебра в) 3% р-р перекиси водорода г) 70% р-р этилового спирта д) кипяченая вода е) 96% р-р этилового спирта**

1бг, 2а, 3е

1вг, 2а, 3д

1вг, 2е, 3д

1вг, 2а, 3б

**Установите соответствие между заболеванием и сроком изоляции заболевших 1. дифтерия 2. скарлатина 3. менингококковая инфекция 4. коклюш а) до отрицательного бактериологического исследования б) 4 дня в) 7 дней г) 10-22 дня**

1а, 2г, 3а, 4а

1б, 2г, 3в, 4а

1г, 2в, 3а, 4а

1а, 2г, 3а, 4б

**Установите соответствие между заболеванием и принципами ухода и тактики 1. конъюнктивит 2. молочница 3. пузырьчатка а) туалет глаз б) использовать**

**стерильные пеленки в) изоляция в ДИО г) кипячение сосок д) обработка бутылок**

1а, 2гд, 3бв

1б, 2гд, 3ав

1а, 2гв, 3бд

1г, 2ад, 3бв

**Установите соответствие между заболеванием и видом лабораторной диагностики**

**1. дизентерия 2. колиинфекция 3. вирусный гепатит а) биохимический анализ крови б) копрологический анализ в) бактериологическое исследование кала**

1бв, 2бв, 3а

1ав, 2бв, 3в

1ав, 2бв, 3б

1ав, 2ав, 3в

**Установите соответствие между вакциной и способом введения 1. БЦЖ 2. АКДС 3.**

**ОПВ 4. ЖКВ 5. ЖПВ 6. гепатит В а) внутрикожно б) подкожно в) внутримышечнор г) через рот д) внутривенно е) скарификация**

1в, 2б, 3а, 4б, 5б, 6в

1а, 2в, 3г, 4б, 5б, 6в

1а, 2в, 3г, 4б, 5а, 6г

1а, 2в, 3г, 4б, 5а, 6б

**Установите соответствие между формой инфекции и симптомами 1.**

**менингококкемия 2. менингит 3. назофарингит а) заложенность носа б)**

**геморагическая сыпь в) неукротимая рвота г) гиперестезия кожи д) судороги**

1ав, 2бгд, 3в

1ав, 2бгд, 3а

1бв, 2вгд, 3а

1бв, 2вгд, 3г

**Соотнесите мероприятия по предупреждению ВБИ с комплексом мер по их проведению А) деконтаминация Б) дезинфекция В) дератизация Г) стерилизация Д)**

**предстерилизационная очистка а) уничтожение микроорганизмов в целях обеспечения инфекционной безопасности, включает дезинфекцию,**

**предстерилизационную очистку и стерилизацию б) уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически значимых объектах**

**больничной среды в) уничтожение грызунов- переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний г) уничтожение всех видов микробной флоры (в том**

**числе споровых микроорганизмов) д) удаление с изделий медицинского назначения биологических жидкостей, лекарственных средств, жировых**

**загрязнений**

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд

Ад, Бб, Вв, Гг, Да

Аа, Бд, Вв, Гг, Дб

Аб, Ба, Вв, Гг, Дд



## **Планирование сестринского вмешательства включает**

1. определение потребности в уходе и
2. определение приоритетности проблем и
3. определение целей и
4. написание плана действий и
5. согласование с пациентом

## **Проблемы, возникающие у медицинских сестер, при выполнении сестринских вмешательств**

- А) вмешательства не способствуют достижению целей и
- Б) неправильное выполнение сестринских вмешательств и
- В) недостаточная или неправильная оценка реакции пациента
- Г) никаких проблем

## **Наиболее частые проблемы семьи и ребенка, подлежащего хирургическому лечению**

- 5. комфортное состояние после операции
- 1. потребность в знаниях о процедурах до и после операции и
- 2. тревога, связанная с разлукой при госпитализации и
- 3. риск осложнений из-за ограничения подвижности и
- 4. вероятность задержки мочи в результате анестезии, страха, боли

## **Проблемы, возникающие у медсестер при оценке предоставленного ухода**

- В) неточные или несоответствующие выводы
- А) не сделана оценка и
- Б) несоизмеримые цели и
- Г) неправильное использование результатов оценки

## **Установите соответствие между документами и формой**

**1. контрольная карта диспансерного учета 2. журнал учета инфекционных заболеваний 3. рецептурные бланки 4. талон амбулаторного пациента 5. экстренные извещения об инфекционном заболевании а) 058/у б) 107/у и 148-1/у-08 в) 025/у-96р г) 060/у д) 030/у**

- 1а, 2д, 3б, 4в, 5г
- 1д, 2г, 3б, 4в, 5а
- 1в, 2г, 3б, 4д, 5а
- 1б, 2г, 3д, 4в, 5а

## **Лабораторная диагностика фенилкетонурии**

- Г. г) исследование крови на церуллооплазмин;
- А. а) проба на ацетон;
- Б. б) проба с треххлористым железом;
- В. в) исследование белковых фракций

Д. д) содержание креатинфосфокиназы в крови и моче.

**Диагноз муковисцидоза подтверждает**

- А. а) рентгенограмма грудной клетки;
- Д. д) определение электролитов пота.
- Б. б) исследование костного мозга;
- В. в) биопсия тонкого кишечника;
- Г. г) микроскопия осадка мочи;

**Установите соответствие между тапами и видами пороков 1. белые 2. синие а) ДМПП б) триада Фалло в) ДМЖП г) ОАП (баталов) д) полная трансозиозия сосудов**

- 1абг, 2вд
- 1бвг, 2ад
- 1авг, 2бд
- 1авд, 2бг

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с тромбоцитопенией могут быть**

- Е. 6. солнечная инсоляция
- Г. 4. занятия физкультурой в основной группе
- А. 1. избегать приема антибиотиков и антиагрегантов и
- Б. 2. санировать очаги хронической инфекции и
- В. 3. гипоаллергенная диета с включением арахиса, шпината, крапивы, укропа и
- Д. 5. повторные курсы фитотерапии

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с острым гломерулонефритом после выписки из стационара могут быть**

- Е. 6. проводить плановую иммунопрофилактику
- Б. 2. диета с увеличением животного белка, жира
- А. 1. поощрять ребенка к самоконтролю, увеличению активности и
- В. 3. исключение калий-содержащих продуктов из диеты и
- Г. 4. контроль за поддерживающей терапией и
- Д. 5. научиться приемам психологической поддержки

**Предположите заболевание. У ребёнка 7 лет поднялась температура 39,2 С, осиплость голоса, лающий мучительный кашель. В зеве на фоне гиперемии на миндалинах, на нёбных дужках, языке задней стенке глотки фибринозные плёнки. При пальпации определяются болезненные и увеличенные подчелюстные лимфоузлы.**

- г) скарлатина
- а) ОРВИ. Ларингоспазм
- б) дифтерия
- в) ангина

**Цели сестринских вмешательств должны быть**

- А) любые
- Б) конкретные и
- В) измеряемые и проверяемые и
- Г) ориентированы на пациента и
- Д) с указанием срока их достижения

**При организации обучения пациента медсестре необходимо определить**

- А) время и место занятий и
- Б) содержание занятий и
- В) цели и ожидаемый результат
- Г) частоту пульса и дыхания
- Д) продолжительность сна

**Пути распространения острого полиомиелита являются**

- А. а) воздушно-капельный;
- Г. г) воздушно-капельный и алиментарный;
- Б. б) алиментарный;
- В. в) трансмиссивный;
- Д. д) все перечисленные.

**Установите соответствие между возрастом и числом дыханий у детей в минуту 1. новорожденный 2. 5 лет 3. 14 лет а) 16-18 б) 20-25 в) 30-35 г) 40-60 д) 60-80 е) 80-100**

1в, 2б, 3а

1г, 2б, 3а

1д, 2б, 3е

1д, 2б, 3а

**Установите соответствие между возрастом ребенка и суточным объемом пищи 1. от 2х до 6 недель 2. от 6 недель до 4 месяцев 3 от 5 до 6 месяцев 4. от 7 до 9 месяцев а) 1/8 б) 1/7 в) 1/6 г) 1/5**

1г, 2б, 3в, 4а

1б, 2в, 3б, 4г

1г, 2в, 3а, 4а

1г, 2в, 3б, 4а

**Тактика медицинской сестры при приступе бронхиальной астмы у ребенка**

- Б) парентеральное введение бронхолитиков
- А) создать психоэмоциональный комфорт и
- В) одно-двухкратная ингаляция бронхолитиков и
- Д) вызвать врача

**Установите соответствие между заболеванием и его симптомами 1. потница 2. опрелости 3. псевдофурункулез а) мокнущие эрозии б) пузырьки с просыное зерно с прозрачным содержимым в) плотные инфильтраты г) страдает общее состояние д) яркая гиперимия кожи**

1б, 2ад, 3вг

1г, 2ад, 3вг

1б, 2гд, 3вг

1в, 2ад, 3бг

**Выраженным цианозом сразу после рождения проявляется**

- А. а) дефект межжелудочковой перегородки;
- В. в) транспозиция магистральных сосудов;
- Б. б) тетрада Фалло;
- Г. г) открытый артериальный проток;
- Д. д) дефект межпредсердной перегородки.

**Тактика медицинской сестры при угрозе стеноза гортани у ребенка вне лечебного учреждения включает**

- Б. б) срочную госпитализацию
- А. а) направление в поликлинику
- В. в) проведение оксигенотерапии
- Г. г) назначение физиотерапевтических процедур

**Количество мочеиспусканий у новорожденных детей в сутки составляет**

- Г. г) 30 – 40 раз
- А. а) 10 – 20 раз
- Б. б) 20 - 25 раз
- В. в) 7 – 15 раз

**Типичной локализацией сыпи при краснухе является**

- В. в) поэтапное распространение сыпи на лице, туловище, конечностях;
- Г. г) туловище, конечности с концентрацией элементов на стопах, кистях и вокруг суставов;
- Б. б) боковые поверхности туловища, внутренняя поверхность бедер, сгибательные поверхности конечностей;
- А. а) лицо, туловище, разгибательные поверхности конечностей, ягодицы;
- Д. д) типичная локализация не характерна.

**При анафилактическом шоке ребенка надо уложить**

- А. а) на живот
- В. в) на бок с приподнятыми ногами
- Б. б) на спину
- Г. г) с приподнятым изголовьем

**Основные принципы охраны здоровья граждан**

- А. а) государственная гарантия и
- Б. б) приоритетность профилактических мер и
- В. в) доступность медико-социальной помощи и
- Д. д) ответственность государственной власти и учреждений

Г. г) социальная защита в случае утраты здоровья

**Проблемы, возникающие у медицинских сестер, при выполнении сестринских вмешательств**

Г) никаких проблем

А) вмешательства не способствуют достижению целей и

Б) неправильное выполнение сестринских вмешательств и

В) недостаточная или неправильная оценка реакции пациента

**тактика медицинской сестры при критическом снижении температуры тела**

3. растереть кожу 40 % р-ром спирта

1. согреть пациента и

2. проводить частую смену белья и

4. напоить теплым чаем и

6. проводить мониторинг жизненно-важных функций организма

5. обеспечить высококалорийным питанием

**Сестринские вмешательства при одышечно-цианотическом приступе у ребенка**

2. положить ребенка на жесткое покрытие

1. не менять вынужденного положения и

3. освободить от стесняющей одежды и

5. провести оксигенотерапию

4. ввести дигоксин

**Установите соответствие между заболеванием и принципами ухода и лечения 1.**

ларингит 2. отит 3. ангина 4. ринит а) щелочные ингаляции б) микроклимат в палате

в) согревающий полуспиртовой компресс г) полоскание р-ром фурациллина 1:5000

д) диета механически, химически, термически щадящая е) р-р адреналина 1:1000 в

виде капель

1аб, 2в, 3гд, 4 е

1аб, 2е, 3гд, 4в

1ав, 2б, 3гд, 4 е

1ае, 2в, 3гд, 4 б

**Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с энтеробиозом могут быть**

6. добавить в диету острые блюда

2. обеспечить обильным питьем

1. проглаживание нательного и постельного белья и

3. спать укладывать ребенка в тугих трусиках и

4. коротко стричь ногти и

5. тщательный туалет промежности

**Установите соответствие между видом гельминтоза и посудой для исследований 1.**

аскаридоз 2. энтеробиоз а) стерильная пробирка со средой б) чистая стеклянная

посуда в) чашка Петри с питательной средой г) предметные стекла, скотч, шпатель

1г, 2в  
1а, 2г  
1б, 2г  
1б, 2в

**Установите соответствие между заболеванием и вакциной для профилактики 1. корь 2. дифтерия 3. коклюш 4. туберкулез 5. полиомиелит 6. эпидемический паротит а) БЦЖ б) АКДС в) АДС-М г) ОПВ д) ЖКВ е) ЖПВ**

1а, 2бв, 3г, 4а, 5в, 6г  
1д, 2бв, 3б, 4а, 5г, 6е

**Установите соответствие между формами бронхита и симптомами 1. острая (простая) 2. обструктивная 3. бронхиолит а) удлиненный "свистящий выдох", хрипы б) сухой приступообразный кашель, усиливающийся ночью в) учащенное шумное "пытящее" дыхание**

1б, 2в, 3а  
1а, 2а, 3а  
1в, 2а, 3б  
1б, 2а, 3в

**Установите соответствие между документами и формой 1. история развития ребенка 2. журнал учета профилактических прививок 3. карта профилактических прививок 4. индивидуальная карта ребенка а) ф № 026/у б) ф № 112/у в) ф № 063/у г) ф № 064/у**

1а, 2б, 3в, 4а  
1б, 2г, 3в, 4а  
1б, 2в, 3г, 4а  
1а, 2г, 3в, 4а

**Установите соответствие между заболеванием и клиническими проявлениями 1. потница 2. опрелости 3. склеродема 4. омфалит а) синюшные очаги, уплотнения на голенях и стопах б) воспаление кожи и подкожной клетчатки в области пупка в) мелкоточечная красная сыпь на туловище и шее г) краснота и мокнутие в паховых складках**

1в, 2г, 3а, 4б  
1в, 2г, 3а, 4а  
1а, 2г, 3в, 4б  
1б, 2г, 3в, 4б

**Предположите заболевание. У ребёнка 7 лет поднялась температура 39,2 С, осиплость голоса, лающий мучительный кашель. В зеве на фоне гиперемии на миндалинах, на нёбных дужках, язычке задней стенке глотки фибринозные плёнки. При пальпации определяются болезненные и увеличенные подчелюстные лимфоузлы.**

а) ОРВИ. Ларингоспазм

- б) дифтерия
- в) ангина
- г) скарлатина

**Установите соответствие заболевание - экзантема 1. менингококковая инфекция 2. скарлатина 3. корь а) пятнисто-папулёзная б) везикулярная в) мелкоточечная г) геморрагическая д) розеолёзная**

- 1г, 2в, 3а
- 1г, 2б, 3а
- 1г, 2в, 3б
- 1б, 2в, 3а

**Установите соответствие между исследованием и его сущностью 1. проба по Шалкову 2. люмбальная пункция 3. реакция Грегерсеан 4. метод Ли-Уайта а) исследование спинномозговой жидкости б) определение частоты сердечных сокращений и АД у пациента в состоянии покоя в) кал на скрытую кровь г) определение свертывания крови**

- 1б, 2г, 3г, 4г
- 1а, 2б, 3в, 4г
- 1б, 2а, 3в, 4г
- 1б, 2а, 3а, 4а

**Для бронхиальной астмы не характерен признак**

- А. а) приступы бронхоспазма с экспираторной одышкой;
- Б. б) повышение хлоридов в поте и моче;
- В. в) гиперпродукция вязкой прозрачной мокроты;
- Г. г) рассеянные непостоянные сухие, свистящие хрипы;
- Д. д) жесткое дыхание.

**Этиологическим лечением острого герпетического стоматита является**

- А. а) полоскание полости рта растворами антисептиков;
- Б. б) противовирусное лечение;
- В. в) диета;
- Г. г) антибактериальные препараты;
- Д. д) жаропонижающие средства.

**У ребенка 3-х лет 6 часов назад возникли острые, приступообразные боли в животе. Стул был кашицеобразный с кровью 1 раз, рвота 1 раз, температура 36,8 С. В первую очередь необходимо исключить**

- А. а) кишечную инфекцию;
- Б. б) инвагинацию;
- В. в) острый аппендицит;
- Г. г) аденовирусную инфекцию;
- Д. д) кишечное кровотечение.

**Установите соответствие между элементами крови и функцией 1. эритроциты 2. лейкоциты 3. тромбоциты а) гемостаз б) транспорт кислорода в) иммунная**

1б, 2а, 3в

1в, 2б, 3а

1а, 2в, 3б

1б, 2в, 3а

**Сестринскими рекомендациями по диетотерапии ребенку с пиелонефритом могут быть**

В. 3. ограничение белка в диете

Б. 2. ограничение жидкости

А. 1. ограничение поваренной соли и

Г. 4. прием минеральной воды и

Д. 5. увеличение молочно-кислых продуктов

**Оцените состояние новорожденного по шкале Апгар: Громко кричит, на введение носового катетера – гримаса, ЧСС- 105 в минуту, акроцианоз, мышечный тонус снижен – наблюдается слабое сгибание конечностей.**

2) 9 баллов

3) 8 баллов

1) 10 баллов

4) 7 баллов

**Назовите периоды развития инфекционного заболевания**

1. продромальный и

2. разгара и

3. инкубационный и

4. реконвалесценции

**Установите соответствие между периодами пневмонии и симптомами 1. начальный 2. разгара 3. выздоровления а) сухой кашель б) чихание в) пенные выделения из рта г) улучшение общего состояния д) исчезновение клинических симптомов е) хрипы влажные, крепитирующие**

1абв, 2ве, 3гд

1авг, 2бе, 3гд

1абе, 2вг, 3гв

1абг, 2вд, 3ге

**Установите соответствие между диабетической комой и помощью 1. кетоацидотическая 2. гипогликемическая а) введение инсулина б) внутривенное введение глюкозы в) противосудорожные средства г) сердечные гликозиды**

1абв, 2гв

1авг, 2гв

1абг, 2бв



Соотнесите требования к подготовке специалистов, претендующих на присвоение квалификационной категории А) вторая Б) первая В) высшая а) должен иметь теоретическую подготовку и практические навыки в области осуществляемой профессиональной деятельности, использовать современные методы диагностики, профилактики, лечения, реабилитации, владеть навыками анализа количественных и качественных показателей работы б) должен иметь теоретическую подготовку и практические навыки в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин, использовать современные методы диагностики, профилактики, лечения, реабилитации, уметь квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности в) должен иметь высокую теоретическую подготовку и практические навыки в области осуществляемой профессиональной деятельности, знать смежные дисциплины, использовать современные методы диагностики, профилактики, лечения, реабилитации, ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности

Аа, Бв, Вб

Аб, Ба, Вв

Аб, Бв, Ва

Аа, Бб, Вв

Установите соответствие между двигательными умениями и возрастом ребенка 1. держит головку 2. сидит 3. ползает 4. ходит а) 7 месяцев б) 10-12 месяцев в) 6 месяцев г) 2 месяца

1а, 2г, 3а, 4б

1г, 2в, 3а, 4б

1г, 2б, 3а, 4в

1в, 2г, 3а, 4а

Установите соответствие между синдромами при родовых травмах и симптомами 1. астеноневротический 2. гипертензионный 3. гидроцефальный 4. синдром очагового поражения мозга 5. гипервозбудимости синдром 6. синдром угнетения а) тремор рук и подбородка, пронзительный крик б) вялость, гипотония, снижение рефлексов в) нистагм, птоз, асимметрия лица г) повышенная возбудимость, двигательные нарушения д) нарастание размеров головы, венозная сеть на голове е) повышенное внутричерепное давление, возбуждение

1е, 2г, 3д, 4в, 5а, 6д

1г, 2е, 3д, 4в, 5а, 6б

Установите соответствие между диатезами и клиническими проявлениями 1. экссудативно-катаральный 2. лимфатико-гипопластический 3. нервно-артрический а) повышенная возбудимость, плохой аппетит, головные боли б) зуд, мокнущая экзема, гнейс на бровях и волосистой части головы в) увеличение лимфатических

**узлов, большие рыхлые миндалины**

1а, 2б, 3в

1в, 2б, 3а

1а, 2в, 3а

1б, 2в, 3а

**Редко вызывает пищевую аллергию мука**

А. а) гречневая;

Д. д) соевая.

Б. б) рисовая;

В. в) овсяная;

Г. г) манная;

**Сестринский процесс включает следующие этапы**

А. а) сестринское обследование и

Б. б) выявление проблем и потребности в уходе и

В. в) планирование и выполнение сестринских вмешательств и

Г. г) оценка эффективности сестринских вмешательств и

Д. д) лечение заболеваний

**Вторичная антибактериальная профилактика ревматизма проводится**

Б. б) бициллином-5

А. а) пенициллином

В. в) вольтареном

Г. г) гентамицином

**При лечении свободной гипербилирубинемии у новорожденных детей наиболее эффективен метод**

Б. б) лечение фенобарбиталом;

А. а) фототерапия;

В. в) инфузионная терапия;

Г. г) комбинация перечисленных методов;

Д. д) энтеросорбенты.

**Причиной относительно низкого АД у детей является**

А. а) малый объем левого желудочка, широкие артерии

Б. б) малый объем левого желудочка, узкие артерии

В. в) большой объем левого желудочка, широкие артерии

Г. г) большой объем левого желудочка, узкие артерии

**В клинической картине ботулизма обычно не наблюдается**

Г. г) гепатолиенального синдрома

А. а) расстройства зрения (туман перед глазами, двоение)

Б. б) нарушение глотания

- В. в) расстройство дыхания
- Д. д) миастении

**Неотложной помощью при опухоли глазницы является**

- А. а) применение антибиотиков, сульфаниламидов
- Г. г) амбулаторное лечение
- Б. б) срочная госпитализация
- В. в) применение антибиотиков

**Миграционная фаза аскаридоза протекает под маской**

- В. в) дизурических расстройств
- Г. г) диспепсических расстройств
- Б. б) неврологических расстройств
- А. а) острого респираторного заболевания

**Установите соответствие между потенциальными проблемами ребенка и причинами, связанными с нарушением питания**  
**1. анемия 2. гипотрофия 3. ожирение 4. гиповитаминоз**  
**а) недостаточное употребление свежих овощей и фруктов б) увеличение калорийности пищи в) уменьшение калорийности пищи г) недостаток железodefицитных продуктов питания**

1аг, 2а, 3б, 4в

1аб, 2г, 3б, 4а

1аг, 2в, 3б, 4а

1аб, 2в, 3б, 4г

**1. стенозирующий ларингит 2. пневмония а) грубый голос б) "бочкообразная" грудная клетка в) влажный кашель г) носогубный цианоз**

1аг, 2вг

1бг, 2ва

1ав, 2вб

1вг, 2аг

**сестринскими рекомендациями родителям по уходу за ребенком с врожденным пороком сердца могут быть**

обеспечить обильным питьем

кормить часто, малыми порциями и

избегать гиперопеки и

научиться оказывать помощь при одышно-цианотических приступах

информировать о преимуществах лечения одного врача над другим

**Установите соответствие периода развития с приоритетными факторами риска**

**1.внутриутробный 2. интранатальный 3. новорожденности 4.грудной 5.ясельный 6. дошкольный 7. младший школьный 8. пубертатный**  
**а) эндокринные заболевания б) родовые травмы в) синдром дыхательных расстройств г) рахит д) детские инфекции е) нарушение осанки ж) тератогенные з) травматизм**

1и, 2б, 3б, 4г, 5д, 6дз, 7е, 8а  
1а, 2б, 3б, 4г, 5б, 6дз, 7е, 8д

**Установите соответствие между типом анемии и симптомами**  
1. железодефицитная  
2. гемолитическая а) иктеричность кожи б) бледность кожи в) гипотония мышц г) снижение гемоглобина крови

1бвг, 2аб  
1абв, 2бг  
1бвг, 2аг  
1бвг, 2вг

**Установите соответствие между заболеванием и профилактическими мероприятиями**  
1. гепатит А 2. гепатит В 3. гепатит С а) контроль за личной гигиеной б) использование одноразового инструментария в) вакцинация г) проведение текущей дезинфекции д) тестирование донорской крови е) механическая контрацепция

1б, 2авгде, 3бвгде  
1а, 2бвгде, 3бвгде

**тактика медицинской сестры при критическом снижении температуры тела**  
1. согреть пациента 2. проводить частую смену белья 3. растереть кожу 40 % р-ром спирта 4. напоить теплым чаем 5. обеспечить высококалорийным питанием 6. проводить мониторинг жизненно-важных функций организма

2,3,4,5  
1,2,4,5  
1,2,4,6  
1,2,3,4

**Установите соответствие между возрастом ребенка и критериями**  
1. 2-3 года 2. 3-4 года 3. 4-5 лет 4. 5-6 лет 5. 6-7 лет а) смена малых зубов б) период первого вытягивания детей в) период "почемучек" у детей г) ребенок самостоятельно одевается д) четкое признание слов

1г, 2д, 3в, 4а, 5б  
1а, 2г, 3в, 4а, 5б  
1г, 2д, 3в, 4б, 5а  
1а, 2д, 3в, 4г, 5б

**Предположите заболевание. У ребёнка 14 лет поднялась температура 39,8 С, озноб, сильная головная боль, многократная рвота, не приносящая облегчения. При осмотре кожные покровы бледные с «мраморным» рисунком, наблюдается ригидность затылочных мышц. АД 90/60мм.рт.ст. PS- 140 в мин.**

б) дифтерия  
в) лептоспироз  
а) ОРВИ. Грипп  
г) менингит

**Какова приоритетная цель ухода за ребенком с обструктивным бронхитом**

- А. а) нормализация температуры тела
- В. в) уменьшение одышки
- Б. б) восстановление аппетита
- Г. г) уменьшение головной боли

**Вакцинация БЦЖ противопоказана**

- В. в) при наличии активного туберкулеза у других детей в семье;
- А. а) при врожденных ферментопатиях;
- Г. г) во всех указанных случаях;
- Б. б) при иммунодефицитных состояниях;
- Д. д) при агаммаглобулинемии Bruton.

**Внебольничную пневмонию у детей в возрасте старше 5 лет чаще вызывают**

- Г. г) грибы;
- А. а) стафилококки;
- В. в) пневмококки;
- Б. б) пневмоцисты;
- Д. д) микоплазмы.

**Количество водного раствора лекарственного средства в 1 чайной ложке**

- Г. г) 15мл
- А. а) 1мл
- Б. б) 5мл
- В. в) 10мл

**Планирование сестринского процесса при коклюше в спазмолитическом периоде**

1. санация дыхательных путей от слизи и
2. аэротерапия и
4. обучение родителей помощи при приступе спазматического кашля и
6. обучить ингаляции с протеолитическими ферментами и
7. обеспечить гомогенной пищей
3. туалет кожи, слизистых
5. контроль за суточным водным балансом

**Установите соответствие между видом вскармливания и характером стула новорожденного 1. естественное 2. искусственное а) темно-коричневого цвета с гнилостным запахом б) ярко-желтого цвета с кислым запахом**

- 1а, 2б
- 1б, 2а

**Программа реабилитации пациента с пиелонефритом включает следующие действия**

1. санация очагов хронической инфекции и

2. контроль за анализами мочи и
3. регулярное наблюдение урологом и
4. поддерживающая терапия уросептиками, фитотерапия

**Перечислите возможные действия медсестры во время приступа бронхиальной астмы**

дать увлажняющий кислород и  
сделать горячие ножные и ручные ванны и  
дать щелочное питье и  
уложить с приподнятым головным концом и  
дать ингалятор

**К функциям сестринского дела относят**

- В. в) лечение заболеваний
- А. а) укрепление здоровья и
- Б. б) профилактика заболеваний и
- Г. г) реабилитация пациентов и
- Д. д) облегчение страданий и уход

**При «белой» гипертермии у детей отмечаются**

- В. в) холодные конечности
- Г. г) гиперемия кожных покровов
- А. а) мраморные кожные покровы
- Б. б) бледные кожные покровы

**Возникновению срыгиваний у новорожденных детей, находящихся на грудном вскармливании способствуют**

- А. а) короткий пищевод;
- Г. г) все перечисленные;
- Б. б) недостаточное развитие кардиального отдела желудка;
- В. в) относительный гипертонус пилорического отдела желудка;
- Д. д) физиологический дефицит ферментов.

**Установите соответствие между заболеванием и сроками карантина 1. гепатит А 2. гепатит В 3. дизентерия а) 7 дней б) 35 дней в) 180 дней**

1б, 2а, 3в

1в, 2б, 3а

1а, 2в, 3б

1б, 2в, 3а

**Соотнесите классы медицинских отходов с требованиями к их сбору А) медотходы класса А Б) медотходы класса Б В) медотходы класса В Г) медотходы класса Г Д) медотходы класса Д а) сбор осуществляется в многоразовые емкости или**

**одноразовые пакеты любого цвета, за исключением желтого и красного б) сбор осуществляется в одноразовую мягкую или твердую упаковку желтого цвета в) сбор осуществляется в одноразовую мягкую или твердую упаковку красного цвета г) сбор осуществляется в маркированные емкости в зависимости от класса опасности отходов д) сбор осуществляется в соответствии с требованиями к обращению с радиоактивными веществами**

Аа, Бб, Вд, Гг, Дв

Аа, Бб, Вв, Гд, Дг

Аб, Бв, Вв, Гг, Дд

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд

**Цели сестринских вмешательств должны быть**

А) любые

Б) конкретные и

В) измеряемые и проверяемые и

Г) ориентированы на пациента и

Д) с указанием срока их достижения

**Установите правильную последовательность появления симптомов столбняка а) скованность туловища и конечностей б) затруднение при сосании и глотании в) опистотонус г) тризм жевательных мышц д) судороги мимических мышц е) ригидность затылочных мышц**

1б, 2г, 3д, 4е, 5а, 6в

1е, 2г, 3д, 4г, 5б, 6в

**Уровень резистентности организма ребенка определяется**

А. а) кратностью острых заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру

Б. б) кратностью острых респираторных заболеваний, перенесенных ребенком в течение года жизни, предшествующего осмотру

В. в) тяжестью острых заболеваний

Г. г) длительностью и тяжестью заболеваний

Д. д) числом обострений хронических заболеваний

**При контакте с детьми, инвазированными гельминтами, возможно заражение**

А. а) аскаридозом

Г. г) энтеробиозом

Б. б) трихинеллезом

В. в) трихоцефаллезом

**При хроническом гепатите ребенку назначают диету № 5 с**

Г. г) ограничением растительного белка

Б. б) дополнительным введением растительного белка

А. а) дополнительным введением животного белка

В. в) ограничением животного белка

**Установите соответствие периода детского возраста с продолжительностью и возрастом** 1. интранатальный 2. новорожденности 3. внутриутробный 4. грудной 5. дошкольный 6. младший школьный 7. подростковый 8. юношеский 9. дошкольный а) 38-40 недель б) от начала родовой деятельности до рождения ребенка в) 28 дней г) 1-12 месяцев д) 1-3 года е) 3-7 лет ж) 7-11 лет з) 12-16 лет и) 17-21 год  
1б, 2в, 3а, 4г, 5д, 6ж, 7з, 8и, 9е  
1а, 2в, 3г, 4г, 5д, 6ж, 7з, 8е, 9и

**Установите соответствие между заболеванием и путями передачи инфекции** 1. дизентерия 2. гепатит А 3. гепатит В 4. колиинфекция 5. сальмонеллез а) воздушно-капельный б) парентеральный в) пищевой г) водный д) контактно-бытовой  
1агд, 2бгд, 3б, 4вгд, 5агд  
1вгд, 2вгд, 3б, 4вгд, 5вгд

**К сестринским вмешательствам относят**

- Г) правомерные
- Б) обязательные
- А) независимые и
- В) зависимые и
- Д) взаимозависимые

**Установите соответствие между заболеванием и причиной возникновения** 1. простой контактный дерматит 2. аллергический контактный дерматит а) от чрезвычайного наружного раздражителя б) от приёма лекарственных средств внутрь в) при повторном наружном воздействии раздражителя  
1б, 2в  
1в, 2б  
1а, 2б  
1а, 2в

**Установите соответствие между стадиями крупы и клиническими признаками** 1. катаральная 2. стенотическая 3. асфиктическая а) затруднен вдох, афония голоса, беззвучный кашель б) признаки сердечно-сосудистой недостаточности, серык кожные покровы, апатия в) осиплость голоса, грубый кашель, субфебрильная температура  
1а, 2а, 3а  
1б, 2а, 3в  
1в, 2б, 3б  
1в, 2а, 3б

**Маточные кровотечения у девочек старшего возраста отмечаются при**

- А. а) алиментарных анемиях
- В. в) тромбоцитопенической пурпуре
- Б. б) гемофилии



Г. г) геморрагическом васкулите

**Проблемы, возникающие у медицинских сестер, при планировании сестринского процесса**

- А. а) поставлены слишком широкие цели и
- Б. б) цели определены с позиций сестры, а не пациента и
- В. в) сестринские требования не реалистичны и
- Г. г) план не предусматривает вклада со стороны пациента и
- Д. д) план не выполняется и не пересматривается

**Программа реабилитации пациента с пиелонефритом включает следующие действия**

- Е. 6. контроль за динамикой АД
- Д. 5. контроль за динамикой отеков
- А. 1. санация очагов хронической инфекции и
- Б. 2. контроль за анализами мочи и
- В. 3. регулярное наблюдение урологом и
- Г. 4. поддерживающая терапия уросептиками, фитотерапия

**Предположите заболевание. У ребёнка 14 лет поднялась температура 39,8 С, озноб, сильная головная боль, многократная рвота, не приносящая облегчения. При осмотре кожные покровы бледные с «мраморным» рисунком, наблюдается ригидность затылочных мышц. АД 90/60мм.рт.ст. PS- 140 в мин.**

- в) лептоспироз
- а) ОРВИ. Грипп
- г) менингит
- б) дифтерия

**Установите соответствие между комой и ее признаками 1. кетоацидотическая 2. гипогликемическая а) яркий румянец, "ветчинный язык" б) сухость кожи в) влажная кожа г) острое развитие д) постепенное развитие е) дыхание Куссмауля ж) дыхание ровное спокойное з) тремор, судороги**

- 1абге 2вджз
- 1авде 2бгжз
- 1абдз 2вгже
- 1абде 2вгжз

**Установите соответствие между заболеванием и сроком карантина 1. дифтерия 2. скарлатина 3. менингококковая инфекция 4. коклюш а) не накладывают б) 7 дней в) 1 дней г) 14 дней**

- 1б, 2б, 3в, 4г
- 1а, 2б, 3в, 4г
- 1б, 2в, 3в, 4в
- 1б, 2г, 3в, 4а

## **Перечислите критерии развития двигательных умений ребенка**

лежит  
ползает и  
сидит и  
переворачивается на живот и  
ходит и  
держит голову

## **Установите соответствие между видом стоматита и возбудителем 1. молочница 2. афтозный 3. кандидозный а) вирус б) грибок в) стафилококк**

1в, 2а, 3б  
1б, 2в, 3б  
1в, 2б, 3а  
1а, 2а, 3в

## **Установите соответствие между заболеванием и клиническими проявлениями 1. ангина 2. дифтерия а) налет на миндалинах не распространяется за пределы дужек б) налет на миндалинах распространяется за пределы дужек небных в) налет снимается с трудом г) налет легко снимается д) высокая температура, боль в горле нарастает е) температура нормальная или субфебрильная, боль в горле уменьшается**

1агд, 2бве  
1агв, 2бвд  
1аге, 2бвг  
1бгд, 2аве

## **Сестринскими рекомендациями ребенку с пиелонефритом могут быть**

Б. 2. тщательный туалет половых органов и  
Г. 4. режим \"принудительного\" мочеиспускания и  
Д. 5. увеличение объема вводимой жидкости и  
Е. 6. проведение противорецидивной терапии  
А. 1. ограничение объема вводимой жидкости  
В. 3. обогащенные диеты углеводами, белком

## **Сестринский процесс при стоматитах**

1. обучение правилам личной гигиены и  
3. обработка полости рта по назначению врача и  
4. обучение адекватному питанию  
2. проведение оксигенотерапии  
5. обеспечить покой, пролонгированный сон

## **Установите соответствие между внутриутробной инфекцией у новорожденного и клиническими проявлениями 1. цитомегаловирусная 2. сифилитическая 3. краснушная а) пузырьчатка на ладонях и стопах, ринит б) глухота, катаракта,**

микроцефалия, врождённые пороки сердца в) гипотрофия, желтуха, гнойничковая сыпь на коже г) желтуха, анемия, тромбоцитопения, гепатоспленомегалия, геморрагическая сыпь д) синдром Дауна

1г, 2а, 3б

1в, 2а, 3б

1г, 2а, 3в

1г, 2в, 3б

**основными задачами концепции развития здравоохранения и медицины в РФ являются**

А. А) увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний и

Б. Б) сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения и

В. В) повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения и

Г. Г) развитие государственного сектора в здравоохранении и

Д. Д) повышение уровня квалификации медицинских работников

**Характерным симптомом эпидемического паротита не является**

Д. д) ангина.

А. а) лихорадка;

Б. б) увеличение околоушных слюнных желез;

В. в) увеличение подчелюстных слюнных желез;

Г. г) боли в животе;

**Проблемы, возникающие у медсестер при оценке предоставленного ухода**

В) неточные или несоответствующие выводы

А) не сделана оценка и

Б) несоизмеримые цели и

Г) неправильное использование результатов оценки

**Установите соответствие между видом ангины и симптомами 1. катаральная 2.**

**лакунарная 3. фолликулярная а) гнойные налеты в криптах миндалин б)**

**гноетечение из уха в) нагноение фолликулов миндалин г) "лающий" кашель д)**

**гиперемия, отек миндалин**

1а, 2аб, 3вд

1д, 2аг, 3вд

1д, 2ад, 3вд

1в, 2аг, 3вд

**Сестринскими рекомендациями по диетотерапии ребенку с пиелонефритом могут быть**

3. ограничение белка в диете

2. ограничение жидкости

1. ограничение поваренной соли и

4. прием минеральной воды и

5. увеличение молочно-кислых продуктов

Соотнесите этапы обработки изделий медицинского назначения в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 А) Использованные изделия медицинского назначения многократного применения, соприкасающиеся с кровью пациента, подлежат Б) Использованные изделия медицинского назначения однократного применения, соприкасающиеся с кровью пациента, подлежат В) Использованные изделия медицинского назначения многократного применения, не соприкасающиеся с биологическими жидкостями пациента, подлежат Г) Использованные изделия медицинского назначения однократного применения, не соприкасающиеся с биологическими жидкостями пациента, подлежат а) дезинфекции б) предстерилизационная очистка в) стерилизация г) утилизация

Аа, Аб, Ав, Ба, Бг, Ва, Га, Гг

Ав, Аб, Аг, Ба, Бг, Ва, Гв, Гг

Установите соответствие между степенью гипогалактией и дефицитом молока 1. I 2. II 3. III 4. IV а) не выше 75 % б) не выше 25 % в) не выше 50 % г) более 75 %

1а, 2а, 3а, 4г

1в, 2б, 3а, 4г

1б, 2б, 3г, 4г

1б, 2в, 3а, 4г

Из отвлекающих процедур ребенку с приступом бронхиальной астмы медсестра порекомендует

Б. б) общую горячую ванну

А. а) ручные и ножные горячие ванны

В. в) лечебную ванну с морской солью

Г. г) воздушную ванну

К физиологическим состояниям новорожденных относят А) мочекишный инфаркт Б) желтуха В) везикулопустулез Г) гипертермия Д) цианоз Е) эритема

Б,В,Г,Е

А,В,Г,Е

А,Б,В,Е

А,Б,Г,Е

Установите соответствие между заболеванием и возбудителем 1. краснуха 2. корь 3. скарлатина 4. дифтерия 5. эпидемический паротит а) вирус б) микобактерия в) менингококк г) В-гемолитический стрептококк д) бактерия Леффлера

1а, 2б, 3г, 4д, 5б

1а, 2а, 3г, 4д, 5а

1а, 2г, 3г, 4д, 5г

1б, 2а, 3г, 4д, 5в

Сестринскими рекомендациями родителям ребенка с острым гломерулонефритом

**после выписки из стационара могут быть**

6. проводить плановую иммунопрофилактику
2. диета с увеличением животного белка, жира
1. поощрять ребенка к самоконтролю, увеличению активности и
3. исключение калий-содержащих продуктов из диеты и
4. контроль за поддерживающей терапией и
5. научиться приемам психологической поддержки

**Установите соответствие между заболеванием и синдромами 1. пиелонефрит 2. гломерулонефрит а) отечный б) гипертензионный в) дизурический г) мочеволевой д) болевой е) общий интоксикационный**

- 1бгде, 2вбг  
1вгде, 2абг  
1вгдб, 2абе  
1агде, 2вбг

**Наиболее информативным исследованием при гастрите является**

- Г. г) иридодиагностика;  
Б. б) рентгеноконтрастное исследование;  
А. а) эндоскопия с биопсией;  
В. в) УЗИ;  
Д. д) копрограмма.

**Установите соответствие между формой омфалита и симптомами 1. катаральная 2. гнойная 3. гангренозная а) серозное, геморрагическое отделяемое б) некроз ткани в) серозно-гнойное отделяемое г) гнойно-геморрагическое отделяемое д) пупочные сосуды отечны**

- 1в, 2агд, 3бд  
1а, 2вгд, 3бд  
1б, 2вгд, 3ад  
1д, 2бвг, 3бд

**сестринскими рекомендациями родителям по уходу за ребенком с врожденным пороком сердца могут быть**

- информировать о преимуществах лечения одного врача над другим  
обеспечить обильным питьем  
кормить часто, малыми порциями и  
избегать гиперопеки и  
научиться оказывать помощь при одышечно-цианотических приступах

**Срок карантина при кори**

- А. а) 7 дней  
В. в) 21 день  
Б. б) 14 дней  
Г. г) 30 дней

**Установите соответствие между продуктами прикорма и сроками введения 1. кефир 2. каши 3. овощное пюре а) 6 месяцев б) 7 месяцев в) 8 месяцев**

1б, 2б, 3в

1а, 2б, 3в

1в, 2а, 3а

1в, 2б, 3а

**Установите соответствия между терапией ГН (лекарственными средствами) и группой лекарственных препаратов 1. курантил, трентал 2. вольтарен, бруфен 3. гепарин 4. глюконат кальция 5. фуросемид верошпирон 6. допегит а) диуретики б) антикоагулянты в) нестероидные противовоспалительные г) гипотензивные д) антигистаминные е) улучшающие почечный кровоток**

1е, 2в, 3б, 4д, 5а, 6г

1а, 2в, 3е, 4д, 5а, 6б

**Обструктивным легочным заболеванием является**

В. в) фиброзирующий альвеолит;

А. а) экзогенный аллергический альвеолит;

Г. г) бронхиальная астма;

Б. б) эозинофильная пневмония;

Д. д) хроническая пневмония.