

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Фармация (среднее)» (I категория) для аттестации

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:

<https://medik-akkreditacia.ru/product/farma/>

Полезные ссылки:

1) Тесты для аккредитации «Фармация (ПСА)» (2100 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/farmaciya/>

2) Тесты для аккредитации «Фармация (специалитет)» (4000 вопросов)

https://medik-akkreditacia.ru/product/farmacia_test/

На всасывание лекарств оказывают влияние факторы

В. В. рН среды

А. А. константа диссоциации

Д. Д. все ответы верны

Б. Б. константа диссоциации

Г. Г. лекарственная форма

К парентеральному пути введения ЛС относят

Б. Б. ингаляционный

А. А. ректальный

В. В. сублингвальный

Г. Г. трансбуккальный

Д. Д. пероральный

После всасывания ЛВ в кровь не развивается действие

Б. Б. местное

А. А. рефлекторное

В. В. главное

Г. Г. резорбтивное

Д. Д. побочное

Подберите лекарственный препарат пациенту, страдающему бессонницей

Б. Б. зопиклон

- А. А. тиопентал - натрий
- В. В. токоферол
- Г. Г. этамбутол
- Д. Д. бутаамид

В состав, какого препарата входит алкалоид никотин?

- А. А. табекс
- Б. Б. папаверин
- В. В. беродуал
- Г. Г. беластезин
- Д. Д. бесалол

Какой лекарственный препарат применяется при больших эпилептических припадках?

- Г. Г. карбамазепин
- А. А. сиднокарб
- Б. Б. фенobarбитал
- В. В. этосуксимид
- Д. Д. гексифенидил

У больного после операции развился паралич кишечника. Какой лекарственный препарат следует назначить?

- В. В. пилокарпин
- Г. Г. ацетилхолин
- А. А. дитилин
- Б. Б. прозерин
- Д. Д. адреналин

Выберите ферментный препарат заместительной терапии

- В. В. панзинорм
- А. А. холагол
- Б. Б. викаир
- Г. Г. вентер
- Д. Д. форлакс

Больному с ОРВИ врач назначил либексин. К какой фармакологической группе относится этот препарат?

- Г. Г. отхаркивающие средства рефлекторного действия
- Б. Б. противокашлевые средства центрального действия
- А. А. противокашлевые средства периферического действия
- В. В. отхаркивающие средства прямого действия
- Д. Д. противовирусные средства

Больному ревматизмом врач назначил диклофенак натрия. В связи с обострением сопутствующего заболевания препарат отменили. Какое заболевание является

противопоказанием для назначения диклофенака натрия?

- В. В. язвенная болезнь желудка
- А. А. стенокардия
- Б. Б. сахарный диабет
- Г. Г. артрит
- Д. Д. бронхит

Укажите ноотропные средства

- Б. Б. сиднокарб
- А. А. пирацетам
- В. В. цитрулин
- Г. Г. пантокрин
- Д. Д. алохол

Представителями бета – адреноблокаторов являются следующие препараты

- Д. Д. метопролол, анаприлин, атенолол
- А. А. нафтизин, мезатон, визин
- Б. Б. изадрин, сальбутамол, эфедрин
- В. В. норадреналин, адреналин, изадрин
- Г. Г. анаприлин, октадин, сальбутамол

После закапывания в глаз глазных капель у больного развился миоз и спазм аккомодации. Внутриглазное давление при этом упало. Какая группа препаратов вызывает такие эффекты?

- Б. Б. М - холиноблокаторы
- А. А. М - холиномиметики
- В. В. местные анестетики
- Г. Г. Н - холиномиметики
- Д. Д. ганглиоблокаторы

Какие лекарственные формы используют с целью местного воздействия на кожу и слизистые оболочки

- Б. Б. присыпки
- В. В. суспензии
- А. А. мази
- Д. Д. все ответы верны
- Г. Г. пластыри

Рефлекторным действием называется такое действие, которое развивается

- Б. Б. на месте введения
- В. В. наряду с главным
- А. А. после всасывания в кровь
- Д. Д. через ЦНС
- Г. Г. через рефлекторную дугу

Прямое действие ЛВ возникает по

- Г. Г. гормону
- Б. Б. рецептору
- А. А. рефлекторной дуге
- В. В. Ферменту
- Д. Д. ЦНС

Быстрое привыкание при повторном введении лекарств называется

- Б. Б. толерантность
- А. А. тахифилаксия
- В. В. адаптация
- Г. Г. резистентность
- Д. Д. кумуляция

Больной с острым ринитом приобрёл в аптеке нафтизин. Проинформируйте посетителя про возможные побочные эффекты препарата

- Б. Б. брадикардия
- Г. Г. диарея
- А. А. гипотония
- В. В. привыкание
- Д. Д. лекарственная зависимость

В аптеке отсутствует диазепам. Предложите замену из группы производных бензодиазеина

- Б. Б. ново - пассит
- А. А. хлзепид
- В. В. натрия бромид
- Г. Г. амитриптилин
- Д. Д. деприм

Чем объясняется сублингвальный приём валидола при приступе стенокардии

- Б. Б. плохим всасыванием в ЖКТ
- А. А. быстрым развитием эффекта
- В. В. разрушением желудочным соком
- Г. Г. вредным влиянием на печень
- Д. Д. разрушением слюны в ротовой полости

Препарат, оказывающий отхаркивающее действие

- В. В. трава термопсиса
- А. А. кодеин
- Б. Б. либексин
- Г. Г. этилморфин
- Д. Д. индометацин

Лекарственную зависимость не вызывает препарат

- А. А. морфин
- Г. Г. парацетамол
- Б. Б. никотин
- В. В. кофеин
- Д. Д. кокаин

При резкой отмене препарата возникает

- А. А. синдром отмены
- Б. Б. аллергическая реакция
- В. В. кумуляция
- Г. Г. тахифилаксия
- Д. Д. пристрастие

Побочное действие возникает при применении доз

- А. А. пороговых
- Г. Г. при любой дозе
- Б. Б. ударных
- В. В. ВРД
- Д. Д. токсических

Представителями β – адреноблокаторов являются следующие препараты

- В. В. норадреналин, адреналин, изадрин
- А. А. нафтизин, мезатон, визин
- Д. Д. метопролол, анаприлин, атенолол
- Б. Б. изадрин, сальбутамол, эфедрин
- Г. Г. анаприлин, октадин, сальбутамол

Желчегонные холеретические средства способствуют

- Б. Б. выведению желчи
- А. А. нейтрализации соляной кислоты
- В. В. образованию желчи
- Г. Г. инактивации ферментов поджелудочной железы
- Д. Д. увеличению секреции соляной кислоты

К какой фармакологической группе относится галоперидол?

- А. А. антидепрессанты
- Г. Г. нейролептики
- Б. Б. общетонизирующие средства
- В. В. аналептики
- Д. Д. транквилизаторы

Ульцерогенное действие проявляется

- А. А. внешними аномалиями
- Б. Б. изъязвлениями ЖКТ
- В. В. пороками сердца

- Г. Г. кожным зудом
- Д. Д. эндокринными нарушениями

Побочное действие ЛС, приводящее к внешним морфологическим аномалиям

- Д. Д. мутагенное
- А. А. эмбриотоксическое
- Б. Б. ульцерогенное
- В. В. фототоксическое
- Г. Г. тератогенное

Какой группой препаратов лечат стойкие галлюцинации

- Г. Г. седативные
- Б. Б. транквилизаторы
- А. А. нейролептики
- В. В. наркотические анальгетики
- Д. Д. антидепрессанты

Укажите ингибитор ацетилхолинэстеразы необратимого действия

- Г. Г. цититон
- А. А. карбахолин
- Б. Б. армин
- В. В. прозерин
- Д. Д. пилокарпин

Назовите действующее вещество донормила

- Б. Б. имован
- В. В. реладорм
- А. А. нитразепам
- Д. Д. доксиламин
- Г. Г. хлоралгидрат

К местным анестетикам не относится препарат

- В. В. прокаин
- Г. Г. анестезин
- Б. Б. тетракаин
- А. А. фамотидин
- Д. Д. ультракаин

Предложите лекарственный препарат в сиропе, которым можно заменить сироп «Панадол», в данный момент, отсутствующий в аптеке

- А. А. ацетилсалициловая кислота
- Б. Б. парацетамол
- В. В. фенигидин
- Г. Г. мукалтин
- Д. Д. кальция глюконат

При всех видах анестезии используют

- А. А. прокаин
- Г. Г. лидокаин
- Б. Б. бупивакаин
- В. В. тетракаин
- Д. Д. новокаин

Рефлекторным действием не обладает препарат

- А. А. горчичники
- В. В. активированный уголь
- Б. Б. раствор аммиака
- Г. Г. скипидар
- Д. Д. семя льна

Наружно не применяют

- А. А. горчичники
- Б. Б. крахмальную слизь
- В. В. танин
- Г. Г. скипидар
- Д. Д. перцовый пластырь

Настойка пустырника – это

- А. А. снотворное средство
- Б. Б. седативное средство
- В. В. анальгетическое средство
- Г. Г. гипотензивное средство
- Д. Д. антиаритмическое средство

Укажите препарат, который относится к муколитикам

- Б. Б. мукалтин
- Г. Г. эуфилин
- А. А. экстракт термопсиса
- В. В. адетилцистеин
- Д. Д. либексин

Не относится к сердечным гликозидам

- В. В. коргликон
- Г. Г. ланатозид Ц
- А. А. дигоксин
- Б. Б. добутамин
- Д. Д. адонизид

Торговое название препарата бутамират

- Б. Б. стоптуссин

- А. А. синекод
- В. В. солвин
- Г. Г. либексин
- Д. Д. лазолван

К салуретикам не относится

- Б. Б. арифон
- А. А. гидрохлортиазид
- В. В. фуросемид
- Г. Г. маннитол
- Д. Д. ацетазоламид

Комбинированным антацидным средством является

- Г. Г. циметидин
- А. А. магния оксид
- В. В. маалокс
- Б. Б. натрия гидрокарбонат
- Д. Д. ранитидин

Во время приступа бронхиальной астмы применяют

- Г. Г. сальбутамол
- А. А. кромолин натрия
- Б. Б. кетотифен
- В. В. преднизолон
- Д. Д. эуфилин

Указать действующее вещество препарата «Гуталакс»

- Б. Б. платифилина гидротартрат
- Г. Г. висмута нитрат
- А. А. атропина сульфат
- В. В. пикосульфат натрия
- Д. Д. натрия гидрокарбонат

Укажите гепатопротектор, не содержащий флавоноидов

- В. В. эсенциале
- А. А. епабене
- Б. Б. дарсил
- Г. Г. карсил
- Д. Д. силибор

Ноотропные средства не применяют при

- В. В. травмах головного мозга
- А. А. атеросклерозе сосудов мозга
- Г. Г. депрессивных состояниях
- Б. Б. ухудшении памяти

Д. Д. головокружении

Каким препаратом можно заменить глауцин

Б. Б. бронхолитин

В. В. сальбутамол

А. А. мукалтин

Д. Д. стоптуссин

Г. Г. амброксол

Укажите сердечные гликозиды сильного, быстрого и кратковременного действия

Б. Б. гликозиды ландыша

А. А. гликозиды наперстянки

В. В. гликозиды горичвета

Г. Г. гликозиды морозника

Д. Д. гликозиды олеандра

Какой пребиотик рационально назначить больному с дисбактериозом после курса антибиотикотерапии

Б. Б. хилак форте

А. А. лоперамид

В. В. бисакодил

Г. Г. мезим

Д. Д. церукал

Какой анестетик рекомендован при аллергодерматитах

В. В. анестезин

А. А. дикаин

Б. Б. новокаин

Г. Г. ультракаин

Д. Д. ксикаин

Какой препарат является рациональным при остром панкреатите

А. А. трипсин

Б. Б. контрикал

В. В. панкреатин

Г. Г. фестал

Д. Д. фибринолизин

К антиаритмическим средствам не относится препарат

А. А. анаприлин

Г. Г. пирацетам

Б. Б. хинидин

В. В. прокаинамид

Д. Д. верапамил

Укажите механизм действия сальбутамола

- Б. Б. возбуждение β - адренорецепторов
- А. А. возбуждение α - адренорецепторов
- В. В. возбуждение α -, β - адренорецепторов
- Г. Г. возбуждение β_1 - адренорецепторов
- Д. Д. возбуждение β_2 - адренорецепторов

При отравлении холиномиметиками применяют лекарственные средства из группы

- В. В. адреномиметики
- А. А. аналептики
- Д. Д. холиноблокаторы
- Б. Б. психостимуляторы
- Г. Г. адреноблокаторы

К диуретическим средствам не относится препарат

- А. А. фуросемид
- В. В. блемарен
- Б. Б. спиронолактон
- Г. Г. ацетазоламид
- Д. Д. триамтерен

К производным фиброевой кислоты относят

- А. А. фенофибрат
- Б. Б. клофилин
- В. В. ловастатин
- Г. Г. вазилип
- Д. Д. симвастатин

Кетамин относится к средствам, которые применяют

- В. В. при эпилепсии
- Г. Г. при паркинсонизме
- Б. Б. для ингаляционного наркоза
- А. А. для внутривенного наркоза
- Д. Д. при гипотонии

Укажите побочное действие ненаркотических анальгетиков

- А. А. повышение артериального давления
- Б. Б. поражение слизистой ЖКТ
- В. В. кристалурия
- Г. Г. понижение артериального давления
- Д. Д. симптомы паркинсонизма

Диуретики не применяют при

- Б. Б. отёк мозга

- Г. Г. глаукома
- А. А. гипертония
- В. В. энурез
- Д. Д. отёк лёгких

Препарат из растительного сырья, не обладающий мочегонным действием

- Б. Б. почки берёзы
- А. А. листья крапивы
- В. В. трава горца птичьего
- Г. Г. листья брусники
- Д. Д. лист ортосифона

Укажите венотропное средство

- Г. Г. фезам
- А. А. аторвостатин
- В. В. троксерутин
- Б. Б. трентал
- Д. Д. раунатин

В больницу поступил ребёнок с признаками отравления белой. Какой лекарственный препарат следует назначить?

- Г. Г. эуфилин
- Б. Б. кофеин
- А. А. прозерин
- В. В. магния сульфат
- Д. Д. натрия вольпроат

Выберите препарат, не применяемый для лечения мочекаменной болезни

- Г. Г. верошпирон
- А. А. блемарен
- Б. Б. уралит
- В. В. этамид
- Д. Д. уродан

Укажите форму выпуска препарата «Феррум – Лек»

- Г. Г. драже
- А. А. таблетки
- В. В. раствор для инъекций
- Б. Б. капсулы
- Д. Д. пероральный раствор

При гиперхромной анемии применяют

- А. А. ферроплек
- Д. Д. кислоту никотиновую
- Б. Б. кислоту фолиевую

В. В. кислоту аскорбиновую
Г. Г. ферковен

Выберите вентонизирующий препарат на основе конского каштана

Г. Г. детралекс
А. А. троксевазин
Б. Б. эскузан
В. В. венарус
Д. Д. флебодия

Противопоказанием к применению атропина является

Г. Г. брадикардия
А. А. язвенная болезнь ЖКТ
В. В. глаукома
Б. Б. печёночная колика
Д. Д. бронхиальная астма

Указать лекарственное растение – источник получения препарата плантаглюцид

А. А. мать – и – мачеха
Б. Б. подорожник
В. В. полынь
Г. Г. алтей
Д. Д. чабрец

Указать препарат, в состав которого входят фосфолипиды

Г. Г. мезим
Б. Б. алохол
А. А. ливорол
В. В. дарсил
Д. Д. хофитол

При анафилактическом шоке применяют

Б. Б. резерпин
А. А. адреналина гидрохлорид
В. В. бендазол
Г. Г. атропина сульфат
Д. Д. изадрин

Комбинированный седативный препарат

А. А. пиндолол
Д. Д. ново – пассит
Б. Б. анаприлин
В. В. гастрोцепин
Г. Г. гастрофарм

Реклама лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача, разрешается

- Г. Г. в амбулаториях
- А. А. в торговом зале
- Б. Б. в журнале \"Фармация\"
- В. В. по радио и телевидению

Товар в мелкорозничную сеть аптеки отпускают

- В. В. по товарно-транспортной накладной
- Г. Г. по контракту
- А. А. по счету-фактур
- Б. Б. по требованию-накладной

Предельные торговые надбавки для формирования отпускных и розничных цен устанавливаются

- Б. Б. министерством здравоохранения РФ
- Г. Г. аптечная сеть
- А. А. правительством РФ
- В. В. органами исполнительной власти субъектов Федерации

Срок действия лицензии на фармацевтическую деятельность

- В. В. 5 лет
- А. А. 1 год
- Б. Б. 2 года
- Г. Г. 7 лет
- Д. Д. 10 лет

Стажевое требование для присвоения I квалификационной категории фармацевта

- А. А. 3 года
- Б. Б. 5 лет
- В. В. 7 лет
- Г. Г. 8 лет
- Д. Д. 2 года

Продолжительность основного отпуска

- В. В. 1 месяц
- Г. Г. рабочих дней
- Б. Б. 28 календарных дней
- А. А. 24 рабочих дня
- Д. Д. календарных дней

Сертификат соответствия на лекарственные средства действителен

- Г. Г. 5 лет
- А. А. 1 год
- В. В. до истечения срока годности лекарственного препарата
- Б. Б. 3 года

Д. Д. 2 года

Если на лекарственное средство, отпускаемое по рецепту врача, не установлена норма отпуска

Г. Г. 2 упаковки

А. А. отпускают столько, сколько попросит покупатель

Б. Б. отпускают в количестве, указанном в рецепте

В. В. норму отпуска может установить аптека

Срок хранения рецептов на наркотические лекарственные средства

А. А. 10 лет

Г. Г. 5 лет

Б. Б. 1 год

В. В. Не хранят

Д. Д. 8 лет

Врач может продлить действие рецепта на срок

В. В. 1 год

А. А. 2 месяца

Б. Б. 2 года

Г. Г. 3 года

Д. Д. 3 месяца

Норма отпуска спирта этилового в чистом виде для амбулаторного больного

В. В. 150,0

Г. Г. 200,0

А. А. 50,0

Б. Б. 100,0

Д. Д. 300,0

Исправление ошибок не допускается в следующих документах

В. В. требование-накладная

Г. Г. стеллажная карточка

А. А. инвентаризационная опись

Б. Б. приходный и расходный кассовые ордера

Стажевое требование для присвоения высшей квалификационной категории фармацевта

Б. Б. 5 лет

А. А. 3 года

В. В. 7 лет

Г. Г. 8 лет

Остаток лимита денег в кассе устанавливается

Б. Б. учредителем

- Г. Г. налоговой инспекцией
- А. А. руководителем аптеки
- В. В. банком, по согласованию с руководителем

Сертификат соответствия на лекарственное средство выдает

- Б. Б. контрольно-испытательная лаборатория
- А. А. орган по сертификации
- В. В. центр госсанэпиднадзора
- Г. Г. поставщик

Документ, подтверждающий качество и безопасность лекарственного средства

- В. В. товарно-транспортная накладная
- Г. Г. договор поставки
- А. А. аннотация к лекарственному средству
- Б. Б. сертификат соответствия лекарственного средства

Сертификат специалиста действителен

- В. В. на территории СНГ
- Г. Г. на территории города
- Б. Б. на территории административного центра
- А. А. на территории РФ

Выручка аптеки за день оформляется

- В. В. кассовым чеком
- Г. Г. товарным чеком
- Б. Б. расходным кассовым ордером
- А. А. приходным кассовым ордером

Лекарственные средства, для которых недопустимо замерзание при хранении

- В. В. противовирусные средства
- Г. Г. камфора
- Б. Б. противовирусные средства
- А. А. препараты инсулина

Срок службы бактерицидных ламп

- В. В. 2000 часов
- Г. Г. 2500 часов
- Б. Б. 1500 часов
- А. А. 1000 часов

Срок хранения кассовой ленты

- А. А. не менее 1 года
- Б. Б. не менее 3 лет
- В. В. не менее 7 лет
- Г. Г. 1 месяц

Вводный инструктаж проводится

- В. В. один раз в месяц
- Г. Г. при смене должности
- Б. Б. один раз в квартал
- А. А. при приеме на работу

Фармацевт аптеки по изготовлению нестерильных лекарственных форм должен менять санитарную одежду не реже

- Б. Б. 2 раза в неделю
- В. В. 3 раз в неделю
- А. А. 1 раза в неделю
- Г. Г. ежедневно

Санитарный день проводится в аптеках

- В. В. 1 раз в месяц
- А. А. 1 раз в неделю
- Б. Б. 1 раз в 10 дней
- Г. Г. 1 раз в квартал

Фармацевт аптеки по изготовлению стерильных лекарственных форм должен менять санитарную одежду не реже

- А. А. 1 раза в неделю
- Г. Г. 1 раз в смену
- Б. Б. 2 раз в неделю
- В. В. 3 раз в неделю

По рецепту врача отпускаются

- В. В. БАД
- А. А. перевязочные средства
- Г. Г. нейролептики и транквилизаторы
- Б. Б. все спиртосодержащие смеси промышленного производства

Сертификация товаров аптечного ассортимента проводится с целью

- Б. Б. организации складирования, хранения товаров
- А. А. обеспечения населения качественными и безопасными ЛС
- В. В. формирования товарного ассортимента
- Г. Г. стимулирования сбыта товаров

Контроль температурного режима при хранении МИБП проводится

- В. В. 1 раз в неделю
- Г. Г. 1 раз в месяц
- Б. Б. 2 раза в день
- А. А. 1 раз в день

Цифровой код России по системе EAN состоит из

- Б. Б. 8 цифр
- В. В. 10 цифр
- А. А. 7 цифр
- Г. Г. 13 цифр

Первые 2-3 цифры штрихового кода обозначают

- В. В. код предприятия-фасовщика
- Г. Г. контрольные цифры
- А. А. код предприятия-изготовителя
- Б. Б. код страны-производителя или страны, в которой зарегистрирована фирма

Держателем сертификата соответствия ЛС является

- А. А. орган сертификации, выдавший сертификат соответствия
- В. В. производитель лекарственных средств
- Б. Б. МЗ РФ
- Г. Г. юридическое лицо любой ОПФ, на имя которого выдан сертификат соответствия

Сертификат специалиста подтверждается

- Б. Б. каждые 3 года
- Г. Г. ежегодно
- А. А. каждые 8 лет
- В. В. каждые 5 лет после соответствующей подготовки в системе повышения квалификации

Лицензирующий орган может приостановить действие лицензии на срок

- А. А. не более 6 месяцев
- Б. Б. не более 1 года
- В. В. не более 3 месяцев
- Г. Г. не более 2 лет
- Д. Д. не более 1 недели

Лицензия может быть аннулирована по решению

- А. А. лицензирующего органа
- Б. Б. министерства здравоохранения субъекта РФ
- В. В. органа местного самоуправления
- Г. Г. суда на основании заявления лицензирующего органа

Перманганат калия относится к группе хранения

- В. В. легковоспламеняющиеся
- Г. Г. легкогорючие
- А. А. взрывчатые
- Б. Б. взрывоопасные

Лекарственные средства, требующие защиты от улетучивания

- В. В. спиртовые экстракты и настойки
- А. А. антибиотики
- Б. Б. сульфаниламидные препараты
- Г. Г. лекарственное сырье, содержащее сердечные гликозиды
- Д. Д. органопрепараты

Большие металлические емкости заполняются этиловым спиртом на

- Б. Б. 90%
- Г. Г. 50%
- А. А. 75%
- В. В. 100%

Хранить отдельно по сериям и срокам годности необходимо

- Б. Б. красящие вещества
- Г. Г. МИБП
- А. А. пахучие вещества
- В. В. настойки и экстракты

Показатели влажности и температуры в помещениях хранения проверяются не реже

- Г. Г. 1 раза в месяц
- Б. Б. 1 раза в неделю
- А. А. 1 раза в сутки
- В. В. 1 раза в 10 дней

Визуальный осмотр состояния тары в помещениях хранения производится не реже

- В. В. 1 раза в 10 дней
- А. А. 1 раза в день
- Г. Г. 1 раза в месяц
- Б. Б. 1 раза в неделю

Срок годности препарата в отделе хранения аптечного склада контролируют по документу

- В. В. карточка складского учета
- А. А. приемный акт
- Г. Г. стеллажная карточка
- Б. Б. реестр счетов

Индивидуальный предприниматель несет ответственность по своим обязательствам

- В. В. всем своим имуществом
- А. А. в пределах уставного капитала
- Б. Б. в пределах вклада
- Г. Г. в пределах пакета акций

В организациях каких организационно-правовых форм прибылью распоряжается собственник, оставляя лишь часть ее самому предприятию?

- В. В. общества с ограниченной ответственностью
- А. А. государственные и муниципальные унитарные предприятия
- Б. Б. производственные кооперативы
- Г. Г. акционерные общества

Доверенность, по которой из аптеки отпускается для ЛПУ этиловый спирт, действительна

- В. В. 1 месяц
- Г. Г. 1 квартал
- Б. Б. 15 дней
- А. А. 10 дней

Документ, с которым товар поступает в аптеку

- В. В. товарно-транспортная накладная (счет-фактура, накладная)
- А. А. приемный акт
- Б. Б. реестр приходных и расходных документов
- Г. Г. стеллажная карточка

Права и социальная защита медицинских и фармацевтических работников регламентированы

- В. В. основами законодательства РФ об охране здоровья граждан
- А. А. ф3 \"О лекарственных средствах\"
- Б. Б. конституцией РФ
- Г. Г. трудовым кодексом

Изготовление экстенпоральной лек. формы 3-недельному ребенку в аптеке осуществляется в

- А. А. ассистентской
- Б. Б. асептической
- В. В. заготовочной
- Г. Г. аналитической

В случае обнаружения потребителем недостатков в товаре продавец

- А. А. обязан заменить товар в течение 7 дней
- Б. Б. может отказать потребителю в замене товара
- В. В. замена может быть проведена в течение трех месяцев
- Г. Г. замена может быть проведена в течение шести месяцев

В качестве лекарственного сырья от производящего растения *plantago major* используют

- корни
- листья
- трава

цветки

При изготовлении микстуры из порошкообразных лекарственных веществ и концентратов последние добавляют

в подставку к раствору порошков
во флакон для отпуска к воде
во флакон для отпуска к раствору порошков
в подставку к воде

Основной группой действующих веществ корневищ и корней марены являются

кумарины
сердечные гликозиды
антраценпроизводные
дубильные вещества

При назначении препарата, который выводится через почки, у больного с хронической почечной недостаточностью

безопасность назначения препарата не меняется
происходит усиление выведения препарата
происходит накопление препарата в организме
уменьшается риск развития побочных эффектов

Влажность глюкозы не учитывают при изготовлении

растворов для инъекций
микстур
порошков
растворов для внутреннего применения детям до 1 года

Срок действия декларации о соответствии лекарственного препарата

равен сроку годности ЛП
не устанавливается
равен сроку реализации ЛП в аптеке
бессрочен

Препарат «эвкалимин» производят из лекарственного растительного сырья

родиолы розовой
календулы лекарственной
ромашки аптечной
эвкалипта прутовидного

При повышенном уровне холестерина назначается препарат

Верапамил
Ципрофлоксацин
Нитроглицерин
Розувастатин

Эфирное масло содержится в лекарственном растительном сырье

зверобоя трава
алтея трава
крушиной ломкой кора
ромашки аптечной цветки

Препарат, который может вызывать брадикардию, называется

Фелодипин
Амлодипин
Нифедипин
Верапамил

Каптоприл противопоказан больным с

бронхиальной астмой
сахарным диабетом 2 типа
стенозом почечной артерии единственной почки
хроническим гепатитом

Особо чувствительные к свету препараты дополнительно

оклеивают чёрной бумагой
окрашивают жёлтой краской
окрашивают белой краской
оклеивают красной бумагой

Суспензионный тип дерматологической мази на жировой основе не образует

ментол
фурацилин
цинка сульфат
висмута нитрат основной

По объёму дозируются жидкости

масло вазелиновое
хлороформ, эфир медицинский
вода очищенная, сироп сахарный
глицерин

Лекарственным препаратом, обладающим витаминной активностью, представляющим собой масляный раствор, является раствор

кислоты никотиновой
кислоты аскорбиновой
цианокобаламина
ретинола ацетата

Лекарственное растительное сырьё «flores» заготавливают от растения

Rosa canina
Urtica dioica
Capsella bursa-pastoris
Sambucus nigra

В качестве лекарственного сырья у ландыша майского заготавливают

плоды
листья
корневища с корнями
корни

Срок обслуживания рецептов на лекарственные препараты, включённые в перечень лекарственных средств, отпускаемых бесплатно по рецептам врача и не вошедшие в минимальный ассортимент лекарственных средств, не превышает (рабочих дней)

30
5
10
3

Расходная часть товарного отчёта мелкорозничной сети оформляется на основании

расходных кассовых ордеров
счетов
квитанций к приходным кассовым ордерам
расходно-приходных накладных

К противогельминтным препаратам, производным бензимидазола относится

Пиперазин
Пирантел
Празиквантел
Мебендазол

Вещества, обладающие сорбционными, красящими свойствами, измельчают

первыми
фракционным методом
помещая между слоями неокрашенных веществ
с летучей жидкостью

Дезинфицирующие средства хранятся

в прохладном месте
на стеллаже в обычных условиях
в защищённом от естественного и искусственного освещения месте
в герметически закупоренной таре, в изолированном помещении, вдали от помещений хранения пластмассовых, резиновых и металлических изделий

Контроль за своевременной реализацией в аптеке лп с ограниченным сроком годности ведётся в

инвентарной карточке

оборотной ведомости

акте

журнале регистрации ЛП с ограниченным сроком годности и стеллажной карточке

Рецепт больному бронхиальной астмой на теофедрин таблетки будет выписан на рецептурном бланке формы №

148-1/У-88

148-1/у-06(л) + 148-1/У-88

148-1/у-06(л) + 107/у-НП

148-1/у-06(л)

Консерванты представляют собой вещества

снижающие скорость окислительных процессов растворов лекарственных веществ
увеличивающие растворимость лекарственных веществ

увеличивающие время нахождения лекарственных средств в организме

предотвращающие рост микроорганизмов

При одновременном использовании диклофенака и варфарина увеличивается риск развития

противовоспалительного эффекта

кровотечения

обезболивающего действия

гипотензивного действия

Единовременный отпуск лекарственного препарата по рецепту, выписанному на рецептурном бланке формы n 107-1 у, срок действия которого составляет один год, допускается по

решению провизора

решению руководителя медицинской организации

согласованию с медицинским работником, выписавшим рецепт

решению руководителя аптеки

Траву чабреца применяют как средство

кровоостанавливающее

отхаркивающее

диуретическое

успокаивающее

Наука, изучающая терапевтическую эффективность лекарственных препаратов в зависимости от фармацевтических факторов, называется

фармацевтическая технология

биофармация

фармацевтическая химия
биотехнология

Коммуникация представляет собой

процесс передачи информации от одного субъекта к другому на основе определённых принципов и закономерностей
метод решения конфликтов
способ реализации установленных норм (правила, инструкции, положения), регламентирующих взаимодействие субъектов в рамках организации
процесс управления поведением сотрудников

Хранение сильнодействующих и ядовитых ЛС, не находящихся под международным контролем, осуществляется в

обычных помещениях хранения
изолированных помещениях хранения
технически укрепленных помещениях, аналогичных помещениям хранения наркотических и психотропных ЛС
металлических шкафах, опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня

Калия перманганат обладает свойствами

легкогорючим
взрывчатыми
легковоспламеняющимися
взрывоопасными

Порядок отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества регламентирован приказом

Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110

Минздрава России от 17.06.2013 № 378н

Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 562н

Минздрава России от 11.07. 2017 г. № 403н

Побочным эффектом наркотических анальгетиков, ограничивающим их широкое назначение, является

спазм гладких мышц
лекарственная зависимость
тошнота и рвота
сонливость

Могут завышаться в 2 раза для инкурабельных онкологических больных нормы единовременного отпуска

Атропина

эфира для наркоза

Кеторола
Морфилона

Вата медицинская негигроскопическая представлена ватой
компрессной
хлопковой
искусственной
гигиенической

Информация о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям в товарно- сопроводительных документах не должна содержать
номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат
наименование изготовителя или поставщика (продавца, принявшего декларацию, и орган, её зарегистрировавший
дату выдачи сертификата
регистрационный номер декларации о соответствии, срок её действия

Целью назначения статинов является
снижение уровня глюкозы
снижение уровня холестерина
повышение уровня калия
снижение артериального давления

Для лекарственного препарата «сенаде» характерно основное фармакологическое действие
вяжущее
тонизирующее
слабительное
отхаркивающее

В ценниках на товары, реализуемые аптекой, не должны содержаться сведения о
наименовании товара
наименовании аптеки
дате оформления ценника
цене за единицу

Срок действия рецептов на наркотические средства и психотропные вещества, внесённые в список II перечня нс, пв и их прекурсоров, составляет (дней)
5
15
30
10

Сборником обязательных общегосударственных стандартов и положений, нормирующих качество лекарственных средств, вспомогательных веществ,

лекарственных форм и препаратов является
приказ МЗ по контролю качества лекарственных средств
Государственная фармакопея
ГОСТ
GMP

Препаратом для лечения глаукомы является

Тиотропий
Атропин
Пилокарпин
Платифиллин

Стеллажная карта, как документ, идентифицирующий хранящиеся лекарственные средства, не должна содержать информацию о Лекарственного средства

стоимости
наименовании
производителя
номере серии тва

Диуретическое действие оказывает лекарственное растительное сырьё

крушины кора
алтея корни
толокнянки обыкновенной листья
подорожника большого листья

Сырьём лекарственного растения *salvia officinalis* является

корневища с корнями
трава
почки
листья

На вторичной упаковке «пустырник форте, таблетки №40» обязательна надпись

«Клинически апробировано»
«Принимать по назначению врача»
«Не является лекарственным средством»
«Является лекарственным препаратом»

Бактериофаги применяют

для диагностики вида возбудителя
с целью регуляции гормональной активности
при гнойно-воспалительных заболеваниях
при токсинемических инфекциях

Систематизированным перечнем наименований и основных характеристик лекарственных препаратов, лекарственных средств, разрешённых к применению в

российской федерации, является

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств

фармакопейная статья

государственная фармакопея

государственный реестр лекарственных средств

Согласно требованиям санитарного режима перед началом работы в помещениях аптечной организации проводят уборку

обычную

влажную с применением дезсредств

сухую

генеральную

Органом государственного надзора, который осуществляет проверки соблюдения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности в организациях, осуществляющих оптовую торговлю лекарственными средствами для медицинского применения, является

Министерство здравоохранения РФ

Минсельхоз

Роспотребнадзор

Росздравнадзор

Действующим веществом препарата ацц является

Карбоцистеин

Амброксол

Бромгексин

Ацетилцистеин

Седативное действие оказывает лекарственное растительное сырьё

крапивы двудомной листья

мелиссы лекарственной трава

дуба кора

берёзы почки

Перечень товаров, разрешённых к реализации через аптечные организации, установлен

приказом МЗСР РФ N 553н от 27.07. 2010 г.

ФЗ № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (статья 55)

приказом МЗ РФ № 403н от 11.07. 2017 г.

постановлением Правительства РФ N 55 от 19.01.1998 г

Для купирования бронхоспазма может быть использован

Монтелукаст

Преднизолон

Кромоглициевая кислота

Сальбутамол

На вторичной упаковке «лактuloза форте, саше №10» обязательна надпись

«Принимать по назначению врача»

«Не является лекарственным средством»

«Является лекарственным препаратом»

«Клинически апробировано»

Целью приёмочного контроля является

проверка лекарственного препарата по внешнему виду, запаху, однородности смешивания, отсутствию механических включений в жидких лекарственных формах
проверка общей массы или объёма лекарственного препарата, количества и массы отдельных доз, входящих в лекарственный препарат

оценка качества изготовления лекарственных препаратов по показателям:

качественный анализ: подлинность лекарственных средств; количественный анализ:

количественное определение лекарственных средств

предупреждение поступления в аптечную организацию недоброкачественных лекарственных средств, используемых для изготовления лекарственных препаратов по рецептам и требованиям, а также некачественных упаковочных материалов

При хранении кальция глюконата следует учитывать его свойство

восстанавливаться

терять кристаллизационную влагу

гигроскопичности

окисляться на свету

В состав слабительного сбора входит сырьё

марены красильной

брусники обыкновенной

багульника болотного

крушины ломкой

К группе анксиолитиков (транквилизаторов) относится

Медазепам

Галоперидол

Клозапин

Трамадол

Помещения аптечных организаций, предназначенные для хранения 3-месячного запаса наркотических средств и психотропных веществ, относятся к категории

1

2

4

3

Основным средством терапии сахарного диабета 1 типа является

Метформин

Глибенкламид

Пиоглитазон

Инсулин

Выраженное ульцерогенное действие характерно для

Морфина

Нимесулида

Пропофола

Кеторолака

Для купирования почечной колики рекомендован

Платифиллин

Ибупрофен

Парацетамол

Фентанил

Цена на экстермпоральную рецептуру, кроме стоимости ингредиентов и аптечной посуды, включает

оплату за охрану помещений

тарифы за изготовление

заработную плату сотрудников

торговую надбавку

К опиоидным (наркотическим) анальгетикам относится

Фентанил

Мелоксикам

Ибупрофен

Парацетамол

При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни применяют

Домперидон

Лоперамид

Кеторолак

Ибупрофен

Хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер следующие антибактериальные препараты

цефалоспорины III генерации

линкозамиды

тетрациклины

макролиды

При установлении в результате испытаний несоответствия качества лекарственного

растительного сырья требованиям нормативной документации необходимо
провести его повторную проверку
забраковать партию лекарственного растительного сырья
рассортировать партию и повторно предъявить к сдаче
провести доработку лекарственного растительного сырья

**Предупредительная надпись «хранить в прохладном месте», наклеиваемая на
изготовленные лекарственные препараты, должна иметь следующий текст и
сигнальный цвет**

на красном фоне белый шрифт
на голубом фоне белый шрифт
на зелёном фоне белый шрифт
на синем фоне белый шрифт

Фармакологическое средство представляет собой

лекарственное средство, представляющее собой индивидуальное химическое
соединение или биологическое вещество
дополнительное вещество, необходимое для изготовления лекарственного
препарата
вещество или смесь веществ с установленной фармакологической активностью,
являющееся объектом клинических испытаний
лекарственное средство в виде определённой лекарственной формы

К общетонизирующим средствам относится настойка

женьшеня
валерианы
полыни
пустырника

К классификации по способу применения относят порошки

простые
присыпки
недозированные
сложные

Настойки являются

концентрированными спиртовыми извлечениями из лекарственного растительного
сырья, используемыми самостоятельно и в составе некоторых лекарственных форм
(капель, микстур и др.)
водными извлечениями из лекарственного растительного сырья, а также водными
растворами сухих и жидких стандартизированных экстрактов
жидкой лекарственной формой, представляющей собой спиртовые и водно-
спиртовые извлечения из лекарственного растительного сырья, полученные без
нагревания и удаления экстрагентов
окрашенными жидкими извлечениями из лекарственного растительного сырья,

изготавливаемыми на 20-40% этаноле и предназначенные для изготовления настоев и отваров в условиях аптеки

Средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от окружающей среды, повреждения, потерь и облегчающих процесс обращения: транспортирование, хранение, реализацию называется

контейнер

стандарт

упаковка

партия товара

В помещениях хранения допускается идентифицировать лекарственные средства с помощью

журналов регистрации

стеллажной карты; кодов и электронных устройств

упаковочных надписей

журналов учёта

Лс, изменяющие свои свойства под действием температуры окружающей среды по гф хiii, являются

термолабильными

термозависимыми

термостабильными

термочувствительными

К видам аптек, утверждённым министерством здравоохранения рф, не относится аптека

межбольничная

производственная

готовых лекарственных форм

производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов

Официальным источником информации о лекарственных препаратах, зарегистрированных для применения на территории российской федерации, является

государственный реестр ЛС

энциклопедия ЛС

Государственная фармакопея

реестр ЛС России