

## **Вопросы с вариантами ответов по специальности «Сестринское дело (среднее)» (II категория) для аттестации**

**Купить базу вопросов с ответами можно здесь:**  
<https://medik-akkreditacia.ru/product/sestrinskoe/>

### **Полезные ссылки:**

1) Тесты для аккредитации «Сестринское дело» (2000 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/sestrinskoe-delo/>

2) Тесты для аккредитации «Сестринское дело (бакалавриат)» (2860 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/sestrinskoe-delo-bakalavriat/>

**Продолжительность измерения температуры тела в подмышечной области  
ртутным термометром составляет не менее**

А. 2 мин

Б. 10 мин.

В. 5 мин.

Г. 3 мин.

Д. 1 мин.

**Учение о морали и нравственности называется**

Б. Б. Деонтология

А. А. Этика

В. В. Субординация

Г. Г. Нравственность

Д. Д. Порядочность

**Противопоказанием для приема снотворных НЕ является**

Г. Г. Бессонница, психомоторное возбуждение

А. А. Беременность, лактация

Б. Б. Детский и подростковый возраст до 15 лет

В. В. Повышенная чувствительность к препарату

Д. Д. Лекарственная зависимость

**Спазмолитическим эффектом обладает**

- А. А. Дротаверин
- Б. Б. Анальгин
- В. В. Димедрол
- Г. Г. Ибупрофен
- Д. Д. Парацетамол

**Лечебное учреждение для оказания помощи инкурабельным больным**

- В. В. Стационар
- Г. Г. Лазарет
- А. А. Госпиталь
- Б. Б. Хоспис
- Д. Д. Поликлиника

**К кровоостанавливающим средствам не относятся**

- В. В. Этамзилат
- А. А. Транексам
- Г. Г. Калия хлорид
- Б. Б. Аминокапроновая кислота
- Д. Д. Викасол

**В очаге менингококковой инфекции устанавливают медицинское наблюдение за контактными лицами с момента разобщения с больным в течение**

- А. А. 10 дней
- Б. Б. 7 дней
- В. В. 3 дня
- Г. Г. 21 день
- Д. Д. 30 дней

**Открытый пневмоторакс – это**

- А. А. Скопление воздуха в подкожной клетчатке
- В. В. Перемещение воздуха при дыхании через рану грудной клетки в плевральную полость и обратно, рана \"дышит\"
- Б. Б. Воздух, попавший при ранении в плевральную полость
- Г. Г. Скопление крови в плевральной полости
- Д. Д. Скопление жидкости в плевральной полости

**В III периоде лихорадки (кризис) возможно применение**

- Б. Б. Прохладного витаминизированного питья
- Г. Г. Влажного обертывания
- А. А. Пузыря со льдом
- В. В. Обильного питья крепкого сладкого чая или кофе
- Д. Д. Холодного компресса

**Передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку невозможна**

- Б. Б. При прохождении через родовые пути

- Г. Г. При кормлении грудью
- А. А. Трансплацентарно
- В. В. При поцелуе
- Д. Д. При пересадке органа от матери к ребенку

**Уретральный катетер перед введением смазывают**

- Б. Б. Стерильным вазелиновым маслом
- А. А. Глицерином
- В. В. Антисептическим раствором
- Г. Г. Чистой водой
- Д. Д. Спиртом

**После использования мочевого катетера необходимо**

- А. А. Промыть его в проточной воде
- Г. Г. Провести предстерилизационную очистку катетера
- Б. Б. Положить катетер в 3% раствор хлорамина на час
- В. В. Положить катетер в 0,02% раствор фурациллина, T= 37 град. С
- Д. Д. Выбросить в канализацию

**Раствор для ухода за полостью рта**

- Г. Г. 10% камфорный спирт
- А. А. 6% перекись водорода
- Б. Б. 2% натрия гидрокарбоната
- В. В. 5% перманганата калия
- Д. Д. 10% спирт

**Кровь на биохимические анализы берется**

- Б. Б. После завтрака
- А. А. Утром натощак
- В. В. В любое время суток
- Г. Г. Перед обедом
- Д. Д. Накануне вечером

**Биологическая смерть наступает через**

- В. В. 1 час после остановки сердца
- Г. Г. 1 минуту после остановки сердца
- Б. Б. 3 минуты после остановки сердца
- А. А. 5 и более минут после остановки сердца
- Д. Д. 30 сек. после остановки сердца

**Основной признак коматозного состояния**

- Б. Б. Угнетение дыхания
- Г. Г. Угнетение периферической нервной системы
- А. А. Угнетение гемодинамики
- В. В. Угнетение ЦНС

Д. Д. Угнетение сердечной деятельности

**Помещение, где проводится санобработка вновь поступившего пациента**

Г. Г. Санитарный пропускник

А. А. Процедурный кабинет

Б. Б. Смотровой кабинет

В. В. Клизменный кабинет

Д. Д. Профилактический кабинет

**Протирание ресниц и век необходимо делать:**

А. А. Круговыми движениями

Г. Г. От наружного угла глаза к внутреннему

Б. Б. От внутреннего угла глаза к наружному

В. В. Снизу вверх

Д. Д. Сверху вниз

**Высококалорийную пищу, усиленное питание назначают при заболевании**

Б. Б. Туберкулезом

А. А. Сердца

В. В. Почек

Г. Г. Желудка

Д. Д. Печени

**Ответственность за получение лекарственных средств из аптеки несет**

В. В. Лечащий врач

А. А. Процедурная медсестра

Г. Г. Старшая медсестра

Б. Б. Заведующий отделением

Д. Д. Постовая медсестра

**Лекарства, раздражающие слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, следует принимать**

Г. Г. Между приемами пищи

А. А. До еды

В. В. После еды, запивая молоком или водой

Б. Б. Во время еды

Д. Д. За 2 часа до еды

**Подготовка пациента к фиброгастроскопии**

А. А. Очистительная клизма утром и вечером

Г. Г. Исследование натошак

Б. Б. Применение газоотводной трубки

В. В. Промывание желудка перед исследованием

Д. Д. Промывание желудка накануне вечером

**Для проведения пробы на индивидуальную групповую совместимость необходимы**

- Г. Г. Кровь больного и донорская кровь
- Б. Б. Сыворотка донорской крови и кровь больного
- А. А. Сыворотка больного и донорская кровь
- В. В. Сыворотка больного и сыворотка донорской крови
- Д. Д. Цоликлоны

**К продуктам, содержащим клетчатку, относятся**

- Б. Б. Овощи
- А. А. Мясо
- В. В. Яйца
- Г. Г. Творог
- Д. Д. Молоко

**Больным сахарным диабетом в состоянии компенсации должны ограничиваться в питании**

- В. В. Углеводы
- А. А. Белки
- Б. Б. Жиры
- Г. Г. Минеральные соли
- Д. Д. Пищевые растительные волокна

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между патологией (цифра): 1. Стенокардия, 2. Артериальная гипертензия, 3. Колика, 4. Гипертермия, 5. Инфаркт миокарда и используемым лекарственным средством (буква): А. Нифидипин, Б. Парацетамол, В. Нитроминт, Г. Фентанил, Д. Но-шпа, Е. Глюкофаж, Ж. Мерказолил**

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-Г;

1-В; 2-А; 3-Д; 4-Б; 5-Г;

1-В; 2-Г; 3-Д; 4-Б; 5-А;

1-Г; 2-В; 3-Д; 4-Б; 5-А;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Столбняк, 2. Ботулизм, 3. Менингит, 4. Отек Квинке и симптомом (ами) (буква): А. Диплопия, Б. Тризм, В. Сардоническая улыбка, Г. Ригидность затылочных мышц, Д. Уртикарная сыпь**

1-Б, В; 2-А; 3-Д; 4-Г

1-Б, Г; 2-А; 3-В; 4-Д

1-А, В; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-Б, В; 2-А; 3-Г; 4-Д

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Дезинфекция, 2. Дератизация, 3. Дезинсекция, 4. Стерилизация и определением (буква) А. Мероприятия по уничтожению грызунов, Б. Мероприятия по уничтожению насекомых, В. Мероприятия по уничтожению микроорганизмов и их спор, Г. Мероприятия по уничтожению членистоногих, Д. Мероприятия по уничтожению грибов, Е. Мероприятия по уничтожению сорняков**

1-А; 2-Г; 3-Б; 4-В

1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между элементом крови (цифра) 1. Эритроцит, 2. Лимфоцит, 3. Эозинофил, 4. Тромбоцит и его функцией (буква) А. Участие в иммунных процессах, Б. Транспорт кислорода, В. Участие в свертывании крови, Г. Антигистаминная**

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В

1-В; 2-А; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между локализацией раны (травмы) (цифра): 1. Голова, 2. Голеностопный сустав, 3. Нижняя челюсть, 4. Плечевой сустав и видом повязки (буква): А. Восьмиобразная, Б. Чепец, В. Уздечка, Г. Мостовидная, Д. Колосовидная**

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д

1-Б; 2-А; 3-В; 4-Д

1-Б; 2-А; 3-Д; 4-В

1-Д; 2-А; 3-Б; 4-В

**Медикаменты с истекшим сроком годности относятся к классу отходов**

А

Г

Б

В

Д

**Для сотрясения головного мозга характерно**

- В. В. Антероградная амнезия
- Г. Г. Конградная амнезия
- А. А. Кома
- Б. Б. Ретроградная амнезия
- Д. Д. Коллапс

**При стенозе гортани на фоне отёка Квинке произошла остановка дыхания.**

**Необходимо**

- А. А. Провести непрямой массаж сердца
- В. В. Выполнить коникотомию
- Б. Б. Сделать искусственное дыхание
- Г. Г. Провести ингаляцию аммиаком
- Д. Д. Дать кислород

**Ведущий признак I периода лихорадки**

- Г. Г. Чувство жара
- А. А. Потоотделение
- В. В. Озноб
- Б. Б. Головные боли
- Д. Д. Слезотечение

**Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимационные мероприятия можно прекратить через**

- Г. Г. 15-20 мин.
- Б. Б. 3-6 мин.
- А. А. 30-40 мин.
- В. В. 2 часа
- Д. Д. 1 час

**Типичное проявления перелома основания черепа**

- А. А. Ликворея или кровотечение из носа и ушей
- Б. Б. Нарушение сознания
- В. В. Гематома в затылочной области
- Г. Г. Симптом «очков»
- Д. Д. Икота

**При попадании биологических жидкостей пациента на слизистые оболочки рта, немедленно прополоскать раствором**

- Б. Б. Перманганата калия 0,25 %
- В. В. Перекиси водорода 6 %
- А. А. Сульфацила натрия 30 %
- Г. Г. Спирта 70%
- Д. Д. Фурацилина 1:5000

**Национальный календарь профилактических прививок регламентируется  
Приказом Министерства здравоохранения РФ**

А. А. От 27.06.2001 № 229

Г. Г. От 21.03.2014 № 125н

Б. Б. От 31.01.2011 г. № 51н

В. В. От 30.10.2007 г. № 673

Д. Д. От 15.06.2013 №33н

**Для постановки гипертонической клизмы необходимо приготовить раствор**

Б. Б. 5% сульфата магния

А. А. 10% натрия хлорида

В. В. 2% натрия гидрокарбоната

Г. Г. 0,9% натрия хлорида

Д. Д. 40% кальция хлорида

**Положение пациента при постановке очистительной клизмы**

Г. Г. На спине

А. А. На правом боку

Б. Б. На левом боку

В. В. На животе

Д. Д. Все верно

**Задержка мочи называется**

Б. Б. Полиурией

В. В. Олигурией

А. А. Анурией

Г. Г. Ишурией

Д. Д. Никтурией

**К ятрогенным относятся заболевания**

Г. Г. Наследственного генеза

А. А. Обусловленные вредными факторами производства

Б. Б. Обусловленные неосторожными действиями или высказываниями  
медицинских работников

В. В. С неблагоприятным прогнозом

Д. Д. Обусловленные окружающей средой

**Третий этап сестринского процесса включает**

А. А. Постановку сестринского диагноза

В. В. Планирование ухода

Б. Б. Оценку состояния пациента

Г. Г. Сбор данных о пациенте

Д. Д. Уход



**Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается во всех перечисленных случаях, кроме**

- Б. Б. Распространения инфекционных заболеваний
- В. В. Расследования случаев массовых отравлений и поражений
- А. А. Запросов органов дознания и следствия
- Г. Г. Запроса администрации по месту работы гражданина
- Д. Д. Обращения за сведениями законного представителя несовершеннолетнего лица

**Для облегчения сухого кашля медсестра рекомендует пациенту**

- Г. Г. Витамины
- Б. Б. Противокашлевое средство
- А. А. Отхаркивающие сиропы и согревающие средства на грудную клетку
- В. В. Антибиотики
- Д. Д. Спазмолитики

**К мерам профилактики инфекционной заболеваемости, направленным на организм человека (хозяина инфекции) относится**

- Г. Г. Дезинсекционные мероприятия
- А. А. Использование антибактериальных препаратов
- Б. Б. Иммунизация
- В. В. Дезинфекционные мероприятия
- Д. Д. Использование противовирусных препаратов

**Реанимацию обязаны проводить**

- А. А. Только врачи и медсестры реанимационных отделений
- Б. Б. Все специалисты, имеющие медицинское образование
- В. В. Всё взрослое население
- Г. Г. Все население
- Д. Д. Только специалисты спасательных служб

**Физиологическая температура тела пациента чаще бывает ниже**

- Б. Б. В обед
- А. А. Утром
- В. В. Вечером
- Г. Г. Ночью
- Д. Д. В течение дня температура неизменна

**Ферментные препараты, улучшающие пищеварение, следует принимать**

- Б. Б. После еды, запивая молоком или водой
- А. А. Во время еды
- В. В. Между приемами пищи
- Г. Г. Независимо от приема пищи
- Д. Д. За 2 часа до еды

**Длина иглы для внутримышечной инъекции у взрослых (в мм)**

- В. В. 30
- Г. Г. 20
- Б. Б. 40
- А. А. 60
- Д. Д. 10

**Основные жалобы при гипертоническом кризе**

- Г. Г. Колющие боли в области сердца, сердцебиение
- А. А. Приступ удушья, кашель с пенистой мокротой
- Б. Б. Головные боли, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, тошнота
- В. В. Головные боли, обморочные состояния, судороги
- Д. Д. Тошнота, рвота с примесью желчи, боли в правом подреберье

**Окончательная остановка кровотечения производится**

- Г. Г. Прижатием сосуда на протяжении
- А. А. Наложением жгута
- В. В. Перевязкой сосуда в ране
- Б. Б. Наложением зажима в ране
- Д. Д. Максимальным сгибанием конечности

**Для общего анализа мочи пациент должен собрать**

- А. А. 100-150 мл утренней мочи
- Б. Б. 300 мл утренней мочи
- В. В. 100 мл вечерней мочи
- Г. Г. 500 мл мочи
- Д. Д. 100 мл днем

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Фактор передачи инфекции, 2. Пути передачи инфекции, 3. Источник инфекции и значением (буква): А. Контакт, Б. Воздух, В. Вода, Г. Трансмиссия, Д. Человек, Е. Почва, Ж. Животное**

- 1-Б, В, Е; 2-А, Б; 3-В, Ж;
- 1-Б, В, Г; 2-А, Е; 3-Д, Ж;
- 1-Б, Б, 2-А, Г; 3-Д, Ж;
- 1-Б, В, Е; 2-А, Г; 3-Д, Ж;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между методом иммунопрофилактики (цифра) 1. Специфическая иммунопрофилактика, 2. Неспецифическая иммунопрофилактика**

и понятием (буква) А. Вакцина, Б. Закаливание, В. Активный иммунитет, Г. Пассивный иммунитет, Д. Режим труда и отдыха, Е. Отсутствие вредных привычек, Ж. Иммуномодуляторы

1-А, В, Ж 2-А, Е,

1-А, В, Ж; 2-Б, Д, Е, Г

1-А, Д, Е, Ж 2-А, Б, Г;

1-А, В, Г; 2-Б, Д, Е, Ж

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между видом потребности (цифра) 1. Социальная потребность, 2. Потребность в самовыражении, 3. Физиологическая потребность и его определением (буква) А. Ненависть, Б. Творчество, В. Признание, Г. Физический комфорт

1-А; 2-Б; 3-В

1-В; 2-Б; 3-Г

1-Г; 2-Б; 3-А

1-Б; 2-В; 3-Г

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между заболеванием (цифры) и возбудителем (буквы): 1. Холера 2. Брюшной тиф, 3. Корь, 4. Туберкулез и возбудителем (буквы) А.

Микобактерия, Б. Вибрион, В. Стафилококк, Г. Сальмонелла, Д. Морбилливирус, Е. Стрептококк, Ж. Бактерия

1-Д; 2-Г; 3-Б; 4-А

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А

1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-А

Последовательность действий при оказании помощи пострадавшему с синдромом длительного сдавления

Г. Г. Обезболивание, освобождение сдавленной конечности, наложение асептической повязки

Б. Б. Освобождение сдавленной конечности, обезболивание, инфузия, наложение жгута, иммобилизация

А. А. Наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, инфузия, наложение асептической повязки, наружное охлаждение конечности

В. В. Обезболивание, иммобилизация, наложение жгута, инфузия

Д. Д. Наложение повязки, освобождение сдавленной конечности, обезболивание

К основным побочным действиям диуретиков НЕ относится

А. А. Ортостатическая гипотония

- В. В. Кожная сыпь
- Б. Б. Гипокалиемия
- Г. Г. Тошнота, рвота
- Д. Д. Боли в области сердца

**Одно из частых побочных действий никотиновой кислоты**

- В. В. Боль в животе
- Г. Г. Боли в суставах
- Б. Б. Повышение АД
- А. А. Покраснение кожи
- Д. Д. Горечь во рту

**Основное назначение функциональной кровати**

- В. В. Облегчает работу медицинскому персоналу
- Г. Г. Экономия места в отделении
- Б. Б. Быстрота и легкость передвижения
- А. А. Придать больному выгодное и удобное положение
- Д. Д. Легкость в обработке

**Остатки мощющего средства на инструментах определяются**

- Г. Г. Калиевой пробой
- А. А. Амидопириновой пробой
- Б. Б. Фенолфталеиновой пробой
- В. В. Азопирамовой пробой
- Д. Д. Термической пробой

**Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается**

- А. А. К углу нижней челюсти
- Б. Б. В ямке за ключицей
- В. В. К VI шейному позвонку
- Г. Г. К I ребру
- Д. Д. К трахее

**При попадании 10% хлорида кальция в мягкие ткани развивается осложнение**

- А. А. Тромбофлебит
- Б. Б. Некроз
- В. В. Абсцесс
- Г. Г. Гепатит
- Д. Д. Стеноз

**Перекладывание кровоостанавливающего жгута производят с целью**

- А. А. Продлить допустимое время остановки кровотечения с помощью жгута
- Б. Б. Заменить импровизированный жгут на табельный
- В. В. Поправить прокладку под жгутом во избежание травмирования мягких тканей
- Г. Г. Переместить ранее наложенный жгут максимально близко к ране

Д. Д. Подложить записку с указанием времени

**Испытание при приеме на работу может устанавливаться**

В. В. Для лиц, окончивших образовательные учреждения и впервые поступающих на работу по полученной специальности

А. А. Для беременных женщин

Г. Г. В случае перевода на другую должность внутри одной организации

Б. Б. Для несовершеннолетних

Д. Д. Для лиц, ранее уволенных из данной организации и принятых вновь на эту же должность

**Диспансеризация — это метод**

А. А. Выявления острых и инфекционных заболеваний

Б. Б. Активного динамического наблюдения за состоянием здоровья определенных контингентов с целью раннего выявления и оздоровления больных

В. В. Наблюдения за состоянием окружающей среды

Г. Г. Оказания неотложной помощи

Д. Д. Наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями

**На восприимчивость к инфекции не влияет**

Б. Б. Нарушение в иммунной системе

Г. Г. Хроническое неинфекционное заболевание

А. А. Возраст

В. В. Конституция (телосложение)

Д. Д. Вакцинация

**Для мытья рук предпочтительно использовать**

Б. Б. Мыльницу с решеткой

В. В. Губки с моющим раствором

А. А. Индивидуальное мыло

Г. Г. Жидкое мыло в дозаторе (диспенсере)

Д. Д. Влажные салфетки

**Первоочередные мероприятия при анафилактическом шоке**

Г. Г. П/к введение адреналина в место инъекции

А. А. Введение антигистаминных препаратов

В. В. В/в введение адреналина и преднизолона

Б. Б. Наложение жгута

Д. Д. Ингаляции кислорода

**Медицинские осмотры персонала медицинской организации проводятся с целью**

Б. Б. Разрыва путей передачи инфекции

А. А. Выявления источника инфекции

В. В. Повышения невосприимчивости к инфекции

Г. Г. Устранения фактора передачи

Д. Д. Уничтожения возбудителей инфекционных заболеваний

**Сублингвальный путь введения лекарственных веществ — это введение**

А. А. В прямую кишку

В. В. Под язык

Б. Б. В дыхательные пути

Г. Г. На кожу

Д. Д. Под кожу

**Наиболее тяжелая форма аллергической реакции пациента на введение лекарственного вещества**

А. А. Отек Квинке

Б. Б. Анафилактический шок

В. В. Крапивница

Г. Г. Покраснение

Д. Д. Рвота

**В 1 мл простого инсулина содержится (в ЕД)**

Г. Г. 4

Б. Б. 40

А. А. 100

В. В. 20

Д. Д. 20

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Гепатит С, 2. Гепатит А, 3. Корь, 4. Краснуха и типичной длительностью инкубационного периода (буква) А. от 7 до 50 дней, Б. от 7 до 14 дней, В. от 14 до 180 дней, Г. от 21 дня до 60 дней, Д. от 14 до 21 дня, Е. от 60 до 180 дней**

1- Д; 2- Б; 3-А; 4-В

1- А; 2- Б; 3-Д; 4-В

1- А; 2- Б; 3-В; 4-Д

1- В; 2- А; 3-Б; 4-Д

**"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (понятием) (цифра) 1. Кома, 2. Десмургия, 3. Деменция, 4. Состояние новорожденного, 5. Сортировка и именем (буква) А. Дезо Пьер, Б. Флоренс Найтингел, В. Мечников И.И., Г. Вирхов Рудольф, Д. Апгар Вирджиния, Е. Юдин С.С., Ж. Пирогов Н.И., З. Глазго (Тиздейл Грэхэм, Б. Дж. Дженнетт), И. Альцгеймер Алоис**

"

1-З; 2-А; 3-И; 4-Д; 5-Ж

1-З; 2-Ж; 3-Д; 4-Д; 5-Ж

1-Ж; 2-Б; 3-И; 4-Г; 5-Ж

1-Б; 2-А; 3-И; 4-Г; 5-Ж

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Холера, 2. Корь, 3. Скарлатина, 4. Грипп и симптомом синдромом (буква) А. Диарея, Б. Гипертермия, В. Сыпь, Г. Интоксикация, Д. Обезвоживание, Е. Рвота**

1-А,Б, Д, Е; 2-А, В, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Г, Д, Е; 2-Б, В, Г; 3-Б, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Д, Е; 2-Б, А, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Д

1-А, Г, Д, Е; 2-Б, В, Г; 3-А,Б, В; 4-Б

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Ортопное, 2. Акроцианоз, 3. Обморок, 4. Асцит, 5. Анасарка и описанием (буква) А. Кратковременная потеря сознания, Б. Скопление жидкости в плевральной полости, В. Положение в постели, Г. Скопление жидкости в брюшной полости, Д. Синюшность губ, кончика носа, Е.**

**Распространенные отеки**

1-Д; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-Е;

1-Б; 2-Д; 3-А; 4-Г; 5-Е;

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г; 5-Е;

1-В; 2-Д; 3-А; 4-Г; 5-Е;

**Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» принят в**

В. В. 2000 г.

А. А. 1991 г.

Г. Г. 2010 г.

Б. Б. 1988 г.

Д. Д. 2014 г.

**Срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более**

Б. Б. Не более шести месяцев

В. В. Не более трёх лет

А. А. Не более одного года

Г. Г. Не более пяти лет

Д. Д. Не более 1 мес.

**Показание к применению грелки**

В. В. Кровотечение

- А. А. Острый аппендицит
- Г. Г. Переохлаждение
- Б. Б. Инсульт
- Д. Д. Гипотония

**Энтеральный путь введения лекарственных средств**

- Г. Г. На кожу
- Б. Б. Через дыхательные пути
- А. А. Через желудочно-кишечный тракт
- В. В. Внутрикожно
- Д. Д. В мышцу

**При попадании воздуха в сосуд развивается осложнение**

- Б. Б. Тромбофлебит
- А. А. Воздушная эмболия
- В. В. Некроз
- Г. Г. Инфильтрат
- Д. Д. Нагноение

**Для записи ЭКГ V6 активный электрод располагают**

- А. А. По переднеподмышечной линии на уровне V4
- В. В. По заднеподмышечной линии на уровне V4
- Б. Б. По среднеподмышечной линии на уровне V4
- Г. Г. По срединноключичной линии
- Д. Д. По заднеключичной линии

**Какой препарат НЕ является базовым в лечении бронхиальной астмы**

- А. А. Симбикорт
- Б. Б. Беротек
- В. В. Интал
- Г. Г. Тайлед
- Д. Д. Недокромил

**Рекомендуемые медсестрой немедикаментозные мероприятия, снижающие артериальное давление все, кроме**

- А. А. Отказ от курения, ограничение потребления алкоголя
- В. В. Снижение физической активности
- Б. Б. Снижение потребления поваренной соли
- Г. Г. Нормализация массы тела
- Д. Д. Избегать стрессов

**Обработка промежности тяжелобольному и неподвижному пациенту проводится**

- А. А. Ежедневно
- Б. Б. После каждого акта дефекации и мочеиспускания
- В. В. 1 раз в неделю



- Г. Г. 3 раза в день
- Д. Д. 2 раза в неделю

**Проба для проверки мед.инструментария на наличие скрытой крови называется**

- Б. Б. Фенолфталеиновой
- Г. Г. Бензойной
- А. А. Бензидиновой
- В. В. Азопирамовой
- Д. Д. Гемоиндикационной

**Количество капель лекарственного вещества для введения в глаза**

- А. А. 1-2
- Б. Б. 4-6
- В. В. 6-8
- Г. Г. 8-10
- Д. Д. 12-13

**Укажите концентрацию изотонического раствора глюкозы**

- А. А. 0,85%
- Г. Г. 5%
- Б. Б. 3%
- В. В. 10%
- Д. Д. 1%

**Здоровье по определению ВОЗ - это**

- Г. Г. Отсутствие заболеваний
- Б. Б. Отсутствие хронических заболеваний и функциональных нарушений
- А. А. Полное физическое, духовное и социальное благополучие
- В. В. Отсутствие физических и психических нарушений
- Д. Д. Отсутствие острых заболеваний

**Потеря сознания, бледность кожных покровов, снижение АД - симптомы**

- В. В. Коллапса
- Г. Г. Инфаркта
- А. А. Шока
- Б. Б. Обморока
- Д. Д. Инсульта

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между описанием обсуждения какого-либо вопроса (цифра) 1. Выслушать каждого и прийти к общей точке зрения, 2. Высказываются все и остаются при своем мнении, 3. Высказывается каждый, не слушая других, 4. Каждый стремится заставить других принять его точку зрения и его определением**

**(буква) А. Спор, Б. Дискуссия, В. Конфликт, Г. Полемика**

1-А; 2-Г; 3-Б; 4-В

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между понятиями (цифра) 1. Обмен информацией между людьми, 2. Цель общения, 3. Мотив общения, 4. Способ общения и описанием**

**(буква) А. Сознательное намерение, Б. Рациональное намерение, В. Общение, Г.**

**Несознательное намерение, Д. Вербальный, Е. Прозрачный**

1-В; 2-Д; 3-Б; 4-Г

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом проблемы (цифра) 1. Физиологическая проблема, 2. Психологическая проблема, 3. Социальная проблема и его описанием**

**(буква) А. Страх смерти, Б. Боль, В. Одиночество, Г. Недержание мочи, Д.**

**Неуверенность в исходе лечения**

1-Б, 2-Д; 3-В

1-Д, 2-Б; 3-В

1-А, Д; 2-Б, Г; 3-В

1-Б, Г; 2-А, Д; 3-В

**При критическом снижении температуры, пациента необходимо**

А. А. Уложить с приподнятым головным концом

Б. Б. Уложить с приподнятым ножным концом

В. В. Уложить строго горизонтально

Г. Г. Усадить

Д. Д. Уложить на бок

**Если у пациента кашель с обильной мокротой, медсестра должна**

Г. Г. Дать противокашлевое средство

Б. Б. Рекомендовать обильное питье

А. А. Обеспечить больного плевательницей

В. В. Рекомендовать диету с повышенным содержанием жиров

Д. Д. Сделать ингаляцию

**В первом периоде лихорадки возможно применение**

- В. В. Влажного обертывания
- Г. Г. Холодного компресса
- А. А. Пузыря со льдом
- Б. Б. Грелки
- Д. Д. Обдувания

**Графики сменности доводятся до сведения работников не позже, чем за**

- В. В. 2 недели до введения их в действие
- Г. Г. 3 дня до введения их в действие
- Б. Б. Одну неделю до введения их в действие
- А. А. Один месяц до введения их в действие
- Д. Д. Накануне

**Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется в медицинской документации с подписью**

- А. А. Медработника
- Г. Г. Гражданина или его представителя
- Б. Б. Родственника пациента
- В. В. Любого из сопровождающих
- Д. Д. Главного врача

**Лицензирование медицинской организации означает**

- В. В. Определение соответствия качества медицинской помощи установленным стандартам
- Г. Г. Оценку степени квалификации медицинского персонала
- А. А. Определение видов и объема медицинской помощи, оказываемой медицинской организацией
- Б. Б. Выдачу документов на право заниматься определенным видом лечебно-профилактической деятельности
- Д. Д. Определение сроков оказания медицинской помощи

**Для профилактики послеоперационных бронхолегочных осложнений больному назначают**

- А. А. Дыхательную гимнастику
- Б. Б. Интубацию трахеи
- В. В. Диету, богатую белком
- Г. Г. Компресс на грудную клетку
- Д. Д. Ингаляции кислорода

**Медицинской сортировкой называется**

- А. А. Метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях
- Б. Б. Выделение пораженных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи
- В. В. Распределение потока пострадавших на «ходячих» и «носилочных»
- Г. Г. Распределение пораженных на группы по возрастному признаку

Д. Д. Распределение пораженных на группы по полу

**Правило укладывания больного при сердечно-легочной реанимации**

- Б. Б. Приподнять головной конец
- Г. Г. Опустить головной конец
- А. А. Приподнять ножной конец
- В. В. Положить на твердую ровную поверхность
- Д. Д. Опустить ножной конец

**Независимое сестринское действие во время обострения бронхиальной астмы**

- Г. Г. Ввести антигистаминные средства
- Б. Б. Ввести эуфиллин в вену
- А. А. Придать удобное положение пациенту, применить карманный ингалятор
- В. В. Ввести преднизолон в вену
- Д. Д. Начать инфузионную терапию

**Кашель с розовой пенистой мокротой, удушье во время гипертонического криза - признак**

- В. В. Бронхиальной астмы
- Г. Г. Легочного кровотечения
- А. А. Крупозной пневмонии
- Б. Б. Отёка легких
- Д. Д. Инфаркта миокарда

**Осложнение раннего послеоперационного периода**

- А. А. рвота
- Б. Б. Эвентрация кишечника
- В. В. Бронхопневмония
- Г. Г. Лигатурный свищ
- Д. Д. Перитонит

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между порядком действия для профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов в аварийной ситуации (цифра): 1. - 1; 2. - 2; 3. - 3; 4. - 4; 5.-5; 6. - 6; 7. -7 и описанием действия (буква) А. смазать ранку 5% спиртовым раствором йода, Б. выдавить кровь из ранки, В. снять перчатки, Г. под проточной водой тщательно вымыть руки с мылом, Д. использованные перчатки погрузить в дезинфицирующий раствор, Е. заклеить ранку бактерицидным лейкопластырем, Ж. обработать руки 70% спиртом, З. вымыть руки в перчатках с мылом**

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-Ж; 5-В; 6-Е; 7-Г 8-З

1-З, 2 - В, 3 - Д, 4 - Б, 5 - Г, 6 - Ж, 7 - А, 8- Е

1-Д; 2-В; 3-Ж; 4-А; 5-Б; 6-Е; 7-Г 8 - З

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом инъекции (цифра): 1. Внутримышечно, 2. Внутривенно, 3. Подкожно, 4. Внутрикожно и углом наклона иглы в градусах (буква): А. 45, Б. 90, В. 10-15, Г. 60, Д. 30**

1-А; 2-В; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-В; 3-А; 4-В

1-Б; 2-Б; 3-В; 4-В

1-А; 2-В; 3-Г; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Антропометрия, 2. Пульс, 3. Дыхание, 4. Артериальное давление, 5. Динамометрия и определением (буква) А. Напряжение, Б. Тахипное, В. Гипертония, Г. Вес, Д. Наполнение, Е. Гипотония, Ж. Тип, З. Рост, И. Мышечная сила**

1-А 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-Ж

1- А, Д; 2- Г, З; 3-Б, 4-В, Е; 5-И

1-Г, З; 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-И

1-А, И; 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-Ж

**За контактными с больными сальмонеллёзом устанавливают медицинское наблюдение в течение**

В. В. 30 дней

Г. Г. 180 дней

Б. Б. 10 дней

А. А. 7 дней

Д. Д. 2 недели

**Высокую степень риска заражения представляют**

Г. Г. Колюще-режущий медицинский инструментарий

А. А. Стены, потолки, полы

Б. Б. Термометры, тонометры

В. В. Медицинская мебель

Д. Д. Посуда

**Введение наркотических средств пациенту производится в присутствии**

Г. Г. Зав.отделением

Б. Б. Второй медсестры

А. А. Врача

В. В. Родственников

Д. Д. Главной м/сестры

**Правило хранения термометров**

- Б. Б. В 3% растворе перекиси водорода
- А. А. После дезинфекции в сухом виде
- В. В. В 3% растворе хлорамина
- Г. Г. В дистиллированной воде
- Д. Д. В 70% спирте

**Продолжительность сбора анализа мочи по Зимницкому**

- Г. Г. 3 часа
- Б. Б. 10 часов
- А. А. 24 часа
- В. В. 8 часов
- Д. Д. 1 час

**Способ транспортировки пациента определяет:**

- Г. Г. Младшая медицинская сестра
- А. А. Палатная медицинская сестра
- Б. Б. Врач
- В. В. Старшая медицинская сестра отделения
- Д. Д. Больной сам решает

**При ожирении пищу нельзя**

- А. А. Готовить на пару
- Б. Б. Жарить
- В. В. Тушить
- Г. Г. Отваривать
- Д. Д. Принимать в сыром виде

**К ключевым государственным задачам развития в сфере охраны здоровья матери и ребёнка относится**

- А. А. Возможность выбора врача
- Б. Б. Развитие сети перинатальных центров
- В. В. Возможность получить санаторно-курортное лечение
- Г. Г. Выдача материнского капитала
- Д. Д. Страхование матерей

**Реанимация показана**

- Б. Б. Только при внезапной смерти молодых больных и детей
- Г. Г. Только, если клиническая смерть наступила в стационаре
- А. А. В каждом случае смерти больного
- В. В. При внезапно развивающихся терминальных состояниях
- Д. Д. Только у лиц до 70 лет

**Путь передачи инфекции при заражении вирусным гепатитом «В»**

- Г. Г. Воздушно-пылевой
- А. А. Пищевой
- Б. Б. Искусственный (артифициальный)
- В. В. Воздушно-капельный
- Д. Д. Бытовой

**После перенесенной острой дизентерии диспансерному наблюдению подлежат**

- Б. Б. Лица «декретированной группы»
- А. А. Все переболевшие
- В. В. Только больные, перенесшие тяжелое течение
- Г. Г. Бактерионосители
- Д. Д. Только дети

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Амнезия, 2. Эйфория, 3. Эмоция, 4. Вербальный, 5. Конфликт и понятием значением (буква) А. Настоение, Б. Общение, В. Память, Г. Интерес, Д. Слово, Е. Взгляд, Ж. Речь, З. Информация**

1-В; 2-А; 3-Б, З; 4-Д, Ж; 5-Г

1-В; 2-А; 3-Б, З; 4-Г; 5-Д, Ж

1-В; 2-А; 3-З; 4-Д 5-Г

1-В; 2-Г; 3-З; 4-Д 5-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между причинами, факторами, проблемами, формами, относящимися к инфаркту миокарда (цифра): 1. Фактор риска, 2. Психологическая проблема, 3. Причина, 4. Форма и описанием определением (буква): А. Стресс, Б. Атеросклероз, В. Страх смерти, Г. Гиподинамия, Д. Тромбоз, Е. Артериальная гипертензия, Ж. Болевая, Е. Абдоминальная**

1-А, В, Б; 2-В; 3-А, Д; 4-Е, З

1-А, Б,В; 2-Г; 3-Б, 4-Ж, З

1-А, Г, Е; 2-В; 3-Б, Д; 4-Ж, З

**К острой левожелудочковой недостаточности относится**

- Б. Б. Отек легких
- А. А. Шок
- В. В. Аритмия
- Г. Г. Обморок
- Д. Д. Тахикардия

**Для исследования мочи по методу Нечипоренко мочу собирают**

- А. А. За сутки

- Г. Г. Утром из середины струи
- Б. Б. За 10 часов
- В. В. За три часа
- Д. Д. Накануне вечером

**Для исследования суточной мочи на сахар ее собирают в течение**

- Г. Г. 3 часов
- Б. Б. 10 часов
- А. А. 24 часов
- В. В. 8 часов
- Д. Д. 1 Часа

**Наука о профессиональном поведении медработников - это**

- В. В. Нравственность
- Г. Г. Честь
- А. А. Этика
- Б. Б. Деонтология
- Д. Д. Порядочность

**При появлении признаков нагноения послеоперационной раны в первую очередь необходимо**

- А. А. Наложить сухую стерильную повязку
- В. В. Снять несколько швов, дренировать рану
- Б. Б. Наложить повязку с ихтиоловой мазью
- Г. Г. Ввести наркотический анальгетик
- Д. Д. Назначить антибиотики

**Положение Тренделенбурга применяется при операциях**

- В. В. На печени
- Г. Г. На сердце
- Б. Б. На почке
- А. А. На органах малого таза
- Д. Д. На желудке

**В мирное время для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях применяется система этапного лечения**

- А. А. Одноэтапная
- Б. Б. Двухэтапная
- В. В. Трехэтапная
- Г. Г. Многоэтапная
- Д. Д. Пятиэтапная

**Гирудотерапия -это**

- Б. Б. Лечение заболеваний человека змеиным ядом
- Г. Г. Метод теплолечения



- А. А. Метод акупунктуры
- В. В. Применение пиявок с лечебными целями
- Д. Д. Лечение заболеваний человека пчелами и их продуктами

**Частота искусственных вдохов при ИВЛ у взрослых должна быть**

- А. А. 4-5 в минуту
- Б. Б. 12-16 в минуту
- В. В. 30-40 в минуту
- Г. Г. 50-70 в минуту
- Д. Д. 5-10 в минуту

**Противопоказанием для проведения реанимации является**

- В. В. Инфаркт миокарда
- Г. Г. Наличие хронического заболевания у пациента
- А. А. Инсульт
- Б. Б. Неизлечимое заболевание в терминальной стадии
- Д. Д. Острое отравление сердечными гликозидами

**Расположите документы по степени значимости: 1-приказ администрации учреждения, 2-Федеральный закон, 3- приказ МЗ РФ, 4 – распоряжение регионального МЗ**

- Б. Б. 2, 3, 4, 1
- А. А. 1, 2, 3, 4
- В. В. 3, 2, 1, 4
- Г. Г. 4, 1, 3, 2
- Д. Д. 4, 3, 2, 1

**При переподготовке работника с одной специальности на другую, например, с «сестринского дела» на «сестринское дело в педиатрии»**

- А. А. Категория сохраняется
- В. В. Категория не сохраняется
- Б. Б. Категория может быть сохранена по усмотрению администрации медицинской организации
- Г. Г. Категория снижается на одну
- Д. Д. Категория снижается на две

**В стерилизационной коробке с фильтром содержимое сохраняется стерильным с момента стерилизации в течение**

- В. В. 6 часов
- Г. Г. 24 часов
- Б. Б. 7 суток
- А. А. 20 суток
- Д. Д. 3 суток

**"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого**

пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между номером нормативного документа (цифра): 1. №323-ФЗ, 2. №52-ФЗ, 3. №2.1.3.2630-10, 4. №541Н и названием (буква): А.

Санитарно-эпид.требования к организациям, осуществляющим медиц. деятельность; Б. Об основах охраны здоровья граждан в РФ; В. Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения; Г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

"

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-А; 2-Г; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г

1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г

**Какого цвета накладывают электрод при записи ЭКГ на левую руку**

Г. Г. Черного

А. А. Красного

Б. Б. Желтого

В. В. Зеленого

Д. Д. Коричневого

**Побочным эффектом снотворных средств НЕ является**

А. А. Синдром отмены

Б. Б. Повышенная возбудимость

В. В. Лекарственную зависимость

Г. Г. Возрастание риска автопроисшествий

Д. Д. Аллергическая реакция

**Для защиты щитовидной железы при авариях на радиационно опасных объектах применяют**

Б. Б. Промедол

В. В. Этаперазин

А. А. Тарен

Г. Г. Йодистый калий

Д. Д. Хлористый калий

**Специальность по сертификату и занимаемая должность это**

А. А. Одно и тоже

Б. Б. Это разные понятия

В. В. Существенной разницы между специальностью и должностью нет

Г. Г. Должность указывается в сертификате

Д. Д. Синонимы

**Препаратом выбора при лечении анафилактического шока является**

Б. Б. Антигистаминные препараты

- А. А. Адреналин
- В. В. Антибиотики
- Г. Г. Гормоны
- Д. Д. Пипольфен

**Второй этап сестринского процесса включает**

- Б. Б. Постановку сестринского диагноза
- А. А. Планирование ухода
- В. В. Взаимозависимые сестринские вмешательства
- Г. Г. Оценку результатов ухода
- Д. Д. Сбор информации

**Ведущий путь заражения гепатитом «В», «С» и ВИЧ в медицинских организациях**

- В. В. Парентеральный
- А. А. Контактно-бытовой
- Б. Б. Фекально-оральный
- Г. Г. Вертикальный
- Д. Д. Воздушно-капельный

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между названием метода дезинфекции (цифра) 1.**

**Механический, 2. Физический, 3. Химический, 4. Биологический и способом дезинфекции (буква) А. Протирание, Б. Кипячение, В. Вентиляция, Г.**

**Ультрафиолетовое облучение, Д. Стирка, Е. Воздействие ультразвуком, Ж.**

**Хлорирование, З. Использование дезинфектантов, И. Антагонистическое действие микроорганизмов**

1-А, В, Д; 2-Б, Г, Е; 3-Ж, З; 4-И

1-А, Б, Д; 2-Б,Д, Е; 3-Ж, З; 4-И

1-А, В, Ж; 2-Б, Г,И; 3-Ж, З; 4-И

**Окклюзионная повязка применяется при**

- Б. Б. Открытом пневмотораксе
- А. А. Венозных кровотечениях
- В. В. Ранение мягких тканей головы
- Г. Г. После пункции сустава
- Д. Д. После лапароцентеза

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Острый**

**гломерулонефрит, 2. Мочекаменная болезнь, 3. Пиелонефрит и причиной, которой она вызвано (буква): А. Однообразное питание, Б. Аллергия, В. Гемолитический**

**стрептококк, Г. Нарушение уродинамики, Д. Хроническая инфекция мочевых путей**

1-Д; 2-А, В; 3-Г

1-А; 2-В, Г; 3-Г

1-В; 2-А, Г; 3-Г, Д

1-Д; 2-А, Г; 3-Г, В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом клизмы (цифра): 1.Клизма по Огневу, 2.**

**Гипертоническая клизма, 3. Очистительная клизма, 4. Сифонная клизма и составом**

**(буква): А. NaCl-10% 150 ml, Б. NaCl 10% 20 мл+глицерин 20 мл + Перекись 3% 20 мл;**

**В. Вода до 10 л, Г. Вода 1,5-2,0 л; Г. Масло вазелиновое 100 мл.**

1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А

**Последовательность выполнения действий при проведении сердечно-легочной реанимации**

А. ИВЛ, наружный массаж сердца

Б. наружный массаж сердца, ИВЛ

В. ИВЛ, тройной прием Сафара, наружный массаж сердца

Г. Тройной прием Сафара, ИВЛ, наружный массаж сердца

Д. Дефибрилляция, ИВЛ

**Лечение пролежней третьей степени осуществляется**

А. А. Протиранием 10% камфорным спиртом

В. В. Хирургическим методом

Б. Б. Массажем

Г. Г. Смазыванием 70% этиловым спиртом

Д. Д. Обработкой марганцовокислым калием

**Независимые сестринские вмешательства включают**

Г. Г. Постановку капельницы

Б. Б. Запись ЭКГ

А. А. Кормление пациента

В. В. В/м инъекции

Д. Д. Постановку клизмы

**Можно ли проходить повышение квалификации раньше, чем через 5 лет**

Г. Г. Проходить необязательно, достаточно иметь диплом

А. А. Нельзя, надо проходить строго через 5 лет

Б. Б. Можно

В. В. Можно пройти позже

Д. Д. Все перечисленное верно

**Ведущий признак при типичной форме инфаркта миокарда**

Г. Г. Дефицит пульса

А. А. Аритмия сердечной деятельности

Б. Б. Сжимающий характер болей за грудиной

В. В. Гипертензивный синдром

Д. Д. Снижение температуры тела

**Действие медсестры в первые дни послеоперационного периода пациента**

Г. Г. Выхаживание

А. А. Назначение гигиенических ванн

Б. Б. Назначение инъекций

В. В. Назначение массажа

Д. Д. Назначение ЛФК

**За три дня до проведения ультразвукового исследования органов брюшной полости из рациона питания пациента медсестра посоветует исключить**

В. В. Яйца, белый хлеб, сладости

Г. Г. Мясо, рыбу, консервы

А. А. Гречневую кашу, помидоры, гранаты

Б. Б. Молоко, овощи, фрукты, черный хлеб

Д. Д. Чай, кофе

**Вид санитарной обработки пациента определяет**

Б. Б. Врач

А. А. Медицинская сестра приемного отделения

В. В. Старшая медсестра приемного отделения

Г. Г. Младшая медицинская сестра

Д. Д. Больной сам решает

**Зависимые сестринские вмешательства включают**

В. В. Мероприятия по личной гигиене тяжелобольных

Г. Г. Кормление больных

А. А. Смена белья

Б. Б. В/м, в/в, п/к инъекции

Д. Д. Знакомство больных с режимом в отделении

**Может ли медицинская сестра работать акушеркой**

Г. Г. На усмотрение администрации медицинской организации

А. А. Может

В. В. Нет

Б. Б. Может, если пройдет повышение квалификации по «Акушерскому делу»

Д. Д. Все перечисленное верно

**Для любого медицинского вмешательства требуется согласие**

- Б. Б. Медсестры
- Г. Г. Зав. отделением
- А. А. Врача
- В. В. Пациента или его представителя
- Д. Д. Родственников пациента

**При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у ребенка должна быть**

- Г. Г. 6-8 см
- А. А. 1-2 см
- Б. Б. 2-4 см
- В. В. 4-5 см
- Д. Д. 5-6 см

**Ортостатический коллапс в виде резкого перепада давления развивается чаще**

- В. В. При переходе из горизонтального положения в вертикальное
- А. А. В горизонтальном положении
- Б. Б. При длительном стоянии
- Г. Г. В положении сидя
- Д. Д. При переходе из вертикального в горизонтальное положение

**В первую очередь при электротравме необходимо**

- Б. Б. Наложить асептическую повязку
- Г. Г. Ввести эуфиллин
- А. А. Ввести спазмолитики
- В. В. Прекратить воздействие тока на пострадавшего
- Д. Д. Проверить пульс

**В положении «лягушки» транспортируют пациентов с переломом**

- А. А. Верхней челюсти
- В. В. Костей таза
- Б. Б. Позвоночника
- Г. Г. Нижних конечностей
- Д. Д. Ребер

**При холере необходимо, прежде всего, обработать**

- Б. Б. Одежду больного
- Г. Г. Постельное белье
- А. А. Посуду больного
- В. В. Выделения больного
- Д. Д. Личные вещи больного

**Назовите первичные клинические признаки осложнения при переливании больному несовместимой крови**

Г. Г. Повышение АД и температуры

А. А. Остановка дыхания и сердечной деятельности

В. В. Выраженное беспокойство, озноб, боли в голове, пояснице, одышка, гиперемия лица, тахикардия, резкое падение АД

Б. Б. Рвота и кровохарканье, потеря сознания

Д. Д. Горечь во рту, слезотечение

**Появление пульса на сонной артерии непосредственно при непрямом массаже сердца НЕ свидетельствует**

Г. Г. О выборе правильной глубины продавливания грудной клетки

А. А. Об эффективности реанимации

В. В. Об оживлении больного

Б. Б. О правильности проведения массажа сердца

Д. Д. О возможном возобновлении самостоятельной сердечной деятельности

**Пациента с большой кровопотерей транспортируют**

А. А. Сидя

Г. Г. Лежа с опущенным головным концом на носилках

Б. Б. Полусидя

В. В. Лежа с приподнятым головным концом на носилках

Д. Д. Просто горизонтально

**Парентеральное введение лекарственных веществ предполагает лекарственные формы**

Г. Г. Порошки

Б. Б. Драже

А. А. Стерильные растворы

В. В. Таблетки

Д. Д. Капли

**Документ, разрешающий медицинскому учреждению указанный в нем вид деятельности**

В. В. Сертификат

Г. Г. Диплом

Б. Б. Приказ

А. А. Лицензия

Д. Д. Свидетельство

**Ведущий фактор передачи гнойно-септической инфекции в медицинских учреждениях**

В. В. Руки персонала

А. А. Инструменты

Б. Б. Предметы ухода

Г. Г. Воздух

Д. Д. Обувь

### **Белки необходимы организму как источник**

- Г. Г. Микроэлементов
- А. А. Энергии
- Б. Б. Строительного материала
- В. В. Витаминов
- Д. Д. Углеводов

### **На 1 этапе экстренную медицинскую помощь пострадавшим оказывают**

- А. А. Бригада скорой помощи
- В. В. Врачебно-фельдшерские бригады
- Б. Б. Бригада экстренной доврачебной помощи
- Г. Г. Бригады специализированной медицинской помощи
- Д. Д. Медицинские сестры

### **Температура воды для проведения санитарной обработки тяжелобольного**

- Г. Г. 45-50°С
- Б. Б. 39-40°С
- А. А. 35-37°С
- В. В. 40-42°С
- Д. Д. 28-30°С

### **Охлаждение ожоговой поверхности холодной водой показано**

- Г. Г. Только при химических ожогах
- Б. Б. Не показано
- А. А. В первые минуты после ожога I степени в течение 10-15 минут
- В. В. Только при ожоге III степени
- Д. Д. Только при ожогах пламенем

### **ЦСО – это**

- Б. Б. Централизованное стерилизационное отделение
- А. А. Центральное специализированное отделение
- В. В. Централизованное специализированное отделение
- Г. Г. Централизованное стерильное отделение
- Д. Д. Центральное статистическое отделение

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом травмы почек (цифра) 1. Открытая травма почки, 2. Закрытая травма почки и симптомами (буква) А. Гематурия, Б. Боль в поясничной области, В. Напряжение мышц поясничной области, Г. Запах мочи из раны, Д. Наличие раны кожных покровов, Е. Сохранение целостности кожи**

1- А, Б, Д; 2-А, В, Г, Д

1- А, Б, В, Г, Д; 2-А, Б, В, Г, Д, Е



1- А, Б, В, Д; 2-А, В, Г, Д

1- А, Б, В; 2-А, В, Г, Д

**К терминальным состояниям не относится**

В. В. Агония

Г. Г. Клиническая смерть

А. А. Преагональное состояние

Б. Б. Шок

Д. Д. Внезапная остановка дыхания и сердца

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между методом (видом) лечения (цифра) 1.**

**Физиотерапия, 2. Массаж, 3. Лечебная физкультура и термином(ами) (буква) А.**

**Мощность, Б. Длительность сеанса, В. Физическая нагрузка, Г. Глубина воздействия, Д. Интенсивность, Е. Проницаемость**

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, В 3-Б, Г, Д;

1- А, Б, Е; 2-Б, Г, В; 3-Б, В

1-Б, Г, Д; 2 - А, Б, Г, Е; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, Г, Д; 3-Б, В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Анурия, 2. Дизурия, 3. Ишурия, 4. Никтурия, 5. Олигурия и определением (буква) А. Расстройство мочеиспускания, Б. Отсутствие выделения мочи, В. Преобладание ночного диуреза, Г. Снижение количества выделяемой мочи, Д. Задержка мочи, Е. Повышение концентрации мочи, Ж. Недержание мочи**

1-В; 2-А; 3-Ж; 4-А; 5-Г

1-Б; 2-А; 3-Ж; 4-В; 5-Г

1-Г; 2-А; 3-Ж; 4-В; 5-Б

1-Ж; 2-А; 3-Г; 4-В; 5-Б

**Условиям измерения артериального давления не удовлетворяет**

В. В. Состояние покоя

Г. Г. Наложение манжеты в соответствии с инструкцией

Б. Б. Исключение курения и употребления крепкого кофе или чая

А. А. Поза больного, положение руки

Д. Д. Правильная техника измерения АД

**Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» введен в действие в**

А. А. 1988 г.

- Г. Г. 2011 г.
- Б. Б. 1993 г.
- В. В. 1998 г.
- Д. Д. 2014 г.

**К группе риска заражения ВИЧ-инфекцией относятся все, кроме**

- Г. Г. Проживающих совместно с ВИЧ инфицированным в одной квартире
- А. А. Имеющих незащищённый половой контакт
- Б. Б. Принимающих инъекционные наркотики
- В. В. Детей ВИЧ инфицированных матерей
- Д. Д. Гомосексуалистов

**Ацетилсалициловая кислота принимается при ИБС**

- Г. Г. Как жаропонижающее
- А. А. Как противовоспалительное средство
- Б. Б. В качестве дезагреганта
- В. В. Как болеутоляющее средство
- Д. Д. Как гипотензивное

**Признаками клинической смерти являются**

- Б. Б. Потеря сознания, нитевидный пульс, цианоз
- Г. Г. Потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии
- А. А. Нитевидный пульс, цианоз, агональное дыхание
- В. В. Потеря сознания, отсутствие пульса на сонных артериях, остановка дыхания, расширение зрачков
- Д. Д. Потеря сознания, пульс реже 40 в 1 мин., АД ниже 50 мм рт. ст.

**При исследовании функции почек по Зимницкому пациент должен собрать**

- Б. Б. 3 порции мочи
- Г. Г. 1 порцию мочи
- А. А. 6 порций мочи
- В. В. 8 порций мочи
- Д. Д. 4 порции мочи

**Во время коллапса кожные покровы**

- Г. Г. Гиперемированные, влажные
- А. А. Бледные, сухие, теплые
- Б. Б. Бледные, влажные, прохладные
- В. В. Гиперемированные, сухие
- Д. Д. Не меняются

**Можно ли делать очистительную клизму дистиллированной водой**

- Г. Г. Можно после дополнительного кипячения
- А. А. Можно
- Б. Б. Нельзя

В. В. Существенной разницы нет

Д. Д. Можно, если объем вводимой жидкости больше 1,5 литров

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между цветом электрода (цифра): 1. Красный, 2. Желтый, 3. Зеленый, 4. Черный и местом его наложения (буква): А. Левая нога, Б. Левая рука, В. Правая нога, Г. Правая рука**

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В

1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А

**Температуру тела измеряют**

В. В. Максимальным медицинским термометром

А. А. Водным термометром

Б. Б. Тонометром

Г. Г. Спирометром

Д. Д. Термостатом

**К острым аллергическим реакциям не относится**

Г. Г. Контактный дерматит

А. А. Анафилактический шок

Б. Б. Крапивница

В. В. Отёк Квинке

Д. Д. Синдром Лайелла

**Сильными пищевыми стимуляторами желудочной секреции являются**

Г. Г. Творог

А. А. Яичный белок

В. В. Жареные блюда

Б. Б. Молоко

Д. Д. Отварное мясо

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра) 1. Ожог, 2. Судорожный синдром, 3. Артериальная гипертензия, 4. Стенокардия, 5.**

**Анафилактический шок и используемым лекарственным препаратом (буква) А.**

**Седуксен, Б. Анальгин, В. Адреналин, Г. Дибазол, Д. Нитроглицерин, Е.**

**Преднизолон, Ж. Ацетилсалициловая к-та**

**1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В,Е**

**1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В**

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Д, Ж; 5-В,Е

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Д, Ж; 5-В,Е

### **Медперсоналу осуществлять эвтаназию**

Г. Г. Запрещено законом

А. А. Разрешается по просьбе пациента

Б. Б. Разрешается по решению консилиума

В. В. Допускается в исключительных случаях

Д. Д. Разрешается по просьбе родственников

### **Какой препарат применяют в первую очередь при остановке сердца**

В. В. Адреналин

А. А. Кордиамин

Б. Б. Дроперидол

Г. Г. Фуросемид

Д. Д. Димедрол

### **Факторами передачи возбудителя сибирской язвы является все перечисленное, кроме**

Б. Б. Шкуры, меха, шерсть

А. А. Яйца птиц

В. В. Мясо

Г. Г. Пыль, воздух, содержащий капельки слизи

Д. Д. Почва

### **Гигиеническая обработка рук обязательна**

В. В. До выполнения всех хирургических манипуляций

Г. Г. Перед приемом пищи

А. А. После приема пищи

Б. Б. До и после выполнения любых инъекций

Д. Д. Только перед началом работы

### **Больному с дегтеобразным стулом необходимо**

Б. Б. Выполнить холодные ручные и ножные ванны

В. В. Сделать очистительную клизму холодной водой

А. А. Положить грелку на живот

Г. Г. Обеспечить покой, сообщить врачу

Д. Д. Промыть желудок

### **Частота искусственных вдохов при ИВЛ у детей должна быть**

Г. Г. 60-80 в минуту

А. А. 4-5 в минуту

В. В. 20-22 в минуту

Б. Б. 12-16 в минуту

Д. Д. 30-40 в минуту

**К независимой помощи медсестры пациенту с приступом бронхиальной астмы НЕ относится**

- Г. Г. Дать теплое обильное питье
- Б. Б. Дача увлажнённого кислорода
- А. А. Внутривенное введение эуфиллина
- В. В. Придание положения: сидя с упором на руки
- Д. Д. Внутривенное введение преднизолона

**Запах изо рта при гипергликемической коме**

- А. А. Тухлый
- Б. Б. Ацетона
- В. В. Сладковатый
- Г. Г. Мочевины
- Д. Д. Кислый