

Тесты с вопросами по специальности «Эндоскопия» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/endoskop/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Эндоскопия» для аккредитации и других экзаменов (2000 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/endoskopiya/

2) Тесты для аккредитации «Гастроэнтерология» (4000 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/gastroenterologiya/

3) Ситуационные задачи по эндоскопии

→ medik-otvet.ru/product/endo/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Светлая, гладкая, блестящая слизистая с четким сосудистым рисунком характерна

А. для слепой кишки

Б. для восходящей кишки

В. для поперечно-ободочной кишки и нисходящей кишки

Г. для сигмовидной кишки

В окологлоточном пространстве расположен крупный артериальный сосуд. Это

- А. верхняя щитовидная артерия
- Б. восходящая шейная артерия
- В. внутренняя сонная артерия
- Г. наружная сонная артерия
- Д. общая сонная артерия

Для болезни Крона характерно все нижеперечисленное, кроме

- А. это предраковое заболевание
- Б. носит наследственный характер
- В. встречается в любом возрасте
- Г. имеет широкое географическое распространение

Показаниями к бронхофиброскопии являются

- А. профузное легочное кровотечение
- Б. статус астматикус
- В. центральный рак легкого
- Г. инородное тело легкого
- Д. гемофилия

Наиболее важными в осуществлении акта дыхания являются

- А. наружные межреберные мышцы
- Б. внутренние межреберные мышцы
- В. диафрагма
- Г. мышцы живота
- Д. все одинаково важны

Сальниковая тения хорошо выражена

- А. в слепой кишке
- Б. в восходящей кишке
- В. в поперечно-ободочной кишке
- Г. в нисходящей кишке
- Д. в сигмовидной кишке

Первый гибкий бронхоскоп создал

- А. Микулич в 1888 г
- Б. Киллиан в 1897 г
- В. Фридель в 1956 г
- Г. Гиршовиц в 1958 г
- Д. Икеда в 1968 г

Выраженность болевых ощущений определяется нижеперечисленными факторами, кроме

- А. индивидуальной восприимчивости к боли
- Б. локализации язвенного процесса
- В. возраста
- Г. пола
- Д. развития осложнений

Симптом, часто наблюдающийся при психогенном мегаколоне и редко при болезни Гиршпрунга

- А. запор
- Б. понос
- В. вздутие живота
- Г. недержание кала
- Д. начало заболевания в детстве

Форму треугольника с закругленными углами и слегка выпуклыми сторонами имеет

- А. слепая кишка
- Б. восходящая кишка
- В. поперечно-ободочная кишка
- Г. нисходящая кишка
- Д. сигмовидная кишка

Брыжеечная тень хорошо выражена

- А. в слепой кишке
- Б. в восходящей кишке
- В. в поперечно-ободочной кишке
- Г. в нисходящей кишке
- Д. в сигмовидной кишке

При мегаколоне отмечается

- А. гипертонус нисходящей ободочной кишки
- Б. атония толстой кишки
- В. аганглиоз
- Г. атрезия ануса
- Д. отсутствие внутреннего ректального сфинктера

Наиболее информативным методом исследования при невыявленной гепатомегалии является

- А. скенирование
- Б. ангиография
- В. лапароскопия
- Г. биопсия печени
- Д. ферментные тесты

Под слизистой оболочкой дна грушевидного кармана глотки проходит

- А. языкоглоточный нерв
- Б. блуждающий нерв
- В. симпатический нерв
- Г. верхний гортанный нерв
- Д. возвратный нерв

К сфинктерам ободочной кишки, имеющим выраженный анатомический субстрат, относятся все перечисленные, кроме

- А. сфинктеров Бузи, Хорста и Кеннона - Бема
- Б. сфинктера Гирша
- В. сфинктера Балли
- Г. сфинктера Росси - Мутье

Противопоказаниями к использованию механической очистки толстой кишки при помощи назогастральной интубации кишечника являются все перечисленные, исключая

- А. возраст больного (старики, дети)
- Б. нарушение функции почек
- В. нарушение функции печени
- Г. явления интубационной толстокишечной непроходимости
- Д. воспалительные заболевания толстой кишки

Анатомической и функциональной границей левой и правой половины толстой кишки является

- А. печеночный угол
- Б. селезеночный угол
- В. физиологический сфинктер Кеннона левый
- Г. физиологический сфинктер Кеннона правый
- Д. физиологический сфинктер Хорста

Развитию синдрома Мэллори - Вейса способствует

- А. язвенная болезнь
- Б. алкоголизм
- В. грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
- Г. рак желудка
- Д. лимфома желудка

Следующие физиологические сфинктеры имеют в своей основе анатомический субстрат

- А. сфинктер Гирша и сфинктер Болли
- Б. сфинктер Бузи
- В. сфинктер Хорста
- Г. сфинктер Пайера - Штрауса

Причинами образования острых язв желудка могут быть все перечисленные, кроме

- А. заболевания ЦНС
- Б. стресса
- В. курения
- Г. ожоговой болезни
- Д. приема ulcerогенных лекарственных препаратов

Корень легкого проецируется на уровне

- А. II-IV ребер
- Б. III-V ребер
- В. IV-VI ребер
- Г. IV-V ребер
- Д. III-IV ребер

Различают

- А. одну степень дисплазии
- Б. две степени дисплазии
- В. три степени дисплазии
- Г. четыре степени дисплазии
- Д. пять степеней дисплазии

Бактерицидным действием на микробную флору обладают все перечисленные антибиотики, кроме

- А. полимиксинов
- Б. тетрациклинов и макролидов
- В. макролидов и цефалоспоринов
- Г. аминогликозидов
- Д. цефалоспоринов

Для дисплазии характерно

- А. нормальное количество специализированных желез
- Б. уменьшение количества специализированных желез
- В. отсутствие специализированных желез
- Г. увеличение специализированных желез
- Д. часть желез представлена молодыми клетками

Тени не видны

- А. в слепой кишке
- Б. в восходящей кишке
- В. в поперечно-ободочной кишке
- Г. в нисходящей кишке
- Д. в сигмовидной кишке

Язвы Курлинга преимущественно локализуются

- А. в дне желудка
- Б. в теле желудка
- В. в антральном отделе
- Г. в 12-перстной кишке
- Д. преимущественной локализации нет

Показанием к хирургическому лечению служит

- А. первая степень дисплазии
- Б. вторая степень дисплазии
- В. третья степень дисплазии
- Г. четвертая степень дисплазии
- Д. нет показаний

В понятие "толстая кишка" не входят

- А. подвздошная, "тощая" кишка
- Б. слепая кишка
- В. восходящая кишка
- Г. прямая кишка

Ведущим фактором в развитии острых изъязвлений слизистой желудка и 12-перстной кишки является

- А. нарушение слизисто-бикарбонатного барьера
- Б. агрессивное действие соляной кислоты и пепсина
- В. нарушение кровообращения слизистой оболочки
- Г. нарушение способности быстрой репарации слизистой
- Д. снижение оксигенации

В обеспечении нормального функционирования пищеводно-желудочного перехода принимают участие

- А. диафрагмальный жом
- Б. диафрагмально-пищеводная связка
- В. клапан Губарева и острый угол Гиса
- Г. нижний пищеводный сфинктер и круглые мышечные волокна желудка
- Д. все перечисленное

Показаниями к интраоперационной колоноскопии является

- А. дивертикулез толстой кишки, осложненный дивертикулитом
- Б. кишечное кровотечение с неустановленным источником
- В. неспецифический язвенный колит, осложненный кровотечением
- Г. болезнь Крона в фазе стриктурирования

Противопоказаниями к бронхофиброскопии являются

- А. периферический рак легкого
- Б. центральный рак легкого
- В. инородное тело бронха
- Г. статус астматикус
- Д. кровохарканье

Гистологические данные, позволяющие дифференцировать болезнь Крона и неспецифический язвенный колит

- А. крипт-абсцессы
- Б. саркоидные гранулемы в подслизистом слое
- В. псевдополипы
- Г. диффузное воспаление слизистой
- Д. атрофия слизистой

Железы желудка располагаются

- А. в подслизистой оболочке
- Б. в мышечной оболочке
- В. в собственной пластинке слизистой оболочки
- Г. в мышечной пластинке слизистой оболочки
- Д. в серозной оболочке

Симптомы гиповолемии появляются, когда кишечное кровотечение превышает

- А. 100 мл
- Б. 300 мл
- В. 500 мл
- Г. 700 мл
- Д. 1000 мл

Болевой синдром при выполнении колоноскопии обусловлен

- А. недостаточной премедикацией
- Б. натяжением брыжейки толстой кишки
- В. избыточной инсуфляцией воздуха
- Г. раздражением слизистой оболочки концом эндоскопа
- Д. правильно б) и в)

Фиксация сигмовидной кишки характеризуется

- А. усилением болей при сосбаривании кишки
- Б. уменьшением болей при сосбаривании кишки
- В. повышением тонуса толстой кишки
- Г. снижением тонуса толстой кишки
- Д. отсутствием перистальтики толстой кишки

Изменения слизистой при болезни Крона похожи

- А. на язвенный колит
- Б. на шигеллез
- В. на амебиаз
- Г. на полипоз
- Д. на брюшной тиф

В норме барий поступает в слепую кишку через

- А. 1 час
- Б. 2 часа
- В. 4 часа
- Г. 8 часа
- Д. 12 часа

Форму равностороннего треугольника с несколько выпуклыми сторонами имеет просвет

- А. слепой кишки
- Б. восходящей кишки
- В. поперечной ободочной кишки
- Г. нисходящей кишки
- Д. сигмовидной кишки

Когда пептическая язва осложняется желудочно-кишечным кровотечением, то боль

- А. усиливается
- Б. исчезает
- В. иррадирует в спину
- Г. сосредоточивается в пупочной области
- Д. характер боли не меняется

Собственные железы желудка располагаются

- А. в кардиальном отделе
- Б. в своде и теле желудка
- В. в антральном отделе
- Г. в субкардиальном отделе
- Д. в привратнике

Прогноз при желудочно-кишечном кровотечении коррелирует

- А. с размерами язвы
- Б. с локализацией язвы
- В. с количеством потерянной крови
- Г. с возрастом больного
- Д. с полом

Дыхание резко затрудняется при параличе мышц трахеобронхиального дерева

- А. мышц мягкого неба
- Б. мышц гортани
- В. мышц сегментарных бронхов
- Г. мышц субсегментарных бронхов
- Д. мышц гортаноглотки

Наиболее часто рак желудка локализуется

- А. в кардиальном отделе
- Б. в области дна
- В. в области тела
- Г. в пилорическом отделе
- Д. в дне и теле

Осмотр ободочной кишки производится в положении больного

- А. лежа на спине
- Б. лежа на левом боку
- В. лежа на правом боку
- Г. лежа на животе
- Д. в коленно-локтевом положении

Полулунные складки характерны

- А. для слепой кишки
- Б. для восходящей кишки
- В. для поперечно-ободочной кишки
- Г. для нисходящей кишки
- Д. для сигмовидной кишки

После нанесения красителя граница между телом желудка и антральным отделом определяется через

- А. 1-2 мин
- Б. 5-10 мин
- В. 20-30 мин
- Г. 1-1.5 часа
- Д. 6 часов

Показаниями к экстренной эзофаго-гастродуоденоскопии являются все перечисленные, кроме

- А. желудочно-кишечное кровотечение
- Б. инородное тело
- В. перфоративная язва
- Г. на операционном столе
- Д. анастомозит

Уменьшению болей при язвенной болезни способствует все нижеперечисленное, кроме

- А. частого и дробного питания
- Б. постельного режима
- В. местного применения холода
- Г. рвоты на высоте болей
- Д. приема антацидных препаратов

В правой продольной борозде на висцеральной поверхности печени расположены

- А. печеночная артерия
- Б. печеночный проток
- В. желчный пузырь
- Г. венозная связка

В понятие "ободочная кишка" входят все следующие отделы кишечника, кроме

- А. подвздошной кишки
- Б. слепой кишки
- В. восходящей кишки
- Г. сигмовидной кишки

При периферической опухоли легкого показана

- А. щипцевая биопсия
- Б. браш-биопсия
- В. аспирационная биопсия
- Г. щипцевая биопсия под рентгенологическим контролем
- Д. пункционная биопсия

Медикаментозные изъязвления преимущественно располагаются

- А. в дне желудка
- Б. в теле желудка
- В. в антральном отделе
- Г. в 12-перстной кишке
- Д. в любом отделе желудка и 12-перстной кишки

По ходу внепеченочных желчных протоков расположено

- А. два сфинктера
- Б. три сфинктера
- В. четыре сфинктера
- Г. пять сфинктеров
- Д. шесть сфинктеров

Слизистую оболочку желудка выстилает

- А. многослойный цилиндрический эпителий
- Б. многослойный плоский эпителий
- В. однослойный плоский эпителий
- Г. однослойный цилиндрический железистый эпителий
- Д. однослойный плоский неороговевающий эпителий

Язвы Кушинга преимущественно локализуются

- А. в дне желудка
- Б. в теле желудка
- В. в антральном отделе
- Г. в 12-перстной кишке
- Д. в любом отделе пищевода, желудка и 12-перстной кишки

Высокие, плотные, морщинистые на вид складки характерны

- А. для слепой кишки
- Б. для восходящей кишки
- В. для поперечно-ободочной кишки
- Г. для сигмовидной кишки
- Д. для прямой кишки

Просвет кишки имеет овальную форму

- А. в слепой кишке
- Б. в восходящей кишке
- В. в поперечно-ободочной кишке
- Г. в нисходящей кишке
- Д. в сигмовидной кишке

Осложнениями бронхоскопии могут быть

- А. бронхо-пищеводный свищ
- Б. желудочное кровотечение
- В. ларингоспазм
- Г. пневмоторакс
- Д. ателектаз легкого

В большинстве случаев рецидив болезни Крона после операции наблюдается

- А. в течение года
- Б. в течение 2-3 лет
- В. в течение 5 лет
- Г. в течение 10 лет
- Д. ничего из перечисленного

Слизистая оболочка пищевода покрыта

- А. однослойным цилиндрическим эпителием
- Б. многослойным плоским эпителием
- В. однослойным призматическим эпителием
- Г. однослойным мерцательным эпителием
- Д. железистым эпителием

К признакам формирования петель в ходе колоноскопии относятся все перечисленные, кроме

- А. выраженного болевого синдрома
- Б. отсутствия "сбаривающего" эффекта при выведении эндоскопа
- В. ограничения или полного отсутствия подвижности винтов
- Г. парадоксального движения колоноскопа
- Д. невозможности выведения просвета кишки в поле зрения

Иннервация гортани осуществляется

- А. X-блуждающим и XI-добавочным
- Б. IX-языкоглоточным и X-блуждающим
- В. X-блуждающим и XII-подъязычным
- Г. X-блуждающим
- Д. IX, X и XI

Введение колоноскопа в прямую кишку производится в положении больного

- А. лежа на спине
- Б. лежа на левом боку
- В. лежа на правом боку
- Г. лежа на животе
- Д. в коленно-локтевом положении

Гастрин - это гормон, который продуцируется

- А. антральным отделом желудка
- Б. дном желудка
- В. 12-перстной кишкой
- Г. бруннеровыми железами
- Д. поджелудочной железой

Абсолютными противопоказаниями к колоноскопии являются

- А. тяжелая форма неспецифического язвенного колита и болезни Крона
- Б. тяжелые степени сердечно-сосудистой и легочной недостаточности
- В. острый парапроктит
- Г. кровоточащий геморрой
- Д. правильно а) и б)

Печень взрослого человека в среднем весит

- А. 500 г
- Б. 750 г
- В. 1000 г
- Г. 1500 г
- Д. 2000 г

Массивные желудочно-кишечные кровотечения редко являются следствием

- А. варикозного расширения вен пищевода
- Б. рефлюкс-эзофагита
- В. эрозивного гастрита
- Г. язвы желудка
- Д. язвы 12-перстной кишки

В понятие "толстая кишка" входят все перечисленные отделы кишечника, кроме

- А. подвздошной кишки
- Б. слепой кишки
- В. поперечно-ободочной кишки
- Г. сигмовидной кишки
- Д. прямой кишки

Значительное повышение сывороточной амилазы характерно для

- А. паротита
- Б. панкреатита
- В. тонкокишечной непроходимости
- Г. рака поджелудочной железы
- Д. пенетрирующей язвы 12-перстной кишки

Абсолютные противопоказания к экстренной гастроскопии

- А. варикозное расширение вен
- Б. инфаркт миокарда
- В. психические заболевания
- Г. агональное состояние больного
- Д. желудочно-кишечное кровотечение

Анатомическими образованиями, прилежащими к пищеводу спереди непосредственно под бифуркацией трахеи, являются

- А. легочные артерии
- Б. перикард и левое предсердие
- В. легочные вены
- Г. перикард и правое предсердие
- Д. перикард и правый желудочек

Большую сочность и интенсивность окраски, менее выраженный сосудистый рисунок имеет слизистая

- А. слепой кишки
- Б. восходящей кишки
- В. поперечно-ободочной кишки
- Г. нисходящей кишки
- Д. сигмовидной кишки

При проведении колоноскопии больного переводят из положения лежа на левом боку в положение лежа на спине во всех перечисленных случаях, кроме

- А. появления болей в животе
- Б. после проведения колоноскопа за ректо-сигмоидный отдел
- В. после проведения колоноскопа за селезеночный или печеночный угол
- Г. появления неадекватного продвижения колоноскопа по кишке

Сосуды подслизистого слоя хорошо видны в норме

- А. в слепой кишке
- Б. в восходящей кишке
- В. в поперечно-ободочной кишке
- Г. в нисходящей кишке
- Д. в сигмовидной кишке

Аппарат Шиндлера представляет собой

- А. металлическую трубку с гибким obturatorом
- Б. полугибкий линзовый гастроскоп
- В. жесткий гастроскоп с электрическим освещением
- Г. полугибкий гастроскоп с управляемым дистальным концом
- Д. фиброгастроскоп

Наиболее крупным является

- А. верхнедолевой бронх справа
- Б. верхнедолевой бронх слева и нижнедолевой бронх справа
- В. среднедолевой бронх справа
- Г. нижнедолевой бронх слева

К факторам, способствующим повышению кислотопродукции желудка, относятся все перечисленные, кроме

- А. увеличения количества париетальных клеток
- Б. повышения чувствительности париетальных клеток
- В. снижения тонуса блуждающего нерва
- Г. повышения концентрации гастрина в крови
- Д. повышения активности эндокринных желез

К возможным осложнениям, связанным с подготовкой толстой кишки к исследованию, относятся все перечисленные, кроме

- А. электролитных расстройств
- Б. гиповолемии
- В. дегидратации
- Г. инфаркта миокарда
- Д. заворота толстой кишки

Истинная ахлоргидия часто встречается при указанных ниже заболеваниях, кроме

- А. пернициозной анемии детей
- Б. пернициозной анемии взрослых
- В. болезни Менетрие
- Г. атрофического гастрита
- Д. рака желудка

Синдром приводящей петли проявляется

- А. рецидивом язвы
- Б. дисфагией
- В. рвотой желчью
- Г. болью в верхней половине живота, облегчаемой рвотой
- Д. правильно в) и г)

К эндоскопическим признакам аксиальной грыжи относятся все перечисленные, исключая

- А. расширение пищевода в нижней трети
- Б. утолщение складок слизистой оболочки пищевода
- В. выраженный пролапс слизистой желудка в грыжевой мешок
- Г. зияние кардии
- Д. спазм кардии

При лечении синдрома Мэллори - Вейса предпочтительно

- А. зонд Блэкмора
- Б. антациды
- В. экстренная операция
- Г. охлаждение желудка
- Д. электрокоагуляция дефекта

Слизистая оболочка прямой кишки образует складки, отличные в разных отделах. В зоне аноректального канала расположены

- А. поперечные
- Б. косые
- В. продольные
- Г. кольцевые
- Д. смешанные

В толще стенки ободочной кишки расположено

- А. семь непостоянных сфинктеров
- Б. восемь непостоянных сфинктеров
- В. десять непостоянных сфинктеров
- Г. одиннадцать непостоянных сфинктеров
- Д. одиннадцать непостоянных сфинктеров

Прямая кишка имеет изгибы в сагитальной и фронтальной плоскостях. Во фронтальной плоскости прямая кишка имеет

- А. один изгиб
- Б. два изгиба
- В. три изгиба
- Г. четыре изгиба
- Д. пять изгибов

Причина развития ахалазии

- А. стресс
- Б. отсутствие ауэрбаховского сплетения
- В. желудочно-пищеводный рефлюкс
- Г. все, перечисленное выше
- Д. ничего из перечисленного выше

Для клинической картины кардиоспазма не характерна

- А. дисфагия
- Б. регургитация
- В. рецидивирующие респираторные инфекции
- Г. анорексия
- Д. загрудинная боль

Гастроскопия впервые выполнена

- А. Боссини в 1795 г
- Б. Сегалс в 1826 г
- В. Дезормо в 1853 г
- Г. Куссмауль в 1868 г
- Д. Бивэн в 1863 г

Длина пищевода у взрослого человека равна

- А. 15 см
- Б. 18-20 см
- В. 23-25 см
- Г. 28-30 см
- Д. до 35 см

Наиболее часто рак желудка локализуется

- А. в дне и теле
- Б. в пилорическом отделе
- В. в области тела
- Г. в области дна
- Д. в кардиальном отделе

Пилорический жом желудка образован

- А. наружным слоем мышечной оболочки
- Б. средним слоем мышечной оболочки
- В. внутренним слоем мышечной оболочки

При язвенной болезни желудка чаще возникают кровотечения

- А. из левой желудочной артерии
- Б. из правой желудочной артерии
- В. из желудочно-сальниковой правой артерии
- Г. из желудочно-двенадцатиперстной артерии
- Д. из желудочно-сальниковой левой артерии

Наименьшее количество крови, вызывающее мелену, равно

- А. 25 мл
- Б. 60 мл
- В. 100 мл
- Г. 250 мл
- Д. 500 мл

Диарея как следствие хирургической операции на желудке по поводу язвенной болезни наиболее вероятно связана

- А. с типом анастомоза
- Б. с величиной резекции
- В. с ваготомией
- Г. с тяжестью язвенной болезни
- Д. с уровнем кислотности

Клапаны Гаустина и складки Кольрауша - это

- А. синонимы
- Б. совершенно различные образования
- В. однотипные образования

Чаще встречаются дивертикулы пищевода

- А. глоточно-пищеводные
- Б. эпифренальные
- В. абдоминального отдела
- Г. бифуркационные

Чаще встречаются дивертикулы пищевода

- А. глоточно-пищеводные
- Б. эпифренальные
- В. бифуркационные
- Г. абдоминального отдела

Бактериостатическим действием обладают все перечисленные антибиотики, кроме

- А. клотримазола и нистатина
- Б. морфоциклина
- В. оманзомицина
- Г. новобиоцина

Наиболее часто у взрослых встречается

- А. складчатая форма 12-перстной кишки
- Б. подковообразная форма 12-перстной кишки
- В. углообразная форма 12-перстной кишки
- Г. кольцевидная форма 12-перстной кишки

Слизистую оболочку желудка выстилает

- А. однослойный плоский неороговевающий эпителий
- Б. однослойный цилиндрический железистый эпителий
- В. однослойный плоский эпителий
- Г. многослойный плоский эпителий
- Д. многослойный цилиндрический эпителий

К ограничениям для колоноскопии относятся

- А. болезнь Гиршпрунга
- Б. выраженный дивертикулёз
- В. максимальная степень активности неспецифического язвенного колита
- Г. фаза деструкции болезни Крона
- Д. правильно а) и б)

Сходную с болезнью Крона морфологическую картину имеют заболевания

- А. неспецифический язвенный колит
- Б. ишемический колит
- В. туберкулез толстой кишки
- Г. эозинофильный энтероколит
- Д. псевдомембранозный колит

При болезни Крона симптомы раннего поражения наблюдаются

- А. в слизистой
- Б. в подслизистой
- В. в лимфатических узлах
- Г. в капиллярах
- Д. в серозе

Расширение бронхов при вдохе обусловлено

- А. симпатическими нервами
- Б. парасимпатическими нервами
- В. возвратными нервами
- Г. диафрагмальными нервами
- Д. межреберными нервами

Возвратные нервы иннервируют

- А. гортань и трахею
- Б. глотку, гортань, трахею и пищевод (верхний отдел)
- В. гортань и глотку
- Г. глотку и пищевод
- Д. щитовидную железу, гортань и глотку

Для перфорации острой язвы желудка характерны все симптомы, кроме

- А. боли в животе
- Б. напряжения передней брюшной стенки
- В. усиленной перистальтики кишечника
- Г. боли в надплечье
- Д. рвоты

В области глоточно-пищеводного перехода расположены

- А. один треугольник
- Б. два треугольника
- В. три треугольника
- Г. четыре треугольника
- Д. межмышечные треугольники отсутствуют

Самый крупный сегментарный бронх левого легкого

- А. верхушечно-задний В1-2
- Б. нижний язычковый В5
- В. передний базальный В8
- Г. латерально-базальный В9
- Д. задне-базальный В10

Причинами возникновения аксиальной грыжи являются все перечисленные, кроме

- А. повышения внутрибрюшного давления
- Б. инволюции тканей пищевода отверстия диафрагмы
- В. прогрессирующего рубцово-воспалительного укорочения пищевода
- Г. кардиоспазма
- Д. эзофагоспазма

Наименьшей абсорбирующей функцией слизистой тонкой кишки обладают

- А. микроворсинка
- Б. бокаловидная клетка
- В. цилиндрическая клетка
- Г. тела Гольджи
- Д. ворсинка

Показаниями к выполнению селективной эндоскопической контрастографии являются все перечисленные, за исключением

- А. выяснения природы сужения толстой кишки
- Б. уточнения протяженности сужения
- В. изучения тонко-толстокишечных анастомозов
- Г. уточнения характера ранее выполненной операции на толстой кишке
- Д. фистулографии

Бифуркация трахеи у взрослых расположена на уровне

- А. II ребра
- Б. III ребра
- В. угла Людовика
- Г. IV ребра
- Д. правильно а) и в)

."Рог" пищевода расположен на уровне

- А. IV шейного позвонка
- Б. дуги перстневидного хряща
- В. V шейного позвонка
- Г. VI шейного позвонка
- Д. голосовых связок гортани

Демпинг-синдром может наблюдаться во всех случаях, кроме

- А. у здоровых лиц
- Б. после ваготомии с пилоропластикой
- В. после ваготомии с резекцией желудка
- Г. после резекции 75% желудка
- Д. после операции на толстой кишке

Наиболее часто способствует возникновению спонтанного пневмоторакса все перечисленное, кроме

- А. разрыв субплевральной кисты
- Б. разрыв врожденной или эмфизематозной буллы
- В. прорыв абсцесса легкого в плевральную полость
- Г. спаечный процесс в результате перенесенного плеврита, пневмоний

Показаниями к жесткой бронхоскопии являются

- А. трахеостома
- Б. статус астматикус
- В. периферический рак легкого
- Г. бронхоэктатическая болезнь
- Д. гипоплазия легкого

К факторам защиты, препятствующим развитию язвенной болезни, относятся все перечисленные, кроме

- А. нейтрализующей способности бикарбонатной щелочности
- Б. слоя защитной слизи
- В. регенераторной способности поверхностного эпителия
- Г. увеличения количества париетальных клеток
- Д. расстройств кровообращения

Специальная подготовка к гастроскопии требуется у больных

- А. с язвой желудка
- Б. со стенозом привратника
- В. с хроническим гастритом
- Г. с эрозивным гастритом
- Д. с полипами желудка

Специальные схемы подготовки используются при всех перечисленных заболеваниях или состояниях толстой кишки, кроме

- А. колостомы
- Б. полипоза толстой кишки
- В. толстокишечной непроходимости
- Г. дивертикулеза
- Д. функциональной диареи

При подготовке к селективной проксимальной ваготомии маркировку границ антрального отдела необходимо производить в следующих отделах желудка

- А. по малой кривизне
- Б. по большой кривизне
- В. по передней стенке
- Г. по задней стенке
- Д. по малой и большой кривизне

Самым крупным из сегментарных бронхов правого легкого является

- А. передний В3
- Б. медиальный В5
- В. передний базальный В8
- Г. латерально-базальный В9
- Д. задне-базальный В10

Форму равностороннего треугольника с несколько выпуклыми сторонами имеет просвет

- А. поперечной ободочной кишки
- Б. нисходящей кишки
- В. сигмовидной кишки
- Г. восходящей кишки
- Д. слепой кишки

К причинам, по которым колоноскоп не удастся провести в купол слепой кишки, относятся

- А. провисание поперечной ободочной кишки в малый таз
- Б. наличие дополнительных петель сигмовидной кишки
- В. плохая подготовка толстой кишки к исследованию
- Г. стенозирование просвета толстой кишки
- Д. правильно в) и г)

Пути возникновения резистентных штаммов микрофлоры при проведении антибиотикотерапии являются

- А. мутация
- Б. трансудация
- В. трансформация
- Г. конъюгация
- Д. все перечисленные

Острые изъязвления, развивающиеся после обширных операций, травм, шока, локализуются преимущественно

- А. в дне желудка
- Б. в теле желудка
- В. в антральном отделе
- Г. в 12-перстной кишке
- Д. верно а), б) и в)

В левой продольной борозде на висцеральной поверхности печени расположены

- А. воротная вена
- Б. круглая связка печени и венозная связка (Аранциев проток)
- В. нижняя полая вена
- Г. печеночная артерия

Первую в мире бронхоскопию выполнил

- А. Микулич в 1888 г
- Б. Киллиан в 1897 г
- В. Шмидт в 1903 г
- Г. Брюннингс в 1926 г
- Д. Фридель в 1956 г

К осложнениям, наиболее часто развивающимся после колоноскопии, относятся все перечисленные, кроме

- А. пневматоза толстой кишки
- Б. динамической толстокишечной непроходимости
- В. коллапса
- Г. брадикардии
- Д. сепсиса

Наилучшим методом диагностики язвы анастомоза является

- А. ангиография
- Б. рентгенография
- В. эндоскопия
- Г. исследование кислотности
- Д. скенирование

Продольные складки характерны

- А. для слепой кишки
- Б. для восходящей кишки
- В. для поперечно-ободочной кишки
- Г. для нисходящей кишки
- Д. для прямой кишки

Клиническая картина болезни Виппля характеризуется всеми симптомами, кроме

- А. поноса
- Б. фекалии жирные, светло-серого цвета, объемистые
- В. значительного увеличения массы тела
- Г. коликообразных болей в области пупка
- Д. генерализованной аденопатии и спленомегалии

К факторам, предрасполагающим к развитию язвенной болезни, относятся все перечисленные, кроме

- А. генетических
- Б. дисфункции вегетативной нервной системы
- В. приема ulcerогенных препаратов
- Г. заболеваний печени, желчных путей и поджелудочной железы
- Д. алиментарного

После прекращения желудочно-кишечного кровотечения скрытая кровь в кале может обнаруживаться в течение максимум

- А. 5 дней
- Б. 1 недели
- В. 2 недель
- Г. 3 недель
- Д. 5 недель

Истинная длина абдоминального отдела пищевода после пересечения связок блуждающих нервов и рассечения брюшины составляет

- А. 1-3 см
- Б. 2-4 см
- В. 4-5 см
- Г. 5-6 см
- Д. 6 и более см

Стимулятором секреции соляной кислоты в желудке является

- А. гастрин
- Б. секретин
- В. глюкагон
- Г. кинины
- Д. простогландины

К сфинктерам толстой кишки, являющимся преимущественно рефлекторными, относятся все перечисленные, кроме

- А. сфинктера Варолиуса
- Б. сфинктера Кеннона - Бема
- В. сфинктера Паейра - Штрауса
- Г. сфинктеров Балли и О`Берна - Пирогова - Мютье

Кровотечение в раннем послеоперационном периоде после резекции желудка чаще всего является следствием

- А. язвы анастомоза
- Б. недостаточного гемостаза в процессе операции
- В. невыявленной язвы
- Г. нарушения гемостаза
- Д. травмы при интубации

В норме в кале встречаются все нижеперечисленные энзимы, кроме

- А. пепсина
- Б. амилазы
- В. липазы
- Г. трипсина
- Д. мальтазы

При отсутствии продвижения колоноскопа вперед по кишке возможно использовать все перечисленные приемы, кроме

- А. смазывания конца аппарата маслом
- Б. аспирации воздуха из просвета кишки
- В. использования ручного пособия через переднюю брюшную стенку
- Г. использования приема "сосбаривания толстой кишки"
- Д. использования приема проведения аппарата "через растянутую петлю"

По отношению к аорте пищевод в нижнегрудном его отделе располагается

- А. сзади от аорты
- Б. справа от аорты
- В. слева и спереди от аорты
- Г. правильного ответа нет

Осмотр терминального отдела подвздошной кишки целесообразен

- А. при неспецифическом язвенном колите
- Б. при болезни Крона
- В. при диффузном полипозе толстой кишки
- Г. при неустановленном источнике кишечного кровотечения
- Д. при всех перечисленных заболеваниях

Наиболее частой причиной непроходимости привратника у взрослых является

- А. рак желудка
- Б. язвенная болезнь
- В. мышечная гипертрофия привратника
- Г. пролапс слизистой желудка через привратник
- Д. доброкачественные полипы желудка

При язвенной болезни желудка чаще возникают кровотечения

- А. из правой желудочной артерии
- Б. из левой желудочной артерии
- В. из желудочно-сальниковой правой артерии
- Г. из желудочно-двенадцатиперстной артерии
- Д. из желудочно-сальниковой левой артерии

Колоноскоп не удастся провести в купол слепой кишки при всех перечисленных состояниях, кроме

- А. спазма толстой кишки
- Б. наличия "несобранных" петель сигмовидной кишки
- В. выраженного спаечного процесса брюшной полости
- Г. плохой подготовки толстой кишки
- Д. выраженного сужения просвета кишки

Колоноскопия не показана

- А. при анемии
- Б. при раке яичника
- В. при метастатическом поражении печени
- Г. при полипе желудка
- Д. при дизентерии

Характерными особенностями болевого синдрома при язвенной болезни являются все нижеперечисленные, кроме

- А. четкого ритма возникновения
- Б. связи с приемом пищи
- В. периодичности
- Г. сезонности
- Д. только б) и г)

Эрозивный гастрит может быть вызван применением всех препаратов, кроме

- А. стероидных гормонов
- Б. салицилатов
- В. резерпина
- Г. цитостатиков
- Д. этанола

К неполной перфорации толстой кишки относятся

- А. разрыв слизистой оболочки
- Б. разрыв слизистого и подслизистого слоев
- В. разрыв всех слоев кишечной стенки, исключая слизистую
- Г. разрыв всех слоев кишечной стенки
- Д. разрыв серозно-мышечного слоя

Относительными противопоказаниями к колоноскопии являются

- А. острые воспалительные поражения анальной и перианальной области
- Б. ранний послеоперационный период (после операций на толстой кишке)
- В. болезнь Крона, фаза инфильтрации
- Г. спаечная кишечная непроходимость
- Д. правильно а) и б)

Наиболее распространенная доброкачественная опухоль тонкого кишечника - это

- А. аденома
- Б. липома
- В. фиброма
- Г. ангиома
- Д. миома

Технически наиболее трудным для проведения колоноскопа является

- А. ректо-сигмовидный отдел
- Б. сигмовидная кишка
- В. селезеночный узел
- Г. печеночный узел
- Д. нисходящая кишка

Анатомической основой гастроэзофагеального сфинктера является

- А. диафрагма
- Б. диафрагмально-пищеводная связка
- В. угол Гисса
- Г. кардия
- Д. ни один из перечисленных выше

Скорость движения воздуха при вдохе наиболее высокая

- А. в трахее
- Б. в главных бронхах
- В. в сегментарных бронхах
- Г. области голосовой щели гортани
- Д. в субсегментарных бронхах

В пищеводе выявляются физиологических сужений

- А. два
- Б. три
- В. четыре
- Г. пять
- Д. не имеется

Наиболее частый клинический признак цирроза печени

- А. пальпируемая печень
- Б. желтуха
- В. асцит
- Г. периферические отеки
- Д. сосудистые звездочки

Лица с долихоколон предрасположены

- А. к инвагинации
- Б. к завороту кишки
- В. к злокачественным новообразованиям
- Г. к выпадению прямой кишки
- Д. к полипам

В чувствительной иннервации зева принимает участие

- А. одна пара нервов
- Б. две пары нервов
- В. три пары нервов
- Г. четыре пары нервов
- Д. пять пар нервов

Розовая, сочная с пятнистым сосудистым рисунком слизистая характерна

- А. для слепой кишки
- Б. для восходящей кишки
- В. для поперечно-ободочной кишки
- Г. для селезеночного угла
- Д. для нисходящей кишки

Наиболее распространенные симптомы, вызванные грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, являются следствием

- А. нарушения прохождения пищи по пищеводу
- Б. расширения пищевода
- В. рефлюкса кислого содержимого желудка в пищевод
- Г. спазма пищевода
- Д. ничего из перечисленного

Пищевые массы и кишечное содержимое при продвижении по желудочно-кишечному тракту встречают препятствие в виде герметически закрывающихся сфинктеров. Этими сфинктерами являются все перечисленные, кроме

- А. нижнего пищеводного сфинктера, сфинктера Гирша и Пирогова - Мюнье
- Б. привратника
- В. баугиниевой заслонки
- Г. сфинктера прямой кишки

Показаниями к проведению дооперационного определения маркировки границ антрального отдела желудка являются все перечисленные, кроме

- А. язвенной болезни желудка
- Б. рака тела желудка
- В. язвенной болезни 12-перстной кишки
- Г. сочетанной формы язвенной болезни
- Д. рецидивы язвы после операции на желудке

Под слизистой оболочкой дна грушевидного кармана глотки проходит

- А. языкоглоточный нерв
- Б. блуждающий нерв
- В. верхний гортанный нерв
- Г. симпатический нерв
- Д. возвратный нерв

Правая половина ободочной кишки кровоснабжается

- А. из селезеночной артерии
- Б. из верхней брыжеечной артерии
- В. из нижней брыжеечной артерии
- Г. из левой ободочной кишки
- Д. из срамной артерии

Распространенный симптом болезни Крона

- А. лихорадка
- Б. боль
- В. диарея
- Г. слабость
- Д. анорексия

Чаще отмечаются аномалии развития

- А. в верхнедолевом бронхе слева
- Б. в нижнедолевом бронхе слева
- В. в верхнедолевом бронхе справа
- Г. в среднедолевом бронхе справа
- Д. в нижнедолевом бронхе справа

При долихоколон больные жалуются

- А. на боль в спине
- Б. на частый стул
- В. на быстрое насыщение
- Г. на вздутие живота
- Д. на запоры начиная с рождения

К клеткам собственных желез желудка относятся все перечисленные, кроме

- А. главных (железистых)
- Б. фундальных
- В. периепальных (обкладочных)
- Г. добавочных слизистых
- Д. шеечных слизистых

Подготовка больных с дивертикулезом толстой кишки имеет следующую особенность

- А. выраженный болевой синдром
- Б. опасность развития перфорации
- В. трудность отмыивания содержимого из дивертикулов
- Г. выраженный спазм кишки
- Д. опасность развития толстокишечной непроходимости

К клиническим проявлениям хронической дуоденальной непроходимости относятся все нижеперечисленные признаки, кроме

- А. тяжести и болей в животе
- Б. горечи во рту
- В. рвоты с примесью желчи
- Г. неустойчивого стула
- Д. изжоги

Разрешающие возможности современного бронхоскопа позволяют осмотреть бронхи

- А. 2-3-го порядка
- Б. 4-го порядка
- В. 5-го порядка
- Г. 6-го порядка
- Д. 7-го порядка

Начало подвздошной кишки при лапароскопии определяется

- А. по цвету кишки
- Б. по изменению перистальтики
- В. по появлению пейеровых бляшек
- Г. по изменению диаметра кишки
- Д. по магистральным сосудам

Для клинической симптоматики неосложненной язвенной болезни не характерны

- А. боли в области левого подреберья
- Б. поздняя рвота (через 2-2.5 часа после еды)
- В. изжога
- Г. отрыжка, сочетающаяся со срыгиванием и саливацией
- Д. поносы

Перед колоноскопией необходимо выполнить

- А. обзорную рентгенографию брюшной полости
- Б. ирригоскопию
- В. пассаж бария по кишечнику
- Г. эзофагогастродуоденоскопию
- Д. ректороманоскопию

К сфинктерам, локализующимся в прямой, сигмовидной и нисходящей кишке, относятся все перечисленные, кроме

- А. сфинктера Гирша
- Б. сфинктера Пирогова - Мюнье
- В. сфинктера Пайера - Штрауса
- Г. сфинктера Болли
- Д. сфинктера Росси - Мюнье

При бронхоскопии возможно диагностировать

- А. бронхоэктатическую болезнь
- Б. интерстициальную пневмонию
- В. неосложненную кисту легкого
- Г. центральный рак легкого
- Д. недренирующийся абсцесс легкого

Выделение гастрина стимулируется всем нижеперечисленным, кроме

- А. ацидификации антрального отдела
- Б. ощелачивания антрального отдела
- В. растяжения антрального отдела
- Г. стимуляции блуждающего нерва
- Д. гистамина

При язвенной болезни 12-перстной кишки кровотечения чаще всего возникают

- А. из привратниковой артерии
- Б. из желудочно-двенадцатиперстной
- В. из желудочно-сальниковой правой
- Г. из поджелудочно-двенадцатиперстной верхней
- Д. из всех перечисленных

О пенетрации язвы свидетельствуют все перечисленные симптомы, кроме

- А. усиления боли
- Б. ослабления боли
- В. иррадиации боли в спину
- Г. болей по ночам
- Д. изменения ритмичности болей

В отношении эндоскопического исследования толстой кишки правильно все перечисленное, кроме

- А. колоноскопия является первичным методом исследования толстой кишки
- Б. колоноскопия является самостоятельным методом исследования
- В. колоноскопия должна подразумевать тотальный осмотр толстой кишки
- Г. колоноскопия выполняется после проведения ирригоскопии
- Д. колоноскопия выполняется после проведения ректороманоскопии

Диагноз болезни Вилля может быть поставлен на основании

- А. характерной клинической картины заболевания
- Б. макроскопической картины слизистой оболочки тонкой кишки
- В. биопсии тонкой кишки
- Г. биопсии печени
- Д. биопсии желудка

Складки Кольрауша и мышцы Гепнера прямой кишки (третий сфинктер прямой кишки) - это

- А. синонимы
- Б. совершенно различные образования
- В. одностипные образования

Глотка иннервируется

- А. IX-языкоглоточным и X-блуждающим
- Б. V-тройничным, IX-языкоглоточным, XI-добавочным
- В. IX, X, XII-подъязычным
- Г. IX, XI и XII парами
- Д. V, IX, X-парами

Зуд при желтухе связан

- А. с билирубином
- Б. с солями желчи
- В. с лецитином
- Г. с фосфолипидами
- Д. с щелочной фосфатазой

К факторам агрессии, способствующим развитию язвенной болезни, относятся все перечисленные, кроме

- А. соляной кислоты
- Б. муцина
- В. пепсина
- Г. нарушения эвакуаторной функции желудка
- Д. дуодено-гастрального рефлюкса

Термин "долихоколон" используется при описании ободочной кишки, которая

- А. петлистая
- Б. укорочена
- В. не прикреплена к брыжейке
- Г. удвоена
- Д. удлинена

Аминогликозиды (канамицин, мономицин, неомицин, гентамицин, амикацин и др.), являясь бактерицидными препаратами, обладают следующим механизмом действия на микробную клетку

- А. нарушают функцию клеточных мембран
- Б. ингибируют синтез ДНК и РНК
- В. нарушают систему трансляции
- Г. ингибируют синтез клеточной оболочки
- Д. подавляют синтез белка на уровне рибосом

Органическое заболевание, сопровождающееся изжогой

- А. язва 12-перстной кишки
- Б. язва желудка
- В. скользящая диафрагмальная грыжа
- Г. параэзофагеальная грыжа
- Д. гастрит

К гистологическим данным, которые указывают на улучшение в течении неспецифического язвенного колита, относятся все, кроме

- А. появления островков регенерации
- Б. исчезновения крипт-абсцессов
- В. снижения васкуляриности
- Г. восстановления бокаловидных клеток
- Д. увеличения лимфоцитарной инфильтрации подслизистого слоя

Растяжение петель сигмовидной кишки при колоноскопии не сопровождается болевыми опущениями

- А. при длинной брыжейке сигмовидной кишки
- Б. при короткой брыжейке сигмовидной кишки
- В. при спаечном процессе брюшной полости
- Г. при спазме толстой кишки
- Д. при атонии толстой кишки

Наиболее выражены циркулярные складки Керкринга

- А. в 12-перстной кишке
- Б. в начальном отделе тощей кишки
- В. в дистальном отделе тощей кишки
- Г. в подвздошной кишке
- Д. в толстой кишке

Показаниями к urgentной колоноскопии являются

- А. толстокишечная непроходимость
- Б. кишечное кровотечение
- В. подозрение на перфорацию толстой кишки
- Г. дивертикулез толстой кишки с явлениями периколита
- Д. правильно а) и б)

Гастроскопия впервые выполнена

- А. Боссини в 1795 г
- Б. Сегалс в 1826 г
- В. Дезормо в 1853 г
- Г. Бивэн в 1863 г
- Д. Куссмауль в 1868 г

К наиболее часто встречающимся врожденным порокам относятся

- А. гипоплазия легких
- Б. добавочные доли легкого
- В. поликистоз легких
- Г. слияние легочных долей
- Д. легочная секвестрация

Позыв на дефекацию возникает при

- А. сокращении наружного анального сфинктера
- Б. сокращении внутреннего анального сфинктера
- В. повышении давления в сигмовидной кишке
- Г. повышении давления в прямой кишке
- Д. сокращении прямой кишки

При экстренном обследовании больных с толстокишечным кровотечением могут быть использованы все перечисленные методы, кроме

- А. ректороманоскопии
- Б. ирригоскопии
- В. селективной ангиографии
- Г. диагностической колоноскопии
- Д. интраоперационной колоноскопии

Острые изъязвления желудка и 12-перстной кишки развиваются после воздействия неблагоприятных факторов в течение ближайших

- А. 24 часов
- Б. 36 часов
- В. 72 часов
- Г. 4 суток
- Д. 6 суток

Абсолютными противопоказаниями к плановой эзофаго-гастродуоденоскопии являются все перечисленные, кроме

- А. инфаркта миокарда
- Б. инфаркта миокарда
- В. сердечно-сосудистой недостаточности III степени
- Г. инсульта в острой стадии
- Д. психических заболеваний

Максимально толстая кишка может абсорбировать за сутки

- А. до двух литров жидкости
- Б. до трех литров
- В. до четырех литров
- Г. до пяти литров
- Д. до шести литров

Важнейшими в функции тонкой кишки являются все перечисленные, кроме

- А. переваривания
- Б. всасывания
- В. ассимиляции
- Г. моторной и экскреторной

Для определения границы между телом и антральным отделом желудка используется

- А. конго красный
- Б. бриллиантовая зелень
- В. китайская тушь
- Г. метиленовая синь
- Д. фенолфталеин

Термин "долихоколон" используется при описании ободочной кишки, которая

- А. удлинена
- Б. удвоена
- В. не прикреплена к брыжейке
- Г. укорочена
- Д. петлистая

К антибиотикам, обладающим нефротоксическими и ототоксическим действием, относятся

- А. окситетрациклин
- Б. полимиксин и неомицин
- В. линкомицин
- Г. левомицетин

Показаниями к плановой эзофаго-гастродуоденоскопии являются все перечисленные, кроме

- А. для установления диагноза
- Б. для оценки эффективности лечения
- В. для установления локализации процесса
- Г. для определения источников кровотечения
- Д. для проведения лечебных и поеративных манипуляций

Следующие анатомические образования служат ориентиром при бронхоскопии

- А. язычок мягкого неба, небные дужки, надгортанник
- Б. язычок мягкого неба, надгортанник, голосовые связки
- В. небные дужки, надгортанник, голосовые связки
- Г. небные дужки, надгортанник, грушевидные карманы
- Д. надгортанник, голосовые связки, грушевидные карманы

Гастрин влияет на деятельность следующих органов, кроме

- А. желудка
- Б. поджелудочной железы
- В. тонкой кишки
- Г. печени
- Д. толстой кишки

Самый узкий отдел толстой кишки - это

- А. прямая кишка
- Б. ректо-сигмовидный отдел
- В. сигмовидная кишка
- Г. слепая кишка
- Д. восходящая кишка

Расширение бронхов при вдохе обусловлено ____ нервами

- А. Парасимпатическими
- Б. Симпатическими
- В. Диафрагмальными
- Г. Возвратными

Показанием к аспирационной биопсии во время бронхофиброскопии считают

- А. Инородное тело бронха
- Б. Гемангиому
- В. Легочное кровотечение
- Г. Рак легкого

Сетчатые капиллярные сосуды определяются при _____ типе капиллярного рельефа

- А. CP type II
- Б. CP type I
- В. CP type IIIa
- Г. CP type IIIb

Эндоскопическая картина при хронической дуоденальной непроходимости 3 стадии характеризуется

- А. Наличием застойного содержимого в желудке и значительным расширением просвета двенадцатиперстной кишки
- Б. Спазмом привратника и диффузной атрофией слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки
- В. Диффузной атрофией слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
- Г. Спряmlением верхнего дуоденального изгиба и наличием лимфангиэктазий

Эпителиальные образования 0-iiб типа в соответствии с парижской классификацией представляют собой ____ образования

- А. Углубленные
- Б. Плоские
- В. Приподнятые
- Г. Полиповидные (выступающие)

Клиническая картина при инородных телах трахеи включает

- А. Приступообразный кашель
- Б. Высокую температуру
- В. Постоянный кашель
- Г. Кашель с мокротой

Относительным противопоказанием к проведению колоноскопии является

- А. Эндометриоз
- Б. Острая стадия дизентерии
- В. Миома матки
- Г. Анемия тяжелой степени

Червеобразный отросток отходит от _____ стенки слепой кишки

- А. Латерально-задней
- Б. Передней
- В. Задней медиальной
- Г. Латеральной

Афтозная папула (полная эрозия) имеет вид

- А. Возвышающегося участка слизистой оболочки с уплощённой вершиной, покрытой фибрином, диаметром до 0,5 см с нечётко ограниченным основанием
- Б. Участка слизистой оболочки в виде конусовидного выпячивания с налётом фибрина на вершине и четко ограниченном основании в диаметре до 0,5 см
- В. Возвышающегося участка слизистой оболочки с уплощённой вершиной более яркой окраски с нечётко ограниченным основанием диаметром до 0,5 см
- Г. Возвышающегося участка слизистой оболочки с уплощенной вершиной, покрытой гематином, диаметром до 0,5 см с нечётко ограниченным основанием

При проведении бронхоскопии косвенным признаком увеличения бифуркационных лимфатических узлов считают

- А. Расширение основания карины
- Б. Выраженную деформацию нижнедолевого бронха
- В. Сдавление нижней трети трахеи до ? диаметра просвета
- Г. Сдавление просвета верхнедолевого бронха на ? диаметра

Наиболее частой причиной развития острого эзофагита является

- А. Травматические повреждения
- Б. Приём внутрь агрессивных жидкостей
- В. Неумеренное курение
- Г. Рефлюкс кишечного содержимого

Одним из факторов риска развития рака толстой кишки у пациентов с язвенным колитом является

- А. Длительный анамнез
- Б. Длительная ремиссия
- В. Поражение в форме проктита
- Г. Дебют заболевания старше 50

Сужение анастомотического кольца чаще бывает обусловлено

- А. Мигрирующими лигатурами
- Б. Дефектами оперативного вмешательства
- В. Быстрым разрастанием рубцовой ткани
- Г. Воспалительными изменениями анастомотического кольца

Этапы обработки инструментов к эндоскопам для нестерильной процедуры включают: предварительную очистку

- А. Окончательную очистку, стерилизацию
- Б. Предстерилизационную очистку, дезинфекцию высокого уровня
- В. Окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня
- Г. Предстерилизационную очистку, стерилизацию

Время расправления просвета гипотоничной кишки составляет (в секундах)

- А. 2
- Б. 3
- В. 1
- Г. Более 3

Наиболее характерным осложнением дивертикула двенадцатиперстной кишки является

- А. Кровотечение
- Б. Язва дивертикула
- В. Дивертикулит
- Г. Перфорация

Тактику клапанной бронхоблокации, при которой следующий эндобронхиальный клапан устанавливается только после извлечения предыдущего, после оценки динамики процесса и функциональных возможностей пациента, определяют как

- А. Последовательную
- Б. Одновременную
- В. Комплексную
- Г. Сочетанную

Основной причиной возникновения папиллита служит

- А. Дискинезия сфинктеров большого дуоденального сосочка
- Б. Дискинезия двенадцатиперстной кишки
- В. Инфицированное содержимое полости двенадцатиперстной кишки
- Г. Травматизация слизистой оболочки устья большого дуоденального сосочка мигрирующими конкрементами

По парижской классификации уплощенная приподнятая неоплазия обозначается

- А. 0-IIa
- Б. 0-III
- В. 0-IIc
- Г. 0-IIb

Дивертикулез толстой кишки чаще поражает ____ кишку

- А. Сигмовидную
- Б. Нисходящую
- В. Прямую
- Г. Поперечную ободочную

Для подготовки толстой кишки к колоноскопии используют

- А. Препараты сены и крушины
- Б. Касторовое масло
- В. Дюфалак
- Г. Препараты ПЭГ

К эндоскопическим татуировочным веществам относится

- А. Толлуидин синий
- Б. Уксусная кислота
- В. Гемоблок
- Г. Полиэтиленгликоль

Распространенным симптомом болезни крона считают

- А. Анорексию
- Б. Диарею
- В. Боль
- Г. Слабость

Пик заболеваемости ишемическим колитом приходится на возраст (в годах)

- А. 40-50
- Б. 30-40
- В. Моложе 30
- Г. 60 И старше

Эндоскопическая картина при 1 степени коррозийного эзофагита характеризуется

- А. Наличием участков белого или желтоватого цвета
- Б. Отёком слизистой оболочки пищевода и подчёркнутым сосудистым рисунком
- В. Гиперемией и огрублением рельефа слизистой оболочки пищевода
- Г. Отёком и гиперемией слизистой оболочки пищевода

К форме рака толстой кишки, для которой характерно воронкообразное сужение просвета кишки, относится

- А. Нодозная
- Б. Полиповидная
- В. Инфильтративная
- Г. Блюдцеобразная

Показания к диагностической плановой бронхофиброскопии устанавливают при

- А. Легочных кровохарканьях и профузном легочном кровотечении
- Б. Нарастающем воспалительном отеке со стенозом гортани
- В. Обострении бронхиальной астмы с астматическим состоянием
- Г. Центральных и периферических опухолях легких

В сигмовидной кишке чаще всего образуются

- А. Альфа-петли
- Б. Гамма-петли
- В. N-образные петли
- Г. Обратные альфа-петли

К способам извлечения отсеченных полипов не относят

- А. С помощью биопсионных щипцов
- Б. С помощью полипэктомической петли
- В. Присасывание опухоли к инструментальному каналу эндоскопа и извлечения его вместе с аппаратом
- Г. Промывание желудка

При сверхтяжелой форме язвенного колита возможно наличие

- А. Афтоидных изменений
- Б. Незначительной контактной ранимости
- В. Глубоких язвенных дефектов (до мышечного слоя)
- Г. Перестроенности и деформации сосудистого рисунка

Лечебной тактикой при малигнизированных полипах с инвазивным ростом опухоли, но без поражения ножки является

- А. Только хирургическое лечение
- Б. Симптоматическое лечение
- В. Эндоскопическая полипэктомия
- Г. Эндоскопическая полипэктомия затем – традиционная операция

При кишечной форме туберкулеза дно язвенных дефектов

- А. Мелко-зернистое
- Б. Гладкое
- В. Крупно-зернистые
- Г. Бугристое

При бронхоскопии менее всего свидетельствует об опухоли _____ бронха

- А. Ригидность стенки
- Б. Деформация
- В. Распространение гиперемии по стенке
- Г. Сужение просвета

Псевдополипы при болезни крона

- А. Удалению не подлежат
- Б. Нужно удалять через 6 месяцев после первого эндоскопического исследования
- В. Нужно удалять через 6 месяцев после достижения клинической ремиссии
- Г. Нужно удалять через 6 месяцев после достижения эндоскопической ремиссии

Меланоз толстой кишки развивается при приеме слабительного препарата

- А. Дюфалака
- Б. Эспумизана
- В. Растительного происхождения
- Г. Форлакса

Необходимо выполнить при подозрении на злокачественное новообразование пищевода

А. ФЭГДС, Эндо-Узи, ПЭТ-КТ

Б. ФЭГДС с биопсией, рентгенологическое исследование пищевода с контрастированием, КТ органов грудной клетки и брюшной полости с внутривенным контрастированием, ФБС, Эндо-Узи и ПЭТ-КТ

В. ФЭГДС, КТ органов грудной клетки и брюшной полости с внутривенным контрастированием

Г. ФЭГДС с биопсией, рентгенологическое исследование пищевода с контрастированием

Большие лейомиомы более 1,5 см в диаметре требуют выполнения

А. Консервативного лечения

Б. Хирургического лечения

В. Эндоскопического лечения

Г. Оптической биопсии

Эзофагогастродуоденоскопию при пептической язве желудка проводят

А. Только для подтверждения диагноза

Б. Для подтверждения диагноза и повторяют в процессе лечения для подтверждения положительной динамики

В. Для подтверждения диагноза и повторяют в процессе лечения до подтверждения рубцевания язвы с обязательным осмотром через месяц после рубцевания язвы

Г. Для подтверждения диагноза и повторяют в процессе лечения до подтверждения рубцевания язвы

К эндоскопическим признакам нейроэндокринной опухоли g1 толстой кишки относят

А. Полиповидное образование с хорошо визуализируемым ямочным рисунком на поверхности

Б. Подслизистый характер образования, округлую форму, неизменную слизистую оболочку над образованием, плотно-эластическую консистенцию

В. Подслизистый характер образования, округлую форму, желтоватый цвет, мягко-эластичную консистенцию

Г. Одиночный характер образований с размерами более 5,0 см и полиповидный тип образования

Осложнением трансбронхиальной щипцевой биопсии легкого является

А. Пневмоторакс

Б. Разрыв легкого

В. Обострение хронического бронхита

Г. Перфорация стенки бронха

При подозрении на перфорацию толстой кишки необходима консультация

- А. Врача-инфекциониста
- Б. Врача-терапевта участкового
- В. Врача-хирурга
- Г. Врача-кардиолога

В норме в кале не встречается

- А. Пепсин
- Б. Трипсин
- В. Амилаза
- Г. Липаза

Наибольший диаметр в ободочной кишке имеет _____ кишка

- А. Поперечно-ободочная
- Б. Восходящая
- В. Слепая
- Г. Нисходящая

К кишечным осложнениям, характерным для язвенного колита, относят

- А. Только дилатацию толстой кишки
- Б. Только перфорацию тонкой кишки
- В. Кишечное кровотечение, перфорацию и токсическую дилатацию толстой кишки
- Г. Только кишечное кровотечение

Составной частью программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации является

- А. Территориальная программа обязательного медицинского страхования
- Б. Программа добровольного медицинского страхования
- В. Программа социальной поддержки населения
- Г. Программа Фонда социального страхования

Для оценки пищевода барретта используют классификацию

- А. Пражскую
- Б. Бостонскую
- В. Монреальскую
- Г. Венскую

Эндоскопическая полипэктомия из ободочной кишки производится

- А. Преимущественно в стационаре
- Б. В условиях стационара только при наличии более 10 полипов
- В. В условиях стационара только больным с тяжелыми сопутствующими заболеваниями
- Г. В условиях стационара только при наличии более 5 полипов

Выявляют два типа ахалазии кардии

- А. I тип — с умеренным расширением пищевода, II тип — с S-образным искривлением и удлинением пищевода
- Б. I тип — с функциональными расстройствами без расширения просвета пищевода, II тип — с рубцовыми изменениями кардии, с выраженным расширением пищевода, нарушениями тонуса и перистальтики
- В. I тип — с функциональными расстройствами без расширения просвета пищевода, II тип — со стойким расширением пищевода и сужением в области кардии
- Г. I тип — с рубцовыми изменениями кардии, с выраженным расширением пищевода, нарушениями тонуса и перистальтики, II тип — с изменениями дистального отрезка пищевода в виде эрозивного или эрозивно-язвенного эзофагита

Микроскопическая картина рака легкого включает

- А. Мелкоклеточный рак
- Б. Папиллому
- В. Скирр
- Г. Меланому

Аневризма брюшного отдела аорты является

- А. Относительным противопоказанием
- Б. Ограничением колоноскопии
- В. Абсолютным противопоказанием к колоноскопии
- Г. Показанием к urgentной колоноскопии

Ворсинчатые опухоли чаще всего локализуются в ____ кишке

- А. Восходящей
- Б. Поперечно-ободочной
- В. Слепой
- Г. Сигмовидной

В левом легком выделяют

- А. 2 Доли
- Б. 5 Долей
- В. 3 Доли
- Г. 4 Доли

В пищеводе чаще всего встречаются

- А. Аденоматозные полипы
- Б. Липомы
- В. Лейомиомы
- Г. Лейомиосаркомы

Одним из основных принципов охраны здоровья является

- А. Взаимодействие со средствами массовой информации
- Б. Безусловное выполнение пожеланий пациента по выбору методов диагностики и лечения
- В. Социальная защита граждан РФ
- Г. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи

Стул при язвенном колите характеризуется

- А. Примесью крови и слизи
- Б. Ахоличностью
- В. Фрагментацией
- Г. Дегтеобразным характером

Вероятность развития перфорации полого органа при электрокоагуляции зависит от

- А. Характера источника кровотечения
- Б. Наличия воспалительного процесса
- В. Выбранного режима мощности коагуляции
- Г. Наличия грануляционной ткани

Эндоскопическим признаком недостаточности баугиниевой заслонки является

- А. Контактная кровоточивость слизистой оболочки слепой кишки
- Б. Спазм всех сфинктеров толстой кишки
- В. Наличие большого количества жидкого химуса в слепой и восходящей кишке
- Г. Наличие большого количества желчи в просвете кишки

Спаечная болезнь органов брюшной полости является _____ колоноскопии

- А. Показанием к ургентной
- Б. Противопоказанием к плановой
- В. Противопоказанием к ургентной
- Г. Ограничением

Для папилломы пищевода наиболее характерен _____ цвет

- А. Красноватый
- Б. Голубоватый
- В. Белесоватый
- Г. Розовый

2-й эхослой стенки желудка соответствует

- А. Мышечной оболочке
- Б. Глубоким слоям слизистой оболочки и собственной мышечной пластинке
- В. Серозной оболочке
- Г. Подслизистой оболочке

Если в полипе определяется ямочный рисунок по kudo iiis, I типа, то он является

- А. Аденокарциномой
- Б. Грануляцией
- В. Гиперпластическим
- Г. Аденомой

Конечным отделом толстой кишки является _____ кишка

- А. Восходящая
- Б. Сигмовидная
- В. Прямая
- Г. Нисходящая

Для подготовки толстой кишки к эндоскопическим исследованиям у пациентов с болезнью Крона применяют

- А. Препараты на основе полиэтиленгликоля
- Б. Микроклизмы с раствором ромашки
- В. Препараты с бисакодилом
- Г. Сульфат-содержащие препараты

В норме угол гиса представляет собой

- А. Угол 90 градусов
- Б. Угол 110 градусов
- В. Угол 120 градусов
- Г. Острый угол

При аксиальной хиатальной грыже 3 степени кардия располагается _____ диафрагмы

- А. Значительно выше уровня
- Б. Тотчас ниже уровня
- В. Значительно ниже уровня
- Г. На уровне

Карциноиды развиваются из

- А. Бруннеровых желёз
- Б. Каёмчатых клеток
- В. Нейроэндокринных клеток
- Г. Бокаловидных клеток

Клиническая картина эзофагита включает

- А. Голодные боли
- Б. Изжогу
- В. Кашель
- Г. Дисфагию

Большой дуоденальный сосочек чаще располагается на _____ стенке нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки

- А. Передне-медиальной
- Б. Задне-медиальной
- В. Передне-латеральной
- Г. Задней

Причиной развития недостаточности кардии и рефлюкс-эзофагита могут служить

- А. Язвенная болезнь в острой стадии и варикозное расширение вен 3-4 стадии
- Б. Ахалазия кардии и варикозное расширение вен 3-4 стадии
- В. Дивертикулы пищевода и параэзофагеальная грыжа
- Г. Дивертикулы пищевода и ахалазия кардии

Складки в количестве 12-24 определяются в _____ кишке

- А. Восходящей
- Б. Нисходящей
- В. Поперечно-ободочной
- Г. Слепой

Под дивертикулом ценкера понимают дивертикул

- А. Ложный тракционный
- Б. Истинный пульсионный
- В. Истинный тракционный
- Г. Ложный пульсионный

Форму треугольника с закругленными углами и слегка выпуклыми сторонами имеет ____ кишка

- А. Нисходящая
- Б. Восходящая
- В. Сигмовидная
- Г. Слепая

Для болезни Крона характерно наличие

- А. Сегментарности поражения
- Б. Непрерывности поражения
- В. Крипт-абсцессов
- Г. Высокой дисплазии слизистой оболочки

Отделами толстой кишки, расположенными интраперитонеально, являются _____ кишка

- А. Сигмовидная и прямая
- Б. Восходящая и поперечно-ободочная
- В. Нисходящая и сигмовидная
- Г. Поперечно-ободочная и сигмовидная

Характерным морфологическим признаком для ишемического колита является наличие

- А. Саркоидных гранул
- Б. Гемосидеринсодержащих макрофагов
- В. «Крипт»- абсцессов
- Г. Саркоидных гранул с казеозным некрозом

Применение клинических рекомендаций, стандартов и порядков медицинской помощи способствует

- А. Реорганизации медицинских организаций
- Б. Повышению укомплектованности медицинскими кадрами
- В. Выработке единых подходов к оказанию медицинской помощи
- Г. Увеличению расходов финансовых средств

К морфологическим изменениям слизистой оболочки толстой кишки, характерным только для болезни Крона относят

- А. Саркоидные гранулемы
- Б. Атипию эпителия
- В. Грануляционную ткань
- Г. Гистиоцитарную инфильтрацию

Эндоскопическая картина кардиоэзофагеального рака характеризуется

- А. Нарушением функции кардии
- Б. Не нарушенной функцией кардии
- В. Четко выраженной зубчатой линией
- Г. Отсутствием особенностей слизистой кардиоэзофагеального перехода

Наличие умеренной диффузной гиперемии слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки чаще является признаком

- А. Гемодинамических изменений в пищеварительную фазу
- Б. Гиперпродукции соляной кислоты
- В. Умеренно выраженного воспаления
- Г. Острого гастрита