

Тесты с вопросами по специальности «Эпидемиология» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/epidemiolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Эпидемиология» для аккредитации и других экзаменов (2100 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/epidemiologia/

2) Тесты для аккредитации «Вирусология» (800 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/virus/

3) Тесты для аккредитации «Инфекционные болезни» (3200 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/i_bolezni/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Текущую дезинфекцию в семейных очагах острого гепатита А осуществляют

- А. В течение 35 дней с момента выявления больного
- Б. В течение 45 дней с момента выявления больного
- В. С момента выявления больного до госпитализации, а также в случае изоляции его на дому
- Г. В течение 50 дней с момента выявления больного
- Д. В течение 60 дней с момента выявления больного

Наиболее часто заболевание человека туберкулезом вызывается

- A. Mycobacterium bovis
- Б. Mycobacterium kansasii
- В. Mycobacterium leprae
- Г. Mycobacterium africanum
- Д. Mycobacterium tuberculosis

Укажите соответствие химических веществ для уничтожения фазы развития членистоногих как переносчиков инфекционных агентов: Химические вещества

- А) Инсектициды**
 - Б) Акарициды**
 - В) Имагоциды**
 - Г) Ларвициды**
 - Д) Овициды**
- Членистоногие и стадии их развития**

- 1. Клещи**
- 2. Взрослые стадии**
- 3. Насекомые**
- 4. Яйца членистоногих**
- 5. Личинки членистоногих**

- A. А-1; Б-3; В-2; Г-5; Д-4
- Б. А-3; Б-2; В-1; Г-5; Д-4
- В. А-4; Б-1; В-2; Г-5; Д-3
- Г. А-3 Б-1 В-5 Г-2 Д-4
- Д. А-3; Б-1; В-2; Г-5; Д-4

ИЛП хранились при температуре -20 С°. Можно использовать после размораживания:

- A. никакую нельзя;
- Б. Дифтерийно-столбнячный анатоксин;
- В. Вакцину рекомбинантную дрожжевую против гепатита В;
- Г. Туляремийную вакцину;
- Д. Вакцину против клещевого энцефалита.

Соответствие нозологической формы вирусных гепатитов механизмам передачи инфекции:

- А) ВГА**
- Б) ВГВ**
- 1. фекально-оральный**
- 2. гемоконтактный**
- 3. трансмиссивный**
- 4. аэрозольный**

- A. А-1; Б-2
- Б. А-4; Б-3

Детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, пробу Манту ставят

- А. ежегодно
- Б. не ставят по причине медотвода
- В. 1 раз в год до получения прививки БЦЖ-М
- Г. 2 раза в год до получения прививки БЦЖ-М
- Д. проводят рентгенологическое обследование органов грудной клетки

Какое из перечисленных противопоказаний является ложным:

- А. Аллергия к аминогликозидам;
- Б. Аллергия к пекарским дрожжам;
- В. Атопический дерматит;
- Г. Афебрильные судороги в анамнезе;
- Д. ПВО на предыдущее введение вакцины.

Установите соответствие характеристики источника туберкулезной инфекции и группы эпидопасности эпидемических очагов туберкулеза:

- А) Больной туберкулезом органов дыхания, выделяющий МБТ
 - Б) Больной, выбывший из очага на продолжительный срок
 - В) Больной туберкулезом мочеполовой системы, выделяющий МБТ
 - Г) Больной, прекративший выделять МБТ в результате лечения
 - Д) больная туберкулезом корова
1. 5 группа
 2. 4 группа
 3. 3 группа
 4. 2 группа
 5. 1 группа

- А. А-5; Б-2; В-3; Г-4; Д-1
- Б. А-1; Б-2; В-3; Г-5; Д-4

Установите соответствие основного резервуара возбудителей отдельным нозологическим формам инфекции:

- А) Легионеллез
 - Б) Сибирская язва
 - В) Кишечный иерсиниоз
 - Г) Псевдотуберкулез
1. свиньи
 2. грызуны
 3. почва
 4. вода

- А. А-3,4; Б-3; В-1; Г-2
- Б. А-3,4; Б-2; В-1; Г-2
- В. А-3,4; Б-3; В-2; Г-1
- Г. А-4; Б-3; В-1; Г-2

Обеззараживание отходов класса Б персоналом организации в местах их образования

А. не допускается

Б. обязательно во всех случаях

В. обязательно в инфекционных и фтизиатрических отделениях/стационарах

Г. обязательно при возможности контакта с ними персонала медицинской организации

Д. обязательно в случае отсутствия в организации участка по

обеззараживанию/обезвреживанию отходов класса Б или централизованной системы обезвреживания медицинских отходов принятой на административной территории

Установите соотношение между методом стерилизации и стерилизуемым агентом: Вид стерилизации

А. Паровой

Б. Химический (жидкий стериллянт)

В. Химический (газовый)

Г. радиационный Стерилизуемый агент

1. Формальдегид

2. Насыщенный пар

3. Гамма излучение

4. Глутаровый альдегид

А. А-2; Б-4; В-1; Г-3.

Б. А-3; Б-4; В-1; Г-2.

В. А-1; Б-3; В-1; Г-2.

Управление заболеваемостью населения гепатитом А включает:

А) Информационное обеспечение эпидемиологического надзора

Б) Аналитическое обеспечение эпидемиологического надзора

В) Профилактические и противоэпидемические мероприятия

1) Вакцинация населения против гепатита А

2) Экстренная профилактика в эпидемических очагах гепатита А

3) Учет случаев заболевания гепатитом А

4) Обеспечение населения доброкачественной водой

5) Расчет показателей инцидентности гепатита А

6) Учет населения, проживающего на территории

А. А-3,5; Б-6; В-1,2,4

Б. А-3,6; Б-5; В-1,2,4

Риск инфицирования при уколе иглой, контаминированной кровью больного вирусным гепатитом В, составляет:

А. 0,5-1%;

Б. 10%;

В. 35%;

Г. 50%;

Д. 100%

Установите соответствие между возрастом ребенка и профилактической прививкой:

Возраст ребенка

А. Первые 24 часа

Б. 3-7 дней

В. 3 месяца

Г. 12 месяцев **Наименование вакцины**

1. АКДС, НІВ, ИПВ

2. Вакцина гепатита В

3. Коревая, краснуха, эпидемический паротит

4. БЦЖ

А. А-4; Б-2; В-1; Г-3

Б. А-3; Б-4; В-2; Г-1

В. А-2; Б-4; В-1; Г-3

Управление заболеваемостью населения гепатитом В включает:

А) Информационное обеспечение эпидемиологического надзора

Б) Аналитическое обеспечение эпидемиологического надзора

В) Профилактические и противоэпидемические мероприятия

1) Вакцинация населения против гепатита В

2) Слежение за заболеваемостью гепатитом В

3) Выявление групп и территорий риска заболевания гепатитом В

4) Проведение в эпидемических очагах гепатита В заключительной дезинфекции

5) Слежение за парэнтеральным потреблением психоактивных веществ

6) Формулирование эпидемиологического диагноза

А. А-2; Б-3,5,6; В-1,4

Б. А-2,5; Б-3, 6; В-1,4

Укажите наименее резистентные к дезинфекции микроорганизмы из перечисленных:

А. прионы;

Б. споры бактерий;

В. цисты паразитов;

Г. микобактерии;

Д. малые неболочечные вирусы.

Основными методами лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции являются

А. биохимический

Б. реакция иммунофлюоресценции

В. люминесцентная микроскопия

Г. ИФА, иммуноблоттинг, ПЦР

Д. вирусологический

Для контроля эффективности паровой стерилизации используют споры:

- А. *Bacillus butiricum*;
- Б. *Bacillus licheniformis*;
- В. *Bacillus subtilis*;
- Г. *Bacillus stearothermophilus*;
- Д. *Bacillus bacteroides*.

Из перечисленных стерилизующим средством является:

- А. 0,5% спиртовой раствор хлоргексидина биглюконата;
- Б. 3% раствор перекиси водорода;
- В. 96% этиловый спирт;
- Г. 1% раствор дезоксона-1;
- Д. 3% раствор формалина.

К поствакцинальной реакции относят:

- А. Стойкое нарушение состояния здоровья, обусловленное введением некачественного прививочного препарата;
- Б. Тяжелое нарушение состояния здоровья, связанное с нарушением правил отбора на прививку;
- В. Физиологическую реакцию на введение прививочного препарата;
- Г. Патологическую реакцию, обусловленную нарушением техники иммунизации;
- Д. Все выше перечисленное.

Установите соответствие: Очаги паразитов

А) Независимые

Б) Зависимые

В) Псевдоочаги Это очаги, в которых передача паразита

1. идет на уровне, недостаточном для самопроизводства, и которые угасают без завоза инвазии из вне

2. продолжается в течение неограниченного времени

3. происходить не может, и которые существуют исключительно за счет заноса возбудителя из вне

А. А-1; Б-3; В- 2

Б. А-2; Б-1; В- 3

Для создания активного иммунитета используют:

- А. Сыворотки;
- Б. Вакцины;
- В. Иммуноглобулины;
- Г. Пробиотики;
- Д. Интерферон.

Источниками возбудителя инфекции при скарлатине являются

- А. только животные
- Б. только человек
- В. внешняя среда
- Г. человек и животные
- Д. животные и внешняя среда

Больной корью становится эпидемиологически опасным для окружающих

- А. в начале инкубационного периода
- Б. накануне заболевания и с 1 дня продромального периода
- В. в период высыпания
- Г. в период пигментации
- Д. в период шелушения кожи

Неоднородность и динамическая изменчивость какой из перечисленных характеристик возбудителя болезни имеет максимальное значение в формировании эпидемического процесса:

- А. чувствительность к антибиотикам;
- Б. устойчивость во внешней среде;
- В. адгезия;
- Г. антигенные свойства и вирулентность;
- Д. спорообразование.

Установите соответствие между инфекционным заболеванием и продолжительностью максимального инкубационного периода:

- А) Чума
- Б) Холера
- В) Бешенство
- Г) Туляремия
- Д) Сибирская язва

- 1. 21 день
- 2. 8 дней
- 3. 6 дней
- 4. 5 дней
- 5. 1 год

- А. А-3 Б-4 В-5 Г-1 Д-2
- Б. А-4 Б-3 В-5 Г-1 Д-2
- В. А-2 Б-4 В-5 Г-1 Д-3

Установите соответствие между категорией осложнений на введение БЦЖ-вакцины и его клиническим проявлением: Категория поствакцинального осложнения

А. Локальные поражения

Б. Диссеминированные БЦЖ-инфекции

В. Генерализованные БЦЖ - инфекции

Г. Поствакцинальный БЦЖ- синдром Клиническое проявление

1. Холодный абсцесс

2. Узловая эритема

3. Генерализованные поражения с летальным исходом

4. Остеит

А. А-2; Б-4; В-3; Г-1

Б. А-1; Б-4; В-3; Г-2

В. А-4; Б-1; В-3; Г-2

Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса Б внутри организации производится

А. Ежедневно

Б. по мере загрязнения

В. не реже одного раза в месяц

Г. не реже одного раза в неделю

Д. определяется в соответствии со схемой обращения отходов в каждой конкретной организации

Установите соответствие: Вирусы гепатитов

А) А

Б) В

В) С

Г) D

Д) Е Геном

1. ДНК

2. РНК

А. А-2; Б-1; В-2; Г-1; Д-2

Б. А-1; Б-1; В-2; Г-1; Д-2

В. А-2; Б-2; В-2; Г-1; Д-2

Г. А-1; Б-2; В-2; Г-2; Д-2

Д. А-2; Б-1; В-2; Г-2; Д-2

Соответствие главного пути передачи виду шигелл:

- А) Зонне**
- Б) Флекснера**
- В) Григорьева-Шига**
- 1. водный**
- 2. контактно-бытовой**
- 3. пищевой**
- 4. воздушно-пылевой**
- 5. трансмиссивный**
- А. А-4; Б-1; В-2
- Б. А-1; Б-2; В-3
- В. А-2; Б-3; В-5
- Г. А-3; Б-1; В-2

Поствакцинальным осложнением на введение АКДС является:

- А. Повышение температуры тела до 37 С°;
- Б. Гиперемия в месте введения вакцины;
- В. Судороги;
- Г. Уплотнение в месте введения вакцины;
- Д. ОРВИ.

Противопоказание для вакцинации против вирусного гепатита В:

- А. Ребенок, мать которого является носителем Hbs-антигена
- Б. Повышенная чувствительность к дрожжам
- В. Хронический гепатит С
- Г. Хронический гломерулонефрит
- Д. Хронический бронхит.

С какого возраста рекомендована вакцинация против гриппа:

- А. 12 месяцев;
- Б. 6 месяцев;
- В. 7 месяцев;
- Г. 18 месяцев;
- Д. 2 месяцев.

Норматив охвата прививками против дифтерии среди детей в возрасте 12 месяцев:

- А. 80%;
- Б. 95%;
- В. 99%;
- Г. 85%;
- Д. 75%.

Бактерицидное излучение – это электромагнитное излучение ультрафиолетового спектра с длиной волн в интервале:

- А. 95-105 нм;
- Б. 105-150 нм;
- В. 160-205 нм;
- Г. 205-315 нм;
- Д. 350-415 нм.

Кто из перечисленных групп не относится к группам профессионального риска заражения гепатитом А:

- А. Работники, контактирующие с детьми (ясли, детский сад, школы);
- Б. Работники транспорта;
- В. Рабочие системы канализации;
- Г. Воинские контингенты, командированные, направляющиеся в высоко и умеренно эндемичные зоны;

В системе противоэпидемических мероприятий дератизация как метод борьбы с рядом зооантропонозных заболеваний среди населения направлены на

- А. источник инфекции
- Б. пути передачи возбудителя
- В. восприимчивый организм
- Г. факторы передачи
- Д. снижение восприимчивости населения

Установите соответствие между номером учетной документации по прививкам и ее названием: Номер формы

- А. ф. 112/у
 - Б. ф. 063/у
 - В. ф. 156/у-93
 - Г. ф. 025/у
 - Д. ф. 97/у
- Название формы**
1. Карта профилактических прививок
 2. История развития ребенка
 3. Медицинская карта амбулаторного больного
 4. История развития новорожденного
 5. Сертификат профилактических прививок
- А. А-1, Б-2, В-4, Г-5, Д-3
 - Б. А-3, Б-1, В-4, Г-5, Д-2
 - В. А-2; Б-1; В-5; Г-3; Д-4.

Установите соответствие: Вирусы гепатитов

А) А

Б) В

В) С

Г) D

Д) Е

Е) F Механизм передачи

1. фекально-оральный

2. контактный

А. А-1; Б-2; В-2; Г-1; Д-1; Е-2

Б. А-1; Б-2; В-2; Г-2; Д-1; Е-2

В. А-1; Б-2; В-2; Г-2; Д-2; Е-1

Г. А-2; Б-1; В-1; Г-2; Д-2; Е-2

Д. А-1; Б-2; В-2; Г-1; Д-2; Е-1

Е. А-1; Б-2; В-1; Г-1; Д-1; Е-2

При какой из перечисленных инфекций формируется нестерильный иммунитет

А. Вирусный гепатит А;

Б. Туберкулез;

В. Корь;

Г. Ветряная оспа;

Д. Дифтерия.

Ведущий путь передачи ротавирусов

А. контактно-бытовой

Б. пищевой

В. водный

Г. воздушно-капельный

Д. воздушно-пылевой

Установите соответствие между видом обработки рук и выполняемыми манипуляциями:

Вид обработки рук

А. Гигиеническая обработка рук

Б. Обработка рук хирургов Проводится в следующих случаях

1. Перед непосредственным контактом с пациентом

2. Перед выполнением катетеризации магистральных сосудов

3. Перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом

4. После контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от пациента

5. После контакта с неповрежденной кожей пациента

6. Перед проведением оперативных вмешательств

А. А-1,3,4,5; Б-2,6

Б. А-3,4,5; Б-1,2,6

В. А-1,2,3,4,5; Б-6

Эпидемиологические термины означают:

А) Оборот инвазии

Б) Скорость оборота инвазии

1. Время, необходимое для развития гельминта от одной стадии до такой же стадии следующего его поколения

2.Время от начала выделения гельминтом яиц (личинок) в организме одного окончательного хозяина до момента их появления у другого окончательного хозяина, заразившегося от первого

А. А-2; Б-1

Б. А-1; Б-2

В детских образовательных организациях текущую дезинфекцию проводит

А. Персонал данной организации при подозрении на заболевание острым гепатитом А и до госпитализации больного, а также в течение 35 дней наблюдения от момента изоляции последнего заболевшего

Б. Персонал данной организации при подозрении на заболевание острым гепатитом А и до госпитализации больного, а также в течение 45 дней наблюдения от момента изоляции последнего заболевшего

В. Учреждениями дезинфекционного профиля при подозрении на заболевание острым гепатитом А и до госпитализации больного, а также в течение 35 дней наблюдения от момента изоляции последнего заболевшего

Г. Персонал данной организации при подозрении на заболевание острым гепатитом А и до госпитализации больного, а также в течение 45 дней наблюдения от момента изоляции последнего заболевшего

Д. Учреждениями дезинфекционного профиля при подозрении на заболевание острым гепатитом А и до госпитализации больного, а также в течение 15 дней наблюдения от момента изоляции последнего заболевшего

Регистрационное удостоверение на разрешение к применению вакцины на территории РФ выдается:

А. Органами Роспотребнадзора;

Б. Отделом биологического контроля изготовителя;

В. Минздравом РФ;

Г. Росздравнадзором РФ;

Д. Федеральным центром гигиены и эпидемиологии.

Ведущим путем передачи вирусного гепатита А в детских дошкольных учреждениях является

А. водный

Б. пищевой

В. контактно-бытовой

Г. воздушно-капельный

Д. воздушно-пылевой

Антраксин применяется для

- А. лечения сибирской язвы
- Б. специфической профилактики
- В. экстренной профилактики
- Г. диагностики сибирской язвы
- Д. антибиотикопрофилактики

Соотнесите необходимый уровень обработки инструментов: Виды обработки

А. Дезинфекция высокого уровня

Б. Стерилизация Медицинские инструменты

1. Бронхоскоп

2. Колоноскоп

3. Гастроскоп

4. Цистоскоп

А. А-2. Б-1,3,4

Б. А-2,3. Б-1,4

Развитие энцефалита после введения АКДС-вакцины, как правило,:

- А. Является поствакцинальной реакцией;
- Б. Является поствакцинальным осложнением;
- В. Не имеет причинно-следственных связей с вакциной;
- Г. Нежелательное явление, связанное с введением вакцины;
- Д. Серьезное нежелательное явление, связанное с введением вакцины.

Установите соответствие между названием вакцины и способом ее введения: Название вакцины

А. Туляремиальная живая вакцина

Б. АКДС

В. Живая коревая вакцина

Г. Живая полиомиелитная вакцина Преимущественный способ введения

1. внутримышечный

2. пероральный

3. накожный

4. подкожный

А. А-3, Б-1, В-4, Г-2

Б. А-4, Б-1, В-3, Г-2

В. А-1, Б-4, В-2, Г-3

Установите соответствие инфекционных заболеваний и применяемых средств специфической профилактики:

- А) Дифтерия
- Б) Туляремия
- В) Туберкулез
- Г) Бешенство

Д) Вирусный гепатит В

1. рекомбинантная вакцина
2. аттенуированная вакцина
3. инактивированная вакцина
4. живая вакцина
5. анатоксин

А. А-5; Б-2; В-4; Г-3; Д-1

Б. А-5; Б-4; В-3; Г-2; Д-1

В. А-5; Б-4; В-2; Г-3; Д-1

Выберите, какой организацией должна быть проведена заключительная дезинфекция в очагах инфекционных болезней, выявленных в МО: Организация

А. Дезинфекция силами МО

Б. Дезинфекция дез. отделом государственных унитарных предприятий дезинфекционного профиля Инфекционные заболевания

1. Брюшной тиф
2. Туберкулёз
3. Вирусные гепатиты А и Е
4. Полиомиелит
5. ВИЧ-инфекция
6. Чума

А. А-3,4; Б-1,2

Б. А-2,3,4,5,6; Б-1

Укажите соответствие противопоказаний видам специфической профилактики бешенства:

А) Постэкспозиционная профилактика бешенства

Б) Плановая профилактическая вакцинация

1. беременность
2. аллергия на антибиотики
3. Заболевание гидрофобией
4. Отек Квинке в анамнезе

А. А-1,3; Б-2,4

Б. А-3; Б-1,2,4

Наибольшую опасность как источники инфекции представляют больные бешенством животные с последние

- А. 5 дней жизни
- Б. 10 дней жизни
- В. 30 дней жизни
- Г. 35 дней жизни
- Д. 3 месяца жизни

При возникновении в детских учреждениях групповых заболеваний ротавирусной инфекцией проводятся карантинные мероприятия с момента изоляции последнего больного в течение дней

- А. 3
- Б. 5
- В. 7
- Г. 10
- Д. 14

Соотнесите спектр активности отдельных групп дезинфицирующих средств: АДВ

- А. Спирты**
 - Б. Альдегиды**
 - В. ЧАС Микроорганизмы**
 - 1. Бактерии**
 - 2. Микобактерии туберкулёза**
 - 3. Вирусы**
- А. А-1,2,3; Б-1,2,3; В-1,2.
Б. А-1,2; Б-1,2,3; В-1,2.

К фенотипическим методам внутривидового типирования относится:

- А. рестрикционный анализ плазмид
- Б. антибиотикотипирование
- В. RAPD-ПЦР
- Г. электрофорез в пульсирующем поле
- Д. мультилокусное секвенирование

Какую из перечисленных вакцин допускается хранить на 2 уровне холодной цепи при -20 °С :

- А. АКДС;
- Б. АДС-М;
- В. Против гепатита В;
- Г. Вакцина против полиомиелита ;
- Д. Вакцина против гепатита А

Стерилизация перевязочного материала проводится

- А. Газовым
- Б. Химическим
- В. Паровоздушным
- Г. Пароформалиновым
- Д. Паровым

Методом ранней диагностики брюшного тифа является

- А. бактериологическое исследование желчи
- Б. бактериологическое исследование испражнений
- В. бактериологическое исследование мочи
- Г. бактериологическое исследование крови
- Д. серологическое исследование

Первый день появления сыпи у больного корью считается для контактных

- А. первым днем инкубации
- Б. четвертым-пятыми днями инкубации
- В. первым днем продромального периода
- Г. последним днем продромального периода
- Д. первым днем клинических проявлений

Управление заболеваемостью населения холерой включает:

- А) Информационное обеспечение эпидемиологического надзора
 - Б) Аналитическое обеспечение эпидемиологического надзора
 - В) Профилактические и противоэпидемические мероприятия
- 1) Вакцинация населения против холеры
 - 2) Слежение за заболеваемость холерой
 - 3) Установление путей и факторов передачи холерного вибриона
 - 4) Проведение в эпидемических очагах холеры заключительной дезинфекции
 - 5) Слежение за качеством питьевого водоснабжения населения
 - 6) Оценка эффективности проводимых профилактических мероприятий
- А. А-1,2,5; Б-3,6; В-4
 - Б. А-2,5; Б-3,6; В-1,4

Механизм передачи инфекции при брюшном тифе

- А. Аэрозольный
- Б. Трансмиссивный
- В. Фекально-оральный
- Г. Контактный
- Д. Вертикальный

Установите соответствие основных механизмов передачи нозологическим формам инфекции:

А) Чума

Б) Холера

В) Бешенство

Г) Легионеллез

Д) Синдром врожденной краснухи

1. Фекально-оральный

2. Аэрозольный

3. Трансмиссивный

4. Контактный

5. Вертикальный

А. А-3; Б-1; В-4; Г-2; Д-5

Б. А-5; Б-1; В-4; Г-2; Д-3

В. А-1; Б-3; В-4; Г-2; Д-5

Время стерилизации 2% раствором глютарового альдегида составляет:

А. 1 час;

Б. 2 часа;

В. 30 минут;

Г. 10 часов;

Д. 5 часов.

Укажите соответствие между характером микрофлоры рук и видами микроорганизмов:

Характер микрофлоры

А. Резидентная

Б. Транзиторная Микроорганизмы

1. E. Coli и Proteus spp.

2. Corinebacterium spp.

3. Acinetobacter spp.

4. Staphylococcus aureus, в том числе MRSA

5. Salmonella spp. и Pseudomonas aeruginosa

6. Staphylococcus epidermidis и другие коагулазонегативные стафилококки

А. А-2,3,6; Б-1,4,5.

Б. А-3,6; Б-1,2,4,5.

Управление заболеваемостью населения корью включает:

- А) Информационное обеспечение эпидемиологического надзора
- Б) Аналитическое обеспечение эпидемиологического надзора
- В) Профилактические и противоэпидемические мероприятия
- 1) Вакцинация населения против кори
- 2) Экстренная профилактика в эпидемических очагах кори
- 3) Слежение за уровнем заболеваемости корью
- 4) Определение показателей охвата населения прививками против кори
- 5) Проведение ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости корью
- 6) Учет населения, проживающего на территории
- 7) Учет противопоказаний к проведению иммунизации против кори

А. А-3,4,6,7; Б-5, В-1,2

Б. А-4,6,7; Б-5, В-1,2,3

Установите соответствие содержания дифтерийных и столбнячных антител в сыворотках крови контактных в эпидемическом очаге дифтерии и управленческим решением по проведению экстренной вакцинопрофилактики: Уровень дифтерийного/столбнячного антитоксина

А. 1:80/1:160

Б. 1:10/1:10

В. 1:10/1:80

Г. 1:320/1:10 Рекомендуемая тактика экстренной иммунопрофилактики

1. АДС-М

2. АД-М

3. АС

4. Не приводятся

А. А-1, Б-3, В-2, Г-4

Б. А-4, Б-1, В-2, Г-3

Вариант возбудителя, вызвавший связанные случаи заболевания на территории нескольких географических регионов (стран, континентов) называют:

А. экзотическим штаммом

Б. эндемическим клоном

В. эпидемическим клоном

Г. клональным комплексом

Д. изолятом

Установите соответствие между инфекциями и видом национального календаря прививок. Вид календаря

А. Национальный календарь профилактических прививок

Б. Календарь профилактическим прививок по эпидемическим показаниям

Инфекция

1. Туберкулез

2. Гепатит В

3. Дифтерия

4. Коклюш

5. Столбняк

6. Полиомиелит

7. Корь

8. Хиб-инфекция

9. Пневмококк

10. Бруцеллез

11. Брюшной тиф

12. Гепатит А

А. А-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Б-10,11,12

Б. А-1,2,3,4,5,6,7,9; Б-8,10,11,12

Для профессионально-сельскохозяйственного типа сибирской язвы характерна сезонность

А. Зимняя

Б. Осенняя

В. Зимне-осенняя

Г. Весенняя

Д. Летне-осенняя

Групповыми заболеваниями внутрибольничными инфекциями следует считать:

А. появление 5 и более случаев, связанных одним источником инфекции и общими факторами передачи;

Б. появление 3 и более случаев, связанных одним источником инфекции и общими факторами передачи;

В. появление 5 и более случаев;

Г. появление 5 и более случаев, не связанных одним источником инфекции и общими факторами передачи.

Иммунизацию восприимчивых контактных в очагах вирусного гепатита А следует провести не позднее:

А. 5 суток от момента выявления первого больного в очаге;

Б. 72 часов от момента выявления первого больного в очаге;

В. 9 дней от момента выявления первого больного в очаге;

Г. 48 часов от момента выявления первого больного в очаге;

Д. срок не имеет значения.

Паротитная вакцина содержит:

- А. Живой вирус эпидемического паротита;
- Б. Инаktivированный вирус эпидемического паротита;
- В. Живой вакцинный штамм вируса эпидемического паротита;
- Г. Инаktivированный вакцинный штамм вируса эпидемического паротита;
- Д. Поверхностный антиген вируса эпидемического паротита.

Какой показатель рассчитывается для оценки силы воздействия изучаемого фактора в исследовании случай - контроль

- А. относительный риск
- Б. коэффициент корреляции
- В. отношение шансов
- Г. Хи-квадрат
- Д. критерий Стьюдента

Использование метода различия при расследовании вспышек, в частности, предусматривает

- А. выявление эпидемиологических признаков, отличающихся от характерных признаков вспышек той же инфекции
- Б. оценку частоты встречаемости факторов риска у больных
- В. оценку частоты встречаемости факторов риска у здоровых лиц
- Г. сравнение частоты встречаемости факторов риска у больных и здоровых и выявление фактора, значимо чаще встречающегося у заболевших
- Д. выявление общего для большинства заболевших фактора риска

В борьбе с кишечными инфекциями ведущей мерой является

- А. меры по разрыву механизма передачи;
- Б. вакцинация;
- В. госпитализация больных и носителей;
- Г. фагопрофилактика;
- Д. лечение антибиотиками

Ведущим фактором риска послеродовых инфекций у родильниц являются

- А. хламидиоз
- Б. хориоамнионит
- В. длительная госпитализация до родов
- Г. удаление волос перед родоразрешением
- Д. все вышеперечисленное

В очаге дифтерии не следует проводить

- А. выявление контактных
- Б. наблюдение контактных
- В. бактериологическое обследование контактных
- Г. введение АД-М анатоксина лицам с низким уровнем противодифтерийного иммунитета
- Д. введение контактным лицам противодифтерийной сыворотки

Основным условием интенсивного распространения кори в случае заноса этой инфекции в детские коллективы является

- А. преобладание при кори больных стертыми и легкими формами заболеваний
- Б. низкий уровень коллективного иммунитета
- В. особенность патогенеза заболевания
- Г. высокая устойчивость вируса кори во внешней среде
- Д. высокая степень контакта между детьми в коллективах

Более высокие показатели заболеваемости у детей отмечаются при

- А. ротавирусной инфекции, гепатите А, дизентерии Зонне
- Б. брюшном тифе, дизентерии Флекснера, гепатите Е
- В. бруцеллезе, лептоспирозе, туляремии
- Г. сальмонеллезе, туляремии, брюшном тифе
- Д. коклюше, лептоспирозе, гепатите Е

Предупреждает передачу эпидемиологически важных микроорганизмов от инфицированного или колонизированного пациента через прямой или опосредованный контакт

- А. контактная изоляция
- Б. капельная изоляция
- В. воздушная изоляция
- Г. барьерная изоляция
- Д. функциональная изоляция

Приведите в соответствие вид вакциноассоциированного полиомиелита (ВАП) и условия его развития: Вид ВАП

А. ВАП реципиента

Б. ВАП контактных Условия развития ВАП

1. При инфицировании диким вирусом полиомиелита

2. При введении здоровому ребенку инаktivированной полиомиелитной вакцины

3. При введении ребенку с иммунодефицитом инаktivированной полиомиелитной вакцины

4. При инфицировании вакцинными штаммами полиомиелит непривитых лиц, находящихся в окружении привитых

5. При введении ребенку с иммунодефицитом оральной полиомиелитной вакцины

А. А-1; Б-5

Б. А-5; Б-4

В. А-3; Б-1

Г. А-2; Б-4

Срок медицинского наблюдения за контактными с больным эпидемическим паротитом составляет

А. 7 дней

Б. 17 дней

В. 21 день

Г. 22 дня

Д. 35 дней

Для острых кишечных инфекционных заболеваний обусловленных ротавирусами характерна следующая сезонность:

А. летняя;

Б. осенняя;

В. осенне-зимняя;

Г. зимне-весенняя;

Д. весенне-летняя.

В приемное отделение больницы поступила женщина с кровотечением после внебольничного аборта. Прививочный анамнез неизвестен. Экстренная профилактика столбняка проводится:

А. АС анатоксином;

Б. АС анатоксином и ПСС;

В. ПСС;

Г. антирабической вакциной;

Д. не проводится.

Серологическое и биохимическое обследование доноров с целью раннего выявления вирусного гепатита В проводится

- А. ежегодно
- Б. ежеквартально
- В. ежемесячно
- Г. при взятии на учет
- Д. перед каждой сдачей донорского материала

Пациенты психиатрического диспансера подлежат обследованию на туберкулез с периодичностью

- А. 1 раз в год
- Б. 3 раза в год
- В. 1 раз в 6 месяцев
- Г. 1 раз в 2 года
- Д. 1 раз в 3 года

Возбудитель менингококковой инфекции относится к роду

- А. Коринебактерий
- Б. Нейссерий
- В. Листерий
- Г. Иерсиний
- Д. Пептострептококков

Установите соответствие между категорией медицинского работника и функциональными обязанностями при проведении прививочной работы: Категория медицинского персонала

- А. Врач эпидемиолог
 - Б. Врач КИП
 - В. Участковый терапевт
- Функциональные обязанности в области организации вакцинопрофилактики**
- 1. Эпидемиологический надзор за вакцинопрофилактикой
 - 2. Оформление заявки на бактериальные препараты
 - 3. Планирование профилактических прививок
 - 4. Расследование поствакцинальных осложнений
 - 5. Осмотр ребенка перед прививкой
 - 6. Составление индивидуального графика прививок детей из групп риска развития ПВО
- А. А-1,2,3; Б-4,6; В-4,5
 - Б. А-1,2; Б-4,6; В-3,4,5

Установите соответствие между видом вакцины и ее характеристикой: Виды вакцин

А. Химические вакцины

Б. Комбинированные вакцины

В. Рекомбинантные вакцины Способ получения препарата

1. получены из отдельных компонентов АГ (полисахариды), путем химической экстракцией

2. получены с помощью генной инженерии

3. поливалентные вакцины обеспечивают иммунитет одновременно против нескольких инфекций

А. А-1; Б-3; В-2

Б. А-2; Б-3; В-1

Установите соответствие: Группы гельминтозов

А) Биогельминтозы

Б) Контагиозные Входящие в них инвазии

1) анкилостомоз

2) мансонеллез

3) тениаринхоз

4) трихоцефалез

5) гименолепидоз

6) энтеробиоз

А. А- 2,3; Б- 5,6

Б. А- 1,2; Б- 5,6

В. А- 1,2,3 Б- 5,6

Г. А- 2,3 Б- 4,5,6

Установите соответствие: Пути передачи вирусных гепатитов В и С

А) Половой

Б) Парентеральный

В) Вертикальный Реализация путей передачи

1. заражение плода (новорожденного) во время родов инфицированной беременной женщиной

2. половые контакты

3. повторное использование нестерилизованных игл и инструментов (в том числе внутривенное введение наркотиков), переливание крови и кровезаменяющих жидкостей, трансплантация органов и тканей

А. А-2; Б-3; В-1

Б. А-2; Б-3; В-1

В. А-2; Б-3; В-1

Противопоказанием к введению антирабической вакцины укушенному человеку является

- А. Аллергия
- Б. беременность
- В. пиелонефрит
- Г. заболевание гидрофобией
- Д. заболевание ЦНС

Установите соответствие между названием и типом вакцины против гриппа: Тип вакцины

- А. Расщепленная (сплит) вакцина
 - Б. Субъединичная
 - В. Вирусомальные
- Название вакцины**

- 1. Гриппол
 - 2. Ваксигрипп
 - 3. Инфлювак
 - 4. Ультрикс
 - 5. Флюарикс
- А. А-1,2,5; Б-3; В-4
Б. А-2,5; Б-1,3; В-4

Соответствие нозологической формы главному (ведущему) пути передачи инфекции:

- А) брюшной тиф
 - Б) паратиф А
 - В) паратиф В
1. бытовой
2. пищевой
3. водный
4. трансмиссивный
5. аэрозольный
- А. А-3, Б-3, В-2
Б. А-2, Б-3, В-2

Стадия сосальщика, инвазионная для человека

- А) Церкария
 - Б) Адолескария
 - В) Метациркария
1. кровяной
2. печеночный
3. легочный
4. кошачий
- А. А-2; Б-1; В- 3,4
Б. А-1; Б-2,4; В- 3
В. А-1; Б-2; В- 3,4
Г. А-1,4; Б-2; В- 3

Митигированная корь может возникать:

- А. при повторном заражении корью;
- Б. у лиц с активным искусственным иммунитетом;
- В. у контактных привитых иммуноглобулином;
- Г. у лиц с ослабленным иммунитетом;
- Д. у ВИЧ-инфицированных детей.

Вирус гепатита А обнаруживается в фекалиях

- А. за 10-14 дней до появления желтухи, количественно снижаясь после ее появления
- Б. при появлении антител типа IgM в высоком титре
- В. в течение всего периода заболевания
- Г. при появлении желтухи
- Д. в период реконвалесценции

Укажите лиц, подлежащих обязательному обследованию на HBsAg методом ИФА

- А. персонал детских дошкольных учреждений
- Б. учителя начальных классов
- В. беременные
- Г. новорожденные
- Д. работники сферы обслуживания

Для кровяного сосальщика:

- А) Окончательный хозяин
- Б) Промежуточный хозяин
- В) Дополнительный хозяин
- 1. пресноводные моллюски
- 2. человек
- 3. травоядные животные
- 4. дополнительного хозяина нет
- 5. рыбы, раки и крабы
- 6. плотоядные животные
- А. А-2; Б-3; В-4
- Б. А-6; Б-5; В-2
- В. А-2; Б-5; В-6
- Г. А-2; Б-1; В-4

Плановая вакцинация против вирусного гепатита В проводится по схеме:

- А. 0-2-12;
- Б. 0-1-2;
- В. 0-1-6;
- Г. 0-3-7-14-28-90;
- Д. 0-1-6-12.

Медицинское наблюдение за контактными лицами в эпидемических очагах вирусного гепатита В устанавливается сроком на

- А. 1 месяц
- Б. 35 дней
- В. 3 месяца
- Г. 6 месяцев
- Д. 1 год

Установите соответствие нозологических форм инфекций эпидемиологической классификации:

А) Антропонозы

Б) Зоонозы

В) Сапронозы

1. Листериоз

2. Легионеллез

3. Вирусный гепатит Е

4. Лямблиоз

5. чума

6. инфекционный мононуклеоз

А. А-3,4,6; Б-1,5; В-2

Б. А-3,4,6; Б-5; В-1,2

В. А-3,4,6; Б-1,5; В-2

Г. А-3,6; Б-1,4,5; В-2

Антибиотикопрофилактику при операции кесарева сечения следует, как правило, назначать

А. не ранее чем за 2 часа и не позднее 30 мин до операции однократно

Б. не позднее чем за 2 часа до операции однократно

В. сразу после пережати пуповины

Г. через 30 мин после пережати пуповины и далее в течение 5 дней после операции

Д. не назначать

Учету, как внутрибольничные инфекции в МО подлежат: Виды ИСМП

А. Поверхностная инфекция разреза

Б. Глубокая инфекция в области хирургического вмешательства

В. Глубокая инфекция в области хирургического вмешательства при наличии имплантата в месте операции

Г. Заболевания новорожденных, вызванные условно-патогенной флорой Сроки возникновения

1. В стационаре или не позднее 30 дней после операции

2. В стационаре или не позднее 1 года после операции

3. Не позднее 14 дней с момента выписки из стационара

4. В течение 12 часов с момента операции

5. В стационаре или в течение 7 дней после выписки

А. А-3; Б-1; В-2; Г-5.

Б. А-1; Б-1; В-2; Г-5.

В. А-4; Б-1; В-2; Г-3.

Выберите режимы стерилизации в паровых стерилизаторах: Т°С А - 132 Б - 120 В - 134 Г - 141 Время

1. 45 минут

2. 20минут

3. 5 минут

4. 3 минуты

5. 60 минут

А. А-2; Б-1; В-3; Г-4.

Б. А-4; Б-1; В-3; Г-5.

В. А-3; Б-1; В-2; Г-4.

Смена инфузионной системы для введения крови, компонентов крови и жировых эмульсий должна осуществляться:

А. Нет рекомендаций

Б. Каждые 12 часов

В. Каждые 24 часа

Г. Каждые 36 часов

Д. Каждые 72 часа

Установите соответствие видов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний нозологическим формам инфекций:

- А) Чума**
- Б) Орнитоз**
- В) Бешенство**
- Г) Сибирский клещевой тиф**
- Д) Лямблиоз**

- 1. вирус**
- 2. бактерия**
- 3. хламидия**
- 4. простейшие**
- 5. риккетсия**

А. А-5; Б-3; В-1; Г-2; Д-4

Б. А-2; Б-3; В-1; Г-5; Д-4

В. А-4; Б-3; В-1; Г-5; Д-2

В эпидемических очагах менингококковой инфекции соотношение числа больных генерализованными формами и носителей менингококков в целом во всех возрастных группах составляет

- А. 1:10**
- Б. 1:500**
- В. 1:1500**
- Г. 1:40000**
- Д. 1:100000**

Группой риска при скарлатине являются лица в возрасте

- А. 0-2 года**
- Б. 3-6 лет**
- В. 7-14 лет**
- Г. 15-18 лет**
- Д. 19 лет и старше**

Установите соответствие: Вирусы гепатитов А - А; Б - В; В - С; Г - Е; Д - Г. Инкубационный период 1 - 2-6 недель; 2 - 14-20 дней; 3 - 2-3 месяца; 4 - 3-6 месяцев 5 - 1 месяц.

- А. А-1; Б-4; В-3; Г-5; Д-2.**
- Б. А-2; Б-4; В-3; Г-5; Д-1.**
- В. А-4; Б-1; В-3; Г-5; Д-2.**
- Г. А-1; Б-4; В-2; Г-5; Д-3.**
- Д. А-5; Б-4; В-2; Г-1; Д-3.**

Наименьшей инфекционной опасностью обладает постановка центрального венозного катетера в:

- А. Яремную вену
- Б. Подключичную вену
- В. Бедренную вену
- Г. Локтевую вену
- Д. Нет рекомендаций

Укажите сроки обследования на HBsAg методом ИФА отдельных категорий граждан:

А) Пациенты, поступающие в стационар для плановых операция

Б) доноры

В) Контактные

Г) опекаемые домов-интернатов

Д) Врачи-стоматологи

1. при каждой сдаче донорского материала

2. при выявлении и далее ежегодно

3. при поступлении и далее ежегодно

4. перед поступлением в стационар

А. А-4; Б-1; В-2; Г-3; Д-3

Б. А-3; Б-1; В-2; Г-2; Д-3

В. А-2; Б-1; В-2; Г-3; Д-4

Все из перечисленных утверждений верны, кроме

А. Профилактические прививки проводятся в соответствии с календарем прививок;

Б. В день прививки ребенок должен быть осмотрен врачом;

В. Перед прививкой необходимо провести бракераж препарата;

Г. Открытая ампула с вакциной может храниться в холодильнике в течение 6 часов;

Д. Прививку следует производить в положении вакцинируемого сидя или лежа.

Выберите наиболее подходящий способ дезинфекции: Способы дезинфекции

А. Орошение

Б. Двукратное протирание с интервалом 15 минут

В. Погружение Обрабатываемые объекты

1. Термометр

2. Фонендоскоп

3. Контейнер объемом 20л для дезинфекции инструментов

4. Банка электроотсоса

А. А-1; Б-2,4; В-3.

Б. А-3; Б-1,2; В-4.

В. А-4; Б-1,2; В-3.

Выберите класс раны по степени микробной контаминации: Класс раны

А. Чистая

Б. Контаминированная «загрязненная»

В. Инфицированная «грязная» Определение

1. Открытая свежая рана

2. Послеоперационная рана с перфорацией кишечника

3. Неинфицированная рана при отсутствии воспаления

А. А-1; Б-3; В-2.

Б. А-3; Б-1; В-2.

Какие клетки иммунной системы разрушаются ВИЧ и приводят к иммунодефициту

А. макрофаги

Б. клетки, несущие CD4+ рецепторы

В. клетки, несущие CD8+ рецепторы

Г. клетки, несущие CD16+ рецепторы

Д. клетки, несущие CD20+ рецепторы

Установите соответствие между дозой и сроком введения вакцины гепатита В и задачей, которую она решает: Доза и срок иммунизации

А. 1 доза (первые 24 часа с момента рождения)

Б. 2 доза (1 месяц)

В. 3 доза (6 месяцев) Для чего нужна данная доза вакцины в эти сроки

1. Предупреждает инфицирование HbsAg и развитие цирроза печени

2. Обеспечивает выработку напряженного и продолжительного иммунитета

3. Снижает риски развития цирроза в 4 раза

А. А-1; Б-3; В-2

Б. А-3; Б-1; В-2

Укажите допустимую микробную обсемененность воздуха в операционных во время работы:

А. не > 1 КОЕ/м³;

Б. не > 50 КОЕ/м³;

В. не > 500 КОЕ/м³;

Г. не > 1000 КОЕ/м³;

Д. не нормируется.

В каком из перечисленных случаев применяется активно-пассивная иммунизация:

А. Экстренная профилактика столбняка;

Б. Экстренная профилактика бешенства;

В. Экстренная профилактика брюшного тифа;

Г. Экстренная профилактика клещевого энцефалита;

Д. Плановая иммунопрофилактика клещевого энцефалита.

Какую температуру должен иметь растворитель при восстановлении лиофильно высушенных вакцин

- А. Допускается любая температура;
- Б. От 0 до +2°C;
- В. От +2 до +8°C;
- Г. От +10 до +16°C;
- Д. от -2 до 0°C

Медицинские отходы класса Б из подразделений

- А. в закрытых одноразовых емкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них перемещают на участок по обращению с отходами или помещение для временного хранения медицинских отходов
- Б. в закрытых одноразовых емкостях (пакетах) перемещают на участок по обращению с отходами или помещение для временного хранения медицинских отходов и затем помещают в контейнеры
- В. в закрытых одноразовых емкостях (пакетах) перемещают непосредственно в транспорт специализированных организаций к месту обеззараживания/обезвреживания для последующего вывоза
- Г. из одноразовых емкостей (пакетов) перемещают в многоразовые контейнеры и затем в них перемещают на участок по обращению с отходами или помещение для временного хранения медицинских отходов
- Д. из одноразовых емкостей (пакетов) перемещают в емкости с раствором дезинфицирующих средств и затем в них перемещают на участок по обращению с отходами или помещение для временного хранения медицинских отходов

Пакет, содержащий отходы классов Б и В, может быть заполнен

- А. не более чем на $\frac{3}{4}$
- Б. не менее чем на $\frac{3}{4}$
- В. не более чем на $\frac{1}{2}$
- Г. не более чем на $\frac{2}{3}$
- Д. не менее чем на $\frac{2}{3}$

Что из перечисленного относится к поствакцинальным реакциям:

- А. Вакциноассоциированный полиомиелит
- Б. Регионарный лимфаденит
- В. Энцефалит
- Г. Синдром Стивенса-Джонса
- Д. Отек Квинке

Медицинские работники, имеющие профессиональный контакт с больными туберкулезной инфекцией, подлежат обследованию на туберкулез не реже

- А. 1 раз в 6 месяцев
- Б. 3 раза в год
- В. 1 раз в год
- Г. 1 раз в 2 года
- Д. 1 раз в 3 месяца

Условно чистое помещение, в котором количество микроорганизмов не нормируется, относится к классу:

- А. А
- Б. Б
- В. В
- Г. Г
- Д. Д

К постоянным противопоказаниям к введению определенной вакцины относится:

- А. Иммунодефицит;
- Б. Сильная реакция или осложнение на предыдущее введение;
- В. ОРВИ;
- Г. Хронические заболевания;
- Д. Беременность.

Соответствие между нозологической формой и необходимостью госпитализации больного :

А) дизентерия Зонне

Б) дизентерия Григорьева-Шига

- 1. не госпитализируют**
- 2. по клиническим и эпидемиологическим показаниям**
- 3. по результатам бак.исследования**
- 4. обязательная госпитализация**

- А. А-4; Б-2
- Б. А-3; Б-2
- В. А-2; Б-1

Установите соответствие способов заключительной дезинфекции и объектов дезинфекции в эпидемических очагах туберкулеза:

А) Помещение

Б) Мебель

В) Нательное и постельное белье

Г) столовая посуда

Д) плевательницы

Е) меховая одежда

Ж) подушки, одеяла, матрасы

1. Протирание

2. Замачивание в дезрастворе

3. Орошение

4. Кипячение

5. дезкамера (паровоздушный метод)

6. дезкамера (пароформалиновый метод)

А. А-1,3; Б-1; В-4; Г-2,4; Д-2,4; Е-6; Ж-2,5

Б. А-1,3; Б-1; В-2,4; Г-2,4; Д-2,4; Е-6; Ж-5

Установите соответствие между видом гриппозной вакцины и ее компонентами: Виды вакцин

А. Цельновирионная вакцина

Б. Сплит-вакцина

В. Субъединичная вакцина

1. Содержит разрушенные инаktivированные вирионы вируса гриппа

2. содержит суспензию инаktivированных высокоочищенных цельных вирионов вируса гриппа

3. содержит два вирусных белка (гемагглютинин и нейроминидаза)

А. А-3; Б-1; В-2

Б. А-3; Б-2; В-1

В. А-2; Б-3; В-1

Укажите допустимое содержание *Staphylococcus aureus* в воздухе операционных:

А. содержание не допускается;

Б. не > 1 КОЕ/м³;

В. не > 4 КОЕ/м³;

Г. не > 10 КОЕ/м³;

Д. не нормируется.

Укажите критерии, соответствующие характеристике хлорсодержащих дезинфицирующих средств:

А. противовирусная активность;

Б. низкая токсичность;

В. наличие моющего действия;

Г. отсутствие фиксирующих свойств;

Д. отсутствие коррозирующего эффекта.

Управление заболеваемостью населения бешенством включает:

- А) Информационное обеспечение эпидемиологического надзора
- Б) Аналитическое обеспечение эпидемиологического надзора
- В) Профилактические и противоэпидемические мероприятия
- 1) Вакцинация населения против гепатита В
- 2) Слежение за численностью плотоядных животных (диких, домашних)
- 3) Слежение за охватом прививками против бешенства плотоядных домашних животных
- 4) Проведение в эпидемических очагах гепатита В заключительной дезинфекции
- 5) Учет динамики обращаемости укушенных и ослюенных животными людей
- 6) Выявление территорий риска распространения бешенства

А. А-2,3,4; Б-5,6; В-1

Б. А-2,3,4; Б-5; В-1,6

В. А-2,3,4; Б-5; В-1

Сроки жизни гельминтов в окончательном хозяине:

- А) острица
- Б) карликовый цепень
- В) описторх
- Г) аскарида
- Д) широкий лентец
- 1. 10-12 месяцев
- 2. 1 месяц
- 3. до 4-8 лет
- 4. до 10 лет
- 5. более 10 лет

А. А-1; Б-3; В-5; Г-2; Д-4

Б. А-2; Б-3; В-5; Г-1; Д-4

В. А-2; Б-5; В-3; Г-1; Д-4

Г. А-1; Б-3; В-4; Г-2; Д-5

Д. А-2; Б-1; В-5; Г-3; Д-4

Установите соответствие объема постэкспозиционной профилактики бешенства характеру повреждений:

- А) Царапины кожи рук, нанесенные енотовидной собакой
- Б) Отсутствие прямого контакта с больной бешенством лисицей
- В) Поверхностный укус нижних конечностей, нанесенных домашней кошкой
- Г) Поверхностный укус области лица, нанесенный домашней собакой
- Д) Ослюение неповрежденных кожных покровов, нанесенных домашней собакой
- 1. лечение не назначается
- 2. Лечение КОКАВ в 0, 3,7,14, 30, 90 дни
- 3. комбинированное лечение антирабическим иммуноглобулином и вакциной КОКАВ

А. А-2; Б-1; В-2; Г-3; Д-2

Б. А-3; Б-1; В-2; Г-3; Д-2

Возбудитель скарлатины относится к стрептококкам

- А. альфа-гемолитическим
- Б. бета-гемолитическим
- В. гамма-гемолитическим
- Г. альфа- и бета-гемолитическим
- Д. бета- и гамма –гемолитическим

Смена инфузионной системы должна осуществляться:

- А. Нет рекомендаций
- Б. Каждые 12 часов
- В. Каждые 24 часа
- Г. Каждые 36 часов
- Д. Каждые 72 часа

Установите соответствие: Заболевание

А) ВГА

Б) ВГВ Характерные признаки

1. преимущественное поражение младших возрастных групп
2. преимущественное поражение более старших возрастных групп (подростки, взрослые)
3. территориальное распределение глобальное, неравномерное
4. территориальное распределение региональное
5. чаще болеют дети, посещающие детские дошкольные учреждения, и школьники младших классов

- А. А-1,3,5; Б-2,4
- Б. А-2,4; Б-1,3,5
- В. А-1,4,5; Б-2,3

Выберите спектр цидного эффекта, соответствующий дезинфектанту высокого уровня активности:

- А. вирусы, грибы, вегетативные формы бактерий;
- Б. вирусы, грибы, вегетативные и споровые формы микроорганизмов;
- В. грибы, вегетативные и споровые формы микроорганизмов;
- Г. вирусы, грибы, микобактерии, вегетативные и споровые формы микроорганизмов;
- Д. вегетативные формы микроорганизмов, некоторые виды грибов, частично безоболочечные вирусы, оболочечные вирусы.

Установите соответствие: Направленность противоэпидемических мероприятий при вирусных гепатитах В и С

А) Источник инфекции

Б) Пути передачи

В) Восприимчивый организм Мероприятия

1. медицинское наблюдение за контактными, лабораторное обследование, специфическая профилактика

2. изоляция по клиническим показаниям, диспансеризация переболевших ВГ и носителей

3. дезинфекция и стерилизация медицинских инструментов, использование индивидуальных средств защиты

А. А-2; Б-3; В-1

Б. А-1; Б-3; В-2

В. А-2; Б-1; В-3

Управление заболеваемостью населения гриппом включает:

А) Информационное обеспечение эпидемиологического надзора

Б) Аналитическое обеспечение эпидемиологического надзора

В) Профилактические и противоэпидемические мероприятия

1) Материальное обеспечение специфической и неспецифической профилактики гриппа

2) Проведение обучающих семинаров для медицинских работников

3) Слежение за уровнем заболеваемости гриппом

4) Этиологическая расшифровка случаев заболевания гриппом и ОРВИ

5) Проведение оперативного эпидемиологического анализа заболеваемости гриппом

6) Выявление групп, территорий и времени риска заболевания гриппом

А. А-3,4; Б-5,6; В-1,2

Б. А-1,3,4; Б-5,6; В-2

Соответствие нозологической формы вирусных гепатитов путям передачи :

А) ВГА

Б) ВГС

1. водный

2. парентеральный

3. трансмиссивный

А. А-3, Б-2

Б. А-2, Б-3

В. А-1, Б-2

Установите соответствие между видом иммунитета и механизмом его формирования Вид иммунитета

А. Активный

Б. Пассивный Механизм формирования

1. Латентная иммунизация

2. Инфекция

3. Передача материнских антител через плаценту

4. Передача материнских антител через грудное молоко

5. Введение вакцин

6. Введение анатоксинов

7. Введение иммуноглобулинов

8. Введение сывороток

А. А-1,2,5,6; Б-3,4,7,8

Б. А-1,2,5; Б-3,4,6,7,8

Установите соответствие между максимальным сроком хранения МИБП и организацией:

Срок хранения

А. 1 мес.

Б. 3 мес.

В. 6 мес. Организация

1. ЛПО

2. Склады учреждений Роспотребнадзора (Минздрава)

3. Городские аптечные склады

А. А-2; Б-1; В-3

Б. А-1; Б-3; В-2

Дифференцируйте случай инфекции как: Тип инфицирования

А. Внутрибольничный

Б. Внебольничный Нозологическая форма

1. Пневмония на фоне ИВЛ, возникшая спустя 48 часов

2. Пневмония без ИВЛ, возникшая спустя 72 часа

3. Пневмония, диагностированная в 1-е сутки после госпитализации

4. Омфалит, у новорожденного возникший через 3 дня после выписки

А. А-1; Б-1,2,3.

Б. А-1,2,4; Б-3.

Установите соотношения между выполнением манипуляций и предварительной обработкой рук медицинского персонала: Медицинские манипуляции

А. Постановка в/м инъекции

Б. Постановка мочевого катетера

В. Измерение АД

Г. Выполнение операции хирургом **Обработка рук**

1. Обработать руки гигиеническим способом, надеть разовые перчатки

2. Обработать руки хирургическим способом, надеть стерильные перчатки

3. Обработать руки гигиеническим способом, надеть стерильные перчатки

4. Обработать руки гигиеническим способом

А. А-3; Б-2; В-4; Г-3.

Б. А-1; Б-3; В-4; Г-3.

В. А-4; Б-3; В-4; Г-2.

Наиболее массивное и постоянное выделение вируса гепатита А наблюдается в течение

А. всего инкубационного периода

Б. желтушного периода

В. последних 7-10 дней инкубации и всего преджелтушного периода

Г. последних 15-20 дней инкубации

Д. реконвалесценции

Продолжительность поствакцинального противогриппозного иммунитета при введении инактивированной вакцины:

А. 5-6 мес.;

Б. 6-12 мес.;

В. 1-2 года;

Г. 5 лет;

Д. Пожизненно.

Как часто осуществляется влажная уборка прививочного кабинета:

А. 1 раз в сутки;

Б. 2 раза в день;

В. 1 раз в 2 дня;

Г. 1 раз в неделю;

Д. 3 раза в день.

Лабораторному обследованию на холеру подлежат

А. больные кишечными инфекциями, прибывшие из неблагополучных по холере регионов в предшествующие заболеванию 5 дней

Б. больные с выраженным диарейным синдромом

В. больные – работники водопроводных сооружений

Г. больные кишечными инфекциями дети первых лет жизни

Установите соответствие между фамилией ученого и его вкладом в развитие иммунопрофилактики : Фамилия ученого

А.

Э. Дженнер

Б.

Л. Пастер

В.

Г. Рамон

Г.

А.А.Сморodinцев Вклад в развитие иммунопрофилактики

1. Создал вакцину против бешенства

2. Открыл анатоксины

3. Создал гриппозную вакцину

4. Создал вакцину против натуральной оспы

А. А-2; Б-3; В-1; Г-4

Б. А-4; Б-1; В-2; Г-3

Укажите место инъекции у детей от 0 до 3 лет при внутримышечном способе введения вакцины:

А. Дельтовидная мышца (участок ниже акромиального отростка и выше подмышечной впадины);

Б. Латеральная часть четырехглавой мышцы (передне-наружная область бедра);

В. Верхний латеральный квадрант ягодичной мышцы;

Г. Трапецевидная мышца;

Д. Нижний латеральный квадрант ягодичной мышцы.

Установите соответствие между названием вакцины и входящими в состав компонентами: Название вакцины

А. Пентаксим

Б. Инфанрикс

В. Тетраксим

Г.Бубо-Кок Компонент

1. АКДС+Гепатит В

2. АаКДС+НІВ+ІПВ

3. АаКДС

4.АаКДС+ІПВ

А. А-3; Б-4; В-3; Г-1

Б. А-2; Б-3; В-4; Г-1

Для сбора острых отходов класса Б должны использоваться

- А. многоразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры)
- Б. одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры)
- В. одноразовые пакеты, помещенные в маркированные емкости (контейнеры)
- Г. одноразовые или многоразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры)
- Д. одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры), маркированные знаком «Биологическая опасность»

К следующим классам гельминтов относятся:

- А) Nematoda**
- Б) Cestoidea**
- В) Trematoda**
- 1. Hymenolepis nana**
- 2. Dicrocoelium lanceatum**
- 3. Echinococcus multilocularis**
- 4. Wuchereria bancrofti**
- 5. Paragonimus westermani**
- 6. Opisthorchis felinus**
- А. А-4; Б- 2,6; В- 1,3,5
- Б. А-4; Б- 1,3; В- 2,5,6
- В. А-5,6; Б- 1,3; В- 2,4
- Г. А-1,3; Б- 4; В- 2,5,6

Основной механизм передачи возбудителя туберкулёзной инфекции

- А. Пищевой
- Б. Контактный
- В. Аэрозольный
- Г. Вертикальный
- Д. Артифициальный

Укажите, кто из перечисленных лиц может быть допущен к донорству

- А. контактный с больным острым вирусным гепатитом В
- Б. пациент, 3 месяца назад перенесший оперативное вмешательство
- В. пациент, переболевший гриппом 1 месяц назад
- Г. пациент, лечившийся иглоукалыванием 2 месяца назад
- Д. пациент, перенесший гепатит В 10 лет назад

Установите соответствие между позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент из левой колонки. Каждый цифровой элемент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Укажите кратность проведения разных видов уборок в МО: Вид уборки

А. Мытье оконных стекол

Б. Генеральная уборка помещений палатных отделений В Влажная уборка палатных помещений

Г. Генеральная уборка операционного блока и перевязочных

Д. Генеральная уборка процедурных, манипуляционных, стерилизационных Кратность проведения

1. Не менее 2 раз в сутки

2. Не реже 1 раза в неделю

3. Не реже 2 раз в год

4. Не реже 1 раза в месяц

5. Не реже 1 раза в квартал

А. А-5; Б-4; В-1; Г-2; Д-2

Б. А-3; Б-5; В-1; Г-2; Д-2

В. А-2; Б-4; В-1; Г-2; Д-2

Установите соответствие: Путь заражения инвазией

А) Пероральный

Б) Перкутанный Сосальщик

1. кровяной

2. печеночный

3. кошачий

4. легочный

А. А- 2,3; Б- 1,4

Б. А- 2,3,4; Б- 1

В. А- 1,3; Б- 2,4

Установите соотношение между риском развития ИСМП и видом операционной раны:

Вид операционной раны:

А. Риск развития ВБИ для «чистых» ран составляет.

Б. Риск развития ВБИ для «условно-чистых» ран составляет.

В. Риск развития ВБИ для «загрязненных» ран составляет.

Г. Риск развития ВБИ для «инфицированных» ран составляет. РИСК ИСМП, %

1. 3-11%.

2. 0-17%.

3. 1-5%.

4. Более 25-27%.

А. А-2; Б-3; В-2; Г-4.

Б. А-3; Б-1; В-2; Г-4.

Наиболее реактогенными противогриппозными вакцинами являются:

- А. Живые вакцины;
- Б. Сплит-вакцины;
- В. Субъединичные вакцины;
- Г. Виросомальные вакцины;
- Д. Инактивированные.

Соответствие нозологической формы вирусного гепатита длительности инкубационного периода:

- А) ВГА
- Б) ВГВ
- В) ВГС
- 1. 18 дней
- 2. 60 – 120 дней
- 3. 200 дней
- 4. 35 дней
- 5. 42-56 дней
- А. А-1; Б-2; В-4
- Б. А-5; Б-4; В-2
- В. А-4; Б-2; В-5

Основными факторами передачи при брюшном тифе является

- А. салат из овощей
- Б. яйца
- В. мясо и мясные изделия
- Г. вода и молоко
- Д. рыба и морепродукты

Все контактные лица, выявленные в границах очага острого гепатита А

- А. Подвергаются первичному медицинскому осмотру с последующим медицинским наблюдением в течение 35 дней со дня разобщения с источником инфекции
- Б. Подвергаются первичному медицинскому осмотру с последующим медицинским наблюдением в течение 45 дней со дня разобщения с источником инфекции
- В. Подвергаются первичному медицинскому осмотру с последующим медицинским наблюдением в течение 50 дней со дня разобщения с источником инфекции
- Г. Подвергаются первичному медицинскому осмотру с последующим медицинским наблюдением в течение 30 дней со дня разобщения с источником инфекции
- Д. Подвергаются первичному медицинскому осмотру с последующим медицинским наблюдением в течение 60 дней со дня разобщения с источником инфекции

Установите соответствие между схемой иммунизации и инфекцией: Схема иммунизации

А. 2,

4.5, 15 месяцев

Б.2,

4.5, 6, 18, 20 месяцев, 14 лет

В. 3,

4.5, 6, 18 месяцев

Г. 3,

4.5, 6, 18 месяцев, 6-7 лет, 14 лет, каждые 10 лет Инфекционная патология

1. Полиомиелит

2. Пневмококковая инфекция

3. Гемофильная инфекция

4. Дифтерия.

А. А-4; Б-1; В-3; Г-2

Б. А-3; Б-1; В-2; Г-4

В. А-2; Б-1; В-3; Г-4

Установите соответствие между вакциной и ее характеристикой: Вакцины

А. Коревая

Б. Пневмококковая

В. Коклюшная

Г. Вакцина гепатита

Д. АКДС Характеристика

1. Вакцина, содержащая целые убитые микроорганизмы

2. Вакцина из живых аттенуированных вирусов

3. Химические вакцины из фракций убитых микроорганизмов

4. Генно- инженерные рекомбинантные

5. Ассоциированная

А. А-2, Б-1, В-3, Г-4, Д-5

Б. А-4, Б-3, В-1, Г-2, Д-5

В. А-3, Б-1, В-2, Г-4, Д-5

Специфическим противопоказанием для плановых прививок вакциной против вирусного гепатита В является:

А. хронические болезни органов дыхания;

Б. аллергическая реакция на пекарские дрожжи;

В. масса тела ребёнка при рождении менее 2000 гр.;

Г. тяжелые формы аллергических реакций на аминокислоты;

Д. прогрессирующие заболевания ЦНС, афебрильные судороги в анамнезе.

Установите соответствие: Вирусы гепатитов

А) А

Б) В

В) С

Г) D

Д) Е Семейства

1. гепадновирусы

2. флавивирусы

3. вириод

4. пикорнавирусы

5. калицивирусы

А. А-4; Б-1; В-5; Г-3; Д-2

Б. А-1; Б-4; В-2; Г-3; Д-5

В. А-4; Б-1; В-5; Г-3; Д-2

Г. А-4; Б-1; В-2; Г-3; Д-5

Д. А-4; Б-2; В-1; Г-3; Д-5

Факторами передачи вируса бешенства чаще всего являются

А. Слюна

Б. Кровь

В. Молоко

Г. Шерсть

Д. Почва

Вакцинация против какой инфекции не предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок:

А. Клещевой энцефалит;

Б. Брюшной тиф;

В. Ветряная оспа;

Г. Папилломавирусная инфекция;

Д. Ротавирусная инфекция.

Соответствие результатов бактериологического исследования фекалий на энтеробактерии срокам их получения :

А) положительный

Б) отрицательный

1. на 3 й день

2. на 2 й день

3. на 4 й день

4. на 5 й день

А. А-4; Б-2

Б. А-3; Б-1

При выявлении патологии органов дыхания у подростка врач должен направить его в противотуберкулезный диспансер для завершения обследования в течение

- А. 3 дней
- Б. 6 дней
- В. 10 дней
- Г. 1 месяца
- Д. 2 месяцев

Ведущим возбудителем инфекций кровотока, связанных с катетеризацией, является:

- А. *Staphylococcus aureus*
- Б. *Pseudomonas aeruginosa*
- В. Коагулазоотрицательные стафилококки
- Г. *Klebsiella pneumoniae*
- Д. *Candida albicans*

Установите соответствие класса опасности медицинских отходов характеристикам их морфологического состава

- А. Класс А
 - Б. Класс Б
 - В. Класс В
 - Г. Класс Г
- Характеристика морфологического состава**

1. Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и так далее).
2. Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными.
3. Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию.
4. Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории.

- А. А-1; Б-3; В-4; Г-2
- Б. А-3; Б-1; В-2; Г-4
- В. А-2; Б-1; В-4; Г-3
- Г. А-4; Б-3; В-1; Г-2

Установите соответствие основных источников возбудителей инфекции нозологической форме инфекций:

А) Дифтерия

Б) Чума

В) Туберкулез

Г) Бруцеллез

Д) Сальмонеллез

1. Грызуны

2. Больной человек или носитель

3. Больной человек

4. Сельскохозяйственные животные

5. Птицы

А. А-2; Б-1; В-3,4; Г-4; Д-5

Б. А-2,3; Б-1; В-3,4; Г-4; Д-5

Из представленного списка выберите нетрансмиссивную природно-очаговую инфекцию

А. Клещевой энцефалит

Б. Клещевой сыпной тиф

В. Крымская геморрагическая лихорадка

Г. Иксодовый клещевой боррелиоз

Д. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

Источниками ВИЧ-инфекции являются инфицированные

А. в периоде первичной вирусемии

Б. стадии персистирующей лимфаденопатии

В. при наличии клинических симптомов

Г. в любой стадии, независимо от клинических симптомов

Д. в терминальной стадии

На рабочих местах сбор в общие емкости использованных шприцев в неразобранном виде с предварительным отделением игл, перчаток, перевязочного материала и т.д., относящихся к отходам класса Б

А. не допускается

Б. допускается во всех случаях

В. допускается в случае применения в организации аппаратных методов обеззараживания

Г. не допускается в инфекционных и фтизиатрических отделениях/стационарах

Д. допускается только в операционных блоках и перевязочных

При отсутствии клинических признаков заболевания, контактных лиц, ранее не привитых против гепатита А и не болевших этой инфекцией

- А. Вакцинируют по эпидемическим показаниям не позднее 5 дня с момента выявления больного острым гепатитом А
- Б. Вакцинируют по эпидемическим показаниям не позднее 7 дня с момента выявления больного острым гепатитом А
- В. Вакцинируют по эпидемическим показаниям не позднее 15 дня с момента выявления больного острым гепатитом А
- Г. Вакцинируют по эпидемическим показаниям не позднее 10 дня с момента выявления больного острым гепатитом А
- Д. Вакцинируют по эпидемическим показаниям не позднее 17 дня с момента выявления больного острым гепатитом А

Установите соответствие между категорией медицинского работника и функциональными обязанностями при проведении прививочной работы: Категория медицинского персонала

- А. Врач
 - Б. Медицинская сестра
- Функциональные обязанности**
- 1. Приглашение на прививку
 - 2. Перепись населения
 - 3. Выделение групп риска по развитию ПВР, ПВО
 - 4. Введение вакцины
 - 5. Наблюдение в поствакцинальном периоде
 - 6. Лечение поствакцинальных реакций и осложнений
- А. А-3,6; Б-1,2,4,5
 - Б. А-3,4,6; Б-1,2,5

К помещениям класса чистоты А относится:

- А. Чистая и стерильная зоны ЦСО
- Б. Палаты интенсивной терапии
- В. Процедурные и асептические перевязочные
- Г. Малые операционные
- Д. Послеродовые палаты

Установите соответствие групп риска нозологическим формам инфекций:

А) Бруцеллез

Б) Бешенство

В) ВИЧ-инфекция

Г) Брюшной тиф

Д) Туляремия

1. собаководы

2. скотники

3. геологи

4. потребители инъекционных наркотиков

5. работники очистных сооружений

А. А-1; Б-2; В-4; Г-5; Д-3

Б. А-2; Б-1; В-4; Г-5; Д-3

Установите соответствие проявлений эпидемического процесса первичной стрептококковой (группа

А) инфекции ее различным формам:

А) Респираторные

Б) Кожные

1. распространение в регионах с умеренным или холодным климатом

2. более частое распространение в регионах с жарким климатом

3. преимущественное поражение детей дошкольного возраста

4. преимущественное поражение детей школьного возраста

5. осенне-зимне-весенняя сезонность

6. летне-осенняя сезонность

7. постстрептококковые осложнения – острый нефрит и ревматизм

8. постстрептококковые осложнения – острый нефрит

А. А-1,3,5,7; Б-2,4,6

Б. А-2,3,5,7; Б-1,4,6

В. А-1,3,6,7; Б-2,4,5

Г. А-1,3,5,8; Б-2,4,6

Д. А-1,4,5,8; Б-2,3,6

В районах с высокой заболеваемостью брюшным тифом для внутригодовой динамики наиболее характерна

А. летне-осенняя сезонность

Б. осенняя сезонность

В. равномерность распределения заболеваемости по месяцам

Г. зимняя сезонность

Д. сезонность отсутствует

Главное отличие дезинфекции от стерилизации

- А. область применения
- Б. методы проведения
- В. степень деcontаминации
- Г. объем проведения
- Д. способы проведения

Резервуаром бруцелл в природе являются

- А. больные животные
- Б. вода открытых водоемов
- В. больные люди
- Г. кровососущие членистоногие
- Д. контаминированная почва

При брюшном тифе наибольшее значение имеет выделение возбудителя в окружающую среду с (со)

- А. слюной и мочой
- Б. слюной и фекалиями
- В. фекалиями и мокротой
- Г. фекалиями и мочой
- Д. рвотными массами и слюной

Брюшной тиф характеризуется формированием хронических бактерионосителей в количестве до

- А. 1%
- Б. 5%
- В. 20%
- Г. 25%
- Д. 30%

Препараты для активной иммунизации должны отвечать следующим требованиям, кроме

- А. Иммуногенность;
- Б. Стерильность
- В. Низкая реактогенность;
- Г. Пирогенность;
- Д. Безопасность.

Источниками возбудителя туляремии не могут быть

- А. Водяные крысы
- Б. Ондатры
- В. Больные люди
- Г. Домовые мыши
- Д. Лемминги

Установите соответствие нозологической формы ведущему источнику инфекции:

А) брюшной тиф

Б) паратиф В

1. человек

2. клещи

3. насекомые

4. животные

А. А-2; Б-4

Б. А-4; Б-1

В. А-1; Б-4

Г. А-2; Б-3

Управление заболеваемостью населения шигеллезом Зонне включает:

А) Информационное обеспечение эпидемиологического надзора

Б) Аналитическое обеспечение эпидемиологического надзора

В) Профилактические и противоэпидемические мероприятия

1) Вакцинация населения против шигеллеза Зонне

2) Применение бактериофага в эпидемических очагах шигеллезом Зонне

3) Установление путей и факторов передачи шигеллы Зонне

4) Проведение в эпидемических очагах шигеллеза Зонне заключительной дезинфекции

5) Выявление групп, территорий и времени риска заболевания шигеллезом Зонне

6) Оценка эффективности проводимых профилактических мероприятий

А. А-1,3; Б-5,6; В-2 4

Б. А-3; Б-5,6; В-1,2 4

В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать амбулаторно-поликлинические ЛПО мощностью посещений в смену не более:

А. 50

Б. 100

В. 150

Г. 200

Д. 250

Установите соответствие между уровнями «холодовой цепи» и движением (маршрутом)

ИЛП: Уровень

А. Первый уровень

Б. Второй уровень

В. Третий уровень

Г. Четвертый уровень Движение МИБП

1. От организаций-изготовителей МИБП до аптечных складов и складов учреждений Роспотребнадзора в субъектах РФ

2. От аптечных складов и складов учреждений Роспотребнадзора до городских и районных аптечных складов, складов учреждений Роспотребнадзора и складов организаций здравоохранения

3. От городских и районных аптечных складов и складов учреждений Роспотребнадзора до ЛПУ (участковых больниц, амбулаторий, поликлиник, родильных домов, фельдшерско-акушерских пунктов и др.)

4. Организуется ЛПО

А. А-4; Б-3; В-2; Г-1

Б. А-1; Б-2; В-3; Г-4

Укажите наиболее резистентные к дезинфекции микроорганизмы из перечисленных:

А. грибы;

Б. крупные необолочечные вирусы;

В. малые необолочечные вирусы;

Г. трофозоиты паразитов;

Д. оболочечные вирусы.

Временным критерием для определения принадлежности пневмонии к внутрибольничному случаю является:

А. возникновение после 48 часов пребывания в стационаре;

Б. возникновение после 3 суток пребывания в стационаре;

В. возникновение не позднее чем через 30 суток после выписки из стационара;

Г. возникновение не позднее чем через 90 суток после выписки из стационара;

Д. возникновение после 12 часов пребывания в стационаре.

При вскрытии коробки с коревой вакциной в ней не оказалось инструкции по применению препарата, следует:

А. Воспользоваться инструкцией из другой коробки той же серии;

Б. Применять без инструкции, зная технику проведения прививок;

В. Взять инструкцию у другого врача;

Г. Запретить использование вакцины;

Д. Наличие инструкции не является обязательным условием использования препарата.

Для определения времени возможного заражения необходимо прежде всего знать дату

- А. Начала заболевания
- Б. Госпитализации
- В. Дезинфекции
- Г. Обращения за медицинской помощью

Окончательный диагноз «ВИЧ-инфекция» ставят на основании

- А. Выявления снижения абсолютного числа CD4-лимфоцитов
- Б. Выявления антител к ВИЧ в ИФА
- В. Подтверждения наличия антител к ВИЧ в иммуноблоте
- Г. Клинических признаков

В экспонированные группы включены лица

- А. Прошедшие медицинские осмотры
- Б. Работающие в медицинских учреждениях
- В. Подверженные действию изучаемого фактора
- Г. Из контрольной группы

В структуре заболеваемости гельминтозами в России преобладает

- А. Энтеробиоз
- Б. Дифиллоботриоз
- В. Аскаридоз
- Г. Описторхоз

Основным путем заражения менингококковой инфекцией является

- А. Воздушно-капельный
- Б. Пищевой
- В. Воздушно-пылевой
- Г. Контактнo-бытовой

Возможность вакцинации лиц, общавшихся с больным, определяется

- А. Устойчивостью возбудителя во внешней среде
- Б. Высокой контагиозностью инфекции
- В. Способностью вакцины вызывать формирование иммунитета до окончания инкубационного периода
- Г. Наличием тяжелых форм заболевания с сопутствующей патологией и высокой контагиозностью

Под нозоареалом понимают

- А. Резкое ухудшение санитарно-гигиенической обстановки
- Б. Территорию распространения заболевания
- В. Территорию, подвергшуюся разрушительному воздействию природных сил
- Г. Циркуляцию микроорганизмов во внешней среде

К наиболее вероятным источникам коклюшной инфекции для новорожденных детей и детей первого года жизни относят

- А. Детей из организованных учреждений с круглосуточным пребыванием
- Б. Медицинский персонал родильных домов
- В. Патронажную медсестру
- Г. Родителей и всех членов семьи

Наиболее подверженной заболеваемости энтеробиозом категорией населения являются

- А. Школьники
- Б. Дети 3-6 лет, посещающие детские дошкольные учреждения
- В. Медицинские работники
- Г. Солдаты срочной службы

Микоплазмы вызывают у человека воспалительные заболевания

- А. Органов и тканей пищеварительного тракта
- Б. Органов и тканей сердечно-сосудистой системы
- В. Респираторного, урогенитального трактов, суставов
- Г. Тканей и органов центральной нервной системы

При заболевании детей первых месяцев жизни проводить исследование парных сывороток крови на содержание противокклюшных антител целесообразно

- А. У заболевшего ребенка с интервалом 2 недели
- Б. Одновременно у ребенка и матери с интервалом не менее 1 месяца
- В. Одновременно у ребенка и матери с интервалом 2 недели
- Г. Однократно у матери

Источниками инвазии при геогельминтозах являются заражённые

- А. Животные
- Б. Птицы
- В. Люди
- Г. Рыбы

Вакцина разработана и применяется против

- А. Ротавирусной инфекции
- Б. Чесотки
- В. Стрептококковой инфекции
- Г. Малярии

После перенесенного заболевания краснухой формируется _____ иммунитет

- А. Стойкий, пожизненный
- Б. Продолжительный (до 8-10 лет)
- В. Кратковременный
- Г. Длительный (до 15-20 лет)

При работе в боксе с культурами лептоспир не используют

- А. Косынки или колпаки
- Б. Тапочки
- В. Халаты
- Г. Противочумные костюмы

Вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая относится к семейству herpesviridae, к подсемейству

- А. Betaherpesvirinae
- Б. Gammaherpesvirinae
- В. Alphaherpesvirinae
- Г. Deltaherpesvirinae

При отсутствии заболеваемости дифтерией на территории в течение 5 последних лет необходимо

- А. Продолжать проведение прививок среди групп риска заболевания
- Б. Прекратить проведение плановых прививок
- В. Прививать только контактировавших с заболевшим, если возникнут эпидемические очаги
- Г. Продолжать проведение плановых прививок согласно Национальному календарю профилактических прививок

Методическую основу эпидемиологического надзора составляют

- А. Теория механизма и теория факторов передачи
- Б. Ретроспективный анализ и оперативный анализ
- В. Структуры системы противэпидемической защиты населения
- Г. Теория саморегуляции паразитарных систем и экологическая теория

_____ Менингококка является его главным токсическим фактором

- А. Липопротеин клеточной стенки
- Б. Полисахаридная капсула
- В. Липоолигосахарид клеточной стенки
- Г. Секретируемый экзотоксин

К мероприятиям, позволяющим воздействовать на механизм передачи в очаге аэрозольных инфекций, относят

- А. Дезинфекцию
- Б. Изоляцию больного
- В. Дезинсекцию
- Г. Вакцинацию

В отличие от ОРВИ вирус гриппа характеризует

- А. Циркуляция в период всего года
- Б. Сезонная активность
- В. Очаговость
- Г. Активность в летнее время

О каждом выявленном случае кори, краснухи, эпидемического паротита направляют экстренное извещение в

- А. Дезинфекционную станцию
- Б. Территориальный орган, уполномоченный осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор по месту регистрации заболевания
- В. Департамент здравоохранения по месту регистрации заболевания
- Г. Министерство здравоохранения Российской Федерации

Преимущественным путем распространения *entamoeba histolytica* в развивающихся странах является

- А. Водный
- Б. Трансмиссивный
- В. Контактно-бытовой
- Г. Пищевой

Действенная мера профилактики лихорадки цуцугамуши заключается в

- А. Защите от нападения клещей
- Б. Защите помещений и продуктов питания от грызунов
- В. Проведении мероприятий по истреблению комаров
- Г. Проведении ликвидации безнадзорных животных

Количество известных видов микоплазм составляет

- А. 16
- Б. Более 200
- В. 150
- Г. 4

К эндемичным для России лихорадочным арбовирусным заболеваниям, сопровождающимся сыпью, артрозами и артралгиями относят

- А. Лихорадку Синдбис
- Б. Лихорадку Кемерово
- В. Лихорадку Дхори
- Г. Москитные лихорадки

Актуальность токсоплазмоза определяет

- А. Высокий процент гибели животных
- Б. Высокий процент гибели людей
- В. Высокий индекс контагиозности
- Г. Глобальная распространённость

Международные медико-санитарные правила распространяются на

- А. Желтую лихорадку, холеру, чуму
- Б. Сибирскую язву
- В. Конго-крымскую геморрагическую лихорадку
- Г. Лихорадку Ку, орнитоз

Относительный риск рассчитывается как

- А. Разность показателей заболеваемости среди лиц, подвергшихся и не подвергшихся действию фактора риска
- Б. Доля заболевших среди населения
- В. Заболеваемость какой-либо группы населения не в абсолютных, а в относительных величинах
- Г. Отношение показателя заболеваемости конкретной болезнью в группе людей, подвергавшихся действию фактора риска, к показателю заболеваемости той же болезнью в равноценной группе людей, не подвергавшихся действию фактора риска

Тяжелый острый респираторный синдром этиологически связан с вирусом семейства

- А. Arenaviridae
- Б. Rhabdoviridae
- В. Orthomyxoviridae
- Г. Coronaviridae

Выявление иммуноглобулинов класса igm наблюдается при _____ течении заболевания, вызванном chlamydia pneumoniae

- А. Инапперцептном
- Б. Персистентном
- В. Хроническом
- Г. Остром

На острую стадию гепатита в указывают антитела класса

- А. IgA
- Б. IgG
- В. IgE
- Г. IgM

При расследовании причин поствакцинального осложнения необходимы данные о

- А. Социальных условиях жизни привитого
- Б. Вредных привычках
- В. Прививочном анамнезе
- Г. Составе семьи

Разделение вируса гриппа типа а на подтипы основывается на структуре

- А. Гемагглютинина (НА) и нейраминидазы (NA)
- Б. Матричного (М) белка и нуклеопротеина (NP)
- В. Неструктурных белков (NS)
- Г. Белков полимеразного комплекса (PB1, PB2, PA)

К карантинным инфекциям с фекально-оральным механизмом передачи относят

- А. Холеру
- Б. Гонорею
- В. Сифилис
- Г. Дифтерию

Главной средой обитания возбудителей инфекционных заболеваний, относящихся к группе зоонозов, считают

- А. Внешнюю среду
- Б. Популяцию животных
- В. Популяцию людей
- Г. Продукты животного происхождения

Сколекс свиного цепня отличается от сколекса бычьего цепня

- А. Наличием ботрий
- Б. Наличием крючьев
- В. Наличием хоботка
- Г. Отсутствием присосок

Конкретной особью животного, воспринявшей от донора возбудителя безотносительно к его дальнейшей судьбе, является

- А. Резервуарный хозяин
- Б. Членистоногое-переносчик
- В. Источник возбудителя
- Г. Реципиент

Установление фактора передачи имеет большое значение в очагах

- А. Энтеробиоза
- Б. Трихоцефалеза
- В. Трихинеллеза
- Г. Онхоцеркоза

Длительность постпрививочного иммунитета при вакцинации лептоспирозной вакциной составляет (в годах)

- А. 3
- Б. 10
- В. 1
- Г. 6

Согласно федеральному закону №157-ФЗ «об иммунопрофилактике инфекционных болезней», гражданин России

- А. Имеет право отказаться от прививок, подписав отказ
- Б. Не имеет право отказаться от прививок, за исключением прививок проводимых по эпидемическим показаниям
- В. Имеет право отказаться от прививок, не подписывая отказа от прививок
- Г. Не имеет права отказаться от прививок

СПИД является

- А. Осложнением ВИЧ-инфекции
- Б. Стадией ВИЧ-инфекции
- В. Синонимом ВИЧ-инфекции
- Г. Самостоятельным заболеванием

В медицинскую аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции входят

- А. Стерильная вода 100 мл, спирт 70%, нашатырный спирт
- Б. Перевязочный материал, пипетки, стрептомицин
- В. Марганцевокислый калий 0,05 г, фурацилин
- Г. Йода спиртовой раствор 5%, спирт 70%, марганцевокислый калий 0,05 г

В организме человека взрослые особи *hymenolepis nana* локализуются в

- А. Тонкой кишке
- Б. Толстой кишке
- В. Желчных протоках
- Г. Желудке

Методы молекулярной эпидемиологии используются для точного определения

- А. Химических особенностей патогена
- Б. Генотипа патогенных микроорганизмов
- В. Эффективности ферментативных процессов
- Г. Фенотипа патогенных микроорганизмов

Вирус герпеса человека 8 типа относится к семейству *herpesviridae*, к подсемейству

- А. *Alphaherpesvirinae*
- Б. *Deltaherpesvirinae*
- В. *Gammaherpesvirinae*
- Г. *Betaherpesvirinae*

При сборе, хранении и транспортировании клинического материала для выявления ротавируса _____ замораживание-оттаивание материала

- А. Не допускается
- Б. Допускается многократное
- В. Допускается однократное
- Г. Допускается двукратное

Возбудитель эпидемического паротита относится к семейству

- А. *Paramyxoviridae*
- Б. *Picornaviridae*
- В. *Arenaviridae*
- Г. *Herpesviridae*

К _____ лабораторным методам диагностики герпесвирусной инфекции относится иммуноблоттинг

- А. Молекулярно-биологическим
- Б. Иммунологическим
- В. Микробиологическим
- Г. Биологическим

Экстренную профилактику иксодовых клещевых боррелиозов проводят

- А. Иммуноглобулином
- Б. Вакциной
- В. Антибиотиком
- Г. Иммуногеном

Сколько известно генотипов парвовируса человека в19?

- А. 2
- Б. 3
- В. 5
- Г. 7

Газообразный способ химического метода дератизации используют для обработки

- А. Жилых зданий
- Б. Пищевых объектов, больниц, детских учреждений
- В. Овощехранилищ
- Г. Железнодорожных вагонов, судов, складских помещений

Синонимом термина «эпидемиологическое исследование» считают

- А. Эпидемиологический анализ и эпидемиологическую диагностику
- Б. Серологическую диагностику
- В. Обследование эпидемических очагов
- Г. Расследование вспышек болезней

Q лихорадка относится к

- А. Глистным инвазиям
- Б. Микозам
- В. Зоонозам вирусной природы
- Г. Зоонозам бактериальной природы

Менингококковая инфекция является

- А. Зоо-антропонозом
- Б. Сапронозом
- В. Зоонозом
- Г. Антропонозом

Эффективность антиретровирусной терапии в отношении вариантов ВИЧ

- А. Максимальна для подтипа С
- Б. Повышается в ходе применения антиретровирусной терапии
- В. Практически не различается между подтипами ВИЧ
- Г. Максимальна для подтипа В

Возможные сроки развития поверхностной инфекции в области хирургического вмешательства, которую следует рассматривать как случай исмп (инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи) составляют в течение _____ дней после операции, включая день операции

- А. 10
- Б. 15
- В. 7
- Г. 30

Зависимость активности эпидемического процесса от времени года возможно установить при анализе

- А. Состояния плановой специфической иммунизации населения против инфекционных заболеваний в рамках национального календаря прививок
- Б. Внутригодовой динамики заболеваемости
- В. Спорадического уровня заболеваемости при еженедельной регистрации данных
- Г. Многолетней динамики заболеваемости в сравнении субъекта и Российской Федерации в целом

Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование относится к полномочиям

- А. Ассоциации профильных специалистов
- Б. Учреждений, подведомственных Роспотребнадзору
- В. Российской Федерации
- Г. Субъектов Российской Федерации

В эпидемическом очаге в отношении источника инфекции выполняются меры по

- А. Уничтожению членистоногих
- Б. Госпитализации больного
- В. Вакцинопрофилактике
- Г. Дезинфекции

Для оценки распространенности болезни в отдельный момент времени оптимальнее использовать

- А. Показатель заболеваемости (инцидентности) «человек-время»
- Б. Показатель моментной превалентности
- В. Показатель очаговости
- Г. Кумулятивный показатель заболеваемости (инцидентности)

Вакцины для иммунизации людей против желтой лихорадки

- А. Разрабатываются
- Б. Применяются в виде живой аттенуированной вакцины
- В. Находятся на стадии клинических испытаний
- Г. Отсутствуют и не применяются

Критерием диагноза «ВИЧ-инфекция» у ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью, является выявление антител в возрасте (в месяцах)

- А. 12
- Б. Старше 18
- В. 6
- Г. До 3

Корь относится к числу инфекций

- А. Острых, но с возможностью персистенции вируса в центральной нервной системе
- Б. Затяжных
- В. Острых, но с возможностью персистенции вируса в паренхиматозных органах
- Г. Хронических

Производство противооспенных вакцин в настоящее время обусловлено

- А. Применением противооспенных вакцин против возбудителя оспы обезьян
- Б. Риском использования вируса натуральной оспы как возможного агента биотеррористических атак и биологического оружия
- В. Использованием противооспенных вакцин как политического инструмента влияния на ВОЗ
- Г. Применением противооспенных вакцин в ветеринарии

Теория природной очаговости болезней создана в

- А. Франции
- Б. СССР
- В. Японии
- Г. Германии

Серологический метод диагностики эхинококкоза является методом

- А. Вспомогательным
- Б. Недопустимым
- В. Неинформативным
- Г. Основным

К родентицидам-антикоагулянтам относят

- А. Крысид
- Б. Хлорпикрин
- В. Фосфид цинка
- Г. Зоокумарин

Длительность выживания микоплазм в аэрозолях зависит от

- А. Видовой принадлежности
- Б. Атмосферного давления
- В. Возраста клеток
- Г. Влажности окружающей среды

Выявленных лиц в очагах с подозрением на генерализованную менингококковую инфекцию

- А. Изолируют на месте до уточнения диагноза
- Б. Госпитализируют по профилю «нервные болезни»
- В. Немедленно госпитализируют по профилю «инфекционные болезни»
- Г. Немедленно начинают лечить на месте

С инфицированием *mycoplasma hominis* связывают такие виды патологии беременности, как

- А. Заболевания желудочно-кишечного тракта – гастрит, колит и язвенную болезнь
- Б. Нарушения со стороны центральной нервной системы
- В. Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической системы
- Г. Прерывание беременности, сепсис, пороки развития плода

Для расшифровки групповых вспышек дифтерии используют

- А. Микроскопический метод
- Б. Заражение животных
- В. Фаготипирование
- Г. Аллергологические тесты

С целью подтверждения диагноза «токсоплазмоз» повторные серологические исследования назначаются через

- А. 3 Месяца
- Б. 2 Недели
- В. 1-3 Суток
- Г. 1-2 Месяца

Инкубационный период при псевдотуберкулезе длится

- А. 1-9 Дней
- Б. Несколько часов
- В. 5-8 Недель
- Г. Не более суток

В крупных очагах оки (более 100 случаев заболевания) для обнаружения этиологического агента исследуется выборка больных не менее ____ % от числа заболевших

- А. 10
- Б. 5
- В. 100
- Г. 20

Контактными считаются лица, общавшиеся с больным коклюшем

- А. Только в инкубационный период
- Б. В инкубационный период и в период начала клинических проявлений
- В. В период реконвалесценции
- Г. Только в период клинических проявлений

К мерам специфической профилактики клещевого энцефалита относят

- А. Вакцинацию населения
- Б. Вырубку кустарника вблизи населенных пунктов
- В. Иммуноглобулинопрофилактику за 1 месяц до сезона активности клещей
- Г. Дезинсекцию жилищ

Характерным признаком пищевых вспышек шигеллёзов является

- А. Подъём заболеваемости другими острыми кишечными заболеваниями в период, предшествующий вспышке
- Б. Выделение от больных и носителей разных вариантов возбудителя
- В. Преобладание лёгких вариантов течения инфекции
- Г. Продолжительность вспышки в пределах одного максимального инкубационного периода

Основными источниками инвазии при мочеполовом и кишечном шистосомозах являются

- А. Люди
- Б. Сельскохозяйственные животные
- В. Человекообразные обезьяны
- Г. Домашние животные

Взрослое население в плановом порядке прививают против дифтерии и столбняка с интервалом (в годах)

- А. 15
- Б. 10
- В. 20
- Г. 25

Основным механизмом передачи норовирусной инфекции является

- А. Трансмиссивный
- Б. Фекально-оральный
- В. Вертикальный
- Г. Аэрогенный

К характеристикам инфекционных заболеваний, которые в первую очередь определяют значение дезинфекции в комплексе мероприятий, относят

- А. Характер факторов передачи возбудителя
- Б. Длительность сохранения возбудителя во внешней среде
- В. Наличие дезинфекционных средств, способных уничтожить возбудителя
- Г. Характер путей передачи возбудителя

К простому и быстрому способу обнаружения возбудителя q лихорадки при окоте скота в околоплодных водах и плаценте относится

- А. Реакция Вейль-Феликса с протейями
- Б. Прямой флуоресцентный метод
- В. Биопроба на морских свинках, куриных эмбрионах
- Г. Реакция связывания комплемента

Вакцинацию людей против сибирской язвы в соответствии с национальным календарём профилактических прививок по эпидемическим показаниям проводят

- А. Только взрослому населению
- Б. В профессиональных группах риска
- В. Населению, проживающему на территории сельских районов
- Г. Всему населению на территории

Во внешней среде уреоплазмы сохраняют способность к росту не более

- А. 2 Часов
- Б. 15 Минут
- В. 1 Суток
- Г. 12 Часов

Признаками особо опасной инфекции являются

- А. Длительная инкубация и выраженная манифестность
- Б. Легкое течение и наличие осложнений
- В. Среднетяжелое течение и высокая частота присоединения других инфекционных заболеваний
- Г. Тяжелое течение и высокая летальность

Предметом изучения эпидемиологии являются

- А. Популяции человека и возбудителя
- Б. Механизмы передачи возбудителей
- В. Закономерности развития эпидемического процесса
- Г. Инфекционные процессы

При наличии стойких остаточных явлений переболевшие лептоспирозами люди передаются под наблюдение специалистов по профилю клинических проявлений (врачам-офтальмологам, врачам-невропатологам, врачам-нефрологам и др.) на

- А. 2 Года
- Б. 1 Год
- В. 3 Года
- Г. 5 Лет

К задачам описательных приёмов эпидемиологических исследований относят

- А. Эпидемиологическое определение случая
- Б. Организацию регионального и локального мониторинга
- В. Выявление времени, групп и территорий повышенного риска заболеваемости
- Г. Составление специальных анкет (вопросников)

Орнитоз вызывает

- А. Pneumoniae
- Б. Abortus
- В. Psittaci
- Г. Trachomatis

Методом лабораторной диагностики урогенитального хламидиоза имеющим наибольшую чувствительность является

- А. ПЦР
- Б. Культуральный
- В. Иммунологический
- Г. Микроскопический

Наиболее информативным методом серологической диагностики токсоплазмоза является

- А. Реакция агглютинации
- Б. Иммуноферментный анализ
- В. Реакция иммунофлюоресценции
- Г. Реакция связывания комплемента

К резервуару возбудителя q лихорадки в природе относят

- А. Многочисленный воинский контингент
- Б. Клещей, домашних животных
- В. Водных млекопитающих (выдра, водяная крыса)
- Г. Диких животных семейства кошачьих (тигры, барсы)

Переносчиками возбудителя лихорадки крым-конго являются

- А. Блохи
- Б. Клещи
- В. Комары
- Г. Мухи

Человек является промежуточным хозяином

- А. *Echinococcus granulosus*
- Б. *Strongyloides stercoralis*
- В. *Opisthorchis felinus*
- Г. *Taeniarchynchus saginatus*

От момента заражения до момента выделения яиц при дифиллоботриозе проходит около

- А. Одного месяца
- Б. Одной недели
- В. Трех суток
- Г. Полугода

Заболевание урогенитальной хламидийной инфекцией в большей степени характерно для

- А. Женщин всех возрастов
- Б. Мужчин в возрасте до 50 лет
- В. Сексуально активных людей
- Г. Новорожденных недоношенных детей

К наиболее эффективному способу защиты от укусов клещей и универсальному средству индивидуальной профилактики передающимися ими инфекций относят

- А. Репеллент, отпугивающий клещей
- Б. Самоосмотры и взаимоосмотры одежды
- В. Вакцинацию против заболевания определённой инфекцией
- Г. Аэрозоль, убивающий клещей

Минимальный срок появления рнк после инфицирования ВИЧ составляет

- А. 3 Месяца
- Б. 2 Недели
- В. 1 Месяц
- Г. 10 Дней

Плановой вакцинации против паротита подлежат дети

- А. 18 Месяцев
- Б. 3 Месяцев
- В. 2 Лет
- Г. 12-15 Месяцев

Экспериментальным эпидемиологическим исследованием являются

- А. Когортные перспективные исследования
- Б. Клинические испытания
- В. Исследования типа «случай-контроль»
- Г. Скрининговые исследования

Коклюш в современных условиях распространен

- А. Только в развивающихся странах
- Б. Во всех странах мира
- В. Только в экономически развитых странах
- Г. Только на территории России

Наибольшую концентрацию вируса у инфицированного ВИЧ человека содержит

- А. Ликвор
- Б. Сперма
- В. Грудное молоко
- Г. Слеза

Возраст проведения вакцинации против дифтерии по национальному календарю составляет

- А. 3; 4,5; 6 Месяцев
- Б. 11 Лет
- В. 6 Лет
- Г. 12, 15, 18 Месяцев

Возбудителем сибирской язвы является

- А. *Pseudomonas aeruginosa*
- Б. *Klebsiella pneumonia*
- В. *Yersinia pestis*
- Г. *Bacillus anthracis*

Эшерихии, вызывающие заболевания человека, разделены на _____ подгруппы/подгрупп

- А. 5
- Б. 4
- В. 2
- Г. 3

Период «серонегативного окна» при ВИЧ-инфекции составляет до

- А. 9 Месяцев
- Б. 1 Года
- В. 6 Месяцев
- Г. 3 Месяцев

В соответствии с международными медико-санитарными правилами (2005) под «медико-санитарным наблюдением» понимают

- А. Контроль за состоянием здоровья лица, совершающего поездку, в течение определенного времени в целях определения риска передачи болезни
- Б. Мониторинг на территории государства-участника за объектами, представляющими потенциальную биологическую опасность
- В. Оценку медико-санитарной информации обо всех происходящих на территории государства-участника событиях, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения
- Г. Предварительную оценку лица уполномоченным работником здравоохранения для определения его состояния здоровья и потенциального риска для других лиц

Иммунизация взрослых против дифтерии и столбняка в рамках национального календаря профилактических прививок проводится каждые _____ лет

- А. 7
- Б. 15
- В. 5
- Г. 10

Игрушки и другие предметы из моющихся материалов в помещении, где находился больной генерализованной формой менингококковой инфекции, во время карантина

- А. Обрабатывают 1% раствором фенола
- Б. Ежедневно моют в конце дня горячей водой с моющими средствами
- В. Обрабатывают 0,01% раствором хлорамина
- Г. Изымают из обихода на период карантина

Методом паразитологической диагностики токсоплазмоза является

- А. Тест специфической бласт-трансформации лимфоцитов
- Б. Прямой базофильный тест
- В. Микроскопия мазков с окрашиванием по Романовскому-Гимзе
- Г. Радиоиммунный анализ

Генетическое разнообразие ВИЧ имеет главное отражение в

- А. Характере тропизма вируса
- Б. Чувствительности и специфичности серологических тестов
- В. Эффективности антиретровирусных препаратов
- Г. Чувствительности и специфичности молекулярных тестов

Сезонность во внутригодовой динамике заболеваемости вызывается причинами, которые действуют

- А. Нерегулярно и определяются социальными и природными условиями
- Б. Постоянно на протяжении каждого месяца
- В. Постоянно на протяжении всего года
- Г. Регулярно, в один и то же период года, и определяются социальными и природными условиями

[Вернуться в начало](#)