

Тесты с вопросами по специальности «Гериатрия» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/geriatr/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Гериатрия» для аккредитации и других экзаменов (2000 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/geriatriya/

2) Гериатрия — ситуационные задачи

→ medik-otvet.ru/product/geriatria/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Особенности проведения коронароангиографии (КАГ) у пожилых пациентов включают

- А. Тщательная оценка риска и пользы проведения КАГ
- Б. Предпочтителен феморальный доступ
- В. Высокая частота аллергических реакций на контраст
- Г. Контроль функции почек из-за высокого риска контраст-индуцированной нефропатии
- Д. Предпочтителен радиальный доступ

Результат 30 баллов при оценке по шкале MMSE свидетельствует

- А. Об отсутствии когнитивных нарушений
- Б. О наличии легкой деменции
- В. О наличии тяжелой деменции
- Г. О наличии тяжелой деменции
- Д. О наличии легких когнитивных нарушений

Какие препараты являются наиболее эффективными классами антигипертензивных препаратов для профилактики и лечения диабетической нефропатии?

- А. Бета-блокаторы
- Б. АК дигидропиридиновые
- В. АК недигидропиридиновые
- Г. БРА
- Д. Диуретики
- Е. ИАПФ

Основные механизмы клеточного старения включают в себя

- А. Ограничение пролиферации клеток
- Б. Снижение процессов репарации
- В. Накопление мутаций в геноме
- Г. Снижение процессов метилирования и гликозилирования
- Д. Оксидативный стресс

Какие проявления начальной стадии болезни Альцгеймера?

- А. моторная афазия
- Б. нарушение памяти на текущие события
- В. недержание мочи
- Г. параличи
- Д. нарушения походки

Дайте определение делирия

- А. острый обратимый синдром с расстройством уровня сознания, внимания, с низкой психомоторной активностью и нарушением внимания и цикла сон - бодрствование
- Б. острое нарушение внимания и ориентировки в пространстве и времени, с нарушением психомоторной активности, когнитивных функций, уровня сознания
- В. остро развивающееся состояние, характеризующееся расстройством сознания и внимания, нарушением когнитивных функций с флюктуацией состояния в течении суток, высокой или низкой психомоторной активностью и нарушением цикла сон – бодрствование
- Г. острый обратимый синдром с нарушением когнитивных функций, уровня сознания и высокой психомоторной активностью с формированием инверсии сна

Индивидуальный план ведения гериатрических пациентов не включает в себя

- А. Организация помощи в передвижении
- Б. Коррекция возрастных изменений кожи
- В. Оптимальный комплекс ЛС
- Г. Коррекция зрения и слуха

Укажите особенности фармакотерапии ХСН у пожилых пациентов

- А. Усиленный диурез
- Б. Меньшая начальная доза
- В. Тщательное титрование дозы
- Г. Учитывать нарушение функции почек и печени
- Д. Избегать назначение НПВС

Цель гликемического контроля у функционально-зависимых пожилых пациентов с деменцией составляет

- А. <6,5
- Б. <8,5
- В. <7,5
- Г. <7,0
- Д. <9,5

Сопоставьте тип нежелательной реакции (НР) и ее описание в соответствии с классификаций экспертами ВОЗ. Тип НР А. ТИП А

Б. ТИП В

В. ТИП С

Г. ТИП D Описание

1. Предсказуемые реакции, являются результатов фармакологического действия ЛС, зависят от дозы (частота и тяжесть увеличиваются при повышении дозы)
2. Непредсказуемые реакции, не зависят от дозы препарата, трудно воспроизводимы в условиях эксперимента, часто имеют иммунологическую природу
3. реакции, возникающие при длительном приеме ЛС, часто они проявляются развитием толерантности, лекарственной зависимости, синдромом отмены.
4. Отсроченные НР, возникающие через несколько месяцев и даже лет после отмены ЛС. В их основе лежит мутагенность, канцерогенность, нарушения репродуктивной функции, тера-тогенность, обусловленные предшествующим приемом ЛС.

- А. А-1, Б-2, В-3, Г-4
- Б. А-1, Б-4, В-2, Г-3
- В. А-4, Б-2, В-3, Г-1
- Г. А-4, Б-3, В-2, Г-1

Укажите факторы риска, влияющие на прогноз

- А. Величина пульсового давления пожилых
- Б. Низкая физическая активность
- В. Концентрация глюкозы натощак
- Г. Курение
- Д. Гиперфибриногенемия

Чем опасна анемия для пожилых людей?

- А. Развитие хрупкости
- Б. Снижение физической активности
- В. Увеличение риска глаукомы
- Г. Когнитивные нарушения
- Д. Повышение смертности

Выберите факторы, ассоциированные с высоким риском кровотечения у пожилых людей:

- А. Частые падения
- Б. Нарушение функции печени
- В. Тромбоцитопения
- Г. Деменция
- Д. Ломкость сосудов

Клинические особенности СД 2 типа в пожилом возрасте включают

- А. Бессимптомное («немое») течение
- Б. Преобладание неспецифических жалоб
- В. Клиническая картина осложнений в дебюте диабета
- Г. Отсутствие клинической картины осложнений в дебюте диабета
- Д. Нарушение распознавания гипогликемических состояний

Каковы противопоказания для назначения и/или продолжения терапии метформином?

- А. Инфаркт миокарда в анамнезе
- Б. Уровень СКФ менее 45 мл/мин
- В. Когнитивные нарушения
- Г. Сердечная недостаточность II-IV ФК по классификации NYHA
- Д. Анемия

Какое состояние не предрасполагает к развитию хронического бронхита у пожилых?

- А. снижение иммунологической реактивности
- Б. неполноценное питание
- В. застойная сердечная недостаточность
- Г. тиреотоксикоз
- Д. курение

Какие антигипертензивные препараты являются обязательными для назначения при сочетании АГ с ИБС: постинфарктным кардиосклерозом?

- А. Бета-блокаторы
- Б. АК дигидропиридиновые
- В. АК недигидропиридиновые
- Г. БРА
- Д. Диуретики
- Е. ИАПФ

При каких цифрах витамин Д в норме?

- А. >5 нг / мл
- Б. >10 нг / мл
- В. >400 нг / мл
- Г. >30-100 нг / мл

Укажите причины развития ХСН в старших возрастных группах

- А. ИБС и инфаркт миокарда
- Б. Артериальная гипертензия
- В. Сахарный диабет 2 типа
- Г. Дилатационная кардиомиопатия
- Д. Все перечисленное

Какая шкала используется для скрининга депрессии у пациентов с деменцией?

- А. Cornell
- Б. GDS-15
- В. GDS-30
- Г. Zung Self-Rating Depression Scale
- Д. BAI

Наиболее частыми причинами обморока у пожилых людей считают

- А. Постпрандиальная гипотензия
- Б. Синдром каротидного синуса
- В. Пароксизмальная желудочковая тахикардия
- Г. Синдром подключичного обкрадывания
- Д. Ортостатическая гипотензия

Укажите абсолютные противопоказания к назначению бета-блокаторов при ХСН

- А. Тяжелый облитерирующий энтерит
- Б. Сахарный диабет 2 типа
- В. Хронический бронхит
- Г. Гипотония (АД менее 85 мм рт ст)
- Д. Атрио-вентрикулярная блокада II степени

Как часто проводится пневмококковая вакцина лицам старше 65 лет?

- А. Однократно
- Б. Ежегодно
- В. Раз в 5 лет
- Г. Раз в 10 лет
- Д. Не проводится

К провоцирующим факторам развития ХСН относятся

- А. Ишемия миокарда
- Б. Тахи- и брадиаритмии
- В. Простудные заболевания
- Г. Злоупотребление алкоголем
- Д. Дисфункция щитовидной железы

Укажите факторы риска развития СД при приеме статинов

- А. Повышенный уровень глюкозы натощак
- Б. Артериальная гипертензия
- В. Повышенное содержание триглицеридов
- Г. Нормальный уровень глюкозы натощак
- Д. Нормальная масса тела

Назовите ситуации при которых показан самоконтроль АД

- А. Подозрение на изолированную амбулаторную АГ (гипертония «белого халата»)
- Б. Длительный контроль за антигипертензивной терапией
- В. Контроль АД при повседневной физической активности
- Г. Все выше перечисленное

Препараты для лечения АГ у больных с пароксизмальной формой мерцательной аритмии

- А. Бета-адреноблокаторы
- Б. Блокаторы рецепторов АТ1
- В. Диуретики
- Г. ИАПФ

Какая болезнь является частой причиной лёгких когнитивных расстройств?

- А. болезнь Альцгеймера
- Б. дисциркуляторная энцефалопатия
- В. болезнь Паркинсона
- Г. посттравматическая энцефалопатия
- Д. нормотензивная гидроцефалия

Укажите факторы риска развития СД 2

- А. Многоплодная беременность в анамнезе
- Б. Возраст более 45 лет
- В. Дислипидемия
- Г. Наличие гестационного СД в анамнезе
- Д. Артериальная гипертензия

Укажите основной метод сбора информации о нежелательных реакциях (НР)

- А. Метод спонтанных сообщений
- Б. Метод стимулированных сообщений
- В. Когортные исследования
- Г. Активный мониторинг НР

Назовите абсолютные противопоказания к следующим классам антигипертензивных препаратов
Классы антигипертензивных препаратов А - диуретики Б - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента В - бета-блокаторы

- 1. подагра
- 2. бронхиальная астма
- 3. гиперкалиемия ($> 5,5$ ммоль/л)

- А. А-2, Б-3, В-1
- Б. А-3, Б-2, В-1
- В. А-1, Б-3, В - 2
- Г. А-1, Б-2, В-3

К проявлениям преждевременного старения не относятся

- А. снижение эмоционального реагирования
- Б. снижение репродуктивной способности
- В. раннее снижение памяти
- Г. снижение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы

Выберите, что характерно для препаратов железа Препараты железа

- А) двухвалентные
- Б) трехвалентные
- Признаки 1 низкомолекулярные соединения
- 2. высокомолекулярные соединения
- 3. диспепсические осложнения редко
- 4. диспепсические осложнения часто
- 5. не взаимодействуют с лекарственными препаратами
- 6. взаимодействуют с лекарственными препаратами

- А. А – 1,3,5, Б- 2,4,6
- Б. А – 2, 3, 5, Б – 1, 4, 6
- В. А- 1, 4, 6, Б -2, 3, 5
- Г. А – 2, 4, 5, Б – 1,3, 6

При каком уровне гликированного гемоглобина можно диагностировать СД?

- А. $\geq 6,0\%$
- Б. $\geq 6,5\%$
- В. $\geq 5,7\%$
- Г. $\geq 6,1\%$
- Д. $\geq 7,0\%$

Какие комбинации антигипертензивных препаратов относятся к рациональным?

- А. ИАПФ + диуретик
- Б. ББ + ИАПФ
- В. БРА + АК
- Г. ББ + дигидропиридиновый АК
- Д. ББ + БРА

Что является основным дифференциально-диагностическим признаком мелкоочагового инфаркта миокарда от нестабильной стенокардии?

- А. более выраженный болевой синдром
- Б. более длительное изменение ЭКГ
- В. повышение активности кардиоспецифических ферментов сы-воротки крови в 1,5-2 раза выше нормы
- Г. более высокое значение СОЭ
- Д. выявление зон асинергии миокарда

Что не относится к возраст-ассоциированным изменениям миокарда на клеточном уровне?

- А. Гибель кардиомиоцитов
- Б. Отложение липофусцина
- В. Уменьшение размеров кардиомиоцитов
- Г. Увеличение соединительной ткани
- Д. Увеличение количества одноядерных клеток

Какие клинические ситуации являются абсолютным противопоказанием к назначению НПВП у пожилых пациентов с рецидивом боли при остеоартрите?

- А. ХОБЛ
- Б. перенесенный ОИМ
- В. глаукома
- Г. перенесенная операция АКШ
- Д. тяжелая ХБП

Установите соответствие между препаратом и его осложнением Препарат:

- А. нейролептики**
 - Б. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы**
 - В. Ингибиторы нмда-рецепторов**
 - Г. Антидепрессанты**
- Осложнения:**

- 1. паркинсонизм**
- 2. Тошнота, рвота**
- 3. головокружение**
- 4. тревога**

А. А-4, Б-3, В-2, Г-1

Б. А-2, Б-1, В-4, Г-3

В. А-1, Б-2, В-3, Г-4

Г. А-3, Б-4, В-1, Г-2

Старческая астения имеет код по МКБ-10

А. R63

Б. R53

В. R54

Г. старческой астении нет в МКБ10

Д. F54

Какой самый распространенный причинный фактор, обнаруживаемый при тромбозе мозговых сосудов у пожилых?

А. повышение свертываемости крови, связанное с недостатком половых гормонов

Б. полицитемия

В. атеросклероз

Г. узелковый периартериит

Д. СКВ

Частая причина поражения клапана аорты у пожилых людей

А. Хроническая ревматическая болезнь сердца

Б. Дегенеративный кальциноз

В. Инфекционный эндокардит

Г. Атеросклероз

К какой группе факторов риска возникновения нарушения сна у пожилых людей согласно концепции С.А. Frago относятся возрастные физиологические изменения сна?

А. Провоцирующие факторы

Б. Инволютивные факторы

В. Предрасполагающие факторы

Г. Поддерживающие факторы

Какой класс антигипертензивных препаратов не следует назначать пожилым (>65 лет) пациентам (при отсутствии соответствующих сопутствующих заболеваний, требующих их назначения) в связи с повышением риска падений?

- А. Бета-блокаторы
- Б. Петлевые диуретики
- В. Блокаторы рецепторов к ангиотензину II
- Г. Дигидропиридиновые антагонисты кальция
- Д. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента

Для каких целей разработан инструмент FRAX ?

- А. Для оценки риска переломов
- Б. Для оценки риска пролежней
- В. Для оценки риска падений
- Г. Для контроля лечения остеопороза

Какие основные принципы лечения пожилых пациентов с ХСН?

- А. Устранение причинного фактора (если этого возможно)
- Б. Усиленный диурез
- В. Акцент на нефармакологические и реабилитационные методы лечения
- Г. Рациональная фармакотерапия
- Д. Стимуляция инотропной функции миокарда

Снижение веса пациентов при старческой астении связано патогенетически главным образом с развитием

- А. саркопении
- Б. депрессии
- В. потерей зубов
- Г. нарушением пищеварения

Гипогликемия у пожилого больного сахарным диабетом может быть вызвана

- А. Введением неадекватно большой дозы инсулина
- Б. Нарушенным распознаванием гипогликемии
- В. Приемом препаратов сульфонилмочевины
- Г. Приемом бигуанидов
- Д. Приемом инкретинов

Какие критерии являются критериями успешности лечения СД?

- А. Длительность поддержания эффекта снижения HbA1c
- Б. Степень снижения HbA1c не менее 1,5%
- В. Низкий риск гипогликемии
- Г. Нейтральность в отношении СС рисков
- Д. Увеличение массы тела

Наиболее эффективным способом увеличения мышечной массы и повышения физической работоспособности у пациентов с синдромом старческой астении является

- А. употребление белковых пищевых добавок
- Б. физическая активность
- В. прием витамина D не менее 800 МЕ/сут
- Г. прием омега-3 жирных кислот
- Д. сочетание пищевых белковых добавок с физическими упражнениями и/или физической активностью

Какие расстройства сна при инсомнии принято относить к пресомническим?

- А. Частые ночные пробуждения
- Б. Трудности засыпания
- В. Более раннее чем обычно пробуждение по утрам.
- Г. Ночной храп

Что предрасполагает к развитию пневмонии у лиц пожилого возраста?

- А. Переутомление
- Б. Перегревание
- В. Постельный режим
- Г. Стрессы
- Д. Инсоляции

Выберите основные факторы, способствующие развитию сердечной недостаточности у пожилых людей

- А. Возрастные изменения сердечно-сосудистой системы
- Б. Высокая распространенность некоронарогенных кардиомиопатий
- В. Высокая распространенность ССЗ
- Г. Хроническая болезнь почек
- Д. Пневмония и другие инфекционные заболевания

Что учитывают в диетотерапии для больных с неосложненным СД 2 типа?

- А. Количество белков в граммах
- Б. Хлебные единицы
- В. Количество жиров в граммах
- Г. Суточное потребление калорий
- Д. Количество углеводов в граммах

На вероятность дожития до 100 лет не влияет

- А. Перенесенный инфаркт миокарда
- Б. Возраст матери на момент рождения
- В. Наличие подагры
- Г. Потребление шоколада

Укажите факторы риска жестокого обращения с пожилыми

- А. Домашнее насилие над пожилым человеком
- Б. Люди, которые оскорбляют пожилых людей (особенно их взрослые дети), часто зависят от взрослых в финансовом и других планах
- В. Социальная изоляция
- Г. Часто нарушителем становится супруг
- Д. Все верно

Укажите особенности фармакокинетики лекарственных средств в пожилом организме

- А. всасывание лекарственных средств замедляется
- Б. метаболизм препаратов снижается
- В. меняется распределение лекарственных средств
- Г. меняется проникновение лекарственных средств через клеточные оболочки
- Д. изменяется экскреция лекарственных средств

Вторичная профилактика - это

- А. предупреждение возникновения самого заболевания, посредством учета модифицируемых и немодифицируемых факторов риска и их коррекции
- Б. меры, способствующие раннему выявлению и лечению болезни с целью предотвращения формирования осложнений
- В. мероприятия, направленные на предотвращение инвалидизации и смерти в связи с развернутой формой уже осложненного заболевания
- Г. скрининг рака, раннее выявление нарушений слуха или ухудшения зрения, остеопороза, гипертонии, и аневризмы брюшной аорты

Что является обязательным признаком деменции?

- А. нарушение памяти
- Б. расстройство сознания
- В. нарушение самообслуживания
- Г. необратимый характер когнитивных нарушений
- Д. сосудистое поражение головного мозга

Какова тактика ведения больных с АД более 180/110 и отсутствием факторов риска?

- А. Изменение образа жизни
- Б. Рассмотреть вопрос о необходимости лекарственной терапии
- В. Немедленно начать лекарственную терапию

К первичному паркинсонизму относится

- А. Сосудистый паркинсонизм
- Б. Посттравматический паркинсонизм
- В. Паркинсонизм при деменции с тельцами Леви
- Г. Паркинсонизм при Болезни Паркинсона
- Д. Паркинсонизм при мультисистемной атрофии

Междисциплинарное взаимодействие в гериатрии не включает

- А. Первичная медико-санитарная помощь
- Б. Санаторно-курортное лечение
- В. Кабинеты и отделения медицинской профилактики
- Г. Отделения реабилитации

Какая локализация пролежней не относится к наиболее распространенным?

- А. Область крестца
- Б. Пяточная область
- В. Задняя поверхность бедра
- Г. Затылочная область
- Д. Локти

Какой симптом не относится к проявлениям болезни Альцгеймера?

- А. трудности подбора слов при разговоре
- Б. затруднения при счетных операциях
- В. флюктуирующее течение болезни
- Г. нарушения ориентировки в малознакомой местности
- Д. медленное прогрессирование симптомов

Основные признаки возрастных изменений артерий по данным апplanationной тонометрии?

- А. Уменьшение скорости распространения пульсовой волны
- Б. Увеличение скорости распространения пульсовой волны
- В. Увеличение центрального АД
- Г. Уменьшение центрального АД

Что включает неотложное лечение больных с отстрой задержкой?

- А. катетеризация мочевого пузыря
- Б. наложение постоянного мочепузырного свища
- В. применение мочегонных препаратов
- Г. применение анальгетиков
- Д. теплая грелка на поясничную область

Увеличение частоты побочных реакций с возрастом связано с увеличением числа принимаемых необходимых лекарственных средств

- А. в связи с особенностями физиологического состояния старческого организма
- Б. снижением скорости клубочковой фильтрации и функцией почечных канальцев
- В. уменьшением концентрации и связывающей способности белков плазмы
- Г. полиморбидностью
- Д. потребностью в дополнительной коррекции доз лекарственных средств

Что является результатом проведения комплексной гериатрической оценки?

- А. Признание пациента инвалидом
- Б. Направление пациента в центры социальной защиты
- В. Создание индивидуального плана лечения и ухода
- Г. Институализация пациента

В какой клинической ситуации какой препарат должен быть прекращен Клинические ситуации: А - Сахарный диабет с частыми эпизодами гипогликемии Б - Сердечная недостаточность ФК IV по NYHA В - Гиперкалиемия Препараты 1-лозартан 2 - глибенкламид 3 - верапамил

- А. А - 1, Б - 3, В - 2
- Б. А - 2, Б - 3, В - 1
- В. А - 3, Б - 2, В - 1
- Г. А - 2, Б - 1, В - 3

Какие теории относят к теориям программированного старения?

- А. Теломерная теория
- Б. Антагонистической плеiotропии
- В. Генно-регуляторная теория
- Г. Нейроэндокринная теория
- Д. Свободнорадикальная теория

Определите возраст долгожителей

- А. 45-59 лет
- Б. 60-74 лет
- В. 75-80 лет
- Г. 81-90 лет
- Д. 90 лет и более

Какая основная причина развития застойной сердечной недостаточности в пожилом возрасте?

- А. Артериальная гипертония
- Б. ИБС
- В. Клапанные пороки
- Г. Метаболические расстройства
- Д. Коллагеновые заболевания

Укажите наиболее частые симптомы ОКС у пожилых пациентов

- А. Боль в груди
- Б. Боль в животе, рвота
- В. Нарушения ритма сердца, приступы одышки, безболевые формы
- Г. Церебральные симптомы

Что верно в отношении повязок для лечения пролежней?

- А. Гидроколлоидные повязки используют для пролежней 2-3 стадии с большим количеством экссудата
- Б. Повязки в виде пены используют для инфицированных пролежней с большим количеством экссудата или после дренирования абсцесса
- В. Повязки с алгинатом применяют для пролежней с небольшим количеством экссудата
- Г. Коллагеновые повязки применяют для инфицированных пролежней
- Д. Сухая повязка лучше, чем влажная

Результат 30 баллов при оценке по шкале МоСА свидетельствует

- А. Об отсутствии когнитивных нарушений
- Б. О наличии легких когнитивных нарушений
- В. О наличии легкой деменции
- Г. О наличии умеренной деменции
- Д. О наличии тяжелой деменции

Служба оказания медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста - это

- А. Гериатрическая служба
- Б. Геронтологическая служба
- В. Социальная служба
- Г. Паллиативная служба

Укажите лабораторные признаки гипотиреоза

- А. Дислипидемия
- Б. Снижение уровня гемоглобина
- В. Гипертриглицеридемия
- Г. Повышение уровня билирубина
- Д. Повышение уровня КФК, ЛДГ

По какой шкале оценивается базовая функциональная активность при проведении КГО?

- А. MMSE
- Б. MNA
- В. GDS
- Г. ADL (Barthel)
- Д. IADL

При каком значении показателя MCV можно говорить о микроцитарной анемии?

- А. 82,3
- Б. 94,6
- В. 78,4
- Г. 88
- Д. 102,2

Какой симптом наиболее тесно связан с клинической картиной старческой астении?

- А. Самооценка слабости
- Б. Нарушение походки
- В. Снижение мобильности
- Г. Недержание мочи
- Д. Падения

Перечислите особенности лечения гипотиреоза у пожилых больных и лиц с ИБС

- А. Увеличение дозы тироксина на 12,5-25 мкг/сутки с интервалами в 4-6 нед.
- Б. При появлении клинических и инструментальных признаков ухудшения коронарного кровообращения дозу тироксина следует увеличить на 12,5-25 мкг/сут
- В. При появлении клинических и инструментальных признаков ухудшения коронарного кровообращения дозу тироксина следует уменьшить до предыдущей и удлинить период адаптации
- Г. Начальная доза тироксина 12,5 – 25 мкг в сутки
- Д. Увеличение дозы тироксина на 25-50 мкг/сутки с интервалами в 1-3 дня

Какой препарат согласно START критериям должен быть назначен пациенту с тяжелой гастроэзофагеальнорефлюксной болезнью?

- А. Маалокс
- Б. Пантопразол
- В. Ранитидин
- Г. Пентоксифиллин
- Д. Нитросорбида динитрат

Клинически хронический пиелонефрит в пожилом возрасте проявляется

- А. ознобом, повышением температуры
- Б. выраженным лейкоцитозом со сдвигом влево, ускорением СОЭ
- В. атипичностью клинических проявлений
- Г. нарушением мочеиспускания
- Д. повышением артериального давления

Что такое афазия?

- А. неразборчивость речи в результате нечеткости произношения
- Б. нарушение узнавания при сохранности зрения
- В. утрата речевых способностей как способа выражения мысли
- Г. нарушение памяти на текущие события
- Д. нарушение сложных целенаправленных движений

Какой фактор не относится к факторам риска падений?

- А. нарушение зрения
- Б. низкая физическая активность
- В. европеоидная раса
- Г. прием препаратов, вызывающих головокружение
- Д. снижение клиренса креатинина

Для уменьшения полипрагмазии выберите лекарственный препарат для отмены в каждой конкретной клинической ситуации Ситуация А - Первичная профилактика сердечно-сосудистых событий у пациентов пожилого возраста Б - Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса у пациента с синусовым ритмом В - Отек левой нижней конечности у пациента с переломом левой нижней конечности
Препарат 1 Ацетилсалициловая кислота 2 Фуросемид

3. Дигоксин

- А. А-1, Б-3, В-2
- Б. А-1, Б-2, В-3
- В. А-2, Б-1, В-3
- Г. А-3, Б-2, В-1

К базисной функции не относится

- А. Способность посетить туалет
- Б. Способность приготовить пищу
- В. Способность одеться
- Г. Способность передвигаться от кровати до стула
- Д. Способность подняться по лестнице

Клиническими признаками тиреотоксической энцефалопатии служат

- А. Головная боль
- Б. Выпадение волос
- В. Эмоциональная лабильность
- Г. Нарушение сна
- Д. Сонливость

Прогноз каких заболеваний у пожилых пациентов утяжеляет наличие анемии?

- А. Язвенная болезнь желудка
- Б. ХСН
- В. ХОБЛ
- Г. Катаракта
- Д. Онкологические заболевания

Соотнесите проявления осложнений сахарного диабета и его название Проявление:

- А. Отсутствие температурной чувствительности
 - Б. Инсулинорезистентность
 - В. Извитой ход сосудов сетчатки
 - Г. Узелковый гломерулосклероз Осложнение/синдром
1. Дистальная диабетическая полинейропатия
 2. Диабетическая нефропатия
 3. Пролиферативная ретинопатия
 4. Метаболический синдром
- А. А-3, Б - 2, В – 1, Г- 4
 - Б. А-2, Б - 1, В – 4, Г- 3
 - В. А-1, Б - 4, В – 3, Г- 2
 - Г. А-4, Б - 3, В – 2, Г- 1

Псевдодеменция - это

- А. нарушение памяти и внимания при дисметаболических расстройствах
- Б. возрастные изменения когнитивных функций
- В. когнитивные нарушения при депрессии
- Г. нарушение высших психических функций при опухоли мозга

Наиболее развернутый диагноз при старческой астении устанавливается при

- А. определении синдрома по модели фенотипа старческой астении
- Б. определении индекса старческой астении
- В. по результатам комплексной гериатрической оценки
- Г. при нейро-психологическом тестировании

Какова наиболее частая локализация язвенного дефекта у лиц пожилого возраста ?

- А. Желудок
- Б. ДПК
- В. Слепая кишка
- Г. Ободочная кишка
- Д. Прямая кишка

Укажите признаки жестокого обращения с пожилыми

- А. Синяки, кровоподтеки, следы от ударов, рваные раны, следы от веревок, порезы, колотые раны или незалеченные травмы в разных стадиях заживления
- Б. Сломанные кости, включая череп
- В. Растяжения, вывихи или внутренние травмы
- Г. Признаки истощения
- Д. Все верно

Дифференциально-диагностические признаки микроцитарных анемий Вид анемии:

А) железодефицитная анемия

Б) анемия хронический заболеваний Дифференциально-диагностические признаки

- 1. Нормальный уровень ферритина
- 2. Низкий уровень ферритина
- 3. Нормальный уровень растворимых рецепторов к трансферрину
- 4. Высокий уровень растворимых рецепторов к трансферрину
- 5. Нормальный уровень СРБ
- 6. Высокий уровень СРБ

- А. А – 1,3,5, Б- 2,4,6
- Б. А- 1, 4, 6, Б -2, 3, 5
- В. А – 2, 3, 5, Б – 1, 4, 6
- Г. А – 2, 4, 5, Б – 1,3, 6

Какой фактор не является фактором риска падений?

- А. проведенное оперативное лечение катаракты
- Б. ношение очков с мультифокальными линзами
- В. деформации ногтей на ногах
- Г. боль в стопах при ходьбе
- Д. императивное недержание мочи

Какие абсолютные противопоказания существуют при назначении ингибиторов АПФ?

- А. Беременность
- Б. Гипотония
- В. Ангioneвротический отек
- Г. Односторонний стеноз почечной артерии

При проведении ортостатической пробы необходимо измерять уровень АД

- А. В положении стоя
- Б. В положении сидя и стоя
- В. В положении лежа и стоя
- Г. В положении лежа и сидя
- Д. Только в положении лежа

Иммунная система при старческой астении отвечает

- А. Снижением продукции иммуноглобулинов А и G, интерлейкина 2
- Б. Повышением фагоцитарной активности нейтрофилов
- В. Уменьшением продукции провоспалительных цитокинов

Укажите основной фактор риска возникновения полипрагмазии

- А. Азиатская раса
- Б. Состояние в браке
- В. Возраст пациента (особенно 85 лет и старше)
- Г. Ранняя менопауза у женщин
- Д. Наличие вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем и др.)

Какое из утверждений относительно поведенческих и психических симптомов деменции является не верным?

- А. к поведенческим и психическим симптомам деменции относятся ажитация, агрессивность, бред, галлюцинации, апатия, расторможенность
- Б. развиваются у 30-40% % пациентов с деменцией
- В. у 75% пациентов пик приходится на вечернее время
- Г. являются частой причиной институализации
- Д.) ассоциированы с развитием депрессии у ухаживающих лиц

К особенностям многоузлового зоба у пожилых относят

- А. Морфологическая гетерогенность ткани узла
- Б. Риск развития функциональной автономии узловых образований (многоузловой токсический зоб)
- В. Функциональная гетерогенность узла
- Г. Риск развития гипотиреоза
- Д. Развитие компрессионного синдрома (сдавление трахеи и пищевода) при больших размерах и/или загрудинном расположении зоба

Что не влияет на продолжительность жизни?

- А. Время пребывания на солнце
- Б. Уровень физической активности
- В. Уровень потребления алкоголя
- Г. Курение

Доза какого тромболитика снижается в 2 раза у пациентов старше 75 лет?

- А. Тенектеплаза
- Б. Алтеплаза
- В. Ретеплаза
- Г. Стрептокиназа

Какой из факторов риска является самым значимым при раке шейки матки?

- А. раннее начало половой жизни
- Б. ранние роды
- В. курение
- Г. вирус папилломы человека
- Д. иммунодефицит

Соотнесите тесты и методики для определения компонентов саркопении: Компонент саркопении:

А). Мышечная масса

Б). Мышечная сила

В). Мышечная функция Тест:

1) кистевая динамометрия

2) двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия по программе «Все тело»

3) краткая батарея тестов физической активности (SPPB)

- А. А-3, Б-1, В-2
- Б. А-2, Б-3, В-1
- В. А-2, Б-1, В-3
- Г. А-1, Б-2, В-3

Установите соответствие между болезнью и характерным симптомом Болезнь:

А. Болезнь Паркинсона

Б. Мультисистемная атрофия

В. Прогрессирующий надъядерный паралич

Г. Сосудистый паркинсонизм Симптом:

1. Паркинсонизм нижней части тела

2. Раннее развитие деменции

3. Вегетативная недостаточность

4. Правостороннее начало

- А. А-4, Б-3, В-2, Г-1
- Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4
- В. А-1, Б-2, В-4, Г-3
- Г. А-3, Б-4, В-1, Г-2

При развитии аллергических реакций у пожилых в ответ на антибиотики и медикаментозную терапию нужно провести, в первую очередь, мероприятия

- А. отмена антибиотиков
- Б. назначение антигистаминных препаратов (тавегил, супрастин, задитен)
- В. преднизолон внутрь или внутривенно
- Г. сердечные гликозиды
- Д. назначение препаратов калия

Какой фактор не относится к факторам риска развития делирия?

- А. Возраст старше 80 лет
- Б. Женский пол
- В. Острый инфекционный процесс
- Г. Перелом шейки бедра
- Д. Наличие уретрального катетера

Укажите наиболее частую локализацию рака у людей старше 60 лет

- А. кишечник
- Б. кожа
- В. легкое
- Г. предстательная железа
- Д. гемобластозы

Индекс «хрупкости», или старческой астении оценивает

- А. физическое состояние, количество сопутствующих заболеваний, степень зависимости от посторонней помощи, когнитивный, эмоциональный и социальный статус пожилого человека
- Б. только физическое и функциональное состояния пожилого человека
- В. только эмоциональное состояние пожилого человека
- Г. степень отклонение от нормы результатов лабораторных и инструментальных методов обследования

Какие препараты не применяют для лечения воспалительного процесса в бронхолегочной системе?

- А. антибиотиков разных классов
- Б. иммуномодуляторов
- В. бронхолитиков
- Г. бета-блокаторов
- Д. бронхоскопической санации

Что характерно для пролежней 2 стадии?

- А. На коже имеется покраснение, она не меняет цвет при надавливании; кожа не повреждена
- Б. Внешний слой кожи (эпидермис) и часть дермы либо повреждены, либо отсутствуют
- В. Дно раны обычно представлено темной, твердой омертвевшей тканью
- Г. В рану могут выстоять мышцы, кости и сухожилия
- Д. Поражение распространяется далеко за пределы первичного очага между слоями здоровых тканей

К облигатному симптому паркинсонизма относится

- А. Поза «просителя»
- Б. Брадикинезия
- В. Постуральная неустойчивость
- Г. Феномен «Застывания»
- Д. Ортостатизм

Какой вид недержания мочи является наиболее частым у пожилых?

- А. стрессовое
- Б. императивное
- В. недержание при переполнении
- Г. транзиторное
- Д. смешанное

Какой симптом относится к облигатному симптому делирия?

- А. Наличие иллюзий
- Б. Нарушение внимания
- В. Нарушение цикла сна-бодрствование
- Г. Наличие эйфории
- Д. Наличие галлюцинаций

Выбрать симптом, соответствующий заболеванию: Заболевание:

- А. ХОБЛ**
- Б. Бронхиальная астма**
- В. Пневмония Симптом:**
 - 1. Обратимая обструкция**
 - 2. Внутриальвеолярная экссудация**
 - 3. Необратимая обструкция**
- А. А-3, Б-1, В-2
- Б. А-1, Б-3, В-2
- В. А-3, Б-2, В-1

Какие возрастные изменения познавательной деятельности развиваются у пожилых людей?

- А. возрастании логического запоминания
- Б. возрастании систематического усвоения
- В. снижении логического запоминания
- Г. возрастании механического запоминания
- Д. снижении механического запоминания

Каковы особенности фармакотерапии больных пожилого возраста?

- А. назначение уменьшенных доз препаратов
- Б. медленное развитие лекарственной интоксикации
- В. нет склонности к аллергическим реакциям
- Г. назначение больших доз препаратов

Какие препараты наиболее часто применяются для лечения дизурических явлений у больных доброкачественной гиперплазией простаты?

- А. ингибиторы 5 альфа-редуктазы
- Б. спазмолитики
- В. препараты растительного происхождения
- Г. альфа-адреноблокаторы
- Д. антибактериальные препараты

Соотнесите тип и виды анемии Тип анемии:

А) Микроцитарная анемия

Б) Нормоцитарная анемия

В) Макроцитарная анемия Вид анемии:

1. Анемия хронических заболеваний

2. В-12 дефицитная анемия

3. Железодефицитная анемия

А. А-2, Б -3, В – 1

Б. А-3, Б-2, В- 1

В. А-1, Б -3, В-2

Г. А- 3, Б-1, В-2

Какова наиболее частая причина кровохарканья у лиц пожилого возраста?

- А. острый бронхит
- Б. очаговая пневмония
- В. бронхоэктатическая болезнь
- Г. рак легкого
- Д. хронический бронхит

Укажите причину развития старческого кифоза

- А. деформирующим спондилоартрозом
- Б. сенильным остеопорозом
- В. атрофией длинных мышц спины
- Г. гипертонусом длинных мышц спины
- Д. гипертрофией длинных мышц спины

Что позволяют спрогнозировать STOPP/START критерии?

- А. Развитие межлекарственных взаимодействий
- Б. Вероятность летального исхода
- В. Вероятность развития нежелательных лекарственных реакций
- Г. Вероятность госпитализации пациента в течение ближайшего года
- Д. Вероятность стабилизации хронического заболевания (отсутствие обострений в течение ближайшего года)

Наиболее часто причинами инсульта являются кардиогенные эмболии в следствие

- А. при клапанных пороках сердца
- Б. при ревматическом эндокардите
- В. вследствие пароксизма мерцательной аритмии
- Г. при бактериальном эндокардите
- Д. все верно

Какой из следующих признаков является ключевым для диагностики делирия согласно DSM-V?

- А. нарушение восприятия
- Б. нарушение памяти
- В. нарушение сознания и внимания
- Г. расстройство мышления

Что не характерно для транзиторной ишемической атаки?

- А. Гемипарез
- Б. Афазия
- В. Исчезновение симптомов в течение 24 часов
- Г. Гемигипестезия
- Д. Кома

Какое из утверждений относительно поведенческих и психических симптомов деменции является не верным?

- А. контроль за агрессивным поведением осуществляет гиппокамп, гипоталамус, ядра перегородки и миндалевидное ядро
- Б. установлена связь между агрессивным поведением и дисфункцией дофаминергической и серотонинергической систем
- В. выявление причины является решающим для планирования эффективных мероприятий по воздействию
- Г. для бреда характерны идеи ущерба, воровства и ограбления
- Д. галлюцинации являются наиболее частыми проявлениями психотических расстройств при деменции, обусловленной болезнью Альцгеймера

Какие разделы включает в себя комплексная гериатрическая оценка?

- А. функциональный статус, психическое здоровье
- Б. физическое и психическое здоровье, функциональный статус
- В. физическое здоровье, функциональный статус, психическое здоровье, социально-экономический статус
- Г. физическое здоровье, функциональный статус, социально-экономический статус
- Д. физическое здоровье и функциональный статус

Какие морфологические изменения происходят в миокарде с возрастом?

- А. прогрессирующий склероз
- Б. атрофия мышечных волокон
- В. гнездная гипертрофия мышечных волокон
- Г. некротические изменения
- Д. гипотрофия волокон

Какова основная причина стрессового недержания мочи у женщин?

- А. Неврологические заболевания
- Б. Дислокация шейки мочевого пузыря
- В. Гиперактивность детрузора
- Г. Хронический цистит

Что характерно для болезни Альцгеймера?

- А. относится к группе дегенеративных заболеваний головного мозга
- Б. развивается в молодом возрасте
- В. развивается вследствие сосудистого повреждения головного мозга проявляется центральным гемипарезом
- Г. часто сопровождаются эпилептическими припадками

Установите соответствие между синдромом и симптомом Синдром

А. Лобная атаксия

Б. Вестибулярная атаксия

В. Сенситивная атаксия

Г. Мозжечковая атаксия Симптом

1. Ходьба мелкими шагами на широкой базе

2. Головокружение, неустойчивость при ходьбе

3. Пошатывание в пробе Ромберга с открытыми и закрытыми глазами

4. Пошатывание в пробе Ромберга только с закрытыми глазами

А. А-4, Б-3, В-2, Г-1

Б. А-2, Б-1, В-4, Г-3

В. А-1, Б-2, В-4, Г-3

Г. А-3, Б-4, В-1, Г-2

Какой лабораторный показатель необходимо регулярно контролировать при лечении варфарином?

А. эритроцитов

Б. лейкоцитов

В. тромбоцитов

Г. международного нормализующего отношения

Д. фибринолитической активности

STOPP/START критерии разработаны для аудита лекарственных назначений в какой возрастной группе пациентов?

А. Старше 80 лет

Б. Старше 60 лет

В. Старше 65 лет

Г. Старше 70 лет

Д. Старше 75 лет

При каком уровне АД следует инициировать медикаментозную антигипертензивную терапию у пациента в возрасте 80 лет и старше (согласно европейским рекомендациям 2018 года)?

А. > 160/90 мм рт.ст.

Б. > 165/90 мм рт.ст.

В. > 150/90 мм рт.ст.

Г. > 160/96 мм рт.ст.

Д. > 170/100 мм рт.ст.

Пациент при ходьбе пользуется тростью. При оценке индекса Бартеля

- А. Необходимо дополнительно вычесть 10 баллов
- Б. Необходимо дополнительно прибавить 10 баллов
- В. Использование вспомогательных средств не влияет на результат
- Г. Необходимо дополнительно вычесть 5 баллов
- Д. Необходимо дополнительно прибавить 5 баллов

Сопоставьте факторы риска и группы факторов риска Факторы риска:

А. Нарушение слуха

Б. Запор

В. Задержка мочи

Г. Делирий в анамнезе Группы факторов:

1. Предрасполагающий фактор риска развития делирия

2. Провоцирующий фактор риска развития делирия

А. А – 1, Б – 1, В – 1, Г – 2

Б. А – 1, Б – 2, В – 2, Г – 1

В. А – 2, Б – 1, В – 2, Г – 1

Г. А – 2, Б – 1, В – 1, Г – 2

Какое из утверждений не верно в отношении головокружения среди пожилых людей?

- А. Распространенность головокружения среди людей старше 65 лет составляет 4 - 30%
- Б. Чаще встречается среди женщин
- В. Хроническое головокружение ассоциировано с падениями, функциональной зависимостью, ортостатической гипотензией, синкопе и инсультом
- Г. Распространенность болезни Меньера среди пожилых пациентов с головокружениями составляет 40%
- Д. Вследствие наличия многочисленных сложных связей любое повреждение ЦНС или нарушение его функционирования может проявляться в виде головокружения

Геропротекция не включает в себя

- А. достаточную физическую активность
- Б. снижение пищевого энергопоступления
- В. сохранение постоянной массы тела
- Г. снижение физической активности

Какой из перечисленных методов является обязательным при терапии всех клинических форм сахарного диабета?

- А. диетотерапия
- Б. лечение растительными гипогликозидами
- В. лечение физиотерапевтическими средствами
- Г. лечение сахаропонижающими таблетированными препаратами
- Д. инсулинотерапия

Каковы характерные проявления сосудистого старения?

- А. Систолическо-диастолическая АГ
- Б. Увеличение пульсового АД
- В. Уменьшение пульсового АД
- Г. Увеличение диастолического при нормальном систолическом АД
- Д. Увеличение систолического при сниженном диастолическом АД

Отличительной особенностью синдрома старческой астении является

- А. Снижение зрения и слуха
- Б. Уменьшение роста
- В. Снижение функционирования
- Г. Снижение аппетита

Какой индекс апноэ/гипопноэ соответствует средней степени тяжести апноэ во сне?

- А. индекс апноэ/гипопноэ – 5-14
- Б. индекс апноэ/гипопноэ – 15-30
- В. индекс апноэ/гипопноэ – 30 и более

Укажите причину обратимой деменции

- А. Деменция с тельцами Леви
- Б. Нормотензивная гидроцефалия
- В. Первично-прогрессирующая афазия
- Г. Болезнь Альцгеймера
- Д. Фронтально-темпоральная дегенерация

Какие группы препаратов рекомендованы при лечении пожилых пациентов с ОКС?

- А. Антиагреганты
- Б. Антикоагулянты
- В. Бета-адреноблокаторы
- Г. Статины
- Д. Все вышеперечисленные

Что является обязательным при лечении пациентов с артериальной гипертонией и метаболическим синдромом?

- А. Коррекция нарушений углеводного обмена
- Б. Коррекция нарушений минерального обмена
- В. Немедикаментозные мероприятия, направленные на снижение массы тела
- Г. Немедикаментозные мероприятия, направленные на повышение физической активности
- Д. Коррекция нарушений пуринового обмена

Что верно в отношении санации пролежней?

- А. Хирургическая обработка пролежня противопоказана для пациента с сепсисом
- Б. Механическая санация безопасна для вновь образованных грануляций
- В. Аутолитическая санация более избирательна и эффективна, чем механическая, но более медленная чем энзимная
- Г. Обычно используются антисептические и противомикробные растворы для обработки неинфицированных пролежней

Каковы принципы лечения гипотиреоза у пожилых?

- А. Заместительная терапия гормонами щитовидной железы
- Б. Антикоагулянты
- В. Антибиотики
- Г. Спазмолитики
- Д. НПВС

Как изменяются признаки тиреотоксической энцефалопатии на фоне лечения тиреостатиками?

- А. Исчезают
- Б. Усиливаются
- В. Не изменяются
- Г. Принимают волнообразный характер

Какое из утверждений относительно болезни Паркинсона является не верным?

- А. Прогрессирующее нейродегенеративное заболевание
- Б. Средний возраст постановки диагноза составляет 70,5 лет
- В. Распространенность после 60 лет составляет 1%
- Г. Распространенность после 85 лет составляет 2,6-4%
- Д. Риск развития выше у курильщиков

Каковы целевые уровни АД для хрупких пожилых пациентов?

- А. САД менее 140 мм рт.ст. при условии хорошей переносимости лечения
- Б. САД менее 160 мм рт.ст. при условии хорошей переносимости лечения
- В. САД менее 180 мм рт.ст. при условии хорошей переносимости лечения
- Г. САД менее 100 мм рт.ст. при условии хорошей переносимости лечения
- Д. Индивидуальный подход

Проявления преждевременного старения - это

- А. раннее снижение памяти
- Б. снижение эмоционального реагирования
- В. снижение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы
- Г. повышение трудоспособности
- Д. снижение репродуктивной способности

К тестам для оценки риска падения не относится

- А. Тест «Встань и иди»
- Б. Скорость ходьбы
- В. Тандемный шаг
- Г. Динамометрия
- Д. Тест Тинетти

Геронтология - это

- А. наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте
- Б. наука, изучающая болезни пожилого возраста
- В. наука о механизмах старения организма
- Г. наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожилом и старческом возрасте

Какое из утверждений в отношении профилактики падений является верным?

- А. Физические упражнения позволяют уменьшить риск падений на 50%
- Б. Упражнения на тренировку баланса позволяют уменьшить риск падений на 17%
- В. Образовательные программы являются наиболее эффективными
- Г. Все пожилые пациенты должны проходить скрининг на риск падений 1 раз в 5 лет
- Д. Все пациенты, имеющие в анамнезе 1 падение нуждаются в проведении многокомпонентных вмешательств

Установите соответствие между возбудителями пневмонии и антибактериальным препаратом выбора

- Возбудитель пневмонии**
- А. *St. Pneumoniae*
 - Б. *Haemophilus influenza*
 - В. *Chlamydia* и *Mycoplasma*

- Антибактериальные препараты**
- 1. Макролиды
 - 2. Амоксициллин, цефалоспорины 2-го и 3-го поколения
 - 3. Амоксициллин/клавулат, цефалоспорины 2-го и 3-го поколения

- А. А-2, Б-1, В-3
- Б. А-2, Б-3, В-1
- В. А-1, Б-3, В-2

К основным функциям гериатрического отделения поликлиники не относят

- А. Уменьшение диапазона предоставляемых внебольничных услуг
- Б. Выявление ХНИЗ и факторов риска ХНИЗ, гериатрических синдромов
- В. Первичная комплексная гериатрическая оценка больного (оценка физического состояния, функционального статуса, психического здоровья и социально-экономических условий жизни пациента)
- Г. Формирование долгосрочного индивидуального плана проведения профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, плана социальной и психологической адаптации и осуществление контроля за их выполнением

Что не относится к рекомендациям по профилактике падений пожилых людей в бытовых условиях?

- А. Убрать посторонние предметы с пола
- Б. Положить резиновый коврик на дно душевой кабины
- В. Использовать стул в качестве стремянки
- Г. Пользоваться ночником
- Д. Заменить ванну на душевую кабину

Что относят к методам борьбы с полипрагмазией?

- А. Шкалу SCORE
- Б. Шкалу STOPP/START
- В. Фрамингемскую шкалу
- Г. Шкалу HAS-BLED
- Д. Шкалу MMSE

Укажите факторы риска суицида у пожилых

- А. Вдовство и социальная изоляция
- Б. Хронический болевой синдром, с плохим контролем
- В. Сопутствующие соматические заболевания
- Г. Терминальная стадия заболевания
- Д. Все верно

Назначая лечение гипертонической болезни пожилым больным, страдающим язвенной болезнью, показаны следующие препараты

- А. Капотен
- Б. Арифон
- В. Амлодипин
- Г. Резерпин
- Д. Метилдопа

У больных с легочной эмболией встречаются все следующие клинические проявления кроме:

- А. Гипоксии
- Б. Недостаточности правых отделов сердца
- В. Цианоза
- Г. Тромбоза глубоких вен
- Д. Брадикардии

Медицинская помощь по профилю «гериатрия» реализуется при взаимодействии врача-гериатра с:

- А. участковым врачом-терапевтом, врачом общей практики
- Б. врачом по медицинской реабилитации
- В. врачом-физиотерапевтом
- Г. врачом по лечебной физкультуре
- Д. все верно

Как определяет полипрагмазию официальная медицина в РФ?

- А. одновременное назначение 4 лекарственных средств и более
- Б. одновременное назначение 5 лекарственных средств и более
- В. одновременное назначение 6 лекарственных средств и более
- Г. одновременное назначение 8 лекарственных средств и более
- Д. одновременное назначение 3 лекарственных средств и более

Какой препарат согласно STOPP критериям должен быть отменен у пациентов с подагрой?

- А. Хлорталидон
- Б. Атенолол
- В. Зопиклон
- Г. Моксонидин
- Д. Пропранолол

Что не является показанием для проведения рентгенографии позвоночника для исключения остеопоротических переломов позвонков?

- А. выраженный грудной лордоз
- Б. боль в спине на фоне длительного приема глюкокортикостероидов
- В. боль в спине на фоне диагностированного остеопороза
- Г. снижение роста на 2 см и более за 1-3 года наблюдения или на 4 см в сравнении с ростом в 25 лет
- Д. выраженный грудной кифоз

Какой фактор не относится к факторам риска остеопороза?

- А. Возраст старше 65 лет
- Б. Низкая физическая активность
- В. Мужской пол
- Г. Семейный анамнез остеопороза, в частности перелома шейки бедра
- Д. Предшествующий перелом при небольшой травме

Потребность в гериатрических койках определяется из расчета

- А. 1 койка на 5 000 населения 60 лет и старше
- Б. 1 койка на 10 000 населения 60 лет и старше
- В. 1 койка на 1 000 населения 60 лет и старше
- Г. 1 койка на 2 000 населения 60 лет и старше

Что характерно для лёгких когнитивных расстройств?

- А. нарушено самообслуживание
- Б. грубые расстройства памяти
- В. тазовые расстройства
- Г. выявляются когнитивные синдромы
- Д. изменения не заметны для окружающих

Старческая астения - это

- А. состояние снижения общего внутреннего резерва организма
- Б. состояние, развивающееся на фоне прогрессирования хронической сердечной недостаточности
- В. состояние, развивающееся на фоне недостаточности питания тяжелой степени тяжести у лиц старше 65 лет
- Г. снижение когнитивных функций у лиц старше 65 лет
- Д. выраженная нервно-психическая слабость, характеризующаяся мгновенной истощаемостью ресурсов нервной системы даже при минимальном стрессе

Какая шкала обладает наиболее высокой чувствительностью и специфичностью в диагностике делирия?

- А. NEECHAM
- Б. MDAS
- В. RASS
- Г. CAM
- Д. DOS

Какая фитотерапия показана в гериатрической практике при лечении хронического пиелонефрита?

- А. клюквенный морс
- Б. отвар цветков календулы
- В. отвар бузины
- Г. отвар березовых почек
- Д. все перечисленное верно

Что лежит в основе развития делирия?

- А. деменция
- Б. острая инфекция
- В. полифакториальный характер
- Г. депрессия

Укажите распространенность делирия среди пожилых пациентов многопрофильного стационара

- А. 30%
- Б. 10%
- В. 20%
- Г. 70%
- Д. 5%

Физиологически стареющими можно признать

- А. 1-2% пожилых и старых людей
- Б. 3-6% пожилых и старых людей
- В. 7-10% пожилых и старых людей
- Г. 10-15% пожилых и старых людей
- Д. 15-20% пожилых и старых людей

Укажите причины снижения дренажной функции бронхов

- А. атрофии бронхиального эпителия
- Б. снижения перистальтики бронхов
- В. снижения кашлевого рефлекса
- Г. все вышеперечисленное
- Д. ничего из вышеперечисленного

Укажите, каким должно быть питание пожилых пациентов

- А. С высоким содержанием жиров
- Б. Вегетарианское
- В. С достаточно высоким содержанием белка и витаминов
- Г. С преимущественным содержанием углеводов
- Д. С высоким содержанием жиров и углеводов

Какое количество основных фаз сна выделяют у человека в норме?

- А. 3 фазы
- Б. 2 фазы
- В. 4 фазы
- Г. Сон не принято делить на фазы

Применение какого антиагреганта не рекомендован у пациентов старше 75 лет при первичном ЧКВ?

- А. прасугрел
- Б. клопидогрел
- В. ацетилсалициловая кислота
- Г. тикагрелор

Моторную функцию ЖКТ при старческих запорах улучшают

- А. Глюкоза
- Б. Никотиновая кислота
- В. Аскорбиновая кислота
- Г. Пищевые волокна
- Д. Диуретики

Укажите официальный он-лайн ресурс, который позволяет получить доступ к информации о нежелательных реакциях (НР), собранной в рамках Программы ВОЗ по мониторингу безопасности лекарственных средств (ЛС)

- А. <https://www.who-umc.org/>
- Б. <http://www.vigiaccess.org>
- В. <http://www.who.int>
- Г. <http://www.roszdravnadzor.ru/>

Какой компонент относится к обязательному в любой схеме лечения остеопороза ?

- А. алендронат
- Б. препараты кальция и витамина Д
- В. золедроновая кислота
- Г. аналог паратиреоидного гормона
- Д. деносумаб

Какой основной метод диагностики болезни Альцгеймера?

- А. исследование цереброспинальной жидкости
- Б. транскраниальная доплерография
- В. нейропсихологическое обследование
- Г. эхоэнцефалоскопия
- Д. электроэнцефалография

Чем отличается болезнь Альцгеймера от сосудистой деменции?

- А. наличием первичных расстройств памяти
- Б. выраженностью сердечно-сосудистых факторов риска
- В. наличием галлюцинаций
- Г. тазовыми нарушениями
- Д. поведенческими расстройствами

Как часто рекомендуется проводить скрининг колоректального рака в виде колоноскопии лицам среднего риска в возрасте 50 до 75 лет?

- А. Ежегодно
- Б. Однократно
- В. Раз в 3- 5 лет
- Г. Раз в 10 лет
- Д. Не проводится

Клиническая шкала старческой астении, или «хрупкости» по К. Роквуд выделяет 7 степеней тяжести по

- А. Уровню физической активности
- Б. По скорости ходьбы
- В. По совокупности физического и психического статуса
- Г. По функциональному статусу
- Д. По тяжести хронических заболеваний

К какому виду профилактики относится снижение уровня холестерина?

- А. Первичная профилактика
- Б. Вторичная профилактика
- В. Третичная профилактика
- Г. не относится

Какой антикоагулянт недопустимо использовать у пациентов старше 75 лет?

- А. Ацетисалициловая кислота
- Б. Эноксапарин
- В. Нефракционированный гепарин
- Г. Эпitifибатид

Какие методы попадают под категорию первичной профилактики?

- А. Прививки, модификация образа жизни (отказ от курения, пропаганда физической активности)
- Б. Только прививки
- В. Прививки, нейровизуализация, денситометрия
- Г. Только модификация образа жизни (отказ от курения, пропаганда физической активности)

Сопоставьте показатели индекса апноэ/гипопноэ со степенью тяжести апноэ во сне индекса апноэ/гипопноэ

А. индекс апноэ/гипопноэ – 5-14

Б. индекс апноэ/гипопноэ – 15-30

В. индекс апноэ/гипопноэ – 30 и более Степень тяжести апноэ во сне

1. Легкая степень

2. Средняя степень

3. Тяжелая степень

А. А-1, Б-2, В-3

Б. А-2, Б-3, В –1

В. А-3, Б-1, В – 2

Какие виды упражнений важны для тренировки баланса?

А. Силовые тренировки

Б. Тренировки с отягощением

В. Тренировки на сопротивление

Г. Статические тренировки

Д. Спринт

Какие из перечисленных групп препаратов не относятся к противопаркинсоническим?

А. препараты леводопы

Б. амантадин

В. агонисты дофаминовых рецепторов

Г. ингибиторы моноаминоксидазы

Д. альфа-адреноблокаторы

Соотнесите препарат и показания к приему: Препарат:

А. Эутирокс

Б. Тирозол

В. Йодомарин Показания:

1. Гипотиреоз

2. Тиреотоксикоз

3. Диффузный эутиреоидный зоб

А. А-2, Б-1, В-3

Б. В-1, Б-2, А-3

В. А-1, Б-3, В-2

Г. А-1, Б-2, В-3

Врач какой специальности официально устанавливает диагноз делирия?

А. гериатр

Б. терапевт

В. невролог

Г. психиатр

К физиологическим изменениям мочевых путей в пожилом возрасте не относится

- А. Увеличение объема остаточной мочи
- Б. Уменьшение объема остаточной мочи
- В. Снижение общей емкости мочевого пузыря
- Г. Снижение сократимости детрузора
- Д. Выделение мочи в более позднее время

Какое из утверждений в отношении катетеров является верным?

- А. Наружный катетер повышает риск развития инфекции
- Б. Периодическая катетеризация применяется при ургентном недержании мочи
- В. Периодическая катетеризация повышает риск инфицирования по сравнению с постоянным
- Г. Одним из осложнений постоянного катетера является развитие рака простаты

Фаза маха от всего цикла ходьбы составляет (в процентах)

- А. 60
- Б. 30
- В. 50
- Г. 40

При тяжелом митральном стенозе площадь левого атрио-вентрикулярного отверстия составляет _____ см²

- А. 6-2.4
- Б. 1-1.5
- В. 4-3.5
- Г. Менее 1

Обратимую деменцию вызывает

- А. Деменция с тельцами Леви
- Б. Первично-прогрессирующая афазия
- В. Нормотензивная гидроцефалия
- Г. Болезнь Альцгеймера

Повышение уровня пса может быть при

- А. Перикардите
- Б. Половом воздержании
- В. Раке предстательной железы
- Г. Мочекаменной болезни

Контрактура дюпюитрена является дегенеративно-дистрофическим заболеванием

- А. Коленного сустава
- Б. Кисти
- В. Стопы
- Г. Тазобедренного сустава

Наличие плеврального хилезного экссудата характерно для

- А. Хронического активного гепатита
- Б. Лимфогранулематоза
- В. Тромбоэмболии легочной артерии
- Г. Саркоидоза легких

Уровень сознания при подозрении на делирий оценивается при помощи

- А. Теста мини-ког
- Б. Краткой шкалы оценки психического статуса
- В. Шкалы оценки возбуждения и сонливости Ричмонда
- Г. Шкалы комы Глазго

Общий классический массаж в один день нельзя сочетать с

- А. Электрофорезом
- Б. Общими минеральными ваннами
- В. Местными грязевыми процедурами
- Г. Ингаляциями минеральными водами

При центральном парезе не наблюдают

- А. Фибрилляции
- Б. Повышение сухожильных рефлексов
- В. Клонусы
- Г. Глобальные синкинезии

Для лечения обострения ХОБЛ у пожилых используют

- А. Бронхолитические препараты длительного действия
- Б. Небулизированные суспензии и растворы глюкокортикостероидов
- В. Откашливающие и разжижающие мокроту средства
- Г. Противовирусные препараты

Целью реабилитации пожилых пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата является

- А. Восстановление безопасной ходьбы по комнате
- Б. Стремление к полному восстановлению функции подвижности сустава после оперативного лечения в заданный срок
- В. Использование восстановленных функций по мере необходимости, для предотвращения повторных травм
- Г. Самостоятельное передвижение и самообслуживание, в том числе с использованием технических средств реабилитации

Больному бронхиальной астмой для самоконтроля состояния внешнего дыхания необходимо иметь собственный

- А. Спирограф
- Б. Бодиплетизмограф
- В. Пневмотахограф
- Г. Пикфлоуметр

Врачебная должность врача-гериатра консультативно-диагностического центра устанавливается на _____ тысяч населения

- А. 150
- Б. 100
- В. 200
- Г. 50

Рентгенологический феномен «дымохода» характерен для кишечной стриктуры, ассоциированной с

- А. Раком толстой кишки
- Б. Язвенным колитом
- В. Псевдомембранозным колитом
- Г. Ишемическим колитом

Ингибиторы протонной помпы используются в терапии язвенной болезни в связи с тем, что они

- А. Блокируют секрецию соляной кислоты
- Б. Инактивируют панкреатические ферменты
- В. Увеличивают секрецию защитной слизи и бикарбонатов
- Г. Купируют активное воспаление слизистой оболочки

Для борьбы с гиперкалиемией при острой почечной недостаточности применяют

- А. Тиосульфат натрия
- Б. Кальция глюконат
- В. Глюкозы раствор 5 %
- Г. Фенобарбитал

Третья линия эрадикационной терапии инфекции *helicobacter pylori* включает в себя

- А. Индивидуальный подбор антибиотиков по чувствительности
- Б. Схемы тройной терапии
- В. Схемы висмутсодержащей квадротерапии
- Г. Схемы последовательной терапии

Для диагностики синдрома золлингера – эллисона наиболее результативно

- А. Определение базальной кислотопродукции
- Б. Определение уровня гастрина в крови
- В. Проведение эзофагогастродуоденоскопии
- Г. Определение максимальной кислотопродукции

Узелками бушара называют костные разрастания, локализующиеся в области

- А. Дистальных межфаланговых суставов кисти
- Б. Проксимальных межфаланговых суставов стопы
- В. Проксимальных межфаланговых суставов кисти
- Г. Плюснефаланговых суставов

Доза дабигатрана этексилата у пациента в возрасте 84 года с тромбозом глубоких вен и синдромом старческой астении составляет _____ в день

- А. 220 Мг 1 раз
- Б. 150 Мг 1 раз
- В. 150 Мг 2 раза
- Г. 110 Мг 2 раза

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в целях

- А. Установления причинно-следственной связи заболевания с профессиональной деятельностью
- Б. Определения потребностей гражданина в мерах социальной защиты, включая реабилитацию на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма
- В. Определения способности работника осуществлять трудовую деятельность, необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу
- Г. Выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результат

Механизмом действия сальбутамола является

- А. Блокада α-рецепторов
- Б. Блокада гистаминорецепторов
- В. Стимуляция β-рецепторов
- Г. Снижение тонуса вагуса

Быстрому развитию эмфиземы лёгких способствует недостаточность

- А. Аденилатциклазы
- Б. Фосфодиэстеразы
- В. Альфа-1-антитрипсина
- Г. Лактатдегидрогеназы

Наличие моноклонового протеина (м-градиент) наименее характерно для

- А. Лимфоцитомы селезенки
- Б. Лимфосаркомы кишечника
- В. Хронического миелолейкоза
- Г. Хронического лимфолейкоза

Под гетерокинетичностью понимают

- А. Одновременное наступление старения всех органов и тканей
- Б. Равноценную выраженность процесса старения различных органов и тканей и разных структур одного органа
- В. Различную выраженность процесса старения органов и тканей, а также разных структур одного органа
- Г. Различную скорость развития возрастных изменений

Для профилактики падений при нарушениях походки при болезни паркинсона предпочтительно использование

- А. Костылей
- Б. Многоопорной трости
- В. Четырехколесных ходунков с тормозами
- Г. Одноопорной трости

Синдром мальдигестии в пожилом возрасте обусловлен _____ поджелудочной железы

- А. Сужением протоков
- Б. Снижением секреторной функции
- В. Неравномерностью протоков
- Г. Атрофией инсулярного аппарата

«Золотым стандартом» измерения мышечной массы для диагностики саркопении является

- А. Стабилометрия
- Б. Антропометрия
- В. Денситометрия
- Г. Спирометрия

К достоверным внепищеводным проявлениям гастроэзофагеальной рефлюксной болезни относят

- А. Миокардит
- Б. Полип носа
- В. Серозный менингит
- Г. Бронхиальную астму

Препаратом, потенциально увеличивающим риск развития делирия, является

- А. Омепразол
- Б. Дротаверин
- В. Диклофенак
- Г. Феназепам

В отношении санации пролежней верным является то, что

- А. Аутолитическая санация более избирательна и эффективна, чем механическая, но более медленная, чем энзимная
- Б. Хирургическая обработка пролежня противопоказана для пациента с сепсисом
- В. Обычно при санации используют антисептические и противомикробные растворы для обработки неинфицированных пролежней
- Г. Механическая санация безопасна для вновь образованных грануляций

Ранним рентгенологическим признаком центрального рака легких у пожилых является изменение

- А. Корня легкого
- Б. Верхушки легкого
- В. Купола диафрагмы
- Г. Плевры

К мероприятиям для пожилых пациентов, включенным в базовую программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, относят

- А. Санаторно-курортное лечение
- Б. Палиативную помощь
- В. Мероприятия по медицинской реабилитации
- Г. Медицинский уход

К побочным эффектам нейролептиков относят

- А. Паркинсонизм
- Б. Галлюцинации
- В. Бредовые расстройства
- Г. Лихорадку

Для язвенной болезни двенадцатиперстной кишки характерны

- А. Загрудинные боли во время еды
- Б. Боли в эпигастрии сразу после еды
- В. Схваткообразные боли в эпигастрии и левом подреберье
- Г. Ночные и «голодные» боли в эпигастрии

Доза апиксабана у пациента в возрасте 77 лет с неклапанной фибрилляцией предсердий, массой тела 58 кг и уровнем креатинина сыворотки 156 мкмоль/л составляет _____ в день

- А. 5 Мг 1 раз
- Б. 2,5 Мг 2 раза
- В. 5 Мг 2 раза
- Г. 2,5 Мг 1 раз

Наиболее характерным клиническим симптомом гликозидной интоксикации является

- А. Гипотония
- Б. Паркинсонизм
- В. Рвота
- Г. Бронхоспазм

Ведущим путем инфицирования при нозокомиальной пневмонии является

- А. Микроаспирация секрета ротоглотки
- Б. Гематогенная диссеминация
- В. Ингаляция микробного аэрозоля
- Г. Непосредственное распространение инфекции

Основу долгосрочного лечения персистирующей бронхиальной астмы составляют

- А. Ингаляционные кортикостероиды
- Б. Ингаляционные симпатомиметики длительного действия
- В. Блокаторы H1-рецепторов гистамина
- Г. Метилксантины пролонгированного действия

У лиц пожилого и старческого возраста в случае прекращения или пропуска приема глюкокортикостероидов с большой вероятностью следует ожидать

- А. Запоров
- Б. Повышения аппетита
- В. Нарушения сердечного ритма
- Г. Снижения артериального давления

Больному с острой дорсопатией рекомендуют

- А. Лечебную гимнастику
- Б. Упражнения на спортивных снарядах
- В. Постельный режим
- Г. Посильную физическую нагрузку

К органам-мишеням при гипертонической болезни относят

- А. Сердце, почки, сосуды
- Б. Скелетную мускулатуру
- В. Печень, артерии
- Г. Печень, сетчатку глаза

Признаком тяжёлого аортального стеноза является площадь отверстия аортального клапана (в см

2)

- А. 2-2,5
- Б. 1,5-2
- В. <1,0
- Г. 1-1,5

Доза дабигатрана этексилата у пациента в возрасте 83 года с тромбоэмболией лёгочной артерии и синдромом мальнутриции составляет _____ в день

- А. 110 Мг 2 раза
- Б. 220 Мг 1 раз
- В. 150 Мг 2 раза
- Г. 150 Мг 1 раз

Обязательным исследованием при подозрении на язвенную болезнь желудка является

- А. Интрагастральная рН-метрия
- Б. Электрогастрография
- В. Рентгеновское исследование желудка
- Г. Эзофагогастродуоденоскопия

Осложнением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни является

- А. Ахалазия кардии
- Б. Пищевод Барретта
- В. Диффузный спазм пищевода
- Г. Дивертикул Ценкера

Применение β -блокаторов у лиц пожилого возраста с сахарных диабетом может привести к

- А. Гипогликемии
- Б. Декомпенсации сахарного диабета
- В. Гипергликемии
- Г. Нарушению сердечного ритма

Характерным симптомом для болезни Альцгеймера является

- А. Гемианопсия
- Б. Нарушения походки
- В. Мозжечковая атаксия
- Г. Амнестическая афазия

Для синдрома интоксикации при туберкулезе характерна лихорадка

- А. Длительная, чаще субфебрильная, нарастающая в вечерние часы
- Б. Длительная, чаще субфебрильная, нарастающая в утренние часы до обеда
- В. В первый месяц болезни до фебрильных цифр ночью, отсутствие в дневное время
- Г. В первые две недели болезни, от субфебрильной до фебрильной в течение дня

Методом исследования, достаточным для подтверждения диагноза «трещина анального канала» у больных пожилого возраста, является

- А. Аноскопия
- Б. Колоноскопия
- В. Пальцевое исследование прямой кишки
- Г. Ректоскопия

Риск смерти при остром инфаркте миокарда оценивается по шкале

- А. CHILD-PUGH
- Б. HAS-BLED
- В. GRACE
- Г. CHA2DS2

Хроническое системное иммуновоспалительное заболевание соединительной ткани неизвестной этиологии, характеризующееся развитием симметричного эрозивно-деструктивного полиартрита и внесуставными проявлениями, называется

- А. Ревматоидный артрит
- Б. Остеоартроз
- В. Подагрический артрит
- Г. Анкилозирующий спондилоартрит

Базисным препаратом для лечения ревматоидного артрита является

- А. Метотрексат
- Б. Азатиоприн
- В. Белимумаб
- Г. Хондроитина сульфат

Признаками эмфизематозного типа хронической обструктивной болезни легких являются

- А. Розово-серый оттенок кожи, кахексия, позднее развитие и декомпенсация лёгочного сердца
- Б. Диффузный синий цианоз, абдоминальный тип ожирения, меньшая продолжительность жизни
- В. Более выраженная бронхиальная обструкция, более частые обострения, преобладание кашля над одышкой
- Г. Отеки, пастозность голеней и стоп, ожирение, акроцианоз

К медленно действующим препаратам, модифицирующим симптомы болезни при остеоартрите, относят

- А. Метотрексат
- Б. Диклофенак
- В. Сульфасалазин
- Г. Глюкозамина сульфат

Санаторно-курортное лечение противопоказано при

- А. Гепатите
- Б. Подагре
- В. Диабете
- Г. Кахексии

Для выявления нарушения дискриминационной чувствительности проверяют способность больного определить

- А. Два одновременно наносимых раздражения на близко расположенных участках поверхности тела
- Б. Место прикосновения при нанесении раздражения на различные участки тела
- В. Рисуемые на коже цифры, буквы, простые фигуры
- Г. На ощупь знакомые предметы

Мукозная киста в области суставов пальцев кисти у пациентов пожилого и старческого возраста является показанием для

- А. Назначения гормональной терапии
- Б. Назначения местных противовоспалительных средств
- В. Назначения физиолечения
- Г. Операции удаления кисты с обязательным гистологическим исследованием и пластикой дефекта

Признаками тромбоэмболии легочной артерии на ЭКГ является

- А. Замедление атрио-вентрикулярной проводимости
- Б. Резкая перегрузка левого предсердия;
- В. Полная блокада левой ножки пучка Гиса
- Г. Глубокие зубцы SI, QIII

Специфичность d-димера при подозрении на легочную эмболию составляет у лиц старше 80 лет приблизительно _____ %

- А. 20
- Б. 40
- В. 10
- Г. 60

Исследованием, которое в первую очередь показано женщине 70 лет, страдающей сахарным диабетом 2 типа и варикозной болезнью нижних конечностей, несколько раз терявшей сознание после подъема с постели утром, является

- А. Биохимический анализ крови
- Б. Электроэнцефалография
- В. Эхокардиография
- Г. Ортостатическая проба

Для исключения брадиаритмий у пожилых пациентов с жалобами на эпизоды потери сознания, в первую очередь, для дообследования проводят

- А. Суточное мониторирование ЭКГ
- Б. Электрокардиографию
- В. Электрофизиологическое исследование сердца
- Г. Чреспищеводную эхокардиографию

Лечением контрактуры дюпюитрена должен заниматься

- А. Врач-физиотерапевт
- Б. Массажист
- В. Врач-травматолог-ортопед общего профиля
- Г. Врач-хирург - специалист по кисти

Скрининг диабетической периферической нейропатии при сахарном диабете 2 типа проводят

- А. Через 5 лет от дебюта заболевания
- Б. С момента установления диагноза
- В. Через 2 года от дебюта заболевания
- Г. Через 10 лет от дебюта заболевания

На наличие суточного профиля артериального давления (АД) «овер диппер» («over dipper») указывает суточный индекс систолического АД

- А. 10 - 20% (Нормальное снижение АД в ночные часы)
- Б. <0 (Ночная гипертензия)
- В. <10% (Недостаточное снижение АД)
- Г. >20% (Чрезмерное снижение АД)

К наиболее частым причинам развития хронического панкреатита относят

- А. Эндокринные заболевания
- Б. Алкоголь и болезни билиарной системы
- В. Кишечные инфекции
- Г. Лекарственные препараты