

Тесты с вопросами по специальности «Гериатрия» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/geriatr/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Гериатрия» для аккредитации и других экзаменов (2000 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/geriatriya/

2) Гериатрия — ситуационные задачи

→ medik-otvet.ru/product/geriatria/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

При каких цифрах подозревается дефицит витамина Д?

- А. <30 нг / мл
- Б. <20 нг / мл
- В. <100 нг / мл
- Г. <400 нг / мл
- Д. <300 нг / мл

Установите соответствие между болезнью и возрастом его начала
Заболевание А. Ранняя болезнь Альцгеймера

Б. Поздняя Болезнь Альцгеймера В. Фронтотемпоральная деменция

Г. Рассеянный склероз Возраст начала

1. После 65 лет

2. 50-60 лет

3. 20-30 лет

4. До 65 лет

А. А-1, Б-3, В-2, Г-4

Б. А-3, Б-1, В-4, Г-2

В. А-4, Б-1, В-2, Г-3

Г. А-2, Б-4, В-3, Г-1

К инструментальной функции не относится

А. контроль финансов

Б. приготовление пищи

В. способность принять душ

Г. способность принять лекарства

Д. способность пользоваться телефоном

Что относится к методам борьбы с полипрагмазией?

А. Назначение базисной терапии

Б. Депрескрайбинг

В. Заместительная терапия

Г. Изменение пути введения лекарственного средства

Д. Интенсификацию терапии

Какие переломы не относятся к типичным остеопоротическим переломам?

А. Перелом лучевой кости

Б. Перелом шейки бедренной кости

В. Компрессионный перелом позвоночника

Г. Перелом черепа

Д. перелом дистального отдела бедренной кости

Чем характеризуется синдром микседематозного сердца?

А. Брадикардией

Б. Отрицательным зубцом Т на ЭКГ

В. Тахикардией

Г. Низким вольтажом зубцов на ЭКГ

Д. Кардиомегалией и выпотом в перикарде

Клиническая картина старческой астении не определяется

- А. уровнем АД
- Б. скоростью ходьбы
- В. силой рукопожатия
- Г. низкой физической активностью
- Д. непреднамеренной потерей веса

Какой целевой уровень диастолического АД у пациентов с сочетанием артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца 80 лет и старше?

- А. менее 90 мм рт.ст.
- Б. менее 85 мм рт.ст.
- В. менее 80 мм рт.ст.
- Г. менее 70 мм рт.ст., не рекомендуется снижать менее 60 мм рт.ст.
- Д. менее 80 мм рт.ст., не рекомендуется снижать менее 70 мм рт.ст.

Какая шкала обладает наиболее высокой чувствительностью и специфичностью в диагностике делирия?

- А. CAM
- Б. MDAS
- В. DOS
- Г. NEECHAM
- Д. RASS

Основным принципом лечения запора у пожилых является:

- А. назначение слабительных
- Б. назначение прокинетиков
- В. назначение агонистов серотониновых рецепторов
- Г. правильный рацион питания, включающий пищевые волокна и полноценный водный баланс, а также регулярная физическая нагрузка
- Д. физиолечение

Укажите абсолютные противопоказания к назначению глюкокортикоидов в начальной стадии астматического состояния:

- А. тяжелое течение гипертонической болезни
- Б. недостаточность кровообращения 3 ст
- В. нефрит
- Г. язвенная болезнь желудка и 12п.кишки
- Д. противопоказаний нет

Укажите диагностические критерии СД в пожилом возрасте

- А. Уровень глюкозы натощак в венозной плазме $>7,0$ ммоль/л
- Б. Уровень глюкозы при случайном определении $>7,0$ ммоль/л
- В. Уровень глюкозы через 2 часа после ОГТТ $>8,5$ ммоль/л
- Г. Уровень глюкозы при случайном определении $>11,0$ ммоль/л;
- Д. Уровень глюкозы натощак в капиллярной крови $> 6,1$ ммоль/л

Какие компоненты включает шкала «Возраст не помеха»?

- А. потерю массы тела, снижение зрения или слуха, травмы, связанные с падением во время последнего года, снижение настроения, снижение когнитивных функций, недержание мочи, трудности при перемещении по дому
- Б. потерю массы тела, снижение мышечной силы, повышенную утомляемость, недержание мочи, функциональную зависимость
- В. возраст старше 65 лет, снижение зрения, падения, снижение слуха, снижение массы тела
- Г. возраст старше 85 лет, потерю массы тела, падения, экстренные госпитализации в течение последнего года, полифармацию, снижение слуха и когнитивных функций
- Д. потерю массы тела, снижение мышечной силы, повышенную утомляемость, низкую скорость ходьбы, низкий уровень физической активности

Какое осложнение возможно при применении нейролептиков?

- А. нарушения зрения
- Б. паркинсонизм
- В. тазовые нарушения
- Г. нарушения слуха
- Д. нарушения обоняния

Укажите значения гемоглобина при анемии средней тяжести

- А. 80-109
- Б. 90-119
- В. 80- 119
- Г. 90-109

Назовите предпочтительные комбинации антигипертензивных препаратов в качестве терапии первой линии при сочетании артериальной гипертензии с другими сопутствующими заболеваниями Клинические ситуации А - Артериальная гипертензия и стенокардия Б - Артериальная гипертензия и хроническая сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса В - Артериальная гипертензия и хроническая болезнь почек 4 стадии Комбинации антигипертензивных препаратов

- 1) Дигидропиридиновый антагонист кальция и бета-блокатор
 - 2) ингибитор ангиотензинпревращающего фермента и петлевой диуретик
 - 3) ингибитор ангиотензинпревращающего фермента+бета-блокатор+диуретик
- А. А-2, Б-3, В-1
Б. А-3, Б-2, В-1
В. А-1, Б-2, В -3
Г. А-1, Б-3, В-2

Какое из утверждений относительно поведенческих и психических симптомов деменции является не верным?

- А. контроль за агрессивным поведением осуществляет гиппокамп, гипоталамус, ядра перегородки и миндалевидное ядро
Б. установлена связь между агрессивным поведением и дисфункцией дофаминергической и серотонинергической систем
В. выявление причины является решающим для планирования эффективных мероприятий по воздействию
Г. для бреда характерны идеи ущерба, воровства и ограбления
Д. галлюцинации являются наиболее частыми проявлениями психотических расстройств при деменции, обусловленной болезнью Альцгеймера

Выберите, что характерно для препаратов железа Препараты железа

- А) двухвалентные
Б) трехвалентные Признаки 1 низкомолекулярные соединения
2. высокомолекулярные соединения
3. медленно всасываются
4. быстро всасываются
5. не взаимодействуют с пищей
6. взаимодействуют с пищей
- А. А – 1,3,5, Б- 2, 4, 6
Б. А - 1, 4, 6, Б - 2, 3, 5
В. А – 2, 3, 5, Б – 1, 4, 6
Г. А – 2, 4, 5, Б – 1, 3, 6

Какой клинический симптом не характерен при возникновении пневмонии у лиц пожилого возраста?

- А. Слабость
- Б. Недомогание
- В. Кашель
- Г. Высокая лихорадка
- Д. Отсутствие повышения температуры тела

Какие комбинации препаратов являются нерациональными?

- А. БРА + диуретик
- Б. ББ + диуретик
- В. ББ + недигидропиридиновый АК
- Г. ИАПФ + ИАПФ
- Д. ББ + препарат центрального действия
- Е. ИАПФ + АК

Старость — это

- А. разрушительный процесс, результат нарастающей с возрастом недостаточности физиологических функций органов
- Б. созидательный процесс, результат жизненного опыта
- В. закономерно наступающий заключительный период возрастного развития
- Г. процесс, дестабилизирующий жизнедеятельность, уменьшающий продолжительность жизни
- Д. процесс, стабилизирующий жизнедеятельность, увеличивающий продолжительность жизни

Соотнесите лабораторные изменения и название синдрома Название синдрома:

- А. Тиреотоксикоз
 - Б. Синдром эутиреоидной патологии
 - В. Гипотиреоз
- Лабораторные изменения:
- 1. ТЗсв. норма или повышен, rТЗ норма, Т4св. норма или повышен, ТТГ понижен
 - 2. ТЗсв. снижен, ТЗ повышен, Т4св. норма, ТТГ норма
 - 3. ТЗсв. норма или снижен, rТЗ норма, Т4св. норма или снижен, ТТГ повышен
- А. А-2, Б-1, В-3
 - Б. В-1, Б-2, А-3
 - В. А-1, Б-3, В-2
 - Г. А-1, Б-2, В-3

При сочетании АГ с ХОБЛ или бронхиальной астмой препаратами выбора для лечения АГ являются

- А. ББ
- Б. АК дигидропиридиновые
- В. АК недигидропиридиновые
- Г. БРА
- Д. Диуретики
- Е. ИАПФ

Сложность в проведении нагрузочных проб у пожилых пациентов с целью верификации ИБС обусловлена:

- А. Исходно измененная ЭКГ затрудняют интерпретацию теста
- Б. Высокая частота ложноотрицательных тестов
- В. Высокая частота ложноположительных тестов
- Г. Снижение переносимости физических нагрузок
- Д. Нарушение координации, патология опорно-двигательного аппарата

Чем характеризуются изменения в нейроэндокринной системе при развитии старческой астении?

- А. повышением инсулинорезистентности, тонуса симпатической нервной системы, повышением продукции витамина Д, кортизола и тестостерона
- Б. снижением продукции гормона роста, тестостерона, эстрадиола, витамина Д
- В. снижением продукции половых гормонов, инсулина, кортизола, витамина Д
- Г. повышением активности адренокортикальных клеток, увеличением гормона роста и кортизола

**Установите соответствие между симптомом ХОБЛ и инструментом для его оценки
Симптом:**

- А. Тяжесть одышки
 - Б. Совокупное влияние симптомов ХОБЛ на КЖ
 - В. Степень тяжести обструкции
 - Г. Частота обострений в прошлом
- Инструмент оценки:**

- 1. САТ-тест
- 2. Показатель ОФВ%
- 3. данные ECLIPSE
- 4. шкала mMRC

- А. А-2, Б-1, В-3, Г-3
- Б. А-1, Б-3, В-2, Г-4
- В. А-1, Б-2, В-2, Г-4
- Г. А-4, Б-1, В-2, Г-3

При проведении исследований с внутривенным введением йодосодержащих рентгеноконтрастных препаратов у пациентов со СКФ <60 мл/мин/1,73 м² (ХБП С 3а-5 ст) необходимо:

- А. применять высокоосмолярные препараты
- Б. Отменить метформин, нестероидные противовоспалительные средства, диуретики, потенциально нефротоксичные препараты за 48 ч до процедуры
- В. Адекватная гидратация пациента с использованием физиологического раствора до, во время и после проведения исследования;
- Г. Применять гадолиниевые препараты на основе макроциклических хелатных комплексов.
- Д. Использовать максимально возможную дозу рентгеноконтрастного препарата

Какие нетипичные симптомы встречаются у пожилых пациентов с ХСН?

- А. Кашель
- Б. Усталость, раздражительность
- В. Дизурия
- Г. Диспепсические явления
- Д. Нарушение сна

Укажите цели при лечении 1 стадии ХСН

- А. Улучшение прогноза жизни
- Б. Улучшение качества жизни
- В. Предотвращение развития симптомной ХСН
- Г. Замедление прогрессирования болезни
- Д. Устранение симптомов ХСН

По какой шкале оценивается состояние питания при проведении КГО?

- А. MMSE
- Б. MNA
- В. MoCA
- Г. Barthel
- Д. IADL

Модель организации гериатрической службы в Российской Федерации состоит из

- А. научных центров и стационарных гериатрических отделений
- Б. 3 уровней
- В. амбулаторно-клинического и стационарного звена
- Г. гериатрических отделений/кабинетов, поликлиник для взрослых

Какой антиагрегант наиболее предпочтителен у пациентов с ОКС и эндоваскулярным вмешательством?

- А. Клопидогрел
- Б. Прасугрел
- В. Тикагрелор
- Г. Кангрелор

Синдром СА способствует развитию

- А. сердечной и дыхательной недостаточности
- Б. зависимости от посторонней помощи
- В. деменции
- Г. депрессии

Какое из нижеперечисленных утверждений в отношении недержания мочи является верным?

- А. Антимускариновые препараты являются препаратами выбора при лечении недержании мочи Б)) Г) Д)
- Б. Наиболее частым побочным эффектом антимускариновых препаратов является задержка мочи
- В. Альфа – адренергические препараты являются препаратами выбора при лечении недержании мочи
- Г. Оральные эстрогены являются препаратами выбора при лечении недержания мочи у женщин с атрофическим вагинитом
- Д. Альфа-адреноблокаторы являются препаратами выбора при лечении недержании мочи

Умышленное оставление пожилого человека в больнице, доме престарелых, торговом центре или других общественных местах это

- А. пренебрежение в рамках жестокого обращения с пожилыми
- Б. нарушение этики
- В. нарушение деонтологии
- Г. нарушение служебных обязанностей
- Д. нарушение прав пациента

Что наиболее характерно для лакунарных инсультов?

- А. Общемозговые симптомы
- Б. Менингеальные симптомы
- В. Очаговая симптоматика
- Г. Только гемипарез
- Д. Только дизартрия

Сопоставьте факторы риска и группы факторов риска Факторы риска:

А. Полипрагмазия

Б. Алкогольная зависимость

В. Болевой синдром

Г. Сенсорный дефицит Группы факторов:

1. Предрасполагающий фактор риска развития делирия

2. Провоцирующий фактор риска развития делирия

А. А – 1, Б – 1, В – 1, Г – 2

Б. А – 1, Б – 1, В – 2, Г – 1

В. А – 2, Б – 2, В – 1, Г – 2

Г. А – 2, Б – 1, В – 1, Г – 2

Какой тип кроветворения наблюдается при В12-дефицитной анемии?

А. немегалобластный

Б. мегалобластный

В. реактивный

Г. макроцитарный

Д. никакой из перечисленных

Какие показатели изменяются с возрастом?

А. функция пищеварительных желез

Б. чувствительность органов к гормонам

В. функция половых желез

Г. количество форменных элементов крови

Д. все вышеперечисленное

Какой подход в лечении является наиболее эффективным?

А. реориентирование

Б. назначение нейролептиков

В. фиксация пациента

Г. назначение седативных средств

При каких заболеваниях наблюдается остеопенический синдром?

А. Диффузном эндемическом зобе

Б. Узловым зобе

В. Тиреотоксикозе

Г. Передозировке тиреоидных гормонов

Д. Гипотиреозе

Какие основные признаки возрастных изменений артерий?

- А. Кальцинирование и повышение жесткости артерий
- Б. Увеличение толщины стенки артерий
- В. Атеросклероз артерий
- Г. Увеличение диаметра аорты
- Д. Увеличение эластичности артерий

Назовите лабораторные особенности СД 2 типа в пожилом возрасте

- А. Отсутствие гипергликемии натощак
- Б. Повышение почечного порога для глюкозы с возрастом
- В. Преобладание изолированной постпрандиальной гипергликемии
- Г. кетоацидоз

Назовите антидот к ЛС, который необходимо ввести в случае развития НР: Лекарственный препарат: А. Гепарин

- Б. Варфарин
- В. Дабигатрана этексилат
- Г. Парацетамол Антидот:

- 1. Протамина сульфат
- 2. Витамин К
- 3. идаруцизумаб
- 4. ацетилцистеин

- А. А-1; Б-2; В-3; Г-4
- Б. А-1; Б-4; В-2; Г-3
- В. А-4; Б-2; В-3; Г-1
- Г. А-4; Б-3; В-2; Г-1

В каком возрасте необходима отмена или снижение дозы антигипертензивных препаратов?

- А. Решение об отмене или снижении дозы антигипертензивного препарата не зависит от возраста пациента
- Б. Старше 75 лет
- В. Старше 80 лет
- Г. Старше 85 лет
- Д. Старше 90 лет

Особенностями деструктивного АИТ являются:

- А. Есть исходная патология ЩЖ
- Б. В терапии используются тиреостатики
- В. Чрезмерное высвобождение тиреоидных гормонов
- Г. В терапии используются ГКС в комбинации с тиреостатиками
- Д. Нет исходной патологии ЩЖ

Какой возбудитель пиелонефрита у пожилых больных является наиболее частым?

- А. кишечная палочка
- Б. протей
- В. синегнойная палочка
- Г. стафилококк
- Д. энтерококк

Какие гены претендуют на роль генов долголетия?

- А. Ген Апо А1
- Б. Ген Апо В
- В. Ген Апо Е
- Г. Ген супероксиддисмутазы SOD2
- Д. Ген ангиотензин-превращающего фермента (АСЕ)

Укажите причины высокой распространенности венозной тромбоэмболии у пожилых людей

- А. Высокая распространенность традиционных факторов риска
- Б. Нарушение функции почек/печени
- В. Высокая частота оперативных вмешательств
- Г. Изменения в системе гемостаза с возрастом
- Д. Частое обезвоживание, уменьшение ОЦК

При каком виде недержания мочи хирургическое лечение является наиболее эффективным?

- А. стрессового
- Б. императивного
- В. транзиторного
- Г. смешанного

Выберите тип и виды анемии Тип анемии:

А) Микроцитарная анемия

Б) Нормоцитарная анемия

В) Макроцитарная анемия Вид анемии:

1. Сидероахрестическая анемия

2. фолиеводефицитная анемия

3. Гемолитическая анемия

А. А-2, Б -3, В – 1

Б. А-3, Б-2, В- 1

В. А-1, Б -3, В-2

Г. А- 3, Б-1, В-2

Какие средства не рекомендованы к применению при ХСН?

- А. Антиаритмические препараты I класса
- Б. Верапамил
- В. Трициклические антидепрессанты
- Г. Глюкокортикоиды
- Д. Антикоагулянты

Что верно в отношении лечения пролежней?

- А. местные антибиотики показаны при лечении пролежней 2 стадии с признаками локального инфицирования
- Б. терапия, основанная на отрицательном давлении показана при лечении пролежней 2 стадии при наличии большого количества грануляций
- В. при наличии признаков системной инфекции показана хирургическая обработка пролежня
- Г. применение йода является адекватной местной терапией неинфицированного пролежня
- Д. коллагеновые повязки применяют для инфицированных пролежней

Укажите цели для проведения нагрузочных тестов у больных с СН

- А. Диагностика СН
- Б. Оценка функционального класса ХСН
- В. Определение степени риска
- Г. Оценка эффективности лечения

Какое из утверждений является не верным?

- А. при деменции с тельцами Леви паркинсонизм появляется раньше, чем развивается деменция
- Б. для кортико-базальной дегенерации характерно отсутствие тремора
- В. для мультисистемной атрофии характерно симметричное начало симптомов
- Г. для мультисистемной атрофии характерно отсутствие эффекта от терапии леводопой
- Д. для кортико-базальной дегенерации характерно отсутствие эффекта от терапии леводопой

В какой клинической ситуации какой препарат должен быть прекращен Клинические ситуации: А - Клиренс креатинина менее 15 Б - Длительно стоящий мочевого катетер В - Паркинсонизм Препараты 1- Прохлорперазин 2 - аликсабан 3 - доксазозин

- А. А - 1, Б - 3, В - 2
- Б. А - 3, Б - 2, В - 1
- В. А - 2, Б - 3, В - 1
- Г. А - 2, Б - 1, В - 3

Укажите условия применения фибринолитика (тканевой активатор плазминогена) при инфаркте мозга

- А. артериальное давление 200/120 мм рт.ст. и выше
- Б. Имеется лёгкая степень неврологического дефицита
- В. Прошло 6 часов и более с момента развития инсульта
- Г. Имеется тотальная афазия и гемиплегия
- Д. Имеется хроническая почечная недостаточность

Какая популяция населения является самой быстрорастущей?

- А. 100-летние
- Б. новорожденные
- В. 80-летние
- Г. 60-летние

С каким тромболитиком возможно применение фондапаринукса?

- А. Стрептокиназа
- Б. Алтеплаза
- В. Ретеплаза
- Г. Тенектеплаза

Какие микроорганизмы в старческом возрасте вызывают плеврит?

- А. стафилококк
- Б. синегнойная палочка
- В. пневмококк
- Г. туберкулезная микобактерия
- Д. все вышеперечисленное

Установите соответствие между заболеванием и симптомом Заболевание:

- А. Псевдодеменция
 - Б. Болезнь Паркинсона
 - В. Болезнь Альцгеймера
 - Г. Деменция с тельцами Леви
- Симптом:

1. Первичные нарушения памяти
2. Когнитивные нарушения при депрессии
3. Нарушения памяти, внимания и замедленность мышления
4. Зрительные галлюцинации

- А. А-1, Б-3, В-2, Г-4
- Б. А-3, Б-1, В-4, Г-2
- В. А-4, Б-1, В-2, Г-3
- Г. А-2, Б-3, В-1, Г-4

Что относится к поражению органов мишеней?

- А. Индекс Соколова-Лайона > 35 мм
- Б. УЗ признаки утолщения стенки артерии (ТИМ > 0,9)
- В. МАУ 30-300 мг/сут
- Г. Лодыжечно/плечевой индекс < 1.0
- Д. Клиренс креатинина < 60 мл/мин

Применение в-блокаторов у лиц пожилого возраста с сахарным диабетом может привести к:

- А. декомпенсации сахарного диабета
- Б. гипогликемии
- В. гипергликемии
- Г. гипертензии
- Д. нарушению сердечного ритма

Установите соответствие между заболеванием и симптомом

- Заболевание:**
- А. Псевдодеменция
 - Б. Болезнь Паркинсона
 - В. Болезнь Альцгеймера
 - Г. Деменция с тельцами Леви
- Симптом**
- 1. Первичные нарушения памяти
 - 2. Когнитивные нарушения при депрессии
 - 3. Нарушения памяти, внимания и замедленность мышления
 - 4. Зрительные галлюцинации
- А. А-1, Б-3, В-2, Г-4
 - Б. А-3, Б-1, В-4, Г-2
 - В. А-4, Б-1, В-2, Г-3
 - Г. А-2, Б-3, В-1, Г-4

Создание единой системы профессиональной подготовки специалистов по гериатрии не включает

- А. разработка профессиональных стандартов и модификация образовательных стандартов по гериатрии в соответствии с современным состоянием проблемы
- Б. разработка образовательными учреждениям высшего профессионального образования программы высшего профессионального образования (интернатура по специальности «гериатрия»)
- В. разработка образовательными учреждениям высшего профессионального образования программы дополнительного профессионального образования для терапевтов и врачей общей практики по гериатрии и программы высшего профессионального образования (ординатура по специальности «гериатрия»)
- Г. подготовка врачей первичного звена здравоохранения в рамках их квалификации по программам дополнительного профессионального образования по направлению «гериатрия», а медицинских сестер – по направлению «сестринское дело в гериатрии»

Укажите какие виды аэробной физической активности подходят для лиц старше 65 лет?

- А. для аэробной активности предполагается 30 минут упражнений умеренной интенсивности 5 дней в неделю; или минимум 20 минут занятий высокой интенсивности 3 дня в неделю; или комбинации умеренной интенсивности и занятий высокой интенсивности
- Б. для аэробной активности предполагается 60 минут упражнений умеренной интенсивности 5 дней в неделю; или минимум 40 минут занятий высокой интенсивности 3 дня в неделю
- В. для аэробной активности предполагается 5 минут упражнений умеренной интенсивности 5 дней в неделю; или минимум 10 минут занятий высокой интенсивности 3 дня в неделю; или комбинации умеренной интенсивности и занятий высокой интенсивности
- Г. для аэробной активности предполагается 2 часа упражнений умеренной интенсивности 5 дней в неделю или минимум 1 час занятий высокой интенсивности 3 дня в неделю

Как часто проводится противостолбнячная сыворотка лицам старше 65 лет?

- А. Однократно
- Б. Ежегодно
- В. Раз в 5 лет
- Г. Раз в 10 лет
- Д. Не проводится

Прием какого нейролептика у пациентов с деменцией ассоциирован с наименьшим риском смерти?

- А. оланзапин
- Б. галоперидол
- В. кветиапин
- Г. рисперидон
- Д. вальпроевая кислота

Какие показания для постановки имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора?

- А. Профилактика внезапной смерти при ишемической систолической дисфункции ЛЖ, ФВ $\leq$ 30-40% и ФК II или III
- Б. Больным с ишемической дисфункцией с ФВ $\leq$ 30-35% , ХСН I ФК с неустойчивыми пароксизмами ЖТ
- В. Больным с ХСН IV ФК с ФВ $\leq$ 35% с рецидивирующими устойчивыми пароксизмами ЖТ

Какое лекарство применяется для лечения болезни Альцгеймера?

- А. наком
- Б. циннаризин
- В. экселон
- Г. актовегин
- Д. карнитин

Какие рекомендации для пациентов со старческой астенией являются наиболее актуальными?

- А. по двигательной активности
- Б. по лекарственной терапии
- В. по питанию
- Г. по комплексу стратегий, направленных на улучшение функционального статуса пациента, включая двигательную активность, питание, социальную поддержку, благоустройство быта

Повышение общего периферического сопротивления связано с

- А. увеличением просвета периферических артерий
- Б. склерозированием просвета периферических артерий
- В. снижением кровоснабжения сердца
- Г. снижением кровоснабжения почек
- Д. склерозированием мелких венул

Какая локализация злокачественных новообразований является самой частой среди несвоевременно диагностированной?

- А. кишечник
- Б. желудок
- В. легкое
- Г. предстательная железа
- Д. поджелудочная железа

Что не относят к ожидаемым итогам внедрения гериатрической службы?

- А. Сокращение нагрузки на семейного врача на 11%
- Б. Снижение смертности на 16,3-19%
- В. Сокращение институализации на 23%
- Г. Сокращение нагрузки на семейного врача на 40%

Ортостатическая гипотензия включает снижение САД на

- А. 20 мм.рт.ст.
- Б. 30 мм.рт.ст.
- В. 40 мм.рт.ст.
- Г. 10 мм.рт.ст.
- Д. 5 мм.рт.ст.

Самый частый побочный эффект селективных ингибиторы обратного захвата серотонина:

- А. Тошнота
- Б. Головная боль
- В. Агранулоцитоз
- Г. Лейкопения
- Д. Нарушения ритма

Изменения грудной клетки в пожилом возрасте заключаются в:

- А. увеличении передне-заднего размера
- Б. расширении нижней апертуры
- В. росте отрицательного внутриплеврального давления
- Г. уменьшении передне-заднего размера
- Д. сужении нижней апертуры

Укажите ситуации, при которых требуется уменьшение дозы тироксина:

- А. Беременность
- Б. Мальабсорбция
- В. Старение
- Г. Прием эстрогенсодержащих препаратов
- Д. Усиленная физическая нагрузка

По какой шкале проводится скрининг депрессии при КГО?

- А. MMSE
- Б. MNA
- В. GDS
- Г. Barthel
- Д. IADL

Какие 2 вида анемии можно дифференцировать с помощью sTfR (растворимые рецепторы к трансферрину)?

- А. Анемия хронических заболеваний и гемолитическая анемия
- Б. Железодефицитная анемия и апластическая анемия
- В. В12-дефицитная анемия и фолиеводефицитная анемия
- Г. Любые 2 вида анемий
- Д. Анемия хронических заболеваний и железодефицитная анемия

Какие факторы способствуют атеросклеротическому поражению артерий у пожилых?

- А. Увеличение риска разрыва кальцинированной бляшки
- Б. Эндотелиальная дисфункция
- В. Снижение ответа на действие вазодилатирующих медиаторов
- Г. Кальцификация и фиброз атеросклеротической бляшки

Установите соответствие сопутствующих заболеваний/факторов риска ВП с вероятными возбудителями ВП: Фактор риска:

А. Пребывание в домах престарелых

Б. Подтверждённая или предполагаемая аспирация

В. Бронхоэктазы, муковисцидоз Возбудитель пневмонии:

1. P. aeruginosa, B. ceracia, S. aureus

2. Энтеробактерии, анаэробы

3. S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus, C. pneumoniae, анаэробы, энтеробактерии

А. А-3, Б-1, В-2

Б. А-2, Б-2, В-1

В. А-3, Б-2, В-1

Какое из утверждений является правильным?

А. старческая астения есть результат активации внутрисосудистого свертывания

Б. старческая астения развивается у всех людей в старческом возрасте

В. старческая астения не является неотъемлемой частью процесса старения

Г. старческая астения является исключительно проявлением психического ослабления и дефицита

Д. старческая астения способствует развитию нарушений углеводного обмена

Какое из приведенных утверждений является верным?

А. Удержание равновесия на одной ноге менее 5 секунд свидетельствует о повышенном риске падений

Б. Результат теста «Встань и иди» менее 10 секунд свидетельствует о повышенном риске падений

В. Использование в стационаре ограничителей для кроватей позволяет снизить частоту падений и травм, связанных с падениями

Г. Ожирение повышает риск травм, связанных с падением

Д. Падение вперед повышает риск перелома шейки бедра

Возраст-ассоциированными нарушениями ритма/проводимости сердца принято считать:

А. Дисфункция синусового узла

Б. Желудочковая экстрасистолия

В. Мерцательная аритмия

Г. Синусовая тахикардия

Д. Атриовентрикулярная блокада

Диагноз преастении устанавливается при наличии

А. легких симптомов астении

Б. одного из ведущих симптомов астении

В. обратимых симптомов астении

Г. одного или двух положительных ответов

Какой целевой уровень систолического АД у пациентов 65-79 лет при сочетании с хронической болезнью почек (согласно европейским рекомендациям 2018 года)?

- А. 130-139 мм рт.ст., если переносимость антигипертензивной терапии хорошая
- Б. 130-139 мм рт.ст., если переносимость антигипертензивной терапии хорошая, то снижать менее 130 мм рт.ст.
- В. менее 130 мм рт.ст., если переносимость антигипертензивной терапии хорошая
- Г. менее 140 мм рт.ст.
- Д. 120-129 мм рт.ст., если переносимость антигипертензивной терапии хорошая

При какой численности прикрепленного населения в возрасте 60 лет и старше рекомендовано организовывать гериатрический кабинет?

- А. 10 000 человек и более
- Б. не менее 30 000
- В. 5 000 человек и более
- Г. менее 20 000 человек

Выберите соединение, из которого представители микробиоты не могут метаболизировать триметиламин:

- А. Холин
- Б. Фосфатидилхолин
- В. L-карнитин
- Г. Ниацин

Для снижения риска падений отмена каких препаратов будет полезна у пожилых?

- А. Антибиотики
- Б. Антигипертензивные
- В. Нитраты
- Г. Бензодиазепины
- Д. Антациды

Каково количество пациентов страдающих деменцией во всём мире?

- А. 1 миллион
- Б. 10 миллионов
- В. 47 миллионов
- Г. 120 миллионов
- Д. 1 триллион

К эффектам РААС относятся

- А. Стимуляция САС
- Б. Высвобождение вазопрессина
- В. Апоптоз
- Г. Синтез ДНК и белков
- Д. Усиление жажды

Что характерно для возрастных изменений вегетативной регуляции ритма сердца?

- А. Снижение вариабельности ритма сердца
- Б. Повышение вариабельности ритма сердца
- В. Относительное преобладание симпатического тонуса ВНС
- Г. Относительное преобладание парасимпатического тонуса ВНС

У пожилых людей, не придерживающихся специальной диеты, выраженной считается потеря массы тела за 6 месяцев:

- А. 6,5% от предыдущего измерения
- Б. 3% от предыдущего измерения
- В. 2% от предыдущего измерения
- Г. 1% от предыдущего измерения
- Д. 2 кг по сравнению с предыдущим измерением

Установите соответствие между болезнью и степенью выраженности когнитивных расстройств Степень выраженности когнитивных расстройств:

- А. Субъективные КН
 - Б. Легкие КН
 - В. Умеренные КН
 - Г. Деменция Заболевания:
 - 1. Болезнь Альцгеймера
 - 2. Психогенные расстройства
 - 3. Дициркуляторная энцефалопатия 2 ст.
 - 4. Дисциркуляторная энцефалопатия 1 ст.
- А. А-1, Б-3, В-2, Г-4
 - Б. А-3, Б-1, В-4, Г-2
 - В. А-4, Б-1, В-2, Г-3
 - Г. А-2, Б-4, В-3, Г-1

Что играет наиболее важную роль в патофизиологии болезни Альцгеймера?

- А. дофаминергическая недостаточность
- Б. серотонинергическая недостаточность
- В. ацетилхолинергическая недостаточность
- Г. норадренергическая недостаточность
- Д. норадренергическая активация

Что из перечисленного не входит в мероприятия по реориентированию пациента?

- А. доступ дневного света в палату пациента
- Б. установка календаря и часов на видном месте
- В. ранняя мобилизация пациента
- Г. доступ родственников к пациенту

Какая функция не относится к базисной?

- А. способность самостоятельно умыться
- Б. способность одеться
- В. способность пользоваться телефоном
- Г. способность подняться по лестнице

В системе ОМС не финансируется

- А. организация и ведение школ для пациентов с возраст – ассоциированными заболеваниями и состояниями, а также для близких, осуществляющих уход
- Б. оплата сиделки для ослабленных лиц 75 лет и старше с индексом Бартел $\leq 60/100$ баллов
- В. коэффициент сложности курации, связанной с возрастом, для ослабленных лиц 75 лет и старше с индексом Бартел $\leq 60/100$ баллов (при условии включения дополнительных медицинских услуг для ослабленных пациентов ($K=1,2-1,8$))
- Г. стандарт специализированной медицинской помощи при старческой астении (МКБ R 54)

Какое из утверждений относительно противопаркинсонической терапии является не верным?

- А. использование антихолинэргических препаратов рекомендуется в группе пациентов старше 65 лет
- Б. принятие решения о начале противопаркинсонической терапии зависит от степени функциональных нарушений
- В. леводопа является препаратом выбора в группе пациентов старше 65 лет
- Г. отсутствие эффекта от приема 1000-1500 мг леводопы вызывает сомнения в правильности
- Д. резкое прекращение противопаркинсонической терапии может привести к развитию злокачественного нейролептического синдрома или акинетического криза

Сколько минут в среднем длится один цикл сна здорового человека?

- А. 10 минут
- Б. 30 минут
- В. 90 минут
- Г. 150 минут

Что верно в отношении повязок для лечения пролежней?

- А. сухие повязки лучше, чем влажные
- Б. алгинатные повязки позволяют быстрее зажить пролежням 3-4 стадии, чем гидроколлоидные
- В. повязки, содержащие серебро, применяются для неинфицированных пролежней с умеренным или большим количеством экссудата
- Г. прозрачные повязки применяются для пролежней с умеренным или большим количеством экссудата
- Д. Гидрогелевые повязки противопоказаны для инфицированных ран

Какое из утверждений относительно эссенциального тремора является не верным?

- А. дрожание распределяется преимущественно в верхней части тела – «руки-голова» или «голова-руки»
- Б. односторонний тремор встречается очень редко, при этом никогда не бывает тремора ноги
- В. уменьшение тремора при приеме алкоголя
- Г. препаратом выбора является пропранолол
- Д. препаратами выбора являются миорелаксанты

Наиболее эффективными муколитическими препаратами при хроническом бронхите у пожилых являются:

- А. Бромгексин
- Б. Мукалтин
- В. Термопсис
- Г. АЦЦ
- Д. Детергенты

У больного 78 лет выявлена доброкачественная гиперплазия предстательной железы, 500мл остаточной мочи, дилатация верхних мочевых путей, уровень мочевины крови 15,7. Ему показана:

- А. простатэктомия
- Б. трансуретральная резекция простаты
- В. длительная катетеризация мочевого пузыря
- Г. пункционная цистостомия
- Д. микроволновая терапия

Какую группу лекарственных препаратов желательно назначить при гипертонической форме хронического гломерулонефрита больным пожилого и старческого возраста?

- А. клофелин
- Б. Ганглиоблокаторы
- В. Мочегонные
- Г. ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
- Д. антагонисты кальция

Какой признак не входит в классическое определение фенотипа «хрупкости» по L.Fried?

- А. снижение веса
- Б. снижение зрения
- В. снижение физической активности
- Г. снижение скорости ходьбы
- Д. снижение силы рук

Выберите определение, характеризующее возможную причинно-следственную связь между НР и ЛС с клинической точки зрения:

- А. Клинические проявления НР, изменения лабораторных показателей возникают в период приема препарата, не могут быть объяснены наличием существующих заболеваний и влиянием других факторов. Проявления НР регрессируют после отмены ЛП и возникают вновь при повторном приеме/введении
- Б. Клинические проявления НР, изменения лабораторных показателей связаны по времени с приемом ЛП, вряд ли имеют отношение к сопутствующим заболеваниям или другим факторам и которые регрессируют с отменой препарата. Ответная реакция на повторное назначение препарата неизвестна
- В. Клинические проявления НР, изменения лабораторных показателей связаны по времени с приемом ЛП, но их можно объяснить наличием сопутствующих заболеваний или приемом других ЛП и влиянием химических соединений. Информация на отмену ЛП неясная.
- Г. Клинические проявления НР, изменения лабораторных показателей возникают при отсутствии четкой временной связи с приемом ЛП; присутствуют другие факторы (ЛП, заболевания, химические вещества), которые могут быть причиной их возникновения

Какое утверждение является верным?

- А. количество воды в организме у пожилых снижено, поэтому концентрация водорастворимых препаратов в крови может увеличиваться
- Б. Распределение лекарственных средств в старческом организме изменяется из-за увеличения веса тела
- В. в связи с увеличением в старческом организме количества жировой ткани, концентрация жирорастворимых веществ в крови уменьшается, объем их распределения увеличивается
- Г. распределение лекарственных средств в организме у пожилых уменьшается в связи со снижением скорости кровотока
- Д. концентрация альбуминов в организме у пожилых уменьшается, поэтому в крови увеличивается пропорция несвязанных лекарственных средств

Установите соответствие между препаратом и болезнью Заболевание:

А. Лечение сосудистой деменции

Б. Лечение болезни Альцгеймера

В. Лечение псевдодеменции

Г. Лечение субъективных когнитивных расстройств Препараты:

1. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы

2. Антидепрессанты

3. Психотерапия

4. Коррекция сердечно-сосудистых расстройств

А. А-1, Б-3, В-2, Г-4

Б. А-3, Б-1, В-4, Г-2

В. А-4, Б-1, В-2, Г-3

Г. А-2, Б-3, В-1, Г-4

Что не включает индивидуальный план ведения гериатрических пациентов?

А. социальная адаптация

Б. включение в додипломное образование врачей модуля по гериатрии

В. программа профилактики и лечения депрессии и деменции

Г. профилактика падений

Что характерно для пролежней 3 стадии?

А. на коже имеется покраснение

Б. кожа не повреждена

В. некроз достигает жировой ткани; язва выглядит как кратер

Г. в рану могут выстоять мышцы, кости и сухожилия

Д. поражение распространяется далеко за пределы первичного очага между слоями здоровых тканей

Какое назначение соответствует STOPP-критериям?

А. Пантопразол в дозе 80 мг для лечения язвенной болезни более 8 недель

Б. Клопидогрел в дозе 75 мг для лечения пациента с заболеванием артерий нижних конечностей атеросклеротического генеза

В. Аписабан в дозе 5 мг 2 раза в сутки у пациентки 77 лет, с креатинином 128 мкмоль/л, вес пациентки - 66 кг

Г. Пероральные препараты железа в дозе более 100 мг/сут

Д. Дигоксин в любой дозе при клиренсе креатинина менее 50 мл/мин

К когнитивным функциям относятся все, кроме

А. целенаправленные действия

Б. узнавание

В. атаксия

Г. внимание

Д. память

Выберите метаболит бактерий, являющийся основным источником питания колоноцитов:

- А. Бутират
- Б. Пропионат
- В. Ацетат
- Г. Фенилпропионат

Какие препараты относятся к препаратам первого выбора у пациентов с болезнью Паркинсона старше 65 лет?

- А. препараты леводопы
- Б. агонисты дофаминовых рецепторов
- В. антихолинэргические препараты
- Г. амантадин
- Д. ингибиторы катехол-орто-метил трансферазы

К основным ФР возникновения полипрагмазии относят:

- А. Европеоидная раса
- Б. Состояние в браке
- В. Наличие высокого дохода
- Г. Ранняя менопауза у женщин
- Д. Наличие вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем и др.)

Укажите показания к проведению СМАД

- А. Гипертония «белого халата»
- Б. Контроль за антигипертензивной терапией
- В. Эпизоды гипотонии
- Г. Высокие значение клинического АД у пациентов с малым числом факторов риска и отсутствием характерных для АГ изменений органов мишеней
- Д. Снижение СКФ

Особенностями гипогликемии в пожилом возрасте являются:

- А. Повышенная раздражительность
- Б. Стертость и невыраженность симптомов
- В. Спутанность сознания
- Г. Сложность выхода из состояния гипогликемии
- Д. выраженная тахикардия

Псевдодеменция – это

- А. нарушение памяти и внимания при дисметаболических расстройствах
- Б. возрастные изменения когнитивных функций
- В. когнитивные нарушения при депрессии
- Г. нарушение высших психических функций при опухоли мозга
- Д. нарушение высших психических функций после эпилептического приступа

Какой минимальный срок применения ДААТ при имплантации биоразлагаемых стентов?

- А. 1 месяц
- Б. 3 месяца
- В. 6 месяцев
- Г. 12 месяцев

Как часто рекомендовано проведение скрининга на рак молочной железы в виде маммографии женщинам до 70 лет?

- А. Ежегодно
- Б. Однократно
- В. Раз в 1-2 года
- Г. Раз в 10 лет
- Д. Не проводится

Какие критерии являются ключевыми для постановки диагноза ХСН?

- А. Наличие характерных симптомов СН Б
- Б. Наличие объективных признаков дисфункции сердца (в покое)
- В. Положительный ответ на терапию ХСН

Какие препараты рекомендованы для лечения АГ у больных с бессимптомным атеросклерозом?

- А. Антагонисты кальция
- Б. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
- В. Диуретики
- Г. Бета-адреноблокаторы

Показания для выполнения чреспищеводного ЭХО-КГ

- А. Подозрение на неисправность протеза аортального клапана
- Б. Исключение тромбоза ушка левого предсердия
- В. Нечеткое изображение при трансторакальном доступе

Что необходимо сделать при снижении настроения у пожилого человека?

- А. проконсультировать его у психиатра
- Б. организовать социальную поддержку
- В. назначить легкие антидепрессанты
- Г. дать рекомендации по улучшению бытовых условий пациента

Дайте определение вторичной профилактики?

- А. предупреждение возникновения самого заболевания, посредством учета модифицируемых и немодифицируемых факторов риска и их коррекции.
- Б. меры, способствующие раннему выявлению и лечению болезни с целью предотвращения формирования осложнений
- В. мероприятия, направленные на предотвращение инвалидизации и смерти в связи с развернутой формой уже осложненного заболевания
- Г. скрининг рака, раннее выявление нарушений слуха или ухудшения зрения, остеопороза, гипертонии, и аневризмы брюшной аорты

Какой из следующих показателей лучше отражает обструкцию дыхательных путей?

- А. остаточный объем
- Б. форсированная жизненная емкость легких
- В. объем форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1)
- Г. ОФВ1/ФЖЕЛ
- Д. ничего из перечисленного

Какой фактор риска относится к провоцирующему фактору риска развития делирия?

- А. гипоксия
- Б. нарушение зрения
- В. делирий в анамнезе
- Г. депрессия

Какова средняя длина теломер у человека?

- А. 15-30 тыс. пар нуклеотидов
- Б. 7-15 тыс. пар нуклеотидов
- В. 700-1500 пар нуклеотидов
- Г. 1500-3000 пар нуклеотидов

Какой метод исследования является скрининговым для рака шейки матки?

- А. Осмотр гинеколога
- Б. Трансвагинальное ультразвуковое исследование
- В. Определение специфических онкомаркеров
- Г. Тест Папаниколау
- Д. Гистероскопия

Для уменьшения полипрагмазии выберите лекарственный препарат для отмены в каждой конкретной клинической ситуации Клиническая ситуация

А. - Среднетяжелая ХОБЛ, вне обострения. Б - Венозная тромбоэмболия 2 месяца назад В - Пациент, перенесший 15 месяцев назад глубокий венозный тромбоз, весь этот период отсутствуют провоцирующие факторы риска венозного тромбоза Препараты 1 - Дабигатран 2 - Системные кортикостероиды 3 - Эстрогены

А. А - 1, Б - 3, В - 2

Б. А - 3, Б - 1, В - 2

В. А - 2, Б - 3, В - 1

Г. А - 2, Б - 1, В - 3

Признаки острого легочного сердца наблюдается или характерно:

А. при тотальной пневмонии

Б. при ТЭЛА или тромбозе ветвей легочной артерии

В. при астматическом статусе

Г. при спонтанном пневмотораксе

Д. все верно

Укажите провоспалительные медиаторы

А. Простагландины

Б. Цитокины

В. Тропонин

Г. Гистамин

Д. D-димер

Какой препарат, согласно STOPP-критериям нельзя применять при глаукоме?

А. Пароксетин

Б. Атенолол

В. Ипратропиума бромида (ингаляционный прием)

Г. Ацетилсалициловая кислота

Д. Омепразол

Какая из нижеперечисленных причин вторичной артериальной гипертонии характерна для пожилых пациентов в отличие от пациентов молодого и среднего возраста?

А. Коарктация аорты

Б. Заболевания щитовидной железы

В. Синдром Кушинга

Г. Обструктивное апное сна

Д. Фибромускулярная дисплазия

Какое из утверждений является неверным?

- А. в норме начиная с 5-го десятилетия жизни гибнет 1% клеток черной субстанции каждые 10 лет
- Б. симптоматика болезни Паркинсона появляется при гибели более 50% клеток черной субстанции
- В. симптоматика болезни Паркинсона появляется при снижении уровня дофамина в полосатом теле на 80-85%
- Г. основная гибель нейронов происходит за несколько лет до манифестации клинических симптомов или в первые 2-3 года
- Д. наличие телец Леви – один из признаков болезни Паркинсона

Основные нефармакологические аспекты лечения ХСН у пожилых людей включают в себя:

- А. Повышение калорийности питания
- Б. Ограничение потребления соли
- В. Вакцинация
- Г. Увеличение физических нагрузок
- Д. Контроль веса

Укажите особенности терапии АГ у пожилых пациентов с СД

- А. Препаратами выбора при монотерапии артериальной гипертензии являются тиазидные диуретики
- Б. Не рекомендуется резко снижать АД
- В. Препаратами выбора при монотерапии артериальной гипертензии являются блокаторы РААС
- Г. Целесообразно использовать схему этапного (ступенчатого) снижения
- Д. Целевое САД у больных пожилого возраста составляет <120 мм рт. ст

Какова доля людей старше 80 лет, переносящих падение как минимум 1 раз в год ?

- А. 5%
- Б. 10%
- В. 50%
- Г. 80%
- Д. 95%

Что такое гомеостеноз?

- А. условия самоконтроля
- Б. условия окружающей среды
- В. глобальное изменение функций организма по мере старения
- Г. сохранение функций организма

Какой тип вакцины одобрен к использованию у пожилых людей?

- А. высокодозовая инактивированная вакцина против гриппа
- Б. низкодозовая инактивированная вакцина против гриппа
- В. живая интраназальная вакцина
- Г. живая комбинированная вакцина
- Д. анатоксины

Какая нейротрансмиттерная система участвует в патогенезе делирия?

- А. серотонинергическая система
- Б. холинергическая система
- В. гистаминовая система
- Г. ГАМК – ергическая система

По какой шкале при проведении КГО оценивается инструментальная функциональная активность?

- А. MMSE
- Б. MNA
- В. GDS
- Г. Barthel
- Д. IADL

Особенностями сердечно-сосудистой системы при тиротоксикозе являются:

- А. Увеличение размеров сердца отмечается только при появлении мерцательной аритмии и обусловлено дилатацией желудочков
- Б. Увеличение размеров сердца на ранних стадиях заболевания
- В. Редкость инфаркта миокарда
- Г. Частое развитие инфаркта миокарда
- Д. Сердечная недостаточность развивается по правожелудочковому типу

Что является противопоказаниями для проведения теста на толерантность к глюкозе?

- А. Возраст старше 45 лет
- Б. ГСД в анамнезе
- В. Дислипидемия
- Г. Уровень глюкозы в крови натощак более 7 ммоль/л
- Д. Ожирение

Каковы причины снижения метаболизма лекарственных средств в пожилом возрасте?

- А. уменьшение индукции ферментативных процессов в печени
- Б. уменьшение печеночного кровотока
- В. уменьшение почечного кровотока, клубочковой фильтрации и канальцевой секреции
- Г. изменение липидного спектра крови
- Д. увеличение количества воды в организме

Что такое апраксия?

- А. нечеткость произношения (неразборчивость речи)
- Б. нарушение узнавания при сохранности зрения
- В. утрата речевых способностей как средства выражения мысли
- Г. нарушение координации движений
- Д. нарушение целенаправленных движений

Какие расстройства сна при инсомнии принято относить к интрасомническим?

- А. Частые ночные пробуждения
- Б. Трудности засыпания
- В. Более раннее чем обычно пробуждение по утрам.
- Г. Ночной храп

Какое из утверждений относительно поведенческих и психических симптомов деменции является не верным?

- А. симптомы депрессии выявляются более, чем у 30% пациентов
- Б. возбуждение или агрессия может быть основным проявлением депрессии у пациента с деменцией
- В. в основе нарушений сна может лежать тревога, ноктурия, побочные действия лекарств
- Г. инфекции и токсическое действие лекарств являются редкой причиной изменения поведения у пациентов с деменцией
- Д. пациенты с тяжелой деменцией как правило не могут сообщить самостоятельно об испытываемой боли или дискомфорте

О чем свидетельствует результат 15 баллов при оценке по краткой шкале питания?

- А. об отсутствии проблем с питанием
- Б. о наличии опасности недоедания
- В. о наличии недостаточности питания
- Г. о переедании
- Д. о избыточной калорийности пищевого рациона

Какая тройная комбинация антигипертензивных препаратов рекомендуется на втором этапе при неосложненной артериальной гипертензии?

- А. ингибитор ангиотензинпревращающего фермента+ бета-блокатор+ диуретик
- Б. ингибитор ангиотензинпревращающего фермента+ дигидропиридиновый антагонист кальция+ антагонист альдостерона
- В. Бета-блокатор+ антагонист кальция+ диуретик
- Г. ингибитор ангиотензинпревращающего фермента + антагонист кальция + диуретик
- Д. ингибитор ангиотензинпревращающего фермента+ дигидропиридиновый антагонист кальция+ бета-блокатор

Возрастное уменьшение жизненной емкости легких связано с:

- А. ригидностью грудной клетки
- Б. снижением силы дыхательных мышц
- В. уменьшением эластичности легких
- Г. увеличением силы дыхательных мышц
- Д. увеличением эластичности легких

Для тиреотоксического криза характерно все, кроме:

- А. Похудания
- Б. Симптома Хвостека
- В. Гипертермии
- Г. Тахикардии
- Д. Нервно-психических расстройств

Что характерно для ОКС в пожилом возрасте?

- А. Чаще ОКС с подъемом сегмента ST
- Б. Чаще ОКС без подъема сегмента ST
- В. Атипичная клиническая картина
- Г. Типичная клиническая картина

Наименьшая ассоциация препарата СМ с ИМ и риском смерти от него наблюдается у:

- А. Глибенкламида
- Б. Глимепирида
- В. Гликлазида
- Г. Старых препаратов сульфонилмочевины
- Д. Глипизиды

Какова длина дистанции, которую проходит пациент в тесте «Встань и иди»?

- А. 3 метра
- Б. 2 метра
- В. 10 метров
- Г. 0,5 метра

К какой группе факторов риска возникновения нарушения сна у пожилых людей согласно концепции С.А. Fragozo относится такой фактор как одиночество?

- А. Провоцирующий фактор
- Б. Предрасполагающий фактор
- В. Социальный фактор
- Г. Поддерживающий фактор

Какой из препаратов нельзя назначать пациенту с простатитом (задержка мочи в анамнезе)?

- А. Флуоксетин
- Б. Пароксетин
- В. Циталопрам
- Г. Амитриптилин
- Д. Алпразолам

Старческая астения связана с повышением риска

- А. инсульта
- Б. деменции
- В. полиорганной недостаточности
- Г. институализации

Частота падений среди пожилых людей может увеличиваться при

- А. переселении на новое место
- Б. ношении бедренного протектора
- В. длительном проживании на одном месте
- Г. принятии душа в положении сидя
- Д. использовании ночника

В каком возрасте люди относятся к пожилым?

- А. 45-59
- Б. 60-74
- В. 75-80
- Г. 81-90
- Д. 90 и более

Что может приводить к деменции?

- А. лобно-височная дегенерация
- Б. ревматоидный полиартрит
- В. синингомиелия
- Г. рассеянный склероз
- Д. полинейропатия

Укажите препарат для лечения АГ у пожилых больных с изолированной систолической гипертензией

- А. Антагонисты кальция
- Б. Блокаторы рецепторов AT1
- В. Диуретики
- Г. Бета-адреноблокаторы

Распространенность остеопении у женщин в менопаузе составляет?

- А. 1%
- Б. 37%
- В. 100%
- Г. 50%
- Д. 18%

Какое из утверждений относительно пролежней является верным?

- А. пролежни 1 стадии обычно требуют 3-6 недель оптимального лечения
- Б. образование струпа является результатом повреждения крупного сосуда
- В. недержание мочи несет больший риск развития пролежней, чем недержание кала
- Г. в отделениях, оказывающих экстренную помощь, оценка риска развития пролежней проводится каждые 12 часов
- Д. после санации пролежня транзиторная бактериемия достигает 50%

Соотнесите название сахароснижающего препарата и особенности действия или введения
Препарат:

- А. Аспарт (НовоРapid)
 - Б. Деглюдек (Тресиба)
 - В. Лираглутид (Виктоза)
 - Г. Линаглиптин (Тражента)
- Особенности действия/механизм введения**
- 1. Сахароснижающий препарат из группы инкретиномиметиков с инъекционной формой введения
 - 2. Инсулин короткой продолжительности действия
 - 3. Ингибитор ДПП-4
 - 4. Инсулин сверхдлительного действия
- А. А-3, Б - 2, В – 1, Г- 4
 - Б. А-2, Б - 1, В – 4, Г- 3
 - В. А-2, Б – 4, В-1, Г-3
 - Г. А-3, Б-4, В-1, Г-2

К рациональным антигипертензивным комбинациям двух препаратов относятся

- А. ИАПФ + диуретик
- Б. ББ + ИАПФ
- В. БРА + АК
- Г. ББ + дигидропиридиновый АК
- Д. ББ + БРА

Как часто рекомендуется проведение скрининга колоректального рака в виде анализа кала на скрытую кровь лицам среднего риска в возрасте 50 до 75 лет?

- А. Ежегодно
- Б. Однократно
- В. Раз в 5 лет
- Г. Раз в 10 лет
- Д. Не проводится

Укажите показание к каротидной эндартерэктомии у больного с транзиторными ишемическими атаками

- А. стеноз внутренней сонной артерии более 70% диаметра
- Б. окклюзия внутренней сонной артерии
- В. стеноз внутренней сонной артерии 50-69% диаметра
- Г. стеноз внутренней сонной артерии менее 50 % диаметра
- Д. двусторонний стеноз внутренней сонной артерии менее 50 % диаметра

К возрастным изменениям функционирования желчных путей относится:

- А. повышении тонуса сфинктера Одди при наличии юстапапиллярного дивертикула
- Б. повышении сократительной способности желчного пузыря
- В. увеличение объема желчного пузыря при исследовании нато-щак
- Г. снижении сократительной способности желчного пузыря
- Д. повышении тонуса сфинктера Одди: расширении общего желчного протока

Какое значение Т-критерия соответствует остеопорозу при проведении DXA-денситометрии?

- А. от +2,5 до -0,9
- Б. от -1 до - 2,4
- В. $\leq -2,5$
- Г. $\geq +2,5$
- Д. ≥ 1

Согласно критериям DSM-V для делирия не характерно

- А. нарушение внимания
- Б. колебания в течение дня
- В. развитие в течение короткого периода времени (часы, дни)
- Г. развившиеся нарушения можно объяснить существующим нейрокогнитивным заболеванием

У какой группы пациентов наблюдательные исследования не выявили достоверной связи между смертностью и высоким АД?

- А. У хрупких пациентов (скорость ходьбы <0.8 м/с)
- Б. У хрупких пациентов (скорость ходьбы <0.2 м/с)
- В. У хрупких пациентов (скорость ходьбы <1.8 м/с)
- Г. У крепких пациентов (скорость ходьбы <0.8 м/с)
- Д. У крепких пациентов (скорость ходьбы <0.2 м/с)

Что характерно для тяжёлых когнитивных расстройств?

- А. деменция
- Б. жалобы на нарушения памяти
- В. поведенческие расстройства
- Г. агнозии
- Д. апраксии

Дифференциально-диагностические признаки микроцитарных анемий Вид анемии:

А) железодефицитная анемия

Б) анемия хронический заболеваний Дифференциально-диагностические признаки

1. Нормальный уровень ферритина
2. Низкий уровень ферритина
3. Нормальный уровень растворимых рецепторов к трансферрину
4. Высокий уровень растворимых рецепторов к трансферрину
5. Нормальный уровень СРБ
6. Высокий уровень СРБ

- А. А – 1,3,5, Б- 2,4,6
- Б. А- 1, 4, 6, Б -2, 3, 5
- В. А – 2, 3, 5, Б – 1, 4, 6
- Г. А – 2, 4, 5, Б – 1, 3, 6

Сопоставьте представленные факторы риска с группой факторов риска нарушений сна у пожилых людей по концепции С.А. Fragoso Факторы риска

- А. Полиморбидность
- Б. Потребность в постороннем уходе
- В. Возрастные физиологические изменения сна Группа факторов риска

1. Предрасполагающие факторы
2. Провоцирующие факторы
3. Поддерживающие факторы

- А. А-2, Б-3, В-1
- Б. А-3, Б-1, В-2
- В. А-1, Б-2, В-3

Какие сахароснижающие препараты не вызывают гипогликемии и прибавки массы тела?

- А. препараты сульфонилмочевины
- Б. глиниды
- В. бигуаниды
- Г. тиазолидиндионы
- Д. инсулин

Назовите причины снижения интенсивности боли при инфаркте миокарда у пожилых людей?

- А. усиление воспалительной реакции
- Б. ослабление воспалительной реакции
- В. повышение порога болевой чувствительности
- Г. снижение порога болевой чувствительности
- Д. усиление аллергической реакции

Какой пункт не включает в себя шкала FRAX?

- А. рост
- Б. прием глюкокортикоидов
- В. пол
- Г. возраст
- Д. прием заместительной гормональной терапии

У пациента при проведении полисомнографии выявлен синдром обструктивного апноэ сна, индекс апноэ/гипопноэ –

16. Какой степени тяжести апноэ сна соответствует данный показатель?

- А. Легкая степень
- Б. средняя степень
- В. тяжелая степень
- Г. соответствует нормальным допустимым значениям

. Соотнесите распространенности саркопении в различные возрастные периоды Возраст:

А. Старше 80 лет

Б. 65-70 лет

В. 18 лет Распространенность саркопении:

1. ≥ 50%

Б. 0%

В. 13-24%

А. А-2, Б-3, В-1

Б. А-1, Б-3, В-2

В. А-2, Б-1, В-3

Г. А-3, Б-2, В-1

Сколько людей можно отнести к физиологически стареющим?

- А. 1-2% пожилых и старых людей
- Б. 3-6% пожилых и старых людей
- В. 7-10% пожилых и старых людей
- Г. 10-15% пожилых и старых людей
- Д. 15-20% пожилых и старых людей

На какой период времени возможно продлить прием ДААТ у пациентов с ОКС после эндоваскулярного вмешательства и высоким риском ишемических событий по шкале DAPT SCORE:

- А. более 30 месяцев
- Б. 12 месяцев
- В. 6 месяцев
- Г. 3 месяца

Укажите критерии диагностики ортостатической гипотензии

- А. снижение систолического АД на 10 мм рт. ст. или диастолического АД на 5 мм рт. ст. в течение 3-х минут после перехода из горизонтального в вертикальное положение
- Б. снижение систолического АД до уровня 100 мм рт. ст. в течение 3-х минут после перехода из горизонтального в вертикальное положение
- В. снижение диастолического АД до уровня 60 мм рт. ст. в течение 3-х минут после перехода из горизонтального в вертикальное положение
- Г. снижение систолического АД на 20 мм рт. ст. и более или диастолического АД на 10 мм рт. ст. и более или снижение систолического АД до уровня менее 90 мм рт. ст. в течение 3-х минут после перехода из горизонтального в вертикальное положение
- Д. повышение систолического АД на 10 мм рт.ст. или диастолического АД на 5 мм рт. ст. в течение 3-х минут после перехода из горизонтального в вертикальное положение

Фенотипическая модель хрупкости патогенетически тесно связана с

- А. саркопенией
- Б. полиморбидность
- В. мальнутрицией
- Г. сенсорными дефицитами

Какой процент распространённости деменции в возрасте 65-70 лет?

- А. 50%
- Б. 40%
- В. 5%
- Г. 25%
- Д. 15%

Укажите количество баллов, соответствующее вероятной причинно-следственной связи в соответствии с алгоритмом Наранжо

- А. 9 и более баллов
- Б. 5-8 баллов
- В. 1-4 балла
- Г. 0 и менее баллов

Что не включает профилактика старческой астении?

- А. физическую активность
- Б. сбалансированное питание
- В. скрининг на онкозаболевания
- Г. лечение основного заболевания: АГ, СД, остеопороза, ожирения и т.д.
- Д. устранение метаболических и гормональных дефицитов (вит. Д, В12, фолиевая кислота, тиреотропного гормона и т.д.), санация очагов инфекции

Какое из утверждения не верно в отношении доброкачественного парциального позиционного головокружения?

- А. проявляется внезапными сильными приступами системного головокружения
- Б. возникает при определенном положении головы или переворачивании на бок
- В. причиной возникновения являются фрагменты отолитовой мембраны эллиптического мешочка, которые при свободном перемещении проникают в эндолимфатическое пространство полукружных каналов
- Г. сопровождается тугоухостью, шумом в ушах и головной болью
- Д. диагноз устанавливается на основании анамнеза и положительной пробы Дикса-Холлпайка

Продолжительность рациональной гормональной терапии больных раком предстательной железы должна быть следующей:

- А. 1 год
- Б. 2 года
- В. 5 лет
- Г. 10 лет
- Д. До конца жизни

Какие препараты являются препаратами первого выбора у пациентов с болезнью Паркинсона старше 65 лет?

- А. препараты леводопы
- Б. агонисты дофаминовых рецепторов
- В. антихолинэргические препараты
- Г. амантадин
- Д. ингибиторы катехол- орто-метил трансферазы

Цель гликемического контроля у функционально-зависимых пожилых пациентов с деменцией составляет

- А. <6,5
- Б. <8,5
- В. <7,0
- Г. <7,5
- Д. <9,5

Морфологические изменения при доброкачественная гиперплазии предстательной железы выявляются в:

- А. Семенных пузырьках
- Б. Семенном бугорке
- В. Центральной зоне предстательной железы
- Г. Шейке мочевого пузыря
- Д. Купферовых железах

В какой области головного мозга наиболее выражена атрофия при болезни Альцгеймера?

- А. в лобной доле
- Б. в височной доле
- В. в стволе
- Г. в затылочной доле

Что способствует преждевременному старению?

- А. перенесенные заболевания
- Б. неблагоприятные факторы внешней среды
- В. стрессы
- Г. социальные факторы
- Д. социоэкономические факторы

Какие методы попадают под категорию третичной профилактики?

- А. Скрининг рака, раннее выявление нарушений слуха или ухудшения зрения, остеопороза, гипертонии, и аневризмы брюшной аорты
- Б. Идентификация когнитивных проблем, нарушения походки и равновесия, недоедания и недержания мочи
- В. Прививки, модификация образа жизни (отказ от курения, пропаганда физической активности)
- Г. Только скрининг и вакцинация

Согласно EPIC-Norfolk Prospective Population Study коррекция одного фактора ЗОЖ добавляет

- А. + 3.5 года
- Б. + 5.5 лет
- В. + 3.0 года
- Г. + 1.5 года

У пожилых пациентов систолическое артериальное давление нежелательно снижать ниже _____ мм.рт.ст.

- А. 145
- Б. 135
- В. 130
- Г. 140

Компрессионный перелом тела позвонка 3 степени – это снижение высоты тела позвонка в переднем, среднем или заднем отделах по сравнению с другими отделами этого же позвонка (в процентах)

- А. На 30
- Б. Более, чем на 40
- В. Не менее, чем на 50
- Г. На 20

Нерациональными комбинациями в лечении артериальной гипертензии считают

- А. Бета-адреноблокаторы + диуретик
- Б. Ингибиторы АПФ + сартан
- В. Ингибиторы АПФ + диуретик
- Г. Ингибиторы АПФ + блокаторы медленных кальциевых каналов

Доза апиксабана у пациента в возрасте 86 лет с неклапанной фибрилляцией предсердий, массой тела 69 кг, уровнем креатинина сыворотки 94 мкмоль/л и синдромом старческой астении составляет _____ в день

- А. 2,5 Мг 2 раза
- Б. 2,5 Мг 1 раз
- В. 5 Мг 2 раза
- Г. 5 Мг 1 раз

У лиц пожилого и старческого возраста при приеме трициклических антидепрессантов повышен риск возникновения

- А. Синкопальных состояний, закрытоугольной глаукомы
- Б. Диареи, тахикардии
- В. Подагры, гиперкалиемии
- Г. Расстройств сна, недержания мочи

Главным критерием диагностики ревматизма является

- А. Наличие кардита
- Б. Развитие лейкоцитоза
- В. Появление С-реактивного белка
- Г. Симптом бабочки на лице

Способностью снижать секрецию соляной кислоты париетальными клетками желудка обладает

- А. Сукральфат
- Б. Фамотидин
- В. Висмута трикалия дицитрат
- Г. Альмагель

О деструкции легочной ткани с достоверностью свидетельствуют

- А. Кристаллы Шарко – Лейдена
- Б. Эластические волокна
- В. Эритроциты и лейкоциты
- Г. Спирали Куршмана

Лейкоцитурия является наиболее характерным симптомом при

- А. Гломерулонефрите
- Б. Пиелонефрите
- В. Нефролитиазе
- Г. Амилоидозе

Диарея и кишечное кровотечение часто развиваются в начале

- А. Неспецифического язвенного колита
- Б. Дизентерии
- В. Хронического энтерита
- Г. Болезни Крона

У больных хронической обструктивной болезнью лёгких решающую роль в возникновении тромбоэмболии лёгочной артерии играет

- А. Полицитемия и повышение свёртываемости крови
- Б. Нарушение гемодинамики в малом круге кровообращения
- В. Дыхательная недостаточность
- Г. Склонность к затяжному течению обострений и рецидивам

Типичным симптомом гастроэзофагеального рефлюкса принято считать

- А. Загрудинную боль
- Б. Изжогу
- В. Икоту
- Г. Дисфагию

Регионарными метастазами рака легкого являются

- А. Надключичные
- Б. Трахеобронхиальные
- В. Шейные
- Г. Парааортальные

У пациента с гипертоническим кризом допустимо снижение артериального давления в первые часы

- А. Менее чем на 10%
- Б. Более чем на 25%
- В. До целевых цифр АД
- Г. Менее чем на 25%

Изменение сахароснижающей терапии, при ее неэффективности выполняют не позднее чем через __ месяца/месяцев

- А. 9
- Б. 6
- В. 3
- Г. 12

Рак ободочной кишки чаще всего метастазирует в

- А. Печень
- Б. Кости
- В. Большой сальник
- Г. Головной мозг

Достоверно увеличивает продолжительность жизни

- А. Симвастатин
- Б. Клофибрат
- В. Пробукол
- Г. Омега-3 триглицериды

Препаратом с наименьшим риском развития желудочно-кишечных кровотечений, язв, диспепсии у больных пожилого возраста является

- А. Напроксен
- Б. Целекоксиб
- В. Нимесулид
- Г. Эторикоксиб

Ортостатическая гипотония определяется как снижение систолического артериального давления более чем на _____ мм рт. Ст. Или диастолического давления более чем на _____ мм рт. Ст. Через _____ минуты/минут пребывания в положении стоя

- А. 50; 10; 3
- Б. 60; 20; 7
- В. 20; 10; 3
- Г. 30; 20; 7

Гипотензивный эффект ганглиотиков у пожилых пациентов

- А. Менее выражен
- Б. Отсутствует
- В. Более выражен
- Г. Без закономерности

Протяженность маршрута ходьбы для больных на щадящем режиме составляет не более (в метрах)

- А. 2600-3000
- Б. 2100-2500
- В. 1000-1500
- Г. 1600-2000

Функциональная многоканальная стимуляция мышц во время ходьбы пациентам, перенесшим эндопротезирование коленного сустава, назначается в _____ периоде

- А. Отдаленном послеоперационном
- Б. Раннем послеоперационном
- В. Позднем послеоперационном
- Г. Предоперационном

Самой частой причиной отрицательной гемокультуры при инфекционном эндокардите является

- А. Низкий уровень бактериемии
- Б. Предшествующее лечение антибиотиками
- В. Недостаточное количество проб крови для посева
- Г. Небактериальный агент, как причина эндокардита (например, грибы)

Желудочковая экстрасистолия, приводящая к гемодинамическим нарушениям в остром периоде инфаркта миокарда, является показанием к терапии

- А. Алупентом
- Б. Сердечными гликозидами
- В. Лидокаином
- Г. Верапамилом

Если у больного остро повысилась температура тела до 39°С, появились озноб, грубый лающий кашель, осипший голос, шумное стенотическое дыхание, боли в горле, выраженная краснота ротоглотки, то вероятным диагнозом является

- А. Герпетическая инфекция
- Б. Грипп
- В. Респираторно-синцитиальная инфекция
- Г. Парагрипп

К препаратам выбора при инициальной терапии внебольничной пневмонии нетяжелого течения относят

- А. Фторхинолоны
- Б. Цефалоспорины
- В. Аминогликозиды
- Г. Аминопенициллины

Принятие решения о старте терапии остеопороза осуществляется на основании

- А. Выпадения зубов
- Б. Подсчета риска переломов по алгоритму FRAX
- В. Анализа крови на кальций
- Г. Жалоб пациента на боли в костях

К критериям тяжести бронхиальной обструкции относят значение

- А. Остаточного объема легких
- Б. ОФВ1 / ЖЕЛ
- В. ФЖЕЛ
- Г. ОФВ1

Технические средства реабилитации прописываются в

- А. Индивидуальной программе реабилитации и абилитации
- Б. Направлении на госпитализацию пожилого пациента
- В. Протоколе врачебной комиссии
- Г. Заключение эксперта МСЭ

Согласно stopp-критериям следует отменить колхицин при снижении скорости клубочковой фильтрации при СКФ менее (в мл/мин/1,73м²)

- А. 50
- Б. 15
- В. 30
- Г. 10

Клиническая картина периферического рака легкого проявляется

- А. Болями в области плечевого сустава
- Б. Кровохарканьем
- В. Одышкой
- Г. Цианозом лица

Дифференциальный диагноз при подозрении на фибромиалгию должен включать

- А. Паранеопластический синдром
- Б. Mioфасциальный синдром
- В. Гипотиреоз
- Г. Аутоиммунные ревматические заболевания в ранних стадиях

Пациенту с поливалентной аллергией проводить диагностическую мр-ангиографию можно

- А. Лишь на фоне премедикации
- Б. Лишь при наличии анафилактической укладки
- В. Без опасений
- Г. Лишь в присутствии реаниматолога

Индексом «хрупкости» называют

- А. Степень снижения показателей скорости ходьбы и динамометрии
- Б. Количество гериатрических синдромов
- В. Количество патологических симптомов
- Г. Отношение накопленных дефицитов к общему числу потенциальных дефицитов

Метод оценки риска падений предполагает использование

- А. SPPB-теста
- Б. Мини-BEST теста
- В. Теста Мини-Ког
- Г. Теста зрительной ретенции Бентона

К ренальным причинам развития острого почечного повреждения относят

- А. Острый канальцевый некроз
- Б. Хроническую сердечную недостаточность
- В. Острый инфаркт миокарда
- Г. Врожденные аномалии развития мочевыводящих путей

При проведении суточного мониторирования артериального давления артериальной гипертензией считается повышение в часы сна среднего систолического АД ?

_____ мм.рт.ст. И диастолического АД ? _____ мм.рт.ст.

- А. 135 И 85
- Б. 130 И 80
- В. 125 И 75
- Г. 120 И 70

К симптомам накопления относят

- А. Учащенное и ургентное мочеиспускание
- Б. Затрудненное мочеиспускание
- В. Слабую струю
- Г. Прерывистость мочеиспускания

Обтурационная форма клинического течения рака ободочной кишки наиболее часто встречается при локализации в

- А. Слепой кишке
- Б. Правых отделах ободочной кишки
- В. Левых отделах ободочной кишки
- Г. Поперечно-ободочной кишке

Независимо от причин обращения к врачу денситометрия должна быть рекомендована

- А. Всем женщинам старше 45 лет и мужчинам старше 50 лет
- Б. Только женщинам в предменопаузальном периоде
- В. Всем женщинам старше 65 лет и мужчинам старше 70 лет
- Г. Только мужчинам старше 70 лет

Препаратом уратснижающей терапии является

- А. Индометацин
- Б. Аллопуринол
- В. Преднизолон
- Г. Колхицин

Раздел гериатрии, изучающий здоровье полости рта пожилых и престарелых людей, называют

- А. Геронтостоматология
- Б. Гериатростоматология
- В. Геронтология
- Г. Геронтодентия

При приступе бронхиальной астмы в первую очередь назначают

- А. Ингаляционные β_2 -агонисты
- Б. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- В. Антигистаминные препараты
- Г. Холинолитики

Персистирующей является фибрилляция предсердий продолжительностью более _____ суток

- А. 7
- Б. 3
- В. 5
- Г. 1

Для селективной протеинурии характерна потеря

- А. С мочой иммуноглобулина М, трансферрина
- Б. С мочой иммуноглобулина G, альбумина, трансферрина
- В. Свойств гломерулярного фильтра для молекул радиуса >4 нм
- Г. С мочой альбумина, трансферрина

Согласно шкале старческой астении пожилые люди, набравшие 100/100 баллов по шкале бартела и 7-8/8 баллов по шкале лоутона, имеющие единичные гериатрические синдромы и небольшое снижение мобильности, соответствуют категории

- А. Удовлетворительного состояния здоровья
- Б. Легкой старческой астении
- В. Преастении
- Г. Хорошего состояния здоровья

При интоксикации дигоксином пациент видит мир в _____ цвете

- А. Синем
- Б. Красно-коричневом
- В. Зелено-желтом
- Г. Черно-белом

Учащение позывов к мочеиспусканию в ночное время называют

- А. Цисталгией
- Б. Поллакиурией
- В. Никтурией
- Г. Стрессовой инконтиненцией

Диагностическим приемом, позволяющим провести дифференциальный диагноз между мозжечковой и сенсорной атаксиями является

- А. Тест на кресле Барани
- Б. Проба Ромберга
- В. Тест с отвлечением пациента
- Г. Тест с тандемной ходьбой

Причиной обморока при синдроме каротидного синуса является

- А. Нарушение вертебро-базилярного кровотока
- Б. Сверхчувствительность барорецепторов
- В. Резкое повышение артериального давления
- Г. Снижение частоты сердечных сокращений

Мышечную силу пациента позволяет оценить

- А. Кардиган-тест
- Б. Кистевая динамометрия
- В. Тандем-тест
- Г. Тест «Встань и иди»

Гастрит, ассоциированный с *helicobacter pylori*, по этиологии является

- А. Химико-токсически индуцированным (тип С)
- Б. Смешанным (тип А и В)
- В. Аутоиммунным (тип А)
- Г. Бактериально-обусловленным (тип В)

Потребление белка в количестве 1,0-1,5 г/кг массы тела безопасно при условии скорости клубочковой фильтрации не ниже (в мл/мин/1,73 м²)

- А. 15
- Б. 20
- В. 30
- Г. 10

Расстройство узнавания объектов (предметов, лиц) при сохранности элементарных форм чувствительности, зрения, слуха является

- А. Афазией
- Б. Агнозией
- В. Апатией
- Г. Абулией

У пациента с болезнью Альцгеймера при развитии поведенческих нарушений к препаратам первого выбора относят

- А. Типичные нейролептики
- Б. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы
- В. М-холиноблокаторы
- Г. Глицин

Главным критерием для внутрисуставного введения препаратов гиалуроновой кислоты при остеоартрите является

- А. Отсутствие выпота в сустав
- Б. Анкилоз сустава
- В. Значительное повышение воспалительных маркеров в крови
- Г. Недостаточная эффективность приводимой обезболивающей терапии в течение 1 месяца

Индекс апноэ/гипопноэ, соответствующий средней степени тяжести, составляет (в эпизодах в час)

- А. 31 и более
- Б. 6-14
- В. 0-5
- Г. 15-30

Для поддержания уровня витамина 25(oh)d 3 более 30 нг/мл рекомендовано принимать препарат витамина 25(oh)d 3

- А. 7 000 МЕ в день 4 недели
- Б. 7 000 МЕ в день 8 недель
- В. 1 000 - 2 000 МЕ в день длительно
- Г. 1 000 - 2 000 МЕ в день 8 недель

Снижение скорости ходьбы у пациентов пожилого и старческого возраста обусловлено

- А. Изменениями ритма ходьбы
- Б. Удлинением фазы маха
- В. Укорочением шага
- Г. Удлинением шага

У больных старших возрастных групп риск развития осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта при лечении нестероидными противовоспалительными препаратами определяют как

- А. Умеренный
- Б. Высокий
- В. Очень высокий
- Г. Низкий

Мерой, направленной на сокращение затрат времени пациентов на посещение поликлиники, является

- А. Работа медицинской сестры
- Б. Нормирование деятельности врачей
- В. Квалификация врача
- Г. Анализ интенсивности потока больных по времени

Артифициальные повреждения характерны для

- А. Токсидермии
- Б. Аллергического контактного дерматита
- В. Пролежней
- Г. Простого контактного дерматита

Для лечения артериальной гипертензии у больного старческого возраста, страдающего тофусной подагрой, целесообразно назначение

- А. Лозартана
- Б. Биспролола
- В. Гидрохлортиазида
- Г. Спиронолактона (верошпирона)

Причиной развития приступа при стенокардии принцметала является

- А. Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий
- Б. Повышение вязкости крови
- В. Спазм коронарных артерий
- Г. Тромбоз коронарных артерий

Ингибиторы АПФ _____ тонус _____ артериолы

- А. Повышают; эфферентной
- Б. Повышают; афферентной
- В. Снижают; эфферентной
- Г. Снижают; афферентной