

Тесты с вопросами по специальности «Неврология» для аттестации 1 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/nevrolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Неврология» для аккредитации и других экзаменов (4900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/nevrologiya/

2) Мануальная терапия — тесты с ответами

→ medik-otvet.ru/product/manualnaya/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Частота встречаемости первично-прогрессирующего рассеянного склероза составляет:

- А. более 50 процентов случаев
- Б. 30-40 процентов случаев
- В. 15 процентов случаев
- Г. 80 процентов случаев

Невропатия подъязычного нерва проявляется:

- А. слабостью конвергенции
- Б. гиперакузией
- В. девиацией языка
- Г. атрофией половины языка
- Д. диплопией

Поясничная радикулопатия проявляется:

- А. спастическим парапарезом
- Б. симптомами натяжения нервных корешков
- В. тазовыми нарушениями
- Г. поясничной болью
- Д. трофическими язвами

Альтернирующий синдром Фовилля характеризуется одновременным вовлечением в патологический процесс нервов

- А. Лицевого и подъязычного
- Б. Лицевого и отводящего
- В. Лицевого и глазодвигательного
- Г. Языкоглоточного нерва и блуждающего
- Д. Подъязычного и добавочного

Какие из перечисленных заболеваний нервной системы не относятся к демиелинизирующим?

- А. рассеянный склероз
- Б. оптикомиелит демиелинизирующего
- В. острый рассеянный энцефаломиелит
- Г. паркинсонизм
- Д. оптический неврит

Какие клинические синдромы могут быть в посттравматический период

- А. Паркинсонизм
- Б. гипертензионный
- В. менингеальный
- Г. эпилептический
- Д. трофический

Решающее значение в диагностике внутричерепных аневризм имеет:

- А. ангиография
- Б. г-сцинтиграфия
- В. компьютерная томография

Основными клиническими признаками эпидуральной гематомы являются:

- А. «светлый» промежуток
- Б. ликворея из носа
- В. дислокационные симптомы
- Г. очаговые симптомы
- Д. параорбитальная гематома

Для туберкулезного менингита характерно все, кроме:

- А. геморрагическая сыпь
- Б. подострое начало
- В. субфебрильная температура
- Г. вовлечение II, IV, VI черепных нервов

Какое заболевание нервной системы относится к демиелинизирующим?

- А. паркинсонизм
- Б. наследственная атаксия
- В. рассеянный склероз
- Г. менингит

До какого возраста тета волны являются нормой:

- А. 1 месяц
- Б. 6 месяцев
- В. 1 год
- Г. 5 лет

В пожилом возрасте частота депрессий:

- А. выше
- Б. ниже
- В. сопоставима со средним возрастом
- Г. сопоставима с молодым возрастом

Клинический эффект СИОЗС может отмечаться через:

- А. 1-2 дня
- Б. 3-4 дня
- В. на второй неделе терапии
- Г. к концу второго месяца

Синдром Ландри не включает:

- А. восходящую полирадикулоневропатию
- Б. развитие бульбарного синдрома
- В. белково-клеточная диссоциация в ликворе
- Г. двусторонней наружной офтальмоплегии

Кортиконуклеарный пучок проходит во внутренней капсуле в области:

- А. В передних двух третях заднего бедра
- Б. В колене
- В. В переднем бедре
- Г. В задних отделах заднего бедра

Расстройство схемы тела отмечается при поражении:

- А. теменной доли недоминантного полушария
- Б. височной доли недоминантного полушария
- В. височной доли доминантного полушария

При нейропатии седалищного нерва наблюдается:

- А. снижение ахилова рефлекса
- Б. снижение коленного рефлекса
- В. недержание мочи
- Г. акроцианоз
- Д. гипестезия в области наружного края голени и стопы

Поражение обонятельного нерва проявляется:

- А. аносмией
- Б. обонятельными галлюцинациями
- В. нарушением вкуса
- Г. гипосмией
- Д. диплопией

Что из числа нижеперечисленного наиболее характерно для соматогенной депрессии:

- А. суточные колебания настроения
- Б. витальное снижение настроения
- В. утяжеление депрессии с утяжелением соматического состояния
- Г. скорбное бесчувствие
- Д. бредовые идеи виновности

Для моторной полиневропатии характерно:

- А. патологические стопные рефлексы
- Б. гиперрефлексия
- В. снижение ахилловых и карпо-радиальных рефлексов
- Г. синдром Броун-Секара
- Д. гипотрофии, преимущественно дистальных отделов конечностей

При появлении дискинезий пика дозы рекомендуют:

- А. увеличить разовую дозу леводопы
- Б. увеличить разовую дозу леводопы и увеличить число приемов леводопы
- В. уменьшить разовую дозу леводопы и увеличить число приемов леводопы
- Г. добавить ингибиторы КОМТ и увеличить разовую дозу леводопы

Невропатия зрительного нерва проявляется:

- А. монокулярной слепотой
- Б. двусторонними скотомами
- В. гомонимной гемианопсией
- Г. биназальной гемианопсией
- Д. атрофией зрительного нерва

Фармакотерапия больным с хронической ишемией мозга проводится с целью:

- А. улучшения церебральной гемодинамики и метаболизма мозга
- Б. коррекции электролитных нарушений
- В. нормализации гормонального статуса

Для коррекции истощения эффекта разовой дозы леводопы используют:

- А. уменьшение кратности приема леводопы с увеличением разовой дозы
- Б. увеличение кратности приема леводопы с уменьшением разовой дозы
- В. назначение леводопы каждый час в минимальной дозе
- Г. модификация диеты с увеличением доли белка в суточном рационе
- Д. назначение леводопы до приема пищи

Диабетическая вегетативная полиневропатия проявляется:

- А. вялым тетрапарезом
- Б. неустойчивостью артериального давления
- В. дыхательной недостаточностью
- Г. нейропатическим болевым синдромом
- Д. эректильной дисфункцией

Для постановки диагноза гепато-лентикулярной дегенерации используют:

- А. определение уровня меди в моче
- Б. определение уровня церрулоплазмина
- В. обнаружение кольца Кайзера-Флейшера
- Г. исследование печеночных ферментов
- Д. определение уровня сывороточного железа

Болезнь Паркинсона может начаться:

- А. дрожания головы
- Б. дрожания обеих рук
- В. дрожания одной руки
- Г. постуральной неустойчивости
- Д. тремора подбородка

Непарное заднее ядро глазодвигательного нерва (ядро Перлиа) обеспечивает реакцию зрачка

- А. на свет
- Б. на болевое раздражение
- В. на конвергенцию
- Г. на аккомодацию
- Д. на страх

Что не является противопоказанием для тромболизиса при ишемическом инсульте:

- А. гемиплегия с высоким мышечным тонусом
- Б. размер гиподенсивного очага более трети бассейна средней мозговой артерии при КТ
- В. систолическое АД более 185 мм.рт.ст. или диастолическое АД более 105 мм.рт.ст.

Какие из перечисленных симптомов характерны для легкого сотрясения головного мозга?

- А. головная боль
- Б. афазия
- В. головокружение
- Г. вегетативные расстройства
- Д. парезы конечностей

О каком патологическом процессе может свидетельствовать односторонняя гипо- или анозмия?

- А. об опухоли лобной доли на стороне гипоосмии
- Б. об опухоли лобной доли на противоположной стороне
- В. о патологии ЛОР органов
- Г. о патологии зрительных нервов
- Д. обо всех перечисленных состояниях

Укажите, какие из перечисленных симптомов не могут наблюдаться при субдуральной гематоме?

- А. анизокория
- Б. менингеальные симптомы
- В. парезы по периферическому типу
- Г. патологические пирамидные рефлексы
- Д. «светлый» промежуток

Истинный астереогноз обусловлен поражением:

- А. лобной доли
- Б. височной доли
- В. теменной доли
- Г. затылочной доли
- Д. лобной и височной

Наиболее ранними проявлениям гематомии травмы травматического происхождения является наличие:

- А. расстройств глубокой чувствительности
- Б. синдром Броун-Секара
- В. двигательных проводниковых нарушений
- Г. диссоциированные расстройства чувствительности
- Д. нарушение функции тазовых органов

Ганглионит Гассерова узла может проявляться:

- А. снижением вкуса
- Б. папулезными высыпаниями
- В. локальным болевым синдромом
- Г. мимическим парезом
- Д. нарушением чувствительности на половине лица

Какие из перечисленных заболеваний могут сопровождаться демиелинизацией?

- А. ишемический инсульт
- Б. нейроспид
- В. рассеянный склероз
- Г. менингит
- Д. синдром Гийена-Барре

Какая опухоль головного мозга может разрушить пирамидку височной кости?

- А. опухоль мозжечка
- Б. опухоль лобной доли
- В. опухоль задней черепной ямки
- Г. тератома
- Д. невринома 8 пары

Умеренное когнитивное расстройство:

- А. социоальное поведение
- Б. приводит к поведенческим нарушениям
- В. ограничивает бытовую активность
- Г. не нарушает повседневную активность

При поражении лицевого нерва наблюдается:

- А. Аносмия
- Б. Асимметрия лицевой мускулатуры
- В. Лагофthalm
- Г. Феномен Белла
- Д. Гиперемия кожных покровов

Вестибулярный неврит проявляется:

- А. системным головокружением
- Б. несистемным головокружением
- В. спонтанным нистагмом
- Г. снижением вкуса
- Д. дисфагией

Из каких клеток нервной ткани состоит невринома?

- А. астроцитов
- Б. шванновских
- В. олигодендроцитов
- Г. нейроцитов
- Д. микроглиальных

Раннее назначение леводопы увеличивает риск:

- А. когнитивных расстройств
- Б. депрессии и тревоги
- В. постуральной неустойчивости
- Г. моторных флуктуаций и дискинезий
- Д. тазовых нарушений

Для псевдобульбарного синдрома при хронической недостаточности мозгового кровообращения не характерно наличие:

- А. фибрилляции языка
- Б. дисфонии
- В. дизартрии

Бульбарный синдром включает:

- А. Слабость лицевых мышц
- Б. Дисфонию
- В. Гипракузию
- Г. Дисфагию
- Д. Гиперакузию

Клиническое заключение по ЭЭГ, согласно международным рекомендациям, должно включать:

- А. Описание, заключение, интерпретацию (как соотносятся результаты ЭЭГ с клиникой)
- Б. Только описание и заключение
- В. Только заключение по ЭЭГ
- Г. Анкетные данные и описание ЭЭГ
- Д. Полное автоматизированное заключение

Характерный возраст дебюта рассеянного склероза?

- А. в любом возрасте с одинаковой частотой
- Б. 0-18
- В. 18-45
- Г. 45-55
- Д. старше 60 лет

Для лечения синдрома беспокойных ног могут быть рекомендованы:

- А. антигистаминные препараты
- Б. агонисты дофаминовых рецепторов
- В. амантадины
- Г. трициклические антидепрессанты
- Д. препараты кальция

Бульбарный синдром возникает за счет поражения ядер

- А. IX, X
- Б. IX, X, XI
- В. IX, X, XII
- Г. VIII, IX, X, XII
- Д. VIII, IX, X

Морфологически нейропатии подразделяются на:

- А. демиелинизирующие
- Б. интерстициальные
- В. глиальные
- Г. аксональные
- Д. мезенхимальные

Внутри мозговое обкрадывание очага ишемического инсульта после введения вазодилататоров наступает в результате:

- А. перераспределения крови за счет расширения сосудов неповрежденных областей мозга
- Б. раскрытия артерио-венозных анастомозов
- В. нарушения ауторегуляции кровообращения в очаге

Для поражения задней мозговой артерии характерно наличие:

- А. гомонимной гемианопсии
- Б. битемпоральной гемианопсии
- В. биназальной гемианопсии
- Г. концентрического сужения полей зрения
- Д. ничего из перечисленного

Для дистимии характерно все, кроме:

- А. униполярное течение
- Б. биполярность течения
- В. продолжительность депрессии не менее 2 лет
- Г. преобладание самотовегетативных и астенических симптомокомплексов

Депрессии, возникающие на фоне соматического заболевания, называются:

- А. соматизированными
- Б. соматогенными
- В. шизофреническими
- Г. дистимическими

К нарушениям сознания относят:

- А. оглушение
- Б. брадифрению
- В. алалию

Алкогольная полиневропатия проявляется:

- А. симптомами натяжения нервных стволов
- Б. вялым тетрапарезом
- В. гипестезией по типу перчаток и носок
- Г. трофическими язвами
- Д. когнитивным снижением

Для выявления конструктивной апраксии следует предложить больному:

- А. сложить заданную фигуру из спичек
- Б. коснуться правой рукой левого уха
- В. выполнить различные движения по подражанию

Каудальный отдел сегментарного аппарата парасимпатического отдела вегетативной нервной системы представлен нейронами боковых рогов спинного мозга на уровне сегментов:

- А. L4-L5-L1
- Б. L5-S1-S2
- В. S1-S3
- Г. S2-S4
- Д. S3-S5

Препараты леводопы рекомендуется принимать:

- А. во время приема пищи
- Б. сразу после еды
- В. за 30 минут до еды
- Г. через 1 час после еды
- Д. вместе с белковой пищей

Поражение гиппокампа приводит к развитию:

- А. апраксии
- Б. агнозии
- В. амнезии
- Г. алексии
- Д. афазии

Для бокового амиотрофического синдрома характерно все, кроме:

- А. периферические парезы
- Б. центральные парезы
- В. тазовые расстройства
- Г. фасцикуляции
- Д. атрофия мышц

В норме учащение пульса при исследовании вегетативных рефлексов вызывает проба

- А. Ашнера(глазосердечный рефлекс)
- Б. клиностатическая
- В. ортостатическая
- Г. Шейно-сердечная (синокаротидный рефлекс)
- Д. ни одна из названных

Самым эффективным противопаркинсоническим препаратом является:

- А. агонисты дофаминовых рецепторов
- Б. леводопа
- В. ингибиторы МАО
- Г. амантадины
- Д. холинолитики

Эозинофильная аденома гипофиза у детей проявляется:

- А. гигантизмом
- Б. гирсутизмом
- В. ожирением
- Г. учащённым мочеиспусканием
- Д. остеопорозом

Для депрессивного синдрома не характерны:

- А. переживание тоски
- Б. двигательная заторможенность
- В. псевдогаллюцинации
- Г. идеаторная заторможенность
- Д. идеи самоуничтожения

Какие факторы риска развития инсульта являются модифицируемыми:

- А. все нижеперечисленное
- Б. артериальная гипертензия
- В. сахарный диабет
- Г. курение

Какие признаки свидетельствуют о раздражении затылочной доли опухолью?

- А. зрительные галлюцинации
- Б. фотопсии
- В. метаморфопсии
- Г. все перечисленные
- Д. макро и микропсии

В норме давление ликвора в положении сидя равно:

- А. 200-260 мм вод. ст.
- Б. 70-120 мм вод. ст.
- В. 80-180 мм вод. ст.

Какие общемозговые симптомы могут наблюдаться при опухолях головного мозга?

- А. все ниже перечисленные
- Б. головокружение
- В. тошнота
- Г. рвота
- Д. Головная боль

Основные признаки идиопатических эпилепсий:

- А. наличие неврологических симптомов - характерно
- Б. изменение семиологии приступов в течение заболевания
- В. психопатологические симптомы - отсутствуют
- Г. не являются генетически детерминированными

Врожденные заболевания с патологией миелина относятся к:

- А. миелинопатиям
- Б. миелинокластиям
- В. миопатиям
- Г. рассеянному склерозу

Как долго должны существовать симптомы депрессии для постановки диагноза:

- А. 1-2 недели
- Б. 2-4 недели
- В. 1-2 мес
- Г. 6 мес

Какими клетками вырабатывается миелин центральной нервной системы?

- А. астроцитами
- Б. олигодендроцитами
- В. шванновскими клетками
- Г. микроглией
- Д. лимфоцитами

Для синдрома Гийена-Барре характерно:

- А. спастический монопарез
- Б. гипестезия и гиперпатия в дистальных отделах конечностей
- В. прогрессирующий вялый тетрапарез
- Г. проксимальным парапарезом
- Д. миоклонии

При каком уровне кровотока в головном мозге развивается аноксическая деполяризация мембран и гибель клеток с образованием инфаркта мозга

- А. 10-12 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту
- Б. 40-45 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту
- В. 55-60 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту
- Г. 100-150 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту
- Д. 150-200 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту

«Поза просителя» наиболее характерна для:

- А. последствий инсульта
- Б. болезни Паркинсона
- В. прогрессирующего супрануклеарного паралича
- Г. кортико-базальной дегенерации

К быстрым гиперкинезам не относят следующие виды:

- А. хорей
- Б. баллизм
- В. атетоз
- Г. миоклония
- Д. тики

При повреждении наружных участков перекреста зрительных нервов периметрия выявляет

- А. Одностороннюю гомонимную гемианопсию
- Б. Нижнеквадрантную гемианопсию
- В. Битемпоральную гемианопсию
- Г. Биназальную гемианопсию
- Д. Верхнеквадрантную гемианопсию

Для пирамидной спастичности характерно преимущественное повышение тонуса в мышцах:

- А. сгибателях и пронаторах рук и разгибателях ног
- Б. разгибателях рук и ног
- В. сгибателях и разгибателях рук и ног равномерно

Невропатия тройничного нерва проявляется:

- А. Снижением корнеального рефлекса
- Б. Утрата тактильной чувствительности на половине лица
- В. Нарушение болевой чувствительности в зоне иннервации ветвей нерва
- Г. Гипестезией в зонах Зельдера
- Д. Гиперакузией

Компьютерная томография позволяет диагностировать гиперденситивные участки геморрагических экстравазатов при субарахноидальном кровоизлиянии в мозг спустя:

- А. 1 ч от начала кровоизлияния
- Б. 24 ч от начала кровоизлияния
- В. 3 ч от начала кровоизлияния

Компьютерная томография выявляет зону гиподенситивности в очаге ишемического инсульта:

- А. через 6 ч и более от начала заболевания
- Б. сразу в начале развития заболевания
- В. через 4 ч от начала заболевания

Деменция:

- А. ограничивает социальное поведение
- Б. не ограничивает профессиональное поведение
- В. не ограничивает бытовую активность
- Г. не ограничивает повседневную активность
- Д. связана с изменением сознания

Какие расстройства речи наблюдаются при опухоли лобной доли слева?

- А. дизартрия
- Б. сенсорная афазия
- В. моторная афазия
- Г. алалия
- Д. мутизм

Длительность противорецидивного лечения при депрессиях составляет не менее:

- А. 2 месяца
- Б. 3 месяца
- В. 6 месяцев
- Г. не менее 1 года

Поражение конского хвоста спинного мозга сопровождается:

- А. вялым парезом ног и нарушением чувствительности в промежности и внутренней поверхности бедер
- Б. спастическим парезом ног и тазовыми расстройствами
- В. нарушением глубокой чувствительности дистальных отделов ног и задержкой мочи
- Г. спастическим парапарезом ног без расстройств чувствительности и нарушением функции тазовых органов

Какой вид речевых расстройств возникает при поражении корковых речевых центров?

- А. Афония
- Б. Анартрия
- В. Афазия
- Г. Дизартрия
- Д. Аллексия

Главной причиной церебральной ишемии при остром инфаркте миокарда с нарушением ритма (кардиоцеребральный синдром) является:

- А. снижение системного перфузионного давления
- Б. повышение вязкости крови
- В. повышение активности свертывающей системы

На аутоиммунное воспаление при рассеянном склерозе не влияют:

- А. бета-интерфероны
- Б. кортикостероиды
- В. метаболические препараты
- Г. цитостатики
- Д. глатирамер ацетат

Отличительной особенностью проявлений депрессии у соматических пациентов является все, кроме:

- А. многочисленность жалоб и их неопределенность
- Б. нарушения сна
- В. склонность к суицидальным попыткам
- Г. неспецифические боли
- Д. утомляемость

Для тикозного гиперкинеза не характерно:

- А. стереотипность движения
- Б. преимущественное вовлечение мышц лица и плечевого пояса
- В. детский возраст начала заболевания
- Г. сохраняется во время сна

К структурным единицам венозной системы головного мозга относят все, кроме:

- А. Посткапиллярные венулы
- Б. Мозговые вены
- В. Венозные синусы
- Г. Артериовенозные анастомозы
- Д. Магистральные вены

Критерием положительной гипервентиляционной пробы является:

- А. возникновение предобморочного состояния
- Б. появление дрожи
- В. появление страха
- Г. появление положительного симптома Хвостека
- Д. Воспроизведение у больного имеющихся у него симптомов

Диабетическая проксимальная полиневропатия проявляется:

- А. вялым тетрапарезом
- Б. акроцианозом, гипергидрозом
- В. гипотрофией мышц бедер
- Г. недержанием мочи
- Д. снижением коленных рефлексов

Под вторично-прогрессирующим течением рассеянного склероза понимают:

- А. неуклонное прогрессирующее нарастание неврологических нарушений с самого начала заболевания на протяжении не менее года
- Б. волнообразное течение с периодами ухудшения и улучшения состояния и отсутствие нарастания симптомов в периоды ремиссий
- В. волнообразное течение с периодами ухудшения и улучшения состояния и нарастание симптомов в периоды ремиссий
- Г. смена волнообразного течения с периодами ухудшения и улучшения состояния и отсутствие нарастания симптомов в периоды ремиссий на неуклонное прогрессирующее нарастание неврологических нарушений

Базофильная аденома гипофиза проявляется:

- А. кахексией
- Б. полидипсией
- В. булимией
- Г. гипертермией
- Д. ожирением (синдром Иценко-Кушинга)

С помощью магнитно-резонансной томографии очаг ишемического инсульта головного мозга выявляется от начала заболевания:

- А. к концу первых суток
- Б. через 3 ч
- В. через 1 ч

Для вегетативной полиневропатии характерно:

- А. акроцианоз
- Б. анизорефлексия
- В. нестабильность артериального давления
- Г. сегментарные нарушения чувствительности
- Д. вялый монопарез

Какие из перечисленных симптомов не характерны для субарахноидального кровоизлияния?

- А. «светлый» промежуток
- Б. кровь в ликворе
- В. менингеальные симптомы
- Г. головная боль

Какие препараты не относятся к средствам, используемым для вторичной профилактики инсульта?

- А. нормотимические
- Б. антитромботические
- В. гиполипидемические

Компьютерная томография выявляет зону гиподенситивности в очаге ишемического инсульта:

- А. через 10 ч и более от начала заболевания
- Б. сразу в начале развития заболевания
- В. через 1 ч от начала заболевания
- Г. не раньше конца 1 недели

Для болевой дистальной полиневропатии характерно:

- А. гиперпатия
- Б. дизестезии
- В. анизорефлексия
- Г. снижение глубокой чувствительности
- Д. миоклонии

Для клещевого весенне-летнего энцефалита не характерно:

- А. острое начало
- Б. кожевниковская эпилепсия
- В. синдром паркинсонизма
- Г. вялые парезы мышц шеи, плечевого пояса, проксимальных отделов верхних конечностей

Для туберкулезного менингита в ликворе характерны следующие изменения, кроме:

- А. повышенное давление
- Б. лимфоцитарный плеоцитоз
- В. нейтрофильный плеоцитоз
- Г. снижение сахара и хлоридов

Укажите, при поражении каких образований спинного мозга не может быть нарушение чувствительности по проводниковому типу?

- А. Задние корешки
- Б. При поражении боковых и задних столбов
- В. Поражение боковых столбов спинного мозга
- Г. Поражение половины поперечника спинного мозга
- Д. Поражение всего поперечника спинного мозга

При периферическом парезе левого лицевого нерва, сходящемся косоглазии за счет левого глаза, гиперестезии в средней зоне Зельдера слева, патологических рефlekсах справа очаг локализуется

- А. В левом мосто-мозжечковом углу
- Б. В правом полушарии мозжечка
- В. В мосту мозга слева
- Г. В области верхушки пирамиды левой височной кости
- Д. В правом мосто-мозжечковом углу

ЭЭГ формируется полностью к:

- А. 4 годам
- Б. 5 годам
- В. 12 годам
- Г. 18 годам
- Д. 20 годам

При лечении диабетической полиневропатии используются:

- А. витамины группы В
- Б. противосудорожные препараты
- В. тромболитики
- Г. антипиретики
- Д. препараты альфа-липоевой кислоты

Характерными признаками каузалгии являются:

- А. интенсивные жгучие боли, не соответствующие зоне иннервации травмированного нерва
- Б. нестерпимая боль при давлении на нервный ствол
- В. все перечисленное
- Г. гипалгезия и парестезии в зоне иннервации травмированного нерва и нестерпимая боль при давлении на нервный ствол

Диабетическая полиневропатия проявляется:

- А. дистальной гипестезией конечностей
- Б. спастическим монопарезом
- В. тазовыми нарушениями
- Г. нейропатическим болевым синдромом
- Д. симптомами натяжения нервных стволов

Для нейродегенеративных деменций не характерно:

- А. множественный когнитивный дефицит
- Б. поведенческие расстройства
- В. психотические эпизоды
- Г. нарушение повседневной активности
- Д. острое начало

При болезни Паркинсона в черной субстанции отмечается снижение:

- А. глутамата
- Б. дофамина
- В. норадреналина
- Г. серотонина
- Д. ацетилхолина

Для менингококкового менингита характерно все, кроме:

- А. острое развитие
- Б. геморрагическая сыпь
- В. поражение зрительного и глазодвигательных нервов
- Г. нейтрофильный плеоцитоз в ликворе

Стартовая доза топирамата составляет при лечении эпилепсии у взрослых:

- А. 25мг/сут.
- Б. 50 мг/сут.
- В. 75 мг/сут.
- Г. 100 мг/сут.

Какой из симптомов болезни Альцгеймера появляется первым?

- А. нарушения памяти
- Б. нарушения внимания
- В. нарушения мышления
- Г. нарушения праксиса
- Д. нарушения ходьбы

Какие симптомы не возникают при сотрясении головного мозга?

- А. общемозговые
- Б. оболочечные
- В. вегетативные
- Г. очаговые
- Д. общемозговые и оболочечные

Какие симптомы характерны для гематомииелии поясничного отдела спинного мозга?

- А. нижний парапарез
- Б. нарушение функции тазовых органов
- В. проводниковый тип расстройств чувствительности
- Г. сегментарный тип расстройств чувствительности
- Д. все перечисленные

Эозинофильна аденома гипофиза у взрослых проявляется:

- А. акромегалией
- Б. полиурией
- В. бессонницей
- Г. гиперкератозом
- Д. гиперсаливацией

Под первично-прогрессирующим течением рассеянного склероза понимают:

- А. н прогрессирующее нарастание неврологических нарушений с самого начала заболевания на протяжении не менее года
- Б. волнообразное течение с периодами ухудшения и улучшения состояния и отсутствие нарастания симптомов в периоды ремиссий
- В. волнообразное течение с периодами ухудшения и улучшения состояния и нарастание симптомов в периоды ремиссий
- Г. смена волнообразного течения с периодами ухудшения и улучшения состояния и отсутствие нарастания симптомов в периоды ремиссий на неуклонное прогрессирующее нарастание неврологических нарушений

Для наблюдения за динамикой ангиоспазма у больного со спонтанным субарахноидальным кровоизлиянием наиболее целесообразно использовать:

- А. транскраниальную ультразвуковую доплерографию
- Б. позитронно-эмиссионную томографию
- В. ангиографию

Из какого зародышевого листка развиваются глиомы?

- А. мезодермы
- Б. нейроэктодермы
- В. эктодермы
- Г. энтодермы
- Д. из всех перечисленных

Начальная суточная доза ламотриджина при лечении эпилепсии у детей от 2-х до 12 лет:

- А. 0,2-2мг/кг/сут.
- Б. 2-5мг/кг/сут.
- В. 5-7,5мг/кг/сут.
- Г. 7,5-10мг/кг/сут.
- Д. 10-15мг/кг/сут.

Показанием для наблюдения у психиатра при депрессии является:

- А. наличие суицидальных мыслей
- Б. биполярное расстройство
- В. тяжелая депрессия с психотическими эпизодами
- Г. все перечисленное

При альтернирующем синдроме Мийяра - Гублера очаг находится

- А. В основании ножки мозга
- Б. В заднебоковом отделе продолговатого мозга
- В. В области красного ядра
- Г. В основании нижней части моста мозга
- Д. В верхней части моста

Клиническая характеристика лобных эпилепсий:

- А. приступы сопровождаются парестезиями, дизестезиями, аутоагнозией
- Б. возникает в любом возрасте, сопровождается кратковременными приступами (30-60сек), высокой частотой, преимущественно в ночное время
- В. характерны приступы в виде мелькания мушек перед глазами, преходящий амавроз, зрительные галлюцинации
- Г. для приступов характерны ощущения уже виденного, слышанного, различные автоматизмы

Какие признаки свидетельствуют о раздражении задних отделов лобной доли опухолью?

- А. джексоновские чувствительные припадки
- Б. зрительные галлюцинации
- В. обонятельные галлюцинации
- Г. джексоновские судорожные припадки
- Д. слуховые галлюцинации

Какой принцип наиболее принят в классификации опухолей нервной системы?

- А. онтогенеза
- Б. филогенеза
- В. гистогенеза
- Г. эмбриогенеза
- Д. дизэмбриогенеза

Клиническая характеристика затылочных эпилепсий:

- А. характерны приступы в виде мелькания мошек перед глазами, преходящий амавроз, зрительные галлюцинации.
- Б. для приступа характерны ощущения уже виденного или слышанного, различные автоматизмы
- В. приступ сопровождается парестезиями, дизестезией, аутотопагнозией
- Г. возникает в любом возрасте, сопровождается кратковременными приступами (30-60 сек), высокой частоты, преимущественно в ночное время

К зоне высокого риска заболеваемости рассеянным склерозом относят:

- А. более 50 случаев на 100 тыс населения
- Б. 30 случаев на 100 тыс населения
- В. 20 случаев на 100 тыс населения
- Г. 10 случаев на 100 тыс населения
- Д. 5 случаев на 100 тыс населения

Амантадины чаще всего оказывают положительный эффект при следующем виде вторичного паркинсонизма:

- А. сосудистый
- Б. посттравматический
- В. нейролептический
- Г. постгипоксический
- Д. токсический

Для диагностики невропатий используются:

- А. электромиография
- Б. электроэнцефалография
- В. полисомнография
- Г. доплерография
- Д. дистанционная термометрия

К афферентным связям мозжечка относится следующий путь:

- А. Дентато-рубро-спинальный
- Б. Дентато-таламический
- В. Лобно-мосто-мозжечковый
- Г. Кортико-спинальный
- Д. Кортико-нуклеарный

Апатия – это:

- А. снижение настроения
- Б. повышение настроения
- В. злобно – тоскливое настроение
- Г. отсутствие эмоциональных реакций на внешние раздражители

Какова продолжительность острейшего периода, в течение которого происходит формирование очага инфаркта головного мозга?

- А. 3-7 суток
- Б. 3-6 часов
- В. 21 сутки

Сочетание нарушения глотания и фонации, дизартрии, пареза мягкого неба, отсутствия глоточного рефлекса и тетрапареза свидетельствует о поражении

- А. Ножек мозга
- Б. Моста мозга
- В. Продолговатого мозга
- Г. Покрышки среднего мозга
- Д. Лучистого венца

Прогрессирующий супрануклеарный паралич относится к:

- А. первичному паркинсонизму
- Б. вторичному паркинсонизму
- В. атипичному паркинсонизму
- Г. ювенильному паркинсонизму
- Д. паркинсонизму с ранним началом

Наиболее часто встречаются невриты нерва:

- А. зрительного
- Б. глазодвигательного
- В. слухового
- Г. обонятельного
- Д. лицевого

К возбуждающим медиаторам относят все, кроме:

- А. Глутамат
- Б. Аспартат
- В. ГАМК
- Г. Дофамин
- Д. Норадреналин

При развитии болезни Альцгеймера начинается отложение:

- А. жиров
- Б. бета-амилоида
- В. гомоцистеина
- Г. холестерина
- Д. ничего

Хромофобная аденома гипофиза вызывает:

- А. карликовость
- Б. гипонатриемию
- В. гиперпатию
- Г. гипопитуитаризм
- Д. гипоестезию

При мультисистемной атрофии не наблюдается:

- А. мозжечковые нарушения
- Б. пирамидный синдром
- В. паралич взора вниз
- Г. вегетативные нарушения
- Д. синдром паркинсонизма

К ветвям внутренней сонной артерии относят все, кроме:

- А. Глазная артерия
- Б. Передняя ворсинчатая артерия
- В. Задняя соединительная артерия
- Г. Передняя мозговая артерия
- Д. Артерия лабиринта

Назовите характерный признак опухоли лобной доли?

- А. лобная психика
- Б. эпилептические припадки
- В. афазия
- Г. астазия-абазия
- Д. все перечисленные

Клиническая характеристика височных эпилепсий:

- А. приступы сопровождаются парестезиями, дизестезиями, аутоагнозией
- Б. характерны приступы в виде мелькания мушек перед глазами
- В. возникает в любом возрасте, сопровождается кратковременными приступами (30-60сек), высокой частоты, преимущественно в ночное время
- Г. для приступа характерны ощущения уже виденного или слышанного, различные автоматизмы

В патогенезе рассеянного склероза лидирующую роль отводят:

- А. воспалительной демиелинизации
- Б. воспалительной демиелинизации и нейродегенерации
- В. патологии сосудов
- Г. нейродегенерации
- Д. биохимические нарушения миелина

Какие из лекарственных препаратов и лечебных мероприятий применяются при субарахноидальном кровоизлиянии?

- А. дегидрационные средства
- Б. оперативное вмешательство
- В. все перечисленные
- Г. эпсилон-аминокапроновая кислота
- Д. дицинон

Препаратом первого выбора в возрасте старше 70 лет при лечении болезни Паркинсона является:

- А. агонисты дофаминовых рецепторов
- Б. амантадины
- В. леводопа
- Г. ингибиторы МАО-Б
- Д. холинолитики

Как долго должны существовать симптомы депрессии для постановки диагноза:

- А. не менее 1 недели
- Б. не менее 2 недель
- В. 1-2 мес
- Г. 6 мес

Для сосудистого паркинсонизма характерно все, кроме:

- А. ахейрокинез
- Б. лобная дисбазия
- В. апраксия ходьбы
- Г. ходьба с широко расставленными ногами
- Д. постуральная неустойчивость

Характерным рентгенологическим признаком аденомы гипофиза является:

- А. переломы костей основания черепа
- Б. переломы костей свода черепа
- В. смещение костей черепа
- Г. разрастание костей черепа
- Д. разрушение стенки турецкого седла

Укажите, что не относится к характеристикам астенического синдрома:

- А. эмоциональная лабильность
- Б. повышенная утомляемость
- В. гиперстезии
- Г. раздражительность
- Д. оглушенность

Какие из перечисленных симптомов не характерны для ушиба головного мозга?

- А. головная боль
- Б. парезы конечностей
- В. психомоторное возбуждение
- Г. утрата сознания
- Д. нарушение чувствительности на противоположной стороне

При поражении симпатических клеток C8-Th1 сегментов спинного мозга наблюдается следующая комбинация симптомов:

- А. птоз, миоз, энофтальм
- Б. птоз, мидриаз, экзофтальм
- В. мидриаз, экзофтальм, косоглазие
- Г. птоза, экзофтальма
- Д. миоз, экзофтальм

Какие факторы риска развития инсульта являются немодифицируемыми:

- А. все нижеперечисленное
- Б. возраст
- В. наследственная предрасположенность

Больной с сенсорной афазией:

- А. не понимает обращенную речь и не контролирует собственную
- Б. не может говорить и не понимает обращенную речь
- В. может говорить, но забывает названия предметов

Укажите время, в течение которого показано в/в применение rt-PA при ишемическом инсульте:

- А. 0-4,5 часа
- Б. 3-6 часов
- В. 0-6 часов

Ликвородинамическая проба Пуссепа вызывается

- А. сдавлением шейных вен
- Б. давлением на переднюю брюшную стенку
- В. наклоном головы вперед
- Г. разгибанием ноги, предварительно согнутой в коленном и тазобедренном суставах
- Д. поворотом головы в сторону

Мидриаз возникает при поражении

- А. Верхней порции крупноклеточного ядра глазодвигательного нерва
- Б. Нижней порции крупноклеточного ядра глазодвигательного нерва
- В. Мелкоклеточного добавочного ядра глазодвигательного нерва
- Г. Среднего непарного ядра
- Д. Ядра медиального продольного пучка

Синдром игнорирования характерен для поражения:

- А. лобной доли
- Б. теменной доли
- В. височной доли
- Г. затылочной доли

Выберите, что из перечисленных симптомов не характерно для поражения центрального двигательного нейрона:

- А. Спастический тонус,
- Б. Снижение поверхностных рефлексов
- В. Повышение сухожильных рефлексов
- Г. Атрофия мышц
- Д. Синкинезии

Для поражения лобной доли нехарактерно развитие афазии:

- А. афферентной моторной
- Б. эфферентной моторной
- В. сенсорной
- Г. динамической моторной

К каким заболеваниям относится рассеянный склероз по этиологическим факторам?

- А. инфекционное заболевание
- Б. наследственное заболевание
- В. мультифакториальное заболевание
- Г. сосудистое заболевание

Что не относится к менингеальным симптомам:

- А. симптом Оппенгейма
- Б. симптом Бехтерева
- В. симптом Кернига
- Г. симптом Лассега

Для паркинсонизма при прогрессирующем супрануклеарном параличе характерно:

- А. разгибательная поза
- Б. сгибательная поза
- В. антероколлис
- Г. повышение тонуса в дистальной мускулатуре
- Д. позднее развитие постуральных нарушений

Укажите, где перекрещиваются проводники поверхностной чувствительности?

- А. Передняя белая спайка спинного мозга
- Б. Межолливный слой продолговатого мозга
- В. Варолиев мост.
- Г. Средний мозг
- Д. Задние рога

К зоне среднего риска заболеваемости рассеянным склерозом относят:

- А. более 50 случаев на 100 тыс населения
- Б. 100 случаев на 100 тыс населения
- В. 1-5 случаев на 100 тыс населения
- Г. 5-10 случаев на 100 тыс населения
- Д. 5 случаев на 100 тыс населения
- Е. 10-50 случаев на 100 тыс населения

Феномен «возобновляющегося тремора» характерен для:

- А. эссенциального тремора
- Б. болезни Паркинсона
- В. дистонического тремора
- Г. гепатоцеребральной дегенерации
- Д. тремора при атипичном паркинсонизме

Синдром Аргайла Робертсона наблюдается:

- А. при рассеянном склерозе
- Б. при синдроме Парино
- В. при нейросифилисе
- Г. при сахарном диабете
- Д. при алкоголизме

Наиболее ранним признаком регенерации аксона при травме периферического нерва является:

- А. появление парестезий в зоне иннервации поврежденного нерва
- Б. появление стойкого болевого синдрома в дистальных участках зоны, иннервируемой поврежденным нервом
- В. регресс трофических расстройств
- Г. регресс болевого синдрома в дистальных отделах поврежденной конечности
- Д. регресс болевого синдрома в дистальных отделах поврежденной конечности и трофических расстройств

Основным для прогноза развития болезни Альцгеймера является:

- А. атрофия гиппокампа
- Б. выраженность увеличения желудочков
- В. выраженность расширения субарахноидальных пространств
- Г. атрофия мозжечка

Психотические нарушения при болезни Паркинсона наиболее часто представлены:

- А. зрительными галлюцинациями
- Б. слуховыми галлюцинациями
- В. обонятельными галлюцинациями
- Г. тактильными галлюцинациями
- Д. тактильными и обонятельными галлюцинациями

Деменция может развиваться:

- А. после 30 лет
- Б. после 40 лет
- В. после 50 лет
- Г. после 60 лет
- Д. в любом возрасте

Начальная суточная доза ламотриджина при лечении эпилепсии у взрослых и детей старше 12 лет:

- А. 25-50мг/сут.
- Б. 50-75мг/сут.
- В. 75-100мг/сут.
- Г. 100-125мг/сут.
- Д. 125-150мг/сут.

Семантическая речевая активность это:

- А. называние слов на определенную букву
- Б. называние слов одной категории
- В. называние любых слов
- Г. произнесение фонем

Какие препараты влияют на иммунорегуляцию при рассеянном склерозе?

- А. сосудистые препараты
- Б. метаболические препараты
- В. противоэпилептические препараты
- Г. бета интерфероны
- Д. альфа интерфероны

Преобладающим типом течения рассеянного склероза является:

- А. первично-прогрессирующий тип
- Б. вторично-прогрессирующий тип
- В. ремитирующий тип
- Г. вторично-прогрессирующий с обострениями

При развитии деменции у пациентов с болезнью Паркинсона наиболее предпочтительным препаратом является:

- А. агонисты дофаминовых рецепторов
- Б. амантадины
- В. леводopa
- Г. ингибиторы МАО-В
- Д. ингибиторы КОМТ

Какие инструментальные методы диагностики наиболее значимы для постановки диагноза рассеянного склероза?

- А. компьютерная томография спинного мозга
- Б. МРТ головного мозга
- В. компьютерная томография головного мозга
- Г. ультразвуковое исследование сосудов шеи

К серозным менингитам относят:

- А. менингококковый
- Б. туберкулезный
- В. стафилококковый
- Г. пневмококковый

Сенсорная афазия возникает при поражении:

- А. верхней височной извилины
- Б. средней лобной извилины
- В. средней височной извилины

Показания к применению этосуксимида:

- А. абсансы
- Б. фокальные приступы
- В. генерализованные тонико-клонические приступы
- Г. генерализованные тонико-клонические и фокальные приступы

Изменение риска развития рассеянного склероза при смене зон проживания происходит при миграции в возрасте:

- А. до 5 лет
- Б. до 10 лет
- В. до 15 лет
- Г. до 20 лет
- Д. до 30 лет

Артерия Деппрож-Гуттерона кровоснабжает:

- А. Шейный отдел спинного мозга
- Б. грудной отдел
- В. Нижнегрудной и поясничный
- Г. Нижнегрудной, поясничный и крестцовый
- Д. Шейный и грудной

Поражение каких пар черепных нервов наблюдается при опухоли мосто-мозжечкового угла?

- А. 2 и 3 пары
- Б. 8 , 7 и 5 пары
- В. 12 и 11 пары
- Г. 9 и 10 пары
- Д. все перечисленные

Поражение конского хвоста спинного мозга сопровождается:

- А. вялым парезом ног и нарушением чувствительности по корешковому типу, нарушением функции тазовых органов
- Б. спастическим парезом ног и тазовыми расстройствами
- В. нарушением глубокой чувствительности дистальных отделов ног и задержкой мочи
- Г. спастическим парапарезом ног без расстройств чувствительности и нарушением функции тазовых органов
- Д. нарушением глубокой чувствительности дистальных отделов ног

Диагноз «малого» инсульта устанавливают при полном регрессе неврологической симптоматики через:

- А. 21 сутки
- Б. 24 часа
- В. 15 суток

Одним из проявлений аффективного синдрома является:

- А. деменция
- Б. навязчивость
- В. театральность
- Г. депрессия

Наиболее характерными клиническими признаками первичного альдостеронизма (синдром Конна) являются:

- А. приступы локальной и генерализованной тетании
- Б. симптоматическая артериальная гипертензия
- В. приступы пароксизмальной миоплегии
- Г. все перечисленные
- Д. мышечная слабость

Доказанным внешним фактором риска развития рассеянного склероза не является:

- А. носительство вирус Эпштейна Барра
- Б. черепно-мозговая травма
- В. психоэмоциональные стрессы
- Г. хронические заболевания носоглотки
- Д. избыточное увеличение массы тела в подростковом возрасте

Кровоснабжение поясничного и крестцового отделов спинного мозга осуществляется за счет:

- А. Передней корешковой артерии
- Б. Задней корешковой артерии
- В. Большой передней корешковой артерией Адамкевича
- Г. Дополнительной передней корешковой артерией Демпрож-Гуттерона
- Д. Большой передней корешковой артерией Адамкевича и дополнительной передней корешковой артерией Демпрож-Гуттерона

При ушибе нервного ствола:

- А. сохраняется анатомическая целостность нерва
- Б. происходит полный перерыв нервного ствола
- В. сохраняется анатомическая целостность нерва и происходит кровоизлияние в ствол нерва и отек окружающих тканей
- Г. происходит полный перерыв нервного ствола и кровоизлияние в ствол нерва и отек окружающих тканей

Под ремиттирующим типом течения рассеянного склероза понимают:

- А. неуклонное прогрессирующее нарастание неврологических нарушений с самого начала заболевания на протяжении не менее года
- Б. волнообразное течение с периодами ухудшения и улучшения состояния и отсутствие нарастания симптомов в периоды ремиссий
- В. волнообразное течение с периодами ухудшения и улучшения состояния и нарастание симптомов в периоды ремиссий
- Г. смена волнообразного течения с периодами ухудшения и улучшения состояния и отсутствие нарастания симптомов в периоды ремиссий на неуклонное прогрессирующее нарастание неврологических нарушений

Противоэпилептические препараты (ПЭП) - «золотой стандарт»:

- А. препараты вальпроевой кислоты+карбамазепины
- Б. габапентин+прегабалин
- В. фенobarбитал+зонисамид
- Г. барбитураты+бензодиазепины

Дискинезии пика дозы это:

- А. насильственные движения, возникающие на фоне максимального действия принятой дозы леводопы
- Б. медленные дистонические, часто болезненные движения обычно в нижней половине тела, возникающие на фоне ослабления или прекращения действия принятой дозы леводопы
- В. быстрые размашистые (баллистические) движения обычно в нижних конечностях, возникающие в период начала и прекращения действия принятой дозы леводопы
- Г. резкий переход от состояния относительного благополучия (на фоне действия леводопы) к обездвиженности (внезапное выключение)

Клиническая характеристика теменных эпилепсий:

- А. характерны приступы в виде мелькания мушек перед глазами
- Б. приступ сопровождается перестезиями, дизестезиями, аутотопагнозией
- В. возникает в любом возрасте, сопровождается кратковременными приступами (30-60сек), высокой частоты, преимущественно в ночное время
- Г. для приступа характерны ощущения уже виденного или слышанного, различные автоматизмы

Какие из перечисленных симптомов не характерны для бульбарного синдрома:

- А. Дисфагия
- Б. Дизартрия
- В. Дисфония
- Г. Атрофия
- Д. Насильственный смех и плач

Классическая триада болезни Паркинсона включает в себя:

- А. тремор, ригидность, постуральную неустойчивость
- Б. тремор, ригидность, депрессию
- В. Тремор, ригидность, брадикинезию
- Г. брадикинезию, ригидность, постуральную неустойчивость
- Д. брадикинезию, тремор, постуральную неустойчивость

Амнестическая афазия наблюдается при поражении:

- А. лобной доли
- Б. теменной доли
- В. стыка лобной и теменной
- Г. стыка височной и теменной доли
- Д. височной

Для лечения синдрома задержки фазы сна применяется

- А. Физиотерапия
- Б. Лечебная физическая культура
- В. Хронотерапия
- Г. Психотерапия

Микрогеморрагии при церебральной амилоидной ангиопатии визуализируются в

- А. Юстакортикальном белом веществе
- Б. Базальных ганглиях
- В. Черной субстанции
- Г. Коре

К признакам, исключаяющим болезнь Альцгеймера, относят

- А. Синдром паркинсонизма
- Б. Зрительно-пространственные нарушения
- В. Центральный гемипарез
- Г. Депрессию

Нейробластома относится к ____опухолям

- А. Интрамедуллярным
- Б. Экстракортикальным
- В. Экструдуральным
- Г. Интрадурально-экстрамедуллярным

При повреждении внутренней капсулы обычно встречается

- А. Монопарез ноги
- Б. Монопарез руки
- В. Гемипарез
- Г. Тетрапарез

Основной операцией при каротидно-кавернозном соустье является

- А. Интракраниальное клипирование внутренней сонной артерии
- Б. Перевязка внутренней сонной артерии на шее
- В. Перевязка глазной вены и глазной артерии
- Г. Оклюзия соустья микроспиральями

Для профилактики повторного атеротромботического инсульта применяют

- А. Ацетилсалициловую кислоту
- Б. Нестероидные противовоспалительные препараты
- В. Гепарин
- Г. Варфарин

Менингеальная форма клещевого энцефалита проявляется

- А. Поражением серого вещества на уровне шейного утолщения
- Б. В виде серозного менингита
- В. В виде гнойного менингита
- Г. Поражением моторных нейронов ствола мозга

Чаще всего опухолью боковых желудочков является

- А. Хориоидпапиллома
- Б. Астроцитомы
- В. Эпендимомы
- Г. Менингиомы

Припадок эпилепсии называют генерализованным, если он проявляется

- А. Клоническими судорогами во всех конечностях
- Б. Нарушением сознания
- В. Генерализованными сенсорными эквивалентами
- Г. Тоническими судорогами во всех конечностях

Продолжительность приема антагонистов витамина К у пациентов с церебральным венозным тромбозом без наличия факторов риска составляет максимум

- А. 3 Года
- Б. 12 Месяцев
- В. 10 Лет
- Г. 3 Месяца

Сигмовидный синус впадает в

- А. Верхний каменистый синус
- Б. Нижний каменистый синус
- В. Прямой синус
- Г. Луковицу яремной вены

Для инсульта в системе задней мозговой артерии характерны

- А. Бульбарный синдром, гемипарез
- Б. Моторная афазия, гемипарез, гемигипестезия
- В. Гомонимная гемианопсия, зрительная агнозия
- Г. Спастический парез ноги, гемигипестезия

К межреберному нерву сверху прилежит

- А. Тыльная вена грудной клетки
- Б. Наружная грудная вена
- В. Межреберная артерия
- Г. Межреберная вена

Агонистом дофаминовых рецепторов, выпускаемым в виде на кожного пластыря является

- А. Прамипексол
- Б. Бромокриптин
- В. Пирибедил
- Г. Ротиготин

Выявление мягкотканного образования на нативной компьютерной томограмме в области бифуркации сосуда требуют выполнения

- А. Позитронно-эмиссионной томографии
- Б. Однофотонно-эмиссионной рентгеновской томографии
- В. Компьютерной рентгеновской ангиографии
- Г. Магнитно-резонансной томографии

Медицинской организации присваивается статус клинической, если на базе организации

- А. Проводятся клинические испытания
- Б. Ведется научно-исследовательская деятельность
- В. Осуществляется практическая подготовка медицинских работников
- Г. Проводится подготовка информационно-аналитических материалов

Косоглазие наблюдается при поражении _____ пары черепных нервов

- А. V
- Б. VII
- В. III
- Г. XII

Наиболее эффективным средством в лечении ишемического инсульта является

- А. Депротеинизированный гемодериват из сыворотки крови телят
- Б. Алтеплаза
- В. Пентоксифиллин
- Г. Цитиколин

Висцеро-висцеральные рефлексы отражают влияние

- А. Скелетной мускулатуры на внутренние органы
- Б. Скелетной мускулатуры на позвоночные двигательные сегменты
- В. Внутренних органов на скелетную мускулатуру
- Г. Одних внутренних органов на другие

К упражнениям для создания баланса между паретичными (0-2 балла по шестибальной шкале оценки мышечной силы) и здоровыми мышцами относят

- А. Тренировку целевых двигательных актов с исключением одного сустава
- Б. Элементы спортивных упражнений по «сниженной траектории» - удары по боксерской груше
- В. Упражнения на координацию-точность и меткость, равновесие и т.д.
- Г. Активные движения с полной амплитудой и оказанием сопротивления

Поражение мозжечка характеризует

- А. Скандированная речь
- Б. Афазия
- В. Брадикинезия
- Г. Гипомимия

Агонистом дофаминовых рецепторов для лечения болезни паркинсона является

- А. Амантадин
- Б. Бромокриптин
- В. Леводопа+карбидопа
- Г. Селегилин

Синдром беспокойных ног относят к

- А. Нарушению цикла сон-бодрствование
- Б. Двигательным расстройствам во сне
- В. Инсомнии
- Г. Парасомнии

При метастатическом поражении ЦНС первичная опухоль чаще всего локализована в

- А. Грудной железе
- Б. Желудке
- В. Легких
- Г. Матке

Гипнагогические галлюцинации относят к группе

- А. Инсомний
- Б. Нарушения цикла сон-бодрствование
- В. Парасомний
- Г. Гиперсомний

Для определения минеральной плотности кости наибольшей информативностью обладает

- А. Ультразвуковая денситометрия
- Б. Уровень паратгормона крови
- В. Двухэнергетическая рентгеновская денситометрия
- Г. Уровень кальция крови

Подострый тип течения полиневропатии развивается в течение

- А. 2 Недель
- Б. 1 Недели
- В. 2 Месяцев
- Г. 1 Месяца

Второй нейрон обонятельного анализатора находится в

- А. Биполярных клетках верхних носовых раковин
- Б. Обонятельном треугольнике
- В. Прозрачной перегородке
- Г. Обонятельной луковице

К препаратам, не рекомендованным к применению в остром периоде ишемического инсульта, способствующим истощению нейронов или вызывающим синдром обкрадывания, относят

- А. Пирацетам, аминофиллин, пентоксифиллин, ницерголин
- Б. Препараты тиоктовой кислоты
- В. Цитиколин, холина альфосцерат
- Г. Глицин, магния сульфат, маннитол

Боль в области задней поверхности голени и наружной части стопы характерна для компрессии спинномозгового нерва на уровне _____ сегмента

- А. S1
- Б. L5
- В. L4
- Г. L3

Доступность медицинской помощи обеспечивается главным образом

- А. Финансированием научно-исследовательского сектора
- Б. Закупкой недостающих медикаментов за рубежом
- В. Изменением номенклатуры специальностей медработников
- Г. Развитием первичной медико-санитарной помощи

При поражении малоберцового нерва нарушается функция

- А. Тыльного сгибания стопы (разгибания)
- Б. Сгибания голени
- В. Подошвенного сгибания стопы
- Г. Разгибания голени

Изменением личности в процессе старения является

- А. Усиление экстравертированности
- Б. Заострение свойственных человеку личностных черт
- В. Эмоциональный подъем
- Г. Появление новых черт характера

Под цереброваскулярными болезнями понимают группу заболеваний

- А. Головного мозга, обусловленных патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения
- Б. Обусловленных патологическими изменениями в артериях нижних конечностей
- В. Сердца, обусловленных патологическими изменениями артерий, питающих его
- Г. Артерий шеи, не питающих головной мозг

При миастении антитела и аутореактивные т-клетки поражают антигенные мишени полипептидной природы, расположенные

- А. В миелиновой оболочке
- Б. На пресинаптической мембране
- В. В телах мотонейронов
- Г. На постсинаптической мембране

Односторонний пульсирующий экзофтальм является признаком

- А. Тромбоза глазничной артерии
- Б. Ретробульбарной опухоли орбиты
- В. Каротидно-кавернозного соустья
- Г. Супраселлярной опухоли гипофиза

К умеренно селективным нестероидным противовоспалительным препаратам, применяемым для терапии боли, относят

- А. Тизанидин, ранитидин
- Б. Целекоксиб, эторикоксиб, рофекоксиб
- В. Нимесулид, мелоксикам
- Г. Ибупрофен, кетопрофен, лорноксикам

Для коррекции паркинсонизма при деменции с тельцами леви могут быть использованы невысокие дозы

- А. Амантадинов
- Б. Агонистов дофаминовых рецепторов
- В. Леводопы
- Г. Холинолитиков

Аксоны периферических двигательных нервов заканчиваются в

- А. Межпозвоночных ганглиях
- Б. Ганглиях пограничного симпатического ствола
- В. Мышечных волокнах поперечно-полосатых мышц
- Г. Мышечных волокнах гладких мышц

При поражении зрительного тракта возникает

- А. Амавроз
- Б. Гомонимная гемианопсия
- В. Битемпоральная гетеронимная гемианопсия
- Г. Биназальная гетеронимная гемианопсия

Лечение ортостатической гипотензии при синдроме шая – дрейджера включает назначение флудрокортизона в дозе (в мг/сут)

- А. 0,05-0,1
- Б. 1,0-2,0
- В. 0,1-0,3
- Г. 3,0-4,0

Карбамазепин нельзя применять при _____ припадках

- А. Тонико-клонических эпилептических
- Б. Малых эпилептических
- В. Вторично генерализованных
- Г. Парциальных

Опущение миндалин мозжечка через большое затылочное отверстие в позвоночный канал характерно для аномалии киари ____ типа

- А. III
- Б. I
- В. IV
- Г. II

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в целях

- А. Определения потребностей гражданина в мерах социальной защиты, включая реабилитацию на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма
- Б. Определения способности работника осуществлять трудовую деятельность, необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу
- В. Установления причинно-следственной связи заболевания с профессиональной деятельностью
- Г. Выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результат

Варфарин для профилактики повторного инсульта применяется при

- А. Атеротромботическом инсульте
- Б. Лакунарном инсульте
- В. Кардиоэмболическом инсульте
- Г. Церебральном васкулите

Провокатором эпилептиформной активности на ээг является

- А. Менструация
- Б. Бессонница
- В. Употребление серотонин содержащих продуктов
- Г. Переохлаждение

Для мышечной дистонии наиболее характерно наличие

- А. Дрожания
- Б. Ригидности
- В. Спастичности
- Г. Патологических поз

Наиболее частой причиной спорадического энцефалита является вирус

- А. Коксаки
- Б. Полиомиелита
- В. Простого герпеса
- Г. Вирус бешенства

При тромбозе впа на уровне шеи клинические последствия

- А. Отсутствуют при развитии артерио-синусных соустьей
- Б. Зависят от степени развития коллатерального кровообращения
- В. Зависят больше от выраженности коагуляции крови
- Г. Отсутствуют при разобщённом Виллизиевом соустье

«Утинная» походка с раскачиванием туловища из стороны в сторону характерна для больного с

- А. Прогрессирующей мышечной дистрофией
- Б. Диабетической полиневропатией
- В. Невральной амиотрофией Шарко – Мари – Тута
- Г. Фуникулярным миелозом

В задачи поликлиники не входит

- А. Экспертиза стойкой утраты трудоспособности
- Б. Профилактическая работа, диспансеризация
- В. Санитарно-гигиеническое воспитание и обучение населения
- Г. Лечебно-диагностическая работа

В период ранней реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения пассивные движения применяют для

- А. Стимуляции восстановления движений и профилактики контрактур при парезах и параличах
- Б. Тренировки мышц-разгибателей верхних конечностей и мышц-сгибателей голени и стопы
- В. Восстановления силы мышц
- Г. Увеличения объёма движений в суставах

Для вибрационной болезни характерно расстройство чувствительности по типу

- А. Полиневритическому
- Б. Сегментарному
- В. «Полукуртки»
- Г. Проводниковому

Этиологической причиной прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии на фоне пирс терапии является

- А. Вирус простого герпеса
- Б. Вирус ВИЧ
- В. Вирус JC
- Г. Неидентифицированный вирус

Патогенетическая терапия фуникулярного миелоза включает

- А. Пиридоксин
- Б. Цианокобаламин
- В. Тиамин
- Г. Бета-каротин

Осложнением, возникающим на фоне частого использования комбинированных анальгетиков при головной боли напряжения, является возникновение

- А. Лекарственно-индуцированной головной боли
- Б. Нарушений сна
- В. Когнитивных нарушений
- Г. Аллергических реакций

При неврите лицевого нерва процедуру массажа рекомендуют начинать с/со

- А. Воротниковой зоны
- Б. Здоровой половины лица
- В. Лица
- Г. Области кивательной мышцы

При фармакорезистентной эпилепсии рекомендуют

- А. Стимуляцию n.vagus
- Б. Методики традиционной медицины
- В. Отмену всех противосудорожных средств
- Г. Наблюдение у врача-психиатра

Синдром Туретта характеризуется

- А. Низкой эффективностью нейролептиков
- Б. Генерализованными тиками
- В. Высокой летальностью
- Г. Началом в пожилом возрасте

Основным методом диагностики полиневропатии является

- А. Электромиография
- Б. Ультразвуковое исследование нервов
- В. МРТ периферических нервов
- Г. Биохимический анализ цереброспинальной жидкости

Для синдрома Гийона характерно поражение

- А. Подкорковых ядер
- Б. Задних рогов спинного мозга
- В. Передних корешков спинного мозга
- Г. Конского хвоста

Типом наследования при прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна – Дежерина является

- А. Аутосомно-рецессивный
- Б. Доминантный, сцепленный с X-хромосомой
- В. Аутосомно-доминантный
- Г. Рецессивный, сцепленный с X-хромосомой

У пациента с моторной афазией нарушена возможность

- А. Понимать письменную речь
- Б. Писать
- В. Говорить
- Г. Понимать устную речь

При декомпрессии краниовертебрального перехода проводится резекция

- А. Переднего наклоненного отростка
- Б. Заднего полукольца С-1 позвонка
- В. Костей основания черепа в области ската
- Г. Заднего полукольца С-2 позвонка

Различают боли

- А. Фокальные, доминирующие, полярные, биполярные
- Б. Локальные, секционные, системные, динамические
- В. Локальные, отражённые, проекционные, иррадиирующие
- Г. Неврологические, соматические, опережающие, отстающие

При синдроме неадекватной секреции адг у пациентов в остром приступе порфирии развивается

- А. Гипонатриемия
- Б. Гипернатриемия
- В. Гиперкалиемия
- Г. Гипокалиемия

При нарастании отёка и смещении срединных структур головного мозга на 2 день от развития ишемического инсульта назначают

- А. Гемикраниэктомию
- Б. Приём маннитола
- В. Установку вентрикулярного дренажа
- Г. Пульс-терапию кортикостероидами

Показанием к хирургическому лечению внутримозгового кровоизлияния является

- А. Сердечно-сосудистая и легочная патология в стадии декомпенсации
- Б. Кровоизлияние объемом более 30 мл, сопровождающееся выраженным неврологическим дефицитом
- В. Угнетение сознания до состояния комы
- Г. Систолическая скорость кровотока в М1-сегменте СМА >200 см/с

У пациентов с синдромом малой грудной мышцы развивается

- А. Снижение артериального давления на плечевой артерии при повороте головы в здоровую сторону и при глубоком вдохе
- Б. Диффузный остеопороз кисти
- В. Боль по передне-наружной поверхности грудной клетки
- Г. Усиление боли в предплечье и IV, V пальцах кисти при повороте головы в здоровую сторону

Для лечения пациентов с острой неспецифической болью в спине рекомендуется

- А. Лечебная гимнастика
- Б. Сохранение активности
- В. Ношение корсета
- Г. Постельный режим

Пик заболеваемости эпилепсией приходится на _____ возраст

- А. Подростковый
- Б. Дошкольный
- В. Ранний школьный
- Г. Средний и старший

Для диагностики церебральной артериальной аневризмы наиболее информативным методом исследования является

- А. Рутинная компьютерная томография
- Б. Рутинная магнитно-резонансная томография головного мозга
- В. Интракраниальная доплерография
- Г. Мультиспиральная компьютерная ангиография с внутривенным контрастным усилением

К обязательным признакам субарахноидального кровоизлияния относят

- А. Утрату сознания
- Б. Менингеальный синдром
- В. Нистагм
- Г. Зрачковые расстройства

К ингибиторам обратного захвата норадреналина и серотонина относится

- А. Пароксетин
- Б. Кветиапин
- В. Кломипрамин
- Г. Венлафаксин

Для лечения боли при ретробульбарном неврите назначают

- А. Антидепрессанты
- Б. Опиоидные анальгетики
- В. Нестероидные противовоспалительные средства
- Г. Антиконвульсанты

Средством выбора при лечении эссенциального тремора является

- А. Тригексифенидил
- Б. Бромокриптин
- В. Пропранолол
- Г. Атропин

Причиной усиления головной боли при перкуссии головы при опухоли головного мозга является наличие

- А. Натяжения и дислокации оболочек и черепных нервов
- Б. Затруднения венозного оттока
- В. Нарушения ликвороциркуляции
- Г. Нарушения внутричерепного кровообращения

К начальным патогенетическим факторам, лежащим в основе отёка мозга, относят

- А. Нарушение венозного оттока
- Б. Низкое артериальное давление
- В. Изменения свойства нервной ткани
- Г. Скопление свободной жидкости в тканевых щелях мозга

Спинномозговая жидкость при внутрижелудочковых гематомах

- А. Умеренно ксантохромная
- Б. Окрашена кровью
- В. Бесцветная и прозрачная
- Г. Содержит хлопья фибрина

К опухолям сосудистого сплетения относят

- А. Астроцитому
- Б. Хориоидпапиллому
- В. Краниофарингиому
- Г. Глиому

При параличе клюмпке имеет место

- А. Внутренняя ротация и приведение плеча при наличии движений в пальцах кисти
- Б. Параличу межкостных мышц
- В. Отсутствие движений в пальцах кисти при сохранении движений в плечевом суставе
- Г. Полное отсутствие движения в пораженной конечности

Побеление пальца руки целиком в ответ на адреналиновую пробу соответствует ____ баллам

- А. 2
- Б. 3
- В. 6
- Г. 12

Нарколепсию относят к группе

- А. Гиперсомний
- Б. Нарушения цикла сон-бодрствование
- В. Инсомний
- Г. Парасомний

Наиболее частыми причинами вегетативных кризов являются

- А. Поражения гипоталамуса
- Б. Пороки митрального клапана
- В. Тревожные невротические расстройства
- Г. Черепно-мозговые травмы

Наиболее часто встречается _____ тип рассеянного склероза

- А. Вторично-регрессирующий
- Б. Первично-прогрессирующий
- В. Рецидивирующе-ремиттирующий
- Г. Вторично-прогрессирующий

Симптомом поражения передних рогов спинного мозга является

- А. Расстройство глубокой чувствительности
- Б. Сегментарная анестезия
- В. Атрофия мышц
- Г. Боль на уровне поражения

Хватательный рефлекс янишевского отмечается при поражении _____ доли головного мозга

- А. Затылочной
- Б. Лобной
- В. Теменной
- Г. Височной