

Тесты с вопросами по специальности «Неврология» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/nevrolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Неврология» для аккредитации и других экзаменов (4900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/nevrologiya/

2) Мануальная терапия — тесты с ответами

→ medik-otvet.ru/product/manualnaya/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Характерным признаком невриномы VIII пары черепных нервов является:

- А. Слуховая агнозия
- Б. Снижение слуха на стороне опухоли
- В. Слуховые галлюцинации
- Г. Гиперакузия
- Д. Боль в ухе

Симпатические клетки в спинном мозге располагаются:

- А. В передних рогах
- Б. В задних рогах
- В. В передних и задних рогах
- Г. В боковых рогах
- Д. В передних, задних и боковых рогах

Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях передней центральной извилины:

- А. Эфферентная моторная афазия
- Б. Джексоновские судорожные приступы
- В. Моноанестезия
- Г. Амнестическая афазия
- Д. Астазия-абазия

Выберете правильное утверждение:

- А. Объем черепа = Объем мозга + Объем крови + Объем ликвора
- Б. Объем черепа = Объем мозга + Объем крови
- В. Объем мозга = Объем ликвора + Объем крови

Для периферического одностороннего поражения подъязычного нерва из перечисленного характерно:

- А. Диплопия
- Б. Гиперакузия
- В. Нарушение вкуса передних 2/3 языка
- Г. Атрофия ипсилатеральной половины языка
- Д. Диплопия

Каузалгический синдром наиболее часто встречается при ушибе:

- А. Срединного нерва
- Б. Локтевого нерва
- В. Большеберцового нерва
- Г. Малоберцового нерва
- Д. Малоберцового нерва и локтевого нерва

При каких из перечисленных видов черепно-мозговой травмы может наблюдаться примесь крови в ликворе?

- А. Эпидуральная гематома
- Б. Субарахноидальное кровоизлияние
- В. Сотрясение головного мозга
- Г. Внутримозговая гематома
- Д. Ушиб головного мозга

С какими заболеваниями наиболее редко приходится проводить дифференциальный диагноз рассеянного склероза?

- А. Нейроинфекции
- Б. Сосудистые заболевания
- В. Травматическое поражение
- Г. Опухоли ЦНС
- Д. Наследственные заболевания

Какой препарат не рекомендован при сочетании болезни Паркинсона и эпилепсии?

- А. Вальпроаты
- Б. Левитирацетам
- В. Ламотриджин
- Г. Габапентин

Для сосудистого паркинсонизма не характерно:

- А. Асимметричность начала
- Б. Преобладание ригидности и гипокинезии в ногах
- В. Раннее развитие постуральной неустойчивости
- Г. Тремор покоя
- Д. Пирамидный синдром

Усиление альфа-ритма при открывании глаз является показателем:

- А. Активного бодрствования
- Б. Реакции напряжения в ЭЭГ
- В. Реакции перехода к расслаблению
- Г. Задремывания
- Д. Состояния перехода от дремоты к бодрствованию

Диабетическая вегетативная полинейропатия проявляется:

- А. Вялым тетрапарезом
- Б. Неустойчивостью артериального давления
- В. Дыхательной недостаточностью
- Г. Нейропатическим болевым синдромом
- Д. Сухожильной гиперрефлексией

Показанием к назначению варфарина для вторичной профилактики инсульта является:

- А. Клапанная фибрилляция предсердий
- Б. Повышение свертываемости крови
- В. Стеноз сонных артерий более 70%

Ритм ЭЭГ – это:

- А. Спонтанная электрическая активность мозга, состоящая из волн, имеющих относительно постоянный период
- Б. Комплексы спайк-волна
- В. Полиспайки
- Г. Острые волны
- Д. Любое изменение разницы потенциалов между парой электродов в ЭЭГ записи

Для поражения тройничного нерва из перечисленного характерно:

- А. Снижение корнеального рефлекса
- Б. Асимметрия оскала
- В. Диплопия
- Г. Гиперакузия
- Д. Дизартрия

Клиническая характеристика височных эпилепсий:

- А. Дебют заболевания только в зрелом возрасте
- Б. Изолированные ауры отсутствуют. Рутинная ЭЭГ – диагностически значима
- В. Дебют в любом возрасте. Аура (75%); оро-алиментарные и кистевые автоматизмы. Отсутствие изменений при рутинной ЭЭГ
- Г. Оро-алиментарные и кистевые автоматизмы отсутствуют
- Д. Рутинная ЭЭГ информативна

Из перечисленного в бульбарный синдром входит:

- А. Слабость глазодвигательных мышц
- Б. Дисфония
- В. Гиперакузия
- Г. Диплопия
- Д. Аносмия

При поражении отводящего нерва возникает паралич мышцы:

- А. Верхней прямой
- Б. Наружной прямой
- В. Нижней прямой
- Г. Нижней косой
- Д. Верхней косой

Для поражения лучевого нерва на уровне средней трети плеча из перечисленного характерно наличие:

- А. Усиление рефлекса с трехглавой мышцы
- Б. Паралича разгибателей кисти
- В. Паралича разгибателей предплечья
- Г. Паралича разгибателей предплечья и паралича разгибателей кисти

Псевдобульбарный синдром развивается при сочетанном поражении:

- А. Кортико-нуклеарных и мозжечковых путей доминантного полушария
- Б. Кортико-нуклеарных и мозжечковых путей недоминантного полушария
- В. Кортико-нуклеарных и экстрапирамидных путей доминантного полушария
- Г. Кортико-нуклеарных и экстрапирамидных путей недоминантного полушария
- Д. Кортико-нуклеарных путей доминантного и недоминантного полушарий

Укажите, где перекрещиваются проводники поверхностной чувствительности:

- А. Передняя белая спайка спинного мозга
- Б. Межолливный слой продолговатого мозга
- В. Варолиев мост
- Г. Средний мозг
- Д. Задние рога

Эффективность какого ингибитора АПФ доказана для вторичной профилактики инсульта в мультицентровых исследованиях?

- А. Периндоприл
- Б. Эналаприл
- В. Каптоприл

Для диагностики болезни Вильсона-Коновалова необходимо:

- А. Определение церулоплазмينا в крови
- Б. Исследование роговчатого кольца Кайзера-Флейшера
- В. Электромиография
- Г. Исследование сывороточного железа
- Д. Исследование печеночных ферментов

Для нейропатии седалищного нерва из перечисленного характерно:

- А. Выпадение ахиллова рефлекса
- Б. Выпадение коленного рефлекса
- В. Недержание мочи
- Г. Акроцианоз
- Д. Миоклонии

Битемпоральная гемианопсия при опухолях задней черепной ямки обусловлена:

- А. Компрессией хиазмы при передне-задней дислокации мозга
- Б. Расширением III желудочка
- В. Нарушением кровообращения в хиазме
- Г. Всеми перечисленными факторами
- Д. Ничем из перечисленного

Для лечения пациентов с болезнью Паркинсона младше 70 лет к препаратам первого выбора относят все, кроме:

- А. Агонистам дофаминовых рецепторов
- Б. Леводопа
- В. Ингибиторы МАО-Б
- Г. Амантадины
- Д. Комбинация агонистов дофаминовых рецепторов и ингибиторов МАО-В

Поражение каких пар черепных нервов наблюдается при опухоли мосто-мозжечкового угла?

- А. II и III пар
- Б. VIII, VII и V пар
- В. XII и XI пар
- Г. IX и X пар
- Д. Все перечисленное

Интубацию трахеи необходимо проводить при:

- А. Угнетении уровня сознания глубже сопора и неэффективности самостоятельного дыхания
- Б. Наличии дисфагии
- В. Наличии дисфонии

Поясничная радикулопатия из перечисленного проявляется:

- А. Парапарезом
- Б. Симптомами натяжения
- В. Тазовыми нарушениями
- Г. Акроцианозом
- Д. Трофическими язвами

Распространенность эпилепсии (%):

- А. 0,1-0,3%
- Б. 0,4-0,5%
- В. 0,6-0,7%
- Г. 0,8-1%
- Д. 1,5-3%

Ликвородинамическая проба Пуссепы вызывается:

- А. Сдавлением шейных вен
- Б. Давлением на переднюю брюшную стенку
- В. Наклоном головы вперед
- Г. Разгибанием ноги, предварительно согнутой в коленном и тазобедренном суставах
- Д. Поворотом головы в сторону

В прямой венозный синус впадает:

- А. Большая вена мозга (вена Галена)
- Б. Внутренние вены мозга
- В. Базальные вены Розенталя
- Г. Яремные вены
- Д. Все перечисленное

Для болевой дистальной полинейропатии из перечисленного характерно:

- А. Гипергидроз
- Б. Дизестезии
- В. Анизорефлексия
- Г. Патологические стопные рефлексы
- Д. Миоклонии

Диабетическая полинейропатия проявляется:

- А. Дистальной гипестезией конечностей
- Б. Спастическим монопарезом
- В. Тазовыми нарушениями
- Г. Мимическим парезом
- Д. Симптомами натяжения

Какие из перечисленных симптомов не характерны для субарахноидального кровоизлияния?

- А. Головная боль
- Б. Менингеальные явления
- В. Парезы конечностей
- Г. Тазовые нарушения
- Д. Психомоторное возбуждение

Для диагностики субарахноидального кровоизлияния при поступлении больного в стационар из перечисленных методов используется:

- А. Рентгеновская компьютерная томография
- Б. Электроэнцефалография
- В. Магнитно-резонансная томография

Основным медиатором тормозного действия является:

- А. Ацетилхолин
- Б. ГАМК
- В. Норадреналин
- Г. Адреналин
- Д. Дофамин

Зрительные нарушения при рассеянном склерозе чаще всего обусловлены:

- А. Дегенерацией сетчатки
- Б. Ретробульбарным невритом
- В. Поражением хиазмы
- Г. Атрофией зрительного нерва
- Д. Очагами в зрительной коре

Противопоказанием к назначению холинолитиков является все, кроме

- А. Возраст моложе 50 лет
- Б. Возраст старше 50 лет
- В. Когнитивные нарушения
- Г. Зрительные галлюцинации
- Д. Глаукома

Механизм действия мемантина связан с:

- А. Холинергической системой
- Б. Глутаматергической системой
- В. Норадренергической системой
- Г. Серотонинергической системой
- Д. Мелатонинергической системой

Спинальный очаг демиелинизации на шейном уровне обуславливает:

- А. Симптом горячей ванны
- Б. Симптом Лермитта
- В. Синдром непостоянства клинических симптомов
- Г. Синдром клинической диссоциации
- Д. Нарушение зрения

Для лечения эссенциального тремора чаще всего используют:

- А. Агонисты дофаминовых рецепторов
- Б. Бета-блокаторы
- В. Амантадины
- Г. Леводопу
- Д. Нейролептики

К демиелинизирующим полинейропатиям относятся:

- А. Синдром Гийена-Барре
- Б. Алкогольная
- В. Порфирийная
- Г. Травматическая
- Д. Уремическая

Больной с сенсорной афазией:

- А. Не может говорить и не понимает обращенную речь
- Б. Понимает обращенную речь, но не может говорить
- В. Может говорить, но забывает названия предметов
- Г. Не понимает обращенную речь, но контролирует собственную речь
- Д. Не понимает обращенную речь и не контролирует собственную

Для моторной полинейропатии из перечисленного характерно:

- А. Патологические стопные рефлексy
- Б. Гиперрефлексия
- В. Снижение ахилловых и карпорадиальных рефлексов
- Г. Синдром Броун-Секара
- Д. Акроцианоз

Через какое время после проведения системной тромболитической терапии rtPA можно использовать гепарин или антиагреганты?

- А. Через 24 часа после повторной КТ головного мозга
- Б. Непосредственно после завершения системной тромболитической терапии
- В. Одновременно с rtPA

Какие препараты из перечисленных не относятся к средствам, используемым для вторичной профилактики инсульта?

- А. Нормотимические
- Б. Антитромботические
- В. Гиполипидемические

Какое количество тромбоцитов является противопоказанием для проведения системной тромболитической терапии?

- А. Менее 100,000
- Б. Менее 180,000
- В. Менее 220,000

Для поражения задней мозговой артерии характерно наличие:

- А. Гомонимной гемианопсии
- Б. Битемпоральной гемианопсии
- В. Биназальной гемианопсии
- Г. Концентрического сужения полей зрения
- Д. Ничего из перечисленного

Препаратами второй линии терапии рассеянного склероза являются:

- А. Бета-интерфероны
- Б. Альфа-интерфероны
- В. Митоксантрон
- Г. Финголимод
- Д. Натализумаб

Противопоказаниями к проведению исследования сосудов головного мозга ультразвуковыми методиками принято считать:

- А. Противопоказаний для проведения ультразвуковых исследований не существует
- Б. Почечная колика
- В. Васкулопатии сосудов мозга и шеи

Для поражения лицевого нерва из перечисленного характерно:

- А. Головокружение
- Б. Асимметрия лицевой мускулатуры
- В. Гипестезия на половине лица
- Г. Атрофия языка
- Д. Гиперемия склер

Под вторично-прогрессирующим течением рассеянного склероза понимают:

- А. Неуклонное прогрессирующее нарастание неврологических нарушений с самого начала заболевания на протяжении не менее года
- Б. Волнообразное течение с периодами ухудшения и улучшения состояния и отсутствие нарастания симптомов в периоды ремиссий
- В. Волнообразное течение с периодами ухудшения и улучшения состояния и нарастание симптомов в периоды ремиссий
- Г. Смену волнообразного течения с периодами ухудшения и улучшения состояния и отсутствием нарастания симптомов в периоды ремиссий на неуклонное прогрессирующее нарастание неврологических нарушений

Ранними симптомами опухоли лобно-мозолистой локализации чаще являются:

- А. Двусторонний центральный нижний парепарез
- Б. Нарушения координации
- В. Астазия-абазия
- Г. Нарушения поведения
- Д. Битемпоральные дефекты поля зрения

Когда следует начинать профилактику у больных с транзиторными ишемическими атаками:

- А. Сразу после диагностики ТИА
- Б. После завершения острого периода заболевания
- В. Через месяц

При каких из перечисленных видов черепно-мозговой травмы может наблюдаться кровь в ликворе?

- А. Сотрясение головного мозга
- Б. Субарахноидальное кровоизлияние
- В. Эпидуральная гематома
- Г. Ушиб головного мозга
- Д. Диффузное аксональное повреждение

К основным проявлениям болезни Паркинсона относят все, кроме:

- А. Брадикинезии
- Б. Ригидности
- В. Тремора покоя
- Г. Постуральных нарушений
- Д. Паралича взора

Какой вид речевых расстройств возникает при поражении корковых речевых центров?

- А. Афония
- Б. Анартрия
- В. Афазия
- Г. Дизартрия
- Д. Алексия

Классический вариант тремора при болезни Паркинсона:

- А. Кинетический
- Б. Интенционный
- В. Покоя
- Г. Постуральный
- Д. Изометрический

Основные признаки идиопатических эпилепсий:

- А. Возраст-зависимый дебют - отсутствует
- Б. Наличие неврологических симптомов - характерно
- В. Наличие нескольких типов приступов - нередко
- Г. Изменение семиологии приступов в течение заболевания - нередко
- Д. Психопатологические симптомы - отсутствуют

Какой препарат не относится к антиагрегантам:

- А. Варфарин
- Б. Дипиридамол
- В. Клопидогрель

Какие симптомы не характерны для гематомиилии поясничного отдела спинного мозга:

- А. Тетраплегия
- Б. Нижний парапарез
- В. Мышечная гипотония
- Г. Нарушение функции тазовых органов
- Д. Проводниковый тип расстройства чувствительности

Для снижения повышенной температуры тела у больных с инсультом необходимо использовать:

- А. Парацетамол
- Б. Анальгин + димедрол
- В. Антибиотики широкого спектра действия

Алкогольная полинейропатия проявляется:

- А. Симптомами натяжения
- Б. Вялым тетрапарезом
- В. Когнитивными нарушениями
- Г. Трофическими язвами
- Д. Интенционным тремором

Какие из перечисленных симптомов не характерны для субарахноидального кровоизлияния?

- А. «Светлый» промежуток
- Б. Кровь в ликворе
- В. Менингеальные симптомы
- Г. Головная боль

По какой шкале оценивается степень инвалидизации при рассеянном склерозе?

- А. По шкале Бека
- Б. По шкале комы Глазго
- В. По шкале Апгар
- Г. По шкале EDSS
- Д. специфическая оценка отсутствует

К опухолям ЦНС оболочечно-сосудистого ряда относятся:

- А. Астроцитомы
- Б. Олигодендроглиомы
- В. Мультиформные спонгиобластомы
- Г. Арахноидэндотелиомы
- Д. Все перечисленные

Для лечения синдрома беспокойных ног препаратами первого выбора являются:

- А. Амантадины
- Б. Леводопа
- В. Агонисты дофаминовых рецепторов
- Г. Бета-блокаторы
- Д. Холинолитики

При лечении полинейропатий из перечисленного используются:

- А. Витамины группы В
- Б. Антиагреганты
- В. Тромболитики
- Г. Хирургическое лечение
- Д. Транскраниальная магнитная стимуляция

Препаратами первой линии терапии рассеянного склероза являются:

- А. Альфа-интерфероны
- Б. Бета-интерфероны
- В. Глатирамера ацетат
- Г. Митоксантрон
- Д. Кортикостероиды

Антипиретические мероприятия у больных с инсультом проводятся при:

- А. Температуре тела $>37,5$
- Б. Температуре тела $>36,6$
- В. Данная терапия не показана при инсультах

Препараты леводопы следует назначать:

- А. За 1 час до приема пищи
- Б. Вместе с приемом пищи
- В. Сразу после приема пищи
- Г. Непосредственно перед приемом пищи
- Д. Обязательно с белковыми продуктами

Поражение конского хвоста спинного мозга сопровождается:

- А. Периферическим парезом ног, нарушением чувствительности по корешковому типу, тазовыми расстройствами
- Б. Спастическим парезом ног и тазовыми расстройствами
- В. Нарушением глубокой чувствительности дистальных отделов ног и задержкой мочи
- Г. Спастическим нижним парапарезом без расстройств чувствительности и нарушения функций тазовых органов
- Д. Периферическим нижним парапарезом и тазовыми расстройствами

Для диагностики нейропатий используется:

- А. Электромиография
- Б. Электроэнцефалография
- В. МРТ
- Г. Допплерография
- Д. Полисомнография

Тремор, возникающий при удержании позы, называется:

- А. Покоя
- Б. Постуральный
- В. Кинетический
- Г. Интенционный
- Д. Изометрический

Для болезни Паркинсона характерно все, кроме:

- А. Постепенное начало
- Б. Неуклонное прогрессирование
- В. Асимметричность симптомов, с их большей выраженностью на стороне дебюта заболевания
- Г. Симметричность симптомов
- Д. Хорошая реакция на препараты леводопы

При болезни Паркинсона чаще всего наблюдается тремор:

- А. Рук
- Б. Ног
- В. Головы
- Г. Голосовых связок
- Д. Подбородка

Эффективность каких препаратов доказана в лечении деменции?

- А. Ингибиторы холинестеразы
- Б. Антидепрессанты
- В. Транквилизаторы
- Г. Ноотропы
- Д. Нейролептики

Для синдрома ущемления малоберцового нерва в области подколенной ямки характерны:

- А. Слабость подошвенных сгибателей стопы
- Б. Гипотрофия перонеальной группы мышц
- В. Гипалгезия наружной поверхности голени
- Г. Слабость подошвенных сгибателей стопы и гипотрофия перонеальной группы мышц
- Д. Слабость подошвенных сгибателей стопы и гипалгезия наружной поверхности голени

Для травматического ушиба седалищного нерва выше ягодичной складки характерны:

- А. Парез разгибателей голени
- Б. Выпадение ахиллова рефлекса
- В. Выпадение коленного рефлекса
- Г. Паралич стопы и пальцев ног
- Д. Парез разгибателей голени, выпадение ахиллова рефлекса, паралич стопы и пальцев ног

При периферическом поражении какого нерва наблюдается отклонение нижней челюсти в сторону поражения:

- А. VII
- Б. III
- В. XI
- Г. V
- Д. XI

Эозинофильная аденома гипофиза у взрослых проявляется:

- А. Акромегалией
- Б. Полиурией
- В. Бессонницей
- Г. Гиперкератозом
- Д. Гиперсаливацией

Какими клетками синтезируется миелин периферической нервной системы?

- А. Шванновские клетки
- Б. Олигодендроциты
- В. Астроциты
- Г. Микроглиоциты
- Д. Эпендимоциты

Что является диагностической основой для постановки диагноза рассеянного склероза?

- А. Диссеминация в пространстве и времени
- Б. Диссеминация во времени
- В. Диссеминация в пространстве
- Г. Нейровизуализационная картина
- Д. Данные анализа ликвора

Длительность терапии при болезни Альцгеймера должна быть:

- А. 6 месяцев
- Б. 2 года
- В. 3-5 лет
- Г. Пожизненной

Бульбарный паралич развивается при поражении:

- А. Ножек мозга
- Б. Моста
- В. Продолговатого мозга (ядра IX, X и XII пар черепных нервов)
- Г. Прецентральной извилины
- Д. С1-С2 сегментов спинного мозга

Основные критерии ответа (реакции) в ЭЭГ на афферентные стимулы у больных с нарушенным сознанием:

- А. Появление альфа при стимуляции
- Б. Депрессия альфа-ритма или других фоновых ритмов
- В. Усиление синхронизации при окончании стимуляции
- Г. Наличие реакции навязывания ритма
- Д. Появление тета-ритма при стимуляции

Какие витальные показатели необходимо контролировать при проведении системной тромболитической терапии?

- А. АД, ЧСС, t, SpO₂, ЧДД
- Б. АД, ЧСС, t, SpO₂, ЧДД, ЦВД
- В. АД, ЧСС, SpO₂, внутричерепное давление

Симптом Лермитта характеризуется:

- А. Ощущением прохождения тока по периферическим нервам
- Б. Появлением болевого синдрома в конечностях
- В. Ощущением прохождения тока вдоль позвоночника при наклоне головы
- Г. Нарастанием симптомов после повышения температуры тела
- Д. Ощущением прохождения тока в области лица

Синдром Гийена-Барре проявляется:

- А. Спастическим монопарезом
- Б. Акинетико-ригидным синдромом
- В. Прогрессирующим вялым тетрапарезом
- Г. Проксимальным парапарезом
- Д. Миоклониями

Кровоснабжение поясничного и крестцового отделов спинного мозга осуществляется за счет:

- А. Передней корешковой артерии
- Б. Задней корешковой артерии
- В. Большой передней корешковой артерии Адамкевича
- Г. Дополнительной передней корешковой артерии Демпрож-Гуттерона
- Д. Большой передней корешковой артерии Адамкевича и дополнительной передней корешковой артерии Демпрож-Гуттерона

Симптом «горячей ванны» характеризуется:

- А. Нарастанием очаговой неврологической симптоматики при повышении температуры тела или окружающей среды
- Б. Уменьшением очаговой неврологической симптоматики при повышении температуры тела или окружающей среды
- В. Нарастанием когнитивных нарушений при повышении температуры тела или окружающей среды
- Г. Увеличением болевого синдрома при повышении температуры тела или окружающей среды
- Д. Не сопровождается изменением выраженности симптомов

Нарастание мидриаза на стороне эпидуральной гематомы обусловлено:

- А. Асимметричной гидроцефалией
- Б. Сдавлением моторной области коры
- В. Ущемлением ствола в затылочном отверстии
- Г. Развитием отека мозга и вторичного стволового синдрома
- Д. Асимметричной гидроцефалией и сдавлением моторной области коры

Гипнагогическая гиперсинхрония характерна для ЭЭГ сна у детей в возрасте:

- А. 1 месяцев
- Б. 6-8 месяцев
- В. Старше 3-х лет
- Г. От года до 5 лет
- Д. С 12 лет

Сегментарный аппарат симпатического отдела вегетативной нервной системы представлен нейронами боковых рогов спинного мозга на уровне сегментов:

- А. C5-T10
- Б. T3-T16
- В. T1-L3
- Г. T6-L4
- Д. L5-S1-S2

Для поражения лицевого нерва сразу после отхождения стременного нерва помимо периферического пареза мимической мускулатуры характерно:

- А. Нарушение слюноотделения
- Б. Нарушение вкуса на передних 2/3 языка
- В. Гиперакузия
- Г. Верно все перечисленное
- Д. Нарушение слюноотделения, нарушение вкуса на передних 2/3 языка

В пожилом возрасте частота депрессий:

- А. Выше
- Б. Ниже
- В. Сопоставима со средним возрастом
- Г. Сопоставима с молодым возрастом

При периферическом парезе левого лицевого нерва, сходящемся косоглазии за счет левого глаза, гиперестезии в средней зоне Зельдера слева, патологических рефlekсах справа очаг локализуется:

- А. В левом мостомозжечковом углу
- Б. В правом полушарии мозжечка
- В. В каудальной части моста слева
- Г. В области верхушки пирамиды левой височной кости
- Д. В правом мостомозжечковом углу

Выберите, что из перечисленных симптомов не характерно для поражения периферического двигательного нейрона:

- А. Спастический тонус
- Б. Гипотония мышц
- В. Снижение сухожильных рефлексов
- Г. Атрофия мышц
- Д. Реакция перерождения мышц при исследовании электровозбудимости

К редким подтипам инсульта относят:

- А. Мигренозный инсульт
- Б. Атеротромботический инсульт по типу артерио-артериальной эмболии
- В. Кардиоэмболический инсульт

Одновременное развитие двигательных нарушений в виде верхнего периферического и нижнего центрального пареза ипсилатерально характерно для поражения:

- А. Внутренней капсулы
- Б. Боковых столбов спинного мозга
- В. Продолговатого мозга на уровне перекреста двигательных путей
- Г. Лобной доли
- Д. Половинного поражения поперечника спинного мозга на уровне шейного утолщения

Клиническое заключение по ЭЭГ, согласно международным рекомендациям, должно включать:

- А. Описание, заключение, интерпретацию (как соотносятся результаты ЭЭГ с клиникой)
- Б. Только описание и заключение
- В. Только заключение по ЭЭГ
- Г. Анкетные данные и описание ЭЭГ
- Д. Полное автоматизированное заключение

Какие симптомы не могут возникать при ушибе головного мозга?

- А. Общемозговые
- Б. Оболочечные
- В. Вегетативные
- Г. Очаговые
- Д. Натяжения

Ветвями базилярной артерии являются все, кроме:

- А. Задняя мозговая артерия
- Б. Передняя нижняя мозжечковая артерия
- В. Верхняя мозжечковая артерия
- Г. Задняя нижняя мозжечковая артерия
- Д. Артерия лабиринта

Примером синдрома клинической диссоциации при рассеянном склерозе является:

- А. Сочетание гиперрефлексии и мышечной гипотонии
- Б. Сочетание гиперрефлексии и симптома Бабинского
- В. Сочетание гиперрефлексии и спастического мышечного тонуса
- Г. Сочетание гипорефлексии и низкого мышечного тонуса
- Д. Сочетание гипорефлексии и отсутствия патологических стопных знаков

Амитриптилин относится к антидепрессантам:

- А. Трициклического ряда
- Б. Тетрациклического ряда
- В. Ингибиторам МАО
- Г. СИОЗС
- Д. СИОЗСН

Вторичный синдром беспокойных ног может быть обусловлен:

- А. Недостатком железа
- Б. Избытком железа
- В. Недостатком кальция
- Г. Избытком кальция
- Д. Недостатком калия

К селективным ингибиторам обратного захвата серотонина не относится:

- А. Амитриптилин
- Б. Флуоксетин
- В. Сертралин
- Г. Циталопрам
- Д. Флувоксамин

Рвота при супратенториальных опухолях рассматривается как общемозговой симптом, поскольку возникает:

- А. Вне связи с приемом пищи
- Б. Независимо от перемены положения тела
- В. После кратковременного ощущения тошноты
- Г. При повышении внутричерепного давления
- Д. Все перечисленное

При ушибе нервного ствола:

- А. Сохраняется анатомическая целостность нерва
- Б. Происходит полный перерыв нервного ствола
- В. Происходит кровоизлияние в ствол нерва и отек окружающих тканей
- Г. Сохраняется анатомическая целостность нерва и происходит кровоизлияние в ствол нерва и отек окружающих тканей
- Д. Происходит полный перерыв нервного ствола и кровоизлияние в ствол нерва и отек окружающих тканей

Характеристика спинальных очагов на МРТ при рассеянном склерозе:

- А. Очаги распространяются более чем на 3 сегмента, занимают менее половины поперечного сечения спинного мозга, не вызывают утолщение спинного мозга
- Б. Очаги не должны распространяться более чем на 3 сегмента, занимают менее половины поперечного сечения спинного мозга, не вызывают утолщение спинного мозга
- В. Очаги не должны распространяться более чем на 3 сегмента, занимают менее половины поперечного сечения спинного мозга, вызывают утолщение спинного мозга
- Г. Очаги не должны распространяться более чем на 2 сегмента, занимают менее половины поперечного сечения спинного мозга, не вызывают утолщение спинного мозга

Основные признаки симптоматических эпилепсий

- А. Возраст зависимый дебют
- Б. Имеют генетическую предрасположенность
- В. Наличие нескольких типов приступов
- Г. Отсутствуют изменения на МРТ

Для травматического разрыва бедренного нерва выше пупартовой связки характерно:

- А. Паралич разгибателей голени
- Б. Выпадение коленного рефлекса
- В. Атрофия четырехглавой мышцы бедра
- Г. Все перечисленное
- Д. Паралич разгибателей голени и выпадение коленного рефлекса

Место выработки ликвора:

- А. Сосудистые сплетения желудочков
- Б. Артерии паутинной оболочки
- В. Артерии конвексимальной поверхности головного мозга
- Г. Грануляции паутинной оболочки
- Д. Вены и венозные синусы черепа

Для тремора при болезни Паркинсона характерно все, кроме:

- А. Возникает в покое
- Б. Усиливается при волнении
- В. Относится к числу возобновляющегося тремора
- Г. Усиливается при движении другой рукой
- Д. Начинается с головы

Что из перечисленного не характерно для эпидуральной гематомы?

- А. Наличие «светлого» промежутка
- Б. Как правило, не распространяется за пределы черепных швов
- В. Наличие крови в желудочковой системе
- Г. Дислокационные синдромы
- Д. Очаговые симптомы

Клинический эффект СИОЗС отмечается через:

- А. 1-2 дня
- Б. 3-4 дня
- В. 6-7 дней
- Г. 8-10 дней
- Д. 10-12 дней

Поражение обонятельного нерва проявляется:

- А. Аносмией
- Б. Обонятельными галлюцинациями
- В. Нарушением вкуса
- Г. Снижением вкуса
- Д. Диплопией

Отличительным признаком опухоли верхней теменной доли является:

- А. Гемипарез и расстройства чувствительности по гемитипу
- Б. Поза Вернике-Мана
- В. Расстройства чувствительности по гемитипу
- Г. Вялый характер пареза
- Д. Преобладание афферентного пареза в руке

Моторные тики считаются хроническими, если они наблюдаются более:

- А. 6 месяцев
- Б. 1 года
- В. 3 месяцев
- Г. 3 лет
- Д. 5 лет

Плечевое сплетение формируют передние ветви спинно-мозговых нервов:

- А. C4-C6
- Б. C5-C8, T1-T2
- В. C6-C8
- Г. C8-T2
- Д. C9-T5

Диабетическая проксимальная полинейропатия из перечисленного проявляется:

- А. Вялым тетрапарезом
- Б. Неустойчивостью артериального давления
- В. Гипотрофией мышц бедер
- Г. Недержанием мочи
- Д. Акроцианоз

Укажите, какие из перечисленных симптомов не возникают при опухолях височной доли:

- А. Эпилептические приступы
- Б. Вкусовые и обонятельные галюцинации
- В. Сенсорная афазия
- Г. Амнестическая афазия
- Д. Расстройства поверхностной чувствительности

Компьютерная томография наиболее информативна при локализации опухоли:

- А. В больших полушариях головного мозга
- Б. В базальной зоне головного мозга
- В. В задней черепной ямке
- Г. В краниовертебральной области
- Д. Верно Б и В

Чем из перечисленного характеризуется кардиоэмболический инсульт в соответствии с критериями TOAST?

- А. Наличием кардиогенных источников эмболии
- Б. Размером очага менее 1,5 см по данным МРТ
- В. Стенозом артерии, кровоснабжающей область поражения, более 70%

Какие из перечисленных симптомов не характерны для бульбарного синдрома:

- А. Дисфагия
- Б. Дизартрия
- В. Дисфония
- Г. Атрофия мышц языка
- Д. Симптомы орального автоматизма

ЭЭГ формируется полностью к:

- А. 4 годам
- Б. 5 годам
- В. 12 годам
- Г. 18 годам
- Д. 20 годам

Патология какого черепного нерва часто возникает в дебюте рассеянного склероза?

- А. II
- Б. VIII
- В. При рассеянном повреждаются только спинномозговые нервы
- Г. XII

К расстройствам эмоций относятся:

- А. Деменция
- Б. Умственная отсталость
- В. Астения
- Г. Амнезия
- Д. Депрессия

Особенности ЭЭГ ребенка в возрасте 6 месяцев:

- А. Резко выражен бета-ритм частотой 18-25 Гц
- Б. В затылочной области определяется устойчивая активность частотой 5 Гц и амплитудой 50 мкВ
- В. В затылочной области сформирован альфа-ритм частотой 7-8,5 Гц
- Г. Отмечается снижение активности передних отделов мозга с усилением активности теменно-затылочных отделов мозга

Болезненное понижение настроения с двигательной заторможенностью и общим угнетением психических функций называется:

- А. Дисфория
- Б. Эйфория
- В. Мания
- Г. Депрессия
- Д. Апатия

Характерным рентгенологическим признаком разрастания опухоли гипофиза является:

- А. Переломы верхней челюсти
- Б. Переломы нижней челюсти
- В. Перелом пирамидки височной кости
- Г. Разрушение костей турецкого седла
- Д. Остеопороз

Наиболее часто встречаются невриномы нерва:

- А. Зрительного
- Б. Глазодвигательного
- В. Обонятельного
- Г. Слухового
- Д. Лицевого

Плечеголовной ствол обычно отходит:

- А. От верхней стенки дуги аорты
- Б. От передней стенки дуги аорты
- В. От задней стенки дуги аорты

Противоэпилептические препараты (ПЭП), применяемые при различных типах приступов (с широким спектром воздействия на различные патогенетические «мишени»):

- А. Фенитоин+карбамазепин+тиагабин
- Б. Фенобарбитал+фенитоин+этосуксимид
- В. Препараты вальпроевой кислоты+топирамат+препараты ламотриджинового ряда
- Г. Иминостильбены (карбамазепин)+зонисамид+ фенитоин
- Д. Иминостильбены (карбамазепин)+зонисамид+ фенитоин

До какого возраста тета-волны являются нормой?

- А. 1 месяц
- Б. 6 месяцев
- В. 1 год
- Г. 5 лет
- Д. 12 лет

Какой из симптомов болезни Альцгеймера проявляется более ярко на ранних этапах заболевания?

- А. Нарушения памяти
- Б. Нарушения внимания
- В. Нарушения мышления
- Г. Нарушения праксиса
- Д. Нарушения ходьбы

Синдром поражения внутренней капсулы включает следующее сочетание симптомов:

- А. Монопарез, гемианестезию, гемианопсию
- Б. Гемиплегию, гемианестезию, гемианопсию
- В. Паралез, моноанестезию, гемиатаксию
- Г. Гемиплегию, гемианестезию, афазию
- Д. Гемипарез, гемианестезию

Интрамедуллярные опухоли это чаще всего:

- А. Невриномы
- Б. Бластомы
- В. Глиомы
- Г. Менингеомы
- Д. Лимфомы

Для компрессионной нейропатии срединного нерва (синдром запястного канала) из перечисленного характерны:

- А. Слабость IV, V пальцев
- Б. Атрофия мышц возвышения большого пальца
- В. Усиление болей в кисти при ее сгибании
- Г. Атрофия мышц возвышения большого пальца и усиление болей в кисти при ее сгибании
- Д. Слабость IV, V пальцев и усиление болей в кисти при ее сгибании

Укажите, какой нерв осуществляет иннервацию сфинктера зрачка:

- А. III
- Б. IV
- В. VI
- Г. VII
- Д. V

Оксигенотерапия показана при:

- А. SpO₂ < 80%
- Б. SpO₂ < 100%
- В. SpO₂ < 94%

Какие нарушения высших корковых функций возникают при поражении субдоминантной теменной доли?

- А. Сенсорная афазия
- Б. Зрительная апраксия
- В. Сенсорная агнозия, нарушение схемы тела
- Г. Слуховая агнозия
- Д. Эфферентная моторная афазия

Для вегетативной полинейропатии из перечисленного характерно:

- А. Акроцианоз
- Б. Анизорефлексия
- В. Тетрапарез
- Г. Сегментарные нарушения чувствительности
- Д. Монопарез

Агомелатин воздействует на:

- А. Холинергическую систему
- Б. Серотонинергическую систему
- В. Мелатонинергическую систему
- Г. Норадренергическую систему
- Д. глутаматергическую систему

Клиническая характеристика лобных эпилепсий:

- А. Отсутствие стереотипности приступов. Длительность приступа 2 минуты. Отсутствие вторичной генерализации. Частота приступов 1 раз в неделю.
- Б. Дебют в любом возрасте. Стереотипные приступы. Длительность приступа 30-60 секунд. Необычные двигательные феномены, тонические позы, вокализация. Частота приступов – 10 и более в сутки.
- В. Наличие ауры. Отсутствие двигательных феноменов. Продолжительность приступов 3 минуты. Отсутствие вторичной генерализации.
- Г. Возникают у пожилых пациентов в дневное время. Только тонические приступы продолжительностью 2 минуты и более. Частота приступов 2 раза в месяц.

Какими нарушениями представлен чаще всего дебют рассеянного склероза?

- А. Нейропсихологическими
- Б. Когнитивными
- В. Зрительными нарушениями
- Г. Тазовыми нарушениями
- Д. Психическими нарушениями

Механизм действия эстрогенов у женщин страдающих эпилепсией связан с:

- А. Стимуляцией проницаемости ионотропных ГАМК-рецепторов
- Б. Угнетением проницаемости ионотропных ГАМК-рецепторов
- В. Стимуляцией синтеза ГАМК и подавлением фермента аминотерминальной карбоксилазы
- Г. Угнетением NMDA-рецепторов в гиппокампе
- Д. Повышением концентрации ГАМК в крови

В течение какого срока от появления симптомов ишемического инсульта разрешено применение rtPA для системной тромболитической терапии в России?

- А. До 3 часов
- Б. До 4,5 часов
- В. До 6 часов

Формирование патологических поз и наличие корригирующих жестов характерно для:

- А. Тремора
- Б. Дистонии
- В. Хореи
- Г. Тиков
- Д. Миоклонии

Препаратом выбора для лечения клинически значимого отека головного мозга у больного с ишемическим инсультом является:

- А. Маннитол
- Б. Глюкоза 40%
- В. Реополиглюкин

Для мониторинга состояния системы дыхания у больных с инсультом в первые 72 часа заболевания необходимо использовать:

- А. Оценку насыщения гемоглобина кислородом (SpO₂)
- Б. Оценку жизненной емкости легких
- В. Плетизмографию

Какие препараты предупреждают развитие обострений рассеянного склероза?

- А. Кортикостероиды
- Б. Дофаминэргические
- В. ПИТС
- Г. Антиоксидантные

Для поражения задней центральной извилины характерна следующая комбинация симптомов:

- А. Моноанестезия или гемианестезия, парестезии в противоположной очагу половине тела
- Б. Гемиатаксия, гемианопсия
- В. Моноанестезия и гемиальгии
- Г. Гиперпатия и гемианестезия
- Д. Гемианестезия и гемиатаксия

Какова продолжительность жизни нейронов в ядерной зоне ишемии?

- А. 6-8 мин
- Б. 3-6 часов
- В. 24 часа

Эссенциальный тремор чаще всего представлен тремором:

- А. Покоя
- Б. Изометрическим
- В. Интенционным
- Г. Возобновляющимся
- Д. Постурально-кинетическим

Через какой интервал времени необходимо провести повторное МРТ-исследование у пациента при клинически изолированном синдроме с высоким риском развития развития рассеянного склероза?

- А. Через 1 месяц
- Б. Через 2 месяца
- В. Через 3 месяца
- Г. Через 6 месяцев
- Д. Через 12 месяцев

Как долго следует применять антиагреганты для вторичной профилактики инсульта:

- А. Постоянно пожизненно
- Б. 1 год
- В. Повторными курсами длительностью 1 месяц с перерывами по 3 месяца

Больной с эфферентной моторной афазией:

- А. Понимает обращенную речь, но не может говорить
- Б. Не понимает обращенную речь и не может говорить
- В. Может говорить, но не понимает обращенную речь
- Г. Может говорить, но речь скандированная
- Д. Может говорить, но не помнит названия предметов

Эозинофильная аденома гипофиза у детей проявляется:

- А. Гигантизмом
- Б. Гирсутизмом
- В. Ожирением
- Г. Учащённым мочеиспусканием
- Д. Остеопорозом

Для депрессивного синдрома не характерны:

- А. Переживание тоски
- Б. Двигательная заторможенность
- В. Псевдогаллюцинации
- Г. Идеаторная заторможенность
- Д. Идеи самоуничтожения

Какой препарат не относится к нормотимикам?

- А. Левитирацетам
- Б. Ламотриджин
- В. Вальпроаты
- Г. Карбамазепин

Выберите правильное утверждение. Внутривенное введение 5% глюкозы при ишемическом инсульте:

- А. Может усилить отек мозга за счет снижения осмолярности крови
- Б. Необходимо больным с инсультом для улучшения метаболизма мозга в условиях ишемии
- В. Необходимо больным с инсультом т.к. является основным компонентом в составе «поляризующей смеси»

Невриномы - опухоли для которых характерно все, кроме:

- А. Растут из шванновских клеток
- Б. Растут из задних корешков
- В. Злокачественные
- Г. Доброкачественные
- Д. Локализуются в грудном отделе позвоночника или конском хвосте

Эсциталопрам воздействует на:

- А. Холинергическую систему
- Б. Серотонинергическую систему
- В. Мелатонинергическую систему
- Г. Норадренергическую систему
- Д. глутаматергическую систему

При повреждении внутренних участков перекреста зрительных нервов периметрия выявляет:

- А. Одностороннюю гомонимную гемианопсию
- Б. Нижнеквадрантную гемианопсию
- В. Битемпоральную гемианопсию
- Г. Биназальную гемианопсию
- Д. Верхнеквадрантную гемианопсию

При каких видах черепно-мозговой травмы не наблюдаются очаговые симптомы поражения головного мозга?

- А. Эпидуральная гематома
- Б. Субдуральная гематома
- В. Внутримозговая гематома
- Г. Сотрясение головного мозга
- Д. Ушиб головного мозга

Укажите, какие из перечисленных симптомов не характерны для опухоли мозжечка:

- А. Скандированная речь
- Б. Атаксия
- В. Афазия
- Г. Дисметрия
- Д. Интенционный тремор

Нарушение праксиса носит название:

- А. Апраксия
- Б. Афазия
- В. Агнозия
- Г. Алексия
- Д. Аграфия

Основным для прогноза развития деменции является следующий признак:

- А. Атрофия гиппокампа
- Б. Выраженность увеличения желудочков
- В. Выраженность расширения субарахноидальных пространств
- Г. Атрофия мозжечка

Оптимальными отведениями для выявления эпилептиформной активности у больного височной эпилепсией являются:

- А. Биполярное, с участием височных электродов
- Б. Отведение с усредненным электродом
- В. Референтное с ипсилатеральным ушным электродом
- Г. Вертексное отведение
- Д. Референтное с объединенным ушным электродом

Какие общемозговые симптомы могут наблюдаться при опухолях головного мозга?

- А. Головокружение
- Б. Тошнота
- В. Рвота
- Г. Головная боль
- Д. Все перечисленные

Наиболее постоянными очаговыми симптомами при эпидуральной гематоме являются:

- А. Расширение зрачка на противоположной стороне
- Б. Гемипарез на стороне гематомы
- В. Гемипарез на противоположной стороне
- Г. Вестибулярные расстройства
- Д. Нарушение поверхностной чувствительности на противоположной стороне

Первичным источником метастатических опухолей ЦНС чаще является рак:

- А. Лёгких
- Б. Желудка
- В. Молочной железы
- Г. Матки
- Д. Предстательной железы

Наиболее ранним признаком регенерации аксона при травме периферического нерва является:

- А. Появление парестезий в зоне иннервации поврежденного нерва
- Б. Появление стойкого болевого синдрома в дистальных участках зоны, иннервируемой поврежденным нервом
- В. Регресс трофических расстройств
- Г. Регресс болевого синдрома в дистальных отделах поврежденной конечности
- Д. Регресс болевого синдрома в дистальных отделах поврежденной конечности и трофических расстройств

Базофильная аденома гипофиза проявляется:

- А. Кахексией
- Б. Полидипсией
- В. Булимией
- Г. Гипертермией
- Д. Ожирением (синдром Иценко-Кушинга)

При каком патогенетическом варианте ишемического инсульта для вторичной профилактики показаны непрямые антикоагулянты:

- А. Кардиоэмболическом
- Б. Атеротромботическом
- В. Лакунарном

Слуховая агнозия наступает при поражении:

- А. Теменной доли
- Б. Лобной доли
- В. Затылочной доли
- Г. Височной доли

При рассеянном склерозе проведение МРТ-исследования в режиме с введением контраста служит:

- А. Для определения количества очагов
- Б. Для определения активности процесса
- В. Для определения локализации очагов
- Г. Для определения давности заболевания
- Д. Не имеет диагностического значения

Симптом «горячей ванны» характерен для:

- А. Рассеянного склероза
- Б. Паркинсонизма
- В. Оптического неврита
- Г. Ишемического инсульта
- Д. Опухолей спинного мозга

Какой вид афазии возникает при поражении доминантной лобной доли?

- А. Эфферентная моторная афазия
- Б. Сенсорная афазия
- В. Амнестическая афазия
- Г. Семантическая афазия
- Д. Динамическая афазия

Клиническая характеристика затылочных эпилепсий:

- А. Длительность приступа 3 минуты. Приступ сопровождается кистевыми автоматизмами; сопровождается вокализацией. Хорошо купируется ПЭП.
- Б. 8% всех эпилепсий. Приступ сопровождается простыми зрительными галлюцинациями. Девиация головы и глаз. Более 50% случаев показано нейрохирургическое лечение.
- В. Дебют в любом возрасте. Стереотипные приступы. Длительность приступа 30-60 секунд. Необычные двигательные феномены, тонические позы, вокализация. Частота приступов – 10 и более в сутки.
- Г. Манифестация в пожилом возрасте. Приступ длительностью до 1 минуты, с автоматизмами и двигательными феноменами. Рутинная ЭЭГ неинформативна
- Д. Встречается в 30% эпилепсий. Приступ сопровождается аурой – страхами, слуховыми галлюцинациями. Двигательные феномены. Длительность приступа 4 минуты.

По современным представлениям нейродегенеративный процесс в головном мозге при болезни Паркинсона начинается

- А. В черной субстанции
- Б. В стриатуме
- В. В коре
- Г. В обонятельной луковице и вегетативных ядрах IX, X нервов

Комплексные фокальные приступы характеризуются следующими признаками:

- А. Односторонний или билатеральный фокус в височной или лобной области
- Б. Локальные разряды строго в одной зоне коркового представительства
- В. Генерализованные вспышки с фокальным началом
- Г. Миоклонические подергивания с разрядами
- Д. Коррелятом абсанса

Для лечения болезни Вильсона-Коновалова используют:

- А. Леводопу
- Б. Нейролептики
- В. Бета-блокаторы
- Г. Купренил
- Д. Агонисты дофаминовых рецепторов

При развитии болезни Альцгеймера начинается отложение:

- А. Жиров
- Б. Бета-амилоида
- В. Гомоцистеина
- Г. Холестерина
- Д. Ничего

Изменения на глазном дне при синдроме Фостера-Кеннеди характеризуются:

- А. Атрофией диска зрительного нерва на стороне опухоли и застойными явлениями на противоположном глазном дне и в диске противоположного зрительного нерва
- Б. Атрофией и застоем диска зрительного нерва на стороне опухоли
- В. Атрофией и застоем диска зрительного нерва с двух сторон
- Г. Атрофией диска зрительного нерва на противоположной стороне опухоли
- Д. Застоем диска зрительного нерва на стороне опухоли и атрофией на противоположной стороне

Для больных старше 70 лет препаратами первого выбора при болезни Паркинсона являются:

- А. Леводопа
- Б. Агонисты дофаминовых рецепторов
- В. Ингибиторы МАО-Б
- Г. Амантадины
- Д. Холинолитики

Под первично-прогрессирующим течением рассеянного склероза понимают:

- А. Неуклонное прогрессирующее нарастание неврологических нарушений с самого начала заболевания на протяжении не менее года
- Б. Волнообразное течение с периодами ухудшения и улучшения состояния и отсутствие нарастания симптомов в периоды ремиссий
- В. Волнообразное течение с периодами ухудшения и улучшения состояния и нарастание симптомов в периоды ремиссий
- Г. Смену волнообразного течения с периодами ухудшения и улучшения состояния и отсутствием нарастания симптомов в периоды ремиссий на неуклонное прогрессирующее нарастание неврологических нарушений

Сколько миллионов пациентов в мире страдают эпилепсией (по данным ВОЗ)?

- А. 25 миллионов
- Б. 40 миллионов
- В. 50 миллионов
- Г. 75 миллионов
- Д. 95 миллионов

Какая походка отмечается при поражении паллидонигральной системы?

- А. Спастическая
- Б. Спастико-атактическая
- В. Гемипаретическая
- Г. Шаркающая, мелкими шажками
- Д. Мозжечковая

Вестибулярный неврит проявляется:

- А. Системным головокружением
- Б. Несистемным головокружением
- В. Снижением слуха
- Г. Снижением вкуса
- Д. Мимическим парезом

Укажите, в каких границах среднего артериального давления у нормотоников поддерживается ауторегуляция мозгового кровотока:

- А. 50-120 мм рт. ст.
- Б. 60-160 мм рт. ст.
- В. 110-200 мм рт. ст.
- Г. 130-230 мм рт. ст.
- Д. 150-250 мм рт. ст.

Показанием для наблюдения у психиатра при депрессии является:

- А. Наличие суицидальных мыслей
- Б. Биполярное расстройство
- В. Тяжелая депрессия с психотическими эпизодами
- Г. Все перечисленное

В норме давление ликвора в положении лежа у взрослых равно:

- А. 50-100 мм вод. ст.
- Б. 80-120 мм вод. ст.
- В. 100-180 мм вод. ст.
- Г. 130-250 мм вод. ст.
- Д. 150-300 мм вод. ст.

Нейропатия зрительного нерва проявляется:

- А. Монокулярной слепотой
- Б. Диплопией
- В. Гомонимной гемианопсией
- Г. Биназальной гемианопсией
- Д. Фотопсиями

При когнитивных нарушениях при болезни Паркинсона из противопаркинсонических препаратов следует отдать предпочтение:

- А. Агонистам дофаминовых рецепторов
- Б. Амантадинам
- В. Леводопе
- Г. Ингибиторам МАО-В
- Д. Холинолитикам

К атипичному паркинсонизму не относится:

- А. Мультисистемная дегенерация
- Б. Супрануклеарный паралич
- В. Нейролептический паркинсонизм
- Г. Кортикобазальная дегенерация

Клиническая характеристика теменных эпилепсий:

- А. Дебют – ранний детский возраст. Приступ сопровождается аурой. Приступ купируется ПЭП.
- Б. Манифестация в пожилом возрасте. Приступ длительностью до 1 минуты, с автоматизмами и двигательными феноменами. Рутинная ЭЭГ неинформативна.
- В. Манифестация в любом возрасте. Приступ длительностью 1-2 минуты, с парестезиями, болевыми ощущениями, «сексуальные приступы». Нарушение схемы тела. На ЭЭГ – «биоэлектрически немые» участки.
- Г. Часто встречается у женщин. Сопровождается зрительными галлюцинациями. Длительность приступа 3 минуты. Купируется препаратами ламотриджинового ряда.

К нарушениям мочеиспускания в дебюте рассеянного склероза чаще всего относят

- А. Отсутствие ощущения прохождения мочи
- Б. Истинное недержание мочи
- В. Императивные позывы на мочеиспускание
- Г. Парадоксальные ишурии

По достижении контроля над эпилептическими приступами к постепенной отмене антиконвульсантов приступают через

- А. 6-12 Месяцев
- Б. 4-5 Лет
- В. 2-4 Месяца
- Г. 2-3 Года

Признаком поражения глазодвигательного нерва является

- А. Птоз
- Б. Глиоз
- В. Кифоз
- Г. Миоз

При подозрении на субдуральную гематому стандартным диагностическим методом является

- А. Эхоэнцефалографическое исследование
- Б. Компьютерная томография головного мозга
- В. Трепанация черепа
- Г. Вызов потенциалов головного мозга

К мезенцефальной части парасимпатического отдела сегментарного вегетативного аппарата относятся ядра _____ черепных нервов

- А. V пары
- Б. III пары
- В. VI пары
- Г. IX, X и XII пар

Головная боль средней интенсивности по типу «обруча» характерна для

- А. Мигрени
- Б. Пучковой головной боли
- В. Головной боли напряжения
- Г. Холодовой головной боли

При остром течении синдрома гийена – барре в первую очередь в лечении используют

- А. Десенсибилизирующие препараты
- Б. Плазмаферез
- В. Глюкокортикоиды
- Г. Антибиотики

К дополнительным методам исследования, необходимым для уточнения диагноза вибрационная болезнь, относят

- А. Рентгенографию органов грудной клетки
- Б. Нейроэлектромиографию
- В. Урографию
- Г. УЗИ внутренних органов

Для диагностики болезни вильсона-коновалова применяется определение

- А. Уровня белка Бенс-Джонса в моче
- Б. Уровня цианкоболамина в крови
- В. Церулоплазмина сыворотки
- Г. Креатинфосфокиназы в крови

Классификация вейбеля-филдса деформаций внутренней сонной артерии оценивает

- А. Распространенность деформации
- Б. Форму деформации
- В. Наличие дисплазии
- Г. Грубую гемодинамическую значимость

Школы здоровья чаще организуют по _____ пациентов

- А. Половому составу
- Б. Уровню образования
- В. Профилю заболевания
- Г. Возрасту

Стеноз сонных артерий на шее чаще всего обусловлен

- А. Повреждением наружной стенки сонной артерии
- Б. Врожденной патологией
- В. Атеросклеротическими бляшками
- Г. Ушибом мягких тканей

Оптимальным вариантом удаления вентрально-расположенной эпидермоидной кисты (холестеатомы) цистерн мосто-мозжечкового угла является

- А. Удаление из ретросигмовидного субокципитального доступа с использованием эндоскопической ассистенции
- Б. Удаление из трансорального доступа
- В. Удаление из срединного субокципитального доступа
- Г. Радиохирurgia

Зрительные расстройства при опухолях боковых желудочков обусловлены преимущественно

- А. Воздействием опухоли на четверохолмную пластинку
- Б. Внутрочерепной гипертензией
- В. Воздействием на хиазму
- Г. Внутрочерепной гипертензией, воздействием опухоли на петлю Мейера

Краниофарингиому относят к ____ степени злокачественности

- А. 1
- Б. 3
- В. 4
- Г. 2

Парез разгибателей пальцев и кисти в сочетании со снижением чувствительности в области анатомической табакерки развивается при поражении

- А. Передних рогов спинного мозга на уровне сегментов C5-6
- Б. Мышечно-кожного нерва
- В. Лучевого нерва
- Г. Срединного нерва в области карпального канала

Эпидуральная гематома при черепно-мозговой травме локализуется

- А. В паренхиме головного мозга
- Б. В желудочковой системе головного мозга
- В. Между костью и твердой оболочкой головного мозга
- Г. Между твердой мозговой оболочкой и веществом головного мозга

При боли в спине, сопровождающейся мышечным спазмом, показано назначение

- А. Тизанидина
- Б. Цитиколина
- В. Амитриптилина
- Г. Мелоксикама

Для проводникового типа характерно нарушение чувствительности

- А. Ниже уровня поражения
- Б. В зоне иннервации
- В. Диссоциированное
- Г. На уровне пораженного сегмента

Постэнцефалитный синдром отличается от органического расстройства личности

- А. Некурабельностью
- Б. Менее выраженной клиникой
- В. Прогрессирующим течением
- Г. Обратимостью

Больному с субарахноидальным кровоизлиянием следует назначить

- А. Транексамовую кислоту
- Б. Диклофенак натрия
- В. Ривароксабан
- Г. Низкомолекулярные гепарины

Поражение диафрагмального нерва вызывает

- А. Одышку, затруднение кашлевых движений
- Б. Остановку дыхания
- В. Слабость межреберных мышц
- Г. Боли с иррадиацией в брюшную полость

Симптомом «ликворного толчка» при опухолях спинного мозга называют

- А. Локальную болезненность позвоночника
- Б. Возникновение или резкое усиление боли в зоне иннервации каких-либо корешков спинномозговых нервов, наблюдаемой при сдавливании шейных вен по Квеккенштедту
- В. Усиление локальных болей при кашле, физических нагрузках
- Г. Развитие парапареза после люмбальной пункции

Нарушения речи, характеризующиеся потерей способности правильно использовать ударение, колебания тона, интонацию и эмоциональные жесты, характерны для

- А. Афазии
- Б. Апросодии
- В. Амузии
- Г. Дизартрии

К ранним проявлениям болезни паркинсона относят

- А. Парадоксальную кинезию
- Б. Парадоксальную акинезию
- В. Расстройства обоняния
- Г. Когнитивные нарушения

Для лечения миастенических кризов используют

- А. Пиридостигмин
- Б. Амбенония хлорид
- В. Галантамин
- Г. Неостигмин

К группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина относится

- А. Пароксетин
- Б. Венлафаксин
- В. Вальдоксан
- Г. Флуоксетин

Для менингиом задней черепной ямки наиболее характерным является

- А. Онемение в конечностях по типу «перчаток и носков»
- Б. Нарушение сознания
- В. Двоение предметов при взоре прямо
- Г. Снижение силы в конечностях по пирамидному типу

Полис обязательного медицинского страхования является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на

- А. Бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории РФ
- Б. Оказание медицинской помощи на платной основе
- В. Оплату листка временной нетрудоспособности
- Г. Получение страховой выплаты в результате стойкой утраты работоспособности

Ядра блуждающего нерва расположены в

- А. Мосту
- Б. Среднем мозге
- В. Промежуточном мозге
- Г. Продолговатом мозге

Острое развитие комы характерно для тромбоза

- А. Вены Троланда
- Б. Верхнего сагиттального синуса
- В. Поперечного синуса
- Г. Глубоких церебральных вен

При рассеянном склерозе первично страдают клетки _____ мозга

- А. Коры головного
- Б. Белого вещества головного и спинного
- В. Передних рогов спинного
- Г. Задних рогов спинного

Битемпоральная гемианопсия характерна для опухоли

- А. Пирамиды височной кости
- Б. Гипофиза
- В. Затылочной доли
- Г. Эпифиза

Препаратом, назначаемым для коррекции падения сердечной деятельности при острой тяжёлой черепно-мозговой травме, является

- А. Допамин
- Б. Эпинефрин
- В. Норэпинефрин
- Г. Эфедрин

Через транстемпоральный доступ можно посмотреть

- А. Основную артерию и сифоны внутренних сонных артерий
- Б. Средние, передние и задние мозговые артерии
- В. Основную артерию и задние мозговые артерии
- Г. Основную артерию и наружные сонные артерии

При разрыве аневризм средней мозговой артерии не наблюдают

- А. Парез VI нерва
- Б. Психические расстройства
- В. Субарахноидальное и паренхиматозное кровоизлияние
- Г. Головные боли

Второй нейрон общей чувствительности от задней трети языка, миндалин, мягкого нёба, зева, язычка, внутренней поверхности барабанной перепонки, барабанной полости, сосцевидных ячеек, слуховой трубы и верхней трети глотки находится в

- А. Спинномозговом ядре тройничного нерва (nucleus tractus spinalis)
- Б. Ядре одиночного пути (nucleus tracti solitarii)
- В. Верхнем слюноотделительном ядре (nucleus salivatorius superior)
- Г. Нижнем слюноотделительном ядре (nucleus salivatorius inferior)

Основным компонентом телец леви является

- А. Пресенилин 1
- Б. В-амилоид
- В. А-синуклеин
- Г. Т-протеин

У пациентов с задним шейным симпатическим синдромом отмечается

- А. Сочетание кохлеовестибулярных, зрительных, вестибуломозжечковых нарушений с пульсирующей, жгучей односторонней головной болью
- Б. Выраженная двусторонняя головная боль в затылочной области с тошнотой и повторной рвотой
- В. Сочетание жгучих болей в надключичной области с приступами мышечной слабости в руке
- Г. Сочетание двусторонней затылочной головной боли с корешковыми чувствительными расстройствами в ульнарной области

У пациентов с врожденным синдромом горнера выявляется

- А. Гетерохромия радужки
- Б. Ускоренная реакция зрачка на свет на стороне поражения
- В. Сочетание птоза, миоза, экзофтальма
- Г. Сочетание птоза, мидриаза и энофтальма

При периферической вегетативной недостаточности наблюдают преимущественно

- А. Императивные позывы
- Б. Нарушение опорожнения мочевого пузыря
- В. Периодическое недержание
- Г. Нарушение накопления мочи

Наиболее опасным осложнением стеноза позвоночного канала является

- А. Мононейропатия
- Б. Полинейропатия
- В. Плексопатия
- Г. Миелопатия

Снижение сигнала на t2*импульсной последовательности у пациента с припадками и травмой в анамнезе свидетельствует о

- А. Глиозе
- Б. Демиелинизации
- В. Атрофии
- Г. Геморрагии

У пациентов с синдромом грушевидной мышцы наблюдают

- А. Боль по задней поверхности бедра
- Б. Усиление боли в голени и стопе при приведении бедра
- В. Снижение анального и кремастерного рефлекса
- Г. Боль в паху с иррадиацией в бедро и поясничную область

Антибиотиком, который выбирают при туберкулёзном менингите, является

- А. Ванкомицин
- Б. Цефтриаксон
- В. Изониазид
- Г. Бензилпенициллин

Признаком посткоммоционного синдрома является

- А. Диплопия
- Б. Гемиплегия
- В. Атаксия
- Г. Астения

Если у больного отмечается прозопопарез и слёзотечение в сочетании с нарушением вкуса на передних двух третях языка и гиперакузией, то очаг локализован в

- А. Верхней трети фаллопиева канала
- Б. Нижней трети фаллопиева канала
- В. Области шилососцевидного отверстия
- Г. Средней трети фаллопиева канала

Невральная амиотрофия шарко-мари-тута может быть определена как синдром

- А. Центрального тетрапареза
- Б. Полиневропатии
- В. Бокового амиотрофического склероза
- Г. Альтернирующего синдрома

Санаторно-курортное лечение больному с невропатией лицевого нерва начинают _____ начала заболевания

- А. Через 1-2 месяца от
- Б. Через год от
- В. С первых дней
- Г. Через 6 месяцев от

Астереогноз является симптомом, заключающимся в отсутствии способности

- А. Узнавать предмет зрительно
- Б. Критично относиться к своему заболеванию
- В. Правильно ориентироваться в частях своего тела
- Г. Узнавать предмет наощупь

Атрофия мышц – это основной симптом

- А. Спастического паралича
- Б. Болезни Паркинсона
- В. Вялого паралича
- Г. Миастении

В качестве антиоксидантной терапии при лечении алкогольной и токсической полинейропатии эффективно назначение

- А. Тиоктовой кислоты
- Б. Гинкго двулопастного листьев экстракта
- В. Циннаризина
- Г. Гамма-амино-бета-фенилмасляной кислоты гидрохлорида

Сосудистые, секреторные и трофические сегментарные расстройства возникают при поражении спинного мозга на уровне

- А. Передних рогов
- Б. Задних рогов
- В. Задних канатиков
- Г. Боковых рогов

Экстрапирамидные симптомы при опухолях лобной доли включают

- А. Пароксизмально возникающий астереогноз
- Б. Крупноразмахистый тремор в конечностях
- В. Повышение тонуса в конечностях по спастическому типу
- Г. Мелкоразмахистый тремор в конечностях

Исправления в учетной форме п 025/у «медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» подтверждаются

- А. Подписью врача, заполняющего карту
- Б. Подписью заведующего отделением
- В. Решением врачебной комиссии
- Г. Подписью главного врача

К основным неврологическим проявлениям синдрома задней обратимой энцефалопатии относится

- А. Нижний центральный парепарез
- Б. Диплопия
- В. Головная боль
- Г. Атаксия

Для профилактики и лечения констриктивно-обструктивной артериопатии при субарахноидальном кровоизлиянии используют

- А. Нимодипин
- Б. Пропранолол
- В. Аминофиллин
- Г. Нифедипин

В цереброспинальной жидкости при синдроме гийена-барре повышается содержание

- А. Глюкозы
- Б. Белка
- В. Хлоридов
- Г. Лимфоцитов

Наибольшее значение в лучевой диагностике болезни альцгеймера имеет

- А. Дигитальная субтракционная ангиография
- Б. Компьютерная томография
- В. Магнитно-резонансная томография
- Г. Однофотонная эмиссионная томография

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимается на (в годах)

- А. 1
- Б. 4
- В. 2
- Г. 3

Криблурой называют

- А. Расширенное периваскулярное пространство
- Б. Лакунарную кисту
- В. Расширенное субарахноидальное пространство
- Г. Посттравматическую кисту

Спровоцировать развитие ретробульбарного неврита у пациента с рассеянным склерозом может

- А. Подъем артериального давления
- Б. Прогулка на свежем воздухе
- В. Посещение бани и сауны
- Г. Однократный подъем тяжести

Блуждающий нерв имеет общее ядро с _____ нервом

- А. XI
- Б. VII
- В. XII
- Г. IX

Для альтернирующего синдрома шмидта характерно наличие _____ на стороне поражения, _____ на противоположной стороне

- А. Периферического паралича мягкого нёба, голосовой связки, мышц языка; центральной гемиплегии и гемианестезии
- Б. Паралича мягкого нёба и голосовой связки, синдрома Горнера, мозжечковой атаксии, расстройства поверхностной чувствительности на лице; гемианестезии
- В. Периферического паралича мышц языка; центральной гемиплегии
- Г. Периферического паралича мягкого нёба, голосовой связки, мышц языка, грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц; центральной гемиплегии и гемианестезии

Целью диспансеризации населения является

- А. Сохранение здоровья пациентов конкретного лечебно-профилактического учреждения
- Б. Улучшение здоровья населения
- В. Оказание специализированной медицинской помощи
- Г. Наблюдение за прикрепленным контингентом

При эссенциальном наследственном дрожании препаратами выбора являются

- А. ДОФА-содержащие средства
- Б. Агонисты дофаминовых рецепторов
- В. Бензодиазепины
- Г. Антихолинэстеразные средства

У пациентов с кохлеарным невритом наблюдают

- А. Изолированное снижение воздушной проводимости
- Б. Сочетанное снижение костной и воздушной проводимости
- В. Изолированное снижение костной проводимости
- Г. Гиперакузию

Изменение контура ног по типу «опрокинутой бутылки» обусловлено изменением массы мышц при

- А. Мышечной дистрофии Эрба
- Б. Мышечной дистрофии Беккера – Киннера
- В. Гипертрофической невропатии Дежерина – Сотта
- Г. Амиотрофии Шарко – Мари – Тута

Через трансокипитальный доступ можно посмотреть

- А. Основную артерию и сифоны внутренних сонных артерий
- Б. Основную артерию и задние мозговые артерии
- В. Дистальные сегменты позвоночной артерии и основную артерию
- Г. Основную артерию и наружные сонные артерии

Нейровизуализационным синдромом посттравматической гидроцефалии на КТ и МРТ является

- А. Асимметричный отёк головного мозга
- Б. Баллонообразное расширение желудочковой системы мозга
- В. Увеличение объёма субарахноидальных щелей
- Г. Асимметрия объёма желудочков мозга

Квадрантная гемианопсия возникает при поражении

- А. Височной доли
- Б. Сетчатки глаза
- В. Хиазмы
- Г. Внутренней капсулы

Гипертензионная головная боль возникает

- А. После физической нагрузки
- Б. Вечером
- В. Рано утром
- Г. После психоэмоциональной нагрузки

Длительность неврологических расстройств при транзиторной ишемической атаке составляет до

- А. 3 Недель
- Б. 24 Часов
- В. 2 Суток
- Г. 7 Дней

Арефлексия детрузора мочевого пузыря возникает при поражении _____ мозга

- А. Грудного отдела спинного
- Б. Крестцового отдела спинного
- В. Ствола головного
- Г. Поясничного отдела спинного

Нормотимиком без противосудорожного действия является

- А. Леводопа
- Б. Карбонат лития
- В. Карбамазепин
- Г. Вальпроат натрия

Артериальные сосуды, являющиеся возможной причиной развития невралгии тройничного нерва - это

- А. Верхняя мозжечковая, задняя мозговая артерии
- Б. Внутренняя сонная артерия
- В. Верхняя мозжечковая артерия
- Г. Верхняя мозжечковая, эктопированная позвоночная артерии

Фактором риска возникновения инсульта является

- А. Астения
- Б. Депрессия
- В. Тревога
- Г. Апатия

В структуре клинической картины ревматического поражения нервной системы у детей обычно наблюдается

- А. Вторичная ранняя дистония
- Б. Малая хорея Сиденгама
- В. Нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу
- Г. Церебральный васкулит

Супинация предплечья нарушается при поражении _____ нерва

- А. Локтевого
- Б. Лучевого
- В. Мышечно-кожного
- Г. Срединного

Документом о временной нетрудоспособности при заболевании или травме, наступивших вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения является

- А. Справка на все дни
- Б. Листок нетрудоспособности с указанием кода 21
- В. Листок нетрудоспособности на 3 дня
- Г. Выписка из протокола решения медицинской комиссии

Ядро блокового нерва расположено в

- А. Среднем мозге на уровне верхних бугров четверохолмия
- Б. Верхней части варолиева моста
- В. Среднем мозге на уровне нижних бугров четверохолмия
- Г. Нижней части варолиева моста

Синдром полиневропатии с артрозами и периартрозами лучезапястных и локтевых суставов характерен для вибрационной болезни

- А. Только 1 степени
- Б. Только 2 степени
- В. 3 Степени
- Г. 1-2 Степени

Препаратом со специфическим механизмом действия для купирования приступа мигрени является

- А. Напроксен
- Б. Ибупрофен
- В. Золмитриптан
- Г. Метопролол

При сахарном диабете наиболее часто развивается нейропатия черепных нервов

- А. VII, XI, XII
- Б. III, IV, VI, VII
- В. X, XI, XII
- Г. IX, X

К синуклеинопатиям относится

- А. Деменция с тельцами Леви
- Б. Лобно-височная деменция
- В. Кортико-базальная дегенерация
- Г. Прогрессирующий надъядерный паралич

Диплопия может наблюдаться при лечении алкогольной полинейропатии

- А. Тиамином
- Б. Пиридоксином
- В. Тиоктовой кислотой
- Г. Прегабалином