

Тесты с вопросами по специальности «Неврология» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/nevrolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Неврология» для аккредитации и других экзаменов (4900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/nevrologiya/

2) Мануальная терапия — тесты с ответами

→ medik-otvet.ru/product/manualnaya/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Укажите, через какие ножки мозжечка проводятся импульсы от коры больших полушарий?

- А. верхние
- Б. средние
- В. нижние
- Г. верхние и средние
- Д. верхние и нижние

Ганглионит Гассерова узла проявляется:

- А. снижением вкуса на половине языка
- Б. папулезными высыпаниями
- В. болью в области высыпаний
- Г. гипестезия половины лица
- Д. диссоциированное расстройство чувствительности на лице

Невропатия тройничного нерва проявляется:

- А. снижением корнеального рефлекса
- Б. гипестезия в зоне иннервации ветвей нерва
- В. гипестезией в зонах Зельдера
- Г. гиперакузией
- Д. выраженный болевой синдром

Синдром Гертвига-Мажанди при субтенториальных опухолях реже наблюдается при опухолях:

- А. червя мозжечка
- Б. полушарий мозжечка
- В. мостомозжечкового угла
- Г. одинаково при любой локализации

Для изолированной сенсорной афазии характерна следующая комбинация симптомов:

- А. парафазии, «словесный салат», нарушение понимания простых и сложных инструкций
- Б. персеверация, словесный эмбол, «телеграфный стиль»
- В. нарушение повторения слов и предложений, нарушение рядовой речи, неправильное название предметов
- Г. нарушение фонематического слуха, словесный эмбол, неправильное название предметов
- Д. нарушение понимания возвратных, сравнительных, атрибутивных конструкций

Доказанной эффективностью при лечении острого периода синдрома Гийена-Барре обладают:

- А. антибиотики
- Б. плазмаферез
- В. внутривенное введение иммуноглобулинов
- Г. стероиды
- Д. витамины группы В

Основные признаки идиопатических эпилепсий:

- А. возраст зависимый дебют - отсутствует
- Б. наличие неврологических симптомов - характерно
- В. изменение семиологии приступов в течение заболевания - нередко
- Г. психопатологические симптомы - отсутствуют

Для диагностики поражения периферических нервов используется:

- А. электронейромиография
- Б. электроэнцефалография
- В. панч-биопсия кожи
- Г. ультразвуковое исследование

Какие симптомы не характерны для сотрясения головного мозга?

- А. кратковременная утрата сознания
- Б. рвота
- В. параличи
- Г. нистагм
- Д. головокружение

Диабетическая вегетативная полиневропатия проявляется:

- А. вялым тетрапарезом
- Б. ортостатической гипотензией
- В. дыхательной недостаточностью
- Г. сердечными аритмиями
- Д. эректильной дисфункцией

Моторные тики считаются хроническими, если они наблюдаются более:

- А. 6 месяцев
- Б. 1 года
- В. 3 месяцев
- Г. 3 лет
- Д. 5 лет

Синдром Фостера - Кеннеди характеризуется:

- А. атрофией диска зрительного нерва на стороне опухоли и застойными явлениями на противоположном глазном дне и в диске противоположного зрительного нерва
- Б. атрофией и застоем диска на стороне опухоли
- В. атрофией и застоем диска с двух сторон
- Г. атрофией диска на противоположной стороне опухоли
- Д. застоем диска на стороне опухоли и атрофией на противоположной стороне

Реакция при пробе с гипервентиляцией служит для:

- А. оценки состояния коры
- Б. выявления скрытой эпилептиформной активности
- В. оценки таламической активации

Диабетическая проксимальная полиневропатия проявляется:

- А. вялым тетрапарезом
- Б. акроцианозом, гипергидрозом дистальных отделов конечностей
- В. гипотрофией мышц бедер
- Г. недержанием мочи
- Д. снижением коленных рефлексов

Какой из белков миелина центральной нервной системы человека является наиболее иммуногенным?

- А. основной белок миелина
- Б. миелин-ассоциированный гликопротеин
- В. протеолипидный протеин
- Г. фибриллярный белок
- Д. миелин-олигодендроцитарный гликопротеин

К ранним признакам болезни Паркинсона относится все, кроме:

- А. нарушение поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз
- Б. зрительные галлюцинации
- В. гипосмия
- Г. запоры
- Д. депрессия

Какие из перечисленных симптомов не характерны для субарахноидального кровоизлияния?

- А. «светлый» промежуток
- Б. кровь в ликворе
- В. изменение уровня сознания
- Г. менингеальные симптомы
- Д. головная боль

Клиническая характеристика затылочных эпилепсий:

- А. приступы сопровождаются парестезиями, дизестезиями, аутоагнозией
- Б. характерны приступы в виде мелькания мушек перед глазами, преходящего амавроза, зрительных галлюцинаций
- В. для приступа характерны ощущения уже виденного или слышанного, различные автоматизмы
- Г. возникают в любом возрасте, сопровождаются короткими приступами (30-60 сек), преимущественно в ночное время

Ранними симптомами опухоли лобно-мозолистой локализации являются:

- А. двусторонний пирамидный парез в ногах
- Б. нарушения координации
- В. нарушения поведения
- Г. битемпоральные дефекты поля зрения

Для поражения задней мозговой артерии характерно наличие:

- А. гомонимной гемианопсии
- Б. биназальной гемианопсии
- В. концентрического сужения полей зрения

Алкогольная полиневропатия проявляется:

- А. симптомами натяжения нервных стволов
- Б. медленно прогрессирующим вялым тетрапарезом
- В. гипестезией по типу перчаток и носок
- Г. трофическими язвами
- Д. акроцианозом, дистальным гипергидрозом

Какой препарат не рекомендован при сочетании болезни Паркинсона и эпилепсии?

- А. вальпроаты
- Б. левитирацетам
- В. ламотриджин
- Г. габапентин

Компьютерная томография позволяет диагностировать гиперденситивные участки геморрагических экстравазатов при субарахноидальном кровоизлиянии в мозг спустя:

- А. 1 ч от начала кровоизлияния
- Б. 6 ч от начала кровоизлияния
- В. 24 ч от начала кровоизлияния

Тортиколлис это -

- А. наклон головы кзади
- Б. наклон головы кпереди
- В. поворот головы в сторону
- Г. наклон головы в сторону
- Д. любое положение головы при дистонии

Атипичная МРТ-картина при рассеянном склерозе:

- А. опухолеподобные очаги больших размеров
- Б. очаги в спинном мозге
- В. очаги в мозолистом теле
- Г. очаги размерами более 3 мм в диаметре
- Д. перивентрикулярные очаги

Первичным источником метастатических опухолей ЦНС чаще является рак:

- А. лёгких
- Б. печени
- В. матки
- Г. предстательной железы

Экспериментальный аллергический энцефаломиелит вызывают:

- А. введением белка миелина
- Б. введением токсина МФТП
- В. введением токсина оксотреморина
- Г. экспериментальной окклюзией сосудов
- Д. травматическим повреждением мозга

Невропатия зрительного нерва проявляется:

- А. монокулярной слепотой
- Б. двусторонними мерцающими скотомами
- В. битемпоральной гемианопсией
- Г. биназальной гемианопсией
- Д. атрофией зрительного нерва

Поражение подъязычного нерва проявляется:

- А. снижением глоточного рефлекса
- Б. Гиперакузией
- В. девиацией языка в сторону поражения
- Г. атрофией половины языка
- Д. дизартрией

К атипичному паркинсонизму относят:

- А. сосудистый паркинсонизм
- Б. болезнь Паркинсона
- В. болезнь диффузных телец Леви
- Г. посттравматический паркинсонизм

Назовите стадии развития экстрамедуллярных опухолей:

- А. менингеальная
- Б. невральная
- В. корешковая
- Г. половинное поражение спинного мозга (синдром Броун-Секара)
- Д. полного поперечного поражения спинного мозга

Причиной субарахноидального кровоизлияния чаще всего бывает:

- А. аневризма или артерио-венозная мальформация
- Б. артериальная гипертензия
- В. прием антикоагулянтов

Что не является причиной эпилепсии у взрослых:

- А. инсульт
- Б. энцефалит
- В. болезнь Паркинсона
- Г. травма головного мозга

Какая стадия сна наиболее эффективна для выявления эпилептиформной активности у лиц, подозреваемых на наличие фокальной эпилепсии:

- А. 1 стадия сна
- Б. дремотное состояние
- В. 3-4 стадия сна
- Г. 2 стадия сна
- Д. REM стадия сна

Раннее назначение леводопы увеличивает риск:

- А. когнитивных расстройств
- Б. депрессии и тревоги
- В. постуральной неустойчивости
- Г. моторных флуктуаций и дискинезий
- Д. тазовых нарушений

Какие признаки не характерны для синдрома Вебера?

- А. птоз
- Б. парез IX-X пар черепных нервов
- В. мидриаз
- Г. парез III пары черепных нервов
- Д. гемипарез

Для вегетативной полиневропатии характерны:

- А. акроцианоз
- Б. дистальный гипергидроз
- В. нестабильность артериального давления
- Г. сегментарные нарушения чувствительности
- Д. вялый монопарез

Диабетическая полиневропатия проявляется:

- А. дистальной гипестезией конечностей
- Б. спастическим монопарезом
- В. трофическими нарушениями
- Г. нейропатическим болевым синдромом
- Д. симптомами натяжения нервных стволов

Диагностически значимым при рассеянном склерозе являются следующие изменения:

- А. АТ к вирусу простого герпеса в крови
- Б. олигоклональные Ig G в ликворе
- В. лимфопения
- Г. гиперпротеинемия
- Д. эозинофилия

Эссенциальный тремор чаще всего представлен тремором:

- А. покоя
- Б. изометрическим
- В. интенционным
- Г. возобновляющим
- Д. постурально-кинетическим

Укажите, при каких видах травмы спинного мозга возможны стойкие парезы конечностей?

- А. сотрясении спинного мозга
- Б. гематомииелии
- В. гематорахисе
- Г. при всем из перечисленного

Какие симптомы не могут возникать при ушибе головного мозга?

- А. общемозговые
- Б. оболочечные
- В. вегетативные
- Г. очаговые
- Д. дислокационные

Дебют идиопатических форм эпилепсий развивается в возрасте?

- А. до 15 лет
- Б. 15-34 года
- В. 35-64 года
- Г. 65 лет и старше
- Д. 70 лет и старше

Для супрануклеарного паралича характерно:

- А. асимметричное начало
- Б. псевдобульбарный синдром
- В. преимущественное вовлечение проксимальной мускулатуры
- Г. преимущественное вовлечение дистальной мускулатуры
- Д. падения, преимущественно назад

Характеристика спинальных очагов на МРТ при рассеянном склерозе:

- А. очаги распространяются более чем на 3 сегмента, занимают менее половины поперечного сечения спинного мозга, не вызывают утолщение спинного мозга
- Б. очаги не должны распространяться более чем на 3 сегмента, занимают менее половины поперечного сечения спинного мозга, не вызывают утолщение спинного мозга
- В. очаги не должны распространяться более чем на 3 сегмента, занимают менее половины поперечного сечения спинного мозга, вызывают утолщение спинного мозга
- Г. очаги не должны распространяться более чем на 2 сегмента, занимают менее половины поперечного сечения спинного мозга, не вызывают утолщение спинного мозга

Одновременное развитие центрального пареза правой руки и левой ноги характерно для поражения:

- А. внутренней капсулы
- Б. боковых столбов спинного мозга
- В. продолговатого мозга на уровне перекреста двигательных путей
- Г. лобной доли
- Д. шейного утолщения

Какая популяция Т-клеток играет ведущую роль в патогенезе рассеянного склероза?

- А. Th17
- Б. Т-киллеры
- В. Т-супрессоры
- Г. Т-фолликулярный
- Д. Т-клетки не участвуют в патогенезе рассеянного склероза

Для болезни Паркинсона характерно:

- А. асимметричное начало
- Б. тремор покоя
- В. постуральные нарушения
- Г. развитие деменции в первый год развития заболевания
- Д. раннее развитие тазовых нарушений

Амнестическая афазия наблюдается при поражении:

- А. лобной доли
- Б. теменной доли
- В. стыка лобной и теменной
- Г. стыка височной и теменной доли
- Д. височной

При афферентной моторной афазии нарушено:

- А. спонтанная речь
- Б. автоматизированная речь
- В. повторение слов
- Г. понимание речи окружающих
- Д. артикуляция звуков

Для диагностики болезни Вильсона-Коновалова необходимо:

- А. определение церрулоплазмина в крови
- Б. исследование роговического кольца Кайзера-Флейшера
- В. электромиография
- Г. исследование сывороточного железа
- Д. исследование уровня кальция в крови

Отсутствие позывов к мочеиспусканию, затрудненное мочеиспускание тонкой струей, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, хроническая задержка мочи обозначается термином-

- А. гиперактивный мочевой пузырь
- Б. императивные позывы
- В. детрузорно-сфинктерная диссинергия
- Г. гиперрефлексия детрузора
- Д. гипорефлексия детрузора

ЭЭГ формируется полностью к:

- А. 4годам
- Б. 5годам
- В. 12 годам
- Г. 16 годам
- Д. 18 годам

Компьютерная томография выявляет зону гиподенсивности в очаге ишемического инсульта:

- А. через 10 и более часов от начала заболевания
- Б. сразу в начале развития заболевания
- В. через 4 ч от начала заболевания
- Г. к концу острейшего периода

В патогенезе каких заболеваний преобладает демиелинизирующий компонент?

- А. острый рассеянный энцефаломиелит
- Б. менингит
- В. васкулиты
- Г. энцефалит
- Д. герпетический энцефалит
- Е. бактериальный менингоэнцефалит

Для коррекции "истощения" эффекта разовой дозы леводопы используют:

- А. уменьшение кратности приема леводопы с увеличением разовой дозы
- Б. увеличение кратности приема леводопы с уменьшением разовой дозы
- В. назначение леводопы каждый час в минимальной дозе
- Г. модификация диеты с увеличением доли белка в суточном рационе
- Д. назначение леводопы строго до приема пищи

Характеристика очагов на МРТ при рассеянном склерозе:

- А. овальной формы, размерами более 3 мм, локализованные в белом веществе
- Б. мелкие очаги размерами менее 3 мм
- В. очаги чаще всего локализованы в сером веществе головного мозга
- Г. очаги больших размеров локализованы в височных долях
- Д. очаги размерами более 3 мм, как правило овальной формы, локализованы в сером веществе

При невропатии лицевого нерва наблюдаются:

- А. гипосмия
- Б. полный односторонний парез мимической мускулатуры
- В. лагофthalm
- Г. онемение половины лица
- Д. симптом Белла

При поражении срединного нерва не возникает:

- А. нарушение сгибания 1-го, 2-го и отчасти 3-го пальцев кисти
- Б. нарушение пронации кисти
- В. гипотрофия тенара
- Г. снижение мышечно-суставного чувства в концевых фалангах 2-го и 3-го пальцев кисти
- Д. атрофии межкостных мышц кисти

Клиническая характеристика височных эпилепсий:

- А. дебют в любом возрасте. Короткие приступы (30-60сек), высокая частота, преимущественно в ночное время
- Б. приступы сопровождаются парестезиями, дизестезиями
- В. для приступов характерны ощущения уже виденного или слышанного, различные автоматизмы
- Г. характерны приступы в виде мелькания мошек перед глазами, преходящего амавроза, зрительных галлюцинаций

Иммунный ответ при рассеянном склерозе характеризуется всем ниже перечисленным, кроме:

- А. повышенный уровень экспрессии молекул межклеточной адгезии
- Б. низкий уровень противовоспалительных цитокинов
- В. высокий уровень провоспалительных цитокинов
- Г. низкий уровень провоспалительных цитокинов
- Д. высокая продукция аутоантител

При каких видах черепно-мозговой травмы наблюдается «светлый» промежуток:

- А. субарахноидальное кровоизлияние .
- Б. сотрясение головного мозга
- В. субдуральная гематома
- Г. ушиб головного мозга
- Д. диффузное аксональное повреждение

Поясничная радикулопатия проявляется:

- А. спастическим парапарезом
- Б. симптомами натяжения нервных корешков
- В. тазовыми нарушениями
- Г. поясничной болью
- Д. снижением ахиллова рефлекса на стороне поражения

Вестибулярный неврит проявляется:

- А. системным головокружением
- Б. несистемным головокружением
- В. спонтанным нистагмом
- Г. дизартрией
- Д. тошнотой

Препаратами первого ряда для лечения пациентов с болезнью Паркинсона старше 70 лет являются:

- А. агонисты дофаминовых рецепторов
- Б. амантадины
- В. холинолитики
- Г. леводopa
- Д. ингибиторы МАО-В

Из какого зародышевого листка развиваются глиомы?

- А. мезодермы
- Б. нейроэктодермы
- В. эктодермы
- Г. энтодермы
- Д. из всех перечисленных

К миелинокластиям не относят:

- А. рассеянный склероз
- Б. острый рассеянный энцефаломиелит
- В. оптикомиелит Девика
- Г. оптический неврит
- Д. врожденная лейкодистрофия

Клинические критерии идиопатических фокальных эпилепсий детского возраста:

- А. наличие изменений при нейровизуализации
- Б. начало в возрасте старше 15 лет
- В. наличие генерализованных тонических и атонических приступов
- Г. дебют до 15 лет, как правило, благоприятный исход
- Д. наличие поведенческих и когнитивных нарушений

Для поражения дорсолатерального отдела продолговатого мозга (альтернирующий синдром Валленберга - Захарченко) не является характерным наличие:

- А. паралича мягкого неба, голосовой связки на стороне очага
- Б. атаксии на стороне очага
- В. сегментарных расстройств чувствительности на лице на стороне очага
- Г. нарушения болевой и температурной чувствительности на противоположной очагу стороне
- Д. гемипареза на стороне очага поражения

Морфологически невропатии подразделяются на:

- А. демиелинизирующие
- Б. моторные
- В. глиальные
- Г. аксональные
- Д. смешанные

Основным показанием для назначения оксibuтини́на гидрохлорида является:

- А. гиперактивный мочевой пузырь
- Б. атония мочевого пузыря
- В. детрузорно-сфинктерная диссинергия
- Г. арефлексия детрузора
- Д. гипорефлексия детрузора

Симптом корешковых болей положения наиболее характерен:

- А. для эпидуральных неврином
- Б. для субдуральных неврином
- В. для эпидуральных менингиом
- Г. для субдуральных менингиом
- Д. для всех перечисленных

Скорость регенерации поврежденного аксона при травматическом разрыве нерва составляет:

- А. 0,1 мм\сут
- Б. 1 мм\сут
- В. 10 мм\сут
- Г. 1 мм в 10 дней
- Д. 1 мм в 30 дней

Поражение обонятельного нерва проявляется:

- А. аносмией
- Б. обонятельными галлюцинациями
- В. гипосмией
- Г. диплопией

Тромбоз основной артерии проявляется:

- А. поражением ствола и потерей сознания
- Б. поражением варолиева моста
- В. моторной афазией

Прагматика – это

- А. возможность выполнения целенаправленных действий
- Б. возможность двигаться
- В. возможность принимать решения
- Г. возможность писать
- Д. возможность читать

Для коррекции дискинезий "пики дозы" используют:

- А. снижение разовой дозы леводопы
- Б. повышение разовой дозы леводопы.
- В. назначение ингибиторов КОМТ
- Г. добавление холинолитика

Для болезни диффузных телец Леви характерно:

- А. раннее развитие деменции
- Б. зрительные галлюцинации
- В. тремор покоя
- Г. парез зрения
- Д. флуктуации психического статуса

Конкордантность по рассеянному склерозу у однополых монозиготных близнецов составляет?

- А. 0,03%
- Б. 0,3%
- В. 3%
- Г. 30%

Для неполного травматического перерыва нервного ствола характерны:

- А. сочетание симптомов выпадения с симптомами раздражения в чувствительной сфере
- Б. сосудистые расстройства в зоне иннервации
- В. выраженный болевой синдром
- Г. вегетативно-трофические расстройства в зоне иннервации
- Д. все перечисленное

Для интрамедуллярной спинальной опухоли наиболее характерно наличие:

- А. сегментарного диссоциированного расстройства чувствительности
- Б. корешковых болей положения
- В. ранней блокады субарахноидального пространства
- Г. рентгенологического симптома Эльсберга - Дайка
- Д. все перечисленное

Из каких клеток нервной ткани состоит невринома?

- А. астроцитов
- Б. шванновских
- В. олигодендроцитов
- Г. нейроцитов
- Д. микроглиальных

Каковы первые проявления опухоли мозолистого тела:

- А. психические расстройства
- Б. апатия
- В. сонливость
- Г. нарушение памяти
- Д. все перечисленные

Компьютерная томография наиболее информативна при локализации опухоли:

- А. в полушариях головного мозга
- Б. в базальной зоне головного мозга
- В. в задней черепной ямке
- Г. в краниовертебральной области
- Д. верно оба Б и В

Препаратами первого выбора при лечении соматизированных депрессий являются:

- А. трициклические анитдепрессанты
- Б. СИОЗС
- В. четырехциклические антидепрессанты
- Г. ингибиторы МАО

Чем не характеризуется атеротромботический инсульт в соответствии с критериями TOAST:

- А. размер очага менее 1.5 см
- Б. наличие стенозов >50% в интра- или экстракраниальных артериях
- В. наличие ТИА в анамнезе в том же сосудистом бассейне
- Г. имеется кардиальный источник эмболии

Отличительной особенностью проявлений депрессии у соматических пациентов является:

- А. многочисленность жалоб и их неопределенность
- Б. суицидальные мысли
- В. чувство самоуничижения
- Г. неспецифические мышечно-скелетные жалобы
- Д. утомляемость

Для болевой дистальной полиневропатии характерны:

- А. гиперпатия в дистальных отделах конечностей
- Б. дизестезии в зонах гипестезии
- В. анизорефлексия
- Г. аллодиния
- Д. миоклонии

К генетическим особенностям рассеянного склероза не относят:

- А. наличие семейных форм
- Б. строго моногенное наследование
- В. наличие генетической предрасположенности
- Г. повышенный риск РС среди монозиготных близнецов
- Д. полигенный характер предрасположенности

При оценке дермографизма следует учитывать, что в норме:

- А. красный дермографизм более отчетливо определяется на коже верхней части туловища
- Б. красный дермографизм более отчетливо определяется на коже нижних конечностей
- В. белый дермографизм более отчетливо определяется на коже верхней части туловища
- Г. белый дермографизм более отчетливо определяется на коже нижних конечностей
- Д. красный дермографизм более отчетливо определяется на коже верхней части туловища; белый дермографизм более отчетливо определяется на коже нижних конечностей

Для исключения вторичного синдрома беспокойных ног наиболее информативным показателем является:

- А. уровень ферритина сыворотки крови
- Б. уровень сывороточного железа
- В. уровень кальция в крови
- Г. уровень натрия в крови

Умеренное когнитивное расстройство:

- А. ограничивает повседневную активность
- Б. приводит к утрате профессиональных навыков
- В. ограничивает бытовую активность
- Г. не ограничивает повседневную активность

Укажите, что не относится к характеристикам астенического синдрома:

- А. эмоциональная лабильность
- Б. повышенная утомляемость
- В. гиперстезии
- Г. раздражительность
- Д. оглушенность

Какие участки нервной системы наиболее подвержены демиелинизации?

- А. кора мозга
- Б. мозолистое тело
- В. базальные ганглии
- Г. ядра ствола
- Д. передние рога спинного мозга

Рекомендованный курс терапии антидепрессантами:

- А. 1-2 недели
- Б. 1-2 месяца
- В. 5-6 месяцев
- Г. более 2 лет

Для моторной полиневропатии характерно:

- А. патологические стопные и кистевые рефлексy
- Б. гиперрефлексия
- В. снижение ахилловых и карпо-радиальных рефлексов
- Г. слабость мышц кистей и стоп
- Д. гипотрофии преимущественно дистальных отделов конечностей

При лечении больных с диабетической полиневропатией используются:

- А. витамины группы В
- Б. нейрометаболики
- В. тромболитики
- Г. противоэпилептические препараты
- Д. препараты альфа-липоевой кислоты

Доминантным считается полушарие, с которым связана функция:

- А. памяти
- Б. восприятия
- В. речи
- Г. движений

Тремор, возникающий при удержании позы, называется:

- А. покоя
- Б. постуральный
- В. кинетический
- Г. интенционный
- Д. изометрический

Для мультисистемной атрофии не характерно:

- А. раннее развитие ортостатической гипотензии
- Б. флуктуации психического статуса
- В. акинетико-ригидный симптомокомплекс
- Г. тазовые нарушения
- Д. тремор покоя

Укажите, при поражении каких образований мозга не возникает астереогноз?

- А. задние столбы спинного мозга
- Б. внутренняя капсула
- В. задняя центральная извилина
- Г. теменная доля

Амнестическая афазия наблюдается при поражении

- А. стыка височной и теменной доли
- Б. стыка лобной и теменной доли
- В. теменной доли

Для нижнего синдрома красного ядра (синдром Клода) не является характерным наличие:

- А. паралича глазодвигательного нерва на стороне очага
- Б. гемипареза, гемигипестезии на противоположной стороне
- В. гемиатаксии на противоположной очагу стороне
- Г. гипотонии мышц конечностей на противоположной очагу стороне
- Д. интенционного тремора на противоположной очагу стороне

Факторами риска хронической ишемии мозга являются:

- А. артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклероз
- Б. тиреотоксикоз, сахарный диабет, молодой возраст
- В. острые инфекционные заболевания, женский пол, монголоидная раса

К структурным единицам венозной системы головного мозга относят все, кроме:

- А. посткапиллярные венулы
- Б. мозговые вены
- В. венозные синусы
- Г. артериовенозные анастомозы
- Д. магистральные вены

Деменция может развиваться:

- А. после 30 лет
- Б. после 40 лет
- В. после 50 лет
- Г. после 60 лет
- Д. в любом возрасте

Синдром Захарченко - Валленберга (латеральный медуллярный синдром) возникает при закупорке:

- А. нижней задней артерии мозжечка
- Б. парамедианных артерий моста
- В. коротких циркулярных артерий моста

При травматическом параличе Дюшенна-Эрба страдает функция мышц:

- А. дельтовидной и трехглавой
- Б. двухглавой
- В. разгибатели кисти
- Г. дельтовидной, двухглавой, надостной, подостной, плечелучевой

Артерия Депрож-Гуттерона кровоснабжает:

- А. шейный отдел спинного мозга
- Б. грудной отдел
- В. нижнегрудной и поясничный
- Г. нижнегрудной, поясничный и крестцовый
- Д. шейный и грудной

Какие из перечисленных симптомов не характерны для псевдобульбарного синдрома:

- А. дисфагия
- Б. дизартрия
- В. дисфония
- Г. фибриллярные подергивания языка
- Д. повышение глоточного рефлекса

В состав лимбико-ретикулярного комплекса не входят:

- А. черная субстанция
- Б. гиппокамп
- В. миндалина
- Г. ретикулярная формация
- Д. мамиллярные тела

К опухолям ЦНС оболочечно-сосудистого ряда относятся:

- А. астроцитомы
- Б. олигодендроглиомы
- В. мультиформные спонгиобластомы
- Г. арахноидэндотелиомы
- Д. все перечисленные

Миелинизация волокон пирамидной системы начинается:

- А. на 3 мес внутриутробного развития
- Б. на 6 мес внутриутробного развития
- В. в конце 1 года жизни
- Г. в начале 2 года жизни
- Д. на последнем месяце внутриутробного развития

Нарушения обмена какого нейромедиатора характерно для болезни Альцгеймера?

- А. норадреналина
- Б. глутамата
- В. ацетилхолина
- Г. мелатонина
- Д. серотонина

Депрессии, возникающие на фоне соматического заболевания, называются:

- А. соматизированными
- Б. соматогенными
- В. шизофреническими
- Г. дистимическими

Метастазируют в позвоночный канал опухоли:

- А. рак легких
- Б. грудной железы
- В. предстательной железы
- Г. почек
- Д. все перечисленное

Наиболее информативным для обследования больных с когнитивными нарушениями является:

- А. КТ
- Б. МРТ
- В. трактография
- Г. ЭЭГ

Выпадение верхних или нижних квадрантов полей зрения наступает при поражении:

- А. наружных отделов зрительного перекреста
- Б. глубинных отделов теменной доли
- В. первичных зрительных центров в таламусе
- Г. глубинных отделов височной доли

Какой из белков миелина наиболее подвержен разрушению при демиелинизирующих заболеваниях ЦНС?

- А. основной белок миелина
- Б. протеолипидный протеин
- В. миелин-олигодендроцитарный гликопротеин
- Г. миелин-ассоциированный гликопротеин
- Д. сфингомиелин

Клиническая характеристика теменных эпилепсий:

- А. возникает в любое время, сопровождается короткими приступами (30-60сек), высокая частота, преимущественно в ночное время
- Б. для приступов характерны ощущения уже виденного или слышанного, различные автоматизмы
- В. приступы сопровождаются парестезиями, дизестезиями, аутоапагонзией
- Г. характерны приступы в виде мелькания мошек перед глазами, преходящего амавроза, зрительных галлюцинаций

Лакунарный (микроциркуляторный) инсульт характеризуется:

- А. наличием быстрого восстановления нарушенных функций
- Б. прогрессирующим течением
- В. наличием мерцательной аритмии в анамнезе

К развитию акромегалии приводят аденомы гипофиза:

- А. эозинофильные
- Б. базофильные
- В. хромофобные
- Г. базофильные и хромофобные
- Д. любого из перечисленных гистологических типов

Для синдрома Гийена-Барре характерно:

- А. белково-клеточная диссоциация в цереброспинальной жидкости
- Б. гипестезия и гиперпатия в дистальных отделах конечностей
- В. прогрессирующий вялый тетрапарез
- Г. проксимальным парапарезом
- Д. миоклонии

Какой препарат не относится к нормотимикам?

- А. левитирацетам
- Б. карбамазепин
- В. вальпроаты
- Г. ламотриджин

Для лечения каузалгии, вызванной ушибом периферического нерва, применяют:

- А. антидепрессанты, нейролептики, симпатолитики
- Б. тепловые согревающие процедуры
- В. блокады симпатических ганглиев, симпатэктомию
- Г. антидепрессанты, нейролептики, симпатолитики и блокады симпатических ганглиев, симпатэктомию

Астереогноз возникает при поражении:

- А. язычной извилины теменной доли
- Б. верхней височной извилины
- В. нижней лобной извилины
- Г. верхней теменной дольки

Для поражения затылочной доли не характерно:

- А. апраксия
- Б. агнозия
- В. нарушения зрительной памяти
- Г. метаморфопсии

Для туберкулезного менингита

- А. лимфоцитарный плеоцитоз
- Б. увеличение количества белка
- В. преобладание нейтрофилов
- Г. повышение уровня глюкозы
- Д. снижение уровня глюкозы

Какие изменения спинномозговой жидкости наблюдаются при острой субдуральной гематоме?

- А. лимфоцитарный плеоцитоз
- Б. примесь крови
- В. понижение давления
- Г. нейтрофильный плеоцитоз

При крестцовом уровне поражения наиболее часто возникает:

- А. гиперактивный мочевого пузыря
- Б. императивные позывы
- В. детрузорно-сфинктерная диссинергия
- Г. гиперрефлексия детрузора
- Д. гипорефлексия детрузора

Альтернирующий паралич Шмида включает в себя все, кроме:

- А. периферическое поражение XII нерва
- Б. периферическое поражение X,IX нерва
- В. периферическое поражение XI нерва
- Г. периферическое поражение VII нерва
- Д. центральный гемипарез на противоположной стороне

Наиболее ранними проявлениям гематомиилии травматического происхождения является наличие:

- А. расстройств глубокой чувствительности
- Б. синдром Броун-Секара
- В. двигательных проводниковых нарушений
- Г. диссоциированные расстройства чувствительности
- Д. нарушение функции тазовых органов

Умеренные когнитивные нарушения характеризуются по шкале MMSE:

- А. 24-27 баллов
- Б. 27-30 баллов
- В. 20-24 балла

Клиническая характеристика лобных эпилепсий:

- А. приступы сопровождаются парестезиями, дизестезиями, аутоагнозией
- Б. дебют в любом возрасте. Короткие приступы (30-60сек), высокая частота, преимущественно в ночное время
- В. характерны приступы в виде мелькания мошек перед глазами
- Г. для приступов характерны ощущения уже виденного или слышанного, различные автоматизмы

Для опухоли мозгового конуса наиболее характерно расстройство чувствительности:

- А. по гемитипу
- Б. по типу перчаток
- В. по типу чулок
- Г. седловидная анестезия
- Д. по типу полубрюк

Для травматического разрыва бедренного нерва выше пупартовой связки характерно:

- А. гипестезия на передней поверхности бедра
- Б. паралич сгибателей бедра
- В. паралич разгибателей голени
- Г. гипестезия на передней поверхности бедра и паралич сгибателей бедра
- Д. все перечисленное

Какой ЭЭГ признак может служить показателем наличия сознания?

- А. реактивный альфа ритм, включая и устойчивую десинхронизацию
- Б. диффузная бета активность
- В. наличие вертексных пароксизмов
- Г. наличие синхронных разрядов тета-волн

Клинически изолированный синдром - это любой вариант, кроме:

- А. единственный эпизод демиелинизации, клинически моноочаговый, не менее 1 субклинического(бессимптомного) очага на МРТ, критериев диссеминации во времени нет
- Б. единственный эпизод демиелинизации, клинически многоочаговый, не менее 1 субклинического очага на МРТ, критериев диссеминации во времени нет
- В. множественные эпизоды демиелинизации, клинически моноочаговый, не менее 1 субклинического (бессимптомного) очага на МРТ, критерии диссеминации во времени выполнимы
- Г. единственный эпизод демиелинизации, клинически многоочаговый, на МРТ нет субклинических очагов - изменения отсутствуют
- Д. единственный эпизод демиелинизации, клинически моноочаговый, на МРТ нет субклинических очагов - изменения отсутствуют

Ангедония - это

- А. преувеличенная опасность соматической болезни
- Б. чувство утраты эмоций
- В. идея о бессмысленности существования
- Г. чувство ослабления или исчезновения влечения к жизни
- Д. утрата чувства наслаждения

В развитии недостаточности кровоснабжения мозга при атеросклерозе играют роль все перечисленные факторы, кроме:

- А. снижения активности свертывающей системы
- Б. снижения перфузионного давления
- В. снижения эластичности эритроцитов

К ликворным цистернам головного мозга относят все, кроме:

- А. мозжечково-мозговая
- Б. цистерна моста
- В. межножковая
- Г. конечная
- Д. все перечисленное

Основные признаки симптоматических эпилепсий:

- А. изменения на МРТ отсутствуют
- Б. наличие генетической предрасположенности
- В. дебют только в раннем возрасте
- Г. характерно наличие различных типов приступов

Диагностическими критериями для постановки диагноза рассеянного склероза являются:

- А. 2 и более клинических обострений без объективно обнаруженных очагов на МРТ
- Б. 2 и более клинических обострений плюс 2 и более объективно обнаруженных очагов на МРТ
- В. 2 и более объективно обнаруженных очагов на МРТ без признаков клинических обострений
- Г. 1 клиническое обострение и объективно обнаруженные очаговые изменения на МРТ
- Д. 1 обострение без объективно обнаруженных очагов на МРТ

Протокол лечения эпилептического статуса у взрослых на госпитальном этапе в РФ:

- А. 1-я стадия – раннего статуса: Бензодиазепины 1-5мг в/в болюсно (при необходимости – повторное введение). 2-я стадия – Барбитураты: (гексабарбитал/гексенал) 4г/сутки. Вальпроаты: 500 мг/сутки 3-я стадия – Тиопентал 25-50 мг в*/в болюсно, затем 1-3 мг/кг/в час. Наркоз (пропофол) 1 мг/кг, болюсно, затем в/в 0,5-1мг/кг/час +ИВЛ
- Б. 1-я стадия – раннего статуса: Введение пропафола
- В. 1-я стадия – раннего статуса: Бензодиазепины 10-20мг в/в болюсно (при необходимости – повторное введение). 2-я стадия – Барбитураты: (гексабарбитал/гексенал) 1г/сутки. Вальпроаты: 3 000 мг/сутки 3-я стадия – Тиопентал 100-250 мг в*/в болюсно, затем 3-5 мг/кг/в час. Наркоз (пропофол) 2 мг/кг, болюсно, затем в/в 5-10мг/кг/час +ИВЛ
- Г. 1-я стадия – раннего статуса: Введение барбитуратов
- Д. 1-я стадия – раннего статуса: Введение оксибутирата натрия

Интрамедуллярные опухоли чаще всего локализуются:

- А. только на уровне шейного утолщения
- Б. только на уровне грудного утолщения
- В. только поясничного утолщения
- Г. на уровне шейного и грудного утолщения
- Д. на уровне шейного и поясничного утолщения

Укажите наиболее часто встречаемые типы геморрагического инсульта:

- А. внутримозговое кровоизлияние
- Б. субдуральная гематома
- В. изолированное вентрикулярное кровоизлияние

Противопоказанием к назначению холинолитиков является все, кроме:

- А. возраст моложе 50 лет
- Б. возраст старше 50 лет
- В. когнитивные нарушения
- Г. зрительный галлюцинации
- Д. глаукома

Какие из перечисленных симптомов характерны для сотрясения головного мозга?

- А. головная боль
- Б. менингеальные явления
- В. парезы конечностей
- Г. поражение черепных нервов

Дистимия характеризуется симптоматикой на протяжении:

- А. 1 мес
- Б. 6 мес
- В. 1 год
- Г. 2 года
- Д. 3 года

При травматическом параличе Дежерин-Клюмпке нарушается чувствительность:

- А. наружной поверхности предплечья
- Б. на внутренней поверхности кисти
- В. на внутренней поверхности плеча
- Г. на внутренней поверхности плеча, предплечья, кисти
- Д. наружной поверхности предплечья и внутренней поверхности кисти

Тяжелое диффузное аксональное повреждение головного мозга характеризуется:

- А. длительным коматозным состоянием с момента травмы
- Б. развитием комы после «светлого» промежутка
- В. отсутствием потери сознания
- Г. кратковременной потерей сознания
- Д. менингеальным синдромом

Наиболее эффективным в лечении диссеминированного внутрисосудистого свертывания является:

- А. гепарин с антитромбином III
- Б. хлористый кальций и викасол
- В. эпсилонаминокапроновая кислота

При каком уровне кровотока в головном мозге развивается аноксическая деполяризация мембран и гибель клеток с образованием инфаркта мозга:

- А. 10-12 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту
- Б. 40-45 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту
- В. 150-200 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту

Для поражения задней мозговой артерии характерно наличие:

- А. гомонимной гемианопсии
- Б. битемпоральной гемианопсии
- В. биназальной гемианопсии
- Г. концентрического сужения полей зрения
- Д. ничего из перечисленного

В норме на ЭЭГ взрослого человека в состоянии покоя регистрируется:

- А. альфа-ритм
- Б. низкочастотный бета-ритм амплитудой выше 15 мкВ
- В. дельта- ритм
- Г. тета-ритм
- Д. гипсаритмия

Для лечения синдрома беспокойных ног препаратами первого выбора являются:

- А. амантадины
- Б. леводопа
- В. агонисты дофаминовых рецепторов
- Г. бета-блокаторы
- Д. холинолитики

Чем не характеризуется кардиоэмболический инсульт в соответствии с критериями TOAST:

- А. наличие ТИА в анамнезе в том же сосудистом бассейне
- Б. наличие ТИА или инсульта в более чем одном сосудистом бассейне
- В. полушарный инфаркт более 1,5 см в диаметре
- Г. мерцательная аритмия в анамнезе

Цилиоспинальный центр расположен в боковых рогах спинного мозга на уровне сегментов:

- А. С6-С7
- Б. С7-С8
- В. Т1-Т2
- Г. Т2-Т3
- Д. С5-Т10

При повреждении зрительного тракта периметрия выявляет:

- А. одностороннюю гомонимную гемианопсию
- Б. Нижнеквадрантную гемианопсию
- В. битемпоральную гемианопсию
- Г. биназальную гемианопсию
- Д. верхнеквадрантную гемианопсию

Признаки бульбарного синдрома:

- А. слабость лицевых мышц
- Б. дисфония
- В. гиперacusия
- Г. дисфагия
- Д. дизартрия

Диагноз транзиторной ишемической атаки устанавливают при полном регрессе неврологической симптоматики через:

- А. 24 часа
- Б. 48 часов
- В. 72 часа

Методом наиболее ранней диагностики ишемического инсульта является:

- А. позитронно-эмиссионная томография
- Б. магнитно-резонансная томография
- В. компьютерная томография

Какой принцип наиболее принят в классификации опухолей нервной системы?

- А. онтогенеза
- Б. филогенеза
- В. гистогенеза
- Г. эмбриогенеза
- Д. дизэмбриогенеза

Какой патогенетический тип инсульта не выделен в соответствии с критериями TOAST:

- А. гемодинамический
- Б. лакунарный
- В. инсульт другой неизвестной этиологии

Что не относится к менингеальным симптомам:

- А. симптом Оппегнейма
- Б. симптом Лихтенштейна
- В. симптом Бехтерева
- Г. симптом Брудзинского

Для тикозного гиперкинеза характерно:

- А. усиление во сне
- Б. вовлечение мышц конечностей
- В. преимущественная локализация в мышцах лица и плечевого пояса
- Г. дебют во взрослом возрасте

Вторичный синдром беспокойных ног может быть обусловлен:

- А. недостатком железа
- Б. избытком железа
- В. недостатком кальция
- Г. избытком кальция
- Д. недостатком калия

Экстремедуллярные опухоли спинного мозга наиболее часто располагаются на его -

- А. переднебоковой поверхности
- Б. задней поверхности
- В. задней и заднебоковой поверхности
- Г. передней поверхности
- Д. передней и переднебоковой

Нейрофизиологические механизмы формирования эпилептического припадка:

- А. гиперфункция возбуждающих аминокислот
- Б. гипофункция возбуждающих аминокислот
- В. недостаточность торможения
- Г. гипоактивность Na-каналов

При каком уровне кровотока в головном мозге развивается аноксическая деполяризация мембран и гибель клеток с образованием инфаркта мозга

- А. 10-12 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту
- Б. 40-45 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту
- В. 55-60 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту
- Г. 100-150 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту
- Д. 150-200 мл крови на 100 г вещества головного мозга в минуту

Для травматического разрыва проксимального отдела плечевого сплетения характерны:

- А. паралич Дежерина-Клюмпке
- Б. паралич Дюшенна-Эрба
- В. гипотрофия зубчатой и ромбовидной мышц
- Г. паралич Дежерина-Клюмпке и гипотрофия зубчатой, ромбовидной мышц
- Д. паралич Дюшенна-Эрба и гипотрофия зубчатой, ромбовидной мышц

Эпилептические приступы в пубертатном возрасте приобретают:

- А. нециклический характер
- Б. не связаны с периодом пробуждения
- В. тип приступа не усложняется
- Г. приступы сопровождаются выраженными психическими и поведенческими реакциями
- Д. приступы не сопровождаются поведенческими реакциями

Деменция -

- А. ограничивает профессиональную деятельность, поведенческую и бытовую активность
- Б. не ограничивает профессиональное поведение
- В. не ограничивает бытовую активность
- Г. не ограничивает повседневную активность
- Д. связана с изменением сознания

Снижение АД, в острейшем периоде ишемического инсульта, не нужно, если:

- А. АД < 180/100, независимо от проводимой терапии инсульта
- Б. АД > 185/105, при проведении тромболитической терапии
- В. АД > 200/110, независимо от проводимой терапии инсульта

Для лечения эссенциального тремора чаще всего используют:

- А. агонисты дофаминовых рецепторов
- Б. бета-блокаторы
- В. амантадины
- Г. леводопу
- Д. нейролептики

Показания для приема этосуксимида:

- А. абсансы
- Б. фокальные приступы
- В. генерализованные тонико-клонические припадки
- Г. генерализованные тонико-клонические припадки и фокальные приступы

«Фоновые» особенности мозга новорожденных, способствующие возникновению генерализованных припадков:

- А. высокая степень миелинизации аксонов
- Б. зрелость и совершенство корково-подкорковых и межъядерных функциональных связей
- В. функциональная зрелость ЦНС
- Г. недостаточная специализация отдельных структур ЦНС (функциональная незрелость ЦНС)
- Д. зрелость медиаторных систем

Непарное заднее ядро глазодвигательного нерва (ядро Перлиа) обеспечивает реакцию зрачка:

- А. на свет
- Б. на болевое раздражение
- В. на конвергенцию
- Г. на аккомодацию
- Д. на свет и аккомодацию

Классификация антидепрессантов не включает:

- А. трициклические антидепрессанты
- Б. четырехциклические антидепрессанты
- В. производные бензодиазепина
- Г. ингибиторы моноаминоксидазы
- Д. производные бутирофенона

Синдром Захарченко - Валленберга (латеральный медуллярный синдром) возникает при закупорке:

- А. коротких циркулярных артерий моста
- Б. длинных циркулярных артерий моста
- В. парамедианных артерий моста
- Г. нижней передней артерии мозжечка
- Д. нижней задней артерии мозжечка

Для вертебро-базилярной недостаточности не характерно наличие:

- А. афазии
- Б. расстройств зрения
- В. дизартрии
- Г. атаксии

В состав среднего мозга не входят:

- А. красные ядра
- Б. ядра блокового нерва
- В. ядра глазодвигательного нерва
- Г. ядра отводящего нерва
- Д. ядра лицевого нерва

Могут ли сохраняться когнитивные нарушения после регресса аффективных?

- А. да, могут в любом случае
- Б. нет, не могут
- В. только при наличии субдепрессии
- Г. да, могут при наличии церебральной патологии

Назовите характерный признак изменения ликвора при опухолях головного мозга:

- А. клеточно-белковая диссоциация
- Б. нейтрофильный плеоцитоз
- В. лимфоцитарный плеоцитоз
- Г. белково-клеточная диссоциация
- Д. все перечисленное

Казуалгический синдром наиболее часто встречается при ушибе:

- А. срединного нерва
- Б. локтевого нерва
- В. большеберцового нерва
- Г. малоберцового нерва
- Д. малоберцового нерва и локтевого нерва

При невропатии седалищного нерва наблюдаются:

- А. одностороннее снижение ахиллова рефлекса
- Б. задержка мочеиспускания
- В. миоклонии
- Г. гипестезия в области наружного края голени и стопы
- Д. одностороннее повышение коленного рефлекса

Укажите, на каком уровне в стволе головного мозга расположены ядра III и IV пары черепных нервов:

- А. средний мозг
- Б. варолиев мост.
- В. продолговатый мозг.
- Г. варолиев мост и продолговатый мозг
- Д. промежуточный мозг

Для синдрома ущемления большеберцового нерва (синдром тарзального канала) характерны:

- А. боль в области подошвы
- Б. припухлость в области наружной лодыжки
- В. парезы сгибателей пальцев стопы
- Г. боль в области подошвы и парезы сгибателей пальцев стопы
- Д. припухлость в области наружной лодыжки и парезы сгибателей пальцев стопы

Для лечения болезни Вильсона-Коновалова используют:

- А. леводопу
- Б. нейролептики
- В. бета-блокаторы
- Г. купренил
- Д. агонисты дофаминовых рецепторов

Коррелятами абсанса в ЭЭГ являются:

- А. наличие билатеральных спайков или спайк-волновых комплексов с частотой 2-4 Гц
- Б. дезорганизация корковой электрической активности
- В. наличие фокальных пик-волновых комплексов
- Г. наличие FIRDA
- Д. полифазная пароксизмальная активность

По современным представлениям нейродегенеративный процесс при болезни Паркинсона начинается:

- А. в черной субстанции
- Б. в стриатуме
- В. в обонятельной луковице и вегетативных ядрах IX, X нервов
- Г. в коре

Укажите, какие симптомы не характерны для поражения паллидонигральной системы:

- А. гипокинезия
- Б. сialорea
- В. скандированная речь
- Г. повышение мышечного тонуса по пластическому типу
- Д. гипомимия

Для диагностики болезни Паркинсона на ранней стадии рекомендовано использовать следующие методы, кроме:

- А. УЗИ черной субстанции
- Б. полисомнография
- В. обонятельные тесты
- Г. ЭЭГ

Какие из перечисленных симптомов не характерны для эпидуральной гематомы:

- А. «светлый» промежуток
- Б. кровь в ликворе
- В. парезы конечностей
- Г. менингеальные симптомы
- Д. головная боль

При альтернирующем синдроме Мийяра - Гублера очаг находится:

- А. в основании ножки мозга
- Б. в заднебоковом отделе продолговатого мозга
- В. в области красного ядра
- Г. в основании нижней части моста мозга
- Д. в верхней части моста

Препаратами, наиболее эффективными по влиянию на акинезию при болезни паркинсона, являются

- А. Холинолитики
- Б. Агонисты дофаминовых рецепторов
- В. Амантадины
- Г. Леводопы

Противопоказанием к назначению центральных ингибиторов холинэстеразы является

- А. Перегрузка правых отделов миокарда по данным ЭКГ
- Б. Брадиаритмия менее 50 ударов в мин
- В. Язвенная болезнь желудка
- Г. Инфаркт миокарда в анамнезе

Лекарственными средствами первой линии в лечении острых неспецифических поясничных болей являются

- А. Хондропротекторы
- Б. Антидепрессанты
- В. Антikonвульсанты
- Г. Нестероидные противовоспалительные препараты

Субъектами обязательного медицинского страхования являются

- А. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, медицинское учреждение, застрахованные лица, орган управления здравоохранением
- Б. Застрахованные лица, страхователи, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
- В. Орган управления здравоохранением, медицинское учреждение, застрахованные лица, страховая организация
- Г. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, орган управления здравоохранением, застрахованные лица, страховая организация

У пациентов с экстрапирамидным синдромом, появившемся в возрасте до 50 лет, в первую очередь, необходимо исключить

- А. Прогрессирующий надъядерный паралич
- Б. Гепатолентикулярную дегенерацию
- В. Кортико-базальную дегенерацию
- Г. Деменцию с тельцами Леви

Для купирования приступов ортостатической гипотензии используют

- А. Мидодрин
- Б. Антидепрессанты
- В. Симпатолитики
- Г. Диуретики

Аксоны альфа-мотонейронов заканчиваются в

- А. Мышечном веретене
- Б. Двигательных концевых пластинках
- В. Сухожильных рецепторах Гольджи
- Г. Аннуло-спиральных окончаниях

Хроническая водянистая диарея, сенсорная полинейропатия, деменция и судорожные приступы характерны для

- А. Болезни Альцгеймера
- Б. Нейропатии Шарко - Мари -Тута
- В. Хореи Гентингтона
- Г. Прионного заболевания

В результате передозировки прозерина при холинергическом кризе не развивается

- А. Тремор
- Б. Усиление перистальтики желудочно-кишечного тракта
- В. Гиперсаливация
- Г. Мидриаз

Медицинские работники обязаны

- А. Сообщать работодателю о заболевании сотрудника
- Б. Рассказывать представителям средств массовой информации о случаях поступления пациентов с криминальными травмами
- В. Предоставлять информацию в письменном виде по просьбе родственников о состоянии и диагнозе пациента
- Г. Соблюдать врачебную тайну

К спектру действия транквилизаторов при депрессии относят

- А. Нарушение внимания и аппетита
- Б. Подавленность и утрату чувства удовольствия
- В. Тревогу и нарушение сна
- Г. Пессимизм и утрату интересов

Миофасциальная триггерная точка, которая возникает в одной мышце в результате конкуренции с другой триггерной точкой, находящейся в другой мышце, называется

- А. Сочетанной
- Б. Сателлитной
- В. Ключевой
- Г. Первичной

У пациента, перенесшего ишемический инсульт и страдающего фибрилляцией предсердий, с наличием протезов клапанов сердца целевой уровень МНО должен быть

- А. 1,5-2,5
- Б. 2,5-3,5
- В. 2-3
- Г. 1-2

Для дифференцирования рецидива опухоли и лучевого некроза используют

- А. Трактографию
- Б. Перфузионные методики
- В. Магнитно-резонансную томографию с контрастным усилением
- Г. Морфометрию

При появлении признаков истечения жидкости из носовых ходов у пациента после проведенной васкулярной декомпрессии тройничного нерва следует отдать предпочтение

- А. Осмотру врача-оториноларинголога, установке люмбального дренажа в случае верифицированной ликвореи
- Б. Назначению препарата диакарб
- В. Установке люмбального дренажа
- Г. Назначению антимикробной терапии

Проявления «парадоксальной кинезии» характерны для

- А. Торсионной дистонии
- Б. Хореического гиперкинеза
- В. Паркинсонизма
- Г. Спастической кривошеи

Прорыв абсцесса в ликворные пути можно диагностировать на основании появления у больного

- А. Мутной спинномозговой жидкости при пункции
- Б. И менингеального синдрома, и высокой температуры
- В. Только менингеального синдрома
- Г. Только высокой температуры

Хореические, дистонические или баллистические движения, как правило, в нижней половине тела, возникающие в начале и в конце клинического эффекта леводопы, называют

- А. Дистонией периода выключения
- Б. Дискинезией пика дозы
- В. Двухфазной дискинезией
- Г. Феноменом «включения-выключения»

Если верхняя граница проводниковых расстройств болевой чувствительности определяется на уровне Th10, то поражение спинного мозга локализуется на уровне сегментов

- А. Th9-Th10
- Б. Th6-Th7
- В. Th8-Th9
- Г. Th10-Th11

Экстракраниальная закупорка внутренней сонной артерии

- А. Сопровождается вегетативной симптоматикой
- Б. Никогда не проявляется преходящими нарушениями мозгового кровообращения
- В. При достаточном коллатеральном кровообращении всегда протекает неблагоприятно
- Г. При полноценном виллизиевом круге протекает благоприятно

Метод исследования, который наиболее целесообразно использовать для наблюдения за динамикой ангиоспазма у больного со спонтанным субарахноидальным кровоизлиянием, является

- А. Транскраниальная ультразвуковая доплерография
- Б. Компьютерная томография
- В. Ангиография
- Г. Реоэнцефалография

Антиспастический препарат дантролен

- А. Является Н-холинолитиком центрального действия, угнетающим каудальную часть ретикулярной формации
- Б. Является центральным агонистом α_2 -адренергических рецепторов
- В. Является структурным аналогом ГАМК
- Г. Непосредственно действует на мышечные сократительные элементы, уменьшая выброс кальция из саркоплазматического ретикулума скелетных мышц

Сердечно-сосудистые расстройства встречаются при опухолях задней черепной ямки вследствие

- А. Внутричерепной гипертензии
- Б. Давления опухоли на ядра X нерва
- В. Острого окклюзионного синдрома
- Г. Прорастания опухолью ствола мозга

Часто встречаемым нарушением сердечного ритма при внутричерепной гипертензии является

- А. Брадикардия
- Б. Экстрасистолия
- В. Тахикардия
- Г. Аритмия

Аневризмы головного мозга встречаются чаще в области

- А. Неветвящегося фрагмента вены
- Б. Неветвящегося фрагмента артерии
- В. Артерио-синусного соустья
- Г. Бифуркаций сосудов артериального круга

К неблагоприятным прогностическим факторам восстановления после инсульта относят

- А. Большие размеры очага
- Б. Детский и юношеский возраст
- В. Сохранность интеллекта и активность больного
- Г. Комплексность и адекватность реабилитации

Антиспастический препарат баклофен интратекальный

- А. Непосредственно действует на мышечные сократительные элементы, уменьшая выброс кальция из саркоплазматического ретикулума скелетных мышц
- Б. Является Н-холинолитиком центрального действия, угнетающим каудальную часть ретикулярной формации
- В. Является структурным аналогом ГАМК
- Г. Является центральным агонистом $\alpha 2$ -адренергических рецепторов

Центры регуляции непроизвольного (рефлекторного) мочеиспускания и дефекации локализируются в

- А. Передней центральной извилине
- Б. Верхней теменной дольке
- В. Боковых рогах спинного мозга на уровне L1
- Г. Боковых рогах спинного мозга на уровне S2-S4

Признаки поражения теменной доли доминантного полушария включают

- А. Зрительно-пространственную агнозию
- Б. Астереогноз
- В. Вербальные и двигательные персеверации
- Г. Афазию

Форма фишера синдрома гийена – барре характеризуется

- А. Поражением языкоглоточного нерва
- Б. Поражением глазодвигательных нервов
- В. Поражением каудальной группы черепных нервов и нарушением дыхания
- Г. Двусторонним парезом лицевого нерва

При поражении бедренного нерва характерно нарушение

- А. Разгибания голени
- Б. Тыльного сгибания стопы
- В. Сгибания голени
- Г. Подошвенного сгибания стопы

Решающим диагностическим признаком эпилептического сложного абсанса является

- А. Возникновение множественных миоклоний
- Б. Развитие фокальной или генерализованной атонии мышц
- В. Симметричный тонический спазм мускулатуры конечностей
- Г. Кратковременная утрата сознания

Препаратом выбора для купирования эпилептического статуса генерализованных тонико-клонических приступов на ранней стадии является

- А. Натрия оксибутират
- Б. Магния сульфат
- В. Диазепам
- Г. Тиопентал натрия

Формой прогрессирующей мышечной дистрофии, при которой наблюдаются псевдогипертрофии, является

- А. Амиотрофия Кугельберга – Веландера
- Б. Синдром Дубовица
- В. Дистрофия Дюшенна
- Г. Амиотрофия Кеннеди

Тест тинеля применяется для диагностики синдрома

- А. Спирального канала
- Б. Латерального надмыщелка
- В. Бутовьерки круглого пронатора
- Г. Карпального канала

При болезни альцгеймера с синдромом тяжёлой деменции препаратом первого выбора является

- А. Церебролизин
- Б. Мемантин
- В. Галантамин
- Г. Амантадин

К классическим доброкачественным опухолям относят

- А. Невриномы и менингиомы
- Б. Эпиндимомы
- В. Астроцитомы
- Г. Глиобластомы и медуллобластомы

У пациентов с сакроилиитом выявляется

- А. Ограничение подвижности в тазобедренном суставе
- Б. Болезненность при сдавлении крыльев подвздошной кости
- В. Симптом Ласега
- Г. Уменьшение боли в положении сидя или стоя

К магнитно-резонансным признакам менингиомы относят

- А. Внутримозговую локализацию
- Б. Контрастное усиление по контуру образования
- В. Наличие матрикса опухоли
- Г. Отсутствие накопления контраста

Спинальная амиотрофия верднига – гоффмана наследуется по _____ типу

- А. Рецессивному, сцепленному с полом
- Б. Аутосомно-доминантному
- В. Аутосомно-рецессивному
- Г. Доминантному, сцепленному с полом

Кости черепа кровоснабжаются от _____ артерии

- А. Средней мозговой
- Б. Передней мозговой
- В. Сифона внутренней сонной
- Г. Наружной сонной

Основным показанием к назначению слабых опиоидов является

- А. Корешковый синдром
- Б. Отсутствие эффекта от НПВП и анальгетиков
- В. Задержка мочеиспускания
- Г. Парез мышц голени

Боковой амиотрофический склероз относится к _____ заболеваниям

- А. Сосудистым
- Б. Нейродегенеративным
- В. Демиелинизирующим
- Г. Инфекционным

Алексия наблюдается при поражении

- А. Парагиппокампальной извилины
- Б. Угловой извилины доминантного полушария
- В. Таламуса
- Г. Верхней лобной извилины доминантного полушария

Наиболее распространенной формой нейрона у человека являются клетки

- А. Униполярные
- Б. Биполярные
- В. Мультиполярные
- Г. Псевдоуниполярные

Вплотную к головному мозгу прилежит

- А. Ликворное пространство
- Б. Мягкая мозговая оболочка
- В. Паутинная оболочка
- Г. Твёрдая мозговая оболочка

Функциональную магнитно-резонансную томографию применяют при опухолях в

- А. Пинеальной области
- Б. Хиазмальной области
- В. Слухоречевых зонах
- Г. Задней черепной ямке

При лечении нейролептиками с сильным антипсихотическим действием часто развиваются

- А. Координаторные расстройства
- Б. Экстрапирамидные расстройства
- В. Слуховые и зрительные галлюцинации
- Г. Вестибулярные расстройства

Исчезновение очаговых неврологических симптомов в течение суток характерно для

- А. Тромбоза наружной сонной артерии
- Б. Ишемического инсульта
- В. Преходящего нарушения мозгового кровообращения
- Г. Спонтанного субарахноидального кровоизлияния

Внутри мозговое обкрадывание очага ишемического инсульта наступает в результате

- А. Нарушения ауторегуляции кровообращения в очаге
- Б. Спазма сосудов неповреждённых отделов мозга
- В. Спазма сосудов поражённого участка мозга
- Г. Расширения здоровых сосудов неповреждённых отделов мозга

Транзиторной глобальной амнезией является

- А. Кратковременная афазия
- Б. Преходящее состояние спутанного сознания с дезориентировкой в месте
- В. Преходящее нарушение памяти на текущие и отдаленные события
- Г. Кратковременная утрата сознания с падением мышечного тонуса

При исследовании цсж при рассеянном склерозе выявляют

- А. Выраженный лимфоцитарный плеоцитоз
- Б. Фибриновую пленку
- В. Клеточно-белковую диссоциацию
- Г. Олигоклональные иммуноглобулины G

Для предупреждения возникновения панических атак применяют

- А. Бензодиазепины
- Б. Алимемазин
- В. Гидроксизин
- Г. Антидепрессанты

Основным методом профилактики тромбоза вен паретичных конечностей при ишемическом инсульте является

- А. Антитромбоцитарная терапия
- Б. Антикоагулянтная терапия
- В. Компрессионный трикотаж
- Г. Применение эластичных бинтов

Разгибание в тазобедренном суставе нарушается при поражении _____ нерва

- А. Нижнего ягодичного
- Б. Запирательного
- В. Бедренного
- Г. Верхнего ягодичного

К причинам миофасциального болевого синдрома относят

- А. Внезапное растяжение или ушиб мышцы, статическую перегрузку определенных мышц
- Б. Сосудистую миелопатию
- В. Остеохондроз позвоночника
- Г. Нарушения сна, депрессию

Белково-клеточная диссоциация наблюдается при

- А. Менингоэнцефаломиелите
- Б. Сотрясении головного мозга
- В. Ушибе спинного мозга
- Г. Опухолях мозга

При проведении радиоизотопной g-сцинтиграфии радиофармпрепарат в наибольшей степени накапливается при

- А. Аденоме гипофиза
- Б. Менингиомах
- В. Невриномах
- Г. Краниофарингиомах

Симптом микки-мауса характерен для

- А. Болезни Гентингтона
- Б. Болезни Паркинсона
- В. Болезни Пика
- Г. Прогрессирующего надъядерного паралича

Кардинальными признаками хронической ртутной интоксикации являются

- А. Ретикулоцитоз, определение в моче более 0,05 мг/л ртути
- Б. Ртутный тремор, ртутный эретизм
- В. Стоматит и гингивит
- Г. Повышенное содержание АЛК и КП в моче

У пациентов после 70 лет в качестве начальной терапии болезни паркинсона рекомендуется

- А. Агонист дофаминовых рецепторов
- Б. Препарат леводопы
- В. Амантадин
- Г. Антихолинергический препарат

Ночные страхи и ночные кошмары рассматриваются как

- А. Разные варианты парасомний
- Б. Проявления психической патологии
- В. Разные названия одного и того же варианта парасомний
- Г. Эпилептические феномены

Обязательным исследованием для всех больных эпилепсией является

- А. Электроэнцефалография
- Б. Реоэнцефалография
- В. Компьютерная томография головного мозга
- Г. Определение уровня кортизола в крови

Решающее значение в дифференциальной диагностике туберкулёзного менингита от других заболеваний центральной нервной системы имеет

- А. Рентгенологическое исследование
- Б. Исследование спинномозговой жидкости
- В. Исследование периферической крови
- Г. Биохимическое исследование крови

Неврома мортона наиболее часто локализуется между головками _____ плюсневых костей

- А. III и IV
- Б. II и IV
- В. IV и V
- Г. II и III

Кожная ангиома в проекции тройничного нерва, обызвествления по коре являются характерными признаками болезни

- А. Бурневилля – Прингла
- Б. Стерджа – Вебера
- В. Фон Гиппеля – Линдау
- Г. Паркинсона

В случаях инфильтративного роста тимомы у больных миастенией применяют

- А. Гипербарическую оксигенацию
- Б. Иммуноглобулины
- В. Плазмаферез
- Г. Лучевую терапию

Биназальная гемианопсия возникает при поражении

- А. Центральных (перекрещённых) отделов перекрёста зрительных нервов
- Б. Зрительных трактов
- В. Зрительной лучистости с двух сторон
- Г. Наружных (неперекрещённых) отделов перекрёста зрительных нервов

У пациентов с травматическим разрывом срединного нерва развивается

- А. Нарушение пронации кисти
- Б. Паралич разгибателей пальцев
- В. Нарушение суставно-мышечного чувства в концевой фаланге 2-го пальца
- Г. Нарушение сгибания кисти

Мидриаз развивается при поражении _____ нерва

- А. Отводящего
- Б. Глазодвигательного
- В. Блокового
- Г. Лицевого

При цитомегаловирусном энцефалите назначают

- А. Ацикловир
- Б. Ганцикловир
- В. Иммуноглобулин человека нормальный
- Г. Интерфероны

При невропатических болях стреляющего характера наиболее эффективны

- А. Антikonвульсанты
- Б. Нестероидные противовоспалительные препараты
- В. Симпатолитики
- Г. Антидепрессанты

Если у пациента частые припадки первично генерализованной эпилепсии, то вначале назначается

- А. Минимальная доза выбранного препарата с постепенным повышением дозы
- Б. Сочетание минимальных доз двух или трех основных противоэпилептических препаратов
- В. Максимальная доза выбранного препарата
- Г. Сочетание средней терапевтической дозы одного основного препарата и одного из дополнительных средств

При поражении правой половины поперечника спинного мозга на грудном уровне возникает

- А. Грубое нарушение функции тазовых органов
- Б. Центральный парез и снижение суставно-мышечного чувства левой ноги
- В. Центральный парез и снижение суставно-мышечного чувства правой ноги
- Г. Снижение болевой чувствительности в правой ноге

Для профилактики повторного кардиоэмболического инсульта применяют

- А. Глюкокортикоиды
- Б. Гепарин
- В. Ацетилсалициловую кислоту
- Г. Варфарин

Лица, незаконно занимающиеся медицинской и фармацевтической деятельностью, в соответствии с законодательством Российской Федерации могут привлекаться к _____ ответственности

- А. Материальной
- Б. Процессуальной
- В. Уголовной
- Г. Персональной

Применение солей лития показано в случаях

- А. Лечения нарушения сна
- Б. Потенцирования действия средств для наркоза
- В. Предупреждения приступов маниакально-депрессивного психоза
- Г. Лечения психозов

Малая хорей

- А. Развивается после ушиба головного мозга тяжелой степени
- Б. Развивается после перенесенного менингита
- В. Развивается вследствие ревматизма
- Г. Наследственно обусловлена

Больной с амнестической афазией

- А. Не понимает обращенную речь и не может говорить
- Б. Понимает обращенную речь, но не может говорить
- В. Может говорить, но забывает названия предметов
- Г. Может говорить, но речь скандированная

Поражение нижнего мотонейрона характеризуется

- А. Спастичностью
- Б. Патологическими рефлексам
- В. Фасцикуляциями
- Г. Повышением сухожильных рефлексов

Нарколепсия относится к группе

- А. Гиперсомний
- Б. Нарушения цикла сон-бодрствование
- В. Парасомний
- Г. Инсомний

Наркотическое состояние и эпилептические припадки могут возникнуть при отравлении соединениями

- А. Ртут
- Б. Олова
- В. Свинца
- Г. Мышьяка

В случае подтверждения развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии у пациента с рассеянным склерозом, получающего натализумаб, стандартом терапии является

- А. Прекращение терапии натализумабом и проведение плазмафереза
- Б. Продолжение терапии натализумабом и проведение кортикостероидной терапии
- В. Прекращение терапии натализумабом и проведение кортикостероидной терапии
- Г. Прекращение терапии натализумабом и динамическое наблюдение за пациентом

Наиболее характерным клиническим проявлением тромбоза поверхностных мозговых вен является

- А. Изменчивость очаговых полушарных симптомов
- Б. Субфебрилитет
- В. Менингеальный синдром
- Г. Отёк дисков зрительных нервов

Открытой черепно-мозговой травмой является травма с

- А. Повреждением апоневроза
- Б. Ушибленной раной мягких тканей без повреждения апоневроза
- В. Переломом костей основания черепа без ликвореи
- Г. Переломом костей свода черепа

Для синдрома поражения задних корешков характерно развитие

- А. Периферических парезов и параличей
- Б. Центральных парезов и параличей
- В. Гипестезии по корешковому типу
- Г. Фасцикуляций

Для лечения туберкулёзного менингита назначают

- А. Изониазид и пиридоксин
- Б. Изониазид и пентоксифиллин
- В. Изониазид и пенициллин
- Г. Стрептомицин и пиридоксин

Для лечения ортостатической гипотензии, вызванной периферической вегетативной недостаточностью применяют

- А. Флудрокортизон
- Б. Никетамид
- В. Дексаметазон
- Г. В-блокаторы

Состояние атонического паралича, арефлексии, анестезии всех видов чувствительности ниже уровня травмы позвоночника, отсутствие функции тазовых органов определяются как

- А. Периферический паралич
- Б. Центральный паралич
- В. Спинальный шок
- Г. Спинальная травма

К формам грыжевого выпячивания относят

- А. Миграцию
- Б. Протрузию, экструзию
- В. Спондилез
- Г. Спондилолиз

[Вернуться в начало](#)