

Тесты с вопросами по специальности «Онкология» для аттестации 1, 2 и высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/onkolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Онкология» для аккредитации и других экзаменов (3100 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/onkologiya/

2) Онкология (ситуационные задачи)

→ medik-otvet.ru/product/onkolog-situacia/

3) Радиология — тесты с ответами

→ medik-otvet.ru/product/radiolog/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

Навигация по категориям

- [1 категория](#)
- [2 категория](#)
- [высшая категория](#)

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Необходимо ли сохранять генетический материал молодым пациенткам до 35 лет, перед химиотерапией, при нереализованной репродуктивной функцией

- А. нет
- Б. Только если она замужем
- В. да
- Г. Если ПХТ высокой степени овариальной токсичности

Какие анти-PD1 препараты зарегистрированы в РФ для терапии метастатического рака желудка:

- А. пембролизумаб
- Б. ниволумаб
- В. ипилимумаб
- Г. атезолизумаб

Оптимальное время начала проведения адъювантной химиотерапии после хирургического лечения при раке желудка:

- А. 3-6 недель после операции
- Б. Через 12 недель после операции
- В. 8-12 недель после операции
- Г. 2-3 недели после операции

В течение какого периода времени после операции проводится адъювантная терапия меланомы кожи с использованием BRAF/MEK-ингибиторов?

- А. 24 месяца
- Б. 3 месяца
- В. 6 месяцев
- Г. 12 месяцев

Является ли обязательной D2-лимфодиссекция (удаление групп лимфоузлов №1-12) в хирургии «раннего» рака желудка...

- А. Да, поскольку частота метастазирования в регионарные лимфоузлы желудка после операций по поводу «раннего» рака составляет 5-15%.
- Б. Нет, поскольку «ранний» рак желудка предполагает наличие опухоли в пределах слизистого-подслизистого слоя без метастазов.
- В. Лимфодиссекция D2 выполняется по индивидуальным показаниям, либо в соответствии с установками, принятыми в данной хирургической клинике.
- Г. Все перечисленное.
- Д. Ничего из указанного.

По классификации TNM (8 издание) для рака полости рта символ N2a означает

- А. Метастазы в одном ЛУ шеи на стороне поражения ≤ 3 см и ENE+, или >3 см, но <6 см в наибольшем измерении, ENE отсутствует
- Б. Метастазы в ЛУ шеи с обеих сторон или с противоположной стороны <6 см в наибольшем измерении, ENE отсутствует
- В. Метастазы в ЛУ шеи >6 см в наибольшем измерении и ENE отсутствует
- Г. Метастаз в одном ипсилатеральном ЛУ шеи >3 см и ENE+

Для выбора эндокринотерапии рака молочной железы оптимальным является следующее сочетание рецепторов стероидных гормонов:

- А. РЭ+РП+
- Б. РЭ+РП-
- В. РЭ-РП+
- Г. РЭ-РП-
- Д. рецепторный статус роли не играет

ЧТО ТАКОЕ ОПЕРАЦИЯ ГАРТМАНА?

- А. резекция дистального отдела сигмовидной кишки и верхнеампулярного отдела прямой кишки с выведением одноствольной сигмостомы
- Б. закрытие илеостомы
- В. низкая передняя резекция прямой кишки
- Г. резекция сигмовидной и прямой кишки без формирования колостомы

Какой из молекулярно-биологических подтипов рака молочной железы встречается чаще всего:

- А. люминальный
- Б. тройной негативный
- В. базальноподобный
- Г. HER2 положительный

Противопоказанием для выполнения мультиспиральной компьютерной томографии в режиме коронарографии является:

- А. дыхательная аритмия
- Б. мерцательная аритмия
- В. наличие кардиостимулятора
- Г. непереносимость йод-содержащих контрастных препаратов

У пациента 46 лет рак предстательной железы cT2aN0M0, Gleason 7 (4+3), PSA общ.16 нг/мл.

Рекомендуемое лечение:

- А. Гормонотерапия
- Б. радикальная простатэктомия
- В. радикальная простатэктомия + гормонотерапия
- Г. радикальная простатэктомия + лучевая терапия
- Д. Химиотерапия

У БОЛЬНОГО 69 ЛЕТ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК НИЖНЕЙ НОСОВОЙ РАКОВИНЫ ПЕРВОЙ СТАДИИ. ИЗ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО

- А. хирургическое лечение
- Б. дистанционная гамма-терапия
- В. внутритканевая гамма-терапия
- Г. сочетанная лучевая терапия

Какой из отделов ободочной кишки наиболее часто поражается раком?

- А. Слепая кишка.
- Б. Восходящая ободочная кишка.
- В. Поперечная ободочная кишка.
- Г. Нисходящая ободочная кишка.
- Д. Сигмовидная кишка

Анализ на СА 125 женщинам репродуктивного возраста следует сдавать

- А. в любую фазу цикла
- Б. во вторую фазу цикла
- В. в первую фазу цикла
- Г. вопрос не изучен

Для какой цели выполняется исследование РЭА при выявлении опухоли толстой кишки:

- А. Подтверждение наличия опухоли ободочной кишки
- Б. Определение чувствительности опухоли к химиотерапии
- В. Установление исходного уровня РЭА для использования этого маркера при наблюдении за больным после окончания специального лечения
- Г. Определение гистологического варианта опухоли
- Д. Определение объема хирургического вмешательства

В понятие трофобластической болезни входят все перечисленные формы, кроме:

- А. Пузырный занос
- Б. Трофобластическая опухоль плацентарного ложа
- В. Неразвивающаяся беременность
- Г. Хориокарцинома
- Д. Эпителиоидная трофобластическая опухоль

При платино-резистентном рецидиве нерезектабельного или метастатического плоскоклеточного рака головы/шеи могут быть назначены следующие препараты:

- А. Пембролизумаб
- Б. Ниволумаб
- В. Цетуксимаб
- Г. Все вышеперечисленные

Базальноклеточный рак наиболее часто локализуется на коже

- А. волосистой части головы
- Б. Лица
- В. верхних конечностей
- Г. нижних конечностей
- Д. туловища

При расширенной экстирпации матки с придатками удаляют все перечисленные лимфоузлы, кроме:

- А. Параметральных
- Б. Запирательных
- В. Наружных и внутренних подвздошных
- Г. Парааортальных
- Д. Общих подвздошных

НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ОНКОМАРКЕРАМИ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ ОНКОМАРКЕРЫ

- А. ХГЧ, АФП, РЭА.
- Б. СА 15-3, MUC1, ПСА
- В. СА19-9, SCC, CA50
- Г. СА 125, HE4, индекс ROMA

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. раздельное диагностическое выскабливание
- Б. лапароскопия
- В. биопсия шейки матки
- Г. УЗИ органов малого таза

Плоскоклеточный рак кожи чаще всего развивается на фоне

- А. болезнь Боуэна
- Б. кератоакантома
- В. актинический кератоз
- Г. постлучевой дерматит
- Д. веррукозный невус

Облигатным предраком прямой кишки является:

- А. Аденоматозные полипы;
- Б. Болезнь Крона;
- В. Неспецифический язвенный колит;
- Г. Диффузный семейный полипоз;
- Д. Ворсинчатая опухоль.

ОБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ЛИТИЧЕСКИМ МЕТАСТАЗОМ РАКА В ПОЗВОНОК С УГРОЗОЙ ЕГО ПЕРЕЛОМА БЕЗ КОМПРЕССИИ СПИННОГО МОЗГА МОЖНО СЧИТАТЬ

- А. декомпрессивную операцию
- Б. лучевую терапию
- В. вертебропластику
- Г. лекарственную терапию

Методы диагностики, применяемые при обследовании пациента с узловым образованием в щитовидной железе:

- А. ультразвуковое исследование шеи
- Б. анализ крови на ТТГ
- В. тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ
- Г. все вышеперечисленные

Среди симптомов рака ободочной кишки для опухолей правой половины наиболее характерно:

- А. боли в правой половине живота
- Б. obturationalная кишечная непроходимость.
- В. примесь крови в кале.
- Г. похудание.
- Д. прогрессирующая анемия.

Абсолютным противопоказанием к лучевому лечению является

- А. пожилой возраст
- Б. молодой возраст
- В. активный туберкулез
- Г. ожирение
- Д. сердечно-сосудистая недостаточность

Целью II фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является

- А. определение максимально переносимой дозы препарата
- Б. сравнительное изучение с другими препаратами
- В. доказать клиническую эффективность лекарственного средства у определенной группы пациентов, оценить краткосрочную безопасность активного ингредиента, определение уровня терапевтической дозы препарата и схемы дозирования
- Г. изучение возможных сочетаний с другими препаратами
- Д. анализ экономических показателей лечения и уровня качества жизни

Укажите прогностически наиболее неблагоприятную морфологическую форму рака легкого

- А. мелкоклеточный рак
- Б. крупноклеточный рак
- В. немелкоклеточный рак БДУ /БДУ=БезДополнительныхУточнений/
- Г. плоскоклеточный рак БДУ /БДУ=БезДополнительныхУточнений/
- Д. аденокарциномаБДУ /БДУ=БезДополнительныхУточнений/

БИОПСИЮ САРКОМ КОСТЕЙ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ В ОБЛАСТИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ

- А. рецидива
- Б. отдаленных метастазов
- В. послеоперационных осложнений
- Г. свищевого хода

Какой объем удаляемых лимфоузлов включает двухзональная лимфодиссекция (2F)

- А. Лимфодиссекция D2 в брюшной полости и лимфодиссекция в грудной клетки с удалением лимфатических узлов верхнего средостения по ходу возвратногортанных нервов и аортального окна
- Б. Лимфодиссекция D2 в брюшной полости с удалением лимфоузлов до уровня бифуркации трахеи
- В. Лимфодиссекция D2 в брюшной полости с удалением бифуркационных и паратрахеальных лимфоузлов

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН ПРИ РАКЕ ГОРТАНЕ

- А. доксорубицин
- Б. блеомицин
- В. цисплатин
- Г. метотрексат

Большинство доброкачественных центральных опухолей легкого составляют

- А. Аденомы
- Б. папилломы
- В. сосудистые опухоли
- Г. тератомы
- Д. Гамартомы

Наиболее частым морфологическим вариантом рака толстой кишки является:

- А. Аденокарцинома
- Б. Солидный рак
- В. Недифференцированный рак
- Г. Плоскоклеточный рак
- Д. Карциноид

Целью III фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является

- А. определить краткосрочное и долгосрочное отношение /безопасность/эффективность для лекарственных форм активного компонента
- Б. определение максимально переносимой дозы препарата
- В. изучение противоопухолевой активности препарата и его спектра при "сигнальных опухолях"
- Г. изучение возможных сочетаний с другими препаратами
- Д. анализ экономических показателей лечения и уровня качества жизни

Наиболее редко рак молочной железы диагностируется в:

- А. Нижне-внутреннем квадранте;
- Б. Верхне-внутреннем квадранте;
- В. Верхне-наружном квадранте;
- Г. Нижне- наружном квадранте.
- Д. Добавочной дольке

КАКИЕ РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФОУЗЛЫ ПОРАЖАЮТСЯ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ?

- А. подвздошные лимфоузлы
- Б. надключичные лимфоузлы
- В. подмышечные лимфоузлы
- Г. паховые лимфоузлы

Ведущим методом диагностики меланомы кожи является:

- А. радиофосфорная проба
- Б. постлучевая меланурия (реакция Якша)
- В. морфологический метод
- Г. Термография
- Д. компьютерная томография

Анализ биоптатов рака толстой кишки на мутацию RAS (экзоны 2,3,4 генов KRAS и NRAS) необходим для определения:

- А. Прогноза заболевания
- Б. Объема хирургического вмешательства
- В. Тактики лекарственного лечения при метастатическом раке
- Г. Радикальности оперативного вмешательства
- Д. Ничего из перечисленного

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВЫ И ШЕИ

- А. доцетаксел + цисплатин + 5-фторурацил
- Б. оливомицин + циклофосфан
- В. винбластин + блеомицин
- Г. циклофосфан + метотрексат + 5-фторурацил

У больного 60 лет рак околоушной слюнной железы 1 стадии. Наиболее целесообразным методом лечения является

- А. комбинированное лечение с предоперационной дистанционной лучевой терапией
- Б. комбинированное лечение с послеоперационной дистанционной лучевой терапией
- В. сочетанная лучевая терапия
- Г. только хирургическое лечение
- Д. только лучевая терапия

Основная цель радикальной лучевой терапии

- А. достижение полной эрадикации опухоли
- Б. вызов гибели наиболее чувствительных опухолевых клеток
- В. достижение частичной регрессии опухоли
- Г. снижение биологической активности опухолевых клеток
- Д. подведение максимальной очаговой дозы

Применение какого препарата чаще всего ассоциируется с возникновением тромбозов глубоких вен нижних конечностей?

- А. оральных контрацептивов
- Б. антибиотиков группы фторхинолонов
- В. нестероидных анальгетиков
- Г. Антидепрессантов

В КАКОЙ ОРГАН ЧАСТО ДАЕТ МЕТАСТАЗЫ РАК ПРЯМОЙ КИШКИ?

- А. печень
- Б. легкие
- В. кости
- Г. головной мозг

Какие 3 симптома служат основанием для установления стадии «В» у больных лимфомами?

- А. головная боль, слабость, снижение аппетита
- Б. кожный зуд, гипертермия (выше 38°C) в течение 3 дней без признаков воспаления, незапланированная потеря массы тела более 10% за последние 6 мес.
- В. гипертермия (выше 38°C) в течение 3 дней без признаков воспаления, ночные профузные поты, незапланированная потеря массы тела более 10% за последние 6 мес.
- Г. «алкогольные» боли в лимфоузлах, гипертермия (выше 38°C) в течение 3 дней без признаков воспаления, незапланированная потеря массы тела более 10% за последние 6 мес.
- Д. слабость, снижение аппетита, незапланированная потеря массы тела более 10% за последние 6 мес.

При первичной неходжкинской лимфоме желудочно-кишечного тракта наиболее часто поражается:

- А. желудок
- Б. пищевод
- В. подвздошная кишка
- Г. ободочная кишка
- Д. прямая кишка

Благоприятным прогностическим признаком при высокодифференцированном раке щитовидной железы является:

- А. возраст младше 45 лет
- Б. мужской пол
- В. возраст старше 45 лет
- Г. минимальный выход опухоли за пределы капсулы щитовидной железы
- Д. локализация опухоли в средних отделах доли щитовидной железы

Цель общения с пациентом в терминальной стадии опухолевого процесса

- А. вселить надежду на выздоровление,
- Б. отвлечь от мыслей о надвигающейся смерти,
- В. избавить от неопределенности и придать новое значение отношениям с окружающими.
- Г. сообщить информацию о состоянии, угрожающем жизни пациента

Для подбора оптимального режима терапии при метастатическом раке толстой кишки необходимо исследование:

- А. Молекулярно-генетическое исследование для выявления мутаций в генах BRCA 1/2.
- Б. Гистологическое заключение с определением числа пораженных лимфоузлов
- В. Гистологическое заключение с определением морфологического типа опухоли, молекулярно-генетическое исследование для выявления мутаций в генах KRAS, NRAS, BRAF.
- Г. Гистологическое заключение с определением морфологического типа опухоли и ее злокачественности

ДЕСЭМБРИОНАЛЬНОЙ ОПУХОЛЬЮ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. хеMODEKтoмa
- Б. менингиома
- В. хордома
- Г. бронхиогенный рак

После радикальной нефрэктомии по поводу рака почки T2N0M0 II стадии показано:

- А. профилактическая таргетная терапия
- Б. профилактическая лучевая терапия
- В. профилактическая гормонотерапия
- Г. адьювантная иммунотерапия
- Д. динамическое наблюдение

Противопоказанием для трансторакальной игловой биопсии очага в легком является:

- А. подозрение на опухоль легкого
- Б. возможный туберкулез легкого
- В. буллезная эмфизема
- Г. плевральные шварты

Основная роль в лечении трофобластических опухолей принадлежит:

- А. Хирургическому лечению
- Б. Вакциотерапии
- В. Лекарственному лечению
- Г. Лучевому лечению
- Д. Все вышеперечисленное

Наиболее часто встречающийся гистологический тип злокачественных опухолей щитовидной железы

- А. папиллярный рак
- Б. фолликулярный рак
- В. медуллярный рак
- Г. недифференцированный рак
- Д. плоскоклеточный рак

При прогрессировании на оксалиплатин-содержащем режиме химиотерапии в последующей линии рекомендовано использование режимов на основе:

- А. Ингибиторов ароматазы
- Б. Антрациклинов
- В. Иринотекана
- Г. Паклитаксела

При подозрении на метастатическое поражение печени при раке толстой кишки необходимо выполнить:

- А. КТ брюшной полости с контрастным усилением
- Б. УЗИ органов брюшной полости
- В. Обзорную рентгенографию органов брюшной полости
- Г. Колоноскопию

К отдаленным лимфогенным метастазам при раке шейки матки относятся метастазы в лимфатические узлы (TNM8)

- А. не один из выше перечисленных
- Б. Внутренние подвздошные
- В. Наружные подвздошные
- Г. Парааортальные
- Д. Общие подвздошные

Фармакодинамика это

- А. раздел фармакологии, изучающий локализацию, механизм действия и фармакологические эффекты лекарственных средств, силу и длительность их воздействия
- Б. раздел фармакологии и патофизиологии, изучающий локализацию, механизм действия и фармакологические эффекты лекарственных средств, силу и длительность их воздействия
- В. это результат относительной избирательности действия лекарственных средств, которая характеризует их способность воздействовать на чувствительные мишени, не связанные с реализацией терапевтического фармакологического эффекта
- Г. раздел фармакологии, изучающий механизм действия лекарственных средств

Оптимальным вариантом хирургического вмешательства при высокодифференцированном раке щитовидной железы, при опухоли более 2см в диаметре является:

- А. гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка
- Б. тиреоидэктомия
- В. энуклеация опухолевого узла
- Г. резекция пораженной доли щитовидной железы
- Д. резекция щитовидной железы по Николаеву

Определение экспрессии какого биомаркера при нерезектабельном/метастатическом раке желудка является обязательным для выбора 1 линии лекарственного лечения?

- А. Возможные варианты таргетной терапии при раке желудка не требуют поиска и определения предикторов ответа
- Б. Her2neu
- В. MSI
- Г. PD-L1

Основной метод диагностики, который необходимо применить для выявления или исключения рака при узловом образовании в щитовидной железе:

- А. радиоизотопное сканирование щитовидной железы с I-131 или I-125
- Б. анализ крови на Ат-ТГ, Ат-ТПО
- В. тонкоигольную пункционную биопсию под контролем УЗИ
- Г. срочное гистологическое исследование во время операции
- Д. магнитно-резонансную томографию с контрастным усилением

Наихудшей в плане прогноза можно считать локализацию меланомы на коже

- А. головы
- Б. верхних конечностей
- В. в передней поверхности туловища
- Г. задней поверхности туловища
- Д. нижних конечностей

Зонами регионарного метастазирования при раке щитовидной железы являются:

- А. надключичные л/узлы
- Б. л/узлы, расположенные вдоль внутренней яремной вены
- В. медиастинальные л/узлы
- Г. предгортанный л/узел
- Д. все вышеперечисленные

ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОЙ И ОТСРОЧЕННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ ПРИ НИЗКОЭМЕТОГЕННОЙ ОДНОДНЕВНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ВКЛЮЧАЕТ

- А. Антагонист рецепторов серотонина (5-нТЗ)+дексаметазон
- Б. Дексаметазон
- В. Антагонист рецепторов серотонина (5-нТЗ)+дексаметазон+ апрепитант/фосапрепитант
- Г. Не требует профилактики

Метод лечения папиллярного и фолликулярного рака щитовидной железы стадий T1N0M0, больных в возрасте до 45 лет.

- А. лучевой
- Б. хирургический
- В. комбинированный (тиреоидэктомия + лучевая терапия)
- Г. комбинированный (тиреоидэктомия + лечение радиоактивным йодом)
- Д. тиреоидэктомия и терапия тирозинкиназными ингибиторами

При каких опухолях головы и шеи наиболее часто болеют женщины

- А. полости рта
- Б. глотки
- В. гортани
- Г. щитовидной железы

Укажите наиболее частую локализацию отдаленных метастазов при мелкоклеточном раке легкого

- А. внутригрудные лимфатические узлы
- Б. печень
- В. почки и надпочечники
- Г. кости
- Д. головной мозг

Этиологический фактор в развитии рака эндометрия:

- А. Гиперэстрогения
- Б. Вирус папилломы человека
- В. Химические факторы
- Г. Бактериальная вагинальная инфекция
- Д. Все вышеперечисленное

При тройном негативном BRCA-ассоциированном локализованном раке молочной железы предпочтительно включение в лечебный режим неоадъювантной химиотерапии:

- А. препаратов платины (цисплатин или карбоплатин)
- Б. трастузумаба
- В. деносумаба
- Г. гозерелина

Выберите наиболее эффективные схемы сочетания противоопухолевых препаратов для лечения рака молочной железы:

- А. антрациклины и гемцитабин
- Б. таксаны и винорелбин
- В. антрациклины и таксаны
- Г. таксаны и гемцитабин
- Д. гемзар и капецитабин

Какие типы полипов наиболее часто малигнизируются в толстой кишке:

- А. железистые;
- Б. железисто-ворсинчатые;
- В. ворсинчатые;
- Г. ювенильные;
- Д. гиперпластические.

Неoadъювантную химиотерапию используют с целью

- А. уменьшить массу опухоли
- Б. приблизить сроки системного воздействия на опухолевый процесс
- В. определить лекарственный патоморфоз для планирования дальнейшего лечения
- Г. избежать оперативного вмешательства

Обязательным этапом диагностики злокачественного новообразования пищевода является

- А. СКТ органов грудной и брюшной полости с в/в контрастным усилением
- Б. Эзофагогастродуоденоскопия
- В. Морфологическое исследование биопсии опухоли
- Г. Всё вышеперечисленное

Укажите состояние, при котором наиболее повышен риск развития рака желудка

- А. Инфекция *helicobacter pylori*
- Б. Хронический атрофический гастрит
- В. Хроническая язва желудка
- Г. Дисплазия эпителия слизистой оболочки
- Д. Резекция желудка в анамнезе

Наиболее часто при злокачественных опухолях яичка отдаленные метастазы поражают:

- А. Кости
- Б. головной мозг
- В. печень
- Г. легкие
- Д. забрюшинные лимфатические узлы

В течение какого промежутка времени подлежат диспансерному наблюдению лица, излеченные от предраковых заболеваний?

- А. в течение 5 лет
- Б. в течение 3 лет
- В. в течение 2 лет
- Г. в течение 1 года
- Д. после излечения в диспансерном наблюдении не нуждаются

Больным гормонозависимым раком молочной железы в менопаузе с целью профилактики остеопороза могут быть назначены:

- А. бисфосфонаты
- Б. витамины
- В. бевацизумаб
- Г. ингибиторы ароматазы

Какой путь метастазирования наиболее характерен для хориокарциномы:

- А. Лимфогенный
- Б. Гематогенный
- В. Имплантационный
- Г. Все вышеперечисленное
- Д. Все пути метастазирования встречаются с одинаковой частотой

Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается:

- А. в отношении несовершеннолетнего ребёнка
- Б. при несчастных случаях, травмах, независимо от угрозы жизни человеку
- В. в отношении лиц, страдающих онкологическими заболеваниями в терминальной стадии
- Г. в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, и лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
- Д. при отравлениях

При метастатическом раке почки применяется:

- А. Тамоксифен
- Б. Цисплатин
- В. Паклитаксел
- Г. Сунитиниб

Какой опухолевый маркер повышается при эпителиальном раке яичников:

- А. ХГ
- Б. СА-125
- В. АФП
- Г. SCC
- Д. СА-15.3

Адекватным методом лечения первичной инфильтративно-отечной формы рака молочной железы при экспрессии стероидных гормонов является

- А. хирургический
- Б. лучевой
- В. химио-лучевой
- Г. химио-гормоно-лучевая терапия
- Д. химио-гормоно-лучевой и хирургический

Наиболее часто железистый рак пищевода развивается на фоне

- А. рубцовой стриктуры
- Б. инфекции *Helicobacter pylori*
- В. пищевода Барретта
- Г. тяжелой дисплазии многослойного плоского эпителия
- Д. железистый рак пищевода развивается на фоне всего перечисленного

Какая морфологическая форма рака щитовидной железы является наиболее благоприятной в прогностическом плане:

- А. папиллярная аденокарцинома
- Б. фолликулярная аденокарцинома
- В. анапластический (недифференцированный) рак
- Г. медуллярный рак
- Д. рак из клеток Гюртля

Препарат Траметиниб является:

- А. MEK-ингибитором
- Б. BRAF-ингибитором
- В. Анти-CTLA4 моноклональным антителом
- Г. Анти-PD1 моноклональным антителом

Укажите прогностически относительно благоприятную морфологическую форму немелкоклеточного рака легкого

- А. крупноклеточный рак
- Б. плоскоклеточный ороговевающий рак
- В. плоскоклеточный рак без ороговения
- Г. плоскоклеточный веретеноклеточный рак
- Д. аденокарцинома БДУ

К фоновым заболеваниям рака шейки матки относятся все перечисленные, кроме:

- А. Дисплазия
- Б. Эктопия
- В. Лейкоплакия
- Г. Полип
- Д. Эндоцервицит

У больного 59 лет выявлен рак лоханки правой почки cT2N0M0. Определите тактику лечения данного пациента:

- А. радикальная нефрэктомия
- Б. предоперационная лучевая терапия, радикальная нефрэктомия
- В. нефроуретерэктомия, резекция мочевого пузыря с устьем мочеточника
- Г. предоперационная химиотерапия, радикальная нефрэктомия
- Д. химиолучевое лечение

Наиболее часто выявляемый симптом у больных с высокодифференцированным раком щитовидной железы:

- А. изменение голоса
- Б. тиреотоксикоз
- В. наличие пальпируемого узла на шее
- Г. нарушение глотания
- Д. боли в шее с иррадиацией в плечо

Метод исследования, позволяющий определить наличие функционирующей ткани щитовидной железы после предшествующего хирургического вмешательства.

- А. ультразвуковое исследование шеи
- Б. тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ
- В. радиоизотопное сканирование с I-131, I-123 или Tc-99m-пертехнитатом
- Г. компьютерная томография с контрастным усилением
- Д. позитронно-эмиссионная томография

У больной 26 лет папиллярный рак щитовидной железы T1N0M0 с локализацией в правой доле, целесообразно:

- А. выполнить тиреоидэктомию
- Б. провести комбинированное лечение с предоперационной лучевой терапией на I этапе с последующей тиреоидэктомией
- В. провести комбинированное лечение с тиреоидэктомией на I этапе с последующим лечением радиоактивным йодом
- Г. выполнить гемитиреоидэктомию справа с резекцией перешейки
- Д. выполнить субтотальную резекцию щитовидной железы

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. мазок на микрофлору из влагалища
- Б. мазок на онкоцитологию
- В. посев из цервикального канала на микрофлору
- Г. ПЦР на ВПЧ высокоонкогенных типов

Выберите комбинацию иммунопрепаратов, зарегистрированную для лечения метастатической меланомы кожи:

- А. Пембролизумаб и Авелумаб
- Б. Ниволумаб и Ипилимумаб
- В. Пембролизумаб и Ипилиумумаб
- Г. Ниволумаб и ИФН-альфа

Her2/neu – это:

- А. антиэстроген;
- Б. рецептор кортикостероидных гормонов;
- В. один из антрациклинов
- Г. активатор плазминогена урокиназного типа;
- Д. один из тирозинкиназных рецепторов семейства erbB.

Цитогенетический маркёр (Филадельфийская хромосома) наблюдается при:

- А. остром лимфобластном лейкозе
- Б. остром миелобластном лейкозе
- В. хроническом лимфолейкозе
- Г. хроническом миелолейкозе
- Д. хроническом моноцитарном лейкозе

Задачей короткого интенсивного курса предоперационной лучевой терапии является:

- А. улучшение качества жизни
- Б. понижение жизнеспособности опухолевых клеток
- В. получение полной регрессии опухоли
- Г. достижение значительного уменьшения опухоли
- Д. сокращение сроков пребывания больного в стационаре

При диссеминированном раке почечной лоханки целесообразно лечение:

- А. крупнофракционная лучевая терапия на область первичной опухоли и метастазов
- Б. дистанционная гамма-терапия средними фракциями
- В. гормонотерапия
- Г. химиотерапия в режиме гемцитабин+ цисплатин
- Д. иммунотерапия вакциной БЦЖ

Для базальноклеточного рака кожи не характерно:

- А. медленный рост
- Б. многообразие клинических форм
- В. частое метастазирование
- Г. часто рецидивировует

На стадию рака молочной железы влияет следующий гистологический признак:

- А. прорастание опухоли в дерму
- Б. опухолевые эмболы в сосудах
- В. фокусы рака in situ в окружающей ткани
- Г. Микрокальцинаты
- Д. прорастание в большую грудную мышцу

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ОТДАЛЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ У ПАЦИЕНТОВ С САРКОМАМИ КОСТЕЙ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. легкие
- Б. кости
- В. почки
- Г. лимфатические узлы

Какой из препаратов показан для применения при раке толстой кишки в адъювантном режиме?

- А. Бевацизумаб
- Б. Цетуксимаб
- В. Панитумумаб
- Г. Иринотекан
- Д. Ни один из перечисленных препаратов

Точно установить рак молочной железы можно на основании:

- А. клинической картины
- Б. Термографии
- В. Маммографии
- Г. морфологического исследования
- Д. ультразвукового исследования

У больного выявлено: меланома кожи, толщина по Breslow 3.5 мм, инвазия по Clark IV ст., без изъязвления. Определите стадию процесса после операции:

- А. pT1aN0M0
- Б. pT1bN0M0
- В. pT2aN0M0
- Г. pT2bN0M0
- Д. pT3aN0M0

Морфологическая форма злокачественной опухоли щитовидной железы, сохраняющая йодонакопительную функцию

- А. папиллярный рак
- Б. медуллярный рак
- В. плоскоклеточный рак
- Г. недифференцированный рак
- Д. лимфома щитовидной железы

Рак кожи (исключая базалиому и меланому) в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями составляет

- А. около 1%
- Б. 2-3%
- В. 4-8%
- Г. около 15%
- Д. более 20%

Абсолютным показанием к применению эндоваскулярных методов лечения при раке шейки матки является:

- А. 2b-3b стадия заболевания
- Б. Параметральная инвазия
- В. Профузные кровотечения
- Г. Распространение на нижнюю треть влагалища

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А. как этап комбинированного лечения в предоперационном периоде
- Б. как этап комбинированного лечения в послеоперационном периоде
- В. в лечении рака ободочной кишки лучевая терапия не применяется
- Г. как самостоятельный метод лечения

ЦИТОРЕДУКТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ С МАКСИМАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ ОСТАТОЧНЫХ ОПУХОЛЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НЕ БОЛЕЕ 1 СМ СЧИТАЕТСЯ

- А. полной
- Б. субоптимальной
- В. оптимальной
- Г. неоптимальной

Частота сочетания неходжкинской лимфомы ЖКТ с поражением лимфоузлов кольца Пирогова—Вальдейера составляет:

- А. 10-15%
- Б. 20-25%
- В. 30-35%
- Г. 40-45%
- Д. 50%

Какой маркер применяется для диагностики плоскоклеточного рака шейки матки:

- А. CA-125
- Б. ХГ
- В. SCC
- Г. АФП
- Д. CA-19.9

Зрелые тератомы средостения преимущественно располагаются

- А. в переднем верхнем средостении
- Б. в переднем нижнем средостении
- В. в заднем верхнем средостении
- Г. в заднем нижнем средостении
- Д. одинаково часто, как в переднем, так и в заднем средостении

Триггеры Карциномы Меркеля

- А. Полиомавирус (MCPyV)
- Б. Хроническая травматизация
- В. Вирус папилломы человека (ВПЧ)
- Г. Иммуносупрессия

Выберете режим адъювантной ХТ при операбельном раке желудка?

- А. DCF (доцетаксел, цисплатин, 5-фторурацил)
- Б. XELOX (доцетаксел, оксалиплатин, лейковорин, фторурацил)
- В. FLOT
- Г. FOLFIRI (иринотекан, лейковорин, фторурацил)

Наиболее часто рак орофарингеальной области метастазирует в заглоточные лимфатические узлы при локализации

- А. в подвижной части языка
- Б. в корне языка
- В. в мягком и твердом небе
- Г. на слизистой щеки
- Д. на слизистой альвеолярных отростков

К ингибиторам ароматазы относится:

- А. Экземестан
- Б. Анастрозол
- В. Торемифен
- Г. Тамоксифен
- Д. Фулвестрант

Воспалительная форма рака молочной железы классифицируется как:

- А. T3
- Б. T4a
- В. T4b
- Г. T4c
- Д. T4d

Радикальным лечением при злокачественной опухоли нижнего полюса почки до 5 см в диаметре является:

- А. резекция почки
- Б. энуклеация опухоли
- В. нефрэктомия
- Г. нефрадреналэктомия

КАКОЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ ВСТРЕЧАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО?

- А. плоскоклеточный рак
- Б. аденокарцинома
- В. низкодифференцированный рак
- Г. муцинозный рак

Выберите одну характеристику наиболее характерную для плоскоклеточного рака

- А. Характерен для развитых стран
- Б. Заболеваемость постоянно растет
- В. Возникает на фоне пищевода Барретта
- Г. 94% опухолей расположены ниже бифуркации трахеи
- Д. Радиочувствителен, возможна стойкая ремиссия после самостоятельной химиолучевой терапии

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ РЕЗЕКЦИИ ПРИ РАКЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ НЕПОРАЖЕННОЙ ТКАНИ ПЕЧЕНИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ

- А. 10-20%
- Б. 40-50%
- В. 30-40%
- Г. 20-30%

При раке кардиального отдела желудка наиболее характерным симптомом является:

- А. дисфагия
- Б. отрыжка, изжога, рвота
- В. боль в эпигастральной области
- Г. слабость
- Д. похудание

Первым этапом ортоградного лимфогенного метастазирования периферического рака легкого следует считать

- А. пульмональные лимфатические узлы
- Б. бронхопульмональные лимфатические узлы
- В. паратрахеальные лимфатические узлы
- Г. нижние трахеобронхиальные (бифуркационные) лимфоузлы
- Д. верхние трахеобронхиальные лимфоузлы

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА НОСОГЛОТКИ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН МЕТОД

- А. лучевой
- Б. хирургический
- В. химиотерапевтический
- Г. химиолучевой

Какой препарат зарегистрирован для лечения гормоно-чувствительного рака предстательной железы:

- А. олапариб
- Б. энзалутамид
- В. доцетаксел
- Г. кабазитаксел

ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОСАРКОМОЙ

- А. хирургический
- Б. комбинированный
- В. лекарственный
- Г. лучевой

Цетуксимаб и панитумумаб показаны больным с метастатическим раком толстой кишки при

- А. Наличии в опухоли мутации гена KRAS/NRAS
- Б. Наличии в опухоли мутации гена BRCA 1/2
- В. Отсутствии в опухоли мутации гена KRAS/NRAS
- Г. Наличии в опухоли экспрессии HER2
- Д. Наличии мутации гена EGFR

Для подтверждения злокачественного образования толстой кишки необходимо выполнить:

- А. Колоноскопию с биопсией образования
- Б. КТ органов грудной и брюшной полостей
- В. МРТ малого таза
- Г. Обзорную рентгенографию органов брюшной полости

Прогностически неблагоприятным фактором при высокодифференцированных формах рака щитовидной железы является:

- А. мужской пол
- Б. возраст старше 45 лет
- В. выход опухоли за пределы капсулы щитовидной железы
- Г. наличие паратрахеальных метастазов
- Д. все вышеперечисленные

ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО, ОБРАТИВШЕГОСЯ К ВРАЧУ С ЖАЛОБАМИ НА НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

- А. ультразвукового исследования
- Б. рентгенологического исследования толстого кишечника (ирригоскопия)
- В. ректального пальцевого исследования
- Г. колонофиброскопии

Медуллярный рак щитовидной железы развивается:

- А. из фолликулярных клеток
- Б. из метаплазированного эпителия
- В. из парафолликулярных клеток
- Г. из клеток Гюртля
- Д. из любых вышеуказанных

В качестве первых проявлений лимфомы Ходжкина наиболее часто отмечается увеличение:

- А. шейно-надключичных лимфоузлов
- Б. медиастинальных лимфоузлов
- В. забрюшинных лимфоузлов
- Г. паховых лимфоузлов
- Д. всех групп лимфоузлов с одинаковой частотой

У больного 70 лет рак нижней губы II а стадии. Наиболее целесообразный метод лечения

- А. близкофокусная рентгенотерапия
- Б. дистанционная лучевая терапия фотонами
- В. облучение электронами
- Г. дистанционная гамма терапия
- Д. операция

Какая морфологическая форма опухолей щитовидной железы является наиболее неблагоприятной в прогностическом плане:

- А. папиллярная аденокарцинома
- Б. фолликулярная аденокарцинома
- В. анапластический (недифференцированный) рак
- Г. медуллярный рак
- Д. инсулярный рак

ДЛЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ

- А. наличие крови и слизи в стуле
- Б. тошнота и рвота
- В. болезненность при дефекации
- Г. изменение консистенции каловых масс при испражнении

При локализованном раке предстательной железы радикальными методами считаются:

- А. радикальная простатэктомия или лучевая терапия
- Б. только гормональная терапия (аГРГ)
- В. химиотерапия препаратом доцетаксел
- Г. иммунотерапия препаратом атезолизумаб

Чем отличаются принципиально операции, предложенные Ivor Lewis и McKeown:

- А. Путем проведения трансплантата
- Б. Шириной стебля
- В. Объемом лимфодиссекции
- Г. Местом формирования анастомоза

ОСНВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ХОНДРОСАРКОМЫ СЧИТАЮТ

- А. лучевой
- Б. лекарственный
- В. комбинированный
- Г. хирургический

К лекарственным средствам относятся

- А. Субстанции, реактивы категории ЧДА, фармацевтические субстанции, лекарственные препараты
- Б. фармацевтические субстанции, лекарственные препараты
- В. фармацевтические субстанции, лекарственные препараты, реактивы, применяемые на фармацевтическом производстве
- Г. фармацевтические субстанции, лекарственные препараты, вспомогательные вещества

ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ ПРЯМОЙ КИШКИ МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ ВЫЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО

- А. в первые 3 года
- Б. через 3-5 лет
- В. через 5-10 лет
- Г. в период свыше 10 лет

К доброкачественной форме трофобластической болезни относится:

- А. Хориокарцинома
- Б. Пузырный занос
- В. Трофобластическая опухоль плацентарного ложа
- Г. Эпителиоидная трофобластическая опухоль
- Д. Неразвивающаяся беременность

При определении индекса захвата технеция щитовидной железой выполняется сцинтиграфия с ____

- А. ^{99m}Tc – пертехнетатом
- Б. ^{99m}Tc – технетрилом (МИБИ)
- В. ^{99m}Tc - пентатех
- Г. ^{99m}Tc -технефит

Назначение какого препарата возможно в случае выявления мутации в гене c-KIT у пациентов с метастатической меланомой кожи:

- А. Иматиниб
- Б. Панитумумаб
- В. Вемурафениб
- Г. Олапариб

Какие цитостатики эффективны при лечении колоректального рака

- А. фторпиримидины
- Б. антрациклины
- В. таксаны
- Г. анти-HER2 моноклональные антитела

Противопоказания к проведению Фотодинамической терапии с внутривенным введением фотосенсибилизаторов производных хлорина Е6

- А. Хроническая сердечная недостаточность 1-2 степени
- Б. Вирусный гепатит С минимальная биохимическая активность
- В. Эпилепсия
- Г. Индивидуальная непереносимость

Из нижеперечисленных невусов, как правило, трансформируется в меланому

- А. папилломатозный невус
- Б. невус Ито
- В. ограниченный предраковый меланоз Дюбрея
- Г. веррукозный невус
- Д. монгольское пятно

К какой стадии рака шейки матки относятся метастазы в парааортальные лимфатические узлы по TNM8

- А. I стадия
- Б. II стадия
- В. III стадия
- Г. IV стадия
- Д. IIIA

Что относится к относительному противопоказанию к химиотерапии рака желудка?

- А. заболевание в стадии декомпенсации
- Б. неэффективность данного вида лечения
- В. активный туберкулез легких
- Г. распад опухоли (угроза кровотечения)

ОСНОВНЫМ ПРЕПАРАТОМ СИСТЕМНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. доксорубицин
- Б. этопозид
- В. паклитаксел
- Г. вотриент

Регионарными метастазами рака щитовидной железы не поражаются:

- А. л/узлы вдоль внутренней яремной вены
- Б. надключичные л/узлы
- В. паратрахеальные л/узлы
- Г. подчелюстные л/узлы
- Д. все вышеперечисленные группы

Чаще других гистологических форм при раке легкого встречается:

- А. карциноид
- Б. аденокарцинома
- В. Мелкоклеточный рак
- Г. Крупноклеточный рак

Частота отдаленного метастазирования базально-клеточного рака кожи

- А. Не дает метастазов
- Б. От 5 до 10 %
- В. От 0,0028 до 3,5%.
- Г. От 10 до 20%

При лимфоме Ходжкина поражение пахово-подвздошных лимфоузлов и селезёнки трактуется как стадия:

- А. I
- Б. II
- В. III
- Г. IIIB
- Д. IV

Какой из морфологических вариантов почечно-клеточного рака встречается чаще всего:

- А. светлоклеточный
- Б. медуллярный
- В. папиллярный I и II типа
- Г. хромофобный

К ФОНОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ ОТНОСЯТ

- А. синехии полости матки
- Б. полип эндометрия
- В. железистую гиперплазию
- Г. атипическую гиперплазию

Показания для выполнения наружного чрескостного остеосинтеза при метастатическом поражении длинных костей.

- А. как первый этап хирургического лечения (при технической невозможности других методов)
- Б. солитарный характер метастатического поражения
- В. у пациентов с ожидаемой консолидацией перелома на фоне проведения специальной терапии

Сочетанная лучевая терапия подразумевает:

- А. облучение в сочетании с химиотерапией
- Б. расщепление курса лучевой терапии
- В. облучение с радиомодификатором
- Г. применение двух способов облучения или двух видов излучения
- Д. сочетание с гормонотерапией

Дайте определение «раннего» рака желудка:

- А. Carcinoma in situ.
- Б. Опухоль желудка без метастазов.
- В. Опухоль желудка, в том числе и с метастазами, но только в пределах слизистого/подслизистого слоя.
- Г. Опухоль желудка, в том числе и с метастазами, но только в пределах слизистого/подслизистого слоя, а также мышечной оболочки.
- Д. Опухоль желудка с инвазией в пределах слизистого/подслизистого слоя

КАКИЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ОТНОСЯТСЯ К СФИНКТЕРОСОХРАНЯЮЩИМ?

- А. лапароскопическая резекция прямой кишки
- Б. чресбрюшинная резекция прямой кишки
- В. брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
- Г. брюшно-анальная резекция прямой кишки

Основным функциональным показателем кардиотоксичности антрациклинов является:

- А. изменение зубца Т на электрокардиограмме
- Б. увеличение интервала Р-Q на электрокардиограмме
- В. тахикардия
- Г. гипотония
- Д. уменьшение фракции выброса левого желудочка

К меланомонеопасным невусам относятся

- А. синий (голубой) невус
- Б. невус Ота
- В. пограничный пигментный невус
- Г. гигантский пигментный невус
- Д. веррукозный невус

ПОВЫШЕННЫЙ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ИМЕЮТ ЖЕНЩИНЫ С

- А. цитомегаловирусной инфекцией
- Б. вирусным гепатитом В
- В. сахарным диабетом
- Г. папилломавирусной инфекцией

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ РАДИОДЕРМАТИТА НА ФОНЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РЕКОМЕНДОВАНО

- А. Низкоинтенсивное лазерное излучение
- Б. Инфракрасное светодиодное излучение
- В. Внутривенное лазерное облучение крови
- Г. Применение поляризованного света

Что является стандартным вариантом лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря без отдаленных метастазов:

- А. лучевая терапия
- Б. химиотерапия по схеме CG (гемцитабин+цисплатин)
- В. таргетная терапия препаратом панитумумаб
- Г. радикальная цистэктомия с тазовой лимфодиссекцией

Гражданин, имеющий страховой полис ОМС, имеет право на получение медицинской помощи:

- А. только в районной городской больнице по месту постоянной регистрации
- Б. только в районной поликлинике по месту постоянной регистрации
- В. только в областной больнице по месту постоянной регистрации
- Г. только в специализированном ЛПУ
- Д. в любом государственном ЛПУ Российской Федерации

Секторальная резекция молочной железы показана при:

- А. Мастодинии
- Б. диффузной мастопатии
- В. узловой мастопатии
- Г. Мастите
- Д. раке Педжета

К наиболее часто встречающейся морфологической форме рака мочевого пузыря относится

- А. перстневидно-клеточный рак
- Б. уротелиальная карцинома
- В. железистый рак
- Г. солидный рак
- Д. недифференцированный рак

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РАКА СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. плоскоклеточный рак
- Б. саркома
- В. недифференцированный рак
- Г. мукоэпидермоидная опухоль

Больная 43 лет, без выраженных сопутствующих заболеваний. По данным обследования выявлен рак правой почки cT1aN0M0. По данным КТ с внутривенным усилением опухоль 3 см располагается в нижнем полюсе, выступая за контуры правой почки. Больной целесообразно выполнить

- А. радикальную нефрэктомия
- Б. лапароскопическую нефрэктомия
- В. криодеструкцию опухоли
- Г. резекцию почки (оптимально лапароскопическую)
- Д. радиочастотную абляцию опухоли

Для достижения овариальной супрессии у пациенток люминальным типом рака молочной железы применяются:

- А. кабазитаксел
- Б. гозерелин
- В. олапариб
- Г. энзалутамид

Обязательным компонентом органосохраняющего лечения (после выполнения оперативного вмешательства) больных раком молочной железы является:

- А. Гормонотерапия
- Б. Иммуноterapia
- В. лазерная терапия
- Г. лучевая терапия на оставшуюся часть молочной железы
- Д. Химиотерапия

Под термином "метастаз Вирхова" подразумевается метастаз:

- А. в надключичный лимфатический узел
- Б. в клетчатку малого таза
- В. в яичники
- Г. в легкие
- Д. в печень

Целью I фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является

- А. изучение противоопухолевой активности препарата при разных видах опухоли
- Б. определение допустимой для человека разовой и суммарной дозы препарата и спектра токсичности
- В. сравнительное изучение нового агента с другими препаратами
- Г. изучение возможных сочетаний с другими препаратами
- Д. анализ экономических показателей лечения и уровня качества жизни

Поражение сосочкового слоя кожи при меланоме соответствует уровню инвазии по Clark

- А. Первому
- Б. Второму
- В. Третьему
- Г. Четвертому
- Д. Пятому

Профилактическим онкологическим осмотрам подлежат лица старше:

- А. 10 лет
- Б. 20 лет
- В. 30 лет
- Г. 40 лет
- Д. 50 лет

У больного 65 лет, страдающего в течение 15 лет геморроем, после продолжительного бессимптомного периода появились прожилки крови в каловых массах. Болей нет.

Состояние удовлетворительное. Какую тактику избрать?

- А. Назначить свечи с проктогливенолом, диету, явку через 3-4 недели.
- Б. Произвести общий анализ крови, рентгеноскопию грудной клетки.
- В. Произвести пальцевое исследование прямой кишки.
- Г. Произвести пальцевое исследование прямой кишки и ректороманоскопию.
- Д. Динамическое наблюдение

Необходимый объем лечения для пациента с опухолью яичка?

- А. гормонотерапия
- Б. орхофуникулэктомия и экстирпация полового члена
- В. Химиотерапия
- Г. орхофуникулэктомия
- Д. лучевая терапия

При раке молочной железы необходимо назначать лучевую терапию на зоны лимфоколлекторов, независимо от объема оперативного вмешательства при поражении следующего числа лимфоузлов:

- А. 0
- Б. 1
- В. 2
- Г. 3
- Д. 4 и более

Какой препарат используется при светлоклеточном раке почки в I линии при благоприятном прогнозе:

- А. сунитиниб
- Б. темсиролимус
- В. ниволумаб
- Г. гемцитабин

К факультативным предракам кожи относят

- А. эритроплазию Кейра
- Б. кератоакантому
- В. болезнь Педжета
- Г. болезнь Боуэна
- Д. пигментную ксеродерму

Пациенткам с местно-распространенным серозным раком яичников low grade после окончания комбинированного лечения в качестве поддерживающей терапии может быть рекомендовано назначение:

- А. Олапариб
- Б. Рукапариб
- В. Анастразол
- Г. Бевацизумаб

Рак легкого гематогенно метастазирует

- А. в печень
- Б. в кости
- В. в головной мозг
- Г. во все указанные выше локализации
- Д. в указанные выше локализации рак легкого практически не метастазирует

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. эндометрионная аденокарцинома
- Б. серозная аденокарцинома
- В. светлоклеточная карцинома
- Г. плоскоклеточная карцинома

К РЕДКИМ ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА ОТНОСИТСЯ

- А. Хроофобная
- Б. Онкоцитомы
- В. Карцинома собирательных трубочек Беллини
- Г. Ангиомиолипома

ВНЕОРГАННОЙ ОПУХОЛЬЮ APUD-СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. хеомодектома
- Б. бронхиогенный рак
- В. медуллярный рак щитовидной железы
- Г. хордома

Наиболее радиочувствительной среди опухолей носоглотки является

- А. плоскоклеточный ороговевающий рак
- Б. плоскоклеточный рак с высокой степенью лимфатической инфильтрации
- В. лимфосаркома
- Г. аденокарцинома
- Д. саркомы

При p16-положительном раке T3–4, N0–3 раке ротоглотки рекомендуется лечение:

- А. одновременная ХЛТ или индукционная ХТ с последующей ЛТ или одновременной ХЛТ
- Б. индукционная ХТ с последующей ЛТ или одновременной ХЛТ
- В. одновременная ХЛТ
- Г. лекарственное лечение ингибиторами контрольных точек иммунного ответа

У больного 65 лет плоскоклеточный низкодифференцированный рак корня языка T3N2M0. Наиболее целесообразным методом лечения является

- А. резекция языка в сочетании с операцией Крайля
- Б. сочетанная лучевая терапия
- В. дистанционное облучение языка и регионарных зон в сочетании с локальной гипертермией
- Г. внутритканевая лучевая терапия
- Д. одновременное химиолучевое лечение

Укажите стандартные диагностические методы, применяемые для уточнения распространенности рака легкого:

- А. рентгено-томография (и КТ) грудной клетки
- Б. бронхоскопия и/или трансторакальная пункция полости плевры/перикарда
- В. УЗИ (КТ) органов брюшной полости
- Г. скенирование скелета,
- Д. все перечисленное

Какой фактор более всего влияет на частоту метастазирования при раке толстой кишки:

- А. Гистологическая структура опухоли
- Б. Глубина инвазии кишечной стенки
- В. Локализация опухоли
- Г. Возраст больного
- Д. Пол пациента

Для рака эндометрия наиболее характерны следующие виды метастазирования:

- А. Лимфогенное
- Б. Имплантационное
- В. Все вышеперечисленное
- Г. Лимфогенное и имплантационное происходит с одинаковой частотой
- Д. Нет правильного ответа

При радикальной мастэктомии по Мадену

- А. удаляются обе грудные мышцы
- Б. большая грудная мышца сохраняется, малая грудная мышца удаляется
- В. сохраняются большая и малая грудные мышцы
- Г. малая грудная мышца сохраняется, большая грудная мышца удаляется
- Д. сухожилие малой грудной мышцы отсекается, и после лимфодиссекции подшивается

Показанием для применения лечения радиоактивным йодом больного раком щитовидной железы являются:

- А. отдаленные метастазы медуллярного рака
- Б. отдаленные метастазы папиллярного рака
- В. отдаленные метастазы недифференцированного рака
- Г. регионарные метастазы медуллярного рака
- Д. регионарные метастазы плоскоклеточного рака

КАКОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАКЕ ТЕЛА МАТКИ T1aNOm0 у ПАЦИЕНТКИ 55 лет, ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП - ЭНДОМЕТРИОИДНАЯ АДЕНОКАРЦИНОМА G1?

- А. надвлагалищная ампутация матки
- Б. абляция эндометрия
- В. тотальная гистерэктомия, ометэктомия
- Г. экстирпация матки с придатками

Трастузумаб – это:

- А. гуманизированные антитела к Her2/neu;
- Б. один из тирозинкиназных рецепторов семейства erbB;
- В. один из антрациклинов;
- Г. активатор плазминогена урокиназного типа;
- Д. рецептор эпидермального фактора роста.

Какая кишечная непроходимость более характерна для рака ободочной кишки?

- А. Обтурационная
- Б. Странгуляционная
- В. Смешанная
- Г. Динамическая
- Д. Характерного типа нет

Рак пищевода чаще всего поражает

- А. шейный отдел
- Б. верхнегрудной отдел
- В. среднегрудной отдел
- Г. нижнегрудной отдел
- Д. рак пищевода поражает указанные отделы с одинаковой частотой

Диагностическим маркером медуллярного рака щитовидной железы является

- А. кальцитонин
- Б. тиреотропный гормон (ТТГ)
- В. тиреоглобулин (ТГ)
- Г. антитела к тиреоглобулину (Ат-ТГ)
- Д. антитела к тканевой пероксидазе (Ат-ТПО)

Основным методом лечения неходжкинской лимфомы IV стадии является:

- А. симптоматическая терапия
- Б. лучевая терапия
- В. хирургическое лечение
- Г. комбинированный (химиолучевой) метод
- Д. химиотерапия

Основной метод хирургического лечения остеосаркомы

- А. Краевая резекция кости
- Б. Ампутация конечности
- В. Сегментарная резекция с эндопротезированием
- Г. Хирургическое лечение не проводится

Наиболее частой причиной летального исхода при хроническом лимфолейкозе являются:

- А. прогрессирование лейкоза и инфекционные осложнения
- Б. кровотечение
- В. сопутствующие заболевания
- Г. аутоиммунные осложнения
- Д. гиперспленизм

Рак Педжета относится к:

- А. раку соска молочной железы
- Б. доброкачественным дисплазиям
- В. внутрипротоковому раку
- Г. доброкачественным опухолям
- Д. слизистому раку

ПОД ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЭТАПА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ ПОНИМАЮТ

- А. эндопротезирование
- Б. накостный металлостеосинтез
- В. внутрикостный металлостеосинтез
- Г. краевую резекцию кости

Первые симптомы рака легкого чаще всего обусловлены проявлениями

- А. первичной опухоли
- Б. регионарных метастазов
- В. отдаленных метастазов
- Г. регионарных и отдаленных метастазов
- Д. общего воздействия опухоли на организм

При раке тела матки в 80% случаев встречается одна из перечисленных морфологических форм:

- А. Плоскоклеточный рак
- Б. Аденокарцинома
- В. Светлоклеточная аденокарцинома
- Г. Железисто-плоскоклеточный рак
- Д. Недифференцированный рак

КАКОЙ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ?

- А. хирургический
- Б. химиотерапия
- В. лучевая терапия
- Г. сочетание лучевой терапии и химиотерапии

Для диагностики рака молочной железы наиболее достоверными методами исследования являются:

- А. маммография и термография
- Б. Маммография
- В. маммография и ультразвуковое исследование + гистологическое исследование опухоли
- Г. компьютерная томография и термография
- Д. позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и термография

Поздние лучевые повреждения возникают после облучения через:

- А. 7 дней
- Б. 12 дней
- В. 3 месяца
- Г. во время облучения
- Д. 1 месяц

Оптимальным вариантом хирургического вмешательства при высокодифференцированном раке щитовидной железы, при опухоли не более 2см в диаметре в группе благоприятного прогноза является:

- А. гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка
- Б. тиреоидэктомия
- В. субтотальная резекция щитовидной железы
- Г. резекция щитовидной железы по Николаеву
- Д. резекция пораженной доли щитовидной железы

ОСНОВНЫМ ПРОГНОСТИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ У ПАЦИЕНТОВ С ЛОКАЛИЗОВАННЫМИ САРКОМАМИ КОСТЕЙ СЛУЖИТ

- А. степень злокачественности опухоли
- Б. максимальный размер опухоли
- В. возраст больного
- Г. Локализация опухоли

Наиболее раннюю диагностику рака желудка обеспечивает:

- А. рентгенологическое исследование желудка
- Б. гастроскопия с биопсией
- В. поиск синдрома малых признаков
- Г. обзорная рентгеноскопия брюшной полости

Выберите режим лекарственного лечения зарегистрированный в качестве 2 линии (после прогрессии на фоне платиносодержащей ХТ) у пациентов с метастатическим раком желудка:

- А. Паклитаксел и рамуцирумаб
- Б. Ниволумаб и ипилимумаб
- В. Иринотекан и трастузумаб
- Г. FLOT (доцетаксел, оксалиплатин, лейковорин, фторурацил)

Прогностически неблагоприятным фактором при высокодифференцированных формах рака щитовидной железы не является:

- А. мужской пол
- Б. минимальное распространение опухоли за капсулу щитовидной железы
- В. женский пол
- Г. паратрахеальные метастазы
- Д. возраст старше 45 лет

Укажите название операции, при которой выполняется формирование гетеротопического артифициального мочевого пузыря:

- А. Цистопластика по Штудеру
- Б. Цистопластика по Брикеру
- В. Цистопластика по Редди
- Г. Цистопластика по Камей

Лучевое лечение в виде самостоятельного метода терапии используется при лимфоме Ходжкина в стадии:

- А. IA
- Б. IB
- В. IIA
- Г. IIIA
- Д. не используется

Какой препарат является препаратом выбора в качестве адъювантной гормональной терапии у пациенток люминальным типом рака молочной железы в пременопаузе:

- А. тамоксифен
- Б. экземестан
- В. фулвестрант
- Г. рибоциклиб

При полном пузырном заносе в 90% случаев встречается кариотип:

- А. 46XX (все хромосомы отцовские)
- Б. 69 XXX (триплоидия)
- В. 46XY
- Г. Все вышеперечисленное
- Д. Нет правильного ответа

Ранним симптомом рака восходящего отдела ободочной кишки может быть:

- А. Кишечная непроходимость;
- Б. Патологические примеси в кале;
- В. Анемия;
- Г. Всё выше перечисленное.
- Д. Ничего из перечисленного

При наличии у больного меланомы слизистой мягкого неба предпочтительнее проводить

- А. хирургическое лечение
- Б. лучевое лечение
- В. химиотерапию
- Г. химиолучевое лечение
- Д. комбинированное лечение (операция и лучевая терапия)

Меланома кожи относится к опухолям

- А. нейроэктодермальной природы
- Б. эктодермальной природы
- В. мезенхимальной природы
- Г. эмбриональной природы
- Д. эпителиальной природы

Какая из операций требует повторного вмешательства с разрывом во времени для восстановления естественного пассажа содержимого по толстой кишке?

- А. Передняя резекция прямой кишки.
- Б. Ампутация прямой кишки с низведением (протягиванием).
- В. Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки.
- Г. Операция Гартмана
- Д. Резекция сигмовидной кишки

Наличие дочерних пигментных включений на коже (сателлитов) вокруг меланомы указывает

- А. на местную распространенность процесса
- Б. на наличие дополнительных невоидных образований
- В. на рецидив меланомы
- Г. на стабилизацию процесса
- Д. типичное течение болезни

Основной принцип хирургического лечения рака щитовидной железы

- А. операция выполняется интрафасциально
- Б. операция выполняется экстрафасциально с выделением возвратного нерва и паращитовидных желез
- В. обязательно сохранение участка функционирующей тиреоидной ткани для того, чтобы избежать заместительной терапии
- Г. паращитовидные железы сохранять не нужно, так как их функция легко компенсируется

ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ФОРМОЙ РАКА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. плоскоклеточный рак
- Б. недифференцированный рак
- В. диморфный (смешанный железистый и плоскоклеточный) рак
- Г. аденокарцинома

НАИБОЛЕЕ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ОПУХОЛЬЮ НОСОГЛОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. плоскоклеточный ороговевающий рак с высокой степенью лимфатической инфильтрации
- Б. плоскоклеточный ороговевающий рак
- В. аденокарцинома
- Г. саркома

Опухолевое поражение оболочек мозга (нейролейкемия) наиболее часто наблюдается при:

- А. лимфоме Ходжкина
- Б. неходжкинской лимфоме
- В. хроническом миелолейкозе
- Г. хроническом лимфолейкозе
- Д. множественной миеломе

Типовой операцией при раке селезеночного изгиба ободочной кишки является

- А. Резекция поперечной ободочной кишки с удалением селезеночного изгиба
- Б. Тотальная колэктомия
- В. Левосторонняя гемиколэктомия
- Г. Резекция селезеночного изгиба ободочной кишки

Клиническая картина меланомы вульвы проявляется

- А. Зудом
- Б. Болями
- В. Лейкореей
- Г. Гиперпигментацией

При планировании радикального вмешательства с целью удаления злокачественной опухоли грудной клетки, проявляющейся синдромом горнера, нарушением чувствительности кожи и атрофией верхней конечности, оптимальным доступом является _____ торакотомия

- А. Задняя
- Б. Передняя
- В. Парастеральная
- Г. Боковая

Противопоказанием к проведению лучевой терапии при раке легкого является

- А. Метастатический плеврит
- Б. Тромбоцитопения (ниже $110 \cdot 10^9 / л$)
- В. Обширное врастание в соседние органы и сосуды
- Г. Лейкопения (ниже $3 \cdot 10^9 / л$)

Медленным ростом и очень редким метастазированием характеризуется

- А. Меланома
- Б. Плоскоклеточный рак
- В. Базальноклеточный рак
- Г. Рак придатков кожи

Наиболее опасным пигментным невусом для развития меланомы является

- А. Голубой
- Б. Внутридермальный
- В. Смешанный
- Г. Пограничный

Решающим методом для диагностики центральной опухоли легкого является

- А. Компьютерная томография
- Б. Бронхография
- В. Фибробронхоскопия с биопсией
- Г. Рентгенография

Препаратом, индуцирующим кардиотоксичность 2 типа, является

- А. Доксорубин
- Б. Бевацизумаб
- В. Циклофосфамид
- Г. Доцетаксел

К редким формам меланомы относится

- А. Меланома вульвы, прямой кишки
- Б. Лентиго-меланома
- В. Узловая
- Г. Поверхностно-распространенная

Метастазирование в ____ называется метастазом шницлера

- А. Пупок по ходу круглой связки печени
- Б. Левые надключичные лимфатические узлы
- В. Параректальные лимфатические узлы
- Г. Яичник

Гастрэктомия с резекцией поперечной ободочной кишки является _____ операцией

- А. Комбинированной
- Б. Симультантной
- В. Расширенной
- Г. Сочетанной

Рак кожи волосистой части головы без деструкции костей черепа, размером 2,5 см, без регионарных метастазов соответствует ____ стадии заболевания

- А. III
- Б. II
- В. I
- Г. IV

Регионом с высоким уровнем заболеваемости раком печени является

- А. Европа
- Б. Россия
- В. Южная Африка
- Г. США

При раке лёгкого наиболее часто метастазами поражаются _____ лимфатические узлы

- А. Подмышечные
- Б. Внутригрудные
- В. Паховые
- Г. Забрюшинные

Герминогенной опухолью яичка является

- А. Гранулематозная опухоль
- Б. Лейдигома
- В. Сертолиома
- Г. Семинома

Мера поглощения лучевой энергии на различной глубине тканей называется дозой

- А. Интегральной
- Б. Глубинной
- В. Поверхностной
- Г. Очаговой

Показатель одногодичной летальности отражает долю больных

- А. С запущенными формами злокачественных новообразований
- Б. Умерших в онкологическом диспансере в текущем году.
- В. С IV стадией заболевания
- Г. Умерших в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования

Рак верхнечелюстной пазухи следует дифференцировать с

- А. Дистопией третьих моляров
- Б. Хроническим верхнечелюстным синуситом
- В. Плеоморфной аденомой
- Г. Ретенционной кистой

Рекомендованным уровнем ттг для проведения радиойодтерапии является _____ мкМЕ/мл

- А. Более 30
- Б. Менее 10
- В. Более 100
- Г. Менее 30

К профессиональным факторам развития опухолей печени относят

- А. Поливинилхлорид
- Б. Соединения свинца
- В. Соединения ртути
- Г. Соединения меди

Наиболее благоприятной в прогностическом плане морфологической формой опухолей щитовидной железы является

- А. Медуллярный рак
- Б. Фолликулярная аденокарцинома
- В. Папиллярная аденокарцинома
- Г. Анапластический рак

Критерием для проведения костной пластики после удаления злокачественных опухолей челюстей является

- А. Характер метастазирования
- Б. Вид первичной опухоли
- В. Объем опухоли
- Г. Отсутствие рецидива

Клиника опухолей трахеи наиболее часто характеризуется _____ в виде кашля, одышки, стридора, кровохаркания, локальных болей, дисфонии, дисфагии

- А. Подострым течением с относительно медленным развитием клинической картины и одновременным развитием регионарных и отдаленных метастазов с нарастанием симптомов
- Б. «Перебегающей» клинической картиной с чередованием нарастания и стихания проявлений
- В. Медленным нарастанием симптомов заболевания
- Г. Очень длительным периодом бессимптомного течения и появлением симптомов только при достижении опухолью больших размеров

При подозрении на опухоль почки в первую очередь необходимо провести

- А. Ультразвуковое исследование
- Б. Экскреторную рентгенографию
- В. Компьютерную томографию
- Г. Объективный осмотр

Выбор метода лечения эритроплазии кейра зависит от

- А. Сроков заболевания
- Б. Локализации поражения
- В. Формы роста образования
- Г. Размеров очага поражения

Дисфагия при раке пищевода появляется, прежде всего, на _____ пищу

- А. Твердую
- Б. Холодную
- В. Жидкую
- Г. Горячую

Наименование медицинской организации должно соответствовать _____, министерством здравоохранения Российской Федерации

- А. Единому перечню, утвержденному
- Б. Единому реестру, утвержденному
- В. Единой номенклатуре, утвержденной
- Г. Единому регистру, утвержденному

С точки зрения функциональной переносимости и онкологического радикализма, в случае зрелой тератомы верхней доли лёгкого у пациента старческого возраста, страдающего субкомпенсированным сахарным диабетом II типа и хронической сердечной недостаточностью с фракцией выброса левого желудочка 56%, целесообразно выполнение

- А. Типичной сегментэктомии
- Б. Верхней лобэктомии
- В. Билобэктомии
- Г. Атипичной резекции

Чувствительность опухолевого маркера представляет собой

- А. Процентное отношение числа отрицательных результатов теста в группе онкологических больных
- Б. Процентное выражение частоты истинно-положительных результатов теста в группе онкологических больных
- В. Коэффициент отношения числа положительных результатов теста к группе здоровых людей и пациентов с доброкачественными заболеваниями
- Г. Процентное выражение частоты истинно-отрицательных результатов теста в группе здоровых людей и пациентов с доброкачественными заболеваниями

Третья степень дисфагии при раке пищевода характеризуется

- А. Затруднением прохождения по пищеводу твердой пищи
- Б. Затруднением прохождения полужидкой пищи (кашицеобразной)
- В. Полной обтурацией просвета пищевода
- Г. Затруднением прохождения жидкости

К основным показателям, характеризующим общественное здоровье, относят показатели

- А. Средней занятости койки, числа посещений фельдшерско-акушерских пунктов
- Б. Оборота койки, укомплектованности стационара врачами
- В. Средней длительности пребывания больного на койке, летальности
- Г. Демографические, заболеваемости, физического развития, инвалидности

Под вторичной профилактикой рака понимают

- А. Активный поиск онкологических больных
- Б. Пропаганду онкологических знаний среди населения
- В. Лечение предопухолевых заболеваний
- Г. Лечение онкологического заболевания

Из приведенных контрастных методик исследования молочной железы терапевтический эффект имеет

- А. Пневмокистография
- Б. Двойное контрастирование протоков
- В. Пневмомаммография
- Г. Дуктография

Наблюдается высокая частота ассоциации саркомы Капоши и

- А. Экземы
- Б. СПИДа
- В. Гепатита
- Г. Лимфомы

Осложнением метода изолированной регионарной перфузии является

- А. Перелом кости
- Б. Местная токсичность
- В. Отёк лёгких
- Г. Перитонит

Появление механической желтухи опухолевого генеза чаще всего сопровождается

- А. Увеличением желчного пузыря
- Б. Тошнотой, рвотой
- В. Появлением резких болей в эпигастрии
- Г. Асцитом

Аденокистозная карцинома околоушной слюнной железы является опухолью

- А. Злокачественной эпителиальной
- Б. Злокачественной мезенхимальной
- В. Доброкачественной эпителиальной
- Г. Доброкачественной мезенхимальной

Естественным приростом населения называют

- А. Разность между численностью населения в начале и в конце года
- Б. Разность между показателями рождаемости и смертности
- В. Темп роста
- Г. Абсолютный прирост

Если у больного рецидив рака кожи волосистой части головы через год после близкофокусной рентгенотерапии в дозе 60 Гр, то целесообразно назначить

- А. Комбинированное лечение с предоперационной дистанционной g-терапией
- Б. Повторный курс близкофокусной рентгенотерапии
- В. Курс дистанционной g-терапии
- Г. Хирургическое иссечение с пластикой

Самым достоверным способом диагностики лимфом является

- А. Рентгенография грудной клетки
- Б. Гистологическое исследование
- В. Иммуногистохимическое исследование
- Г. Биохимический анализ крови

При расширенной пневмонэктомии выполняют удаление лёгкого с

- А. Трансперикардальной обработкой сосудов лёгкого
- Б. Удалением лимфоузлов переднего и заднего средостения
- В. Удалением корневых, бифуркационных, верхних трахеобронхиальных лимфатических узлов
- Г. Резекцией перикарда или грудной стенки

Метастазы рака желудка чаще поражают

- А. Надпочечники
- Б. Лёгкие
- В. Кости
- Г. Печень

Химиотерапия является эффективным методом лечения

- А. Саркомы Юинга
- Б. Фибросаркомы
- В. Хондросаркомы
- Г. Гемангиосаркомы

Частота лимфомы ходжкина у мальчиков по сравнению с девочками

- А. Выше в подростковом возрасте
- Б. Ниже в возрасте до 12 лет
- В. Выше в возрасте до 12 лет
- Г. Ниже в подростковом возрасте

Наибольшая вероятность малигнизации имеет место при _____ полипах прямой кишки

- А. Ворсинчатых
- Б. Гипопластических
- В. Гиперпластических
- Г. Множественных аденоматозных

Наиболее часто встречающимся гистологическим типом рака почки является _____ рак

- А. Светлоклеточный
- Б. Веретеночлеточный
- В. Гранулярно-клеточный
- Г. Папиллярный

Наиболее достоверным методом диагностики глубины пенетрации при раке пищевода является

- А. Эндосонография
- Б. Компьютерная томография
- В. Магниторезонансная томография
- Г. Ультразвуковое исследование

К наиболее эффективным консервативным вариантам лечения гигантоклеточной опухоли кости 2-3 стадии на сегодняшний день относят

- А. Лучевую терапию в дозе 40 гр
- Б. Деносумаб 120 мг п/к по стандартной схеме курсом 6-9 месяцев
- В. НПВС 7-10 дней, в сочетании с гипсовой иммобилизацией
- Г. ФТЛ магнит, фонофорез с гидрокортизоном, массаж – 14 дней

Одним из ключевых условий радикальности выполнения оперативного вмешательства по поводу мелкоклеточного рака лёгкого, при условии проведения неоадьювантных курсов полихимиотерапии, является пересечение бронха на расстоянии _____ мм и более от видимого края опухоли со срочным гистологическим исследованием края резекции

- А. 7
- Б. 15
- В. 3
- Г. 12

Символом p1 при меланоме кожи обозначают метастазы _____ см в наибольшем измерении в любом из регионарных лимфатических узлов

- А. До 3
- Б. Более 3
- В. До 2
- Г. Более 4

Экзофитный тип роста опухоли пищевода

- А. Представлен бородавчатыми разрастаниями, похожими на цветную капусту
- Б. Как правило растет медленно
- В. Распространяется главным образом по окружности пищевода
- Г. Как правило поздно метастазирует

Для мягкой фибромы характерно наличие в ней

- А. Зрелой жировой и фиброзной ткани
- Б. Зрелой жировой ткани
- В. Зрелой фиброзной ткани
- Г. Незрелой фиброзной ткани

Риск несостоятельности швов воздухопроводящих путей наиболее высок после

- А. Комбинированной пневмонэктомии с резекцией бифуркации трахеи
- Б. Бронхопластической лобэктомии
- В. Комбинированной пневмонэктомии с резекцией левого предсердия
- Г. Расширенной пневмонэктомии с билатеральной лимфодиссекцией

При медуллярном раке щитовидной железы в крови отмечается повышение уровня

- А. Раково-эмбрионального антигена
- Б. Тиреотропного гормона
- В. Тиреоидных гормонов
- Г. Кальцитонина

При раке ректосигмоидного отдела прямой кишки, осложнённом острой кишечной непроходимостью, операцией выбора является

- А. Операция Грекова
- Б. Операция Гартмана
- В. Формирование колостомы
- Г. Формирование обходного анастомоза

Основным симптомом лимфомы ходжкина у детей является

- А. Похудание
- Б. Лихорадка
- В. Анемия
- Г. Лимфаденопатия

Препаратом, который применяется для стимуляции лейкопоза, является

- А. Филграстим
- Б. Ацетилсалициловая кислота
- В. Циклоспорин
- Г. Эптифибатид

В случае периферически расположенного метастаза радикально оперированной опухоли желудочно-кишечного тракта, при условии отсутствия иных метастатических очагов, показано выполнение

- А. Пневмонэктомии
- Б. Сегментэктомии с удалением бронхопульмональных лимфоузлов
- В. Атипичной резекции лёгкого
- Г. Расширенной лобэктомии

Каждый гражданин имеет право выбора врача-терапевта, врача общей практики, врача-педиатра в выбранной медицинской организации ____ в год

- А. 4 Раза
- Б. 2 Раза
- В. 1 Раз
- Г. 3 Раза

В соответствии с международной классификацией лимфомы ходжкина ann-arbor ii стадия характеризуется

- А. Поражением одной лимфатической зоны или локализованным поражением одного экстралимфатического органа или ткани
- Б. Диссеминированным поражением одного или нескольких экстралимфатических органов, с или без поражения лимфатических узлов
- В. Поражением лимфатических узлов по обе стороны диафрагмы
- Г. Поражением двух или более лимфатических областей по одну сторону диафрагмы

Препаратом, применяемым при изолированной химиоперфузии лёгких, является

- А. Мелфалан
- Б. Ритуксимаб
- В. Доксорубицин
- Г. Винкристин

При наличии малигнизированного полипа желудка без инвазии в подслизистый слой наиболее оптимальным методом лечения является

- А. Эндоскопическая подслизистая полипэктомия
- Б. Экономная резекция желудка
- В. Клиновидная резекция желудка
- Г. Субтотальная резекция желудка

2 категория

[Вернуться в начало](#)

При центральном или периферическом плоскоклеточном раке легкого ШБ стадии заболевания применяются все перечисленные методы, кроме

- А. самостоятельного хирургического
- Б. комбинированного (операция + лучевая терапия)
- В. лучевого
- Г. химиотерапии
- Д. химиолучевого

Показанием для определения 1 группы инвалидности является:

- А. наличие онкологического заболевания
- Б. нарушение функций организма, при котором больной нуждается в длительной постоянной посторонней помощи
- В. значительно выраженные функциональные изменения, не вызывающие необходимости в постоянном постороннем уходе или надзоре
- Г. снижение трудоспособности вследствие нарушений функций организма, обусловленное анатомическими дефектами, приведшими к потере профессии или снижению квалификации
- Д. снижение трудоспособности вследствие нарушений функций организма, обусловленное хроническими заболеваниями

Адекватным вариантом лечения при микроинвазивном раке шейки матки является

- А. ампутация шейки матки
- Б. расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников
- В. комбинированное лечение (операция + лучевая терапия)
- Г. сочетанная лучевая терапия
- Д. внутриматочная гамма-терапия

В положении лежа узловое образование молочной железы исчезает при симптоме

- А. «площадки»
- Б. Кенига
- В. Пайра
- Г. Прибрама
- Д. умбиликации

Наиболее частой локализацией рака слизистой полости рта является

- А. слизистая щеки
- Б. слизистая альвеолярного отростка челюсти
- В. дно полости рта
- Г. язык

Наиболее часто встречаемая локализация базальноклеточного рака кожи?

- А. кожа лица
- Б. кожа туловища
- В. кожа верхних и нижних конечностей
- Г. кожа волосистой части головы

Современная международная классификация рака желудка учитывает

- А. размер опухоли по длиннику
- Б. расстояние от опухоли до метастатических лимфоузлов
- В. количество метастатически измененных лимфоузлов
- Г. глубина опухолевой инвазии
- Д. наличие отдаленных метастазов

Основным звеном онкологической службы в субъектах РФ является:

- А. смотровой кабинет поликлиники
- Б. онкологический кабинет стационара
- В. онкологическое отделение районной больницы
- Г. онкологический диспансер
- Д. онкологический институт

Какая морфологическая форма рака гортани встречается наиболее часто:

- А. плоскоклеточный рак
- Б. аденокарцинома
- В. аденокистозный рак
- Г. мукоэпидермоидный рак

Какой метод является наиболее результативным при необходимости подтверждения рака щитовидной железы?

- А. сцинтиграфия
- Б. Исследование гормонов щитовидной железы
- В. Прицельная пункционная биопсия под контролем УЗИ
- Г. Исследование кровотока при цветном картировании на УЗИ

Наиболее специфичным клиническим признаком рака пищевода является

- А. повышенное слюноотделение
- Б. тошнота
- В. дисфагия
- Г. рвота
- Д. кашель

При раке поджелудочной железы наиболее информативным лабораторным тестом является

- А. нейронспецифическая енолаза
- Б. раково-эмбриональный антиген
- В. биохимические показатели (АЛТ, АСТ, амилаза, билирубин)
- Г. онкомаркер СА 19-9
- Д. альфа-фетопротеин

Нарушение функции почек в процессе химиотерапии наиболее выражены при использовании

- А. Митомицина С
- Б. Ифосфамида
- В. Нитрозометилмочевины
- Г. Производных платины
- Д. Антрациклинов

Оптимальным объёмом хирургического лечения при немелкоклеточном раке легкого стадии II-IIIА является:

- А. Сублобарная прецизионная резекция
- Б. Сегментэктомия
- В. Лобэктомия
- Г. Пневмонэктомия

Для диагностики хориокарциномы матки целесообразно определять -

- А. АФП, РЭА (α-фетопротеин, раково-эмбриональный антиген)
- Б. СА 125, ингибин
- В. ХГ, ТбГ (хронический гонадотропин, трофобластический b-глобулин)
- Г. Виментин, белок S-100
- Д. СА 125, трофобластический b-глобулин

При рецидивах гастроинтестинальных стромальных опухолей чаще применяют

- А. Хирургическое лечение
- Б. Лучевую терапию
- В. Химиотерапию
- Г. Таргетную терапию
- Д. Химиолучевую терапию

Наиболее злокачественный вариант опухоли мягких тканей

- А. десмоидная опухоль
- Б. Липосаркома
- В. межмышечная фиброма
- Г. дифференцированная фибросаркома
- Д. Синовиальная саркома

Неврогенные опухоли в абсолютном большинстве наблюдений локализуются в:

- А. среднем нижнем средостении
- Б. верхних отделах переднего средостения
- В. переднем средостении на уровне основания сердца
- Г. реберно-позвоночном углу
- Д. верхней апертуры

Противоопухолевая лекарственная терапия включает

- А. химиотерапию.
- Б. гормонотерапию
- В. иммунотерапию
- Г. все вышеперечисленное

Маммография – это:

- А. рентгенография молочных желез
- Б. ультразвуковое исследование молочных желез
- В. контрастное исследование протоков молочной железы
- Г. комплекс мер, направленных на профилактику рака молочной железы

Для исключения функции яичников применяется:

- А. овариоэктомия
- Б. лучевая терапия
- В. золадекс
- Г. агонист гонадотропин-рилизинг-гормона
- Д. тамоксифен

Для токсико-анемической формы рака толстой кишки характерна локализации опухоли в

- А. Слепой и восходящей кишке
- Б. Поперечно-ободочной кишке
- В. Нисходящей кишке
- Г. Сигмовидной кишке
- Д. Ректосигмоидном отделе

Наиболее адекватная мера профилактики стоматита у онкологических больных, получающих химиотерапию

- А. прием противовирусных препаратов
- Б. прием антибиотиков широкого спектра действия
- В. местное применение противогрибковых препаратов
- Г. системная противогрибковая терапия
- Д. санация кариозных зубов, хорошая гигиена полости рта

К низкому уровню прогрессии рака предстательной железы относится все, кроме

- А. исходный уровень ПСА до биопсии от 10 до 20 нг/мл
- Б. уровень баллов по шкале глисон 6
- В. стадия первичного опухолевого очага Т 1
- Г. исходный уровень пса до биопсии ниже 10 нг/мл

Клинические проявления забрюшинных опухолей в первую очередь обусловлены

- А. гистологической структурой опухоли
- Б. размерами опухоли
- В. локализацией опухоли
- Г. размерами и локализацией опухоли
- Д. гистологической структурой и размерами опухоли

Точный диагноз рака молочной железы устанавливают на основании:

- А. маммографии
- Б. ультразвукового исследования
- В. морфологического исследования
- Г. термографии
- Д. клинического исследования (осмотр, пальпация)

Лекарственная терапия может считаться самостоятельным высокоэффективным методом при лечении

- А. Мелкоклеточного рака легкого
- Б. Рака желудка
- В. Рака почки
- Г. Рака мочевого пузыря
- Д. Рака яичников

Радиоактивный йод применяют с целью диагностики опухолей -

- А. Поджелудочной железы
- Б. Щитовидной железы
- В. Желудка
- Г. Надпочечников
- Д. Опухолей нейроэндокринной системы

Костные саркомы чаще возникают в

- А. Мелких костях
- Б. Суставах
- В. Плоских костях
- Г. Длинных трубчатых костях
- Д. Губчатых костях

Многообразие гистогенеза и морфологических форм отличает злокачественные опухоли

- А. тела матки
- Б. шейки матки
- В. яичников
- Г. влагалища
- Д. вульвы

Лекарственное средство это

А. вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий

Б. вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения и предотвращения беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов и методами синтеза

В. вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий

Г. вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения и предотвращения беременности и полученные из крови и методами синтеза

Для оценки распространенности рака желудка на пищевод наибольшую ценность имеет

- А. эзофагогастроскопия
- Б. трансабдоминальное УЗИ
- В. рентгенография грудной клетки
- Г. рентгенография пищевода и желудка с контрастированием
- Д. ПЭТ – сканирование

При каких клинических ситуациях необходимо дополнительное специальное лечение после операции по поводу рака тела матки:

- А. опухолевые эмболы в кровеносных сосудах
- Б. распространение опухоли на внутренний зев
- В. низкая степень дифференцировки
- Г. локализация в области дна матки

При лечении хронического болевого синдрома у онкологических больных следует

- А. по возможности использовать плацебо
- Б. давать анальгетики только по требованию
- В. назначать анальгетические препараты регулярно для предотвращения боли
- Г. вводить анальгетики внутримышечно
- Д. начинать лечение с максимально переносимой дозы наркотических анальгетиков

Наиболее часто в пищеводе встречаются следующие формы рака

- А. плоскоклеточный
- Б. железистый
- В. мелкоклеточный
- Г. переходноклеточный
- Д. крупноклеточный

Вторичная профилактика рака, это:

- А. Отказ от курения
- Б. Скрининговая маммография
- В. Предупреждение избыточной инсоляции
- Г. Вакцинация от гепатита в
- Д. Соблюдение техники безопасности при работе с радиоактивными веществами

Лекарственную противоопухолевую терапию применяют в качестве:

- А. самостоятельного метода лечения
- Б. компонента комплексного лечения
- В. радиомодификатора
- Г. профилактики послеоперационных осложнений
- Д. верно все вышеперечисленное

Наиболее часто гематогенные метастазы мелкоклеточного рака легкого локализуются в

- А. Костях
- Б. Печени
- В. Надпочечниках
- Г. Головном мозге
- Д. Мягких тканях

Медуллярный рак щитовидной железы развивается из:

- А. А-клеток
- Б. В-клеток
- В. С-клеток
- Г. клеток Гюртле
- Д. мезенхимальной ткани

Рак предстательной железы преимущественно развивается

- А. в переходной зоне
- Б. в периферической зоне
- В. в центральной зоне
- Г. в передней фиброзно-мышечной области
- Д. независимо от анатомической локализации

У больной 20 лет в верхне-наружном квадранте молочной железы пальпируется опухоль размером 2×3 см, подвижная, плотная, с четкими контурами. Кожные симптомы отрицательные. Подмышечные лимфоузлы не увеличены. Наиболее вероятный диагноз

- А. диффузная мастопатия
- Б. рак молочной железы
- В. болезнь Минца
- Г. фиброаденома
- Д. узловая мастопатия

Назовите наиболее часто встречающийся морфологический вариант рака пищевода

- А. Аденокарцинома
- Б. Плоскоклеточный рак
- В. Мелкоклеточный рак
- Г. Аденоплоскоклеточный

Хемодектома блуждающего нерва клинически локализуется в заднечелюстной ямке. Она расположена в

- А. Переднебоковом фарингеальном пространстве
- Б. Заднебоковом фарингеальном пространстве
- В. Ретрофарингеальном пространстве
- Г. Сонном треугольнике
- Д. Подчелюстном треугольнике

Наиболее частой опухолью средостения мезенхимального происхождения является

- А. Фиброма
- Б. Липома
- В. Гемангиома
- Г. Лимфангиома
- Д. Рабдомиома

ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛИМФЕДЕМЫ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ СЧИТАЮТСЯ

- А. Аэробная и силовая физическая нагрузка
- Б. Хирургическое удаление лимфоузлов и лучевая терапия
- В. Избыточное употребление жидкости и белка
- Г. Артериальная гипертензия и сахарный диабет

Основная методика рентгенологического исследования ободочной кишки

- А. пероральное заполнение
- Б. ирригоскопия
- В. водная клизма и супервольтная рентгенография
- Г. воздушное контрастирование

Для лечения выраженной дисплазии влагалищной порции шейки матки (CIN-3) у женщины 30 лет целесообразно использовать

- А. электрокоагуляцию
- Б. экстирпацию матки без придатков
- В. конизацию шейки матки
- Г. экстирпацию матки с придатками
- Д. расширенную экстирпацию матки без придатков

Обследование больного с жалобами на нарушение функций кишечника следует начинать с

- А. Рентгенологического исследования толстого кишечника (ирригоскопии)
- Б. Колонофиброскопии
- В. Ректороманоскопии
- Г. Ректального пальцевого исследования
- Д. Ультразвукового исследования брюшной полости

Чаще всего метастазы гастроинтестинальных стромальных опухолей развиваются в

- А. Регионарных лимфоузлах
- Б. Печени
- В. Легких
- Г. Яичниках
- Д. Коже

К регионарным лимфатическим узлам при раке полового члена относят

- А. поверхностные паховые
- Б. глубокие паховые
- В. тазовые
- Г. паракавалыные

В качестве адъювантной терапии пациентам с локализованной формой меланомы кожи высокого риска прогрессирования IIB-IIС стадии могут быть рекомендованы следующие препараты:

- А. Пембролизумаб
- Б. Пролголимаб
- В. Дабрафениб
- Г. Дакарбазин

Наиболее частыми клиническими проявлениями опухолей органов билиопанкреатодуоденальной зоны являются:

- А. анемия
- Б. желтуха
- В. нарушение кишечной проходимости
- Г. боль
- Д. одышка

Наиболее частое направление лимфогенного метастазирования при раке молочной железы к

- А. подмышечным лимфатическим узлам
- Б. подключичным лимфатическим узлам
- В. парастернальным лимфатическим узлам
- Г. подключичным лимфатическим узлам
- Д. медиастинальным лимфатическим узлам

Изолированное метастатическое поражение плевры у женщин наиболее часто отмечается при

- А. раке желудка
- Б. раке толстой кишки
- В. хорионэпителиоме матки
- Г. раке щитовидной железы
- Д. раке яичников

При распространенном раке предстательной железы максимальную андрогенную блокаду вызывают

- А. Эстрогены
- Б. Ингибиторы ароматазы+антиандрогены
- В. Агонисты LHRG + антиандрогены;
- Г. Прогестины+дексаметазон
- Д. Гормоноцитостатики

Опухоль кожи с медленным ростом и редким метастазированием

- А. базальноклеточный рак
- Б. плоскоклеточный рак
- В. карцинома Меркеля
- Г. аденокарцинома
- Д. узловая меланома

У больного 60 лет плоскоклеточный неороговевающий рак гортани IIIA стадии, инфильтративная форма с явлениями перихондрита. Ему необходимо провести

- А. Ларингэктомию
- Б. Комбинированное лечение с предоперационной лучевой терапией
- В. Комбинированное лечение с послеоперационной лучевой терапией
- Г. Самостоятельный полный курс лучевой терапии по радикальной программе
- Д. Химиотерапию

Наиболее чувствительным опухолевым маркером мелкоклеточного рака легкого является

- А. раково-эмбриональный антиген
- Б. нейроспецифическая енолаза
- В. хорионический гонадотропин, трофобластический b-глобулин
- Г. лактатдегидрогеназа
- Д. щелочная фосфатаза

Углубленное обследование больных Ia клинической группы должно быть закончено не позднее (с момента взятия на диспансерный учет):

- А. 7 дней
- Б. 10 дней
- В. 13 дней
- Г. 16 дней
- Д. 18 дней

Метастатическое поражение легких, диагностируемое до выявления первичной опухоли или синхронно, наиболее часто имеет место при раке

- А. Молочной железы
- Б. Желудка
- В. Почки
- Г. Легкого
- Д. Предстательной железы

По мере роста опухоли скорость нарастания степени нарушения бронхиальной проходимости наиболее выражена при

- А. Эндобронхиальном экзофитном раке
- Б. Перибронхиальном узловатом раке
- В. Разветвленном раке
- Г. Пневмониеподобном раке
- Д. Раке верхушки легкого (Панкоста)

Ведущим методом диагностики меланомы кожи является

- А. магнитно-резонансная томография
- Б. позитронно-эмиссионная томография
- В. термография
- Г. морфологический метод
- Д. дерматоскопия

Среди злокачественных опухолей слюнных желез чаще встречается

- А. Аденокарцинома
- Б. Плоскоклеточный рак
- В. Аденокистозный рак
- Г. Мукоэпидермоидный рак
- Д. Ацинозноклеточный рак

К инвазивным методам рентгенологического исследования относится -

- А. Компьютерная томография
- Б. Ирригоскопия
- В. Флюорография
- Г. Ангиография
- Д. Маммография

Выберите наиболее целесообразный метод лечения рака носоглотки:

- А. хирургический
- Б. лучевой
- В. химиотерапевтический
- Г. химио-лучевой
- Д. комбинированный (хирургический + лучевая терапия)

Химио-лучевая терапия при комбинированном лечении рака пищевода может применяться:

- А. В предоперационном периоде
- Б. Интраоперационно
- В. В раннем послеоперационном периоде
- Г. В послеоперационном периоде в интервале до 2 месяцев
- Д. Через 2 месяца после операции

Какие ранние симптомы при поражений опухолью вестибулярного отдела гортани

- А. осиплость голоса
- Б. боли в горле
- В. дискомфорт и ощущение инородного тела в горле
- Г. увеличенные лимфоузлы шеи

Определение рецепторов стероидных гормонов при раке молочной железы необходимо для проведения

- А. лучевой терапии
- Б. химиотерапии
- В. радикальной мастэктомии
- Г. гормонотерапии
- Д. таргетной терапии

Анализ на РСА3 определяется:

- А. В сыворотке крови
- Б. В моче
- В. В сыворотке крови после массажа простаты
- Г. При иммуногистохимическом исследовании ткани, взятой при биопсии

Методами лечения рака мочевого пузыря являются

- А. хирургический
- Б. комбинированный
- В. лучевой
- Г. гормонотерапия
- Д. химиотерапия

Стандарт комбинированного лечения остеосаркомы G3

- А. Неоадъювантная ПХТ + операция
- Б. Операция + адъювантная ПХТ
- В. Неоадъювантная ПХТ + операция + адъювантная ПХТ
- Г. Полихимиотерапия + лучевая терапия

Для скрининга рака молочной железы у женщин в менопаузе наиболее эффективно применение

- А. маммографии
- Б. ультразвуковой томографии
- В. самообследования молочных желез
- Г. осмотра и пальпации
- Д. магнитно-резонансной томографии

Наиболее частой локализацией рака полости рта является

- А. дно полости рта
- Б. мягкое небо
- В. язык
- Г. слизистая щеки

Рабдомиосаркома – это...

- А. злокачественная опухоль из жировой ткани
- Б. доброкачественная опухоль из скелетных мышц
- В. злокачественная опухоль из гладких мышц
- Г. злокачественная опухоль из кардиомиоцитов
- Д. злокачественная опухоль из скелетных мышц

В средостении НЕТ следующего отдела:

- А. переднее
- Б. среднее
- В. заднее
- Г. левое

Больная 65 лет, около 20 лет страдает хроническим гастритом. При рентгенографии желудка – подозрение на инфильтративный рак. При ЭГДС картина диффузного гастрита, по данным гастробиопсии - признаки хронического воспаления. Больной следует

- А. Выполнить гастрэктомию
- Б. Назначить лечение гастрита с контрольной явкой больной через 6 месяцев
- В. Выполнить лапаротомию, гастротомию с биопсией подозрительных участков слизистой
- Г. Выполнить лапароскопию
- Д. Назначить повторную гастроскопию с множественной биопсией слизистой

С какого возраста рекомендуется выполнять ПСА-тестирование в рамках диспансеризации взрослого населения в РФ

- А. 35 лет
- Б. 40 лет
- В. 45 лет
- Г. 50 лет

Единица поглощенной дозы облучения, это:

- А. Грей
- Б. Зиверт
- В. Рентген
- Г. Кюри
- Д. Бэр

Основные симптомы при опухолевом поражении складчатого отдела гортани

- А. охриплость
- Б. боль при глотании
- В. чувство дискомфорта при глотании
- Г. затрудненный вдох
- Д. поперхивание

Лекарственный препарат это

- А. лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболевания
- Б. Фармакологически активная субстанция в прототипе лекарственной формы, применяемая для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности
- В. лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности
- Г. лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности

Супрастенотическое расширение пищевода при раке отмечается, как правило, при

- А. Полиповидной форме роста
- Б. Язвенно-инфильтративной форме роста
- В. Раке в дивертикуле пищевода
- Г. Экзофитном типе роста
- Д. Смешанном типе роста

Недифференцированные опухоли в классификации TNM обозначаются символом:

- А. G 0
- Б. G 1
- В. G 2
- Г. G 3
- Д. G 4

Какие виды диагностики возможны при проведении фотодинамической терапии (ФДТ)?

- А. компьютерная томография
- Б. флуоресцентная спектроскопия
- В. магнитно-резонансная томография
- Г. динамическая сцинтиграфия

К фоновым воспалительным процессам шейки матки относится

- А. дисплазия
- Б. истинная эрозия
- В. эктопия
- Г. лейкоплакия
- Д. эндометриоз

Биологическое свойство злокачественной опухоли -

- А. Неконтролируемый рост
- Б. Топоингибция
- В. Субстратная зависимость размножения
- Г. Зависимость размножения от факторов роста
- Д. Повышенная чувствительность к ингибирующим сигналам

Из перечисленных симптомов при первичном раке печени наиболее часто встречается

- А. Бледность кожных покровов
- Б. Желтушность кожных покровов
- В. Симптомы портальной гипертензии
- Г. Гепатомегалия
- Д. Симптом Курвуазье

Наиболее частая локализация зернисто-клеточной опухоли (опухоли Абрикосова)

- А. Язык
- Б. Кожа
- В. Гортань
- Г. Твердое небо
- Д. Гипофиз

При локализации опухоли в передне-боковом парафарингеальном пространстве в первую очередь следует исключить новообразования:

- А. эпителиальной природы
- Б. нейрогенной природы
- В. метастатического характера
- Г. сосудистого происхождения
- Д. мезенхимальной природы

Объем хирургического вмешательства при раке селезеночного угла ободочной кишки.

- А. правосторонняя гемиколэктомия.
- Б. резекция поперечной ободочной кишки
- В. брюшно-анальная резекция.
- Г. левосторонняя гемиколэктомия.

К опухолям яичников эпителиальной природы относят

- А. андробластому
- Б. текому
- В. тератобластому
- Г. дисгерминому
- Д. серозный рак

Гемангиоэндотелиома – это опухоль

- А. клеток APUD-системы
- Б. соединительной ткани
- В. нервных ганглиев
- Г. сосудов

Центральным раком легкого называют опухоли возникающие из:

- А. главных, долевого, сегментарных бронхов
- Б. главных, долевого, сегментарных и субсегментарных бронхов
- В. любых бронхов, расположенных в центре легкого
- Г. любых бронхов, расположенных вблизи корня легкого

Соблюдение принципов анатомической зональности и футлярности лежит в основе:

- А. понятия «антибластики» при операциях по поводу злокачественных опухолей
- Б. понятия «абластики» при операциях по поводу злокачественных опухолей
- В. мер профилактики ортоградного лимфогенного метастазирования
- Г. мер профилактики гематогенного метастазирования
- Д. мер профилактики лимфогематогенного метастазирования

Доброкачественная форма опухоли -

- А. лентиго-меланома
- Б. узловатая меланома
- В. поверхностно-распространяющаяся меланома
- Г. акрально-лентигозная меланома
- Д. ювенильная меланома

Прогрессирование после удаления забрюшинных опухолей чаще всего проявляется в виде

- А. метастазов в печень
- Б. метастазов в легкие
- В. метастазов в лимфоузлы
- Г. локальных рецидивов
- Д. метастазов в кости скелета

К высокому уровню риска прогрессии рака предстательной железы относится все, кроме

- А. Исходный уровень пса до биопсии 20 нг/мл
- Б. Уровень баллов по шкале глисон 10
- В. Стадия первичного опухолевого очага Т 1
- Г. исходный уровень пса до биопсии ниже 10 нг/мл

Наиболее часто рак слизистой оболочки полости рта метастазирует в регионарные лимфатические узлы при локализации:

- А. в корне языка
- Б. в подвижной части языка
- В. в мягком и твердом небе
- Г. на слизистой щеки
- Д. на слизистой альвеолярного отростка челюстей

Первичная профилактика рака, это:

- А. Скрининговая маммография
- Б. Исследование мазков по Папаниколау
- В. ПСА-скрининг
- Г. Отказ от курения
- Д. Гемоккульт тест

Больная 40 лет предъявляет жалобы на слабость, потерю веса, снижение аппетита. При рентгеноскопии и ЭГДС выявлен рак желудка с поражением всех отделов. При лапароскопии обнаружен метастаз в левый яичник размерами около 2,0 см. Других проявлений болезни не выявлено. В данной ситуации показано

- А. Выполнить гастрэктомию с последующей внутриполостной химиотерапией
- Б. Выполнить гастрэктомию, экстирпацию матки с придатками с последующим наблюдением больной
- В. Назначить лучевую терапию
- Г. Билатеральная овариоэктомия с последующей системной химиотерапией
- Д. Выполнить гастрэктомию, удаление пораженного яичника с последующей системной химиотерапией

Большинство периферических доброкачественных опухолей легких составляют

- А. Фибромы
- Б. Тератомы
- В. Гамартомы
- Г. Аденомы
- Д. Лейомиомы

Определяющая роль в увеличении заболеваемости населения раком легких принадлежит

- А. генетическому фактору
- Б. профессиональным вредностям
- В. курению
- Г. загрязнению атмосферы
- Д. ионизирующему излучению

Основным первичным учетным документом онкологического диспансера является:

- А. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака
- Б. протокол запущенности
- В. выписка из медицинской карты
- Г. контрольная карта диспансерного наблюдения
- Д. медицинская карта стационарного больного

Каким клиническим симптомом чаще всего проявляется нейтропения?

- А. лимфаденопатией
- Б. спленомегалией
- В. лихорадкой
- Г. кровотечением

Показанием для назначения гормонотерапии в послеоперационном периоде больным раком эндометрия является

- А. возраст больных
- Б. глубина инвазии
- В. наличие рецепторов эстрогенов и прогестерона в опухоли
- Г. сопутствующие заболевания
- Д. величина матки

В каких ситуациях, показано выполнение молекулярно-генетического исследования меланомы на наличие BRAF-мутации:

- А. исследование показано всем больным меланомой кожи независимо от стадии
- Б. только больным с IV стадией
- В. начиная со II стадии
- Г. начиная с III стадии
- Д. только при установленном первичном очаге

Показанием для назначения адъювантной химиотерапии при раке молочной железы является

- А. наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах
- Б. наличие отдаленных метастазов
- В. высокий уровень рецепторов эстрогенов

К доброкачественным опухолям молочной железы относится

- А. фиброзно-кистозная мастопатия
- Б. фиброаденома молочной железы
- В. внутрипротоковая папиллома
- Г. болезнь Педжета
- Д. мастит

Назовите медицинские препараты, применяемые в консервативном лечении атипической гиперплазии эндометрия

- А. прогестерон (дюфастон и т.д.)
- Б. депо-провера
- В. золадекс
- Г. все вышеперечисленные

При распространенных формах рака мочевого пузыря наибольшей эффективностью обладает схемы лечения

- А. Гемцитабин+цисплатин
- Б. Циклофосфан+доксорубицин+цисплатин
- В. Паклитаксел+цисплатин
- Г. Карбоплатин+метотрексат+винбластин
- Д. Метотрексат+доксорубицин+винбластин+цисплатин

Показаниями для многоточковой биопсии предстательной железы являются:

- А. повышение уровня PSA > 2,5 нг/мл
- Б. данные трансректального УЗИ
- В. данные пальцевого ректального исследования
- Г. жалобы больного на дизурические явления

Наиболее оптимальным оперативным доступом при раке почки является

- А. чрезбрюшинный доступ
- Б. доступ по Федорову
- В. Доступ по Bergmann
- Г. Доступ по Nagamatsu
- Д. Доступ по Пирогову

Большинство доброкачественных центральных опухолей легких составляют

- А. Аденомы бронха
- Б. Папилломы бронха
- В. Сосудистые опухоли
- Г. Тератомы
- Д. Гладкомышечные опухоли

При реакции Абелева – Татарина выявляется:

- А. альфафетопротеин
- Б. хорионический гонадотропин
- В. ферритин
- Г. ингибин-В
- Д. кальцитонин

Химиотерапия эпителиальных опухолей головы и шеи наиболее эффективна при

- А. Высокодифференцированном плоскоклеточном раке
- Б. Низкодифференцированном плоскоклеточном раке
- В. Аденокарциноме
- Г. Аденокистозном раке
- Д. Мукоэпидермальном раке

Самой редкой злокачественной опухолью органов билиопанкреатодуоденальной зоны является рак

- А. дистального отдела холедоха
- Б. головки поджелудочной железы
- В. внепеченочных желчных протоков
- Г. 12-перстной кишки
- Д. большого дуоденального сосочка

К промежуточному уровню риска прогрессии рака предстательной железы относится все, кроме

- А. уровень баллов по шкале глисон 6
- Б. исходный уровень пса до биопсии 15 нг/мл
- В. стадия первичного опухолевого очага Т 2
- Г. исходный уровень пса до биопсии от 10 до 20 нг/мл

Наиболее эффективной схемой первой линии химиотерапии распространенного рака яичников является

- А. Цисплатин+циклофосфан
- Б. Цисплатин+адриамицин+циклофосфан
- В. Циклофосфан+карбоплатин
- Г. Паклитаксел + карбоплатин
- Д. Этопозид+ифосфамид

Что является скрининговым тестом при патологии эндометрия?

- А. Пайпель-биопсия эндометрия
- Б. раздельное диагностическое выскабливание матки
- В. УЗИ органов малого таза
- Г. УЗИ органов малого таза с цветным доплеровским картированием

У мужчин, больных центральным раком легкого, преобладает

- А. Плоскоклеточный рак
- Б. Железистый рак
- В. Мелкоклеточный рак
- Г. Крупноклеточный рак
- Д. Светлоклеточный рак

Рак пищевода с инфильтрацией слизисто-подслизистого слоя и отсутствием регионарных метастазов относится к

- А. I стадии
- Б. IIa стадии
- В. IIб стадии
- Г. IIIa стадии
- Д. IIIб стадии

Какой из перечисленных признаков наиболее характерен для периферического рака легкого

- А. затемнение треугольной формы в прикорневой зоне на рентгенограммах
- Б. кровохарканье
- В. кашель с гнойной мокротой и примесью крови
- Г. округлая тень с неровными контурами на рентгенограммах

Под термином «метастаз Крукенберга» подразумевается метастаз в:

- А. забрюшинные лимфоузлы
- Б. яичники
- В. пупок
- Г. надключичный лимфоузел
- Д. средостение

Периферический рак у женщин чаще бывает

- А. Плоскоклеточным
- Б. Железистым
- В. Мелкоклеточным
- Г. Крупноклеточным
- Д. Светлоклеточным

При подозрении на злокачественную опухоль органов билиопанкреатодуоденальной зоны, с целью диагностики, обязательным является выполнение:

- А. колоноскопии
- Б. обзорной рентгенографии органов брюшной полости
- В. рентгенологического исследования желудка и 12-и перстной кишки
- Г. УЗИ печени, поджелудочной железы и внепеченочных желчных путей
- Д. гастродуоденоскопии

Ведущий метод лечения внеорганных опухолей шеи

- А. хирургический
- Б. лучевой
- В. химиотерапевтический
- Г. комбинированный
- Д. комплексный

Наиболее часто колоректальный рак метастазирует в:

- А. Головной мозг
- Б. Печень
- В. Надпочечники
- Г. Легкие
- Д. Селезенку

Центральные доброкачественные опухоли легких чаще всего развиваются в

- А. Главных и долеых бронхах
- Б. Сегментарных бронхах
- В. Бронхах V-VI порядка
- Г. Бронхиолах
- Д. Альвеолах

Helicobacter Pylori участвует в развитии:

- А. рака двенадцатиперстной кишки
- Б. рака печени
- В. опухоли Клацкина
- Г. гастроинтестинальной стромальной опухоли
- Д. рака желудка

Типичной операцией при высокодифференцированном раке щитовидной железы T1-2 является

- А. Энуклеация узла
- Б. Резекция доли
- В. Гемитиреоидэктомия
- Г. Гемитиреоидэктомия с перешейком
- Д. Субтотальная резекция железы

Какой из вариантов лейкозов проявляется увеличением в периферической крови морфологически зрелых лимфоцитов*

- А. острый лимфобластный лейкоз
- Б. острый промиелоцитарный лейкоз
- В. хронический миелолейкоз
- Г. хронический лимфолейкоз

Целью паллиативной помощи онкологическим больным является

- А. продление жизни
- Б. проведение эвтаназии,
- В. создание иллюзии лечения,
- Г. улучшение качества жизни

Катетеризационный и пункционный методы биопсии целесообразны, когда дифференциальный диагноз проводится между периферической доброкачественной опухолью легких и

- А. Бронхогенной кистой
- Б. Энтерогенной кистой
- В. Паразитарной кистой
- Г. Периферическим раком легких
- Д. Туберкулезом

Основной фактор, повышающий риск возникновения рака ободочной кишки -

- А. Ионизирующее излучение
- Б. Курение
- В. Недостаточное употребление грубой клетчатки
- Г. Прием салицилатов
- Д. Употребление алкоголя

Наиболее частое летальное осложнение при одномоментных операциях по поводу рака пищевода

- А. Послеоперационная пневмония
- Б. Тромбоэмболия легочной артерии
- В. Несостоятельность анастомоза
- Г. Надпочечниковая недостаточность
- Д. Инфаркт миокарда

Аспирационный (пункционный) метод исследования наиболее информативен в цитологической диагностике -

- А. Эпителиальных опухолей
- Б. Мезенхимальных опухолей
- В. Нейрогенных опухолей
- Г. Дисэмбриональных опухолей
- Д. Меланоцитарных опухолей

Что считается истинным предраком шейки матки?

- А. легкая степень дисплазии плоского эпителия
- Б. средняя степень дисплазии плоского эпителия
- В. тяжелая степень дисплазии плоского эпителия
- Г. рак шейки матки in situ

Больному 45 лет по поводу плоскоклеточного рака гортани IIIA стадии с преимущественно экзофитной формой роста проведено предоперационное облучение в дозе 40 Гр. Через 2 недели отмечено клинически практически полное исчезновение опухоли. Ему следует

- А. выполнить резекцию гортани
- Б. выполнить ларингэктомию
- В. назначить химиотерапию
- Г. продолжить лучевую терапию по радикальной программе
- Д. прекратить лечение, наблюдать в динамике

Наиболее информативным методом диагностики внутрипротоковых папиллом молочной железы является -

- А. Стандартная маммография
- Б. Компьютерная томография
- В. Дуктография
- Г. Магнитно-резонансная томография
- Д. Ультразвуковая томография

Ранний рак мочевого пузыря чаще всего проявляется

- А. гематурией
- Б. дизурией
- В. болями в промежности
- Г. анемией
- Д. лихорадкой

При лучевой терапии рака яичников применяются

- А. дистанционная лучевая терапия
- Б. внутрибрюшное введение открытых источников
- В. внутритканевая лучевая терапия
- Г. флискофокусная лучевая терапия
- Д. аппликационная лучевая терапия

Наиболее частая гистологическая форма рака мочевого пузыря

- А. плоскоклеточный
- Б. переходноклеточный
- В. аденокарцинома
- Г. мелкоклеточный

Выявление костных включений в виде зубов или фаланг пальцев в опухоли средостения при рентгенологическом исследовании является патогномоничным симптомом для:

- А. тимомы
- Б. зрелой тератомы
- В. злокачественной лимфомы
- Г. энтерокистомы
- Д. бронхиальной кисты

При центральном мелкоклеточном раке легкого III стадии заболевания применяются все перечисленные методы, кроме

- А. хирургического
- Б. симптоматического
- В. лучевого
- Г. химиотерапевтического
- Д. химиолучевого

Наиболее чувствительными к химиопрепаратам являются метастазы меланомы, локализующиеся в

- А. коже и подкожной клетчатке
- Б. костях
- В. легких
- Г. печени
- Д. головном мозге

К облигатным предракам кожи относят

- А. себорейный кератоз
- Б. кератоакантому
- В. постлучевой дерматит
- Г. болезнь Боуэна
- Д. мышьяковистый дерматит

У больного 59 лет через год после нефрэктомии по поводу рака выявлен солитарный метастаз в верхней доле правого легкого. Ему следует

- А. выполнить резекцию легкого
- Б. провести крупнопольное облучение правого легкого
- В. провести локальную лучевую терапию на область метастаза
- Г. назначить химиотерапию
- Д. назначить иммунотерапию

Наиболее часто метастазами рака щитовидной железы поражаются лимфоузлы

- А. вдоль внутренней яремной вены
- Б. надключичные
- В. подключичные
- Г. паратрахеальные
- Д. за грудиной

При раке предстательной железы чаще всего отмечается метастатическое поражение

- А. ребер
- Б. костей черепа
- В. костей таза
- Г. шейного отдела позвоночника
- Д. грудины

По морфологическому строению преобладающей формой рака толстого кишечника является

- А. аденокарцинома различной степени зрелости и функциональной направленности
- Б. плоскоклеточный рак
- В. недифференцированный рак
- Г. диморфный (смешанный железистый и плоскоклеточный) рак
- Д. переходноклеточный рак

При стойкой нейропатической боли у онкологических больных показаны

- А. противосудорожные средства в сочетании с трициклическими антидепрессантами
- Б. лучевая терапия на область пораженного дерматома
- В. нестероидные противовоспалительные средства в максимальных дозировках
- Г. бисфосфонаты
- Д. бензодиазепины

Какой метод диагностики необходимо применить для выявления или исключения рака при узловом образовании в щитовидной железе

- А. пальпация
- Б. сканирование
- В. ультразвуковое исследование (УЗИ)
- Г. пункция и/или пункция под контролем УЗИ
- Д. срочное гистологическое исследование во время операции

Наиболее частая локализация костных сарком

- А. плечевая кость
- Б. большеберцовая кость
- В. позвонки
- Г. кости таза
- Д. бедренная кость

На высокую степень злокачественности мягкотканной саркомы указывает

- А. высокая дифференцировка клеток
- Б. высокая митотическая активность
- В. обилие стромы, малое количество опухолевых клеток
- Г. слабая васкуляризация
- Д. отсутствие некрозов

ЧРЕСКОЖНАЯ БИОПСИЯ ПОЧКИ ПОКАЗАНА

- А. Всем пациентам для определения дальнейшей тактики лечения
- Б. Перед хирургическим лечением, за исключением абляции
- В. При метастатическом процессе
- Г. Для верификации кист

При радикальной мастэктомии по Мадену удаляется

- А. молочная железа с подлежащей фасцией
- Б. молочная железа, большая и малая грудные мышцы и клетчатка с лимфоузлами подмышечной, подключичной и подлопаточной областей
- В. молочная железа, клетчатка с лимфоузлами подмышечной, подключичной и подлопаточной областей
- Г. молочная железа, малая грудная мышца и клетчатка с лимфоузлами подмышечной, подключичной и подлопаточной областей
- Д. молочная железа, большая грудная мышца и клетчатка с лимфоузлами подмышечной, подключичной, подлопаточной и парастернальной областей

Забрюшинное клетчаточное пространство расположено

- А. позади почечной и внутрибрюшной фасций
- Б. между предпочечной и внутрибрюшной фасцией
- В. позади ободочной и предпочечной фасций
- Г. позади ободочной и внутрибрюшной фасций
- Д. между ободочной и предпочечной фасциями

К доброкачественным опухолям легких НЕ относится:

- А. Светлоклеточная опухоль
- Б. гамартома
- В. Аденоплоскоклеточная карцинома
- Г. гемангиома

К предраку шейки матки относят

- А. эндоцервикоз
- Б. эндометриоз
- В. эктропион
- Г. дисплазию
- Д. карциному in situ

Пациент 62 лет. Жалобы на затрудненное прохождение пищи при глотании, потерю веса на 10 кг за последние 2 месяца. При ЭГДС и рентгеноскопии желудка определяется опухоль кардии с переходом на нижнегрудной отдел пищевода. Отдаленных метастазов не выявлено. Ваша тактика

- А. установить стент в пищевод и назначить лучевую терапию
- Б. выполнить чрезбрюшинную гастрэктомию
- В. выполнить проксимальную резекцию желудка с резекцией нижнегрудного отдела пищевода торакоабдоминальным доступом
- Г. выполнить проксимальную резекцию желудка с резекцией нижнегрудного отдела пищевода чрезбрюшинным доступом
- Д. выполнить гастрэктомию с резекцией нижнегрудного отдела пищевода торакоабдоминальным доступом и пластикой толстой кишкой

Наиболее распространенный гистологический вариант рака предстательной железы

- А. аденокарцинома
- Б. переходноклеточный рак
- В. плоскоклеточный рак
- Г. мелкоклеточный рак
- Д. светлоклеточный рак

Гормональная регуляция роста опухоли в организме чаще всего осуществляется:

- А. непосредственным воздействием на генетический аппарат
- Б. непосредственным воздействием на цитоплазму
- В. воздействием на гормональные рецепторы в клеточной мембране
- Г. непосредственным воздействием на онкобелки
- Д. непосредственным воздействием на транскрипционный фактор

Для лечения ранних форм рака шейки матки чаще используется

- А. хирургический метод
- Б. комбинированный метод с предоперационным облучением
- В. комбинированный метод с послеоперационным облучением
- Г. сочетанный лучевой метод
- Д. лекарственный метод

Миастения может иметь место у больных

- А. тимомой
- Б. фибромой средостения
- В. ганглионевромой средостения
- Г. феохромоцитомой средостения
- Д. внегонадной семиномой средостения

При генерализованном раке молочной железы у больных в менопаузе эндокринное лечение в I линии проводят

- А. андрогенами
- Б. кортикостероидами
- В. эстрогенами
- Г. аналогами ЛГРГ
- Д. антиэстрогенами

ПРИ ФЕБРИЛЬНОЙ НЕЙТРОПЕНИИ АНТИБИОТИКОМ ВЫБОРА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Цефепим 2 гр каждые 8 часов
- Б. Ципрофлоксацин 400 мг каждые 8 часов
- В. Ванкомицин 15 мг/кг каждые 12 часов
- Г. Амоксиклав 625 мг каждые 8 часов

При раке тела матки чаще встречается

- А. аденокарцинома
- Б. плоскоклеточный рак
- В. светлоклеточная рак
- Г. железисто-плоскоклеточный рак
- Д. недифференцированный рак

По гистологическому строению рак желудка чаще всего является:

- А. железистым
- Б. плоскоклеточным
- В. переходноклеточным
- Г. смешанным железисто-плоскоклеточным
- Д. мелкоклеточным

Наиболее часто неврологические осложнения возникают после операций по поводу

- А. тератом средостения
- Б. неврином средостения
- В. липом средостения
- Г. тимом
- Д. кист перикарда

Основной метод лечения локализованной меланомы кожи

- А. хирургический
- Б. лучевая терапия
- В. комбинированный
- Г. химиотерапия
- Д. иммунотерапия

У женщины 55 лет по поводу миомы матки произведена операция - экстирпация матки с придатками. При гистологическом исследовании в одном из узлов, расположенных в дне матки - выявлена лейомиосаркома. Ваша тактика

- А. наблюдение
- Б. лучевая терапия
- В. химиотерапия
- Г. повторная операция с выполнением лимфаденэктомии

Препараты для лечения слабой боли у онкологических больных

- А. наркотические анальгетики
- Б. нестероидные противовоспалительные средства
- В. слабые опиоиды
- Г. слабые опиоиды+ненаркотические анальгетики
- Д. слабые опиоиды+антидепрессанты

Превентивное фасциально-фуллярное иссечение клетчатки шеи оправдано при раке

- А. подвижной части языка Ia стадии
- Б. нижней губы I стадии
- В. корня языка IIa стадии
- Г. слизистой дна полости рта Ia стадии
- Д. слизистой щеки I стадии

Чувствительность опухоли к химиотерапии зависит от:

- А. наследственности
- Б. патологии печени
- В. возраста пациента
- Г. морфологической структуры опухоли
- Д. стадии опухолевого процесса

К кистам средостения НЕ относятся:

- А. Бронхогенные кисты
- Б. Энтерогенные кисты
- В. Перикардальные кисты
- Г. Киста Бейкера

Симптом Курвуазье проявляется при обтурации

- А. правого печеночного протока
- Б. левого печеночного протока
- В. общего печеночного протока
- Г. пузырного протока
- Д. общего желчного протока

Для скрининга рака толстой кишки применяется -

- А. Ректороманоскопия
- Б. Анализ кала на скрытую кровь
- В. Ирригоскопия
- Г. Определение раково-эмбрионального антигена
- Д. УЗИ органов брюшной полости

Назовите опухолевые маркеры, определяемые при новообразованиях яичников:

- А. СА-125
- Б. SCC
- В. В-хгч
- Г. ничего из перечисленного

Классическая триада симптомов при раке почки

- А. боль, гематурия, пальпируемая опухоль
- Б. боль, снижение массы тела, ускоренная СОЭ
- В. гематурия, боль, лихорадка
- Г. боль, пальпируемая опухоль, эритроцитоз
- Д. снижение массы тела, пальпируемая опухоль, варикоцеле

Наиболее распространенной гистологической формой рака мочевого пузыря является

- А. плоскоклеточный
- Б. переходноклеточный
- В. аденокарцинома
- Г. мелкоклеточный
- Д. недифференцированный

О дисплазии эпителиальной ткани судят на основании

- А. клинических признаков
- Б. данных рентгенологического исследования
- В. данных компьютерной томографии
- Г. морфологического исследования
- Д. ультразвукового исследования

Под термином «ранний рак желудка» подразумевается

- А. размер опухоли меньше 1 см
- Б. размер опухоли меньше 2 см
- В. опухоль, не прорастающая глубже субсерозного слоя
- Г. бессимптомная опухоль менее 3 см
- Д. опухоль, не прорастающая глубже подслизистого слоя

Основным методом лечения рака желудка I-II стадий является

- А. хирургический
- Б. лучевой
- В. химиотерапия
- Г. иммунотерапия
- Д. таргетная терапия

Хориокарцинома матки чаще встречается в:

- А. пубертатном периоде
- Б. репродуктивном возрасте
- В. пременопаузальном периоде
- Г. менопаузе
- Д. постменопаузе

Расчет дозы препарата по площади под фармакокинетической кривой необходим при применении

- А. Оксалиплатина
- Б. Цисплатина
- В. Циклоплатина
- Г. Адриамицина
- Д. Карбоплатина

Наиболее частая локализация рака слизистой полости рта:

- А. твердое небо
- Б. щека
- В. дно полости рта
- Г. язык
- Д. альвеолярный отросток верхней челюсти

Для злокачественной опухоли кости наиболее характерно

- А. боли, усиливающиеся при ходьбе
- Б. боли, усиливающиеся по ночам
- В. боли, усиливающиеся под влиянием физиотерапии
- Г. боли, усиливающиеся при иммобилизации

При недифференцированном раке носоглотки большую эффективность показывает:

- А. лучевая терапия
- Б. химиотерапия цисплатин+метотрексат+блеомицин
- В. химиотерапия адриамицин+циклофосфан+цисплатин+ винкристин+ преднизолон (АЦОП+цисплатин)
- Г. сочетание лучевой терапии с химиотерапией АЦОП+цисплатин
- Д. оперативное лечение

К доброкачественным мезенхимальным опухолям относят:

- А. Псевдосаркоматозный фасциит
- Б. Гигантоклеточную опухоль сухожильных влагалищ
- В. Ксантогранулему
- Г. Виллонодулярный теносиновит
- Д. Адамантинома

Первым этапом лечения всех больных герминогенными опухолями яичка является

- А. орхофуникулэктомия
- Б. забрюшинная лимфаденэктомия
- В. лучевая терапия
- Г. химиотерапия
- Д. гормонотерапия

Наиболее характерными жалобами больных раком билиопанкреатодуоденальной зоны в первом периоде болезни являются

- А. Боли в эпигастрии и спине, жажда, повышенный аппетит
- Б. Тошнота, рвота, появление желтухи
- В. Боли в эпигастрии и спине, потеря массы тела
- Г. Частая рвота, анорексия, поносы
- Д. «горячие приливы»

Больной 46 лет обратился к хирургу с жалобами на утолщение шеи. Из сопутствующих заболеваний - хронический алкоголизм с поражением печени. При осмотре и пальпации определяется подкожное мягкотканное образование, кольцевидно охватывающее шею.

Диагноз: болезнь

- А. Реклингхаузена
- Б. Гиппеля-Линдау
- В. Пейтца-Егерса
- Г. Горлин-Гольца
- Д. Маделунга

Самостоятельное хирургическое лечение показано при

- А. остеогенной саркоме
- Б. опухоли Юинга
- В. хондросаркоме
- Г. ретикулосаркоме
- Д. не показано при перечисленных опухолях

Истинным предраком эндометрия следует считать

- А. железистую гиперплазию
- Б. фиброзный полип
- В. железистый полип
- Г. аденомиоз
- Д. атипическую гиперплазию (аденоматоз)

Какое инструментальное исследование не входит в обязательный минимум при обследовании больного раком толстой кишки?

- А. рентгенография грудной клетки
- Б. эхокардиография.
- В. колоноскопия.
- Г. ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
- Д. ирригоскопия

СТАНДАРТОМ ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФЕДЕМЫ СЧИТАЕТСЯ

- А. Мануальный лимфодренаж
- Б. Перемежающаяся пневмокомпрессия в режиме «нарастающая волна»
- В. Комплексная противоотечная терапия
- Г. Аэробная и силовая тренировка в компрессионном трикотаже

Нарушения глотания вследствие поражения нервного аппарата глотки чаще развиваются при раке пищевода

- А. Шейного и верхнегрудного отделов
- Б. Среднегрудного отдела
- В. Нижнегрудного отдела
- Г. Абдоминального сегмента
- Д. С переходом на кардию

Паллиативная помощь должна осуществляться

- А. только медицинскими работниками,
- Б. только членами семьи и/или друзьями больного,
- В. только социальными работниками и священнослужителями,
- Г. всеми перечисленными группами.

Целью паллиативной медицинской помощи неизлечимым онкологическим больным является:

- А. улучшение качества жизни
- Б. продление жизни
- В. улучшение психологического статуса
- Г. лечение хронической боли
- Д. симптоматическое лечение

Остеогенная саркома чаще метастазирует в

- А. регионарные лимфоузлы
- Б. плоские кости
- В. легкие
- Г. кожу
- Д. мягкие ткани

Минимальным объемом хирургического вмешательства при раке щитовидной железы следует считать

- А. Резекцию доли
- Б. Гемитиреоидэктомию
- В. Гемитиреоидэктомию с резекцией перешейки
- Г. Субтотальную резекцию щитовидной железы
- Д. Тиреоидэктомию

Наиболее частой морфологической формой злокачественных опухолей слизистой полости рта является

- А. саркома
- Б. плоскоклеточный рак
- В. мукоэпидермоидная опухоль
- Г. недифференцированный рак

Внутриполостная лучевая терапия – это

- А. размещение источников излучения на поверхности опухоли
- Б. внедрение источников излучения в ткани
- В. внедрение источников излучения в полость опухоли при ее распаде
- Г. внедрение источников излучения в полостные органы
- Д. прием источников излучения пероральным путем

Ангиография является наиболее информативным методом в диагностике -

- А. Хемодектомы шеи
- Б. Метастазов в лимфоузлы шеи
- В. Рака слюнных желез
- Г. Рака носоглотки
- Д. Рака щитовидной железы

При развитии угнетения дыхания у онкологического больного, принимающего морфин, следует назначить

- А. налоксон
- Б. преднизолон
- В. атропин
- Г. сальбутамол
- Д. кислородную маску

В меланому, как правило, трансформируется

- А. папилломатозный невус
- Б. «монгольское» пятно
- В. невус Сеттона
- Г. меланоз Дюбрея
- Д. невус Беккера

Реакция на α -фетопротеин (Абелева – Татаринова) может быть положительной при

- А. Тимоме
- Б. Хемодектоне
- В. Зрелой тератоме
- Г. Незрелой тератоме (тератобластоме) с элементами эмбрионального рака
- Д. Сосудистых опухолях

Наиболее частым клиническим симптомом мелкоклеточного центрального рака легкого является

- А. Кашель
- Б. Одышка
- В. Повышение температуры тела
- Г. Осиплость голоса
- Д. Похудание

Наиболее частая локализация гематогенных метастазов сарком мягких тканей

- А. кости
- Б. печень
- В. лёгкие
- Г. головной мозг
- Д. почки

На первом этапе лечения диссеминированного рака предстательной железы следует проводить

- А. дистанционную лучевую терапию
- Б. химиотерапию
- В. иммунотерапию
- Г. введение системных радионуклидов
- Д. гормонотерапию

Основным методом лечения доброкачественных опухолей молочной железы является

- А. хирургический
- Б. лучевой
- В. гормональный
- Г. химиотерапевтический
- Д. комбинированный

Раннее выявление опухоли соответствует стадии:

- А. T1-2 N0M0
- Б. T1 N1M0
- В. T1 N1-2M0
- Г. T1 N2M0
- Д. T1 N1M1

Точкой приложения винбластина является фаза клеточного цикла

- А. G0
- Б. G1
- В. M
- Г. S
- Д. G2

Какая морфологическая форма злокачественной опухоли наиболее характерна для тела матки (чаще встречается)?

- А. плоскоклеточный рак
- Б. мелкоклеточный рак
- В. эндометриальная стромальная саркома
- Г. карциносаркома
- Д. аденокарцинома

Базальноклеточный рак наиболее часто локализуется на коже

- А. грудной клетки
- Б. лица
- В. верхних конечностей
- Г. нижних конечностей
- Д. спины

Опасность возникновения кардиотоксичности при лечении трастузумабом более вероятна в комбинации с

- А. Антрациклинами
- Б. Паклитакселом
- В. Винорельбином
- Г. Доцетакселом
- Д. 5-фторурацилом

Какое из ниже перечисленных заболеваний не является предраковым для толстой кишки

- А. диффузный семейный полипоз
- Б. хронический неспецифический язвенный колит.
- В. аппендицит.
- Г. болезнь Крона.
- Д. синдром Гарденера

Наиболее частая морфологическая форма злокачественных опухолей слизистой полости рта

- А. Плоскоклеточный рак
- Б. Саркома
- В. Мукоэпидермоидная опухоль
- Г. Цилиндрома
- Д. Недифференцированный рак

При операциях по поводу забрюшинных опухолей чаще всего используется

- А. срединная лапаротомия
- Б. внебрюшинный доступ
- В. тораколапаротомия
- Г. брюшно-промежностный доступ
- Д. поясничный доступ

«Золотым стандартом» для лечения сильной боли у онкологических больных является

- А. кодеин
- Б. фентанил
- В. морфин
- Г. метадон
- Д. оксикодон

К опухолям нейроэндокринного происхождения относится:

- А. рак слюнных желез
- Б. рак почки
- В. менингиома
- Г. хордома
- Д. медуллярный рак щитовидной железы

форма рака лёгкого, при которой наблюдается триада Горнера и боль по ходу плечевого сплетения

- А. Эндобронхиальная
- Б. Перибронхиальная
- В. Пневмониеподобная
- Г. Рак Пенкоста
- Д. Шаровидная опухоль

Больному 38 лет произведена трансуретральная резекция рецидивного поверхностного рака мочевого пузыря. Дальнейшее лечение включает

- А. профилактическую системную химиотерапию
- Б. профилактическую внутрипузырную химиотерапии.
- В. профилактическую лучевую терапию
- Г. радикальную цистэктомию
- Д. динамическое наблюдение

Можно ли выполнить онкопластическую резекцию если есть несколько образований в молочной железе

- А. нет
- Б. По желанию онколога
- В. По желанию пациента
- Г. Да

Меланома кожи относится к опухолям

- А. нейроэктодермального происхождения
- Б. неопределенного происхождения
- В. мезенхимальной происхождения
- Г. дисэмбриональной природы
- Д. эпителиального происхождения

Больному 56 лет произведена гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка по поводу аденоматоза щитовидной железы. В двух узлах – фолликулярная аденома. В одном (размером в 1 см) – папиллярный рак. Ему следует назначить

- А. Повторную операцию в объеме субтотальной резекции щитовидной железы
- Б. Профилактическую лучевую терапию
- В. Профилактическую химиотерапию
- Г. Лечение радиоактивным йодом
- Д. Наблюдение

Рак толстой кишки наиболее часто локализуется в

- А. Слепой кишке
- Б. Восходящем отделе
- В. Поперечно-ободочной кишке
- Г. Нисходящем отделе
- Д. Сигмовидной кишке

К ноцицептивной боли относится:

- А. соматическая и висцеральная боль
- Б. соматическая боль
- В. висцеральная боль
- Г. аллодиния и каузалгия
- Д. деафферентационная боль

Колониестимулирующие факторы (Г-КСФ) назначают при:

- А. тошноте и рвоте
- Б. лейкопении
- В. почечно-печеночной недостаточности
- Г. метастазах в костях
- Д. анемии

Рак молочной железы развивается из

- А. лимфатических узлов
- Б. кровеносных сосудов
- В. перидуктальной гладкомышечной ткани
- Г. железистого эпителия протоков
- Д. незрелой соединительной ткани

Наиболее подвержены малигнизации _____ полипы желудка

- А. Гиперпластические
- Б. Гиперплазиогенные
- В. Ювенильные
- Г. Аденоматозные

Если у больной 50 лет папиллярный рак щитовидной железы t2n0m0 с локализацией в правой доле, то следует провести

- А. Самостоятельную лучевую терапию
- Б. Комбинированное лечение с послеоперационной лучевой терапией
- В. Комбинированное лечение с предоперационной лучевой терапией
- Г. Тиреоидэктомию с центральной лимфодиссекцией

Железы монтгомери расположены в

- А. Ткани молочной железы
- Б. Области подмышечной впадины
- В. Области ареолы молочной железы
- Г. Области непигментированной части кожи молочной железы

Клинически наиболее поздно проявляется рак

- А. Кардинального отдела
- Б. Антрального отдела
- В. Тела желудка
- Г. Субкардинального отдела

Абсолютным противопоказанием к выполнению изолированной химиоперфузии лёгкого является

- А. Полиорганная недостаточность
- Б. Туберкулёз лёгких
- В. Острое нарушение мозгового кровообращения
- Г. Сахарный диабет

Протамина сульфат 1 мг нейтрализует _____ ед гепарина

- А. 1000-1500
- Б. 80-100
- В. 70-50
- Г. 2500-5000

К основным неорганическим опухолям средостения из ретикулярной ткани относятся

- А. Лимфогранулематоз, лимфосаркома, плазмоцитомы, ретикулосаркома
- Б. Плазмоцитомы, лимфангиомы
- В. Лимфогранулематоз, лимфангиоэндотелиомы
- Г. Ретикулосаркома, лимфосаркома, остеосаркома

Одной из характеристик t4b при раке молочной железы является

- А. Прорастание опухоли в грудную стенку
- Б. Втяжение кожи над опухолью II степени
- В. Изъязвление опухоли
- Г. Прорастание опухоли в грудные мышцы

Наиболее часто при раке молочной железы отдаленные метастазы гематогенным путем поражают легкие, печень, кожу и

- А. Головной мозг
- Б. Мягкие ткани
- В. Кости
- Г. Яичники

Основной целью адъювантной лекарственной терапии является

- А. Уменьшение размеров опухоли
- Б. Изучение лекарственного патоморфоза для планирования дальнейшего лечения
- В. Эрадикация микрометастазов после излечения первичной опухоли
- Г. Усиление степени повреждения опухоли

К препаратам таргетной терапии при раке молочной железы относится

- А. Метотрексат
- Б. Циклофосфамид
- В. Доксорубицин
- Г. Трастузумаб

Наиболее частыми причинами возникновения рака по данным международного агентства по изучению рака являются

- А. Загрязнения почвы, воды
- Б. Сердечно-сосудистые заболевания, повышение уровня холестерина в крови
- В. Нарушения питания, курение
- Г. Острые респираторные заболевания, острые респираторные вирусные инфекции

Первым и обязательным методом диагностики при подозрении на рак прямой кишки является

- А. Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости
- Б. Компьютерная томография органов брюшной полости
- В. Ирригоскопия с двойным контрастированием
- Г. Пальцевое ректальное исследование

Метастатическое поражение печени чаще всего происходит

- А. Гематогенно по системе воротной вены
- Б. Гематогенно по системе печеночной артерии
- В. Лимфогенно ретроградно
- Г. Лимфогенно ортоградно

Наиболее радикальным способом лечения аденокарциномы дистальной части пищевода и кардии является

- А. Экстирпация пищевода
- Б. Лучевая терапия
- В. Химиотерапия 5-fu и митомицином С
- Г. Таргетная терапия

Наиболее часто лимфогенное метастазирование при раке молочной железы происходит по _____ пути

- А. Парастернальному
- Б. Подключичному
- В. Транспекторальному
- Г. Подмышечному

Рак ободочной кишки наиболее часто локализуется в

- А. Поперечной ободочной кишке
- Б. Восходящем отделе
- В. Сигмовидной кишке
- Г. Слепой кишке

Хлорид радия-223 используют при лечении

- А. Костных метастазов рака предстательной железы
- Б. Миеломной болезни для предотвращения деминерализации костной ткани
- В. Прогрессирующей остеогенной саркомы, как паллиативный метод
- Г. Лимфопролиферативных заболеваний с вовлечением костного мозга

Наиболее характерным клиническим признаком рака пищевода является

- А. Дисфагия
- Б. Общая слабость
- В. Рвота
- Г. Тошнота

При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе по решению врачебной комиссии листок нетрудоспособности формируется и продлевается на срок не более _____ месяцев с даты начала временной нетрудоспособности

- А. 5
- Б. 4
- В. 6
- Г. 7

Наиболее часто при раке прямой кишки применяют схемы химиотерапии

- А. BOLD, CVD
- Б. CHOP, MOPP, ABVD
- В. FOLFOX, XELOX, FOLFIRI
- Г. HAM, FLAG, CLAG

Симптомы, наиболее характерные для рака пилорической части желудка, обусловлены феноменом

- А. Обтурации
- Б. Деструкции
- В. Интоксикации
- Г. Компрессии

С целью верификации диагноза «саркома капюши» необходимо выполнить

- А. Витроскопию
- Б. Пробу Тцанка
- В. Осмотр с лампой Вуда
- Г. Биопсию кожи

Видом оперативного лечения рака мочевого пузыря в стадии t3n0m0 является

- А. Электрокоагуляция
- Б. Цистэктомия
- В. Резекция мочевого пузыря
- Г. Трансуретральная электрорезекция

Онкомаркером при раке яичников является

- А. ?-ХГЧ (?-субъединица хорионического гонадотропина человека)
- Б. СА-19-9
- В. АФП (альфа-фетопротеин)
- Г. СА-125

Заболевание детей до 3 лет лимфомой ходжкина является

- А. Невозможным вообще
- Б. Второй по частоте опухолью
- В. Возможным, но редким
- Г. Возможным только при синдроме Дауна

Радикальным методом лечения рака поджелудочной железы является

- А. Хирургический
- Б. Иммуноterapia
- В. Химиотерапевтический
- Г. Лучевая терапия

Среди доброкачественных опухолей молочной железы преобладает

- А. Аденома
- Б. Липома
- В. Фиброаденома
- Г. Фиброма

Письменное обращение гражданина, поступившее в государственные органы, органы местного самоуправления, должно быть рассмотрено в течение ____ дней со дня ____ письменного обращения

- А. 30; Регистрации
- Б. 48; Отправления
- В. 32; Написания
- Г. 22; Поступления

Нативная (неконтрастная плотность) доброкачественных образований надпочечников при компьютерной томографии в единицах хаунсфилда равна

- А. Менее 20 HU
- Б. Более 40 HU
- В. Более 30 HU
- Г. Менее 10 HU

При раке пищевода дифференциальная диагностика должна проводиться с

- А. Острой пневмонией
- Б. Острым панкреатитом
- В. Язвенной болезнью желудка
- Г. Кардиоспазмом

Из железистого эпителия возникает ____ рак

- А. Папиллярный
- Б. Базально-клеточный
- В. Смешанный
- Г. Плоскоклеточный неороговевающий

При высокодифференцированной аденокарциноме лёгкого 2 стадии методом выбора является

- А. Химиолучевое лечение
- Б. Лучевая терапия
- В. Химиотерапия
- Г. Хирургическое лечение

При iii стадии рака эндометрия первым этапом применяется

- А. Хирургическое лечение
- Б. Сочетанное лучевое лечение
- В. Гормональное лечение
- Г. Химиотерапия

Лекарственным препаратом, обладающим наибольшей эффективностью при раке поджелудочной железы, является

- А. Метотрексат
- Б. Циклофосфамид
- В. Винкристин
- Г. Фторурацил

Менинготелиоматозные, фиброзные, переходные, псаммоматозные менингиомы по классификации ВОЗ относят к _____ степени

- А. IV
- Б. III
- В. I
- Г. II

Признание человека инвалидом возможно только при проведении экспертизы

- А. Военно-врачебной
- Б. Медико-социальной
- В. Трудоспособности
- Г. Судебно-медицинской

Гистологическая структура рака пищевода в большинстве случаев является

- А. Саркомой
- Б. Сциррозной опухолью
- В. Плоскоклеточным раком
- Г. Аденокарциномой

Низкодифференцированные опухоли желудочно-кишечного тракта обладают преимущественно ростом

- А. Инфильтративным
- Б. Экзофитным
- В. Экспансивным
- Г. Смешанным

Одним из ключевых условий радикальности выполнения оперативного вмешательства по поводу немелкоклеточного рака лёгкого, при условии проведения неоадьювантных курсов полихимиотерапии, является пересечение бронха на расстоянии _____ мм и более от видимого края опухоли со срочным гистологическим исследованием края резекции

- А. 7
- Б. 15
- В. 12
- Г. 3

Для лечения диссеминированного немелкоклеточного рака легкого с экспрессией pd-l1 более 50% применяют

- А. Серитиниб
- Б. Эрлотиниб
- В. Пембролизумаб
- Г. Алектиниб

В 6% случаев менингиомы встречаются в

- А. Задней черепной ямке
- Б. Области позвоночного канала
- В. Области верхнего сагиттального синуса
- Г. Области намета мозжечка

К этиологическим факторам рака лёгкого относят

- А. Снижение иммунитета
- Б. Химические канцерогены
- В. Воспаление лёгких
- Г. Недостаток витаминов

Нарушения глотания вследствие поражения нервного аппарата глотки чаще развиваются при раке _____ пищевода

- А. Нижнегрудного отдела
- Б. Среднегрудного отдела
- В. Шейного и верхнегрудного отделов
- Г. Абдоминального сегмента

Структура заболеваемости выражается в показателях

- А. Соотношения
- Б. Абсолютных
- В. Экстенсивных
- Г. Интенсивных

Клиническим симптомом, который чаще наблюдается при раке слепой кишки, является

- А. Наличие патологических выделений
- Б. Анемия
- В. Кишечное расстройство
- Г. Боль схваткообразного характера

Больные со злокачественными опухолями, не подлежащие специальному лечению, относятся к клинической группе

- А. 1Б
- Б. 3
- В. 4
- Г. 2А

Трудности при открывании рта (тризм) у больного раком ротоглотки и слизистой оболочки полости рта свидетельствуют о

- А. Присоединении вторичной инфекции
- Б. Поражении опухолью звёздчатого узла симпатического ствола
- В. Распространении опухоли на тело нижней челюсти
- Г. Распространении опухоли на жевательные мышцы

Иностранным гражданам листок нетрудоспособности может быть выдан

- А. При заболевании туберкулезом
- Б. После оперативного вмешательства
- В. Во всех случаях нетрудоспособности
- Г. Если он является застрахованным

Рак желудка наиболее часто развивается в возрасте от ____ до ____ лет

- А. 70; 80
- Б. 51; 70
- В. 21; 50
- Г. 10; 20

Индукционный режим химиотерапии назначается с целью

- А. Продления жизни и улучшения её качества
- Б. Достижения ремиссии опухолевого процесса
- В. Профилактики рецидивов после завершения основного курса
- Г. Полной эрадикации опухоли

Лечение при двустороннем поражении почек опухолью вильмса следует начинать с

- А. Лучевой терапии
- Б. Удаления первичной опухоли
- В. Иммунотерапии
- Г. Неоадъювантной химиотерапии

Для выбора гормонотерапии при раке молочной железы оптимальным является сочетание рецепторов стероидных гормонов

- А. РГ+ и РП+
- Б. РА+ и РГ+
- В. РА- и РЭ-
- Г. РЭ+ и РП+

Ранним симптомом при поражении опухолью вестибулярного отдела гортани является

- А. Осиплость голоса
- Б. Ощущение инородного тела в горле
- В. Наличие увеличенных лимфоузлов шеи
- Г. Затрудненное глотание

Гражданин РФ имеет право на смену медицинской организации или лечащего врача

- А. У гражданина РФ нет такого прав
- Б. Ежемесячно
- В. Не чаще 1 раза в год
- Г. Не чаще 1 раза в полгода

Клиническим признаком, исключающим возможность радикального оперативного вмешательства при раке прямой кишки, является

- А. Анемия
- Б. Пальпируемая опухоль
- В. Острая кишечная непроходимость
- Г. Асцит

Предопухолевым заболеванием пищевода является

- А. Кардиоспазм
- Б. Ахалазия кардии
- В. Синдром Пламмера – Винсона
- Г. Эзофагит

Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованием

- А. Радиоизотопным
- Б. Рентгенологическим
- В. Ультразвуковым
- Г. Гистологическим

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

К опухолям с местнодеструкующим ростом относятся

- А. десмоидная фиброма
- Б. фиброаденома
- В. миома
- Г. липома
- Д. нейрофиброма

Четкий цитогенетический маркер (филадельфийская хромосома) наблюдается при:

- А. остром лимфобластном лейкозе;
- Б. остром миелобластном лейкозе;
- В. хроническом лимфолейкозе;
- Г. хроническом миелолейкозе;
- Д. хроническом моноцитарном лейкозе.

Метод лечения больных с местнораспространенным раком пищевода

- А. эндоскопическое лечение
- Б. комбинированное лечение
- В. хирургическое лечение
- Г. самостоятельная химиолучевая терапия
- Д. системная химиотерапия

Какому методу лечения следует отдавать предпочтение при плоскоклеточном раке анального канала

- А. брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки
- Б. полихимиотерапии
- В. химиолучевому лечению
- Г. сочетанной лучевой терапии

К редким паранеопластическим синдромам, встречаемым при тимоме НЕ относится:

- А. Гематологический синдром
- Б. Аутоиммунные расстройства
- В. Синдром иммунодефицита
- Г. Синдром сдавления верхней полой вены

Какие ранние симптомы при поражении опухолью вестибулярного отдела гортани

- А. Стойкая осиплость
- Б. Кровохарканье
- В. Затрудненное дыхание
- Г. Дискомфорт и ощущение инородного тела в горле

При лечении рака вульвы I стадии применяют лечение:

- А. хирургическое + лучевая терапия;
- Б. хирургическое;
- В. хирургическое + химиотерапия;
- Г. хирургическое + гормонотерапия;
- Д. только лучевое.

Наиболее частыми клиническими проявлениями опухолевого поражения правых отделов ободочной кишки являются:

- А. нарушение кишечной проходимости
- Б. анемия
- В. желтуха
- Г. слабость, быстрая утомляемость
- Д. примесь слизи и крови в кале

При какой стадии рака эндометрия применяется химиотерапия?

- А. IA
- Б. II
- В. III A
- Г. ни при какой

Целью паллиативной помощи онкологическим больным является:

- А. продление жизни
- Б. проведение эвтаназии
- В. создание иллюзии лечения
- Г. улучшение качества жизни

При каких опухолях головы и шеи наиболее часто болеют женщины

- А. Щитовидной железы
- Б. Полость рта
- В. Язык
- Г. Гортаноглотка

Рак шейки матки чаще всего возникает:

- А. у внутреннего зева;
- Б. у границы плоского и цилиндрического эпителиев;
- В. на влагалищной порции шейки матки;
- Г. в железах шейки матки;
- Д. в экзоцервиксе.

Симптомами окклюзионного приступа являются:

- А. Тетраплегия
- Б. Резкие головные боли, двигательное беспокойство
- В. Внезапные головные боли, нарушение сознания, нарастание глазодвигательных нарушений, пирамидных и стволовых расстройств, недержание мочи
- Г. Кома, снижение тонуса в конечностях, патологические симптомы

При сдавлении спинного мозга с развитием тетрапареза или парапареза эффективны:

- А. нестероидные противовоспалительные средства
- Б. антрациклины
- В. бисфосфонаты
- Г. кортикостероиды

Целью II фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является:

- А. определение максимально переносимой дозы цитостатика;
- Б. сравнительное изучение с другими цитостатиками;
- В. доказать клиническую эффективность лекарственного средства у определенной группы пациентов, оценить краткосрочную безопасность активного ингредиента, определение уровня терапевтической дозы препарата и схемы дозирования;
- Г. изучение возможных сочетаний с другими цитостатиками;
- Д. анализ экономических показателей лечения и уровня качества жизни.

Наиболее объективные сведения о природе злокачественного новообразования могут быть получены при:

- А. клиническом осмотре больного;
- Б. рентгенологическом исследовании;
- В. использовании эндоскопических методов;
- Г. ультразвуковой томографии;
- Д. патоморфологическом исследовании резецированного (удаленного) органа с регионарным лимфатическим аппаратом.

Что входит в понятие циторедуктивной операции R1?

- А. пробное вмешательство
- Б. оставление макроскопического фрагмента опухоли
- В. опухолевые клетки по линии резекции
- Г. отсутствие всех перечисленных признаков

Адено-кистозный рак трахеи протяженностью 7 колец. Смешанная экзо-эндофитная форма роста. Дыхательная недостаточность. Какова лечебная тактика?

- А. реканализация
- Б. симптоматическое лечение
- В. полихимиотерапия
- Г. реканализация с последующей сочетанной лучевой терапией.

Тактика лечения при недифференцированным раке носоглотки с интракраниальным компонентом и метастазами на шее с обеих сторон

- А. симптоматическая терапия
- Б. операция
- В. лучевая терапия
- Г. многокурсовая ПХТ с последующей лучевой терапией

Соблюдение принципов зональности и футлярности при выполнении онкологических операций направлено на:

- А. обеспечение антибластики;
- Б. обеспечение абластики;
- В. снижение риска хирургических вмешательств;
- Г. максимальное сохранение функции органа;
- Д. улучшение качества жизни.

При рецидивах злокачественных глиом и метастазов после курса лучевой терапии применяется

- А. ПЭТ-КТ с галлием
- Б. ПЭТ-КТ с метионином
- В. ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозой
- Г. ПЭТ-КТ с фторэтилтирозином

Укажите правильные места для проведения открытой или пункционной биопсии при локализации опухоли в дистальной трети бедра?

- А. передняя поверхность бедра
- Б. задняя поверхность бедра
- В. латеральная поверхность бедра
- Г. медиальная поверхность бедра
- Д. через область надколенника

Гиперпластические полипы желудка:

- А. Являются предраковым состоянием, требуют эндоскопического удаления
- Б. Не являются предраком, требуют эндоскопического удаления
- В. Не требуют эндоскопического удаления, необходимо назначение терапии гастроэнтерологом

Укажите среди перечисленных ниже методы диагностики раннего рака шейки матки

- А. кольпоскопия
- Б. гистерография
- В. цитологическое исследование мазков
- Г. лимфография

Стереотаксическая биопсия выполняется во всех случаях, кроме

- А. МР-картина лимфомы ЦНС
- Б. Опухоли базальных ядер
- В. Опухоли мозжечка с компрессией ликвороотводящих путей
- Г. Дифференциальный диагноз лучевого некроза и рецидива опухоли

У пациента множественные (30 шт) нейроэндокринные опухоли I типа G1 в желудке, с инвазией в пределах слизистой оболочки. Ваша тактика?

- А. Чресбрюшинная гастрэктомия с лимфодиссекцией D2
- Б. Эндоскопическое удаление опухолей
- В. Химиотерапия
- Г. Терапия сандостатином

Препараты, используемые при лечении генерализованного рака мочевого пузыря:

- А. гемцитабин
- Б. антрациклины
- В. цисплатин
- Г. преднизолон

В 95% случаев рак полового члена локализуется в:

- А. области головки и крайней плоти;
- Б. средней трети;
- В. области крайней плоти;
- Г. пещеристом теле.

Основными показаниями к нервосберегающей простатэктомии являются:

- А. объем предстательной железы не более 50 см³
- Б. отсутствие эректильной дисфункции до операции
- В. T1-2вN0M0
- Г. уровень ПСА менее 10 нг/мл

Назовите наиболее часто встречающиеся причины гибели больных острым лейкозом:

- А. Печеночная недостаточность
- Б. Выраженная анемия
- В. Инфекционные осложнения
- Г. Нейролейкоз

Эхографическая картина рака внепеченочных желчевыводящих протоков необходимо дифференцировать с эхографической картиной:

- А. Холедохолитиаз
- Б. Лимфаденопатии в области печеночно 12 – перстной связки
- В. Рака головки поджелудочной железы
- Г. Рака большого дуоденального сосочка
- Д. Верно все

Какой метод диагностики помогает определить инвазию рака в миометрий?

- А. лапароскопия
- Б. кольпоскопия.
- В. УЗИ органов малого таза с цветным доплеровским картированием
- Г. гистеросальпингография.

Источник лазерного света с какой длиной волны необходим для проведения ФДТ с фотосенсибилизаторами хлоринового ряда (Фотолон, Фотодитазин, Радахлорин)?

- А. 662 нм
- Б. 630 нм
- В. 670 нм
- Г. 810 нм

У больного эмбриональным раком яичка с метастазами в забрюшинные лимфоузлы после проведенного лечения (орхофуникулэктомия и полихимиотерапия) по данным КТ исследования выявлены увеличенные парааортальные лимфоузлы. Дальнейшая лечебная тактика:

- А. наблюдение
- Б. продолжение полихимиотерапии
- В. дистанционная лучевая терапия
- Г. забрюшинная лимфаденэктомия

Какой метод лечения является основным при злокачественных опухолях мягких тканей G2, G3?

- А. химиотерапия
- Б. лучевая терапия
- В. хирургический
- Г. комбинированный
- Д. фотодинамическая терапия

Основное значение в диагностике идиопатического миелофиброза имеет

- А. Сочетание нейтрофильного гиперлейкоцитоза и выраженной спленомегалии
- Б. Результаты пункции костного мозга
- В. Обнаружение хромосомной патологии
- Г. Гистологическое исследование костного мозга методом трепанобиопсии

Вирховский метастаз при раке желудка следует расценивать как:

- А. отдаленный гематогенный метастаз;
- Б. регионарный гематогенный метастаз;
- В. отдаленный лимфогенный метастаз;
- Г. регионарный лимфогенный метастаз;
- Д. имплантационный метастаз.

Адекватным объемом хирургического лечения при раке легкого НЕ является

- А. Атипичная резекция легкого
- Б. Лобэктомия
- В. Билобэктомия
- Г. Пневмонэктомия

Излюбленной локализацией гематогенных метастазов рака толстой кишки являются:

- А. легкие;
- Б. кости;
- В. печень;
- Г. надпочечники;
- Д. селезенка.

Регионарными лимфатическими узлами при раке вульвы являются:

- А. подвздошные;
- Б. крестцовые;
- В. obturatorные;
- Г. бедренные;
- Д. параметральные.

Радикальным методом лечения рака почки является:

- А. иммунотерапия;
- Б. лучевой;
- В. химиотерапия;
- Г. хирургический;
- Д. комбинированный (операция + лучевая терапия).

Для II стадии лимфедемы по классификации Международного общества лимфологии характерно наличие

- А. Непостоянного отека с редукцией при элевации конечности
- Б. Постоянного отека с частичной редукцией при элевации конечности
- В. Увеличения длины диаметров конечности в стандартных точках на 2 – 6 см в сравнении со здоровой
- Г. Постоянного отека с утолщением кожи и уплотнением мягких тканей

К возникновению лимфомы Беркитта и рака носоглотки у человека имеет отношение:

- А. аденовирус;
- Б. вирус Эпштейн - Барра (возбудитель инфекционного мононуклеоза);
- В. Рарова-вирус;
- Г. вирус из группы вирусов оспы;
- Д. вирус из группы вирусов herpes.

Характерными вариантами метастазирования рака желудка являются:

- А. Метастаз Вирхова
- Б. Метастаз Шницлера
- В. Метастаз сестры Джозеф
- Г. все перечисленное

Заболеваемость раком почки в России:

- А. остается стабильной на низком уровне;
- Б. имеет тенденцию к снижению;
- В. остается стабильной на высоком уровне;
- Г. имеет тенденцию к росту.

Клинические проявления забрюшинных неорганных опухолей в первую очередь обусловлены:

- А. гистологической структурой опухоли;
- Б. размерами опухоли;
- В. локализацией опухоли;
- Г. размерами и локализацией опухоли;
- Д. гистологической структурой и размерами опухоли.

Определите медикаментозную тактику лечения больного раком предстательной железы при наличии роста уровня ПСА на фоне проведения гормональной терапии по схеме максимальной андрогенной блокады:

- А. золадекс 3,6 мг
- Б. химиотерапия (таксаны)
- В. касодекс 150 мг
- Г. касодекс 50 мг

Неблагоприятными факторами прогноза при лимфоме Ходжкина являются:

- А. увеличение медиастинальных лимфоузлов $> 1/3$ диаметра грудной клетки;
- Б. повышения уровня АСТ, АЛТ;
- В. гистологический вариант – лимфоидное преобладание;
- Г. возраст старше 60 лет;
- Д. лейкоцитоз.

Частота локализации базальноклеточного рака на коже лица составляет:

- А. 20-30%;
- Б. 35-40%;
- В. 45-50%;
- Г. около 60%;
- Д. 94-97%.

Выберите наиболее характерные рентгенологические признаки рака молочной железы:

- А. четкие контуры и отсутствие кальцинатов;
- Б. неоднородная структура
- В. лучистые контуры и неоднородная структура;
- Г. лучистые контуры и микрокальцинаты;
- Д. однородная структура и четкие контуры.

При лимфогранулематозе IIIБ стадии предпочтение следует отдавать

- А. курсам химиотерапии
- Б. лучевой терапии на все зоны поражения и зоны возможного субклинического распространения опухоли
- В. курсам химиотерапии с последующей лучевой терапией на все зоны поражения и зоны возможного субклинического распространения опухоли
- Г. курсам химиотерапии с последующей лучевой терапией на зоны исходно больших опухолевых масс и (или) остаточные лимфатические узлы
- Д. все варианты одинаково эффективны

В понятие билиопанкреатодуоденальной области следует включать:

- А. поджелудочную железу, печень, 12-перстную кишку, желудок, желчный пузырь;
- Б. печень, внепеченочные желчные протоки, желчный пузырь, большой дуоденальный сосочек, 12-перстную кишку;
- В. большой дуоденальный сосочек, 12-перстную кишку, поджелудочную железу, желчный пузырь, внепеченочные желчные протоки;
- Г. внутрипеченочные желчные протоки, желчный пузырь, 12-перстную кишку, поджелудочную железу, печень;
- Д. поджелудочную железу, печень, 12-перстную кишку.

Характерный для ФДТ так называемый «коллагенсохраняющий» некроз тканей способствует

- А. заживлению дефекта мягких тканей по типу репарации
- Б. медленной эпителизации
- В. формированию келоидных рубцов
- Г. длительному периоду отторжения некротических тканей

Химиотерапия I линии глиом III-IV степени злокачественности

- А. Ингибиторы тирозинкиназы
- Б. Таксаны
- В. Темозоломид
- Г. Препараты платины

ПО КЛАССИФИКАЦИИ BOSNIAK ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ИМЕЮТ КИСТЫ

- А. Bosniak I-II типа
- Б. Bosniak IIF типа
- В. Bosniak III типа
- Г. Bosniak III-IV типа

Распространенность N2 поражения при раке желудка, согласно классификации TNM 8 издания обозначают при:

- А. отсутствие поражения регионарных лимфоузлов
- Б. поражении 1-2 регионарных лимфоузлов
- В. поражении 3-6 регионарных лимфоузлов
- Г. поражении 7 и более регионарных лимфоузлов

У пациентки 19 лет лапароскопически удалены правые придатки. При гистологическом исследовании в яичнике выявлена зрелая тератома. Какое дополнительное лечение необходимо пациентке?

- А. удаление большого сальника.
- Б. резекция второго яичника
- В. резекция большого сальника и резекция второго яичника
- Г. дополнительного лечения не требуется

Медуллярный рак щитовидной железы развивается из:

- А. А-клеток;
- Б. В-клеток;
- В. С-клеток;
- Г. эпителиальной ткани;
- Д. мезенхимальной ткани.

Рак молочной железы у мужчин встречается реже, чем у женщин в:

- А. 10 раз;
- Б. 50 раз;
- В. 100 раз;
- Г. 200 раз.

Какой уровень лимфодиссекции принят сейчас при раке желудка?

- А. D0
- Б. D1
- В. D2
- Г. D3

ОБЪЕМ ЛИМФАДЕНЭКТОМИИ ПРИ ПКР ПРАВОЙ ПОЧКИ

- А. Латерокавальные, прекавальные, аортокавальные, ретрокавальные л/у
- Б. Латероаортальные, предаортальные, аортокавальные, ретроаортальные л/у
- В. Латероаортальные, л/у ворот почки, ретроаортальные
- Г. Латерокавальные, предкавальные, аортокавальные, ретроаортальные

Наиболее частыми жалобами пациенток раком вульвы ранних стадий являются:

- А. зуд;
- Б. кровянистые выделения;
- В. боли, наличие язвы;
- Г. гнойные выделения, боли;
- Д. язва, жжение, раздражение.

После радикальной простатэктомии биохимический рецидив регистрируется при значении общего ПСА крови выше:

- А. 0,1 нг/мл
- Б. 0,2 нг/мл
- В. 0,3 нг/мл
- Г. 0,4 нг/мл

Плоскоклеточный и диморфный (смешанный железистый и плоскоклеточный) рак чаще всего локализуется в:

- А. слепой кишке;
- Б. восходящем отделе ободочной кишки;
- В. нисходящем отделе ободочной кишки;
- Г. сигмовидной кишке;
- Д. прямой кишке.

При забрюшинных неорганных опухолях чаще встречаются:

- А. прорастание различных органов опухолью;
- Б. сдавление или смещение органов опухолью;
- В. с одинаковой частотой встречается как прорастание так и сдавление или смещение органов опухолью;
- Г. нарушение проходимости полых органов;
- Д. воспалительный инфильтрат окружающей клетчатки.

Какой метод лечения является основным при злокачественных опухолях мягких тканей G1

- А. химиотерапия
- Б. лучевая терапия
- В. хирургический
- Г. комбинированный
- Д. комплексный

К важнейшим свойствам опухолевых клеток относится:

- А. самодостаточность в пролиферативных сигналах;
- Б. повышенная чувствительность к ростсупрессирующим сигналам;
- В. торможение ангиогенеза;
- Г. усиление апоптоза;
- Д. торможение локомоции.

Пациенткам с HER2-позитивным раком молочной железы в случае отсутствия полного патоморфологического регресса опухоли RCB II-III после окончания неoadъювантной терапии с включением трастузумаба +/- пертузумаба рекомендуется смена таргетного агента на:

- А. Трастузумаб-энтанзин
- Б. Трастузумаб-дерукстекан
- В. Лапатиниб
- Г. Нератиниб

Из органов билиопанкреатодуоденальной зоны наиболее часто поражается раком:

- А. большой дуоденальный сосочек;
- Б. 12-перстная кишка;
- В. желчный пузырь;
- Г. поджелудочная железа;
- Д. внепеченочные желчные протоки.

Поражение кожи при меланоме 3 уровня инвазии по Clark соответствует стадии pT:

- А. pT3;
- Б. pT1;
- В. pT2;
- Г. pT4.

При каких опухолях головы и шеи наиболее часто болеют мужчины

- А. гортани
- Б. Язык
- В. Ротоглотка
- Г. Гортаноглотка

При первичнойлимфоме желудочно-кишечного тракта наиболее часто поражается:

- А. желудок;
- Б. пищевод;
- В. подвздошная кишка;
- Г. ободочная кишка;
- Д. прямая кишка.

Механизм хронической боли при раке:

- А. периферический
- Б. центральный
- В. психологический
- Г. включает все перечисленное

Наиболее широко распространенной радикальной операцией при раке органов билиопанкреатодуоденальной зоны является:

- А. экстирпация 12-перстной кишки;
- Б. расширенная резекция большого дуоденального соска;
- В. гастропанкреатодуоденальная резекция;
- Г. гастрэктомия;
- Д. криодеструкция.

Патогенез поздних лучевых осложнений

- А. хроническое воспаление
- Б. отек
- В. облитерация сосудов, нарушение микроциркуляции, гипоксия
- Г. иммунодефицит

Методом выбора в лечении больных мультицентричным ранним центральным раком обоих легких является:

- А. Пневмонэктомия
- Б. Лобэктомия
- В. Лучевая терапия
- Г. Эндоскопическая фотодинамическая терапия

Для диагностики метастатического поражения костей чаще всего используется радиоактивный:

- А. ^{32}P ;
- Б. ^{99}Sr ;
- В. ^{90}Co ;
- Г. ^{131}I ;
- Д. $^{99\text{Tc}}$.

Какой химиопрепарат обязательно входит в схему химиотерапии распространенного рака яичников?

- А. циклофосфан
- Б. препараты платины
- В. адриабластин
- Г. таксол.

Флуоресцентная диагностика с аминолевулиновой кислотой основана на

- А. Аутофлуоресценции
- Б. Индуцированной флуоресценции
- В. Флуоресценции экзогенных флуорофоров
- Г. Не проводится

При каких условиях можно проводить лучевую терапию больным плоскоклеточным раком пищевода при преимущественно эндофитной форме роста с дисфагией III-IV степени после

- А. наложения гастростомы
- Б. резекции пищевода
- В. лазерной реканализации
- Г. стентирования

Какие формы рака щитовидной железы сохраняют йодонакопительную функцию

- А. папиллярная аденокарцинома
- Б. фолликулярная аденокарцинома
- В. медулярный рак
- Г. плоскоклеточный рак
- Д. недифференцированный рак

Какие поздние лучевые осложнения Вы знаете?

- А. лучевая язва
- Б. фиброз
- В. эпителиит, эпидермит
- Г. телеангиоэктазии

Помимо стадии опухоли, выбор лечения рака полового члена зависит от следующих факторов?

- А. Размера опухоли
- Б. Локализации опухоли
- В. Степени инвазии
- Г. Все вышеперечисленное

Под термином локализованный мелкоклеточный рак легкого подразумевают:

- А. опухоль ограничена одной долей;
- Б. опухоль ограничена одним легким;
- В. метастазы в контралатеральные лимфоузлы;
- Г. опухоль ограничена одним гемитораксом.

При какой локализации первичной опухоли гениталий у женщин встречается поражение паховых лимфоузлов?

- А. раке шейки матки
- Б. раке яичников.
- В. раке вульвы
- Г. при всех вышеперечисленных локализациях.

Какой оптимальный объем оперативного вмешательства для больных раком шейки матки IB - II A ст. молодого возраста?

- А. операция Вертгейма
- Б. экстирпация матки с придатками
- В. экстирпация матки с придатками + подвздошно-обтураторная л/а
- Г. расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников
- Д. трахелэктомия

К опухолевым процессам в яичнике относится

- А. фолликулярная киста
- Б. киста желтого тела
- В. киста яичников
- Г. дермоидная киста
- Д. хемодектома

Медуллярный рак щитовидной железы развивается:

- А. из А-клеток
- Б. из В-клеток
- В. из С-клеток
- Г. из любой вышеуказанной
- Д. из мезенхимальной ткани

К лучевому воздействию не чувствительны:

- А. лейомиосаркома;
- Б. карциносаркома;
- В. эндометриальная саркома;
- Г. ботриоидная саркома;
- Д. стромальная саркома.

У девочки 18 лет на операции выявлена герминогенная опухоль левого яичника. Какой объем оперативного вмешательства следует выбрать

- А. надвлагалищная ампутация матки с придатками
- Б. надвлагалищная ампутация матки с придатками + резекция большого сальника
- В. удаление опухоли
- Г. удаление опухоли со срочным гистологическим исследованием
- Д. удаление придатков на стороне опухоли + резекция контрлатерального яичника + резекция большого сальника

При какой стадии рака яичников возможно органосохранное лечение?

- А. IA
- Б. IB
- В. IB
- Г. IIC

Прямое распространение первичной опухоли на регионарные лимфатические узлы классифицируется как:

- А. N0;
- Б. Nx;
- В. N1-3;
- Г. Mx;
- Д. M1.

Какие формы заболевания относят к раннему раку шейки матки

- А. интраэпителиальный рак (сг in situ)
- Б. тяжелая степень дисплазии
- В. рак шейки матки 1 а стадии
- Г. рак шейки матки II стадии

У больного 65 лет плоскоклеточный рак нижней носовой раковины I стадии. Какой вариант лечения наиболее целесообразен:

- А. дистанционная гамма-терапия
- Б. внутритканевая лучевая терапия
- В. внутриполостная лучевая терапия
- Г. сочетанная лучевая терапия (дистанционная лучевая терапия + внутриполостная лучевая терапия)
- Д. хирургическое лечение

Наиболее частый вариант пластики пищевода при радикальном хирургическом лечении рака средней трети пищевода

- А. пластика тонкой кишкой
- Б. пластика толстой кишкой
- В. пластика желудочным стеблем
- Г. пластика кожно-мышечным лоскутом

В диагностике опухоли яичника на дооперационном этапе используются следующие методы, за исключением:

- А. диагностическая пункция опухоли яичника
- Б. исследование уровня маркера СА-125
- В. УЗИ органов малого таза, брюшной полости
- Г. МРТ органов малого таза, брюшной полости
- Д. КТ органов малого таза, брюшной полости

Какой метод лечения трофобластической опухоли является ведущим?

- А. лучевой
- Б. хирургический
- В. химиотерапия
- Г. комбинированный

При выявлении нейроэндокринной опухоли с показателями Grade 3 Ki-67 >20%, наиболее эффективным будет применение РФП _

- А. 68Ga-DOTA-TATE
- Б. 18F-ФДГ
- В. 68Ga-PSMA
- Г. 99mTc-MIBI

Понятие «пограничные опухоли» возможно использовать только при опухолях:

- А. герминогенных;
- Б. стромы полового тяжа;
- В. эпителиальных;
- Г. липидноклеточных;
- Д. гонадобластомах.

При лимфэдеме главным лечением является:

- А. прием мочегонных
- Б. давящее бинтование
- В. тщательный уход за кожей
- Г. все перечисленное

Показания к послеоперационному облучению у больных раком легкого

- А. опухолевые клетки по линии резекции бронха
- Б. обнаружение метастазов в регионарных лимфатических узлах
- В. радикальная операция при N0
- Г. множественные отсеы опухоли в легочную ткань

При прогрессировании процесса, при люминальном В подтипе в первой линии назначается Гормонотерапия+ ингибиторы CDK4/6

- А. нет
- Б. Только при наличии висцерального криза
- В. да
- Г. Если пациент откажется от химиотерапии

Особенностью лимфатической системы пищевода является:

- А. наличие продольно расположенных лимфатических сплетений в слизистой оболочке, подслизистом слое и мышечной оболочке
- Б. близкое расположение грудного лимфатического протока
- В. тесная взаимосвязь лимфатической системы пищевода и желудка
- Г. все вышеперечисленное

Стволовые клетки какого происхождения чаще всего используются на практике при проведении трансплантации аутологичных гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК)?

- А. костного мозга
- Б. периферической крови
- В. пуповинной крови
- Г. мезенхимального

В клинической классификации TNM символ "Т" может быть представлен в следующем сочетании:

- А. ТХ;
- Б. Т0;
- В. Тis;
- Г. Т1;
- Д. все перечисленное верно.

У больного 54 лет, аденокарцинома головки поджелудочной железы T2NxM0. Уровень общего билирубина в крови 800 ммоль/л. С чего предпочтительнее начать лечение:

- А. выполнения панкреатодуоденальной резекции
- Б. выполнения тотальной панкреатодуоденэктомии
- В. проведение неoadъювантной химиотерапии
- Г. выполнения желчеотводящей операции
- Д. проведение лучевой терапии

Стандартом для проведения первой линии химиотерапии при распространенном раке яичника является комбинация препаратов:

- А. доксорубицин + циклофосфан;
- Б. паклитаксел + карбоплатин;
- В. гемцитабин + цисплатин;
- Г. этопозид + карбоплатин;
- Д. карбоплатин + доксорубицин.

Для лечения лимфомы Ходжкина не используется:

- А. Полихимиотерапия
- Б. Использования сверхвысоких доз цитостатиков с трансплантацией аллогенного костного мозга
- В. Радикальная лучевой терапии
- Г. Хирургическое удаление массивных опухолевых образований

Ведущим методом диагностики меланомы кожи является:

- А. радиофосфорная проба;
- Б. постлучевая меланурия (реакция Якша);
- В. термография;
- Г. морфологический метод;
- Д. компьютерная томография.

Получить морфологическую верификацию из лимфатических узлов средостения НЕЛЬЗЯ при:

- А. медиастиноскопии
- Б. EBUS/EUS
- В. ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в режиме «все тело»
- Г. торакоскопии

При дистальной субтотальной резекции желудка по поводу рака удаляют все перечисленные анатомические структуры, кроме:

- А. Малого сальника
- Б. Пилорического жома
- В. Селезенки
- Г. Большого сальника

Высококочувствительными к химиотерапии являются

- А. хорионкарцинома матки
- Б. злокачественные опухоли яичка
- В. рак пищевода
- Г. лимфогранулематоз
- Д. рак шейки матки

У больной 33 лет паренхима в обеих молочных железах зерниста, нечетко пальпируются мелкие очаги уплотнений. В предменструальном периоде они становятся более плотными и болезненными. Кожа молочных желез не изменена. Выделений из сосков нет. Ваш диагноз.

- А. диффузная фиброзно-кистозная мастопатия
- Б. маститоподобный рак молочной железы
- В. инфильтративно-отечная форма рака молочной железы
- Г. хронический двухсторонний мастит

При аррозивном кровотечении из ЗНО, с целью достижения оптимального гемостаза у пациента с местно-распространенным процессом эффективным методом лечения является:

- А. Выполнение гипертермии области ЗНО
- Б. Применение антиагрегантной терапии в максимальной дозировке
- В. Выполнение гемотрансфузионной терапии
- Г. Выполнение ангиографии, с последующей эмболизацией афферентных артерий ЗНО

При феохромоцитоме надпочечника для чего следует выполнять УЗИ щитовидной железы?

- А. Для исключения медуллярного рака щитовидной железы
- Б. Для исключения фолликулярного рака щитовидной железы
- В. Для исключения метастазов
- Г. Для исключения тиреоидита

Лечение нерезектабельных десмоидных фибром у пациентов репродуктивного возраста

- А. циторедуктивная операция
- Б. лучевая терапия
- В. гормонотерапия
- Г. полихимиотерапия
- Д. верно все вышеперечисленное

Больные злокачественными новообразованиями подлежат диспансерному наблюдению в течение:

- А. 2 лет;
- Б. 3 лет;
- В. 5 лет;
- Г. 10 лет;
- Д. пожизненно.

Ведущим методом лечения резектабельного немелкоклеточного рака легкого является:

- А. хирургическое лечение
- Б. лучевая терапия
- В. химиотерапия
- Г. комбинированное и комплексное лечение

У пациента рак антрального отдела желудка TisN0M0 размерами 0,8 см. Наиболее предпочтительная лечебная тактика:

- А. Субтотальная дистальная резекция желудка
- Б. Химиотерапия
- В. Лучевая терапия
- Г. Эндоскопическая резекция слизистой оболочки

Интраоперационная лучевая терапия, ее особенности. Вид ионизирующего излучения, доза.

- А. многократное фракционное облучение
- Б. однократное облучение
- В. электронный пучок 15-20 Гр
- Г. гаммаоблучение 40-50 Гр

К наиболее часто встречающейся морфологической форме опухоли мочевого пузыря относится:

- А. перстневидно-клеточный рак;
- Б. переходно-клеточный рак;
- В. железистый рак;
- Г. солидный рак;
- Д. недифференцированный рак.

РФП DOTA-TATE, применяемый для выявления нейроэндокринной опухоли, является тропным к соматостатиновому рецептору _

- А. 2a,b
- Б. 1
- В. 3
- Г. 5

Рак почки наиболее часто метастазирует

- А. в плевру и печень
- Б. в кости и легкие
- В. в печень и головной мозг
- Г. в мягкие ткани и забрюшинные лимфатические узлы
- Д. в забрюшинные лимфатические узлы и печень

У женщины 40 лет - рак вульвы. Опухоль размерами до 1,5 см в диаметре без инфильтрации тканей располагается в верхней трети большой половой губы. Ваш выбор метода лечения

- А. гемивульвэктомия + операция Дюкена
- Б. лучевая терапия
- В. гемивульвэктомия + лучевая терапия
- Г. гемивульвэктомия

Проявлением гиперпластического синдрома при остром лейкозе является

- А. Увеличение лимфоузлов
- Б. Появление лейкоидов на коже
- В. Нейролейкемия
- Г. Все перечисленное

Какие структуры могут присутствовать в тератоме яичника

- А. эпителий кишечного типа
- Б. элементы хрящевой ткани
- В. элементы кожи и ее придатков
- Г. нервная ткань
- Д. все вышеперечисленные

Характерная эхографическая картина хронического гипертрофического холецистита в стадии ремиссии может иметь следующие признаки:

- А. нормальные размеры желчного пузыря, однослойная тонкая - до 2-3 мм стенка, однородная эхонегативная полость
- Б. нормальные или увеличенные размеры желчного пузыря, неоднородная тонкая до 0,5-1,5 мм гиперэхогенная стенка, полость часто с эхогенной взвесью
- В. различные размеры желчного пузыря, утолщенная 3,5-4 мм неоднородная стенка повыш. эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью
- Г. различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная более 4-5 мм, слоисто-неоднородная стенка смешанной эхогенности (с гипо-, изо-, гиперэхогенными участками), однородная или с эхогенной взвесью полость
- Д. различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная, неоднородная, иногда слоистая стенка умеренно и значительно повышенной эхогенности, однородная или с признаками застоя желчи полость

Основанием выбора тактики лечения лимфом служит

- А. морфологический вариант опухоли
- Б. распространенность процесса
- В. локализация первичного очага опухоли
- Г. наличие симптомов интоксикации

Основные типы радикальных операций при раке желудка

- А. дистальная субтотальная резекция желудка
- Б. гастрэктомия
- В. проксимальная субтотальная резекция желудка
- Г. клиновидная резекция желудка

Наиболее часто возникновение рака шейки матки связано с инфицирование вирусом:

- А. герпеса;
- Б. аденовирусом;
- В. гепатита В;
- Г. Эпштейн-Барра;
- Д. папилломы человека.

Носитель генетической информации находится:

- А. клеточной мембране;
- Б. цитоплазме;
- В. ядре;
- Г. рибосомах;
- Д. во всех структурах клетки.

Выполнение радиочастотной термоабляции метастазов колоректального рака в печень возможно при:

- А. билобарное поражение печени с размером очагов до 2 см
- Б. унилобарное поражение печени с размером очагов до 2 см
- В. единичные очаги размером до 2 см
- Г. билобарное поражение печени с размером очагов более 5 см;
- Д. унилобарное поражение печени с размером очага более 5 см

Какой метод лечения является основным при хондросаркоме G1, G2?

- А. химиотерапия
- Б. лучевая терапия
- В. хирургический
- Г. комбинированный
- Д. комплексный

При подозрении на метастатическое поражение головного мозга необходимо выполнить

- А. Компьютерную томографию без контрастного усиления
- Б. Магнитно-резонансную томографию без контрастного усиления
- В. Магнитно-резонансную томографию с контрастным усилением
- Г. Обзорную краниографию

К Вам обратился пациент с диагнозом «Рак фатерова сосочка» и механической желтухой. Каковы будут Ваши действия?

- А. Экстренная панкреатодуоденальная резекция
- Б. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия и стентирование с решением вопроса о лечебной тактике после дообследования
- В. Чрескожная чреспеченочная холангиостомия с решением вопроса о лечебной тактике после дообследования
- Г. Эндоскопическая папиллэктомия

Варианты клинического течения опухолей ЦНС

- А. Бластоматозное (туморозное) течение
- Б. Эпилептоподобное течение
- В. Инсультоподобное течение
- Г. Все вышеперечисленное

К новообразованиям АПУД-системы относятся

- А. рак большой слюнной железы
- Б. медуллярный рак щитовидной железы
- В. бронхиогенный рак
- Г. менингиома
- Д. хордома

Согласно международной классификации TNM 7 пересмотра, критерию T2 при неорганных опухолях забрюшинного пространства соответствует:

- А. опухоль более 5 см
- Б. опухоль менее 5 см
- В. опухоль менее 7 см
- Г. опухоль более 7 см

Какова должна быть тактика при выявлении в желудке образования размерами 1 см, гистологически подтвержденного как "тяжелая дисплазия эпителия"

- А. Динамическое наблюдение, контрольное эндоскопическое исследование через 1 год
- Б. Хирургическое вмешательство в объеме гастрэктомии
- В. Повторная множественная эндоскопическая биопсия
- Г. Эндоскопическое удаление образования

Предраковые состояния слизистой оболочки желудка при гистологическом исследовании характеризуются:

- А. наличием атипичных клеток;
- Б. степенью дисплазии клеток;
- В. наличием хронического атрофического гастрита;
- Г. наличием кишечной метаплазии очагового характера;
- Д. наличием эрозии.

Способы морфологической верификации забрюшинных неорганных опухолей при планировании неoadъювантной терапии:

- А. трепанобиопсия
- Б. открытая биопсия
- В. лапароскопическая биопсия
- Г. тонкоигльная пункция
- Д. эндоскопическая биопсия

Паренхиму новообразования составляют:

- А. соединительная ткань;
- Б. кровеносные и лимфатические сосуды;
- В. собственно опухолевые клетки;
- Г. нервные и клеточные элементы стромы;
- Д. лимфатические сосуды.

У больных раком яичника с нарушением функции почек с большой осторожностью следует применять:

- А. доксорубицин;
- Б. этопозид;
- В. цисплатин;
- Г. циклофосфан;
- Д. гемцитабин.

Побочным действием нестероидных противовоспалительных средств является:

- А. раздражение слизистой ЖКТ
- Б. геморрагические осложнения
- В. гранулоцитопения
- Г. кожные аллергические реакции
- Д. все перечисленные симптомы

Забрюшинная лимфаденэктомия является этапом комбинированного лечения больных злокачественной опухолью яичка при:

- А. семинозной опухоли
- Б. опухоли желточного мешка
- В. сперматоцитарной семиноме
- Г. несеминозной опухоли

В какие сроки наиболее предпочтительно проводить хирургический этап после неoadъювантного лечения местнораспространенного плоскоклеточного рака грудного отдела пищевода

- А. Сразу после завершения предоперационной терапии
- Б. Через 6 месяцев
- В. При хорошем эффекте от неoadъювантного лечения хирургический этап можно не проводить
- Г. 6-8 недель

К злокачественным неэпителиальным опухолям желудка относятся:

- А. лимфома
- Б. лейомиома
- В. гастроинтестинальная стромальная опухоль
- Г. карциноид
- Д. плоскоклеточный рак

Показания к установке стентов в онкологии

- А. рефлюкс-эзофагит
- Б. дисфагия II-III степени
- В. сужение мочевыводящих путей
- Г. послеоперационные грыжи

Симптоматическая терапия пациентов с опухолями головного мозга включает все, кроме:

- А. Глюкокортикостероидные гормоны
- Б. Диуретики
- В. Нестероидные противовоспалительные препараты
- Г. Опиоидные анальгетики

При каком условии только лучевое лечение у больных раком тела матки является методом выбора.

- А. III стадия заболевания
- Б. недифференцированный рак эндометрия
- В. тяжелая сопутствующая патология
- Г. распространение опухоли на влагалище
- Д. все перечисленное выше

При операциях по поводу забрюшинных неорганных опухолей чаще всего используется:

- А. чрезбрюшинный доступ;
- Б. внебрюшинный доступ;
- В. торако-абдоминальный доступ;
- Г. брюшно-промежностный доступ;
- Д. двухподреберный доступ.

Характерный симптом стенозирующего рака пилорического отдела желудка

- А. Увеличение надключичного лимфатического узла
- Б. Шум плеска натошак
- В. Дисфагия
- Г. Мелена

Предраковыми изменениями при раке желудка являются

- А. гиперпластические полипы
- Б. хронический гастрит
- В. дисплазии
- Г. язва желудка
- Д. аденомы

В IБ группу диспансерного учёта включают больных:

- А. с предопухолевыми заболеваниями;
- Б. с подозрением на злокачественную опухоль;
- В. подлежащих радикальному лечению;
- Г. излеченных от онкологического заболевания;
- Д. подлежащих симптоматическому лечению.

К меланоопасным невусам следует отнести:

- А. веррукозный невус;
- Б. На Ло-невус;
- В. фиброэпителиальный невус;
- Г. невус Ота;
- Д. папилломатозный невус.

Одна инстиляция химиотерапевтического препарата после ТУР мочевого пузыря (не позднее 6 часов) снижает риск рецидива рака мочевого пузыря на:

- А. 0.8
- Б. 0.6
- В. 0.4
- Г. 0.2

Расщепленный курс лучевой терапии применяют для:

- А. повышения радиочувствительности опухоли;
- Б. защиты нормальных тканей;
- В. снижения числа рецидивов;
- Г. повышения дозы облучения;
- Д. улучшения результатов лечения.

Дайте точное определение остеосаркоме.

- А. злокачественная эпителиальная опухоль
- Б. злокачественная неэпителиальная опухоль
- В. злокачественная опухоль костной ткани неэпителиальной природы
- Г. злокачественная опухоль кости эпителиальной природы
- Д. опухоль костной ткани

При поражении лимфоузлов выше диафрагмы и селезенки при лимфомеХоджкина должна быть поставлена стадия:

- А. I;
- Б. II;
- В. III;
- Г. IV.

Для радионуклидной диагностики феохромоцитомы применяется радиофармпрепарат __

- А. ^{123}I -МИБГ
- Б. ^{123}I -гиппуран
- В. ^{123}I -йодид натрия
- Г. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -МИБИ (Технетрил)

Обязательным компонентом органосохраняющего лечения (после выполнения оперативного вмешательства) больных раком молочной железы является:

- А. гормонотерапия;
- Б. иммунотерапия;
- В. лазерная терапия;
- Г. лучевая терапия на оставшуюся часть молочной железы;
- Д. химиотерапия.

К доброкачественной опухоли пищевода неэпителиального происхождения относится:

- А. Полипы
- Б. Лейомима
- В. ГИСО
- Г. Аденома

Наиболее частые «ургентные» осложнения рака толстой кишки:

- А. перфорация.
- Б. кровотечение.
- В. абсцедирование.
- Г. непроходимость.
- Д. верно все

Опухоли спинного мозга, часто растущие по типу "песочных часов" это:

- А. Невриномы
- Б. Менингиомы
- В. Холестеатомы
- Г. Саркомы

Непосредственным трансформирующим действием обладают:

- А. активированные протоонкогены;
- Б. активированные гены-супрессоры;
- В. витамины;
- Г. активированные рецепторы;
- Д. транскрипционные факторы.

Эхографическим признаком перекрута яичка является

- А. увеличение размеров придатка яичка и резкое повышение эхогенности яичка
- Б. увеличение придатка и яичка, снижение эхогенности ткани яичка и придатка за счет появления множественных мелких гипо-и анэхогенных зон или гипозэхогенных зон больших размеров с нечеткой границей
- В. Отсутствие кровотока в яичковой артерии при доплерографии
- Г. уменьшение размеров придатка и яичка с повышением эхогенности их и явлениями атрофии

У больной 45 лет плоскоклеточный рак анального канала T2N0M0. С какого вида предпочтительно начать лечение:

- А. выполнение брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки
- Б. выполнение местного удаления опухоли
- В. проведение химиотерапии
- Г. проведение лучевой или химиолучевой терапии
- Д. проведение симптоматической терапии

Целью I фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является:

- А. изучение противоопухолевой активности цитостатика при разных видах опухоли;
- Б. определение допустимой для человека разовой и суммарной дозы цитостатика и спектра токсичности;
- В. сравнительное изучение нового агента с другими цитостатиками;
- Г. изучение возможных сочетаний с другими цитостатиками;
- Д. анализ экономических показателей лечения и уровня качества жизни.

Сочетанная лучевая терапия означает:

- А. облучение в сочетании с химиотерапией;
- Б. расщепление курса лучевой терапии;
- В. облучение с радиомодификатором;
- Г. применение двух способов облучения или двух видов излучения;
- Д. облучение в сочетании с гормонотерапией.

Аутоиммунный нервно-мышечный паранеопластический синдром у 30-60% больных ассоциирован с

- А. Внегонадной герминогенной опухолью
- Б. тимомой
- В. невриномой
- Г. лимфомой

Международная классификация болезней – это

- А. перечень наименований болезней в определенном порядке;
- Б. перечень диагнозов в определенном порядке;
- В. перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по определенному принципу;
- Г. документ, используемый как ведущая статистическая и классификационная основа в здравоохранении;
- Д. перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в определенном порядке.

В случае выявления злокачественного новообразования врач первичного онкологического кабинета должен:

- А. обязательно уведомить онкологический диспансер;
- Б. с информированного согласия пациента уведомить онкологический диспансер;
- В. с информированного согласия пациента уведомить специализированное федеральное учреждение;
- Г. обязательно уведомить специализированное федеральное учреждение;
- Д. информирование специализированного федерального учреждения законом не предусматривается.

Какая локализация экстранодальной инфильтрации наиболее типична для Т-клеточных лимфом

- А. Желудочно-кишечный тракт
- Б. кожа
- В. легкие
- Г. кости

Повышенные уровни серологических опухолеассоциированных маркеров однозначно свидетельствует о

- А. наличии злокачественного новообразования
- Б. наличии злокачественного новообразования или воспалительного заболевания
- В. обострении хронического воспалительного заболевания
- Г. необходимости углубленного обследования

Какие методы визуализации используются при выполнении вертебропластики

- А. компьютерная томография
- Б. УЗИ
- В. рентгеноскопия
- Г. магниторезонансная томография
- Д. сцинтиграфия

Наиболее часто встречающаяся морфологическая форма рака шейки матки

- А. плоскоклеточный рак
- Б. аденогенный рак
- В. саркома
- Г. светлоклеточный рак
- Д. ангиосклерома

Абсолютные противопоказания для выполнения органосохраняющих операций при саркомах длинных костей?

- А. патологический перелом
- Б. пожилой возраст
- В. врастание опухоли в магистральные сосуды
- Г. тотальное поражение мышечных и соединительно тканых структур в области поражения
- Д. метастатическое поражение легких

Плоскоклеточному раку чаще всего сопутствуют:

- А. болезнь Боуэна;
- Б. кератоакантома;
- В. сенильная кератома;
- Г. постлучевой дерматит;
- Д. веррукозный невус.

К наиболее частым интрамедулярным опухолям спинного мозга относятся следующие:

- А. Астроцитомы
- Б. Олигодендроглиомы
- В. Эпендимомы
- Г. Ангиоретикуломы

Ультразвуковым признаком рака желчного пузыря не является

- А. объемное образование в полости, стенке или вне ж. пузыря
- Б. неровные наружный и внутренний контуры в сочетании с неравномерными изменениями (утолщение, неоднородность и т. д.) стенки на фоне отсутствия клиники воспаления.
- В. неоднородный характер структуры, смешанная эхогенность.
- Г. перемещаемость структуры при изменении положения тела
- Д. все перечисленное неверно.

У пациента верифицирован гепатоцеллюлярный рак промежуточной стадии по BCLC. Узлы при этом чётко определены и портальный кровоток сохранен. Какой метод лечения рекомендован пациенту?

- А. Абляция
- Б. Системная терапия
- В. Трансартериальная химиоэмболизация
- Г. Резекция

У пациента латерально-распространяющаяся опухоль сигмовидной кишки размерами 3,5 см, гистологически подтвержденная как тубулярная аденома с фокусами высокодифференцированной аденокарциномы, с инвазией в пределах слизистой оболочки. Ваша тактика?

- А. Эндоскопическое удаление методом фрагментарной резекции слизистой оболочки
- Б. Эндоскопическое удаление методом петлевой резекции слизистой оболочки
- В. Эндоскопическое удаление методом эндоскопической резекции слизистой оболочки с диссекцией в подслизистом слое
- Г. Хирургическая резекция сигмовидной кишки
- Д. Химиотерапевтическое лечение

Какой из морфологических типов сарком костей не является радиорезистентной опухолью?

- А. Остеомаркома
- Б. Саркома Юинга
- В. Хондросаркома
- Г. Злокачественная гигантоклеточная опухоль

К Вам обратился пациент с диагнозом «стенозирующий рак пищевода T4N1M1», дисфагия III степени. Ваша тактика:

- А. Экстренная резекция пищевода с пластикой
- Б. Экстренная лучевая терапия по радикальной программе
- В. Эндоскопическое стентирование с решением вопроса о последующей лечебной тактике
- Г. Еюностомия

К симптомам интоксикации при неходжкинской лимфоме относятся:

- А. потеря веса, гипертермия (более 38°C);
- Б. потеря веса, профузная потливость;
- В. потеря веса, гипертермия (более 38°C), профузная потливость;
- Г. кожный зуд, потеря веса, профузная потливость;
- Д. гипертермия (более 38°C).

Абсолютным противопоказанием к лучевому лечению является:

- А. пожилой возраст;
- Б. молодой возраст;
- В. активный туберкулез;
- Г. ожирение;
- Д. сердечно-сосудистая недостаточность.

Злокачественные опухоли характеризуются

- А. наличием капсулы
- Б. инфильтративным ростом в окружающие органы и ткани
- В. снижением силы сцепления клеток
- Г. оттеснением окружающих тканей

Рекомендуемый режим индукционной химиотерапии при плоскоклеточных карциномах головы и шеи:

- А. DCF (TPF) - доцетаксел 75 мг/м² в/в в 1 й день + цисплатин 75 мг/м² в/в в 1 й день + 5 фторурацил 1000 мг/м²/сут. в/в 96 часовая инфузия в 1–4 й дни, каждые 3 нед.
- Б. TP - доцетаксел 75 мг/м² в/в в 1 й день + цисплатин 75 мг/м² в/в в 1 й день
- В. эрбитукс - начальная доза 400 мг/м², далее 250 мг/м² 1 раз в неделю
- Г. пембролизумаб 200 мг в/в 1 раз в 3 нед. или 400 мг 1 раз в 6 нед. до прогрессирования или неприемлемой токсичности

Органы-"мишени" метастазирования почечно-клеточного рака - это:

- А. легкие, кости, мозг, щитовидная железа, органы малого таза;
- Б. печень, органы малого таза, надпочечники;
- В. печень, кожа, мозг, органы мошонки;
- Г. молочные железы, печень - у женщин, органы мошонки, печень-у мужчин
- Д. надпочечники.

Наиболее часто рак ротоглотки локализуется

- А. В области задней стенки глотки
- Б. На границе с гортаноглоткой
- В. На боковой стенке глотки
- Г. В области небных миндалин

Для мелкоклеточного рака легкого характерно:

- А. составляет 10-15% в структуре заболеваемости рака легкого;
- Б. чаще всего к моменту постановки диагноза выявляют распространенный процесс;
- В. чувствительный к химиолучевой терапии;
- Г. все перечисленное верно.

Каков окончательный этап диагностики при предопухолевых и опухолевых заболеваниях шейки матки?

- А. цитологическое исследование
- Б. кольпоскопия.
- В. цервикоскопия.
- Г. биопсия шейки матки + выскабливание цервикального канала с гистологическим исследованием.

У больной 46 лет – рак яичника, асцит, плеврит. Стадия заболевания по классификации TNM – T3N1M1. Укажите стадию заболевания по классификации FIGO:

- А. IIC;
- Б. IIIA;
- В. IIIB;
- Г. IIIC;
- Д. IV.

Гистологическая классификация тимом средостения включает:

- А. тип А;
- Б. тип В (В1,В2 и В3);
- В. смешанная (АВ);
- Г. тип С (карцинома);
- Д. все перечисленное верно.

Для какого из перечисленных вариантов НХЛ наиболее характерен синтез моноклоновых Ig?

- А. Лимфоцитарная лимфома (лимфоцитомы)
- Б. Лимфома клеток мантийной зоны
- В. Лимфоплазмочитарная лимфома
- Г. Лимфома маргинальной зоны

Критериями отбора пациентов для эндоскопической резекции слизистой при раннем раке желудка являются:

- А. эндосонографическая оценка глубины инвазии опухоли;
- Б. диаметр опухоли;
- В. гистологический тип;
- Г. макроскопическая форма роста опухоли;
- Д. все перечисленные факторы.

Какой вариант пластического замещения мочевого пузыря после цистэктомии предполагает анастомоз мочевого резервуара с мочеиспускательным каналом

- А. ортотопическая пластика
- Б. гетеротопическая пластика
- В. формирование кондуита
- Г. уретерокутанеостомия
- Д. операция Брикера

Об инвазии мышечного слоя мочевого пузыря опухолью может свидетельствовать следующий эхографический признак:

- А. деформация внутреннего контура мочевого пузыря
- Б. резкое уменьшение объема мочевого пузыря;
- В. утолщение стенки мочевого пузыря в месте расположения опухоли
- Г. поражение мочеточниковых устьев;
- Д. поражение шейки мочевого пузыря.

К цитостатикам с преимущественно фазово-неспецифическим действием относятся:

- А. адриамицин;
- Б. платидиам;
- В. метотрексат;
- Г. алкилирующие агенты;
- Д. таксаны.

К наиболее часто встречающимся неэпителиальным опухолям желудка относят:

- А. Лимфома желудка
- Б. Солитарная фиброзная опухоль
- В. Гастроинтестинальная стромальная опухоль
- Г. Лейомиома

Частота внеорганных опухолей среди всех новообразований шеи составляет от:

- А. 3 до 5%;
- Б. 20 до 25%;
- В. 30 до 40%;
- Г. 50 до 60%;
- Д. более 60%.

Целью III фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является:

- А. определить краткосрочное и долгосрочное отношение /безопасность/эффективность для лекарственных форм активного компонента;
- Б. определение максимально переносимой дозы цитостатика;
- В. изучение противоопухолевой активности цитостатика и ее спектра при "сигнальных опухолях";
- Г. изучение возможных сочетаний с другими цитостатиками;
- Д. анализ экономических показателей лечения и уровня качества жизни.

Какие онкомаркеры используют для мониторинга при лечении плоскоклеточного рака пищевода?

- А. СА 72-4
- Б. SCC
- В. РЭА
- Г. СА 19-9

Ведущее значение в диагностике острого лейкоза имеет

- А. Наличие анемии
- Б. Увеличение периферических лимфоузлов
- В. Бластная инфильтрация костного мозга
- Г. Все перечисленное

При каких из перечисленных вариантов острого лейкоза отсутствует положительная реакция на миелопероксидазу и липиды

- А. M2
- Б. M6
- В. M5
- Г. L2

При первичной опухоли Tis-T1 рака пищевода оптимальным объемом лечения является:

- А. операция по типу IvorLewis
- Б. эндоскопическая резекция с диссекцией подслизистого слоя
- В. операция по типу McKewon
- Г. экстирпация пищевода

Современным стандартом радикального хирургического этапа лечения локализованного и местнораспространенного рака грудного отдела пищевода является

- А. Одномоментная субтотальная резекция с пластикой пищевода
- Б. Эзофагэктомия с формированием гастростомы и эзофагостомы, отсроченной пластикой
- В. Эзофагогастрэктомия
- Г. Сегментарная резекция пищевода

У больной 30 лет диагностирован инвазивный плоскоклеточный рак шейки матки на фоне беременности сроком 34 недели. Ваш выбор лечения

- А. лучевая терапия
- Б. искусственные преждевременные роды, потом операция
- В. операция с последующей лучевой терапией
- Г. кесарево сечение + лучевая терапия
- Д. кесарево сечение одномоментно с расширенной экстирпацией матки с придатками + лучевая терапия.

Стереотаксическая биопсия при метастатических опухолях головного мозга применяется при:

- А. Глубинное расположение опухоли
- Б. Расположение опухоли в функционально значимых зонах
- В. Пожилой возраст, минимальная неврологическая симптоматика
- Г. Все выше перечисленное

Какие из перечисленных химиопрепаратов являются основными при лечении саркомы Юинга?

- А. доксорубицин
- Б. митомицин С
- В. метотрексат
- Г. ифосфамид
- Д. таксотер

Операция выбора у мужчин молодого возраста, больных раком мочевого пузыря T2-T3a с локализацией опухоли вне шейки мочевого пузыря:

- А. резекция мочевого пузыря с лимфаденэктомией
- Б. трансуретральная резекция мочевого пузыря
- В. цистпростатэктомия с ортотопической пластикой мочевого пузыря
- Г. цистпростатэктомия с гетеротопической пластикой мочевого пузыря

Необходимо ли делать NGS исследование BRCA 1/2 у пациенток до 50 лет с семейным онкологическим анамнезом, при отсутствии тройного негативного подтипа опухоли

- А. нет
- Б. По желанию онколога
- В. По желанию пациента
- Г. да

Для достижения критической массы, несовместимой с жизнью, опухолевая клетка должна пройти следующее количество удвоений:

- А. 10;
- Б. 20;
- В. 30;
- Г. 40;
- Д. 50.

К высокоагрессивным Неходжскинским лимфомам относят

- А. лимфобластную
- Б. лимфому маргинальной зоны
- В. диффузную В-клеточную
- Г. фолликулярную лимфому
- Д. лимфому из клеток мантийной зоны

Консультативная помощь по ведению онкологического больного на дому осуществляется

- А. врачом первичного онкологического кабинета;
- Б. врачом первичного онкологического отделения;
- В. участковым терапевтом;
- Г. врачами первичного онкологического кабинета и отделения;
- Д. выездной службой хосписа.

У больной 48 лет, локализованный мелкоклеточный рак правого легкого T3N2M1 (метастатический плеврит). Определите тактику лечения больного:

- А. химиотерапия;
- Б. комбинированная химиолучевая терапия;
- В. хирургическое лечение с адъювантной химиолучевой терапией;
- Г. хирургическое лечение с адъювантной химиотерапией;
- Д. лучевая терапия.

Наиболее часто злокачественные опухоли яичка встречаются в возрасте:

- А. старше 80 лет;
- Б. от 40 до 60 лет;
- В. от 60 до 80 лет;
- Г. от 25 до 35 лет.

ПРИ НАЛИЧИИ КАКОГО ФАКТОРА РИСКА АДЪЮВАНТНАЯ ГОРМОНОТЕРАПИЯ ТАМОКСИФЕНОМ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАЗНАЧАЕТСЯ ДО 10 ЛЕТ

- А. G2
- Б. Ki67<10%
- В. положительный край резекции
- Г. T3-4

Какой вариант лечения адекватен при немелкоклеточном раке легкого в стадии T1-2 N1 M0

- А. хирургический
- Б. операция в сочетании с лучевой терапией
- В. операция в сочетании с химиотерапией
- Г. операция в сочетании с лучевой и химиотерапией

У пациента рак антрального отдела желудка T1b1N0M0 размерами 2,5 см, без изъязвления. Наиболее предпочтительная лечебная тактика:

- А. Субтотальная дистальная резекция желудка
- Б. Химиотерапия
- В. Эндоскопическая резекция слизистой оболочки с диссекцией в подслизистом слое
- Г. Эндоскопическая резекция слизистой оболочки

У больного 24 лет в верхнем переднем средостении определяется богато-васкуляризированное опухолевое образование размерами 6,4 x 7,3 см в диаметре с неровными контурами, с инвазией перикарда. Отмечается резкое увеличение уровня хорионгонадотропина (ХГ) и а-фетопroteина (а-FP) в сыворотке крови. Лимфатические узлы шеи и средостения не увеличены. Определите тактику лечения больного:

- А. хирургическое удаление опухоли с резекцией перикарда;
- Б. комбинированное хирургическое лечение с адъювантной лучевой терапией;
- В. химиотерапия, включающая препараты: цисплатин, этопозид, блеомицин с последующим удалением резидуальной опухоли;
- Г. лучевая терапия СОД = 60 Гр;
- Д. химиолучевая терапия.

Больная раком молочной железы в течение 2-х лет принимала тамоксифен. Появились сукровичные выделения из половых путей. Ваша тактика.

- А. увеличить дозу тамоксифена
- Б. отменить тамоксифен через 2 недели
- В. гемостатическая терапия
- Г. гистероцервикоскопия с прицельной биопсией эндометрия

Гормонотерапия рака предстательной железы направлена на:

- А. повышение уровня тестостерона;
- Б. снижение уровня эстрогенов;
- В. снижение уровня прогестерона;
- Г. снижение уровня АКТГ (адренокортикотропный гормон);
- Д. снижение уровня тестостерона и/или блокирование воздействия циркулирующих андрогенов на андрогеновые рецепторы предстательной железы.

При какой из перечисленных НХЛ наиболее часто встречаются экстранодальные поражения:

- А. Диффузная крупноклеточная лимфома
- Б. Фолликулярная лимфома
- В. Лимфома маргинальной зоны
- Г. Лимфома мантийной зоны

Раннее метастазирование в лёгкие наиболее характерно для:

- А. рака шейки матки;
- Б. хориокарциномы матки;
- В. рака яичника;
- Г. рака вульвы;
- Д. рака влагалища.

К сфинктеросохраняющим операциям при раке прямой кишки относятся:

- А. брюшно-анальная резекция прямой кишки с резекцией внутреннего сфинктера
- Б. низкая внутрибрюшная резекция
- В. брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной в анальный канал с избытком
- Г. внутрибрюшная резекция прямой кишки
- Д. все вышеперечисленные

Какой объем операции производится при I- II стадиях рака гортани

- А. Резекция гортани
- Б. Лярингэктомия
- В. Ляринг-фарингэктомия
- Г. Полиорганный резекция глотки

Пациенту 55 лет с раком языка $T_3N_1M_0$ рекомендуется

- А. Фасциально-фулярное иссечение клетчатки шеи
- Б. Проведение лучевой терапии до СОД 66-70 Гр
- В. Индукционная химиотерапия (по схеме TPF) с последующей лучевой терапией до СОД 45-50 Гр
- Г. Хирургическое лечение с последующей лучевой или химиолучевой терапией

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин может выбирать медицинскую организацию ____ в год

- А. 1 Раз
- Б. 4 Раза
- В. 2 Раза
- Г. 3 Раза

Радикальная мастэктомия по мэддену при раке молочной железы характеризуется

- А. Удалением обеих грудных мышц
- Б. Сохранением обеих грудных мышц
- В. Сохранением малой грудной мышцы
- Г. Сохранением большой грудной мышцы

Наиболее характерным признаком периферического рака легкого является

- А. Кровохарканье
- Б. Кашель с гнойной мокротой и примесью крови
- В. Округлая тень с неровными контурами
- Г. Затемнение треугольной формы в прикорневой зоне

Наличие инфильтрации меланомы до ретикулярного слоя кожи указывает на ____ степень инвазии по clark

- А. III
- Б. V
- В. IV
- Г. II

Опасность возникновения кардиотоксичности более вероятна при лечении трастузумабом в комбинации с

- А. Винорелбином
- Б. Паклитакселом
- В. Антрациклинами
- Г. Фторурацилом

Наличие клеток березовского – штенберга характерно для

- А. Лимфоцитарной лимфосаркомы
- Б. Иммунобластной лимфосаркомы
- В. Лимфомы Беркитта
- Г. Лимфомы Ходжкина

Решающим методом обследования для выявления саркомы мягких тканей является

- А. Ультразвуковое исследование
- Б. Рентгенологическое исследование
- В. Ангиография
- Г. Биопсия прощупываемого образования

Основным опухолевым маркером при раке яичников является

- А. АФП
- Б. СА 15-3
- В. СА-125
- Г. СА 19-9

Радикальный режим химиотерапии назначается с целью

- А. Продления жизни и улучшения её качества
- Б. Достижения ремиссии опухолевого процесса
- В. Полной эрадикации опухоли
- Г. Профилактики рецидивов после завершения основного курса

К ранним лучевым осложнениям относят реакции, развивающиеся не позднее _____ месяцев после облучения

- А. 2
- Б. 6
- В. 3
- Г. 12

Наиболее частой гистологической формой рака мочевого пузыря является

- А. Мелкоклеточный рак
- Б. Аденокарцинома
- В. Плоскоклеточный рак
- Г. Переходноклеточный рак

Диагноз и все последующие разделы медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма №025/у), заполняются

- А. Медицинским регистратором
- Б. Медицинской сестрой
- В. Лечащим врачом
- Г. Заведующим отделением

Символ «n» в классификации tnm принят для обозначения состояния

- А. Любых групп лимфатических узлов
- Б. Всех групп лимфатических узлов выше или ниже диафрагмы
- В. Только регионарных лимфатических узлов
- Г. Метастазов в отдалённые органы

Основным побочным действием таргетной терапии при меланоме кожи является

- А. Появление телеангиэктазий
- Б. Появление плоскоклеточного рака кожи
- В. Почечная недостаточность
- Г. Появление гемангиомы

Местнодеструктивным ростом в гинекологической патологии обладает

- А. Фиброма
- Б. Эндометриоз
- В. Лейомиома
- Г. Киста

Начало развития заболевания при раке предстательной железы характеризуется

- А. Выраженным болевым синдромом
- Б. Острой задержкой мочи
- В. Ранним появлением дизурических расстройств
- Г. Длительным бессимптомным течением

Основным методом лечения рака желудка является

- А. Иммунотерапия
- Б. Химиотерапия
- В. Лучевая терапия
- Г. Хирургический

К методу цитологической верификации заболеваний поджелудочной железы относят

- А. Пункционно-аспирационную (тонкоигольную) биопсию
- Б. Эндоскопическое исследование желудка
- В. Лапаротомию
- Г. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

Дозиметрический контроль пациентов при радиойодтерапии проводят с использованием

- А. Детекторов гамма-излучения
- Б. Позитронных томографов
- В. Инфракрасных камер
- Г. Масс-спектрометров

Поражение шейных лимфоузлов справа, медиастинальных лимфоузлов и аксиллярных слева при лимфоме соответствует _____ стадии

- А. III
- Б. IV
- В. II
- Г. I

Выявленные при раке желудка увеличенные лимфатические узлы левой надключичной области носят название метастаз

- А. Крукенберга
- Б. Сестры Марии Джозеф
- В. Шницлера
- Г. Вирхова

Типовой операцией при раке ректосигмоидного отдела прямой кишки является

- А. Операция Гартмана
- Б. Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
- В. Левосторонняя гемиколэктомия
- Г. Передняя резекция прямой кишки

При удалении пигментного невуса разрез необходимо выполнять, отступив от границ пятна на

- А. 2 Мм
- Б. 2-3 См
- В. 1 См
- Г. 3-4 Мм

Что не характерно для фолликулярной лимфомы?

- А. Пятилетняя безрецидивная выживаемость более 50%
- Б. Отношение к индолентным лимфомам
- В. Применение препарата брентуксимаб ведотин
- Г. Соблюдение принципа «наблюдай и жди»

В общей структуре злокачественных опухолей рак щитовидной железы составляет примерно (в процентах)

- А. 10-12
- Б. 20-22
- В. 30-32
- Г. 1-2

При раке прямой кишки колоноскопия не позволяет выявить

- А. Сужение просвета кишки
- Б. Морфологическую структуру опухоли
- В. Канцероматоз органов брюшной полости
- Г. Форму роста опухоли

При гормонорезистентном раке предстательной железы эффективно сочетание

- А. Кабазитаксела+преднизолона
- Б. Блеомицина+винбластина
- В. Оливомицина+циклофосфамида
- Г. Фторурацила+циклофосфамида

К какому направлению первичной профилактики злокачественных новообразований относят применение вакцины против гепатита в?

- А. Медико-генетическому
- Б. Эндокринно-возрастному
- В. Иммунобиологическому
- Г. Биохимическому

Больная с фиброаденомой молочной железы относится к/ко _____ клинической группе

- А. 1Б
- Б. III
- В. II
- Г. 1А

Под преинвазивным раком лёгкого понимают опухоль, которая не распространяется за пределы

- А. Поверхностного эпителиального слоя
- Б. Базальной мембраны эпителиального пласта
- В. Мышечного слоя стенки бронха
- Г. Подслизистого слоя стенки бронха

Большинство доброкачественных центральных опухолей лёгких составляют

- А. Тератомы
- Б. Аденомы бронха
- В. Сосудистые опухоли
- Г. Папилломы бронха

Клетками иммунной системы, участвующими в стимуляции опухолевого роста, являются

- А. CD8+ цитотоксические Т-лимфоциты
- Б. Дендритные клетки
- В. M2 макрофаги
- Г. M1 макрофаги

Комплекс медицинских мероприятий, направленных на выявление больных с предраковыми заболеваниями, с последующим их оздоровлением и наблюдением за ними называют _____ профилактикой

- А. Первичной
- Б. Четвертичной
- В. Третичной
- Г. Вторичной

Рак кожи волосистой части головы размерами более 5 см без деструкции костей черепа и регионарных метастазов соответствует ____ стадии

- А. IV
- Б. II
- В. Ia
- Г. III

Наиболее частым клиническим проявлением гепатоцеллюлярного рака является

- А. Иктеричность кожных покровов
- Б. Гепатомегалия
- В. Синдром астении-кахексии
- Г. Лихорадка

К одной из основных категорий жизнедеятельности онкобольного относят способность к

- А. Самореализации
- Б. Обобщению
- В. Совершенствованию
- Г. Самообслуживанию

При заболевании работника в период очередного оплачиваемого отпуска оформляется

- А. Листок нетрудоспособности до окончания отпуска
- Б. Листок нетрудоспособности на весь период временной утраты трудоспособности вследствие заболевания
- В. Справка установленного образца
- Г. Листок нетрудоспособности со дня предполагаемого выхода на работу

Оптимальной химиотерапевтической схемой лечения местнораспространенного нерезектабельного рака поджелудочной железы при удовлетворительном состоянии больного является

- А. BEACOPP
- Б. FOLFIRINOX
- В. FOLFIRI
- Г. ELF

При раке лёгкого t3n0m0 больному показано

- А. Лечение цитостатиками
- Б. Проведение лучевой терапии
- В. Комбинированное цитостатическое и радиологическое лечение
- Г. Хирургическое лечение

Медицинской организации присваивается статус клинической, если на базе организации

- А. Ведется научно-исследовательская деятельность
- Б. Проводится подготовка информационно-аналитических материалов
- В. Проводятся клинические испытания
- Г. Осуществляется практическая подготовка медицинских работников

В случае доброкачественной эндобронхиальной опухоли на широком основании с признаками воспалительных изменений в бронхах оптимальным вариантом является двухэтапное хирургическое лечение с применением в качестве первого этапа

- А. Ультразвуковой деструкции
- Б. Электрорезекции
- В. Криодеструкции
- Г. Лазерной выпаризации

Лентиго-меланома обычно развивается на фоне

- А. Меланоза Дюбрейля
- Б. Гигантского пигментного невуса
- В. Неизмененной кожи
- Г. Пограничного невуса

Основным методом диагностики рака щитовидной железы до операции является

- А. Ультразвуковое исследование
- Б. Сцинтиграфия
- В. Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия
- Г. Пальпация

К абсолютным противопоказаниям для лучевой терапии рака пищевода относят

- А. Локализацию опухоли в верхнегрудном и шейном отделах пищевода
- Б. Эндоскопически определяемые признаки перфорации
- В. Выраженную дисфагию
- Г. Протяженность поражения более 8 см

Основным диагностическим методом при синдроме верхней полой вены является

- А. Позитронная эмиссионная томография
- Б. Ангиография
- В. Рентгенологическое исследование грудной клетки
- Г. УЗИ сонных и надключичных вен

Ионизирующие излучения используются при

- А. Электромагнитной терапии
- Б. Гипертермии
- В. Гипотермии
- Г. Радионуклидной терапии с радиофармпрепаратами

При раке поджелудочной железы метастазы в первую очередь появляются в

- А. Печени
- Б. Лёгких
- В. Костях
- Г. Надпочечниках

Клиническим проявлением начальных форм рака пищевода является

- А. Осиплость голоса
- Б. Мучительный кашель, сопровождающийся кровохарканьем
- В. Чувство царапанья за грудиной или прилипания при проглатывании пищи
- Г. Дисфагия II-III степени

Противопоказанием к лучевому лечению больных раком шейки матки является

- А. Молодой возраст
- Б. Кольпит
- В. Прорастание смежных с шейкой матки полостных органов
- Г. Миома матки больших размеров

К признакам злокачественной трансформации пигментных пятен (правило abcd) относится

- А. Однородность окраски
- Б. Размеры пятна более 3 мм
- В. Асимметрия
- Г. Четкость контуров

Химиотерапия наиболее эффективна при _____ лёгкого

- А. Плоскоклеточном неороговевающем раке
- Б. Мелкоклеточном раке
- В. Плоскоклеточном ороговевающем раке
- Г. Аденокарциноме

Согласно классификации по системе тпм (для центрального рака легкого) т2 соответствует поражение

- А. Сегментарного бронха
- Б. Главного бронха, проксимальный край опухоли в 2,3 см от карины
- В. Субсегментарного бронха
- Г. Главного бронха + метастатический плеврит

Метастаз крукенберга является

- А. Гематогенным
- Б. Имплантационным
- В. Лимфогенным ортоградным
- Г. Лимфогенным ретроградным

Для установления диагноза злокачественной опухоли слюнной железы необходимо выполнить

- А. Ангиографию
- Б. Компьютерную томографию
- В. Биопсию с морфологическим исследованием
- Г. Сиалографию

При подозрении на наличие опухоли брюшной полости или забрюшинного пространства у детей первым исследованием, которое выполняется, является

- А. МРТ
- Б. УЗИ
- В. Выделительная урография
- Г. КТ

Пальпаторно узловая фиброзно-кистозная мастопатия определяется как образование

- А. Мягкоэластической консистенции, с чёткими границами
- Б. Плотно-эластической консистенции, без чётких границ с зернистой поверхностью
- В. Плотной консистенции, бугристое, безболезненное, с чёткими границами
- Г. Плотно-эластической консистенции с гладкой поверхностью, чёткими границами, смещаемое

К признакам злокачественного перерождения пигментной пренеоплазмы относят

- А. Наличие четких контуров
- Б. Изъязвление поверхности, кровоточивость
- В. Однородную пигментацию
- Г. Похолодание в пигментном очаге

Какие характеристики неходжкинских злокачественных лимфом определяют стратегию лечения?

- А. Наличие экстранодальных поражений
- Б. Степень распространения процесса (стадия)
- В. Наличие или отсутствие симптомов интоксикации
- Г. Степень злокачественности по морфологическим критериям

Регионарной химиотерапией является

- А. Внутриполостное введение цитостатиков при наличии специфического плеврита или асцита
- Б. Перитуморальные подкожные введения цитостатиков при наличии специфических опухолевых язв
- В. Прием цитостатиков внутрь при наличии опухоли желудка
- Г. Внутриартериальное введение цитостатиков при первичном раке печени или ее метастатическом поражении

Доброкачественным процессом с наименьшим риском малигнизации считают

- А. Лентиго
- Б. Внутридермальный невус
- В. Пигментную ксеродерму
- Г. Меланоз Дюбрейля

[Вернуться в начало](#)