

Тесты с вопросами по специальности «Онкология» для аттестации 1 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/onkolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Онкология» для аккредитации и других экзаменов (3100 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/onkologiya/

2) Онкология (ситуационные задачи)

→ medik-otvet.ru/product/onkolog-situacia/

3) Радиология — тесты с ответами

→ medik-otvet.ru/product/radiolog/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Необходимо ли сохранять генетический материал молодым пациенткам до 35 лет, перед химиотерапией, при нереализованной репродуктивной функцией

А. нет

Б. Только если она замужем

В. да

Г. Если ПХТ высокой степени овариальной токсичности

Какие анти-PD1 препараты зарегистрированы в РФ для терапии метастатического рака желудка:

- А. пембролизумаб
- Б. ниволумаб
- В. ипилимумаб
- Г. атезолизумаб

Оптимальное время начала проведения адъювантной химиотерапии после хирургического лечения при раке желудка:

- А. 3-6 недель после операции
- Б. Через 12 недель после операции
- В. 8-12 недель после операции
- Г. 2-3 недели после операции

В течение какого периода времени после операции проводится адъювантная терапия меланомы кожи с использованием BRAF/MEK-ингибиторов?

- А. 24 месяца
- Б. 3 месяца
- В. 6 месяцев
- Г. 12 месяцев

Является ли обязательной D2-лимфодиссекция (удаление групп лимфоузлов №1-12) в хирургии «раннего» рака желудка...

- А. Да, поскольку частота метастазирования в регионарные лимфоузлы желудка после операций по поводу «раннего» рака составляет 5-15%.
- Б. Нет, поскольку «ранний» рак желудка предполагает наличие опухоли в пределах слизистого-подслизистого слоя без метастазов.
- В. Лимфодиссекция D2 выполняется по индивидуальным показаниям, либо в соответствии с установками, принятыми в данной хирургической клинике.
- Г. Все перечисленное.
- Д. Ничего из указанного.

По классификации TNM (8 издание) для рака полости рта символ N2a означает

- А. Метастазы в одном ЛУ шеи на стороне поражения ≤ 3 см и ENE+, или >3 см, но <6 см в наибольшем измерении, ENE отсутствует
- Б. Метастазы в ЛУ шеи с обеих сторон или с противоположной стороны <6 см в наибольшем измерении, ENE отсутствует
- В. Метастазы в ЛУ шеи >6 см в наибольшем измерении и ENE отсутствует
- Г. Метастаз в одном ипсилатеральном ЛУ шеи >3 см и ENE+

Для выбора эндокринотерапии рака молочной железы оптимальным является следующее сочетание рецепторов стероидных гормонов:

- А. РЭ+РП+
- Б. РЭ+РП-
- В. РЭ-РП+
- Г. РЭ-РП-
- Д. рецепторный статус роли не играет

ЧТО ТАКОЕ ОПЕРАЦИЯ ГАРТМАНА?

- А. резекция дистального отдела сигмовидной кишки и верхнеампулярного отдела прямой кишки с выведением одноствольной сигмостомы
- Б. закрытие илеостомы
- В. низкая передняя резекция прямой кишки
- Г. резекция сигмовидной и прямой кишки без формирования колостомы

Какой из молекулярно-биологических подтипов рака молочной железы встречается чаще всего:

- А. люминальный
- Б. тройной негативный
- В. базальноподобный
- Г. HER2 положительный

Противопоказанием для выполнения мультиспиральной компьютерной томографии в режиме коронарографии является:

- А. дыхательная аритмия
- Б. мерцательная аритмия
- В. наличие кардиостимулятора
- Г. непереносимость йод-содержащих контрастных препаратов

У пациента 46 лет рак предстательной железы cT2aN0M0, Gleason 7 (4+3), PSA общ.16 нг/мл. Рекомендуемое лечение:

- А. Гормонотерапия
- Б. радикальная простатэктомия
- В. радикальная простатэктомия + гормонотерапия
- Г. радикальная простатэктомия + лучевая терапия
- Д. Химиотерапия

У БОЛЬНОГО 69 ЛЕТ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК НИЖНЕЙ НОСОВОЙ РАКОВИНЫ ПЕРВОЙ СТАДИИ. ИЗ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО

- А. хирургическое лечение
- Б. дистанционная гамма-терапия
- В. внутритканевая гамма-терапия
- Г. сочетанная лучевая терапия

Какой из отделов ободочной кишки наиболее часто поражается раком?

- А. Слепая кишка.
- Б. Восходящая ободочная кишка.
- В. Поперечная ободочная кишка.
- Г. Нисходящая ободочная кишка.
- Д. Сигмовидная кишка

Анализ на СА 125 женщинам репродуктивного возраста следует сдавать

- А. в любую фазу цикла
- Б. во вторую фазу цикла
- В. в первую фазу цикла
- Г. вопрос не изучен

Для какой цели выполняется исследование РЭА при выявлении опухоли толстой кишки:

- А. Подтверждение наличия опухоли ободочной кишки
- Б. Определение чувствительности опухоли к химиотерапии
- В. Установление исходного уровня РЭА для использования этого маркера при наблюдении за больным после окончания специального лечения
- Г. Определение гистологического варианта опухоли
- Д. Определение объема хирургического вмешательства

В понятие трофобластической болезни входят все перечисленные формы, кроме:

- А. Пузырный занос
- Б. Трофобластическая опухоль плацентарного ложа
- В. Неразвивающаяся беременность
- Г. Хориокарцинома
- Д. Эпителиоидная трофобластическая опухоль

При платино-резистентном рецидиве нерезектабельного или метастатического плоскоклеточного рака головы/шеи могут быть назначены следующие препараты:

- А. Пембролизумаб
- Б. Ниволумаб
- В. Цетуксимаб
- Г. Все вышеперечисленные

Базальноклеточный рак наиболее часто локализуется на коже

- А. волосистой части головы
- Б. Лица
- В. верхних конечностей
- Г. нижних конечностей
- Д. туловища

При расширенной экстирпации матки с придатками удаляют все перечисленные лимфоузлы, кроме:

- А. Параметральных
- Б. Запирательных
- В. Наружных и внутренних подвздошных
- Г. Парааортальных
- Д. Общих подвздошных

НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ОНКОМАРКЕРАМИ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ ОНКОМАРКЕРЫ

- А. ХГЧ, АФП, РЭА.
- Б. СА 15-3, МUC1, ПСА
- В. СА19-9, SCC, CA50
- Г. СА 125, HE4, индекс ROMA

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. раздельное диагностическое выскабливание
- Б. лапароскопия
- В. биопсия шейки матки
- Г. УЗИ органов малого таза

Плоскоклеточный рак кожи чаще всего развивается на фоне

- А. болезнь Боуэна
- Б. кератоакантома
- В. актинический кератоз
- Г. постлучевой дерматит
- Д. веррукозный невус

Облигатным предраком прямой кишки является:

- А. Аденоматозные полипы;
- Б. Болезнь Крона;
- В. Неспецифический язвенный колит;
- Г. Диффузный семейный полипоз;
- Д. Ворсинчатая опухоль.

ОБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ЛИТИЧЕСКИМ МЕТАСТАЗОМ РАКА В ПОЗВОНОК С УГРОЗОЙ ЕГО ПЕРЕЛОМА БЕЗ КОМПРЕССИИ СПИННОГО МОЗГА МОЖНО СЧИТАТЬ

- А. декомпрессивную операцию
- Б. лучевую терапию
- В. вертебропластику
- Г. лекарственную терапию

Методы диагностики, применяемые при обследовании пациента с узловым образованием в щитовидной железе:

- А. ультразвуковое исследование шеи
- Б. анализ крови на ТТГ
- В. тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ
- Г. все вышеперечисленные

Среди симптомов рака ободочной кишки для опухолей правой половины наиболее характерно:

- А. боли в правой половине живота
- Б. обтурационная кишечная непроходимость.
- В. примесь крови в кале.
- Г. похудание.
- Д. прогрессирующая анемия.

Абсолютным противопоказанием к лучевому лечению является

- А. пожилой возраст
- Б. молодой возраст
- В. активный туберкулез
- Г. ожирение
- Д. сердечно-сосудистая недостаточность

Целью II фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является

- А. определение максимально переносимой дозы препарата
- Б. сравнительное изучение с другими препаратами
- В. доказать клиническую эффективность лекарственного средства у определенной группы пациентов, оценить краткосрочную безопасность активного ингредиента, определение уровня терапевтической дозы препарата и схемы дозирования
- Г. изучение возможных сочетаний с другими препаратами
- Д. анализ экономических показателей лечения и уровня качества жизни

Укажите прогностически наиболее неблагоприятную морфологическую форму рака легкого

- А. мелкоклеточный рак
- Б. крупноклеточный рак
- В. немелкоклеточный рак БДУ /БДУ=БезДополнительныхУточнений/
- Г. плоскоклеточный рак БДУ /БДУ=БезДополнительныхУточнений/
- Д. аденокарциномаБДУ /БДУ=БезДополнительныхУточнений/

БИОПСИЮ САРКОМ КОСТЕЙ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ В ОБЛАСТИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ

- А. рецидива
- Б. отдаленных метастазов
- В. послеоперационных осложнений
- Г. свищевого хода

Какой объем удаляемых лимфоузлов включает двухзональная лимфодиссекция (2F)

- А. Лимфодиссекция D2 в брюшной полости и лимфодиссекция в грудной клетки с удалением лимфатических узлов верхнего средостения по ходу возвратногортанных нервов и аортального окна
- Б. Лимфодиссекция D2 в брюшной полости с удалением лимфоузлов до уровня бифуркации трахеи
- В. Лимфодиссекция D2 в брюшной полости с удалением бифуркационных и паратрахеальных лимфоузлов

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН ПРИ РАКЕ ГОРТАНЕ

- А. доксорубицин
- Б. блеомицин
- В. цисплатин
- Г. метотрексат

Большинство доброкачественных центральных опухолей легкого составляют

- А. Аденомы
- Б. папилломы
- В. сосудистые опухоли
- Г. тератомы
- Д. Гамартомы

Наиболее частым морфологическим вариантом рака толстой кишки является:

- А. Аденокарцинома
- Б. Солидный рак
- В. Недифференцированный рак
- Г. Плоскоклеточный рак
- Д. Карциноид

Целью III фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является

- А. определить краткосрочное и долгосрочное отношение /безопасность/эффективность для лекарственных форм активного компонента
- Б. определение максимально переносимой дозы препарата
- В. изучение противоопухолевой активности препарата и его спектра при "сигнальных опухолях"
- Г. изучение возможных сочетаний с другими препаратами
- Д. анализ экономических показателей лечения и уровня качества жизни

Наиболее редко рак молочной железы диагностируется в:

- А. Нижне-внутреннем квадранте;
- Б. Верхне-внутреннем квадранте;
- В. Верхне-наружном квадранте;
- Г. Нижне- наружном квадранте.
- Д. Добавочной дольке

КАКИЕ РЕГИОНАРНЫЕ ЛИМФОУЗЛЫ ПОРАЖАЮТСЯ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ?

- А. подвздошные лимфоузлы
- Б. надключичные лимфоузлы
- В. подмышечные лимфоузлы
- Г. паховые лимфоузлы

Ведущим методом диагностики меланомы кожи является:

- А. радиофосфорная проба
- Б. постлучевая меланурия (реакция Якша)
- В. морфологический метод
- Г. Термография
- Д. компьютерная томография

Анализ биоптатов рака толстой кишки на мутацию RAS (экзоны 2,3,4 генов KRAS и NRAS) необходим для определения:

- А. Прогноза заболевания
- Б. Объема хирургического вмешательства
- В. Тактики лекарственного лечения при метастатическом раке
- Г. Радикальности оперативного вмешательства
- Д. Ничего из перечисленного

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВЫ И ШЕИ

- А. доцетаксел + цисплатин + 5-фторурацил
- Б. оливамицин + циклофосфан
- В. винбластин + блеомицин
- Г. циклофосфан + метотрексат + 5-фторурацил

У больного 60 лет рак околоушной слюнной железы 1 стадии. Наиболее целесообразным методом лечения является

- А. комбинированное лечение с предоперационной дистанционной лучевой терапией
- Б. комбинированное лечение с послеоперационной дистанционной лучевой терапией
- В. сочетанная лучевая терапия
- Г. только хирургическое лечение
- Д. только лучевая терапия

Основная цель радикальной лучевой терапии

- А. достижение полной эрадикации опухоли
- Б. вызов гибели наиболее чувствительных опухолевых клеток
- В. достижение частичной регрессии опухоли
- Г. снижение биологической активности опухолевых клеток
- Д. подведение максимальной очаговой дозы

Применение какого препарата чаще всего ассоциируется с возникновением тромбозов глубоких вен нижних конечностей?

- А. оральных контрацептивов
- Б. антибиотиков группы фторхинолонов
- В. нестероидных анальгетиков
- Г. Антидепрессантов

В КАКОЙ ОРГАН ЧАСТО ДАЕТ МЕТАСТАЗЫ РАК ПРЯМОЙ КИШКИ?

- А. печень
- Б. легкие
- В. кости
- Г. головной мозг

Какие 3 симптома служат основанием для установления стадии «В» у больных лимфомами?

- А. головная боль, слабость, снижение аппетита
- Б. кожный зуд, гипертермия (выше 38°C) в течение 3 дней без признаков воспаления, незапланированная потеря массы тела более 10% за последние 6 мес.
- В. гипертермия (выше 38°C) в течение 3 дней без признаков воспаления, ночные профузные поты, незапланированная потеря массы тела более 10% за последние 6 мес.
- Г. «алкогольные» боли в лимфоузлах, гипертермия (выше 38°C) в течение 3 дней без признаков воспаления, незапланированная потеря массы тела более 10% за последние 6 мес.
- Д. слабость, снижение аппетита, незапланированная потеря массы тела более 10% за последние 6 мес.

При первичной неходжкинской лимфоме желудочно-кишечного тракта наиболее часто поражается:

- А. желудок
- Б. пищевод
- В. подвздошная кишка
- Г. ободочная кишка
- Д. прямая кишка

Благоприятным прогностическим признаком при высокодифференцированном раке щитовидной железы является:

- А. возраст младше 45 лет
- Б. мужской пол
- В. возраст старше 45 лет
- Г. минимальный выход опухоли за пределы капсулы щитовидной железы
- Д. локализация опухоли в средних отделах доли щитовидной железы

Цель общения с пациентом в терминальной стадии опухолевого процесса

- А. вселить надежду на выздоровление,
- Б. отвлечь от мыслей о надвигающейся смерти,
- В. избавить от неопределенности и придать новое значение отношениям с окружающими.
- Г. сообщить информацию о состоянии, угрожающем жизни пациента

Для подбора оптимального режима терапии при метастатическом раке толстой кишки необходимо исследование:

- А. Молекулярно-генетическое исследование для выявления мутаций в генах BRCA 1/2.
- Б. Гистологическое заключение с определением числа пораженных лимфоузлов
- В. Гистологическое заключение с определением морфологического типа опухоли, молекулярно-генетическое исследование для выявления мутаций в генах KRAS, NRAS, BRAF.
- Г. Гистологическое заключение с определением морфологического типа опухоли и ее злокачественности

ДЕСЭМБРИОНАЛЬНОЙ ОПУХОЛЬЮ ШЕИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. хемодектома
- Б. менингиома
- В. хордома
- Г. бронхиогенный рак

После радикальной нефрэктомии по поводу рака почки T2N0M0 II стадии показано:

- А. профилактическая таргетная терапия
- Б. профилактическая лучевая терапия
- В. профилактическая гормонотерапия
- Г. адъювантная иммунотерапия
- Д. динамическое наблюдение

Противопоказанием для трансторакальной игловой биопсии очага в легком является:

- А. подозрение на опухоль легкого
- Б. возможный туберкулез легкого
- В. буллезная эмфизема
- Г. плевральные шварты

Основная роль в лечении трофобластических опухолей принадлежит:

- А. Хирургическому лечению
- Б. Вакцинотерапии
- В. Лекарственному лечению
- Г. Лучевому лечению
- Д. Все вышеперечисленное

Наиболее часто встречающийся гистологический тип злокачественных опухолей щитовидной железы

- А. папиллярный рак
- Б. фолликулярный рак
- В. медуллярный рак
- Г. недифференцированный рак
- Д. плоскоклеточный рак

При прогрессировании на оксалиплатин-содержащем режиме химиотерапии в последующей линии рекомендовано использование режимов на основе:

- А. Ингибиторов ароматазы
- Б. Антрациклинов
- В. Иринотекана
- Г. Паклитаксела

При подозрении на метастатическое поражение печени при раке толстой кишки необходимо выполнить:

- А. КТ брюшной полости с контрастным усилением
- Б. УЗИ органов брюшной полости
- В. Обзорную рентгенографию органов брюшной полости
- Г. Колоноскопию

К отдаленным лимфогенным метастазам при раке шейки матки относятся метастазы в лимфатические узлы (TNM8)

- А. не один из выше перечисленных
- Б. Внутренние подвздошные
- В. Наружные подвздошные
- Г. Парааортальные
- Д. Общие подвздошные

Фармакодинамика это

- А. раздел фармакологии, изучающий локализацию, механизм действия и фармакологические эффекты лекарственных средств, силу и длительность их воздействия
- Б. раздел фармакологии и патофизиологии, изучающий локализацию, механизм действия и фармакологические эффекты лекарственных средств, силу и длительность их воздействия
- В. это результат относительной избирательности действия лекарственных средств, которая характеризует их способность воздействовать на чувствительные мишени, не связанные с реализацией терапевтического фармакологического эффекта
- Г. раздел фармакологии, изучающий механизм действия лекарственных средств

Оптимальным вариантом хирургического вмешательства при высокодифференцированном раке щитовидной железы, при опухоли более 2 см в диаметре является:

- А. гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка
- Б. тиреоидэктомия
- В. энуклеация опухолевого узла
- Г. резекция пораженной доли щитовидной железы
- Д. резекция щитовидной железы по Николаеву

Определение экспрессии какого биомаркера при нерезектабельном/метастатическом раке желудка является обязательным для выбора 1 линии лекарственного лечения?

- А. Возможные варианты таргетной терапии при раке желудка не требуют поиска и определения предикторов ответа
- Б. Her2neu
- В. MSI
- Г. PD-L1

Основной метод диагностики, который необходимо применить для выявления или исключения рака при узловом образовании в щитовидной железе:

- А. радиоизотопное сканирование щитовидной железы с I-131 или I-125
- Б. анализ крови на Ат-ТГ, Ат-ТПО
- В. тонкоигольную пункционную биопсию под контролем УЗИ
- Г. срочное гистологическое исследование во время операции
- Д. магнитно-резонансную томографию с контрастным усилением

Наихудшей в плане прогноза можно считать локализацию меланомы на коже

- А. головы
- Б. верхних конечностей
- В. в передней поверхности туловища
- Г. задней поверхности туловища
- Д. нижних конечностей

Зонами регионарного метастазирования при раке щитовидной железы являются:

- А. надключичные л/узлы
- Б. л/узлы, расположенные вдоль внутренней яремной вены
- В. медиастинальные л/узлы
- Г. предгортанный л/узел
- Д. все вышеперечисленные

ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОЙ И ОТСРОЧЕННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ ПРИ НИЗКОЭМЕТОГЕННОЙ ОДНОДНЕВНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ВКЛЮЧАЕТ

- А. Антагонист рецепторов серотонина (5-нТЗ)+дексаметазон
- Б. Дексаметазон
- В. Антагонист рецепторов серотонина (5-нТЗ)+дексаметазон+ апрепитант/фосапрепитант
- Г. Не требует профилактики

Метод лечения папиллярного и фолликулярного рака щитовидной железы стадий T1N0M0, больных в возрасте до 45 лет.

- А. лучевой
- Б. хирургический
- В. комбинированный (тиреоидэктомия + лучевая терапия)
- Г. комбинированный (тиреоидэктомия + лечение радиоактивным йодом)
- Д. тиреоидэктомия и терапия тирозинкиназными ингибиторами

При каких опухолях головы и шеи наиболее часто болеют женщины

- А. полости рта
- Б. глотки
- В. гортани
- Г. щитовидной железы

Укажите наиболее частую локализацию отдаленных метастазов при мелкоклеточном раке легкого

- А. внутригрудные лимфатические узлы
- Б. печень
- В. почки и надпочечники
- Г. кости
- Д. головной мозг

Этиологический фактор в развитии рака эндометрия:

- А. Гиперэстрогения
- Б. Вирус папилломы человека
- В. Химические факторы
- Г. Бактериальная вагинальная инфекция
- Д. Все вышеперечисленное

При тройном негативном BRCA-ассоциированном локализованном раке молочной железы предпочтительно включение в лечебный режим неоадьювантной химиотерапии:

- А. препаратов платины (цисплатин или карбоплатин)
- Б. трастузумаба
- В. деносумаба
- Г. гозерелина

Выберите наиболее эффективные схемы сочетания противоопухолевых препаратов для лечения рака молочной железы:

- А. антрациклины и гемцитабин
- Б. таксаны и винорелбин
- В. антрациклины и таксаны
- Г. таксаны и гемцитабин
- Д. гемзар и капецитабин

Какие типы полипов наиболее часто малигнизируются в толстой кишке:

- А. железистые;
- Б. железисто-ворсинчатые;
- В. ворсинчатые;
- Г. ювенильные;
- Д. гиперпластические.

Неoadъювантную химиотерапию используют с целью

- А. уменьшить массу опухоли
- Б. приблизить сроки системного воздействия на опухолевый процесс
- В. определить лекарственный патоморфоз для планирования дальнейшего лечения
- Г. избежать оперативного вмешательства

Обязательным этапом диагностики злокачественного новообразования пищевода является

- А. СКТ органов грудной и брюшной полости с в/в контрастным усилением
- Б. Эзофагогастродуоденоскопия
- В. Морфологическое исследование биопсии опухоли
- Г. Всё вышеперечисленное

Укажите состояние, при котором наиболее повышен риск развития рака желудка

- А. Инфекция *helicobacter pylori*
- Б. Хронический атрофический гастрит
- В. Хроническая язва желудка
- Г. Дисплазия эпителия слизистой оболочки
- Д. Резекция желудка в анамнезе

Наиболее часто при злокачественных опухолях яичка отдаленные метастазы поражают:

- А. Кости
- Б. головной мозг
- В. печень
- Г. легкие
- Д. забрюшинные лимфатические узлы

В течение какого промежутка времени подлежат диспансерному наблюдению лица, излеченные от предраковых заболеваний?

- А. в течение 5 лет
- Б. в течение 3 лет
- В. в течение 2 лет
- Г. в течение 1 года
- Д. после излечения в диспансерном наблюдении не нуждаются

Больным гормонозависимым раком молочной железы в менопаузе с целью профилактики остеопороза могут быть назначены:

- А. бисфосфонаты
- Б. витамины
- В. бевацизумаб
- Г. ингибиторы ароматазы

Какой путь метастазирования наиболее характерен для хориокарциномы:

- А. Лимфогенный
- Б. Гематогенный
- В. Имплантационный
- Г. Все вышеперечисленное
- Д. Все пути метастазирования встречаются с одинаковой частотой

Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается:

- А. в отношении несовершеннолетнего ребёнка
- Б. при несчастных случаях, травмах, независимо от угрозы жизни человеку
- В. в отношении лиц, страдающих онкологическими заболеваниями в терминальной стадии
- Г. в отношении лиц, страдающих тяжёлыми психическими расстройствами, и лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
- Д. при отравлениях

При метастатическом раке почки применяется:

- А. Тамоксифен
- Б. Цисплатин
- В. Паклитаксел
- Г. Сунитиниб

Какой опухолевый маркер повышается при эпителиальном раке яичников:

- А. ХГ
- Б. СА-125
- В. АФП
- Г. SCC
- Д. СА-15.3

Адекватным методом лечения первичной инфильтративно-отечной формы рака молочной железы при экспрессии стероидных гормонов является

- А. хирургический
- Б. лучевой
- В. химио-лучевой
- Г. химио-гормоно-лучевая терапия
- Д. химио-гормоно-лучевой и хирургический

Наиболее часто железистый рак пищевода развивается на фоне

- А. рубцовой стриктуры
- Б. инфекции *Helicobacter pylori*
- В. пищевода Барретта
- Г. тяжелой дисплазии многослойного плоского эпителия
- Д. железистый рак пищевода развивается на фоне всего перечисленного

Какая морфологическая форма рака щитовидной железы является наиболее благоприятной в прогностическом плане:

- А. папиллярная аденокарцинома
- Б. фолликулярная аденокарцинома
- В. анапластический (недифференцированный) рак
- Г. медуллярный рак
- Д. рак из клеток Гюртля

Препарат Траметиниб является:

- А. MEK-ингибитором
- Б. BRAF-ингибитором
- В. Анти-CTLA4 моноклональным антителом
- Г. Анти-PD1 моноклональным антителом

Укажите прогностически относительно благоприятную морфологическую форму немелкоклеточного рака легкого

- А. крупноклеточный рак
- Б. плоскоклеточный ороговевающий рак
- В. плоскоклеточный рак без ороговения
- Г. плоскоклеточный веретеноклеточный рак
- Д. аденокарцинома БДУ

К фоновым заболеваниям рака шейки матки относятся все перечисленные, кроме:

- А. Дисплазия
- Б. Эктопия
- В. Лейкоплакия
- Г. Полип
- Д. Эндоцервицит

У больного 59 лет выявлен рак лоханки правой почки cT2N0M0. Определите тактику лечения данного пациента:

- А. радикальная нефрэктомия
- Б. предоперационная лучевая терапия, радикальная нефрэктомия
- В. нефроуретерэктомия, резекция мочевого пузыря с устьем мочеточника
- Г. предоперационная химиотерапия, радикальная нефрэктомия
- Д. химиолучевое лечение

Наиболее часто выявляемый симптом у больных с высокодифференцированным раком щитовидной железы:

- А. изменение голоса
- Б. тиреотоксикоз
- В. наличие пальпируемого узла на шее
- Г. нарушение глотания
- Д. боли в шее с иррадиацией в плечо

Метод исследования, позволяющий определить наличие функционирующей ткани щитовидной железы после предшествующего хирургического вмешательства.

- А. ультразвуковое исследование шеи
- Б. тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ
- В. радиоизотопное сканирование с I-131, I-123 или Tc-99m-пертехнитатом
- Г. компьютерная томография с контрастным усилением
- Д. позитронно-эмиссионная томография

У больной 26 лет папиллярный рак щитовидной железы T1N0M0 с локализацией в правой доле, целесообразно:

- А. выполнить тиреоидэктомию
- Б. провести комбинированное лечение с предоперационной лучевой терапией на I этапе с последующей тиреоидэктомией
- В. провести комбинированное лечение с тиреоидэктомией на I этапе с последующим лечением радиоактивным йодом
- Г. выполнить гемитиреоидэктомию справа с резекцией перешейки
- Д. выполнить субтотальную резекцию щитовидной железы

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. мазок на микрофлору из влагалища
- Б. мазок на онкоцитологию
- В. посев из цервикального канала на микрофлору
- Г. ПЦР на ВПЧ высокоонкогенных типов

Выберите комбинацию иммунопрепаратов, зарегистрированную для лечения метастатической меланомы кожи:

- А. Пембролизумаб и Авелумаб
- Б. Ниволумаб и Ипилимумаб
- В. Пембролизумаб и Ипилиумумаб
- Г. Ниволумаб и ИФН-альфа

Her2/neu – это:

- А. антиэстроген;
- Б. рецептор кортикостероидных гормонов;
- В. один из антрациклинов
- Г. активатор плазминогена урокиназного типа;
- Д. один из тирозинкиназных рецепторов семейства erbB.

Цитогенетический маркёр (Филадельфийская хромосома) наблюдается при:

- А. остром лимфобластном лейкозе
- Б. остром миелобластном лейкозе
- В. хроническом лимфолейкозе
- Г. хроническом миелолейкозе
- Д. хроническом моноцитарном лейкозе

Задачей короткого интенсивного курса предоперационной лучевой терапии является:

- А. улучшение качества жизни
- Б. понижение жизнеспособности опухолевых клеток
- В. получение полной регрессии опухоли
- Г. достижение значительного уменьшения опухоли
- Д. сокращение сроков пребывания больного в стационаре

При диссеминированном раке почечной лоханки целесообразно лечение:

- А. крупнофракционная лучевая терапия на область первичной опухоли и метастазов
- Б. дистанционная гамма-терапия средними фракциями
- В. гормонотерапия
- Г. химиотерапия в режиме гемцитабин+ цисплатин
- Д. иммунотерапия вакциной БЦЖ

Для базальноклеточного рака кожи не характерно:

- А. медленный рост
- Б. многообразие клинических форм
- В. частое метастазирование
- Г. часто рецидивирует

На стадию рака молочной железы влияет следующий гистологический признак:

- А. прорастание опухоли в дерму
- Б. опухолевые эмболы в сосудах
- В. фокусы рака in situ в окружающей ткани
- Г. Микрокальцинаты
- Д. прорастание в большую грудную мышцу

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ОТДАЛЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ У ПАЦИЕНТОВ С САРКОМАМИ КОСТЕЙ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. легкие
- Б. кости
- В. почки
- Г. лимфатические узлы

Какой из препаратов показан для применения при раке толстой кишки в адъювантном режиме?

- А. Бевацизумаб
- Б. Цетуксимаб
- В. Панитумумаб
- Г. Иринотекан
- Д. Ни один из перечисленных препаратов

Точно установить рак молочной железы можно на основании:

- А. клинической картины
- Б. Термографии
- В. Маммографии
- Г. морфологического исследования
- Д. ультразвукового исследования

У больного выявлено: меланома кожи, толщина по Breslow

3.5 мм, инвазия по Clark IV ст., без изъязвления. Определите стадию процесса после операции:

- А. pT1aN0M0
- Б. pT1bN0M0
- В. pT2aN0M0
- Г. pT2bN0M0
- Д. pT3aN0M0

Морфологическая форма злокачественной опухоли щитовидной железы, сохраняющая йодонакопительную функцию

- А. папиллярный рак
- Б. медуллярный рак
- В. плоскоклеточный рак
- Г. недифференцированный рак
- Д. лимфома щитовидной железы

Рак кожи (исключая базалиому и меланому) в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями составляет

- А. около 1%
- Б. 2-3%
- В. 4-8%
- Г. около 15%
- Д. более 20%

Абсолютным показанием к применению эндоваскулярных методов лечения при раке шейки матки является:

- А. 2b-3b стадия заболевания
- Б. Параметральная инвазия
- В. Профузные кровотечения
- Г. Распространение на нижнюю треть влагалища

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А. как этап комбинированного лечения в предоперационном периоде
- Б. как этап комбинированного лечения в послеоперационном периоде
- В. в лечении рака ободочной кишки лучевая терапия не применяется
- Г. как самостоятельный метод лечения

ЦИТОРЕДУКТИВНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ С МАКСИМАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ ОСТАТОЧНЫХ ОПУХОЛЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НЕ БОЛЕЕ 1 СМ СЧИТАЕТСЯ

- А. полной
- Б. субоптимальной
- В. оптимальной
- Г. неоптимальной

Частота сочетания неходжкинской лимфомы ЖКТ с поражением лимфоузлов кольца Пирогова—Вальдейера составляет:

- А. 10-15%
- Б. 20-25%
- В. 30-35%
- Г. 40-45%
- Д. 50%

Какой маркер применяется для диагностики плоскоклеточного рака шейки матки:

- А. СА-125
- Б. ХГ
- В. SCC
- Г. АФП
- Д. СА-19.9

Зрелые тератомы средостения преимущественно располагаются

- А. в переднем верхнем средостении
- Б. в переднем нижнем средостении
- В. в заднем верхнем средостении
- Г. в заднем нижнем средостении
- Д. одинаково часто, как в переднем, так и в заднем средостении

Триггеры Карциномы Меркеля

- А. Полиомавирус (MCPyV)
- Б. Хроническая травматизация
- В. Вирус папилломы человека (ВПЧ)
- Г. Иммуносупрессия

Выберете режим адъювантной ХТ при операбельном раке желудка?

- А. DCF (доцетаксел, цисплатин, 5-фторурацил)
- Б. XELOX (доцетаксел, оксалиплатин, лейковорин, фторурацил)
- В. FLOT
- Г. FOLFIRI (иринотекан, лейковорин, фторурацил)

Наиболее часто рак орофарингеальной области метастазирует в заглоточные лимфатические узлы при локализации

- А. в подвижной части языка
- Б. в корне языка
- В. в мягком и твердом небе
- Г. на слизистой щеки
- Д. на слизистой альвеолярных отростков

К ингибиторам ароматазы относится:

- А. Экземестан
- Б. Анастрозол
- В. Торемифен
- Г. Тамоксифен
- Д. Фулвестрант

Воспалительная форма рака молочной железы классифицируется как:

- А. T3
- Б. T4a
- В. T4b
- Г. T4c
- Д. T4d

Радикальным лечением при злокачественной опухоли нижнего полюса почки до 5 см в диаметре является:

- А. резекция почки
- Б. энуклеация опухоли
- В. нефрэктомия
- Г. нефрадреналэктомия

КАКОЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ ВСТРЕЧАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО?

- А. плоскоклеточный рак
- Б. аденокарцинома
- В. низкодифференцированный рак
- Г. муцинозный рак

Выберите одну характеристику наиболее характерную для плоскоклеточного рака

- А. Характерен для развитых стран
- Б. Заболеваемость постоянно растет
- В. Возникает на фоне пищевода Барретта
- Г. 94% опухолей расположены ниже бифуркации трахеи
- Д. Радиочувствителен, возможна стойкая ремиссия после самостоятельной химиолучевой терапии

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ РЕЗЕКЦИИ ПРИ РАКЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ НЕПОРАЖЕННОЙ ТКАНИ ПЕЧЕНИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ

- А. 10-20%
- Б. 40-50%
- В. 30-40%
- Г. 20-30%

При раке кардиального отдела желудка наиболее характерным симптомом является:

- А. дисфагия
- Б. отрыжка, изжога, рвота
- В. боль в эпигастральной области
- Г. слабость
- Д. похудание

Первым этапом ортоградного лимфогенного метастазирования периферического рака легкого следует считать

- А. пульмональные лимфатические узлы
- Б. бронхопульмональные лимфатические узлы
- В. паратрахеальные лимфатические узлы
- Г. нижние трахеобронхиальные (бифуркационные) лимфоузлы
- Д. верхние трахеобронхиальные лимфоузлы

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА НОСОГЛОТКИ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗЕН МЕТОД

- А. лучевой
- Б. хирургический
- В. химиотерапевтический
- Г. химиолучевой

Какой препарат зарегистрирован для лечения гормоно-чувствительного рака предстательной железы:

- А. олапариб
- Б. энзалутамид
- В. доцетаксел
- Г. кабазитаксел

ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОСАРКОМОЙ

- А. хирургический
- Б. комбинированный
- В. лекарственный
- Г. лучевой

Цетуксимаб и панитумумаб показаны больным с метастатическим раком толстой кишки при

- А. Наличии в опухоли мутации гена KRAS/NRAS
- Б. Наличии в опухоли мутации гена BRCA 1/2
- В. Отсутствии в опухоли мутации гена KRAS/NRAS
- Г. Наличии в опухоли экспрессии HER2
- Д. Наличии мутации гена EGFR

Для подтверждения злокачественного образования толстой кишки необходимо выполнить:

- А. Колоноскопию с биопсией образования
- Б. КТ органов грудной и брюшной полостей
- В. МРТ малого таза
- Г. Обзорную рентгенографию органов брюшной полости

Прогностически неблагоприятным фактором при высокодифференцированных формах рака щитовидной железы является:

- А. мужской пол
- Б. возраст старше 45 лет
- В. выход опухоли за пределы капсулы щитовидной железы
- Г. наличие паратрахеальных метастазов
- Д. все вышеперечисленные

ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО, ОБРАТИВШЕГОСЯ К ВРАЧУ С ЖАЛОБАМИ НА НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

- А. ультразвукового исследования
- Б. рентгенологического исследования толстого кишечника (ирригоскопия)
- В. ректального пальцевого исследования
- Г. колонофиброскопии

Медуллярный рак щитовидной железы развивается:

- А. из фолликулярных клеток
- Б. из метapлазированного эпителия
- В. из парафолликулярных клеток
- Г. из клеток Гюртля
- Д. из любых вышеуказанных

В качестве первых проявлений лимфомы Ходжкина наиболее часто отмечается увеличение:

- А. шейно-надключичных лимфоузлов
- Б. медиастинальных лимфоузлов
- В. забрюшинных лимфоузлов
- Г. паховых лимфоузлов
- Д. всех групп лимфоузлов с одинаковой частотой

У больного 70 лет рак нижней губы II а стадии. Наиболее целесообразный метод лечения

- А. близкофокусная рентгенотерапия
- Б. дистанционная лучевая терапия фотонами
- В. облучение электронами
- Г. дистанционная гамма терапия
- Д. операция

Какая морфологическая форма опухолей щитовидной железы является наиболее неблагоприятной в прогностическом плане:

- А. папиллярная аденокарцинома
- Б. фолликулярная аденокарцинома
- В. анапластический (недифференцированный) рак
- Г. медуллярный рак
- Д. инсулярный рак

ДЛЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ

- А. наличие крови и слизи в стуле
- Б. тошнота и рвота
- В. болезненность при дефекации
- Г. изменение консистенции каловых масс при испражнении

При локализованном раке предстательной железы радикальными методами считаются:

- А. радикальная простатэктомия или лучевая терапия
- Б. только гормональная терапия (агРГ)
- В. химиотерапия препаратом доцетаксел
- Г. иммунотерапия препаратом атезолизумаб

Чем отличаются принципиально операции, предложенные Ivor Lewis и McKeown:

- А. Путем проведения трансплантата
- Б. Шириной стебля
- В. Объемом лимфодиссекции
- Г. Местом формирования анастомоза

ОСНВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ХОНДРОСАРКОМЫ СЧИТАЮТ

- А. лучевой
- Б. лекарственный
- В. комбинированный
- Г. хирургический

К лекарственным средствам относятся

- А. Субстанции, реактивы категории ЧДА, фармацевтические субстанции, лекарственные препараты
- Б. фармацевтические субстанции, лекарственные препараты
- В. фармацевтические субстанции, лекарственные препараты, реактивы, применяемые на фармацевтическом производстве
- Г. фармацевтические субстанции, лекарственные препараты, вспомогательные вещества

ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ ПРЯМОЙ КИШКИ МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ ВЫЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО

- А. в первые 3 года
- Б. через 3-5 лет
- В. через 5-10 лет
- Г. в период свыше 10 лет

К доброкачественной форме трофобластической болезни относится:

- А. Хориокарцинома
- Б. Пузырный занос
- В. Трофобластическая опухоль плацентарного ложа
- Г. Эпителиоидная трофобластическая опухоль
- Д. Неразвивающаяся беременность

При определении индекса захвата технеция щитовидной железой выполняется сцинтиграфия с ____

- А. ^{99m}Tc – пертехнетатом
- Б. ^{99m}Tc – технетрилом (МИБИ)
- В. ^{99m}Tc - пентатех
- Г. ^{99m}Tc -технефит

Назначение какого препарата возможно в случае выявления мутации в гене c-KIT у пациентов с метастатической меланомой кожи:

- А. Иматиниб
- Б. Панитумумаб
- В. Вемурафениб
- Г. Олапариб

Какие цитостатики эффективны при лечении колоректального рака

- А. фторпиримидины
- Б. антрациклины
- В. таксаны
- Г. анти-HER2 моноклональные антитела

Противопоказания к проведению Фотодинамической терапии с внутривенным введением фотосенсибилизаторов производных хлорина Е6

- А. Хроническая сердечная недостаточность 1-2 степени
- Б. Вирусный гепатит С минимальная биохимическая активность
- В. Эпилепсия
- Г. Индивидуальная непереносимость

Из нижеперечисленных невусов, как правило, трансформируется в меланому

- А. папилломатозный невус
- Б. невус Ито
- В. ограниченный предраковый меланоз Дюбрея
- Г. веррукозный невус
- Д. монгольское пятно

К какой стадии рака шейки матки относятся метастазы в парааортальные лимфатические узлы по TNM8

- А. I стадия
- Б. II стадия
- В. III стадия
- Г. IV стадия
- Д. IIIA

Что относится к относительному противопоказанию к химиотерапии рака желудка?

- А. заболевание в стадии декомпенсации
- Б. неэффективность данного вида лечения
- В. активный туберкулез легких
- Г. распад опухоли (угроза кровотечения)

ОСНОВНЫМ ПРЕПАРАТОМ СИСТЕМНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. доксорубицин
- Б. этопозид
- В. паклитаксел
- Г. вотриент

Регионарными метастазами рака щитовидной железы не поражаются:

- А. л/узлы вдоль внутренней яремной вены
- Б. надключичные л/узлы
- В. паратрахеальные л/узлы
- Г. подчелюстные л/узлы
- Д. все вышеперечисленные группы

Чаще других гистологических форм при раке легкого встречается:

- А. карциноид
- Б. аденокарцинома
- В. Мелкоклеточный рак
- Г. Крупноклеточный рак

Частота отдаленного метастазирования базально-клеточного рака кожи

- А. Не дает метастазов
- Б. От 5 до 10 %
- В. От 0,0028 до 3,5%.
- Г. От 10 до 20%

При лимфоме Ходжкина поражение пахово-подвздошных лимфоузлов и селезёнки трактуется как стадия:

- А. I
- Б. II
- В. III
- Г. IIIB
- Д. IV

Какой из морфологических вариантов почечно-клеточного рака встречается чаще всего:

- А. светлоклеточный
- Б. медуллярный
- В. папиллярный I и II типа
- Г. хромофобный

К ФОНОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ ОТНОСЯТ

- А. синехии полости матки
- Б. полип эндометрия
- В. железистую гиперплазию
- Г. атипическую гиперплазию

Показания для выполнения наружного чрескостного остеосинтеза при метастатическом поражении длинных костей.

- А. как первый этап хирургического лечения (при технической невозможности других методов)
- Б. солитарный характер метастатического поражения
- В. у пациентов с ожидаемой консолидацией перелома на фоне проведения специальной терапии

Сочетанная лучевая терапия подразумевает:

- А. облучение в сочетании с химиотерапией
- Б. расщепление курса лучевой терапии
- В. облучение с радиомодификатором
- Г. применение двух способов облучения или двух видов излучения
- Д. сочетание с гормонотерапией

Дайте определение «раннего» рака желудка:

- А. Carcinoma in situ.
- Б. Опухоль желудка без метастазов.
- В. Опухоль желудка, в том числе и с метастазами, но только в пределах слизистого/подслизистого слоя.
- Г. Опухоль желудка, в том числе и с метастазами, но только в пределах слизистого/подслизистого слоя, а также мышечной оболочки.
- Д. Опухоль желудка с инвазией в пределах слизистого/подслизистого слоя

КАКИЕ ОПЕРАЦИИ НЕ ОТНОСЯТСЯ К СФИНКТЕРОСОХРАНЯЮЩИМ?

- А. лапароскопическая резекция прямой кишки
- Б. чресбрюшинная резекция прямой кишки
- В. брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
- Г. брюшно-анальная резекция прямой кишки

Основным функциональным показателем кардиотоксичности антрациклинов является:

- А. изменение зубца Т на электрокардиограмме
- Б. увеличение интервала Р-Q на электрокардиограмме
- В. тахикардия
- Г. гипотония
- Д. уменьшение фракции выброса левого желудочка

К меланомонеопасным невусам относятся

- А. синий (голубой) невус
- Б. невус Ота
- В. пограничный пигментный невус
- Г. гигантский пигментный невус
- Д. веррукозный невус

ПОВЫШЕННЫЙ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ИМЕЮТ ЖЕНЩИНЫ С

- А. цитомегаловирусной инфекцией
- Б. вирусным гепатитом В
- В. сахарным диабетом
- Г. папилломавирусной инфекцией

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ РАДИОДЕРМАТИТА НА ФОНЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РЕКОМЕНДОВАНО

- А. Низкоинтенсивное лазерное излучение
- Б. Инфракрасное светодиодное излучение
- В. Внутривенное лазерное облучение крови
- Г. Применение поляризованного света

Что является стандартным вариантом лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря без отдаленных метастазов:

- А. лучевая терапия
- Б. химиотерапия по схеме CG (гемцитабин+цисплатин)
- В. таргетная терапия препаратом панитумумаб
- Г. радикальная цистэктомия с тазовой лимфодиссекцией

Гражданин, имеющий страховой полис ОМС, имеет право на получение медицинской помощи:

- А. только в районной городской больнице по месту постоянной регистрации
- Б. только в районной поликлинике по месту постоянной регистрации
- В. только в областной больнице по месту постоянной регистрации
- Г. только в специализированном ЛПУ
- Д. в любом государственном ЛПУ Российской Федерации

Секторальная резекция молочной железы показана при:

- А. Мастодинии
- Б. диффузной мастопатии
- В. узловой мастопатии
- Г. Мастите
- Д. раке Педжета

К наиболее часто встречающейся морфологической форме рака мочевого пузыря относится

- А. перстневидно-клеточный рак
- Б. уротелиальная карцинома
- В. железистый рак
- Г. солидный рак
- Д. недифференцированный рак

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РАКА СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. плоскоклеточный рак
- Б. саркома
- В. недифференцированный рак
- Г. мукоэпидермоидная опухоль

Больная 43 лет, без выраженных сопутствующих заболеваний. По данным обследования выявлен рак правой почки cT1aN0M0. По данным КТ с внутривенным усилением опухоль 3 см располагается в нижнем полюсе, выступая за контуры правой почки. Больной целесообразно выполнить

- А. радикальную нефрэктомия
- Б. лапароскопическую нефрэктомия
- В. криодеструкцию опухоли
- Г. резекцию почки (оптимально лапароскопическую)
- Д. радиочастотную абляцию опухоли

Для достижения овариальной супрессии у пациенток люминальным типом рака молочной железы применяются:

- А. кабазитаксел
- Б. гозерелин
- В. олапариб
- Г. энзалутамид

Обязательным компонентом органосохраняющего лечения (после выполнения оперативного вмешательства) больных раком молочной железы является:

- А. Гормонотерапия
- Б. Иммуноterapia
- В. лазерная терапия
- Г. лучевая терапия на оставшуюся часть молочной железы
- Д. Химиотерапия

Под термином "метастаз Вирхова" подразумевается метастаз:

- А. в надключичный лимфатический узел
- Б. в клетчатку малого таза
- В. в яичники
- Г. в легкие
- Д. в печень

Целью I фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является

- А. изучение противоопухолевой активности препарата при разных видах опухоли
- Б. определение допустимой для человека разовой и суммарной дозы препарата и спектра токсичности
- В. сравнительное изучение нового агента с другими препаратами
- Г. изучение возможных сочетаний с другими препаратами
- Д. анализ экономических показателей лечения и уровня качества жизни

Поражение сосочкового слоя кожи при меланоме соответствует уровню инвазии по Clark

- А. Первому
- Б. Второму
- В. Третьему
- Г. Четвертому
- Д. Пятому

Профилактическим онкологическим осмотрам подлежат лица старше:

- А. 10 лет
- Б. 20 лет
- В. 30 лет
- Г. 40 лет
- Д. 50 лет

У больного 65 лет, страдающего в течение 15 лет геморроем, после продолжительного бессимптомного периода появились прожилки крови в каловых массах. Болей нет.

Состояние удовлетворительное. Какую тактику избрать?

- А. Назначить свечи с проктогливенолом, диету, явку через 3-4 недели.
- Б. Произвести общий анализ крови, рентгеноскопию грудной клетки.
- В. Произвести пальцевое исследование прямой кишки.
- Г. Произвести пальцевое исследование прямой кишки и ректороманоскопию.
- Д. Динамическое наблюдение

Необходимый объем лечения для пациента с опухолью яичка?

- А. гормонотерапия
- Б. орхофуникулэктомия и экстирпация полового члена
- В. Химиотерапия
- Г. орхофуникулэктомия
- Д. лучевая терапия

При раке молочной железы необходимо назначать лучевую терапию на зоны лимфоколлекторов, независимо от объема оперативного вмешательства при поражении следующего числа лимфоузлов:

- А. 0
- Б. 1
- В. 2
- Г. 3
- Д. 4 и более

Какой препарат используется при светлоклеточном раке почки в I линии при благоприятном прогнозе:

- А. сунитиниб
- Б. темсиролимус
- В. ниволумаб
- Г. гемцитабин

К факультативным предракам кожи относят

- А. эритроплазию Кейра
- Б. кератоакантому
- В. болезнь Педжета
- Г. болезнь Боуэна
- Д. пигментную ксеродерму

Пациенткам с местно-распространенным серозным раком яичников low grade после окончания комбинированного лечения в качестве поддерживающей терапии может быть рекомендовано назначение:

- А. Олапариб
- Б. Рукапариб
- В. Анастразол
- Г. Бевацизумаб

Рак легкого гематогенно метастазирует

- А. в печень
- Б. в кости
- В. в головной мозг
- Г. во все указанные выше локализации
- Д. в указанные выше локализации рак легкого практически не метастазирует

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. эндометрионная аденокарцинома
- Б. серозная аденокарцинома
- В. светлоклеточная карцинома
- Г. плоскоклеточная карцинома

К РЕДКИМ ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА ОТНОСИТСЯ

- А. Хроофобная
- Б. Онкоцитома
- В. Карцинома собирательных трубочек Беллини
- Г. Ангиомиолипома

ВНЕОРГАННОЙ ОПУХОЛЬЮ APUD-СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. хеMODEKТОМА
- Б. бронхиогенный рак
- В. медуллярный рак щитовидной железы
- Г. хордома

Наиболее радиочувствительной среди опухолей носоглотки является

- А. плоскоклеточный ороговевающий рак
- Б. плоскоклеточный рак с высокой степенью лимфатической инфильтрации
- В. лимфосаркома
- Г. аденокарцинома
- Д. саркомы

При p16-положительном раке T3–4, N0–3 раке ротоглотки рекомендуется лечение:

- А. одновременная ХЛТ или индукционная ХТ с последующей ЛТ или одновременной ХЛТ
- Б. индукционная ХТ с последующей ЛТ или одновременной ХЛТ
- В. одновременная ХЛТ
- Г. лекарственное лечение ингибиторами контрольных точек иммунного ответа

У больного 65 лет плоскоклеточный низкодифференцированный рак корня языка T3N2M0. Наиболее целесообразным методом лечения является

- А. резекция языка в сочетании с операцией Крайля
- Б. сочетанная лучевая терапия
- В. дистанционное облучение языка и регионарных зон в сочетании с локальной гипертермией
- Г. внутритканевая лучевая терапия
- Д. одновременное химиолучевое лечение

Укажите стандартные диагностические методы, применяемые для уточнения распространенности рака легкого:

- А. рентгено-томография (и КТ) грудной клетки
- Б. бронхоскопия и/или трансторакальная пункция полости плевры/перикарда
- В. УЗИ (КТ) органов брюшной полости
- Г. скенирование скелета,
- Д. все перечисленное

Какой фактор более всего влияет на частоту метастазирования при раке толстой кишки:

- А. Гистологическая структура опухоли
- Б. Глубина инвазии кишечной стенки
- В. Локализация опухоли
- Г. Возраст больного
- Д. Пол пациента

Для рака эндометрия наиболее характерны следующие виды метастазирования:

- А. Лимфогенное
- Б. Имплантационное
- В. Все вышеперечисленное
- Г. Лимфогенное и имплантационное происходит с одинаковой частотой
- Д. Нет правильного ответа

При радикальной мастэктомии по Мадену

- А. удаляются обе грудные мышцы
- Б. большая грудная мышца сохраняется, малая грудная мышца удаляется
- В. сохраняются большая и малая грудные мышцы
- Г. малая грудная мышца сохраняется, большая грудная мышца удаляется
- Д. сухожилие малой грудной мышцы отсекается, и после лимфодиссекции подшивается

Показанием для применения лечения радиоактивным йодом больного раком щитовидной железы являются:

- А. отдаленные метастазы медуллярного рака
- Б. отдаленные метастазы папиллярного рака
- В. отдаленные метастазы недифференцированного рака
- Г. регионарные метастазы медуллярного рака
- Д. регионарные метастазы плоскоклеточного рака

КАКОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАКЕ ТЕЛА МАТКИ T1aN0M0 У ПАЦИЕНТКИ 55 лет, ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП - ЭНДОМЕТРИОИДНАЯ АДЕНОКАРЦИНОМА G1?

- А. надвлагалищная ампутация матки
- Б. абляция эндометрия
- В. тотальная гистерэктомия, ометэктомия
- Г. экстирпация матки с придатками

Трастузумаб – это:

- А. гуманизированные антитела к Her2/neu;
- Б. один из тирозинкиназных рецепторов семейства erbB;
- В. один из антрациклинов;
- Г. активатор плазминогена урокиназного типа;
- Д. рецептор эпидермального фактора роста.

Какая кишечная непроходимость более характерна для рака ободочной кишки?

- А. Обтурационная
- Б. Странгуляционная
- В. Смешанная
- Г. Динамическая
- Д. Характерного типа нет

Рак пищевода чаще всего поражает

- А. шейный отдел
- Б. верхнегрудной отдел
- В. среднегрудной отдел
- Г. нижнегрудной отдел
- Д. рак пищевода поражает указанные отделы с одинаковой частотой

Диагностическим маркером медуллярного рака щитовидной железы является

- А. кальцитонин
- Б. тиреотропный гормон (ТТГ)
- В. тиреоглобулин (ТГ)
- Г. антитела к тиреоглобулину (Ат-ТГ)
- Д. антитела к тканевой пероксидазе (Ат-ТПО)

Основным методом лечения неходжкинской лимфомы IV стадии является:

- А. симптоматическая терапия
- Б. лучевая терапия
- В. хирургическое лечение
- Г. комбинированный (химиолучевой) метод
- Д. химиотерапия

Основной метод хирургического лечения остеосаркомы

- А. Краевая резекция кости
- Б. Ампутация конечности
- В. Сегментарная резекция с эндопротезированием
- Г. Хирургическое лечение не проводится

Наиболее частой причиной летального исхода при хроническом лимфолейкозе являются:

- А. прогрессирование лейкоза и инфекционные осложнения
- Б. кровотечение
- В. сопутствующие заболевания
- Г. аутоиммунные осложнения
- Д. гиперспленизм

Рак Педжета относится к:

- А. раку соска молочной железы
- Б. доброкачественным дисплазиям
- В. внутрипротоковому раку
- Г. доброкачественным опухолям
- Д. слизистому раку

ПОД ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЭТАПА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ ПОНИМАЮТ

- А. эндопротезирование
- Б. накостный металлостеосинтез
- В. внутрикостный металлостеосинтез
- Г. краевую резекцию кости

Первые симптомы рака легкого чаще всего обусловлены проявлениями

- А. первичной опухоли
- Б. регионарных метастазов
- В. отдаленных метастазов
- Г. регионарных и отдаленных метастазов
- Д. общего воздействия опухоли на организм

При раке тела матки в 80% случаев встречается одна из перечисленных морфологических форм:

- А. Плоскоклеточный рак
- Б. Аденокарцинома
- В. Светлоклеточная аденокарцинома
- Г. Железисто-плоскоклеточный рак
- Д. Недифференцированный рак

КАКОЙ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ?

- А. хирургический
- Б. химиотерапия
- В. лучевая терапия
- Г. сочетание лучевой терапии и химиотерапии

Для диагностики рака молочной железы наиболее достоверными методами исследования являются:

- А. маммография и термография
- Б. Маммография
- В. маммография и ультразвуковое исследование + гистологическое исследование опухоли
- Г. компьютерная томография и термография
- Д. позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и термография

Поздние лучевые повреждения возникают после облучения через:

- А. 7 дней
- Б. 12 дней
- В. 3 месяца
- Г. во время облучения
- Д. 1 месяц

Оптимальным вариантом хирургического вмешательства при высокодифференцированном раке щитовидной железы, при опухоли не более 2см в диаметре в группе благоприятного прогноза является:

- А. гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка
- Б. тиреоидэктомия
- В. субтотальная резекция щитовидной железы
- Г. резекция щитовидной железы по Николаеву
- Д. резекция пораженной доли щитовидной железы

ОСНОВНЫМ ПРОГНОСТИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ У ПАЦИЕНТОВ С ЛОКАЛИЗОВАННЫМИ САРКОМАМИ КОСТЕЙ СЛУЖИТ

- А. степень злокачественности опухоли
- Б. максимальный размер опухоли
- В. возраст больного
- Г. Локализация опухоли

Наиболее раннюю диагностику рака желудка обеспечивает:

- А. рентгенологическое исследование желудка
- Б. гастроскопия с биопсией
- В. поиск синдрома малых признаков
- Г. обзорная рентгеноскопия брюшной полости

Выберите режим лекарственного лечения зарегистрированный в качестве 2 линии (после прогрессии на фоне платиносодержащей ХТ) у пациентов с метастатическим раком желудка:

- А. Паклитаксел и рамуцирумаб
- Б. Ниволумаб и ипилимумаб
- В. Иринотекан и трастузумаб
- Г. FLOT (доцетаксел, оксалиплатин, лейковорин, фторурацил)

Прогностически неблагоприятным фактором при высокодифференцированных формах рака щитовидной железы не является:

- А. мужской пол
- Б. минимальное распространение опухоли за капсулу щитовидной железы
- В. женский пол
- Г. паратрахеальные метастазы
- Д. возраст старше 45 лет

Укажите название операции, при которой выполняется формирование гетеротопического артифициального мочевого пузыря:

- А. Цистопластика по Штудеру
- Б. Цистопластика по Брикеру
- В. Цистопластика по Редди
- Г. Цистопластика по Камей

Лучевое лечение в виде самостоятельного метода терапии используется при лимфоме Ходжкина в стадии:

- А. IA
- Б. IB
- В. IIA
- Г. IIIA
- Д. не используется

Какой препарат является препаратом выбора в качестве адъювантной гормональной терапии у пациенток люминальным типом рака молочной железы в пременопаузе:

- А. тамоксифен
- Б. экземестан
- В. фулвестрант
- Г. рибоциклиб

При полном пузырном заносе в 90% случаев встречается кариотип:

- А. 46XX (все хромосомы отцовские)
- Б. 69 XXX (триплоидия)
- В. 46XY
- Г. Все вышеперечисленное
- Д. Нет правильного ответа

Ранним симптомом рака восходящего отдела ободочной кишки может быть:

- А. Кишечная непроходимость;
- Б. Патологические примеси в кале;
- В. Анемия;
- Г. Всё выше перечисленное.
- Д. Ничего из перечисленного

При наличии у больного меланомы слизистой мягкого неба предпочтительнее проводить

- А. хирургическое лечение
- Б. лучевое лечение
- В. химиотерапию
- Г. химиолучевое лечение
- Д. комбинированное лечение (операция и лучевая терапия)

Меланома кожи относится к опухолям

- А. нейроэктодермальной природы
- Б. эктодермальной природы
- В. мезенхимальной природы
- Г. эмбриональной природы
- Д. эпителиальной природы

Какая из операций требует повторного вмешательства с разрывом во времени для восстановления естественного пассажа содержимого по толстой кишке?

- А. Передняя резекция прямой кишки.
- Б. Ампутация прямой кишки с низведением (протягиванием).
- В. Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки.
- Г. Операция Гартмана
- Д. Резекция сигмовидной кишки

Наличие дочерних пигментных включений на коже (сателлитов) вокруг меланомы указывает

- А. на местную распространенность процесса
- Б. на наличие дополнительных невоидных образований
- В. на рецидив меланомы
- Г. на стабилизацию процесса
- Д. типичное течение болезни

Основной принцип хирургического лечения рака щитовидной железы

- А. операция выполняется интрафасциально
- Б. операция выполняется экстрафасциально с выделением возвратного нерва и паращитовидных желез
- В. обязательно сохранение участка функционирующей тиреоидной ткани для того, чтобы избежать заместительной терапии
- Г. паращитовидные железы сохранять не нужно, так как их функция легко компенсируется

ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ФОРМОЙ РАКА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. плоскоклеточный рак
- Б. недифференцированный рак
- В. диморфный (смешанный железистый и плоскоклеточный) рак
- Г. аденокарцинома

НАИБОЛЕЕ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ОПУХОЛЬЮ НОСОГЛОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. плоскоклеточный ороговевающий рак с высокой степенью лимфатической инфильтрации
- Б. плоскоклеточный ороговевающий рак
- В. аденокарцинома
- Г. саркома

Опухолевое поражение оболочек мозга (нейролейкемия) наиболее часто наблюдается при:

- А. лимфоме Ходжкина
- Б. неходжкинской лимфоме
- В. хроническом миелолейкозе
- Г. хроническом лимфолейкозе
- Д. множественной миеломе

Типовой операцией при раке селезеночного изгиба ободочной кишки является

- А. Резекция поперечной ободочной кишки с удалением селезеночного изгиба
- Б. Тотальная колэктомия
- В. Левосторонняя гемиколэктомия
- Г. Резекция селезеночного изгиба ободочной кишки

Клиническая картина меланомы вульвы проявляется

- А. Зудом
- Б. Болями
- В. Лейкореей
- Г. Гиперпигментацией

При планировании радикального вмешательства с целью удаления злокачественной опухоли грудной клетки, проявляющейся синдромом горнера, нарушением чувствительности кожи и атрофией верхней конечности, оптимальным доступом является

_____ торакотомия

- А. Задняя
- Б. Передняя
- В. Парастернальная
- Г. Боковая

Противопоказанием к проведению лучевой терапии при раке легкого является

- А. Метастатический плеврит
- Б. Тромбоцитопения (ниже $110 \cdot 10^9 / \text{л}$)
- В. Обширное врастание в соседние органы и сосуды
- Г. Лейкопения (ниже $3 \cdot 10^9 / \text{л}$)

Медленным ростом и очень редким метастазированием характеризуется

- А. Меланома
- Б. Плоскоклеточный рак
- В. Базальноклеточный рак
- Г. Рак придатков кожи

Наиболее опасным пигментным невусом для развития меланомы является

- А. Голубой
- Б. Внутридермальный
- В. Смешанный
- Г. Пограничный

Решающим методом для диагностики центральной опухоли легкого является

- А. Компьютерная томография
- Б. Бронхография
- В. Фибробронхоскопия с биопсией
- Г. Рентгенография

Препаратом, индуцирующим кардиотоксичность 2 типа, является

- А. Доксорубицин
- Б. Бевацизумаб
- В. Циклофосфамид
- Г. Доцетаксел

К редким формам меланомы относится

- А. Меланома вульвы, прямой кишки
- Б. Лентиго-меланома
- В. Узловая
- Г. Поверхностно-распространенная

Метастазирование в ____ называется метастазом шницлера

- А. Пупок по ходу круглой связки печени
- Б. Левые надключичные лимфатические узлы
- В. Параректальные лимфатические узлы
- Г. Яичник

Гастрэктомия с резекцией поперечной ободочной кишки является _____ операцией

- А. Комбинированной
- Б. Симультантной
- В. Расширенной
- Г. Сочетанной

Рак кожи волосистой части головы без деструкции костей черепа, размером 2,5 см, без регионарных метастазов соответствует _____ стадии заболевания

- А. III
- Б. II
- В. I
- Г. IV

Регионом с высоким уровнем заболеваемости раком печени является

- А. Европа
- Б. Россия
- В. Южная Африка
- Г. США

При раке лёгкого наиболее часто метастазами поражаются _____ лимфатические узлы

- А. Подмышечные
- Б. Внутригрудные
- В. Паховые
- Г. Забрюшинные

Герминогенной опухолью яичка является

- А. Гранулематозная опухоль
- Б. Лейдигома
- В. Сертолиома
- Г. Семинома

Мера поглощения лучевой энергии на различной глубине тканей называется дозой

- А. Интегральной
- Б. Глубинной
- В. Поверхностной
- Г. Очаговой

Показатель одногодичной летальности отражает долю больных

- А. С запущенными формами злокачественных новообразований
- Б. Умерших в онкологическом диспансере в текущем году.
- В. С IV стадией заболевания
- Г. Умерших в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования

Рак верхнечелюстной пазухи следует дифференцировать с

- А. Дистопией третьих моляров
- Б. Хроническим верхнечелюстным синуситом
- В. Плеоморфной аденомой
- Г. Ретенционной кистой

Рекомендованным уровнем ттг для проведения радиойодтерапии является _____ мкме/мл

- А. Более 30
- Б. Менее 10
- В. Более 100
- Г. Менее 30

К профессиональным факторам развития опухолей печени относят

- А. Поливинилхлорид
- Б. Соединения свинца
- В. Соединения ртути
- Г. Соединения меди

Наиболее благоприятной в прогностическом плане морфологической формой опухолей щитовидной железы является

- А. Медуллярный рак
- Б. Фолликулярная аденокарцинома
- В. Папиллярная аденокарцинома
- Г. Анапластический рак

Критерием для проведения костной пластики после удаления злокачественных опухолей челюстей является

- А. Характер метастазирования
- Б. Вид первичной опухоли
- В. Объем опухоли
- Г. Отсутствие рецидива

Клиника опухолей трахеи наиболее часто характеризуется _____
в виде кашля, одышки, стридора, кровохаркания, локальных болей, дисфонии, дисфагии

А. Подострым течением с относительно медленным развитием клинической картины и одновременным развитием регионарных и отдаленных метастазов с нарастанием симптомов

Б. «Перебегающей» клинической картиной с чередованием нарастания и стихания проявлений

В. Медленным нарастанием симптомов заболевания

Г. Очень длительным периодом бессимптомного течения и появлением симптомов только при достижении опухолью больших размеров

При подозрении на опухоль почки в первую очередь необходимо провести

- А. Ультразвуковое исследование
- Б. Экскреторную рентгенографию
- В. Компьютерную томографию
- Г. Объективный осмотр

Выбор метода лечения эритроплазии кейра зависит от

- А. Сроков заболевания
- Б. Локализации поражения
- В. Формы роста образования
- Г. Размеров очага поражения

Дисфагия при раке пищевода появляется, прежде всего, на _____ пищу

- А. Твердую
- Б. Холодную
- В. Жидкую
- Г. Горячую

Наименование медицинской организации должно соответствовать _____, министерством здравоохранения Российской Федерации

- А. Единому перечню, утвержденному
- Б. Единому реестру, утвержденному
- В. Единой номенклатуре, утвержденной
- Г. Единому регистру, утвержденному

С точки зрения функциональной переносимости и онкологического радикализма, в случае зрелой тератомы верхней доли лёгкого у пациента старческого возраста, страдающего субкомпенсированным сахарным диабетом II типа и хронической сердечной недостаточностью с фракцией выброса левого желудочка 56%, целесообразно выполнение

- А. Типичной сегментэктомии
- Б. Верхней лобэктомии
- В. Билобэктомии
- Г. Атипичной резекции

Чувствительность опухолевого маркера представляет собой

- А. Процентное отношение числа отрицательных результатов теста в группе онкологических больных
- Б. Процентное выражение частоты истинно-положительных результатов теста в группе онкологических больных
- В. Коэффициент отношения числа положительных результатов теста к группе здоровых людей и пациентов с доброкачественными заболеваниями
- Г. Процентное выражение частоты истинно-отрицательных результатов теста в группе здоровых людей и пациентов с доброкачественными заболеваниями

Третья степень дисфагии при раке пищевода характеризуется

- А. Затруднением прохождения по пищеводу твердой пищи
- Б. Затруднением прохождения полужидкой пищи (кашицеобразной)
- В. Полной obturацией просвета пищевода
- Г. Затруднением прохождения жидкости

К основным показателям, характеризующим общественное здоровье, относят показатели

- А. Средней занятости койки, числа посещений фельдшерско-акушерских пунктов
- Б. Оборота койки, укомплектованности стационара врачами
- В. Средней длительности пребывания больного на койке, летальности
- Г. Демографические, заболеваемости, физического развития, инвалидности

Под вторичной профилактикой рака понимают

- А. Активный поиск онкологических больных
- Б. Пропаганду онкологических знаний среди населения
- В. Лечение предопухолевых заболеваний
- Г. Лечение онкологического заболевания

Из приведенных контрастных методик исследования молочной железы терапевтический эффект имеет

- А. Пневмокистография
- Б. Двойное контрастирование протоков
- В. Пневмомаммография
- Г. Дуктография

Наблюдается высокая частота ассоциации саркомы Капоши и

- А. Экземы
- Б. СПИДа
- В. Гепатита
- Г. Лимфомы

Осложнением метода изолированной регионарной перфузии является

- А. Перелом кости
- Б. Местная токсичность
- В. Отёк лёгких
- Г. Перитонит

Появление механической желтухи опухолевого генеза чаще всего сопровождается

- А. Увеличением желчного пузыря
- Б. Тошнотой, рвотой
- В. Появлением резких болей в эпигастрии
- Г. Асцитом

Аденокистозная карцинома околоушной слюнной железы является опухолью

- А. Злокачественной эпителиальной
- Б. Злокачественной мезенхимальной
- В. Доброкачественной эпителиальной
- Г. Доброкачественной мезенхимальной

Естественным приростом населения называют

- А. Разность между численностью населения в начале и в конце года
- Б. Разность между показателями рождаемости и смертности
- В. Темп роста
- Г. Абсолютный прирост

Если у больного рецидив рака кожи волосистой части головы через год после близкофокусной рентгенотерапии в дозу 60 Гр, то целесообразно назначить

- А. Комбинированное лечение с предоперационной дистанционной г-терапией
- Б. Повторный курс близкофокусной рентгенотерапии
- В. Курс дистанционной г-терапии
- Г. Хирургическое иссечение с пластикой

Самым достоверным способом диагностики лимфом является

- А. Рентгенография грудной клетки
- Б. Гистологическое исследование
- В. Иммуногистохимическое исследование
- Г. Биохимический анализ крови

При расширенной пневмонэктомии выполняют удаление лёгкого с

- А. Трансперикардальной обработкой сосудов лёгкого
- Б. Удалением лимфоузлов переднего и заднего средостения
- В. Удалением корневых, бифуркационных, верхних трахеобронхиальных лимфатических узлов
- Г. Резекцией перикарда или грудной стенки

Метастазы рака желудка чаще поражают

- А. Надпочечники
- Б. Лёгкие
- В. Кости
- Г. Печень

Химиотерапия является эффективным методом лечения

- А. Саркомы Юинга
- Б. Фибросаркомы
- В. Хондросаркомы
- Г. Гемангиосаркомы

Частота лимфомы ходжкина у мальчиков по сравнению с девочками

- А. Выше в подростковом возрасте
- Б. Ниже в возрасте до 12 лет
- В. Выше в возрасте до 12 лет
- Г. Ниже в подростковом возрасте

Наибольшая вероятность малигнизации имеет место при _____ полипах прямой кишки

- А. Ворсинчатых
- Б. Гипопластических
- В. Гиперпластических
- Г. Множественных аденоматозных

Наиболее часто встречающимся гистологическим типом рака почки является _____ рак

- А. Светлоклеточный
- Б. Веретеноклеточный
- В. Гранулярно-клеточный
- Г. Папиллярный

Наиболее достоверным методом диагностики глубины пенетрации при раке пищевода является

- А. Эндосонография
- Б. Компьютерная томография
- В. Магниторезонансная томография
- Г. Ультразвуковое исследование

К наиболее эффективным консервативным вариантам лечения гигантоклеточной опухоли кости 2-3 стадии на сегодняшний день относят

- А. Лучевую терапию в дозе 40 гр
- Б. Деносумаб 120 мг п/к по стандартной схеме курсом 6-9 месяцев
- В. НПВС 7-10 дней, в сочетании с гипсовой иммобилизацией
- Г. ФТЛ магнит, фонофорез с гидрокортизоном, массаж – 14 дней

Одним из ключевых условий радикальности выполнения оперативного вмешательства по поводу мелкоклеточного рака лёгкого, при условии проведения неоадьювантных курсов полихимиотерапии, является пересечение бронха на расстоянии _____ мм и более от видимого края опухоли со срочным гистологическим исследованием края резекции

- А. 7
- Б. 15
- В. 3
- Г. 12

Символом p1 при меланоме кожи обозначают метастазы _____ см в наибольшем измерении в любом из регионарных лимфатических узлов

- А. До 3
- Б. Более 3
- В. До 2
- Г. Более 4

Экзофитный тип роста опухоли пищевода

- А. Представлен бородавчатыми разрастаниями, похожими на цветную капусту
- Б. Как правило растет медленно
- В. Распространяется главным образом по окружности пищевода
- Г. Как правило поздно метастазирует

Для мягкой фибромы характерно наличие в ней

- А. Зрелой жировой и фиброзной ткани
- Б. Зрелой жировой ткани
- В. Зрелой фиброзной ткани
- Г. Незрелой фиброзной ткани

Риск несостоятельности швов воздухопроводящих путей наиболее высок после

- А. Комбинированной пневмонэктомии с резекцией бифуркации трахеи
- Б. Бронхопластической лобэктомии
- В. Комбинированной пневмонэктомии с резекцией левого предсердия
- Г. Расширенной пневмонэктомии с билатеральной лимфодиссекцией

При медуллярном раке щитовидной железы в крови отмечается повышение уровня

- А. Раково-эмбрионального антигена
- Б. Тиреотропного гормона
- В. Тиреоидных гормонов
- Г. Кальцитонина

При раке ректосигмоидного отдела прямой кишки, осложнённом острой кишечной непроходимостью, операцией выбора является

- А. Операция Грекова
- Б. Операция Гартмана
- В. Формирование колостомы
- Г. Формирование обходного анастомоза

Основным симптомом лимфомы ходжкина у детей является

- А. Похудание
- Б. Лихорадка
- В. Анемия
- Г. Лимфаденопатия

Препаратом, который применяется для стимуляции лейкопоэза, является

- А. Филграстим
- Б. Ацетилсалициловая кислота
- В. Циклоспорин
- Г. Эпителин

В случае периферически расположенного метастаза радикально оперированной опухоли желудочно-кишечного тракта, при условии отсутствия иных метастатических очагов, показано выполнение

- А. Пневмонэктомии
- Б. Сегментэктомии с удалением бронхопульмональных лимфоузлов
- В. Атипичной резекции лёгкого
- Г. Расширенной лобэктомии

Каждый гражданин имеет право выбора врача-терапевта, врача общей практики, врача-педиатра в выбранной медицинской организации ____ в год

- А. 4 Раза
- Б. 2 Раза
- В. 1 Раз
- Г. 3 Раза

В соответствии с международной классификацией лимфомы ходжкина ann-arbor ii стадия характеризуется

- А. Поражением одной лимфатической зоны или локализованным поражением одного экстралимфатического органа или ткани
- Б. Диссеминированным поражением одного или нескольких экстралимфатических органов, с или без поражения лимфатических узлов
- В. Поражением лимфатических узлов по обе стороны диафрагмы
- Г. Поражением двух или более лимфатических областей по одну сторону диафрагмы

Препаратом, применяемым при изолированной химиоперфузии лёгких, является

- А. Мелфалан
- Б. Ритуксимаб
- В. Доксорубицин
- Г. Винкристин

При наличии малигнизированного полипа желудка без инвазии в подслизистый слой наиболее оптимальным методом лечения является

- А. Эндоскопическая подслизистая полипэктомия
- Б. Экономная резекция желудка
- В. Клиновидная резекция желудка
- Г. Субтотальная резекция желудка

