

Тесты с вопросами по специальности «Онкология» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/onkolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Онкология» для аккредитации и других экзаменов (3100 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/onkologiya/

2) Онкология (ситуационные задачи)

→ medik-otvet.ru/product/onkolog-situacia/

3) Радиология — тесты с ответами

→ medik-otvet.ru/product/radiolog/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

При центральном или периферическом плоскоклеточном раке легкого Шб стадии заболевания применяются все перечисленные методы, кроме

- А. самостоятельного хирургического
- Б. комбинированного (операция + лучевая терапия)
- В. лучевого
- Г. химиотерапии
- Д. химиолучевого

Показанием для определения 1 группы инвалидности является:

- А. наличие онкологического заболевания
- Б. нарушение функций организма, при котором больной нуждается в длительной постоянной посторонней помощи
- В. значительно выраженные функциональные изменения, не вызывающие необходимости в постоянном постороннем уходе или надзоре
- Г. снижение трудоспособности вследствие нарушений функций организма, обусловленное анатомическими дефектами, приведшими к потере профессии или снижению квалификации
- Д. снижение трудоспособности вследствие нарушений функций организма, обусловленное хроническими заболеваниями

Адекватным вариантом лечения при микроинвазивном раке шейки матки является

- А. ампутация шейки матки
- Б. расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников
- В. комбинированное лечение (операция + лучевая терапия)
- Г. сочетанная лучевая терапия
- Д. внутриволостная гамма-терапия

В положении лежа узловое образование молочной железы исчезает при симптоме

- А. «площадки»
- Б. Кенига
- В. Пайра
- Г. Прибрама
- Д. умбиликации

Наиболее частой локализацией рака слизистой полости рта является

- А. слизистая щеки
- Б. слизистая альвеолярного отростка челюсти
- В. дно полости рта
- Г. язык

Наиболее часто встречаемая локализация базальноклеточного рака кожи?

- А. кожа лица
- Б. кожа туловища
- В. кожа верхних и нижних конечностей
- Г. кожа волосистой части головы

Современная международная классификация рака желудка учитывает

- А. размер опухоли по длиннику
- Б. расстояние от опухоли до метастатических лимфоузлов
- В. количество метастатически измененных лимфоузлов
- Г. глубина опухолевой инвазии
- Д. наличие отдаленных метастазов

Основным звеном онкологической службы в субъектах РФ является:

- А. смотровой кабинет поликлиники
- Б. онкологический кабинет стационара
- В. онкологическое отделение районной больницы
- Г. онкологический диспансер
- Д. онкологический институт

Какая морфологическая форма рака гортани встречается наиболее часто:

- А. плоскоклеточный рак
- Б. аденокарцинома
- В. аденокистозный рак
- Г. мукоэпидермоидный рак

Какой метод является наиболее результативным при необходимости подтверждения рака щитовидной железы?

- А. сцинтиграфия
- Б. Исследование гормонов щитовидной железы
- В. Прицельная пункционная биопсия под контролем УЗИ
- Г. Исследование кровотока при цветном картировании на УЗИ

Наиболее специфичным клиническим признаком рака пищевода является

- А. повышенное слюноотделение
- Б. тошнота
- В. дисфагия
- Г. рвота
- Д. кашель

При раке поджелудочной железы наиболее информативным лабораторным тестом является

- А. нейронспецифическая енолаза
- Б. раково-эмбриональный антиген
- В. биохимические показатели (АЛТ, АСТ, амилаза, билирубин)
- Г. онкомаркер СА 19-9
- Д. альфа-фетопротеин

Нарушение функции почек в процессе химиотерапии наиболее выражены при использовании

- А. Митомицина С
- Б. Ифосфамида
- В. Нитрозометилмочевины
- Г. Производных платины
- Д. Антрациклинов

Оптимальным объёмом хирургического лечения при немелкоклеточном раке легкого стадии II-IIIА является:

- А. Сублобарная прецизионная резекция
- Б. Сегментэктомия
- В. Лобэктомия
- Г. Пневмонэктомия

Для диагностики хориокарциномы матки целесообразно определять -

- А. АФП, РЭА (α -фетопротеин, раково-эмбриональный антиген)
- Б. СА 125, ингибин
- В. ХГ, ТбГ (хронический гонадотропин, трофобластический b-глобулин)
- Г. Виментин, белок S-100
- Д. СА 125, трофобластический b-глобулин

При рецидивах гастроинтестинальных стромальных опухолей чаще применяют

- А. Хирургическое лечение
- Б. Лучевую терапию
- В. Химиотерапию
- Г. Таргетную терапию
- Д. Химиолучевую терапию

Наиболее злокачественный вариант опухоли мягких тканей

- А. десмоидная опухоль
- Б. Липосаркома
- В. межмышечная фиброма
- Г. дифференцированная фибросаркома
- Д. Синовиальная саркома

Неврогенные опухоли в абсолютном большинстве наблюдений локализуются в:

- А. среднем нижнем средостении
- Б. верхних отделах переднего средостения
- В. переднем средостении на уровне основания сердца
- Г. реберно-позвоночном углу
- Д. верхней апертуре

Противоопухолевая лекарственная терапия включает

- А. химиотерапию.
- Б. гормонотерапию
- В. иммунотерапию
- Г. все вышеперечисленное

Маммография – это:

- А. рентгенография молочных желез
- Б. ультразвуковое исследование молочных желез
- В. контрастное исследование протоков молочной железы
- Г. комплекс мер, направленных на профилактику рака молочной железы

Для выключения функции яичников применяется:

- А. овариоэктомия
- Б. лучевая терапия
- В. золадекс
- Г. аримидекс
- Д. тамоксифен

Для токсико-анемической формы рака толстой кишки характерна локализации опухоли в

- А. Слепой и восходящей кишке
- Б. Поперечно-ободочной кишке
- В. Нисходящей кишке
- Г. Сигмовидной кишке
- Д. Ректосигмоидном отделе

Наиболее адекватная мера профилактики стоматита у онкологических больных, получающих химиотерапию

- А. прием противовирусных препаратов
- Б. прием антибиотиков широкого спектра действия
- В. местное применение противогрибковых препаратов
- Г. системная противогрибковая терапия
- Д. санация кариозных зубов, хорошая гигиена полости рта

К низкому уровню прогрессии рака предстательной железы относится все, кроме

- А. исходный уровень ПСА до биопсии от 10 до 20 нг/мл
- Б. уровень баллов по шкале глисон 6
- В. стадия первичного опухолевого очага Т 1
- Г. исходный уровень пса до биопсии ниже 10 нг/мл

Клинические проявления забрюшинных опухолей в первую очередь обусловлены

- А. гистологической структурой опухоли
- Б. размерами опухоли
- В. локализацией опухоли
- Г. размерами и локализацией опухоли
- Д. гистологической структурой и размерами опухоли

Точный диагноз рака молочной железы устанавливают на основании:

- А. маммографии
- Б. ультразвукового исследования
- В. морфологического исследования
- Г. термографии
- Д. клинического исследования (осмотр, пальпация)

Лекарственная терапия может считаться самостоятельным высокоэффективным методом при лечении

- А. Мелкоклеточного рака легкого
- Б. Рака желудка
- В. Рака почки
- Г. Рака мочевого пузыря
- Д. Рака яичников

Радиоактивный йод применяют с целью диагностики опухолей -

- А. Поджелудочной железы
- Б. Щитовидной железы
- В. Желудка
- Г. Надпочечников
- Д. Опухолей нейроэндокринной системы

Костные саркомы чаще возникают в

- А. Мелких костях
- Б. Суставах
- В. Плоских костях
- Г. Длинных трубчатых костях
- Д. Губчатых костях

Многообразие гистогенеза и морфологических форм отличает злокачественные опухоли

- А. тела матки
- Б. шейки матки
- В. яичников
- Г. влагалища
- Д. вульвы

Лекарственное средство это

- А. вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий
- Б. вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения и предотвращения беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов и методами синтеза
- В. вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий
- Г. вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения и предотвращения беременности и полученные из крови и методами синтеза

Для оценки распространенности рака желудка на пищевод наибольшую ценность имеет

- А. эзофагогастроскопия
- Б. трансабдоминальное УЗИ
- В. рентгенография грудной клетки
- Г. рентгенография пищевода и желудка с контрастированием
- Д. ПЭТ – сканирование

При каких клинических ситуациях необходимо дополнительное специальное лечение после операции по поводу рака тела матки:

- А. опухолевые эмболы в кровеносных сосудах
- Б. распространение опухоли на внутренний зев
- В. низкая степень дифференцировки
- Г. локализация в области дна матки

При лечении хронического болевого синдрома у онкологических больных следует

- А. по возможности использовать плацебо
- Б. давать анальгетики только по требованию
- В. назначать анальгетические препараты регулярно для предотвращения боли
- Г. вводить анальгетики внутримышечно
- Д. начинать лечение с максимально переносимой дозы наркотических анальгетиков

Наиболее часто в пищеводе встречаются следующие формы рака

- А. плоскоклеточный
- Б. железистый
- В. мелкоклеточный
- Г. переходноклеточный
- Д. крупноклеточный

Вторичная профилактика рака, это:

- А. Отказ от курения
- Б. Скрининговая маммография
- В. Предупреждение избыточной инсоляции
- Г. Вакцинация от гепатита в
- Д. Соблюдение техники безопасности при работе с радиоактивными веществами

Лекарственную противоопухолевую терапию применяют в качестве:

- А. самостоятельного метода лечения
- Б. компонента комплексного лечения
- В. радиомодификатора
- Г. профилактики послеоперационных осложнений
- Д. верно все вышеперечисленное

Наиболее часто гематогенные метастазы мелкоклеточного рака легкого локализуются в

- А. Костях
- Б. Печени
- В. Надпочечниках
- Г. Головном мозге
- Д. Мягких тканях

Медуллярный рак щитовидной железы развивается из:

- А. А-клеток
- Б. В-клеток
- В. С-клеток
- Г. клеток Гюртле
- Д. мезенхимальной ткани

Рак предстательной железы преимущественно развивается

- А. в переходной зоне
- Б. в периферической зоне
- В. в центральной зоне
- Г. в передней фиброзно-мышечной области
- Д. независимо от анатомической локализации

У больной 20 лет в верхне-наружном квадранте молочной железы пальпируется опухоль размером 2×3 см, подвижная, плотная, с четкими контурами. Кожные симптомы отрицательные. Подмышечные лимфоузлы не увеличены. Наиболее вероятный диагноз

- А. диффузная мастопатия
- Б. рак молочной железы
- В. болезнь Минца
- Г. фиброаденома
- Д. узловая мастопатия

Назовите наиболее часто встречающийся морфологический вариант рака пищевода

- А. Аденокарцинома
- Б. Плоскоклеточный рак
- В. Мелкоклеточный рак
- Г. Аденоплоскоклеточный

Хемодектома блуждающего нерва клинически локализуется в заднечелюстной ямке. Она расположена в

- А. Переднебоковом фарингеальном пространстве
- Б. Заднебоковом фарингеальном пространстве
- В. Ретрофарингеальном пространстве
- Г. Сонном треугольнике
- Д. Подчелюстном треугольнике

Наиболее частой опухолью средостения мезенхимального происхождения является

- А. Фиброма
- Б. Липома
- В. Гемангиома
- Г. Лимфангиома
- Д. Рабдомиома

ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛИМФЕДЕМЫ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ СЧИТАЮТСЯ

- А. Аэробная и силовая физическая нагрузка
- Б. Хирургическое удаление лимфоузлов и лучевая терапия
- В. Избыточное употребление жидкости и белка
- Г. Артериальная гипертензия и сахарный диабет

Основная методика рентгенологического исследования ободочной кишки

- А. пероральное заполнение
- Б. ирригоскопия
- В. водная клизма и супервольтная рентгенография
- Г. воздушное контрастирование

Для лечения выраженной дисплазии влагалищной порции шейки матки (CIN-3) у женщины 30 лет целесообразно использовать

- А. электрокоагуляцию
- Б. экстирпацию матки без придатков
- В. конизацию шейки матки
- Г. экстирпацию матки с придатками
- Д. расширенную экстирпацию матки без придатков

Обследование больного с жалобами на нарушение функций кишечника следует начинать с

- А. Рентгенологического исследования толстого кишечника (ирригоскопии)
- Б. Колонофиброскопии
- В. Ректороманоскопии
- Г. Ректального пальцевого исследования
- Д. Ультразвукового исследования брюшной полости

Чаще всего метастазы гастроинтестинальных стромальных опухолей развиваются в

- А. Регионарных лимфоузлах
- Б. Печени
- В. Легких
- Г. Яичниках
- Д. Коже

К регионарным лимфатическим узлам при раке полового члена относят

- А. поверхностные паховые
- Б. глубокие паховые
- В. тазовые
- Г. паракаваальные

В качестве адъювантной терапии пациентам с локализованной формой меланомы кожи высокого риска прогрессирования IIB-IIС стадии могут быть рекомендованы следующие препараты:

- А. Пембролизумаб
- Б. Пролголимаб
- В. Дабрафениб
- Г. Дакарбазин

Наиболее частыми клиническими проявлениями опухолей органов билиопанкреатодуоденальной зоны являются:

- А. анемия
- Б. желтуха
- В. нарушение кишечной проходимости
- Г. боль
- Д. одышка

Наиболее частое направление лимфогенного метастазирования при раке молочной железы к

- А. подмышечным лимфатическим узлам
- Б. подключичным лимфатическим узлам
- В. парастернальным лимфатическим узлам
- Г. подключичным лимфатическим узлам
- Д. медиастинальным лимфатическим узлам

Изолированное метастатическое поражение плевры у женщин наиболее часто отмечается при

- А. раке желудка
- Б. раке толстой кишки
- В. хорионэпителиоме матки
- Г. раке щитовидной железы
- Д. раке яичников

При распространенном раке предстательной железы максимальную андрогенную блокаду вызывают

- А. Эстрогены
- Б. Ингибиторы ароматазы+антиандрогены
- В. Агонисты LHRG + антиандрогены;
- Г. Прогестины+дексаметазон
- Д. Гормоноцитостатики

Опухоль кожи с медленным ростом и редким метастазированием

- А. базальноклеточный рак
- Б. плоскоклеточный рак
- В. карцинома Меркеля
- Г. аденокарцинома
- Д. узловая меланома

У больного 60 лет плоскоклеточный неороговевающий рак гортани IIIA стадии, инфильтративная форма с явлениями перихондрита. Ему необходимо провести

- А. Ларингэктомию
- Б. Комбинированное лечение с предоперационной лучевой терапией
- В. Комбинированное лечение с послеоперационной лучевой терапией
- Г. Самостоятельный полный курс лучевой терапии по радикальной программе
- Д. Химиотерапию

Наиболее чувствительным опухолевым маркером мелкоклеточного рака легкого является

- А. раково-эмбриональный антиген
- Б. нейроспецифическая енолаза
- В. хорионический гонадотропин, трофобластический b-глобулин
- Г. лактатдегидрогеназа
- Д. щелочная фосфатаза

Углубленное обследование больных Ia клинической группы должно быть закончено не позднее (с момента взятия на диспансерный учет):

- А. 7 дней
- Б. 10 дней
- В. 13 дней
- Г. 16 дней
- Д. 18 дней

Метастатическое поражение легких, диагностируемое до выявления первичной опухоли или синхронно, наиболее часто имеет место при раке

- А. Молочной железы
- Б. Желудка
- В. Почки
- Г. Легкого
- Д. Предстательной железы

По мере роста опухоли скорость нарастания степени нарушения бронхиальной проходимости наиболее выражена при

- А. Эндобронхиальном экзофитном раке
- Б. Перибронхиальном узловатом раке
- В. Разветвленном раке
- Г. Пневмониеподобном раке
- Д. Раке верхушки легкого (Панкоста)

Ведущим методом диагностики меланомы кожи является

- А. магнитно-резонансная томография
- Б. позитронно-эмиссионная томография
- В. термография
- Г. морфологический метод
- Д. дерматоскопия

Среди злокачественных опухолей слюнных желез чаще встречается

- А. Аденокарцинома
- Б. Плоскоклеточный рак
- В. Аденокистозный рак
- Г. Мукоэпидермоидный рак
- Д. Ацинозноклеточный рак

К инвазивным методам рентгенологического исследования относится -

- А. Компьютерная томография
- Б. Ирригоскопия
- В. Флюорография
- Г. Ангиография
- Д. Маммография

Выберите наиболее целесообразный метод лечения рака носоглотки:

- А. хирургический
- Б. лучевой
- В. химиотерапевтический
- Г. химио-лучевой
- Д. комбинированный (хирургический + лучевая терапия)

Химио-лучевая терапия при комбинированном лечении рака пищевода может применяться:

- А. В предоперационном периоде
- Б. Интраоперационно
- В. В раннем послеоперационном периоде
- Г. В послеоперационном периоде в интервале до 2 месяцев
- Д. Через 2 месяца после операции

Какие ранние симптомы при поражений опухолью вестибулярного отдела гортани

- А. осиплость голоса
- Б. боли в горле
- В. дискомфорт и ощущение инородного тела в горле
- Г. увеличенные лимфоузлы шеи

Определение рецепторов стероидных гормонов при раке молочной железы необходимо для проведения

- А. лучевой терапии
- Б. химиотерапии
- В. радикальной мастэктомии
- Г. гормонотерапии
- Д. таргетной терапии

Анализ на РСА3 определяется:

- А. В сыворотке крови
- Б. В моче
- В. В сыворотке крови после массажа простаты
- Г. При иммуногистохимическом исследовании ткани, взятой при биопсии

Методами лечения рака мочевого пузыря являются

- А. хирургический
- Б. комбинированный
- В. лучевой
- Г. гормонотерапия
- Д. химиотерапия

Стандарт комбинированного лечения остеосаркомы G3

- А. Неоадъювантная ПХТ + операция
- Б. Операция + адъювантная ПХТ
- В. Неоадъювантная ПХТ + операция + адъювантная ПХТ
- Г. Полихимиотерапия + лучевая терапия

Для скрининга рака молочной железы у женщин в менопаузе наиболее эффективно применение

- А. маммографии
- Б. ультразвуковой томографии
- В. самообследования молочных желез
- Г. осмотра и пальпации
- Д. магнитно-резонансной томографии

Наиболее частой локализацией рака полости рта является

- А. дно полости рта
- Б. мягкое небо
- В. язык
- Г. слизистая щеки

Рабдомиосаркома – это...

- А. злокачественная опухоль из жировой ткани
- Б. доброкачественная опухоль из скелетных мышц
- В. злокачественная опухоль из гладких мышц
- Г. злокачественная опухоль из кардиомиоцитов
- Д. злокачественная опухоль из скелетных мышц

В средостении НЕТ следующего отдела:

- А. переднее
- Б. среднее
- В. заднее
- Г. левое

Больная 65 лет, около 20 лет страдает хроническим гастритом. При рентгенографии желудка – подозрение на инфильтративный рак. При ЭГДС картина диффузного гастрита, по данным гастробиопсии - признаки хронического воспаления. Больной следует

- А. Выполнить гастрэктомию
- Б. Назначить лечение гастрита с контрольной явкой больной через 6 месяцев
- В. Выполнить лапаротомию, гастротомию с биопсией подозрительных участков слизистой
- Г. Выполнить лапароскопию
- Д. Назначить повторную гастроскопию с множественной биопсией слизистой

С какого возраста рекомендуется выполнять ПСА-тестирование в рамках диспансеризации взрослого населения в РФ

- А. 35 лет
- Б. 40 лет
- В. 45 лет
- Г. 50 лет

Единица поглощенной дозы облучения, это:

- А. Грей
- Б. Зиверт
- В. Рентген
- Г. Кюри
- Д. Бэр

Основные симптомы при опухолевом поражении складчатого отдела гортани

- А. охриплость
- Б. боль при глотании
- В. чувство дискомфорта при глотании
- Г. затрудненный вдох
- Д. поперхивание

Лекарственный препарат это

- А. лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболевания
- Б. Фармакологически активная субстанция в прототипе лекарственной формы, применяемая для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности
- В. лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности
- Г. лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности

Супрастенотическое расширение пищевода при раке отмечается, как правило, при

- А. Полиповидной форме роста
- Б. Язвенно-инфильтративной форме роста
- В. Раке в дивертикуле пищевода
- Г. Экзофитном типе роста
- Д. Смешанном типе роста

Недифференцированные опухоли в классификации TNM обозначаются символом:

- А. G 0
- Б. G 1
- В. G 2
- Г. G 3
- Д. G 4

Какие виды диагностики возможны при проведении фотодинамической терапии (ФДТ)?

- А. компьютерная томография
- Б. флуоресцентная спектроскопия
- В. магнитно-резонансная томография
- Г. динамическая сцинтиграфия

К фоновым воспалительным процессам шейки матки относится

- А. дисплазия
- Б. истинная эрозия
- В. эктопия
- Г. лейкоплакия
- Д. эндометриоз

Биологическое свойство злокачественной опухоли -

- А. Неконтролируемый рост
- Б. Топоингибция
- В. Субстратная зависимость размножения
- Г. Зависимость размножения от факторов роста
- Д. Повышенная чувствительность к ингибирующим сигналам

Из перечисленных симптомов при первичном раке печени наиболее часто встречается

- А. Бледность кожных покровов
- Б. Желтушность кожных покровов
- В. Симптомы портальной гипертензии
- Г. Гепатомегалия
- Д. Симптом Курвуазье

Наиболее частая локализация зернисто-клеточной опухоли (опухоли Абрикосова)

- А. Язык
- Б. Кожа
- В. Гортань
- Г. Твердое небо
- Д. Гипофиз

При локализации опухоли в передне-боковом парафарингеальном пространстве в первую очередь следует исключить новообразования:

- А. эпителиальной природы
- Б. нейрогенной природы
- В. метастатического характера
- Г. сосудистого происхождения
- Д. мезенхимальной природы

Объем хирургического вмешательства при раке селезеночного угла ободочной кишки.

- А. правосторонняя гемиколэктомия.
- Б. резекция поперечной ободочной кишки
- В. брюшно-анальная резекция.
- Г. левосторонняя гемиколэктомия.

К опухолям яичников эпителиальной природы относят

- А. андробластому
- Б. текому
- В. тератобластому
- Г. дисгерминому
- Д. серозный рак

Гемангиоэндотелиома – это опухоль

- А. клеток APUD-системы
- Б. соединительной ткани
- В. нервных ганглиев
- Г. сосудов

Центральным раком легкого называют опухоли возникающие из:

- А. главных, долевых, сегментарных бронхов
- Б. главных, долевых, сегментарных и субсегментарных бронхов
- В. любых бронхов, расположенных в центре легкого
- Г. любых бронхов, расположенных вблизи корня легкого

Соблюдение принципов анатомической зональности и футлярности лежит в основе:

- А. понятия «антибластики» при операциях по поводу злокачественных опухолей
- Б. понятия «абластики» при операциях по поводу злокачественных опухолей
- В. мер профилактики ортоградного лимфогенного метастазирования
- Г. мер профилактики гематогенного метастазирования
- Д. мер профилактики лимфогематогенного метастазирования

Доброкачественная форма опухоли -

- А. лентиго-меланома
- Б. узловая меланома
- В. поверхностно-распространяющаяся меланома
- Г. акрально-лентигинозная меланома
- Д. ювенильная меланома

Прогрессирование после удаления забрюшинных опухолей чаще всего проявляется в виде

- А. метастазов в печень
- Б. метастазов в легкие
- В. метастазов в лимфоузлы
- Г. локальных рецидивов
- Д. метастазов в кости скелета

К высокому уровню риска прогрессии рака предстательной железы относится все, кроме

- А. Исходный уровень пса до биопсии 20 нг/мл
- Б. Уровень баллов по шкале глисон 10
- В. Стадия первичного опухолевого очага Т 1
- Г. исходный уровень пса до биопсии ниже 10 нг/мл

Наиболее часто рак слизистой оболочки полости рта метастазирует в регионарные лимфатические узлы при локализации:

- А. в корне языка
- Б. в подвижной части языка
- В. в мягком и твердом небе
- Г. на слизистой щеки
- Д. на слизистой альвеолярного отростка челюстей

Первичная профилактика рака, это:

- А. Скрининговая маммография
- Б. Исследование мазков по Папаниколау
- В. ПСА-скрининг
- Г. Отказ от курения
- Д. Гемоккульт тест

Больная 40 лет предъявляет жалобы на слабость, потерю веса, снижение аппетита. При рентгеноскопии и ЭГДС выявлен рак желудка с поражением всех отделов. При лапароскопии обнаружен метастаз в левый яичник размерами около 2,0 см. Других проявлений болезни не выявлено. В данной ситуации показано

- А. Выполнить гастрэктомию с последующей внутриполостной химиотерапией
- Б. Выполнить гастрэктомию, экстирпацию матки с придатками с последующим наблюдением больной
- В. Назначить лучевую терапию
- Г. Билатеральная овариоэктомия с последующей системной химиотерапией
- Д. Выполнить гастрэктомию, удаление пораженного яичника с последующей системной химиотерапией

Большинство периферических доброкачественных опухолей легких составляют

- А. Фибромы
- Б. Тератомы
- В. Гамартомы
- Г. Аденомы
- Д. Лейомиомы

Определяющая роль в увеличении заболеваемости населения раком легких принадлежит

- А. генетическому фактору
- Б. профессиональным вредностям
- В. курению
- Г. загрязнению атмосферы
- Д. ионизирующему излучению

Основным первичным учетным документом онкологического диспансера является:

- А. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака
- Б. протокол запущенности
- В. выписка из медицинской карты
- Г. контрольная карта диспансерного наблюдения
- Д. медицинская карта стационарного больного

Каким клиническим симптомом чаще всего проявляется нейтропения?

- А. лимфаденопатией
- Б. спленомегалией
- В. лихорадкой
- Г. кровотечением

Показанием для назначения гормонотерапии в послеоперационном периоде больным раком эндометрия является

- А. возраст больных
- Б. глубина инвазии
- В. наличие рецепторов эстрогенов и прогестерона в опухоли
- Г. сопутствующие заболевания
- Д. величина матки

В каких ситуациях, показано выполнение молекулярно-генетического исследования меланомы на наличие BRAF-мутации:

- А. исследование показано всем больным меланомой кожи независимо от стадии
- Б. только больным с IV стадией
- В. начиная со II стадии
- Г. начиная с III стадии
- Д. только при установленном первичном очаге

Показанием для назначения адъювантной химиотерапии при раке молочной железы является

- А. наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах
- Б. наличие отдаленных метастазов
- В. высокий уровень рецепторов эстрогенов

К доброкачественным опухолям молочной железы относится

- А. фиброзно-кистозная мастопатия
- Б. фиброаденома молочной железы
- В. внутрипротоковая папиллома
- Г. болезнь Педжета
- Д. мастит

Назовите медицинские препараты, применяемые в консервативном лечении атипической гиперплазии эндометрия

- А. прогестерон (дюфастон и т.д.)
- Б. депо-провера
- В. золадекс
- Г. все вышеперечисленные

При распространенных формах рака мочевого пузыря наибольшей эффективностью обладает схемы лечения

- А. Гемцитабин+цисплатин
- Б. Циклофосфан+доксорубицин+цисплатин
- В. Паклитаксел+цисплатин
- Г. Карбоплатин+метотрексат+винбластин
- Д. Метотрексат+доксорубицин+винбластин+цисплатин

Показаниями для многоточковой биопсии предстательной железы являются:

- А. повышение уровня PSA > 2,5 нг/мл
- Б. данные трансректального УЗИ
- В. данные пальцевого ректального исследования
- Г. жалобы больного на дизурические явления

Наиболее оптимальным оперативным доступом при раке почки является

- А. чрезбрюшинный доступ
- Б. доступ по Федорову
- В. Доступ по Bergmann
- Г. Доступ по Nagamatsu
- Д. Доступ по Пирогову

Большинство доброкачественных центральных опухолей легких составляют

- А. Аденомы бронха
- Б. Папилломы бронха
- В. Сосудистые опухоли
- Г. Тератомы
- Д. Гладкомышечные опухоли

При реакции Абелева – Татаринова выявляется:

- А. альфафетопротеин
- Б. хорионический гонадотропин
- В. ферритин
- Г. ингибин-В
- Д. кальцитонин

Химиотерапия эпителиальных опухолей головы и шеи наиболее эффективна при

- А. Высокодифференцированном плоскоклеточном раке
- Б. Низкодифференцированном плоскоклеточном раке
- В. Аденокарциноме
- Г. Аденокистозном раке
- Д. Мукоэпидермальном раке

Самой редкой злокачественной опухолью органов билиопанкреатодуоденальной зоны является рак

- А. дистального отдела холедоха
- Б. головки поджелудочной железы
- В. внепеченочных желчных протоков
- Г. 12-перстной кишки
- Д. большого дуоденального сосочка

К промежуточному уровню риска прогрессии рака предстательной железы относится все, кроме

- А. уровень баллов по шкале глисон 6
- Б. исходный уровень пса до биопсии 15 нг/мл
- В. стадия первичного опухолевого очага Т 2
- Г. исходный уровень пса до биопсии от 10 до 20 нг/мл

Наиболее эффективной схемой первой линии химиотерапии распространенного рака яичников является

- А. Цисплатин+циклофосфан
- Б. Цисплатин+адриамицин+циклофосфан
- В. Циклофосфан+карбоплатин
- Г. Паклитаксел + карбоплатин
- Д. Этопозид+ифосфамид

Что является скрининговым тестом при патологии эндометрия?

- А. Пайпель-биопсия эндометрия
- Б. раздельное диагностическое выскабливание матки
- В. УЗИ органов малого таза
- Г. УЗИ органов малого таза с цветным доплеровским картированием

У мужчин, больных центральным раком легкого, преобладает

- А. Плоскоклеточный рак
- Б. Железистый рак
- В. Мелкоклеточный рак
- Г. Крупноклеточный рак
- Д. Светлоклеточный рак

Рак пищевода с инфильтрацией слизисто-подслизистого слоя и отсутствием регионарных метастазов относится к

- А. I стадии
- Б. IIa стадии
- В. IIб стадии
- Г. IIIa стадии
- Д. IIIб стадии

Какой из перечисленных признаков наиболее характерен для периферического рака легкого

- А. затемнение треугольной формы в прикорневой зоне на рентгенограммах
- Б. кровохарканье
- В. кашель с гнойной мокротой и примесью крови
- Г. округлая тень с неровными контурами на рентгенограммах

Под термином «метастаз Крукенберга» подразумевается метастаз в:

- А. забрюшинные лимфоузлы
- Б. яичники
- В. пупок
- Г. надключичный лимфоузел
- Д. средостение

Периферический рак у женщин чаще бывает

- А. Плоскоклеточным
- Б. Железистым
- В. Мелкоклеточным
- Г. Крупноклеточным
- Д. Светлоклеточным

При подозрении на злокачественную опухоль органов билиопанкреатодуоденальной зоны, с целью диагностики, обязательным является выполнение:

- А. колоноскопии
- Б. обзорной рентгенографии органов брюшной полости
- В. рентгенологического исследования желудка и 12-и перстной кишки
- Г. УЗИ печени, поджелудочной железы и внепеченочных желчных путей
- Д. гастродуоденоскопии

Ведущий метод лечения внеорганных опухолей шеи

- А. хирургический
- Б. лучевой
- В. химиотерапевтический
- Г. комбинированный
- Д. комплексный

Наиболее часто колоректальный рак метастазирует в:

- А. Головной мозг
- Б. Печень
- В. Надпочечники
- Г. Легкие
- Д. Селезенку

Центральные доброкачественные опухоли легких чаще всего развиваются в

- А. Главных и долевого бронхах
- Б. Сегментарных бронхах
- В. Бронхах V-VI порядка
- Г. Бронхиолах
- Д. Альвеолах

Helicobacter Pylori участвует в развитии:

- А. рака двенадцатиперстной кишки
- Б. рака печени
- В. опухоли Клацкина
- Г. гастроинтестинальной стромальной опухоли
- Д. рака желудка

Типичной операцией при высокодифференцированном раке щитовидной железы T1-2 является

- А. Энуклеация узла
- Б. Резекция доли
- В. Гемитиреоидэктомия
- Г. Гемитиреоидэктомия с перешейком
- Д. Субтотальная резекция железы

Какой из вариантов лейкозов проявляется увеличением в периферической крови морфологически зрелых лимфоцитов*

- А. острый лимфобластный лейкоз
- Б. острый промиелоцитарный лейкоз
- В. хронический миелолейкоз
- Г. хронический лимфолейкоз

Целью паллиативной помощи онкологическим больным является

- А. продление жизни
- Б. проведение эвтаназии,
- В. создание иллюзии лечения,
- Г. улучшение качества жизни

Катетеризационный и пункционный методы биопсии целесообразны, когда дифференциальный диагноз проводится между периферической доброкачественной опухолью легких и

- А. Бронхогенной кистой
- Б. Энтерогенной кистой
- В. Паразитарной кистой
- Г. Периферическим раком легких
- Д. Туберкулезом

Основной фактор, повышающий риск возникновения рака ободочной кишки -

- А. Ионизирующее излучение
- Б. Курение
- В. Недостаточное употребление грубой клетчатки
- Г. Прием салицилатов
- Д. Употребление алкоголя

Наиболее частое летальное осложнение при одномоментных операциях по поводу рака пищевода

- А. Послеоперационная пневмония
- Б. Тромбоэмболия легочной артерии
- В. Несостоятельность анастомоза
- Г. Надпочечниковая недостаточность
- Д. Инфаркт миокарда

Аспирационный (пункционный) метод исследования наиболее информативен в цитологической диагностике -

- А. Эпителиальных опухолей
- Б. Мезенхимальных опухолей
- В. Нейрогенных опухолей
- Г. Дисэмбриональных опухолей
- Д. Меланоцитарных опухолей

Что считается истинным предраком шейки матки?

- А. легкая степень дисплазии плоского эпителия
- Б. средняя степень дисплазии плоского эпителия
- В. тяжелая степень дисплазии плоского эпителия
- Г. рак шейки матки in situ

Больному 45 лет по поводу плоскоклеточного рака гортани IIIA стадии с преимущественно экзофитной формой роста проведено предоперационное облучение в дозе 40 Гр. Через 2 недели отмечено клинически практически полное исчезновение опухоли. Ему следует

- А. выполнить резекцию гортани
- Б. выполнить ларингэктомию
- В. назначить химиотерапию
- Г. продолжить лучевую терапию по радикальной программе
- Д. прекратить лечение, наблюдать в динамике

Наиболее информативным методом диагностики внутрипротоковых папиллом молочной железы является -

- А. Стандартная маммография
- Б. Компьютерная томография
- В. Дуктография
- Г. Магнитно-резонансная томография
- Д. Ультразвуковая томография

Ранний рак мочевого пузыря чаще всего проявляется

- А. гематурией
- Б. дизурией
- В. болями в промежности
- Г. анемией
- Д. лихорадкой

При лучевой терапии рака яичников применяются

- А. дистанционная лучевая терапия
- Б. внутрибрюшное введение открытых источников
- В. внутритканевая лучевая терапия
- Г. флизкофокусная лучевая терапия
- Д. аппликационная лучевая терапия

Наиболее частая гистологическая форма рака мочевого пузыря

- А. плоскоклеточный
- Б. переходноклеточный
- В. аденокарцинома
- Г. мелкоклеточный

Выявление костных включений в виде зубов или фаланг пальцев в опухоли средостения при рентгенологическом исследовании является патогномоничным симптомом для:

- А. тимомы
- Б. зрелой тератомы
- В. злокачественной лимфомы
- Г. энтерокистомы
- Д. бронхиальной кисты

При центральном мелкоклеточном раке легкого III стадии заболевания применяются все перечисленные методы, кроме

- А. хирургического
- Б. симптоматического
- В. лучевого
- Г. химиотерапевтического
- Д. химиолучевого

Наиболее чувствительными к химиопрепаратам являются метастазы меланомы, локализующиеся в

- А. коже и подкожной клетчатке
- Б. костях
- В. легких
- Г. печени
- Д. головном мозге

К облигатным предракам кожи относят

- А. себорейный кератоз
- Б. кератоакантому
- В. постлучевой дерматит
- Г. болезнь Боуэна
- Д. мышьяковистый дерматит

У больного 59 лет через год после нефрэктомии по поводу рака выявлен солитарный метастаз в верхней доле правого легкого. Ему следует

- А. выполнить резекцию легкого
- Б. провести крупнопольное облучение правого легкого
- В. провести локальную лучевую терапию на область метастаза
- Г. назначить химиотерапию
- Д. назначить иммунотерапию

Наиболее часто метастазами рака щитовидной железы поражаются лимфоузлы

- А. вдоль внутренней яремной вены
- Б. надключичные
- В. подключичные
- Г. паратрахеальные
- Д. загрудинные

При раке предстательной железы чаще всего отмечается метастатическое поражение

- А. ребер
- Б. костей черепа
- В. костей таза
- Г. шейного отдела позвоночника
- Д. грудины

По морфологическому строению преобладающей формой рака толстого кишечника является

- А. аденокарцинома различной степени зрелости и функциональной направленности
- Б. плоскоклеточный рак
- В. недифференцированный рак
- Г. диморфный (смешанный железистый и плоскоклеточный) рак
- Д. переходноклеточный рак

При стойкой нейропатической боли у онкологических больных показаны

- А. противосудорожные средства в сочетании с трициклическими антидепрессантами
- Б. лучевая терапия на область пораженного дерматома
- В. нестероидные противовоспалительные средства в максимальных дозировках
- Г. бисфосфонаты
- Д. бензодиазепины

Какой метод диагностики необходимо применить для выявления или исключения рака при узловом образовании в щитовидной железе

- А. пальпация
- Б. сканирование
- В. ультразвуковое исследование (УЗИ)
- Г. пункция и/или пункция под контролем УЗИ
- Д. срочное гистологическое исследование во время операции

Наиболее частая локализация костных сарком

- А. плечевая кость
- Б. большеберцовая кость
- В. позвонки
- Г. кости таза
- Д. бедренная кость

На высокую степень злокачественности мягкотканной саркомы указывает

- А. высокая дифференцировка клеток
- Б. высокая митотическая активность
- В. обилие стромы, малое количество опухолевых клеток
- Г. слабая васкуляризация
- Д. отсутствие некрозов

ЧРЕСКОЖНАЯ БИОПСИЯ ПОЧКИ ПОКАЗАНА

- А. Всем пациентам для определения дальнейшей тактики лечения
- Б. Перед хирургическим лечением, за исключением аблации
- В. При метастатическом процессе
- Г. Для верификации кист

При радикальной мастэктомии по Мадену удаляется

- А. молочная железа с подлежащей фасцией
- Б. молочная железа, большая и малая грудные мышцы и клетчатка с лимфоузлами подмышечной, подключичной и подлопаточной областей
- В. молочная железа, клетчатка с лимфоузлами подмышечной, подключичной и подлопаточной областей
- Г. молочная железа, малая грудная мышца и клетчатка с лимфоузлами подмышечной, подключичной и подлопаточной областей
- Д. молочная железа, большая грудная мышца и клетчатка с лимфоузлами подмышечной, подключичной, подлопаточной и парастеральной областей

Забрюшинное клетчаточное пространство расположено

- А. позади почечной и внутрибрюшной фасций
- Б. между предпочечной и внутрибрюшной фасцией
- В. позади ободочной и предпочечной фасций
- Г. позади ободочной и внутрибрюшной фасций
- Д. между ободочной и предпочечной фасциями

К доброкачественным опухолям легких НЕ относится:

- А. Светлоклеточная опухоль
- Б. гамартома
- В. Аденоплоскоклеточная карцинома
- Г. гемангиома

К предраку шейки матки относят

- А. эндоцервикоз
- Б. эндометриоз
- В. эктропион
- Г. дисплазию
- Д. карциному in situ

Пациент 62 лет. Жалобы на затрудненное прохождение пищи при глотании, потерю веса на 10 кг за последние 2 месяца. При ЭГДС и рентгеноскопии желудка определяется опухоль кардии с переходом на нижнегрудной отдел пищевода. Отдаленных метастазов не выявлено. Ваша тактика

- А. установить стент в пищевод и назначить лучевую терапию
- Б. выполнить чрезбрюшинную гастрэктомию
- В. выполнить проксимальную резекцию желудка с резекцией нижнегрудного отдела пищевода торакоабдоминальным доступом
- Г. выполнить проксимальную резекцию желудка с резекцией нижнегрудного отдела пищевода чрезбрюшинным доступом
- Д. выполнить гастрэктомию с резекцией нижнегрудного отдела пищевода торакоабдоминальным доступом и пластикой толстой кишкой

Наиболее распространенный гистологический вариант рака предстательной железы

- А. аденокарцинома
- Б. переходноклеточный рак
- В. плоскоклеточный рак
- Г. мелкоклеточный рак
- Д. светлоклеточный рак

Гормональная регуляция роста опухоли в организме чаще всего осуществляется:

- А. непосредственным воздействием на генетический аппарат
- Б. непосредственным воздействием на цитоплазму
- В. воздействием на гормональные рецепторы в клеточной мембране
- Г. непосредственным воздействием на онкобелки
- Д. непосредственным воздействием на транскрипционный фактор

Для лечения ранних форм рака шейки матки чаще используется

- А. хирургический метод
- Б. комбинированный метод с предоперационным облучением
- В. комбинированный метод с послеоперационным облучением
- Г. сочетанный лучевой метод
- Д. лекарственный метод

Миастения может иметь место у больных

- А. тимомой
- Б. фибромой средостения
- В. ганглионевромой средостения
- Г. феохромоцитомой средостения
- Д. внегонадной семиномой средостения

При генерализованном раке молочной железы у больных в менопаузе эндокринное лечение в I линии проводят

- А. андрогенами
- Б. кортикостероидами
- В. эстрогенами
- Г. аналогами ЛГРГ
- Д. антиэстрогенами

ПРИ ФЕБРИЛЬНОЙ НЕЙТРОПЕНИИ АНТИБИОТИКОМ ВЫБОРА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Цефепим 2 гр каждые 8 часов
- Б. Ципрофлоксацин 400 мг каждые 8 часов
- В. Ванкомицин 15 мг/кг каждые 12 часов
- Г. Амоксиклав 625 мг каждые 8 часов

При раке тела матки чаще встречается

- А. аденокарцинома
- Б. плоскоклеточный рак
- В. светлоклеточная рак
- Г. железисто-плоскоклеточный рак
- Д. недифференцированный рак

По гистологическому строению рак желудка чаще всего является:

- А. железистым
- Б. плоскоклеточным
- В. переходноклеточным
- Г. смешанным железисто-плоскоклеточным
- Д. мелкоклеточным

Наиболее часто неврологические осложнения возникают после операций по поводу

- А. тератом средостения
- Б. неврином средостения
- В. липом средостения
- Г. тимом
- Д. кист перикарда

Основной метод лечения локализованной меланомы кожи

- А. хирургический
- Б. лучевая терапия
- В. комбинированный
- Г. химиотерапия
- Д. иммунотерапия

У женщины 55 лет по поводу миомы матки произведена операция - экстирпация матки с придатками. При гистологическом исследовании в одном из узлов, расположенных в дне матки - выявлена лейомиосаркома. Ваша тактика

- А. наблюдение
- Б. лучевая терапия
- В. химиотерапия
- Г. повторная операция с выполнением лимфаденэктомии

Препараты для лечения слабой боли у онкологических больных

- А. наркотические анальгетики
- Б. нестероидные противовоспалительные средства
- В. слабые опиоиды
- Г. слабые опиоиды+ненаркотические анальгетики
- Д. слабые опиоиды+антидепрессанты

Превентивное фасциально-фулярное иссечение клетчатки шеи оправдано при раке

- А. подвижной части языка Ia стадии
- Б. нижней губы I стадии
- В. корня языка IIa стадии
- Г. слизистой дна полости рта Ia стадии
- Д. слизистой щеки I стадии

Чувствительность опухоли к химиотерапии зависит от:

- А. наследственности
- Б. патологии печени
- В. возраста пациента
- Г. морфологической структуры опухоли
- Д. стадии опухолевого процесса

К кистам средостения НЕ относятся:

- А. Бронхогенные кисты
- Б. Энтерогенные кисты
- В. Перикардальные кисты
- Г. Киста Бейкера

Симптом Курвуазье проявляется при обтурации

- А. правого печеночного протока
- Б. левого печеночного протока
- В. общего печеночного протока
- Г. пузырного протока
- Д. общего желчного протока

Для скрининга рака толстой кишки применяется -

- А. Ректороманоскопия
- Б. Анализ кала на скрытую кровь
- В. Ирригоскопия
- Г. Определение раково-эмбрионального антигена
- Д. УЗИ органов брюшной полости

Назовите опухолевые маркеры, определяемые при новообразованиях яичников:

- А. СА-125
- Б. SCC
- В. В-хгч
- Г. ничего из перечисленного

Классическая триада симптомов при раке почки

- А. боль, гематурия, пальпируемая опухоль
- Б. боль, снижение массы тела, ускоренная СОЭ
- В. гематурия, боль, лихорадка
- Г. боль, пальпируемая опухоль, эритроцитоз
- Д. снижение массы тела, пальпируемая опухоль, варикоцеле

Наиболее распространенной гистологической формой рака мочевого пузыря является

- А. плоскоклеточный
- Б. переходноклеточный
- В. аденокарцинома
- Г. мелкоклеточный
- Д. недифференцированный

О дисплазии эпителиальной ткани судят на основании

- А. клинических признаков
- Б. данных рентгенологического исследования
- В. данных компьютерной томографии
- Г. морфологического исследования
- Д. ультразвукового исследования

Под термином «ранний рак желудка» подразумевается

- А. размер опухоли меньше 1 см
- Б. размер опухоли меньше 2 см
- В. опухоль, не прорастающая глубже субсерозного слоя
- Г. бессимптомная опухоль менее 3 см
- Д. опухоль, не прорастающая глубже подслизистого слоя

Основным методом лечения рака желудка I-II стадий является

- А. хирургический
- Б. лучевой
- В. химиотерапия
- Г. иммунотерапия
- Д. таргетная терапия

Хориокарцинома матки чаще встречается в:

- А. пубертатном периоде
- Б. репродуктивном возрасте
- В. пременопаузальном периоде
- Г. менопаузе
- Д. постменопаузе

Расчет дозы препарата по площади под фармакокинетической кривой необходим при применении

- А. Оксалиплатина
- Б. Цисплатина
- В. Циклоплатина
- Г. Адриамицина
- Д. Карбоплатина

Наиболее частая локализация рака слизистой полости рта:

- А. твердое небо
- Б. щека
- В. дно полости рта
- Г. язык
- Д. альвеолярный отросток верхней челюсти

Для злокачественной опухоли кости наиболее характерно

- А. боли, усиливающиеся при ходьбе
- Б. боли, усиливающиеся по ночам
- В. боли, усиливающиеся под влиянием физиотерапии
- Г. боли, усиливающиеся при иммобилизации

При недифференцированном раке носоглотки большую эффективность показывает:

- А. лучевая терапия
- Б. химиотерапия цисплатин+метотрексат+блеомицин
- В. химиотерапия адриамицин+циклофосфан+цисплатин+ винкристин+ преднизолон (АЦОП+цисплатин)
- Г. сочетание лучевой терапии с химиотерапией АЦОП+цисплатин
- Д. оперативное лечение

К доброкачественным мезенхимальным опухолям относят:

- А. Псевдосаркоматозный фасциит
- Б. Гигантоклеточную опухоль сухожильных влагалищ
- В. Ксантогранулему
- Г. Виллонодулярный теносиновит
- Д. Адамантинома

Первым этапом лечения всех больных герминогенными опухолями яичка является

- А. орхофуникулэктомия
- Б. забрюшинная лимфаденэктомия
- В. лучевая терапия
- Г. химиотерапия
- Д. гормонотерапия

Наиболее характерными жалобами больных раком билиопанкреатодуоденальной зоны в первом периоде болезни являются

- А. Боли в эпигастрии и спине, жажда, повышенный аппетит
- Б. Тошнота, рвота, появление желтухи
- В. Боли в эпигастрии и спине, потеря массы тела
- Г. Частая рвота, анорексия, поносы
- Д. «горячие приливы»

Больной 46 лет обратился к хирургу с жалобами на утолщение шеи. Из сопутствующих заболеваний - хронический алкоголизм с поражением печени. При осмотре и пальпации определяется подкожное мягкотканное образование, кольцевидно охватывающее шею.

Диагноз: болезнь

- А. Реклингхаузена
- Б. Гиппеля-Линдау
- В. Пейтца-Егерса
- Г. Горлин-Гольца
- Д. Маделунга

Самостоятельное хирургическое лечение показано при

- А. остеогенной саркоме
- Б. опухоли Юинга
- В. хондросаркоме
- Г. ретикулосаркоме
- Д. не показано при перечисленных опухолях

Истинным предраком эндометрия следует считать

- А. железистую гиперплазию
- Б. фиброзный полип
- В. железистый полип
- Г. аденомиоз
- Д. атипическую гиперплазию (аденоматоз)

Какое инструментальное исследование не входит в обязательный минимум при обследовании больного раком толстой кишки?

- А. рентгенография грудной клетки
- Б. эхокардиография.
- В. колоноскопия.
- Г. ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
- Д. ирригоскопия

СТАНДАРТОМ ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФЕДЕМЫ СЧИТАЕТСЯ

- А. Мануальный лимфодренаж
- Б. Перемежающаяся пневмокомпрессия в режиме «нарастающая волна»
- В. Комплексная противоотечная терапия
- Г. Аэробная и силовая тренировка в компрессионном трикотаже

Нарушения глотания вследствие поражения нервного аппарата глотки чаще развиваются при раке пищевода

- А. Шейного и верхнегрудного отделов
- Б. Среднегрудного отдела
- В. Нижнегрудного отдела
- Г. Абдоминального сегмента
- Д. С переходом на кардию

Паллиативная помощь должна осуществляться

- А. только медицинскими работниками,
- Б. только членами семьи и/или друзьями больного,
- В. только социальными работниками и священнослужителями,
- Г. всеми перечисленными группами.

Целью паллиативной медицинской помощи неизлечимым онкологическим больным является:

- А. улучшение качества жизни
- Б. продление жизни
- В. улучшение психологического статуса
- Г. лечение хронической боли
- Д. симптоматическое лечение

Остеогенная саркома чаще метастазирует в

- А. регионарные лимфоузлы
- Б. плоские кости
- В. легкие
- Г. кожу
- Д. мягкие ткани

Минимальным объемом хирургического вмешательства при раке щитовидной железы следует считать

- А. Резекцию доли
- Б. Гемитиреоидэктомию
- В. Гемитиреоидэктомию с резекцией перешейка
- Г. Субтотальную резекцию щитовидной железы
- Д. Тиреоидэктомию

Наиболее частой морфологической формой злокачественных опухолей слизистой полости рта является

- А. саркома
- Б. плоскоклеточный рак
- В. мукоэпидермоидная опухоль
- Г. недифференцированный рак

Внутриполостная лучевая терапия – это

- А. размещение источников излучения на поверхности опухоли
- Б. внедрение источников излучения в ткани
- В. внедрение источников излучения в полость опухоли при ее распаде
- Г. внедрение источников излучения в полостные органы
- Д. прием источников излучения пероральным путем

Ангиография является наиболее информативным методом в диагностике -

- А. Хемодектомы шеи
- Б. Метастазов в лимфоузлы шеи
- В. Рака слюнных желез
- Г. Рака носоглотки
- Д. Рака щитовидной железы

При развитии угнетения дыхания у онкологического больного, принимающего морфин, следует назначить

- А. налоксон
- Б. преднизолон
- В. атропин
- Г. сальбутамол
- Д. кислородную маску

В меланому, как правило, трансформируется

- А. папилломатозный невус
- Б. «монгольское» пятно
- В. невус Сеттона
- Г. меланоз Дюбрея
- Д. невус Беккера

Реакция на α -фетопротеин (Абелева – Татарина) может быть положительной при

- А. Тимоме
- Б. Хемодектоме
- В. Зрелой тератоме
- Г. Незрелой тератоме (тератобластоме) с элементами эмбрионального рака
- Д. Сосудистых опухолях

Наиболее частым клиническим симптомом мелкоклеточного центрального рака легкого является

- А. Кашель
- Б. Одышка
- В. Повышение температуры тела
- Г. Осиплость голоса
- Д. Похудание

Наиболее частая локализация гематогенных метастазов сарком мягких тканей

- А. кости
- Б. печень
- В. лёгкие
- Г. головной мозг
- Д. почки

На первом этапе лечения диссеминированного рака предстательной железы следует проводить

- А. дистанционную лучевую терапию
- Б. химиотерапию
- В. иммунотерапию
- Г. введение системных радионуклидов
- Д. гормонотерапию

Основным методом лечения доброкачественных опухолей молочной железы является

- А. хирургический
- Б. лучевой
- В. гормональный
- Г. химиотерапевтический
- Д. комбинированный

Раннее выявление опухоли соответствует стадии:

- А. T1-2 N0M0
- Б. T1 N1M0
- В. T1 N1-2M0
- Г. T1 N2M0
- Д. T1 N1M1

Точкой приложения винбластина является фаза клеточного цикла

- А. G0
- Б. G1
- В. M
- Г. S
- Д. G2

Какая морфологическая форма злокачественной опухоли наиболее характерна для тела матки (чаще встречается)?

- А. плоскоклеточный рак
- Б. мелкоклеточный рак
- В. эндометриальная стромальная саркома
- Г. карциносаркома
- Д. аденокарцинома

Базальноклеточный рак наиболее часто локализуется на коже

- А. грудной клетки
- Б. лица
- В. верхних конечностей
- Г. нижних конечностей
- Д. спины

Опасность возникновения кардиотоксичности при лечении трастузумабом более вероятна в комбинации с

- А. Антрациклинами
- Б. Паклитакселом
- В. Винорельбином
- Г. Доцетакселом
- Д. 5-фторурацилом

Какое из ниже перечисленных заболеваний не является предраковым для толстой кишки

- А. диффузный семейный полипоз
- Б. хронический неспецифический язвенный колит.
- В. аппендицит.
- Г. болезнь Крона.
- Д. синдром Гарденера

Наиболее частая морфологическая форма злокачественных опухолей слизистой полости рта

- А. Плоскоклеточный рак
- Б. Саркома
- В. Мукоэпидермоидная опухоль
- Г. Цилиндрома
- Д. Недифференцированный рак

При операциях по поводу забрюшинных опухолей чаще всего используется

- А. срединная лапаротомия
- Б. внебрюшинный доступ
- В. тораколапаротомия
- Г. брюшно-промежностный доступ
- Д. поясничный доступ

«Золотым стандартом» для лечения сильной боли у онкологических больных является

- А. кодеин
- Б. фентанил
- В. морфин
- Г. метадон
- Д. оксикодон

К опухолям нейроэндокринного происхождения относится:

- А. рак слюнных желез
- Б. рак почки
- В. менингиома
- Г. хордома
- Д. медуллярный рак щитовидной железы

форма рака лёгкого, при которой наблюдается триада Горнера и боль по ходу плечевого сплетения

- А. Эндобронхиальная
- Б. Перибронхиальная
- В. Пневмониеподобная
- Г. Рак Пенкоста
- Д. Шаровидная опухоль

Больному 38 лет произведена трансуретральная резекция рецидивного поверхностного рака мочевого пузыря. Дальнейшее лечение включает

- А. профилактическую системную химиотерапию
- Б. профилактическую внутривезикулярную химиотерапию.
- В. профилактическую лучевую терапию
- Г. радикальную цистэктомию
- Д. динамическое наблюдение

Можно ли выполнить онкопластическую резекцию если есть несколько образований в молочной железе

- А. нет
- Б. По желанию онколога
- В. По желанию пациента
- Г. Да

Меланома кожи относится к опухолям

- А. нейроэктодермального происхождения
- Б. неопределенного происхождения
- В. мезенхимальной происхождения
- Г. дисэмбриональной природы
- Д. эпителиального происхождения

Больному 56 лет произведена гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка по поводу аденоматоза щитовидной железы. В двух узлах – фолликулярная аденома. В одном (размером в 1 см) – папиллярный рак. Ему следует назначить

- А. Повторную операцию в объеме субтотальной резекции щитовидной железы
- Б. Профилактическую лучевую терапию
- В. Профилактическую химиотерапию
- Г. Лечение радиоактивным йодом
- Д. Наблюдение

Рак толстой кишки наиболее часто локализуется в

- А. Слепой кишке
- Б. Восходящем отделе
- В. Поперечно-ободочной кишке
- Г. Нисходящем отделе
- Д. Сигмовидной кишке

К ноцицептивной боли относится:

- А. соматическая и висцеральная боль
- Б. соматическая боль
- В. висцеральная боль
- Г. аллодиния и каузалгия
- Д. деафферентационная боль

Колонистимулирующие факторы (Г-КСФ) назначают при:

- А. тошноте и рвоте
- Б. лейкопении
- В. почечно-печеночной недостаточности
- Г. метастазах в костях
- Д. анемии

Рак молочной железы развивается из

- А. лимфатических узлов
- Б. кровеносных сосудов
- В. перидуктальной гладкомышечной ткани
- Г. железистого эпителия протоков
- Д. незрелой соединительной ткани

Наиболее подвержены малигнизации _____ полипы желудка

- А. Гиперпластические
- Б. Гиперплазиогенные
- В. Ювенильные
- Г. Аденоматозные

Если у больной 50 лет папиллярный рак щитовидной железы t2n0m0 с локализацией в правой доле, то следует провести

- А. Самостоятельную лучевую терапию
- Б. Комбинированное лечение с послеоперационной лучевой терапией
- В. Комбинированное лечение с предоперационной лучевой терапией
- Г. Тиреоидэктомию с центральной лимфодиссекцией

Железы монтгомери расположены в

- А. Ткани молочной железы
- Б. Области подмышечной впадины
- В. Области ареолы молочной железы
- Г. Области непигментированной части кожи молочной железы

Клинически наиболее поздно проявляется рак

- А. Кардинального отдела
- Б. Антрального отдела
- В. Тела желудка
- Г. Субкардинального отдела

Абсолютным противопоказанием к выполнению изолированной химиоперфузии лёгкого является

- А. Полиорганная недостаточность
- Б. Туберкулёз лёгких
- В. Острое нарушение мозгового кровообращения
- Г. Сахарный диабет

Протамина сульфат 1 мг нейтрализует _____ ед гепарина

- А. 1000-1500
- Б. 80-100
- В. 70-50
- Г. 2500-5000

К основным неорганическим опухолям средостения из ретикулярной ткани относятся

- А. Лимфогранулематоз, лимфосаркома, плазмоцитомы, ретикулосаркома
- Б. Плазмоцитомы, лимфангиомы
- В. Лимфогранулематоз, лимфангиоэндотелиома
- Г. Ретикулосаркома, лимфосаркома, остеосаркома

Одной из характеристик t4b при раке молочной железы является

- А. Прорастание опухоли в грудную стенку
- Б. Втяжение кожи над опухолью II степени
- В. Изъязвление опухоли
- Г. Прорастание опухоли в грудные мышцы

Наиболее часто при раке молочной железы отдаленные метастазы гематогенным путем поражают легкие, печень, кожу и

- А. Головной мозг
- Б. Мягкие ткани
- В. Кости
- Г. Яичники

Основной целью адъювантной лекарственной терапии является

- А. Уменьшение размеров опухоли
- Б. Изучение лекарственного патоморфоза для планирования дальнейшего лечения
- В. Эрадикация микрометастазов после излечения первичной опухоли
- Г. Усиление степени повреждения опухоли

К препаратам таргетной терапии при раке молочной железы относится

- А. Метотрексат
- Б. Циклофосфамид
- В. Доксорубицин
- Г. Трастузумаб

Наиболее частыми причинами возникновения рака по данным международного агентства по изучению рака являются

- А. Загрязнения почвы, воды
- Б. Сердечно-сосудистые заболевания, повышение уровня холестерина в крови
- В. Нарушения питания, курение
- Г. Острые респираторные заболевания, острые респираторные вирусные инфекции

Первым и обязательным методом диагностики при подозрении на рак прямой кишки является

- А. Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости
- Б. Компьютерная томография органов брюшной полости
- В. Ирригоскопия с двойным контрастированием
- Г. Пальцевое ректальное исследование

Метастатическое поражение печени чаще всего происходит

- А. Гематогенно по системе воротной вены
- Б. Гематогенно по системе печеночной артерии
- В. Лимфогенно ретроградно
- Г. Лимфогенно ортоградно

Наиболее радикальным способом лечения аденокарциномы дистальной части пищевода и кардии является

- А. Экстирпация пищевода
- Б. Лучевая терапия
- В. Химиотерапия 5-fu и митомицином С
- Г. Таргетная терапия

Наиболее часто лимфогенное метастазирование при раке молочной железы происходит по _____ пути

- А. Парастернальному
- Б. Подключичному
- В. Транспекторальному
- Г. Подмышечному

Рак ободочной кишки наиболее часто локализуется в

- А. Поперечной ободочной кишке
- Б. Восходящем отделе
- В. Сигмовидной кишке
- Г. Слепой кишке

Хлорид радия-223 используют при лечении

- А. Костных метастазов рака предстательной железы
- Б. Миеломной болезни для предотвращения деминерализации костной ткани
- В. Прогрессирующей остеогенной саркомы, как паллиативный метод
- Г. Лимфопролиферативных заболеваний с вовлечением костного мозга

Наиболее характерным клиническим признаком рака пищевода является

- А. Дисфагия
- Б. Общая слабость
- В. Рвота
- Г. Тошнота

При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе по решению врачебной комиссии листок нетрудоспособности формируется и продлевается на срок не более _____ месяцев с даты начала временной нетрудоспособности

- А. 5
- Б. 4
- В. 6
- Г. 7

Наиболее часто при раке прямой кишки применяют схемы химиотерапии

- А. BOLD, CVD
- Б. CHOP, MOPP, ABVD
- В. FOLFOX, XELOX, FOLFIRI
- Г. HAM, FLAG, CLAG

Симптомы, наиболее характерные для рака пилорической части желудка, обусловлены феноменом

- А. Обтурации
- Б. Деструкции
- В. Интоксикации
- Г. Компрессии

С целью верификации диагноза «саркома Капоши» необходимо выполнить

- А. Витроскопию
- Б. Пробу Тцанка
- В. Осмотр с лампой Вуда
- Г. Биопсию кожи

Видом оперативного лечения рака мочевого пузыря в стадии T3N0M0 является

- А. Электрокоагуляция
- Б. Цистэктомия
- В. Резекция мочевого пузыря
- Г. Трансуретральная электрорезекция

Онкомаркером при раке яичников является

- А. β -ХГЧ (β -субъединица хорионического гонадотропина человека)
- Б. СА-19-9
- В. АФП (альфа-фетопротеин)
- Г. СА-125

Заболевание детей до 3 лет лимфомой Ходжкина является

- А. Невозможным вообще
- Б. Второй по частоте опухолью
- В. Возможным, но редким
- Г. Возможным только при синдроме Дауна

Радикальным методом лечения рака поджелудочной железы является

- А. Хирургический
- Б. Иммунотерапия
- В. Химиотерапевтический
- Г. Лучевая терапия

Среди доброкачественных опухолей молочной железы преобладает

- А. Аденома
- Б. Липома
- В. Фиброаденома
- Г. Фиброма

Письменное обращение гражданина, поступившее в государственные органы, органы местного самоуправления, должно быть рассмотрено в течение ____ дней со дня ____ письменного обращения

- А. 30; Регистрации
- Б. 48; Отправления
- В. 32; Написания
- Г. 22; Поступления

Нативная (неконтрастная плотность) доброкачественных образований надпочечников при компьютерной томографии в единицах хаунсфилда равна

- А. Менее 20 HU
- Б. Более 40 HU
- В. Более 30 HU
- Г. Менее 10 HU

При раке пищевода дифференциальная диагностика должна проводиться с

- А. Острой пневмонией
- Б. Острым панкреатитом
- В. Язвенной болезнью желудка
- Г. Кардиоспазмом

Из железистого эпителия возникает ____ рак

- А. Папиллярный
- Б. Базально-клеточный
- В. Смешанный
- Г. Плоскоклеточный неороговевающий

При высокодифференцированной аденокарциноме лёгкого 2 стадии методом выбора является

- А. Химиолучевое лечение
- Б. Лучевая терапия
- В. Химиотерапия
- Г. Хирургическое лечение

При iii стадии рака эндометрия первым этапом применяется

- А. Хирургическое лечение
- Б. Сочетанное лучевое лечение
- В. Гормональное лечение
- Г. Химиотерапия

Лекарственным препаратом, обладающим наибольшей эффективностью при раке поджелудочной железы, является

- А. Метотрексат
- Б. Циклофосфамид
- В. Винкристин
- Г. Фторурацил

Менинггиоматозные, фиброзные, переходные, псаммоматозные менингиомы по классификации ВОЗ относят к _____ степени

- А. IV
- Б. III
- В. I
- Г. II

Признание человека инвалидом возможно только при проведении экспертизы

- А. Военно-врачебной
- Б. Медико-социальной
- В. Трудоспособности
- Г. Судебно-медицинской

Гистологическая структура рака пищевода в большинстве случаев является

- А. Саркомой
- Б. Скиррозной опухолью
- В. Плоскоклеточным раком
- Г. Аденокарциномой

Низкодифференцированные опухоли желудочно-кишечного тракта обладают преимущественно ростом

- А. Инфильтративным
- Б. Экзофитным
- В. Экспансивным
- Г. Смешанным

Одним из ключевых условий радикальности выполнения оперативного вмешательства по поводу немелкоклеточного рака лёгкого, при условии проведения неоадъювантных курсов полихимиотерапии, является пересечение бронха на расстоянии _____ мм и более от видимого края опухоли со срочным гистологическим исследованием края резекции

- А. 7
- Б. 15
- В. 12
- Г. 3

Для лечения диссеминированного немелкоклеточного рака легкого с экспрессией pd-l1 более 50% применяют

- А. Серитиниб
- Б. Эрлотиниб
- В. Пембролизумаб
- Г. Алектиниб

В 6% случаев менингиомы встречаются в

- А. Задней черепной ямке
- Б. Области позвоночного канала
- В. Области верхнего сагиттального синуса
- Г. Области намета мозжечка

К этиологическим факторам рака лёгкого относят

- А. Снижение иммунитета
- Б. Химические канцерогены
- В. Воспаление лёгких
- Г. Недостаток витаминов

Нарушения глотания вследствие поражения нервного аппарата глотки чаще развиваются при раке _____ пищевода

- А. Нижнегрудного отдела
- Б. Среднегрудного отдела
- В. Шейного и верхнегрудного отделов
- Г. Абдоминального сегмента

Структура заболеваемости выражается в показателях

- А. Соотношения
- Б. Абсолютных
- В. Экстенсивных
- Г. Интенсивных

Клиническим симптомом, который чаще наблюдается при раке слепой кишки, является

- А. Наличие патологических выделений
- Б. Анемия
- В. Кишечное расстройство
- Г. Боль схваткообразного характера

Больные со злокачественными опухолями, не подлежащие специальному лечению, относятся к клинической группе

- А. 1Б
- Б. 3
- В. 4
- Г. 2А

Трудности при открывании рта (тризм) у больного раком ротоглотки и слизистой оболочки полости рта свидетельствуют о

- А. Присоединении вторичной инфекции
- Б. Поражении опухолью звёздчатого узла симпатического ствола
- В. Распространении опухоли на тело нижней челюсти
- Г. Распространении опухоли на жевательные мышцы

Иностранцам гражданам листок нетрудоспособности может быть выдан

- А. При заболевании туберкулезом
- Б. После оперативного вмешательства
- В. Во всех случаях нетрудоспособности
- Г. Если он является застрахованным

Рак желудка наиболее часто развивается в возрасте от ____ до ____ лет

- А. 70; 80
- Б. 51; 70
- В. 21; 50
- Г. 10; 20

Индукционный режим химиотерапии назначается с целью

- А. Продления жизни и улучшения её качества
- Б. Достижения ремиссии опухолевого процесса
- В. Профилактики рецидивов после завершения основного курса
- Г. Полной эрадикации опухоли

Лечение при двустороннем поражении почек опухолью вильмса следует начинать с

- А. Лучевой терапии
- Б. Удаления первичной опухоли
- В. Иммунотерапии
- Г. Неоадъювантной химиотерапии

Для выбора гормонотерапии при раке молочной железы оптимальным является сочетание рецепторов стероидных гормонов

- А. РГ+ и РП+
- Б. РА+ и РГ+
- В. РА- и РЭ-
- Г. РЭ+ и РП+

Ранним симптомом при поражении опухолью вестибулярного отдела гортани является

- А. Осиплость голоса
- Б. Ощущение инородного тела в горле
- В. Наличие увеличенных лимфоузлов шеи
- Г. Затрудненное глотание

Гражданин РФ имеет право на смену медицинской организации или лечащего врача

- А. У гражданина РФ нет такого прав
- Б. Ежемесячно
- В. Не чаще 1 раза в год
- Г. Не чаще 1 раза в полгода

Клиническим признаком, исключающим возможность радикального оперативного вмешательства при раке прямой кишки, является

- А. Анемия
- Б. Пальпируемая опухоль
- В. Острая кишечная непроходимость
- Г. Асцит

Предопухолевым заболеванием пищевода является

- А. Кардиоспазм
- Б. Ахалазия кардии
- В. Синдром Пламмера – Винсона
- Г. Эзофагит

Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованием

- А. Радиоизотопным
- Б. Рентгенологическим
- В. Ультразвуковым
- Г. Гистологическим