

Тесты с вопросами по специальности «Онкология» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/onkolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Онкология» для аккредитации и других экзаменов (3100 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/onkologiya/

2) Онкология (ситуационные задачи)

→ medik-otvet.ru/product/onkolog-situacia/

3) Радиология — тесты с ответами

→ medik-otvet.ru/product/radiolog/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

К опухолям с местнодеструктивным ростом относятся

- А. десмоидная фиброма
- Б. фиброаденома
- В. миома
- Г. липома
- Д. нейрофиброма

Четкий цитогенетический маркер (филадельфийская хромосома) наблюдается при:

- А. остром лимфобластном лейкозе;
- Б. остром миелобластном лейкозе;
- В. хроническом лимфолейкозе;
- Г. хроническом миелолейкозе;
- Д. хроническом моноцитарном лейкозе.

Метод лечения больных с местнораспространенным раком пищевода

- А. эндоскопическое лечение
- Б. комбинированное лечение
- В. хирургическое лечение
- Г. самостоятельная химиолучевая терапия
- Д. системная химиотерапия

Какому методу лечения следует отдавать предпочтение при плоскоклеточном раке анального канала

- А. брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки
- Б. полихимиотерапии
- В. химиолучевому лечению
- Г. сочетанной лучевой терапии

К редким паранеопластическим синдромам, встречаемым при тимоме НЕ относится:

- А. Гематологический синдром
- Б. Аутоиммунные расстройства
- В. Синдром иммунодефицита
- Г. Синдром сдавления верхней полой вены

Какие ранние симптомы при поражении опухолью вестибулярного отдела гортани

- А. Стойкая осиплость
- Б. Кровохарканье
- В. Затрудненное дыхание
- Г. Дискомфорт и ощущение инородного тела в горле

При лечении рака вульвы I стадии применяют лечение:

- А. хирургическое + лучевая терапия;
- Б. хирургическое;
- В. хирургическое + химиотерапия;
- Г. хирургическое + гормонотерапия;
- Д. только лучевое.

Наиболее частыми клиническими проявлениями опухолевого поражения правых отделов ободочной кишки являются:

- А. нарушение кишечной проходимости
- Б. анемия
- В. желтуха
- Г. слабость, быстрая утомляемость
- Д. примесь слизи и крови в кале

При какой стадии рака эндометрия применяется химиотерапия?

- А. IA
- Б. II
- В. III A
- Г. ни при какой

Целью паллиативной помощи онкологическим больным является:

- А. продление жизни
- Б. проведение эвтаназии
- В. создание иллюзии лечения
- Г. улучшение качества жизни

При каких опухолях головы и шеи наиболее часто болеют женщины

- А. Щитовидной железы
- Б. Полость рта
- В. Язык
- Г. Гортаноглотка

Рак шейки матки чаще всего возникает:

- А. у внутреннего зева;
- Б. у границы плоского и цилиндрического эпителиев;
- В. на влагалищной порции шейки матки;
- Г. в железах шейки матки;
- Д. в эктоцервиксе.

Симптомами окклюзионного приступа являются:

- А. Тетраплегия
- Б. Резкие головные боли, двигательное беспокойство
- В. Внезапные головные боли, нарушение сознания, нарастание глазодвигательных нарушений, пирамидных и стволовых расстройств, недержание мочи
- Г. Кома, снижение тонуса в конечностях, патологические симптомы

При сдавлении спинного мозга с развитием тетрапареза или парапареза эффективны:

- А. нестероидные противовоспалительные средства
- Б. антрациклины
- В. бисфосфонаты
- Г. кортикостероиды

Целью II фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является:

- А. определение максимально переносимой дозы цитостатика;
- Б. сравнительное изучение с другими цитостатиками;
- В. доказать клиническую эффективность лекарственного средства у определенной группы пациентов, оценить краткосрочную безопасность активного ингредиента, определение уровня терапевтической дозы препарата и схемы дозирования;
- Г. изучение возможных сочетаний с другими цитостатиками;
- Д. анализ экономических показателей лечения и уровня качества жизни.

Наиболее объективные сведения о природе злокачественного новообразования могут быть получены при:

- А. клиническом осмотре больного;
- Б. рентгенологическом исследовании;
- В. использовании эндоскопических методов;
- Г. ультразвуковой томографии;
- Д. патоморфологическом исследовании резецированного (удаленного) органа с регионарным лимфатическим аппаратом.

Что входит в понятие циторедуктивной операции R1?

- А. пробное вмешательство
- Б. оставление макроскопического фрагмента опухоли
- В. опухолевые клетки по линии резекции
- Г. отсутствие всех перечисленных признаков

Адено-кистозный рак трахеи протяженностью 7 колец. Смешанная экзо-эндофитная форма роста. Дыхательная недостаточность. Какова лечебная тактика?

- А. реканализация
- Б. симптоматическое лечение
- В. полихимиотерапия
- Г. реканализация с последующей сочетанной лучевой терапией.

Тактика лечения при недифференцированным раке носоглотки с интракраниальным компонентом и метастазами на шее с обеих сторон

- А. симптоматическая терапия
- Б. операция
- В. лучевая терапия
- Г. многокурсовая ПХТ с последующей лучевой терапией

Соблюдение принципов зональности и футлярности при выполнении онкологических операций направлено на:

- А. обеспечение антибластики;
- Б. обеспечение абластики;
- В. снижение риска хирургических вмешательств;
- Г. максимальное сохранение функции органа;
- Д. улучшение качества жизни.

При рецидивах злокачественных глиом и метастазов после курса лучевой терапии применяется

- А. ПЭТ-КТ с галлием
- Б. ПЭТ-КТ с метионином
- В. ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозой
- Г. ПЭТ-КТ с фторэтилтирозином

Укажите правильные места для проведения открытой или пункционной биопсии при локализации опухоли в дистальной трети бедра?

- А. передняя поверхность бедра
- Б. задняя поверхность бедра
- В. латеральная поверхность бедра
- Г. медиальная поверхность бедра
- Д. через область надколенника

Гиперпластические полипы желудка:

- А. Являются предраковым состоянием, требуют эндоскопического удаления
- Б. Не являются предраком, требуют эндоскопического удаления
- В. Не требуют эндоскопического удаления, необходимо назначение терапии гастроэнтерологом

Укажите среди перечисленных ниже методы диагностики раннего рака шейки матки

- А. кольпоскопия
- Б. гистерография
- В. цитологическое исследование мазков
- Г. лимфография

Стереотаксическая биопсия выполняется во всех случаях, кроме

- А. МР-картина лимфомы ЦНС
- Б. Опухоли базальных ядер
- В. Опухоли мозжечка с компрессией ликвороотводящих путей
- Г. Дифференциальный диагноз лучевого некроза и рецидива опухоли

У пациента множественные (30 шт) нейроэндокринные опухоли I типа G1 в желудке, с инвазией в пределах слизистой оболочки. Ваша тактика?

- А. Чресбрюшинная гастрэктомия с лимфодиссекцией D2
- Б. Эндоскопическое удаление опухолей
- В. Химиотерапия
- Г. Терапия сандостатином

Препараты, используемые при лечении генерализованного рака мочевого пузыря:

- А. гемцитабин
- Б. антрациклины
- В. цисплатин
- Г. преднизолон

В 95% случаев рак полового члена локализуется в:

- А. области головки и крайней плоти;
- Б. средней трети;
- В. области крайней плоти;
- Г. пещеристом теле.

Основными показаниями к нервосберегающей простатэктомии являются:

- А. объем предстательной железы не более 50 см³
- Б. отсутствие эректильной дисфункции до операции
- В. T1-2вN0M0
- Г. уровень ПСА менее 10 нг/мл

Назовите наиболее часто встречающиеся причины гибели больных острым лейкозом:

- А. Печеночная недостаточность
- Б. Выраженная анемия
- В. Инфекционные осложнения
- Г. Нейролейкоз

Эхографическая картина рака внепеченочных желчевыводящих протоков необходимо дифференцировать с эхографической картиной:

- А. Холедохолитиаза
- Б. Лимфаденопатии в области печеночно 12 – перстной связки
- В. Рака головки поджелудочной железы
- Г. Рака большого дуоденального сосочка
- Д. Верно все

Какой метод диагностики помогает определить инвазию рака в миометрий?

- А. лапароскопия
- Б. кольпоскопия.
- В. УЗИ органов малого таза с цветным доплеровским картированием
- Г. гистеросальпингография.

Источник лазерного света с какой длиной волны необходим для проведения ФДТ с фотосенсибилизаторами хлоринового ряда (Фотолон, Фотодитазин, Радахлорин)?

- А. 662 нм
- Б. 630 нм
- В. 670 нм
- Г. 810 нм

У больного эмбриональным раком яичка с метастазами в забрюшинные лимфоузлы после проведенного лечения (орхофуникулэктомия и полихимиотерапия) по данным КТ исследования выявлены увеличенные парааортальные лимфоузлы. Дальнейшая лечебная тактика:

- А. наблюдение
- Б. продолжение полихимиотерапии
- В. дистанционная лучевая терапия
- Г. забрюшинная лимфаденэктомия

Какой метод лечения является основным при злокачественных опухолях мягких тканей G2, G3?

- А. химиотерапия
- Б. лучевая терапия
- В. хирургический
- Г. комбинированный
- Д. фотодинамическая терапия

Основное значение в диагностике идиопатического миелофиброза имеет

- А. Сочетание нейтрофильного гиперлейкоцитоза и выраженной спленомегалии
- Б. Результаты пункции костного мозга
- В. Обнаружение хромосомной патологии
- Г. Гистологическое исследование костного мозга методом трепанобиопсии

Вирховский метастаз при раке желудка следует расценивать как:

- А. отдаленный гематогенный метастаз;
- Б. регионарный гематогенный метастаз;
- В. отдаленный лимфогенный метастаз;
- Г. регионарный лимфогенный метастаз;
- Д. имплантационный метастаз.

Адекватным объемом хирургического лечения при раке легкого НЕ является

- А. Атипичная резекция легкого
- Б. Лобэктомия
- В. Билобэктомия
- Г. Пневмонэктомия

Излюбленной локализацией гематогенных метастазов рака толстой кишки являются:

- А. легкие;
- Б. кости;
- В. печень;
- Г. надпочечники;
- Д. селезенка.

Регионарными лимфатическими узлами при раке вульвы являются:

- А. подвздошные;
- Б. крестцовые;
- В. obturatorные;
- Г. бедренные;
- Д. пахральные.

Радикальным методом лечения рака почки является:

- А. иммунотерапия;
- Б. лучевой;
- В. химиотерапия;
- Г. хирургический;
- Д. комбинированный (операция + лучевая терапия).

**ДЛЯ II СТАДИИ ЛИМФЕДЕМЫ ПО КЛАССИФИКАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА
ЛИМФОЛОГИИ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ**

- А. Непостоянного отека с редукцией при элевации конечности
- Б. Постоянного отека с частичной редукцией при элевации конечности
- В. Увеличения длины диаметров конечности в стандартных точках на 2 – 6 см в сравнении со здоровой
- Г. Постоянного отека с утолщением кожи и уплотнением мягких тканей

К возникновению лимфомы Беркитта и рака носоглотки у человека имеет отношение:

- А. аденовирус;
- Б. вирус Эпштейн - Барра (возбудитель инфекционного мононуклеоза);
- В. Рарова-вирус;
- Г. вирус из группы вирусов оспы;
- Д. вирус из группы вирусов herpes.

Характерными вариантами метастазирования рака желудка являются:

- А. Метастаз Вирхова
- Б. Метастаз Шницлера
- В. Метастаз сестры Джозеф
- Г. все перечисленное

Заболеваемость раком почки в России:

- А. остается стабильной на низком уровне;
- Б. имеет тенденцию к снижению;
- В. остается стабильной на высоком уровне;
- Г. имеет тенденцию к росту.

Клинические проявления забрюшинных неорганных опухолей в первую очередь обусловлены:

- А. гистологической структурой опухоли;
- Б. размерами опухоли;
- В. локализацией опухоли;
- Г. размерами и локализацией опухоли;
- Д. гистологической структурой и размерами опухоли.

Определите медикаментозную тактику лечения больного раком предстательной железы при наличии роста уровня ПСА на фоне проведения гормональной терапии по схеме максимальной андрогенной блокады:

- А. золадекс 3,6 мг
- Б. химиотерапия (таксаны)
- В. касодекс 150 мг
- Г. касодекс 50 мг

Неблагоприятными факторами прогноза при лимфоме Ходжкина являются:

- А. увеличение медиастинальных лимфоузлов $> 1/3$ диаметра грудной клетки;
- Б. повышения уровня АСТ, АЛТ;
- В. гистологический вариант – лимфоидное преобладание;
- Г. возраст старше 60 лет;
- Д. лейкоцитоз.

Частота локализации базальноклеточного рака на коже лица составляет:

- А. 20-30%;
- Б. 35-40%;
- В. 45-50%;
- Г. около 60%;
- Д. 94-97%.

Выберите наиболее характерные рентгенологические признаки рака молочной железы:

- А. четкие контуры и отсутствие кальцинатов;
- Б. неоднородная структура
- В. лучистые контуры и неоднородная структура;
- Г. лучистые контуры и микрокальцинаты;
- Д. однородная структура и четкие контуры.

При лимфогранулематозе IIIБ стадии предпочтение следует отдавать

- А. курсам химиотерапии
- Б. лучевой терапии на все зоны поражения и зоны возможного субклинического распространения опухоли
- В. курсам химиотерапии с последующей лучевой терапией на все зоны поражения и зоны возможного субклинического распространения опухоли
- Г. курсам химиотерапии с последующей лучевой терапией на зоны исходно больших опухолевых масс и (или) остаточные лимфатические узлы
- Д. все варианты одинаково эффективны

В понятие билиопанкреатодуоденальной области следует включать:

- А. поджелудочную железу, печень, 12-перстную кишку, желудок, желчный пузырь;
- Б. печень, внепеченочные желчные протоки, желчный пузырь, большой дуоденальный сосочек, 12-перстную кишку;
- В. большой дуоденальный сосочек, 12-перстную кишку, поджелудочную железу, желчный пузырь, внепеченочные желчные протоки;
- Г. внутрипеченочные желчные протоки, желчный пузырь, 12-перстную кишку, поджелудочную железу, печень;
- Д. поджелудочную железу, печень, 12-перстную кишку.

Характерный для ФДТ так называемый «коллагенсохраняющий» некроз тканей способствует

- А. заживлению дефекта мягких тканей по типу репарации
- Б. медленной эпителизации
- В. формированию келоидных рубцов
- Г. длительному периоду отторжения некротических тканей

Химиотерапия I линии глиом III-IV степени злокачественности

- А. Ингибиторы тирозинкиназы
- Б. Таксаны
- В. Темозоломид
- Г. Препараты платины

ПО КЛАССИФИКАЦИИ BOSNIAK ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ИМЕЮТ КИСТЫ

- А. Bosniak I-II типа
- Б. Bosniak IIF типа
- В. Bosniak III типа
- Г. Bosniak III-IV типа

Распространенность N2 поражения при раке желудка, согласно классификации TNM 8 издания обозначают при:

- А. отсутствие поражения регионарных лимфоузлов
- Б. поражении 1-2 регионарных лимфоузлов
- В. поражении 3-6 регионарных лимфоузлов
- Г. поражении 7 и более регионарных лимфоузлов

У пациентки 19 лет лапароскопически удалены правые придатки. При гистологическом исследовании в яичнике выявлена зрелая тератома. Какое дополнительное лечение необходимо пациентке?

- А. удаление большого сальника.
- Б. резекция второго яичника
- В. резекция большого сальника и резекция второго яичника
- Г. дополнительного лечения не требуется

Медуллярный рак щитовидной железы развивается из:

- А. А-клеток;
- Б. В-клеток;
- В. С-клеток;
- Г. эпителиальной ткани;
- Д. мезенхимальной ткани.

Рак молочной железы у мужчин встречается реже, чем у женщин в:

- А. 10 раз;
- Б. 50 раз;
- В. 100 раз;
- Г. 200 раз.

Какой уровень лимфодиссекции принят сейчас при раке желудка?

- А. D0
- Б. D1
- В. D2
- Г. D3

ОБЪЕМ ЛИМФАДЕНЭКТОМИИ ПРИ ПКР ПРАВОЙ ПОЧКИ

- А. Латерокавальные, прекавальные, аортокавальные, ретрокавальные л/у
- Б. Латероаортальные, предаортальные, аортокавальные, ретроаортальные л/у
- В. Латероаортальные, л/у ворот почки, ретроаортальные
- Г. Латерокавальные, предкавальные, аортокавальные, ретроаортальные

Наиболее частыми жалобами пациенток раком вульвы ранних стадий являются:

- А. зуд;
- Б. кровянистые выделения;
- В. боли, наличие язвы;
- Г. гнойные выделения, боли;
- Д. язва, жжение, раздражение.

После радикальной простатэктомии биохимический рецидив регистрируется при значении общего ПСА крови выше:

- А. 0,1 нг/мл
- Б. 0,2 нг/мл
- В. 0,3 нг/мл
- Г. 0,4 нг/мл

Плоскоклеточный и диморфный (смешанный железистый и плоскоклеточный) рак чаще всего локализуется в:

- А. слепой кишке;
- Б. восходящем отделе ободочной кишки;
- В. нисходящем отделе ободочной кишки;
- Г. сигмовидной кишке;
- Д. прямой кишке.

При забрюшинных неорганных опухолях чаще встречаются:

- А. прорастание различных органов опухолью;
- Б. сдавление или смещение органов опухолью;
- В. с одинаковой частотой встречается как прорастание так и сдавление или смещение органов опухолью;
- Г. нарушение проходимости полых органов;
- Д. воспалительный инфильтрат окружающей клетчатки.

Какой метод лечения является основным при злокачественных опухолях мягких тканей G1

- А. химиотерапия
- Б. лучевая терапия
- В. хирургический
- Г. комбинированный
- Д. комплексный

К важнейшим свойствам опухолевых клеток относится:

- А. самодостаточность в пролиферативных сигналах;
- Б. повышенная чувствительность к ростсупрессирующим сигналам;
- В. торможение ангиогенеза;
- Г. усиление апоптоза;
- Д. торможение локомоции.

Пациенткам с HER2-позитивным раком молочной железы в случае отсутствия полного патоморфологического регресса опухоли RCB II-III после окончания неоадъювантной терапии с включением трастузумаба +/- пертузумаба рекомендуется смена таргетного агента на:

- А. Трастузумаб-эмантанзин
- Б. Трастузумаб-дерукстекан
- В. Лапатиниб
- Г. Нератиниб

Из органов билиопанкреатодуоденальной зоны наиболее часто поражается раком:

- А. большой дуоденальный сосочек;
- Б. 12-перстная кишка;
- В. желчный пузырь;
- Г. поджелудочная железа;
- Д. внепеченочные желчные протоки.

Поражение кожи при меланоме 3 уровня инвазии по Clark соответствует стадии pT:

- А. pT3;
- Б. pT1;
- В. pT2;
- Г. pT4.

При каких опухолях головы и шеи наиболее часто болеют мужчины

- А. гортани
- Б. Язык
- В. Ротоглотка
- Г. Гортаноглотка

При первичной лимфоме желудочно-кишечного тракта наиболее часто поражается:

- А. желудок;
- Б. пищевод;
- В. подвздошная кишка;
- Г. ободочная кишка;
- Д. прямая кишка.

Механизм хронической боли при раке:

- А. периферический
- Б. центральный
- В. психологический
- Г. включает все перечисленное

Наиболее широко распространенной радикальной операцией при раке органов билиопанкреатодуоденальной зоны является:

- А. экстирпация 12-перстной кишки;
- Б. расширенная резекция большого дуоденального соска;
- В. гастропанкреатодуоденальная резекция;
- Г. гастрэктомия;
- Д. криодеструкция.

Патогенез поздних лучевых осложнений

- А. хроническое воспаление
- Б. отек
- В. облитерация сосудов, нарушение микроциркуляции, гипоксия
- Г. иммунодефицит

Методом выбора в лечении больных мультицентричным ранним центральным раком обоих легких является:

- А. Пневмонэктомия
- Б. Лобэктомия
- В. Лучевая терапия
- Г. Эндоскопическая фотодинамическая терапия

Для диагностики метастатического поражения костей чаще всего используется радиоактивный:

- А. ^{32}P ;
- Б. ^{99}Sr ;
- В. ^{90}Co ;
- Г. ^{131}I ;
- Д. $^{99\text{Tcm}}$.

Какой химиопрепарат обязательно входит в схему химиотерапии распространенного рака яичников?

- А. циклофосфан
- Б. препараты платины
- В. адриабластин
- Г. таксол.

Флуоресцентная диагностика с аминолевулиновой кислотой основана на

- А. Аутофлуоресценции
- Б. Индуцированной флуоресценции
- В. Флуоресценции экзогенных флуорофоров
- Г. Не проводится

При каких условиях можно проводить лучевую терапию больным плоскоклеточным раком пищевода при преимущественно эндофитной форме роста с дисфагией III-IV степени после

- А. наложения гастростомы
- Б. резекции пищевода
- В. лазерной реканализации
- Г. стентирования

Какие формы рака щитовидной железы сохраняют йодонакопительную функцию

- А. папиллярная аденокарцинома
- Б. фолликулярная аденокарцинома
- В. медулярный рак
- Г. плоскоклеточный рак
- Д. недифференцированный рак

Какие поздние лучевые осложнения Вы знаете?

- А. лучевая язва
- Б. фиброз
- В. эпителиит, эпидермит
- Г. телеангиоэктазии

Помимо стадии опухоли, выбор лечения рака полового члена зависит от следующих факторов?

- А. Размера опухоли
- Б. Локализации опухоли
- В. Степени инвазии
- Г. Все вышеперечисленное

Под термином локализованный мелкоклеточный рак легкого подразумевают:

- А. опухоль ограничена одной долей;
- Б. опухоль ограничена одним легким;
- В. метастазы в контралатеральные лимфоузлы;
- Г. опухоль ограничена одним гемитораксом.

При какой локализации первичной опухоли гениталий у женщин встречается поражение паховых лимфоузлов?

- А. раке шейки матки
- Б. раке яичников.
- В. раке вульвы
- Г. при всех вышеперечисленных локализациях.

Какой оптимальный объем оперативного вмешательства для больных раком шейки матки IB - II A ст. молодого возраста?

- А. операция Вертгейма
- Б. экстирпация матки с придатками
- В. экстирпация матки с придатками + подвздошно-обтураторная л/а
- Г. расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников
- Д. трахелэктомия

К опухолевым процессам в яичнике относится

- А. фолликулярная киста
- Б. киста желтого тела
- В. киста яичников
- Г. дермоидная киста
- Д. хемодектома

Медуллярный рак щитовидной железы развивается:

- А. из А-клеток
- Б. из В-клеток
- В. из С-клеток
- Г. из любой вышеуказанной
- Д. из мезенхимальной ткани

К лучевому воздействию не чувствительны:

- А. лейомиосаркома;
- Б. карциносаркома;
- В. эндометриальная саркома;
- Г. ботриоидная саркома;
- Д. стромальная саркома.

У девочки 18 лет на операции выявлена герминогенная опухоль левого яичника. Какой объем оперативного вмешательства следует выбрать

- А. надвлагалищная ампутиация матки с придатками
- Б. надвлагалищная ампутиация матки с придатками + резекция большого сальника
- В. удаление опухоли
- Г. удаление опухоли со срочным гистологическим исследованием
- Д. удаление придатков на стороне опухоли + резекция контрлатерального яичника + резекция большого сальника

При какой стадии рака яичников возможно органосохранное лечение?

- А. IA
- Б. IB
- В. IV
- Г. IIC

Прямое распространение первичной опухоли на регионарные лимфатические узлы классифицируется как:

- А. N0;
- Б. Nx;
- В. N1-3;
- Г. Mx;
- Д. M1.

Какие формы заболевания относят к раннему раку шейки матки

- А. интраэпителиальный рак (сг in situ)
- Б. тяжелая степень дисплазии
- В. рак шейки матки 1 а стадии
- Г. рак шейки матки II стадии

У больного 65 лет плоскоклеточный рак нижней носовой раковины I стадии. Какой вариант лечения наиболее целесообразен:

- А. дистанционная гамма-терапия
- Б. внутритканевая лучевая терапия
- В. внутриполостная лучевая терапия
- Г. сочетанная лучевая терапия (дистанционная лучевая терапия + внутриполостная лучевая терапия)
- Д. хирургическое лечение

Наиболее частый вариант пластики пищевода при радикальном хирургическом лечении рака средней трети пищевода

- А. пластика тонкой кишкой
- Б. пластика толстой кишкой
- В. пластика желудочным стеблем
- Г. пластика кожно-мышечным лоскутом

В диагностике опухоли яичника на дооперационном этапе используются следующие методы, за исключением:

- А. диагностическая пункция опухоли яичника
- Б. исследование уровня маркера СА-125
- В. УЗИ органов малого таза, брюшной полости
- Г. МРТ органов малого таза, брюшной полости
- Д. КТ органов малого таза, брюшной полости

Какой метод лечения трофобластической опухоли является ведущим?

- А. лучевой
- Б. хирургический
- В. химиотерапия
- Г. комбинированный

При выявлении нейроэндокринной опухоли с показателями Grade 3 Ki-67 >20%, наиболее эффективным будет применение РФП _

- А. 68Ga-DOTA-TATE
- Б. 18F-ФДГ
- В. 68Ga-PSMA
- Г. 99mTc-MIBI

Понятие «пограничные опухоли» возможно использовать только при опухолях:

- А. герминогенных;
- Б. стромы полового тяжа;
- В. эпителиальных;
- Г. липидноклеточных;
- Д. гонадобластомах.

При лимфэдеме главным лечением является:

- А. прием мочегонных
- Б. давящее бинтование
- В. тщательный уход за кожей
- Г. все перечисленное

Показания к послеоперационному облучению у больных раком легкого

- А. опухолевые клетки по линии резекции бронха
- Б. обнаружение метастазов в регионарных лимфатических узлах
- В. радикальная операция при N0
- Г. множественные отсеы опухоли в легочную ткань

При прогрессировании процесса, при люминальном В подтипе в первой линии назначается Гормонотерапия+ ингибиторы CDK4/6

- А. нет
- Б. Только при наличии висцерального криза
- В. да
- Г. Если пациент откажется от химиотерапии

Особенностью лимфатической системы пищевода является:

- А. наличие продольно расположенных лимфатических сплетений в слизистой оболочке, подслизистом слое и мышечной оболочке
- Б. близкое расположение грудного лимфатического протока
- В. тесная взаимосвязь лимфатической системы пищевода и желудка
- Г. все вышеперечисленное

Стволовые клетки какого происхождения чаще всего используются на практике при проведении трансплантации аутологичных гемопоэтических стволовых клеток (аутоТГСК)?

- А. костного мозга
- Б. периферической крови
- В. пуповинной крови
- Г. мезенхимального

В клинической классификации TNM символ "Т" может быть представлен в следующем сочетании:

- А. ТХ;
- Б. Т0;
- В. Тis;
- Г. Т1;
- Д. все перечисленное верно.

У больного 54 лет, аденокарцинома головки поджелудочной железы T2NxM0. Уровень общего билирубина в крови 800 ммоль/л. С чего предпочтительнее начать лечение:

- А. выполнения панкреатодуоденальной резекции
- Б. выполнения тотальной панкреатодуоденэктомии
- В. проведение неоадъювантной химиотерапии
- Г. выполнения желчеотводящей операции
- Д. проведение лучевой терапии

Стандартом для проведения первой линии химиотерапии при распространенном раке яичника является комбинация препаратов:

- А. доксорубицин + циклофосфан;
- Б. паклитаксел + карбоплатин;
- В. гемцитабин + цисплатин;
- Г. этопозид + карбоплатин;
- Д. карбоплатин + доксорубицин.

Для лечения лимфомы Ходжкина не используется:

- А. Полихимиотерапия
- Б. Использования сверхвысоких доз цитостатиков с трансплантацией аллогенного костного мозга
- В. Радикальная лучевой терапии
- Г. Хирургическое удаление массивных опухолевых образований

Ведущим методом диагностики меланомы кожи является:

- А. радиофосфорная проба;
- Б. постлучевая меланурия (реакция Якша);
- В. термография;
- Г. морфологический метод;
- Д. компьютерная томография.

Получить морфологическую верификацию из лимфатических узлов средостения НЕЛЬЗЯ при:

- А. медиастиноскопии
- Б. EBUS/EUS
- В. ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в режиме «все тело»
- Г. торакоскопии

При дистальной субтотальной резекции желудка по поводу рака удаляют все перечисленные анатомические структуры, кроме:

- А. Малого сальника
- Б. Пилорического жома
- В. Селезенки
- Г. Большого сальника

Высококчувствительными к химиотерапии являются

- А. хорионкарцинома матки
- Б. злокачественные опухоли яичка
- В. рак пищевода
- Г. лимфогранулематоз
- Д. рак шейки матки

У больной 33 лет паренхима в обеих молочных железах зерниста, нечетко пальпируются мелкие очаги уплотнений. В предменструальном периоде они становятся более плотными и болезненными. Кожа молочных желез не изменена. Выделений из сосков нет. Ваш диагноз.

- А. диффузная фиброзно-кистозная мастопатия
- Б. маститоподобный рак молочной железы
- В. инфильтративно-отечная форма рака молочной железы
- Г. хронический двухсторонний мастит

При аррозивном кровотечении из ЗНО, с целью достижения оптимального гемостаза у пациента с местно-распространенным процессом эффективным методом лечения является:

- А. Выполнение гипертермии области ЗНО
- Б. Применение антиагрегантной терапии в максимальной дозировке
- В. Выполнение гемотрансфузионной терапии
- Г. Выполнение ангиографии, с последующей эмболизацией афферентных артерий ЗНО

При феохромоцитоме надпочечника для чего следует выполнять УЗИ щитовидной железы?

- А. Для исключения медуллярного рака щитовидной железы
- Б. Для исключения фолликулярного рака щитовидной железы
- В. Для исключения метастазов
- Г. Для исключения тиреоидита

Лечение нерезектабельных десмоидных фибром у пациентов репродуктивного возраста

- А. циторедуктивная операция
- Б. лучевая терапия
- В. гормонотерапия
- Г. полихимиотерапия
- Д. верно все вышеперечисленное

Больные злокачественными новообразованиями подлежат диспансерному наблюдению в течение:

- А. 2 лет;
- Б. 3 лет;
- В. 5 лет;
- Г. 10 лет;
- Д. пожизненно.

Ведущим методом лечения резектабельного немелкоклеточного рака легкого является:

- А. хирургическое лечение
- Б. лучевая терапия
- В. химиотерапия
- Г. комбинированное и комплексное лечение

У пациента рак антрального отдела желудка TisN0M0 размерами 0,8 см. Наиболее предпочтительная лечебная тактика:

- А. Субтотальная дистальная резекция желудка
- Б. Химиотерапия
- В. Лучевая терапия
- Г. Эндоскопическая резекция слизистой оболочки

Интраоперационная лучевая терапия, ее особенности. Вид ионизирующего излучения, доза.

- А. многократное фракционное облучение
- Б. однократное облучение
- В. электронный пучок 15-20 Гр
- Г. гаммаоблучение 40-50 Гр

К наиболее часто встречающейся морфологической форме опухоли мочевого пузыря относится:

- А. перстневидно-клеточный рак;
- Б. переходно-клеточный рак;
- В. железистый рак;
- Г. солидный рак;
- Д. недифференцированный рак.

РФП DOTA-TATE, применяемый для выявления нейроэндокринной опухоли, является тропным к соматостатиновому рецептору _

- А. 2a,b
- Б. 1
- В. 3
- Г. 5

Рак почки наиболее часто метастазирует

- А. в плевру и печень
- Б. в кости и легкие
- В. в печень и головной мозг
- Г. в мягкие ткани и забрюшинные лимфатические узлы
- Д. в забрюшинные лимфатические узлы и печень

У женщины 40 лет - рак вульвы. Опухоль размерами до 1,5 см в диаметре без инфильтрации тканей располагается в верхней трети большой половой губы. Ваш выбор метода лечения

- А. гемивульвэктомия + операция Дюкена
- Б. лучевая терапия
- В. гемивульвэктомия + лучевая терапия
- Г. гемивульвэктомия

Проявлением гиперпластического синдрома при остром лейкозе является

- А. Увеличение лимфоузлов
- Б. Появление лейкемидов на коже
- В. Нейролейкемия
- Г. Все перечисленное

Какие структуры могут присутствовать в тератоме яичника

- А. эпителий кишечного типа
- Б. элементы хрящевой ткани
- В. элементы кожи и ее придатков
- Г. нервная ткань
- Д. все вышеперечисленные

Характерная эхографическая картина хронического гипертрофического холецистита в стадии ремиссии может иметь следующие признаки:

- А. нормальные размеры желчного пузыря, однослойная тонкая - до 2-3 мм стенка, однородная эхонегативная полость
- Б. нормальные или увеличенные размеры желчного пузыря, неоднородная тонкая до 0,5-1,5 мм гиперэхогенная стенка, полость часто с эхогенной взвесью
- В. различные размеры желчного пузыря, утолщенная 3,5-4 мм неоднородная стенка повыш. эхогенности, полость эхонегативная или с эхогенной взвесью
- Г. различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная более 4-5 мм, слоисто-неоднородная стенка смешанной эхогенности (с гипо-, изо-, гиперэхогенными участками), однородная или с эхогенной взвесью полость
- Д. различные размеры желчного пузыря, неравномерно утолщенная, неоднородная, иногда слоистая стенка умеренно и значительно повышенной эхогенности, однородная или с признаками застоя желчи полость

Основанием выбора тактики лечения лимфом служит

- А. морфологический вариант опухоли
- Б. распространенность процесса
- В. локализация первичного очага опухоли
- Г. наличие симптомов интоксикации

Основные типы радикальных операций при раке желудка

- А. дистальная субтотальная резекция желудка
- Б. гастрэктомия
- В. проксимальная субтотальная резекция желудка
- Г. клиновидная резекция желудка

Наиболее часто возникновение рака шейки матки связано с инфицирование вирусом:

- А. герпеса;
- Б. аденовирусом;
- В. гепатита В;
- Г. Эпштейн-Барра;
- Д. папилломы человека.

Носитель генетической информации находится:

- А. клеточной мембране;
- Б. цитоплазме;
- В. ядре;
- Г. рибосомах;
- Д. во всех структурах клетки.

Выполнение радиочастотной термоабляции метастазов колоректального рака в печень возможно при:

- А. билобарное поражение печени с размером очагов до 2 см
- Б. унилобарное поражение печени с размером очагов до 2 см
- В. единичные очаги размером до 2 см
- Г. билобарное поражение печени с размером очагов более 5 см;
- Д. унилобарное поражение печени с размером очага более 5 см

Какой метод лечения является основным при хондросаркоме G1, G2?

- А. химиотерапия
- Б. лучевая терапия
- В. хирургический
- Г. комбинированный
- Д. комплексный

При подозрении на метастатическое поражение головного мозга необходимо выполнить

- А. Компьютерную томографию без контрастного усиления
- Б. Магнитно-резонансную томографию без контрастного усиления
- В. Магнитно-резонансную томографию с контрастным усилением
- Г. Обзорную краниографию

К Вам обратился пациент с диагнозом «Рак фатерова сосочка» и механической желтухой. Каковы будут Ваши действия?

- А. Экстренная панкреатодуоденальная резекция
- Б. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия и стентирование с решением вопроса о лечебной тактике после дообследования
- В. Чрескожная чреспеченочная холангиостомия с решением вопроса о лечебной тактике после дообследования
- Г. Эндоскопическая папиллэктомия

Варианты клинического течения опухолей ЦНС

- А. Бластоматозное (туморозное) течение
- Б. Эпилептоподобное течение
- В. Инсультоподобное течение
- Г. Все вышеперечисленное

К новообразованиям АПУД-системы относятся

- А. рак большой слюнной железы
- Б. медуллярный рак щитовидной железы
- В. бронхиогенный рак
- Г. менингиома
- Д. хордома

Согласно международной классификации TNM 7 пересмотра, критерию T2 при неорганных опухолях забрюшинного пространства соответствует:

- А. опухоль более 5 см
- Б. опухоль менее 5 см
- В. опухоль менее 7 см
- Г. опухоль более 7 см

Какова должна быть тактика при выявлении в желудке образования размерами 1 см, гистологически подтвержденного как "тяжелая дисплазия эпителия"

- А. Динамическое наблюдение, контрольное эндоскопическое исследование через 1 год
- Б. Хирургическое вмешательство в объеме гастрэктомии
- В. Повторная множественная эндоскопическая биопсия
- Г. Эндоскопическое удаление образования

Предраковые состояния слизистой оболочки желудка при гистологическом исследовании характеризуются:

- А. наличием атипичных клеток;
- Б. степенью дисплазии клеток;
- В. наличием хронического атрофического гастрита;
- Г. наличием кишечной метаплазии очагового характера;
- Д. наличием эрозии.

Способы морфологической верификации забрюшинных неорганных опухолей при планировании неоадьювантной терапии:

- А. трепанобиопсия
- Б. открытая биопсия
- В. лапароскопическая биопсия
- Г. тонкоигольная пункция
- Д. эндоскопическая биопсия

Паренхиму новообразования составляют:

- А. соединительная ткань;
- Б. кровеносные и лимфатические сосуды;
- В. собственно опухолевые клетки;
- Г. нервные и клеточные элементы стромы;
- Д. лимфатические сосуды.

У больных раком яичника с нарушением функции почек с большой осторожностью следует применять:

- А. доксорубицин;
- Б. этопозид;
- В. цисплатин;
- Г. циклофосфан;
- Д. гемцитабин.

Побочным действием нестероидных противовоспалительных средств является:

- А. раздражение слизистой ЖКТ
- Б. геморрагические осложнения
- В. гранулоцитопения
- Г. кожные аллергические реакции
- Д. все перечисленные симптомы

Забрюшинная лимфаденэктомия является этапом комбинированного лечения больных злокачественной опухолью яичка при:

- А. семинозной опухоли
- Б. опухоли желточного мешка
- В. сперматоцитарной семиноме
- Г. несеминозной опухоли

В какие сроки наиболее предпочтительно проводить хирургический этап после неoadъювантного лечения местнораспространенного плоскоклеточного рака грудного отдела пищевода

- А. Сразу после завершения предоперационной терапии
- Б. Через 6 месяцев
- В. При хорошем эффекте от неoadъювантного лечения хирургический этап можно не проводить
- Г. 6-8 недель

К злокачественным неэпителиальным опухолям желудка относятся:

- А. лимфома
- Б. лейомиома
- В. гастроинтестинальная стромальная опухоль
- Г. карциноид
- Д. плоскоклеточный рак

Показания к установке стентов в онкологии

- А. рефлюкс-эзофагит
- Б. дисфагия II-III степени
- В. сужение мочевыводящих путей
- Г. послеоперационные грыжи

Симптоматическая терапия пациентов с опухолями головного мозга включает все, кроме:

- А. Глюкокортикостероидные гормоны
- Б. Диуретики
- В. Нестероидные противовоспалительные препараты
- Г. Опиоидные анальгетики

При каком условии только лучевое лечение у больных раком тела матки является методом выбора.

- А. III стадия заболевания
- Б. недифференцированный рак эндометрия
- В. тяжелая сопутствующая патология
- Г. распространение опухоли на влагалище
- Д. все перечисленное выше

При операциях по поводу забрюшинных неорганных опухолей чаще всего используется:

- А. чрезбрюшинный доступ;
- Б. внебрюшинный доступ;
- В. торако-абдоминальный доступ;
- Г. брюшно-промежностный доступ;
- Д. двухподреберный доступ.

Характерный симптом стенозирующего рака пилорического отдела желудка

- А. Увеличение надключичного лимфатического узла
- Б. Шум плеска натошак
- В. Дисфагия
- Г. Мелена

Предраковыми изменениями при раке желудка являются

- А. гиперпластические полипы
- Б. хронический гастрит
- В. дисплазии
- Г. язва желудка
- Д. аденомы

В IБ группу диспансерного учёта включают больных:

- А. с предопухолевыми заболеваниями;
- Б. с подозрением на злокачественную опухоль;
- В. подлежащих радикальному лечению;
- Г. излеченных от онкологического заболевания;
- Д. подлежащих симптоматическому лечению.

К меланомоопасным невусам следует отнести:

- А. веррукозный невус;
- Б. На Lo-невус;
- В. фиброэпителиальный невус;
- Г. невус Ота;
- Д. папилломатозный невус.

Одна инстиляция химиотерапевтического препарата после ТУР мочевого пузыря (не позднее 6 часов) снижает риск рецидива рака мочевого пузыря на:

- А. 0.8
- Б. 0.6
- В. 0.4
- Г. 0.2

Расщепленный курс лучевой терапии применяют для:

- А. повышения радиочувствительности опухоли;
- Б. защиты нормальных тканей;
- В. снижения числа рецидивов;
- Г. повышения дозы облучения;
- Д. улучшения результатов лечения.

Дайте точное определение остеосаркоме.

- А. злокачественная эпителиальная опухоль
- Б. злокачественная неэпителиальная опухоль
- В. злокачественная опухоль костной ткани неэпителиальной природы
- Г. злокачественная опухоль кости эпителиальной природы
- Д. опухоль костной ткани

При поражении лимфоузлов выше диафрагмы и селезенки при лимфоме Ходжкина должна быть поставлена стадия:

- А. I;
- Б. II;
- В. III;
- Г. IV.

Для радионуклидной диагностики феохромоцитомы применяется радиофармпрепарат __

- А. ^{123}I -МИБГ
- Б. ^{123}I -гиппуран
- В. ^{123}I -йодид натрия
- Г. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -МИБИ (Технетрил)

Обязательным компонентом органосохраняющего лечения (после выполнения оперативного вмешательства) больных раком молочной железы является:

- А. гормонотерапия;
- Б. иммунотерапия;
- В. лазерная терапия;
- Г. лучевая терапия на оставшуюся часть молочной железы;
- Д. химиотерапия.

К доброкачественной опухоли пищевода неэпителиального происхождения относится:

- А. Полипы
- Б. Лейомима
- В. ГИСО
- Г. Аденома

Наиболее частые «ургентные» осложнения рака толстой кишки:

- А. перфорация.
- Б. кровотечение.
- В. абсцедирование.
- Г. непроходимость.
- Д. верно все

Опухоли спинного мозга, часто растущие по типу "песочных часов" это:

- А. Невриномы
- Б. Менингиомы
- В. Холестеатомы
- Г. Саркомы

Непосредственным трансформирующим действием обладают:

- А. активированные протоонкогены;
- Б. активированные гены-супрессоры;
- В. витамины;
- Г. активированные рецепторы;
- Д. транскрипционные факторы.

Эхографическим признаком перекрута яичка является

- А. увеличение размеров придатка яичка и резкое повышение эхогенности яичка
- Б. увеличение придатка и яичка, снижение эхогенности ткани яичка и придатка за счет появления множественных мелких гипо-и анэхогенных зон или гипозохогенных зон больших размеров с нечеткой границей
- В. Отсутствие кровотока в яичковой артерии при доплерографии
- Г. уменьшение размеров придатка и яичка с повышением эхогенности их и явлениями атрофии

У больной 45 лет плоскоклеточный рак анального канала T2N0M0. С какого вида предпочтительно начать лечение:

- А. выполнение брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки
- Б. выполнение местного удаления опухоли
- В. проведение химиотерапии
- Г. проведение лучевой или химиолучевой терапии
- Д. проведение симптоматической терапии

Целью I фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является:

- А. изучение противоопухолевой активности цитостатика при разных видах опухоли;
- Б. определение допустимой для человека разовой и суммарной дозы цитостатика и спектра токсичности;
- В. сравнительное изучение нового агента с другими цитостатиками;
- Г. изучение возможных сочетаний с другими цитостатиками;
- Д. анализ экономических показателей лечения и уровня качества жизни.

Сочетанная лучевая терапия означает:

- А. облучение в сочетании с химиотерапией;
- Б. расщепление курса лучевой терапии;
- В. облучение с радиомодификатором;
- Г. применение двух способов облучения или двух видов излучения;
- Д. облучение в сочетании с гормонотерапией.

Аутоиммунный нервно-мышечный паранеопластический синдром у 30-60% больных ассоциирован с

- А. Внегонадной герминогенной опухолью
- Б. тимомой
- В. невриномой
- Г. лимфомой

Международная классификация болезней – это

- А. перечень наименований болезней в определенном порядке;
- Б. перечень диагнозов в определенном порядке;
- В. перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по определенному принципу;
- Г. документ, используемый как ведущая статистическая и классификационная основа в здравоохранении;
- Д. перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в определенном порядке.

В случае выявления злокачественного новообразования врач первичного онкологического кабинета должен:

- А. обязательно уведомить онкологический диспансер;
- Б. с информированного согласия пациента уведомить онкологический диспансер;
- В. с информированного согласия пациента уведомить специализированное федеральное учреждение;
- Г. обязательно уведомить специализированное федеральное учреждение;
- Д. информирование специализированного федерального учреждения законом не предусматривается.

Какая локализация экстранодальной инфильтрации наиболее типична для Т-клеточных лимфом

- А. Желудочно-кишечный тракт
- Б. кожа
- В. легкие
- Г. кости

Повышенные уровни серологических опухолеассоциированных маркеров однозначно свидетельствует о

- А. наличии злокачественного новообразования
- Б. наличии злокачественного новообразования или воспалительного заболевания
- В. обострении хронического воспалительного заболевания
- Г. необходимости углубленного обследования

Какие методы визуализации используются при выполнении вертебропластики

- А. компьютерная томография
- Б. УЗИ
- В. рентгеноскопия
- Г. магниторезонансная томография
- Д. сцинтиграфия

Наиболее часто встречающаяся морфологическая форма рака шейки матки

- А. плоскоклеточный рак
- Б. аденогенный рак
- В. саркома
- Г. светлоклеточный рак
- Д. ангиосклерома

Абсолютные противопоказания для выполнения органосохраняющих операций при саркомах длинных костей?

- А. патологический перелом
- Б. пожилой возраст
- В. врастание опухоли в магистральные сосуды
- Г. тотальное поражение мышечных и соединительно тканых структур в области поражения
- Д. метастатическое поражение легких

Плоскоклеточному раку чаще всего сопутствуют:

- А. болезнь Боуэна;
- Б. кератоакантома;
- В. сенильная кератома;
- Г. постлучевой дерматит;
- Д. веррукозный невус.

К наиболее частым интрамедулярным опухолям спинного мозга относятся следующие:

- А. Астроцитомы
- Б. Олигодендроглиомы
- В. Эпендимомы
- Г. Ангиоретикуломы

Ультразвуковым признаком рака желчного пузыря не является

- А. объемное образование в полости, стенке или вне ж. пузыря
- Б. неровные наружный и внутренний контуры в сочетании с неравномерными изменениями (утолщение, неоднородность и т. д.) стенки на фоне отсутствия клиники воспаления.
- В. неоднородный характер структуры, смешанная эхогенность.
- Г. перемещаемость структуры при изменении положения тела
- Д. все перечисленное неверно.

У пациента верифицирован гепатоцеллюлярный рак промежуточной стадии по BCLC. Узлы при этом чётко определены и порталный кровоток сохранен. Какой метод лечения рекомендован пациенту?

- А. Абляция
- Б. Системная терапия
- В. Трансартериальная химиоэмболизация
- Г. Резекция

У пациента латерально-распространяющаяся опухоль сигмовидной кишки размерами 3,5 см, гистологически подтвержденная как тубулярная аденома с фокусами высокодифференцированной аденокарциномы, с инвазией в пределах слизистой оболочки. Ваша тактика?

- А. Эндоскопическое удаление методом фрагментарной резекции слизистой оболочки
- Б. Эндоскопическое удаление методом петлевой резекции слизистой оболочки
- В. Эндоскопическое удаление методом эндоскопической резекции слизистой оболочки с диссекцией в подслизистом слое
- Г. Хирургическая резекция сигмовидной кишки
- Д. Химиотерапевтическое лечение

Какой из морфологических типов сарком костей не является радиорезистентной опухолью?

- А. Остеомаркома
- Б. Саркома Юинга
- В. Хондросаркома
- Г. Злокачественная гигантоклеточная опухоль

К Вам обратился пациент с диагнозом «стенозирующий рак пищевода T4N1M1», дисфагия III степени. Ваша тактика:

- А. Экстренная резекция пищевода с пластикой
- Б. Экстренная лучевая терапия по радикальной программе
- В. Эндоскопическое стентирование с решением вопроса о последующей лечебной тактике
- Г. Еюностомия

К симптомам интоксикации при неходжкинской лимфоме относятся:

- А. потеря веса, гипертермия (более 38°C);
- Б. потеря веса, профузная потливость;
- В. потеря веса, гипертермия (более 38°C), профузная потливость;
- Г. кожный зуд, потеря веса, профузная потливость;
- Д. гипертермия (более 38°C).

Абсолютным противопоказанием к лучевому лечению является:

- А. пожилой возраст;
- Б. молодой возраст;
- В. активный туберкулез;
- Г. ожирение;
- Д. сердечно-сосудистая недостаточность.

Злокачественные опухоли характеризуются

- А. наличием капсулы
- Б. инфильтративным ростом в окружающие органы и ткани
- В. снижением силы сцепления клеток
- Г. оттеснением окружающих тканей

Рекомендуемый режим индукционной химиотерапии при плоскоклеточных карциномах головы и шеи:

- А. DCF (TPF) - доцетаксел 75 мг/м² в/в в 1 й день + цисплатин 75 мг/м² в/в в 1 й день + 5 фторурацил 1000 мг/м²/сут. в/в 96 часовая инфузия в 1–4 й дни, каждые 3 нед.
- Б. TP - доцетаксел 75 мг/м² в/в в 1 й день + цисплатин 75 мг/м² в/в в 1 й день
- В. эрбитукс - начальная доза 400 мг/м², далее 250 мг/м² 1 раз в неделю
- Г. пембролизумаб 200 мг в/в 1 раз в 3 нед. или 400 мг 1 раз в 6 нед. до прогрессирования или неприемлемой токсичности

Органы-"мишени" метастазирования почечно-клеточного рака - это:

- А. легкие, кости, мозг, щитовидная железа, органы малого таза;
- Б. печень, органы малого таза, надпочечники;
- В. печень, кожа, мозг, органы мошонки;
- Г. молочные железы, печень - у женщин, органы мошонки, печень-у мужчин
- Д. надпочечники.

Наиболее часто рак ротоглотки локализуется

- А. В области задней стенки глотки
- Б. На границе с гортаноглоткой
- В. На боковой стенке глотки
- Г. В области небных миндалин

Для мелкоклеточного рака легкого характерно:

- А. составляет 10-15% в структуре заболеваемости рака легкого;
- Б. чаще всего к моменту постановки диагноза выявляют распространенный процесс;
- В. чувствительный к химиолучевой терапии;
- Г. все перечисленное верно.

Каков окончательный этап диагностики при предопухолевых и опухолевых заболеваниях шейки матки?

- А. цитологическое исследование
- Б. кольпоскопия.
- В. цервикоскопия.
- Г. биопсия шейки матки + выскабливание цервикального канала с гистологическим исследованием.

У больной 46 лет – рак яичника, асцит, плеврит. Стадия заболевания по классификации TNM – T3N1M1. Укажите стадию заболевания по классификации FIGO:

- А. IIC;
- Б. IIIA;
- В. IIIB;
- Г. IIIC;
- Д. IV.

Гистологическая классификация тимом средостения включает:

- А. тип А;
- Б. тип В (В1,В2 и В3);
- В. смешанная (АВ);
- Г. тип С (карцинома);
- Д. все перечисленное верно.

Для какого из перечисленных вариантов НХЛ наиболее характерен синтез моноклоновых Ig?

- А. Лимфоцитарная лимфома (лимфоцитомы)
- Б. Лимфома клеток мантийной зоны
- В. Лимфоплазмочитарная лимфома
- Г. Лимфома маргинальной зоны

Критериями отбора пациентов для эндоскопической резекции слизистой при раннем раке желудка являются:

- А. эндосонографическая оценка глубины инвазии опухоли;
- Б. диаметр опухоли;
- В. гистологический тип;
- Г. макроскопическая форма роста опухоли;
- Д. все перечисленные факторы.

Какой вариант пластического замещения мочевого пузыря после цистэктомии предполагает анастомоз мочевого резервуара с мочеиспускательным каналом

- А. ортотопическая пластика
- Б. гетеротопическая пластика
- В. формирование кондуита
- Г. уретерокутанеостомия
- Д. операция Брикера

Об инвазии мышечного слоя мочевого пузыря опухолью может свидетельствовать следующий эхографический признак:

- А. деформация внутреннего контура мочевого пузыря
- Б. резкое уменьшение объема мочевого пузыря;
- В. утолщение стенки мочевого пузыря в месте расположения опухоли
- Г. поражение мочеточниковых устьев;
- Д. поражение шейки мочевого пузыря.

К цитостатикам с преимущественно фазово-неспецифическим действием относятся:

- А. адриамицин;
- Б. платидиам;
- В. метотрексат;
- Г. алкилирующие агенты;
- Д. таксаны.

К наиболее часто встречающимся неэпителиальным опухолям желудка относят:

- А. Лимфома желудка
- Б. Солитарная фиброзная опухоль
- В. Гастроинтестинальная стромальная опухоль
- Г. Лейомиома

Частота внеорганных опухолей среди всех новообразований шеи составляет от:

- А. 3 до 5%;
- Б. 20 до 25%;
- В. 30 до 40%;
- Г. 50 до 60%;
- Д. более 60%.

Целью III фазы клинического изучения противоопухолевого препарата является:

- А. определить краткосрочное и долгосрочное отношение /безопасность/эффективность для лекарственных форм активного компонента;
- Б. определение максимально переносимой дозы цитостатика;
- В. изучение противоопухолевой активности цитостатика и ее спектра при "сигнальных опухолях";
- Г. изучение возможных сочетаний с другими цитостатиками;
- Д. анализ экономических показателей лечения и уровня качества жизни.

Какие онкомаркеры используют для мониторинга при лечении плоскоклеточного рака пищевода?

- А. СА 72-4
- Б. SCC
- В. РЭА
- Г. СА 19-9

Ведущее значение в диагностике острого лейкоза имеет

- А. Наличие анемии
- Б. Увеличение периферических лимфоузлов
- В. Бластная инфильтрация костного мозга
- Г. Все перечисленное

При каких из перечисленных вариантов острого лейкоза отсутствует положительная реакция на миелопероксидазу и липиды

- А. M2
- Б. M6
- В. M5
- Г. L2

При первичной опухоли Tis-T1 рака пищевода оптимальным объемом лечения является:

- А. операция по типу IvorLewis
- Б. эндоскопическая резекция с диссекцией подслизистого слоя
- В. операция по типу McKeown
- Г. экстирпация пищевода

Современным стандартом радикального хирургического этапа лечения локализованного и местнораспространенного рака грудного отдела пищевода является

- А. Одномоментная субтотальная резекция с пластикой пищевода
- Б. Эзофагэктомия с формированием гастростомы и эзофагостомы, отсроченной пластикой
- В. Эзофагогастрэктомия
- Г. Сегментарная резекция пищевода

У больной 30 лет диагностирован инвазивный плоскоклеточный рак шейки матки на фоне беременности сроком 34 недели. Ваш выбор лечения

- А. лучевая терапия
- Б. искусственные преждевременные роды, потом операция
- В. операция с последующей лучевой терапией
- Г. кесарево сечение + лучевая терапия
- Д. кесарево сечение одномоментно с расширенной экстирпацией матки с придатками + лучевая терапия.

Стереотаксическая биопсия при метастатических опухолях головного мозга применяется при:

- А. Глубинное расположение опухоли
- Б. Расположение опухоли в функционально значимых зонах
- В. Пожилой возраст, минимальная неврологическая симптоматика
- Г. Все выше перечисленное

Какие из перечисленных химиопрепаратов являются основными при лечении саркомы Юинга?

- А. доксорубицин
- Б. митомицин С
- В. метотрексат
- Г. ифосфамид
- Д. таксотер

Операция выбора у мужчин молодого возраста, больных раком мочевого пузыря T2-T3a с локализацией опухоли вне шейки мочевого пузыря:

- А. резекция мочевого пузыря с лимфаденэктомией
- Б. трансуретральная резекция мочевого пузыря
- В. цистпростатэктомия с ортотопической пластикой мочевого пузыря
- Г. цистпростатэктомия с гетеротопической пластикой мочевого пузыря

Необходимо ли делать NGS исследование BRCA ½ у пациенток до 50 лет с семейным онкологическим анамнезом, при отсутствии тройного негативного подтипа опухоли

- А. нет
- Б. По желанию онколога
- В. По желанию пациента
- Г. да

Для достижения критической массы, несовместимой с жизнью, опухолевая клетка должна пройти следующее количество удвоений:

- А. 10;
- Б. 20;
- В. 30;
- Г. 40;
- Д. 50.

К высокоагрессивным Неходжскинским лимфомам относят

- А. лимфобластную
- Б. лимфому маргинальной зоны
- В. диффузную В-клеточную
- Г. фолликулярную лимфому
- Д. лимфому из клеток мантийной зоны

Консультативная помощь по ведению онкологического больного на дому осуществляется

- А. врачом первичного онкологического кабинета;
- Б. врачом первичного онкологического отделения;
- В. участковым терапевтом;
- Г. врачами первичного онкологического кабинета и отделения;
- Д. выездной службой хосписа.

У больной 48 лет, локализованный мелкоклеточный рак правого легкого T3N2M1 (метастатический плеврит). Определите тактику лечения больного:

- А. химиотерапия;
- Б. комбинированная химиолучевая терапия;
- В. хирургическое лечение с адъювантной химиолучевой терапией;
- Г. хирургическое лечение с адъювантной химиотерапией;
- Д. лучевая терапия.

Наиболее часто злокачественные опухоли яичка встречаются в возрасте:

- А. старше 80 лет;
- Б. от 40 до 60 лет;
- В. от 60 до 80 лет;
- Г. от 25 до 35 лет.

ПРИ НАЛИЧИИ КАКОГО ФАКТОРА РИСКА АДЪЮВАНТНАЯ ГОРМОНОТЕРАПИЯ ТАМОКСИФЕНОМ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАЗНАЧАЕТСЯ ДО 10 ЛЕТ

- А. G2
- Б. Ki67<10%
- В. положительный край резекции
- Г. T3-4

Какой вариант лечения адекватен при немелкоклеточном раке легкого в стадии T1-2 N1 M0

- А. хирургический
- Б. операция в сочетании с лучевой терапией
- В. операция в сочетании с химиотерапией
- Г. операция в сочетании с лучевой и химиотерапией

У пациента рак антрального отдела желудка T1b1N0M0 размерами 2,5 см, без изъязвления. Наиболее предпочтительная лечебная тактика:

- А. Субтотальная дистальная резекция желудка
- Б. Химиотерапия
- В. Эндоскопическая резекция слизистой оболочки с диссекцией в подслизистом слое
- Г. Эндоскопическая резекция слизистой оболочки

У больного 24 лет в верхнем переднем средостении определяется богато-васкуляризированное опухолевое образование размерами 6,4 x 7,3 см в диаметре с неровными контурами, с инвазией перикарда. Отмечается резкое увеличение уровня хорионгонадотропина (ХГ) и а-фетопротеина (а-FP) в сыворотке крови. Лимфатические узлы шеи и средостения не увеличены. Определите тактику лечения больного:

- А. хирургическое удаление опухоли с резекцией перикарда;
- Б. комбинированное хирургическое лечение с адъювантной лучевой терапией;
- В. химиотерапия, включающая препараты: цисплатин, этопозид, блеомицин с последующим удалением резидуальной опухоли;
- Г. лучевая терапия СОД = 60 Гр;
- Д. химиолучевая терапия.

Больная раком молочной железы в течение 2-х лет принимала тамоксифен. Появились сукровичные выделения из половых путей. Ваша тактика.

- А. увеличить дозу тамоксифена
- Б. отменить тамоксифен через 2 недели
- В. гемостатическая терапия
- Г. гистероцервикоскопия с прицельной биопсией эндометрия

Гормонотерапия рака предстательной железы направлена на:

- А. повышение уровня тестостерона;
- Б. снижение уровня эстрогенов;
- В. снижение уровня прогестерона;
- Г. снижение уровня АКТГ (адренокортикотропный гормон);
- Д. снижение уровня тестостерона и/или блокирование воздействия циркулирующих андрогенов на андрогеновые рецепторы предстательной железы.

При какой из перечисленных НХЛ наиболее часто встречаются экстранодальные поражения:

- А. Диффузная крупноклеточная лимфома
- Б. Фолликулярная лимфома
- В. Лимфома маргинальной зоны
- Г. Лимфома мантийной зоны

Раннее метастазирование в лёгкие наиболее характерно для:

- А. рака шейки матки;
- Б. хориокарциномы матки;
- В. рака яичника;
- Г. рака вульвы;
- Д. рака влагалища.

К сфинктеросохраняющим операциям при раке прямой кишки относятся:

- А. брюшно-анальная резекция прямой кишки с резекцией внутреннего сфинктера
- Б. низкая внутрибрюшная резекция
- В. брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной в анальный канал с избытком
- Г. внутрибрюшная резекция прямой кишки
- Д. все вышеперечисленные

Какой объем операции производится при I- II стадиях рака гортани

- А. Резекция гортани
- Б. Лярингэктомия
- В. Ляринг-фарингэктомия
- Г. Полиорганный резекция глотки

Пациенту 55 лет с раком языка t3n1m0 рекомендуется

- А. Фасциально-фулярное иссечение клетчатки шеи
- Б. Проведение лучевой терапии до СОД 66-70 Гр
- В. Индукционная химиотерапия (по схеме TPF) с последующей лучевой терапией до СОД 45-50 Гр
- Г. Хирургическое лечение с последующей лучевой или химиолучевой терапией

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин может выбирать медицинскую организацию ____ в год

- А. 1 Раз
- Б. 4 Раза
- В. 2 Раза
- Г. 3 Раза

Радикальная мастэктомия по мэддену при раке молочной железы характеризуется

- А. Удалением обеих грудных мышц
- Б. Сохранением обеих грудных мышц
- В. Сохранением малой грудной мышцы
- Г. Сохранением большой грудной мышцы

Наиболее характерным признаком периферического рака легкого является

- А. Кровохарканье
- Б. Кашель с гнойной мокротой и примесью крови
- В. Округлая тень с неровными контурами
- Г. Затемнение треугольной формы в прикорневой зоне

Наличие инфильтрации меланомы до ретикулярного слоя кожи указывает на ____ степень инвазии по clark

- А. III
- Б. V
- В. IV
- Г. II

Опасность возникновения кардиотоксичности более вероятна при лечении трастузумабом в комбинации с

- А. Винорелбином
- Б. Паклитакселом
- В. Антрациклинами
- Г. Фторурацилом

Наличие клеток березовского – штенберга характерно для

- А. Лимфоцитарной лимфосаркомы
- Б. Иммунобластной лимфосаркомы
- В. Лимфомы Беркитта
- Г. Лимфомы Ходжкина

Решающим методом обследования для выявления саркомы мягких тканей является

- А. Ультразвуковое исследование
- Б. Рентгенологическое исследование
- В. Ангиография
- Г. Биопсия прощупываемого образования

Основным опухолевым маркером при раке яичников является

- А. АФП
- Б. СА 15-3
- В. СА-125
- Г. СА 19-9

Радикальный режим химиотерапии назначается с целью

- А. Продления жизни и улучшения её качества
- Б. Достижения ремиссии опухолевого процесса
- В. Полной эрадикации опухоли
- Г. Профилактики рецидивов после завершения основного курса

К ранним лучевым осложнениям относят реакции, развивающиеся не позднее _____ месяцев после облучения

- А. 2
- Б. 6
- В. 3
- Г. 12

Наиболее частой гистологической формой рака мочевого пузыря является

- А. Мелкоклеточный рак
- Б. Аденокарцинома
- В. Плоскоклеточный рак
- Г. Переходноклеточный рак

Диагноз и все последующие разделы медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма №025/у), заполняются

- А. Медицинским регистратором
- Б. Медицинской сестрой
- В. Лечащим врачом
- Г. Заведующим отделением

Символ «n» в классификации tnm принят для обозначения состояния

- А. Любых групп лимфатических узлов
- Б. Всех групп лимфатических узлов выше или ниже диафрагмы
- В. Только регионарных лимфатических узлов
- Г. Метастазов в отдалённые органы

Основным побочным действием таргетной терапии при меланоме кожи является

- А. Появление телеангиэктазий
- Б. Появление плоскоклеточного рака кожи
- В. Почечная недостаточность
- Г. Появление гемангиомы

Местнодеструкующим ростом в гинекологической патологии обладает

- А. Фиброма
- Б. Эндометриоз
- В. Лейомиома
- Г. Киста

Начало развития заболевания при раке предстательной железы характеризуется

- А. Выраженным болевым синдромом
- Б. Острой задержкой мочи
- В. Ранним появлением дизурических расстройств
- Г. Длительным бессимптомным течением

Основным методом лечения рака желудка является

- А. Иммунотерапия
- Б. Химиотерапия
- В. Лучевая терапия
- Г. Хирургический

К методу цитологической верификации заболеваний поджелудочной железы относят

- А. Пункционно-аспирационную (тонкоигольную) биопсию
- Б. Эндоскопическое исследование желудка
- В. Лапаротомию
- Г. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

Дозиметрический контроль пациентов при радиойодтерапии проводят с использованием

- А. Детекторов гамма-излучения
- Б. Позитронных томографов
- В. Инфракрасных камер
- Г. Масс-спектрометров

Поражение шейных лимфоузлов справа, медиастинальных лимфоузлов и аксиллярных слева при лимфоме соответствует _____ стадии

- А. III
- Б. IV
- В. II
- Г. I

Выявленные при раке желудка увеличенные лимфатические узлы левой надключичной области носят название метастаз

- А. Крукенберга
- Б. Сестры Марии Джозеф
- В. Шницлера
- Г. Вирхова

Типовой операцией при раке ректосигмоидного отдела прямой кишки является

- А. Операция Гартмана
- Б. Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
- В. Левосторонняя гемиколэктомия
- Г. Передняя резекция прямой кишки

При удалении пигментного невуса разрез необходимо выполнять, отступив от границ пятна на

- А. 2 Мм
- Б. 2-3 См
- В. 1 См
- Г. 3-4 Мм

Что не характерно для фолликулярной лимфомы?

- А. Пятилетняя безрецидивная выживаемость более 50%
- Б. Отношение к индолентным лимфомам
- В. Применение препарата брентуксимаб ведотин
- Г. Соблюдение принципа «наблюдай и жди»

В общей структуре злокачественных опухолей рак щитовидной железы составляет примерно (в процентах)

- А. 10-12
- Б. 20-22
- В. 30-32
- Г. 1-2

При раке прямой кишки колоноскопия не позволяет выявить

- А. Сужение просвета кишки
- Б. Морфологическую структуру опухоли
- В. Канцероматоз органов брюшной полости
- Г. Форму роста опухоли

При гормонорезистентном раке предстательной железы эффективно сочетание

- А. Кабазитаксела+преднизолона
- Б. Блеомицина+винбластин
- В. Оливомицина+циклофосфамида
- Г. Фторурацила+циклофосфамида

К какому направлению первичной профилактики злокачественных новообразований относят применение вакцины против гепатита в?

- А. Медико-генетическому
- Б. Эндокринно-возрастному
- В. Иммунобиологическому
- Г. Биохимическому

Больная с фиброаденомой молочной железы относится к/ко _____ клинической группе

- А. 1Б
- Б. III
- В. II
- Г. 1А

Под преинвазивным раком лёгкого понимают опухоль, которая не распространяется за пределы

- А. Поверхностного эпителиального слоя
- Б. Базальной мембраны эпителиального пласта
- В. Мышечного слоя стенки бронха
- Г. Подслизистого слоя стенки бронха

Большинство доброкачественных центральных опухолей лёгких составляют

- А. Тератомы
- Б. Аденомы бронха
- В. Сосудистые опухоли
- Г. Папилломы бронха

Клетками иммунной системы, участвующими в стимуляции опухолевого роста, являются

- А. CD8+ цитотоксические Т-лимфоциты
- Б. Дендритные клетки
- В. M2 макрофаги
- Г. M1 макрофаги

Комплекс медицинских мероприятий, направленных на выявление больных с предраковыми заболеваниями, с последующим их оздоровлением и наблюдением за ними называют _____ профилактикой

- А. Первичной
- Б. Четвертичной
- В. Третичной
- Г. Вторичной

Рак кожи волосистой части головы размерами более 5 см без деструкции костей черепа и регионарных метастазов соответствует ____ стадии

- А. IV
- Б. II
- В. Ia
- Г. III

Наиболее частым клиническим проявлением гепатоцеллюлярного рака является

- А. Иктеричность кожных покровов
- Б. Гепатомегалия
- В. Синдром астении-кахексии
- Г. Лихорадка

К одной из основных категорий жизнедеятельности онкобольного относят способность к

- А. Самореализации
- Б. Обобщению
- В. Совершенствованию
- Г. Самообслуживанию

При заболевании работника в период очередного оплачиваемого отпуска оформляется

- А. Листок нетрудоспособности до окончания отпуска
- Б. Листок нетрудоспособности на весь период временной утраты трудоспособности вследствие заболевания
- В. Справка установленного образца
- Г. Листок нетрудоспособности со дня предполагаемого выхода на работу

Оптимальной химиотерапевтической схемой лечения местнораспространенного нерезектабельного рака поджелудочной железы при удовлетворительном состоянии больного является

- А. BEACOPP
- Б. FOLFIRINOX
- В. FOLFIRI
- Г. ELF

При раке лёгкого t3n0m0 больному показано

- А. Лечение цитостатиками
- Б. Проведение лучевой терапии
- В. Комбинированное цитостатическое и радиологическое лечение
- Г. Хирургическое лечение

Медицинской организации присваивается статус клинической, если на базе организации

- А. Ведется научно-исследовательская деятельность
- Б. Проводится подготовка информационно-аналитических материалов
- В. Проводятся клинические испытания
- Г. Осуществляется практическая подготовка медицинских работников

В случае доброкачественной эндобронхиальной опухоли на широком основании с признаками воспалительных изменений в бронхах оптимальным вариантом является двухэтапное хирургическое лечение с применением в качестве первого этапа

- А. Ультразвуковой деструкции
- Б. Электрорезекции
- В. Криодеструкции
- Г. Лазерной выпаризации

Лентиго-меланома обычно развивается на фоне

- А. Меланоза Дюбрейля
- Б. Гигантского пигментного невуса
- В. Неизменной кожи
- Г. Пограничного невуса

Основным методом диагностики рака щитовидной железы до операции является

- А. Ультразвуковое исследование
- Б. Сцинтиграфия
- В. Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия
- Г. Пальпация

К абсолютным противопоказаниям для лучевой терапии рака пищевода относят

- А. Локализацию опухоли в верхнегрудном и шейном отделах пищевода
- Б. Эндоскопически определяемые признаки перфорации
- В. Выраженную дисфагию
- Г. Протяженность поражения более 8 см

Основным диагностическим методом при синдроме верхней полой вены является

- А. Позитронная эмиссионная томография
- Б. Ангиография
- В. Рентгенологическое исследование грудной клетки
- Г. УЗИ сонных и надключичных вен

Ионизирующие излучения используются при

- А. Электромагнитной терапии
- Б. Гипертермии
- В. Гипотермии
- Г. Радионуклидной терапии с радиофармпрепаратами

При раке поджелудочной железы метастазы в первую очередь появляются в

- А. Печени
- Б. Лёгких
- В. Костях
- Г. Надпочечниках

Клиническим проявлением начальных форм рака пищевода является

- А. Осиплость голоса
- Б. Мучительный кашель, сопровождающийся кровохарканьем
- В. Чувство царапанья за грудиной или прилипания при проглатывании пищи
- Г. Дисфагия II-III степени

Противопоказанием к лучевому лечению больных раком шейки матки является

- А. Молодой возраст
- Б. Кольпит
- В. Прорастание смежных с шейкой матки полостных органов
- Г. Миома матки больших размеров

К признакам злокачественной трансформации пигментных пятен (правило abcd) относится

- А. Однородность окраски
- Б. Размеры пятна более 3 мм
- В. Асимметрия
- Г. Четкость контуров

Химиотерапия наиболее эффективна при _____ лёгкого

- А. Плоскоклеточном неороговевающем раке
- Б. Мелкоклеточном раке
- В. Плоскоклеточном ороговевающем раке
- Г. Аденокарциноме

Согласно классификации по системе тпм (для центрального рака легкого) т2 соответствует поражение

- А. Сегментарного бронха
- Б. Главного бронха, проксимальный край опухоли в 2,3 см от карины
- В. Субсегментарного бронха
- Г. Главного бронха + метастатический плеврит

Метастаз крукенберга является

- А. Гематогенным
- Б. Имплантационным
- В. Лимфогенным ортоградным
- Г. Лимфогенным ретроградным

Для установления диагноза злокачественной опухоли слюнной железы необходимо выполнить

- А. Ангиографию
- Б. Компьютерную томографию
- В. Биопсию с морфологическим исследованием
- Г. Сиалографию

При подозрении на наличие опухоли брюшной полости или забрюшинного пространства у детей первым исследованием, которое выполняется, является

- А. МРТ
- Б. УЗИ
- В. Выделительная урография
- Г. КТ

Пальпаторно узловатая фиброзно-кистозная мастопатия определяется как образование

- А. Мягкоэластической консистенции, с чёткими границами
- Б. Плотно-эластической консистенции, без чётких границ с зернистой поверхностью
- В. Плотной консистенции, бугристое, безболезненное, с чёткими границами
- Г. Плотно-эластической консистенции с гладкой поверхностью, чёткими границами, смещаемое

К признакам злокачественного перерождения пигментной пренеоплазмы относят

- А. Наличие четких контуров
- Б. Изъязвление поверхности, кровоточивость
- В. Однородную пигментацию
- Г. Похолодание в пигментном очаге

Какие характеристики неходжкинских злокачественных лимфом определяют стратегию лечения?

- А. Наличие экстранодальных поражений
- Б. Степень распространения процесса (стадия)
- В. Наличие или отсутствие симптомов интоксикации
- Г. Степень злокачественности по морфологическим критериям

Регионарной химиотерапией является

- А. Внутриполостное введение цитостатиков при наличии специфического плеврита или асцита
- Б. Перитуморальные подкожные введения цитостатиков при наличии специфических опухолевых язв
- В. Прием цитостатиков внутрь при наличии опухоли желудка
- Г. Внутриаартериальное введение цитостатиков при первичном раке печени или ее метастатическом поражении

Доброкачественным процессом с наименьшим риском малигнизации считают

- А. Лентиго
- Б. Внутридермальный невус
- В. Пигментную ксеродерму
- Г. Меланоз Дюбрейля

[Вернуться в начало](#)