

Тесты с вопросами по специальности «Ортодонтия» для аттестации 1, 2 и высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/ortodont/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Ортодонтия» для аккредитации и других экзаменов (1500 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/ortodontiya/

2) Тесты для аккредитации «Стоматология ортопедическая» (1900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/ortoped/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

Навигация по категориям

- [1 категория](#)
- [2 категория](#)
- [высшая категория](#)

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Упражнения с роторасширителем необходимо выполнять в следующем режиме

- А. Статическом и динамическом
- Б. Статическом
- В. Динамическом
- Г. Быстром

В норме нижние центральные резцы имеют

- А. По 1 антагонисту
- Б. По 2 антагониста
- В. Контактируют с клыками верхней челюсти
- Г. Контактируют с боковыми резцами верхней челюсти

Латеральное положение центральных резцов приводит к

- А. Тремам
- Б. Диастеме
- В. Тртоаномалии
- Г. Транспозиции

По месту расположения аппарат Норда

- А. Внеротовой
- Б. Внутриротовой, одночелюстной
- В. Комбинированный
- Г. Одночелюстной

Плоскость основания верхней челюсти обозначается

- А. N-S
- Б. MI
- В. NI
- Г. Fh

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена небно
 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно
 3. Косметический центр смещен влево
 4. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена вестибулярно
- Окклюзия**
- А. Палатино-**
Б. Лингво-
В. Вестибуло-
Г. Трансверсальная резцовая
- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

С целью измерения длины тела верхней челюсти используют

- А. Ортопантограмму
Б. Трг - прямая проекция
В. Трг - боковая проекция
Г. Томографию внчс

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Клиническая ситуация

1. Глубокая резцовая окклюзия
 2. Сужение и укорочение зубного ряда
 3. Зубоальвеолярное удлинение
 4. Латеральное положение центральных резцов
- Конструктивный элемент**
- А. Окклюзионные накладки**
Б. Накусочную площадку
В. Винт Бертони
Г. Петля для устранения диастемы
- А. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Для съемного ортодонтического аппарата активным элементом является

- А. пугочатый кламер
Б. кламер Адамса
В. протрагирующая пружина
Г. Круглый кламер

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <A/N/B

2. <1/1 "alfa"

3.<S/N/Pg

4. <NL/ML "B" Характеристика

А. Взаимоположение оснований верхней и нижней челюстных костей

Б. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

В. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Пластика на верхнюю челюсть с винтом и срединным распилом применяется для

А. Равномерного расширения верхнего зубного ряда

Б. Удлинения фронтального участка нижнего зубного ряда

В. Одностороннего расширения верхнего зубного ряда

Г. Раскрытия срединного небного шва

Вестибулоклюзия - это смещение

А. Нижних или верхних боковых зубов в щечную сторону

Б. Нижних или верхних боковых зубов в оральную сторону

В. Только верхних боковых зубов в оральную сторону

Г. Нижних передних зубов орально

К моменту рождения в норме нижняя челюсть

А. Меньше верхней

Б. Больше верхней на мм

В. Равна верхней

Г. Больше верхней на 5 мм

Пропорциональность мезиодистальных размеров коронок постоянных резцов определяют по

А. Индексу Пона;

Б. Методу Коркхауза;

В. Индексу Тона;

Г. Методу Нансе.

Увеличение $\angle$ SNPg характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Глубокой резцовой
- Г. Физиологической

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S

2. A'-Snpr

3. $\angle$ A/N/V

4. P_g'- Go Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Длина апикального базиса верхней челюсти

Г. Длина переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Резцовое перекрытие составляет более 2/3

2. Обратное смыкание резцов

3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля

4. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля Окклюзия

А. Мезиальная

Б. Дистальная

В. Глубокая резцовая дизокклюзия

Г. Обратная трансверсальная резцовая

А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Графический метод Хаулея- Гербера-Гербста применяют для определения нарушений

А. Длины верхней или нижней челюстей

Б. Формы челюстных костей

В. Положения зубов и формы зубных рядов

Г. Положения зубов в вертикальном направлении

Установите соответствие между конструкцией аппарат и его функцией Аппарат

- 1. Пластика с сагитальным распилом**
 - 2. Регулятор функций Френкеля**
 - 3. Лицевая дуга**
 - 4. Наклонная плоскость Действие**
- А. Расширения зубного ряда**
Б. Нормализация окклюзии
В. Вестибулярное отклонение резцов
Г. Экструзия ,дистализация моляров
- А. 1-А 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Коронка с распоркой на зуб 16 предназначена для

- А. Сохранения места 15**
Б. Мезиализации 16
В. Дистализации 16
Г. Ротации 16

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Уменьшение $\angle$ SNB и увеличение наружного $\angle$ U1/NL**
 - 2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов нижней челюсти**
 - 3. Уменьшение $\angle$ SNB и уменьшение наружного $\angle$ U1/NL**
 - 4. Увеличение $\angle$ В Окклюзия**
- А. Глубокая резцовая окклюзия**
Б. Дистальная II класс I подкласс
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Дистальная глубокая окклюзия II класс II подкласс
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-Г 2-А 3-Б 4-В
В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Г. 1-А 2-В 3-Г 4-В

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Расширяющий винт
2. Протрагирующая пружина
3. Рукообразная пружина
4. Петля для устранения диастемы

- Функция**
- А. Расширение зубных рядов
 - Б. Вестибулярное отклонение зубов
 - В. Устранение трем
 - Г. Устранение диастем

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Лицевая маска Диляра позволяет

- А. Сдерживать рост верхней челюсти
- Б. Перемещать вперед верхний зубной ряд и верхнюю челюсть
- В. Стимулировать рост нижней челюсти
- Г. Сдерживать рост обеих челюстей

Угловой параметр <L1-ML характеризует

- А. Наклон резцов верхней челюсти
- Б. Наклон резцов нижней челюсти
- В. Положение апикального базиса верхней челюсти
- Г. Положение апикального базиса нижней челюсти

Удаление временных зубов по методу Хотца показано

- А. При несоответствии размеров зубов и челюстей
- Б. При наличии сверхкомплектных зубов
- В. Адентии
- Г. Ретенции зубов

Для механически действующего аппарата характерно наличие

- А. Накусочной площадки
- Б. Винта, лигатуры, пружины, дуги, резинового кольца
- В. Наклонной плоскости
- Г. Щита

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle 1/1$ "alfa"

2. $\angle A/N/B$

3. $\angle S/N/Pg$

4. $\angle NL/NSL$ Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

В. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Точка центра турецкого седла

А. S

Б. Po

В. Pt

Г. Ba

По назначению аппарат Андресена-гойпля

А. Лечебный

Б. Профилактический

В. Ретенционный

Г. Комбинированный

Вид эластичной тяги при лечении трансверсальной резцовой окклюзии

А. Межчелюстная по ii классу

Б. Одночелюстная

В. Межчелюстная по iii классу

Г. Перекрестная

Вид эластичной тяги при лечении дистальной окклюзии

А. Межчелюстная по ii классу

Б. Одночелюстная

В. Межчелюстная по iii классу

Г. Вертикальная

Каждый зуб верхней челюсти антагонизирует в норме с

- А. Одноименным и вперёдистоящим зубами н/ч
- Б. Одноименным и позадистоящим зубами н/ч
- В. Только одноименным зубом
- Г. Только позадистоящим

Фиксирующие элементы в аппарате Кламонта

- А. Губной пелот
- Б. Рукообразные пружины
- В. Кламмер Адамса
- Г. Только вестибулярная дуга

Щечные бугорки нижних боковых зубов в норме контактируют

- А. С небными бугорками верхних
- Б. С продольными фиссурами верхних
- В. Со щечными бугорками верхних
- Г. Вестибулярными поверхностями верхних

Установите соответствие между аппаратом и его показаниями Аппарат

- 1. Открытый активатор Кламонта с винтом
 - 2. Пластика с секторальным размером в области первых моляров
 - 3. Квадреликс
 - 4. Маска Дилера
- Функция**
- А. Нормализация окклюзии и расширения зубных рядов
 - Б. Удлинение зубного ряда
 - В. Расширение зубных рядов
 - Г. Нормализация положения верхней челюсти
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
Г. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Метод Пона основан

- А. На зависимости суммы мезиодистальных размеров нижних резцов и ширины зубного ряда в переднем и заднем отделах
- Б. На зависимости суммы мезиодистальных размеров верхних резцов и ширины зубных рядов
- В. На пропорциональности размеров верхних и нижних резцов
- Г. На зависимости между шириной зубного ряда в переднем и заднем отделах

Небные бугорки верхних временных моляров 4-х летнего ребенка располагаются

- А. На одном уровне с язычными бугорками нижних моляров
- Б. В продольной фиссуре нижних моляров
- В. Вестибулярнее щечных бугорков нижних моляров
- Г. На одном уровне с щечными бугорками нижних моляров

Базальная дуга нижней челюсти

- А. Меньше альвеолярной дуги на 5 мм
- Б. Больше альвеолярной дуги
- В. Равна альвеолярной дуге
- Г. Меньше альвеолярной дуги на 3 мм

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Вестибулярные поверхности верхних резцов контактируют с нижними резцами
- 2.Зубоальвеолярное удлинение в области резцов верхней и нижней челюстей
- 3.Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля
4. Протрузия верхних резцов и ретрузия нижних Оклюзия

А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия

Б. Дистальная окклюзия

В. Глубокая резцовая

Г. Обратная резцовая окклюзия

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и вестибулярной дугой позволяет провести

- А. Уплотнение переднего отдела нижнего зубного ряда
- Б. Расширение и уплотнение верхнего зубного ряда
- В. Устранение вредных привычек
- Г. Устранение дизокклюзии

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Резцовое перекрытие составляет более 1/3**
- 2. Обратное перекрытие в области резцов верхней и нижней челюстей, смещение косметического центра**
- 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля**
- 4. Несовпадение средней линии Оклюзия**

А. Мезиальная

Б. Трансверсальная резцовая

В. Глубокая резцовая

Г. Обратная трансверсальная резцовая

А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Увеличение <LI-ML характерно для

- А. Протрузии резцов верхней челюсти**
- Б. Ретрузии резцов верхней челюсти**
- В. Протрузии резцов нижней челюсти**
- Г. Ретрузии резцов нижней челюсти**

Установите соответствие между аппаратом и их функцией Аппарат

- 1. Открытый активатор Кламонта с упором для языка и окклюзионными накладками**
- 2. Пластина с секторальным размером в области первых моляров**
- 3. Квадреликс**
- 4. Маска Дилера Функция**

А. Удлинение зубного ряда в боковом отделе

Б. Вертикальная резцовая дизокклюзия

В. Расширения верхнего зубного ряда

Г. Нормализация положения верхней челюсти

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Точка Me соответствует

- А. Передней точке на нижнем контуре тела нижней челюсти**
- Б. Вершине суставной головки**
- В. Точке пересечения тела нижней челюсти**
- Г. Нижней точке на нижнем контуре тела нижней челюсти на месте пересечения симфиза**

Зубные ряды в прикусе временных зубов имеют форму

- А. Полуэллипса
- Б. Полукруга
- В. Параболы
- Г. Трапеции

Зубоальвеолярную высоту переднего отдела верхней челюсти характеризует параметр

- А. U1- NL
- Б. U6 - NL
- В. L1- ML
- Г. L1- ML

Супраположение зуба - это

- А. Высокое положение зуба
- Б. Поворот зуба вокруг вертикальной оси
- В. Вестибулярный наклон зуба
- Г. Оральное положение зуба

Аппарат Pendulum используется для

- А. Дистализации верхних первых моляров
- Б. Сужения зубного ряда
- В. Укорочения зубного ряда
- Г. Ретенции

Условия для нарушения носового дыхания создаются при

- А. Хроническом гастрите
- Б. Пиелонефрите
- В. Бронхиальной астме, хронических бронхитах
- Г. Нарушении осанки

Недостаток места может привести к аномалии

- А. Положения
- Б. Размера
- В. Формы
- Г. Структуры

Регулятор функции Френкеля I типа создает условия для роста

- А. Нижней челюсти
- Б. Верхней челюсти
- В. Обеих челюстей
- Г. Не влияет на рост

Резцы в/ч в норме контактируют с резцами н/ч

- А. Небной поверхностью
- Б. Режущим краем
- В. Вестибулярной поверхностью
- Г. Апроксимальной поверхностью

Гиперодонтия возникает при

- А. Наличии сверхкомплектных зубов
- Б. Отсутствии зачатков зубов
- В. Ретенции зубов
- Г. Увеличении размеров зубов

Франкфуртская горизонталь проводится через точки

- А. Or-Po
- Б. N-s
- В. Ar-go
- Г. Sna-snp

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

- 1. Заслонка для языка
 - 2. Оклюзионные накладки в области боковых зубов
 - 3. Протрагирующая пружина
 - 4. Петля для устранения диастемы
- Функция**
- А. Интрузия боковых зубов
 - Б. Нормализация положения языка
 - В. Нормализация положения передних зубов
 - Г. Медиальное смещение резцов
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
 - Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
 - В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
 - Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

- 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена щечно**
- 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно**
- 3. Косметический центр смещен вправо**
- 4. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена небно** **Окклюзия**

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Вестибуло-

Г. Трансверсальная резцовая

А. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Установите соответствие между состоянием окклюзии и соотношением первых моляров
Соотношение первых моляров

1. Физиологическая

2. Мезиальная

3. Дистальная с протрузией резцов верхней челюсти

4. Дистальная с ретрузией резцов верхней челюсти **Состояние окклюзии**

А. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается в поперечной фиссуре нижнего первого моляра

Б. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Протрузия резцов верхней челюсти

В. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Ретрузия резцов верхней челюсти

Г. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается позади поперечной фиссуры нижнего первого моляра

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Установите соответствие между аппаратом для функциональной диагностики и показателями Метод диагностики

- 1. Периотест**
 - 2. Миотонометр**
 - 3. Кинезиограф**
 - 4. Электромиограф Определяет**
 - А. Тонус мышц**
 - Б. Биопотенциалы мышц**
 - В. Движение нижней челюсти**
 - Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке**
- А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Тортоаномалия - это

- А. Высокое положение зуба
Б. Поворот зуба вокруг вертикальной оси
В. Вестибулярный наклон зуба
Г. Оральное положение зуба

Губные пелоты способствуют

- А. Росту апикального базиса челюсти
Б. Сдерживанию роста апикального базиса челюсти
В. Устранению протрузии резцов
Г. Фиксации аппарата в полости рта

К специальным методам диагностики в ортодонтии относятся

- А. Осмотр полости рта, функциональные пробы
Б. Опрос, рентгенологические, функциональные, графические
В. Опрос, осмотр, измерение гипсовых моделей челюстей
Г. Функциональные, графические, кефалометрические

Установите соответствие между аппаратом и показаниями его применения Аппарат

1. Регулятор функций Френкеля II типа
 2. Расширяющая пластинка
 3. Пластинка с секторальным распилом
 4. Пластинка с окклюзионными накладками Лечение окклюзии
- А. Дистальная II класс II подкласс
Б. Сужение зубных рядов
В.Зубоальвеолярное удлинение в области жевательной группы зубов
Г. Уплотнение переднего участка зубного ряда
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Первый и второй подклассы II класса Энгля различаются положением

- А. Моляров
Б. Клыков
В. Резцов
Г. Челюстей

При "инфантильном" типе глотания положение кончика языка

- А. на вестибулярной поверхности верхних резцов
Б. на дне полости рта
В. между верхними и нижними резцами
Г. на небе

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Обратное соотношение резцов верхней и нижней челюстей
 2. Смещение косметического центра вправо
 - 3.Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля
 4. Снижение нижней трети лица. Окклюзия
- А. Мезиальная
Б. Трансверсальная
В. Глубокая резцовая
Г. Обратная резцовая
- А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Передний щечный бугорок 16 зуба в норме контактирует с

- А. Задним щечным бугорком 46
- Б. Межбугорковой фиссурой 46
- В. Контактной точкой между 45 и 46
- Г. Передней ямкой продольной фиссуры 46

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией

1. Вестибулярная дуга

2. Губной пелот

3. Протрагирующая пружина

4. Петля для устранения диастемы

А. Уплотнение зубного ряда

Б. Стимуляция роста апикального базиса

В. Отклонение вестибулярно зубов

Г. Нормализация положения центральных резцов

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Дистальные поверхности вторых временных моляров 6-летнего ребенка располагаются

- А. В одной вертикальной плоскости
- Б. С мезиальной ступенькой
- В. С дистальной ступенькой
- Г. С латеральной ступенькой

Точка Pt является

- А. Верхней дистальной точкой крыловидно-верхнечелюстной щели
- Б. Серединой турецкого седла
- В. Нижней точкой края орбиты
- Г. Верхней точкой наружного слухового прохода

Порядок прорезывания постоянных зубов

А. 6-1-2-3-4-5-7

Б. 1-2-4-5-3-6

В. 6-1-2-4-3-5-7

Г. 6-1-2-5-3-4-7

Аппарат Pendulum применяют для

- А. Дистализации моляров верхней челюсти
- Б. Смещения нижней челюсти вперед
- В. Смещения верхнего зубного ряда вперед
- Г. Стабилизации положения верхней челюсти

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его действия

Элемент

1. Протрагирующая пружина

2. Расширяющий винт

3. Веерообразный винт

4. Вестибулярная дуга

Функция

А. Нормализация положения зубов

Б. Фиксация аппарата

В. Расширить зубной ряд в переднем отделе

Г. Расширение верхнего зубного ряда

А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Функциональное состояние мышц челюстно-лицевой области определяют методом

- А. Электромиографии, электромиотонометрии
- Б. Реопарадонтोगрафии
- В. Артрофонографии
- Г. Аксиографии

Задняя точка верхней челюсти

А. Co

Б. Snp

В. Go

Г. Sna

К ретенционным аппаратам относятся аппараты для

- А. Предупреждения развития аномалий
- Б. Расширения зубного ряда
- В. Закрепления достигнутых результатов лечения
- Г. Лечения аномалий зубных рядов

Вредная привычка сосания пальца причина

- А. Вертикальной резцовой дизокклюзии
- Б. Прямой резцовой окклюзии
- В. Глубокой резцовой окклюзии
- Г. Глубокой резцовой дизокклюзии

Аппарат Норда используется для

- А. Удлинения верхнего зубного ряда
- Б. Ротации первых верхних моляров
- В. Раскрытия небного шва
- Г. Сужение верхнего зубного ряда

О симметричности развития правой и левой половины нижней челюсти позволяют судить

- А. Панорамная рентгенограмма
- Б. Трг - боковая проекция
- В. Трг - прямая проекция и Клт
- Г. Ортопантомограмма и томография внчс

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Аппарат

- 1. Пластика с секторальным распилом в области резцов верхней челюсти
- 2. Пластика с сагиттальным распилом
- 3. Аппарат Андресена-Гойпля
- 4. Pendulum Функция

- А. Удлинение зубного ряда в переднем отделе
- Б. Расширение зубного ряда верхней челюсти
- В. Дистализация первых моляров
- Г. Нормализация окклюзии

- А. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
- Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
- В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
- Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <A/N/B

2. <1/1 "alfa"

3.<S/N/Pg

4. Pg'- Go Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Аномалии челюстей в сагиттальном направлении можно определить с помощью

А. Ортопантомографии

Б. Трг в боковой проекции

В. Панорамной рентгенографии

Г. Трг прямая проекция

Резцы н/ч в норме контактируют с резцами в/ч

А. Язычной поверхностью

Б. Режущим краем

В. Вестибулярной поверхностью

Г. Апроксимальной поверхностью

Точка на ветви нижней челюсти обозначается

А. Со

Б. Me

В. Go

Г. Ро

Дистальная окклюзия характеризуется смещением боковых зубов

А. Нижней челюсти назад

Б. Нижней челюсти вперед

В. Верхней челюсти назад

Г. Верхней челюсти латерально

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S

2. A'-SnP

3. <L1/ML

4. <A/N/B Характеристика

А. Длина апикального базиса верхней челюсти

Б. Длина переднего отдела основания черепа

В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Уменьшение <SNA характерно для окклюзии

А. Дистальной

Б. Мезиальной

В. Глубокой резцовой

Г. Физиологической

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Упор для языка

2. Щечные щиты

3. Протрагирующая пружина

4. Накусочная площадка Функция

А. Нормализация положения языка

Б. Интрузия резцов

В. Отведение мышц щек от альвеолярного отростка

Г. Нормализация положения зубов

А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Аппарат

1. Пластика с секторальным распилом в области резцов нижней челюсти

2. Pendulum

3. Аппарат Андресена-Гойпля

4. Пластика с накусочной площадкой Функция

А. Удлинение зубного ряда в переднем отделе

Б. Удлинение зубного ряда

В. Нормализация окклюзии

Г. Интрузия резцов нижней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Рукообразные пружины перемещают зубы в направлении

А. Оральном

Б. Вестибулярном

В. Вертикальном

Г. Мезио-дистальном

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Аппарат

1. Пластика с секторальным распилом в области первых моляров

2. Пластика с сагиттальным распилом

3. Открытый активатор Кламмта

4. Круглый кламер Функция

А. Удлинение зубного ряда

Б. Нормализация окклюзии

В. Расширение зубного ряда

Г. Фиксация аппарата

А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Вестибулярная дуга
 2. Оклюзионные накладки
 3. Пелот для отведения губы
 4. Щечные щиты Функция
- А. Фиксирующий элемент
Б. Интрузия
В. Отведение мышц щек от альвеолярного отростка
Г. Отведение губы и стимуляция роста апикального базиса
- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Расширяющий винт
 2. Оклюзионные накладки в области боковых зубов
 3. Веерообразный винт
 4. Кламмер Адамса Функция
- А. расширение зубных рядов
Б. Интрузия боковых зубов
В. Расширение зубного ряда в переднем участке
Г. Фиксация аппарата
- А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Увеличение $\angle$ SNB характерно для окклюзии

- А. Дистальной
Б. Мезиальной
В. Глубокой резцовой
Г. Физиологической

Внеротовая резиновая тяга используется для

- А. Тренировки мышц
Б. Введения дополнительного элемента аппарата лицевая дуга, подбородочная праща
В. Нормализации дыхания
Г. Устранения вредных привычек

Бампер Корна с упором для языка предназначен для

- А. Стабилизации положения зубов
- Б. Перемещения зубов в вестибулярном направлении
- В. Внедрения передней группы зубов
- Г. Устранения вредной привычки

Установите соответствие между аппаратом и его свойствами Аппарат

1. Регулятор функций Френкеля III типа

2. Pendulum

3. Открытый активатор Кламмта

4. Пластика с наклонной плоскостью Свойства аппарата

А. Механический

Б. Функциональный

В. Комбинированный

Г. Съёмный

А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Передняя точка носовой ости

А. Co

Б. Snp

В. Go

Г. Sna

Аппарат Андресена - Хойпля предназначен для

А. Расширения зубного ряда

Б. Дистального перемещения боковой группы зубов справа

В. Трансверсального расширения

Г. Лечения дистальной окклюзии

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент 1

Расширяющий винт

2. Губной пелот

3. Протрагирующая пружина

4. Петля для устранения диастемы Функция

А. Стимуляция роста апикального базиса

Б. Равномерное расширение зубного ряда

В. Отклонение вестибулярно

Г. Нормализация положения центральных резцов

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение <SNB

2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов на верхней и нижней челюстях

3. Зубоальвеолярное укорочение в области боковых зубов на верхней и нижней челюстях

4. Увеличение <SNB Окклюзия

А. Глубокая резцовая дизокклюзия

Б. Дистальная

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Мезиальная

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <ML/NSL

2. <S/N/A

3. <NL/NSL

4. <S/N/B Характеристика

А. Положение основания нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Б. Положение апикального базиса нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

В. Положение апикального базиса верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Г. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Губной пелот

2. Кламмера Адамса

3. Рукообразная пружина

4. Вестибулярная дуга Функция

А. Нормализация положения отдельных зубов

Б. Стимуляции роста апикального базиса челюсти в переднем отделе

В. Устранение протрузии резцов

Г. Фиксация аппарата

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-В 4- Г

Для оценки пародонта боковой группы зубов целесообразно использовать

А. Трг - прямую проекцию

Б. Ортопантомографию

В. Томографию

Г. Прицельную рентгенографию

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Веерообразный винт

2. Губной пелот

3. Протрагирующая пружина

4. Рукообразная пружина Функция

А. Стимуляция роста апикального базиса

Б. Отклонение вестибулярно зубов

В. Расширениезубного ряда в переднем отделе

Г. Нормализация положения отдельных зубов

А. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Б. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle 1/1$ "alfa"

2. A'-SnP

3. $\angle A/N/B$

4. Pg'-Go Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Длина апикального базиса верхней челюсти

Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

А. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S

2. Co-Go

3. $\angle L1/ML$

4. $\angle A/N/B$ Характеристика

А. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

Б. Длина ветви нижней челюсти

В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Г. Длина переднего отдела основания черепа

А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Угловой параметр $\angle U1-NL$ характеризует

А. Наклон резцов верхней челюсти

Б. Наклон резцов нижней челюсти

В. Положение апикального базиса верхней челюсти

Г. Положение апикального базиса нижней челюсти

Губной бампер не используют для

А. Расширения нижнего зубного ряда

Б. Дистализации первых нижних моляров

В. Уплощения переднего отрезка верхнего зубного ряда

Г. Удлинения переднего отрезка нижнего зубного ряда

Установите соответствие между состоянием мягких тканей полости рта и формированием нарушения

Состояние мягких тканей полости рта

1. Низкое прикрепление уздечки верхней губы

2. Укорочение уздечки языка

3. Мелкое преддверие

4. Тяжи

А. Недоразвитие переднего участка нижнего зубного ряда

Б. Латерального положения центральных резцов

В. Рецессия десны в области передних зубов

Г. Рецессия десны в области боковых зубов

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией

Элемент

1. Заслонка для языка

2. Оклюзионные накладки

3. Вестибулярная дуга

4. Пелот

А. Нормализация положения языка

Б. Интрузия боковых зубов

В. Фиксация аппарата

Г. Отведение губы и стимуляция роста апикального базиса

А. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой

Показатели

1. $\angle \text{NL/ML}$ "В"

2. $\angle \text{S/N/A}$

3. $\angle 1/1$ "alfa"

4. $\angle \text{A/N/B}$ Характеристика

А. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

Б. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

В. Положение апикального базиса верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение оснований верхней и нижней челюстных костей

А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

При аномалиях окклюзии необходимо провести

- А. Клиническое обследование
- Б. Антропометрические измерения гипсовых моделей челюстей, внешний осмотр
- В. Клиническое обследование и специальные методы диагностики
- Г. Осмотр полости рта и рентгенологические методы

Линия N-S соответствует плоскости

- А. Основания верхней челюсти
- Б. Основания нижней челюсти
- В. Переднего отдела основания черепа
- Г. Эстетической по rickets

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Аппарат Персина

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
- 2. Окклюзионные накладки
- 3. Нижний губной пелот
- 4. Заслонка для языка

Окклюзия

- А. Протрузия верхних резцов
- Б. Мезиальная
- В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- Г. Дистальная

А. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Б. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Аппарат для лечения перекрестной окклюзии является

- А. Одночелюстным, механическим
- Б. Одночелюстным, функциональным
- В. Двучелюстным, комбинированным
- Г. Двучелюстным, функциональным

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <ML/NSL

2. <L1/ML

3. <U1/NL

4. <NL/NSL Характеристика

А. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти

Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

В. Положение основания нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Г. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Аппарат Нанса предназначен для

А. Стабилизации положения резцов

Б. Вестибулярного перемещения резцов

В. Выдвижения нижней челюсти

Г. Стабилизации положения моляров

Точка Со расположена на

А. Переднем контуре апикального базиса верхней челюсти

Б. Переднем контуре апикального базиса нижней челюсти

В. Заднем контуре суставной головки нижней челюсти

Г. Вершине суставной головки нижней челюсти

Длину переднего отрезка зубного ряда определяют с помощью метода

А. Пона

Б. Коркхауза

В. Хауса-Снагиной

Г. Нансе

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

- 1. Упор для языка**
 - 2. Расширяющий винт**
 - 3. Веерообразный винт**
 - 4. Петля для устранения диастемы** **Функция**
- А. Нормализация положения языка**
 - Б. Равномерное расширение зубного ряда**
 - В. Расширение зубного ряда в переднем отделе**
 - Г. Нормализация положения центральных резцов**
- А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
В. 1-Б 2-Г 3-А 4--В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Ортодонтический аппарат с винтом и поперечным распилом в переднем отделе предназначен для

- А. Сохранения места зубу 35**
- Б. Коррекции положения первого постоянного моляра**
- В. Удлинения зубного ряда**
- Г. Расширения зубного ряда**

Положение языка между зубами приводит к

- А. Мезиальной окклюзии**
- Б. Глубокой резцовой окклюзии**
- В. Дистальной окклюзии**
- Г. Вертикальной резцовой дизокклюзии**

Установите соответствие между аппаратом и их функцией Аппарат

- 1. Маска Диляра**
 - 2. Небный бюгель**
 - 3. Лицевая дуга с головной тягой**
 - 4. Аппарат Норда** **Функция**
- А. Деротация моляров**
 - Б. Интрузия моляров**
 - В. Разрыв небного шва**
 - Г. Нормализация положения верхней челюсти**
- А. 1-Г 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-В 2-Б 3-Г 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между аппаратом и их функцией Аппарат

1. Маска Диляра
 2. Аппарат Персина
 3. Лицевая дуга с головной тягой
 4. Квадхеликс Функция
- А. Интрузия моляров
Б. Нормализация окклюзии
В. Нормализация положения верхней челюсти
Г. Расширение верхнего зубного ряда
- А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Пластика на верхнюю челюсть с винтом и секторальным распилом применяется для

- А. Равномерного расширения верхнего зубного ряда
Б. Укорочения фронтального участка нижнего зубного ряда
В. Одностороннего расширения верхнего зубного ряда
Г. Раскрытия срединного небного шва

Уменьшение параметра Pg' -Go характерно для окклюзии

- А. Дистальной
Б. Мезиальной
В. Сужения зубных рядов
Г. Физиологической

Нейтральная (физиологическая) окклюзия соответствует классу Энгля

- А. I
Б. II
В. III
Г. IV

Регулятор функции Френкеля III типа используется для лечения

- А. Дизокклюзии зубных рядов
Б. Дистальной окклюзии
В. Мезиальной окклюзии
Г. Перекрестной окклюзии

Головная шапочка с подбородочной пращей позволяет

- А. Сдерживать рост нижней челюсти
- Б. Перемещать вперед верхний зубной ряд и верхнюю челюсть
- В. Стимулировать рост нижней челюсти
- Г. Сдерживать рост обеих челюстей

Установите соответствие между соотношением первых моляров по Энгу и состоянием окклюзии Соотношение первых моляров

- 1. 1-ый класс
 - 2. 2-ой класс I подкласс
 - 3. 2-ой класс II подкласс
 - 4. III класс Состояние окклюзии
- А. Физиологическая
Б. Мезиальная
В. Дистальная с протрузией резцов верхней челюсти
Г. Дистальная с ретрузией резцов верхней челюсти
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Клиническая ситуация

- 1. Вертикальная резцовая дизокклюзия
 - 2. Ретрузия резцов
 - 3. Адентия
 - 4. Глубокая резцовая окклюзия Конструктивный элемент
- А. Протрагирующая пружина
Б. Накусочную площадку
В. Заслонку для языка
Г. Искусственные зубы
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Регулятор функций Френкеля

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти

2. Без окклюзионных накладок

3. Пелот для отведения нижней губы

4. Пелот для отведения верхней губы

А. Дистальная II класс I подкласс.

Б. Глубокая

В. Недоразвитие аппикального базиса верхней челюсти

Г. Недоразвитие аппикального базиса нижней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Б 2-В 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Изучить размеры зубных рядов в периоде временных зубов можно методом

А. Пона

Б. Коркхауза

В. Долгополовой

Г. Тона

Палатокклюзия относится к аномалиям окклюзии в направлении

А. Сагиттальном

Б. Вертикальном

В. Трансверсальном

Г. Сагиттальном и вертикальном

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его действия

1. Винт Бертони

2. Расширяющий винт

3. Кламмера Адамса

4. Протрагирующая пружина

А. Одномоментно или поочередно расширить и удлинить зубной ряд

Б. Фиксация аппарата

В. Расширение зубного ряда

Г. Нормализация положения в вестиболо-оральном направлении

А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Передняя точка апикального базиса нижней челюсти

- А. Рg
- Б. В
- В. Me
- Г. А

Период подготовки к смене зубов продолжается

- А. От до лет
- Б. От 5 до 6 лет
- В. От 5 до 8 лет
- Г. От до 9 лет

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Клиническая ситуация

- 1. Глубокая резцовая окклюзия
- 2. Ретрузия резцов
- 3. Нарушение функции языка
- 4. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов Конструктивный элемент

- А. Секторальный распил с винтом
- Б. Накусочную площадку
- В. Заслонку для языка
- Г. Окклюзионные накладки в области жевательной группы зубов

- А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г
- Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
- В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
- Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

**Установите соответствие между методом функциональной диагностики и его показателями
Метод диагностики**

- 1. Электромиография
- 2. Аксиография
- 3. Миотонометрия
- 4. Периотестометрия Определяет
- А. Тонус мышц
- Б. Биопотенциалы мышц
- В. Движение суставной головки
- Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке

- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
- Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
- В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
- Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $A'-Snr$
 2. Увеличение $Pg'-Go$
 3. Увеличение $<U1/Nl$
 4. Уменьшение $<L1/ML$ Окклюзия
- А. Ретрузия нижних резцов
Б. Дистальная
В. Ретрузия верхних резцов
Г. Мезиальная
- А. 1-Б 2-Г 3-В 4-А
Б. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

При синдроме "наперстка" наблюдается

- А. Напряжение круговой и подбородочной мышц
Б. Напряжение верхней части лица
В. Ротовое дыхание
Г. Несмыкание губ

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $<1/1$ "alfa"
 2. $<U1/Nl$
 3. $<L1/ML$
 4. $<ML/NSL$ Характеристика
- А. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти
Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти
В. Положение основания нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа
Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
В. 1-Г 2-А 3-Б 4-В
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Компактоостеотомия проводится с целью

- А. Улучшения фиксации ортодонтического аппарата
Б. Ускорения ортодонтического лечения
В. Продолжения ортодонтического лечения
Г. Стабилизации результатов ортодонтического лечения

В регуляторе функции Френкеля I типа губные пелоты располагаются в области губы

- А. Нижней
- Б. Верхней
- В. Верхней и нижней
- Г. Нет губных пелотов

Вид эластичной тяги при лечении мезиальной окклюзии

- А. Межчелюстная по II классу
- Б. Одночелюстная
- В. Межчелюстная по III классу
- Г. Вертикальная

Передняя точка апикального базиса верхней челюсти

- А. Pg
- Б. В
- В. Me
- Г. А

Аппарат Брюкля предназначен для нормализации окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Вертикальной дизокклюзии
- Г. Лингвоокклюзии

Метод Герлаха применяют для определения

- А. Длины тела нижней челюсти
- Б. Ширины зубного ряда
- В. Пропорциональности размеров боковых и передних сегментов зубных рядов верхней и нижней челюстей
- Г. Лонгитудинальной длины зубного ряда

Диаграмма Хаулея-Гербера-Гербста позволяет определить

- А. Размеры зубных рядов
- Б. Форму зубных рядов
- В. Размеры сегментов зубных рядов
- Г. Размеры челюстных костей

Аппарат Pendulum используется для

- А. Дистализации боковой группы зубов
- Б. Сужения зубного ряда
- В. Укорочения зубного ряда
- Г. Ретенции

Ортопантомографию в ортодонтии применяют для определения

- А. Длины верхней челюсти
- Б. Длины нижней челюсти
- В. Наличия зачатков постоянных зубов
- Г. Ширины зубных рядов

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle L1/ML$

2. $Pg'-Go$

3. N-S

4. Co-Go Характеристика

А. Длина ветви нижней челюсти

Б. Длина переднего отдела основания черепа

В. Длина тела нижней челюсти

Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Точка угла нижней челюсти обозначается

- А. Co
- Б. Ar
- В. Go
- Г. Po

Лингвоокклюзия - это смещение

- А. Верхних боковых зубов орально
- Б. Нижних боковых зубов орально
- В. Верхних боковых зубов щечно
- Г. Нижних передних зубов вестибулярно

Передняя костная точка подбородочного отдела точка обозначается

- А. Pg
- Б. Me
- В. Ar
- Г. Go

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией

- | | |
|---|----------------|
| 1. Вестибулярна дуга | Элемент |
| 2. Трехмерный винт Бертони | |
| 3. Протрагирующая пружина | |
| 4. Петля для устранения диастемы | Функция |

- А. Вестилярное отклонение резцов**
- Б. Устранение протрузии резцов**
- В. Расширение и удлинение зубного ряда**
- Г. Нормализация положения центральных резцов**

- А. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
- Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
- В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
- Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Сроки прорезывания постоянных зубов

- А. 1 - 6-7 лет, 2- 7-8 лет, 4 - 8-9 лет, 3 - 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 6 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- Б. 6 - 6-7 лет, 1- 7-8 лет, 2 - 8-9 лет, 3 - 11-12 лет, 4 - 9-10 лет, 5 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- В. 1 - 6-7 лет, 2- 7-8 лет, 3 - 8-9 лет, 4 - 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 6 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- Г. 6 - 6-7 лет, 1- 7-8 лет, 2 - 8-9 лет, 4- 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 3 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет

Показанием к протезированию у детей является

- А. Нарушение окклюзии
- Б. Аномалии формы временных зубов
- В. Ранняя потеря молочных зубов
- Г. Нарушение формы зубных рядов

Установите соответствие между аппаратом и показаниями его применению Аппарат

- 1. Регулятор функций Френкеля I типа**
 - 2. Расширяющая пластинка**
 - 3. Пластинка с секторальным распилом**
 - 4. Пластинка с накусочной площадкой Лечение окклюзии**
- А. Дистальная II класс I подкласс**
Б. Глубокая резцовая окклюзия
В. Уплотнение переднего участка зубного ряда
Г. Сужение зубных рядов
- А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Б. 1-Б 2-Г 3-В 4-А
В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

- 1. $<S/N/Pg$**
 - 2. Co-Go**
 - 3. $<A/N/V$**
 - 4. A'-Snr Характеристика**
- А. Длина апикального базиса верхней челюсти**
Б. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
В. Длина ветви нижней челюсти
Г. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа
- А. 1-А 2-Г 3-Б 4-В
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Привычка спать на спине с запрокинутой головой приводит к

- А. Нарушению положения зубов
Б. Нарушению прорезывания зубов
В. Задержке роста нижней челюсти
Г. Выдвижению нижней челюсти

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. Pg'- Go

2. <L1/ML

3. <U1/NL

4. A'-Snр Характеристика

А. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Длина апикального базиса верхней челюсти

Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Порядок прорезывания временных зубов

А. I - II - III - IV - V

Б. I - II - IV - III - V

В. II - I - III - IV - V

Г. I - II - V - IV - III

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Расширяющий винт

2. Протрагирующая пружина

3. Рукообразная пружина

4. Петля для устранения диастемы Функция

А. Расширения зубного ряда

Б. Нормализация положения отдельных зубов

В. Нормализация положения центральных резцов

Г. Небное положение зубов

А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между методом функциональной диагностики и его показателями

Метод диагностики

- 1. Периотестометрия**
 - 2. Миотонометрия**
 - 3. Кинезиография**
 - 4. Электромиография** Определяет
- А. Тонус мышц**
Б. Биопотенциалы мышц
В. Движение нижней челюсти
Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке
- А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
Б. 1-В 2-Б 3-Г 4-А
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

- 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда расположена небно**
 - 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно**
 - 3. Косметический центр смещен вправо**
 - 4. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена щечно** Окклюзия
- А. Палатино-**
Б. Лингво-
В. Трансверсальная резцовая
Г. Вестибуло-
- А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Метод электромиографии в ортодонтии применяется для исследования

- А. Кровеносных сосудов пародонта**
Б. Работы ВНЧС
В. состояния пародонта
Г. Биопотенциала мышц

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Клиническая ситуация

- 1. Вертикальная резцовая дизокклюзия**
 - 2. Ретрузия резцов**
 - 3. Адентия**
 - 4. Глубокая резцовая окклюзия Конструктивный элемент**
- А. Секторальный распил**
Б. Накусочную площадку
В. Искусственные зубы
Г. Окклюзионные накладки
- А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
Б. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Губной бампер используют для

- А. Укорочения нижнего зубного ряда**
Б. Дистализации первых нижних моляров
В. Уплотнения переднего отрезка верхнего зубного ряда
Г. Сужения нижнего зубного ряда

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

- 1. N-S**
 - 2. Co-Go**
 - 3. Pg'- Go**
 - 4. <A/N/V Характеристика**
- А. Длина тела нижней челюсти**
Б. Длина переднего отдела основания черепа
В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
Г. Длина ветви нижней челюсти
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение A'- Snp
 2. Увеличение Pg'- Go
 3. Увеличение U1-NL
 4. Уменьшение U1-NL Окклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Глубокая резцовая
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
В. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. A'-Snp
 2. Co-Go
 3. Pg'- Go
 4. N-S Характеристика
- А. Длина ветви нижней челюсти
Б. Длина тела нижней челюсти
В. Длина апикального базиса верхней челюсти
Г. Длина переднего отдела основания черепа
- А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <NL/NSL
 2. A'-Snp
 3. <A/N/V
 4. Pg'- Go Характеристика
- А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
Б. Длина тела нижней челюсти
В. Длина апикального базиса верхней челюсти
Г. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа
- А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение $A'-Snpr$
 2. Уменьшение $Pg'-Go$
 3. Увеличение $U1-NL$
 4. Увеличение $<B$ Оклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Глубокая резцовая
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
В. 1-Г 2-А 3-Б 4-В
Г. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $<L1/ML$
 2. $Co-Go$
 3. $Pg'-Go$
 4. $<A/N/B$ Характеристика
- А. Длина тела нижней челюсти
Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти
В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
Г. Длина ветви нижней челюсти
- А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Метод лучевой диагностики используемый для определения состояния пародонта зубов

- А. Ортопантомография;
Б. Внутриротовая рентгенография;
В. ТРГ-боковой проекции
Г. Томография ВНЧС.

Дистальное положение зуба - это смещение зуба

- А. Вперед по зубной дуге
Б. Назад по зубной дуге
В. В сторону неба
Г. В сторону щеки

Установите соответствие между аппаратом для функциональной диагностики и показателями Метод диагностики

1. Аксиограф
 2. Миотонометр
 3. Периотест
 4. Электромиограф Определяет
- А. Тонус мышц
Б. Биопотенциалы мышц
В. Движение суставной головки
Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между соотношением первых моляров по Энгля и состоянием окклюзии Соотношение первых моляров

1. 1-ый класс
 2. 2-ой класс I подкласс
 3. 2-ой класс II подкласс
 4. III класс Состояние окклюзии
- А. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается в поперечной фиссуре нижнего первого моляра
Б. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Протрузия резцов верхней челюсти
В. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Ретрузия резцов верхней челюсти
Г. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается позади поперечной фиссуры нижнего первого моляра
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Лицевая дуга позволяет

- А. Сдерживать рост верхней челюсти
Б. Перемещать вперед верхний зубной ряд и верхнюю челюсть
В. Стимулировать рост нижней челюсти
Г. Сдерживать рост обеих челюстей

II класс Энгля характеризуется смещением зубов

- А. Нижней челюсти назад
Б. Верхней челюсти назад
В. Нижней челюсти вперед
Г. Нижней челюсти латерально

Вестибулоклюзия относится к аномалиям окклюзии в направлении

- А. Сагиттальном
- Б. Вертикальном
- В. Трансверсальном
- Г. Сагиттальном и вертикальном

Мезиальное положение зуба - это смещение зуба

- А. Вперед по зубной дуге
- Б. Назад по зубной дуге
- В. В сторону неба
- Г. В сторону щеки

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle S/N/V$

2. $\angle L1/ML$

3. $\angle U1/NL$

4. $\angle S/N/A$ Характеристика

А. Положение апикального базиса верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

В. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти

Г. Положение апикального базиса нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

В. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Макродентия - это

- А. Уменьшение размеров зубов
- Б. Увеличение количества зубов
- В. Увеличение размеров зубов
- Г. Уменьшение количества зубов

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $\angle SNA$
 2. Зубоальвеолярное укорочение в области резцов на верхней и нижней челюстях
 3. Зубоальвеолярное укорочение в области боковых зубов на верхней и нижней челюстях
 4. Протрузия верхних резцов
- Окклюзия
- А. Вертикальная резцовая дизокклюзия
 - Б. Дистальная
 - В. Сагиттальная резцовая дизокклюзия
 - Г. Дизокклюзия
- А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Дуга энгля относится к аппаратам

- А. Комбинированного действия
- Б. Механического действия
- В. Функционального действия
- Г. Внеротовым

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle S/N/Pg$
 2. $A'-Snp$
 3. $\angle L1/ML$
 4. $\angle A/N/B$ Характеристика
- А. Длина апикального базиса верхней челюсти
Б. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа
В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Фиксирующие элементы в аппарате кламта

- А. Вестибулярная дуга
- Б. Рукообразные пружины
- В. Кламмер аддамса
- Г. Только вестибулярная дуга

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Пуговчатый кламмер
 2. Накусочная площадка
 3. Щечный щит
 4. Пелот
- Функция**
- А. Интрузия нижних резцов
 - Б. Фиксация аппарата
 - В. Отведение мышц щек от альвеолярного отростка
 - Г. Отведение губы и стимуляция роста апикального базиса
- А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Уменьшение $\angle$ SNB характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Глубокой резцовой
- Г. Физиологической

Прогнатия и ретрогнатия относятся к аномалиям

- А. Размера челюстей
- Б. Положения челюстей
- В. Формы челюстей
- Г. Положения и формы

Регулятор функции Френкеля III типа создает условия для роста

- А. Нижней челюсти
- Б. Верхней челюсти
- В. Обеих челюстей
- Г. Не влияет на рост

Увеличение $\angle$ SNA характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Глубокой резцовой
- Г. Физиологической

Уменьшение <SNPg характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Глубокой резцовой
- Г. Физиологической

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Активация

1. Винта и вестибулярной дуги в расширяющей пластинке

2. Петли для устранения диастемы

3. Протрагирующей пружины

4. Рукообразной пружины Функция

А. Расширяется и укорачивается

Б. Медиальное смещение центральных резцов

В. Отклоняет вестибулярно

Г. Нормализует положение отдельных групп зубов

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Формированию вертикальной резцовой дизокклюзии может способствовать тип роста

- А. Смешанный
- Б. Вертикальный
- В. Горизонтальный
- Г. Нейтральный

При нейтральном смыкании зубных рядов верхний постоянный клык расположен

- А. На уровне бугорка нижнего клыка
- Б. На уровне первого премоляра
- В. Между нижним клыком и первым премоляром
- Г. Между нижним клыком и латеральным резцом

На телерентгенограмме черепа в боковой проекции угол β показывает

- А. Положение базисов челюстей относительно друг друга с учетом вертикального компонента
- Б. Наклон базиса верхней челюсти к основанию черепа
- В. Положение базисов челюстей относительно друг друга без учета вертикального компонента
- Г. Наклон базиса нижней челюсти к основанию черепа

«Полнопазной» дугой в брекетах

0.022 паза является

- А. 021X0.025
- Б. 016X0.022
- В. 019X0.025
- Г. 017X0.025

Окклюзионные накладки в аппарате персина для лечения вертикальной резцовой дизокклюзии позволяют

- А. Сдерживать рост апикального базиса
- Б. Нормализовать зубоальвеолярные высоты в области жевательной группы зубов
- В. Нормализовать функцию глотания
- Г. Стимулировать рост апикального базиса

Съемные пластиночные аппараты с искусственными зубами назначаются детям при

- А. Раннем удалении временных зубов
- Б. Физиологической смене зубов
- В. Дистальной окклюзии
- Г. Инфантильном типе глотания

Вращение зуба вокруг своей продольной оси без эффекта перемещения в других направлениях называют

- А. Ангуляцией
- Б. Транспозицией
- В. Ротацией
- Г. Торком

С помощью вестибулярной пластинки хинца можно

- А. Устранить вредную привычку сосания пальца
- Б. Устранить расщелину
- В. Расширить верхний зубной ряд
- Г. Нормализовать окклюзию

К аномалиям прорезывания зубов относят

- А. Ретенцию
- Б. Макродентию
- В. Гиперодентию
- Г. Адентию

Какой точке на коронке зуба должна соответствовать срединная точка опорной площадки брекета в технике прямой дуги: точке пересечения вертикальной оси зуба с

- А. Горизонтальной линией, разделяющей коронку на две равные половины
- Б. Горизонтальной линией, соответствующей анатомической шейки зуба
- В. Линией экватора коронки
- Г. Линией режущего края коронки

Величину скелетного челюстного несоответствия определяет угол

- А. ANB
- Б. SNB
- В. SNA
- Г. Go

Угол snb на боковой трг обозначает

- А. Соотношение базисов верхней челюсти и нижней челюсти в сагиттальной плоскости
- Б. Наклон нижней челюсти к основанию черепа
- В. Положение верхней челюсти в сагиттальной плоскости относительно основания черепа
- Г. Положение нижней челюсти в сагиттальной плоскости относительно основания черепа

Принцип действия аппарата дерихсвайлера

- А. Функционально действующий
- Б. Комбинированный
- В. Функционально направляющий
- Г. Механический

Реография области височно – нижнечелюстного сустава позволяет определить

- А. Движение суставных головок нижней челюсти
- Б. Гемодинамическое состояние сосудов височно – нижнечелюстного сустава
- В. Выносливость тканей пародонта
- Г. Сократительную способность мышц челюстно-лицевой области

Элайнер позволяет

- А. Сдерживать рост апикального базиса
- Б. Нормализовать функцию
- В. Нормализовать положение отдельных зубов
- Г. Стимулировать рост апикального базиса

Конструкция эластопозиционера повторяет контуры

- А. Вестибулярной, небной, язычной поверхностей зубов и альвеолярных отростков
- Б. Только вестибулярной поверхности зубов и альвеолярных отростков
- В. Только небной и вестибулярной поверхностей зубов
- Г. Только язычной и вестибулярной поверхностей зубов

Обязательного лечения в период временного прикуса требует

- А. Глубокая окклюзия
- Б. Дистальная окклюзия
- В. Перекрёстный прикус со смещением нижней челюсти
- Г. Фронтальная дезокклюзия

Уменьшение угла наклона базиса нижней челюсти к основанию черепа говорит о

- А. Горизонтальном типе роста
- Б. Ротации нижней челюсти против часовой стрелки
- В. Ротации нижней челюсти по часовой стрелке
- Г. Вертикальном типе роста

Перемещение депульпированных зубов возможно

- А. Только в сагиттальной плоскости
- Б. Только в вертикальной плоскости
- В. Только в трансверзальной плоскости
- Г. В сагиттальной, трансверзальной, вертикальной плоскостях

Активатор функции френкеля 3 типа используется для лечения

- А. Дистальной окклюзии с протрузией верхних резцов
- Б. Мезиальной окклюзии
- В. Дистальной окклюзии с ретрузией верхних резцов
- Г. Вертикальной резцовой дизокклюзии

Активатор андрезена-гойпля действует в

- А. Сагиттальной плоскости
- Б. Вертикальной плоскости
- В. Трёх плоскостях
- Г. Двух плоскостях

Преддверие полости рта глубиной в 4 мм считается

- А. Аномальным
- Б. Мелким
- В. Средним
- Г. Глубоким

Для дистопии характерным является

- А. Задержка прорезывания зуба
- Б. Поворот зуба вокруг своей оси
- В. Неправильное положение зуба
- Г. Уменьшение коронки зуба

Для нормализации функции дыхания применяется

- А. Применение активатора Андресена - Гойпля
- Б. Пластика укороченной уздечки языка
- В. Миотерапия для круговой мышцы губ после санации носоглотки
- Г. Исправление аномалии прикуса

При лечении прогенического прикуса (мезиальное смещение нижней челюсти) первым действием является

- А. Пришлифовывание зубов
- Б. Нормализация функции языка и глотания
- В. Аппаратурное лечение аномалии
- Г. Устранение деформации окклюзионной поверхности зубных рядов

На трг головы (в боковой проекции) определение sna snb anb , положения резцов относительно pa и pb и s -линии по методу

- А. Fastlight
- Б. Персина
- В. McNamara
- Г. Steiner

К моменту рождения у ребёнка наблюдается младенческая

- А. Протрузия
- Б. Ретрузия
- В. Прогения
- Г. Ретрогения

Компьютерная оптическая топография используется для

- А. Исследования объема языка
- Б. Обследования ВНЧС
- В. Обследования осанки
- Г. Обследовании мышц челюстно-лицевой области

Протрагирующая пружина по виду воздействия является элементом

- А. Механическим
- Б. Функциональным
- В. Опорно-удерживающим
- Г. Ретенционным

Абсолютным противопоказанием для аппаратного ортодонтического лечения является

- А. Олигофрения
- Б. ДЦП спастическая форма
- В. Синдром Дауна
- Г. Шизофрения

Прокладывание языка между зубами приводит к _____ резцовой _____

- А. Мезиальной; окклюзии
- Б. Глубокой; окклюзии
- В. Вертикальной; дизокклюзии
- Г. Дистальной; окклюзии

Лицевую дугу относят к аппаратам

- А. Комбинированного типа действия
- Б. Ретенционным
- В. Функционального типа действия
- Г. Механического типа действия

У новорожденного нижняя челюсть в норме занимает _____ положение

- А. Варибельное
- Б. Нейтральное
- В. Дистальное
- Г. Мезиальное

На телерентгенограмме черепа в боковой проекции угол nsI/ml показывает наклон

- А. Базисов челюстей друг к другу
- Б. Базиса нижней челюсти к основанию черепа
- В. Базиса верхней челюсти к основанию черепа
- Г. Нижних резцов к плоскости основания черепа

Аппарат миотонометр позволяет определить

- А. Подвижность зубов
- Б. Сократительную способность мышц
- В. Тонус жевательных мышц
- Г. Движение суставной головки

Центральные временные резцы на нижней челюсти в норме прорезываются в _____ месяцев

- А. 3-6
- Б. 9-12
- В. 0-3
- Г. 6-8

Окончательный диагноз устанавливается

- А. После сбора анамнеза
- Б. После анализа данных клинических и лабораторных исследований
- В. На основании симптоматического диагноза и эстетических нарушений
- Г. На основании клинических данных

Макродентия является аномалией _____ зубов

- А. Формы
- Б. Размера
- В. Количества
- Г. Структуры

Увеличение угла snv говорит о _____ челюсти

- А. Прогнатии верхней
- Б. Ретрогнатии верхней
- В. Прогнатии нижней
- Г. Ретрогнатии нижней

Соотношение первых моляров по 1 классу энгла соответствует окклюзии в боковом отделе

- А. Мезиальной
- Б. Дистальной
- В. Перекрестной
- Г. Физиологической

Дистальная окклюзия относится к аномалиям окклюзии в _____ плоскости

- А. Трансверзальной
- Б. Аксиальной
- В. Вертикальной
- Г. Сагиттальной

К показанию к удалению первых премоляров верхнего зубного ряда относят

- А. Мезиальную окклюзию
- Б. Макродентию верхних зубов, микродентию нижних зубов
- В. Дистальную окклюзию с дистопией, ретенцией верхних клыков
- Г. Дистальную окклюзию с глубокой резцовой окклюзией

В результате силового воздействия ортодонтического аппарата на стороне давления периодонтальная щель

- А. Расширяется
- Б. Сужается
- В. Не изменяется
- Г. Перемещается

Вестибулоокклюзия – это положение боковых зубов

- А. Лингвальное
- Б. Нёбное
- В. Язычное
- Г. Щечное

Полную морфологическую высоту лица измеряют между точками

- А. Or-Or
- Б. Zy-zy
- В. Go-go
- Г. N-gn

Для дистализации моляров верхней челюсти используют

- А. Лицевую маску
- Б. Лицевую дугу
- В. Аппарат Quad Helix
- Г. Аппарат Nance

Под инклинацией коронки зуба следует понимать

- А. Наклон ее продольной оси в мезиодистальном направлении
- Б. Наклон ее продольной оси в вестибулооральном направлении
- В. Интрузию коронки
- Г. Экструзию коронки

К аппаратам механического действия относится

- А. Брекет-система
- Б. Трейнер
- В. Каппа Шварца
- Г. Накусочная пластинка Катца

Самая распространенная нозологическая форма зубочелюстных аномалий

- А. Мезиальная окклюзия
- Б. Дистальная окклюзия
- В. Палатоокклюзия
- Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия

При открывании рта суставные головки нижней челюсти сдвигаются в сторону _____ суставного бугорка

- А. На середине
- Б. У основания
- В. В нижней трети
- Г. К вершине

По способу фиксации аппарат френкеля

- А. Частично несъемный
- Б. Сочетанный
- В. Съемный
- Г. Несъемный

У пациентов с микросомией в период сформированного прикуса постоянных зубов нормализация окклюзии возможна только в результате _____ лечения

- А. Терапевтического
- Б. Ортодонтического
- В. Комбинированного
- Г. Протетического

Аппарат pendulum предназначен для

- А. Дистализации моляров
- Б. Протракции фронтальной группы зубов
- В. Стабилизации положения моляров
- Г. Мезиализации моляров

Угол spa показывает

- А. Положение базиса верхней челюсти относительно основания черепа
- Б. Положение базиса нижней челюсти относительно основания черепа
- В. Положение базисов челюстей относительно друг друга
- Г. Наклон базиса верхней челюсти к основанию черепа

Щечным положением зуба называют

- А. Инфраположение
- Б. Супраположение
- В. Оральное
- Г. Вестибулярное

Главными элементами конструкции аппарата twin block являются

- А. Расширяющие винты
- Б. Щечные щиты
- В. Блоки с наклонными плоскостями
- Г. Подъязычные пелоты

Под установкой ортодонтического винта в зону izc понимают установку винта в

- А. Апикальный базис нижней челюсти
- Б. Ретромолярную область
- В. Апикальный базис верхней челюсти
- Г. Подскуловой гребень

В норме форму параболы имеет зубной ряд _____ прикусе

- А. Нижний во временном
- Б. Верхний во временном
- В. Верхний в постоянном
- Г. Нижний в постоянном

На трг головы в боковой проекции по методу jarabak определяются параметры

- А. SNA; SNB; ANB
- Б. ArGoMe; NGoAr; NGoMe
- В. NSAr; SArGo; ArGoMe
- Г. N-Ba\\PtV-Gn; NSGn; SGn\\FH

На трг головы (в боковой проекции) определение инклинации резцов относительно nl , ml , оср в зависимости от nl/ml по методу

- А. Fastlight
- Б. Steiner
- В. Персина
- Г. McNamara

Укороченная уздечка языка является причиной

- А. Задержки прорезывания постоянных зубов
- Б. Лингвоокклюзии
- В. Уплотнения переднего участка нижнего зубного ряда
- Г. Сужения верхнего зубного ряда

При лечении вертикальной резцовой дизоокклюзии в сменном прикусе необходимо ввести в конструкцию съемного аппарата

- А. Заслонку для языка
- Б. Губной пелот
- В. Накусочную площадку в переднем сегменте
- Г. Внеротовую тягу

Прогнатией называется аномалия _____ челюсти

- А. Формы
- Б. Симметричности
- В. Размера
- Г. Положения

При сочетанной патологии правильной последовательностью формулировки диагноза считают

- А. Ортодонтический, стоматологический диагнозы с перечислением заболеваний других органов и систем
- Б. Ортодонтический, симптоматический диагнозы и характеристика других заболеваний пациента
- В. Топо-морфометрический диагноз с перечислением заболеваний других органов и систем пациента
- Г. Перечисление функциональных и эстетических нарушений пациента

Привычка сосания большого пальца может привести к

- А. Протрузии нижних резцов
- Б. Ретрузии верхних резцов
- В. Мезиальной окклюзии
- Г. Протрузии верхних резцов

Асимметричное сужение верхней челюсти относится к аномалии

- А. Зубных рядов по трансверсали
- Б. Позиции челюстей относительно друг друга
- В. Зубных рядов по вертикали
- Г. Размеров челюстей

На трг головы (в боковой проекции) референтная линия, проходящая через точки me и go

- А. NSL
- Б. NL
- В. ML
- Г. OccL

Вестибулярную дугу с м-образным изгибом применяют при

- А. Сужении верхнего зубного ряда
- Б. Небном положении клыка
- В. Вестибулярном положении клыка
- Г. Большом количестве трем

Верхняя губа относительно эстетической плоскости рикетса в норме должна располагаться

- А. На плоскости
- Б. На 2-4 мм кпереди
- В. На 2-4 мм кзади
- Г. Пересекать плоскость

По месту расположения аппарат норда является

- А. Комбинированным
- Б. Внутриротовым
- В. Внеротовым
- Г. Лицевым

На цифровых моделях зубных рядов возможно определение антропометрических показателей

- А. Индексов Тонна, Болтона
- Б. Ширины и длины зубных рядов
- В. Всех существующих
- Г. Ширины и длины апикальных базисов

Рукообразная пружина является элементом

- А. Функциональным
- Б. Направляющим
- В. Фиксирующим
- Г. Механическим

При ретракции клыков на верхней челюсти прогресс регистрируется измерением расстояния

- А. Между клыком и латеральным резцом
- Б. От межрезцовой точки до вершины рвущего бугра клыка
- В. Между вершинами рвущих бугров клыков
- Г. Между наивысшей точкой щечной фиссуры первого моляра и вершиной рвущего бугра клыка

Рентгенографию кистей рук делают для

- А. Изучения динамики роста организма
- Б. Выяснения аномалий развития скелета
- В. Прогноза роста челюстей
- Г. Уточнения сроков окостенения

К длительному сохранению инфантильного типа глотания приводит использование

- А. Слишком жесткой соски для кормления
- Б. Грудного вскармливания
- В. Соски с большим отверстием для кормления
- Г. Укороченной соски для кормления

Для определения симметрии нижней челюсти необходимо сделать рентгеновский снимок

- А. ТРГ в боковой проекции
- Б. ТРГ в прямой проекции
- В. Зонографию ВНЧС
- Г. ОПТГ

Тактикой врача при ранней потере моляров на одной из челюстей при временном нейтральном прикусе является

- А. Рентгенобследование и массаж десны
- Б. Наблюдение
- В. Удаление зубов на противоположной челюсти
- Г. Изготовление съёмного протеза

К аномалиям окклюзии зубных рядов в боковом отделе относится

- А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия
- Б. Палатиноокклюзия
- В. Обратная резцовая окклюзия
- Г. Передняя перекрёстная дизокклюзия

Зубные ряды во временном прикусе имеют форму

- А. Параболы
- Б. Полукруга
- В. Полуэллипса
- Г. Трапеции

При «инфантильном» типе глотания формируется

- А. Мезиальная окклюзия
- Б. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- В. Глубокая резцовая дизокклюзия
- Г. Глубокая резцовая окклюзия

На трг головы (в боковой проекции) параметр, характеризующий нижнюю про- и ретрогнатию

- А. SNPog
- Б. SNA
- В. SNB
- Г. Se-N

На трг головы в боковой проекции значение угла $\alpha\text{nb}=8$ градусов свидетельствует о

- А. III скелетном классе
- Б. I скелетном классе
- В. Протрузии верхних резцов
- Г. II скелетном классе

Аппарат шварца относится к

- А. Комбинированным
- Б. Профилактическим
- В. Ретенционным
- Г. Лечебным

Сагиттальная резцовая дизокклюзия чаще всего сочетается с

- А. Мезиальной окклюзией
- Б. Дистальной окклюзией
- В. Сменным прикусом
- Г. Физиологической окклюзией зубных рядов

При мезиальной окклюзии на трг в боковой проекции угол αnb

- А. Не изменяется
- Б. Увеличивается
- В. Становится резко положительным
- Г. Уменьшается

Нижняя макрогнатия чаще сочетается с аномалией положения резцов

- А. Протрузией верхних и ретрузией нижних резцов
- Б. Протрузией верхних и нижних резцов
- В. Ретрузией верхних и протрузией нижних резцов
- Г. Положение резцов вариабельно

Для коррекции небного положения бокового резца в период смены зубов используется пластинка с

- А. Окклюзионными накладками
- Б. Протрагирующей пружиной
- В. Заслонкой для языка
- Г. Вестибулярной дугой

Измерение длины головы проводят по точкам

- А. Zy-zy
- Б. Go-go
- В. Or-Or
- Г. Gl-op

Сагитальная щель может быть обусловлена _____ челюсти

- А. Протрузией резцов верхней; ретрузией резцов нижней
- Б. Протрузией резцов нижней; ретрузией резцов верхней
- В. Ретрузией резцов верхней и нижней
- Г. Протрузией резцов верхней и нижней

Глубокая резцовая дизокклюзия – это аномалия окклюзии в _____ плоскости

- А. Окклюзионной
- Б. Сагитальной
- В. Трансверсальной
- Г. Вертикальной

Для ускоренного раскрытия срединного небного шва применяют

- А. Аппарат Энгля
- Б. Аппарат Айнсворта
- В. Аппарат Дерихсвайлера с винтом Бидермана
- Г. Мультибондинг-систему

Передняя точка подбородка обозначается

- А. Go
- Б. Ar
- В. Pg
- Г. Me

Угол i-nl на боковой трг обозначает

- А. Межчелюстной угол
- Б. Наклон верхних резцов к плоскости верхней челюсти
- В. Гониальный угол
- Г. Межрезцовый угол

Жевательная проба с.е. Гельмана показывает

- А. Степень измельчения 0,8 г ореха после пережевывания до появления глотательного рефлекса
- Б. Время разжевывания пищи
- В. Степень измельчения 5 г миндаля после жевания в течение 50 сек
- Г. Время, необходимое для совершения 50 жевательных движений

Позиционер необходим для установки брекетов по

- А. Ангуляции
- Б. Высоте
- В. Торку
- Г. Ротации

Точка n на трг - это

- А. Передне-верхний край носолобного шва
- Б. Передняя носовая ость
- В. Срединная точка на уровне входа в турецкое седло
- Г. Верхняя точка наружного слухового прохода

По классификации энгля дистальный блокирующий прикус относится к _____ классу

- А. II; 1 подклассу
- Б. III
- В. II; 2 подклассу
- Г. I

Латеральным положением центральных резцов называют

- А. Интрузию
- Б. Экструзию
- В. Тремы
- Г. Диастему

Мышцей, влияющей на формирования передне-медиальной дислокации суставного диска внчс, называют

- А. Височную
- Б. Латеральную крыловидную
- В. Медиальную крыловидную
- Г. Жевательную

Период подготовки к смене зубов у детей проходит в возрасте от ____ до (в годах)

- А. 3; 4
- Б. 5; 8
- В. 4: 6
- Г. 3; 9

Клиническую пробу эшлера-битнера применяют для уточнения этиологии

- А. Трансверсальной резцовой дизокклюзии
- Б. Мезиальной окклюзии
- В. Вертикальной резцовой дизокклюзии
- Г. Дистальной окклюзии

При отсутствии одного зуба в боковом отделе нижней челюсти у детей показано изготовление

- А. Малого седловидного протеза
- Б. Коронки с распоркой
- В. Частичного съемного протеза
- Г. Консольного протеза

Под интрузией понимают перемещение зуба

- А. В направлении к окклюзионной плоскости
- Б. Вестибулярно
- В. В направлении к апексу
- Г. Дистально

Типичное положение нижней челюсти новорожденного называется младенческой

- А. Прогнатией
- Б. Микрогнатией
- В. Ретрогенией
- Г. Прогенией

Клинической картине подвывиха суставного диска соответствует

- А. Невозможность закрыть рот
- Б. Щелчок при открывании рта
- В. Увеличение амплитуды движения нижней челюсти
- Г. Ограничение открывания рта

Длина тела нижней челюсти по шварцу при ее нормальном развитии равна длине основания передней черепной ямки плюс (в мм)

- А. 4
- Б. 5
- В. 2
- Г. 3

В норме индекс тона равен

- А. 2,15
- Б. 1,33
- В. 2
- Г. 1

Памятью формы обладают дуги

- А. Стальные
- Б. Титан-молибденовые
- В. Хром-кобальтовые
- Г. Никель-титановые

Палатиноокклюзия – это положение боковых зубов

- А. Щечное
- Б. Нёбное
- В. Вестибулярное
- Г. Лингвальное

При проведении компьютерной оптической топографии используют

- А. Световой поток
- Б. Электроды
- В. Рентгеновские лучи
- Г. Магниты

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Уменьшение <SNA**
 - 2. Зубоальвеолярное укорочение в области боковых зубов**
 - 3. Зубоальвеолярное укорочение в области передних зубов**
 - 4. Уменьшение <U1/NL Окклюзия**
- А. Мезиальная**
Б. Глубокая резцовая окклюзия II класс II подкласс
В. Глубокая резцовая окклюзия
Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- А. 1-Г 2-А 3-Б 4-В
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

К вертикальной резцовой дизокклюзии приводит

- А. Грудное вскармливание
Б. Использование короткой соски;
В. Длительное использование соски
Г. Не использование соски

Точка Со расположена на

- А. Переднем контуре апикального базиса верхней челюсти
Б. Переднем контуре апикального базиса нижней челюсти
В. Заднем контуре суставной головки нижней челюсти
Г. Вершине суставной головки нижней челюсти

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Антропометрические параметры гипсовых моделей зубных рядов

- 1. Измерение медиолатеральных размеров резцов верхнего и нижнего зубного ряда и определение соотношения их сумм**
 - 2. Определение по таблице ширины зубных рядов в области премоляров и моляров**
 - 3. Определение ширины апикального базиса челюстей**
 - 4. Определение длины переднего участка верхнего зубного ряда Метод антропометрической диагностики**
- А. Определение индекса Тонна**
Б. Метод Пона
В. Метод Коркхауза
Г. Метод Хауса
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
В. 1-В 2-Б 3-А 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Точка А является:

- А. Наиболее глубокой точкой на переднем контуре апикального базиса верхней челюсти;
- Б. Наиболее глубокой точкой на переднем контуре апикального базиса нижней челюсти;
- В. Передней точкой носолобного шва;
- Г. Центром турецкого седла.

Рукообразные пружины перемещают зубы в направлении

- А. Оральном
- Б. Вестибулярном
- В. Вертикальном
- Г. Мезио-дистальном

Пластика уздечки нижней губы показана при:

- А. Сужении зубных рядов;
- Б. Диастеме 31 и 41;
- В. Ретракции десны на 1.1 и 2.1;
- Г. Нижней ретрогнатии.

К наследственным зубочелюстным аномалиям относятся:

- А. Вторичные частичные адентии;
- Б. Первичные адентии, макродениты;
- В. Вторичная полная адентия;
- Г. Травма зуба.

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Обратное соотношение резцов верхней и нижней челюстей
- 2. Смещение косметического центра вправо
- 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля
- 4. Увеличение зубоальвеолярной высоты в переднем отделе Окклюзия

- А. Мезиальная
- Б. Трансверсальная
- В. Глубокая резцовая
- Г. Обратная резцовая

- А. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
- Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
- В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
- Г. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Вредная привычка прокладывания языка между зубами приводит к:

- А. Расширению верхнего зубного ряда;
- Б. Неполному прорезыванию передних зубов;
- В. Сужению нижнего зубного ряда;
- Г. Перекрестной окклюзии.

Пластика на верхнюю челюсть с винтом и срединным распилом применяется для

- А. Равномерного расширения верхнего зубного ряда
- Б. Удлинения фронтального участка нижнего зубного ряда
- В. Одностороннего расширения верхнего зубного ряда
- Г. Раскрытия срединного небного шва

Функциональное состояние мышц челюстно-лицевой области определяют методом

- А. Электромиографии, электромиотонометрии
- Б. Реопарадентографии
- В. Артрофонографии
- Г. Аксиографии

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля
- 2. Смещение косметического центра вправо
- 3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля
- 4. Протрузия верхних резцов и ретрузия нижних Оклюзия
- А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия
- Б. Дистальная , глубокая окклюзия
- В. Мезиальная окклюзия
- Г. Трансверсальная резцовая
- А. 1-А 2-Г 3-Б 4-В
- Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
- В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
- Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Резцовое перекрытие составляет более 1/3
2. Обратное перекрытие в области резцов верхней и нижней челюстей, смещение косметического центра
3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля
4. Уменьшение длины тела нижней челюсти Окклюзия

А. Мезиальная

Б. Дистальная

В. Глубокая резцовая

Г. Обратная, трансверсальная резцовая

А. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Б. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Аппарат Персина

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
2. Окклюзионные накладки
3. Нижний губной пелот
4. Заслонка для языка Окклюзия

А. Протрузия верхних резцов

Б. Мезиальная

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Дистальная

А. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Б. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Угловой параметр <U1-NL характеризует

- А. Наклон резцов верхней челюсти
- Б. Наклон резцов нижней челюсти
- В. Положение апикального базиса верхней челюсти
- Г. Положение апикального базиса нижней челюсти

При смещении н/ч вперед зона натяжения возникает

- А. В переднем отделе внчс
- Б. В заднем отделе внчс
- В. В верхнем отделе внчс
- Г. Во всех отделах внчс

Упражнения для мышц выдвигающих нижнюю челюсть, рекомендуются при:

- А. Сужении зубных рядов;
- Б. Недоразвитии нижней челюсти;
- В. Мезиальной окклюзии;
- Г. Верхней ретрогнатии.

Точка угла нижней челюсти обозначается

- А. Со
- Б. Ar
- В. Go
- Г. Ро

Функциональное состояние мышц челюстно-лицевой области определяют методом:

- А. Электромиографии, электромиотонометрии;
- Б. Реопарадентографии;
- В. Артрофонографии;
- Г. Аксиографии.

Головная шапочка с подбородочной пращей позволяет

- А. Сдерживать рост нижней челюсти
- Б. Перемещать вперед верхний зубной ряд и верхнюю челюсть
- В. Стимулировать рост нижней челюсти
- Г. Сдерживать рост обеих челюстей

Уменьшение $\angle$ SNB характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Глубокой резцовой
- Г. Физиологической

Аппарат Андресена-Гойпля с винтом относится к аппаратам:

- А. Функциональным;
- Б. Механическим;
- В. Комбинированным;
- Г. Капповым.

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

- 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена небно**
- 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно**
- 3. Косметический центр смещен влево**
- 4. Подбородок смещен влево**

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Перекрестная

Г. Трансверсальная резцовая

А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Увеличение $\angle$ SNB**
- 2. Зубоальвеолярное укорочение в области передних зубов**
- 3. Одностороннее сужение верхнего зубного ряда**
- 4. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля**

А. Мезиальная

Б. Дистальная

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Трансверсальная резцовая

А. 1-А,2-В,3-Г,4-Б

Б. 1-Б,2-А,3-В,4-Г

В. 1-В,2-Б,3-Г,4-А

Г. 1-В,2-Г,3-А,4-Б

Этап прорезывание 36 и 46 соответствует возрасту

А. 3 года

Б. 6 лет

В. 8 лет

Г. 1лет

Этап прорезывания 13 и 23 соответствует возрасту:

А. 3 года;

Б. 5 лет;

В. 8 лет;

Г. 12 лет.

Дуга Энгля относится к аппаратам

- А. Комбинированного действия
- Б. Механического действия
- В. Функционального действия
- Г. Внеротовым

С целью измерения длины тела нижней челюсти используют:

- А. Ортопантограмму;
- Б. ТРГ - прямая проекция;
- В. ТРГ - боковая проекция;
- Г. Томографию ВНЧС.

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Расстояния в области fossa canina на уровне вершук корней первых премоляров верхней челюсти

2. Определение соотношения сумм медиолатеральных размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов

3. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров

4. Соотношения сумм размеров резцов верхнего и нижнего зубных рядов Метод антропометрической диагностики

А. Ширина апикального базиса верхней челюсти

Б. Индекс Болтона (1,08)

В. Индекс Тонна

Г. Метод Коркхауза

А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Губной бампер не используют для

- А. Расширения нижнего зубного ряда
- Б. Дистализации первых нижних моляров
- В. Уплощения переднего отрезка верхнего зубного ряда
- Г. Удлинения переднего отрезка нижнего зубного ряда

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Протрузия резцов верхней и нижней челюстей**
- 2. Отсутствие режуще-бугорковых контактов в переднем отделе**
- 3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля**
- 4. Уменьшение длины тела верхней челюсти Окклюзия**

А. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Б. Дистальная

В. Мезиальная окклюзия

Г. Бипротрузия

А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Б. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Точка Go является:

А. Вершиной суставной головки;

Б. Передней точкой апикального базиса нижней челюсти;

В. Точкой пересечения касательных к ветви и телу нижней челюсти;

Г. Передней точкой подбородочного выступа.

Установите соответствие между клинической ситуацией и состоянием окклюзии

Клиническая ситуация

- 1. Протрузия резцов верхней челюсти**
- 2. Перекрытие в переднем отделе более 1/3 коронки**
- 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля**
- 4. Смещение косметического центра Окклюзия**

А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия

Б. Мезиальная

В. Глубокая резцовая

Г. Трансверсальная резцовая окклюзия

А. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $A'-Snr$
 2. Увеличение $Pg'-Go$
 3. Увеличение $<U1/NL$ (наружный)
 4. Уменьшение $<L1/ML$ (внутренний) Окклюзия
- А. Ретрузия нижних резцов
Б. Дистальная
В. Ретрузия верхних резцов
Г. Мезиальная
- А. 1-Б 2-Г 3-В 4-А
Б. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Губные пелоты способствуют

- А. Росту апикального базиса челюсти
Б. Сдерживанию роста апикального базиса челюсти
В. Устранению протрузии резцов
Г. Фиксации аппарата в полости рта

Графический метод Хаулея-Гербера-Гербста применяют для определения нарушений

- А. Длины верхней или нижней челюстей
Б. Формы челюстных костей
В. Положения зубов и формы зубных рядов
Г. Положения зубов в вертикальном направлении

Регулятор функции Френкеля I Типа позволяет:

- А. Удлинить верхний зубной ряд;
Б. Укорачивать нижний зубной ряд;
В. Удлинять оба зубных ряда;
Г. Выдвигать нижнюю челюсть

Регулятор функций Френкеля

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов нижней челюсти**
 - 2. Без окклюзионных накладок**
 - 3. Пелот для отведения верхней губы**
 - 4. Щечные щиты Окклюзия**
- А. Дистальная и мезиальная**
Б. Мезиальная
В. Протрузия резцов
Г. Дистальная
- А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
Б. 1-Б 2-В 3-Г 4-А
В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

- 1. Измерение мезиодистальных размеров резцов верхнего зубного ряда и определение ширины зубного ряда в области моляров**
 - 2. Измерение расстояния от резцов до линии проходящей через измерительные точки на премолярах**
 - 3. Определение соотношения сумм размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов**
 - 4. Измерение длины апикального базиса Метод антропометрической диагностики**
- А. Определение индекса Болтона (1,08)**
Б. Метод Пона
В. Метод Коркхауса
Г. Метод Хауса
- А. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
Г. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии состоянием окклюзии

Открытый активатор Кламмта

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти**
 - 2. Без окклюзионных накладок**
 - 3. Пелот для отведения нижней губы**
 - 4. Пелот для отведения верхней губы Окклюзия**
- А. Мезиальная**
Б. Глубокая резцовая
В. Недоразвитие апикального базиса нижней челюсти
Г. Протрузия верхних резцов
- А. 1-Б 2-В 3-Г 4-А
Б. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Точка Pg соответствует:

- А. Передней точке на нижнем контуре тела нижней челюсти;
- Б. Нижней точке на нижнем контуре тела нижней челюсти;
- В. Точке пересечения касательных к ветви и телу нижней челюсти;
- Г. Передней точке подбородочного выступа.

По назначению аппарат Андресена-Гойпля

- А. Лечебный
- Б. Профилактический
- В. Ретенционный
- Г. Комбинированный

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Уменьшение параметра Co-Go
 - 2. Зубоальвеолярное укорочение в области резцов верхней челюсти
 - 3. Уменьшение параметра A'-Snpr
 - 4. Уменьшение $\angle$ SNB и уменьшение наружного $\angle$ U1/NL
- Окклюзия**
- А. Вертикальная резцовая дизокклюзия
 - Б. Дистальная
 - В. Мезиальная
 - Г. Дистальная, глубокая окклюзия II класс I подкласс
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
 - Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
 - В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
 - Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Этап прорезывание 14и 24 соответствует возрасту

- А. 3 года
- Б. 5 лет
- В. 8 лет
- Г. 10 лет

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Аппарат Андресена-Гойпля

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти**
- 2. С окклюзионными накладками**
- 3. Пелот для отведения нижней губы**
- 4. Сагиттальный распил. Установлен расширяющий винт**

А. Протрузия резцов

Б. Недоразвитие апикального базиса нижней челюсти

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Сужение зубных рядов

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Этап прорезывания 12 и 22 соответствует возрасту:

А. 3 года;

Б. 5 лет;

В. 8 лет;

Г. 11 лет.

Увеличение <SNP_g характерно для окклюзии

А. Дистальной

Б. Мезиальной

В. Глубокой резцовой

Г. Физиологической

Передняя точка носовой ости

А. Co

Б. Snp

В. Go

Г. Sna

Этап прорезывания 33 и 43 соответствует возрасту

А. 7 года

Б. 5 лет

В. 8 лет

Г. 11 лет

Измерительные точки Пона на 14 и 24:

- А. Середина межбугорковой фиссуры;
- Б. Вершина щечного бугорка;
- В. Дистальная точка ската щечного бугорка;
- Г. Мезиальная точка ската щечного бугорка.

Плоскость основания верхней челюсти обозначается

- А. N-S
- Б. ML;
- В. NL;
- Г. FH.

Щечные бугорки нижних боковых зубов в норме контактируют

- А. С небными бугорками верхних
- Б. С продольными фиссурами верхних
- В. Со щечными бугорками верхних
- Г. Вестибулярными поверхностями верхних

Измерительные точки Пона на 34 и 44:

- А. Середина межбугорковой фиссуры;
- Б. Вершина щечного бугорка;
- В. Дистальная точка ската щечного бугорка;
- Г. Мезиальная точка ската щечного бугорка.

По месту расположения аппарат Норда

- А. Внеротовой
- Б. Внутриротовой, одночелюстной
- В. Комбинированный
- Г. Одночелюстной

Вредная привычка сосания пальца причина

- А. Вертикальной резцовой дизокклюзии
- Б. Прямой резцовой окклюзии
- В. Глубокой резцовой окклюзии
- Г. Глубокой резцовой дизокклюзии

К ретенционным аппаратам относятся аппараты для

- А. Предупреждения развития аномалий
- Б. Расширения зубного ряда
- В. Закрепления достигнутых результатов лечения
- Г. Лечения аномалий зубных рядов

Латеральное положение центральных резцов приводит к

- А. Тремам
- Б. Диастеме
- В. Тортоаномалии
- Г. Транспозиции

Уменьшение <SNP_g характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Глубокой резцовой
- Г. Физиологической

Упражнения с роторасширителем необходимо выполнять в следующем режиме

- А. Статическом и динамическом
- Б. Статическом
- В. Динамическом
- Г. Быстром

Лечебные аппараты используются для:

- А. Устранения вредных привычек;
- Б. Нормализации носового дыхания;
- В. Исправления положения зубов, формы и размера зубного ряда и нормализации соотношения зубных рядов;
- Г. Ретенции результатов ортодонтического лечения.

О симметричности развития правой и левой половины нижней челюсти позволяют судить

- А. Панорамная рентгенограмма
- Б. Трг - боковая проекция
- В. Трг - прямая проекция и Клт
- Г. Ортопантограмма и томография внчс

Этап прорезывания 32 и 42 соответствует возрасту:

- А. 8 года;
- Б. 5 лет;
- В. 9 лет;
- Г. 11 лет.

При аномалиях окклюзии необходимо провести

- А. Клиническое обследование
- Б. Антропометрические измерения гипсовых моделей челюстей, внешний осмотр
- В. Клиническое обследование и специальные методы диагностики
- Г. Осмотр полости рта и рентгенологические методы

При "инфантильном" типе глотания положение кончика языка

- А. на вестибулярной поверхности верхних резцов
- Б. на дне полости рта
- В. между верхними и нижними резцами
- Г. на небе

Передняя костная точка подбородочного отдела точка обозначается

- А. Pg
- Б. Me
- В. Ar
- Г. Go

Пропорциональность мезиодистальных размеров коронок постоянных резцов определяют по

- А. Индексу Пона;
- Б. Методу Коркхауза;
- В. Индексу Тона;
- Г. Методу Нансе.

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Уменьшение <SNB**
 - 2. Зубоальвеолярное укорочение в области передних зубов**
 - 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля**
 - 4. Зубоальвеолярное удлинение в области передних зубов Окклюзия**
- А. Мезиальная**
Б. Дистальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Глубокая резцовая
- А. 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А
Б. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г
В. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г
Г. 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А

Метод лучевой диагностики используемый для определения состояния пародонта зубов

- А. Ортопантомография;
Б. Внутриротовая рентгенография;
В. ТРГ-боковой проекции
Г. Томография ВНЧС.

Удаление временных зубов по методу Хотца показано

- А. При несоответствии размеров зубов и челюстей
Б. При наличии сверхкомплектных зубов
В. Адентии
Г. Ретенции зубов

Вид эластичной тяги при лечении мезиальной окклюзии

- А. Межчелюстная по II классу
Б. Одночелюстная
В. Межчелюстная по III классу
Г. Вертикальная

Передний щечный бугорок 16 зуба в норме контактирует с

- А. Задним щечным бугорком 46
Б. Межбугорковой фиссурой 46
В. Контактной точкой между 45 и 46
Г. Передней ямкой продольной фиссуры 46

Аппарат Брюкля предназначен для нормализации окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Меziальной
- В. Вертикальной дизокклюзии
- Г. Лингвоокклюзии

Уменьшение параметра A'-SNP характерно для окклюзии:

- А. Дистальной;
- Б. Меziальной;
- В. Перекрестной;
- Г. Физиологической.

Точка центра турецкого седла

- А. S
- Б. Po
- В. Pt
- Г. Ba

Этап прорезывания 33 и 43 соответствует возрасту:

- А. 3 года;
- Б. 5 лет;
- В. 10 лет;
- Г. 12 лет.

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $\angle$ SNB
2. Увеличение $\angle$ SNA
3. Зубоальвеолярное укорочение в области резцов верхнего зубного ряда
4. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов верхнего зубного ряда

- А. Меziальная
- Б. Дистальная
- В. Глубокая резцовая окклюзия
- Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия

- А. 1-Б 2-В 3-Г 4-А
- Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
- В. 1-Г 2-А 3-Б 4-В
- Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Положение языка между зубами проводит к

- А. Мезиальной окклюзии
- Б. Глубокой резцовой окклюзии
- В. Дистальной окклюзии
- Г. Вертикальной резцовой дизокклюзии

К моменту рождения в норме нижняя челюсть

- А. Меньше верхней
- Б. Больше верхней на мм
- В. Равна верхней
- Г. Больше верхней на 5 мм

Увеличение <LI- ML характерно для

- А. Протрузии резцов верхней челюсти
- Б. Ретрузии резцов верхней челюсти
- В. Протрузии резцов нижней челюсти
- Г. Ретрузии резцов нижней челюсти

Аппарат Норда используется для

- А. Удлинения верхнего зубного ряда
- Б. Ротации первых верхних моляров
- В. Раскрытия небного шва
- Г. Расширения верхнего зубного ряда только в переднем отделе

Лингвоокклюзия - это смещение

- А. Верхних боковых зубов орально
- Б. Нижних боковых зубов орально
- В. Верхних боковых зубов щечно
- Г. Нижних передних зубов вестибулярно

Гиперодонтия возникает при

- А. Наличии сверхкомплектных зубов
- Б. Отсутствии зачатков зубов
- В. Ретенции зубов
- Г. Увеличении размеров зубов

Показанием к протезированию у детей является

- А. Нарушение окклюзии
- Б. Аномалии формы временных зубов
- В. Ранняя потеря молочных зубов
- Г. Нарушение формы зубных рядов

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

- 1. Сагиттальный распил, расширяющий винт
 - 2. Секторальный распил в области первого моляра
 - 3. Секторальный распил во фронтальной области
 - 4. Петля для устранения диастемы
- Клиническая ситуация**

- А. Сужение зубного ряда
- Б. Уплотнение переднего участка
- В. Латеральное смещение центральных резцов
- Г. Мезиальное смещение моляров

- А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
- Б. 1-А 2-Г 3-Б 4-В
- В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
- Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Коронка с распоркой на зуб 16 предназначена для

- А. Сохранения места 15
- Б. Мезиализации 16
- В. Дистализации 16
- Г. Ротации 16

Этап прорезывание 13и 23 соответствует возрасту

- А. 3 года
- Б. 5 лет
- В. 8 лет
- Г. 12лет

Для механически действующего аппарата характерно наличие

- А. Накусочной площадки
- Б. Винта, лигатуры, пружины, дуги, резинового кольца
- В. Наклонной плоскости
- Г. Щита

Увеличение <SNB характерно для окклюзии:

- А. Дистальной;
- Б. Мезиальной;
- В. Глубокой резцовой;
- Г. Физиологической.

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии состоянием окклюзии

Открытый активатор Кламмта

1. Пелот для отведения верхней губы
2. Окклюзионные накладки
3. Пелот для отведения нижней губы
4. Вестибулярная дуга в области верхних резцов

- Окклюзия**
- А. Дистальная
 - Б. Мезиальная
 - В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
 - Г. Сагиттальная щель. Протрузия резцов на верхней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Короткая уздечка языка может привести к:

- А. Укорочению верхнего зубного ряда;
- Б. Укорочению нижнего зубного ряда;
- В. Расширению верхнего зубного ряда;
- Г. Сужению верхнего зубного ряда.

Вестибулоокклюзия относится к аномалиям окклюзии в направлении

- А. Сагиттальном
- Б. Вертикальном
- В. Трансверсальном
- Г. Сагиттальном и вертикальном

Увеличение <SNB характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Глубокой резцовой
- Г. Физиологической

Внеротовая резиновая тяга используется для

- А. Тренировки мышц
- Б. Введения дополнительного элемента аппарата лицевая дуга, подбородочная праща
- В. Нормализации дыхания
- Г. Устранения вредных привычек

Условия для нарушения носового дыхания создаются при

- А. Хроническом гастрите
- Б. Пиелонефрите
- В. Бронхиальной астме, хронических бронхитах
- Г. Нарушении осанки

Резцы в/ч в норме контактируют с резцами н/ч

- А. Небной поверхностью
- Б. Режущим краем
- В. Вестибулярной поверхностью
- Г. Апроксимальной поверхностью

Изучить размеры зубных рядов в периоде временных зубов можно методом

- А. Пона
- Б. Коркхауза
- В. Долгополовой
- Г. Тона

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Вестибулярные поверхности верхних резцов контактируют с нижними резцами
 - 2.Зубоальвеолярное удлинение в области резцов верхней и нижней челюстей
 - 3.Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля
 4. Протрузия верхних резцов и ретрузия нижних Оклюзия
- А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия
 - Б. Дистальная окклюзия
 - В. Глубокая резцовая
 - Г. Обратная резцовая окклюзия
- А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
 - Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
 - В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
 - Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда расположена небно
 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно
 3. Косметический центр смещен вправо
 4. Подбородок смещен вправо
- Окклюзия**

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Нет правильного ответа

Г. Трансверсальная резцовая

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

В. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Аппарат Андресена - Гойпля предназначен для

- А. Расширения зубного ряда
- Б. Дистального перемещения боковой группы зубов справа
- В. Трансверсального расширения
- Г. Лечения дистальной окклюзии

К внутриротовым аппаратам относятся:

- А. Пластинки на верхнюю челюсть с винтом;
- Б. Лицевая дуга;
- В. Подбородочная праща с головной шапочкой;
- Г. Маска Диляра.

Ортопантомографию в ортодонтии применяют для определения

- А. Длины верхней челюсти
- Б. Длины нижней челюсти
- В. Наличия зачатков постоянных зубов
- Г. Ширины зубных рядов

Лицевая маска Диляра позволяет

- А. Сдерживать рост верхней челюсти
- Б. Перемещать вперед верхний зубной ряд и верхнюю челюсть
- В. Стимулировать рост нижней челюсти
- Г. Сдерживать рост обеих челюстей

Губной бампер используют для

- А. Укорочения нижнего зубного ряда
- Б. Дистализации первых нижних моляров
- В. Уплощения переднего отрезка верхнего зубного ряда
- Г. Сужения нижнего зубного ряда

Диаграмма Хаулея-Гербера-Гербста позволяет определить

- А. Размеры зубных рядов
- Б. Форму зубных рядов
- В. Размеры сегментов зубных рядов
- Г. Размеры челюстных костей

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Сумма медиолатеральных размеров резцов верхнего зубного ряда и определение ширины зубного ряда
2. Измерение сегментов зубного ряда
3. Определение величины перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров
4. Произведение суммы медиолатеральных размеров резцов нижнего зубного ряда на индекс Тонна (1,33) Метод антропометрической диагностики

А.

А. Метод Коркхауза

Б. Метод Пона

В. Определение индивидуальных размеров резцов верхнего зубного ряда

Г. Метод Герлаха

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-Г 2-А 3-Б 4-Б

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов**
- 2. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля**
- 3. Зубоальвеолярное удлинение в области передних зубов**
- 4. Увеличение <SNPg Окклюзия**

А. Мезиальная

Б. Дистальная

В. Глубокая резцовая окклюзия

Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия

А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Порядок прорезывания временных зубов

А. I - II - III - IV - V

Б. I - II - IV - III - V

В. II - I - III - IV - V

Г. I - II - V - IV - III

Порядок прорезывания постоянных зубов

А. 6-1-2-3-4-5-7

Б. 1-2-4-5-3-6

В. 6-1-2-4-3-5-7

Г. 6-1-2-5-3-4-7

Резцы н/ч в норме контактируют с резцами в/ч

А. Язычной поверхностью

Б. Режущим краем

В. Вестибулярной поверхностью

Г. Апроксимальной поверхностью

Длину переднего отрезка зубного ряда определяют с помощью метода

А. Пона

Б. Коркхауза

В. Хауса-Снагиной

Г. Нансе

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение $\angle$ SNB и увеличение наружного $\angle$ U1/NL
 2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов нижней челюсти
 3. Уменьшение $\angle$ SNB и уменьшение наружного $\angle$ U1/NL
 4. Увеличение $\angle$ B Оклюзия
- А. Глубокая резцовая окклюзия
Б. Дистальная II класс I подкласс
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Дистальная глубокая окклюзия II класс II подкласс

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-В

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Расстояния в области fossa canina на уровне верхушек корней первых премоляров верхней челюсти
2. Величина перпендикуляра проведенного от линии соединяющей дистальные поверхности первых моляров до вершины резцового сосочка
3. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров
4. Соотношение сумм мезиодистальных размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов

Метод антропометрической диагностики

- А. Ширина апикального базиса верхней челюсти
Б. Длина апикального базиса верхней челюсти
В. Индекс Тонна
Г. Метод Коркхауза

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Уменьшение $\angle$ SNA характерно для окклюзии

- А. Дистальной
Б. Мезиальной
В. Глубокой резцовой
Г. Физиологической

Недостаток места может привести к аномалии

- А. Положения
- Б. Размера
- В. Формы
- Г. Структуры

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Измерение ширины апикальных базисов
 2. Измерение медиолатеральных размеров резцов верхнего зубного рядого
 3. Измерение медиолатеральных размеров резцов верхнего и нижнего зубного ряда и определение соотношения их сумм
 4. Определение по таблице ширины зубных рядов в области премоляров
- Метод антропометрической диагностики
- А. Определение индекса Тонна
 - Б. Метод Пона
 - В. Определение индивидуальных размеров резцов верхнего зубного ряда
 - Г. Метод Хауса
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
 - Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
 - В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
 - Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Фиксирующие элементы в аппарате Кламмта

- А. Протрагирующие пружины
- Б. Рукообразные пружины
- В. Кламмер адамса
- Г. Только вестибулярная дуга

Тортоаномалия - это

- А. Высокое положение зуба
- Б. Поворот зуба вокруг вертикальной оси
- В. Вестибулярный наклон зуба
- Г. Оральное положение зуба

Франкфуртская горизонталь проводится через точки

- А. Or-Po
- Б. N-S
- В. Ar-Go
- Г. Sna-Snp

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Антропометрические параметры гипсовых моделей зубных рядов

1. Измерение медиолатеральных размеров резцов верхнего зубного ряда и ширины между премолярами
 2. Измерение лонгитудинальной длины зубного ряда
 3. Определение соотношения сумм резцов верхнего и нижнего зубных рядов
 4. Определение длины переднего участка верхнего зубного ряда
- Метод антропометрической диагностики
- А. Определение индекса Тонна
Б. Метод Пона
В. Метод Коркхауса
Г. Метод Нанса
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Аппарат для лечения перекрестной окклюзии является

- А. Одночелюстным, механическим
Б. Одночелюстным, функциональным
В. Двучелюстным, комбинированным
Г. Двучелюстным, функциональным

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

1. Сагиттальный распил, расширяющий винт
 2. Секторальный распил в области первого моляра
 3. Рукообразные пружины
 4. Петля для устранения диастемы
- Клиническая ситуация
- А. Мезио-дистальное смещение зуба
Б. Сужение верхнего зубного ряда
В. Мезиальное смещение боковых зубов
Г. Латеральное смещение резцов
- А. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
Б. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Этап прорезывания 16 и 26 соответствует возрасту:

- А. 3 года;
Б. 6 лет;
В. 8 лет;
Г. 11 лет.

Регулятор функции Френкеля III типа создает условия для роста

- А. Нижней челюсти
- Б. Верхней челюсти
- В. Обеих челюстей
- Г. Не влияет на рост

Пластика на верхнюю челюсть с винтом и секторальным распилом применяется для

- А. Равномерного расширения верхнего зубного ряда
- Б. Укорочения фронтального участка нижнего зубного ряда
- В. Одностороннего расширения верхнего зубного ряда
- Г. Раскрытия срединного небного шва

Супраположение зуба - это

- А. Высокое положение зуба
- Б. Поворот зуба вокруг вертикальной оси
- В. Вестибулярный наклон зуба
- Г. Оральное положение зуба

Аномалии челюстей в сагиттальном направлении можно определить с помощью

- А. Ортопантомографии
- Б. ТрГ в боковой проекции
- В. Панорамной рентгенографии
- Г. ТрГ прямая проекция

Макродентия - это

- А. Уменьшение размеров зубов
- Б. Увеличение количества зубов
- В. Увеличение размеров зубов
- Г. Уменьшение количества зубов

Молярный индекс Пона равен

- А. 80;
- Б. 85;
- В. 64;
- Г. 90

Привычка спать на спине с запрокинутой головой приводит к

- А. Нарушению положения зубов
- Б. Нарушению прорезывания зубов
- В. Задержке роста нижней челюсти
- Г. Выдвижению нижней челюсти

Дистальное положение зуба - это смещение зуба

- А. Вперед по зубной дуге
- Б. Назад по зубной дуге
- В. В сторону неба
- Г. В сторону щеки

Регулятор функции Френкеля I типа создает условия для роста

- А. Нижней челюсти
- Б. Верхней челюсти
- В. Обеих челюстей
- Г. Не влияет на рост

Рукообразные пружины перемещают зубы в направлении :

- А. Оральном;
- Б. Вестибулярном;
- В. Вертикальном
- Г. Мезио-дистальном.

Вид эластичной тяги при лечении трансверсальной резцовой окклюзии

- А. Межчелюстная по II классу
- Б. Одночелюстная
- В. Межчелюстная по III классу
- Г. Перекрестная

Уменьшение параметра Pg' -Go характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Сужения зубных рядов
- Г. Физиологической

К специальным методам диагностики в ортодонтии относятся

- А. Осмотр полости рта, функциональные пробы
- Б. Опрос, рентгенологические, функциональные, графические
- В. Опрос, осмотр, измерение гипсовых моделей челюстей
- Г. Функциональные, графические, кефалометрические

Зубные ряды в прикусе временных зубов имеют форму

- А. Полуэллипса
- Б. Полукруга
- В. Параболы
- Г. Трапеции

Задняя точка верхней челюсти

- А. Co
- Б. Snp
- В. Go
- Г. Sna

С целью измерения длины тела верхней челюсти используют:

- А. Ортопантограмму;
- Б. ТРГ - прямая проекция;
- В. ТРГ - боковая проекция;
- Г. Томографию ВНЧС.

Метод Пона основан

- А. На зависимости суммы мезиодистальных размеров нижних резцов и ширины зубного ряда в переднем и заднем отделах
- Б. На зависимости суммы мезиодистальных размеров верхних резцов и ширины зубных рядов
- В. На пропорциональности размеров верхних и нижних резцов
- Г. На зависимости между шириной зубного ряда в переднем и заднем отделах

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Регулятор функций Френкеля

1. Пелот для отведения нижней губы

2. С окклюзионными накладками

3. Вестибулярная дуга

4. Протраггирующая дуга Окклюзия

А. Мезиальная

Б. Дистальная

В. Протрузия верхних резцов

Г. Ретрузия верхних резцов

А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Ортодонтический аппарат с винтом и поперечным распилом в переднем отделе предназначен для

А. Сохранения места зубу 35

Б. Коррекции положения первого постоянного моляра

В. Удлинения зубного ряда

Г. Расширения зубного ряда

Вестибулоокклюзия - это смещение

А. Нижних или верхних боковых зубов в щечную сторону

Б. Нижних или верхних боковых зубов в оральную сторону

В. Только верхних боковых зубов в оральную сторону

Г. Нижних передних зубов орально

Нейтральная (физиологическая) окклюзия соответствует класс Энгля

А. I

Б. II

В. III

Г. IV

Для съемного ортодонтического аппарата активным элементом является

А. пуговчатый кламер

Б. кламер Адамса

В. протрагирующая пружина

Г. Круглый кламер

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена щечно
2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно
3. Косметический центр смещен вправо
4. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда наклонена небно

Окклюзия

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Вестибуло-

Г. трансверсальная резцовая

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Для определения нарушения формы зубных рядов используют методики:

А. Пона;

Б. Коркхауза;

В. Хаулея-Гербера-Гербста;

Г. Тона.

Базальная дуга нижней челюсти

А. Меньше альвеолярной дуги на 5 мм

Б. Больше альвеолярной дуги

В. Равна альвеолярной дуге

Г. Меньше альвеолярной дуги на 3 мм

Прогнатия и ретрогнатия относятся к аномалиям

А. Размера челюстей

Б. Положения челюстей

В. Формы челюстей

Г. Положения и формы

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение $\angle B$
 2. Уменьшение $\angle SNB$
 3. Зубоальвеолярное укорочение в области передних зубов
 4. Уменьшение $\angle SNA$ Окклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Глубокая резцовая
Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия

А. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

В. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Первый и второй подклассы II класса энгла различаются положением

- А. Моляров
Б. Клыков
В. Резцов
Г. Челюстей

Точка Me соответствует

- А. Передней точке на нижнем контуре тела нижней челюсти
Б. Вершине суставной головки
В. Точке пересечения тела нижней челюсти
Г. Нижней точке на нижнем контуре тела нижней челюсти на месте пересечения симфиза

Передняя точка апикального базиса нижней челюсти

- А. Pg
Б. В
В. Me
Г. А

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Расширяющий винт
 2. Протрагирующая пружина
 3. Рукообразная пружина
 4. Петля для устранения диастемы
- Функция**
- А. Расширение зубных рядов
 - Б. Вестибулярное отклонение зубов
 - В. Мезиодистальное перемещение зубов
 - Г. Устранение диастем
- А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Г. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Точка Pt является

- А. Верхней дистальной точкой крыловидно-верхнечелюстной щели
- Б. Серединой турецкого седла
- В. Нижней точкой края орбиты
- Г. Верхней точкой наружного слухового прохода

Аппарат Pendulum используется для

- А. Дистализации боковой группы зубов
- Б. Сужения зубного ряда
- В. Укорочения зубного ряда
- Г. Ретенции

Этап прорезывания 34 и 44 соответствует возрасту:

- А. 3 года;
- Б. 5 лет;
- В. 8 лет;
- Г. 10 лет.

Период подготовки к смене зубов продолжается

- А. От до лет
- Б. От 5 до 6 лет
- В. От 5 до 8 лет
- Г. От до 9 лет

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Увеличение $\angle SNA$**
 - 2. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов**
 - 3. Увеличение $\angle U1/NL$ (внутренний угол)**
 - 4. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля Окклюзия**
- А. Мезиальная**
Б. Дистальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Протрузия верхних резцов
- А. 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В
Б. 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А
В. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

С целью измерения длины тела верхней челюсти используют

- А. Ортопантограмму
Б. Трг - прямая проекция
В. Трг - боковая проекция
Г. Томографию внчс

Лицевая дуга позволяет

- А. Сдерживать рост верхней челюсти
Б. Перемещать вперед верхний зубной ряд и верхнюю челюсть
В. Стимулировать рост нижней челюсти
Г. Сдерживать рост обеих челюстей

Макрогнатия нижней челюсти характеризуется увеличением:

- А. $A' - S_{np}$;
Б. $N - S$;
В. $Pg' - Go$;
Г. $Co - Go$.

В норме нижние центральные резцы имеют

- А. По 1 антагонисту
Б. По 2 антагониста
В. Контактуют с клыками верхней челюсти
Г. Контактуют с боковыми резцами верхней челюсти

Метод Герлаха применяют для определения

- А. Длины тела нижней челюсти
- Б. Ширины зубного ряда
- В. Пропорциональности размеров боковых и передних сегментов зубных рядов верхней и нижней челюстей
- Г. Лонгитудиальной длины зубного ряда

Передняя точка апикального базиса верхней челюсти

- А. Pg
- Б. В
- В. Me
- Г. А

Метод электромиографии в ортодонтии применяется для исследования

- А. Кровеносных сосудов пародонта
- Б. Работы ВНЧС
- В. Состояния пародонта
- Г. Биопонтециала мышц

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Резцовое перекрытие составляет более 2/3
- 2. Смещение межрезцовой линии
- 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля
- 4. Уменьшение длины тела нижней челюсти Окклюзия

- А. Мезиальная
- Б. Дистальная
- В. Глубокая резцовая дизокклюзия
- Г. Трансверсальная резцовая окклюзия

- А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
- Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-Б
- В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
- Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

При синдроме "наперстка" наблюдается

- А. Напряжение круговой и подбородочной мышц
- Б. Напряжение верхней части лица
- В. Ротовое дыхание
- Г. Несмыкание губ

Увеличение $\angle$ SNA характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Глубокой резцовой
- Г. Физиологической

Компактоостеотомия проводится с целью

- А. Улучшения фиксации ортодонтического аппарата
- Б. Ускорения ортодонтического лечения
- В. Продолжения ортодонтического лечения
- Г. Стабилизации результатов ортодонтического лечения

Этап прорезывание 16 и 26 соответствует возрасту

- А. 3 года
- Б. 6 лет
- В. 8 лет
- Г. 12лет

Плоскость основания верхней челюсти обозначается:

- А. NSL;
- Б. ML;
- В. NL;
- Г. FH.

Линия N-S соответствует плоскости

- А. Основания верхней челюсти
- Б. Основания нижней челюсти
- В. Переднего отдела основания черепа
- Г. Эстетической по riccets

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Уменьшение <SNB**
 - 2. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов**
 - 3. Увеличение <SNP_g**
 - 4. Резцовое перекрытие более 2/3 Окклюзия**
- А. Мезиальная**
Б. Дистальная
В. Глубокая резцовая
Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

Мезиальное положение зуба - это смещение зуба

- А. Вперед по зубной дуге
Б. Назад по зубной дуге
В. В сторону неба
Г. В сторону щеки

Этап прорезывание 17и 27 соответствует возрасту

- А. 3 года
Б. 5 лет
В. 8 лет
Г. 12 лет

Этап прорезывания 14 и 24 соответствует возрасту:

- А. 3 года;
Б. 5 лет;
В. 8 лет;
Г. 10 лет.

Аппарат Норда используется для :

- А. Удлинения верхнего зубного ряда;
Б. Ротации первых верхних моляров;
В. Раскрытия небного шва;
Г. Расширения верхнего зубного ряда только в переднем отделе.

Бампер Корна с упором для языка предназначен для

- А. Стабилизации положения зубов
- Б. Перемещения зубов в вестибулярном направлении
- В. Внедрения передней группы зубов
- Г. Устранения вредной привычки

Сроки прорезывания постоянных зубов

- А. 1 - 6-7 лет, 2 - 7-8 лет, 4 - 8-9 лет, 3 - 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 6 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- Б. 6 - 6-7 лет, 1- 7-8 лет, 2 - 8-9 лет, 3 - 11-12 лет, 4 - 9-10 лет, 5 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- В. 1 - 6-7 лет, 2- 7-8 лет, 3 - 8-9 лет, 4 - 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 6 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- Г. 6 - 6-7 лет, 1- 7-8 лет, 2 - 8-9 лет, 4- 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 3 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет

Этап прорезывание 11и 21соответствует возрасту

- А. 3 года
- Б. 5 лет
- В. 7 лет
- Г. 1лет

В регуляторе функции Френкеля I типа губные пелоты располагаются в области губы

- А. Нижней
- Б. Верхней
- В. Верхней и нижней
- Г. Нет губных пелотов

Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и вестибулярной дугой позволяет провести

- А. Уплотнение переднего отдела нижнего зубного ряда
- Б. Расширение и уплотнение верхнего зубного ряда
- В. Устранение вредных привычек
- Г. Устранение дизокклюзии

Зубоальвеолярную высоту переднего отдела верхней челюсти характеризует параметр

- А. U1- NL
- Б. U6 - NL
- В. L1- ML
- Г. L6-ML

Палатоокклюзия относится к аномалиям окклюзии в направлении:

- А. Сагиттальном;
- Б. Вертикальном;
- В. Трансверсальном;
- Г. Сагиттальном и вертикальном.

Аппарат Нанса предназначен для

- А. Стабилизации положения резцов
- Б. Вестибулярного перемещения резцов
- В. Выдвижения нижней челюсти
- Г. Стабилизации положения моляров

Для оценки пародонта боковой группы зубов целесообразно использовать

- А. Трг - прямую проекцию
- Б. Ортопантомографию
- В. Томографию
- Г. Прицельную рентгенографию

Дистальные поверхности вторых временных моляров 6-летнего ребенка располагаются

- А. В одной вертикальной плоскости
- Б. С мезиальной ступенькой
- В. С дистальной ступенькой
- Г. С латеральной ступенькой

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Аппарат Андресена-Гойпля

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
- 2. Без окклюзионных накладок
- 3. Пелот для отведения нижней губы
- 4. Капюшон на нижних резцах

- А. Протрузия нижних резцов
- Б. Глубокая
- В. Недоразвитие апикального базиса нижней челюсти
- Г. Протрузия верхних резцов

- А. 1-В 2-Б 3-Г 4-А
- Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
- В. 1-Г 2-Б 3- В 4-А
- Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В регуляторе функции Френкеля III Типа окклюзионные накладки имеют отпечатки:

- А. Верхних зубов;
- Б. Нижних зубов;
- В. Верхних и нижних зубов;
- Г. Нет окклюзионных накладок.

Аппарат Pendulum применяют для

- А. Дистализации моляров верхней челюсти
- Б. Смещения нижней челюсти вперед
- В. Смещения верхнего зубного ряда вперед
- Г. Стабилизации положения верхней челюсти

II класс энгля характеризуется смещением зубов

- А. Нижней челюсти назад
- Б. Верхней челюсти назад
- В. Нижней челюсти вперед
- Г. Нижней челюсти латерально

Регулятор функции Френкеля III типа используется для лечения

- А. Дизокклюзии зубных рядов
- Б. Дистальной окклюзии
- В. Мезиальной окклюзии
- Г. Перекрестной окклюзии

Дистальная окклюзия характеризуется смещением боковых зубов

- А. Нижней челюсти назад
- Б. Нижней челюсти вперед
- В. Верхней челюсти назад
- Г. Верхней челюсти латерально

Каждый зуб верхней челюсти антагонизирует в норме с

- А. Одноименным и передистоящим зубами н/ч
- Б. Одноименным и позадистоящим зубами н/ч
- В. Только одноименным зубом
- Г. Только позадистоящим

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $\angle SNB$
 2. Увеличение $\angle SNA$
 3. Укорочение переднего отдела верхнего зубного ряда
 4. Соотношение клыков справа по III, слева по II классу Энгля Окклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Обратная резцовая дизокклюзия
Г. Трансверсальная резцовая
- А. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-Б
Б. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г
В. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-Б
Г. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В

Небные бугорки верхних временных моляров 4-х летнего ребенка располагаются

- А. На одном уровне с язычными бугорками нижних моляров
Б. В продольной фиссуре нижних моляров
В. Вестибулярнее щечных бугорков нижних моляров
Г. На одном уровне с щечными бугорками нижних моляров

Временные клыки прорезываются в _____ месяцев

- А. 8-12
Б. 6-8
В. 12-16
Г. 16-20

Недостаток места может привести к аномалии _____ зуба

- А. Структуры
Б. Формы
В. Положения
Г. Размера

На телерентгенограмме черепа в боковой проекции угол sna показывает положение

- А. Базиса верхней челюсти относительно основания черепа
Б. Базисов челюстей относительно друг друга
В. Базиса нижней челюсти относительно основания черепа
Г. Резцов относительно плоскости верхней челюсти

Функция сосания угасает к _____ жизни

- А. 2 Годам
- Б. 6 Месяцам
- В. 1 Году
- Г. 3 Годам

Задачей врача-ортодонта при лечении перекрестного прикуса без смещения нижней челюсти в период временного прикуса является

- А. Сдерживание роста нижней челюсти, стимуляция роста верхней челюсти
- Б. Нормализация формы зубных рядов и создания условий для роста и развития челюстей
- В. Оптимизация роста нижней челюсти и верхней челюсти
- Г. Нормализация формы зубных рядов

Лицевой дугой называют

- А. Механически действующий, одночелюстной, оральный несъёмный аппарат
- Б. Функционально-направляющий аппарат, одночелюстной, назубный, несъёмный дуговой аппарат
- В. Ретенционный аппарат
- Г. Механически действующий, внеротовой, съёмный, дуговой аппарат со стационарной опорой

Аппарат гербста относится к

- А. Несъемным функциональным
- Б. Несъемным механическим
- В. Съёмным комбинированным
- Г. Съёмным механическим

Тератогенетический терминационный период для твердого нёба _____ недели гестации

- А. 2-3
- Б. 10-12
- В. 4-8
- Г. 6-9

Инфраположение - это аномалия положения зубов в _____ плоскости

- А. Вертикальной
- Б. Сагиттальной
- В. Трансверсальной
- Г. Окклюзионной

Неправильное положение зуба называют

- А. Ретенцией
- Б. Альвеолитом
- В. Перикоронитом
- Г. Дистопией

Наиболее глубокая точка на переднем контуре апикального базиса верхней челюсти

- А. Pg
- Б. В
- В. Me
- Г. А

Причиной трем является

- А. Недоразвитие верхней челюсти
- Б. Микроденития
- В. Короткая уздечка языка
- Г. Сужение зубных рядов

На трг головы (в боковой проекции) параметр, характеризующий ретро-антеинклинацию верхней челюсти

- А. NSL\\ML
- Б. SNPog
- В. NSL\\NL
- Г. NL\\ML

Ортодонтический аппарат pendilum позволяет

- А. Устранить диастему
- Б. Дистализировать зубы 1.6, 2.6
- В. Провести интрузию жевательных зубов на верхней челюсти
- Г. Устранить глубокую резцовую окклюзию

Изучить диагностические модели челюстей по трансверсали позволяет методика

- А. Шмута
- Б. Фриеля
- В. Пона
- Г. Изара

Аппарат гербста предназначен для

- А. Выдвижения нижней челюсти
- Б. Протракции зубов верхней челюсти
- В. Нормализации функции языка
- Г. Внедрения нижних фронтальных зубов

Нарушение положения зубов, при котором зубы повернуты по оси, называется

- А. Транспозиция
- Б. Инфраположение
- В. Тортоаномалия
- Г. Супраположение

Для устранения выраженного лингвального наклона моляра используют

- А. Торковый изгиб
- Б. Кросс-тягу
- В. Кантилевер
- Г. Торковую пружину

Угол snb на trg характеризует положение апикального базиса _____ челюсти в _____ плоскости относительно плоскости основания черепа

- А. Нижней; вертикальной
- Б. Нижней; сагиттальной
- В. Верхней; вертикальной
- Г. Верхней; сагиттальной

Элайнер по способу фиксации

- А. Несъемный, внеротовой
- Б. Съемный, внутриротовой
- В. Съемный, внеротовой
- Г. Несъемный, внутриротовой

Внутриротовой ортодонтической опорой не может служить такое приспособление как

- А. Небный базис пластинки
- Б. Рукообразные пружины
- В. Круглый кламмер
- Г. Кламмера Адамса

Аппарат персина для лечения вертикальной резцовой дизокклюзии позволяет

- А. Сдерживать рост апикального базиса нижней челюсти
- Б. Нормализовать зубоальвеолярные высоты в области жевательной и передней группы зубов
- В. Сдерживать рост апикального базиса верхней челюсти
- Г. Расширить зубные ряды

Лицевой индекс izard характеризует

- А. Асимметричность лица
- Б. Глубину профиля
- В. Ширину лица
- Г. Высоту лица

Снижение объема верхних дыхательных путей обычно бывает при

- А. Перекрестной окклюзии
- Б. Макрогнатии
- В. Мезиальной окклюзии
- Г. Дистальной окклюзии

Вестибулярные пластинки применяют с целью

- А. Отучения ребенка от вредных привычек
- Б. Профилактики кариеса постоянных зубов
- В. Профилактики заболеваний пародонта
- Г. Улучшения гигиены полости рта

Причина мезиального смещения постоянных премоляров и моляров определяется как

- А. Дистальная окклюзия
- Б. Глубокая резцовая окклюзия
- В. Ранняя потеря временных клыков
- Г. Сверхкомплектные зубы

Ортодонтическое лечение у ребенка 6 лет не показано при

- А. Диастеме
- Б. Палатиноокклюзии
- В. Нёбном наклоне верхних резцов с образованием обратной резцовой окклюзии
- Г. Дистальной окклюзии

Глубокая травматическая окклюзия может привести к травме пародонта

- А. Нижних моляров
- Б. Верхних резцов
- В. Премоляров
- Г. Клыков

Недостаточная ангуляция при фиксации брекетов на центральные резцы верхней челюсти может привести к

- А. Увеличению мезио-дистальной ширины переднего участка
- Б. Формированию диастемы
- В. Повороту зубов по оси
- Г. Сближению корней резцов

Ортопантомографию челюстей проводят для

- А. Прогноза роста челюстей
- Б. Определения формы и размера суставных отростков нижней челюсти и суставных ямок
- В. Определения количества и расположения зубов
- Г. Изучения строения лицевого отдела черепа

Суставной бугорок отсутствует в возрасте

- А. 1-6 Месяцев
- Б. 45-50 Лет
- В. 5-6 Лет
- Г. Старше 60 лет

Мезиальное смещение и мезиальный наклон первого постоянного моляра чаще всего происходит при

- А. Преждевременном удалении временного моляра
- Б. Аномалии окклюзии 3 класса по Энгля
- В. Аномалии окклюзии 2 класса по Энгля
- Г. Вредной привычке сосать палец

Мезиальная ступень между дистальными поверхностями вторых временных моляров формируется

- А. В период сменного прикуса
- Б. При бруксизме в ночное время
- В. В период подготовки к смене временных зубов на постоянные
- Г. При окончательном формировании ВНЧС

Физиологические тремы и диастема характерны для периода

- А. Формирования временного прикуса
- Б. Постоянного прикуса
- В. Сформированного временного прикуса
- Г. Подготовки к смене временных зубов

Угол сна на трг определяет положение апикального базиса

- А. Нижней челюсти в сагиттальной плоскости относительно плоскости основания черепа
- Б. Нижней челюсти относительно апикального базиса верхней челюсти
- В. Верхней челюсти в сагиттальной плоскости относительно плоскости основания черепа
- Г. Верхней челюсти относительно Франкфуртской горизонтали

Ротация зуба представляет собой изменение положения зуба

- А. Мезиально
- Б. Нёбно
- В. Дистально
- Г. Вокруг своей оси

Ширину головы определяют измерением расстояния между латерально расположенными точками

- А. Go – go
- Б. Op – gl
- В. Zy – zy
- Г. Eu – eu

К фиксирующим элементам в съёмных ортодонтических аппаратах относят

- А. Кламмера
- Б. Пелоты
- В. Наклонную плоскость
- Г. Накусочную площадку

Протрагирующая пружина используется для

- А. Мезиального перемещения зуба
- Б. Лингвального отклонения зубов
- В. Дистального перемещения зуба
- Г. Вестибулярного отклонения зубов

Заслонка для языка в аппарате персина для лечения вертикальной резцовой дизокклюзии позволяет

- А. Сдерживать рост апикального базиса
- Б. Стимулировать рост апикального базиса
- В. Нормализовать соотношение первых моляров
- Г. Нормализовать функцию и положение языка

По месту расположения эластопозиционер является

- А. Затылочным
- Б. Внеротовым
- В. Внутриротовым
- Г. Лицевым

Нарушение носового дыхания может стать причиной развития зубочелюстной аномалии

- А. Расширения верхнего зубного ряда
- Б. Уплощения фронтального отдела верхней челюсти
- В. Сужения верхнего зубного ряда
- Г. Сужения нижнего зубного ряда

Положительный торк брекетов для клыков следует выбирать при

- А. Ретенции
- Б. Изначальном высоком торке клыков
- В. Изначальном низком торке клыков
- Г. Сепарации

Симметричность развития правой и левой половины нижней челюсти наиболее полно можно оценить с помощью

- А. Телерентгенографии в боковой проекции
- Б. Прицельной рентгенографии
- В. Панорамной рентгенографии
- Г. Телерентгенографии в прямой проекции

На телерентгенограмме черепа в случае гармонично развитого лица при анализе положения губ по отношению к е-линии по ricketts наблюдается положение верхней губы _____, положение нижней губы _____

- А. Кзади на 2-3 мм; кзади на 1-2 мм
- Б. На е-линии; кзади на 2-3 мм
- В. И; на е-линии
- Г. Кпереди на 1-2 мм; кзади на 2-3 мм

Первым этапом ортодонтического лечения является

- А. Устранение трем
- Б. Устранение ротаций зубов
- В. Нивелирование
- Г. Коррекция зубных рядов в сагиттальной плоскости

Активным элементом пластиночного аппарата является

- А. Винт
- Б. Губной пелот
- В. Накусочная площадка
- Г. Щечные щиты

Вестибулярную пластинку относят к аппаратам

- А. Внутриротовым
- Б. Одночелюстным
- В. Внеротовым
- Г. Комбинированным

Обходящий изгиб используют для

- А. Усиления воздействия дуги в сагиттальной и вертикальных плоскостях в области опорных моляров и резцов
- Б. Ограничения смещения дуги
- В. Закрытия постэкстракционных промежутков
- Г. Сохранения места в зубном ряду за счет перемещений зубов по обе стороны от изгиба

В ходе работы аппарата «периотест» вторым режимом является

- А. Считывание биопотенциала с поверхности мышцы
- Б. Регистрация движений нижней челюсти
- В. Возбуждение механического ударного импульса и передача его бойку
- Г. Прием ответного сигнала механической системы и передача его для анализа в микропроцессорную часть

Osamu retainer используют для

- А. Нормализации окклюзии
- Б. Раскрытия небного шва
- В. Стимуляции роста апикального базиса верхней челюсти
- Г. Ретенции

Ранняя потеря временных моляров может привести к

- А. Вертикальной резцовой дизокклюзии
- Б. Наклону соседних зубов в сторону дефекта
- В. Диастеме
- Г. Удлинению зубной дуги

Особенностью компьютерной оптической топографии является возможность ее проведения

- А. Без компьютера
- Б. Без рентгеновского облучения
- В. Только в условиях стационара
- Г. Только при наличии врача-рентгенолога

Точка не соответствует

- А. Вершине суставной головки
- Б. Передней точке подбородочного выступа
- В. Точке пересечения касательных к ветви и телу нижней челюсти
- Г. Передней точке на нижнем контуре тела нижней челюсти

Для применения расширяющих аппаратов с винтом ведущим показанием является

- А. Недостаток места для имеющихся зубов
- Б. Мезиальное смещение боковых зубов
- В. Уменьшение ширины зубного ряда
- Г. Уменьшение переднего отрезка зубной дуги

При третьем классе по энглю мезиально-щечный бугор первого моляра верхней челюсти находится _____ нижнего моляра

- А. В межбугровой фиссуре первого
- Б. Кпереди от межбугровой фиссуры первого
- В. В межбугровой фиссуре второго
- Г. Позади межбугровой фиссуры первого

Сосание пальца приводит к

- А. Гипертонусу мускулатуры и расширению зубных рядов
- Б. Неполному прорезыванию передних зубов
- В. Гипертонусу мускулатуры и сужению зубных рядов
- Г. Перемещению моляров

К аномалиям зубного ряда не относят

- А. Тортоаномалию
- Б. Аномалии формы
- В. Аномалии размера
- Г. Сужение

Вместо ортодонтического винта для расширения зубного ряда можно использовать

- А. Пружину Коффина
- Б. Вестибулярную дугу
- В. Пуговчатый кламер
- Г. Протрагирующую пружину

Ортодонтический аппарат для быстрого нёбного расширения называется

- А. Cetlin
- Б. Distal Jet
- В. Аппарат Норда
- Г. Pendulum

Зачатки верхней и нижней челюсти образуются из ____ пары жаберных дуг

- А. 1
- Б. 4
- В. 3
- Г. 2

Применение регулятора функции iii типа показано при

- А. Дистальной блокирующей окклюзии
- Б. Дистальной окклюзии с протрузией резцов на верхней челюсти
- В. Мезиальной окклюзии
- Г. Перекрестной окклюзии

Аппарат брюкля применяется при

- А. Горизонтальной резцовой дизокклюзии
- Б. Мезиальной окклюзии
- В. Дистальной окклюзии
- Г. Вертикальной резцовой дизокклюзии

После возрастного периода физиологического прорезывания зубов диагноз их ретенции можно поставить через

- А. 3 Года
- Б. 1 Год
- В. Полгода
- Г. 4 Года

В аппарате френкеля второго типа пелот предназначен для

- А. Нормализации положения языка
- Б. Ретрузии резцов нижней челюсти
- В. Отведения верхней губы
- Г. Стимуляции роста апикального базиса и отведения нижней губы

Rme называют

- А. Медленное расширение верхней челюсти
- Б. Быстрое расширение верхней челюсти
- В. Полубыстрое расширение верхней челюсти
- Г. Хирургически ассистированное быстрое нёбное расширение

На телерентгенограмме черепа в боковой проекции увеличение угла nl/ml и расстояния sna свидетельствует о

- А. Мезиальном соотношении челюстей
- Б. Дистальном соотношении челюстей
- В. Горизонтальном типе роста лицевого скелета
- Г. Вертикальном типе роста лицевого скелета

Артрофонография регистрирует

- А. Движения суставной головки
- Б. Шумы в ВНЧС
- В. Биопотенциал мышц
- Г. Движения нижней челюсти

Миотонометрия регистрирует

- А. Движение суставной головки
- Б. Тонус мышц
- В. Биопотенциал мышц
- Г. Движение нижней челюсти

Показанием к применению аппарата норда является

- А. Дистализация моляров
- Б. Значительное сужение нижнего зубного ряда
- В. Значительное сужение верхней челюсти
- Г. Мезиализация моляров

Точка а обозначает на боковой трг

- А. Переднюю носовую ость
- Б. Наиболее дистальную точку на переднем контуре апикального базиса на нижней челюсти
- В. Наиболее глубокую точку на переднем контуре базиса верхней челюсти
- Г. Заднюю носовую ость

На трг головы (в боковой проекции) антропометрической точкой, расположенной в центре турецкого седла, является точка

- А. S
- Б. Se
- В. Gn
- Г. Pog

К клиническим методам обследования относится

- А. Рентгенография
- Б. Общий анализ крови
- В. Реопародонтография
- Г. Пальпация

Угол трансверзального суставного пути (угол беннета) в среднем равен (в градусах)

- А. 9
- Б. 17
- В. 2
- Г. 10

Методом исследования боковых трг головы является метод

- А. Шварца
- Б. Парма
- В. Паатера
- Г. Колоткова

Назначение губных пелотов в ортодонтических аппаратах способствует _____ влияния _____ сил

- А. Ослаблению; внутренних
- Б. Усилению; внутренних
- В. Усилению; внешних
- Г. Ослаблению; внешних

Дилацерацией корня зуба называют

- А. Преждевременную апексификацию
- Б. Раздвоение
- В. Посттравматическое искривление
- Г. Резорбцию

Для определения переднего положения нижней челюсти необходим рентгенологический метод

- А. Зонограмма ВНЧС
- Б. Ортопантомография
- В. ТРГ в боковой проекции
- Г. ТРГ в прямой проекции

К преимуществам цифровых моделей зубных рядов перед гипсовыми относят

- А. Значительные погрешности в измерениях
- Б. Трудоемкость выполнения измерений
- В. Необходимость создания пространств для хранения моделей
- Г. Оперативность и быстроту работы

На трг головы в боковой проекции угол бета в норме равен

- А. 27-35
- Б. 2-5
- В. 15-20
- Г. 36-40

Глубина кривой шпее в норме не превышает (в мм)

- А. 4
- Б. 3
- В. 1,5
- Г. 5

Для оценки ширины зубных рядов по методу пона референтные точки устанавливают в области

- А. Премоляров и моляров
- Б. Резцов и премоляров
- В. Клыков и премоляров
- Г. Клыков и моляров

Шов на нижней челюсти у ребенка окостеневает

- А. После первого года жизни
- Б. К 5 годам
- В. К 6 месяцам
- Г. После второго года жизни

Макродентия относится к аномалии _____ зубов

- А. Структуры твердых тканей
- Б. Положения
- В. Размеров
- Г. Формы

В период формирования прикуса временных зубов зубные ряды имеют форму

- А. Полуэллипса
- Б. Седловидную
- В. Параболы
- Г. Полукруга

Профилактические аппараты используют детям до _____ лет

- А. 12
- Б. 14
- В. 5
- Г. 3

Наибольшая сила для ортодонтического перемещения зуба необходима для

- А. Наклона
- Б. Корпусного перемещения зуба
- В. Интрузии
- Г. Вращения

Тип аппаратов, предназначенных для раскрытия срединного небного шва

- А. Ретенционные
- Б. Сочетанного действия
- В. Функционально-действующие
- Г. Механически действующие

Подрывающая резорбция является следствием _____ нагрузки

- А. Тяжелой
- Б. Двусторонней разнонаправленной
- В. Легкой
- Г. Отсутствия

Уменьшение угла α указывает на

- А. Вертикальный тип роста
- Б. Ретроположение нижней челюсти
- В. Горизонтальный тип роста
- Г. Мезиальную окклюзию

Точка go является

- А. Точкой пересечения касательных к ветви и телу нижней челюсти
- Б. Передней точкой подбородочного выступа
- В. Вершиной суставной головки
- Г. Передней точкой апикального базиса нижней челюсти

В раннем сменном прикусе ортодонтическое лечение

- А. Направлено на перемещение временных зубов
- Б. Направлено на выравнивание всех прорезывавшихся зубов
- В. Направлено на создание места всем постоянным зубам
- Г. Проводится для закрытия промежутков

Для оценки конфигурации небного свода применяют

- А. Симметрограф Коркхауза
- Б. Штанген-циркуль
- В. Транспортёр
- Г. Миллиметровую бумагу

Вестибулярная дуга является элементом

- А. Функционально-направляющим
- Б. Фиксирующим
- В. Функциональным
- Г. Направляющим

Параметрами боковой трг головы для определения типа роста лицевого скелета являются

- А. NGoAr; ArGoe; NGoMe
- Б. Snp-A; SNA; SNB; ANB
- В. Go-Pog; SNB; ArGoMe; NGoAr
- Г. SGo:NMe; NSL\\ML; Sum.Bjork

Преимуществом элайнеров является

- А. Разнообразная цветовая гамма
- Б. Использование при приеме пищи
- В. Наличие металлических элементов
- Г. Гипоаллергенность

Штампованные каппы изготавливают на аппарате

- А. Ивоклар
- Б. Жермак
- В. Биостар
- Г. Аверон

Абсолютная сила жевательных мышц по веберу при их двухстороннем сокращении равняется (в кг)

- А. 300
- Б. 390
- В. 195
- Г. 100

Микродензия относится к аномалии _____ зубов

- А. Структуры твердых тканей
- Б. Формы
- В. Размеров
- Г. Положения

Нейтральный прикус соответствует в классификации энгля _____ классу

- А. 2
- Б. 4
- В. 3
- Г. 1

С целью укорочения зубной дуги верхней челюсти в период окклюзии постоянных зубов чаще всего удаляют

- А. Клыки
- Б. Резцы
- В. Первые моляры
- Г. Первые премоляры

«Микродентия» означает уменьшение

- А. Количества зачатков постоянных зубов
- Б. Количества зубов
- В. Размера зубов
- Г. Размера зубных рядов

Аппарат haas применяют для

- А. Расширения верхнего зубного ряда
- Б. Лечения глубокого прикуса
- В. Дистализации моляров верхнего зубного ряда
- Г. Лечения открытого прикуса

Для одновременного расширения и удлинения верхнего зубного ряда применяют пластинки с винтами

- А. Скелетированными с четырехгранными направляющими штифтами
- Б. Вайзе
- В. Бидермана
- Г. Бертони

Методом исследования объема носового дыхания называют

- А. Фарингоскопию
- Б. Риноманометрию
- В. Мастикациографию
- Г. Кинезиографию

На трг головы в боковой проекции по методу di raolo заднюю высоту нижней части лица морфометрически определяют как

- А. АВ
- Б. АМ
- В. МJ
- Г. ВJ

Метод коркхауза основан на

- А. Зависимости суммы мезиодистальных размеров верхних резцов и длины переднего отрезка зубного ряда
- Б. Зависимости суммы мезиодистальных размеров нижних резцов и ширины зубных рядов
- В. Пропорциональности размеров верхних и нижних резцов
- Г. Зависимости ширины и длины зубных рядов

Увеличение угла snb указывает на

- А. Наличие III скелетного класса
- Б. Горизонтальный тип роста
- В. Дизокклюзию во фронтальном отделе
- Г. Наличие II скелетного класса

Прокладывание языка между зубами приводит к

- А. Сужению нижнего зубного ряда
- Б. Неполному прорезыванию передних зубов
- В. Перемещению моляров
- Г. Расширению верхнего зубного ряда

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Разрушение дистальной поверхности зуба 75 приводит к

- А. Сужению нижнего зубного ряда
- Б. Тесному положению нижних передних зубов
- В. Мезиальному смещению зуба 16
- Г. Не имеет последствий

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

- 1. Сагиттальный распил, расширяющий винт**
 - 2. Секторальный распил в области первого моляра справа**
 - 3. Протрагирующие пружины**
 - 4. Петля для устранения диастемы**
- Клиническая ситуация**
- А. Мезиальное смещение первого моляра справа**
- Б. Оральное положение зубов**
- В. Сужение верхнего зубного ряда**
- Г. Латеральное положение центральных резцов**

А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики

Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

- 1. Расстояния в области fossa canina на уровне верхушек корней первых премоляров верхней челюсти**
 - 2. Мезиодистальные размеры резцов нижнего зубного ряда и определение их суммы**
 - 3. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров**
 - 4. Соотношения сумм размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов**
- Метод антропометрической диагностики**

А. Ширина апикального базиса верхней челюсти

Б. Определение индекса пропорциональности зубных рядов (1,08)

В. Индекс Тонна

Г. Метод Коркхауса

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

В. 1-А 2-Г 3-В 4--Б

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S

2. A'-Snр

3. <A/N/V

4. Pg'- Go Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Длина апикального базиса верхней челюсти

Г. Длина переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Упор для языка

2. Расширяющий винт

3. Веерообразный винт

4. Петля для устранения диастемы Функция

А. Нормализация положения языка

Б. Равномерное расширение зубного ряда

В. Расширение зубного ряда в переднем отделе

Г. Нормализация положения центральных резцов

А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

В. 1-Б 2-Г 3-А 4--В

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

По месту расположения небный бюгель

А. Внутриротовой

Б. Внеротовой

В. Вестибулярный

Г. Сочетанный

Пластика на верхнюю челюсть с винтом и срединным распилом применяется для

А. Равномерного расширения верхнего зубного ряда

Б. Удлинения фронтального участка нижнего зубного ряда

В. Одностороннего расширения верхнего зубного ряда

Г. Раскрытия срединного небного шва

Точка центра турецкого седла

- A. S
- Б. Po
- В. Pt
- Г. Ba

Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и вестибулярной дугой позволяет провести

- A. Уплотнение переднего отдела нижнего зубного ряда
- Б. Расширение и уплощение верхнего зубного ряда
- В. Устранение вредных привычек
- Г. Устранение дизокклюзии

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <NL/ML "B"

2. <S/N/A

3. <1/1 "alfa"

4. <A/N/B Характеристика

A. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

Б. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

В. Положение апикального базиса верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение оснований верхней и нижней челюстных костей

A. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между методом лучевой диагностики и областью изучения Метод лучевой диагностики

1. Ортопантомограмма

2. ТРГ головы в боковой проекции

3. ТРГ головы в прямой проекции

4. Панорамный рентгеновский снимок Изучает состояние

A. Пародонта боковой группы зубов

Б. Пародонта передней группы зубов

В. Сагиттальные размеры челюстных костей и их положение

Г. Трансверсальные размеры челюстных костей и их положение

A. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $\angle$ SNB
 2. Увеличение $\angle$ SNA
 3. Зубоальвеолярное укорочение в области резцов верхнего зубного ряда
 4. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов верхнего зубного ряда
- Окклюзия
- А. Мезиальная
 - Б. Дистальная
 - В. Глубокая резцовая окклюзия
 - Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
- Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
- В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
- Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии Регулятор функций Френкеля

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
 2. Окклюзионные накладки
 3. Пелот для отведения нижней губы
 4. Пелот для отведения верхней губы
- Окклюзия
- А. Дистальная II класс I подкласс.
 - Б. Мезиальная
 - В. Недоразвитие аппикального базиса верхней челюсти
 - Г. Недоразвитие аппикального базиса нижней челюсти
- А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
- Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
- В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
- Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Расширяющий винт
 2. Протрагирующая пружина
 3. Рукообразная пружина
 4. Петля для устранения диастемы
- Функция
- А. Расширения зубного ряда
 - Б. Нормализация положения отдельных зубов
 - В. Нормализация положения центральных резцов
 - Г. Небное положение зубов
- А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
- Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
- В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
- Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

- 1. Вестибулярна дуга**
 - 2. Трехмерный винт Бертони**
 - 3. Протрагирующая пружина**
 - 4. Петля для устранения диастемы** **Функция**
- А. Вестибярное отклонение резцов**
Б. Устранение протрузии резцов
В. Расширение и удлинение зубного ряда
Г. Нориализация положения центральных резцов
- А. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

- 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда расположена небно**
 - 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно**
 - 3. Косметический центр смещен вправо**
 - 4. Подбородок смещен вправо** **Окклюзия**
- А. Палатино-**
Б. Лингво-
В. Нет правильного ответа
Г. Трансверсальная резцовая
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
В. 1-А 2-Г 3-Б 4-В
Г. 1-В 2- Г 3-Б 4-А

Мезиальное положение зуба - это смещение зуба

- А. Вперед по зубной дуге
Б. Назад по зубной дуге
В. В сторону неба
Г. В сторону щеки

В норме нижние центральные резцы имеют

- А. По антагонисту
Б. По 2 антагониста
В. Контактируют с клыками верхней челюсти
Г. Контактируют с боковыми резцами верхней челюсти

Установите соответствие между клинической картиной в полости и состоянием окклюзии

Клиническая ситуация в полости рта

1. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля

2. Смещение косметического центра вправо

3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля

4. Протрузия верхних резцов

Окклюзия

А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия

Б. Дистальная

В. Мезиальная

Г. Трансверсальная резцовая

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Квадхеликс предназначен для

А. Расширения зубного ряда

Б. Удлинения зубного ряда

В. Стимуляции роста нижней челюсти

Г. Профилактики зубочелюстных аномалий

Положение языка между зубами проводит к

А. Мезиальной окклюзии

Б. Глубокой резцовой окклюзии

В. Дистальной окклюзии

Г. Вертикальной резцовой дизокклюзии

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии

Клиническая ситуация в полости рта

1. Протрузия резцов верхней и нижней челюстей

2. Отсутствие смыкания передних зубов

3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля

4. Резцовое перекрытие более 1/3

Окклюзия

А. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Б. Дистальная

В. Глубокая резцовая

Г. Бипротрузия

А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Б. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <ML/NSL

2. <S/N/A

3. <NL/NSL

4. <S/N/B Характеристика

А. Положение основания нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Б. Положение апикального базиса нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

В. Положение апикального базиса верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Г. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Резцовое перекрытие составляет более 2/3

2. Отсутствие режуще-бугорковых контактов

3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля

4. Обратное смыкание резцов Окклюзия

А. Глубокая

Б. Дистальная

В. Дизокклюзия

Г. Обратная резцовая

А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Соотношение сумм медиолатеральных размеров резцов верхнего и нижнего зубных рядов
 2. Мезиодистальные размеры верхних и нижних зубов и их соотношение
 3. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров
 4. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности нижних центральных резцов до линии в области дистальных поверхностей первых моляров
- Метод антропометрической диагностики
- А. Индекс пропорциональности размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов (1.08мм)
Б. Длина апикального базиса верхней челюсти
В. Индекс Тонна
Г. Метод Коркхауза
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-В 3-Г 4-А
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для нижней челюсти

1. Сагиттальный распил, расширяющий винт
 2. Секторальный распил в области резцов нижней челюсти
 3. Вестибулярная дуга
 4. Протрагирующая пружина
- Клиническая ситуация
- А. Протрузия резцов нижней челюсти
Б. Уплотнение переднего участка нижнего зубного ряда
В. Сужение нижнего зубного ряда
Г. Лингвальное положение резцов
- А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
В. 1-В 2-Б 3-А 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Клиническая ситуация

- 1. Глубокая резцовая окклюзия**
- 2. Сужение и укорочение зубного ряда**
- 3. Зубоальвеолярное удлинение**
- 4. Латеральное положение центральных резцов Конструктивный элемент**

- А. Оклюзионные накладки**
- Б. Накусочную площадку**
- В. Винт Бертони**
- Г. Петля для устранения диастемы**

А. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Трехмерный винт Бертони позволяет

- А. Одномоментно или поочередно расширить и удлинить зубной ряд**
- Б. Дистализировать зубы в боковых отделах верхнего зубного ряда**
- В. Расширить зубной ряд в переднем отделе**
- Г. Раскрыть небный шов**

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

- 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена щечно**
- 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно**
- 3. Косметический центр смещен вправо**
- 4. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена небно Окклюзия**

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Вестибуло-

Г. Трансверсальная резцовая

А. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Открытый активатор Кламмта

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
2. Окклюзионные накладки отсутствуют
3. Сагиттальный распил. Установлен расширяющий винт
4. Упор для языка Окклюзия

А. Дистальная. Сужение верхнего зубного ряда

Б. Глубокая

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Протрузия резцов

А. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Расстояния в области fossa canina на уровне верхушек корней первых премоляров верхней челюсти
2. Величина перпендикуляра проведенного от линии соединяющей дистальные поверхности первых моляров до вершины резцового сосочка
3. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров
4. Соотношение сумм мезиодистальных размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов

Метод антропометрической диагностики

А. Ширина апикального базиса верхней челюсти

Б. Длина апикального базиса верхней челюсти

В. Индекс Тонна

Г. Метод Коркхауса

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Фиксирующие элементы

А. Винт

Б. Вестибулярная дуга

В. Базис и кламмера Адамса

Г. Протрагирующие пружины

Установите соответствие между аппаратом и показаниями его применению Аппарат

1. Регулятор функций Френкеля I типа
 2. Расширяющая пластинка
 3. Пластинка с секторальным распилом
 4. Пластинка с накусочной площадкой Лечение окклюзии
- А. Дистальная II класс I подкласс
Б. Глубокая резцовая окклюзия
В. Уплотнение переднего участка зубного ряда
Г. Сужение зубных рядов
- А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Б. 1-Б 2-Г 3-В 4-А
В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Аппарат Кламонта предназначен для

- А. Сужения верхнего зубного ряда
Б. Нормализации окклюзии в сагиттальном направлении
В. Нормализации окклюзии в трансверсальном направлении
Г. Удлинения верхнего зубного ряда

О симметричности развития правой и левой половины нижней челюсти позволяют судить

- А. Панорамная рентгенограмма
Б. Трг - боковая проекция
В. Трг - прямая проекция и Клт
Г. Ортопантограмма и томография внчс

Самая глубокая точка апикального базиса верхней челюсти

- А. А
Б. В
В. Sna
Г. Snp

Мандибулярная плоскость обозначается

- А. Ocl
Б. ML
В. NL
Г. FH

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение A'- Snr
 2. Увеличение Pg'- Go
 3. Увеличение <U1/NI
 4. Уменьшение <L1/ML Окклюзия
- А. Ретрузия нижних резцов
Б. Дистальная
В. Ретрузия верхних резцов
Г. Мезиальная
- А. 1-Б 2-Г 3-В 4-А
Б. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии состоянием окклюзии Открытый активатор Кламмта

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
 2. Окклюзионные накладки
 3. Пелот для отведения верхней губы
 4. Расширяющий винт. Вестибулярная дуга Окклюзия
- А. Дистальная. Сужение верхнего зубного ряда
Б. Мезиальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Сагиттальная щель. Протрузия резцов на верхней челюсти
- А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
Б. 1-Г 2-В 3-А 4-В
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Щечные бугорки нижних боковых зубов в норме контактируют

- А. С небными бугорками верхних
Б. С продольными фиссурами верхних
В. Со щечными бугорками верхних
Г. Вестибулярными поверхностями верхних

Установите соответствие между аппаратом для функциональной диагностики и показателями Метод диагностики

- 1. Аксиограф**
 - 2. Миотонометр**
 - 3. Периотест**
 - 4. Электромиограф** Определяет
- А. Тонус мышц**
Б. Биопотенциалы мышц
В. Движение суставной головки
Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Прогнатия и ретрогнатия относятся к аномалиям

- А. Размера челюстей**
Б. Положения челюстей
В. Формы челюстей
Г. Положения и формы

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

- 1. Сагиттальный распил, расширяющий винт**
 - 2. Протрагирующие пружины в области резцов верхнего зубного ряда**
 - 3. Рукообразные пружины**
 - 4. Петля для устранения диастемы** Клиническая ситуация
- А. Оральное положение верхних резцов**
Б. Сужение верхнего зубного ряда
В. Латеральное положение центральных резцов
Г. Латеральное положение зубов
- А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его действия Элемент

1. Винт Бертони

2. Расширяющий винт

3. Кламмера Адамса

4. Протрагирующая пружина Функция

А. Одномоментно или поочередно расширить и удлинить зубной ряд

Б. Фиксация аппарата

В. Расширение зубного ряда

Г. Нормализация положения в вестиболо-оральном направлении

А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S

2. A'-Snр

3. <L1/ML

4. <A/N/V Характеристика

А. Длина апикального базиса верхней челюсти

Б. Длина переднего отдела основания черепа

В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение A'- Snр

2. Увеличение Pg'- Go

3. Увеличение U1-NL

4. Уменьшение U1-NL Окклюзия

А. Мезиальная

Б. Дистальная

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Глубокая резцовая

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

В. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Установите соответствие между аппаратом и их функцией Аппарат

- 1. Открытый активатор Кламмта с упором для языка и окклюзионными накладками**
 - 2. Пластика с секторальным размером в области первых моляров**
 - 3. Квадреликс**
 - 4. Маска Диляра Функция**
- А. Удлинение зубного ряда в боковом отделе**
Б. Вертикальная резцовая дизокклюзия
В. Расширения верхнего зубного ряда
Г. Нормализация положения верхней челюсти
- А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Резцовое перекрытие составляет более 1/3**
 - 2. Обратное перекрытие в области резцов верхней и нижней челюстей, смещение косметического центра**
 - 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля**
 - 4. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля Окклюзия**
- А. Мезиальная**
Б. Дистальная
В. Глубокая резцовая
Г. Обратная трансверсальная резцовая
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между методом функциональной диагностики и его показателями Метод диагностики

- 1. Электромиография**
 - 2. Аксиография**
 - 3. Миотонометрия**
 - 4. Периотестометрия Определяет**
- А. Тонус мышц**
Б. Биопотенциалы мышц
В. Движение суставной головки
Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Недостаток места может привести к аномалии

- А. Положения
- Б. Размера
- В. Формы
- Г. Структуры

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Открытый активатор Кламмта

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
- 2. Окклюзионные накладки отсутствуют
- 3. Сагиттальный распил. Установлен расширяющий винт
- 4. Упор для языка Окклюзия

А. Дистальная. Сужение верхнего зубного ряда

Б. Глубокая

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Протрузия резцов

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. A'-Snр

2. Co-Go

3. P_g'- Go

4. N-S Характеристика

А. Длина ветви нижней челюсти

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Длина апикального базиса верхней челюсти

Г. Длина переднего отдела основания черепа

А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <L1/ML

2. Pg'- Go

3. N-S

4. Co-Go Характеристика

А. Длина ветви нижней челюсти

Б. Длина переднего отдела основания черепа

В. Длина тела нижней челюсти

Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Резцовое перекрытие составляет более 1/3

2. Обратное перекрытие в области резцов верхней и нижней челюстей, смещение косметического центра

3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля

4. Несовпадение средней линии Окклюзия

А. Мезиальная

Б. Трансверсальная резцовая

В. Глубокая резцовая

Г. Обратная трансверсальная резцовая

А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Открытый активатор Кламмта

1. Вестибулярная дуга в области резцов нижней челюсти

2. Без окклюзионных накладок

3. Пелот для отведения верхней губы 4 Установлен расширяющий винт Окклюзия

А. Сужение верхнего зубного ряда

Б. Протрузия резцов

В. Глубокая резцовая

Г. Мезиальная

А. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Б 2-В 3-Г 4-А

Головная шапочка с подбородочной пращей позволяет

- А. Сдерживать рост нижней челюсти
- Б. Перемещать вперед верхний зубной ряд и верхнюю челюсть
- В. Стимулировать рост нижней челюсти
- Г. Сдерживать рост обеих челюстей

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Антропометрические параметры гипсовых моделей зубных рядов

- 1. Измерение ширины апикального базиса
 - 2. Измерение ширины зубного ряда
 - 3. Определение соотношения сумм резцов верхнего и нижнего зубных рядов
 - 4. Определение длины переднего участка верхнего зубного ряда
- Метод антропометрической диагностики**

А. Определение индекса Тонна

Б. Метод Пона

В. Метод Коркхауса

Г. Метод Хауса

А. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Б. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

В. 1-Б 2-В 3-Г 4-А

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии
Аппарат Персина

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
 - 2. Окклюзионные накладки
 - 3. Нижний губной пелот
 - 4. Заслонка для языка
- Окклюзия**

А. Протрузия верхних резцов

Б. Мезиальная

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Дистальная

А. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Б. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Пуговчатый кламмер
 2. Накусочная площадка
 3. Щечный щит
 4. Пелот Функция
- А. Интрузия нижних резцов
Б. Фиксация аппарата
В. Отведение мышц щек от альвеолярного отростка
Г. Отведение губы и стимуляция роста апикального базиса
- А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов
 2. Уменьшение $\angle$ SNB
 3. Зубоальвеолярное удлинение в области передних зубов
 4. Увеличение $\angle$ SNB Окклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Глубокая резцовая
Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в прямой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда расположена небно
 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно
 3. Косметический центр смещен вправо
 4. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена щечно Окклюзия
- А. Палатино-
Б. Лингво-
В. Трансверсальная резцовая
Г. Вестибуло-
- А. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение $\angle SNB$
 2. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов
 3. увеличение $\angle SNPg$
 4. Резцовое перекрытие более $2/3$ Окклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Глубокая резцовая
Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии Регулятор функций Френкеля

1. Пелот для отведения верхней губы
 2. Вестибулярная дуга
 3. Пелот для отведения нижней губы
 4. Протрагирующая дуга Окклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Протрузия резцов
Г. Дистальная окклюзия в сочетании с ретрузией верхних резцов
- А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Г. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Заслонка для языка
 2. Окклюзионные накладки
 3. Вестибулярная дуга
 4. Пелот Функция
- А. Нормализация положения языка
Б. Интрузия боковых зубов
В. Фиксация аппарата
Г. Отведение губы и стимуляция роста апикального базиса
- А. 1-Б 2-Г 3-В 4-А
Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

- 1. Упор для языка**
 - 2. Щечные щиты**
 - 3. Протрагирующая пружина**
 - 4. накусочная площадка**
- Функция**
- А. Нормализация положения языка**
 - Б. Интрузия резцов**
 - В. Отведение мышц щек от альвеолярного отростка**
 - Г. Нормализация положения зубов**
- А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Для нормализации положения зубов показан

- А. Позиционер с Setup зубов**
- Б. Преформированный ретейнер**
- В. Каппа Шварца**
- Г. Аппарат Кламмта**

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

- 1. $\angle S/N/Pg$**
 - 2. $A'-SnP$**
 - 3. $\angle L1/ML$**
 - 4. $\angle A/N/V$ Характеристика**
- А. Длина апикального базиса верхней челюсти**
Б. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа
В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <ML/NSL

2. <L1/ML

3. <U1/NL

4. <NL/NSL Характеристика

А. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти

Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

В. Положение основания нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Г. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Вестибулярная дуга

2. Губной пелот

3. Протрагирующая пружина

4. Петля для устранения диастемы Функция

А. Уплотнение зубного ряда

Б. Стимуляция роста апикального базиса

В. Отклонение вестибулярно зубов

Г. Нормализация положение центральных резцов

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его действия Элемент

1. Протрагирующая пружина

2. Расширяющий винт

3. Веерообразный винт

4. Вестибулярная дуга Функция

А. Нормализация положения зубов

Б. Фиксация аппарата

В. Расширить зубной ряд в переднем отделе

Г. Расширение верхнего зубного ряда

А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Аппарат для раскрытия срединного небного шва

- А. Небный бюгель
- Б. Аппарат Дерихсвайлера
- В. Бихеликс
- Г. Расширяющая пластинка

Плоскость основания верхней челюсти обозначается

- А. Ocl
- Б. ML
- В. NL
- Г. FH

Сроки прорезывания постоянных зубов

- А. 1 - 6-7 лет, 2- 7-8 лет, 4 - 8-9 лет, 3 - 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 6 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- Б. 6 - 6-7 лет, 1- 7-8 лет, 2 - 8-9 лет, 3 - 11-12 лет, 4 - 9-10 лет, 5 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- В. 1 - 6-7 лет, 2- 7-8 лет, 3 - 8-9 лет, 4 - 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 6 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- Г. 6 - 6-7 лет, 1- 7-8 лет, 2 - 8-9 лет, 4- 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 3 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <L1/ML

2. Co-Go

3. Pg'- Go

4. <A/N/B Характеристика

А. Длина тела нижней челюсти

Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Г. Длина ветви нижней челюсти

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <S/N/Pg

2. Co-Go

3. <A/N/B

4. A'-Snр Характеристика

А. Длина апикального базиса верхней челюсти

Б. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

В. Длина ветви нижней челюсти

Г. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Измерение ширины и длины апикального базиса

2. Соотношение суммы медиолатеральных размеров верхних и нижних резцов

3. Измерение медиолатеральных размеров резцов нижнего зубного ряда

4. Определение по таблице ширины зубных рядов в области премоляров Метод антропометрической диагностики

А. Определение индекса Тонна (1,33)

Б. Метод Пона

В. Определение индивидуальных размеров резцов верхнего зубного ряда

Г. Метод Хауса

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Аппарат

1. Пластика с секторальным распилом в области резцов верхней челюсти

2. Пластика с сагиттальным распилом

3. Аппарат Андресена-Гойпля

4. Pendulum Функция

А. Удлинение зубного ряда в переднем отделе

Б. Расширение зубного ряда верхней челюсти

В. Дистализация первых моляров

Г. Нормализация окклюзии

А. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Аппарат Норда предназначен для

- А. Симметричного расширения верхнего зубного ряда
- Б. Одностороннего расширения верхнего зубного ряда
- В. Раскрытия небного шва
- Г. Профилактики перекрестной окклюзии

Вестибулоокклюзия - это смещение

- А. Нижних или верхних боковых зубов в щечную сторону
- Б. Нижних или верхних боковых зубов в оральную сторону
- В. Только верхних боковых зубов в оральную сторону
- Г. Нижних передних зубов орально

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Клиническая ситуация

- 1. Глубокая резцовая окклюзия
- 2. Ретрузия резцов
- 3. Нарушение функции языка
- 4. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов

- Конструктивный элемент
- А. Секторальный распил с винтом
 - Б. Накусочную площадку
 - В. Заслонку для языка
 - Г. Окклюзионные накладки в области жевательной группы зубов

А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Метод Герлаха применяют для определения:

- А. Длины тела нижней челюсти
- Б. Ширины зубного ряда
- В. Пропорциональности размеров боковых и передних сегментов зубных рядов верхней и нижней челюстей
- Г. Лонгитудинальной длины зубного ряда

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Резцовое перекрытие составляет более 2/3**
 - 2. Обратное смыкание резцов**
 - 3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля**
 - 4. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля**
- Окклюзия**
- А. Мезиальная**
 - Б. Дистальная**
 - В. Глубокая резцовая дизокклюзия**
 - Г. Обратная трансверсальная резцовая**
- А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Аппарат Андресена-Гойпля по назначению является

- А. Лечебным**
- Б. Ретенционным**
- В. Профилактическим**
- Г. Комбинированным**

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

- 1. Расширяющий винт**
 - 2. Протрагирующая пружина**
 - 3. Рукообразная пружина**
 - 4. Петля для устранения диастемы**
- Функция**
- А. Расширение зубных рядов**
 - Б. Вестибулярное отклонение зубов**
 - В. Устранение трем**
 - Г. Устранение диастем**
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Коронка с распоркой на зуб 16 предназначена для

- А. Сохранения места 15**
- Б. Мезиализации 16**
- В. Дистализации 16**
- Г. Ротации 16**

Нейтральная (физиологическая) окклюзия соответствует классу энгля

- А. I
- Б. li
- В. lii
- Г. Iv

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. Pg'- Go

2. <L1/ML

3. <U1/NL

4. A'-Snр Характеристика

А. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Длина апикального базиса верхней челюсти

Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Линия, соответствующая основанию верхней челюсти, проводится через точки

- А. Pg-Go
- Б. N-S
- В. Ar-Go
- Г. Sna-Snp

Открытый активатор Кламмта относится к

- А. Профилактическим
- Б. Лечебным съемным
- В. Ретенционным
- Г. Лечебным несъемным

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Клиническая ситуация

1. Вертикальная резцовая дизокклюзия
 2. Ретрузия резцов
 3. Адентия
 4. Глубокая резцовая окклюзия Конструктивный элемент
- А. Секторальный распил
Б. Накусочную площадку
В. Искусственные зубы
Г. Оклюзионные накладки
- А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
Б. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Антропометрические параметры гипсовых моделей зубных рядов

1. Измерение медиолатеральных размеров резцов верхнего зубного ряда и определение их суммы
 2. Определение по таблице длины апикального базиса
 3. Определение по таблице ширины зубных рядов в области моляров
 4. Определение длины переднего участка верхнего зубного ряда Метод антропометрической диагностики
- А. Определение индекса Тонна
Б. Метод Пона
В. Метод Коркхауса
Г. Метод Хауса
- А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Г 3-Б 4-В
Г. 1-В 2-А 3-Б 4- Г

Регулятор функций Френкеля

1. Вестибулярная дуга в области резцов нижней челюсти
 2. Без окклюзионных накладок
 3. Пелот для отведения верхней губы
 4. Щечные щиты Окклюзия
- А. Дистальная и мезиальная
Б. Мезиальная
В. Протрузия резцов
Г. Дистальная
- А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
Б. 1-Б 2-В 3-Г 4-А
В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между конструкцией аппарата и его функцией Аппарат

- 1. Пластика с сагиттальным распилом**
 - 2. Регулятор функций Френкеля**
 - 3. Лицевая дуга**
 - 4. Наклонная плоскость Действие**
- А. Расширения зубного ряда**
Б. Нормализация окклюзии
В. Вестибулярное отклонение резцов
Г. Экструзия ,дистализация моляров
- А. 1-А 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии
Регулятор функций Френкеля

- 1. Пелот для отведения нижней губы**
 - 2. С окклюзионными накладками**
 - 3. Вестибулярная дуга**
 - 4. Протраггующая дуга Окклюзия**
- А. Мезиальная**
Б. Дистальная
В. Протрузия верхних резцов
Г. Ретрузия верхних резцов
- А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между методом функциональной диагностики и его показателями
Метод диагностики

- 1. Периотестометрия**
 - 2. Миотонометрия**
 - 3. Кинезиография**
 - 4. Электромиография Определяет**
- А. Тонус мышц**
Б. Биопотенциалы мышц
В. Движение нижней челюсти
Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке
- А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
Б. 1-В 2-Б 3-Г 4-А
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

- 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда расположена небно**
- 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно**
- 3. Косметический центр смещен вправо**
- 4. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена щечно**

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Трансверсальная резцовая

Г. Вестибуло-

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между клинической ситуацией и состоянием окклюзии

Клиническая ситуация

- 1. Протрузия резцов верхней челюсти**
- 2. Перекрытие в переднем отделе более 1/3 коронки**
- 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля**
- 4. Смещение косметического центра**

А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия

Б. Мезиальная

В. Глубокая резцовая

Г. Трансверсальная резцовая окклюзия

А. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Расстояния в области fossa canina на уровне верхушек корней первых премоляров верхней челюсти
2. Величина перпендикуляра проведенного от линии соединяющей дистальные поверхности первых моляров до вершины резцового сосочка
3. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров
4. Соотношение сумм мезиодистальных размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов

Метод антропометрической диагностики

А. Ширина апикального базиса верхней челюсти

Б. Длина апикального базиса верхней челюсти

В. Индекс Тонна

Г. Метод Коркхауса

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии состоянием окклюзии

Открытый активатор Кламмта

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
2. Без окклюзионных накладок
3. Пелот для отведения нижней губы
4. Сагиттальный распил. Установлен расширяющий винт

Окклюзия

А. Сужение зубного ряда

Б. Глубокая

В. Недоразвитие апикального базиса нижней челюсти

Г. Протрузия резцов

А. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Вестибулярные поверхности верхних резцов контактируют с нижними резцами
- 2.Зубоальвеолярное удлинение в области резцов верхней и нижней челюстей
- 3.Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля
4. Протрузия верхних резцов и ретрузия нижних Окклюзия

А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия

Б. Дистальная окклюзия

В. Глубокая резцовая

Г. Обратная резцовая окклюзия

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $\angle$ SNB
2. Зубоальвеолярное укорочение в области передних зубов
- 3.Зубоальвеолярное удлинение в области передних зубов
4. Уменьшение $\angle$ SNB Окклюзия

А. Мезиальная

Б. Дистальная

В. Глубокая резцовая

Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия

А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Обратное соотношение резцов верхней и нижней челюстей
2. Смещение косметического центра вправо
- 3.Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля
4. Снижение нижней трети лица. Окклюзия

А. Мезиальная

Б. Трансверсальная

В. Глубокая резцовая

Г. Обратная резцовая

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Регулятор функций Френкеля

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти**
 - 2. Без окклюзионных накладок**
 - 3. Пелот для отведения нижней губы**
 - 4. Пелот для отведения верхней губы**
- Окклюзия**
- А. Дистальная II класс I подкласс.**

Б. Глубокая

В. Недоразвитие аппикального базиса верхней челюсти

Г. Недоразвитие аппикального базиса нижней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Б 2-В 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

- 1. Секторальный распил с винтом**
 - 2. Вестибулярная дуга**
 - 3. Рукообразные пружины**
 - 4. Петля для устранения диастемы**
- Клиническая ситуация**

А. Мезиальное смещение первого моляра справа

Б. Латеральное положение зубов

В. Протрузия резцов верхнего зубного ряда

Г. Латеральное положение центральных резцов

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Порядок прорезывания временных зубов

А. I - II - III - IV - V

Б. I - II - IV - III - V

В. II - I - III - IV - V

Г. I - II - V - IV - III

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

- 1. Расширяющий винт**
 - 2. Оклюзионные накладки в области боковых зубов**
 - 3. Веерообразный винт**
 - 4. Кламмер Адамса** Функция
 - А. расширение зубных рядов**
 - Б. Интрузия боковых зубов**
 - В. Расширение зубного ряда в переднем участке**
 - Г. Фиксация аппарата**
- А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

- 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена щечно**
 - 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно**
 - 3. Косметический центр смещен вправо**
 - 4. Одностороннее сужение верхней челюсти** Окклюзия
 - А. Палатино-**
 - Б. Лингво-**
 - В. Вестибуло-**
 - Г. Трансерсальная резцовая**
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
В. 1-В 2-Б 3-Г 4-А
Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

По способу фиксации аппарат Андресена-гойпля

- А. Съемный
Б. Профилактический
В. Ретенционный
Г. Несъемный

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Активация

1. Винта и вестибулярной дуги в расширяющей пластинке
2. Петли для устранения диастемы
3. Протрагирующей пружины
4. Рукообразной пружины Функция

- А. Расширяется и укорачивается
- Б. Медиальное смещение центральных резцов
- В. Отклоняет вестибулярно
- Г. Нормализует положение отдельных групп зубов

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Аппарат

1. Пластика с секторальным распилом в области первых моляров
2. Пластика с сагиттальным распилом
3. Открытый активатор Кламита
4. Круглый кламер Функция

- А. Удлинение зубного ряда
- Б. Нормализация окклюзии
- В. Расширение зубного ряда
- Г. Фиксация аппарата

А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для нижней челюсти

1. Сагиттальный распил, расширяющий винт
2. Секторальный распил в области первого моляра слева
3. Рукообразные пружины
4. Петля для устранения диастемы Клиническая ситуация

- А. Мезиальное смещение первого моляра слева
- Б. Латеральное положение центральных резцов
- В. Латеральное положение зубов
- Г. Сужение зубного ряда. Протрузия резцов

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Самая глубокая точка апикального базиса нижней челюсти

- А. Gn
- Б. Go
- В. В
- Г. Me

Установите соответствие между аппаратом и показаниями его применения Аппарат

- 1. Регулятор функций Френкеля III типа**
- 2. Регулятор функции Френкеля II типа**
- 3. Регулятор функции Френкеля I типа**
- 4. Пластина с окклюзионными накладками Лечение окклюзии**

- А. Дистальная II класс I подкласс**
- Б. Мезиальная**
- В. Дистальная II класс II подкласс**
- Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия**

- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
- Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
- В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
- Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Уменьшение $\angle SNA$**
- 2. Уменьшение $\angle SNB$**
- 3. Зубоальвеолярное укорочение в области резцов верхнего зубного ряда**
- 4. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов верхнего зубного ряда Окклюзия**

- А. Глубокая резцовая окклюзия**
- Б. Дистальная**
- В. Вертикальная резцовая дизокклюзия**
- Г. Мезиальная**

- А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
- Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
- В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
- Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Лицевая дуга фиксируется на

- А. Верхней челюсти
- Б. Нижней челюсти
- В. Верхней и нижней челюсти
- Г. подбородке

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение $\angle B$
 2. Зубоальвеолярное укорочение в области передних зубов
 3. Уменьшение $\angle SNA$
 4. Увеличение $\angle SNA$ Окклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Глубокая резцовая окклюзия
Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Г. 1-В 2-Г 3-В 4-А

Установите соответствие между состоянием мягких тканей полости рта и формированием нарушения Состояние мягких тканей полости рта

1. Низкое прикрепление уздечки верхней губы
 2. Укорочение уздечки языка
 3. Мелкое преддверие
 4. Тяжи Нарушение
- А. Недоразвитие переднего участка нижнего зубного ряда
Б. Латерального положения центральных резцов
В. Рецессия десны в области передних зубов
Г. Рецессия десны в области боковых зубов
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle 1/1$ "alfa"
 2. $A'-SnP$
 3. $\angle A/N/V$
 4. $Pg'-Go$ Характеристика
- А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
Б. Длина тела нижней челюсти
В. Длина апикального базиса верхней челюсти
Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей
- А. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Ортопантомографию в ортодонтии применяют для определения

- А. Длины верхней челюсти
- Б. Длины нижней челюсти
- В. Наличия зачатков постоянных зубов
- Г. Ширины зубных рядов

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

- 1. $\angle A/N/B$
- 2. $\angle 1/1$ "alfa"
- 3. $\angle S/N/Pg$

4. $\angle NL/ML$ "B" Характеристика

- А. Взаимоположение оснований верхней и нижней челюстных костей
- Б. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
- В. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа
- Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

- А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
- Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
- В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
- Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Обратное соотношение резцов верхней и нижней челюстей
- 2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов верхней и нижней челюстей
- 3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля
- 4. Протрузия верхних резцов Окклюзия

- А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия
- Б. Дистальная
- В. Глубокая резцовая
- Г. Обратная резцовая

- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
- Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
- В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
- Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Антропометрические параметры гипсовых моделей зубных рядов

- 1. Измерение медиолатеральных размеров резцов верхнего зубного ряда и ширины между премолярами**
 - 2. Измерение лонгитудинальной длины зубного ряда**
 - 3. Определение соотношения сумм резцов верхнего и нижнего зубных рядов**
 - 4. Определение длины переднего участка верхнего зубного ряда Метод антропометрической диагностики**
- А. Определение индекса Тонна**
Б. Метод Пона
В. Метод Коркхауса
Г. Метод Нанса
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Губной пелот служит для

- А. Расширения нижнего зубного ряда
Б. Стимуляции роста апикального базиса челюстей в переднем отделе
В. Укорочения нижнего зубного ряда
Г. Сдерживания роста нижней челюсти

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Уменьшение $\angle$ SNB и увеличение наружного $\angle$ U1/NL**
 - 2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов нижней челюсти**
 - 3. Уменьшение $\angle$ SNB и уменьшение наружного $\angle$ U1/NL**
 - 4. Увеличение $\angle$ В Оклюзия**
- А. Глубокая резцовая окклюзия**
Б. Дистальная II класс I подкласс
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Дистальная глубокая окклюзия II класс II подкласс
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-Г 2-А 3-Б 4-В
В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Г. 1-А 2-В 3-Г 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

- 1. Расширяющий винт**
 - 2. Секторальный распил в области первого моляра**
 - 3. Протрагирующие пружины**
 - 4. Петля для устранения диастемы**
- Клиническая ситуация**
- А. Сужение зубного ряда**
 - Б. Латеральное положение центральных резцов**
 - В. Мезиальное смещение моляра**
 - Г. Оральное положение зубов**
- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Вестибулоокклюзия относится к аномалиям окклюзии в направлении

- А. Сагиттальном**
- Б. Вертикальном**
- В. Трансверсальном**
- Г. Сагиттальном и вертикальном**

Установите соответствие между аппаратом и его показаниями

- Аппарат**
- 1. Открытый активатор Кламмта с винтом**
 - 2. Пластика с секторальным размером в области первых моляров**
 - 3. Квадхеликс**
 - 4. Маска Дилера**
- Функция**
- А. Нормализация окклюзии и расширения зубных рядов**
 - Б. Удлинение зубного ряда**
 - В. Расширение зубных рядов**
 - Г. Нормализация положения верхней челюсти**
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
Г. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Установите соответствие между соотношением первых моляров по Энгля и состоянием окклюзии

- Соотношение первых моляров**
1. 1-ый класс
 2. 2-ой класс I подкласс
 3. 2-ой класс II подкласс
 4. III класс
- Состояние окклюзии**
- А. Физиологическая
 - Б. Меziальная
 - В. Дистальная с протрузией резцов верхней челюсти
 - Г. Дистальная с ретрузией резцов верхней челюсти
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Установите соответствие между аппаратом и показаниями его применения

- Аппарат**
1. Небный бюгель Гожгариана
 2. Андресена-Гойпля
 3. Пластиночный аппарат с секторальным распилом
 4. Пластиночный аппарат с расширяющим винтом
- Показания**
- А. Ротация первых моляров
 - Б. Нарушение окклюзии
 - В. Укорочения зубного ряда
 - Г. Сужение зубного ряда
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Небные бугорки верхних временных моляров 3 -х летнего ребенка располагаются

- А. На одном уровне с язычными бугорками нижних моляров
- Б. В продольной фиссуре нижних моляров
- В. Вестибулярнее щечных бугорков нижних моляров
- Г. На одном уровне с щечными бугорками нижних моляров

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Измерение медиолатеральных размеров резцов верхнего зубного ряда
2. Построение линии соединяющей точки Пона на первых премолярах
3. Определение величины перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров
4. Соотношение суммы медиолатеральных размеров резцов верхнего и нижнего зубных рядов

Метод антропометрической диагностики

- А. Определение индекса Тонна (1,33)
Б. Пона
В. Определение индивидуальных размеров резцов верхнего зубного ряда
Г. Коркхауса

- А. 1-В 2-Б 3-Г 4-А
Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между соотношением первых моляров по Энгию и состоянием окклюзии Соотношение первых моляров

1. 1-ый класс
 2. 2-ой класс I подкласс
 3. 2-ой класс II подкласс
 4. III класс Состояние окклюзии
- А. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается в поперечной фиссуре нижнего первого моляра
Б. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Протрузия резцов верхней челюсти
В. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Ретрузия резцов верхней челюсти
Г. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается позади поперечной фиссуры нижнего первого моляра

- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Установите соответствие между клинической ситуацией и состоянием окклюзии

Клиническая ситуация

- 1. Ретрузия резцов верхней челюсти**
 - 2. Сагиттальная щель 8,0 мм**
 - 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля**
 - 4. Смещение косметического центра Окклюзия**
- А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия**
Б. Мезиальная
В. Глубокая резцовая
Г. Трансверсальная резцовая
- А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Г. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Аппарат Андресена-Гойпля

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти**
 - 2. С окклюзионными накладками**
 - 3. Пелот для отведения нижней губы**
 - 4. Сагиттальный распил. Установлен расширяющий винт Окклюзия**
- А. Протрузия резцов**
Б. Недоразвитие апикального базиса нижней челюсти
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Сужение зубных рядов
- А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Увеличение $\angle B$**
 - 2. Увеличение $\angle SNA$**
 - 3. Протрузия верхних резцов**
 - 4. Снижение нижней трети лица Окклюзия**
- А. Глубокая резцовая дизокклюзия**
Б. Дистальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Сагиттальная резцовая дизокклюзия
- А. 1-В 2-Б 3-Г 4-А
Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Г. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии состоянием окклюзии

Открытый активатор Кламмта

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти

2. Оклюзионные накладки

3. Пелот для отведения верхней губы

4. Расширяющий винт. Вестибулярная дуга Окклюзия

А. Дистальная. Сужение верхнего зубного ряда

Б. Мезиальная

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Протрузия резцов на верхней челюсти

А. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение $A'-SnP$

2. Уменьшение $Pg'-Go$

3. Увеличение $U1-NL$

4. Увеличение $<B$ Окклюзия

А. Мезиальная

Б. Дистальная

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Глубокая резцовая

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

В. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для нижней челюсти

1. Сагиттальный распил, расширяющий винт

2. Секторальный распил в области первого моляра слева

3. Секторальный распил в области верхних резцов

4. Петля для устранения диастемы Клиническая ситуация

А. Сужение нижнего зубного ряда

Б. Уплотнение переднего участка нижнего зубного ряда

В. Мезиальное смещение первого моляра

Г. Латеральное положение центральных резцов

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Внеротовым является аппарат

- А. Лицевая дуга
- Б. Губной бампер
- В. Упор для языка
- Г. Небный бюгель

Окклюзионная плоскость обозначается

- А. Ocl
- Б. ML
- В. NL
- Г. FH

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Измерение ширины апикальных базисов
 2. Произведение суммы медиолатеральных размеров резцов нижнего зубного ряда на индекс Тонна (1,33)
 3. Измерение медиолатеральных размеров резцов верхнего и нижнего зубного ряда и определение соотношения их сумм
 4. Определение по таблице ширины зубных рядов в области премоляров
- Метод антропометрической диагностики
- А. Определение индекса Тонна
 - Б. Метод Пона
 - В. Определение индивидуальных размеров резцов верхнего зубного ряда
 - Г. Метод Хауса
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
 - Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
 - В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
 - Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Макродентия - это

- А. Уменьшение размеров зубов
- Б. Увеличение количества зубов
- В. Увеличение размеров зубов
- Г. Уменьшение количества зубов

Первый и второй подклассы II класса Энгля различаются положением

- А. Моляров
- Б. Клыков
- В. Резцов
- Г. Челюстей

Квадхеликс по способу фиксации

- А. Ретенционный
- Б. Профилактический
- В. Несъемный
- Г. Съемный

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Клиническая ситуация

1. Вертикальная резцовая дизокклюзия
 2. Ретрузия резцов
 3. Адентия
 4. Глубокая резцовая окклюзия
- Конструктивный элемент
- А. Протрагирующая пружина
 - Б. Накусочную площадку
 - В. Заслонку для языка
 - Г. Искусственные зубы
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Обратное соотношение резцов верхней и нижней челюстей
 2. Смещение косметического центра вправо
 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля
 4. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля
- Окклюзия
- А. Мезиальная
 - Б. Трансверсальная
 - В. Дистальная
 - Г. Обратная резцовая
- А. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <NL/NSL

2. A'-Snр

3. <A/N/B

4. Pg'- Go Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Длина апикального базиса верхней челюсти

Г. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Заслонка для языка

2. Оклюзионные накладки в области боковых зубов

3. Протрагирующая пружина

4. Петля для устранения диастемы Функция

А. Интрузия боковых зубов

Б. Нормализация положения языка

В. Нормализация положения передних зубов

Г. Медиальное смещение резцов

А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Аппарат Pendulum предназначен для

А. Равномерного расширения зубного ряда

Б. Расширения и укорочения переднего отдела зубного ряда

В. Удлинения зубного ряда

Г. Дистализации первых верхних моляров

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы с состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы

- 1. Уменьшение $\angle SNA$**
 - 2. Зубоальвеолярное укорочение в области боковых зубов**
 - 3. Одностороннее сужение верхней челюсти**
 - 4. Ретрузия резцов верхней и нижней челюстей Окклюзия**
- А. Мезиальная**
Б. Дистальная, глубокая
В. Палатиноокклюзия
Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

К специальным методам диагностики в ортодонтии относятся

- А. Осмотр полости рта, функциональные пробы**
Б. Опрос, рентгенологические, функциональные, графические
В. Опрос, осмотр, измерение гипсовых моделей челюстей
Г. Функциональные, графические, кефалометрические

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

- 1. $\angle A/N/B$**
 - 2. $\angle 1/1$ "alfa"**
 - 3. $\angle S/N/Pg$**
 - 4. $Pg'-Go$ Характеристика**
- А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей**
Б. Длина тела нижней челюсти
В. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа
Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S

2. Co-Go

3. Pg'- Go

4. <A/N/B Характеристика

А. Длина тела нижней челюсти

Б. Длина переднего отдела основания черепа

В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Г. Длина ветви нижней челюсти

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Губной пелот

2. Кламмера Адамса

3. Рукообразная пружина

4. Вестибулярная дуга Функция

А. Нормализация положения отдельных зубов

Б. Стимуляции роста апикального базиса челюсти в переднем отделе

В. Устранение прогрузии резцов

Г. Фиксация аппарата

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-В 4- Г

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Соотношение сумм медиолатеральных размеров резцов верхнего и нижнего зубных рядов
 2. Расстояния в области fossa canina на уровне верхушек корней первых премоляров верхней челюсти
 3. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров
 4. Измерение ширины зубных рядов в области моляров и премоляров Метод антропометрической диагностики
- А. Ширина апикального базиса верхней челюсти
Б. Метод Тонна
В. Метод Коркхауза
Г. Метод Пона
- А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Низкое прикрепление уздечки верхней губы является причиной

- А. Ретенции центральных резцов верхней челюсти
Б. Латерального положения центральных резцов, диастемы
В. Транспозиции резцов
Г. Дистальной окклюзии

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S
 2. Co-Go
 3. $\angle L1/ML$
 4. $\angle A/N/B$ Характеристика
- А. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти
Б. Длина ветви нижней челюсти
В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
Г. Длина переднего отдела основания черепа
- А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $\angle$ SNB
 2. Увеличение $\angle$ SNA
 3. Укорочение переднего отдела верхнего зубного ряда
 4. Соотношение клыков справа по III, слева по II классу Энгля Окклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Обратная резцовая дизокклюзия
Г. Трансверсальная резцовая
- А. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-Б
Б. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г
В. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-Б
Г. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение $\angle$ SNB
 2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов на верхней и нижней челюстях
 3. Зубоальвеолярное укорочение в области боковых зубов на верхней и нижней челюстях
 4. Увеличение $\angle$ SNB Окклюзия
- А. Глубокая резцовая дизокклюзия
Б. Дистальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Мезиальная
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Измерение ширины зубных рядов
 2. Измерение мезиодистальных размеров зубов нижних резцов и определение их суммы
 3. Определение соотношения сумм размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов
 4. Измерение длины апикального базиса Метод антропометрической диагностики
- А. Определение индекса пропорциональности зубных рядов (1,08)
Б. Метод Пона
В. Метод Тонна
Г. Метод Хауса
- А. 1-Г 2-А 3-Б 4-Г
Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
В. 1-А 2-Б 3-Б 4-Г
Г. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Франкфуртская горизонталь обозначается

- A. Ocl
- Б. MIL
- В. NL
- Г. FH

Плоскость переднего отдела основания черепа обозначается

- A. Ocl
- Б. ML
- В. NL
- Г. NS

Установите соответствие между аппаратом и его свойствами Аппарат

1. Регулятор функций Френкеля III типа
2. Pendulum
3. Открытый активатор Кламмта
4. Пластина с наклонной плоскостью Свойства аппарата

- A. Механический
- Б. Функциональный
- В. Комбинированный
- Г. Съёмный

- A. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
- Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
- В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
- Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Веерообразный винт
 2. Губной пелот
 3. Протрагирующая пружина
 4. Рукообразная пружина Функция
- A. Стимуляция роста апикального базиса
 - Б. Отклонение вестибулярно зубов
 - В. Расширение зубного ряда в переднем отделе
 - Г. Нормализация положения отдельных зубов

- A. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
- Б. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
- В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
- Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Аппарат

1. Пластика с секторальным распилом в области резцов нижней челюсти

2. Pendulum

3. Аппарат Андресена-Гойпля

4. Пластика с накусочной площадкой Функция

А. Удлинение зубного ряда в переднем отделе

Б. Удлинение зубного ряда

В. Нормализация окклюзии

Г. Интрузия резцов нижней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Резцы в/ч в норме контактируют с резцами н/ч

А. Небной поверхностью

Б. Режущим краем

В. Вестибулярной поверхностью

Г. Апроксимальной поверхностью

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена небно

2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно

3. Косметический центр смещен влево

4. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена вестибулярно Окклюзия

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Трансверсальная резцовая

Г. Вестибуло-

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Дистальные поверхности вторых временных моляров 6-летнего ребенка располагаются

А. В одной вертикальной плоскости

Б. С мезиальной ступенькой

В. С дистальной ступенькой

Г. С латеральной ступенькой

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Вестибулярная дуга
 2. Оклюзионные накладки
 3. Пелот для отведения губы
 4. Щечные щиты Функция
- А. Фиксирующий элемент
Б. Интрузия
В. Отведение мышц щек от альвеолярного отростка
Г. Отведение губы и стимуляция роста апикального базиса
- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент 1
Расширяющий винт

2. Губной пелот
 3. Протрагирующая пружина
 4. Петля для устранения диастемы Функция
- А. Стимуляция роста апикального базиса
Б. Равномерное расширение зубного ряда
В. Отклонение вестибулярно
Г. Нормализация положения центральных резцов
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $\angle SNA$
 2. Зубоальвеолярное укорочение в области резцов на верхней и нижней челюстях
 3. Зубоальвеолярное укорочение в области боковых зубов на верхней и нижней челюстях
 4. Протрузия верхних резцов Окклюзия
- А. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Б. Дистальная
В. Сагиттальная резцовая дизокклюзия
Г. Дизокклюзия
- А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и антропометрическими точками черепа Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Плоскость основания нижней челюсти
2. Оклюзионная плоскость
3. Заднего отдела основания черепа
4. Ось нижних резцов Антропометрический параметр черепа

1. Gn-Go

2. Ocp

3. S-Ba

4. L1/ML

A. 1-B 2-A 3-B 4-Г

Б. 1-Г 2-A 3-B 4-Б

В. 1-A 2-B 3-Б 4-Г

Г. 1-A 2-Б 3-B 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Аппарат Андресена-Гойпля

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
2. Без окклюзионных накладок
3. Пелот для отведения верхней губы
4. Капюшон на нижних резцах Окклюзия

A. Протрузия нижних резцов

Б. Глубокая

В. Недоразвитие апикального базиса верхней челюсти

Г. Протрузия верхних резцов

A. 1-B 2-Б 3-Г 4-A

Б. 1-A 2-Б 3-Г 4-B

В. 1-Г 2-Б 3- В 4-A

Г. 1-A 2-Г 3-B 4-Б

Установите соответствие между аппаратом для функциональной диагностики и показателями Метод диагностики

1. Периотест
 2. Миотонометр
 3. Кинезиограф
 4. Электромиограф Определяет
- A. Тонус мышц
- Б. Биопотенциалы мышц
- В. Движение нижней челюсти
- Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке

A. 1-A 2-Г 3-B 4-Б

Б. 1-Г 2-A 3-B 4-Б

В. 1-Б 2-A 3-Г 4-B

Г. 1-A 2-Б 3-Г 4-B

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение <SNA

2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов на верхней и нижней челюстях

3. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов на верхней и нижней челюстях

4. Уменьшение <SNA **Окклюзия**

А. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Б. Дистальная

В. Мезиальная

Г. Глубокая

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

1. Сагиттальный распил, расширяющий винт

2. Секторальный распил в области первого моляра слева

3. Рукообразные пружины, петля для устранения диастемы

4. Секторальный распил в области верхних резцов **Клиническая ситуация**

А. Тремы. Латеральное положение центральных резцов

Б. Уплотнение переднего участка верхнего зубного ряда

В. Сужение. Протрузия резцов верхнего зубного ряда

Г. Мезиальное смещение первого моляра слева

А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

По месту расположения аппарат Норда

А. Внеротовой

Б. Внутриротовой, одночелюстной

В. Комбинированный

Г. Одночелюстной

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

1. Сагиттальный распил, расширяющий винт
2. Секторальный распил в области первого моляра слева
3. Рукообразные пружины
4. Петля для устранения диастемы

Клиническая ситуация

А. Латеральное положение зубов

Б. Латеральное положение центральных резцов

В. Сужение верхнего зубного ряда

Г. Укорочение зубного ряда слева

А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Г. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Активация изгибов вестибулярной дуги аппарата способствует

А. Оральному смещению резцов

Б. Мезиоальному смещению резцов верхней челюсти

В. Мезиальному смещению резцов нижней челюсти

Г. Внедрению моляров

N-S линия - плоскость

А. Основания верхней челюсти

Б. Основания нижней челюсти

В. Переднего отдела основания черепа

Г. Франкфуртская горизонталь

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для нижней челюсти

1. Сагиттальный распил, расширяющий винт
2. Секторальный распил в области первого моляра слева
3. Рукообразные пружины, петля для устранения диастемы
4. Протрагирующая пружина

Клиническая ситуация

А. Тремы, латеральное положение центральных резцов

Б. Небный наклон центрального резца

В. Сужение зубного ряда

Г. Укорочение зубного ряда слева

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle 1/1$ "alfa"

2. $\angle A/N/B$

3. $\angle S/N/Pg$

4. $\angle NL/NSL$ Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

В. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Диастема устраняется с помощью

А. Рукообразных пружин

Б. Кламмеров Адамса

В. Базиса

Г. Винта

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена небно

2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно

3. Косметический центр смещен влево

4. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена вестибулярно Оклюзия

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Вестибуло-

Г. Трансверсальная резцовая

А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Передняя точка носовой ости

А. Co

Б. Snp

В. Go

Г. Sna

Установите соответствие между аппаратом и показаниями его применения Аппарат

- 1. Регулятор функций Френкеля II типа**
- 2. Расширяющая пластинка**
- 3. Пластика с секторальным распилом**
- 4. Пластика с окклюзионными накладками Лечение окклюзии**
- А. Дистальная II класс II подкласс**
- Б. Сужение зубных рядов**
- В.Зубоальвеолярное удлинение в области жевательной группы зубов**
- Г. Уплотнение переднего участка зубного ряда**

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Вредная привычка сосания большого пальца способствует

- А. Протрузии верхних и ретрузии нижних резцов**
- Б. Сужению зубных рядов**
- В. Нарушению осанки**
- Г. Нарушению функции языка**

Установите соответствие между аппаратом и их функцией Аппарат

- 1. Маска Диляра**
- 2.Аппарат Персина**
- 3.Лицевая дуга с головной тягой**
- 4.Квадхеликс Функция**
- А. Интрузия моляров**
- Б. Нормализация окклюзии**
- В. Нормализация положения верхней челюсти**
- Г. Расширение верхнего зубного ряда**

А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Задняя точка верхней челюсти

- А. Co**
- Б. Snp**
- В. Go**
- Г. Sna**

Установите соответствие между антропометрическим анализом и его показателями

Антропометрический анализ

- 1. Премолярный индекс Пона**
- 2. Молярный индекс Пона**
- 3. Индекс Тонна**
- 4. Болтона Показатели**

А. 80

Б. 1,08

В. 1,33

Г. 64

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Аппарат Брюкля предназначен для

А. Сужения верхнего зубного ряда

Б. Нормализации окклюзии в сагиттальном направлении

В. Нормализации окклюзии в трансверсальном направлении

Г. Укорочения нижнего зубного ряда

Установите соответствие между состоянием окклюзии и соотношением первых моляров

Соотношение первых моляров

1. Физиологическая

2. Мезиальная

3. Дистальная с протрузией резцов верхней челюсти

4. Дистальная с ретрузией резцов верхней челюсти **Состояние окклюзии**

А. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается в поперечной фиссуре нижнего первого моляра

Б. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Протрузия резцов верхней челюсти

В. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Ретрузия резцов верхней челюсти

Г. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается позади поперечной фиссуры нижнего первого моляра

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы:

1. Увеличение $\angle B$
 2. Зубоальвеолярное удлинение e в области передних зубов
 3. Одностороннее сужение верхней челюсти
 4. Уменьшение $\angle SNA$ Окклюзия
- А. Палатиноокклюзия
Б. Мезиальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Глубокая резцовая окклюзия
- А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Базальная дуга нижней челюсти

- А. Меньше альвеолярной дуги на 5 мм
Б. Больше альвеолярной дуги
В. Равна альвеолярной дуге
Г. Меньше альвеолярной дуги на 3 мм

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle 1/1$ "alfa"
 2. $\angle U1/NL$
 3. $\angle L1/ML$
 4. $\angle ML/NSL$ Характеристика
- А. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти
Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти
В. Положение основания нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа
Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
В. 1-Г 2-А 3-Б 4-В
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между аппаратом и их функцией Аппарат

1. Маска Диляра

2. Небный бюгель

3. Лицевая дуга с головной тягой

4. Аппарат Норда Функция

А. Деротация моляров

Б. Интрузия моляров

В. Разрыв небного шва

Г. Нормализация положения верхней челюсти

А. 1-Г 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-В 2-Б 3-Г 4-Г

В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

**Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии
Регулятор функций Френкеля**

1. Вестибулярная дуга в области резцов нижней челюсти

2. Окклюзионные накладки

3. Пелот для отведения верхней губы

4. Протрагирующая дуга Окклюзия

А. Недоразвитие аппикального базиса верхней челюсти

Б. Мезиальная

В. Протрузия резцов

Г. Дистальная окклюзия в сочетании с ретрузией верхних резцов

А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-Д

В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Г. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Профиль при дистальной окклюзии чаще бывает

А. Вогнутым

Б. Выпуклым

В. Нейтральным

Г. Прямым

Неправильное мезио-дистальное соотношение первых постоянных моляров может быть обусловлено

А. Снижением окклюзионной высоты

Б. Ранней потерей второго временного моляра

В. Физиологической стираемостью

Г. Патологической стираемостью

Аппарат персина для лечения мезиальной окклюзии позволяет

- А. Сдерживать рост апикального базиса верхней челюсти
- Б. Стимулировать рост апикального базиса верхней челюсти
- В. Расширять зубные ряды
- Г. Стимулировать рост апикального базиса нижней челюсти

К возможному осложнению в ходе перемещения зубов относят

- А. Резорбцию корней
- Б. Ятрогенный пульпит
- В. Гиперэстезию эмали зубов
- Г. Афты слизистой полости рта

К клиническим этапам изготовления ортодонтических аппаратов относят

- А. Гипсование восковой модели аппарата в кювете
- Б. Снятие оттисков
- В. Пакование в кювету жесткой акриловой пластмассы
- Г. Изгибание фиксирующих кламмеров

По способу фиксации ортодонтические аппараты делятся на

- А. Внутриротовые и внеротовые
- Б. Несъемные, съемные, сочетанные
- В. Одночелюстные, одночелюстные межчелюстного действия, двухчелюстные, внеротовые, сочетанные
- Г. Дуговые, капповые, пластиночные, блоковые, каркасные, эластичные

Адентия боковых резцов верхней челюсти чаще сочетается с ретенцией

- А. Первых премоляров
- Б. Клыков
- В. Вторых премоляров
- Г. Центральные резцов

При резко выраженном сужении верхней челюсти у детей с врожденной сквозной расщелиной верхней губы и нёба в период постоянного прикуса для ее расширения целесообразно применять

- А. Аппарат Дерихсвайлера с винтом Хайрекса
- Б. Пластинку с пружиной Коффина
- В. Активатор Вундерера
- Г. Пластинку с винтом Бертони

В результате силового воздействия ортодонтического аппарата резорбция костной ткани происходит в лунке зуба

- А. Справа от зоны давления
- Б. Слева от зоны тяги
- В. В зоне давления
- Г. В зоне тяги

Аппарат норда классифицируется как

- А. Профилактический
- Б. Лечебный съемный
- В. Ретенционный
- Г. Лечебный несъемный

Функциональный метод исследования, основанный на регистрации биоэлектрических потенциалов, возникающих в мышцах в момент возбуждения, называют

- А. Реопародонтографией
- Б. Миотонометрией
- В. Элетромиографией
- Г. Аксиографией

Принцип действия аппарата френкеля

- А. Комбинированный
- Б. Механический
- В. Ретенционный
- Г. Функциональный

При переносе брекета с левой стороны зубного ряда на правую или наоборот в рамках одной челюсти

- А. Торк не меняется, ангуляция меняется
- Б. Ротация меняется, ангуляция меняется
- В. Торк меняется, ангуляция не меняется
- Г. Ротация не меняется, ангуляция не меняется

Толщина дистального отдела суставного диска составляет ____ мм

- А. 5-2
- Б. 3-4
- В. 5-1.5
- Г. 0-1

Ранним клиническим симптомом сужения зубных рядов является

- А. Увеличение фронтального участка
- Б. Уплотнение фронтального участка
- В. Уменьшение ширины зубного ряда
- Г. Тесное положение зубов

На трг головы в боковой проекции по методу fastlight определяются параметры наклона резцов относительно

- А. Co-A: Co-B; NSL\\ML
- Б. NSL; N-Ba; ArGoMe
- В. N-A; N-B; NSBa
- Г. NL; ML; Ocp; NL\\ML

Ангуляцией называется

- А. Вестибуло-оральный наклон зуба
- Б. Поворот зуба по оси
- В. Наклон верхних резцов относительно нижних
- Г. Мезио-дистальный наклон зуба

Петлю рейхенбаха используют для

- А. Лечения открытой окклюзии
- Б. Закрытия диастем
- В. Закрытия трем
- Г. Лечения дистальной окклюзии

Нарушение носового дыхания приводит к

- А. Расширению верхнего зубного ряда
- Б. Сужению нижнего зубного ряда
- В. Сужению верхнего зубного ряда
- Г. Расширению нижнего зубного ряда

Инклинацией называется

- А. Поворот зуба по оси
- Б. Вестибуло-оральный наклон зуба
- В. Наклон верхних резцов относительно нижних
- Г. Мезио-дистальный наклон зуба

Углом трансверсального суставного пути (угол беннета) называется угол, образованный между линиями

- А. Вертикального и трансверсального суставного пути в сагиттальной плоскости
- Б. Сагиттального и трансверсального суставного пути в вертикальной плоскости
- В. Сагиттального и трансверсального суставного пути в горизонтальной плоскости
- Г. Вертикального и трансверсального суставного пути в горизонтальной плоскости

Верхний зубной ряд у ребенка 3 лет имеет форму

- А. Полуэллипса
- Б. Полукруга
- В. Трапеции
- Г. Параболы

Протезирование у детей можно проводить

- А. В 5-7 лет
- Б. В 3-4 года
- В. Без возрастных ограничений
- Г. В 12-14 лет

Увеличение числа зубов по сравнению с нормой называют

- А. Макроодонтией
- Б. Гипоодонтией
- В. Микроодонтией
- Г. Гиперодонтией

По назначению ортодонтические аппараты подразделяются на

- А. Пластиночные, дуговые, блоковые, каркасные, капповые
- Б. Профилактические, лечебные, ретенционные
- В. Несъемные, съемные, сочетанные
- Г. Взаимодействующие (реципроктные), стационарные

Методом обследования, позволяющим наиболее точно оценить строение лицевого скелета, является

- А. Внутриротовая рентгенография
- Б. Телерентгенография
- В. Радивизиография
- Г. Ортопантомография

Ортодонтическое лечение перед ортогнатической хирургией заключается в

- А. Нормализации формы зубных рядов и положения зубов
- Б. Нормализации окклюзии
- В. Ортопедическом воздействии на нижнюю челюсть
- Г. Ортопедическом воздействии на верхнюю челюсть

Морфологически череп разделяется на _____ отделы

- А. Верхний и нижний
- Б. Мозговой и лицевой
- В. Затылочный, лобный, челюстной
- Г. Челюстной и лобный

На трг головы (в боковой проекции) референтная линия, проходящая через точки s и p

- А. FH
- Б. NL
- В. ML
- Г. NSL

Ортодонтические аппараты по принципу действия

- А. Механически-действующие, функционально-действующие, комбинированные
- Б. Несъемные, съемные, сочетанные
- В. Внутриротовые, внеротовые
- Г. Одночелюстные, одночелюстные межчелюстного действия, двухчелюстные, сочетанные

К аномалиям размеров зубов относится

- А. Микрогнатия
- Б. Микродензия
- В. Макроглоссия
- Г. Глоссоптоз

Лицевая маска используется при лечении

- А. Дистальной окклюзии
- Б. Вертикальной резцовой дизокклюзии
- В. Мезиальной окклюзии
- Г. Перекрестной окклюзии

При втором классе по энглю мезиально-щечный бугор первого моляра верхней челюсти находится _____ нижнего моляра

- А. В межбугровой фиссуре второго
- Б. В межбугровой фиссуре первого
- В. Позади межбугровой фиссуры первого
- Г. Кпереди от межбугровой фиссуры первого

Увеличение угла sargo свидетельствует о

- А. Вертикальном типе роста лицевого скелета
- Б. Горизонтальном направлении роста лицевого скелета
- В. Ретрогнатическом типе профиля
- Г. Вращении нижней челюсти против часовой стрелки

Лицевую маску используют при

- А. Открытом прикусе
- Б. Дистальной окклюзии
- В. Асимметрии
- Г. Мезиальной окклюзии

Инфраположение характеризуется положением зуба

- А. Вестибулярно
- Б. Ниже окклюзионной плоскости
- В. Орально
- Г. Выше окклюзионной плоскости

Деформация кожно-хрящевого отдела носа всегда имеет место при врожденной расщелине губы

- А. Неполной двусторонней
- Б. Скрытой односторонней
- В. Полной односторонней
- Г. Неполной односторонней

Автоматизированная система регистрации окклюзии t-skan iii анализирует

- А. Тонус мышц
- Б. Биопотенциалы мышц
- В. Силу смыкания зубных рядов
- Г. Форму зубных рядов

Точка ar расположена на _____ челюсти

- А. Заднем контуре суставной головки нижней
- Б. Переднем контуре апикального базиса нижней
- В. Переднем контуре апикального базиса верхней
- Г. Вершине суставной головки нижней

К лицевому признаку глубокой окклюзии относят

- А. «Сердитое» лицо
- Б. Увеличение высоты нижней трети лица
- В. Положительную губную ступеньку
- Г. Супраментальную борозду

Потеря временного зуба за 2 года до его физиологической смены приводит к

- А. Убыли костной ткани в месте его расположения
- Б. Мезиальному смещению соседних зубов
- В. Дистальному смещению соседних зубов
- Г. Адентии одноименного постоянного зуба

Миотонометрию рекомендовано проводить

- А. Только до лечения
- Б. Только после лечения
- В. Только во время лечения
- Г. До, во время и после лечения

При witz анализе перпендикуляры из точек а и в должны быть опущены на плоскость

- А. Окклюзионную
- Б. Основания верхней челюсти
- В. Основания черепа
- Г. Основания нижней челюсти

Удлиненное лицо является следствием

- А. Недоразвития верхней челюсти
- Б. Нейтрального роста
- В. Чрезмерного горизонтального роста челюстей
- Г. Чрезмерного вертикального роста челюстей

При вредной привычке сосания нижней губы формируется

- А. Трансверсальная резцовая окклюзия
- Б. Мезиальная окклюзия
- В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- Г. Дистальная окклюзия

Макродентия определяется как аномалия

- А. Количества
- Б. Формы
- В. Размера
- Г. Положения

Нарушением верхней челюсти при ретрогнатии является

- А. Смещение кзади
- Б. Чрезмерное развитие
- В. Несимметричная деформация
- Г. Выраженное недоразвитие

При инфантильном типе глотания язык

- А. Упирается в купол неба
- Б. Упирается в альвеолярную часть нижней челюсти
- В. Расположен на дне полости рта
- Г. Упирается в губы

Ютилити-дуга используется с целью

- А. Дистализации зубов 1.3, 2.3
- Б. Устранения диастемы
- В. Мезиализации зубов 1.3, 2.3
- Г. Зубоальвеолярного укорочения в переднем отделе

Временный прикус формируется в возрасте до (в годах)

- А. 7
- Б. 1
- В. 3
- Г. 5

Привычка ребенка спать с запрокинутой головой формирует

- А. Мезиальную окклюзию
- Б. Перекрёстную окклюзию
- В. Дистальную окклюзию
- Г. Вертикальную резцовую дизокклюзию

Для трансверсального расширения переднего участка зубного ряда используется пластинка с винтом

- А. Расширяющим
- Б. Бертони
- В. Секторальным
- Г. Веерообразным

Компактостеотомия проводится с целью

- А. Улучшения фиксации ортодонтического аппарата
- Б. Ускорения ортодонтического лечения
- В. Дополнительной диагностики
- Г. Продолжения ортодонтического лечения

На трг головы (в боковой проекции) ротация тела нижней челюсти по часовой стрелке характеризуется увеличением угла (выше 35°)

- А. NSL\\NL
- Б. NSL\\ML
- В. NL\\ML
- Г. SNA

Выявить мезиальное смещение боковых зубов на диагностических моделях челюстей позволяет методика

- А. Пона
- Б. Шмута
- В. Снагиной
- Г. Изара

Длину головы измеряют между точками

- А. Zy - zy
- Б. Op - gl
- В. Go - go
- Г. Eu – eu

Ретенционные пластиночные аппараты носят в течение _____ часов в сутки

- А. 10 - 12
- Б. 24
- В. 2 - 3
- Г. 1 - 2

Мезиальный щёчный бугор первого верхнего моляра располагается в межбугорковой фиссуре первого нижнего моляра, что соответствует _____ классу энгля

- А. Второму (подкласс 2)
- Б. Первому
- В. Второму (подкласс 1)
- Г. Третьему

Под торком зуба понимают

- А. Мезио-дистальный наклон зуба
- Б. Положение зуба по вертикали
- В. Правильное положение зуба в зубном ряду по своей оси
- Г. Вестибуло-оральный наклон зуба

Каппы изготавливают из

- А. Базисной пластмассы
- Б. Никель-титанового сплава
- В. Гипса
- Г. Термопластичного полиуретана

«Макрогнатия» означает

- А. Увеличение размеров челюсти
- Б. Уменьшение размеров челюсти
- В. Смещение челюсти вперед
- Г. Уменьшение углов SNA либо SNB

Младенческая ретрогения обусловлена _____ челюсти

- А. Увеличением верхней
- Б. Мезиальным положением верхней
- В. Дистальным положением нижней
- Г. Увеличением нижней

Макродентией называется

- А. Увеличение количества зубов
- Б. Уменьшение размеров зубов
- В. Увеличение размеров зубов
- Г. Увеличение размеров челюстей

Аппарат кламмта применяется при

- А. Горизонтальной резцовой дизокклюзии
- Б. Мезиальной окклюзии
- В. Палатинокклюзии
- Г. Дистальной окклюзии и вертикальной резцовой дизокклюзии

Патология внчс, при которой нарушается координация функций жевательных мышц и взаимного расположения суставных элементов, называется

- А. Анкилозом
- Б. Суставной дисфункцией
- В. Мышечно-суставной дисфункцией
- Г. Мышечной дисфункцией

Под мезио-дистальным наклоном зуба понимают

- А. Ангуляцию
- Б. Торк
- В. Протрузию
- Г. Инклинацию

Аппараты quadhelix используют для _____ челюсти

- А. Интрузии моляров верхней
- Б. Интрузии моляров нижней
- В. Дистализации моляров верхней
- Г. Расширения верхней

Бугорок верхнего клыка в норме располагается

- А. Между нижним клыком и первым племоляром
- Б. На уровне бугорка нижнего клыка
- В. Между нижним клыком и нижним вторым резцом
- Г. В поперечной фиссуре нижнего первого премоляра

Вредной привычкой, способствующей развитию сагиттальной резцовой дизокклюзии, является

- А. Привычка закусывать верхнюю губу
- Б. Сон на высокой подушке
- В. Подкладывание руки под щеку во время сна
- Г. Сосание большого пальца

Для торка характерен _____ наклон зуба

- А. Лабио-лингвальный
- Б. Мезио-дистальный
- В. Вестибуло-оральный
- Г. Лабио-латеральный

Статокинезиограмма (скг) позволяет оценить

- А. Смещение центра тяжести тела по эллипсу
- Б. Внеокклюзионные движения нижней челюсти (опускание/поднимание)
- В. Скорость движения нижней челюсти
- Г. Скорость кровотока в пародонте

Поворот зуба вокруг вертикальной оси называется

- А. Торк
- Б. Ангуляция
- В. Ротация
- Г. Инклинация

В аппарате Брюкля применяется

- А. Протрагирующая дуга
- Б. Наклонная плоскость
- В. Небный бюгель
- Г. Лингвальная дуга

У пациентов с гнатической формой дистальной окклюзии в сочетании с сагиттальной резцовой дизокклюзией на трг головы (в боковой проекции) диагностически значимо могут быть уменьшены значения

- А. SNB; 1°; Go-Pog
- Б. NL°/ML°; Snp-A; Co-Go
- В. ArGoMe; NL°/ML°; Snp-A
- Г. SNA; NL°/ML°; Snp-A

Прогнатия относится к аномалии

- А. Размера зубных рядов
- Б. Размера челюсти
- В. Положения челюсти
- Г. Формы челюсти

Ортодонтический аппарат, предназначенный для дистализации моляров, называется

- А. Distal Jet
- Б. Quadhelix
- В. Норда
- Г. Cetlin

Для определения размеров и положения челюстных костей в сагиттальном и вертикальном направлениях используется анализ

- А. Томограмма ВНЧС
- Б. ТРГ в боковой проекции
- В. ТРГ в прямой проекции
- Г. ОПТГ

Основным направлением первичной профилактики является

- А. Восстановление утраченных функций
- Б. Реабилитация больных
- В. Лечение и предупреждение осложнений заболеваний
- Г. Предупреждение возникновения заболеваний

На трг головы в боковой проекции по методу ricketts определяются параметры

- А. NSAr; SArGo
- Б. N-S; Go-Me
- В. NGoAr; ArGoMe
- Г. N-Ba\\PtV-Gn; Xi

Положение зубов ниже окклюзионной плоскости

- А. Вестибулярное
- Б. Инфраположение
- В. Дистальное
- Г. Оральное

В норме у ребёнка 4 лет

- А. Дистальные поверхности вторых временных моляров расположены в одной плоскости
- Б. Между дистальными поверхностями вторых временных моляров формируется дистальная ступень
- В. Между дистальными поверхностями первых временных моляров формируется мезиальная ступень
- Г. Между дистальными поверхностями вторых временных моляров формируется мезиальная ступень

Причиной скученности зубов является

- А. Сужение и укорочение зубного ряда
- Б. Макроглоссия
- В. Микроденития
- Г. Макрогнатия

Сепарационные кольца нужны для

- А. Межапроксимальной сепарации
- Б. Создания места для установки ортодонтических колец
- В. Фиксации дуги в пазах брекета
- Г. Удаления композита с поверхности зуба

Брекеты для клыков с высоким торком рекомендованы в случае

- А. Небной дистопии клыков
- Б. Изначальной избыточно вестибулярной инклинации
- В. Лечения с удалением первых премоляров
- Г. Выраженной ротации клыков

На свойства ортодонтических дуг влияет

- А. Торк в основании брекета
- Б. Длина дуги
- В. Торк в пазах брекета
- Г. Сплав дуги

Гиперодонтией является

- А. Уменьшение количества зубов
- Б. Уменьшение размеров зубов
- В. Увеличение размеров зубов
- Г. Наличие сверхкомплектного зуба

Рентгеновские снимки кисти в ортодонтии используют для

- А. Определения типа роста скелета
- Б. Обнаружения скелетной патологии
- В. Определения плотности кости
- Г. Расчета скелетного возраста

Для лечения перекрестного прикуса с боковым смещением нижней челюсти окклюзионные накладки двухчелюстных аппаратов

- А. Готовят на стороне смещения
- Б. Не делают
- В. Готовят на противоположной стороне
- Г. Готовят с двух сторон

Симметричность развития правой и левой половины нижней челюсти можно оценить с помощью

- А. Панорамной рентгенографии
- Б. Телерентгенографии в боковой проекции
- В. Прицельной рентгенографии
- Г. Телерентгенографии в прямой проекции

Увеличение базального угла говорит о

- А. Вертикальном типе роста, гипердивергенции челюстей
- Б. Горизонтальном типе роста, гиподивергенции челюстей
- В. Биретрузии
- Г. Бипротрузии

При ротовом дыхании формируется

- А. Сагиттальная щель
- Б. «Готическое» нёбо
- В. Симптом «наперстка»
- Г. Диастема

Макроглоссия характеризуется

- А. Уменьшением размера языка
- Б. Атрофией языко-глоточного нерва
- В. Увеличением размера языка
- Г. Раздвоением кончика языка

Положением зуба ниже окклюзионной плоскости называют

- А. Транспозицию
- Б. Ретропозицию
- В. Супрапозицию
- Г. Инфрапозицию

Адентия зубов относится к аномалии их

- А. Структуры
- Б. Сроков прорезывания
- В. Количества
- Г. Формы

Лицевая маска дилера относится к ортодонтическим аппаратам

- А. Профилактическим
- Б. Комбинированным
- В. Лечебным
- Г. Ретенционным

К механическим элементам пластинки относят

- А. Вестибулярную дугу
- Б. Базис
- В. Винт
- Г. Кламмер

Под корпусным перемещением зуба понимают

- А. Перемещение только коронки зуба
- Б. Одновременное движение коронки и корня в одном направлении
- В. Выдвижение зуба окклюзионно
- Г. Перемещение только корня зуба

Одной из возможных причин сагиттальной резцовой дизокклюзии является

- А. Микродентия верхних зубов при нормальном размере нижних
- Б. Наличие сверхкомплектных зубов на нижней челюсти
- В. Микродентия верхних зубов при макродентии нижних
- Г. Макродентия верхних зубов при нормальном размере нижних

Сагиттальная окклюзионная кривая по имени автора называется кривая

- А. Уилсона
- Б. Хантера
- В. Шпее
- Г. Беннета

Сращение небных отростков происходит на ____ неделе внутриутробного развития

- А. 3
- Б. 7
- В. 17
- Г. 4-5

Опорными точками при построении эстетической плоскости рикеттса являются _____ и подбородок

- А. Носо-лобный шов
- Б. Основание носа
- В. Кончик носа
- Г. Выступающая часть лба

Постепенное уменьшение высоты клинических коронок от резцов до моляров, за исключением клыков, формирует

- А. Франкфуртскую горизонталь
- Б. Кривую Шпее
- В. Кривую Уилсона
- Г. Окклюзионную плоскость

Угол anb на трг показывает положение

- А. Базиса нижней челюсти относительно основания черепа
- Б. Базиса верхней челюсти относительно основания черепа
- В. Оси верхнего резца относительно основания черепа
- Г. Базисов челюстей относительно друг друга

Начальный период смены зубов соответствует возрасту от ____ до ____ лет

- А. 9; 11
- Б. 6; 9
- В. 1; 3
- Г. 3; 6

У пациентов с гнатической формой мезиальной окклюзии на трг головы (в боковой проекции) диагностически значимо могут быть уменьшены значения

- А. Go-Pog; SNB
- Б. ArGoMe; NSL\\ML
- В. NSL\\ML; NL\\ML
- Г. Snp-A; SNA

На телерентгенограмме черепа в боковой проекции угол nsl/nl показывает наклон

- А. Верхних резцов к плоскости основания черепа
- Б. Базисов челюстей друг к другу
- В. Базиса нижней челюсти к основанию черепа
- Г. Базиса верхней челюсти к основанию черепа

Для тренировки мышц и нормализации функции языка используют

- А. Аппарат Андресена-Гойпля
- Б. Пластинку с накусочной площадкой
- В. Пластинку Хинца с бусиной
- Г. Расширяющую пластинку

У пациентов с гнатической формой дистальной окклюзии в сочетании с вертикальной резцовой дизокклюзией на трг головы (в боковой проекции) диагностически значимо могут быть увеличены значения

- А. SNA; ANB; NL\\ML; NSL\\ML
- Б. SNB; Go-Pog; 1\\1; NSL\\NL
- В. SNPog; 1\\1; Go-Pog
- Г. NGoAr; 1\\1; Go-Pog

Для устранения вредной привычки назначают

- А. Аппарат Френкеля 2 типа
- Б. Съёмный расширяющий аппарат
- В. Вестибулярную пластинку
- Г. Несъёмный расширяющий аппарат

[Вернуться в начало](#)