

Тесты с вопросами по специальности «Ортодонтия» для аттестации 1 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/ortodont/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Ортодонтия» для аккредитации и других экзаменов (1500 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/ortodontiya/

2) Тесты для аккредитации «Стоматология ортопедическая» (1900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/ortoped/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Упражнения с роторасширителем необходимо выполнять в следующем режиме

- А. Статическом и динамическом
- Б. Статическом
- В. Динамическом
- Г. Быстром

В норме нижние центральные резцы имеют

- А. По 1 антагонисту
- Б. По 2 антагониста
- В. Контактируют с клыками верхней челюсти
- Г. Контактируют с боковыми резцами верхней челюсти

Латеральное положение центральных резцов приводит к

- А. Тремам
- Б. Диастеме
- В. Тортоаномалии
- Г. Транспозиции

По месту расположения аппарат Норда

- А. Внеротовой
- Б. Внутриротовой, одночелюстной
- В. Комбинированный
- Г. Одночелюстной

Плоскость основания верхней челюсти обозначается

- А. N-S
- Б. MI
- В. NI
- Г. Fh

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

- 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена небно
 - 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно
 - 3. Косметический центр смещен влево
 - 4. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена вестибулярно
- Окклюзия**

- А. Палатино-
 - Б. Лингво-
 - В. Вестибуло-
 - Г. Трансверсальная резцовая
- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
 - Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
 - В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
 - Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

С целью измерения длины тела верхней челюсти используют

- А. Ортопантомограмму
- Б. Трг - прямая проекция
- В. Трг - боковая проекция
- Г. Томографию внчс

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией

Клиническая ситуация

- 1. Глубокая резцовая окклюзия**
 - 2. Сужение и укорочение зубного ряда**
 - 3. Зубоальвеолярное удлинение**
 - 4. Латеральное положение центральных резцов**
- Конструктивный элемент**

- А. Окклюзионные накладки**
- Б. Накусочную площадку**
- В. Винт Бертони**
- Г. Петля для устранения диастемы**

А. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Для съемного ортодонтического аппарата активным элементом является

- А. пугочатый кламер**
- Б. кламер Адамса**
- В. протрагирующая пружина**
- Г. Круглый кламер**

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

- 1. $\angle A/N/B$**
- 2. $\angle 1/1$ "alfa"**
- 3. $\angle S/N/Pg$**
- 4. $\angle NL/ML$ "B" Характеристика**

А. Взаимоположение оснований верхней и нижней челюстных костей

Б. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

В. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Пластика на верхнюю челюсть с винтом и срединным распилом применяется для

- А. Равномерного расширения верхнего зубного ряда**
- Б. Удлинения фронтального участка нижнего зубного ряда**
- В. Одностороннего расширения верхнего зубного ряда**
- Г. Раскрытия срединного небного шва**

Вестибулоклюзия - это смещение

- А. Нижних или верхних боковых зубов в щечную сторону
- Б. Нижних или верхних боковых зубов в оральную сторону
- В. Только верхних боковых зубов в оральную сторону
- Г. Нижних передних зубов орально

К моменту рождения в норме нижняя челюсть

- А. Меньше верхней
- Б. Больше верхней на мм
- В. Равна верхней
- Г. Больше верхней на 5 мм

Пропорциональность мезиодистальных размеров коронок постоянных резцов определяют по

- А. Индексу Пона;
- Б. Методу Коркхауза;
- В. Индексу Тона;
- Г. Методу Нансе.

Увеличение $\angle$ SNPg характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Глубокой резцовой
- Г. Физиологической

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S

2. A'-Snpr

3. $\angle$ A/N/V

4. P_g'- Go Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Длина апикального базиса верхней челюсти

Г. Длина переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Резцовое перекрытие составляет более 2/3**
- 2. Обратное смыкание резцов**
- 3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля**
- 4. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля Оклюзия**

А. Мезиальная

Б. Дистальная

В. Глубокая резцовая дизокклюзия

Г. Обратная трансверсальная резцовая

А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Графический метод Хаулея- Гербера-Гербста применяют для определения нарушений

А. Длины верхней или нижней челюстей

Б. Формы челюстных костей

В. Положения зубов и формы зубных рядов

Г. Положения зубов в вертикальном направлении

Установите соответствие между конструкцией аппарат и его функцией Аппарат

1. Пластика с сагиттальным распилом

2. Регулятор функций Френкеля

3. Лицевая дуга

4. Наклонная плоскость Действие

А. Расширения зубного ряда

Б. Нормализация окклюзии

В. Вестибулярное отклонение резцов

Г. Экструзия ,дистализация моляров

А. 1-А 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Коронка с распоркой на зуб 16 предназначена для

А. Сохранения места 15

Б. Мезиализации 16

В. Дистализации 16

Г. Ротации 16

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение $\angle$ SNB и увеличение наружного $\angle$ U1/NL
 2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов нижней челюсти
 3. Уменьшение $\angle$ SNB и уменьшение наружного $\angle$ U1/NL
 4. Увеличение $\angle$ B Оклюзия
- А. Глубокая резцовая окклюзия
Б. Дистальная II класс I подкласс
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Дистальная глубокая окклюзия II класс II подкласс
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-Г 2-А 3-Б 4-В
В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Г. 1-А 2-В 3-Г 4-В

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Расширяющий винт
 2. Протрагирующая пружина
 3. Рукообразная пружина
 4. Петля для устранения диастемы Функция
- А. Расширение зубных рядов
Б. Вестибулярное отклонение зубов
В. Устранение трем
Г. Устранение диастем
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Лицевая маска Диляра позволяет

- А. Сдерживать рост верхней челюсти
Б. Перемещать вперед верхний зубной ряд и верхнюю челюсть
В. Стимулировать рост нижней челюсти
Г. Сдерживать рост обеих челюстей

Угловой параметр $\angle$ L1-ML характеризует

- А. Наклон резцов верхней челюсти
Б. Наклон резцов нижней челюсти
В. Положение апикального базиса верхней челюсти
Г. Положение апикального базиса нижней челюсти

Удаление временных зубов по методу Хотца показано

- А. При несоответствии размеров зубов и челюстей
- Б. При наличии сверхкомплектных зубов
- В. Адентии
- Г. Ретенции зубов

Для механически действующего аппарата характерно наличие

- А. Накусочной площадки
- Б. Винта, лигатуры, пружины, дуги, резинового кольца
- В. Наклонной плоскости
- Г. Щита

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle 1/1$ "alfa"

2. $\angle A/N/B$

3. $\angle S/N/Pg$

4. $\angle NL/NSL$ Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

В. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Точка центра турецкого седла

- А. S
- Б. Po
- В. Pt
- Г. Ba

По назначению аппарат Андресена-гойпля

- А. Лечебный
- Б. Профилактический
- В. Ретенционный
- Г. Комбинированный

Вид эластичной тяги при лечении трансверсальной резцовой окклюзии

- А. Межчелюстная по II классу
- Б. Одночелюстная
- В. Межчелюстная по III классу
- Г. Перекрестная

Вид эластичной тяги при лечении дистальной окклюзии

- А. Межчелюстная по II классу
- Б. Одночелюстная
- В. Межчелюстная по III классу
- Г. Вертикальная

Каждый зуб верхней челюсти антагонизирует в норме с

- А. Одноименным и впередистоящим зубами н/ч
- Б. Одноименным и позадистоящим зубами н/ч
- В. Только одноименным зубом
- Г. Только позадистоящим

Фиксирующие элементы в аппарате Кламмта

- А. Губной пелот
- Б. Рукообразные пружины
- В. Кламмер Адамса
- Г. Только вестибулярная дуга

Щечные бугорки нижних боковых зубов в норме контактируют

- А. С небными бугорками верхних
- Б. С продольными фиссурами верхних
- В. Со щечными бугорками верхних
- Г. Вестибулярными поверхностями верхних

Установите соответствие между аппаратом и его показаниями Аппарат

1. Открытый активатор Кламмта с винтом

2. Пластика с секторальным размером в области первых моляров

3. Квадреликс

4. Маска Диляра Функция

А. Нормализация окклюзии и расширения зубных рядов

Б. Удлинение зубного ряда

В. Расширение зубных рядов

Г. Нормализация положения верхней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Г. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Метод Пона основан

А. На зависимости суммы мезиодистальных размеров нижних резцов и ширины зубного ряда в переднем и заднем отделах

Б. На зависимости суммы мезиодистальных размеров верхних резцов и ширины зубных рядов

В. На пропорциональности размеров верхних и нижних резцов

Г. На зависимости между шириной зубного ряда в переднем и заднем отделах

Небные бугорки верхних временных моляров 4-х летнего ребенка располагаются

А. На одном уровне с язычными бугорками нижних моляров

Б. В продольной фиссуре нижних моляров

В. Вестибулярнее щечных бугорков нижних моляров

Г. На одном уровне с щечными бугорками нижних моляров

Базальная дуга нижней челюсти

А. Меньше альвеолярной дуги на 5 мм

Б. Больше альвеолярной дуги

В. Равна альвеолярной дуге

Г. Меньше альвеолярной дуги на 3 мм

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Вестибулярные поверхности верхних резцов контактируют с нижними резцами
- 2.Зубоальвеолярное удлинение в области резцов верхней и нижней челюстей
- 3.Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля
4. Протрузия верхних резцов и ретрузия нижних Оклюзия

А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия

Б. Дистальная окклюзия

В. Глубокая резцовая

Г. Обратная резцовая окклюзия

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и вестибулярной дугой позволяет провести

- А. Уплотнение переднего отдела нижнего зубного ряда
- Б. Расширение и уплотнение верхнего зубного ряда
- В. Устранение вредных привычек
- Г. Устранение дизокклюзии

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Резцовое перекрытие составляет более 1/3
2. Обратное перекрытие в области резцов верхней и нижней челюстей, смещение косметического центра
3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля
4. Несовпадение средней линии Оклюзия

А. Мезиальная

Б. Трансверсальная резцовая

В. Глубокая резцовая

Г. Обратная трансверсальная резцовая

А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Увеличение <LI-ML характерно для

- А. Протрузии резцов верхней челюсти
- Б. Ретрузии резцов верхней челюсти
- В. Протрузии резцов нижней челюсти
- Г. Ретрузии резцов нижней челюсти

Установите соответствие между аппаратом и их функцией Аппарат

1. Открытый активатор Кламмта с упором для языка и окклюзионными накладками
 2. Пластика с секторальным размером в области первых моляров
 3. Квадхеликс
 4. Маска Диляра
- Функция**
- А. Удлинение зубного ряда в боковом отделе
 - Б. Вертикальная резцовая дизокклюзия
 - В. Расширения верхнего зубного ряда
 - Г. Нормализация положения верхней челюсти
- А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Точка Me соответствует

- А. Передней точке на нижнем контуре тела нижней челюсти
- Б. Вершине суставной головки
- В. Точке пересечения тела нижней челюсти
- Г. Нижней точке на нижнем контуре тела нижней челюсти на месте пересечения симфиза

Зубные ряды в прикусе временных зубов имеют форму

- А. Полуэллипса
- Б. Полукруга
- В. Параболы
- Г. Трапеции

Зубоальвеолярную высоту переднего отдела верхней челюсти характеризует параметр

- А. U1- NL
- Б. U6 - NL
- В. L1- ML
- Г. L1- ML

Супраположение зуба - это

- А. Высокое положение зуба
- Б. Поворот зуба вокруг вертикальной оси
- В. Вестибулярный наклон зуба
- Г. Оральное положение зуба

Аппарат Pendulum используется для

- А. Дистализации верхних первых моляров
- Б. Сужения зубного ряда
- В. Укорочения зубного ряда
- Г. Ретенции

Условия для нарушения носового дыхания создаются при

- А. Хроническом гастрите
- Б. Пиелонефрите
- В. Бронхиальной астме, хронических бронхитах
- Г. Нарушении осанки

Недостаток места может привести к аномалии

- А. Положения
- Б. Размера
- В. Формы
- Г. Структуры

Регулятор функции Френкеля I типа создает условия для роста

- А. Нижней челюсти
- Б. Верхней челюсти
- В. Обеих челюстей
- Г. Не влияет на рост

Резцы в/ч в норме контактируют с резцами н/ч

- А. Небной поверхностью
- Б. Режущим краем
- В. Вестибулярной поверхностью
- Г. Апроксимальной поверхностью

Гиперодонтия возникает при

- А. Наличии сверхкомплектных зубов
- Б. Отсутствии зачатков зубов
- В. Ретенции зубов
- Г. Увеличении размеров зубов

Франкфуртская горизонталь проводится через точки

- A. Or-Po
- Б. N-s
- В. Ar-go
- Г. Sna-snp

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

- 1. Заслонка для языка
- 2. Оклюзионные накладки в области боковых зубов
- 3. Протрагирующая пружина
- 4. Петля для устранения диастемы Функция

- A. Интрузия боковых зубов
- Б. Нормализация положения языка
- В. Нормализация положения передних зубов
- Г. Медиальное смещение резцов

- A. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
- Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
- В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
- Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

- 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена щечно
- 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно
- 3. Косметический центр смещен вправо
- 4. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена небно Оклюзия

- A. Палатино-
- Б. Лингво-
- В. Вестибуло-
- Г. Трансверсальная резцовая

- A. 1-В 2-Б 3-Г 4-А
- Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
- В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
- Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Установите соответствие между состоянием окклюзии и соотношением первых моляров

Соотношение первых моляров

1. Физиологическая
 2. Мезиальная
 3. Дистальная с протрузией резцов верхней челюсти
 4. Дистальная с ретрузией резцов верхней челюсти
- Состояние окклюзии**

А. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается в поперечной фиссуре нижнего первого моляра

Б. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Протрузия резцов верхней челюсти

В. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Ретрузия резцов верхней челюсти

Г. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается позади поперечной фиссуры нижнего первого моляра

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Установите соответствие между аппаратом для функциональной диагностики и показателями
Метод диагностики

1. Периотест
 2. Миотонометр
 3. Кинезиограф
 4. Электромиограф
- Определяет**

А. Тонус мышц

Б. Биопотенциалы мышц

В. Движение нижней челюсти

Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке

А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Тортоаномалия - это

А. Высокое положение зуба

Б. Поворот зуба вокруг вертикальной оси

В. Вестибулярный наклон зуба

Г. Оральное положение зуба

Губные пелоты способствуют

А. Росту апикального базиса челюсти

Б. Сдерживанию роста апикального базиса челюсти

В. Устранению протрузии резцов

Г. Фиксации аппарата в полости рта

К специальным методам диагностики в ортодонтии относятся

- А. Осмотр полости рта, функциональные пробы
- Б. Опрос, рентгенологические, функциональные, графические
- В. Опрос, осмотр, измерение гипсовых моделей челюстей
- Г. Функциональные, графические, кефалометрические

Установите соответствие между аппаратом и показаниями его применения Аппарат

- 1. Регулятор функций Френкеля II типа
- 2. Расширяющая пластинка
- 3. Пластика с секторальным распилом
- 4. Пластика с окклюзионными накладками Лечение окклюзии
- А. Дистальная II класс II подкласс
- Б. Сужение зубных рядов
- В. Зубоальвеолярное удлинение в области жевательной группы зубов
- Г. Уплотнение переднего участка зубного ряда
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
- Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
- В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
- Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Первый и второй подклассы II класса Энгля различаются положением

- А. Моляров
- Б. Клыков
- В. Резцов
- Г. Челюстей

При "инфантильном" типе глотания положение кончика языка

- А. на вестибулярной поверхности верхних резцов
- Б. на дне полости рта
- В. между верхними и нижними резцами
- Г. на небе

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Обратное соотношение резцов верхней и нижней челюстей**
- 2. Смещение косметического центра вправо**
- 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля**
- 4. Снижение нижней трети лица. Окклюзия**

- А. Мезиальная**
Б. Трансверсальная
В. Глубокая резцовая
Г. Обратная резцовая

- А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В**
Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Передний щечный бугорок 16 зуба в норме контактирует с

- А. Задним щечным бугорком 46**
Б. Межбугорковой фиссурой 46
В. Контактной точкой между 45 и 46
Г. Передней ямкой продольной фиссуры 46

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

- 1. Вестибулярная дуга**
- 2. Губной пелот**
- 3. Протрагирующая пружина**
- 4. Петля для устранения диастемы Функция**

- А. Уплотнение зубного ряда**
Б. Стимуляция роста апикального базиса
В. Отклонение вестибулярно зубов
Г. Нормализация положение центральных резцов

- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г**
Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Дистальные поверхности вторых временных моляров 6-летнего ребенка располагаются

- А. В одной вертикальной плоскости**
Б. С мезиальной ступенькой
В. С дистальной ступенькой
Г. С латеральной ступенькой

Точка Pt является

- А. Верхней дистальной точкой крыловидно-верхнечелюстной щели
- Б. Серединой турецкого седла
- В. Нижней точкой края орбиты
- Г. Верхней точкой наружного слухового прохода

Порядок прорезывания постоянных зубов

- А. 6-1-2-3-4-5-7
- Б. 1-2-4-5-3-6
- В. 6-1-2-4-3-5-7
- Г. 6-1-2-5-3-4-7

Аппарат Pendulum применяют для

- А. Дистализации моляров верхней челюсти
- Б. Смещения нижней челюсти вперед
- В. Смещения верхнего зубного ряда вперед
- Г. Стабилизации положения верхней челюсти

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его действия

- | | |
|---|----------------|
| Элемент | |
| 1. Протрагирующая пружина | |
| 2. Расширяющий винт | |
| 3. Веерообразный винт | |
| 4. Вестибулярная дуга | Функция |
| А. Нормализация положения зубов | |
| Б. Фиксация аппарата | |
| В. Расширить зубной ряд в переднем отделе | |
| Г. Расширение верхнего зубного ряда | |
| А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б | |
| Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г | |
| В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б | |
| Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б | |

Функциональное состояние мышц челюстно-лицевой области определяют методом

- А. Электромиографии, электромиотонометрии
- Б. Реопарадонтोगрафии
- В. Артрофонографии
- Г. Аксиографии

Задняя точка верхней челюсти

- А. Со
- Б. Snp
- В. Go
- Г. Sna

К ретенционным аппаратам относятся аппараты для

- А. Предупреждения развития аномалий
- Б. Расширения зубного ряда
- В. Закрепления достигнутых результатов лечения
- Г. Лечение аномалий зубных рядов

Вредная привычка сосания пальца причина

- А. Вертикальной резцовой дизокклюзии
- Б. Прямой резцовой окклюзии
- В. Глубокой резцовой окклюзии
- Г. Глубокой резцовой дизокклюзии

Аппарат Норда используется для

- А. Удлинения верхнего зубного ряда
- Б. Ротации первых верхних моляров
- В. Раскрытия небного шва
- Г. Сужение верхнего зубного ряда

О симметричности развития правой и левой половины нижней челюсти позволяют судить

- А. Панорамная рентгенограмма
- Б. Трг - боковая проекция
- В. Трг - прямая проекция и Клкт
- Г. Ортопантограмма и томография внчс

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Аппарат

1. Пластика с секторальным распилом в области резцов верхней челюсти
2. Пластика с сагиттальным распилом
3. Аппарат Андресена-Гойпля
4. Pendulum Функция

А. Удлинение зубного ряда в переднем отделе

Б. Расширение зубного ряда верхней челюсти

В. Дистализация первых моляров

Г. Нормализация окклюзии

А. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle A/N/B$

2. $\angle 1/1$ "alfa"

3. $\angle S/N/Pg$

4. $Pg'-Go$ Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Аномалии челюстей в сагиттальном направлении можно определить с помощью

А. Ортопантомографии

Б. Трг в боковой проекции

В. Панорамной рентгенографии

Г. Трг прямая проекция

Резцы н/ч в норме контактируют с резцами в/ч

А. Язычной поверхностью

Б. Режущим краем

В. Вестибулярной поверхностью

Г. Апроксимальной поверхностью

Точка на ветви нижней челюсти обозначается

- А. Со
- Б. Ме
- В. Go
- Г. Ро

Дистальная окклюзия характеризуется смещением боковых зубов

- А. Нижней челюсти назад
- Б. Нижней челюсти вперед
- В. Верхней челюсти назад
- Г. Верхней челюсти латерально

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S

2. A'-SnP

3. $\angle$ L1/ML

4. $\angle$ A/N/V Характеристика

А. Длина апикального базиса верхней челюсти

Б. Длина переднего отдела основания черепа

В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Уменьшение $\angle$ SNA характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Глубокой резцовой
- Г. Физиологической

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Упор для языка
 2. Щечные щиты
 3. Протрагирующая пружина
 4. Накусочная площадка
- Функция**
- А. Нормализация положения языка
 - Б. Интрузия резцов
 - В. Отведение мышц щек от альвеолярного отростка
 - Г. Нормализация положения зубов
- А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Аппарат

1. Пластика с секторальным распилом в области резцов нижней челюсти
 2. Pendulum
 3. Аппарат Андресена-Гойпля
 4. Пластика с накусочной площадкой
- Функция**
- А. Удлинение зубного ряда в переднем отделе
 - Б. Удлинение зубного ряда
 - В. Нормализация окклюзии
 - Г. Интрузия резцов нижней челюсти
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Рукообразные пружины перемещают зубы в направлении

- А. Оральном
- Б. Вестибулярном
- В. Вертикальном
- Г. Мезио-дистальном

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Аппарат

1. Пластика с секторальным распилом в области первых моляров
 2. Пластика с сагиттальным распилом
 3. Открытый активатор Кламонта
 4. Круглый кламер Функция
- А. Удлинение зубного ряда
Б. Нормализация окклюзии
В. Расширение зубного ряда
Г. Фиксация аппарата
- А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-В 2-Б 3-Г 4-А
Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Вестибулярная дуга
 2. Окклюзионные накладки
 3. Пелот для отведения губы
 4. Щечные щиты Функция
- А. Фиксирующий элемент
Б. Интрузия
В. Отведение мышц щек от альвеолярного отростка
Г. Отведение губы и стимуляция роста апикального базиса
- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Расширяющий винт
 2. Окклюзионные накладки в области боковых зубов
 3. Веерообразный винт
 4. Кламмер Адамса Функция
- А. расширение зубных рядов
Б. Интрузия боковых зубов
В. Расширение зубного ряда в переднем участке
Г. Фиксация аппарата
- А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Увеличение $\angle$ SNB характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Глубокой резцовой
- Г. Физиологической

Внеротовая резиновая тяга используется для

- А. Тренировки мышц
- Б. Введения дополнительного элемента аппарата лицевая дуга, подбородочная праща
- В. Нормализации дыхания
- Г. Устранения вредных привычек

Бампер Корна с упором для языка предназначен для

- А. Стабилизации положения зубов
- Б. Перемещения зубов в вестибулярном направлении
- В. Внедрения передней группы зубов
- Г. Устранения вредной привычки

Установите соответствие между аппаратом и его свойствами Аппарат

- 1. Регулятор функций Френкеля III типа
 - 2. Pendulum
 - 3. Открытый активатор Клармта
 - 4. Пластина с наклонной плоскостью
- Свойства аппарата
- А. Механический
 - Б. Функциональный
 - В. Комбинированный
 - Г. Съёмный
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
 - Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
 - В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
 - Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Передняя точка носовой ости

- А. Co
- Б. Snp
- В. Go
- Г. Sna

Аппарат Андресена - Хойпля предназначен для

- А. Расширения зубного ряда
- Б. Дистального перемещения боковой группы зубов справа
- В. Трансверсального расширения
- Г. Лечения дистальной окклюзии

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент 1
Расширяющий винт

- 2. Губной пелот
 - 3. Протрагирующая пружина
 - 4. Петля для устранения диастемы
- Функция**
- А. Стимуляция роста апикального базиса
 - Б. Равномерное расширение зубного ряда
 - В. Отклонение вестибулярно
 - Г. Нормализация положения центральных резцов
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
 - Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
 - В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
 - Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Уменьшение $\angle$ SNB
 - 2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов на верхней и нижней челюстях
 - 3. Зубоальвеолярное укорочение в области боковых зубов на верхней и нижней челюстях
 - 4. Увеличение $\angle$ SNB
- Окклюзия**
- А. Глубокая резцовая дизокклюзия
 - Б. Дистальная
 - В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
 - Г. Мезиальная
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
 - Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
 - В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
 - Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <ML/NSL

2. <S/N/A

3. <NL/NSL

4. <S/N/B Характеристика

А. Положение основания нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Б. Положение апикального базиса нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

В. Положение апикального базиса верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Г. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Губной пелот

2. Кламмера Адамса

3. Рукообразная пружина

4. Вестибулярная дуга Функция

А. Нормализация положения отдельных зубов

Б. Стимуляции роста апикального базиса челюсти в переднем отделе

В. Устранение протрузии резцов

Г. Фиксация аппарата

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-В 4- Г

Для оценки пародонта боковой группы зубов целесообразно использовать

А. Трг - прямую проекцию

Б. Ортопантомографию

В. Томографию

Г. Прицельную рентгенографию

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Веерообразный винт
 2. Губной пелот
 3. Протрагирующая пружина
 4. Рукообразная пружина Функция
- А. Стимуляция роста апикального базиса
 - Б. Отклонение вестибулярно зубов
 - В. Расширениезубного ряда в переднем отделе
 - Г. Нормализация положения отдельных зубов
- А. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
Б. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle 1/1$ "alfa"
 2. A'-SnP
 3. $\angle A/N/V$
 4. Pg'- Go Характеристика
- А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
 - Б. Длина тела нижней челюсти
 - В. Длина апикального базиса верхней челюсти
 - Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей
- А. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S
 2. Co-Go
 3. $\angle L1/ML$
 4. $\angle A/N/V$ Характеристика
- А. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти
 - Б. Длина ветви нижней челюсти
 - В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
 - Г. Длина переднего отдела основания черепа
- А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Угловой параметр <U1-NL характеризует

- А. Наклон резцов верхней челюсти
- Б. Наклон резцов нижней челюсти
- В. Положение апикального базиса верхней челюсти
- Г. Положение апикального базиса нижней челюсти

Губной бампер не используют для

- А. Расширения нижнего зубного ряда
- Б. Дистализации первых нижних моляров
- В. Уплощения переднего отрезка верхнего зубного ряда
- Г. Удлинения переднего отрезка нижнего зубного ряда

Установите соответствие между состоянием мягких тканей полости рта и формированием нарушения
Состояние мягких тканей полости рта

1. Низкое прикрепление уздечки верхней губы

2. Укорочение уздечки языка

3. Мелкое преддверие

4. Тяжи **Нарушение**

А. Недоразвитие переднего участка нижнего зубного ряда

Б. Латерального положения центральных резцов

В. Рецессия десны в области передних зубов

Г. Рецессия десны в области боковых зубов

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией
Элемент

1. Заслонка для языка

2. Оклюзионные накладки

3. Вестибулярная дуга

4. Пелот **Функция**

А. Нормализация положения языка

Б. Интрузия боковых зубов

В. Фиксация аппарата

Г. Отведение губы и стимуляция роста апикального базиса

А. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <NL/ML "B"

2. <S/N/A

3. <1/1 "alfa"

4. <A/N/B Характеристика

А. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

Б. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

В. Положение апикального базиса верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение оснований верхней и нижней челюстных костей

А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

При аномалиях окклюзии необходимо провести

А. Клиническое обследование

Б. Антропометрические измерения гипсовых моделей челюстей, внешний осмотр

В. Клиническое обследование и специальные методы диагностики

Г. Осмотр полости рта и рентгенологические методы

Линия N-S соответствует плоскости

А. Основания верхней челюсти

Б. Основания нижней челюсти

В. Переднего отдела основания черепа

Г. Эстетической по rickets

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Аппарат Персина

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти

2. Окклюзионные накладки

3. Нижний губной пелот

4. Заслонка для языка Окклюзия

А. Протрузия верхних резцов

Б. Мезиальная

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Дистальная

А. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Б. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Аппарат для лечения перекрестной окклюзии является

- А. Одночелюстным, механическим
- Б. Одночелюстным, функциональным
- В. Двучелюстным, комбинированным
- Г. Двучелюстным, функциональным

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <ML/NSL

2. <L1/ML

3. <U1/NL

4. <NL/NSL Характеристика

А. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти

Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

В. Положение основания нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Г. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Аппарат Нанса предназначен для

- А. Стабилизации положения резцов
- Б. Вестибулярного перемещения резцов
- В. Выдвижения нижней челюсти
- Г. Стабилизации положения моляров

Точка Со расположена на

- А. Переднем контуре апикального базиса верхней челюсти
- Б. Переднем контуре апикального базиса нижней челюсти
- В. Заднем контуре суставной головки нижней челюсти
- Г. Вершине суставной головки нижней челюсти

Длину переднего отрезка зубного ряда определяют с помощью метода

- А. Пона
- Б. Коркхауза
- В. Хауса-Снагиной
- Г. Нансе

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Упор для языка
 2. Расширяющий винт
 3. Веерообразный винт
 4. Петля для устранения диастемы
- Функция**
- А. Нормализация положения языка
 - Б. Равномерное расширение зубного ряда
 - В. Расширение зубного ряда в переднем отделе
 - Г. Нормализация положения центральных резцов
- А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Ортодонтический аппарат с винтом и поперечным распилом в переднем отделе предназначен для

- А. Сохранения места зубу 35
- Б. Коррекции положения первого постоянного моляра
- В. Удлинения зубного ряда
- Г. Расширения зубного ряда

Положение языка между зубами приводит к

- А. Мезиальной окклюзии
- Б. Глубокой резцовой окклюзии
- В. Дистальной окклюзии
- Г. Вертикальной резцовой дизокклюзии

Установите соответствие между аппаратом и их функцией Аппарат

1. Маска Диляра
 2. Небный бюгель
 3. Лицевая дуга с головной тягой
 4. Аппарат Норда
- Функция**
- А. Деротация моляров
 - Б. Интрузия моляров
 - В. Разрыв небного шва
 - Г. Нормализация положения верхней челюсти
- А. 1-Г 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-В 2-Б 3-Г 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между аппаратом и их функцией Аппарат

1. Маска Дилера
 2. Аппарат Персина
 3. Лицевая дуга с головной тягой
 4. Квадхеликс
- Функция
- А. Интрузия моляров
 - Б. Нормализация окклюзии
 - В. Нормализация положения верхней челюсти
 - Г. Расширение верхнего зубного ряда
- А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Пластина на верхнюю челюсть с винтом и секторальным распилом применяется для

- А. Равномерного расширения верхнего зубного ряда
- Б. Укорочения фронтального участка нижнего зубного ряда
- В. Одностороннего расширения верхнего зубного ряда
- Г. Раскрытия срединного небного шва

Уменьшение параметра P_g'-Go характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Сужения зубных рядов
- Г. Физиологической

Нейтральная (физиологическая) окклюзия соответствует классу Энгля

- А. I
- Б. II
- В. III
- Г. IV

Регулятор функции Френкеля III типа используется для лечения

- А. Дизокклюзии зубных рядов
- Б. Дистальной окклюзии
- В. Мезиальной окклюзии
- Г. Перекрестной окклюзии

Головная шапочка с подбородочной пращей позволяет

- А. Сдерживать рост нижней челюсти
- Б. Перемещать вперед верхний зубной ряд и верхнюю челюсть
- В. Стимулировать рост нижней челюсти
- Г. Сдерживать рост обеих челюстей

Установите соответствие между соотношением первых моляров по Энгля и состоянием окклюзии

Соотношение первых моляров

- 1. 1-ый класс
 - 2. 2-ой класс I подкласс
 - 3. 2-ой класс II подкласс
 - 4. III класс
- Состояние окклюзии**

- А. Физиологическая
- Б. Мезиальная
- В. Дистальная с протрузией резцов верхней челюсти
- Г. Дистальная с ретрузией резцов верхней челюсти

- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
- Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
- В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
- Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией

Клиническая ситуация

- 1. Вертикальная резцовая дизокклюзия
 - 2. Ретрузия резцов
 - 3. Адентия
 - 4. Глубокая резцовая окклюзия
- Конструктивный элемент**

- А. Протрагирующая пружина
- Б. Накусочную площадку
- В. Заслонку для языка
- Г. Искусственные зубы

- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
- Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
- В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
- Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Регулятор функций Френкеля

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти

2. Без окклюзионных накладок

3. Пелот для отведения нижней губы

4. Пелот для отведения верхней губы **Окклюзия**

А. Дистальная II класс I подкласс.

Б. Глубокая

В. Недоразвитие аппикального базиса верхней челюсти

Г. Недоразвитие аппикального базиса нижней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Б 2-В 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Изучить размеры зубных рядов в периоде временных зубов можно методом

А. Пона

Б. Коркхауза

В. Долгополовой

Г. Тона

Палатокклюзия относится к аномалиям окклюзии в направлении

А. Сагиттальном

Б. Вертикальном

В. Трансверсальном

Г. Сагиттальном и вертикальном

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его действия **Элемент**

1. Винт Бертони

2. Расширяющий винт

3. Кламмера Адамса

4. Протрагирующая пружина **Функция**

А. Одномоментно или поочередно расширить и удлинить зубной ряд

Б. Фиксация аппарата

В. Расширение зубного ряда

Г. Нормализация положения в вестиболо-оральном направлении

А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-А 2-В 3 -Б 4-Г

Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Передняя точка апикального базиса нижней челюсти

- А. Рg
- Б. В
- В. Me
- Г. А

Период подготовки к смене зубов продолжается

- А. От до лет
- Б. От 5 до 6 лет
- В. От 5 до 8 лет
- Г. От до 9 лет

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией

Клиническая ситуация

1. Глубокая резцовая окклюзия
2. Ретрузия резцов
3. Нарушение функции языка
4. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов

Конструктивный элемент

- А. Секторальный распил с винтом
- Б. Накусочную площадку
- В. Заслонку для языка
- Г. Окклюзионные накладки в области жевательной группы зубов

- А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г
- Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
- В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
- Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между методом функциональной диагностики и его показателями

- Метод диагностики**
1. Электромиография
 2. Аксиография
 3. Миотонометрия
 4. Периотестометрия

- Определяет**
- А. Тонус мышц
 - Б. Биопотенциалы мышц
 - В. Движение суставной головки
 - Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке

- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
- Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
- В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
- Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $A'-Snpr$
 2. Увеличение $Pg'-Go$
 3. Увеличение $<U1/Nl$
 4. Уменьшение $<L1/ML$ Окклюзия
- А. Ретрузия нижних резцов
Б. Дистальная
В. Ретрузия верхних резцов
Г. Мезиальная
- А. 1-Б 2-Г 3-В 4-А
Б. 1-В 2-Г 3-Б 4-А
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

При синдроме "наперстка" наблюдается

- А. Напряжение круговой и подбородочной мышц
Б. Напряжение верхней части лица
В. Ротовое дыхание
Г. Несмыкание губ

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $<1/1$ "alfa"
 2. $<U1/Nl$
 3. $<L1/ML$
 4. $<ML/NSL$ Характеристика
- А. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти
Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти
В. Положение основания нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа
Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
В. 1-Г 2-А 3-Б 4-В
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Компактоостеотомия проводится с целью

- А. Улучшения фиксации ортодонтического аппарата
Б. Ускорения ортодонтического лечения
В. Продолжения ортодонтического лечения
Г. Стабилизации результатов ортодонтического лечения

В регуляторе функции Френкеля I типа губные пелоты располагаются в области губы

- А. Нижней
- Б. Верхней
- В. Верхней и нижней
- Г. Нет губных пелотов

Вид эластичной тяги при лечении мезиальной окклюзии

- А. Межчелюстная по ii классу
- Б. Одночелюстная
- В. Межчелюстная по iii классу
- Г. Вертикальная

Передняя точка апикального базиса верхней челюсти

- А. Pg
- Б. В
- В. Me
- Г. А

Аппарат Брюкля предназначен для нормализации окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Вертикальной дизокклюзии
- Г. Лингвоокклюзии

Метод Герлаха применяют для определения

- А. Длины тела нижней челюсти
- Б. Ширины зубного ряда
- В. Пропорциональности размеров боковых и передних сегментов зубных рядов верхней и нижней челюстей
- Г. Лонгитудинальной длины зубного ряда

Диаграмма Хаулея-Гербера-Гербста позволяет определить

- А. Размеры зубных рядов
- Б. Форму зубных рядов
- В. Размеры сегментов зубных рядов
- Г. Размеры челюстных костей

Аппарат Pendulum используется для

- А. Дистализации боковой группы зубов
- Б. Сужения зубного ряда
- В. Укорочения зубного ряда
- Г. Ретенции

Ортопантомографию в ортодонтии применяют для определения

- А. Длины верхней челюсти
- Б. Длины нижней челюсти
- В. Наличия зачатков постоянных зубов
- Г. Ширины зубных рядов

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle L1/ML$

2. $Pg'-Go$

3. N-S

4. Co-Go Характеристика

А. Длина ветви нижней челюсти

Б. Длина переднего отдела основания черепа

В. Длина тела нижней челюсти

Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Точка угла нижней челюсти обозначается

- А. Co
- Б. Ar
- В. Go
- Г. Po

Лингвоокклюзия - это смещение

- А. Верхних боковых зубов орально
- Б. Нижних боковых зубов орально
- В. Верхних боковых зубов щечно
- Г. Нижних передних зубов вестибулярно

Передняя костная точка подбородочного отдела точка обозначается

- А. Pg
- Б. Me
- В. Ar
- Г. Go

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Вестибулярна дуга
 2. Трехмерный винт Бертони
 3. Протрагирующая пружина
 4. Петля для устранения диастемы
- Функция**

- А. Вестибярное отклонение резцов
- Б. Устранение протрузии резцов
- В. Расширение и удлинение зубного ряда
- Г. Нормализация положения центральных резцов

- А. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
- Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
- В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
- Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Сроки прорезывания постоянных зубов

- А. 1 - 6-7 лет, 2- 7-8 лет, 4 - 8-9 лет, 3 - 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 6 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- Б. 6 - 6-7 лет, 1- 7-8 лет, 2 - 8-9 лет, 3 - 11-12 лет, 4 - 9-10 лет, 5 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- В. 1 - 6-7 лет, 2- 7-8 лет, 3 - 8-9 лет, 4 - 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 6 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- Г. 6 - 6-7 лет, 1- 7-8 лет, 2 - 8-9 лет, 4- 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 3 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет

Показанием к протезированию у детей является

- А. Нарушение окклюзии
- Б. Аномалии формы временных зубов
- В. Ранняя потеря молочных зубов
- Г. Нарушение формы зубных рядов

Установите соответствие между аппаратом и показаниями его применению Аппарат

- 1. Регулятор функций Френкеля I типа**
 - 2. Расширяющая пластинка**
 - 3. Пластинка с секторальным распилом**
 - 4. Пластинка с накусочной площадкой Лечение окклюзии**
- А. Дистальная II класс I подкласс**
Б. Глубокая резцовая окклюзия
В. Уплотнение переднего участка зубного ряда
Г. Сужение зубных рядов
- А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Б. 1-Б 2-Г 3-В 4-А
В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

- 1. $\angle S/N/Pg$**
 - 2. Co-Go**
 - 3. $\angle A/N/V$**
 - 4. A'-Snр Характеристика**
- А. Длина апикального базиса верхней челюсти**
Б. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
В. Длина ветви нижней челюсти
Г. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа
- А. 1-А 2-Г 3-Б 4-В
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Привычка спать на спине с запрокинутой головой приводит к

- А. Нарушению положения зубов
Б. Нарушению прорезывания зубов
В. Задержке роста нижней челюсти
Г. Выдвижению нижней челюсти

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $Pg'-Go$

2. $<L1/ML$

3. $<U1/NL$

4. $A'-Snr$ Характеристика

А. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Длина апикального базиса верхней челюсти

Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Порядок прорезывания временных зубов

А. I - II - III - IV - V

Б. I - II - IV - III - V

В. II - I - III - IV - V

Г. I - II - V - IV - III

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Расширяющий винт

2. Протрагирующая пружина

3. Рукообразная пружина

4. Петля для устранения диастемы Функция

А. Расширения зубного ряда

Б. Нормализация положения отдельных зубов

В. Нормализация положения центральных резцов

Г. Небное положение зубов

А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между методом функциональной диагностики и его показателями Метод диагностики

- 1. Периотестометрия**
 - 2. Миотонометрия**
 - 3. Кинезиография**
 - 4. Электромиография** Определяет
- А. Тонус мышц**
Б. Биопотенциалы мышц
В. Движение нижней челюсти
Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке
- А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
Б. 1-В 2-Б 3-Г 4-А
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

- 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда расположена небно**
 - 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно**
 - 3. Косметический центр смещен вправо**
 - 4. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена щечно** Окклюзия
- А. Палатино-**
Б. Лингво-
В. Трансверсальная резцовая
Г. Вестибуло-
- А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Метод электромиографии в ортодонтии применяется для исследования

- А. Кровеносных сосудов пародонта**
Б. Работы ВНЧС
В. состояния пародонта
Г. Биопотенциала мышц

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией

Клиническая ситуация

1. Вертикальная резцовая дизокклюзия

2. Ретрузия резцов

3. Адентия

4. Глубокая резцовая окклюзия Конструктивный элемент

А. Секторальный распил

Б. Накусочную площадку

В. Искусственные зубы

Г. Окклюзионные накладки

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Губной бампер используют для

А. Укорочения нижнего зубного ряда

Б. Дистализации первых нижних моляров

В. Уплотнения переднего отрезка верхнего зубного ряда

Г. Сужения нижнего зубного ряда

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S

2. Co-Go

3. P_g'- Go

4. <A/N/V Характеристика

А. Длина тела нижней челюсти

Б. Длина переднего отдела основания черепа

В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Г. Длина ветви нижней челюсти

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение A'-Snpr
 2. Увеличение Pg'-Go
 3. Увеличение U1-NL
 4. Уменьшение U1-NL Окклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Глубокая резцовая
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
В. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. A'-Snpr
 2. Co-Go
 3. Pg'-Go
 4. N-S Характеристика
- А. Длина ветви нижней челюсти
Б. Длина тела нижней челюсти
В. Длина апикального базиса верхней челюсти
Г. Длина переднего отдела основания черепа
- А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <NL/NSL
 2. A'-Snpr
 3. <A/N/V
 4. Pg'-Go Характеристика
- А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
Б. Длина тела нижней челюсти
В. Длина апикального базиса верхней челюсти
Г. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа
- А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение A'- Snp
 2. Уменьшение Pg'- Go
 3. Увеличение U1-NL
 4. Увеличение <B Окклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Глубокая резцовая
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
В. 1-Г 2-А 3-Б 4-В
Г. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <L1/ML
 2. Co-Go
 3. Pg'- Go
 4. <A/N/V Характеристика
- А. Длина тела нижней челюсти
Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти
В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
Г. Длина ветви нижней челюсти
- А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Метод лучевой диагностики используемый для определения состояния пародонта зубов

- А. Ортопантомография;
Б. Внутриротовая рентгенография;
В. ТРГ-боковой проекции
Г. Томография ВНЧС.

Дистальное положение зуба - это смещение зуба

- А. Вперед по зубной дуге
Б. Назад по зубной дуге
В. В сторону неба
Г. В сторону щеки

Установите соответствие между аппаратом для функциональной диагностики и показателями Метод диагностики

1. Аксиограф
 2. Миотонометр
 3. Периотест
 4. Электромиограф Определяет
- А. Тонус мышц
Б. Биопотенциалы мышц
В. Движение суставной головки
Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между соотношением первых моляров по Энгу и состоянием окклюзии Соотношение первых моляров

1. 1-ый класс
 2. 2-ой класс I подкласс
 3. 2-ой класс II подкласс
 4. III класс Состояние окклюзии
- А. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается в поперечной фиссуре нижнего первого моляра
Б. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Протрузия резцов верхней челюсти
В. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Ретрузия резцов верхней челюсти
Г. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается позади поперечной фиссуры нижнего первого моляра
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Лицевая дуга позволяет

- А. Сдерживать рост верхней челюсти
Б. Перемещать вперед верхний зубной ряд и верхнюю челюсть
В. Стимулировать рост нижней челюсти
Г. Сдерживать рост обеих челюстей

II класс Энгля характеризуется смещением зубов

- А. Нижней челюсти назад
Б. Верхней челюсти назад
В. Нижней челюсти вперед
Г. Нижней челюсти латерально

Вестибулоклюзия относится к аномалиям окклюзии в направлении

- А. Сагиттальном
- Б. Вертикальном
- В. Трансверсальном
- Г. Сагиттальном и вертикальном

Мезиальное положение зуба - это смещение зуба

- А. Вперед по зубной дуге
- Б. Назад по зубной дуге
- В. В сторону неба
- Г. В сторону щеки

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle S/N/V$

2. $\angle L1/ML$

3. $\angle U1/NL$

4. $\angle S/N/A$ Характеристика

А. Положение апикального базиса верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

В. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти

Г. Положение апикального базиса нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

В. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Макродентия - это

- А. Уменьшение размеров зубов
- Б. Увеличение количества зубов
- В. Увеличение размеров зубов
- Г. Уменьшение количества зубов

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $\angle SNA$

2. Зубоальвеолярное укорочение в области резцов на верхней и нижней челюстях

3. Зубоальвеолярное укорочение в области боковых зубов на верхней и нижней челюстях

4. Протрузия верхних резцов Окклюзия

А. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Б. Дистальная

В. Сагиттальная резцовая дизокклюзия

Г. Дизокклюзия

А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Дуга энгля относится к аппаратам

А. Комбинированного действия

Б. Механического действия

В. Функционального действия

Г. Внеротовым

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle S/N/Pg$

2. $A'-Snp$

3. $\angle L1/ML$

4. $\angle A/N/V$ Характеристика

А. Длина апикального базиса верхней челюсти

Б. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа

В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Фиксирующие элементы в аппарате кламта

А. Вестибулярная дуга

Б. Рукообразные пружины

В. Кламмер адамса

Г. Только вестибулярная дуга

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Пуговчатый кламмер
2. Накусочная площадка
3. Щечный щит
4. Пелот

А. Интрузия нижних резцов

Б. Фиксация аппарата

В. Отведение мышц щек от альвеолярного отростка

Г. Отведение губы и стимуляция роста апикального базиса

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Уменьшение $\angle$ SNB характерно для окклюзии

А. Дистальной

Б. Мезиальной

В. Глубокой резцовой

Г. Физиологической

Прогнатия и ретрогнатия относятся к аномалиям

А. Размера челюстей

Б. Положения челюстей

В. Формы челюстей

Г. Положения и формы

Регулятор функции Френкеля III типа создает условия для роста

А. Нижней челюсти

Б. Верхней челюсти

В. Обеих челюстей

Г. Не влияет на рост

Увеличение $\angle$ SNA характерно для окклюзии

А. Дистальной

Б. Мезиальной

В. Глубокой резцовой

Г. Физиологической

Уменьшение $\angle$ SNPg характерно для окклюзии

- А. Дистальной
- Б. Мезиальной
- В. Глубокой резцовой
- Г. Физиологической

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Активация

1. Винта и вестибулярной дуги в расширяющей пластинке

2. Петли для устранения диастемы

3. Протрагирующей пружины

4. Рукообразной пружины Функция

А. Расширяется и укорачивается

Б. Медиальное смещение центральных резцов

В. Отклоняет вестибулярно

Г. Нормализует положение отдельных групп зубов

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Формированию вертикальной резцовой дизокклюзии может способствовать тип роста

- А. Смешанный
- Б. Вертикальный
- В. Горизонтальный
- Г. Нейтральный

При нейтральном смыкании зубных рядов верхний постоянный клык расположен

- А. На уровне бугорка нижнего клыка
- Б. На уровне первого премоляра
- В. Между нижним клыком и первым премоляром
- Г. Между нижним клыком и латеральным резцом

На телерентгенограмме черепа в боковой проекции угол β показывает

- А. Положение базисов челюстей относительно друг друга с учетом вертикального компонента
- Б. Наклон базиса верхней челюсти к основанию черепа
- В. Положение базисов челюстей относительно друг друга без учета вертикального компонента
- Г. Наклон базиса нижней челюсти к основанию черепа

«Полнопазной» дугой в брекетах

0.022 паза является

- А. 021X0.025
- Б. 016X0.022
- В. 019X0.025
- Г. 017X0.025

Окклюзионные накладки в аппарате персина для лечения вертикальной резцовой дизокклюзии позволяют

- А. Сдерживать рост апикального базиса
- Б. Нормализовать зубоальвеолярные высоты в области жевательной группы зубов
- В. Нормализовать функцию глотания
- Г. Стимулировать рост апикального базиса

Съемные пластиночные аппараты с искусственными зубами назначаются детям при

- А. Раннем удалении временных зубов
- Б. Физиологической смене зубов
- В. Дистальной окклюзии
- Г. Инfantильном типе глотания

Вращение зуба вокруг своей продольной оси без эффекта перемещения в других направлениях называют

- А. Ангуляцией
- Б. Транспозицией
- В. Ротацией
- Г. Торком

С помощью вестибулярной пластинки хинца можно

- А. Устранить вредную привычку сосания пальца
- Б. Устранить расщелину
- В. Расширить верхний зубной ряд
- Г. Нормализовать окклюзию

К аномалиям прорезывания зубов относят

- А. Ретенцию
- Б. Макродентию
- В. Гиперодентию
- Г. Адентию

Какой точке на коронке зуба должна соответствовать срединная точка опорной площадки брекета в технике прямой дуги: точке пересечения вертикальной оси зуба с

- А. Горизонтальной линией, разделяющей коронку на две равные половины
- Б. Горизонтальной линией, соответствующей анатомической шейки зуба
- В. Линией экватора коронки
- Г. Линией режущего края коронки

Величину скелетного челюстного несоответствия определяет угол

- А. ANB
- Б. SNB
- В. SNA
- Г. Go

Угол snb на боковой трг обозначает

- А. Соотношение базисов верхней челюсти и нижней челюсти в сагиттальной плоскости
- Б. Наклон нижней челюсти к основанию черепа
- В. Положение верхней челюсти в сагиттальной плоскости относительно основания черепа
- Г. Положение нижней челюсти в сагиттальной плоскости относительно основания черепа

Принцип действия аппарата дерихсвайлера

- А. Функционально действующий
- Б. Комбинированный
- В. Функционально направляющий
- Г. Механический

Реография области височно – нижнечелюстного сустава позволяет определить

- А. Движение суставных головок нижней челюсти
- Б. Гемодинамическое состояние сосудов височно – нижнечелюстного сустава
- В. Выносливость тканей пародонта
- Г. Сократительную способность мышц челюстно-лицевой области

Элайнер позволяет

- А. Сдерживать рост апикального базиса
- Б. Нормализовать функцию
- В. Нормализовать положение отдельных зубов
- Г. Стимулировать рост апикального базиса

Конструкция эластопозиционера повторяет контуры

- А. Вестибулярной, небной, язычной поверхностей зубов и альвеолярных отростков
- Б. Только вестибулярной поверхности зубов и альвеолярных отростков
- В. Только небной и вестибулярной поверхностей зубов
- Г. Только язычной и вестибулярной поверхностей зубов

Обязательного лечения в период временного прикуса требует

- А. Глубокая окклюзия
- Б. Дистальная окклюзия
- В. Перекрёстный прикус со смещением нижней челюсти
- Г. Фронтальная дезокклюзия

Уменьшение угла наклона базиса нижней челюсти к основанию черепа говорит о

- А. Горизонтальном типе роста
- Б. Ротации нижней челюсти против часовой стрелки
- В. Ротации нижней челюсти по часовой стрелке
- Г. Вертикальном типе роста

Перемещение депульпированных зубов возможно

- А. Только в сагиттальной плоскости
- Б. Только в вертикальной плоскости
- В. Только в трансверзальной плоскости
- Г. В сагиттальной, трансверзальной, вертикальной плоскостях

Активатор функции френкеля 3 типа используется для лечения

- А. Дистальной окклюзии с протрузией верхних резцов
- Б. Мезиальной окклюзии
- В. Дистальной окклюзии с ретрузией верхних резцов
- Г. Вертикальной резцовой дизокклюзии

Активатор андрезена-гойпля действует в

- А. Сагиттальной плоскости
- Б. Вертикальной плоскости
- В. Трёх плоскостях
- Г. Двух плоскостях

Преддверие полости рта глубиной в 4 мм считается

- А. Аномальным
- Б. Мелким
- В. Средним
- Г. Глубоким

Для дистопии характерным является

- А. Задержка прорезывания зуба
- Б. Поворот зуба вокруг своей оси
- В. Неправильное положение зуба
- Г. Уменьшение коронки зуба

Для нормализации функции дыхания применяется

- А. Применение активатора Андресена - Гойпля
- Б. Пластика укороченной уздечки языка
- В. Миотерапия для круговой мышцы губ после санации носоглотки
- Г. Исправление аномалии прикуса

При лечении прогенического прикуса (мезиальное смещение нижней челюсти) первым действием является

- А. Пришлифовывание зубов
- Б. Нормализация функции языка и глотания
- В. Аппаратурное лечение аномалии
- Г. Устранение деформации окклюзионной поверхности зубных рядов

На трг головы (в боковой проекции) определение sna snb anb , положения резцов относительно na и nb и s -линии по методу

- А. Fastlight
- Б. Персина
- В. McNamara
- Г. Steiner

К моменту рождения у ребёнка наблюдается младенческая

- А. Протрузия
- Б. Ретрузия
- В. Прогения
- Г. Ретрогения

Компьютерная оптическая топография используется для

- А. Исследования объема языка
- Б. Обследования ВНЧС
- В. Обследования осанки
- Г. Обследовании мышц челюстно-лицевой области

Протрагирующая пружина по виду воздействия является элементом

- А. Механическим
- Б. Функциональным
- В. Опорно-удерживающим
- Г. Ретенционным

Абсолютным противопоказанием для аппаратного ортодонтического лечения является

- А. Олигофрения
- Б. ДЦП спастическая форма
- В. Синдром Дауна
- Г. Шизофрения

Прокладывание языка между зубами приводит к _____ резцовой _____

- А. Мезиальной; окклюзии
- Б. Глубокой; окклюзии
- В. Вертикальной; дизокклюзии
- Г. Дистальной; окклюзии

Лицевую дугу относят к аппаратам

- А. Комбинированного типа действия
- Б. Ретенционным
- В. Функционального типа действия
- Г. Механического типа действия

У новорожденного нижняя челюсть в норме занимает _____ положение

- А. Варибельное
- Б. Нейтральное
- В. Дистальное
- Г. Мезиальное

На телерентгенограмме черепа в боковой проекции угол nsI/ml показывает наклон

- А. Базисов челюстей друг к другу
- Б. Базиса нижней челюсти к основанию черепа
- В. Базиса верхней челюсти к основанию черепа
- Г. Нижних резцов к плоскости основания черепа

Аппарат мионометр позволяет определить

- А. Подвижность зубов
- Б. Сократительную способность мышц
- В. Тонус жевательных мышц
- Г. Движение суставной головки

Центральные временные резцы на нижней челюсти в норме прорезываются в _____ месяцев

- А. 3-6
- Б. 9-12
- В. 0-3
- Г. 6-8

Окончательный диагноз устанавливается

- А. После сбора анамнеза
- Б. После анализа данных клинических и лабораторных исследований
- В. На основании симптоматического диагноза и эстетических нарушений
- Г. На основании клинических данных

Макродентия является аномалией _____ зубов

- А. Формы
- Б. Размера
- В. Количества
- Г. Структуры

Увеличение угла snb говорит о _____ челюсти

- А. Прогнатии верхней
- Б. Ретрогнатии верхней
- В. Прогнатии нижней
- Г. Ретрогнатии нижней

Соотношение первых моляров по 1 классу энгля соответствует окклюзии в боковом отделе

- А. Мезиальной
- Б. Дистальной
- В. Перекрестной
- Г. Физиологической

Дистальная окклюзия относится к аномалиям окклюзии в _____ плоскости

- А. Трансверзальной
- Б. Аксиальной
- В. Вертикальной
- Г. Сагиттальной

К показанию к удалению первых премоляров верхнего зубного ряда относят

- А. Мезиальную окклюзию
- Б. Макродентию верхних зубов, микродентию нижних зубов
- В. Дистальную окклюзию с дистопией, ретенцией верхних клыков
- Г. Дистальную окклюзию с глубокой резцовой окклюзией

В результате силового воздействия ортодонтического аппарата на стороне давления периодонтальная щель

- А. Расширяется
- Б. Сужается
- В. Не изменяется
- Г. Перемещается

Вестибулоокклюзия – это положение боковых зубов

- А. Лингвальное
- Б. Нёбное
- В. Язычное
- Г. Щечное

Полную морфологическую высоту лица измеряют между точками

- А. Or-Or
- Б. Zy-zy
- В. Go-go
- Г. N-gn

Для дистализации моляров верхней челюсти используют

- А. Лицевую маску
- Б. Лицевую дугу
- В. Аппарат Quad Helix
- Г. Аппарат Nance

Под инклинацией коронки зуба следует понимать

- А. Наклон ее продольной оси в мезиодистальном направлении
- Б. Наклон ее продольной оси в вестибулооральном направлении
- В. Интрузию коронки
- Г. Экструзию коронки

К аппаратам механического действия относится

- А. Брекет-система
- Б. Трейнер
- В. Каппа Шварца
- Г. Накусочная пластинка Катца

Самая распространенная нозологическая форма зубочелюстных аномалий

- А. Мезиальная окклюзия
- Б. Дистальная окклюзия
- В. Палатоокклюзия
- Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия

При открывании рта суставные головки нижней челюсти сдвигаются в сторону _____ суставного бугорка

- А. На середине
- Б. У основания
- В. В нижней трети
- Г. К вершине

По способу фиксации аппарат френкеля

- А. Частично несъемный
- Б. Сочетанный
- В. Съемный
- Г. Несъемный

У пациентов с микросомией в период сформированного прикуса постоянных зубов нормализация окклюзии возможна только в результате _____ лечения

- А. Терапевтического
- Б. Ортодонтического
- В. Комбинированного
- Г. Протетического

Аппарат pendulum предназначен для

- А. Дистализации моляров
- Б. Протракции фронтальной группы зубов
- В. Стабилизации положения моляров
- Г. Мезиализации моляров

Угол spn показывает

- А. Положение базиса верхней челюсти относительно основания черепа
- Б. Положение базиса нижней челюсти относительно основания черепа
- В. Положение базисов челюстей относительно друг друга
- Г. Наклон базиса верхней челюсти к основанию черепа

Щечным положением зуба называют

- А. Инфраположение
- Б. Супраположение
- В. Оральное
- Г. Вестибулярное

Главными элементами конструкции аппарата twin block являются

- А. Расширяющие винты
- Б. Щечные щиты
- В. Блоки с наклонными плоскостями
- Г. Подъязычные пелоты

Под установкой ортодонтического винта в зону izc понимают установку винта в

- А. Апикальный базис нижней челюсти
- Б. Ретромолярную область
- В. Апикальный базис верхней челюсти
- Г. Подскуловой гребень

В норме форму параболы имеет зубной ряд _____ прикусе

- А. Нижний во временном
- Б. Верхний во временном
- В. Верхний в постоянном
- Г. Нижний в постоянном

На трг головы в боковой проекции по методу jarabak определяются параметры

- А. SNA; SNB; ANB
- Б. ArGoMe; NGoAr; NGoMe
- В. NSAr; SArGo; ArGoMe
- Г. N-Ba\\PtV-Gn; NSGn; SGn\\FH

На трг головы (в боковой проекции) определение инклинации резцов относительно nl , ml , осп в зависимости от nl/ml по методу

- А. Fastlight
- Б. Steiner
- В. Персина
- Г. McNamara

Укороченная уздечка языка является причиной

- А. Задержки прорезывания постоянных зубов
- Б. Лингвоокклюзии
- В. Уплотнения переднего участка нижнего зубного ряда
- Г. Сужения верхнего зубного ряда

При лечении вертикальной резцовой дизокклюзии в сменном прикусе необходимо ввести в конструкцию съемного аппарата

- А. Заслонку для языка
- Б. Губной пелот
- В. Накусочную площадку в переднем сегменте
- Г. Внеротовую тягу

Прогнатией называется аномалия _____ челюсти

- А. Формы
- Б. Симметричности
- В. Размера
- Г. Положения

При сочетанной патологии правильной последовательностью формулировки диагноза считают

- А. Ортодонтический, стоматологический диагнозы с перечислением заболеваний других органов и систем
- Б. Ортодонтический, симптоматический диагнозы и характеристика других заболеваний пациента
- В. Топо-морфометрический диагноз с перечислением заболеваний других органов и систем пациента
- Г. Перечисление функциональных и эстетических нарушений пациента

Привычка сосания большого пальца может привести к

- А. Протрузии нижних резцов
- Б. Ретрузии верхних резцов
- В. Мезиальной окклюзии
- Г. Протрузии верхних резцов

Асимметричное сужение верхней челюсти относится к аномалии

- А. Зубных рядов по трансверсали
- Б. Позиции челюстей относительно друг друга
- В. Зубных рядов по вертикали
- Г. Размеров челюстей

На трг головы (в боковой проекции) референтная линия, проходящая через точки me и go

- А. NSL
- Б. NL
- В. ML
- Г. OccL

Вестибулярную дугу с м-образным изгибом применяют при

- А. Сужении верхнего зубного ряда
- Б. Небном положении клыка
- В. Вестибулярном положении клыка
- Г. Большом количестве трем

Верхняя губа относительно эстетической плоскости рикеттса в норме должна располагаться

- А. На плоскости
- Б. На 2-4 мм кпереди
- В. На 2-4 мм кзади
- Г. Пересекать плоскость

По месту расположения аппарат норда является

- А. Комбинированным
- Б. Внутриротовым
- В. Внеротовым
- Г. Лицевым

На цифровых моделях зубных рядов возможно определение антропометрических показателей

- А. Индексов Тонна, Болтона
- Б. Ширины и длины зубных рядов
- В. Всех существующих
- Г. Ширины и длины апикальных базисов

Рукообразная пружина является элементом

- А. Функциональным
- Б. Направляющим
- В. Фиксирующим
- Г. Механическим

При ретракции клыков на верхней челюсти прогресс регистрируется измерением расстояния

- А. Между клыком и латеральным резцом
- Б. От межрезцовой точки до вершины рвущего бугра клыка
- В. Между вершинами рвущих бугров клыков
- Г. Между наивысшей точкой щечной фиссуры первого моляра и вершиной рвущего бугра клыка

Рентгенографию кистей рук делают для

- А. Изучения динамики роста организма
- Б. Выяснения аномалий развития скелета
- В. Прогноза роста челюстей
- Г. Уточнения сроков окостенения

К длительному сохранению инфантильного типа глотания приводит использование

- А. Слишком жесткой соски для кормления
- Б. Грудного вскармливания
- В. Соски с большим отверстием для кормления
- Г. Укороченной соски для кормления

Для определения симметрии нижней челюсти необходимо сделать рентгеновский снимок

- А. ТРГ в боковой проекции
- Б. ТРГ в прямой проекции
- В. Зонографию ВНЧС
- Г. ОПТГ

Тактикой врача при ранней потере моляров на одной из челюстей при временном нейтральном прикусе является

- А. Рентгенобследование и массаж десны
- Б. Наблюдение
- В. Удаление зубов на противоположной челюсти
- Г. Изготовление съёмного протеза

К аномалиям окклюзии зубных рядов в боковом отделе относится

- А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия
- Б. Палатиноокклюзия
- В. Обратная резцовая окклюзия
- Г. Передняя перекрёстная дизокклюзия

Зубные ряды во временном прикусе имеют форму

- А. Параболы
- Б. Полукруга
- В. Полуэллипса
- Г. Трапеции

При «инфантильном» типе глотания формируется

- А. Мезиальная окклюзия
- Б. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- В. Глубокая резцовая дизокклюзия
- Г. Глубокая резцовая окклюзия

На трг головы (в боковой проекции) параметр, характеризующий нижнюю про- и ретрогнатию

- А. SNPog
- Б. SNA
- В. SNB
- Г. Se-N

На трг головы в боковой проекции значение угла $anb=8$ градусов свидетельствует о

- А. III скелетном классе
- Б. I скелетном классе
- В. Протрузии верхних резцов
- Г. II скелетном классе

Аппарат шварца относится к

- А. Комбинированным
- Б. Профилактическим
- В. Ретенционным
- Г. Лечебным

Сагиттальная резцовая дизокклюзия чаще всего сочетается с

- А. Мезиальной окклюзией
- Б. Дистальной окклюзией
- В. Сменным прикусом
- Г. Физиологической окклюзией зубных рядов

При мезиальной окклюзии на трг в боковой проекции угол anb

- А. Не изменяется
- Б. Увеличивается
- В. Становится резко положительным
- Г. Уменьшается

Нижняя макрогнатия чаще сочетается с аномалией положения резцов

- А. Протрузией верхних и ретрузией нижних резцов
- Б. Протрузией верхних и нижних резцов
- В. Ретрузией верхних и протрузией нижних резцов
- Г. Положение резцов вариабельно

Для коррекции небного положения бокового резца в период смены зубов используется пластинка с

- А. Окклюзионными накладками
- Б. Протрагирующей пружиной
- В. Заслонкой для языка
- Г. Вестибулярной дугой

Измерение длины головы проводят по точкам

- A. Zy-zy
- Б. Go-go
- В. Or-Or
- Г. Gl-op

Саггитальная щель может быть обусловлена _____ челюсти

- A. Протрузией резцов верхней; ретрузией резцов нижней
- Б. Протрузией резцов нижней; ретрузией резцов верхней
- В. Ретрузией резцов верхней и нижней
- Г. Протрузией резцов верхней и нижней

Глубокая резцовая дизокклюзия – это аномалия окклюзии в _____ плоскости

- A. Окклюзионной
- Б. Сагиттальной
- В. Трансверсальной
- Г. Вертикальной

Для ускоренного раскрытия срединного небного шва применяют

- A. Аппарат Энгля
- Б. Аппарат Айнсворта
- В. Аппарат Дерихсвайлера с винтом Бидермана
- Г. Мультибондинг-систему

Передняя точка подбородка обозначается

- A. Go
- Б. Ar
- В. Pg
- Г. Me

Угол i-nl на боковой трг обозначает

- A. Межчелюстной угол
- Б. Наклон верхних резцов к плоскости верхней челюсти
- В. Гониальный угол
- Г. Межрезцовый угол

Жевательная проба с.е. Гельмана показывает

- А. Степень измельчения 0,8 г ореха после пережевывания до появления глотательного рефлекса
- Б. Время разжевывания пищи
- В. Степень измельчения 5 г миндаля после жевания в течение 50 сек
- Г. Время, необходимое для совершения 50 жевательных движений

Позиционер необходим для установки брекетов по

- А. Ангуляции
- Б. Высоте
- В. Торку
- Г. Ротации

Точка n на трг - это

- А. Передне-верхний край носолобного шва
- Б. Передняя носовая ость
- В. Срединная точка на уровне входа в турецкое седло
- Г. Верхняя точка наружного слухового прохода

По классификации энгля дистальный блокирующий прикус относится к _____ классу

- А. II; 1 подклассу
- Б. III
- В. II; 2 подклассу
- Г. I

Латеральным положением центральных резцов называют

- А. Интрузию
- Б. Экструзию
- В. Тремы
- Г. Диастему

Мышцей, влияющей на формирования передне-медиальной дислокации суставного диска внчс, называют

- А. Височную
- Б. Латеральную крыловидную
- В. Медиальную крыловидную
- Г. Жевательную

Период подготовки к смене зубов у детей проходит в возрасте от ____ до (в годах)

- А. 3; 4
- Б. 5; 8
- В. 4; 6
- Г. 3; 9

Клиническую пробу эшлера-битнера применяют для уточнения этиологии

- А. Трансверсальной резцовой дизокклюзии
- Б. Мезиальной окклюзии
- В. Вертикальной резцовой дизокклюзии
- Г. Дистальной окклюзии

При отсутствии одного зуба в боковом отделе нижней челюсти у детей показано изготовление

- А. Малого седловидного протеза
- Б. Коронки с распоркой
- В. Частичного съемного протеза
- Г. Консольного протеза

Под интрузией понимают перемещение зуба

- А. В направлении к окклюзионной плоскости
- Б. Вестибулярно
- В. В направлении к апексу
- Г. Дистально

Типичное положение нижней челюсти новорожденного называется младенческой

- А. Прогнатией
- Б. Микрогнатией
- В. Ретрогенией
- Г. Прогенией

Клинической картине подвывиха суставного диска соответствует

- А. Невозможность закрыть рот
- Б. Щелчок при открывании рта
- В. Увеличение амплитуды движения нижней челюсти
- Г. Ограничение открывания рта

Длина тела нижней челюсти по шварцу при ее нормальном развитии равна длине основания передней черепной ямки плюс (в мм)

- А. 4
- Б. 5
- В. 2
- Г. 3

В норме индекс тона равен

- А. 2,15
- Б. 1,33
- В. 2
- Г. 1

Памятью формы обладают дуги

- А. Стальные
- Б. Титан-молибденовые
- В. Хром-кобальтовые
- Г. Никель-титановые

Палатиноокклюзия – это положение боковых зубов

- А. Щечное
- Б. Нёбное
- В. Вестибулярное
- Г. Лингвальное

При проведении компьютерной оптической топографии используют

- А. Световой поток
- Б. Электроды
- В. Рентгеновские лучи
- Г. Магниты