

Тесты с вопросами по специальности «Ортодонтия» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/ortodont/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Ортодонтия» для аккредитации и других экзаменов (1500 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/ortodontiya/

2) Тесты для аккредитации «Стоматология ортопедическая» (1900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/ortoped/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Разрушение дистальной поверхности зуба 75 приводит к

- А. Сужению нижнего зубного ряда
- Б. Тесному положению нижних передних зубов
- В. Мезиальному смещению зуба 16
- Г. Не имеет последствий

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

- 1. Сагиттальный распил, расширяющий винт**
 - 2. Секторальный распил в области первого моляра справа**
 - 3. Протрагирующие пружины**
 - 4. Петля для устранения диастемы**
- Клиническая ситуация**
- А. Мезиальное смещение первого моляра справа**
- Б. Оральное положение зубов**
- В. Сужение верхнего зубного ряда**
- Г. Латеральное положение центральных резцов**

А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики

Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

- 1. Расстояния в области fossa canina на уровне верхушек корней первых премоляров верхней челюсти**
 - 2. Мезиодистальные размеры резцов нижнего зубного ряда и определение их суммы**
 - 3. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров**
 - 4. Соотношения сумм размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов**
- Метод антропометрической диагностики**

А. Ширина апикального базиса верхней челюсти

Б. Определение индекса пропорциональности зубных рядов (1,08)

В. Индекс Тонна

Г. Метод Коркхауса

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

В. 1-А 2-Г 3-В 4--Б

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S

2. A'-Snр

3. <A/N/B

4. Pg'- Go Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Длина апикального базиса верхней челюсти

Г. Длина переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Упор для языка

2. Расширяющий винт

3. Веерообразный винт

4. Петля для устранения диастемы Функция

А. Нормализация положения языка

Б. Равномерное расширение зубного ряда

В. Расширение зубного ряда в переднем отделе

Г. Нормализация положения центральных резцов

А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

В. 1-Б 2-Г 3-А 4--В

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

По месту расположения небный бюгель

А. Внутриротовой

Б. Внеротовой

В. Вестибулярный

Г. Сочетанный

Пластика на верхнюю челюсть с винтом и срединным распилом применяется для

А. Равномерного расширения верхнего зубного ряда

Б. Удлинения фронтального участка нижнего зубного ряда

В. Одностороннего расширения верхнего зубного ряда

Г. Раскрытия срединного небного шва

Точка центра турецкого седла

- A. S
- Б. Po
- В. Pt
- Г. Ba

Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и вестибулярной дугой позволяет провести

- A. Уплотнение переднего отдела нижнего зубного ряда
- Б. Расширение и уплотнение верхнего зубного ряда
- В. Устранение вредных привычек
- Г. Устранение дизокклюзии

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <NL/ML "B"

2. <S/N/A

3. <1/1 "alfa"

4. <A/N/B Характеристика

A. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

Б. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

В. Положение апикального базиса верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение оснований верхней и нижней челюстных костей

A. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между методом лучевой диагностики и областью изучения

Метод лучевой диагностики

1. Ортопантомограмма

2. ТРГ головы в боковой проекции

3. ТРГ головы в прямой проекции

4. Панорамный рентгеновский снимок Изучает состояние

A. Пародонта боковой группы зубов

Б. Пародонта передней группы зубов

В. Сагиттальные размеры челюстных костей и их положение

Г. Трансверсальные размеры челюстных костей и их положение

A. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $\angle$ SNB
 2. Увеличение $\angle$ SNA
 3. Зубоальвеолярное укорочение в области резцов верхнего зубного ряда
 4. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов верхнего зубного ряда
- Окклюзия
- А. Мезиальная
 - Б. Дистальная
 - В. Глубокая резцовая окклюзия
 - Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии
Регулятор функций Френкеля

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
 2. Окклюзионные накладки
 3. Пелот для отведения нижней губы
 4. Пелот для отведения верхней губы
- Окклюзия
- А. Дистальная II класс I подкласс.
 - Б. Мезиальная
 - В. Недоразвитие аппикального базиса верхней челюсти
 - Г. Недоразвитие аппикального базиса нижней челюсти
- А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Расширяющий винт
 2. Протрагирующая пружина
 3. Рукообразная пружина
 4. Петля для устранения диастемы
- Функция
- А. Расширения зубного ряда
 - Б. Нормализация положения отдельных зубов
 - В. Нормализация положения центральных резцов
 - Г. Небное положение зубов
- А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Вестибулярна дуга
 2. Трехмерный винт Бертони
 3. Протрагирующая пружина
 4. Петля для устранения диастемы
- Функция**
- А. Вестибярное отклонение резцов
 - Б. Устранение протрузии резцов
 - В. Расширение и удлинение зубного ряда
 - Г. Нормализация положения центральных резцов
- А. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда расположена небно
 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно
 3. Косметический центр смещен вправо
 4. Подбородок смещен вправо
- Окклюзия**
- А. Палатино-
 - Б. Лингво-
 - В. Нет правильного ответа
 - Г. Трансверсальная резцовая
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
В. 1-А 2-Г 3-Б 4-В
Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Мезиальное положение зуба - это смещение зуба

- А. Вперед по зубной дуге
- Б. Назад по зубной дуге
- В. В сторону неба
- Г. В сторону щеки

В норме нижние центральные резцы имеют

- А. По антагонисту
- Б. По 2 антагониста
- В. Контактируют с клыками верхней челюсти
- Г. Контактируют с боковыми резцами верхней челюсти

Установите соответствие между клинической картиной в полости и состоянием окклюзии

Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля**
 - 2. Смещение косметического центра вправо**
 - 3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля**
 - 4. Протрузия верхних резцов**
- Окклюзия**
- А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия**
- Б. Дистальная**
- В. Мезиальная**
- Г. Трансверсальная резцовая**

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Квадхеликс предназначен для

- А. Расширения зубного ряда**
- Б. Удлинения зубного ряда**
- В. Стимуляции роста нижней челюсти**
- Г. Профилактики зубочелюстных аномалий**

Положение языка между зубами приводит к

- А. Мезиальной окклюзии**
- Б. Глубокой резцовой окклюзии**
- В. Дистальной окклюзии**
- Г. Вертикальной резцовой дизокклюзии**

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии

Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Протрузия резцов верхней и нижней челюстей**
 - 2. Отсутствие смыкания передних зубов**
 - 3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля**
 - 4. Резцовое перекрытие более 1/3**
- Окклюзия**
- А. Вертикальная резцовая дизокклюзия**
- Б. Дистальная**
- В. Глубокая резцовая**
- Г. Бипротрузия**

А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Б. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <ML/NSL

2. <S/N/A

3. <NL/NSL

4. <S/N/B Характеристика

А. Положение основания нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Б. Положение апикального базиса нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

В. Положение апикального базиса верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Г. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Резцовое перекрытие составляет более 2/3

2. Отсутствие режуще-бугорковых контактов

3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля

4. Обратное смыкание резцов Окклюзия

А. Глубокая

Б. Дистальная

В. Дизокклюзия

Г. Обратная резцовая

А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Соотношение сумм медиолатеральных размеров резцов верхнего и нижнего зубных рядов
 2. Мезиодистальные размеры верхних и нижних зубов и их соотношение
 3. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров
 4. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности нижних центральных резцов до линии в области дистальных поверхностей первых моляров
- Метод антропометрической диагностики
- А. Индекс пропорциональности размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов (1.08мм)
- Б. Длина апикального базиса верхней челюсти
- В. Индекс Тонна
- Г. Метод Коркхауза
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
- Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
- В. 1-Б 2-В 3-Г 4-А
- Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией
Пластиночный аппарат для нижней челюсти

1. Сагиттальный распил, расширяющий винт
 2. Секторальный распил в области резцов нижней челюсти
 3. Вестибулярная дуга
 4. Протрагирующая пружина
- Клиническая ситуация
- А. Протрузия резцов нижней челюсти
- Б. Уплотнение переднего участка нижнего зубного ряда
- В. Сужение нижнего зубного ряда
- Г. Лингвальное положение резцов
- А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
- Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
- В. 1-В 2-Б 3-А 4-Г
- Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией

Клиническая ситуация

- 1. Глубокая резцовая окклюзия**
- 2. Сужение и укорочение зубного ряда**
- 3. Зубоальвеолярное удлинение**
- 4. Латеральное положение центральных резцов** Конструктивный элемент

А. Окклюзионные накладки

Б. Накусочную площадку

В. Винт Бертони

Г. Петля для устранения диастемы

А. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Трехмерный винт Бертони позволяет

А. Одномоментно или поочередно расширить и удлинить зубной ряд

Б. Дистализировать зубы в боковых отделах верхнего зубного ряда

В. Расширить зубной ряд в переднем отделе

Г. Раскрыть небный шов

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена щечно

2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно

3. Косметический центр смещен вправо

4. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена небно Окклюзия

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Вестибуло-

Г. Трансверсальная резцовая

А. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Открытый активатор Кламмта

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
2. Окклюзионные накладки отсутствуют
3. Сагиттальный распил. Установлен расширяющий винт
4. Упор для языка Окклюзия

А. Дистальная. Сужение верхнего зубного ряда

Б. Глубокая

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Протрузия резцов

А. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Расстояния в области fossa canina на уровне верхушек корней первых премоляров верхней челюсти

2. Величина перпендикуляра проведенного от линии соединяющей дистальные поверхности первых моляров до вершины резцового сосочка

3. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров

4. Соотношение сумм мезиодистальных размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов Метод антропометрической диагностики

А. Ширина апикального базиса верхней челюсти

Б. Длина апикального базиса верхней челюсти

В. Индекс Тонна

Г. Метод Коркхауса

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Фиксирующие элементы

А. Винт

Б. Вестибулярная дуга

В. Базис и кламмера Адамса

Г. Протрагирующие пружины

Установите соответствие между аппаратом и показаниями его применению Аппарат

1. Регулятор функций Френкеля I типа
 2. Расширяющая пластинка
 3. Пластинка с секторальным распилом
 4. Пластинка с накусочной площадкой Лечение окклюзии
- А. Дистальная II класс I подкласс
Б. Глубокая резцовая окклюзия
В. Уплотнение переднего участка зубного ряда
Г. Сужение зубных рядов
- А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Б. 1-Б 2-Г 3-В 4-А
В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Аппарат Кламмта предназначен для

- А. Сужения верхнего зубного ряда
Б. Нормализации окклюзии в сагиттальном направлении
В. Нормализации окклюзии в трансверсальном направлении
Г. Удлинения верхнего зубного ряда

О симметричности развития правой и левой половины нижней челюсти позволяют судить

- А. Панорамная рентгенограмма
Б. Трп - боковая проекция
В. Трп - прямая проекция и Клт
Г. Ортопантограмма и томография внчс

Самая глубокая точка апикального базиса верхней челюсти

- А. А
Б. В
В. Sna
Г. Snp

Мандибулярная плоскость обозначается

- А. Ocl
Б. ML
В. NL
Г. FH

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $A'-Snpr$
2. Увеличение $Pg'-Go$
3. Увеличение $<U1/NI$
4. Уменьшение $<L1/ML$ Окклюзия

А. Ретрузия нижних резцов

Б. Дистальная

В. Ретрузия верхних резцов

Г. Мезиальная

А. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Б. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии состоянием окклюзии

Открытый активатор Кламмта

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти

2. Окклюзионные накладки

3. Пелот для отведения верхней губы

4. Расширяющий винт. Вестибулярная дуга Окклюзия

А. Дистальная. Сужение верхнего зубного ряда

Б. Мезиальная

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Сагиттальная щель. Протрузия резцов на верхней челюсти

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-Г 2-В 3-А 4-В

В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Щечные бугорки нижних боковых зубов в норме контактируют

А. С небными бугорками верхних

Б. С продольными фиссурами верхних

В. Со щечными бугорками верхних

Г. Вестибулярными поверхностями верхних

Установите соответствие между аппаратом для функциональной диагностики и показателями Метод диагностики

- 1. Аксиограф**
 - 2. Миотонометр**
 - 3. Периотест**
 - 4. Электромиограф** Определяет
- А. Тонус мышц**
Б. Биопотенциалы мышц
В. Движение суставной головки
Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Прогнатия и ретрогнатия относятся к аномалиям

- А. Размера челюстей**
Б. Положения челюстей
В. Формы челюстей
Г. Положения и формы

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

- 1. Сагиттальный распил, расширяющий винт**
 - 2. Протрагирующие пружины в области резцов верхнего зубного ряда**
 - 3. Рукообразные пружины**
 - 4. Петля для устранения диастемы** Клиническая ситуация
- А. Оральное положение верхних резцов**
Б. Сужение верхнего зубного ряда
В. Латеральное положение центральных резцов
Г. Латеральное положение зубов
- А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его действия Элемент

1. Винт Бертони
 2. Расширяющий винт
 3. Кламмера Адамса
 4. Протрагирующая пружина
- Функция
- А. Одномоментно или поочередно расширить и удлинить зубной ряд
 - Б. Фиксация аппарата
 - В. Расширение зубного ряда
 - Г. Нормализация положения в вестиболо-оральном направлении
- А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
- Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
- В. 1-А 2-В 3 -Б 4-Г
- Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S
 2. A'-Snpr
 3. <L1/ML
 4. <A/N/V Характеристика
- А. Длина апикального базиса верхней челюсти
- Б. Длина переднего отдела основания черепа
- В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
- Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти
- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
- Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
- В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
- Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение A'- Snpr
 2. Увеличение Pg'- Go
 3. Увеличение U1-NL
 4. Уменьшение U1-NL Окклюзия
- А. Мезиальная
- Б. Дистальная
- В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- Г. Глубокая резцовая
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
- Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
- В. 1-Г 2-Б 3-В 4-А
- Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Установите соответствие между аппаратом и их функцией Аппарат

1. Открытый активатор Кламмта с упором для языка и окклюзионными накладками
 2. Пластика с секторальным размером в области первых моляров
 3. Квадхеликс
 4. Маска Диляра Функция
- А. Удлинение зубного ряда в боковом отделе
Б. Вертикальная резцовая дизокклюзия
В. Расширения верхнего зубного ряда
Г. Нормализация положения верхней челюсти
- А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Резцовое перекрытие составляет более 1/3
 2. Обратное перекрытие в области резцов верхней и нижней челюстей, смещение косметического центра
 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля
 4. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля Окклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Глубокая резцовая
Г. Обратная трансверсальная резцовая
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между методом функциональной диагностики и его показателями Метод диагностики

1. Электромиография
 2. Аксиография
 3. Миотонометрия
 4. Периотестометрия Определяет
- А. Тонус мышц
Б. Биопотенциалы мышц
В. Движение суставной головки
Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Недостаток места может привести к аномалии

- А. Положения
- Б. Размера
- В. Формы
- Г. Структуры

**Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии
Открытый активатор Кламмта**

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
- 2. Окклюзионные накладки отсутствуют
- 3. Сагиттальный распил. Установлен расширяющий винт
- 4. Упор для языка Окклюзия

- А. Дистальная. Сужение верхнего зубного ряда
- Б. Глубокая
- В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- Г. Протрузия резцов

- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
- Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
- В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
- Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

- 1. A'-Snpr
- 2. Co-Go
- 3. P_g'- Go
- 4. N-S Характеристика
- А. Длина ветви нижней челюсти
- Б. Длина тела нижней челюсти
- В. Длина апикального базиса верхней челюсти
- Г. Длина переднего отдела основания черепа

- А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г
- Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
- В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
- Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <L1/ML

2. Pg'- Go

3. N-S

4. Co-Go Характеристика

А. Длина ветви нижней челюсти

Б. Длина переднего отдела основания черепа

В. Длина тела нижней челюсти

Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Резцовое перекрытие составляет более 1/3

2. Обратное перекрытие в области резцов верхней и нижней челюстей, смещение косметического центра

3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля

4. Несовпадение средней линии Окклюзия

А. Мезиальная

Б. Трансверсальная резцовая

В. Глубокая резцовая

Г. Обратная трансверсальная резцовая

А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии Открытый активатор Кламмта

1. Вестибулярная дуга в области резцов нижней челюсти

2. Без окклюзионных накладок

3. Пелот для отведения верхней губы 4 Установлен расширяющий винт Окклюзия

А. Сужение верхнего зубного ряда

Б. Протрузия резцов

В. Глубокая резцовая

Г. Мезиальная

А. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Б 2-В 3-Г 4-А

Головная шапочка с подбородочной пращей позволяет

- А. Сдерживать рост нижней челюсти
- Б. Перемещать вперед верхний зубной ряд и верхнюю челюсть
- В. Стимулировать рост нижней челюсти
- Г. Сдерживать рост обеих челюстей

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики
Антропометрические параметры гипсовых моделей зубных рядов

- 1. Измерение ширины апикального базиса
 - 2. Измерение ширины зубного ряда
 - 3. Определение соотношения сумм резцов верхнего и нижнего зубных рядов
 - 4. Определение длины переднего участка верхнего зубного ряда
- Метод антропометрической диагностики**

А. Определение индекса Тонна

Б. Метод Пона

В. Метод Коркхауса

Г. Метод Хауса

А. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Б. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

В. 1-Б 2-В 3-Г 4-А

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии
Аппарат Персина

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
 - 2. Окклюзионные накладки
 - 3. Нижний губной пелот
 - 4. Заслонка для языка
- Окклюзия**

А. Протрузия верхних резцов

Б. Мезиальная

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Дистальная

А. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Б. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией

- | | |
|---|---------|
| 1. Пуговчатый кламмер | |
| 2. Накусочная площадка | |
| 3. Щечный щит | |
| 4. Пелот | Функция |
| А. Интрузия нижних резцов | |
| Б. Фиксация аппарата | |
| В. Отведение мышц щек от альвеолярного отростка | |
| Г. Отведение губы и стимуляция роста апикального базиса | |
| А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б | |
| Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г | |
| В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г | |
| Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б | |

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии

- | | |
|--|----------|
| Показатели ТРГ головы в боковой проекции | |
| 1. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов | |
| 2. Уменьшение <SNB | |
| 3. Зубоальвеолярное удлинение в области передних зубов | |
| 4. Увеличение <SNB | Окклюзия |
| А. Мезиальная | |
| Б. Дистальная | |
| В. Глубокая резцовая | |
| Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия | |
| А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г | |
| Б. 1-Г 2-Б 3-В 4-А | |
| В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б | |
| Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б | |

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в прямой проекции и состоянием окклюзии

- | | |
|---|----------|
| Показатели ТРГ головы в прямой проекции | |
| 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда расположена небно | |
| 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно | |
| 3. Косметический центр смещен вправо | |
| 4. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена щечно | Окклюзия |
| А. Палатино- | |
| Б. Лингво- | |
| В. Трансверсальная резцовая | |
| Г. Вестибуло- | |
| А. 1-А 2-В 3-Г 4-Б | |
| Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г | |
| В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г | |
| Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В | |

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение <SNB
2. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов
3. увеличение <SNPg
4. Резцовое перекрытие более 2/3 Окклюзия

- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Глубокая резцовая
Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия

- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
Г. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии
Регулятор функций Френкеля

1. Пелот для отведения верхней губы
2. Вестибулярная дуга
3. Пелот для отведения нижней губы
4. Протрагирующая дуга Окклюзия

- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Протрузия резцов
Г. Дистальная окклюзия в сочетании с ретрузией верхних резцов

- А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Г. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Заслонка для языка
 2. Окклюзионные накладки
 3. Вестибулярная дуга
 4. Пелот Функция
- А. Нормализация положения языка
Б. Интрузия боковых зубов
В. Фиксация аппарата
Г. Отведение губы и стимуляция роста апикального базиса

- А. 1-Б 2-Г 3-В 4-А
Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

- 1. Упор для языка**
 - 2. Щечные щиты**
 - 3. Протрагирующая пружина**
 - 4. накусочная площадка**
- Функция**
- А. Нормализация положения языка**
 - Б. Интрузия резцов**
 - В. Отведение мышц щек от альвеолярного отростка**
 - Г. Нормализация положения зубов**
- А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Для нормализации положения зубов показан

- А. Позиционер с Setup зубов**
- Б. Преформированный ретейнер**
- В. Каппа Шварца**
- Г. Аппарат Кламонта**

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

- 1. $\angle S/N/Pg$**
 - 2. $A'-Snp$**
 - 3. $\angle L1/ML$**
 - 4. $\angle A/N/B$ Характеристика**
- А. Длина апикального базиса верхней челюсти**
Б. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа
В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти
- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <ML/NSL

2. <L1/ML

3. <U1/NL

4. <NL/NSL Характеристика

А. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти

Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

В. Положение основания нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

Г. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Вестибулярная дуга

2. Губной пелот

3. Протрагирующая пружина

4. Петля для устранения диастемы Функция

А. Уплотнение зубного ряда

Б. Стимуляция роста апикального базиса

В. Отклонение вестибулярно зубов

Г. Нормализация положения центральных резцов

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его действия Элемент

1. Протрагирующая пружина

2. Расширяющий винт

3. Веерообразный винт

4. Вестибулярная дуга Функция

А. Нормализация положения зубов

Б. Фиксация аппарата

В. Расширить зубной ряд в переднем отделе

Г. Расширение верхнего зубного ряда

А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Аппарат для раскрытия срединного небного шва

- А. Небный бюгель
- Б. Аппарат Дерихсвайлера
- В. Бихеликс
- Г. Расширяющая пластинка

Плоскость основания верхней челюсти обозначается

- А. Ocl
- Б. ML
- В. NL
- Г. FH

Сроки прорезывания постоянных зубов

- А. 1 - 6-7 лет, 2- 7-8 лет, 4 - 8-9 лет, 3 - 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 6 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- Б. 6 - 6-7 лет, 1- 7-8 лет, 2 - 8-9 лет, 3 - 11-12 лет, 4 - 9-10 лет, 5 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- В. 1 - 6-7 лет, 2- 7-8 лет, 3 - 8-9 лет, 4 - 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 6 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет
- Г. 6 - 6-7 лет, 1- 7-8 лет, 2 - 8-9 лет, 4- 11-12 лет, 5 - 9-10 лет, 3 - 10-11лет, 7 - 12-13 лет

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <L1/ML

2. Co-Go

3. Pg'- Go

4. <A/N/V Характеристика

А. Длина тела нижней челюсти

Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Г. Длина ветви нижней челюсти

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <S/N/Pg

2. Co-Go

3. <A/N/B

4. A'-Snр Характеристика

А. Длина апикального базиса верхней челюсти

Б. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

В. Длина ветви нижней челюсти

Г. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Г. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Измерение ширины и длины апикального базиса

2. Соотношение суммы медиолатеральных размеров верхних и нижних резцов

3. Измерение медиолатеральных размеров резцов нижнего зубного ряда

4. Определение по таблице ширины зубных рядов в области премоляров Метод антропометрической диагностики

А. Определение индекса Тонна (1,33)

Б. Метод Пона

В. Определение индивидуальных размеров резцов верхнего зубного ряда

Г. Метод Хауса

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Аппарат

1. Пластика с секторальным распилом в области резцов верхней челюсти

2. Пластика с сагиттальным распилом

3. Аппарат Андресена-Гойпля

4. Pendulum Функция

А. Удлинение зубного ряда в переднем отделе

Б. Расширение зубного ряда верхней челюсти

В. Дистализация первых моляров

Г. Нормализация окклюзии

А. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Аппарат Норда предназначен для

- А. Симметричного расширения верхнего зубного ряда
- Б. Одностороннего расширения верхнего зубного ряда
- В. Раскрытия небного шва
- Г. Профилактики перекрестной окклюзии

Вестибулоклюзия - это смещение

- А. Нижних или верхних боковых зубов в щечную сторону
- Б. Нижних или верхних боковых зубов в оральную сторону
- В. Только верхних боковых зубов в оральную сторону
- Г. Нижних передних зубов орально

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией

Клиническая ситуация

- 1. Глубокая резцовая окклюзия
- 2. Ретрузия резцов
- 3. Нарушение функции языка
- 4. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов

Конструктивный элемент

- А. Секторальный распил с винтом
- Б. Накусочную площадку
- В. Заслонку для языка
- Г. Окклюзионные накладки в области жевательной группы зубов

А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Метод Герлаха применяют для определения:

- А. Длины тела нижней челюсти
- Б. Ширины зубного ряда
- В. Пропорциональности размеров боковых и передних сегментов зубных рядов верхней и нижней челюстей
- Г. Лонгитудальной длины зубного ряда

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

- 1. Резцовое перекрытие составляет более 2/3**
- 2. Обратное смыкание резцов**
- 3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля**
- 4. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля Оклюзия**

А. Мезиальная

Б. Дистальная

В. Глубокая резцовая дизокклюзия

Г. Обратная трансверсальная резцовая

А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Аппарат Андресена-Гойпля по назначению является

А. Лечебным

Б. Ретенционным

В. Профилактическим

Г. Комбинированным

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Расширяющий винт

2. Протрагирующая пружина

3. Рукообразная пружина

4. Петля для устранения диастемы Функция

А. Расширение зубных рядов

Б. Вестибулярное отклонение зубов

В. Устранение трем

Г. Устранение диастем

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Коронка с распоркой на зуб 16 предназначена для

А. Сохранения места 15

Б. Мезиализации 16

В. Дистализации 16

Г. Ротации 16

Нейтральная (физиологическая) окклюзия соответствует классу энгля

- А. I
- Б. li
- В. lii
- Г. lv

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. Pg'- Go

2. <L1/ML

3. <U1/NL

4. A'-Snр Характеристика

А. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Длина апикального базиса верхней челюсти

Г. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Линия, соответствующая основанию верхней челюсти, проводится через точки

- А. Pg-Go
- Б. N-S
- В. Ar-Go
- Г. Sna-Snp

Открытый активатор Кламмта относится к

- А. Профилактическим
- Б. Лечебным съемным
- В. Ретенционным
- Г. Лечебным несъемным

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией

Клиническая ситуация

- 1. Вертикальная резцовая дизокклюзия**
 - 2. Ретрузия резцов**
 - 3. Адентия**
 - 4. Глубокая резцовая окклюзия**
- Конструктивный элемент**

- А. Секторальный распил**
- Б. Накусочную площадку**
- В. Искусственные зубы**
- Г. Окклюзионные накладки**

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики
Антропометрические параметры гипсовых моделей зубных рядов

- 1. Измерение медиолатеральных размеров резцов верхнего зубного ряда и определение их суммы**
 - 2. Определение по таблице длины апикального базиса**
 - 3. Определение по таблице ширины зубных рядов в области моляров**
 - 4. Определение длины переднего участка верхнего зубного ряда**
- Метод антропометрической диагностики**

- А. Определение индекса Тонна**
- Б. Метод Пона**
- В. Метод Коркхауса**
- Г. Метод Хауса**

А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Г. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Регулятор функций Френкеля

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов нижней челюсти**
 - 2. Без окклюзионных накладок**
 - 3. Пелот для отведения верхней губы**
 - 4. Щечные щиты**
- Окклюзия**

- А. Дистальная и мезиальная**
- Б. Мезиальная**
- В. Протрузия резцов**
- Г. Дистальная**

А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Б. 1-Б 2-В 3-Г 4-А

В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между конструкцией аппарат и его функцией Аппарат

- 1. Пластика с сагиттальным распилом**
- 2. Регулятор функций Френкеля**
- 3. Лицевая дуга**
- 4. Наклонная плоскость Действие**

- А. Расширения зубного ряда**
- Б. Нормализация окклюзии**
- В. Вестибулярное отклонение резцов**
- Г. Экструзия ,дистализация моляров**

- А. 1-А 2-А 3-В 4-Г**
- Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В**
- В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В**
- Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В**

**Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии
Регулятор функций Френкеля**

- 1. Пелот для отведения нижней губы**
- 2. С окклюзионными накладками**
- 3. Вестибулярная дуга**
- 4. Протраггующая дуга Окклюзия**

- А. Мезиальная**
- Б. Дистальная**
- В. Протрузия верхних резцов**
- Г. Ретрузия верхних резцов**

- А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г**
- Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г**
- В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г**
- Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г**

Установите соответствие между методом функциональной диагностики и его показателями Метод диагностики

- 1. Периотестометрия**
- 2. Миотонометрия**
- 3. Кинезиография**
- 4. Электромиография Определяет**

- А. Тонус мышц**
- Б. Биопотенциалы мышц**
- В. Движение нижней челюсти**
- Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке**

- А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б**
- Б. 1-В 2-Б 3-Г 4-А**
- В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В**
- Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г**

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

- 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда расположена небно**
- 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно**
- 3. Косметический центр смещен вправо**
- 4. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена щечно**

Окклюзия

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Трансверсальная резцовая

Г. Вестибуло-

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между клинической ситуацией и состоянием окклюзии

Клиническая ситуация

- 1. Протрузия резцов верхней челюсти**
- 2. Перекрытие в переднем отделе более 1/3 коронки**
- 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля**
- 4. Смещение косметического центра**

Окклюзия

А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия

Б. Мезиальная

В. Глубокая резцовая

Г. Трансверсальная резцовая окклюзия

А. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Расстояния в области fossa canina на уровне верхушек корней первых премоляров верхней челюсти

2. Величина перпендикуляра проведенного от линии соединяющей дистальные поверхности первых моляров до вершины резцового сосочка

3. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров

4. Соотношение сумм мезиодистальных размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов Метод антропометрической диагностики

А. Ширина апикального базиса верхней челюсти

Б. Длина апикального базиса верхней челюсти

В. Индекс Тонна

Г. Метод Коркхауса

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии состоянием окклюзии Открытый активатор Кламмта

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти

2. Без окклюзионных накладок

3. Пелот для отведения нижней губы

4. Сагиттальный распил. Установлен расширяющий винт Окклюзия

А. Сужение зубного ряда

Б. Глубокая

В. Недоразвитие апикального базиса нижней челюсти

Г. Протрузия резцов

А. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Вестибулярные поверхности верхних резцов контактируют с нижними резцами
- 2.Зубоальвеолярное удлинение в области резцов верхней и нижней челюстей
- 3.Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля
4. Протрузия верхних резцов и ретрузия нижних Оклюзия

А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия

Б. Дистальная окклюзия

В. Глубокая резцовая

Г. Обратная резцовая окклюзия

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $\angle$ SNB
2. Зубоальвеолярное укорочение в области передних зубов
- 3.Зубоальвеолярное удлинение в области передних зубов
4. Уменьшение $\angle$ SNB Оклюзия

А. Мезиальная

Б. Дистальная

В. Глубокая резцовая

Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия

А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Обратное соотношение резцов верхней и нижней челюстей
2. Смещение косметического центра вправо
- 3.Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля
4. Снижение нижней трети лица. Оклюзия

А. Мезиальная

Б. Трансверсальная

В. Глубокая резцовая

Г. Обратная резцовая

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Регулятор функций Френкеля

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти**
- 2. Без окклюзионных накладок**
- 3. Пелот для отведения нижней губы**
- 4. Пелот для отведения верхней губы**

А. Дистальная II класс I подкласс.

Б. Глубокая

В. Недоразвитие аппикального базиса верхней челюсти

Г. Недоразвитие аппикального базиса нижней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Б 2-В 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

- 1. Секторальный распил с винтом**
- 2. Вестибулярная дуга**
- 3. Рукообразные пружины**
- 4. Петля для устранения диастемы**

А. Мезиальное смещение первого моляра справа

Б. Латеральное положение зубов

В. Протрузия резцов верхнего зубного ряда

Г. Латеральное положение центральных резцов

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Порядок прорезывания временных зубов

А. I - II - III - IV - V

Б. I - II - IV - III - V

В. II - I - III - IV - V

Г. I - II - V - IV - III

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

- 1. Расширяющий винт**
- 2. Оклюзионные накладки в области боковых зубов**
- 3. Веерообразный винт**
- 4. Кламмер Адамса Функция**
- А. расширение зубных рядов**
- Б. Интрузия боковых зубов**
- В. Расширение зубного ряда в переднем участке**
- Г. Фиксация аппарата**

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

- 1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена щечно**
- 2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно**
- 3. Косметический центр смещен вправо**
- 4. Одностороннее сужение верхней челюсти Окклюзия**

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Вестибуло-

Г. Трансерсальная резцовая

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

В. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

По способу фиксации аппарат Андресена-гойпля

А. Съемный

Б. Профилактический

В. Ретенционный

Г. Несъемный

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Активация

1. Винта и вестибулярной дуги в расширяющей пластинке
2. Петли для устранения диастемы
3. Протрагирующей пружины
4. Рукообразной пружины Функция

- А. Расширяется и укорачивается
- Б. Медиальное смещение центральных резцов
- В. Отклоняет вестибулярно
- Г. Нормализует положение отдельных групп зубов

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Аппарат

1. Пластика с секторальным распилом в области первых моляров
2. Пластика с сагиттальным распилом
3. Открытый активатор Кламонта
4. Круглый кламер Функция

- А. Удлинение зубного ряда
- Б. Нормализация окклюзии
- В. Расширение зубного ряда
- Г. Фиксация аппарата

А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для нижней челюсти

1. Сагиттальный распил, расширяющий винт
2. Секторальный распил в области первого моляра слева
3. Рукообразные пружины
4. Петля для устранения диастемы Клиническая ситуация

- А. Мезиальное смещение первого моляра слева
- Б. Латеральное положение центральных резцов
- В. Латеральное положение зубов
- Г. Сужение зубного ряда. Протрузия резцов

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Самая глубокая точка апикального базиса нижней челюсти

- А. Gn
- Б. Go
- В. В
- Г. Me

Установите соответствие между аппаратом и показаниями его применения Аппарат

- 1. Регулятор функций Френкеля III типа**
- 2. Регулятор функции Френкеля II типа**
- 3. Регулятор функции Френкеля I типа**
- 4. Пластина с окклюзионными накладками Лечение окклюзии**

- А. Дистальная II класс I подкласс**
- Б. Мезиальная**
- В. Дистальная II класс II подкласс**
- Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия**

- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
- Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г
- В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
- Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Уменьшение $\angle SNA$**
- 2. Уменьшение $\angle SNB$**
- 3. Зубоальвеолярное укорочение в области резцов верхнего зубного ряда**
- 4. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов верхнего зубного ряда Окклюзия**

- А. Глубокая резцовая окклюзия**
- Б. Дистальная**
- В. Вертикальная резцовая дизокклюзия**
- Г. Мезиальная**

- А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
- Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
- В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
- Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Лицевая дуга фиксируется на

- А. Верхней челюсти
- Б. Нижней челюсти
- В. Верхней и нижней челюсти
- Г. подбородке

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение $\angle B$
 2. Зубоальвеолярное укорочение в области передних зубов
 3. Уменьшение $\angle SNA$
 4. Увеличение $\angle SNA$ Оклюзия
- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Глубокая резцовая окклюзия
Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия

- А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Г. 1-В 2-Г 3-В 4-А

Установите соответствие между состоянием мягких тканей полости рта и формированием нарушения Состояние мягких тканей полости рта

1. Низкое прикрепление уздечки верхней губы
 2. Укорочение уздечки языка
 3. Мелкое преддверие
 4. Тяжи Нарушение
- А. Недоразвитие переднего участка нижнего зубного ряда
Б. Латерального положения центральных резцов
В. Рецессия десны в области передних зубов
Г. Рецессия десны в области боковых зубов

- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А
Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle 1/1$ "alfa"
 2. $A'-SnP$
 3. $\angle A/N/V$
 4. $Pg'-Go$ Характеристика
- А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
Б. Длина тела нижней челюсти
В. Длина апикального базиса верхней челюсти
Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

- А. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Ортопантомографию в ортодонтии применяют для определения

- А. Длины верхней челюсти
- Б. Длины нижней челюсти
- В. Наличия зачатков постоянных зубов
- Г. Ширины зубных рядов

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle A/N/B$

2. $\angle 1/1$ "alfa"

3. $\angle S/N/Pg$

4. $\angle NL/ML$ "B" Характеристика

- А. Взаимоположение оснований верхней и нижней челюстных костей
- Б. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей
- В. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа
- Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии Клиническая ситуация в полости рта

1. Обратное соотношение резцов верхней и нижней челюстей

2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов верхней и нижней челюстей

3. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля

4. Протрузия верхних резцов Окклюзия

А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия

Б. Дистальная

В. Глубокая резцовая

Г. Обратная резцовая

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Антропометрические параметры гипсовых моделей зубных рядов

1. Измерение медиолатеральных размеров резцов верхнего зубного ряда и ширины между премолярами

2. Измерение лонгитудинальной длины зубного ряда

3. Определение соотношения сумм резцов верхнего и нижнего зубных рядов

4. Определение длины переднего участка верхнего зубного ряда Метод антропометрической диагностики

А. Определение индекса Тонна

Б. Метод Пона

В. Метод Коркхауса

Г. Метод Нанса

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Губной пелот служит для

А. Расширения нижнего зубного ряда

Б. Стимуляции роста апикального базиса челюстей в переднем отделе

В. Укорочения нижнего зубного ряда

Г. Сдерживания роста нижней челюсти

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение $\angle SNB$ и увеличение наружного $\angle U1/NL$

2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов нижней челюсти

3. Уменьшение $\angle SNB$ и уменьшение наружного $\angle U1/NL$

4. Увеличение $\angle B$ Окклюзия

А. Глубокая резцовая окклюзия

Б. Дистальная II класс I подкласс

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Дистальная глубокая окклюзия II класс II подкласс

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

- 1. Расширяющий винт**
- 2. Секторальный распил в области первого моляра**
- 3. Протрагирующие пружины**
- 4. Петля для устранения диастемы**

А. Сужение зубного ряда

Б. Латеральное положение центральных резцов

В. Мезиальное смещение моляра

Г. Оральное положение зубов

А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Вестибулоклюзия относится к аномалиям окклюзии в направлении

А. Сагиттальном

Б. Вертикальном

В. Трансверсальном

Г. Сагиттальном и вертикальном

Установите соответствие между аппаратом и его показаниями

1. Открытый активатор Кламонта с винтом

2. Пластина с секторальным размером в области первых моляров

3. Квадхеликс

4. Маска Дилера

А. Нормализация окклюзии и расширения зубных рядов

Б. Удлинение зубного ряда

В. Расширение зубных рядов

Г. Нормализация положения верхней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Г. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Установите соответствие между соотношением первых моляров по Энгу и состоянием окклюзии

- Соотношение первых моляров**
1. 1-ый класс
 2. 2-ой класс I подкласс
 3. 2-ой класс II подкласс
 4. III класс Состояние окклюзии

А. Физиологическая

Б. Мезиальная

В. Дистальная с протрузией резцов верхней челюсти

Г. Дистальная с ретрузией резцов верхней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Установите соответствие между аппаратом и показаниями его применения

- Аппарат**
1. Небный бюгель Гожгариана
 2. Андрезена-Гойпля
 3. Пластиночный аппарат с секторальным распилом
 4. Пластиночный аппарат с расширяющим винтом Показания

А. Ротация первых моляров

Б. Нарушение окклюзии

В. Укорочения зубного ряда

Г. Сужение зубного ряда

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Небные бугорки верхних временных моляров 3 -х летнего ребенка располагаются

А. На одном уровне с язычными бугорками нижних моляров

Б. В продольной фиссуре нижних моляров

В. Вестибулярнее щечных бугорков нижних моляров

Г. На одном уровне с щечными бугорками нижних моляров

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Измерение медиолатеральных размеров резцов верхнего зубного ряда
2. Построение линии соединяющей точки Пона на первых премолярах
3. Определение величины перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров
4. Соотношение суммы медиолатеральных размеров резцов верхнего и нижнего зубных рядов

Метод антропометрической диагностики

- А. Определение индекса Тонна (1,33)
Б. Пона
В. Определение индивидуальных размеров резцов верхнего зубного ряда
Г. Коркхауса

А. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между соотношением первых моляров по Энгу и состоянием окклюзии Соотношение первых моляров

1. 1-ый класс
2. 2-ой класс I подкласс
3. 2-ой класс II подкласс
4. III класс Состояние окклюзии

А. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается в поперечной фиссуре нижнего первого моляра

Б. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Протрузия резцов верхней челюсти

В. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Ретрузия резцов верхней челюсти

Г. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается позади поперечной фиссуры нижнего первого моляра

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Установите соответствие между клинической ситуацией и состоянием окклюзии

Клиническая ситуация

- 1. Ретрузия резцов верхней челюсти**
 - 2. Сагиттальная щель 8,0 мм**
 - 3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля**
 - 4. Смещение косметического центра Окклюзия**
- А. Сагиттальная резцовая дизокклюзия**
Б. Мезиальная
В. Глубокая резцовая
Г. Трансверсальная резцовая

А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Г. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Аппарат Андрезена-Гойпля

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти**
 - 2. С окклюзионными накладками**
 - 3. Пелот для отведения нижней губы**
 - 4. Сагиттальный распил. Установлен расширяющий винт Окклюзия**
- А. Протрузия резцов**
Б. Недоразвитие апикального базиса нижней челюсти
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Сужение зубных рядов

А. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Увеличение $\angle B$**
 - 2. Увеличение $\angle SNA$**
 - 3. Протрузия верхних резцов**
 - 4. Снижение нижней трети лица Окклюзия**
- А. Глубокая резцовая дизокклюзия**
Б. Дистальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Сагиттальная резцовая дизокклюзия

А. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Б. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии состоянием окклюзии

Открытый активатор Кламмта

- 1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти**
- 2. Окклюзионные накладки**
- 3. Пелот для отведения верхней губы**
- 4. Расширяющий винт. Вестибулярная дуга Окклюзия**

А. Дистальная. Сужение верхнего зубного ряда

Б. Мезиальная

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Протрузия резцов на верхней челюсти

А. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Уменьшение $A'-SnP$**
- 2. Уменьшение $Pg'-Go$**
- 3. Увеличение $U1-NL$**
- 4. Увеличение $<B$ Окклюзия**

А. Мезиальная

Б. Дистальная

В. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Г. Глубокая резцовая

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

В. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для нижней челюсти

- 1. Сагиттальный распил, расширяющий винт**
- 2. Секторальный распил в области первого моляра слева**
- 3. Секторальный распил в области верхних резцов**
- 4. Петля для устранения диастемы Клиническая ситуация**

А. Сужение нижнего зубного ряда

Б. Уплотнение переднего участка нижнего зубного ряда

В. Мезиальное смещение первого моляра

Г. Латеральное положение центральных резцов

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Внеротовым является аппарат

- А. Лицевая дуга
- Б. Губной бампер
- В. Упор для языка
- Г. Небный бюгель

Окклюзионная плоскость обозначается

- А. Ocl
- Б. ML
- В. NL
- Г. FH

Установите соответствие между антропометрическими параметрами и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Измерение ширины апикальных базисов
 2. Произведение суммы медиолатеральных размеров резцов нижнего зубного ряда на индекс Тонна (1,33)
 3. Измерение медиолатеральных размеров резцов верхнего и нижнего зубного ряда и определение соотношения их сумм
 4. Определение по таблице ширины зубных рядов в области премоляров
- Метод антропометрической диагностики
- А. Определение индекса Тонна
 - Б. Метод Пона
 - В. Определение индивидуальных размеров резцов верхнего зубного ряда
 - Г. Метод Хауса
- А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
 - Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
 - В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
 - Г. 1-В 2-Г 3-Б 4-А

Макродентия - это

- А. Уменьшение размеров зубов
- Б. Увеличение количества зубов
- В. Увеличение размеров зубов
- Г. Уменьшение количества зубов

Первый и второй подклассы II класса Энгля различаются положением

- А. Моляров
- Б. Клыков
- В. Резцов
- Г. Челюстей

Квадхеликс по способу фиксации

- А. Ретенционный
- Б. Профилактический
- В. Несъемный
- Г. Съемный

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией

Клиническая ситуация

1. Вертикальная резцовая дизокклюзия
2. Ретрузия резцов
3. Адентия
4. Глубокая резцовая окклюзия

Конструктивный элемент

- А. Протрагирующая пружина
- Б. Накусочную площадку
- В. Заслонку для языка
- Г. Искусственные зубы

- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
- Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
- В. 1-А 2-В 3-Г 4-Б
- Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между клинической картиной в полости рта и состоянием окклюзии

Клиническая ситуация в полости рта

1. Обратное соотношение резцов верхней и нижней челюстей
2. Смещение косметического центра вправо
3. Соотношение клыков и моляров по III классу Энгля
4. Соотношение клыков и моляров по II классу Энгля

- А. Мезиальная
- Б. Трансверсальная
- В. Дистальная
- Г. Обратная резцовая

- А. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
- Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б
- В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
- Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. <NL/NSL

2. A'-Snp

3. <A/N/B

4. Pg'- Go Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Длина апикального базиса верхней челюсти

Г. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Б. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Заслонка для языка

2. Окклюзионные накладки в области боковых зубов

3. Протрагирующая пружина

4. Петля для устранения диастемы Функция

А. Интрузия боковых зубов

Б. Нормализация положения языка

В. Нормализация положения передних зубов

Г. Медиальное смещение резцов

А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Аппарат Pendulum предназначен для

А. Равномерного расширения зубного ряда

Б. Расширения и укорочения переднего отдела зубного ряда

В. Удлинения зубного ряда

Г. Дистализации первых верхних моляров

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы с состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы

- 1. Уменьшение $\angle SNA$**
- 2. Зубоальвеолярное укорочение в области боковых зубов**
- 3. Одностороннее сужение верхней челюсти**
- 4. Ретрузия резцов верхней и нижней челюстей Окклюзия**

А. Мезиальная

Б. Дистальная, глубокая

В. Палатиноокклюзия

Г. Вертикальная резцовая дизокклюзия

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Г. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

К специальным методам диагностики в ортодонтии относятся

А. Осмотр полости рта, функциональные пробы

Б. Опрос, рентгенологические, функциональные, графические

В. Опрос, осмотр, измерение гипсовых моделей челюстей

Г. Функциональные, графические, кефалометрические

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle A/N/B$

2. $\angle 1/1$ "alfa"

3. $\angle S/N/Pg$

4. Pg' - Go Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Длина тела нижней челюсти

В. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

А. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S

2. Co-Go

3. Pg'- Go

4. <A/N/V Характеристика

А. Длина тела нижней челюсти

Б. Длина переднего отдела основания черепа

В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Г. Длина ветви нижней челюсти

А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Губной пелот

2. Кламмера Адамса

3. Рукообразная пружина

4. Вестибулярная дуга Функция

А. Нормализация положения отдельных зубов

Б. Стимуляции роста апикального базиса челюсти в переднем отделе

В. Устранение прогрузии резцов

Г. Фиксация аппарата

А. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

В. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-В 4- Г

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Соотношение сумм медиолатеральных размеров резцов верхнего и нижнего зубных рядов

2. Расстояния в области fossa canina на уровне верхушек корней первых премоляров верхней челюсти

3. Величина перпендикуляра от контактной точки на вестибулярной поверхности центральных резцов до линии в области первых премоляров

4. Измерение ширины зубных рядов в области моляров и премоляров Метод антропометрической диагностики

А. Ширина апикального базиса верхней челюсти

Б. Метод Тонна

В. Метод Коркхауза

Г. Метод Пона

А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Низкое прикрепление уздечки верхней губы является причиной

А. Ретенции центральных резцов верхней челюсти

Б. Латерального положения центральных резцов, диастемы

В. Транспозиции резцов

Г. Дистальной окклюзии

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. N-S

2. Co-Go

3. <L1/ML

4. <A/N/B Характеристика

А. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти

Б. Длина ветви нижней челюсти

В. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Г. Длина переднего отдела основания черепа

А. 1-Г 2-Б 3-В 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $\angle$ SNB
2. Увеличение $\angle$ SNA
3. Укорочение переднего отдела верхнего зубного ряда
4. Соотношение клыков справа по III, слева по II классу Энгля Окклюзия

- А. Мезиальная
Б. Дистальная
В. Обратная резцовая дизокклюзия
Г. Трансверсальная резцовая

- А. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-Б
Б. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г
В. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-Б
Г. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Уменьшение $\angle$ SNB
2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов на верхней и нижней челюстях
3. Зубоальвеолярное укорочение в области боковых зубов на верхней и нижней челюстях
4. Увеличение $\angle$ SNB Окклюзия

- А. Глубокая резцовая дизокклюзия
Б. Дистальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Мезиальная

- А. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Установите соответствие между результатами антропометрического анализа и методом антропометрической диагностики Показатели антропометрического анализа гипсовых моделей зубных рядов

1. Измерение ширины зубных рядов
2. Измерение мезиодистальных размеров зубов нижних резцов и определение их суммы
3. Определение соотношения сумм размеров зубов верхнего и нижнего зубных рядов
4. Измерение длины апикального базиса Метод антропометрической диагностики

- А. Определение индекса пропорциональности зубных рядов (1,08)
Б. Метод Пона
В. Метод Тонна
Г. Метод Хауса

- А. 1-Г 2-А 3-Б 4-Г
Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
В. 1-А 2-Б 3-Б 4-Г
Г. 1-Б 2-В 3-А 4-Г

Франкфуртская горизонталь обозначается

- A. Ocl
- Б. MIL
- В. NL
- Г. FH

Плоскость переднего отдела основания черепа обозначается

- A. Ocl
- Б. ML
- В. NL
- Г. NS

Установите соответствие между аппаратом и его свойствами Аппарат

1. Регулятор функций Френкеля III типа
2. Pendulum
3. Открытый активатор Кламмта
4. Пластина с наклонной плоскостью Свойства аппарата

- A. Механический
- Б. Функциональный
- В. Комбинированный
- Г. Съёмный

- A. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
- Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
- В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
- Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент

1. Веерообразный винт
 2. Губной пелот
 3. Протрагирующая пружина
 4. Рукообразная пружина Функция
- A. Стимуляция роста апикального базиса
 - Б. Отклонение вестибулярно зубов
 - В. Расширение зубного ряда в переднем отделе
 - Г. Нормализация положения отдельных зубов

- A. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
- Б. 1-Б 2-Г 3-А 4-В
- В. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
- Г. 1-Г 2-Б 3-А 4-В

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Аппарат

1. Пластика с секторальным распилом в области резцов нижней челюсти

2. Pendulum

3. Аппарат Андресена-Гойпля

4. Пластика с накусочной площадкой Функция

А. Удлинение зубного ряда в переднем отделе

Б. Удлинение зубного ряда

В. Нормализация окклюзии

Г. Интрузия резцов нижней челюсти

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-В 3-Г 4-Б

Резцы в/ч в норме контактируют с резцами н/ч

А. Небной поверхностью

Б. Режущим краем

В. Вестибулярной поверхностью

Г. Апроксимальной поверхностью

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена небно

2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно

3. Косметический центр смещен влево

4. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена вестибулярно Окклюзия

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Трансверсальная резцовая

Г. Вестибуло-

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Дистальные поверхности вторых временных моляров 6-летнего ребенка располагаются

А. В одной вертикальной плоскости

Б. С мезиальной ступенькой

В. С дистальной ступенькой

Г. С латеральной ступенькой

Установите соответствие между конструктивным элементом аппарата и принципом его функцией Элемент

1. Вестибулярная дуга
 2. Окклюзионные накладки
 3. Пелот для отведения губы
 4. Щечные щиты Функция
- А. Фиксирующий элемент
Б. Интрузия
В. Отведение мышц щек от альвеолярного отростка
Г. Отведение губы и стимуляция роста апикального базиса
- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В
В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между конструктивными элементами и их функцией Элемент 1
Расширяющий винт

2. Губной пелот
 3. Протрагирующая пружина
 4. Петля для устранения диастемы Функция
- А. Стимуляция роста апикального базиса
Б. Равномерное расширение зубного ряда
В. Отклонение вестибулярно
Г. Нормализация положения центральных резцов
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Б 2-А 3-В 4-Г
В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
Г. 1-Г 2-В 3-Б 4-А

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Увеличение $\angle SNA$
 2. Зубоальвеолярное укорочение в области резцов на верхней и нижней челюстях
 3. Зубоальвеолярное укорочение в области боковых зубов на верхней и нижней челюстях
 4. Протрузия верхних резцов Окклюзия
- А. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Б. Дистальная
В. Сагиттальная резцовая дизокклюзия
Г. Дизокклюзия
- А. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и антропометрическими точками черепа Показатели ТРГ головы в боковой проекции

1. Плоскость основания нижней челюсти
2. Оклюзионная плоскость
3. Заднего отдела основания черепа
4. Ось нижних резцов Антропометрический параметр черепа

1. Gn–Go
2. Ocp
3. S-Ba
4. L1/ML

А. 1-В 2-А 3-Б 4-Г

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-А 2-В 3-Б 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии

Аппарат Андресена-Гойпля

1. Вестибулярная дуга в области резцов верхней челюсти
2. Без окклюзионных накладок
3. Пелот для отведения верхней губы
4. Капюшон на нижних резцах Окклюзия

А. Протрузия нижних резцов

Б. Глубокая

В. Недоразвитие апикального базиса верхней челюсти

Г. Протрузия верхних резцов

А. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-Г 2-Б 3- В 4-А

Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Установите соответствие между аппаратом для функциональной диагностики и показателями Метод диагностики

1. Периотест
2. Миотонометр
3. Кинезиограф
4. Электромиограф Определяет

А. Тонус мышц

Б. Биопотенциалы мышц

В. Движение нижней челюсти

Г. Устойчивость зуба к горизонтальной нагрузке

А. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в боковой проекции

- 1. Увеличение <SNA**
- 2. Зубоальвеолярное удлинение в области резцов на верхней и нижней челюстях**
- 3. Зубоальвеолярное удлинение в области боковых зубов на верхней и нижней челюстях**
- 4. Уменьшение <SNA Окклюзия**

А. Вертикальная резцовая дизокклюзия

Б. Дистальная

В. Мезиальная

Г. Глубокая

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-Б 2-Г 3-А 4-В

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

- 1. Сагиттальный распил, расширяющий винт**
- 2. Секторальный распил в области первого моляра слева**
- 3. Рукообразные пружины, петля для устранения диастемы**
- 4. Секторальный распил в области верхних резцов Клиническая ситуация**

А. Тремы. Латеральное положение центральных резцов

Б. Уплотнение переднего участка верхнего зубного ряда

В. Сужение. Протрузия резцов верхнего зубного ряда

Г. Мезиальное смещение первого моляра слева

А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

По месту расположения аппарат Норда

А. Внеротовой

Б. Внутриворотной, одночелюстной

В. Комбинированный

Г. Одночелюстной

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для верхней челюсти

1. Сагиттальный распил, расширяющий винт
2. Секторальный распил в области первого моляра слева
3. Рукообразные пружины
4. Петля для устранения диастемы

Клиническая ситуация

- А. Латеральное положение зубов
- Б. Латеральное положение центральных резцов
- В. Сужение верхнего зубного ряда
- Г. Укорочение зубного ряда слева

А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

В. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Г. 1-В 2-Б 3-Г 4-А

Активация изгибов вестибулярной дуги аппарата способствует

- А. Оральному смещению резцов
- Б. Мезиоальному смещению резцов верхней челюсти
- В. Мезиальному смещению резцов нижней челюсти
- Г. Внедрению моляров

N-S линия - плоскость

- А. Основания верхней челюсти
- Б. Основания нижней челюсти
- В. Переднего отдела основания черепа
- Г. Франкфуртская горизонталь

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с клинической ситуацией

Пластиночный аппарат для нижней челюсти

1. Сагиттальный распил, расширяющий винт
2. Секторальный распил в области первого моляра слева
3. Рукообразные пружины, петля для устранения диастемы
4. Протрагирующая пружина

Клиническая ситуация

- А. Тремы, латеральное положение центральных резцов
- Б. Небный наклон центрального резца
- В. Сужение зубного ряда
- Г. Укорочение зубного ряда слева

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-В 2-Г 3-А 4-Б

Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle 1/1$ "alfa"

2. $\angle A/N/B$

3. $\angle S/N/Pg$

4. $\angle NL/NSL$ Характеристика

А. Взаимоположение апикальных базисов верхней и нижней челюстных костей

Б. Положение основания верхней челюсти относительно переднего отдела основания черепа

В. Положение подбородочного выступа относительно переднего отдела основания черепа

Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

А. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

В. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

Диастема устраняется с помощью

А. Рукообразных пружин

Б. Кламмеров Адамса

В. Базиса

Г. Винта

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы и и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы в прямой проекции

1. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена небно

2. Боковая группа зубов нижнего зубного ряда слева наклонена язычно

3. Косметический центр смещен влево

4. Боковая группа зубов верхнего зубного ряда слева наклонена вестибулярно Окклюзия

А. Палатино-

Б. Лингво-

В. Вестибуло-

Г. Трансверсальная резцовая

А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Передняя точка носовой ости

А. Co

Б. Snp

В. Go

Г. Sna

Установите соответствие между аппаратом и показаниями его применения Аппарат

1. Регулятор функций Френкеля II типа
 2. Расширяющая пластинка
 3. Пластика с секторальным распилом
 4. Пластика с окклюзионными накладками Лечение окклюзии
- А. Дистальная II класс II подкласс
Б. Сужение зубных рядов
В. Зубоальвеолярное удлинение в области жевательной группы зубов
Г. Уплотнение переднего участка зубного ряда
- А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-Г 2-Б 3-А 4-В
В. 1-В 2-А 3-Б 4-Г
Г. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Вредная привычка сосания большого пальца способствует

- А. Протрузии верхних и ретрузии нижних резцов
Б. Сужению зубных рядов
В. Нарушению осанки
Г. Нарушению функции языка

Установите соответствие между аппаратом и их функцией Аппарат

1. Маска Диляра
 2. Аппарат Персина
 3. Лицевая дуга с головной тягой
 4. Квадхеликс Функция
- А. Интрузия моляров
Б. Нормализация окклюзии
В. Нормализация положения верхней челюсти
Г. Расширение верхнего зубного ряда
- А. 1-В 2-Б 3-А 4-Г
Б. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
В. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Задняя точка верхней челюсти

- А. Co
Б. Snp
В. Go
Г. Sna

Установите соответствие между антропометрическим анализом и его показателями

Антропометрический анализ

- 1. Премолярный индекс Пона**
- 2. Молярный индекс Пона**
- 3. Индекс Тонна**
- 4. Болтона Показатели**

А. 80

Б. 1,08

В. 1,33

Г. 64

А. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Б. 1-А 2-Г 3-В 4-Б

В. 1-Г 2-А 3-Б 4-В

Г. 1-Б 2-Г 3-В 4-А

Аппарат Брюкля предназначен для

А. Сужения верхнего зубного ряда

Б. Нормализации окклюзии в сагиттальном направлении

В. Нормализации окклюзии в трансверсальном направлении

Г. Укорочения нижнего зубного ряда

Установите соответствие между состоянием окклюзии и соотношением первых моляров

Соотношение первых моляров

1. Физиологическая

2. Мезиальная

3. Дистальная с протрузией резцов верхней челюсти

4. Дистальная с ретрузией резцов верхней челюсти **Состояние окклюзии**

А. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается в поперечной фиссуре нижнего первого моляра

Б. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Протрузия резцов верхней челюсти

В. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается впереди поперечной фиссуры нижнего первого моляра. Ретрузия резцов верхней челюсти

Г. Мезиальный щечный бугор первого моляра верхней челюсти располагается позади поперечной фиссуры нижнего первого моляра

А. 1-А 2-Б 3-Г 4-В

Б. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

В. 1-В 2-А 3-Г 4-Б

Г. 1-А 2-Г 3-Б 4-В

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и состоянием окклюзии Показатели ТРГ головы:

1. Увеличение $\angle B$
2. Зубоальвеолярное удлинение в области передних зубов
3. Одностороннее сужение верхней челюсти
4. Уменьшение $\angle SNA$ Окклюзия

- А. Палатиноокклюзия
Б. Мезиальная
В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
Г. Глубокая резцовая окклюзия

- А. 1-В 2-Г 3-А 4-Б
Б. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
В. 1-А 2-Б 3-В 4-Г
Г. 1-Г 2-А 3-В 4-Б

Базальная дуга нижней челюсти

- А. Меньше альвеолярной дуги на 5 мм
Б. Больше альвеолярной дуги
В. Равна альвеолярной дуге
Г. Меньше альвеолярной дуги на 3 мм

Установите соответствие между показателями телерентгенограммы головы в боковой проекции и его характеристикой Показатели

1. $\angle 1/1$ "alfa"
2. $\angle U1/NL$
3. $\angle L1/ML$
4. $\angle ML/NSL$ Характеристика

- А. Угол наклона верхних резцов относительно основания верхней челюсти
Б. Угол наклона нижних резцов относительно основания нижней челюсти
В. Положение основания нижней челюсти относительно переднего отдела основания черепа
Г. Взаимоположение осей резцов верхней и нижней челюстей

- А. 1-В 2-А 3-Г 4-Б
Б. 1-А 2-В 3-Б 4-Г
В. 1-Г 2-А 3-Б 4-В
Г. 1-Б 2-А 3-В 4-Г

Установите соответствие между аппаратом и их функцией Аппарат

1. Маска Диляра
 2. Небный бюгель
 3. Лицевая дуга с головной тягой
 4. Аппарат Норда
- Функция**
- А. Деротация моляров
 - Б. Интрузия моляров
 - В. Разрыв небного шва
 - Г. Нормализация положения верхней челюсти
- А. 1-Г 2-Б 3-В 4-Г
Б. 1-В 2-Б 3-Г 4-Г
В. 1-Б 2-А 3-Г 4-В
Г. 1-А 2-Б 3-В 4-Г

Соотнесите конструктивные элементы аппарата в соответствии с состоянием окклюзии
Регулятор функций Френкеля

1. Вестибулярная дуга в области резцов нижней челюсти
 2. Окклюзионные накладки
 3. Пелот для отведения верхней губы
 4. Протрагирующая дуга
- Окклюзия**
- А. Недоразвитие аппикального базиса верхней челюсти
 - Б. Мезиальная
 - В. Протрузия резцов
 - Г. Дистальная окклюзия в сочетании с ретрузией верхних резцов
- А. 1-Г 2-В 3-А 4-Б
Б. 1-А 2-Б 3-Г 4-Д
В. 1-А 2-Г 3-В 4-Б
Г. 1-В 2-Б 3-А 4-Г

Профиль при дистальной окклюзии чаще бывает

- А. Вогнутым
- Б. Выпуклым
- В. Нейтральным
- Г. Прямым

Неправильное мезио-дистальное соотношение первых постоянных моляров может быть обусловлено

- А. Снижением окклюзионной высоты
- Б. Ранней потерей второго временного моляра
- В. Физиологической стираемостью
- Г. Патологической стираемостью

Аппарат персина для лечения мезиальной окклюзии позволяет

- А. Сдерживать рост апикального базиса верхней челюсти
- Б. Стимулировать рост апикального базиса верхней челюсти
- В. Расширять зубные ряды
- Г. Стимулировать рост апикального базиса нижней челюсти

К возможному осложнению в ходе перемещения зубов относят

- А. Резорбцию корней
- Б. Ятрогенный пульпит
- В. Гиперэстезию эмали зубов
- Г. Афты слизистой полости рта

К клиническим этапам изготовления ортодонтических аппаратов относят

- А. Гипсование восковой модели аппарата в кювете
- Б. Снятие оттисков
- В. Пакование в кювету жесткой акриловой пластмассы
- Г. Изгибание фиксирующих кламмеров

По способу фиксации ортодонтические аппараты делятся на

- А. Внутриротовые и внеротовые
- Б. Несъемные, съемные, сочетанные
- В. Одночелюстные, одночелюстные межчелюстного действия, двухчелюстные, внеротовые, сочетанные
- Г. Дуговые, капповые, пластиночные, блоковые, каркасные, эластичные

Адентия боковых резцов верхней челюсти чаще сочетается с ретенцией

- А. Первых премоляров
- Б. Клыков
- В. Вторых премоляров
- Г. Центральные резцов

При резко выраженном сужении верхней челюсти у детей с врожденной сквозной расщелиной верхней губы и нёба в период постоянного прикуса для ее расширения целесообразно применять

- А. Аппарат Дерихсвайлера с винтом Хайрекса
- Б. Пластинку с пружиной Коффина
- В. Активатор Вундерера
- Г. Пластинку с винтом Бертони

В результате силового воздействия ортодонтического аппарата резорбция костной ткани происходит в лунке зуба

- А. Справа от зоны давления
- Б. Слева от зоны тяги
- В. В зоне давления
- Г. В зоне тяги

Аппарат норда классифицируется как

- А. Профилактический
- Б. Лечебный съемный
- В. Ретенционный
- Г. Лечебный несъемный

Функциональный метод исследования, основанный на регистрации биоэлектрических потенциалов, возникающих в мышцах в момент возбуждения, называют

- А. Реопародонтографией
- Б. Миотонометрией
- В. Элетромиографией
- Г. Аксиографией

Принцип действия аппарата френкеля

- А. Комбинированный
- Б. Механический
- В. Ретенционный
- Г. Функциональный

При переносе брекета с левой стороны зубного ряда на правую или наоборот в рамках одной челюсти

- А. Торк не меняется, ангуляция меняется
- Б. Ротация меняется, ангуляция меняется
- В. Торк меняется, ангуляция не меняется
- Г. Ротация не меняется, ангуляция не меняется

Толщина дистального отдела суставного диска составляет ____ мм

- А. 5-2
- Б. 3-4
- В. 5-1.5
- Г. 0-1

Ранним клиническим симптомом сужения зубных рядов является

- А. Увеличение фронтального участка
- Б. Уплотнение фронтального участка
- В. Уменьшение ширины зубного ряда
- Г. Тесное положение зубов

На трг головы в боковой проекции по методу fastlight определяются параметры наклона резцов относительно

- А. Co-A; Co-B; NSL\\ML
- Б. NSL; N-Ba; ArGoMe
- В. N-A; N-B; NSBa
- Г. NL; ML; Ocp; NL\\ML

Ангуляцией называется

- А. Вестибуло-оральный наклон зуба
- Б. Поворот зуба по оси
- В. Наклон верхних резцов относительно нижних
- Г. Мезио-дистальный наклон зуба

Петлю рейхенбаха используют для

- А. Лечения открытой окклюзии
- Б. Закрытия диастем
- В. Закрытия трем
- Г. Лечения дистальной окклюзии

Нарушение носового дыхания приводит к

- А. Расширению верхнего зубного ряда
- Б. Сужению нижнего зубного ряда
- В. Сужению верхнего зубного ряда
- Г. Расширению нижнего зубного ряда

Инклинацией называется

- А. Поворот зуба по оси
- Б. Вестибуло-оральный наклон зуба
- В. Наклон верхних резцов относительно нижних
- Г. Мезио-дистальный наклон зуба

Углом трансверсального суставного пути (угол беннета) называется угол, образованный между линиями

- А. Вертикального и трансверсального суставного пути в сагиттальной плоскости
- Б. Сагиттального и трансверсального суставного пути в вертикальной плоскости
- В. Сагиттального и трансверсального суставного пути в горизонтальной плоскости
- Г. Вертикального и трансверсального суставного пути в горизонтальной плоскости

Верхний зубной ряд у ребенка 3 лет имеет форму

- А. Полуэллипса
- Б. Полукруга
- В. Трапеции
- Г. Параболы

Протезирование у детей можно проводить

- А. В 5-7 лет
- Б. В 3-4 года
- В. Без возрастных ограничений
- Г. В 12-14 лет

Увеличение числа зубов по сравнению с нормой называют

- А. Макроодонтией
- Б. Гипоодонтией
- В. Микроодонтией
- Г. Гиперодонтией

По назначению ортодонтические аппараты подразделяются на

- А. Пластиночные, дуговые, блоковые, каркасные, капповые
- Б. Профилактические, лечебные, ретенционные
- В. Несъемные, съемные, сочетанные
- Г. Взаимодействующие (реципроктные), стационарные

Методом обследования, позволяющим наиболее точно оценить строение лицевого скелета, является

- А. Внутриротовая рентгенография
- Б. Телерентгенография
- В. Радивизиография
- Г. Ортопантомография

Ортодонтическое лечение перед ортогнатической хирургией заключается в

- А. Нормализации формы зубных рядов и положения зубов
- Б. Нормализации окклюзии
- В. Ортопедическом воздействии на нижнюю челюсть
- Г. Ортопедическом воздействии на верхнюю челюсть

Морфологически череп разделяется на _____ отделы

- А. Верхний и нижний
- Б. Мозговой и лицевой
- В. Затылочный, лобный, челюстной
- Г. Челюстной и лобный

На трг головы (в боковой проекции) референтная линия, проходящая через точки s и p

- А. FH
- Б. NL
- В. ML
- Г. NSL

Ортодонтические аппараты по принципу действия

- А. Механически-действующие, функционально-действующие, комбинированные
- Б. Несъемные, съемные, сочетанные
- В. Внутриротовые, внеротовые
- Г. Одночелюстные, одночелюстные межчелюстного действия, двухчелюстные, сочетанные

К аномалиям размеров зубов относится

- А. Микрогнатия
- Б. Микродентия
- В. Макроглоссия
- Г. Глоссоптоз

Лицевая маска используется при лечении

- А. Дистальной окклюзии
- Б. Вертикальной резцовой дизокклюзии
- В. Мезиальной окклюзии
- Г. Перекрестной окклюзии

При втором классе по энглю мезиально-щечный бугор первого моляра верхней челюсти находится _____ нижнего моляра

- А. В межбугровой фиссуре второго
- Б. В межбугровой фиссуре первого
- В. Позади межбугровой фиссуры первого
- Г. Кпереди от межбугровой фиссуры первого

Увеличение угла sargo свидетельствует о

- А. Вертикальном типе роста лицевого скелета
- Б. Горизонтальном направлении роста лицевого скелета
- В. Ретрогнатическом типе профиля
- Г. Вращении нижней челюсти против часовой стрелки

Лицевую маску используют при

- А. Открытом прикусе
- Б. Дистальной окклюзии
- В. Асимметрии
- Г. Мезиальной окклюзии

Инфраположение характеризуется положением зуба

- А. Вестибулярно
- Б. Ниже окклюзионной плоскости
- В. Орально
- Г. Выше окклюзионной плоскости

Деформация кожно-хрящевого отдела носа всегда имеет место при врожденной расщелине губы

- А. Неполной двусторонней
- Б. Скрытой односторонней
- В. Полной односторонней
- Г. Неполной односторонней

Автоматизированная система регистрации окклюзии t-skan iii анализирует

- А. Тонус мышц
- Б. Биопотенциалы мышц
- В. Силу смыкания зубных рядов
- Г. Форму зубных рядов

Точка ar расположена на _____ челюсти

- А. Заднем контуре суставной головки нижней
- Б. Переднем контуре апикального базиса нижней
- В. Переднем контуре апикального базиса верхней
- Г. Вершине суставной головки нижней

К лицевому признаку глубокой окклюзии относят

- А. «Сердитое» лицо
- Б. Увеличение высоты нижней трети лица
- В. Положительную губную ступеньку
- Г. Супраментальную борозду

Потеря временного зуба за 2 года до его физиологической смены приводит к

- А. Убыли костной ткани в месте его расположения
- Б. Мезиальному смещению соседних зубов
- В. Дистальному смещению соседних зубов
- Г. Адентии одноименного постоянного зуба

Миотонометрию рекомендовано проводить

- А. Только до лечения
- Б. Только после лечения
- В. Только во время лечения
- Г. До, во время и после лечения

При witz анализе перпендикуляры из точек a и в должны быть опущены на плоскость

- А. Окклюзионную
- Б. Основания верхней челюсти
- В. Основания черепа
- Г. Основания нижней челюсти

Удлиненное лицо является следствием

- А. Недоразвития верхней челюсти
- Б. Нейтрального роста
- В. Чрезмерного горизонтального роста челюстей
- Г. Чрезмерного вертикального роста челюстей

При вредной привычке сосания нижней губы формируется

- А. Трансверсальная резцовая окклюзия
- Б. Мезиальная окклюзия
- В. Вертикальная резцовая дизокклюзия
- Г. Дистальная окклюзия

Макродентия определяется как аномалия

- А. Количества
- Б. Формы
- В. Размера
- Г. Положения

Нарушением верхней челюсти при ретрогнатии является

- А. Смещение кзади
- Б. Чрезмерное развитие
- В. Несимметричная деформация
- Г. Выраженное недоразвитие

При инфантильном типе глотания язык

- А. Упирается в купол неба
- Б. Упирается в альвеолярную часть нижней челюсти
- В. Расположен на дне полости рта
- Г. Упирается в губы

Ютилити-дуга используется с целью

- А. Дистализации зубов 1.3, 2.3
- Б. Устранения диастемы
- В. Мезиализации зубов 1.3, 2.3
- Г. Зубоальвеолярного укорочения в переднем отделе

Временный прикус формируется в возрасте до (в годах)

- А. 7
- Б. 1
- В. 3
- Г. 5

Привычка ребенка спать с запрокинутой головой формирует

- А. Мезиальную окклюзию
- Б. Перекрёстную окклюзию
- В. Дистальную окклюзию
- Г. Вертикальную резцовую дизокклюзию

Для трансверсального расширения переднего участка зубного ряда используется пластинка с винтом

- А. Расширяющим
- Б. Бертони
- В. Секторальным
- Г. Веерообразным

Компактостеотомия проводится с целью

- А. Улучшения фиксации ортодонтического аппарата
- Б. Ускорения ортодонтического лечения
- В. Дополнительной диагностики
- Г. Продолжения ортодонтического лечения

На трг головы (в боковой проекции) ротация тела нижней челюсти по часовой стрелке характеризуется увеличением угла (выше 35°)

- А. $NSL \setminus \setminus NL$
- Б. $NSL \setminus \setminus ML$
- В. $NL \setminus \setminus ML$
- Г. SNA

Выявить мезиальное смещение боковых зубов на диагностических моделях челюстей позволяет методика

- А. Пона
- Б. Шмута
- В. Снагиной
- Г. Изара

Длину головы измеряют между точками

- А. Zy - zy
- Б. Op - gl
- В. Go - go
- Г. Eu – eu

Ретенционные пластиночные аппараты носят в течение _____ часов в сутки

- А. 10 - 12
- Б. 24
- В. 2 - 3
- Г. 1 - 2

Мезиальный щёчный бугор первого верхнего моляра располагается в межбугорковой фиссуре первого нижнего моляра, что соответствует _____ классу энгля

- А. Второму (подкласс 2)
- Б. Первому
- В. Второму (подкласс 1)
- Г. Третьему

Под торком зуба понимают

- А. Мезио-дистальный наклон зуба
- Б. Положение зуба по вертикали
- В. Правильное положение зуба в зубном ряду по своей оси
- Г. Вестибуло-оральный наклон зуба

Каппы изготавливают из

- А. Базисной пластмассы
- Б. Никель-титанового сплава
- В. Гипса
- Г. Термопластичного полиуретана

«Макрогнатия» означает

- А. Увеличение размеров челюсти
- Б. Уменьшение размеров челюсти
- В. Смещение челюсти вперед
- Г. Уменьшение углов SNA либо SNB

Младенческая ретрогения обусловлена _____ челюсти

- А. Увеличением верхней
- Б. Мезиальным положением верхней
- В. Дистальным положением нижней
- Г. Увеличением нижней

Макродентией называется

- А. Увеличение количества зубов
- Б. Уменьшение размеров зубов
- В. Увеличение размеров зубов
- Г. Увеличение размеров челюстей

Аппарат кламмта применяется при

- А. Горизонтальной резцовой дизокклюзии
- Б. Мезиальной окклюзии
- В. Палатинокклюзии
- Г. Дистальной окклюзии и вертикальной резцовой дизокклюзии

Патология внчс, при которой нарушается координация функций жевательных мышц и взаимного расположения суставных элементов, называется

- А. Анкилозом
- Б. Суставной дисфункцией
- В. Мышечно-суставной дисфункцией
- Г. Мышечной дисфункцией

Под мезио-дистальным наклоном зуба понимают

- А. Ангуляцию
- Б. Торк
- В. Протрузию
- Г. Инклинацию

Аппараты quadhelix используют для _____ челюсти

- А. Интрузии моляров верхней
- Б. Интрузии моляров нижней
- В. Дистализации моляров верхней
- Г. Расширения верхней

Бугорок верхнего клыка в норме располагается

- А. Между нижним клыком и первым племоляром
- Б. На уровне бугорка нижнего клыка
- В. Между нижним клыком и нижним вторым резцом
- Г. В поперечной фиссуре нижнего первого премоляра

Вредной привычкой, способствующей развитию сагиттальной резцовой дизокклюзии, является

- А. Привычка закусывать верхнюю губу
- Б. Сон на высокой подушке
- В. Подкладывание руки под щеку во время сна
- Г. Сосание большого пальца

Для торка характерен _____ наклон зуба

- А. Лабио-лингвальный
- Б. Мезио-дистальный
- В. Вестибуло-оральный
- Г. Лабио-латеральный

Статокинезиограмма (скг) позволяет оценить

- А. Смещение центра тяжести тела по эллипсу
- Б. Внеокклюзионные движения нижней челюсти (опускание/поднимание)
- В. Скорость движения нижней челюсти
- Г. Скорость кровотока в пародонте

Поворот зуба вокруг вертикальной оси называется

- А. Торк
- Б. Ангуляция
- В. Ротация
- Г. Инклинация

В аппарате Брюкля применяется

- А. Протрагирующая дуга
- Б. Наклонная плоскость
- В. Небный бюгель
- Г. Лингвальная дуга

У пациентов с гнатической формой дистальной окклюзии в сочетании с сагиттальной резцовой дизокклюзией на трг головы (в боковой проекции) диагностически значимо могут быть уменьшены значения

- А. SNB; 1°\NL; Go-Pog
- Б. NL\ML; Snp-A; Co-Go
- В. ArGoMe; NL\ML; Snp-A
- Г. SNA; NL\ML; Snp-A

Прогнатия относится к аномалии

- А. Размера зубных рядов
- Б. Размера челюсти
- В. Положения челюсти
- Г. Формы челюсти

Ортодонтический аппарат, предназначенный для дистализации моляров, называется

- А. Distal Jet
- Б. Quadhelix
- В. Норда
- Г. Cetlin

Для определения размеров и положения челюстных костей в сагиттальном и вертикальном направлениях используется анализ

- А. Томограмма ВНЧС
- Б. ТРГ в боковой проекции
- В. ТРГ в прямой проекции
- Г. ОПТГ

Основным направлением первичной профилактики является

- А. Восстановление утраченных функций
- Б. Реабилитация больных
- В. Лечение и предупреждение осложнений заболеваний
- Г. Предупреждение возникновения заболеваний

На трг головы в боковой проекции по методу ricketts определяются параметры

- А. NSAr; SArGo
- Б. N-S; Go-Me
- В. NGoAr; ArGoMe
- Г. N-Ba\\PtV-Gn; Xi

Положение зубов ниже окклюзионной плоскости

- А. Вестибулярное
- Б. Инфраположение
- В. Дистальное
- Г. Оральное

В норме у ребёнка 4 лет

- А. Дистальные поверхности вторых временных моляров расположены в одной плоскости
- Б. Между дистальными поверхностями вторых временных моляров формируется дистальная ступень
- В. Между дистальными поверхностями первых временных моляров формируется мезиальная ступень
- Г. Между дистальными поверхностями вторых временных моляров формируется мезиальная ступень

Причиной скученности зубов является

- А. Сужение и укорочение зубного ряда
- Б. Макрогlossия
- В. Микрогlossия
- Г. Макрогнатия

Сепарационные кольца нужны для

- А. Межапроксимальной сепарации
- Б. Создания места для установки ортодонтических колец
- В. Фиксации дуги в пазах брекета
- Г. Удаления композита с поверхности зуба

Брекеты для клыков с высоким торком рекомендованы в случае

- А. Небной дистопии клыков
- Б. Изначальной избыточно вестибулярной инклинации
- В. Лечения с удалением первых премоляров
- Г. Выраженной ротации клыков

На свойства ортодонтических дуг влияет

- А. Торк в основании брекета
- Б. Длина дуги
- В. Торк в пазах брекета
- Г. Сплав дуги

Гиперодонтией является

- А. Уменьшение количества зубов
- Б. Уменьшение размеров зубов
- В. Увеличение размеров зубов
- Г. Наличие сверхкомплектного зуба

Рентгеновские снимки кисти в ортодонтии используют для

- А. Определения типа роста скелета
- Б. Обнаружения скелетной патологии
- В. Определения плотности кости
- Г. Расчета скелетного возраста

Для лечения перекрестного прикуса с боковым смещением нижней челюсти окклюзионные накладки двухчелюстных аппаратов

- А. Готовят на стороне смещения
- Б. Не делают
- В. Готовят на противоположной стороне
- Г. Готовят с двух сторон

Симметричность развития правой и левой половины нижней челюсти можно оценить с помощью

- А. Панорамной рентгенографии
- Б. Телерентгенографии в боковой проекции
- В. Прицельной рентгенографии
- Г. Телерентгенографии в прямой проекции

Увеличение базального угла говорит о

- А. Вертикальном типе роста, гипердивергенции челюстей
- Б. Горизонтальном типе роста, гиподивергенции челюстей
- В. Биретрузии
- Г. Бипротрузии

При ротовом дыхании формируется

- А. Сагиттальная щель
- Б. «Готическое» нёбо
- В. Симптом «наперстка»
- Г. Диастема

Макроглоссия характеризуется

- А. Уменьшением размера языка
- Б. Атрофией языко-глоточного нерва
- В. Увеличением размера языка
- Г. Раздвоением кончика языка

Положением зуба ниже окклюзионной плоскости называют

- А. Транспозицию
- Б. Ретропозицию
- В. Супрапозицию
- Г. Инфрапозицию

Адентия зубов относится к аномалии их

- А. Структуры
- Б. Сроков прорезывания
- В. Количества
- Г. Формы

Лицевая маска дилера относится к ортодонтическим аппаратам

- А. Профилактическим
- Б. Комбинированным
- В. Лечебным
- Г. Ретенционным

К механическим элементам пластинки относят

- А. Вестибулярную дугу
- Б. Базис
- В. Винт
- Г. Кламмер

Под корпусным перемещением зуба понимают

- А. Перемещение только коронки зуба
- Б. Одновременное движение коронки и корня в одном направлении
- В. Выдвижение зуба окклюзионно
- Г. Перемещение только корня зуба

Одной из возможных причин сагиттальной резцовой дизокклюзии является

- А. Микроденция верхних зубов при нормальном размере нижних
- Б. Наличие сверхкомплектных зубов на нижней челюсти
- В. Микроденция верхних зубов при макроденции нижних
- Г. Макроденция верхних зубов при нормальном размере нижних

Сагиттальная окклюзионная кривая по имени автора называется кривая

- А. Уилсона
- Б. Хантера
- В. Шпее
- Г. Беннета

Сращение небных отростков происходит на ____ неделе внутриутробного развития

- А. 3
- Б. 7
- В. 17
- Г. 4-5

Опорными точками при построении эстетической плоскости рикеттса являются _____ и подбородок

- А. Носо-лобный шов
- Б. Основание носа
- В. Кончик носа
- Г. Выступающая часть лба

Постепенное уменьшение высоты клинических коронок от резцов до моляров, за исключением клыков, формирует

- А. Франкфуртскую горизонталь
- Б. Кривую Шпее
- В. Кривую Уилсона
- Г. Окклюзионную плоскость

Угол αnb на трг показывает положение

- А. Базиса нижней челюсти относительно основания черепа
- Б. Базиса верхней челюсти относительно основания черепа
- В. Оси верхнего резца относительно основания черепа
- Г. Базисов челюстей относительно друг друга

Начальный период смены зубов соответствует возрасту от ____ до ____ лет

- А. 9; 11
- Б. 6; 9
- В. 1; 3
- Г. 3; 6

У пациентов с гнатической формой мезиальной окклюзии на трг головы (в боковой проекции) диагностически значимо могут быть уменьшены значения

- А. Go-Pog; SNB
- Б. ArGoMe; NSL\\ML
- В. NSL\\ML; NL\\ML
- Г. Snp-A; SNA

На телерентгенограмме черепа в боковой проекции угол nsI/nI показывает наклон

- А. Верхних резцов к плоскости основания черепа
- Б. Базисов челюстей друг к другу
- В. Базиса нижней челюсти к основанию черепа
- Г. Базиса верхней челюсти к основанию черепа

Для тренировки мышц и нормализации функции языка используют

- А. Аппарат Андресена-Гойпля
- Б. Пластинку с накусочной площадкой
- В. Пластинку Хинца с бусиной
- Г. Расширяющую пластинку

У пациентов с гнатической формой дистальной окклюзии в сочетании с вертикальной резцовой дизокклюзией на трг головы (в боковой проекции) диагностически значимо могут быть увеличены значения

- А. SNA; ANB; NL\\ML; NSL\\ML
- Б. SNB; Go-Pog; 1\\1; NSL\\NL
- В. SNPog; 1\\1; Go-Pog
- Г. NGoAr; 1\\1; Go-Pog

Для устранения вредной привычки назначают

- А. Аппарат Френкеля 2 типа
- Б. Съёмный расширяющий аппарат
- В. Вестибулярную пластинку
- Г. Несъёмный расширяющий аппарат

[Вернуться в начало](#)