

Тесты с вопросами по специальности «Оториноларингология» для аттестации 1, 2 и высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/lor/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Оториноларингология» для аккредитации и других экзаменов (3900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/otorinolaringolog/

2) Тесты для аккредитации «Сурдология-оториноларингология» (1100 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/surdologiya/

3) Сурдология-оториноларингология (аттестация — тесты с ответами)

→ medik-otvet.ru/product/surdolog/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

Навигация по категориям

- [1 категория](#)
- [2 категория](#)
- [высшая категория](#)

1 категория

[Вернуться в начало](#)

При отосклерозе выполняется операция

- А. антромастоидотомия
- Б. стапедопластика
- В. аттикоантротомия
- Г. тимпанопластика

Иннервация гортани осуществляется

- А. блуждающим нервом
- Б. языкоглоточным нервом
- В. отводящим нервом
- Г. тройничным нервом

Отдел височной кости, в котором находится внутреннее ухо

- А. сосцевидный отросток
- Б. чешуя височной кости
- В. пирамида
- Г. скуловой отросток

К звукопроводящему отделу звукового анализатора относится

- А. наружное ухо, барабанная перепонка, слуховые косточки
- Б. внутреннее ухо
- В. преддверно-улитковый нерв
- Г. первый нейрон звукового анализатора

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и возбудителем. Заболевание:

1. Лакунарная ангина. Возбудитель:

- А. Бацилла леффлера;
 - Б. Веретенообразная палочка + спирохета полости рта;
 - В. Стрептококк.
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Соотнесите анатомические образования и локализацию:

1. Кавернозный синус.

А. Передняя черепная ямка;

Б. Средняя черепная ямка;

В. Задняя черепная ямка.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Соотнесите структуры, обеспечивающие соответствующие функции звукового анализатора:

1. Звукопроводение.

А. Ушная раковина;

Б. Улитка;

В. Наружный слуховой проход;

Г. Кортиев орган;

Д. Слуховые косточки.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Пункция верхнечелюстной пазухи проводится через носовой ход

А. общий

Б. нижний

В. средний

Г. верхний

Паралич мягкого неба сопровождается

А. нарушением обоняния

Б. закрытой гнусавостью

В. открытой гнусавостью

Г. затруднением носового дыхания

Характерными для дифтерии гортани являются симптомы

- А. осиплость, сухой «старческий» кашель, постепенное нарастание симптомов стеноза гортани
- Б. внезапное начало, инспираторная одышка, чистый голос, «лающий» кашель, быстрое развитие симптомов стеноза гортани

Воспаление всех придаточных пазух носа называется

- А. полисинусит
- Б. пансинусит
- В. гемисинусит
- Г. риносинусит

При гнойном сфеноидите отделяемое при риноскопии наблюдается в носовом ходе

- А. среднем
- Б. верхнем
- В. нижнем
- Г. общем

Диагноз моноцитарной ангины устанавливается после исследования

- А. мочи
- Б. крови
- В. бактериологического
- Г. цитологического

Границей между носоглоткой и ротоглоткой является

- А. горизонтальная плоскость, проведенная через твердое небо
- Б. горизонтальная плоскость, проведенная через поверхность языка
- В. верхний полюс небных миндалин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте возбудителей и заболевания, основным этиологическим фактором которого они являются:

1. *Bacteriae leptotrix*.

А. Ангина вульгарная;

Б. Ангина симановского – венсана – плаута;

В. Гиперкератоз глотки;

Г. Эпиглоттит;

Д. Озена.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Предпосылкой развития ложного крупа является

А. атопический дерматит

Б. пневмония

В. острый ринит

Г. ангина

Холестеатома характерна для

А. отосклероза

Б. адгезивного отита

В. хронического гнойного мезотимпанита

Г. хронического гнойного эптитимпанита

Наиболее часто риногенные внутричерепные осложнения возникают как осложнение

А. гайморита

Б. фронтита

В. этмоидита

Г. сфеноидита

Задняя стенка глотки состоит из слоев

А. одного

Б. двух

В. трех

Г. четырех

Слезно-носовой канал открывается в носовой ход

- А. верхний
- Б. средний
- В. нижний
- Г. общий

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте парные и непарные хрящи гортани:

1. Непарные хрящи.

- А. Щитовидный;**
- Б. Черпаловидный;**
- В. Надгортанник;**
- Г. Рожковидный;**
- Д. Перстневидный.**

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Для промывания серных пробок рекомендуется использовать воду температурой

- А. 25 °С
- Б. 30 °С
- В. 37 °С
- Г. 49 °С

Патогенетической основой болезни меньера считается

- А. гидропс лабиринта
- Б. наличие холестеатомы
- В. нарушения в эндокринной системе
- Г. артериальная гипертензия

При проведении тональной пороговой аудиометрии при поражении звукопроводящего отдела звукового анализатора мы наблюдаем

- А. снижение костного и воздушного звукопроведения
- Б. снижение воздушного звукопроведения
- В. снижение костного звукопроведения
- Г. островки звука

У детей гортань находится на уровне шейных позвонков

- А. V-VI
- Б. III-IV
- В. IV-VI
- Г. II-III

Заглочные абсцессы чаще бывают в возрасте

- А. до 3-х лет жизни
- Б. от 3 до 10 лет
- В. от 10 до 20 лет
- Г. от 20 лет и старше

При переходе воспалительного процесса на околоминдаликовую клетчатку может развиваться

- А. парафарингеальный абсцесс
- Б. паратонзиллярный абсцесс
- В. сиалоаденит
- Г. ретрофарингеальный абсцесс

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте костные и хрящевые составляющие носовой перегородки:

1. Костная часть перегородки носа.

- А. Сошник;
- Б. Слезная кость;
- В. Перпендикулярная пластинка решетчатой кости;
- Г. Четырехугольный хрящ.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

Инородные тела бронхов чаще локализуются

- А. в левом бронхе
- Б. в правом бронхе
- В. одинаково часто как в левом, так и в правом
- Г. в области бифуркации трахеи

Адиadoхокинез является специфическим симптомом поражения

- А. височной доли головного мозга
- Б. мозжечка
- В. лобной доли головного мозга
- Г. лабиринта

Причиной нарушения подвижности мягкого неба при дифтерии является

- А. отек мягких тканей глотки
- Б. токсический парез мышц небной занавески
- В. парез лицевого нерва
- Г. парез языкоглоточного нерва

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте характеристики сенсоневральной тугоухости:

1. I степень.

- А. Потеря слуха 26 – 40 дБ;
- Б. Потеря слуха 41 – 55 дБ;
- В. Потеря слуха 56 – 70 дБ;
- Г. Потеря слуха 71 – 90 дБ;
- Д. Потеря слуха более 91 дБ.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Тело первого нейрона вестибулярного анализатора располагается в

- А. барабанную полость
- Б. преддверии
- В. улитке
- Г. внутреннем слуховом проходе

При закрытии обонятельной щели наступает

- А. эссенциальная гипо- или аносмия
- Б. респираторная гипо-или аносмия
- В. кокасмия

Наиболее вероятный путь при распространении инфекции из среднего уха при субдуральном абсцессе

- А. гематогенный
- Б. контактный
- В. лимфогенный
- Г. преформированный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте онп и носовые ходы, в которые открываются их соустья:

1. Средний носовой ход.

- А. Клиновидная пазуха;
- Б. Верхнечелюстная пазуха;
- В. Лобная пазуха;
- Г. Передние клетки решетчатого лабиринта;
- Д. Средние клетки решетчатого лабиринта.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Рецидивирующие носовые кровотечения наблюдаются при хроническом рините

- А. вазомоторном
- Б. гипертрофическом
- В. катаральном
- Г. атрофическом

После коникотомии следует

- А. назначить противовоспалительную терапию
- Б. переместить канюлю в трахею (сделав верхнюю или нижнюю трахеостомию)
- В. провести фиброскопию
- Г. сделать томограмму

Канал улитки состоит из

- А. лестницы преддверия и барабанной лестницы
- Б. лестницы барабанной и лестницы лабиринта
- В. лестницы лабиринта и лестницы преддверия
- Г. лестницы преддверия и лестницы вестибулярной

При заболевании мешочков преддверия появляется

- А. отолитовый нистагм
- Б. спонтанный нистагм
- В. оптокинетический нистагм
- Г. позиционный нистагм

Пункцию верхнечелюстной пазухи проводят через носовой ход

- А. общий
- Б. нижний
- В. средний
- Г. верхний

Скорость распространения звуковых колебаний в воздухе составляет

- А. 332 м/с
- Б. 950 м/с
- В. 1450 м/с
- Г. 300000 м/с

К анестезии слизистой оболочки гортани приводит поражение

- А. тройничного нерва
- Б. нижнего гортанного нерва
- В. верхнего гортанного нерва
- Г. языкоглоточного нерва

К симптомам хронического тонзиллита относится

- А. симптом зака
- Б. симптом шеффера
- В. симптом оппенгейма
- Г. симптом гордона

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте формы воспаления онп:

1. Смешанная форма.

А. Кистозная;

Б. Гнойно – полипозная;

В. Катаральная;

Г. Пристеночно - гиперпластическая;

Д. Гребень клиновидной кости.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

В каждой половине полости носа имеется носовых ходов

А. два

Б. три

В. четыре

Г. пять

С латеральной стенкой клиновидной пазухи граничит

А. сигмовидный синус

Б. пещеристый синус

В. поперечный синус

Г. продольный синус

признаком гнойного воспаления клиновидной пазухи является наличие гноя в

А. верхнем носовом ходе

Б. среднем носовом ходе

В. нижнем носовом ходе

Г. общем носовом ходе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между образованием и его локализацией. Образование:

1. Кровотокающий полип носа. Локализация:

- А. Носоглотка;
- Б. Носовая перегородка;
- В. В/ч пазуха;
- Г. Клетки решетчатого лабиринта.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Функциональная роль движений в перстнещитовидном суставе заключается в

- А. расширению голосовой щели
- Б. сужению голосовой щели
- В. изменении натяжения голосовых складок
- Г. опускании надгортанника

К звукопроводящему отделу звукового анализатора относится

- А. среднее ухо, внутреннее ухо
- Б. наружный слуховой проход, барабанная полость, улитка
- В. наружное ухо, среднее ухо, жидкости улитки
- Г. слуховые косточки и жидкости полукружных каналов

Сигмовидный синус находится

- А. в средней черепной ямке
- Б. в задней черепной ямке
- В. в основании черепа
- Г. в основании черепа

Во втором законе Эвальда говорится, что

- А. направление движения эндолимфы соответствует направлению медленного компонента нистагма
- Б. вращение тела вправо возбуждает левый лабиринт
- В. вращение тела влево возбуждает правый лабиринт
- Г. направление движения эндолимфы соответствует направлению быстрого компонента нистагма

Острый ринит имеет стадии

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

При проведении вращательной пробы в кресле барани голову больного наклоняют

- А. на левый бок
- Б. на правый бок
- В. на 30 градусов вперед
- Г. на 90 градусов вперед

Ангины чаще встречаются в возрасте

- А. до 5 лет
- Б. от 5 до 30 лет
- В. от 30 до 50 лет
- Г. от 50 и старше

Адекватный метод лечения при токсико-аллергической форме I степени хронического тонзиллита

- А. промывание лакун небных миндалин
- Б. тонзиллотомия
- В. тонзиллэктомия
- Г. физиотерапевтическое лечение

Инородные тела пищевода чаще встречаются в отделе

- А. шейном
- Б. грудном
- В. брюшном

В формировании медиальной стенки полости носа участвует

- А. перпендикулярная пластинка небной кости
- Б. лобные отростки верхней челюсти
- В. носовые отростки лобной кости
- Г. перпендикулярная пластинка решетчатой кости

Типичной локализацией кровотока полипа полости носа является

- А. перпендикулярная пластинка решетчатого лабиринта
- Б. дно полости носа
- В. хрящевая часть носовой перегородки
- Г. костная часть носовой перегородки

Лимфатическая сеть гортани наиболее выражена в отделе

- А. вестибулярном
- Б. среднем
- В. подскладочном

Гортань у детей находится на уровне шейных позвонков

- А. II-III
- Б. IV-VI
- В. III-IV
- Г. IV-VII

Сигмовидный синус находится в

- А. передней черепной ямке
- Б. средней черепной ямке
- В. задней черепной ямке
- Г. основании черепа

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Соотнесите анатомические образования, составляющие скелет наружного носа и носовой перегородки:

1. Скелет перегородки носа.

- А. Лобная кость;
- Б. Носовая кость;
- В. Передняя носовая ость;
- Г. Сошник;
- Д. Гребень клиновидной кости.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Костный лабиринт заполнен

- А. эндолимфой
- Б. лимфой
- В. ликвором
- Г. перилимфой

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте стадию воспаления среднего уха и отоскопическую картину:

1. Острый тубоотит.

- А. Мt гиперемирована, инфильтрирована, отечна, выбухает, пульсирует;
- Б. Мt перфорирована, гиперемирована;
- В. Втяжение mt – укорочение рукоятки молоточка, укорочение/исчезновение светового конуса;
- Г. Мt местами петрифицирована, утолщена;
- Д. Мt гиперемирована, отечна.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Кавернозный синус находится в

- А. передней черепной ямке
- Б. средней черепной ямке
- В. задней черепной ямке
- Г. основании черепа

В костном лабиринте выделяют отделов

- А. 1
- Б. 2
- В. 3
- Г. 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между образованием и его локализацией:

1. Глоточная миндалина:

- А. Носоглотка;**
- Б. Ротоглотка;**
- В. Гортаноглотка.**
- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Радикальная операция на ухе выполняется при

- А. отосклерозе
- Б. остром среднем гнойном отите
- В. мастоидите
- Г. хроническом гнойном среднем отите

Срочная трахеостомия показана при остром стенозе гортани в стадии

- А. компенсации
- Б. субкомпенсации
- В. декомпенсации
- Г. асфиксии

При ожоге гортани впервую очередь поражаются

- А. голосовые складки
- Б. вестибулярные складки
- В. гортанная поверхность надгортанника
- Г. язычная поверхность надгортанника

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и тактикой лечения. Заболевание:

1. Острый катаральный средний отит. Тактика лечения:

- А. Обезболивающие и противовоспалительные капли;**
- Б. Продувание слуховых труб;**
- В. Турунды с антибактериальной мазью в ухо.**
- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Задние клетки решетчатого лабаранта открываются в носовой ход

- А. верхний
- Б. средний
- В. нижний
- Г. общий

Границы трахеи

- А. 4-5 шейный позвонок и 6 грудной позвонок
- Б. 6-7 шейный позвонок и 4-5 грудной позвонок
- В. 4-5 шейный позвонок и 5-6 грудной позвонок
- Г. нижний край щитовидного хряща и 5 грудной позвонок

Адекватные раздражитель рецепторов преддверия

- А. прямолинейное ускорение, ускорение силы тяжести
- Б. угловое ускорение, прямолинейное ускорение
- В. ускорение силы тяжести, угловое ускорение
- Г. прямолинейное ускорение, угловое ускорение

Опыт ринне при отосклерозе будет

- А. укорочен
- Б. удлинен
- В. положительный
- Г. отрицательный

При определении степени нистагма взгляд больного фиксируют

- А. в сторону быстрого компонента
- Б. перед больным
- В. в сторону медленного компонента
- Г. вниз

При опыте швабаха определяют

- А. длительность восприятия звука через кость
- Б. длительность восприятия звука по воздуху
- В. разницу в длительности восприятия звука по кости и по воздуху
- Г. латерализацию звука

В клинике отогенного абсцесса головного мозга выделяют стадий

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

Чувствительная иннервация глотки осуществляется

- А. второй веточкой тройничного нерва, блуждающим и подъязычным нервами
- Б. блуждающим нервом, первой и второй ветвями тройничного нерва
- В. первой и второй ветвями тройничного нерва и языкоглоточным нервом
- Г. языкоглоточным, блуждающим нервами и второй веточкой тройничного нерва

Санториниевы щели в наружном слуховом проходе располагаются на

- А. верхней стенке
- Б. задней стенке
- В. нижней стенке
- Г. передней стенке

Средние клетки решетчатого лабиринта открываются в носовой ход

- А. общий
- Б. нижний
- В. средний
- Г. верхний

Для петрозита характерно

- А. парез или паралич лицевого нерва
- Б. тригеминит
- В. двустороннее снижение слуха
- Г. боль при жевании

При отосклерозе первичный отосклеротический очаг чаще всего локализуется

- А. в области круглого окна
- Б. в области овального окна
- В. в области пирамидального возвышения
- Г. в области барабанного отверстия слуховой трубы

Для остановки кровотечения при травме шеи целесообразно применить

- А. холод местно
- Б. давящую повязку
- В. наложение лигатуры на кровоточащий сосуд
- Г. тампонаду раны

Абсолютные показания к трахеостомии

- А. уровень стеноза гортани
- Б. степень стеноза гортани
- В. причины стеноза гортани
- Г. возраст пациента

При опыте швабаха определяют

- А. длительность восприятия звука по воздуху
- Б. длительность восприятия звука по кости
- В. разницу в длительности восприятия звука по воздуху и по кости
- Г. латерализацию звука

Кортиев орган располагается в

- А. ампулах полукружных каналов
- Б. улитке
- В. преддверии
- Г. внутреннем слуховом проходе

Внутреннее ухо латерально граничит с

- А. барабанной полостью
- Б. слуховой трубой
- В. сосцевидным отростком
- Г. скуловым отростком

Наличие синюшных и белых пятен на слизистой оболочке полости носа характерно для хронического ринита

- А. гипертрофического
- Б. атрофического
- В. вазомоторного
- Г. катарального

Основная этиологическая роль в возникновении ангины у детей принадлежит

- А. зеленым стрептококку
- Б. золотистому стафилококку
- В. бета-гемолитическому стрептококку группы А
- Г. аденовирусам

Иностранные тела чаще локализуются в

- А. гортани
- Б. трахеи
- В. бронхах

Для юношеской ангиофибромы основания черепа характерно

- А. затруднение носового дыхания
- Б. налет на небных миндалинах
- В. стекание гноя по задней стенке глотки
- Г. деформация лица

Заглоточное пространство у детей содержит

- А. сосудисто-нервный пучок
- Б. лимфатические узлы
- В. слюнные железы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте стенки барабанной полости и образования, с которыми они граничат:

1. Верхняя стенка.

- А. Внутренняя сонная артерия;
- Б. Внутреннее ухо;
- В. Сосцевидный отросток;
- Г. Средняя черепная ямка.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

При гнойном сфеноидите отделяемое при риноскопии наблюдается в носовом ходе

- А. общем
- Б. нижнем
- В. среднем
- Г. верхнем

Предрасполагающим фактором к развитию фурункула носа является

- А. хронический гастрит
- Б. сахарный диабет
- В. тиреотоксикоз
- Г. хронический гипертрофический ринит

Кровоснабжение небных миндалин осуществляется из артериальной системы

- А. наружной сонной артерии
- Б. внутренней сонной артерии
- В. наружной и внутренней сонной артерии

С латеральной стенкой клиновидной пазухи граничит синус

- А. продольный
- Б. поперечный
- В. сигмовидный
- Г. пещеристый

Передние клетки решетчатого лабиринта открываются в носовой ход

- А. верхний
- Б. средний
- В. нижний
- Г. общий

Барабанная струна является ветвью

- А. слухового нерва
- Б. вестибулярного нерва
- В. лицевого нерва
- Г. тройничного нерва

Рак гортани чаще развивается

- А. в вестибулярном и голосовом отделе
- Б. в вестибулярном отделе
- В. в подскладковом отделе
- Г. у женщин

Периферический рецептор звукового анализатора

- А. ампулярный аппарат
- Б. кортиев орган
- В. отолитовый аппарат
- Г. овальное окно

Характерным симптомом озоны является

- А. зловонный насморк
- Б. гипертрофия носовых раковин
- В. вязкий секрет
- Г. узкие носовые ходы

Предрасполагающим фактором к возникновению фурункула носа является

- А. бронхиальная астма
- Б. гипертоническая болезнь
- В. сахарный диабет
- Г. псориаз

Носовую перегородку образуют

- А. треугольный хрящ, решетчатый лабиринт, сошник
- Б. перпендикулярная пластинка решетчатой кости, сошник, четырехугольный хрящ, носовой гребешок верхней челюсти
- В. небная кость, сошник, четырехугольный хрящ
- Г. носовая кость, четырехугольный хрящ, сошник

У больного с поражением звуковоспринимающего отдела звукового анализатора правого уха звук в опыте вебера будет направлен в

- А. вправо
- Б. влево
- В. в обе стороны
- Г. в центр головы

Какую связку необходимо рассечь при асфиксии для вскрытия просвета гортани

- А. щитоподъязычную
- Б. щитонадгортанную
- В. перстнещитовидную
- Г. перстнетрахеальную

Степени отклонения туловища при пробе воячека

- А. одна
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

При отомикозе, вызванном грибом *aspergillus niger*, отделяемое будет иметь цвет

- А. черно – коричневый
- Б. желтоватый
- В. зеленоватый
- Г. бело – серый

Первый нейрон звукового анализатора располагается в

- А. барабанной полости
- Б. улитке
- В. преддверии
- Г. внутреннем слуховом проходе

Срочная трахеостомия производится при остром стенозе гортани

- А. 1-й степени
- Б. 2-й степени
- В. 3-й степени
- Г. 4-й степени

Слизистая оболочка голосовых складок представлена

- А. цилиндрическим мерцательным эпителием
- Б. многослойным плоским эпителием
- В. многослойным плоским эпителием

Симптомы, характерные для подскладочного ларингита

- А. постепенное начало, смешанная одышка, осиплость, сухой «старческий» кашель, постепенное нарастание симптоматики стеноза гортани
- Б. внезапное начало, инспираторная одышка, чистый голос, «лающий» кашель, быстрое развитие симптомов стеноза гортани
- В. постепенное начало, смешанная одышка, чистый голос, «лающий» кашель, постепенное нарастание симптоматики стеноза гортани

Сила громкой разговорной речи составляет

- А. 30 дБ
- Б. 50 дБ
- В. 65 дБ
- Г. 80 дБ

При хроническом атрофическом фарингите слизистая оболочка

- А. истончена
- Б. гиперемирована
- В. отечна
- Г. имеются увеличенные лимфоидные гранулы

Двигательная иннервация глотки осуществляется

- А. возвратным и языкоглоточным нервом
- Б. первой веточкой тройничного нерва и возвратным нервом
- В. языкоглоточным и подъязычным нервом
- Г. подъязычным и возвратным нервом

Воздушные кисты гортани исходят из

- А. гортанных желудочков
- Б. валлекул
- В. грушевидных синусов
- Г. вестибулярных складок

Основная этиологическая роль в возникновении бактериальной ангины принадлежит

- А. пневмококку
- Б. золотистому стафилококку
- В. бета-гемолитическому стрептококку группы А
- Г. зеленающему стрептококку

Внутреннее ухо состоит из

- А. полукружных каналов, преддверия, барабанной полости
- Б. улитки, преддверия, внутреннего слухового прохода
- В. улитки, полукружных каналов, преддверия
- Г. преддверия, барабанной полости, внутреннего слухового прохода

Голосовые складки проецируются на щитовидный хрящ

- А. на границе верхней и средней трети
- Б. на границе нижней и средней трети
- В. посередине щитовидного хряща
- Г. у основания щитовидного хряща

Больного с ангиной при необходимости госпитализируют в

- А. инфекционное отделение
- Б. лор-отделение
- В. терапевтическое отделение
- Г. хирургическое отделение

Диагноз агранулоцитарной ангины устанавливается после исследования

- А. мочи
- Б. крови
- В. гистологического
- Г. бактериологического

На задней стенке преддверия лабиринта находится отверстие

- А. 1
- Б. 2
- В. 4
- Г. 5

Первый нейрон вестибулярного анализатора располагается в

- А. барабанной полости
- Б. улитке
- В. преддверии
- Г. внутреннем слуховом проходе

Внутренние мышцы гортани делятся на группы

- А. суживающие голосовую щель, расширяющие голосовую щель, натягивающие голосовые складки
- Б. натягивающие голосовые складки, суживающие голосовую щель
- В. расширяющие и суживающие голосовую щель
- Г. натягивающие, расширяющие голосовые складки, поднимающие гортань

Ухо человека воспринимает речевые частоты в диапазоне

- А. 50 – 100 гц
- Б. 8000 – 10000 гц
- В. 800 – 2000 гц
- Г. 10000 – 13000 гц

Постоянный симптом хронического среднего отита

- А. повышение температуры тела
- Б. боль в ухе
- В. перфорация барабанной перепонки
- Г. нарушение фланговой походки

Аденоидами называется гипертрофия

- А. небных миндалин
- Б. боковых валиков глотки
- В. носоглоточной миндалины
- Г. язычной миндалины

Пищевод имеет анатомических сужений

- А. одно
- Б. два
- В. три
- Г. четыре

В средний носовой ход открываются

- А. верхнечелюстная пазуха, лобная пазуха, клиновидная пазуха
- Б. носо-слезный канал, верхнечелюстная пазуха, передние клетки решетчатого лабиринта
- В. лобная пазуха, передние и средние клетки решетчатого лабиринта, верхнечелюстная пазуха
- Г. клиновидная пазуха, задние клетки решетчатого лабиринта

Направление нистагма определяется

- А. направлением медленного компонента нистагма
- Б. направлением быстрого компонента нистагма
- В. самым большим
- Г. аудиометрией

Брадикардия характерна для

- А. менингита
- Б. лабиринтита
- В. абсцесса височной доли головного мозга
- Г. синустромбоза

Для продольного перелома височной кости наиболее характерно

- А. кровотечение из уха
- Б. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва
- В. гемианопсия
- Г. системное головокружение

Нижняя стенка полости носа образована

- А. крыловидный отросток клиновидной кости и небный отросток верхней челюсти
- Б. горизонтальная пластинка небной кости и крыловидный отросток клиновидной кости
- В. небный отросток верхней челюсти и горизонтальная пластинка небной кости
- Г. носовые кости и небный отросток верхней челюсти

Границей между ротоглоткой и гортаноглоткой является

- А. нижний край мягкого неба
- Б. корень языка и надгортанник
- В. нижние полюса небных миндалин
- Г. дно полости рта

Санториниевы щели располагаются в наружном слуховом проходе на

- А. нижней стенке
- Б. верхней стенке
- В. передней стенке
- Г. задней стенке

Симптом кернига наблюдается при

- А. арахноидите
- Б. лабиринтите
- В. менингите
- Г. сифилисе

У взрослых гортань находится на уровне шейных позвонков

- А. III-IV
- Б. IV-VII
- В. V-VII
- Г. IV-VI

К звуковоспринимающему отделу звукового анализатора относится

- А. покровная пластинка
- Б. кортиев орган
- В. эндолимфа
- Г. перилимфа

При миогенных парезах чаще поражаются мышцы гортани

- А. кивательная
- Б. черпалонадгортанные
- В. поперечные
- Г. голосовые

Метод исследования слуха с помощью камертонов называется

- А. аудиометрия
- Б. акуметрия
- В. импедансометрия
- Г. тимпанометрия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте фарингоскопические признаки хронического тонзиллита с названием их по автору:

1. Признак зака.

- А. Инфильтрация и гиперплазия краев передних дужек;
- Б. Гиперемия краев небных дужек;
- В. Отечность краев верхних отделов небных дужек.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Острый насморк имеет стадий

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

Разлитая гиперемия слизистой оболочки глотки наблюдается при

- А. грибковой ангине
- Б. лакунарной ангине
- В. ангине Симановского-Венсана
- Г. остром фарингите

Дыхательная функция полости носа исследуется с помощью

- А. эндоскопии полости носа
- Б. ринопневмометрии
- В. передней риноскопии
- Г. задней риноскопии

Естественное отверстие лобной пазухи располагается в носовом ходе

- А. общем
- Б. нижнем
- В. среднем
- Г. верхнем

Адекватный раздражитель рецепторов полукружных каналов

- А. угловое ускорение
- Б. прямолинейное ускорение
- В. прямолинейное и угловое ускорение
- Г. ускорение силы тяжести

Амнестическая афазия наблюдается при

- А. абсцессе лобной доли головного мозга
- Б. абсцессе мозжечка
- В. менингите
- Г. абсцессе височной доли головного мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения. Заболевание:

1. Искривление носовой перегородки. Метод лечения:

- А. Вазотомия н/носовых раковин;
 - Б. Подслизистая резекция перегородки носа;
 - В. Подслизистая конхотомия.
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1- В

Основная этиологическая роль в возникновении бактериальной ангины принадлежит

- А. бета-гемолитическому стрептококку группы а
- Б. золотистому стафилококку
- В. пневмококку
- Г. зеленышему стрептококку

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между исследуемым органом и методом исследования.

Орган:

1. Нос и онп. Метод исследования:

- А. Диафаноскопия;
 - Б. R- графия;
 - В. Задняя риноскопия;
 - Г. Передняя риноскопия.
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1- В
Г. 1-Г

При травме гортани, осложненной кровотечением, пострадавший должен находиться в положении

- А. сидя
- Б. лежа на спине
- В. лежа на противоположной повреждению стороне
- Г. лежа на стороне повреждения или на животе

Для гемисинуита характерно

- А. воспаление всех околоносовых пазух
- Б. лево- или правостороннее воспаление всех пазух на одноименной стороне
- В. поражение нескольких околоносовых пазух
- Г. поражение одной околоносовой пазухи

В основе патогенеза отосклероза лежит

- А. остеодистрофический процесс в лабиринте
- Б. снижение внутрилабиринтного давления
- В. повышение давления эндолимфы и наличие гидропса лабиринта
- Г. деструкция отолитовых мембран

При рентгенологическом исследовании острых синуситов наблюдается

- А. гомогенное снижение прозрачности пазухи
- Б. пристеночное утолщение слизистой оболочки пазухи
- В. неомогенное снижение прозрачности пазухи
- Г. снижение прозрачности пазухи отсутствует

Отосклероз чаще наблюдается

- А. у девочек
- Б. у мальчиков
- В. у мужчин
- Г. у женщин

Острый вторичный тонзиллит наблюдается при

- А. гемобластозе
- Б. лейкозе
- В. гемофилии
- Г. капилляротоксикозе

В формировании верхней стенки полости носа участвует

- А. скуловая кость
- Б. продырявленная пластинка решетчатой кости
- В. альвеолярный отросток
- Г. верхняя стенка клиновидной пазухи

Положение больного в позе «ружейного курка» или «легавой собаки» наблюдается при

- А. отосклерозе
- Б. менингите
- В. лабиринтите
- Г. аэроотите

При остром стенозе гортани у детей чаще применяется

- А. верхняя трахеотомия
- Б. средняя трахеотомия
- В. нижняя трахеотомия
- Г. коникотомия

Гортань у детей соответствует уровню шейных позвонков

- А. IV-VI
- Б. II-III
- В. III-IV
- Г. IV-VII

Проникновение инфекции в среднее ухо при остром среднем отите происходит чаще всего

- А. транстимпанальным путем
- Б. тубарным путем
- В. гематогенным путем
- Г. лимфогенным путем

В носоглотке устье слуховой трубы располагается на

- А. верхней стенке
- Б. задней стенке
- В. боковой стенке
- Г. передней стенке

Наиболее частым путем распространения инфекции из среднего и внутреннего уха является

- А. контактный
- Б. лимфогенный
- В. гематогенный
- Г. лабиринтный

Начало пищевода соответствует проекции

- А. верхнего края щитовидного хряща
- Б. подъязычной кости
- В. нижнего края перстневидного хряща
- Г. нижнего края щитовидного хряща

Периферический рецептор звукового анализатора

- А. барабанная перепонка
- Б. ушная раковина
- В. слуховые косточки
- Г. кортиева орган

При стенозе гортани у детей чаще применяется

- А. верхняя трахеостомия
- Б. средняя трахеостомия
- В. нижняя трахеостомия
- Г. коникотомия

Внутреннее ухо располагается в

- А. барабанной полости
- Б. пирамиде височной кости
- В. чешуе височной кости
- Г. сосцевидном отростке

При сильном кровотечении из гортани для его остановки необходимо перевязать

- А. общую сонную артерию
- Б. внутреннюю сонную артерию
- В. наружную сонную артерию

Для поперечного перелома височной кости наиболее характерно

- А. ликворея
- Б. кровотечение из уха
- В. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва
- Г. гемианопсия

Ретрофарингеальный абсцесс развивается преимущественно в

- А. детском возрасте
- Б. зрелом возрасте
- В. пожилом возрасте
- Г. возраст значения не имеет

Через зев полость рта сообщается с отделом глотки

- А. верхним
- Б. средним
- В. нижним

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте стенки полости носа и образования, с которыми они граничат:

1. Нижняя.

- А. Сошник;
- Б. Четырехугольный хрящ;
- В. Горизонтальная пластинка небной кости;
- Г. Решетчатая кость;
- Д. Продырявленная пластинка решетчатой кости.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Резорбция эндолимфы происходит в

- А. в сферическом мешочке
- Б. в эллиптическом мешочке
- В. в эндолимфатическом мешочке
- Г. в перепончатой улитке

Некротические изменения на миндалинах возникают при

- А. агранулоцитозе
- Б. фарингите
- В. гриппе
- Г. кори

Аудиометрический признак тимпанальной формы отосклероза

- А. перцептивная тугоухость
- Б. смешанная тугоухость
- В. кондуктивная тугоухость
- Г. скалярная тугоухость

Отоскопическим признаком отосклероза является

- А. перфорация барабанной перепонки в ненатянутой части
- Б. нормальный вид или истончение барабанной перепонки
- В. перфорация барабанной перепонки в натянутой части
- Г. наличие петрификатов на барабанной перепонке

При экссудативном отите регистрируется тимпанограмма

- А. типа а
- Б. типа с
- В. типа b
- Г. типа d

Тело первого нейрона звукового анализатора располагается в

- А. улитке
- Б. ампулах
- В. мешочках преддверия
- Г. внутреннем слуховом проходе

Опыт ринне у больного с нейросенсорной тугоухостью будет

- А. удлинен
- Б. укорочен
- В. отрицательный
- Г. положительный

Спинно-мозговая пункция проводится в отделе позвоночника

- А. шейном
- Б. грудном
- В. поясничном

В глотке располагается миндалин

- А. три
- Б. четыре
- В. пять
- Г. шесть

Лимфатическая сеть гортани более развита в

- А. верхнем этаже
- Б. среднем этаже
- В. нижнем этаже

Среднее ухо состоит из

- А. барабанной перепонки, слуховой трубы, клеток сосцевидного отростка
- Б. слуховой трубы, барабанной полости, клеток сосцевидного отростка
- В. клеток сосцевидного отростка, слуховых косточек, барабанной перепонки
- Г. слуховых косточек, барабанной перепонки, слуховой трубы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения. Заболевание:

1. Отосклероз. Метод лечения:

- А. Радикальная операция на ухе;
- Б. Стапедопластика;
- В. Операция на эндолимфатическом мешке.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Патогномоничным симптомом отосклероза является

- А. гиперacusия
- Б. аутофония
- В. парacusис виллисии
- Г. пресбиacusис

какой признак, характерный для синдрома молчащего синуса является

- А. растяжение стенок клетки решетчатого лабиринта
- Б. наличие дополнительного соустья
- В. латерализация крючковидного отростка
- Г. наличие тени полуовальной формы

Эритематозную форму сифилиса гортани следует дифференцировать с

- А. аллергическим отеком
- Б. катаральным ларингитом
- В. атрофическим ларингитом
- Г. гиперпластическим ларингитом

В клинике острого среднего отита выделяют

- А. 1 стадию
- Б. 2 стадии
- В. 3 стадии
- Г. 4 стадии

У детей гортань находится на уровне шейных позвонков

- А. IV-VI
- Б. III-IV
- В. III-VI
- Г. VI-VII

Естественное отверстие верхнечелюстной пазухи располагается в носовом ходе

- А. верхнем
- Б. среднем
- В. нижнем
- Г. общем

Гортань у взрослого человека находится на уровне шейных позвонков

- А. III-V
- Б. IV-VI
- В. IV-VII
- Г. V-VII

Глотка проецируется на шейные позвонки

- А. 1--3
- Б. 1--4
- В. 1--5
- Г. 1--6

На задней стенке барабанной полости находится

- А. пирамидальный отросток для стременной мышцы
- Б. круглое окно
- В. отверстие слуховой трубы
- Г. овальное окно

Задний паратонзиллярный абсцесс вскрывается через

- А. У-образное пространство нёбной дужки
- Б. Заднюю нёбную дужку
- В. Переднюю нёбную дужку
- Г. Нишу удаленной нёбной миндалины нёбной дужки

Лестница преддверия и барабанная лестница сообщаются через

- А. Окно улитки
- Б. Водопровод преддверия
- В. Окно преддверия
- Г. Гелиотрему

Главной структурой остеомы является _____ основа

- А. Мягкотканная
- Б. Костная
- В. Жировая
- Г. Жидкостная

В зависимости от характера повреждающего фактора ожоги глотки бывают

- А. Физические, биологические
- Б. Гальванические, солнечные
- В. Газовые, электрические
- Г. Химические, термические

Наружные отиты классифицируются на

- А. Ограниченные и диффузные
- Б. Гранулезные и язвенные
- В. Катаральные и экссудативные
- Г. Атрофические и гипертрофические

При длительном одностороннем течении ринита у ребенка 2 лет необходимо исключить

- А. Инородное тело полости носа
- Б. Фурункул преддверия носа
- В. Перелом костей носа
- Г. Острый сфеноидит

Инородное тело полости носа характеризуется односторонним гнойным насморком с неприятным запахом и

- А. Односторонней деформацией ската носа
- Б. Гемилатеральным затруднением носового дыхания
- В. Отделяемым из носа кровянистого характера
- Г. Длительным затруднением носового дыхания

По международной классификации степеней тугоухости, II степень тугоухости соответствует нарушению слуха в диапазоне (в дБ)

- А. 26-40
- Б. 0-25
- В. 41-55
- Г. 56-70

Количество стадий стеноза гортани равняется

- А. Трех
- Б. Двум
- В. Четырех
- Г. Пяти

Вероятным признаком дифтерии гортани является ларингит

- А. С афонией при нормальной или субфебрильной температуре тела
- Б. С осиплостью голоса и грубым лающим кашлем
- В. С высокой температурой и интоксикацией
- Г. Сопровождающийся конъюнктивитом и пятнисто-папулезной сыпью

Парацентез производится в _____ квадранте барабанной перепонки

- А. Передненижнем
- Б. Задненижнем
- В. Передневерхнем
- Г. Задневерхнем

Степень тяжести синдрома апноэ во сне определяется

- А. Наличием сонливости в дневное время
- Б. Состоянием сердечно-сосудистой системы
- В. Количеством эпизодов апноэ/гипопноэ во сне
- Г. Наличием неврологических заболеваний

Наиболее частым путем проникновения инфекции при паратонзиллите является

- А. Тонзиллогенный
- Б. Отогенный
- В. Лимфогенный
- Г. Гематогенный

Методом исследования околоносовых пазух путем просвечивания является

- А. Эндоскопия
- Б. Риноманометрия
- В. Диафаноскопия
- Г. Риноскопия

При дифференциальной диагностике расстройства рецептивной речи для исключения тугоухости необходимо проведение

- А. Тимпанометрию
- Б. Магнитно-резонансную томографию
- В. Аудиометрию
- Г. Электроэнцефалографию

Двусторонняя артрэзия хоан характеризуется

- А. Затруднением при глотании
- Б. Отделяемым из носа
- В. Затруднением дыхания
- Г. Кровотечениями

Для диагностики дивертикула ценкера основным исследованием является

- А. Рентгеноскопия с контрастированием взвеси бария
- Б. УЗИ органов шеи
- В. Ларингоскопия
- Г. Томография гортани

Абсолютно противопоказана работа в химической промышленности лицам с

- А. Функциональной дисфонией
- Б. Хроническим атрофическим процессом ВДП
- В. Хроническим тонзиллитом
- Г. Хроническим катаральным ринофарингитом

К побочным эффектам сосудосуживающих препаратов относят

- А. Сухость слизистой оболочки
- Б. Ринорею
- В. Приступы чихания
- Г. Уменьшение ощущения заложенности носа

Оптимальным объемом хирургического вмешательства при признаках отогенного менингита на фоне острого отита является

- А. Расширенная антромастотомия
- Б. Тимпанопункция
- В. Расширенная общеполостная операция
- Г. Парацентез барабанной перепонки

К характерным признакам катаральной ангины относят

- А. Расширенные устья лакун нёбных миндалин
- Б. Гиперемию дужек и нёбных миндалин
- В. Нагноившиеся фолликулы
- Г. Белые или светло-желтые налеты в лакунах

К основным симптомам болезни меньера относятся самопроизвольные приступы головокружения, шум в ухе

- А. Гноетечение из уха
- Б. Сенсоневральная тугоухость
- В. Боль в ушах
- Г. Ушной зуд

В области глоточно-пищеводного перехода расположены

- А. Два треугольника
- Б. Три треугольника
- В. Межмышечные треугольники
- Г. Четыре треугольника

Курс ингаляций с кортикостероидами назначается при диагнозе

- А. Рак гортани
- Б. Туберкулез гортани
- В. Болезнь Гайека-Рейнке
- Г. Хронический атрофический ларингит

Для профессиональной нейросенсорной тугоухости характерно

- А. Одностороннее поражение слуха
- Б. Двустороннее поражение слуха
- В. Острое развитие
- Г. Раннее повышение порогов слуха на частоте 7000 Гц

При распространенной форме папилломатоза гортани папилломы располагаются на

- А. Обеих голосовых складках
- Б. Одной голосовой складке, не суживают голосовую щель
- В. Одной голосовой складке, суживают голосовую щель на 1/3
- Г. Всём просвете гортани, вызывая стеноз

Первую стадию острого ринита называют стадией

- А. Сухой или раздражения
- Б. Отечной
- В. Слизисто-гнойных выделений
- Г. Серозных выделений

Показанием к наложению трахеостомы является

- А. Острый ларингит
- Б. Ложный круп
- В. Острый флегмонозный ларингит
- Г. Декомпенсированный стеноз гортани

Кровотокающий полип носа обычно локализуется

- А. Под средней носовой раковиной
- Б. В верхних отделах носа
- В. В задних отделах перегородки носа
- Г. В передненижнем отделе перегородки носа

Наиболее предпочтительный возраст детей с прелингвальной глухотой для кохлеарной имплантации

- А. 7-10 Лет
- Б. 3-6 Лет
- В. Старше 10 лет
- Г. 2-4 Года

Клиническая картина при дифтерии глотки характеризуется

- А. Язвами на одной миндалине
- Б. Пленкой на миндалинах и признаками выраженной интоксикации
- В. Воспалением дна полости рта с выраженной инфильтрацией
- Г. Внезапно возникшим отеком шеи, губ, подчелюстной области и гортани

Для заключения о нормальной слуховой функции у детей отоакустическая эмиссия является достаточной

- А. При отсутствии жалоб у пациентов
- Б. Если зарегистрирована однократно
- В. Всегда
- Г. Не всегда

Сенсоневральную тугоухость, возникшую 3 недели назад, считают

- А. Подострой
- Б. Острой
- В. Внезапной
- Г. Хронической

Забор мазка из зева на флору и чувствительность к антибактериальным препаратам для выявления хронического носительства пневмококка и гемофильной палочки делают

- А. На фоне респираторно-вирусной инфекции
- Б. На фоне приема антибактериальных препаратов
- В. Через 1 неделю после окончания курса антибиотика
- Г. При наличии у пациента ангины

Анатомическим образованием, являющимся продолжением заглоточного пространства, выступает

- А. Околоминдаликовое пространство
- Б. Переднее средостение
- В. Парафарингеальное пространство
- Г. Заднее средостение

Среди разнообразных возможных микробных возбудителей ангины в большинстве случаев основная этиологическая роль принадлежит

- А. Пневмококкам
- Б. Стафилококкам
- В. В-гемолитическому стрептококку группы А
- Г. Аденовирусам

Барабанная перепонка подразделяется на натянутую и _____ части

- А. Заднюю
- Б. Передненижнюю
- В. Основную
- Г. Расслабленную

Формирование нижнего носового хода у детей происходит к

- А. 4 Годам
- Б. Рождению
- В. 10 Годам
- Г. 7 Годам

При массивном носовом, непрекращающемся кровотечении проводят

- А. Хирургическую диатермию
- Б. Заднюю тампонаду
- В. Химическую коагуляцию
- Г. Гальванокаустическую

Одним из факторов риска рака гортани является

- А. Папилломатоз гортани
- Б. Кандидоз гортани
- В. Частое употребление мороженого, холодных напитков
- Г. Паратонзиллярный абсцесс

Кадык у мужчин формирует хрящ

- А. Черпаловидный
- Б. Надгортанный
- В. Перстневидный
- Г. Щитовидный

К методам объективной аудиометрии относится

- А. Ультразвуковое исследование слуха
- Б. Тональная пороговая аудиометрия
- В. Регистрация слуховых вызванных потенциалов
- Г. Тональная надпороговая аудиометрия

Препаратом, подавляющим кашлевой рефлекс является

- А. Ацц
- Б. Флюдитек
- В. Синекод
- Г. Проспан

Этиологическим фактором буллёзного отита является

- А. Хламидия
- Б. Протей
- В. Вирус гриппа
- Г. Гемолитический стрептококк

I степень сенсоневральной тугоухости характеризуется потерей слуха (в дБ)

- А. 56-70
- Б. 26-40
- В. 71-90
- Г. 41-55

Ювенильная ангиофиброма распространяется в глазницу или подвисочную ямку с локализацией снаружи твёрдой мозговой оболочки в _____ стадию

- А. IV а
- Б. III б
- В. IV б
- Г. III а

Этиологией острого среднего отита обычно является _____ флора

- А. Паразитарная
- Б. Вирусная
- В. Бактериальная
- Г. Грибковая

Клиническим проявлением хронического гипертрофического фарингита является _____ глотки

- А. Бледность слизистой оболочки задней стенки
- Б. Умеренно выраженная гиперемия слизистой оболочки задней стенки
- В. Выраженная сухость слизистой оболочки задней стенки
- Г. Стекание слизисто-гнойных выделений по задней стенке

В терапии острых риносинуситов наибольший уровень доказательности имеет топический интраназальный глюкокортикостероид

- А. Будесонид
- Б. Флутиказона фуруат
- В. Флутиказона пропионат
- Г. Мометазона фуруат

Лечение неосложненного острого гнойного среднего отита необходимо начинать с

- А. Гентамицина
- Б. Сумамеда
- В. Аугментина
- Г. Цефтриаксона

Слух при iv типе тимпаноластики возникает за счёт

- А. Воздействия звука на неотимпанальную мембрану и стремя
- Б. Воздействия звука на неотимпанальную мембрану и молоточек
- В. Воздействия звука на овальное окно через барабанную перепонку и протез
- Г. Увеличения разницы звукового давления на лабиринтные окна

Для сфеноидита характерна головная боль по типу

- А. Локализованной в области лба
- Б. Опооясывающей
- В. Диффузной, без четкой локализации
- Г. Возникающей к вечеру в горизонтальном положении

Инфильтраты при волчанке характеризуются

- А. Инфильтратами с язвой темно-красного цвета, дно язвы с салым налетом
- Б. Инфильтратами с глубокими язвами
- В. Мелкоточечными высыпаниями, которые сливаются и изъязвляются
- Г. Инфильтратами серого цвета, не образующими язв

Заложенность носа при инфекционном мононуклеозе обусловлена

- А. Грибковыми наложениями
- Б. Увеличением носоглоточной миндалины
- В. Катарально-экссудативным ринитом
- Г. Наличием фибринозной пленки

Лоскутом для создания искусственной барабанной перепонки при тимпаноластике может быть

- А. Плёнка из амниотической оболочки куриного яйца
- Б. Лоскут из фасции височной мышцы
- В. Кожный лоскут из позадиушной области
- Г. Тефлоновая пластинка

Клиническим проявлением хронического катарального фарингита является

- А. Першение в глотке
- Б. Дисфагия
- В. Нарушение глотания
- Г. Осиплость

При сифилисе поражение слизистой оболочки полости рта и глотки возможны в _____ периоде

- А. Третичном
- Б. Вторичном
- В. Первичном
- Г. Любом

Слизистая оболочка полости носа в течении суток в среднем выделяет _____ влаги

- А. 100 Мл
- Б. 500 Мл
- В. 50 Мл
- Г. 2 Литра

Число квадрантов, которые условно выделяют в натянутой части барабанной перепонки при отоскопии, равно

- А. 3
- Б. 5
- В. 4
- Г. 6

Преимущество ингаляционной терапии при патологии гортани заключается в

- А. Увеличении активной поверхности лекарственного вещества
- Б. Увеличении системного эффекта лекарственного препарата
- В. Отсутствии возрастных ограничений
- Г. Отсутствии депонирования лекарственного вещества в подслизистом слое

К клиническим формам хронических фарингитов относят

- А. Простой, токсико-аллергический
- Б. Катаральный, атрофический, гипертрофический
- В. Гиперпластический, некротический
- Г. Серозный, гнойный

Ранняя диагностика дизартрии осуществляется на основании

- А. Грубого нарушения фонематического восприятия
- Б. Наличия неврологической неречевой симптоматики
- В. Выраженности лексико-грамматических расстройств
- Г. Наличия стойких дефектов звукопроизношения

Длительность установочного нистагма в норме до

- А. 1 Минуты
- Б. 3 Секунд
- В. 5 Минут
- Г. 15 Секунд

К симптому наиболее характерному для риногенных орбитальных осложнений относят

- А. Астигматизм
- Б. Миоклонус век
- В. Амблиопию
- Г. Реактивный отек века

Для лечения лакунарной ангины стрептококковой этиологии применяют

- А. Кларитромицин
- Б. Феноксиметилпенициллин
- В. Цефиксим
- Г. Азитромицин

Какова тактика врача после пункции и эвакуации гематомы перегородки носа?

- А. Назначение гемостатиков
- Б. Широкое вскрытие гематомы
- В. Назначение антибиотиков
- Г. Тампонада носа

К верхней трахеостомии относят разрез

- А. Колец трахеи на уровне 2-3 полуколец
- Б. Колец трахеи на уровне 3-4 полуколец
- В. В области конической связки
- Г. Колец трахеи на уровне 4-5 полуколец

Передние и задние клетки решетчатой кости делит

- A. Lamina basilaris concha nasalis media
- Б. Concha nasalis media
- В. Processus uncinatus
- Г. Ethmoidas cell

Основным этиологическим фактором хронического тонзиллита у детей является

- A. Энтерококк
- Б. Стафилококк
- В. Зеленающий стрептококк
- Г. Бетта-гемолитический стрептококк группы а

Сенсорным органом реагирующим на движения является

- A. Костная улитка
- Б. Овальное окно
- В. Ампулярный гребешок
- Г. Нерв преддверия

Вестибулярным нейронитом называют заболевание, при котором вестибулярные расстройства возникают после инфекционного процесса, проявляются неустойчивостью при ходьбе и головокружением

- A. При резких поворотах головы без нарушения слуховой функции
- Б. При наклоне головы
- В. При изменении положения тела
- Г. С нарушением слуховой функции

При отогенных абсцессах мозга и мозжечка, как правило, отмечают пульс

- A. Частый – тахикардию
- Б. Не измененный – нормальный
- В. Редкий – брадикардию
- Г. С выраженной экстрасистолией

К методу лечения фурункула носа в стадии абсцедирования относят

- A. Аутогемотерапию
- Б. Физиотерапевтический
- В. Консервативный
- Г. Хирургический

Для диагностики слуха у маленьких детей до года применяют

- А. Отоакустическую эмиссию и слуховые вызванные потенциалы
- Б. Электроэнцефалографию
- В. Тональную пороговую аудиометрию
- Г. Звукореактотест

Процедура исправления формы наружного носа при его переломе называется

- А. Риностомией
- Б. Ринопластикой
- В. Редрессацией
- Г. Репозицией

Препаратом для лечения фолликулярной ангины у пациента 20 лет с рецидивирующим заболеванием является

- А. Амикацин
- Б. Амоксиклав
- В. Тетрациклин
- Г. Ципрофлоксацин

Симптомом экссудативного отита является

- А. Снижение слуха
- Б. Пульсирующий шум в ухе
- В. Боль в ухе
- Г. Гноетечение из уха

При нарушении вентиляционной функции слуховой трубы регистрируется тимпанограмма типа

- А. А
- Б. С
- В. В
- Г. Е

Хронические ларингиты делят на катаральный, гиперпластический, атрофический и

- А. Отечно-полипозный
- Б. Некротический
- В. Флегманозный
- Г. Специфический

Наиболее тяжелую клиническую картину вызывает поражение раковой опухолью _____ стенки наружного слухового прохода

- А. Задней
- Б. Нижней
- В. Передней
- Г. Верхней

Эффективным методом лечения тимпанальной формы отосклероза является

- А. Стапедопластика
- Б. Тимпаноластика
- В. Использование имплантируемых систем костного проведения
- Г. Кохлеарная имплантация

Фурункул полости носа располагается в преддверии носа и на

- А. Перегородке
- Б. Носовых раковинах
- В. Носовых ходах
- Г. Крыльях

Вестибулометрия при односторонней тугоухости

- А. Проводится в исключительных случаях
- Б. Неинформативна
- В. Проводится по желанию пациента
- Г. Обязательна

Средний носовой ход ограничен

- А. Верхней носовой раковиной
- Б. Нижней носовой раковиной
- В. Пространством между носовой перегородкой и носовыми раковинами
- Г. Носовой перегородкой

Особенность хирургического лечения кровоточащего полипа носа заключается в

- А. Адекватной коагуляции и гемостаза
- Б. Необходимости проведения противорецидивного консервативного лечения
- В. Выполнении только под общим обезболиванием
- Г. Удалении с подлежащей слизистой оболочкой

Имплантации коллагена, тефлоновой пасты или жира в область голосовой складки при параличе гортани проводят для

- А. Смещения голосовой складки латерально
- Б. Смещения голосовой складки к средней линии
- В. Расширения просвета гортани
- Г. Улучшения подвижности голосовой складки

Методом радикального хирургического лечения больных хроническим тонзиллитом является

- А. Двусторонняя тонзиллэктомия
- Б. Удаление папилломы миндалины
- В. Аденотомия
- Г. Вскрытие кисты миндалины

У пациентов молодого возраста кондуктивная потеря слуха и отсутствие патологических изменений при отоскопии, снижение акустического рефлекса свидетельствуют в пользу диагноза

- А. «Сенсоневральная тугоухость»
- Б. «Адгезивный средний отит»
- В. «Хронический средний гнойный отит с холестеатомой»
- Г. «Отосклероз»

При отогенном внутричерепном осложнении проводят срочное хирургическое лечение по принципу

- А. Тимпанопластики
- Б. Антродренажа
- В. Мастоидотомии
- Г. Расширенной радикальной операции

Причина частых носовых кровотечений, характерная для мужчин в молодом возрасте

- А. Юношеская ангиофиброма носоглотки
- Б. Искривление перегородки носа
- В. Полипозный риносинусит
- Г. Аллергический ринит

Разрушение кортикального слоя при мастоидите приводит к

- А. Перихондриту
- Б. Тромбозу сигмовидного синуса
- В. Субпериостальному абсцессу
- Г. Эпидуральному абсцессу

Экзостозы наружного слухового прохода представляют собой

- А. Костные выступы в наружном слуховом проходе (аномалия)
- Б. Доброкачественную опухоль из костной ткани
- В. Опухоль из фиброзной ткани
- Г. Доброкачественную опухоль из хрящевой ткани

При остром катаральном фарингите проводится

- А. Системная антибиотикотерапия
- Б. Цитостатическая терапия
- В. Новокаиновая блокада задней стенки глотки
- Г. Местное этиопатогенетическое лечение

Показанием к тонзиллоэктомии считают

- А. Гипертрофию миндалин
- Б. Декомпенсированную форму хронического тонзиллита
- В. Аденоидные вегетации
- Г. Хронический фарингомикоз

Наиболее типичная локализация доброкачественных опухолей гортани находится на

- А. Гортаноглотке
- Б. Истинных голосовых складках
- В. Ложных голосовых складках
- Г. Подскладковом пространстве

Толщина ситовидной пластинки составляет (в мм)

- А. 6-8
- Б. 5-6
- В. 10
- Г. 2-3

Обострение круглогодичного аллергического ринита провоцируется

- А. Аллергенами насекомых
- Б. Пыльцой злаковых
- В. Латексом
- Г. Домашней пылью

При двустороннем параличе гортани со стенозом выполняют

- А. Тиропластику I типа
- Б. Инъекционную ларингопластику
- В. Хордэктомия
- Г. Медиализацию голосовых складок

Инспираторная одышка в покое при острых стенозах гортани появляется в стадии

- А. Декомпенсации
- Б. Субкомпенсации
- В. Асфиксии
- Г. Компенсации

Наиболее частым осложнением острого аденоидита является

- А. Острый средний отит
- Б. Эпиглотит
- В. Ангина
- Г. Острый фронтит

Неотложной помощью при двустороннем параличе гортани является

- А. Тиреопластика
- Б. Трахеостомия
- В. Латерофиксация
- Г. Ларингофиссура

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Гортань у детей находится на уровне шейных позвонков

- А. II-III
- Б. IV-VI
- В. III-IV
- Г. IV-VII

С латеральной стенкой клиновидной пазухи граничит синус

- А. продольный
- Б. поперечный
- В. сигмовидный
- Г. пещеристый

Для синус-тромбоза характерна температура

- А. субфебрильная
- Б. нормальная
- В. гектическая
- Г. фебрильная

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте иннервацию глотки:

1. Гортань у взрослого человека.

- А. III – IV;
- Б. IV – VI.
- А. 1-А
- Б. 1-Б

При неэффективности тампонады носа для остановки носового кровотечения производят

- А. перевязку верхнечелюстной артерии
- Б. перевязку наружной сонной артерии
- В. перевязку внутренней сонной артерии
- Г. перевязку решетчатой артерии

Положение больного, в котором он должен находиться при травме гортани, осложненной кровотечением

- А. лежа на стороне повреждения или на животе
- Б. лежа на спине
- В. лежа на противоположной повреждению стороне
- Г. сидя

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения. Заболевание:

1. Отосклероз. Метод лечения:

- А. Радикальная операция на ухе;
- Б. Стапедопластика;
- В. Операция на эндолимфатическом мешке.
- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Барабанная полость посредством слуховой трубы сообщается с

- А. носоглоткой
- Б. пещерой
- В. улиткой
- Г. полукружными каналами

У детей гортань находится на уровне шейных позвонков

- А. V-VI
- Б. III-IV
- В. IV-VI
- Г. II-III

Для промывания серных пробок рекомендуется использовать воду температурой

- А. 25 °C
- Б. 30 °C
- В. 37 °C
- Г. 49 °C

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Соотнесите анатомические образования, составляющие скелет наружного носа и носовой перегородки:

1. Скелет перегородки носа.

- А. Лобная кость;
- Б. Носовая кость;
- В. Передняя носовая ость;
- Г. Сошник;
- Д. Гребень клиновидной кости.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Положение больного, в котором он должен находиться при травме гортани, осложненной кровотечением

- А. лежа на стороне повреждения или на животе
- Б. сидя
- В. лежа на спине
- Г. лежа на противоположной повреждению стороне

Брадикардия наблюдается при

- А. менингите
- Б. оточенном сепсисе
- В. абсцессе мозжечка
- Г. тромбозе сигмовидного синуса

В опыте ринне используется камертон частоты

- А. 128 гц
- Б. 512 гц
- В. 1024 гц
- Г. 2048 гц

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте стенки полости носа и образования, с которыми они граничат:

1. Нижняя.

- А. Сошник;
- Б. Четырехугольный хрящ;
- В. Горизонтальная пластинка небной кости;
- Г. Решетчатая кость;
- Д. Продырявленная пластинка решетчатой кости.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте заболевание и адекватный метод хирургического лечения:

1. Искривление перегородки носа.

- А. Подслизистая конхотомия;
- Б. Подслизистая резекция носовой перегородки;
- В. Подслизистая вазотомия.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Соотнесите структуры, обеспечивающие соответствующие функции звукового анализатора:

1. Звукопроведение.

А. Ушная раковина;

Б. Улитка;

В. Наружный слуховой проход;

Г. Кортиев орган;

Д. Слуховые косточки.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Нормальная барабанная перепонка имеет цвет

А. розовый

Б. белый

В. перламутровый

Санториниевы щели располагаются в наружном слуховом проходе на

А. верхней стенке

Б. нижней стенке

В. передней стенке

Г. задней стенке

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между исследуемым органом и методом исследования.

Орган:

1. Нос и онп. Метод исследования:

А. Диафаноскопия;

Б. R- графия;

В. Задняя риноскопия;

Г. Передняя риноскопия.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Для отогематомы характерно скопление крови

- А. в барабанной полости
- Б. в лабиринте
- В. в наружном слуховом проходе
- Г. между хрящом и надхрящницей ушной раковины

Диагноз агранулоцитарной ангины устанавливается после исследования

- А. мочи
- Б. крови
- В. гистологического
- Г. бактериологического

Слизистая оболочка голосовых складок представлена

- А. цилиндрическим мерцательным эпителием
- Б. многослойным плоским эпителием
- В. многослойным плоским эпителием

Степени отклонения туловища при пробе воячека

- А. одна
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

Для поперечного перелома пирамиды височной кости характерно

- А. ликворея
- Б. амнестическая афазия
- В. кровотечение из уха
- Г. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва

Какую связку необходимо рассечь при асфиксии для вскрытия просвета гортани

- А. щитоподъязычную
- Б. щитонадгортанную
- В. перстнещитовидную
- Г. перстнетрахеальную

Наиболее характерная причина гематомы перегородки носа

- А. носовое кровотечение
- Б. инородное тело носа
- В. травма носа
- Г. острый ринит

Первый нейрон вестибулярного анализатора располагается в

- А. продолговатом мозге
- Б. улитке
- В. внутреннем слуховом проходе
- Г. полукружных каналах

При отосклерозе первичный отосклеротический очаг чаще всего локализуется в области

- А. круглого окна
- Б. овального окна
- В. области мыса
- Г. входа в пещеру

Адекватным лечением смешанной формы отосклероза является

- А. мирингопластика
- Б. радикальная операция на ухе
- В. антромастоидотомия
- Г. стапедопластика

Наиболее частая причина возникновения сенсоневральной тугоухости

- А. травматический фактор
- Б. интоксикация
- В. сосудисто-реологический фактор
- Г. инфекционные заболевания

Отосклероз чаще встречается

- А. у мужчин
- Б. у женщин
- В. у мальчиков
- Г. у девочек

При неблагоприятном течении фурункула носа может развиваться тромбоз

- А. сигмовидного синуса
- Б. пещеристого синуса
- В. поперечного синуса
- Г. продольного синуса

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте вегетативные реакции при проведении отолитовой пробы по воячку:

1. Первая степень.

- А. Изменение сердечной и дыхательной деятельности, рвота, обморок;
- Б. Холодный пот, тошнота;
- В. Побледнение лица, изменение пульса.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Основная роль в развитии менингеальных симптомов при отогенных внутричерепных осложнениях принадлежит

- А. ущемлению ствола мозга и мозжечка в большом затылочном отверстии
- Б. обширные деструктивные изменения костных стенок барабанной полости и сосцевидного отростка
- В. разрушение вещества мозга гнойным процессом
- Г. отек и раздражение мозговых оболочек

Рентгенография височных костей по стенверсу применяется для диагностики при подозрении на

- А. болезнь меньера
- Б. отосклероз
- В. невриному VIII черепного нерва
- Г. паралич лицевого нерв

Парацентез выполняют в квадранте барабанной перепонки

- А. передне-верхнем
- Б. задне-верхнем
- В. передне-нижнем
- Г. задне-нижнем

Барабанная струна является ветвью

- А. слухового нерва
- Б. вестибулярного нерва
- В. лицевого нерва
- Г. тройничного нерва

При сенсоневральной тугоухости опыт швабаха будет

- А. укорочен
- Б. удлинен
- В. положительный
- Г. отрицательный

При аудиометрии у больных с острым средним отитом выявляется

- А. перцептивная тугоухость
- Б. кондуктивная тугоухость
- В. смешанная тугоухость

При односторонней сенсоневральной тугоухости в опыте вебера латерализация будет в

- А. одинаково в оба уха
- Б. больное ухо
- В. здоровое ухо
- Г. в центре головы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте онп и носовые ходы, в которые открываются их соустья:

1. Средний носовой ход.

- А. Клиновидная пазуха;
- Б. Верхнечелюстная пазуха;
- В. Лобная пазуха;
- Г. Передние клетки решетчатого лабиринта;
- Д. Средние клетки решетчатого лабиринта.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте вид лечения, адекватный для стадии стеноза гортани:

1. Стадия компенсации.

А. Консервативная терапия;

Б. Трахеотомия;

В. Коникотомия.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Соотнесите значения силы звука и вида речи:

1. Шепотная речь.

А. 30 дБ;

Б. До 60 дБ;

В. 80 дБ.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

При абсцессе мозжечка наблюдается

А. повышение тонуса мышц на стороне повреждения

Б. повышение тонуса мышц на противоположной стороне

В. снижение тонуса мышц на противоположной стороне

Г. снижение тонуса мышц на стороне поражения

Воздушные кисты гортани исходят из

А. гортанных желудочков

Б. валлекул

В. грушевидных синусов

Г. вестибулярных складок

В глотке располагается миндалины

А. три

Б. четыре

В. пять

Г. шесть

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте характеристики сенсоневральной тугоухости:

1. I степень.

- А. Потеря слуха 26 – 40 дБ;
- Б. Потеря слуха 41 – 55 дБ;
- В. Потеря слуха 56 – 70 дБ;
- Г. Потеря слуха 71 – 90 дБ;
- Д. Потеря слуха более 91 дБ.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Соотнесите этажи глотки шейным позвонкам.

- А. I – III;
- Б. III;
- В. IV – VI.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Патогенетической основой болезни меньера считается

- А. наличие холестеатомы
- Б. травма уха
- В. гидропс лабиринта
- Г. инфекция

При ожоге гортани в первую очередь поражаются

- А. голосовые складки
- Б. вестибулярные складки
- В. гортанная поверхность надгортанника
- Г. язычная поверхность надгортанника

Латерализация звука в опыте выбера у больного с односторонней сенсоневральной тугоухостью будет

- А. в больное ухо
- Б. в здоровое ухо
- В. в центре головы
- Г. в оба уха одинаково

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте парные и непарные хрящи гортани:

1. Непарные хрящи.

- А. Щитовидный;
- Б. Черпаловидный;
- В. Надгортанник;
- Г. Рожковидный;
- Д. Перстневидный.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Наиболее вероятный путь при распространении инфекции из среднего уха при субдуральном абсцессе

- А. гематогенный
- Б. контактный
- В. лимфогенный
- Г. преформированный

Границей между носоглоткой и ротоглоткой является

- А. горизонтальная плоскость, проведенная через твердое небо
- Б. горизонтальная плоскость, проведенная через поверхность язык
- В. верхний полюс небных миндалин

Острый вторичный тонзиллит наблюдается пр

- А. гемобластозе
- Б. лейкозе
- В. гемофилии
- Г. капилляротоксикозе

При сильном кровотечении из гортани для его остановки необходимо перевязать

- А. общую сонную артерию
- Б. внутреннюю сонную артерию
- В. наружную сонную артерию

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВООБЩЕ. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения. Заболевание:

1. Искривление носовой перегородки. Метод лечения:

- А. Вазотомия н/носовых раковин;
- Б. Подслизистая резекция перегородки носа;
- В. Подслизистая конхотомия.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

На передней стенке барабанной полости располагается

- А. мыс
- Б. отверстие слуховой трубы
- В. окно преддверия
- Г. окно улитки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВООБЩЕ. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Катаральный фарингит.

- А. Разлитая гиперемия слизистой оболочки;
- Б. Бледная и сухая слизистая оболочка;
- В. Утолщение боковых валиков глотки и увеличение лимфоидных гранул.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте частотные характеристики звуков:

1. Звуки низкой частоты.

- А. 16 – 800 гц;
- Б. 800 – 4000 гц;
- В. 4000 – 10000 гц;
- Г. 10000 – 20000 гц.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

К менингеальным симптомам относится

- А. ригидность затылочных мышц
- Б. диффузная интенсивная головная боль
- В. затруднение называние предметов при сохраненной возможности повторения речи
- Г. выпадение квадрантов полей зрения

Для петрозита характерно

- А. двустороннее снижение слуха
- Б. тригеминит
- В. парез или паралич лицевого нерва
- Г. боль при жевании

В клинике абсцесса височной доли мозга выделяют стадий

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

Для юношеской ангиофибромы основания черепа характерн

- А. затруднение носового дыхания
- Б. налет на небных миндалинах
- В. стекание гноя по задней стенке глотки
- Г. деформация лица

На передней стенке барабанной полости располагается

- А. окно преддверия
- Б. окно улитки
- В. канал лицевого нерва
- Г. отверстие слуховой трубы

Сигмовидный синус находится

- А. в средней черепной ямке
- Б. в задней черепной ямке
- В. в основании черепа
- Г. в основании черепа

Адекватный метод лечения при токсико-аллергической форме II степени хронического тонзилита

- А. физиотерапия
- Б. тонзиллэктомия
- В. тонзиллотомия
- Г. промывание лакун небных миндалин

При аудиометрии у больных с хроническим средним отитом выявляется

- А. кондуктивная тугоухость
- Б. смешанная тугоухость
- В. перцептивная тугоухость

При определении степени нистагма взгляд больного фиксируют

- А. в сторону быстрого компонента
- Б. перед больным
- В. в сторону медленного компонента
- Г. вниз

Основная этиологическая роль в возникновении бактериальной ангины принадлежит

- А. пневмококку
- Б. золотистому стафилококку
- В. бета-гемолитическому стрептококку группы а
- Г. зеленающему стрептококку

Первый нейрон проводящих путей звукового анализатора располагается в

- А. слуховой трубе
- Б. внутреннем слуховом проходе
- В. улитке
- Г. продолговатом мозге

У взрослых гортань находится на уровне шейных позвонков

- А. III-IV
- Б. IV-VII
- В. V-VII
- Г. IV-VI

Через зев полость рта сообщается с отделом глотки

- А. верхним
- Б. средним
- В. нижним

Инородные тела чаще локализуются в

- А. гортани
- Б. трахее
- В. бронхах

Для продольного перелома пирамиды височной кости характерно

- А. амнестическая афазия
- Б. гемианопсия
- В. кровотечение из уха
- Г. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва

Из отогенных внутричерепных осложнений чаще всего встречается

- А. абсцесс мозга и мозжечка
- Б. менингит
- В. менингоэнцефалит
- Г. синустромбоз и отогенный сепсис

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте иннервацию носа:

1. Кожа наружного носа.

А. Тройничный нерв;

Б. Лицевой нерв;

В. Языкоглоточный нерв.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

При остром среднем катаральном отите наблюдается

А. втянутость барабанной перепонки

Б. гиперемия барабанной перепонки

В. оторея

Г. перфорация барабанной перепонки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте костные и хрящевые составляющие носовой перегородки:

1. Костная часть перегородки носа.

А. Сошник;

Б. Слезная кость;

В. Перпендикулярная пластинка решетчатой кости;

Г. Четырехугольный хрящ.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Изменение психики в виде неадекватных поступков, необоснованной эйфории характерно для

А. тромбоза кавернозного синуса

Б. абсцесса височной доли головного мозга

В. абсцесса лобной доли головного мозга

Г. абсцесса мозжечка

Периферический рецептор звукового анализатора

- А. барабанная перепонка
- Б. ушная раковина
- В. слуховые косточки
- Г. кортиева орган

В клинике острого среднего отита выделяют

- А. 1 стадию
- Б. 2 стадии
- В. 3 стадии
- Г. 4 стадии

Какой признак, характерный для синдрома молчащего синуса является

- А. растяжение стенок клетки решетчатого лабиринта
- Б. наличие дополнительного соустья
- В. латерализация крючковидного отростка
- Г. наличие тени полуовальной формы

Одностороннюю сенсоневральную тугоухость необходимо дифференцировать с

- А. невритом преддверно-улиткового нерва
- Б. отосклерозом
- В. адгезивным средним отитом
- Г. тубоотитом

Патологоанатомическая сущность хондроперихондрита заключается в

- А. в гнойном воспалении подслизистого слоя гортани
- Б. в гнойном воспалении хрящей гортани
- В. в воспалении надхрящницы с трофическими изменениями хряща
- Г. в гнойном воспалении слизистой оболочки гортани

Кровоснабжение небных миндалин осуществляется из артериальной системы

- А. наружной сонной артерии
- Б. внутренней сонной артерии
- В. наружной и внутренней сонной артерии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте отклонение туловища при проведении опыта воячека со степенью реакции:

1. Первая степень.

А. 0 – 5 °;

Б. 5 – 30 °;

В. Более 30 °.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Предрасполагающим фактором к возникновению фурункула носа является

А. бронхиальная астма

Б. гипертоническая болезнь

В. сахарный диабет

Г. псориаз

Симптомы, характерные для подскладочного ларингита

А. постепенное начало, смешанная одышка, осиплость, сухой «старческий» кашель, постепенное нарастание симптоматики стеноза гортани

Б. внезапное начало, инспираторная одышка, чистый голос, «лающий» кашель, быстрое развитие симптомов стеноза гортани

В. постепенное начало, смешанная одышка, чистый голос, «лающий» кашель, постепенное нарастание симптоматики стеноза гортани

признаком гнойного воспаления клиновидной пазухи является наличие гноя в

А. верхнем носовом ходе

Б. среднем носовом ходе

В. нижнем носовом ходе

Г. общем носовом ходе

На задней стенке барабанной полости находится

А. мыс

Б. отверстие слуховой трубы

В. овальное окно

Г. отверстие для барабанной струны

Постоянным признаком хронического гнойного среднего отита является

- А. нарушение равновесия
- Б. оторея
- В. головокружение
- Г. субъективный шум в ухе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Соотнесите анатомические образования, отвечающие за восприятие ускорения:

1. Преддверие.

- А. Угловое ускорение;
- Б. Прямолинейное ускорение;
- В. Ускорение силы тяжести.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте стадию воспаления среднего уха и отоскопическую картину:

1. Острый тубоотит.

- А. Мt гиперемирована, инфильтрирована, отечна, выбухает, пульсирует;
- Б. Мt перфорирована, гиперемирована;
- В. Втяжение mt – укорочение рукоятки молоточка, укорочение/исчезновение светового конуса;
- Г. Мt местами петрифицирована, утолщена;
- Д. Мt гиперемирована, отечна.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Характерными для дифтерии гортани являются симптомы

- А. осиплость, сухой «старческий» кашель, постепенное нарастание симптомов стеноза гортани
- Б. внезапное начало, инспираторная одышка, чистый голос, «лающий» кашель, быстрое развитие симптомов стеноза гортани

Жалобы, характерные для больных с сенсоневральной тугоухостью

- А. головокружение
- Б. гноетечение из уха
- В. снижение слуха
- Г. улучшение слуха в шумной обстановке

В средний носовой ход открываются

- А. верхнечелюстная пазуха, лобная пазуха, клиновидная пазуха
- Б. носо-слезный канал, верхнечелюстная пазуха, передние клетки решетчатого лабиринта
- В. лобная пазуха, передние и средние клетки решетчатого лабиринта, верхнечелюстная пазуха
- Г. клиновидная пазуха, задние клетки решетчатого лабиринта

При остром стенозе гортани у детей чаще применяется

- А. верхняя трахеотомия
- Б. средняя трахеотомия
- В. нижняя трахеотомия
- Г. коникотомия

После репозиции костей носа для фиксации костных отломков целесообразно проводить переднюю тампонаду носа с

- А. оливковым маслом
- Б. парафином
- В. перекисью водорода
- Г. синтомициновой эмульсией

При заболевании мешочков преддверия появляется

- А. отолитовый нистагм
- Б. спонтанный нистагм
- В. оптокинетический нистагм
- Г. позиционный нистагм

Для гемисинуита характерно

- А. воспаление всех околоносовых пазух
- Б. лево- или правостороннее воспаление всех пазух на одноименной стороне
- В. поражение нескольких околоносовых пазух
- Г. поражение одной околоносовой пазухи

Метод исследования слуха с помощью камертонов называется

- А. аудиометрия
- Б. акуметрия
- В. импедансометрия
- Г. тимпанометрия

Скорость распространения звука по воздуху составляет

- А. 100 м/с
- Б. 332 м/с
- В. 1450 м/с
- Г. 300000 м/с

Адиадохокинез выявляется при

- А. менингите
- Б. абсцессе мозжечка
- В. абсцессе височной доли головного мозга
- Г. абсцессе лобной доли головного мозга

Глотка проецируется на шейные позвонки

- А. 1 -- 3
- Б. 1 -- 4
- В. 1 -- 5
- Г. 1 -- 6

В носоглотке устье слуховой трубы располагается на

- А. верхней стенке
- Б. задней стенке
- В. боковой стенке
- Г. передней стенке

К симптомам хронического тонзиллита относится

- А. симптом зака
- Б. симптом шеффера
- В. симптом оппенгейма
- Г. симптом гордона

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и возбудителем. Заболевание:

1. Лакунарная ангина. Возбудитель:

А. Бацилла леффлера;

Б. Веретенообразная палочка + спирохета полости рта;

В. Стрептококк.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте функцию носа и метод ее оценки:

1. Дыхательная.

А. Ольфактометрия;

Б. Риноскопия;

В. Ринопневмометрия;

Г. Сахариновый тест.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Соотнесите анатомические образования и локализацию:

1. Кавернозный синус.

А. Передняя черепная ямка;

Б. Средняя черепная ямка;

В. Задняя черепная ямка.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте кистовидное растяжение околоносовых пазух и их содержимое:

1. Пиоцеле.

А. Гной;

Б. Слизь;

В. Кровь;

Г. Воздух.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте иннервацию глотки:

1. Ротоглотка.

А. Тройничный нерв;

Б. Языкоглоточный;

В. Блуждающий.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Амнестическая афазия наблюдается при

А. абсцессе лобной доли головного мозга

Б. абсцессе височной доли головного мозга

В. абсцессе мозжечка

Г. менингите

Латерализация звука в опыте выбера при одностороннем остром среднем отите будет

А. в больное ухо

Б. в здоровое ухо

В. в центре головы

Г. в оба уха одинаково

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и тактикой лечения. Заболевание:

1. Острый катаральный средний отит. Тактика лечения:

А. Обезболивающие и противовоспалительные капли;

Б. Продувание слуховых труб;

В. Турунды с антибактериальной мазью в ухо.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Постоянный симптом хронического среднего отита

А. снижение слуха

Б. повышение температуры тела

В. резкая боль в ухе

Г. головокружение

Резорбция эндолимфы происходит в

А. в сферическом мешочке

Б. в эллиптическом мешочке

В. в эндолимфатическом мешочке

Г. в перепончатой улитке

При инородных телах пищевода возможно развитие

А. медиастинита

Б. перикардита

В. гастрита

Г. парафарингита

Чувствительная иннервация глотки осуществляется

А. второй веточкой тройничного нерва, блуждающим и подъязычным нервами

Б. блуждающим нервом, первой и второй ветвями тройничного нерва

В. первой и второй ветвями тройничного нерва и языкоглоточным нервом

Г. языкоглоточным, блуждающим нервами и второй веточкой тройничного нерва

При проведении отолитовой пробы больного наклоняют на

А. 45 градусов на правый бок

Б. 45 градусов на левый бок

В. 30 градусов вперед

Г. 90 градусов вперед

Гемианопсия наблюдается при

- А. абсцессе лобной доли головного мозга
- Б. абсцессе височной доли головного мозга
- В. абсцессе мозжечка
- Г. тромбозе кавернозного синуса

Амнестическая афазия наблюдается при

- А. менингите
- Б. абсцессе височной доли головного мозга
- В. абсцессе мозжечка
- Г. арахноидите

К звукопроводящему отделу звукового анализатора относится

- А. наружное ухо, барабанная перепонка, слуховые косточки
- Б. внутреннее ухо
- В. преддверно-улитковый нерв
- Г. первый нейрон звукового анализатора

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте формы воспаления онп:

1. Смешанная форма.

- А. Кистозная;
- Б. Гнойно – полипозная;
- В. Катаральная;
- Г. Пристеночно - гиперпластическая;
- Д. Гребень клиновидной кости.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Границей между ротоглоткой и гортаноглоткой является

- А. нижний край мягкого неба
- Б. корень языка и надгортанник
- В. нижние полюса небных миндалин
- Г. дно полости рта

Радикальная операция на ухе выполняется при

- А. отосклерозе
- Б. тубоотит
- В. экссудативном отите
- Г. хроническом гнойном среднем отите

Сенсорная афазия наблюдается у больных с

- А. абсцессом лобной доли головного мозга
- Б. абсцессом мозжечка
- В. лабиринтитом
- Г. абсцессом височной доли головного мозга

Натянутая часть барабанной перепонки состоит из

- А. 2 слоев
- Б. 3 слоев
- В. 4 слоев

При стенозе гортани, вызванном дифтерией гортани, следует провести: вызванном дифтерией гортани, следует провести:

- А. трахеостомию
- Б. удаление корок из гортани
- В. коникотомию
- Г. интубацию гортани

Положение больного в позе «легавой собаки» характерно для

- А. менингита
- Б. абсцесса мозжечка
- В. абсцесса лобной доли головного мозга
- Г. абсцесса височной доли головного мозга

Костный лабиринт заполнен

- А. эндолимфой
- Б. перилимфой
- В. кортилимфой
- Г. лимфой

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте возбудителей и заболевания, основным этиологическим фактором которого они являются:

1. *Bacteriae leptotrix*.

А. Ангина вульгарная;

Б. Ангина симановского – венсана – плаута;

В. Гиперкератоз глотки;

Г. Эпиглоттит;

Д. Озена.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Первый нейрон вестибулярного анализатора располагается

А. во внутреннем слуховом проходе

Б. в улитке

В. в преддверии

Г. в полукружных каналах

Скорость распространения звуковых колебаний по воде составляет

А. 332 м/с

Б. 850 м/с

В. 1450 м/с

Г. 14500 м/с

Рвота при абсцессах мозга возникает

А. во время приема пищи

Б. после приема пищи

В. при физической нагрузке

Г. на высоте головной боли

При отоскопии у больных с сенсоневральной тугоухостью выявляется

А. перфорация барабанной перепонки в ненатянутой части

Б. перфорация барабанной перепонки в натянутой части

В. втянутая барабанная перепонка

Г. не измененная барабанная перепонка

Вестибулярный рефлекс на мышцы глаз выражается в появлении

- А. слезотечения
- Б. нистагма
- В. экзофтальма
- Г. болевого синдрома

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте стенки барабанной полости и образования, с которыми они граничат:

1. Верхняя стенка.

- А. Внутренняя сонная артерия;**
- Б. Внутреннее ухо;**
- В. Сосцевидный отросток;**
- Г. Средняя черепная ямка.**

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

Направление нистагма определяется

- А. направлением медленного компонента
- Б. направлением быстрого компонента
- В. при аудиометрии
- Г. при акуметрии

При опыте швабаха определяют

- А. латерализацию звука
- Б. длительность восприятия звука по воздуху
- В. длительность восприятия звука через кость
- Г. разницу в длительности восприятия звука по воздуху и по кости

Аденоидами называется гипертрофия

- А. небных миндалин
- Б. боковых валиков глотки
- В. носоглоточной миндалины
- Г. язычной миндалины

Внутреннее ухо располагается в

- А. барабанной полости
- Б. пирамиде височной кости
- В. чешуе височной кости
- Г. сосцевидном отростке

Опыт ринне у больного с отосклерозом будет

- А. положительный
- Б. отрицательный
- В. удлинен
- Г. укорочен

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте группы врожденных дефектов носа:

1. Гипергенезия.

- А. Избыточное развития органа;
- Б. Недоразвитие органа;
- В. Нарушение нормального положения органа;
- Г. Неправильное развитие органа;
- Д. Сохранение эмбриональных структур.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Сопоставьте термин и локализацию воспаления.

- А. Воспаление слизистой оболочки носа;
- Б. Воспаление слизистой оболочки глотки;
- В. Воспаление слизистой оболочки гортани.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

В состав среднего уха входит

- А. барабанная полость, внутренний слуховой проход, слуховая труба
- Б. барабанная полость, слуховая труба, наружный слуховой проход
- В. слуховая труба, сосцевидный отросток, барабанная полость
- Г. сосцевидный отросток, слуховая труба, слуховые косточки

Патогенетической основой болезни меньера считается

- А. травма уха
- Б. гидропс лабиринта
- В. беременность
- Г. инфекция

Больных с дифтерией гортани необходимо госпитализировать в

- А. хирургическое отделение
- Б. лор отделение
- В. инфекционное отделение или в инфекционную больницу
- Г. терапевтическое отделение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Дайте определение различным формам ринита:

1. Инфекционный ринит:

- А. Хроническое заболевание, в основе которого лежит воспалительная ig -е опосредованная реакция, вызванная попаданием аллергенов на слизистую оболочку полости носа;
- Б. Неаллергическое воспаление слизистой полости носа, связанное с нарушением метаболизма арахидоновой кислоты. Является предвестником развития тяжелой формы полипозного риносинусита, аспириновой бронхиальной астмы, непереносимости НПВС. характеризуется эозинофилией носового секрета при отсутствии повышенного уровня ig -е в сыворотке крови и отрицательным эндоназальным провокационным тестом;
- В. Воспаление слизистой оболочки полости носа, вызванное вирулентными микроорганизмами и проявляющееся затруднением носового дыхания, выделениями из носа и чиханьем;
- Г. Хронический неаллергический ринит, основными симптомами которого являются заложенность носа и затруднение носового дыхания, связанные с лабильностью и повышенным кровенаполнением сосудов носовых раковин.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

К анестезии слизистой оболочки гортани приводит поражение

- А. тройничного нерва
- Б. нижнего гортанного нерва
- В. верхнего гортанного нерва
- Г. языкоглоточного нерва

При проведении калорической пробы правого уха холодной водой нистагм будет направлен

- А. вверх
- Б. вправо
- В. влево
- Г. вниз

Предпосылкой развития ложного крупа является

- А. атопический дерматит
- Б. пневмония
- В. острый ринит
- Г. ангина

Для поперечного перелома пирамиды височной кости характерно

- А. ликворея
- Б. кровотечение из уха
- В. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва
- Г. гемианопсия

Лимфатическая сеть гортани более развита в

- А. верхнем этаже
- Б. среднем этаже
- В. нижнем этаже

Резорбция эндолимфы происходит

- А. в сферическом мешочке
- Б. в эндолимфатическом мешочке
- В. в эллиптическом мешочке
- Г. в ампулах полукружных каналов

Латерализация звука в опыте вебера при одностороннем остром гнойном отите будет

- А. в больное ухо
- Б. в здоровое ухо
- В. одинаково в оба уха
- Г. в центре головы

Санториниевы щели в наружном слуховом проходе располагаются на

- А. верхней стенке
- Б. задней стенке
- В. нижней стенке
- Г. передней стенке

Продолжительность нистагма определяют при взгляде больного в

- А. сторону быстрого компонента
- Б. сторону медленного компонента
- В. вверх
- Г. прямо перед собой

Иннервация внутреннего уха осуществляется черепными нервами

- А. V
- Б. VI
- В. VII
- Г. VIII

Вынужденное положение головы наблюдается при

- А. абсцессе мозжечка
- Б. тромбозе сигмовидного синуса
- В. абсцессе височной доли головного мозга
- Г. абсцессе лобной доли головного мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте симптомы, характерные для стадии стеноза гортани:

1. Стадия компенсации.

- А. Урежение и углубление дыхания, выпадение пауз между вдохом и выдохом;
- Б. Инспираторная одышка в покое, бледность кожных покровов, беспокойное состояние больного;
- В. Пульс становится частым, слабым, кожа бледно-серого цвета, состояние усугубляется экзофтальмом – выпячиванием глаз, потерей сознания, непроизвольным мочеиспусканием, дефекацией, возможна остановка сердца.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Носо-слезный канал открывается в носовой ход

- А. верхний
- Б. средний
- В. нижний
- Г. общий

Стапедопластика выполняется при

- А. экссудативном отите
- Б. отосклерозе
- В. остром гнойном среднем отите
- Г. хроническом гнойном среднем отите

При челюстно-лицевой травме подкожная эмфизема является признаком

- А. перелома костей носа
- Б. гематомы перегородки носа
- В. травмы околоносовых пазух
- Г. абсцесса перегородки носа

Внутреннее ухо располагается в

- А. сосцевидном отростке
- Б. пирамиде височной кости
- В. скуловом отростке
- Г. чешуе височной кости

Радикальная операция на ухе выполняется при

- А. остром среднем отите
- Б. хроническом среднем гнойном отите
- В. отосклерозе
- Г. экссудативном отите

При миогенных парезах чаще поражаются мышцы гортани

- А. кивательная
- Б. черпалонадгортанные
- В. поперечные
- Г. голосовые

Брадикардия характерна для

- А. сепсиса
- Б. менингита
- В. абсцесса мозга
- Г. синус-тромбоза

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте расположение физиологических отверстий глотки:

- 1. Хоана.**
- А. Носоглотка;**
 - Б. Ротоглотка;**
 - В. Гортаноглотка.**
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1- В

При остром среднем отите опухоль евстахиева будет

- А. удлинен
- Б. укорочен
- В. положительный
- Г. отрицательный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между образованием и его локализацией:

- 1. Глоточная миндалина:**
- А. Носоглотка;**
 - Б. Ротоглотка;**
 - В. Гортаноглотка.**
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1- В

При отосклерозе выполняется операция

- А. радикальная операция на ухе
- Б. миринопластика
- В. тимпанопластика
- Г. стапедопластика

Санториниевы щели располагаются в наружном слуховом проходе в

- А. в перепончато-хрящевом отделе
- Б. в костном отделе
- В. в перепончато-хрящевом и костном отделах

Двигательная иннервация глотки осуществляется

- А. возвратным и языкоглоточным нервом
- Б. первой веточкой тройничного нерва и возвратным нервом
- В. языкоглоточным и подъязычным нервом
- Г. подъязычным и возвратным нервом

Амнестическая афазия наблюдается при

- А. отогенном менингите
- Б. синус-тромбозе
- В. абсцессе мозжечка
- Г. абсцессе височной доли головного мозга

Первый нейрон звукового анализатора располагается

- А. во внутреннем слуховом проходе
- Б. в улитке
- В. в барабанной полости
- Г. в преддверии

Среднее ухо состоит из

- А. барабанной перепонки, слуховой трубы, клеток сосцевидного отростка
- Б. слуховой трубы, барабанной полости, клеток сосцевидного отростка
- В. клеток сосцевидного отростка, слуховых косточек, барабанной перепонки
- Г. слуховых косточек, барабанной перепонки, слуховой трубы

Тимпанопластика выполняется при

- А. отогенных внутричерепных осложнениях
- Б. нейросенсорной тугоухости
- В. хроническом гнойном среднем отите
- Г. отосклерозе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Цваардемакер.

А. Химическая теория;

Б. Физическая теория;

В. Физико-химическая теория.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Направление нистагма определяется

А. направлением медленного компонента нистагма

Б. направлением быстрого компонента нистагма

В. силой нистагма

Г. амплитудой нистагма

В клинике абсцесса височной доли головного мозга выделяют стадий

А. одну

Б. две

В. три

Г. четыре

Опыт ринне у больного с нейросенсорной тугоухостью будет

А. удлинен

Б. укорочен

В. отрицательный

Г. положительный

Для продольного перелома пирамиды височной кости характерно

А. гемианопсия

Б. кровотечение из уха

В. амнестическая афазия

Г. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва

При переходе воспалительного процесса на околоминдаликовую клетчатку может развиваться

А. парафарингеальный абсцесс

Б. паратонзиллярный абсцесс

В. сиалоаденит

Г. ретрофарингеальный абсцесс

Разрез барабанной перепонки при парацентезе выполняют в

- А. задненижнем квадранте
- Б. передненижнем квадранте
- В. задневерхнем квадранте
- Г. передневерхнем квадранте

Тело первого нейрона звукового анализатора располагается в

- А. улитке
- Б. ампулах
- В. мешочках преддверия
- Г. внутреннем слуховом проходе

Тело первого нейрона вестибулярного анализатора располагается в

- А. барабанную полости
- Б. преддверии
- В. улитке
- Г. внутреннем слуховом проходе

Заглочное пространство у детей содержит

- А. сосудисто-нервный пучок
- Б. лимфатические узлы
- В. слизистые железы

Иннервация гортани осуществляется

- А. блуждающим нервом
- Б. языкоглоточным нервом
- В. отводящим нервом
- Г. тройничным нервом

Кровоточивая зона полости носа располагается в

- А. среднем носовом ходе
- Б. передне-нижнем отделе перегородки носа
- В. преддверии носа
- Г. зоне роста пререпородки носа

Наиболее частая локализация головной боли при абсцессе мозжечка

- А. затылочная область с возможной иррадиацией по задней поверхности шеи
- Б. теменная область
- В. затылочная область
- Г. височная область

Латерализация звука в опыте вебера при односторонней сенсоневральной тугоухости будет

- А. в больное ухо
- Б. в здоровое ухо
- В. в центре головы
- Г. в оба уха одинаково

Вынужденное положение головы наблюдается

- А. менингите
- Б. абсцессе мозжечка
- В. тромбозе сигмовидного минуса
- Г. абсцессе лобной доли головного мозга

Пункцию верхнечелюстной пазухи проводят через носовой ход

- А. общий
- Б. нижний
- В. средний
- Г. верхний

Сферический и эллиптический мешочки находятся в

- А. полукружных каналах
- Б. преддверии
- В. барабанной полости
- Г. улитке

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте фарингоскопические признаки хронического тонзиллита с названием их по автору:

1. Признак зака.

А. Инфильтрация и гиперплазия краев передних дужек;

Б. Гиперемия краев небных дужек;

В. Отечность краев верхних отделов небных дужек.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Для сенсоневральной тугоухости характерны следующие аудиометрические данные

А. нисходящий тип костной и воздушной кривых без костно-воздушного интервала

Б. нисходящий тип костной и воздушной кривых с интервалом между ними 5 – 10 дБ

В. горизонтальный тип костной и воздушной кривых с интервалом между ними в 35 – 40 дБ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между образованием и его локализацией. Образование:

1. Кровоточащий полип носа. Локализация:

А. Носоглотка;

Б. Носовая перегородка;

В. В/ч пазуха;

Г. Клетки решетчатого лабиринта.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Воздействие смв на область уха производится _____ излучателем

А. Прямоугольным

Б. Внутриушным

В. Большим цилиндрическим

Г. Крыловидным

Отрицательная проба федеричи является характерной для

- А. Нарушения звуковосприятия
- Б. Нарушения звукопроводения
- В. Смешанной тугоухости
- Г. Нормального слуха

При сенсоневральной тугоухости противопоказаны

- А. Шум и вибрация
- Б. Неблагоприятные метеорологические условия
- В. Физические нагрузки
- Г. Стрессовые нагрузки

К абсолютным противопоказаниям к проведению калорической пробы водой относят

- А. Возраст пациента
- Б. Наличие перфорации барабанной перепонки, наружный отит
- В. Гипертоническую болезнь
- Г. Подозрение на невриному 8-й пары черепно-мозговых нервов

У больных при эпителимпаните наряду с процессами воспаления слизистой оболочки возникает

- А. Некроз улитки
- Б. Атрофия слизистой оболочки
- В. Кариез кости
- Г. Паралич тройничного нерва

При асфиксии для вскрытия просвета гортани необходимо рассечь связку

- А. Перстне-трахеальную
- Б. Перстнещитовидную
- В. Щитоподъязычную
- Г. Щито-надгортанную

При болезни меньера регистрируется _____ нистагм

- А. Прессорный
- Б. Спонтанный
- В. Крупноразмашистый
- Г. Повторяющийся

Спиральный канал улитки имеет протяжённость до (см)

- А. 1
- Б. 3
- В. 7
- Г. 5

Предрасполагающим фактором возникновения фарингомикоза является длительное применение

- А. Ингаляционных антисептиков
- Б. Ингаляционных глюкокортикостероидов
- В. В-блокаторов
- Г. Деконгестантов

Основным критерием диагностики новообразования гортани является

- А. Стробоскопия
- Б. Прямая ларингоскопия
- В. Рентгенограмма органов шеи
- Г. Гистологическое исследование гортани

Лакунарную ангину, в первую очередь, необходимо дифференцировать с

- А. Острым фарингитом
- Б. Ангиной Симановского – Венсана
- В. Дифтерией
- Г. Грибковой ангиной

Пациенту с раком околоушной слюнной железы 3а стадии необходимо провести

- А. Только хирургическое лечение
- Б. Сочетанную лучевую терапию
- В. Химиотерапию
- Г. Послеоперационную лучевую терапию

При стенозе гортани в стадии декомпенсации проводят

- А. Кортикостероидную терапию
- Б. Противовоспалительную терапию
- В. Трахеостомию
- Г. Антибиотикотерапию

Основным методом остановки носового кровотечения является

- А. Тампонада носа
- Б. Закапывание в нос пероксида водорода 3% и деконгестантов
- В. Перевязка наружной сонной артерии
- Г. Введение коагулянтов

Осложнением фурункула носа может быть тромбоз вен лица, кавернозного синуса и

- А. Поперечного
- Б. Улитки
- В. Сигмовидного
- Г. Орбиты

Какова тактика врача при закрытых переломах наружных стенок передней группы околоносовых пазух?

- А. Антибактериальная терапия, наблюдение
- Б. Экстраназальная ревизия синуса
- В. Ситуация не требует терапии
- Г. Эндоназальное вмешательство

Возбудителем ангины Людвига является

- А. Синегнойная палочка
- Б. Гемофильная палочка
- В. Анаэробная микрофлора
- Г. Бета-гемолитический стрептококк группы А

Гемианопсия наблюдается при абсцессе _____ доли головного мозга

- А. Лобной
- Б. Височной
- В. Теменной
- Г. Мозжечковой

Больные с эпиглоттитом жалуются на

- А. Осиплость
- Б. Кашель, сухость и першение в горле
- В. Дисфагию различной степени тяжести и боли в горле
- Г. Быструю утомляемость голоса

Симптомы шумного, резко затрудненного дыхания через нос, поперхивания во время кормления, иногда срыгивания, наличие храпа у новорожденного характеризуют

- А. Гипертрофию небных миндалин
- Б. Гипертрофию аденоидов
- В. Одностороннюю хоанальную атрезию
- Г. Искривление перегородки носа

В спинномозговой жидкости при отогенном и риногенном гнойном менингите наиболее часто обнаруживают

- А. Резко выраженный плеоцитоз с преобладанием нейтрофилов
- Б. Диплококк
- В. Повышение содержания сахара и хлоридов
- Г. Пониженное содержание белка

Вестибулярный нейронит характеризуется _____ на всём протяжении заболевания

- А. Угнетением вестибулярной функции на стороне поражения
- Б. Наличием односторонней пузырьковой сыпи в области ушной раковины
- В. Снижением слуха
- Г. Наличием клono-тонического нистагма раздражения

Методом лечения декомпенсированной формы хронического тонзиллита является

- А. Промывание лакун
- Б. Консервативная терапия
- В. Физиолечение
- Г. Тонзиллэктомия

Метод кобрака используют при

- А. Калорической пробе
- Б. Аудиометрии
- В. Регистрации слухового вызванного потенциала
- Г. Вращательной пробе

Показанием для слухопротезирования у взрослых является потеря слуха от ____ дб и выше

- А. 50
- Б. 40
- В. 20
- Г. 30

При 3 степени сужения просвета рубцового стеноза гортани просвет сужен до ____ диаметра

- А. $\frac{1}{3}$
- Б. $\frac{1}{4}$
- В. $\frac{1}{2}$
- Г. $\frac{2}{3}$

По данным всемирной организации здравоохранения существует ____ тугоухости

- А. 6 Степеней
- Б. 2 Степени
- В. 3 Степени
- Г. 4 Степени

К наиболее частой локализации отдаленных метастазов рака гортани относят

- А. Печень
- Б. Легкие
- В. Средостение
- Г. Головной мозг

Наличие нескольких перфораций барабанной перепонки характерно для

- А. Эпитимпанита
- Б. Мезотимпанита
- В. Туберкулезного поражения среднего уха
- Г. Острого гнойного среднего отита

Основным симптомом острого профессионального ларингита является

- А. Дисфония
- Б. Кашель с мокротой
- В. Повышение температуры тела
- Г. Боль в горле

Паратонзиллярный абсцесс чаще всего бывает

- А. Задним
- Б. Боковым
- В. Передне-нижним
- Г. Передне-верхним

Боль в области лба при фронтите следует дифференцировать с

- А. Артериальной гипертензией
- Б. Невралгией лицевого нерва
- В. Мигренью
- Г. Невралгией тройничного нерва

Компенсированная стадия стеноза гортани характеризуется

- А. Появлением одышки при нагрузке и учащением пульса
- Б. Отсутствием одышки в покое и урежением пульса
- В. Появлением одышки в покое и урежением пульса
- Г. Отсутствием одышки в покое, но учащением пульса

Обонятельные нити проникают в полость носа через

- А. Бумажную пластинку решетчатой кости
- Б. Перпендикулярную пластинку решетчатой кости
- В. Крылонёбную ямку
- Г. Решетчатую пластинку

К основным симптомам папилломатоза гортани относят

- А. Нарушение глотания
- Б. Охриплость, удушье
- В. Поперхивание, при приеме пищи
- Г. Кровохарканье

В ротоглотке туберкулезные язвы обычно локализуются на

- А. Нёбных дужках
- Б. Спинке языка
- В. Малом язычке
- Г. Корне языка

При хроническом тонзиллите застойное валикообразное утолщение краев небных дужек характеризуется как признак

- А. Зака
- Б. Преображенского
- В. Бохона
- Г. Гизе

Видом тугоухости у новорожденных является

- А. Антидромная
- Б. Отоакустическая
- В. Вестибулярная
- Г. Ретрокохлеарная

Использование вестибулярных супрессантов при вестибулярном нейроните не должно превышать _____ дней

- А. 7
- Б. 10
- В. 3
- Г. 14

Длительный процесс заживления с развитием осложнений отмечается при _____ ранах наружного уха

- А. Укушенных
- Б. Резаных
- В. Колотых
- Г. Размозженных

У новорожденного ребенка есть клетки решетчатого лабиринта и

- А. Верхнечелюстные околоносовые пазухи
- Б. Левая лобная околоносовая пазуха
- В. Правая лобная околоносовая пазуха
- Г. Клиновидные околоносовые пазухи

Двигательными волокнами мышц гортани управляет _____ нерв

- А. Блуждающий
- Б. Подъязычный
- В. Лицевой
- Г. Тройничный

Классификация хронического тонзиллита по б.с. Преображенскому и в.т. Пальчуну выделяет простую и _____ формы

- А. Субкомпенсированную
- Б. Токсико-аллергическую I и II степени
- В. Компенсированную
- Г. Декомпенсированную

Туберкулезные поражения (бугорки) полости носа наиболее часто локализуются в

- А. Области носовых раковин
- Б. Области дна полости носа
- В. Нижнем хрящевом отделе носовой перегородки носа
- Г. Обонятельной зоне

Симптом гризингера может наблюдаться при

- А. Менингите
- Б. Абсцессе мозжечка
- В. Тромбозе сигмовидного синуса
- Г. Арахноидите

При врожденной атрезии хоан ребенку срочно показано проведение

- А. Иссечения атрезии и установка термопластических трубок
- Б. Искусственной вентиляции легких
- В. Назотрахеальной интубации
- Г. Трахеотомии с установкой трахеостомической канюли

При остром стенозе гортани вне лечебного учреждения проводится

- А. Микротрахеотомия
- Б. Коникотомия
- В. Трахеостомия
- Г. Трахеотомия

При синдроме шегрена чаще развивается/развиваются

- А. Узелки голосовых складок
- Б. Функциональная гипертонусная дисфония
- В. Субатрофический и атрофический хронический ларингит
- Г. Функциональная гипотонусная дисфония

Абсцесс височной доли мозга образуется из-за

- А. Разлитого гнойного воспаления мягких оболочек головного мозга, развивающегося в результате бактериального инфицирования
- Б. Патологического симптомокомплекса, обусловленного постоянным поступлением в кровь микроорганизмов из очага воспаления
- В. Ограниченного скопления гноя в веществе головного мозга, возникающего вторично
- Г. Воспаления оболочек головного мозга, развивающегося в результате распространения инфекции

Нехарактерным признаком заглоточного абсцесса является

- А. Отказ ребенка от пищи
- Б. Заболеваемость преимущественно у взрослых
- В. Затруднение дыхания
- Г. Флюктуирующее выпячивание задней стенки глотки

К основным симптомам абсцесса мозга относят головную боль, субфебрильную лихорадку и

- А. Головокружение
- Б. Ликворею
- В. Очаговую неврологическую симптоматику
- Г. Менингеальные знаки

Клетка галлера распространяется в

- А. Дно полости носа
- Б. Верхнечелюстную пазуху
- В. Клиновидную пазуху
- Г. Лобную пазуху

Лечение гематомы перегородки носа состоит из

- А. Вскрытия и дренирования полости
- Б. Передней тампонады носа
- В. Лазеротерапии и антибактериальной терапии
- Г. Дренирования полости и терапии

Головная боль при абсцессе мозжечка чаще локализуется в _____ области

- А. Височной
- Б. Лобной
- В. Теменной
- Г. Затылочной

К клиническим проявлениям лакунарной ангины относят

- А. Наличие плотно спаянных с поверхностью миндалин пленок серого цвета
- Б. Бледность слизистой оболочки небных миндалин
- В. Наличие язв покрытых белым налетом
- Г. Желтовато-белый налет в виде очагов или пленку на поверхности миндалин

**В явной стадии отогенных абсцессов головного мозга и мозжечка выделяют
общепараинфекционные, парамозговые, проводниковые, _____ группы симптомов**

- А. Общие
- Б. Местные
- В. Специальные
- Г. Очаговые

**Выделение из полости носа серой и вязкой слизи с точечными чёрными фрагментами
характерно для синусита**

- А. Грибкового
- Б. Аллергического
- В. Вирусного
- Г. Бактериального

При дифтерии налёты характеризует

- А. Лёгкое отслоение
- Б. Грязно-серый цвет
- В. Белый цвет
- Г. Гной

Показанием для хирургического лечения деформации перегородки носа является

- А. Хронический гипертрофический ринит
- Б. Атрофический ринит
- В. Наличие деформации перегородки носа
- Г. Затруднение носового дыхания

Исследование обонятельной функции является

- А. Эндоскопия
- Б. Риноскопия
- В. Ольфактометрия
- Г. Риноманометрия

Хронический тонзиллит является

- А. Хроническим воспалением слизистой оболочки трахеи
- Б. Общим инфекционно-аллергическим заболеванием с местными проявлениями в виде стойкого хронического воспаления миндалин
- В. Воспалением слизистой оболочки гортани
- Г. Хроническим воспалением слизистой оболочки глотки

При абсцессе правой височной доли мозга головная боль наиболее часто локализуется в области

- А. Височно-теменной слева
- Б. Лобной
- В. Затылочной
- Г. Височно-теменной справа

К регионарным лимфатическим узлам первого порядка для нёбных миндалин относят

- А. Верхний узел глубокой яремной цепи шеи
- Б. Параларингеальные лимфатические узлы
- В. Верхние боковые шейные лимфатические узлы
- Г. Зачелюстные лимфатические узлы

Репозицию костей носа предпочтительней выполнять в срок, не превышающий _____ после травмы

- А. 72 Часа
- Б. 24 Часа
- В. 10-14 Суток
- Г. 1 Месяц

Невринома слухового нерва клинически проявляется патологией слуха, вестибулярного аппарата и

- А. Мозжечка
- Б. Тройничного нерва
- В. Лицевого нерва
- Г. Коркового центра слуха

Острый гнойный отит является воспалением барабанной полости, слуховой трубы и

- А. Улитки
- Б. Сосцевидного отростка
- В. Барабанной перепонки
- Г. Лабиринта

При истинном крупе голос бывает вначале хриплый, затем

- А. Развивается полная афония
- Б. Высокий
- В. Осиплый
- Г. Чистый

Шваннома гортани может быть проявлением

- А. Нейрофиброматоза Реклинхаузена
- Б. Синдрома Мунье - Куна
- В. Болезни Шенлейна - Геноха
- Г. Васкулита Кавасаки

Возбудителями фарингомикоза являются

- А. *Staphylococcus aureus*
- Б. Грибы рода *Candida*
- В. *Haemophilus influenzae*
- Г. *Chlamydia pneumoniae*

Локализацией контактных абсцессов отогенного происхождения у детей является

- А. Височная доля
- Б. Ствол мозга
- В. Лобная доля
- Г. Затылочная доля

Стартовая антибактериальная терапия у детей с острым гнойным средним отитом включает назначение

- А. Азитромицина 10 мг/кг 1 раз в день
- Б. Гентамицина 3-5 мг × 3 раза в день
- В. Метронидазола 20-30 мг/кг в день
- Г. Амоксициллина 40-90 мг/кг/сут в 3 приема

Сикоз носа вызывается

- А. Грибковой флорой
- Б. *Demodex folliculorum*
- В. Стрептококками и стафилококками
- Г. Анаэробной флорой

Юношеская фиброма носоглотки исходит из

- А. Надкостницы
- Б. Фасциального листка носоглотки
- В. Мышцы
- Г. Слизистой оболочки

Поражение слизистой оболочки носа от действия хрома проходит стадии

- А. Поверхностного изъязвления, глубокой язвы, перфорации носовой перегородки
- Б. Сенсебилизации, воспаления, некроза
- В. Воспаления и ожога
- Г. Ожога, воспаления, некроза

Симптом баллотирования характерен для инородного тела

- А. Бронха
- Б. Глотки
- В. Пищевода
- Г. Трахеи

Скопление крови при гематоме носовой перегородки возникает между

- А. Перегородкой носа и нижней носовой раковиной
- Б. Хрящом и надхрящницей
- В. Слизистой оболочкой и надхрящницей
- Г. Хрящом и слизистой оболочкой

Прорыв гноя через верхушку сосцевидного отростка и скопление его под грудино-ключично-сосцевидной мышцей развивается при

- А. Мастоидите Бецоляда
- Б. Зигоматиците
- В. Фурункуле наружного слухового прохода
- Г. Петрозите

При наличии у работника I (легкой) степени снижения слуха медицинским противопоказанием к работе является

- А. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения
- Б. Отрицательная аудиологическая динамика (в течение года)
- В. Сопутствующая сердечно-сосудистая патология
- Г. Ухудшение разборчивости шепотной речи (в течение года)

Образованием голосовой складки сосочкового строения, напоминающим цветную капусту, является

- А. Полип
- Б. Гранулема
- В. Киста
- Г. Папиллома

Эндолимфа и перилимфа различаются по

- А. Ионному составу
- Б. Количеству
- В. По окраске
- Г. Удельному весу

Лакунарную ангину чаще всего вызывают

- А. Коронавирусы
- Б. β -Гемолитические стрептококки группы А
- В. Аденовирусы
- Г. Спирохета щечная и веретенообразная палочка

К методам остановки носового кровотечения в амбулаторных условиях относят

- А. Перевязку наружной сонной артерии
- Б. Гидравлическую отсепаровку
- В. Переднюю и заднюю тампонаду
- Г. Селективную эмболизацию сосудов

Двигательными волокнами мышц гортани управляет _____ нерв

- А. Лицевой
- Б. Тройничный
- В. Подъязычный
- Г. Блуждающий

При носовом кровотечении через ____ показано удалять переднюю тампонаду

- А. 7 Дней
- Б. Несколько часов
- В. 2 Недели
- Г. 2-3 Дня

При остром среднем отите, осложненном мастоидитом, проводят

- А. Антродренаж
- Б. Антротомию
- В. Общеполостную санирующую операцию
- Г. Антромастоидотомию

Число отверстий, которыми полукружные каналы открываются в преддверие, равно

- А. 2
- Б. 1
- В. 5
- Г. 3

Резонаторами постоянного типа, влияющими на тембр, являются

- А. Мягкое нёбо, мышцы нижней челюсти
- Б. Твердое нёбо, околоносовые пазухи
- В. Диафрагма, мышцы шеи
- Г. Губы, щеки, язык

Среди бактериальных возбудителей острого риносинусита к наиболее значимым относят

- А. *Streptococcus pneumoniae*
- Б. Хламидии
- В. Микоплазмы
- Г. *Aureus*

Отёк подкожной клетчатки шеи, распространяющийся ниже ключиц, характерен для

- А. Токсической дифтерии ротоглотки III степени
- Б. Тяжёлого течения скарлатины
- В. Паротитной инфекции с субмаксиллитом
- Г. Инфекционного мононуклеоза

Что является основным в лечении токсической дифтерии ротоглотки?

- А. Противодифтерийная сыворотка
- Б. Плазмоферез
- В. Глюкокортикоиды
- Г. Антибиотики

Показанием к тонзиллэктомии являются рецидивирующие ангины, паратонзиллиты, паратонзиллярные абсцессы и

- А. Метатонзиллярные осложнения
- Б. Рецидивирующие респираторные заболевания
- В. Субфебрильная температура
- Г. Местные признаки хронического тонзиллита

К общим осложнениям острого тонзиллита относят ревматизм, миокардит, эндокардит, гломерулонефрит, ревматоидный полиартрит и

- А. Аденогепатоспленомегалию
- Б. Тонзиллогенный сепсис
- В. Острый шейный лимфаденит
- Г. Стеноз гортани

К грозным, часто фатальным осложнениям, при резаных ранах гортани относят

- А. Парез гортани
- Б. Кровотечение из крупных сосудов шеи
- В. Кровоизлияние в мышцы
- Г. Эмфизему в области шеи

Сифилитическое поражение гортани при вторичном сифилисе характеризуется

- А. Корками в просвете голосовой щели
- Б. Расположением гуммы в верхнем этаже гортани
- В. Отеком подскладочного пространства
- Г. Эритемой истинных голосовых складок

При неосложненной форме риносинусита стартовым препаратом для детей является

- А. Левофлоксацин
- Б. Ампициллин
- В. Гентамицин
- Г. Амоксициллин

Первой помощью при инородном теле бронхов является проведение

- А. Обезболивания
- Б. Коникотомии
- В. Противоотечной терапии
- Г. Бронхоскопии

Решётчатая воронка ограничена спереди и сзади

- А. Крючковидным отростком и bulla ethmoidalis
- Б. Agger nasi и bulla ethmoidalis
- В. Крючковидным отростком и передним краем средней носовой раковиной
- Г. Крючковидным отростком и agger nasi

Круглые инородные тела из полости носа удаляют

- А. Анатомическим пинцетом
- Б. Корнцангом
- В. Крючком
- Г. Щипцами Блейкли

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте фарингоскопические признаки хронического тонзиллита с названием их по автору:

1. Признак зака.

- А. Инфильтрация и гиперплазия краев передних дужек;
- Б. Гиперемия краев небных дужек;
- В. Отечность краев верхних отделов небных дужек.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Формы аллергического ринита:

1. Среднетяжелая форма:

- А. Проявления ринита беспокоят больного менее 4-х дней в неделю или менее 4-х недель в году;
- Б. Симптомы настолько выражены, что пациент не может нормально работать, учиться, заниматься спортом и спать ночью, если не получает лечение;
- В. Симптомы нарушают сон пациента, препятствуют работе, учебе, занятиям спортом. Качество жизни существенно ухудшается;
- Г. Проявления ринита беспокоят больного более 4-х дней в неделю, или более 4-х недель в году;
- Д. У пациента имеются лишь незначительные клинические признаки болезни, не нарушающие дневную активность или сон.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Наиболее часто микроорганизмы проникают в среднее ухо через

- А. слуховую трубу (ринотубарный путь)
- Б. наружный слуховой проход при травме барабанной перепонки
- В. кровь (гематогенный путь)
- Г. из полости черепа по преддверно - улитковому и лицевому нервам (периневрально)

Первый нейрон звукового анализатора располагается в

- А. в преддверии
- Б. в полукружных каналах
- В. в улитке
- Г. в продолговатом мозге

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте иннервацию глотки:

1. Гортань у взрослого человека.

А. III – IV;

Б. IV – VI.

А. 1-А

Б. 1-Б

Заглоточное пространство у детей содержит

- А. сосудисто-нервный пучок
- Б. лимфатические узлы
- В. слизистые железы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте возбудителей и заболевания, основным этиологическим фактором которого они являются:

1. *Bacteriae leptotrix*.

А. Ангина вульгарная;

Б. Ангина симановского – венсана – плаута;

В. Гиперкератоз глотки;

Г. Эпиглоттит;

Д. Озена.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Соотнесите анатомические образования, составляющие скелет наружного носа и носовой перегородки:

1. Скелет перегородки носа.

А. Лобная кость;

Б. Носовая кость;

В. Передняя носовая ость;

Г. Сошник;

Д. Гребень клиновидной кости.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Какие из форм микозов относятся к инвазивным, а какие к неинвазивным формам грибкового поражения носа и онп:

1. Инвазивная форма.

А. Поверхностный синоназальный микоз;

Б. Острая молниеносная форма;

В. Грибковый шар;

Г. Хроническая форма;

Д. Аллергический грибковый синусит.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

При ожоге гортани в первую очередь поражается

А. гортанная поверхность надгортанника

Б. вестибулярные складки

В. голосовые складки

Г. язычная поверхность надгортанника

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Клинические особенности гиперчувствительности к различным аллергенам:

1. Аллергия на пыльцу растений.

А. Непереносимость дрожжесодержащих и других продуктов, ухудшение состояния во влажную погоду, а также при посещении сырых, плохо проветриваемых помещений;

Б. Возникновение симптомов при контакте с животными, усиление проявлений ринита при ношении одежды из шерсти и меха;

В. Облегчение или исчезновение симптомов Ринита, когда больной находится вне дома.

Круглогодичное течение заболевания с обострениями в прохладное время года, появление симптомов ночью, манифестация симптомов при уборке квартиры, во время ремонта;

Г. Облегчение состояния в городских условиях и ухудшение при выезде за город, сезонность обострений, метеозависимость.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Клинические особенности гиперчувствительности к различным аллергенам:

1. Периферическое головокружение.

А. Поражение проводящих путей головного мозга;

Б. Поражение вестибулярного нерва;

В. Поражение вестибулярных ядер;

Г. Поражение лабиринта.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Наиболее вероятный путь при распространении инфекции из среднего уха при субдуральном абсцессе

А. гематогенный

Б. контактный

В. лимфогенный

Г. преформированный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте кистовидное растяжение околоносовых пазух и их содержимое:

1. Пиоцеле.

А. Гной;

Б. Слизь;

В. Кровь;

Г. Воздух.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Адекватный метод хирургического лечения нейро-вегетативной формы вазомоторного ринита

А. конхотомия

Б. гальванокаустика

В. подслизистая вазотомия

Г. подслизистая резекция носовой перегородки

Пункция верхнечелюстной пазухи проводится через носовой ход

- А. общий
- Б. нижний
- В. средний
- Г. верхний

У детей раннего возраста в среднем ухе происходит некролиз

- А. соединительной ткани
- Б. эпителия
- В. миксоидной ткани
- Г. хрящевой ткани

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Какие из перечисленных методов относятся к объективным, а какие к субъективным методам исследования слуховой функции:

1. Субъективные методы.

- А. Акуметрия;
- Б. Методы электрофизиологической аудиометрии (ксвп, ссвп, дсвп);
- В. Тональная пороговая аудиометрия;
- Г. Тональная надпороговая аудиометрия;
- Д. Методы электроакустической аудиометрии (оаэ, акустическая рефлектометрия).

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Нижняя стенка полости носа образована

- А. крыловидный отросток клиновидной кости и небный отросток верхней челюсти
- Б. небный отросток верхней челюсти и горизонтальная пластинка небной кости
- В. горизонтальная пластинка небной кости и крыловидный отросток клиновидной кости
- Г. крыловидный отросток клиновидной кости и сошник

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте расположение физиологических отверстий глотки:

1. Хоана.

А. Носоглотка;

Б. Ротоглотка;

В. Гортаноглотка.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Клинические проявления певческих узелков

А. болевые ощущения

Б. приступообразный кашель

В. стойкая дисфония

Г. клинически не проявляются

Диагноз агранулоцитарной ангины устанавливается после исследования

А. мочи

Б. крови

В. гистологического

Г. бактериологического

Дыхательная функция полости носа исследуется с помощью

А. эндоскопии полости носа

Б. ринопневмометрии

В. передней риноскопии

Г. задней риноскопии

Глотка проецируется на шейные позвонки

А. 01--03

Б. 01--04

В. 01--05

Г. 01--06

Сигмовидный синус находится

А. в задней черепной ямке

Б. в передней черепной ямке

В. в средней черепной ямке

Г. основании черепа

При фурункуле носа возможно осложнение

- А. тромбоз сигмовидного синуса
- Б. тромбоз кавернозного синуса
- В. мастоидит
- Г. абсцесс височной доли

Отток венозной крови из гортани осуществляется в

- А. наружную яремную
- Б. переднюю яремную вену
- В. внутреннюю яремную
- Г. позадичелюстную вену

В клинике абсцесса височной доли головного мозга выделяют стадий

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

Для промывания серной пробки следует применять воду имеющую температуру

- А. 27 °C
- Б. 37 °C
- В. 20 °C
- Г. 49 °C

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и возбудителем. Заболевание:

1. Лакунарная ангина. Возбудитель:

- А. Бацилла леффлера;
 - Б. Веретенообразная палочка + спирохета полости рта;
 - В. Стрептококк.
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1- В

Передние клетки решетчатого лабиринта открываются в носовой ход

- А. верхний
- Б. средний
- В. нижний
- Г. общий

При отосклерозе выполняется операция

- А. антромастотомия
- Б. стапедопластика
- В. аттикоантротомия
- Г. тимпанопластика

Кровоснабжение полости носа обеспечивается ветвями

- А. внутренней сонной артерии
- Б. наружной сонной артерии
- В. внутренней и наружной сонной артерии

Сила шепотной речи соответствует примерно

- А. 20 дБ
- Б. 30 дБ
- В. 40 дБ
- Г. 50 дБ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Соотнесите структуры, обеспечивающие соответствующие функции звукового анализатора:

1. Звукопроводение.

- А. Ушная раковина;
- Б. Улитка;
- В. Наружный слуховой проход;
- Г. Кортиев орган;
- Д. Слуховые косточки.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте заболевание и адекватный метод хирургического лечения:

1. Искривление перегородки носа.

А. Подслизистая конхотомия;

Б. Подслизистая резекция носовой перегородки;

В. Подслизистая вазотомия.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте иннервацию глотки:

1. Ротоглотка.

А. Тройничный нерв;

Б. Языкоглоточный;

В. Блуждающий.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Выберите правильные соответствия между стенками наружного слухового прохода и образованиями, с которыми они граничат:

1. Передняя стенка.

А. Граничит с капсулой околоушной слюнной железы;

Б. Граничит с височно-нижнечелюстным суставом;

В. Граничит с воздухоносными клетками сосцевидного отростка, с пещерой;

Г. Граничит со средней черепной ямкой.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Причина возникновения постинтубационной гранулемы гортани

- А. использование интубационной трубки несоответствующего размера
- Б. несоблюдение голосового режима пациентом
- В. острый ларингит в послеоперационном период
- Г. длительная интубация гортани

В глотке располагается миндалин

- А. три
- Б. четыре
- В. пять
- Г. шесть

кт признак, характерный для синдрома молчащего синуса является

- А. растяжение стенок клетки решетчатого лабиринта
- Б. наличие дополнительного соустья
- В. латерализация крючковидного отростка
- Г. наличие тени полуовальной формы

Воспаление всех придаточных пазух носа называется

- А. полисинусит
- Б. пансинусит
- В. гемисинусит
- Г. риносинусит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. В функциональном (физиологическом) отношении в слуховом анализаторе различают две части. Выберите соответствия:

1. Звуковоспринимающая часть.

- А. Спиральный (кортиев) орган;
- Б. Ушная раковина;
- В. Улитка;
- Г. Нервный путь до мозгового центра;
- Д. Наружный слуховой проход.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте парные и непарные хрящи гортани:

1. Непарные хрящи.

- А. Щитовидный;**
- Б. Черпаловидный;**
- В. Надгортанник;**
- Г. Рожковидный;**
- Д. Перстневидный.**

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Прессорная пробы проводится при исследовании анализатора

- А. звукового
- Б. обонятельного
- В. вестибулярного
- Г. вкусового

Степени отклонения туловища при пробе воячека

- А. одна
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

Паралич мягкого неба сопровождается

- А. нарушением обоняния
- Б. закрытой гнусавостью
- В. открытой гнусавостью
- Г. затруднением носового дыхания

В формировании ската носа участвует

- А. носовая кость
- Б. лобная кость
- В. продырявленная пластинка решетчатой кости
- Г. передняя стенка клиновидной пазухи

Положение больного в позе «ружейного курка» или «легавой собаки» наблюдается при

- А. отосклерозе
- Б. менингите
- В. лабиринтите
- Г. аэроотите

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте онп и носовые ходы, в которые открываются их соустья:

1. Средний носовой ход.

- А. Клиновидная пазуха;
- Б. Верхнечелюстная пазуха;
- В. Лобная пазуха;
- Г. Передние клетки решетчатого лабиринта;
- Д. Средние клетки решетчатого лабиринта.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Выберите правильные соответствия:

1. Антрохоанальный полип.

- А. Поллиноз;
- Б. Муковисцидоз (кистозный фиброз);
- В. Синдром янга;
- Г. Бронхиальная астма;
- Д. Аллергический ринит.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Симптом кернига наблюдается при

- А. арахноидите
- Б. лабиринтите
- В. менингите
- Г. сифилисе

В средний носовой ход открываются

- А. верхнечелюстная пазуха, лобная пазуха, клиновидная пазуха
- Б. носо-слезный канал, верхнечелюстная пазуха, передние клетки решетчатого лабиринта
- В. лобная пазуха, передние и средние клетки решетчатого лабиринта, верхнечелюстная пазуха
- Г. клиновидная пазуха, задние клетки решетчатого лабиринта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте вид лечения, адекватный для стадии стеноза гортани:

1. Стадия компенсации.

А. Консервативная терапия;

Б. Трахеотомия;

В. Коникотомия.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Брадикардия характерна для

- А. менингита
- Б. лабиринтита
- В. абсцесса височной доли головного мозга
- Г. синустромбоза

Для поперечного перелома височной кости наиболее характерно

- А. ликворея
- Б. кровотечение из уха
- В. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва
- Г. гемианопсия

Холестеатома характерна для

- А. отосклероза
- Б. адгезивного отита
- В. хронического гнойного мезотимпанита
- Г. хронического гнойного эптитимпанита

Проникновение инфекции в среднее ухо при остром среднем отите происходит чаще всего

- А. транстимпанальным путем
- Б. тубарным путем
- В. гематогенным путем
- Г. лимфогенным путем

Для флегмонозного ларингита наиболее характерно

- А. дисфония и боль в гортани
- Б. дисфония, дисфагия, боль в гортани, лихорадка, нарастающая дыхательная недостаточность
- В. дисфагия, боль за грудиной
- Г. дисфагия, боль при глотании

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между исследуемым органом и методом исследования.

Орган:

1. Нос и онп. Метод исследования:

- А. Диафаноскопия;
- Б. R- графия;
- В. Задняя риноскопия;
- Г. Передняя риноскопия.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

Характерным симптомом озоны является

- А. зловонный насморк
- Б. гипертрофия носовых раковин
- В. вязкий секрет
- Г. узкие носовые ходы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. При исследовании слуха с помощью камертона используют несколько опытов. Выберите правильные соответствия, для чего проводятся эти опыты:

1. Опыт вебера.

- А. Изучение состояния звуковоспринимающего аппарата;
- Б. Выявление фиксации стремени в окне преддверия при отосклерозе;
- В. Выявление «латерализации» звука в одном или другом ухе;
- Г. Сравнение длительности восприятия звука камертона через воздух и через кость.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

Задние клетки решетчатого лабиринта открываются в носовой ход

- А. верхний
- Б. средний
- В. нижний
- Г. общий

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте отклонение туловища при проведении опыта воячека со степенью реакции:

1. Первая степень.

- А. 0 – 5 °;
- Б. 5 – 30 °;
- В. Более 30 °.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Для гемисинуита характерно

- А. воспаление всех околоносовых пазух
- Б. лево- или правостороннее воспаление всех пазух на одноименной стороне
- В. поражение нескольких околоносовых пазух
- Г. поражение одной околоносовой пазухи

Больным с гортанной ангиной показано лечение в

- А. лор отделении
- Б. в поликлинике
- В. в инфекционном отделении
- Г. в реанимации

Границей между ротоглоткой и гортаноглоткой является

- А. нижний край мягкого неба
- Б. корень языка и надгортанник
- В. нижние полюса небных миндалин
- Г. дно полости рта

Сила громкой разговорной речи составляет

- А. 30 дБ
- Б. 50 дБ
- В. 65 дБ
- Г. 80 дБ

Острый ринит имеет стадии

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

При адгезивном среднем отите наблюдается

- А. перфорация барабанной перепонки
- Б. слизисто-гнойное отделяемое в слуховом проходе
- В. отложение извести на барабанной перепонке
- Г. грануляции, полипы в барабанной полости

Гортань у детей находится на уровне шейных позвонков

- А. VI-VII
- Б. IV-VI
- В. III-IV
- Г. II-III

Воспаление слизистой оболочки глотки называется

- А. фарингит
- Б. ларингит
- В. тонзиллит
- Г. ринит

Для хронического гнойного эпитимпанита характерны изменения барабанной перепонки в виде

- А. центральной перфорации
- Б. втянутости
- В. краевой перфорации в ненатянутой части
- Г. взбухание

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Что относится к риногенным и отогенным внутричерепным осложнениям?

1. Отогенные.

- А. Менингит;
- Б. Абсцесс мозга;
- В. Экстрадуральный абсцесс;
- Г. Субдуральный абсцесс;
- Д. Синустромбоз.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Для юношеской ангиофибромы основания черепа характерн

- А. затруднение носового дыхания
- Б. налет на небных миндалинах
- В. стекание гноя по задней стенке глотки
- Г. деформация лица

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте симптомы, характерные для стадии стеноза гортани:

1. Стадия компенсации.

А. Урежение и углубление дыхания, выпадение пауз между вдохом и выдохом;

Б. Инспираторная одышка в покое, бледность кожных покровов, беспокойное состояние больного;

В. Пульс становится частым, слабым, кожа бледно-серого цвета, состояние усугубляется экзофтальмом – выпячиванием глаз, потерей сознания, непроизвольным мочеиспусканием, дефекацией, возможна остановка сердца.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Начало пищевода соответствует проекции

А. верхнего края щитовидного хряща

Б. подъязычной кости

В. нижнего края перстневидного хряща

Г. нижнего края щитовидного хряща

Диагноз агранулоцитарной ангины устанавливается после исследования

А. бактериологического

Б. цитологического

В. крови

Г. мочи

Парацентез барабанной перепонки производится в квадранте

А. задне-верхнем

Б. передне-нижнем

В. передне-верхнем

Г. задне-нижнем

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Соотнесите анатомические образования, отвечающие за восприятие ускорения:

1. Преддверие.

А. Угловое ускорение;

Б. Прямолинейное ускорение;

В. Ускорение силы тяжести.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Первый нейрон проводящих путей вестибулярного анализатора располагается

А. в преддверии

Б. в полукружных каналах

В. во внутреннем слуховом проходе

Г. в наружном слуховом проходе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите правильные соответствия между основными типами назальных полипов:

1. Антрохоанальный полип.

А. Односторонний;

Б. Двухсторонний;

В. Возникает из гайморовой пазухи;

Г. Возникает из решётчатого лабиринта;

Д. Обычно бывает у детей.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Иннервация внутреннего уха осуществляется черепными нервами

А. V

Б. VI

В. VII

Г. VIII

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Соотнесите значения силы звука и вида речи:

1. Шепотная речь.

А. 30 дБ;

Б. До 60 дБ;

В. 80 дБ.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте формы воспаления онп:

1. Смешанная форма.

А. Кистозная;

Б. Гнойно – полипозная;

В. Катаральная;

Г. Пристеночно - гиперпластическая;

Д. Гребень клиновидной кости.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Адекватный метод лечения при токсико-аллергической форме I степени хронического тонзиллита

А. промывание лакун небных миндалин

Б. тонзиллотомия

В. тонзиллэктомия

Г. физиотерапевтическое лечение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Выберите правильные соответствия: что происходит с голосовой щелью:

1. При спокойном дыхании.

А. Приобретает форму овала;

Б. Приобретает форму треугольника;

В. Приобретает форму ромба.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Рейснерова мембрана располагается в

А. полукружных каналах

Б. улитке

В. преддверии

Г. барабанной полости

Гортань у детей находится на уровне шейных позвонков

А. II-III

Б. IV-VI

В. III-IV

Г. IV-VII

Предрасполагающим фактором к возникновению фурункула носа является

А. бронхиальная астма

Б. гипертоническая болезнь

В. сахарный диабет

Г. псориаз

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Периферический отдел слухового анализатора состоит из трёх частей. Выберите соответствия:

1. Наружное ухо.

А. Барабанная перепонка;

Б. Ушная раковина;

В. Полости сосцевидного отростка;

Г. Улитка;

Д. Наружный слуховой проход.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Цваардемакер.

А. Химическая теория;

Б. Физическая теория;

В. Физико-химическая теория.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Клиновидная пазуха открывается в носовой ход

А. верхний

Б. средний

В. нижний

Г. общий

Коникотомия при остром стенозе гортани показана в стадии

А. компенсации

Б. стадии неполной компенсации

В. стадии декомпенсации

Г. терминальной стадии

Наиболее часто риногенные внутричерепные осложнения возникают как осложнение

- А. гайморита
- Б. фронтита
- В. этмоидита
- Г. сфеноидита

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Местные и общие причины носовых кровотечений:

1. Общие причины.

- А. Хирургические вмешательства;**
- Б. Заболевания печени;**
- В. Гипертоническая болезнь;**
- Г. Злокачественные и доброкачественные новообразования полости носа и носоглотки.**
- Д. Нефросклероз.**

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Лимфатическая сеть гортани более развита в этаже

- А. верхнем
- Б. среднем
- В. нижнем
- Г. верхнем и нижнем

Пункцию верхнечелюстной пазухи проводят через

- А. верхний носовой ход
- Б. нижний носовой ход
- В. средний носовой ход
- Г. общий носовой ход

Через зев полость рта сообщается с отделом глотки

- А. верхним
- Б. средним
- В. нижним

В опыте вебера при двустороннем заболевании звуковоспринимающего аппарата звук латерализуется в

- А. хуже слышащее ухо
- Б. в оба уха одинаково
- В. в центре головы
- Г. лучше слышащее ухо

Границы трахеи

- А. 4-5 шейный позвонок и 5-6 грудной позвонок
- Б. 6-7 шейный позвонок и 4-5 грудной позвонок
- В. 4-5 шейный позвонок и 6 грудной позвонок
- Г. нижний край перстневидного хряща и 6 грудной позвонок

При закрытии обонятельной щели наступает

- А. эссенциальная гипо- или аносмия
- Б. респираторная гипо-или аносмия
- В. кокасмия

В клинике отогенного абсцесса головного мозга выделяют стадий

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

Располагающиеся в небных миндалинах под эпителием желтые «просяные» точки характерны для ангины

- А. дифтеритической
- Б. лакунарной
- В. фолликулярной
- Г. агранулоцитарной

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Выберите правильные соответствия между заболеваниями глотки и их симптомами:

1. Ангина.

А. Грязно-серые налеты на небных миндалинах, дужках;

Б. Гиперемия небных миндалин и дужек;

В. Болезненность регионарных лимфоузлов;

Г. На поверхности миндалин видны желтовато-белые точки;

Д. Налеты распространяются на заднюю стенку глотки, в гортань.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Трепанопункция лобной пазухи проводится через стенку

А. нижнюю

Б. медиальную

В. переднюю

Г. заднюю

Отоскопическим признаком отосклероза является

А. перфорация барабанной перепонки в ненатянутой части

Б. нормальный вид или истончение барабанной перепонки

В. перфорация барабанной перепонки в натянутой части

Г. наличие петрификатов на барабанной перепонке

Адекватный раздражитель рецепторов полукружных каналов

А. прямолинейное ускорение

Б. угловое ускорение

В. прямолинейное и угловое ускорение

Носовую перегородку образуют

А. треугольный хрящ, решетчатый лабиринт, сошник

Б. перпендикулярная пластинка решетчатой кости, сошник, четырехугольный хрящ, носовой гребешок верхней челюсти

В. небная кость, сошник, четырехугольный хрящ

Г. носовая кость, четырехугольный хрящ, сошник

Рыхлый подслизистый слой лучше развит в этаже гортани

- А. верхнем
- Б. среднем
- В. нижнем

Периферическим рецептором звукового анализатора является

- А. отолитовый аппарат
- Б. кортиев орган
- В. ампулярный аппарат
- Г. барабанная перепонка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте характеристики сенсоневральной тугоухости:

1. I степень.

- А. Потеря слуха 26 – 40 дБ;
- Б. Потеря слуха 41 – 55 дБ;
- В. Потеря слуха 56 – 70 дБ;
- Г. Потеря слуха 71 – 90 дБ;
- Д. Потеря слуха более 91 дБ.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Чувствительная иннервация глотки осуществляется

- А. второй веточкой тройничного нерва, блуждающим и подъязычным нервами
- Б. блуждающим нервом, первой и второй ветвями тройничного нерва
- В. первой и второй ветвями тройничного нерва и языкоглоточным нервом
- Г. языкоглоточным, блуждающим нервами и второй веточкой тройничного нерва

Ампулофугальное направление движения эндолимфы – это движение

- А. к ампуле
- Б. от ампулы
- В. вокруг ампулы
- Г. внутри ампулы

Чтобы определить продолжительность нистагма взгляд исследуемого фиксируют

- А. в сторону медленного компонента нистагма
- Б. в сторону быстрого компонента нистагма
- В. прямо перед собой

Для продольного перелома височной кости наиболее характерно

- А. кровотечение из уха
- Б. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва
- В. гемианопсия
- Г. системное головокружение

При гнойном сфеноидите отделяемое при риноскопии наблюдается в носовом ходе

- А. общем
- Б. нижнем
- В. среднем
- Г. верхнем

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Соотнесите этажи глотки шейным позвонкам.

- А. I – III;
- Б. III;
- В. IV – VI.
- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Симптом гизе характерен для

- А. атрофического фарингита
- Б. острого ларингита
- В. хронического тонзиллита
- Г. ангины

Расширяет просвет гортани мышца

- А. парная боковая перстнечерпаловидная
- Б. парная задняя перстнечерпаловидная
- В. парная косая черпаловидная
- Г. непарная поперечная черпаловидная

признаком гнойного воспаления клиновидной пазухи является наличие гноя в

- А. верхнем носовом ходе
- Б. среднем носовом ходе
- В. нижнем носовом ходе
- Г. общем носовом ходе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте вегетативные реакции при проведении отолитовой пробы по воячку:

1. Первая степень.

А. Изменение сердечной и дыхательной деятельности, рвота, обморок;

Б. Холодный пот, тошнота;

В. Побледнение лица, изменение пульса.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Патогенетической основой болезни меньера считается

- А. гидропс лабиринта
- Б. наличие холестеатомы
- В. нарушения в эндокринной системе
- Г. артериальная гипертензия

При проведении вращательной пробы в кресле барани голову больного наклоняют

- А. на 60 градусов назад
- Б. на 30 градусов вперед
- В. на левый бок
- Г. на правый бок

Круглое окно располагается на стенке барабанной полости

- А. медиальной
- Б. латеральной
- В. передней
- Г. задней

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Укажите, в каких анатомических образованиях находятся рецепторы:

1. Вестибулярного анализатора.

А. Преддверие;

Б. Полукружные каналы;

В. Перепончатая улитка.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Кистовидное растяжение околоносовых пазух содержащее гной называется

А. пиоцеле

Б. гемоцеле

В. пневмоцеле

Г. мукоцеле

Углубления между складками преддверия и голосовыми складками называются

А. грушевидные синусы

Б. гортанные желудочки

В. ямки розенмюллера

Г. валлекулы

Адиадохокинез определяется при

А. тромбозе кавернозного синуса

Б. абсцессе лобной доли головного мозга

В. абсцессе мозжечка

Г. абсцессе височной доли головного мозга

Гемианопсия наблюдается при

А. абсцессе лобной доли головного мозга

Б. абсцессе височной доли головного мозга

В. абсцессе мозжечка

Г. тромбозе кавернозного синуса

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте стенки полости носа и образования, с которыми они граничат:

1. Нижняя.

А. Сошник;

Б. Четырехугольный хрящ;

В. Горизонтальная пластинка небной кости;

Г. Решетчатая кость;

Д. Продырявленная пластинка решетчатой кости.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения. Заболевание:

1. Отосклероз. Метод лечения:

А. Радикальная операция на ухе;

Б. Стапедопластика;

В. Операция на эндолимфатическом мешке.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

У новорожденных отсутствуют околоносовые пазухи

А. лобные

Б. верхнечелюстные

В. решетчатый лабиринт

Г. лобные и клиновидные

Гортань у детей соответствует уровню шейных позвонков

А. IV-VI

Б. II-III

В. III-IV

Г. IV-VII

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте стадию воспаления среднего уха и отоскопическую картину:

1. Острый тубоотит.

А. Мг гиперемизована, инфильтрирована, отечна, выбухает, пульсирует;

Б. Мг перфорирована, гиперемизована;

В. Втяжение *mt* – укорочение рукоятки молоточка, укорочение/исчезновение светового конуса;

Г. Мг местами петрифицирована, утолщена;

Д. Мг гиперемизована, отечна.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и тактикой лечения. Заболевание:

1. Острый катаральный средний отит. Тактика лечения:

А. Обезболивающие и противовоспалительные капли;

Б. Продувание слуховых труб;

В. Турунды с антибактериальной мазью в ухо.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Срочная трахеостомия показана при остром стенозе гортани в стадии

А. компенсации

Б. субкомпенсации

В. декомпенсации

Г. асфиксии

Инородные тела чаще встречаются в

А. гортани

Б. трахее

В. бронхах

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Выберите правильные соответствия: постановка тимпаностомических трубок:

1. Проводится.

А. Детям до 6 мес.;

Б. Детям с хроническим экссудативным средним отитом;

В. Детям с баротравмой;

Г. Детям с осложнениями острого среднего отита (ателектаз, адгезивный средний отит);

Д. Детям с нейросенсорной тугоухостью.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Клинические особенности центрального и периферического головокружения:

1. Центральное головокружение.

А. Горизонтальный или горизонтально-ротаторный нистагм;

Б. Наличие симптомов поражения ствола головного мозга/или мозжечка;

В. Горизонтальный, вертикальный, альтернирующий нистагм;

Г. Фиксация взгляда уменьшает головокружение или нистагм;

Д. Нарушение слуха/или звон, шум в ухе.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Причины различных форм стенозов гортани:

1. Молниеносный.

А. Воспалительный отек гортани, травматический отек гортани, гематома гортани;

Б. Инородное тело гортани, аллергический отек, парезы гортани;

В. Новообразования гортани, рубцовые изменения, парезы гортани.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

При травме гортани, осложненной кровотечением, пострадавший должен находиться в положении

- А. сидя
- Б. лежа на спине
- В. лежа на противоположной повреждению стороне
- Г. лежа на стороне повреждения или на животе

Размер тампона для задней тампонады носа должен соответствовать размеру

- А. ногтевых фаланг больших пальцев врача
- Б. ногтевых фаланг больших пальцев пациента
- В. ногтевых фаланг указательных пальцев врача
- Г. ногтевых фаланг указательных пальцев пациента

Заглочные абсцессы чаще развиваются в возрасте

- А. от 20 до 30 лет
- Б. от 10 до 20 лет
- В. от 3 до 10 лет
- Г. до 3 лет

При опыте швабаха определяют

- А. длительность восприятия звука по воздуху
- Б. длительность восприятия звука по кости
- В. разницу в длительности восприятия звука по воздуху и по кости
- Г. латерализацию звука

Вход в гортань ограничен спереди

- А. верхушками черпаловидных хрящей
- Б. надгортанником
- В. черпалонадгортанными складками
- Г. хоанами

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте частотные характеристики звуков:

1. Звуки низкой частоты.

- А. 16 – 800 гц;
- Б. 800 – 4000 гц;
- В. 4000 – 10000 гц;
- Г. 10000 – 20000 гц.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

Паракузис willisii наблюдается при

- А. болезни меньера
- Б. отосклерозе
- В. нейросенсорной тугоухости
- Г. адгезивном отите

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Соотнесите анатомические образования и локализацию:

1. Кавернозный синус.

- А. Передняя черепная ямка;
- Б. Средняя черепная ямка;
- В. Задняя черепная ямка.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Риногенные абсцессы чаще всего возникают

- А. в височной доле
- Б. в лобной доле
- В. в теменной доле
- Г. в затылочной доле

С латеральной стенкой клиновидной пазухи граничит синус

- А. продольный
- Б. поперечный
- В. сигмовидный
- Г. пещеристый

Опыт ринне при отосклерозе будет

- А. укорочен
- Б. удлинен
- В. положительный
- Г. отрицательный

Детям обычно делают трахеотомию

- А. нижнюю
- Б. среднюю
- В. верхнюю

Направление нистагма определяется

- А. направлением медленного компонента нистагма
- Б. направлением быстрого компонента нистагма
- В. самим больным
- Г. аудиометрией

Положение больного в позе «ружейного курка» характерно для внутричерепного осложнения

- А. менингита
- Б. абсцесса мозжечка
- В. абсцесса лобной доли головного мозга
- Г. абсцесса височной доли головного мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте костные и хрящевые составляющие носовой перегородки:

1. Костная часть перегородки носа.

А. Сошник;

Б. Слезная кость;

В. Перпендикулярная пластинка решетчатой кости;

Г. Четырехугольный хрящ.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Типичной локализацией кровотока полипа полости носа является

А. перпендикулярная пластинка решетчатого лабиринта

Б. дно полости носа

В. хрящевая часть носовой перегородки

Г. костная часть носовой перегородки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте группы врожденных дефектов носа:

1. Гипергенезия.

А. Избыточное развития органа;

Б. Недоразвитие органа;

В. Нарушение нормального положения органа;

Г. Неправильное развитие органа;

Д. Сохранение эмбриональных структур.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Средняя часть глотки (ротоглотка) соответствует позвонкам

А. 2 шейному

Б. 3 шейному

В. 4 шейному

Г. 5 шейному

Выявление нистагма при взгляде в сторону медленного компонента нистагма указывает на то, что он

- А. первой степени
- Б. второй степени
- В. третьей степени

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте функцию носа и метод ее оценки:

1. Дыхательная.

- А. Ольфактометрия;
- Б. Риноскопия;
- В. Ринопневмометрия;
- Г. Сахариновый тест.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте иннервацию носа:

1. Кожа наружного носа.

- А. Тройничный нерв;
- Б. Лицевой нерв;
- В. Языкоглоточный нерв.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Средние клетки решетчатого лабиринта открываются в носовой ход

- А. общий
- Б. нижний
- В. средний
- Г. верхний

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения. Заболевание:

1. Искривление носовой перегородки. Метод лечения:

- А. Вазотомия н/носовых раковин;**
- Б. Подслизистая резекция перегородки носа;**
- В. Подслизистая конхотомия.**
- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Разлитая гиперемия слизистой оболочки глотки характерна для

- А. катаральной ангины
- Б. острого фарингита
- В. лакунарной ангины
- Г. ангины симановского-венсана

Боль при остром среднем отите вызывается раздражением нерва

- А. лицевого
- Б. блуждающего
- В. языкоглоточного
- Г. преддверно-улиткового

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте стенки барабанной полости и образования, с которыми они граничат:

- 1. Верхняя стенка.**
- А. Внутренняя сонная артерия;**
 - Б. Внутреннее ухо;**
 - В. Сосцевидный отросток;**
 - Г. Средняя черепная ямка.**
 - А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1- В
 - Г. 1-Г

Пункцию верхнечелюстной пазухи проводят через носовой ход

- А. общий
- Б. нижний
- В. средний
- Г. верхний

Анемизация слизистой оболочки полости носа проводится для дифференциальной диагностики

- А. вазомоторного и атрофического ринита
- Б. вазомоторного и гипертрофического ринита
- В. вазомоторного и катарального ринита
- Г. катарального и гипертрофического ринита

Нижняя гортанная артерия является ветвью

- А. внутренней сонной артерии
- Б. наружной сонной артерии
- В. нижней щитовидной артерии
- Г. подключичной артерии

Естественное отверстие клиновидной пазухи располагается в носовом ходе

- А. нижнем
- Б. среднем
- В. верхнем
- Г. общем

Аудиометрический признак тимпанальной формы отосклероза

- А. перцептивная тугоухость
- Б. смешанная тугоухость
- В. кондуктивная тугоухость
- Г. скалярная тугоухость

Направление нистагма определяется

- А. направлением его медленного компонента
- Б. направлением его быстрого компонента
- В. силой нистагма
- Г. плоскостью нистагма

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Дайте определение различным формам ринита:

1. Инфекционный ринит:

А. Хроническое заболевание, в основе которого лежит воспалительная *ig-e* опосредованная реакция, вызванная попаданием аллергенов на слизистую оболочку полости носа;

Б. Неаллергическое воспаление слизистой полости носа, связанное с нарушением метаболизма арахидоновой кислоты. Является предвестником развития тяжелой формы полипозного риносинусита, аспириновой бронхиальной астмы, непереносимости *нпвс*. характеризуется эозинофилией носового секрета при отсутствии повышенного уровня *ig-e* в сыворотке крови и отрицательным эндоназальным провокационным тестом;

В. Воспаление слизистой оболочки полости носа, вызванное вирулентными микроорганизмами и проявляющееся затруднением носового дыхания, выделениями из носа и чиханьем;

Г. Хронический неаллергический ринит, основными симптомами которого являются заложенность носа и затруднение носового дыхания, связанные с лабильностью и повышенным кровенаполнением сосудов носовых раковин.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Здоровый человек должен воспринимать шепотную речь с расстояния не менее

А. 2 м

Б. 3 м

В. 6 м

Г. 4 м

Двигательная иннервация глотки осуществляется

А. возвратным и языкоглоточным нервом

Б. первой веточкой тройничного нерва и возвратным нервом

В. языкоглоточным и подъязычным нервом

Г. подъязычным и возвратным нервом

При стенозе гортани у детей чаще применяется

А. верхняя трахеостомия

Б. средняя трахеостомия

В. нижняя трахеостомия

Г. коникотомия

Спинно-мозговая пункция проводится в отделе позвоночника

- А. шейном
- Б. грудном
- В. поясничном

Звукопроводящий отдел звукового анализатора составляют

- А. наружное ухо, слуховая труба, улитка
- Б. слуховые косточки, слуховая труба, наружный слуховой проход
- В. наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо
- Г. наружное ухо, среднее ухо, перилимфа и эндолимфа улитки

Границей между носоглоткой и ротоглоткой является

- А. горизонтальная плоскость, проведенная через твердое небо
- Б. горизонтальная плоскость, проведенная через поверхность языка
- В. верхний полюс небных миндалин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между образованием и его локализацией. Образование:

1. Кровоточащий полип носа. Локализация:

- А. Носоглотка;
 - Б. Носовая перегородка;
 - В. В/ч пазуха;
 - Г. Клетки решетчатого лабиринта.
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1- В
 - Г. 1-Г

Соотношение восприятия звучания камертона с 128 по воздушной и костной проводимости называется опытом

- А. вебера
- Б. швабаха
- В. ринне
- Г. желле

Основная этиологическая роль в возникновении ангины у детей принадлежит

- А. вирусам
- Б. спирохетам
- В. золотистому стафилококку
- Г. бета-гемолитическому стрептококку группы а

Кровоснабжение небных миндалин осуществляется из артериальной системы

- А. наружной сонной артерии
- Б. внутренней сонной артерии
- В. наружной и внутренней сонной артерии

Конической называется связка

- А. щито-перстневидная
- Б. перстне-трахеальная
- В. щито-подъязычная
- Г. надгортанно-щитовидная

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Сопоставьте термин и локализацию воспаления.

- А. Воспаление слизистой оболочки носа;
- Б. Воспаление слизистой оболочки глотки;
- В. Воспаление слизистой оболочки гортани.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Основная этиологическая роль в возникновении бактериальной ангины принадлежит

- А. бета-гемолитическому стрептококку группы а
- Б. золотистому стафилококку
- В. пневмококку
- Г. зеленым стрептококку

Симптомом хронического тонзиллита является

- А. симптом кернига
- Б. симптом зака
- В. симптом оппенгейма
- Г. симптом гордона

Амнестическая афазия наблюдается при

- А. абсцессе лобной доли головного мозга
- Б. абсцессе мозжечка
- В. менингите
- Г. абсцессе височной доли головного мозга

Воздушные кисты гортани исходят из

- А. валлекул
- Б. грушевидных синусов
- В. гортанных желудочков
- Г. щито-подъязычной мембраны

Диагноз моноцитарной ангины устанавливается после исследования

- А. мочи
- Б. крови
- В. бактериологического
- Г. цитологического

К непарным хрящам гортани относят

- А. перстневидный
- Б. черпаловидный
- В. клиновидный
- Г. рожковидный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Катаральный фарингит.

- А. Разлитая гиперемия слизистой оболочки;
- Б. Бледная и сухая слизистая оболочка;
- В. Утолщение боковых валиков глотки и увеличение лимфоидных гранул.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Амнестическая афазия наблюдается при

- А. тромбозе кавернозного синуса
- Б. тромбозе сигмовидного синуса
- В. абсцессе височной доли головного мозга
- Г. абсцессе мозжечка

Метод исследования остроты слуха с помощью камертонов называется

- А. аудиометрия
- Б. акуметрия
- В. импедансометрия
- Г. тимпанометрия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между образованием и его локализацией:

1. Глоточная миндалина:

- А. Носоглотка;**
- Б. Ротоглотка;**
- В. Гортаноглотка.**

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Срочная трахеостомия показана при остром стенозе гортани в стадии

- А. компенсации
- Б. неполной компенсации
- В. декомпенсации
- Г. терминальной

Вторым названием ретрофарингеального абсцесса является абсцесс

- А. Окологлоточный
- Б. Паратонзиллярный
- В. Заглоточный
- Г. Крыло-челюстного пространства

Ретрофарингеальный (заглоточный) абсцесс чаще всего развивается в _____ возрасте

- А. Пожилом
- Б. Неонатальном
- В. Взрослом
- Г. Детском

Симптомы одностороннего паралича в первые дни после появления заболевания включают в себя: поперхивание, ощущение инородного тела в горле и

- А. Дисфагию
- Б. Дисфонию
- В. Боль в горле
- Г. Кашель

При рожистом воспалении наружного слухового прохода барабанная перепонка бывает

- А. Интактной
- Б. Гиперемированной
- В. Втянутой
- Г. Буллезно измененной

При мезофарингоскопии шпателем отжимают ____ языка

- А. Передние две трети
- Б. Переднюю треть
- В. Задние две трети
- Г. Корень языка

В ближайший послеоперационный период после аденотомии ревизия носоглотки проводится при

- А. Носовом кровотечении
- Б. Отсутствии носового дыхания
- В. Тубоотите
- Г. Рецидивирующем аденоидите

К характерным симптомам отогенного абсцесса мозжечка относят

- А. Анамнестическую афазию
- Б. Адиадохокинез, атаксию
- В. Двустороннее промахивание при пальце-носовой пробе
- Г. Моторную афазию

Осмотр верхнего отдела глотки называется

- А. Эпифарингоскопией
- Б. Фарингоскопией
- В. Гипофарингоскопией
- Г. Передней риноскопией

Осложнением ангины у взрослых может быть абсцесс

- А. Височной доли мозга
- Б. Эпидуральный
- В. Надгортаника
- Г. Паратонзиллярный

Двусторонний паралич гортани может вызвать

- А. Опухоль мозга
- Б. Опухоль средостения
- В. Правосторонняя пневмония
- Г. Расширение диаметра аорты

Больных отогенным менингитом срочно госпитализируют в _____ отделение

- А. Инфекционное
- Б. Нейрохирургическое
- В. Оториноларингологическое
- Г. Неврологическое

Тактикой лечения сумки торнвальдта является

- А. Динамическое наблюдение
- Б. Удаление кисты
- В. Марсупиализация
- Г. Зондирование сумки

Ангины при дифтерии характеризуют умеренная гиперемия миндалин, покрытых сероватым налётом, умеренная болезненность при глотании и

- А. Глоссит, тошнота, потливость
- Б. Увеличение печени и селезёнки
- В. Умеренно увеличенные и болезненные зачелюстные лимфатические узлы
- Г. Быстро наступающий некротический распад, регионарный лимфаденит

Объективным методом диагностики патологического процесса в клиновидной пазухе является _____ околоносовых пазух

- А. Рентгенография
- Б. Ультразвуковое исследование
- В. Компьютерная томография
- Г. Диафаноскопия

Для юношеской ангиофибromы стадии iva характерно распространение опухоли

- А. В крылонёбную ямку или верхнечелюстную, решетчатую или клиновидную пазухи
- Б. Под твёрдой мозговой оболочкой без вовлечения кавернозного синуса, гипофиза и перекрёста зрительных нервов
- В. Под твёрдой мозговой оболочкой и вовлечение в опухолевый процесс кавернозного синуса, гипофиза или перекрёста зрительных нервов
- Г. В глазницу или подвисочную ямку с локализацией снаружи твёрдой мозговой оболочки

Препаратом выбора для ингаляций при стенозе гортани I степени является

- А. Дексаметазон
- Б. Будесонид
- В. Гидрокортизон
- Г. Преднизолон

При рубцовом стенозе в области комиссуры гортани протяженностью 4 мм применяют

- А. Многоэтапный метод хирургического лечения экстраларингеальным доступом
- Б. Многоэтапное бужирование гортани
- В. Удаление рубцов и установку эндопротеза эндоларингеальным доступом
- Г. Латерофиксацию голосовой складки

Наиболее значимым возбудителем острых бактериальных тонзиллофарингитов является

- А. *Staphylococcus aureus*
- Б. *Streptococcus pneumoniae*
- В. *Streptococcus viridans*
- Г. *Streptococcus pyogenes*

Наиболее распространенным видом консервативного лечения хронического неспецифического тонзиллита является

- А. Иглорефлексотерапия
- Б. Промывание лакун нёбных миндалин
- В. Гипосенсибилизирующая терапия
- Г. Иммуностимулирующее воздействие

При остром среднем отите системные антибиотики обязательно следует назначить

- А. У детей младше четырех лет
- Б. При сохранении симптомов более 72 часов
- В. При наличии ушного шума
- Г. При двустороннем процессе

«Лимфаденоидное глоточное кольцо» вальдейера - пирогова является

- А. Лимфоидным аппаратом носоглотки
- Б. Патологическим образованием
- В. Лимфоидным аппаратом глотки
- Г. Нёбными миндалинами

К современному эффективному методу лечения стойкой дисфункции слуховой трубы относится

- А. Баллонная дилатация глоточного устья
- Б. Электростимуляция мышц
- В. Катетеризация
- Г. Продувание баллоном Политцера

Понятие патологии гортани «ларингиты» объединяет

- А. Функциональные заболевания гортани
- Б. Органические заболевания дыхательной системы
- В. Органические заболевания гортани
- Г. Функциональные расстройства шейных мышц

Для одонтогенных синуситов характерной флорой являются

- А. Анаэробы
- Б. Аэробы
- В. Грибы
- Г. Простейшие

Распространенный цианоз, стридорозное дыхание, вынужденное положение, активное участие дополнительной мускулатуры в акте дыхания характеризует

- А. Бронхиальную астму
- Б. Эмфизему легких
- В. Субкомпенсированный стеноз гортани
- Г. Декомпенсированный стеноз гортани

Аллергическая форма вазомоторного ринита характеризуется увеличением в крови

- А. Эозинофилов
- Б. Макрофагов
- В. Нейтрофилов
- Г. Базофилов

Для ложного крупа характерен

- А. Истерический ларингоспазм
- Б. Отек слизистой оболочки подскладочного пространства
- В. Образование дифтеритических налетов на голосовых складках
- Г. Двусторонний паралич гортани

Ототоксическим действием обладают

- А. Макролиды
- Б. Цефалоспорины
- В. Аминопенициллины
- Г. Аминогликозиды

При хирургическом лечении срединных кист шеи у взрослых подъязычную кость

- А. Обязательно резецируют
- Б. Поднимают
- В. Сохраняют интактной
- Г. Не связывают со срединной кистой шеи

Глазная артерия принадлежит к системе _____ артерии

- А. Внутренней сонной
- Б. Клиновидно-нёбной
- В. Наружной сонной
- Г. Лицевой

Ринофима является осложнением

- А. Acne vulgooris
- Б. Acne rosacea
- В. Пемфигуса
- Г. Себорейного дерматита

К наиболее опасным для жизни осложнениям фурункула носа относят тромбоз кавернозного синуса и

- А. Тромбоз вен орбиты
- Б. Сепсис
- В. Тромбоз вен лица
- Г. Реактивный отёк мягких тканей носа

Отоскопическими признаками диагностики адгезивного среднего отита являются

- А. Перфорации барабанной перепонки и периодические выделения не гнойного характера из полостей среднего уха без признаков воспаления
- Б. Перфорации барабанной перепонки с омозолелыми краями с постоянными выделениями гнойного характера
- В. Втянутость и ограничение подвижности барабанной перепонки, наличие рубцов и отложений извести на барабанной перепонке
- Г. Гипертрофия тканей вблизи барабанной перепонки, утолщение или выбухание барабанной перепонки

Открытая гнусавость появляется при дефектах твёрдого и мягкого нёба, парезах и параличах мягкого нёба и

- А. Аденоидах
- Б. Хоанальных полипах
- В. Укорочении мягкого нёба
- Г. Новообразованиях

Для аллергического ринита характерно увеличение в крови

- А. Моноцитов
- Б. Нейтрофилов
- В. Лимфоцитов
- Г. Эозинофилов

Верхняя и нижняя щитовидные артерии являются ветвями _____ артерии

- А. Подключичной
- Б. Наружной сонной
- В. Общей сонной
- Г. Внутренней сонной

Заглочные абсцессы чаще возникают в возрасте (лет)

- А. До 3
- Б. 20-30
- В. 10-20
- Г. 3-10

Высокие тоны воспринимаются в _____ завитке улитки

- А. Латеральном
- Б. Основном
- В. Верхнем
- Г. Среднем

К объективным методам исследования слуха относят

- А. Пороговую тональную аудиометрию
- Б. Импедансометрию
- В. Шепотную и разговорную речь
- Г. Речевую аудиометрию

К острой форме тонзиллита относят

- А. Атрофическую
- Б. Склеротическую
- В. Гипертрофическую
- Г. Лакунарную

Болезнь меньера характеризуется

- А. Нарушением походки
- Б. Повторяющимися приступами кохлеовестибулярных и вегетативных нарушений
- В. Головокружением при движении в транспорте
- Г. Нарушением координации движений

Одной из мышц, суживающих просвет голосовой щели, является

- А. Перстнещитовидная
- Б. Черпалонадгортанная
- В. Задняя перстнечерпаловидная
- Г. Боковая перстнечерпаловидная

При сфеноидите отделяемое обозревается в _____ носовом ходе

- А. Общем
- Б. Верхнем
- В. Среднем
- Г. Нижнем

Ложный круп характеризуется отеком _____ отдела гортани

- А. Подголосового
- Б. Голосового
- В. Области валекул
- Г. Вестибулярного

Струп в полости рта и в глотке при ожогах азотной кислотой имеет _____ окраску

- А. Белую
- Б. Черную
- В. Желтую
- Г. Бурую

Контроль барофункции уха обязательно проводят у

- А. Связистов
- Б. Водолазов
- В. Шоферов
- Г. Рабочих шумных цехов

Для экссудативного отита правильной тимпанограммой является тип

- А. Ad
- Б. В
- В. А
- Г. С

При фурункуле носа наиболее опасным осложнением выступает

- А. Образование свища
- Б. Реактивный отёк мягких тканей носа
- В. Тромбоз вен лица
- Г. Тромбоз пещеристой пазухи

Гноетечение при остром гнойном среднем отите обычно

- А. Длится 2 недели
- Б. Продолжается 3-4 недели
- В. Продолжается 5-7 дней
- Г. Не прекращается

При фиброме носоглотки лечение всегда является

- А. Хирургическим
- Б. Комбинированным
- В. Химиотерапевтическим
- Г. Консервативным

Для открытой резаной раны на уровне щито-подъязычной мембраны характерно

- А. Отсутствие голоса
- Б. Затрудненное дыхание
- В. Наличие подкожной эмфиземы
- Г. Зияние краев раны

«Лимфаденоидное глоточное кольцо» вальдейера - пирогова образуют две нёбные миндалины, одна глоточная, одна язычная и

- А. Лимфоидные гранулы
- Б. Боковые столбы глотки
- В. Гортанные миндалины
- Г. Две трубные миндалины

Сроки антибиотикотерапии затяжного острого среднего отита и рецидивирующего среднего отита при пероральном приеме препаратов должны составлять не менее (пороговое значение) _____ дней

- А. 7
- Б. 18
- В. 5
- Г. 14

При эндоскопической ревизии лобного кармана основным анатомическим ориентиром является

- А. Крючковидный отросток
- Б. Решетчатая булла
- В. Место прикрепления средней носовой раковины
- Г. Основание Agger nasi

Певческие узелки в гортани располагаются

- А. В средней трети гортанных желудочков
- Б. На границе передней и средней трети гортани
- В. На границе передней и средней трети голосовых складок
- Г. В задней трети гортани в области черпаловидных хрящей

Пансинусит является воспалением пазух

- А. Всех околоносовых
- Б. Околоносовых только одной стороны
- В. Верхнечелюстных
- Г. Только двух околоносовых

Твердые округлой формы инородные тела, как правило, извлекают из слухового прохода посредством применения

- А. Ушного пинцета
- Б. Промывания
- В. Ушных щипцов
- Г. Тупого крючка

При рентгенологическом исследовании у пациента с инородным телом в гортани хуже всего определяются кости

- А. Барана
- Б. Рыбы
- В. Курицы
- Г. Коровы

Латерализацию звука исследуют при пробе

- А. Федеричи
- Б. Швабаха
- В. Вебера
- Г. Ринне

Для разрыва цепи слуховых косточек характерна тимпанометрическая кривая типа

- А. Е
- Б. С
- В. А
- Г. В

Головные боли в области лба, затрудненное носовое дыхание, наличие гнойных полосок в среднем носовом ходе с обеих сторон позволяет заподозрить

- А. Риносклерому
- Б. Острый двусторонний гнойный гайморит
- В. Аденоидит
- Г. Острый ринит

Юношеская ангиофиброма является опухолью

- А. Гортани
- Б. Носоглотки
- В. Основания черепа
- Г. Наружного уха

Развитие рубцового стеноза дыхательных путей в местах физиологического сужения характеризует

- А. Новообразования
- Б. Склерому
- В. Туберкулез
- Г. Пневмонию

Чаще всего при эптитимпанитах имеют место выделения из полостей среднего уха

- А. Обильные светлые, тягучие
- Б. Без запаха, слизисто-гнойного характера, желтоватого цвета
- В. С неприятным запахом серого цвета или с неприятным запахом с чешуйками, напоминающие творожистые массы
- Г. Без запаха с примесью крови

Диагноз «моноцитарная ангина» устанавливается после исследования

- А. Мочи
- Б. Крови
- В. Цитологического
- Г. Бактериологического

Паракузис вилизии отмечается при

- А. Адгезивном отите
- Б. Болезни Менъера
- В. Отосклерозе
- Г. Мезотимпаните

Нижняя носовая раковина представляет собой

- А. Самостоятельную кость
- Б. Отросток верхней челюсти
- В. Отросток клиновидной кости
- Г. Отросток решетчатой кости

Гранулёмой стюарта является

- А. Летальная срединная гранулёма
- Б. Проявление туберкулёзного процесса
- В. Гранулёматозный процесс в третичном периоде сифилиса
- Г. Гранулёма при склероме

С барабанной полостью через слуховую трубу контактирует

- А. Боковая стенка ротоглотки
- Б. Ротоглотка
- В. Гортаноглотка
- Г. Носоглотка

Наиболее часто развивается паратонзиллярный абсцесс

- А. Передненижний
- Б. Передневерхний
- В. Боковой
- Г. Задний

Длительное пребывание инородного тела в слуховом проходе приводит к

- А. Нейросенсорной тугоухости
- Б. Образованию отолита
- В. Отосклерозу
- Г. Образованию ринолита

Гиперпластические узелки гортани чаще всего локализуются

- А. На свободном крае надгортанника
- Б. В межчерпаловидном пространстве
- В. В области передней комиссуры
- Г. В задней трети голосовых складок

Острый синусит является воспалением слизистой оболочки

- А. Околоносовых пазух
- Б. Носоглотки
- В. Гортани
- Г. Бронхов

К возбудителям отомикоза относят

- А. Стрептококки
- Б. Синегнойную палочку
- В. Грибы
- Г. Стафилококки

Парацентез барабанной перепонки при остром среднем отите обычно делают в

- А. Квадранте задне-нижнем
- Б. Месте наибольшего выбухания
- В. Квадранте передне-верхнем
- Г. Квадранте передне-нижнем

При поражении звукопроводящего аппарата при тональной пороговой аудиометрии выявляют

- А. Повышение порогов при костном проведении
- Б. Повышение порогов при воздушном проведении
- В. Костно-воздушный разрыв
- Г. Отсутствие костно-воздушного интервала

Волчанкой чаще поражаются

- А. Средние носовые раковины
- Б. Крылья носа и носовая перегородка
- В. Нижние носовые раковины
- Г. Область ситовидной пластинки

Причиной возникновения контактной язвы гортани является

- А. Сифилис
- Б. Перенапряжение голосовой функции
- В. Туберкулез
- Г. Вирусная инфекция

Характерной чертой первичного сифилиса глотки считают

- А. Изменения со стороны мягкого нёба
- Б. Односторонний характер поражения
- В. Открытую гнусавость
- Г. Симметричность расположения патологических элементов

Под реэдукацией слуха понимают

- А. Выпадение слуха на определенных частотах
- Б. Раздражение органа слуха звуковыми колебаниями разной интенсивности
- В. Восстановление восприятия звука на определенных частотах
- Г. Тренировку слуха различными тонами

Под аллергическим ринитом понимают

- А. Симптом системного заболевания соединительной ткани
- Б. Острый инфекционный процесс
- В. Хронический инфекционный процесс
- Г. Хроническое аллергическое воспаление слизистой оболочки носа

Больной гортанной ангиной госпитализируется

- А. Не всегда, возможно амбулаторное лечение
- Б. Обязательно
- В. Только в случае наличия у больного осложнений
- Г. При сопутствующей соматической патологии

Экранирующая функция первичной барабанной перепонки заключается в

- А. Препятствии попадания звуковой волны на вторичную барабанную перепонку
- Б. Предотвращении попадания инфекции в среднее ухо
- В. Защите овального окна и стремечка внутри него от громких звуков
- Г. Защите слуховых косточек от физических раздражителей

Ринолит представляет собой

- А. Опухоль носа
- Б. Хронический насморк
- В. Кисту носа
- Г. Носовой камень

Оксигенотерапия при остром обструктивном ларингите

- А. Показана только при стенозе гортани III степени
- Б. Показана при стенозе гортани II степени
- В. Показана при стенозе гортани I степени
- Г. Не показана

Местной причиной носового кровотечения наиболее часто является

- А. Атеросклероз
- Б. Острый лейкоз
- В. Травма носа
- Г. Риносинусит

При отсутствии патологии среднего уха регистрируется тимпанограмма типа

- А. Е
- Б. В
- В. А
- Г. С

Диагноз «менингит» устанавливается на основании данных

- А. Анализа крови
- Б. Спинномозговой пункции
- В. Анализа мочи
- Г. Стерильной пункции

Ангина является острым воспалением

- А. Задней стенки глотки
- Б. Передних нёбных дужек
- В. Всех отделов глотки
- Г. Нёбных миндалин

Признаками плоскоклеточного рака наружного слухового прохода на спиральной компьютерной томографии является

- А. Мякотканное образование в слуховом проходе
- Б. Образование в слуховом проходе хрящевой плотности
- В. Объемное образование наружного слухового прохода с деструктивными изменениями его стенок
- Г. Объемное образование наружного слухового прохода без деструктивных изменений его стенок

Основные патологические изменения при отосклерозе заключаются в фиксации

- А. Стремени
- Б. Молоточка
- В. Вторичной мембраны окна улитки
- Г. Наковальни

Тенденцию к озлокачествлению имеет _____ уха

- А. Хондрома
- Б. Фиброма
- В. Невус
- Г. Аденома

Моноцитарная ангина диагностируется

- А. На основании мезофарингоскопии
- Б. С помощью тест-полоски
- В. На основании исследования крови
- Г. На основании микробиологического исследования

В полости носа задерживается _____ % вдыхаемой пыли и бактерий

- А. 40 – 60
- Б. 60 – 80
- В. 30 – 40
- Г. 10 – 20

Хронический тонзиллит характеризуется симптомом

- А. Гордона
- Б. Кёрнига
- В. Зака
- Г. Оппенгейма

Кровоснабжение клиновидной пазухи осуществляется из _____артерии

- А. Ушно-височной
- Б. Верхнечелюстной
- В. Слезной
- Г. Крылонёбной

Термин петроапикит означает

- А. Воспаление верхушки пирамиды височной кости
- Б. Воспаление скулового отростка
- В. Гнойное расплавление внутренних ячеек верхушки сосцевидного отростка
- Г. Воспаление сосцевидного отростка

Вращательная проба проводится в кресле

- А. Эвальди
- Б. Проетца
- В. Гельмгольца
- Г. Барани

Тактикой лечения при грибковом теле верхнечелюстной пазухи является

- А. Только эндоскопическое удаление
- Б. Только противогрибковая терапия
- В. Удаление с последующей системной противогрибковой терапией
- Г. Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе по Колдуэллу-Люку

К iii типу хордэктомии относят

- А. Чрезмышечную
- Б. Тотальную
- В. С включением подскладочного пространства
- Г. С включением черпаловидного хряща

[Вернуться в начало](#)