

Тесты с вопросами по специальности «Оториноларингология» для аттестации 1 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/lor/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Оториноларингология» для аккредитации и других экзаменов (3900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/otorinolaringolog/

2) Тесты для аккредитации «Сурдология-оториноларингология» (1100 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/surdologiya/

3) Сурдология-оториноларингология (аттестация — тесты с ответами)

→ medik-otvet.ru/product/surdolog/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

1 категория

[Вернуться в начало](#)

При отосклерозе выполняется операция

- А. антромастотомия
- Б. стапедопластика
- В. аттикоантромия
- Г. тимпанопластика

Иннервация гортани осуществляется

- А. блуждающим нервом
- Б. языкоглоточным нервом
- В. отводящим нервом
- Г. тройничным нервом

Отдел височной кости, в котором находится внутреннее ухо

- А. сосцевидный отросток
- Б. чешуя височной кости
- В. пирамида
- Г. скуловой отросток

К звукопроводящему отделу звукового анализатора относится

- А. наружное ухо, барабанная перепонка, слуховые косточки
- Б. внутреннее ухо
- В. преддверно-улитковый нерв
- Г. первый нейрон звукового анализатора

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и возбудителем. Заболевание:

1. Лакунарная ангина. Возбудитель:

- А. Бацилла леффлера;
 - Б. Веретенообразная палочка + спирохета полости рта;
 - В. Стрептококк.
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Соотнесите анатомические образования и локализацию:

1. Кавернозный синус.

- А. Передняя черепная ямка;
 - Б. Средняя черепная ямка;
 - В. Задняя черепная ямка.
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Соотнесите структуры, обеспечивающие соответствующие функции звукового анализатора:

1. Звукопроведение.

А. Ушная раковина;

Б. Улитка;

В. Наружный слуховой проход;

Г. Кортиев орган;

Д. Слуховые косточки.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Пункция верхнечелюстной пазухи проводится через носовой ход

А. общий

Б. нижний

В. средний

Г. верхний

Паралич мягкого неба сопровождается

А. нарушением обоняния

Б. закрытой гнусавостью

В. открытой гнусавостью

Г. затруднением носового дыхания

Характерными для дифтерии гортани являются симптомы

А. осиплость, сухой «старческий» кашель, постепенное нарастание симптомов стеноза гортани

Б. внезапное начало, инспираторная одышка, чистый голос, «лающий» кашель, быстрое развитие симптомов стеноза гортани

Воспаление всех придаточных пазух носа называется

А. полисинусит

Б. пансинусит

В. гемисинусит

Г. риносинусит

При гнойном сфеноидите отделяемое при риноскопии наблюдается в носовом ходе

- А. среднем
- Б. верхнем
- В. нижнем
- Г. общем

Диагноз моноцитарной ангины устанавливается после исследования

- А. мочи
- Б. крови
- В. бактериологического
- Г. цитологического

Границей между носоглоткой и ротоглоткой является

- А. горизонтальная плоскость, проведенная через твердое небо
- Б. горизонтальная плоскость, проведенная через поверхность язык
- В. верхний полюс небных миндалин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте возбудителей и заболевания, основным этиологическим фактором которого они являются:

1. Bacteriae leptotrix.

- А. Ангина вульгарная;
- Б. Ангина симановского – венсана – плаута;
- В. Гиперкератоз глотки;
- Г. Эпиглоттит;
- Д. Озена.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Предпосылкой развития ложного крупа является

- А. атопический дерматит
- Б. пневмония
- В. острый ринит
- Г. ангина

Холестеатома характерна для

- А. отосклероза
- Б. адгезивного отита
- В. хронического гнойного мезотимпанита
- Г. хронического гнойного эптитимпанита

Наиболее часто риногенные внутричерепные осложнения возникают как осложнение

- А. гайморита
- Б. фронтита
- В. этмоидита
- Г. сфеноидита

Задняя стенка глотки состоит из слоев

- А. одного
- Б. двух
- В. трех
- Г. четырех

Слезно-носовой канал открывается в носовой ход

- А. верхний
- Б. средний
- В. нижний
- Г. общий

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте парные и непарные хрящи гортани:

1. Непарные хрящи.

- А. Щитовидный;
- Б. Черпаловидный;
- В. Надгортанник;
- Г. Рожковидный;
- Д. Перстневидный.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Для промывания серных пробок рекомендуется использовать воду температурой

- А. 25 °C
- Б. 30 °C
- В. 37 °C
- Г. 49 °C

Патогенетической основой болезни меньера считается

- А. гидропс лабиринта
- Б. наличие холестеатомы
- В. нарушения в эндокринной системе
- Г. артериальная гипертензия

При проведении тональной пороговой аудиометрии при поражении звукопроводящего отдела звукового анализатора мы наблюдаем

- А. снижение костного и воздушного звукопроводения
- Б. снижение воздушного звукопроводения
- В. снижение костного звукопроводения
- Г. островки звука

У детей гортань находится на уровне шейных позвонков

- А. V-VI
- Б. III-IV
- В. IV-VI
- Г. II-III

Заглочные абсцессы чаще бывают в возрасте

- А. до 3-х лет жизни
- Б. от 3 до 10 лет
- В. от 10 до 20 лет
- Г. от 20 лет и старше

При переходе воспалительного процесса на околоминдаликовую клетчатку может развиваться

- А. парафарингеальный абсцесс
- Б. паратонзиллярный абсцесс
- В. сиалоаденит
- Г. ретрофарингеальный абсцесс

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте костные и хрящевые составляющие носовой перегородки:

1. Костная часть перегородки носа.

А. Сошник;

Б. Слезная кость;

В. Перпендикулярная пластинка решетчатой кости;

Г. Четырехугольный хрящ.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Инородные тела бронхов чаще локализуются

А. в левом бронхе

Б. в правом бронхе

В. одинаково часто как в левом, так и в правом

Г. в области бифуркации трахеи

Адиадохокинез является специфическим симптомом поражения

А. височной доли головного мозга

Б. мозжечка

В. лобной доли головного мозга

Г. лабиринта

Причиной нарушения подвижности мягкого неба при дифтерии является

А. отек мягких тканей глотки

Б. токсический парез мышц небной занавески

В. парез лицевого нерва

Г. парез языкоглоточного нерва

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте характеристики сенсоневральной тугоухости:

1. I степень.

- А. Потеря слуха 26 – 40 дБ;
- Б. Потеря слуха 41 – 55 дБ;
- В. Потеря слуха 56 – 70 дБ;
- Г. Потеря слуха 71 – 90 дБ;
- Д. Потеря слуха более 91 дБ.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Тело первого нейрона вестибулярного анализатора располагается в

- А. барабанную полость
- Б. преддверии
- В. улитке
- Г. внутреннем слуховом проходе

При закрытии обонятельной щели наступает

- А. эссенциальная гипо- или аносмия
- Б. респираторная гипо-или аносмия
- В. кокасмия

Наиболее вероятный путь при распространении инфекции из среднего уха при субдуральном абсцессе

- А. гематогенный
- Б. контактный
- В. лимфогенный
- Г. преформированный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте онп и носовые ходы, в которые открываются их соустья:

1. Средний носовой ход.

А. Клиновидная пазуха;

Б. Верхнечелюстная пазуха;

В. Лобная пазуха;

Г. Передние клетки решетчатого лабиринта;

Д. Средние клетки решетчатого лабиринта.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Рецидивирующие носовые кровотечения наблюдаются при хроническом рините

А. вазомоторном

Б. гипертрофическом

В. катаральном

Г. атрофическом

После коникотомии следует

А. назначить противовоспалительную терапию

Б. переместить канюлю в трахею (сделав верхнюю или нижнюю трахеостомию)

В. провести фиброскопию

Г. сделать томограмму

Канал улитки состоит из

А. лестницы преддверия и барабанной лестницы

Б. лестницы барабанной и лестницы лабиринта

В. лестницы лабиринта и лестницы преддверия

Г. лестницы преддверия и лестницы вестибулярной

При заболевании мешочков преддверия появляется

А. отолитовый нистагм

Б. спонтанный нистагм

В. оптокинетический нистагм

Г. позиционный нистагм

Пункцию верхнечелюстной пазухи проводят через носовой ход

- А. общий
- Б. нижний
- В. средний
- Г. верхний

Скорость распространения звуковых колебаний в воздухе составляет

- А. 332 м/с
- Б. 950 м/с
- В. 1450 м/с
- Г. 300000 м/с

К анестезии слизистой оболочки гортани приводит поражение

- А. тройничного нерва
- Б. нижнего гортанного нерва
- В. верхнего гортанного нерва
- Г. языкоглоточного нерва

К симптомам хронического тонзиллита относится

- А. симптом зака
- Б. симптом шеффера
- В. симптом оппенгейма
- Г. симптом гордона

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте формы воспаления онп:

1. Смешанная форма.

- А. Кистозная;
- Б. Гнойно – полипозная;
- В. Катаральная;
- Г. Пристеночно - гиперпластическая;
- Д. Гребень клиновидной кости.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

В каждой половине полости носа имеется носовых ходов

- А. два
- Б. три
- В. четыре
- Г. пять

С латеральной стенкой клиновидной пазухи граничит

- А. сигмовидный синус
- Б. пещеристый синус
- В. поперечный синус
- Г. продольный синус

признаком гнойного воспаления клиновидной пазухи является наличие гноя в

- А. верхнем носовом ходе
- Б. среднем носовом ходе
- В. нижнем носовом ходе
- Г. общем носовом ходе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между образованием и его локализацией. Образование:

1. Кровоточащий полип носа. Локализация:

- А. Носоглотка;
- Б. Носовая перегородка;
- В. В/ч пазуха;
- Г. Клетки решетчатого лабиринта.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

Функциональная роль движений в перстнещитовидном суставе заключается в

- А. расширении голосовой щели
- Б. сужении голосовой щели
- В. изменении натяжения голосовых складок
- Г. опускании надгортанника

К звукопроводящему отделу звукового анализатора относится

- А. среднее ухо, внутреннее ухо
- Б. наружный слуховой проход, барабанная полость, улитка
- В. наружное ухо, среднее ухо, жидкости улитки
- Г. слуховые косточки и жидкости полукружных каналов

Сигмовидный синус находится

- А. в средней черепной ямке
- Б. в задней черепной ямке
- В. в основании черепа
- Г. в основании черепа

Во втором законе Эвальда говорится, что

- А. направление движения эндолимфы соответствует направлению медленного компонента нистагма
- Б. вращение тела вправо возбуждает левый лабиринт
- В. вращение тела влево возбуждает правый лабиринт
- Г. направление движения эндолимфы соответствует направлению быстрого компонента нистагма

Острый ринит имеет стадии

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

При проведении вращательной пробы в кресле барани голову больного наклоняют

- А. на левый бок
- Б. на правый бок
- В. на 30 градусов вперед
- Г. на 90 градусов вперед

Ангины чаще встречаются в возрасте

- А. до 5 лет
- Б. от 5 до 30 лет
- В. от 30 до 50 лет
- Г. от 50 и старше

Адекватный метод лечения при токсико-аллергической форме I степени хронического тонзиллита

- А. промывание лакун небных миндалин
- Б. тонзиллотомия
- В. тонзиллэктомия
- Г. физиотерапевтическое лечение

Инородные тела пищевода чаще встречаются в отделе

- А. шейном
- Б. грудном
- В. брюшном

В формировании медиальной стенки полости носа участвует

- А. перпендикулярная пластинка небной кости
- Б. лобные отростки верхней челюсти
- В. носовые отростки лобной кости
- Г. перпендикулярная пластинка решетчатой кости

Типичной локализацией кровотока полипа полости носа является

- А. перпендикулярная пластинка решетчатого лабиринта
- Б. дно полости носа
- В. хрящевая часть носовой перегородки
- Г. костная часть носовой перегородки

Лимфатическая сеть гортани наиболее выражена в отделе

- А. вестибулярном
- Б. среднем
- В. подскладочном

Гортань у детей находится на уровне шейных позвонков

- А. II-III
- Б. IV-VI
- В. III-IV
- Г. IV-VII

Сигмовидный синус находится в

- А. передней черепной ямке
- Б. средней черепной ямке
- В. задней черепной ямке
- Г. основании черепа

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Соотнесите анатомические образования, составляющие скелет наружного носа и носовой перегородки:

1. Скелет перегородки носа.

А. Лобная кость;

Б. Носовая кость;

В. Передняя носовая ость;

Г. Сошник;

Д. Гребень клиновидной кости.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Костный лабиринт заполнен

А. эндолимфой

Б. лимфой

В. ликвором

Г. перилимфой

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте стадию воспаления среднего уха и отоскопическую картину:

1. Острый тубоотит.

А. Мt гиперемирована, инфильтрирована, отечна, выбухает, пульсирует;

Б. Мt перфорирована, гиперемирована;

В. Втяжение mt – укорочение рукоятки молоточка, укорочение/исчезновение светового конуса;

Г. Мt местами петрифицирована, утолщена;

Д. Мt гиперемирована, отечна.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Кавернозный синус находится в

- А. передней черепной ямке
- Б. средней черепной ямке
- В. задней черепной ямке
- Г. основании черепа

В костном лабиринте выделяют отделов

- А. 1
- Б. 2
- В. 3
- Г. 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между образованием и его локализацией:

1. Глоточная миндалина:

- А. Носоглотка;
 - Б. Ротоглотка;
 - В. Гортаноглотка.
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1- В

Радикальная операция на ухе выполняется при

- А. отосклерозе
- Б. остром среднем гнойном отите
- В. мастоидите
- Г. хроническом гнойном среднем отите

Срочная трахеостомия показана при остром стенозе гортани в стадии

- А. компенсации
- Б. субкомпенсации
- В. декомпенсации
- Г. асфиксии

При ожоге гортани в первую очередь поражаются

- А. голосовые складки
- Б. вестибулярные складки
- В. гортанная поверхность надгортанника
- Г. язычная поверхность надгортанника

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и тактикой лечения. Заболевание:

1. Острый катаральный средний отит. Тактика лечения:

- А. Обезболивающие и противовоспалительные капли;
- Б. Продувание слуховых труб;
- В. Турунды с антибактериальной мазью в ухо.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Задние клетки решетчатого лабиринта открываются в носовой ход

- А. верхний
- Б. средний
- В. нижний
- Г. общий

Границы трахеи

- А. 4-5 шейный позвонок и 6 грудной позвонок
- Б. 6-7 шейный позвонок и 4-5 грудной позвонок
- В. 4-5 шейный позвонок и 5-6 грудной позвонок
- Г. нижний край щитовидного хряща и 5 грудной позвонок

Адекватные раздражитель рецепторов преддверия

- А. прямолинейное ускорение, ускорение силы тяжести
- Б. угловое ускорение, прямолинейное ускорение
- В. ускорение силы тяжести, угловое ускорение
- Г. прямолинейное ускорение, угловое ускорение

Опыт ринне при отосклерозе будет

- А. укорочен
- Б. удлинен
- В. положительный
- Г. отрицательный

При определении степени нистагма взгляд больного фиксируют

- А. в сторону быстрого компонента
- Б. перед больным
- В. в сторону медленного компонента
- Г. вниз

При опыте швабаха определяют

- А. длительность восприятия звука через кость
- Б. длительность восприятия звука по воздуху
- В. разницу в длительности восприятия звука по кости и по воздуху
- Г. латерализацию звука

В клинике отогенного абсцесса головного мозга выделяют стадий

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

Чувствительная иннервация глотки осуществляется

- А. второй веточкой тройничного нерва, блуждающим и подъязычным нервами
- Б. блуждающим нервом, первой и второй ветвями тройничного нерва
- В. первой и второй ветвями тройничного нерва и языкоглоточным нервом
- Г. языкоглоточным, блуждающим нервами и второй веточкой тройничного нерва

Санториниевы щели в наружном слуховом проходе располагаются на

- А. верхней стенке
- Б. задней стенке
- В. нижней стенке
- Г. передней стенке

Средние клетки решетчатого лабиринта открываются в носовой ход

- А. общий
- Б. нижний
- В. средний
- Г. верхний

Для петрозита характерно

- А. парез или паралич лицевого нерва
- Б. тригеминит
- В. двустороннее снижение слуха
- Г. боль при жевании

При отосклерозе первичный отосклеротический очаг чаще всего локализуется

- А. в области круглого окна
- Б. в области овального окна
- В. в области пирамидального возвышения
- Г. в области барабанного отверстия слуховой трубы

Для остановки кровотечения при травме шеи целесообразно применить

- А. холод местно
- Б. давящую повязку
- В. наложение лигатуры на кровоточащий сосуд
- Г. тампонаду раны

Абсолютные показания к трахеостомии

- А. уровень стеноза гортани
- Б. степень стеноза гортани
- В. причины стеноза гортани
- Г. возраст пациента

При опыте швабаха определяют

- А. длительность восприятия звука по воздуху
- Б. длительность восприятия звука по кости
- В. разницу в длительности восприятия звука по воздуху и по кости
- Г. латерализацию звука

Кортиев орган располагается в

- А. ампулах полукружных каналов
- Б. улитке
- В. преддверии
- Г. внутреннем слуховом проходе

Внутреннее ухо латерально граничит с

- А. барабанной полостью
- Б. слуховой трубой
- В. сосцевидным отростком
- Г. скуловым отростком

Наличие синюшных и белых пятен на слизистой оболочке полости носа характерно для хронического ринита

- А. гипертрофического
- Б. атрофического
- В. вазомоторного
- Г. катарального

Основная этиологическая роль в возникновении ангины у детей принадлежит

- А. зеленающему стрептококку
- Б. золотистому стафилококку
- В. бета-гемолитическому стрептококку группы а
- Г. аденовирусам

Инородные тела чаще локализуются в

- А. гортани
- Б. трахее
- В. бронхах

Для юношеской ангиофибromы основания черепа характерн

- А. затруднение носового дыхания
- Б. налет на небных миндалинах
- В. стекание гноя по задней стенке глотки
- Г. деформация лица

Заглочное пространство у детей содержит

- А. сосудисто-нервный пучок
- Б. лимфатические узлы
- В. слизистые железы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте стенки барабанной полости и образования, с которыми они граничат:

1. Верхняя стенка.

А. Внутренняя сонная артерия;

Б. Внутреннее ухо;

В. Сосцевидный отросток;

Г. Средняя черепная ямка.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

При гнойном сфеноидите отделяемое при риноскопии наблюдается в носовом ходе

А. общем

Б. нижнем

В. среднем

Г. верхнем

Предрасполагающим фактором к развитию фурункула носа является

А. хронический гастрит

Б. сахарный диабет

В. тиреотоксикоз

Г. хронический гипертрофический ринит

Кровоснабжение небных миндалин осуществляется из артериальной системы

А. наружной сонной артерии

Б. внутренней сонной артерии

В. наружной и внутренней сонной артерии

С латеральной стенкой клиновидной пазухи граничит синус

А. продольный

Б. поперечный

В. сигмовидный

Г. пещеристый

Передние клетки решетчатого лабиринта открываются в носовой ход

- А. верхний
- Б. средний
- В. нижний
- Г. общий

Барабанная струна является ветвью

- А. слухового нерва
- Б. вестибулярного нерва
- В. лицевого нерва
- Г. тройничного нерва

Рак гортани чаще развивается

- А. в вестибулярном и голосовом отделе
- Б. в вестибулярном отделе
- В. в подскладковом отделе
- Г. у женщин

Периферический рецептор звукового анализатора

- А. ампулярный аппарат
- Б. кортиев орган
- В. отолитовый аппарат
- Г. овальное окно

Характерным симптомом озоны является

- А. зловонный насморк
- Б. гипертрофия носовых раковин
- В. вязкий секрет
- Г. узкие носовые ходы

Предрасполагающим фактором к возникновению фурункула носа является

- А. бронхиальная астма
- Б. гипертоническая болезнь
- В. сахарный диабет
- Г. псориаз

Носовую перегородку образуют

- А. треугольный хрящ, решетчатый лабиринт, сошник
- Б. перпендикулярная пластинка решетчатой кости, сошник, четырехугольный хрящ, носовой гребешок верхней челюсти
- В. небная кость, сошник, четырехугольный хрящ
- Г. носовая кость, четырехугольный хрящ, сошник

У больного с поражением звуковоспринимающего отдела звукового анализатора правого уха звук в опыте вебера будет направлен в

- А. вправо
- Б. влево
- В. в обе стороны
- Г. в центр головы

Какую связку необходимо рассечь при асфиксии для вскрытия просвета гортани

- А. щитоподъязычную
- Б. щитонадгортанную
- В. перстнещитовидную
- Г. перстнетрахеальную

Степени отклонения туловища при пробе воячека

- А. одна
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

При отомикозе, вызванном грибом *aspergillus niger*, отделяемое будет иметь цвет

- А. черно – коричневый
- Б. желтоватый
- В. зеленоватый
- Г. бело – серый

Первый нейрон звукового анализатора располагается в

- А. барабанной полости
- Б. улитке
- В. преддверии
- Г. внутреннем слуховом проходе

Срочная трахеостомия производится при остром стенозе гортани

- А. 1-й степени
- Б. 2-й степени
- В. 3-й степени
- Г. 4-й степени

Слизистая оболочка голосовых складок представлена

- А. цилиндрическим мерцательным эпителием
- Б. многослойным плоским эпителием
- В. многослойным плоским эпителием

Симптомы, характерные для подскладочного ларингита

- А. постепенное начало, смешанная одышка, осиплость, сухой «старческий» кашель, постепенное нарастание симптоматики стеноза гортани
- Б. внезапное начало, инспираторная одышка, чистый голос, «лающий» кашель, быстрое развитие симптомов стеноза гортани
- В. постепенное начало, смешанная одышка, чистый голос, «лающий» кашель, постепенное нарастание симптоматики стеноза гортани

Сила громкой разговорной речи составляет

- А. 30 дБ
- Б. 50 дБ
- В. 65 дБ
- Г. 80 дБ

При хроническом атрофическом фарингите слизистая оболочка

- А. истончена
- Б. гиперемирована
- В. отечна
- Г. имеются увеличенные лимфоидные гранулы

Двигательная иннервация глотки осуществляется

- А. возвратным и языкоглоточным нервом
- Б. первой веточкой тройничного нерва и возвратным нервом
- В. языкоглоточным и подъязычным нервом
- Г. подъязычным и возвратным нервом

Воздушные кисты гортани исходят из

- А. гортанных желудочков
- Б. валлекул
- В. грушевидных синусов
- Г. вестибулярных складок

Основная этиологическая роль в возникновении бактериальной ангины принадлежит

- А. пневмококку
- Б. золотистому стафилококку
- В. бета-гемолитическому стрептококку группы а
- Г. зеленыющему стрептококку

Внутреннее ухо состоит из

- А. полукружных каналов, преддверия, барабанной полости
- Б. улитки, преддверия, внутреннего слухового прохода
- В. улитки, полукружных каналов, преддверия
- Г. преддверия, барабанной полости, внутреннего слухового прохода

Голосовые складки проецируются на щитовидный хрящ

- А. на границе верхней и средней трети
- Б. на границе нижней и средней трети
- В. посредине щитовидного хряща
- Г. у основания щитовидного хряща

Больного с ангиной при необходимости госпитализируют в

- А. инфекционное отделение
- Б. лор-отделение
- В. терапевтическое отделение
- Г. хирургическое отделение

Диагноз агранулоцитарной ангины устанавливается после исследования

- А. мочи
- Б. крови
- В. гистологического
- Г. бактериологического

На задней стенке преддверия лабиринта находится отверстие

- А. 1
- Б. 2
- В. 4
- Г. 5

Первый нейрон вестибулярного анализатора располагается в

- А. барабанной полости
- Б. улитке
- В. преддверии
- Г. внутреннем слуховом проходе

Внутренние мышцы гортани делятся на группы

- А. суживающие голосовую щель, расширяющие голосовую щель, натягивающие голосовые складки
- Б. натягивающие голосовые складки, суживающие голосовую щель
- В. расширяющие и суживающие голосовую щель
- Г. натягивающие, расширяющие голосовые складки, поднимающие гортань

Ухо человека воспринимает речевые частоты в диапазоне

- А. 50 – 100 гц
- Б. 8000 – 10000 гц
- В. 800 – 2000 гц
- Г. 10000 – 13000 гц

Постоянный симптом хронического среднего отита

- А. повышение температуры тела
- Б. боль в ухе
- В. перфорация барабанной перепонки
- Г. нарушение фланговой походки

Аденоидами называется гипертрофия

- А. небных миндалин
- Б. боковых валиков глотки
- В. носоглоточной миндалины
- Г. язычной миндалины

Пищевод имеет анатомических сужений

- А. одно
- Б. два
- В. три
- Г. четыре

В средний носовой ход открываются

- А. верхнечелюстная пазуха, лобная пазуха, клиновидная пазуха
- Б. носо-слезный канал, верхнечелюстная пазуха, передние клетки решетчатого лабиринта
- В. лобная пазуха, передние и средние клетки решетчатого лабиринта, верхнечелюстная пазуха
- Г. клиновидная пазуха, задние клетки решетчатого лабиринта

Направление нистагма определяется

- А. направлением медленного компонента нистагма
- Б. направлением быстрого компонента нистагма
- В. самым больным
- Г. аудиометрией

Брадикардия характерна для

- А. менингита
- Б. лабиринтита
- В. абсцесса височной доли головного мозга
- Г. синустромбоза

Для продольного перелома височной кости наиболее характерно

- А. кровотечение из уха
- Б. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва
- В. гемианопсия
- Г. системное головокружение

Нижняя стенка полости носа образована

- А. крыловидный отросток клиновидной кости и небный отросток верхней челюсти
- Б. горизонтальная пластинка небной кости и крыловидный отросток клиновидной кости
- В. небный отросток верхней челюсти и горизонтальная пластинка небной кости
- Г. носовые кости и небный отросток верхней челюсти

Границей между ротоглоткой и гортаноглоткой является

- А. нижний край мягкого неба
- Б. корень языка и надгортанник
- В. нижние полюса небных миндалин
- Г. дно полости рта

Санториниевы щели располагаются в наружном слуховом проходе на

- А. нижней стенке
- Б. верхней стенке
- В. передней стенке
- Г. задней стенке

Симптом кернига наблюдается при

- А. арахноидите
- Б. лабиринтите
- В. менингите
- Г. сифилисе

У взрослых гортань находится на уровне шейных позвонков

- А. III-IV
- Б. IV-VII
- В. V-VII
- Г. IV-VI

К звуковоспринимающему отделу звукового анализатора относится

- А. покровная пластинка
- Б. кортиев орган
- В. эндолимфа
- Г. перилимфа

При миогенных парезах чаще поражаются мышцы гортани

- А. кивательная
- Б. черпалонадгортанные
- В. поперечные
- Г. голосовые

Метод исследования слуха с помощью камертонов называется

- А. аудиометрия
- Б. акуметрия
- В. импедансометрия
- Г. тимпанометрия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте фарингоскопические признаки хронического тонзиллита с названием их по автору:

1. Признак зака.

- А. Инфильтрация и гиперплазия краев передних дужек;
- Б. Гиперемия краев небных дужек;
- В. Отечность краев верхних отделов небных дужек.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Острый насморк имеет стадий

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

Разлитая гиперемия слизистой оболочки глотки наблюдается при

- А. грибковой ангине
- Б. лакунарной ангине
- В. ангине Симановского-Венсана
- Г. остром фарингите

Дыхательная функция полости носа исследуется с помощью

- А. эндоскопии полости носа
- Б. ринопневмометрии
- В. передней риноскопии
- Г. задней риноскопии

Естественное отверстие лобной пазухи располагается в носовом ходе

- А. общем
- Б. нижнем
- В. среднем
- Г. верхнем

Адекватный раздражитель рецепторов полукружных каналов

- А. угловое ускорение
- Б. прямолинейное ускорение
- В. прямолинейное и угловое ускорение
- Г. ускорение силы тяжести

Амнестическая афазия наблюдается при

- А. абсцессе лобной доли головного мозга
- Б. абсцессе мозжечка
- В. менингите
- Г. абсцессе височной доли головного мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения. Заболевание:

1. Искривление носовой перегородки. Метод лечения:

- А. Вазотомия н/носовых раковин;
 - Б. Подслизистая резекция перегородки носа;
 - В. Подслизистая конхотомия.
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1- В

Основная этиологическая роль в возникновении бактериальной ангины принадлежит

- А. бета-гемолитическому стрептококку группы а
- Б. золотистому стафилококку
- В. пневмококку
- Г. зеленающему стрептококку

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между исследуемым органом и методом исследования. Орган:

1. Нос и онп. Метод исследования:

А. Диафаноскопия;

Б. R- графия;

В. Задняя риноскопия;

Г. Передняя риноскопия.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

При травме гортани, осложненной кровотечением, пострадавший должен находиться в положении

А. сидя

Б. лежа на спине

В. лежа на противоположной повреждению стороне

Г. лежа на стороне повреждения или на животе

Для гемисинуита характерно

А. воспаление всех околоносовых пазух

Б. лево- или правостороннее воспаление всех пазух на одноименной стороне

В. поражение нескольких околоносовых пазух

Г. поражение одной околоносовой пазухи

В основе патогенеза отосклероза лежит

А. остеодистрофический процесс в лабиринте

Б. снижение внутрилабиринтного давления

В. повышение давления эндолимфы и наличие гидропса лабиринта

Г. деструкция отолитовых мембран

При рентгенологическом исследовании острых синуситов наблюдается

А. гомогенное снижение прозрачности пазухи

Б. пристеночное утолщение слизистой оболочки пазухи

В. неомогенное снижение прозрачности пазухи

Г. снижение прозрачности пазухи отсутствует

Отосклероз чаще наблюдается

- А. у девочек
- Б. у мальчиков
- В. у мужчин
- Г. у женщин

Острый вторичный тонзиллит наблюдается при

- А. гемобластозе
- Б. лейкозе
- В. гемофилии
- Г. капилляротоксикозе

В формировании верхней стенки полости носа участвует

- А. скуловая кость
- Б. продырявленная пластинка решетчатой кости
- В. альвеолярный отросток
- Г. верхняя стенка клиновидной пазухи

Положение больного в позе «ружейного курка» или «легавой собаки» наблюдается при

- А. отосклерозе
- Б. менингите
- В. лабиринтите
- Г. аэроотите

При остром стенозе гортани у детей чаще применяется

- А. верхняя трахеотомия
- Б. средняя трахеотомия
- В. нижняя трахеотомия
- Г. коникотомия

Гортань у детей соответствует уровню шейных позвонков

- А. IV-VI
- Б. II-III
- В. III-IV
- Г. IV-VII

Проникновение инфекции в среднее ухо при остром среднем отите происходит чаще всего

- А. транстимпанальным путем
- Б. тубарным путем
- В. гематогенным путем
- Г. лимфогенным путем

В носоглотке устье слуховой трубы располагается на

- А. верхней стенке
- Б. задней стенке
- В. боковой стенке
- Г. передней стенке

Наиболее частым путем распространения инфекции из среднего и внутреннего уха является

- А. контактный
- Б. лимфогенный
- В. гематогенный
- Г. лабиринтный

Начало пищевода соответствует проекции

- А. верхнего края щитовидного хряща
- Б. подъязычной кости
- В. нижнего края перстневидного хряща
- Г. нижнего края щитовидного хряща

Периферический рецептор звукового анализатора

- А. барабанная перепонка
- Б. ушная раковина
- В. слуховые косточки
- Г. кортиева орган

При стенозе гортани у детей чаще применяется

- А. верхняя трахеостомия
- Б. средняя трахеостомия
- В. нижняя трахеостомия
- Г. коникотомия

Внутреннее ухо располагается в

- А. барабанной полости
- Б. пирамиде височной кости
- В. чешуе височной кости
- Г. сосцевидном отростке

При сильном кровотечении из гортани для его остановки необходимо перевязать

- А. общую сонную артерию
- Б. внутреннюю сонную артерию
- В. наружную сонную артерию

Для поперечного перелома височной кости наиболее характерно

- А. ликворея
- Б. кровотечение из уха
- В. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва
- Г. гемианопсия

Ретрофарингеальный абсцесс развивается преимущественно в

- А. детском возрасте
- Б. зрелом возрасте
- В. пожилом возрасте
- Г. возраст значения не имеет

Через зев полость рта сообщается с отделом глотки

- А. верхним
- Б. средним
- В. нижним

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте стенки полости носа и образования, с которыми они граничат:

1. Нижняя.

А. Сошник;

Б. Четырехугольный хрящ;

В. Горизонтальная пластинка небной кости;

Г. Решетчатая кость;

Д. Продырявленная пластинка решетчатой кости.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Резорбция эндолимфы происходит в

А. в сферическом мешочке

Б. в эллиптическом мешочке

В. в эндолимфатическом мешочке

Г. в перепончатой улитке

Некротические изменения на миндалинах возникают при

А. агранулоцитозе

Б. фарингите

В. гриппе

Г. кори

Аудиометрический признак тимпанальной формы отосклероза

А. перцептивная тугоухость

Б. смешанная тугоухость

В. кондуктивная тугоухость

Г. скалярная тугоухость

Отоскопическим признаком отосклероза является

А. перфорация барабанной перепонки в ненапрянутой части

Б. нормальный вид или истончение барабанной перепонки

В. перфорация барабанной перепонки в натянутой части

Г. наличие петрификатов на барабанной перепонке

При экссудативном отите регистрируется тимпанограмма

- А. типа а
- Б. типа с
- В. типа b
- Г. типа d

Тело первого нейрона звукового анализатора располагается в

- А. улитке
- Б. ампулах
- В. мешочках преддверия
- Г. внутреннем слуховом проходе

Опыт ринне у больного с нейросенсорной тугоухостью будет

- А. удлинен
- Б. укорочен
- В. отрицательный
- Г. положительный

Спинно-мозговая пункция проводится в отделе позвоночника

- А. шейном
- Б. грудном
- В. поясничном

В глотке располагается миндалин

- А. три
- Б. четыре
- В. пять
- Г. шесть

Лимфатическая сеть гортани более развита в

- А. верхнем этаже
- Б. среднем этаже
- В. нижнем этаже

Среднее ухо состоит из

- А. барабанной перепонки, слуховой трубы, клеток сосцевидного отростка
- Б. слуховой трубы, барабанной полости, клеток сосцевидного отростка
- В. клеток сосцевидного отростка, слуховых косточек, барабанной перепонки
- Г. слуховых косточек, барабанной перепонки, слуховой трубы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения. Заболевание:

1. Отосклероз. Метод лечения:

А. Радикальная операция на ухе;

Б. Стапедопластика;

В. Операция на эндолимфатическом мешке.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Патогномоничным симптомом отосклероза является

А. гиперacusia

Б. аутофония

В. парacusis Willisii

Г. пресбиacusis

какой признак, характерный для синдрома молчащего синуса является

А. растяжение стенок клетки решетчатого лабиринта

Б. наличие дополнительного соустья

В. латерализация крючковидного отростка

Г. наличие тени полуовальной формы

Эритематозную форму сифилиса гортани следует дифференцировать с

А. аллергическим отеком

Б. катаральным ларингитом

В. атрофическим ларингитом

Г. гиперпластическим ларингитом

В клинике острого среднего отита выделяют

А. 1 стадию

Б. 2 стадии

В. 3 стадии

Г. 4 стадии

У детей гортань находится на уровне шейных позвонков

- А. IV-VI
- Б. III-IV
- В. III-VI
- Г. VI-VII

Естественное отверстие верхнечелюстной пазухи располагается в носовом ходе

- А. верхнем
- Б. среднем
- В. нижнем
- Г. общем

Гортань у взрослого человека находится на уровне шейных позвонков

- А. III-V
- Б. IV-VI
- В. IV-VII
- Г. V-VII

Глотка проецируется на шейные позвонки

- А. 1--3
- Б. 1--4
- В. 1--5
- Г. 1--6

На задней стенке барабанной полости находится

- А. пирамидальный отросток для стременной мышцы
- Б. круглое окно
- В. отверстие слуховой трубы
- Г. овальное окно

Задний паратонзиллярный абсцесс вскрывается через

- А. У-образное пространство нёбной дужки
- Б. Заднюю нёбную дужку
- В. Переднюю нёбную дужку
- Г. Нишу удаленной нёбной миндалины нёбной дужки

Лестница преддверия и барабанная лестница сообщаются через

- А. Окно улитки
- Б. Водопровод преддверия
- В. Окно преддверия
- Г. Геликотрему

Главной структурой остеомы является _____ основа

- А. Мягкотканная
- Б. Костная
- В. Жировая
- Г. Жидкостная

В зависимости от характера повреждающего фактора ожоги глотки бывают

- А. Физические, биологические
- Б. Гальванические, солнечные
- В. Газовые, электрические
- Г. Химические, термические

Наружные отиты классифицируются на

- А. Ограниченные и диффузные
- Б. Гранулезные и язвенные
- В. Катаральные и экссудативные
- Г. Атрофические и гипертрофические

При длительном одностороннем течении ринита у ребенка 2 лет необходимо исключить

- А. Инородное тело полости носа
- Б. Фурункул преддверия носа
- В. Перелом костей носа
- Г. Острый сфеноидит

Инородное тело полости носа характеризуется односторонним гнойным насморком с неприятным запахом и

- А. Односторонней деформацией ската носа
- Б. Гемилатеральным затруднением носового дыхания
- В. Отделяемым из носа кровянистого характера
- Г. Длительным затруднением носового дыхания

По международной классификации степеней тугоухости, II степень тугоухости соответствует нарушению слуха в диапазоне (в дБ)

- А. 26-40
- Б. 0-25
- В. 41-55
- Г. 56-70

Количество стадий стеноза гортани равняется

- А. Трех
- Б. Двум
- В. Четырем
- Г. Пяти

Вероятным признаком дифтерии гортани является ларингит

- А. С афонией при нормальной или субфебрильной температуре тела
- Б. С осиплостью голоса и грубым лающим кашлем
- В. С высокой температурой и интоксикацией
- Г. Сопровождающийся конъюнктивитом и пятнисто-папулезной сыпью

Парацентез производится в _____ квадранте барабанной перепонки

- А. Передненижнем
- Б. Задненижнем
- В. Передневерхнем
- Г. Задневерхнем

Степень тяжести синдрома апноэ во сне определяется

- А. Наличием сонливости в дневное время
- Б. Состоянием сердечно-сосудистой системы
- В. Количеством эпизодов апноэ/гипопноэ во сне
- Г. Наличием неврологических заболеваний

Наиболее частым путем проникновения инфекции при паратонзиллите является

- А. Тонзиллогенный
- Б. Отогенный
- В. Лимфогенный
- Г. Гематогенный

Методом исследования околоносовых пазух путем просвечивания является

- А. Эндоскопия
- Б. Риноманометрия
- В. Диафаноскопия
- Г. Риноскопия

При дифференциальной диагностике расстройства рецептивной речи для исключения тугоухости необходимо проведение

- А. Тимпанометрию
- Б. Магнитно-резонансную томографию
- В. Аудиометрию
- Г. Электроэнцефалографию

Двусторонняя артррезия хоан характеризуется

- А. Затруднением при глотании
- Б. Отделяемым из носа
- В. Затруднением дыхания
- Г. Кровотечениями

Для диагностики дивертикула ценкера основным исследованием является

- А. Рентгеноскопия с контрастированием взвеси бария
- Б. УЗИ органов шеи
- В. Ларингоскопия
- Г. Томография гортани

Абсолютно противопоказана работа в химической промышленности лицам с

- А. Функциональной дисфонией
- Б. Хроническим атрофическим процессом ВДП
- В. Хроническим тонзиллитом
- Г. Хроническим катаральным ринофарингитом

К побочным эффектам сосудосуживающих препаратов относят

- А. Сухость слизистой оболочки
- Б. Ринорею
- В. Приступы чихания
- Г. Уменьшение ощущения заложенности носа

Оптимальным объемом хирургического вмешательства при признаках отогенного менингита на фоне острого отита является

- А. Расширенная антромастотомия
- Б. Тимпанопункция
- В. Расширенная общеполостная операция
- Г. Парацентез барабанной перепонки

К характерным признакам катаральной ангины относят

- А. Расширенные устья лакун нёбных миндалин
- Б. Гиперемию дужек и нёбных миндалин
- В. Нагноившиеся фолликулы
- Г. Белые или светло-желтые налеты в лакунах

К основным симптомам болезни меньера относятся самопроизвольные приступы головокружения, шум в ухе

- А. Гноетечение из уха
- Б. Сенсоневральная тугоухость
- В. Боль в ушах
- Г. Ушной зуд

В области глоточно-пищеводного перехода расположены

- А. Два треугольника
- Б. Три треугольника
- В. Межмышечные треугольники
- Г. Четыре треугольника

Курс ингаляций с кортикостероидами назначается при диагнозе

- А. Рак гортани
- Б. Туберкулез гортани
- В. Болезнь Гайека-Рейнке
- Г. Хронический атрофический ларингит

Для профессиональной нейросенсорной тугоухости характерно

- А. Одностороннее поражение слуха
- Б. Двустороннее поражение слуха
- В. Острое развитие
- Г. Раннее повышение порогов слуха на частоте 7000 Гц

При распространенной форме папилломатоза гортани папилломы располагаются на

- А. Обеих голосовых складках
- Б. Одной голосовой складке, не суживают голосовую щель
- В. Одной голосовой складке, суживают голосовую щель на 1/3
- Г. Всём просвете гортани, вызывая стеноз

Первую стадию острого ринита называют стадией

- А. Сухой или раздражения
- Б. Отечной
- В. Слизисто-гнойных выделений
- Г. Серозных выделений

Показанием к наложению трахеостомы является

- А. Острый ларингит
- Б. Ложный круп
- В. Острый флегмонозный ларингит
- Г. Декомпенсированный стеноз гортани

Кровотоочащий полип носа обычно локализуется

- А. Под средней носовой раковиной
- Б. В верхних отделах носа
- В. В задних отделах перегородки носа
- Г. В передненижнем отделе перегородки носа

Наиболее предпочтительный возраст детей с прелингвальной глухотой для кохлеарной имплантации

- А. 7-10 Лет
- Б. 3-6 Лет
- В. Старше 10 лет
- Г. 2-4 Года

Клиническая картина при дифтерии глотки характеризуется

- А. Язвами на одной миндалине
- Б. Пленкой на миндалинах и признаками выраженной интоксикации
- В. Воспалением дна полости рта с выраженной инфильтрацией
- Г. Внезапно возникшим отеком шеи, губ, подчелюстной области и гортани

Для заключения о нормальной слуховой функции у детей отоакустическая эмиссия является достаточной

- А. При отсутствии жалоб у пациентов
- Б. Если зарегистрирована однократно
- В. Всегда
- Г. Не всегда

Сенсоневральную тугоухость, возникшую 3 недели назад, считают

- А. Подострой
- Б. Острой
- В. Внезапной
- Г. Хронической

Забор мазка из зева на флору и чувствительность к антибактериальным препаратам для выявления хронического носительства пневмококка и гемофильной палочки делают

- А. На фоне респираторно-вирусной инфекции
- Б. На фоне приема антибактериальных препаратов
- В. Через 1 неделю после окончания курса антибиотика
- Г. При наличии у пациента ангины

Анатомическим образованием, являющимся продолжением заглоточного пространства, выступает

- А. Околоминдаликовое пространство
- Б. Переднее средостение
- В. Парафарингеальное пространство
- Г. Заднее средостение

Среди разнообразных возможных микробных возбудителей ангины в большинстве случаев основная этиологическая роль принадлежит

- А. Пневмококкам
- Б. Стафилококкам
- В. В-гемолитическому стрептококку группы А
- Г. Аденовирусам

Барабанная перепонка подразделяется на натянутую и _____ части

- А. Заднюю
- Б. Передненижнюю
- В. Основную
- Г. Расслабленную

Формирование нижнего носового хода у детей происходит к

- А. 4 Годам
- Б. Рождению
- В. 10 Годам
- Г. 7 Годам

При массивном носовом, непрекращающемся кровотечении проводят

- А. Хирургическую диатермию
- Б. Заднюю тампонаду
- В. Химическую коагуляцию
- Г. Гальванокаусту

Одним из факторов риска рака гортани является

- А. Папилломатоз гортани
- Б. Кандидоз гортани
- В. Частое употребление мороженого, холодных напитков
- Г. Паратонзиллярный абсцесс

Кадык у мужчин формирует хрящ

- А. Черпаловидный
- Б. Надгортанный
- В. Перстневидный
- Г. Щитовидный

К методам объективной аудиометрии относится

- А. Ультразвуковое исследование слуха
- Б. Тональная пороговая аудиометрия
- В. Регистрация слуховых вызванных потенциалов
- Г. Тональная надпороговая аудиометрия

Препаратом, подавляющим кашлевой рефлекс является

- А. Ацц
- Б. Флюдитек
- В. Синекод
- Г. Проспан

Этиологическим фактором буллёзного отита является

- А. Хламидия
- Б. Протей
- В. Вирус гриппа
- Г. Гемолитический стрептококк

I степень сенсоневральной тугоухости характеризуется потерей слуха (в дБ)

- А. 56-70
- Б. 26-40
- В. 71-90
- Г. 41-55

Ювенильная ангиофиброма распространяется в глазницу или подвисочную ямку с локализацией снаружи твёрдой мозговой оболочки в _____ стадию

- А. IV а
- Б. III б
- В. IV б
- Г. III а

Этиологией острого среднего отита обычно является _____ флора

- А. Паразитарная
- Б. Вирусная
- В. Бактериальная
- Г. Грибковая

Клиническим проявлением хронического гипертрофического фарингита является _____ глотки

- А. Бледность слизистой оболочки задней стенки
- Б. Умеренно выраженная гиперемия слизистой оболочки задней стенки
- В. Выраженная сухость слизистой оболочки задней стенки
- Г. Стеkanie слизисто-гнойных выделений по задней стенке

В терапии острых риносинуситов наибольший уровень доказательности имеет топический интраназальный глюкокортикостероид

- А. Будесонид
- Б. Флутиказона фуруат
- В. Флутиказона пропианат
- Г. Мометазона фуруат

Лечение неосложненного острого гнойного среднего отита необходимо начинать с

- А. Гентамицина
- Б. Сумамеда
- В. Аугментина
- Г. Цефтриаксона

Слух при iv типе тимпаноластики возникает за счёт

- А. Воздействия звука на неотимпанальную мембрану и стремя
- Б. Воздействия звука на неотимпанальную мембрану и молоточек
- В. Воздействия звука на овальное окно через барабанную перепонку и протез
- Г. Увеличения разницы звукового давления на лабиринтные окна

Для сфеноидита характерна головная боль по типу

- А. Локализованной в области лба
- Б. Опоясывающей
- В. Диффузной, без четкой локализации
- Г. Возникающей к вечеру в горизонтальном положении

Инфильтраты при волчанке характеризуются

- А. Инфильтратами с язвой темно-красного цвета, дно язвы с сальным налетом
- Б. Инфильтратами с глубокими язвами
- В. Мелкоточечными высыпаниями, которые сливаются и изъязвляются
- Г. Инфильтратами серого цвета, не образующими язв

Заложенность носа при инфекционном мононуклеозе обусловлена

- А. Грибковыми наложениями
- Б. Увеличением носоглоточной миндалины
- В. Катарально-экссудативным ринитом
- Г. Наличием фибринозной пленки

Лоскутом для создания искусственной барабанной перепонки при тимпаноластике может быть

- А. Плёнка из амниотической оболочки куриного яйца
- Б. Лоскут из фасции височной мышцы
- В. Кожный лоскут из позадиушной области
- Г. Тефлоновая пластинка

Клиническим проявлением хронического катарального фарингита является

- А. Першение в глотке
- Б. Дисфагия
- В. Нарушение глотания
- Г. Осиплость

При сифилисе поражение слизистой оболочки полости рта и глотки возможны в _____ периоде

- А. Третичном
- Б. Вторичном
- В. Первичном
- Г. Любом

Слизистая оболочка полости носа в течении суток в среднем выделяет _____ влаги

- А. 100 Мл
- Б. 500 Мл
- В. 50 Мл
- Г. 2 Литра

Число квадрантов, которые условно выделяют в натянутой части барабанной перепонки при отоскопии, равно

- А. 3
- Б. 5
- В. 4
- Г. 6

Преимущество ингаляционной терапии при патологии гортани заключается в

- А. Увеличении активной поверхности лекарственного вещества
- Б. Увеличении системного эффекта лекарственного препарата
- В. Отсутствии возрастных ограничений
- Г. Отсутствии депонирования лекарственного вещества в подслизистом слое

К клиническим формам хронических фарингитов относят

- А. Простой, токсико-аллергический
- Б. Катаральный, атрофический, гипертрофический
- В. Гиперпластический, некротический
- Г. Серозный, гнойный

Ранняя диагностика дизартрии осуществляется на основании

- А. Грубого нарушения фонематического восприятия
- Б. Наличия неврологической неречевой симптоматики
- В. Выраженности лексико-грамматических расстройств
- Г. Наличия стойких дефектов звукопроизношения

Длительность установочного нистагма в норме до

- А. 1 Минуты
- Б. 3 Секунд
- В. 5 Минут
- Г. 15 Секунд

К симптому наиболее характерному для риногенных орбитальных осложнений относят

- А. Астигматизм
- Б. Миоклонус век
- В. Амблиопию
- Г. Реактивный отек века

Для лечения лакунарной ангины стрептококковой этиологии применяют

- А. Кларитромицин
- Б. Феноксиметилпенициллин
- В. Цефиксим
- Г. Азитромицин

Какова тактика врача после пункции и эвакуации гематомы перегородки носа?

- А. Назначение гемостатиков
- Б. Широкое вскрытие гематомы
- В. Назначение антибиотиков
- Г. Тампонада носа

К верхней трахеостомии относят разрез

- А. Колец трахеи на уровне 2-3 полуколец
- Б. Колец трахеи на уровне 3-4 полуколец
- В. В области конической связки
- Г. Колец трахеи на уровне 4-5 полуколец

Передние и задние клетки решетчатой кости делит

- A. Lamina basilaris concha nasalis media
- Б. Concha nasalis media
- В. Processus uncinatus
- Г. Ethmoidas cell

Основным этиологическим фактором хронического тонзиллита у детей является

- A. Энтерококк
- Б. Стафилококк
- В. Зеленающий стрептококк
- Г. Бетта-гемолитический стрептококк группы а

Сенсорным органом реагирующим на движения является

- A. Костная улитка
- Б. Овальное окно
- В. Ампулярный гребешок
- Г. Нерв преддверия

Вестибулярным нейронитом называют заболевание, при котором вестибулярные расстройства возникают после инфекционного процесса, проявляются неустойчивостью при ходьбе и головокружением

- A. При резких поворотах головы без нарушения слуховой функции
- Б. При наклоне головы
- В. При изменении положения тела
- Г. С нарушением слуховой функции

При отогенных абсцессах мозга и мозжечка, как правило, отмечают пульс

- A. Частый – тахикардию
- Б. Не измененный – нормальный
- В. Редкий – брадикардию
- Г. С выраженной экстрасистолой

К методу лечения фурункула носа в стадии абсцедирования относят

- A. Аутогемотерапию
- Б. Физиотерапевтический
- В. Консервативный
- Г. Хирургический

Для диагностики слуха у маленьких детей до года применяют

- А. Отоакустическую эмиссию и слуховые вызванные потенциалы
- Б. Электроэнцефалографию
- В. Тональную пороговую аудиометрию
- Г. Звукореактотест

Процедура исправления формы наружного носа при его переломе называется

- А. Риностомией
- Б. Ринопластикой
- В. Редрессацией
- Г. Репозицией

Препаратом для лечения фолликулярной ангины у пациента 20 лет с рецидивирующим заболеванием является

- А. Амикацин
- Б. Амоксиклав
- В. Тетрациклин
- Г. Ципрофлоксацин

Симптомом экссудативного отита является

- А. Снижение слуха
- Б. Пульсирующий шум в ухе
- В. Боль в ухе
- Г. Гноетечение из уха

При нарушении вентиляционной функции слуховой трубы регистрируется тимпанограмма типа

- А. А
- Б. С
- В. В
- Г. Е

Хронические ларингиты делят на катаральный, гиперпластический, атрофический и

- А. Отечно-полипозный
- Б. Некротический
- В. Флегманозный
- Г. Специфический

Наиболее тяжелую клиническую картину вызывает поражение раковой опухолью _____ стенки наружного слухового прохода

- А. Задней
- Б. Нижней
- В. Передней
- Г. Верхней

Эффективным методом лечения тимпанальной формы отосклероза является

- А. Стапедопластика
- Б. Тимпанопластика
- В. Использование имплантируемых систем костного проведения
- Г. Кохлеарная имплантация

Фурункул полости носа располагается в преддверии носа и на

- А. Перегородке
- Б. Носовых раковинах
- В. Носовых ходах
- Г. Крыльях

Вестибулометрия при односторонней тугоухости

- А. Проводится в исключительных случаях
- Б. Неинформативна
- В. Проводится по желанию пациента
- Г. Обязательна

Средний носовой ход ограничен

- А. Верхней носовой раковиной
- Б. Нижней носовой раковиной
- В. Пространством между носовой перегородкой и носовыми раковинами
- Г. Носовой перегородкой

Особенность хирургического лечения кровоточащего полипа носа заключается в

- А. Адекватной коагуляции и гемостаза
- Б. Необходимости проведения противорецидивного консервативного лечения
- В. Выполнении только под общим обезболиванием
- Г. Удалении с подлежащей слизистой оболочкой

Имплантации коллагена, тefлоновой пасты или жира в область голосовой складки при параличе гортани проводят для

- А. Смещения голосовой складки латерально
- Б. Смещения голосовой складки к средней линии
- В. Расширения просвета гортани
- Г. Улучшения подвижности голосовой складки

Методом радикального хирургического лечения больных хроническим тонзиллитом является

- А. Двусторонняя тонзиллэктомия
- Б. Удаление папилломы миндалины
- В. Аденотомия
- Г. Вскрытие кисты миндалины

У пациентов молодого возраста кондуктивная потеря слуха и отсутствие патологических изменений при отоскопии, снижение акустического рефлекса свидетельствуют в пользу диагноза

- А. «Сенсоневральная тугоухость»
- Б. «Адгезивный средний отит»
- В. «Хронический средний гнойный отит с холестеатомой»
- Г. «Отосклероз»

При отогенном внутричерепном осложнении проводят срочное хирургическое лечение по принципу

- А. Тимпанопластики
- Б. Антродренажа
- В. Мастоидотомии
- Г. Расширенной радикальной операции

Причина частых носовых кровотечений, характерная для мужчин в молодом возрасте

- А. Юношеская ангиофиброма носоглотки
- Б. Искривление перегородки носа
- В. Полипозный риносинусит
- Г. Аллергический ринит

Разрушение кортикального слоя при мастоидите приводит к

- А. Перихондриту
- Б. Тромбозу сигмовидного синуса
- В. Субпериостальному абсцессу
- Г. Эпидуральному абсцессу

Экзостозы наружного слухового прохода представляют собой

- А. Костные выступы в наружном слуховом проходе (аномалия)
- Б. Доброкачественную опухоль из костной ткани
- В. Опухоль из фиброзной ткани
- Г. Доброкачественную опухоль из хрящевой ткани

При остром катаральном фарингите проводится

- А. Системная антибиотикотерапия
- Б. Цитостатическая терапия
- В. Новокаиновая блокада задней стенки глотки
- Г. Местное этиопатогенетическое лечение

Показанием к тонзиллоэктомии считают

- А. Гипертрофию миндалин
- Б. Декомпенсированную форму хронического тонзиллита
- В. Аденоидные вегетации
- Г. Хронический фарингомикоз

Наиболее типичная локализация доброкачественных опухолей гортани находится на

- А. Гортаноглотке
- Б. Истинных голосовых складках
- В. Ложных голосовых складках
- Г. Подскладковом пространстве

Толщина сидовидной пластинки составляет (в мм)

- А. 6-8
- Б. 5-6
- В. 10
- Г. 2-3

Обострение круглогодичного аллергического ринита провоцируется

- А. Аллергенами насекомых
- Б. Пыльцой злаковых
- В. Латексом
- Г. Домашней пылью

При двустороннем параличе гортани со стенозом выполняют

- А. Тироластику I типа
- Б. Инъекционную ларинголастику
- В. Хордэктомию
- Г. Медиализацию голосовых складок

Инспираторная одышка в покое при острых стенозах гортани появляется в стадии

- А. Декомпенсации
- Б. Субкомпенсации
- В. Асфиксии
- Г. Компенсации

Наиболее частым осложнением острого аденоидита является

- А. Острый средний отит
- Б. Эпиглотит
- В. Ангина
- Г. Острый фронтит

Неотложной помощью при двустороннем параличе гортани является

- А. Тиреоластика
- Б. Трахеостомия
- В. Латерофиксация
- Г. Ларингофиссура