

Тесты с вопросами по специальности «Оториноларингология» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/lor/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Оториноларингология» для аккредитации и других экзаменов (3900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/otorinolaringolog/

2) Тесты для аккредитации «Сурдология-оториноларингология» (1100 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/surdologiya/

3) Сурдология-оториноларингология (аттестация — тесты с ответами)

→ medik-otvet.ru/product/surdolog/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Гортань у детей находится на уровне шейных позвонков

- А. II-III
- Б. IV-VI
- В. III-IV
- Г. IV-VII

С латеральной стенкой клиновидной пазухи граничит синус

- А. продольный
- Б. поперечный
- В. сигмовидный
- Г. пещеристый

Для синус-тромбоза характерна температура

- А. субфебрильная
- Б. нормальная
- В. гектическая
- Г. фебрильная

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте иннервацию глотки:

1. Гортань у взрослого человека.

- А. III – IV;
- Б. IV – VI.
- А. 1-А
- Б. 1-Б

При неэффективности тампонады носа для остановки носового кровотечения производят

- А. перевязку верхнечелюстной артерии
- Б. перевязку наружной сонной артерии
- В. перевязку внутренней сонной артерии
- Г. перевязку решетчатой артерии

Положение больного, в котором он должен находиться при травме гортани, осложненной кровотечением

- А. лежа на стороне повреждения или на животе
- Б. лежа на спине
- В. лежа на противоположной повреждению стороне
- Г. сидя

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения. Заболевание:

1. Отосклероз. Метод лечения:

А. Радикальная операция на ухе;

Б. Стапедопластика;

В. Операция на эндолимфатическом мешке.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Барабанная полость посредством слуховой трубы сообщается с

А. носоглоткой

Б. пещерой

В. улиткой

Г. полукружными каналами

У детей гортань находится на уровне шейных позвонков

А. V-VI

Б. III-IV

В. IV-VI

Г. II-III

Для промывания серных пробок рекомендуется использовать воду температурой

А. 25 °C

Б. 30 °C

В. 37 °C

Г. 49 °C

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Соотнесите анатомические образования, составляющие скелет наружного носа и носовой перегородки:

1. Скелет перегородки носа.

А. Лобная кость;

Б. Носовая кость;

В. Передняя носовая ость;

Г. Сошник;

Д. Гребень клиновидной кости.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Положение больного, в котором он должен находиться при травме гортани, осложненной кровотечением

А. лежа на стороне повреждения или на животе

Б. сидя

В. лежа на спине

Г. лежа на противоположной повреждению стороне

Брадикардия наблюдается при

А. менингите

Б. оточенном сепсисе

В. абсцессе мозжечка

Г. тромбозе сигмовидного синуса

В опыте ринне используется камертон частоты

А. 128 гц

Б. 512 гц

В. 1024 гц

Г. 2048 гц

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте стенки полости носа и образования, с которыми они граничат:

1. Нижняя.

А. Сошник;

Б. Четырехугольный хрящ;

В. Горизонтальная пластинка небной кости;

Г. Решетчатая кость;

Д. Продырявленная пластинка решетчатой кости.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте заболевание и адекватный метод хирургического лечения:

1. Искривление перегородки носа.

А. Подслизистая конхотомия;

Б. Подслизистая резекция носовой перегородки;

В. Подслизистая вазотомия.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Соотнесите структуры, обеспечивающие соответствующие функции звукового анализатора:

1. Звукопроводение.

А. Ушная раковина;

Б. Улитка;

В. Наружный слуховой проход;

Г. Кортиев орган;

Д. Слуховые косточки.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Нормальная барабанная перепонка имеет цвет

А. розовый

Б. белый

В. перламутровый

Санториниевы щели располагаются в наружном слуховом проходе на

А. верхней стенке

Б. нижней стенке

В. передней стенке

Г. задней стенке

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между исследуемым органом и методом исследования. Орган:

1. Нос и онп. Метод исследования:

А. Диафаноскопия;

Б. R- графия;

В. Задняя риноскопия;

Г. Передняя риноскопия.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Для отогематомы характерно скопление крови

- А. в барабанной полости
- Б. в лабиринте
- В. в наружном слуховом проходе
- Г. между хрящом и надхрящницей ушной раковины

Диагноз агранулоцитарной ангины устанавливается после исследования

- А. мочи
- Б. крови
- В. гистологического
- Г. бактериологического

Слизистая оболочка голосовых складок представлена

- А. цилиндрическим мерцательным эпителием
- Б. многослойным плоским эпителием
- В. многослойным плоским эпителием

Степени отклонения туловища при пробе воячека

- А. одна
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

Для поперечного перелома пирамиды височной кости характерно

- А. ликворея
- Б. амнестическая афазия
- В. кровотечение из уха
- Г. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва

Какую связку необходимо рассечь при асфиксии для вскрытия просвета гортани

- А. щитоподъязычную
- Б. щитонадгортанную
- В. перстнещитовидную
- Г. перстнетрахеальную

Наиболее характерная причина гематомы перегородки носа

- А. носовое кровотечение
- Б. инородное тело носа
- В. травма носа
- Г. острый ринит

Первый нейрон вестибулярного анализатора располагается в

- А. продолговатом мозге
- Б. улитке
- В. внутреннем слуховом проходе
- Г. полукружных каналах

При отосклерозе первичный отосклеротический очаг чаще всего локализуется в области

- А. круглого окна
- Б. овального окна
- В. области мыса
- Г. входа в пещеру

Адекватным лечением смешанной формы отосклероза является

- А. мирингопластика
- Б. радикальная операция на ухе
- В. антромастотомия
- Г. стапедопластика

Наиболее частая причина возникновения сенсоневральной тугоухости

- А. травматический фактор
- Б. интоксикация
- В. сосудисто-реологический фактор
- Г. инфекционные заболевания

Отосклероз чаще встречается

- А. у мужчин
- Б. у женщин
- В. у мальчиков
- Г. у девочек

При неблагоприятном течении фурункула носа может развиваться тромбоз

- А. сигмовидного синуса
- Б. пещеристого синуса
- В. поперечного синуса
- Г. продольного синуса

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте вегетативные реакции при проведении отолитовой пробы по воячке:

1. Первая степень.

- А. Изменение сердечной и дыхательной деятельности, рвота, обморок;
- Б. Холодный пот, тошнота;
- В. Побледнение лица, изменение пульса.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Основная роль в развитии менингеальных симптомов при отогенных внутричерепных осложнениях принадлежит

- А. ущемлению ствола мозга и мозжечка в большом затылочном отверстии
- Б. обширные деструктивные изменения костных стенок барабанной полости и сосцевидного отростка
- В. разрушение вещества мозга гнойным процессом
- Г. отек и раздражение мозговых оболочек

Рентгенография височных костей по стенверсу применяется для диагностики при подозрении на

- А. болезнь меньера
- Б. отосклероз
- В. невриному VIII черепного нерва
- Г. паралич лицевого нерва

Парацентез выполняют в квадранте барабанной перепонки

- А. передне-верхнем
- Б. задне-верхнем
- В. передне-нижнем
- Г. задне-нижнем

Барабанная струна является ветвью

- А. слухового нерва
- Б. вестибулярного нерва
- В. лицевого нерва
- Г. тройничного нерва

При сенсоневральной тугоухости опыт швабаха будет

- А. укорочен
- Б. удлинен
- В. положительный
- Г. отрицательный

При аудиометрии у больных с острым средним отитом выявляется

- А. перцептивная тугоухость
- Б. кондуктивная тугоухость
- В. смешанная тугоухость

При односторонней сенсоневральной тугоухости в опыте вебера латерализация будет в

- А. одинаково в оба уха
- Б. больное ухо
- В. здоровое ухо
- Г. в центре головы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте онп и носовые ходы, в которые открываются их соустья:

1. Средний носовой ход.

- А. Клиновидная пазуха;
- Б. Верхнечелюстная пазуха;
- В. Лобная пазуха;
- Г. Передние клетки решетчатого лабиринта;
- Д. Средние клетки решетчатого лабиринта.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте вид лечения, адекватный для стадии стеноза гортани:

1. Стадия компенсации.

А. Консервативная терапия;

Б. Трахеотомия;

В. Коникотомия.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Соотнесите значения силы звука и вида речи:

1. Шепотная речь.

А. 30 дб;

Б. До 60 дб;

В. 80 дб.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

При абсцессе мозжечка наблюдается

А. повышение тонуса мышц на стороне повреждения

Б. повышение тонуса мышц на противоположной стороне

В. снижение тонуса мышц на противоположной стороне

Г. снижение тонуса мышц на стороне поражения

Воздушные кисты гортани исходят из

А. гортанных желудочков

Б. валлекул

В. грушевидных синусов

Г. вестибулярных складок

В глотке располагается миндалин

- А. три
- Б. четыре
- В. пять
- Г. шесть

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте характеристики сенсоневральной тугоухости:

1. I степень.

- А. Потеря слуха 26 – 40 дБ;
- Б. Потеря слуха 41 – 55 дБ;
- В. Потеря слуха 56 – 70 дБ;
- Г. Потеря слуха 71 – 90 дБ;
- Д. Потеря слуха более 91 дБ.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Соотнесите этажи глотки шейным позвонкам.

- А. I – III;
- Б. III;
- В. IV – VI.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Патогенетической основой болезни меньера считается

- А. наличие холестеатомы
- Б. травма уха
- В. гидропс лабиринта
- Г. инфекция

При ожоге гортани в первую очередь поражаются

- А. голосовые складки
- Б. вестибулярные складки
- В. гортанная поверхность надгортанника
- Г. язычная поверхность надгортанника

Латерализация звука в опыте выбера у больного с односторонней сенсоневральной тугоухостью будет

- А. в больное ухо
- Б. в здоровое ухо
- В. в центре головы
- Г. в оба уха одинаково

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте парные и непарные хрящи гортани:

1. Непарные хрящи.

- А. Щитовидный;
- Б. Черпаловидный;
- В. Надгортанник;
- Г. Рожковидный;
- Д. Перстневидный.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Наиболее вероятный путь при распространении инфекции из среднего уха при субдуральном абсцессе

- А. гематогенный
- Б. контактный
- В. лимфогенный
- Г. преформированный

Границей между носоглоткой и ротоглоткой является

- А. горизонтальная плоскость, проведенная через твердое небо
- Б. горизонтальная плоскость, проведенная через поверхность язык
- В. верхний полюс небных миндалин

Острый вторичный тонзиллит наблюдается при

- А. гемобластозе
- Б. лейкозе
- В. гемофилии
- Г. капилляротоксикозе

При сильном кровотечении из гортани для его остановки необходимо перевязать

- А. общую сонную артерию
- Б. внутреннюю сонную артерию
- В. наружную сонную артерию

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения. Заболевание:

1. Искривление носовой перегородки. Метод лечения:

- А. Вазотомия н/носовых раковин;
- Б. Подслизистая резекция перегородки носа;
- В. Подслизистая конхотомия.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

На передней стенке барабанной полости располагается

- А. мыс
- Б. отверстие слуховой трубы
- В. окно преддверия
- Г. окно улитки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Катаральный фарингит.

- А. Разлитая гиперемия слизистой оболочки;
- Б. Бледная и сухая слизистая оболочка;
- В. Утолщение боковых валиков глотки и увеличение лимфоидных гранул.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте частотные характеристики звуков:

1. Звуки низкой частоты.

А. 16 – 800 гц;

Б. 800 – 4000 гц;

В. 4000 – 10000 гц;

Г. 10000 – 20000 гц.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

К менингеальным симптомам относится

А. ригидность затылочных мышц

Б. диффузная интенсивная головная боль

В. затруднение называние предметов при сохраненной возможности повторения речи

Г. выпадение квадрантов полей зрения

Для петрозита характерно

А. двустороннее снижение слуха

Б. тригеминит

В. парез или паралич лицевого нерва

Г. боль при жевании

В клинике абсцесса височной доли мозга выделяют стадий

А. одну

Б. две

В. три

Г. четыре

Для юношеской ангиофибромы основания черепа характерн

А. затруднение носового дыхания

Б. налет на небных миндалинах

В. стекание гноя по задней стенке глотки

Г. деформация лица

На передней стенке барабанной полости располагается

- А. окно преддверия
- Б. окно улитки
- В. канал лицевого нерва
- Г. отверстие слуховой трубы

Сигмовидный синус находится

- А. в средней черепной ямке
- Б. в задней черепной ямке
- В. в основании черепа
- Г. в основании черепа

Адекватный метод лечения при токсико-аллергической форме II степени хронического тонзилита

- А. физиотерапия
- Б. тонзиллэктомия
- В. тонзиллотомия
- Г. промывание лакун небных миндалин

При аудиометрии у больных с хроническим средним отитом выявляется

- А. кондуктивная тугоухость
- Б. смешанная тугоухость
- В. перцептивная тугоухость

При определении степени нистагма взгляд больного фиксируют

- А. в сторону быстрого компонента
- Б. перед больным
- В. в сторону медленного компонента
- Г. вниз

Основная этиологическая роль в возникновении бактериальной ангины принадлежит

- А. пневмококку
- Б. золотистому стафилококку
- В. бета-гемолитическому стрептококку группы а
- Г. зеленышечу стрептококку

Первый нейрон проводящих путей звукового анализатора располагается в

- А. слуховой трубе
- Б. внутреннем слуховом проходе
- В. улитке
- Г. продолговатом мозге

У взрослых гортань находится на уровне шейных позвонков

- А. III-IV
- Б. IV-VII
- В. V-VII
- Г. IV-VI

Через зев полость рта сообщается с отделом глотки

- А. верхним
- Б. средним
- В. нижним

Инородные тела чаще локализуются в

- А. гортани
- Б. трахее
- В. бронхах

Для продольного перелома пирамиды височной кости характерно

- А. амнестическая афазия
- Б. гемианопсия
- В. кровотечение из уха
- Г. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва

Из отогенных внутричерепных осложнений чаще всего встречается

- А. абсцесс мозга и мозжечка
- Б. менингит
- В. менингоэнцефалит
- Г. синустромбоз и отогенный сепсис

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте иннервацию носа:

1. Кожа наружного носа.

А. Тройничный нерв;

Б. Лицевой нерв;

В. Языкоглоточный нерв.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

При остром среднем катаральном отите наблюдается

А. втянутость барабанной перепонки

Б. гиперемия барабанной перепонки

В. оторея

Г. перфорация барабанной перепонки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте костные и хрящевые составляющие носовой перегородки:

1. Костная часть перегородки носа.

А. Сошник;

Б. Слезная кость;

В. Перпендикулярная пластинка решетчатой кости;

Г. Четырехугольный хрящ.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Изменение психики в виде неадекватных поступков, необоснованной эйфории характерно для

А. тромбоза кавернозного синуса

Б. абсцесса височной доли головного мозга

В. абсцесса лобной доли головного мозга

Г. абсцесса мозжечка

Периферический рецептор звукового анализатора

- А. барабанная перепонка
- Б. ушная раковина
- В. слуховые косточки
- Г. кортиева орган

В клинике острого среднего отита выделяют

- А. 1 стадию
- Б. 2 стадии
- В. 3 стадии
- Г. 4 стадии

какой признак, характерный для синдрома молчащего синуса является

- А. растяжение стенок клетки решетчатого лабиринта
- Б. наличие дополнительного соустья
- В. латерализация крючковидного отростка
- Г. наличие тени полуовальной формы

Одностороннюю сенсоневральную тугоухость необходимо дифференцировать с

- А. невритом преддверно-улиткового нерва
- Б. отосклерозом
- В. адгезивным средним отитом
- Г. тубоотитом

Патологоанатомическая сущность хондроперихондрита заключается в

- А. в гнойном воспалении подслизистого слоя гортани
- Б. в гнойном воспалении хрящей гортани
- В. в воспалении надхрящницы с трофическими изменениями хряща
- Г. в гнойном воспалении слизистой оболочки гортани

Кровоснабжение небных миндалин осуществляется из артериальной системы

- А. наружной сонной артерии
- Б. внутренней сонной артерии
- В. наружной и внутренней сонной артерии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте отклонение туловища при проведении опыта воячека со степенью реакции:

1. Первая степень.

А. 0 – 5 °;

Б. 5 – 30 °;

В. Более 30 °.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Предрасполагающим фактором к возникновению фурункула носа является

А. бронхиальная астма

Б. гипертоническая болезнь

В. сахарный диабет

Г. псориаз

Симптомы, характерные для подскладочного ларингита

А. постепенное начало, смешанная одышка, осиплость, сухой «старческий» кашель, постепенное нарастание симптоматики стеноза гортани

Б. внезапное начало, инспираторная одышка, чистый голос, «лающий» кашель, быстрое развитие симптомов стеноза гортани

В. постепенное начало, смешанная одышка, чистый голос, «лающий» кашель, постепенное нарастание симптоматики стеноза гортани

признаком гнойного воспаления клиновидной пазухи является наличие гноя в

А. верхнем носовом ходе

Б. среднем носовом ходе

В. нижнем носовом ходе

Г. общем носовом ходе

На задней стенке барабанной полости находится

А. мыс

Б. отверстие слуховой трубы

В. овальное окно

Г. отверстие для барабанной струны

Постоянным признаком хронического гнойного среднего отита является

- А. нарушение равновесия
- Б. оторея
- В. головокружение
- Г. субъективный шум в ухе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Соотнесите анатомические образования, отвечающие за восприятие ускорения:

1. Преддверие.

- А. Угловое ускорение;
- Б. Прямолинейное ускорение;
- В. Ускорение силы тяжести.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте стадию воспаления среднего уха и отоскопическую картину:

1. Острый тубоотит.

- А. Мt гиперемирована, инфильтрирована, отечна, выбухает, пульсирует;
- Б. Мt перфорирована, гиперемирована;
- В. Втяжение mt – укорочение рукоятки молоточка, укорочение/исчезновение светового конуса;
- Г. Мt местами петрифицирована, утолщена;
- Д. Мt гиперемирована, отечна.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Характерными для дифтерии гортани являются симптомы

- А. осиплость, сухой «старческий» кашель, постепенное нарастание симптомов стеноза гортани
- Б. внезапное начало, инспираторная одышка, чистый голос, «лающий» кашель, быстрое развитие симптомов стеноза гортани

Жалобы, характерные для больных с сенсоневральной тугоухостью

- А. головокружение
- Б. гноетечение из уха
- В. снижение слуха
- Г. улучшение слуха в шумной обстановке

В средний носовой ход открываются

- А. верхнечелюстная пазуха, лобная пазуха, клиновидная пазуха
- Б. носо-слезный канал, верхнечелюстная пазуха, передние клетки решетчатого лабиринта
- В. лобная пазуха, передние и средние клетки решетчатого лабиринта, верхнечелюстная пазуха
- Г. клиновидная пазуха, задние клетки решетчатого лабиринта

При остром стенозе гортани у детей чаще применяется

- А. верхняя трахеотомия
- Б. средняя трахеотомия
- В. нижняя трахеотомия
- Г. коникотомия

После репозиции костей носа для фиксации костных отломков целесообразно проводить переднюю тампонаду носа с

- А. оливковым маслом
- Б. парафином
- В. перекисью водорода
- Г. синтомициновой эмульсией

При заболевании мешочков преддверия появляется

- А. отолитовый нистагм
- Б. спонтанный нистагм
- В. оптокинетический нистагм
- Г. позиционный нистагм

Для гемисинуита характерно

- А. воспаление всех околоносовых пазух
- Б. лево- или правостороннее воспаление всех пазух на одноименной стороне
- В. поражение нескольких околоносовых пазух
- Г. поражение одной околоносовой пазухи

Метод исследования слуха с помощью камертонов называется

- А. аудиометрия
- Б. акуметрия
- В. импедансометрия
- Г. тимпанометрия

Скорость распространения звука по воздуху составляет

- А. 100 м/с
- Б. 332 м/с
- В. 1450 м/с
- Г. 300000 м/с

Адиадохокинез выявляется при

- А. менингите
- Б. абсцессе мозжечка
- В. абсцессе височной доли головного мозга
- Г. абсцессе лобной доли головного мозга

Глотка проецируется на шейные позвонки

- А. 1 -- 3
- Б. 1 -- 4
- В. 1 -- 5
- Г. 1 -- 6

В носоглотке устье слуховой трубы располагается на

- А. верхней стенке
- Б. задней стенке
- В. боковой стенке
- Г. передней стенке

К симптомам хронического тонзиллита относится

- А. симптом зака
- Б. симптом шеффера
- В. симптом оппенгейма
- Г. симптом гордона

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и возбудителем. Заболевание:

1. Лакунарная ангина. Возбудитель:

- А. Бацилла леффлера;
- Б. Веретенообразная палочка + спирохета полости рта;
- В. Стрептококк.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте функцию носа и метод ее оценки:

1. Дыхательная.

- А. Ольфактометрия;
- Б. Риноскопия;
- В. Ринопневмометрия;
- Г. Сахариновый тест.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Соотнесите анатомические образования и локализацию:

1. Кавернозный синус.

- А. Передняя черепная ямка;
- Б. Средняя черепная ямка;
- В. Задняя черепная ямка.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте кистовидное растяжение околоносовых пазух и их содержимое:

1. Пиоцеле.

А. Гной;

Б. Слизь;

В. Кровь;

Г. Воздух.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте иннервацию глотки:

1. Ротоглотка.

А. Тройничный нерв;

Б. Языкоглоточный;

В. Блуждающий.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Амнестическая афазия наблюдается при

А. абсцессе лобной доли головного мозга

Б. абсцессе височной доли головного мозга

В. абсцессе мозжечка

Г. менингите

Латерализация звука в опыте выбера при одностороннем остром среднем отите будет

А. в больное ухо

Б. в здоровое ухо

В. в центре головы

Г. в оба уха одинаково

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и тактикой лечения. **Заболевание:**

1. Острый катаральный средний отит. Тактика лечения:

А. Обезболивающие и противовоспалительные капли;

Б. Продувание слуховых труб;

В. Турунды с антибактериальной мазью в ухо.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Постоянный симптом хронического среднего отита

А. снижение слуха

Б. повышение температуры тела

В. резкая боль в ухе

Г. головокружение

Резорбция эндолимфы происходит в

А. в сферическом мешочке

Б. в эллиптическом мешочке

В. в эндолимфатическом мешочке

Г. в перепончатой улитке

При инородных телах пищевода возможно развитие

А. медиастинита

Б. перикардита

В. гастрита

Г. парафарингита

Чувствительная иннервация глотки осуществляется

А. второй веточкой тройничного нерва, блуждающим и подъязычным нервами

Б. блуждающим нервом, первой и второй ветвями тройничного нерва

В. первой и второй ветвями тройничного нерва и языкоглоточным нервом

Г. языкоглоточным, блуждающим нервами и второй веточкой тройничного нерва

При проведении отолитовой пробы больного наклоняют на

- А. 45 градусов на правый бок
- Б. 45 градусов на левый бок
- В. 30 градусов вперед
- Г. 90 градусов вперед

Гемианопсия наблюдается при

- А. абсцессе лобной доли головного мозга
- Б. абсцессе височной доли головного мозга
- В. абсцессе мозжечка
- Г. тромбозе кавернозного синуса

Амнестическая афазия наблюдается при

- А. менингите
- Б. абсцессе височной доли головного мозга
- В. абсцессе мозжечка
- Г. арахноидите

К звукопроводящему отделу звукового анализатора относится

- А. наружное ухо, барабанная перепонка, слуховые косточки
- Б. внутреннее ухо
- В. преддверно-улитковый нерв
- Г. первый нейрон звукового анализатора

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте формы воспаления онп:

1. Смешанная форма.

- А. Кистозная;
- Б. Гнойно – полипозная;
- В. Катаральная;
- Г. Пристеночно - гиперпластическая;
- Д. Гребень клиновидной кости.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Границей между ротоглоткой и гортаноглоткой является

- А. нижний край мягкого неба
- Б. корень языка и надгортанник
- В. нижние полюса небных миндалин
- Г. дно полости рта

Радикальная операция на ухе выполняется при

- А. отосклерозе
- Б. тубоотит
- В. экссудативном отите
- Г. хроническом гнойном среднем отите

Сенсорная афазия наблюдается у больных с

- А. абсцессом лобной доли головного мозга
- Б. абсцессом мозжечка
- В. лабиринтитом
- Г. абсцессом височной доли головного мозга

Натянутая часть барабанной перепонки состоит из

- А. 2 слоев
- Б. 3 слоев
- В. 4 слоев

При стенозе гортани, вызванном дифтерией гортани, следует провести: вызванном дифтерией гортани, следует провести:

- А. трахеостомию
- Б. удаление корок из гортани
- В. коникотомию
- Г. интубацию гортани

Положение больного в позе «легавой собаки» характерно для

- А. менингита
- Б. абсцесса мозжечка
- В. абсцесса лобной доли головного мозга
- Г. абсцесса височной доли головного мозга

Костный лабиринт заполнен

- А. эндолимфой
- Б. перилимфой
- В. кортилимфой
- Г. лимфой

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте возбудителей и заболевания, основным этиологическим фактором которого они являются:

1. Bacteriae leptotrix.

- А. Ангина вульгарная;
 - Б. Ангина симановского – венсана – плаута;
 - В. Гиперкератоз глотки;
 - Г. Эпиглоттит;
 - Д. Озена.
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1- В
 - Г. 1-Г
 - Д. 1-Д

Первый нейрон вестибулярного анализатора располагается

- А. во внутреннем слуховом проходе
- Б. в улитке
- В. в преддверии
- Г. в полукружных каналах

Скорость распространения звуковых колебаний по воде составляет

- А. 332 м/с
- Б. 850 м/с
- В. 1450 м/с
- Г. 14500 м/с

Рвота при абсцессах мозга возникает

- А. во время приема пищи
- Б. после приема пищи
- В. при физической нагрузке
- Г. на высоте головной боли

При отоскопии у больных с сенсоневральной тугоухостью выявляется

- А. перфорация барабанной перепонки в ненатянутой части
- Б. перфорация барабанной перепонки в натянутой части
- В. втянутая барабанная перепонка
- Г. не измененная барабанная перепонка

Вестибулярный рефлекс на мышцы глаз выражается в появлении

- А. слезотечения
- Б. нистагма
- В. экзофтальма
- Г. болевого синдрома

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте стенки барабанной полости и образования, с которыми они граничат:

1. Верхняя стенка.

- А. Внутренняя сонная артерия;
- Б. Внутреннее ухо;
- В. Сосцевидный отросток;
- Г. Средняя черепная ямка.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

Направление нистагма определяется

- А. направлением медленного компонента
- Б. направлением быстрого компонента
- В. при аудиометрии
- Г. при акуметрии

При опыте швабаха определяют

- А. латерализацию звука
- Б. длительность восприятия звука по воздуху
- В. длительность восприятия звука через кость
- Г. разницу в длительности восприятия звука по воздуху и по кости

Аденоидами называется гипертрофия

- А. небных миндалин
- Б. боковых валиков глотки
- В. носоглоточной миндалины
- Г. язычной миндалины

Внутреннее ухо располагается в

- А. барабанной полости
- Б. пирамиде височной кости
- В. чешуе височной кости
- Г. сосцевидном отростке

Опыт ринне у больного с отосклерозом будет

- А. положительный
- Б. отрицательный
- В. удлинен
- Г. укорочен

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте группы врожденных дефектов носа:

1. Гипергенезия.

- А. Избыточное развития органа;
- Б. Недоразвитие органа;
- В. Нарушение нормального положения органа;
- Г. Неправильное развитие органа;
- Д. Сохранение эмбриональных структур.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Сопоставьте термин и локализацию воспаления.

- А. Воспаление слизистой оболочки носа;**
- Б. Воспаление слизистой оболочки глотки;**
- В. Воспаление слизистой оболочки гортани.**

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

В состав среднего уха входит

- А. барабанная полость, внутренний слуховой проход, слуховая труба
- Б. барабанная полость, слуховая труба, наружный слуховой проход
- В. слуховая труба, сосцевидный отросток, барабанная полость
- Г. сосцевидный отросток, слуховая труба, слуховые косточки

Патогенетической основой болезни меньера считается

- А. травма уха
- Б. гидропс лабиринта
- В. беременность
- Г. инфекция

Больных с дифтерией гортани необходимо госпитализировать в

- А. хирургическое отделение
- Б. лор отделение
- В. инфекционное отделение или в инфекционную больницу
- Г. терапевтическое отделение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Дайте определение различным формам ринита:

1. Инфекционный ринит:

А. Хроническое заболевание, в основе которого лежит воспалительная Ig-е опосредованная реакция, вызванная попаданием аллергенов на слизистую оболочку полости носа;

Б. Неаллергическое воспаление слизистой полости носа, связанное с нарушением метаболизма арахидоновой кислоты. Является предвестником развития тяжелой формы полипозного риносинусита, аспириновой бронхиальной астмы, непереносимости НПВС. характеризуется эозинофилией носового секрета при отсутствии повышенного уровня Ig-е в сыворотке крови и отрицательным эндоназальным провокационным тестом;

В. Воспаление слизистой оболочки полости носа, вызванное вирулентными микроорганизмами и проявляющееся затруднением носового дыхания, выделениями из носа и чиханьем;

Г. Хронический неаллергический ринит, основными симптомами которого являются заложенность носа и затруднение носового дыхания, связанные с лабильностью и повышенным кровенаполнением сосудов носовых раковин.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

К анестезии слизистой оболочки гортани приводит поражение

А. тройничного нерва

Б. нижнего гортанного нерва

В. верхнего гортанного нерва

Г. языкоглоточного нерва

При проведении kalorической пробы правого уха холодной водой нистагм будет направлен

А. вверх

Б. вправо

В. влево

Г. вниз

Предпосылкой развития ложного крупа является

А. атопический дерматит

Б. пневмония

В. острый ринит

Г. ангина

Для поперечного перелома пирамиды височной кости характерно

- А. ликворея
- Б. кровотечение из уха
- В. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва
- Г. гемианопсия

Лимфатическая сеть гортани более развита в

- А. верхнем этаже
- Б. среднем этаже
- В. нижнем этаже

Резорбция эндолимфы происходит

- А. в сферическом мешочке
- Б. в эндолимфатическом мешочке
- В. в эллиптическом мешочке
- Г. в ампулах полукружных каналов

Латерализация звука в опыте вебера при одностороннем остром гнойном отите будет

- А. в больное ухо
- Б. в здоровое ухо
- В. одинаково в оба уха
- Г. в центре головы

Санториниевы щели в наружном слуховом проходе располагаются на

- А. верхней стенке
- Б. задней стенке
- В. нижней стенке
- Г. передней стенке

Продолжительность нистагма определяют при взгляде больного в

- А. сторону быстрого компонента
- Б. сторону медленного компонента
- В. вверх
- Г. прямо перед собой

Иннервация внутреннего уха осуществляется черепными нервами

- А. V
- Б. VI
- В. VII
- Г. VIII

Вынужденное положение головы наблюдается при

- А. абсцессе мозжечка
- Б. тромбозе сигмовидного синуса
- В. абсцессе височной доли головного мозга
- Г. абсцессе лобной доли головного мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте симптомы, характерные для стадии стеноза гортани:

1. Стадия компенсации.

- А. Урежение и углубление дыхания, выпадение пауз между вдохом и выдохом;
- Б. Инспираторная одышка в покое, бледность кожных покровов, беспокойное состояние больного;
- В. Пульс становится частым, слабым, кожа бледно-серого цвета, состояние усугубляется экзофтальмом – выпячиванием глаз, потерей сознания, непроизвольным мочеиспусканием, дефекацией, возможна остановка сердца.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Носо-слезный канал открывается в носовой ход

- А. верхний
- Б. средний
- В. нижний
- Г. общий

Стапедопластика выполняется при

- А. экссудативном отите
- Б. отосклерозе
- В. остром гнойном среднем отите
- Г. хроническом гнойном среднем отите

При челюстно-лицевой травме подкожная эмфизема является признаком

- А. перелома костей носа
- Б. гематомы перегородки носа
- В. травмы околоносовых пазух
- Г. абсцесса перегородки носа

Внутреннее ухо располагается в

- А. сосцевидном отростке
- Б. пирамиде височной кости
- В. скуловом отростке
- Г. чешуе височной кости

Радикальная операция на ухе выполняется при

- А. остром среднем отите
- Б. хроническом среднем гнойном отите
- В. отосклерозе
- Г. экссудативном отите

При миогенных парезах чаще поражаются мышцы гортани

- А. кивательная
- Б. черпалонадгортанные
- В. поперечные
- Г. голосовые

Брадикардия характерна для

- А. сепсиса
- Б. менингита
- В. абсцесса мозга
- Г. синус-тромбоза

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте расположение физиологических отверстий глотки:

1. Хоана.

А. Носоглотка;

Б. Ротоглотка;

В. Гортаноглотка.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

При остром среднем отите опух ринне будет

А. удлинен

Б. укорочен

В. положительный

Г. отрицательный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между образованием и его локализацией:

1. Глоточная миндалина:

А. Носоглотка;

Б. Ротоглотка;

В. Гортаноглотка.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

При отосклерозе выполняется операция

А. радикальная операция на ухе

Б. мирингопластика

В. тимпанопластика

Г. стапедопластика

Санториниевы щели располагаются в наружном слуховом проходе в

- А. в перепончато-хрящевом отделе
- Б. в костном отделе
- В. в перепончато-хрящевом и костном отделах

Двигательная иннервация глотки осуществляется

- А. возвратным и языкоглоточным нервом
- Б. первой веточкой тройничного нерва и возвратным нервом
- В. языкоглоточным и подъязычным нервом
- Г. подъязычным и возвратным нервом

Амнестическая афазия наблюдается при

- А. отогенном менингите
- Б. синус-тромбозе
- В. абсцессе мозжечка
- Г. абсцессе височной доли головного мозга

Первый нейрон звукового анализатора располагается

- А. во внутреннем слуховом проходе
- Б. в улитке
- В. в барабанной полости
- Г. в преддверии

Среднее ухо состоит из

- А. барабанной перепонки, слуховой трубы, клеток сосцевидного отростка
- Б. слуховой трубы, барабанной полости, клеток сосцевидного отростка
- В. клеток сосцевидного отростка, слуховых косточек, барабанной перепонки
- Г. слуховых косточек, барабанной перепонки, слуховой трубы

Тимпанопластика выполняется при

- А. отогенных внутричерепных осложнениях
- Б. нейросенсорной тугоухости
- В. хроническом гнойном среднем отите
- Г. отосклерозе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Цваардемакер.

А. Химическая теория;

Б. Физическая теория;

В. Физико-химическая теория.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Направление нистагма определяется

А. направлением медленного компонента нистагма

Б. направлением быстрого компонента нистагма

В. силой нистагма

Г. амплитудой нистагма

В клинике абсцесса височной доли головного мозга выделяют стадий

А. одну

Б. две

В. три

Г. четыре

Опыт ринне у больного с нейросенсорной тугоухостью будет

А. удлинен

Б. укорочен

В. отрицательный

Г. положительный

Для продольного перелома пирамиды височной кости характерно

А. гемианопсия

Б. кровотечение из уха

В. амнестическая афазия

Г. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва

При переходе воспалительного процесса на околоминдаликовую клетчатку может развиваться

- А. парафарингеальный абсцесс
- Б. паратонзиллярный абсцесс
- В. сиалоаденит
- Г. ретрофарингеальный абсцесс

Разрез барабанной перепонки при парацентезе выполняют в

- А. задненижнем квадранте
- Б. передненижнем квадранте
- В. задневерхнем квадранте
- Г. передневерхнем квадранте

Тело первого нейрона звукового анализатора располагается в

- А. улитке
- Б. ампулах
- В. мешочках преддверия
- Г. внутреннем слуховом проходе

Тело первого нейрона вестибулярного анализатора располагается в

- А. барабанную полости
- Б. преддверии
- В. улитке
- Г. внутреннем слуховом проходе

Заглочное пространство у детей содержит

- А. сосудисто-нервный пучок
- Б. лимфатические узлы
- В. слизистые железы

Иннервация гортани осуществляется

- А. блуждающим нервом
- Б. языкоглоточным нервом
- В. отводящим нервом
- Г. тройничным нервом

Кровоточивая зона полости носа располагается в

- А. среднем носовом ходе
- Б. передне-нижнем отделе перегородки носа
- В. преддверии носа
- Г. зоне роста перегородки носа

Наиболее частая локализация головной боли при абсцессе мозжечка

- А. затылочная область с возможной иррадиацией по задней поверхности шеи
- Б. теменная область
- В. затылочная область
- Г. височная область

Латерализация звука в опыте вебера при односторонней сенсоневральной тугоухости будет

- А. в больное ухо
- Б. в здоровое ухо
- В. в центре головы
- Г. в оба уха одинаково

Вынужденное положение головы наблюдается

- А. менингите
- Б. абсцессе мозжечка
- В. тромбозе сигмовидного минуса
- Г. абсцессе лобной доли головного мозга

Пункцию верхнечелюстной пазухи проводят через носовой ход

- А. общий
- Б. нижний
- В. средний
- Г. верхний

Сферический и эллиптический мешочки находятся в

- А. полукружных каналах
- Б. преддверии
- В. барабанной полости
- Г. улитке

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте фарингоскопические признаки хронического тонзиллита с названием их по автору:

1. Признак Зака.

А. Инфильтрация и гиперплазия краев передних дужек;

Б. Гиперемия краев небных дужек;

В. Отечность краев верхних отделов небных дужек.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Для сенсоневральной тугоухости характерны следующие аудиометрические данные

А. нисходящий тип костной и воздушной кривых без костно-воздушного интервала

Б. нисходящий тип костной и воздушной кривых с интервалом между ними 5 – 10 дБ

В. горизонтальный тип костной и воздушной кривых с интервалом между ними в 35 – 40 дБ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между образованием и его локализацией. Образование:

1. Кровотоочащий полип носа. Локализация:

А. Носоглотка;

Б. Носовая перегородка;

В. В/ч пазуха;

Г. Клетки решетчатого лабиринта.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Воздействие смв на область уха производится _____ излучателем

А. Прямоугольным

Б. Внутриушным

В. Большим цилиндрическим

Г. Крыловидным

Отрицательная проба федеричи является характерной для

- А. Нарушения звуковосприятия
- Б. Нарушения звукопроводения
- В. Смешанной тугоухости
- Г. Нормального слуха

При сенсоневральной тугоухости противопоказаны

- А. Шум и вибрация
- Б. Неблагоприятные метеорологические условия
- В. Физические нагрузки
- Г. Стрессовые нагрузки

К абсолютным противопоказаниям к проведению калорической пробы водой относят

- А. Возраст пациента
- Б. Наличие перфорации барабанной перепонки, наружный отит
- В. Гипертоническую болезнь
- Г. Подозрение на невриному 8-й пары черепно-мозговых нервов

У больных при эпителимпаните наряду с процессами воспаления слизистой оболочки возникает

- А. Некроз улитки
- Б. Атрофия слизистой оболочки
- В. Кариес кости
- Г. Паралич тройничного нерва

При асфиксии для вскрытия просвета гортани необходимо рассечь связку

- А. Перстне-трахеальную
- Б. Перстнещитовидную
- В. Щитоподъязычную
- Г. Щито-надгортанную

При болезни меньера регистрируется _____ нистагм

- А. Прессорный
- Б. Спонтанный
- В. Крупноразмашистый
- Г. Поствращательный

Спиральный канал улитки имеет протяжённость до (см)

- А. 1
- Б. 3
- В. 7
- Г. 5

Предрасполагающим фактором возникновения фарингомикоза является длительное применение

- А. Ингаляционных антисептиков
- Б. Ингаляционных глюкокортикостероидов
- В. В-блокаторов
- Г. Деконгестантов

Основным критерием диагностики новообразования гортани является

- А. Стробоскопия
- Б. Прямая ларингоскопия
- В. Рентгенограмма органов шеи
- Г. Гистологическое исследование гортани

Лакунарную ангину, в первую очередь, необходимо дифференцировать с

- А. Острым фарингитом
- Б. Ангиной Симановского – Венсана
- В. Дифтерией
- Г. Грибковой ангиной

Пациенту с раком околоушной слюнной железы iiа стадии необходимо провести

- А. Только хирургическое лечение
- Б. Сочетанную лучевую терапию
- В. Химиотерапию
- Г. Послеоперационную лучевую терапию

При стенозе гортани в стадии декомпенсации проводят

- А. Кортикостероидную терапию
- Б. Противовоспалительную терапию
- В. Трахеостомию
- Г. Антибиотико терапию

Основным методом остановки носового кровотечения является

- А. Тампонада носа
- Б. Закапывание в нос пероксида водорода 3% и деконгестантов
- В. Перевязка наружной сонной артерии
- Г. Введение коагулянтов

Осложнением фурункула носа может быть тромбоз вен лица, кавернозного синуса и

- А. Поперечного
- Б. Улитки
- В. Сигмовидного
- Г. Орбиты

Какова тактика врача при закрытых переломах наружных стенок передней группы околоносовых пазух?

- А. Антибактериальная терапия, наблюдение
- Б. Экстраназальная ревизия синуса
- В. Ситуация не требует терапии
- Г. Эндоназальное вмешательство

Возбудителем ангины Людвига является

- А. Синегнойная палочка
- Б. Гемофильная палочка
- В. Анаэробная микрофлора
- Г. Бета-гемолитический стрептококк группы А

Гемианопсия наблюдается при абсцессе _____ доли головного мозга

- А. Лобной
- Б. Височной
- В. Теменной
- Г. Мозжечковой

Больные с эпиглоттитом жалуются на

- А. Осиплость
- Б. Кашель, сухость и першение в горле
- В. Дисфагию различной степени тяжести и боли в горле
- Г. Быструю утомляемость голоса

Симптомы шумного, резко затрудненного дыхания через нос, поперхивания во время кормления, иногда срыгивания, наличие храпа у новорожденного характеризуют

- А. Гипертрофию небных миндалин
- Б. Гипертрофию аденоидов
- В. Одностороннюю хоанальную атрезию
- Г. Искривление перегородки носа

В спинномозговой жидкости при отогенном и риногенном гнойном менингите наиболее часто обнаруживают

- А. Резко выраженный плеоцитоз с преобладанием нейтрофилов
- Б. Диплококк
- В. Повышение содержания сахара и хлоридов
- Г. Пониженное содержание белка

Вестибулярный нейронит характеризуется _____ на всём протяжении заболевания

- А. Угнетением вестибулярной функции на стороне поражения
- Б. Наличием односторонней пузырьковой сыпи в области ушной раковины
- В. Снижением слуха
- Г. Наличием клono-тонического нистагма раздражения

Методом лечения декомпенсированной формы хронического тонзиллита является

- А. Промывание лакун
- Б. Консервативная терапия
- В. Физиолечение
- Г. Тонзиллэктомия

Метод кобрака используют при

- А. Калорической пробе
- Б. Аудиометрии
- В. Регистрации слухового вызванного потенциала
- Г. Вращательной пробе

Показанием для слухопротезирования у взрослых является потеря слуха от ____ дб и выше

- А. 50
- Б. 40
- В. 20
- Г. 30

При 3 степени сужения просвета рубцового стеноза гортани просвет сужен до ____ диаметра

- А. $\frac{1}{3}$
- Б. $\frac{1}{4}$
- В. $\frac{1}{2}$
- Г. $\frac{2}{3}$

По данным всемирной организации здравоохранения существует ____ тугоухости

- А. 6 Степеней
- Б. 2 Степени
- В. 3 Степени
- Г. 4 Степени

К наиболее частой локализации отдаленных метастазов рака гортани относят

- А. Печень
- Б. Легкие
- В. Средостение
- Г. Головной мозг

Наличие нескольких перфораций барабанной перепонки характерно для

- А. Эпитимпанита
- Б. Мезотимпанита
- В. Туберкулезного поражения среднего уха
- Г. Острого гнойного среднего отита

Основным симптомом острого профессионального ларингита является

- А. Дисфония
- Б. Кашель с мокротой
- В. Повышение температуры тела
- Г. Боль в горле

Паратонзиллярный абсцесс чаще всего бывает

- А. Задним
- Б. Боковым
- В. Передне-нижним
- Г. Передне-верхним

Боль в области лба при фронтите следует дифференцировать с

- А. Артериальной гипертензией
- Б. Невралгией лицевого нерва
- В. Мигренью
- Г. Невралгией тройничного нерва

Компенсированная стадия стеноза гортани характеризуется

- А. Появлением одышки при нагрузке и учащением пульса
- Б. Отсутствием одышки в покое и урежением пульса
- В. Появлением одышки в покое и урежением пульса
- Г. Отсутствием одышки в покое, но учащением пульса

Обонятельные нити проникают в полость носа через

- А. Бумажную пластинку решетчатой кости
- Б. Перпендикулярную пластинку решетчатой кости
- В. Крылонёбную ямку
- Г. Решетчатую пластинку

К основным симптомам папилломатоза гортани относят

- А. Нарушение глотания
- Б. Охриплость, удушье
- В. Поперхивание, при приеме пищи
- Г. Кровохарканье

В ротоглотке туберкулезные язвы обычно локализуются на

- А. Нёбных дужках
- Б. Спинке языка
- В. Малом язычке
- Г. Корне языка

При хроническом тонзиллите застойное валикообразное утолщение краев небных дужек характеризуется как признак

- А. Зака
- Б. Преображенского
- В. Бохона
- Г. Гизе

Видом тугоухости у новорожденных является

- А. Антидромная
- Б. Отоакустическая
- В. Вестибулярная
- Г. Ретрокохлеарная

Использование вестибулярных супрессантов при вестибулярном нейроните не должно превышать _____ дней

- А. 7
- Б. 10
- В. 3
- Г. 14

Длительный процесс заживления с развитием осложнений отмечается при _____ ранах наружного уха

- А. Укушенных
- Б. Резаных
- В. Колотых
- Г. Размозженных

У новорожденного ребенка есть клетки решетчатого лабиринта и

- А. Верхнечелюстные околоносовые пазухи
- Б. Левая лобная околоносовая пазуха
- В. Правая лобная околоносовая пазуха
- Г. Клиновидные околоносовые пазухи

Двигательными волокнами мышц гортани управляет _____ нерв

- А. Блуждающий
- Б. Подъязычный
- В. Лицевой
- Г. Тройничный

Классификация хронического тонзиллита по б.с. Преображенскому и в.т. Пальчуну выделяет простую и _____ формы

- А. Субкомпенсированную
- Б. Токсико-аллергическую I и II степени
- В. Компенсированную
- Г. Декомпенсированную

Туберкулезные поражения (бугорки) полости носа наиболее часто локализуются в

- А. Области носовых раковин
- Б. Области дна полости носа
- В. Нижнем хрящевом отделе носовой перегородки носа
- Г. Обонятельной зоне

Симптом гризингера может наблюдаться при

- А. Менингите
- Б. Абсцессе мозжечка
- В. Тромбозе сигмовидного синуса
- Г. Арахноидите

При врожденной атрезии хоан ребенку срочно показано проведение

- А. Иссечения атрезии и установка термопластических трубок
- Б. Искусственной вентиляции легких
- В. Назотрахеальной интубации
- Г. Трахеотомии с установкой трахеостомической канюли

При остром стенозе гортани вне лечебного учреждения проводится

- А. Микротрахеотомия
- Б. Коникотомия
- В. Трахеостомия
- Г. Трахеотомия

При синдроме шегрена чаще развивается/развиваются

- А. Узелки голосовых складок
- Б. Функциональная гипертонусная дисфония
- В. Субатрофический и атрофический хронический ларингит
- Г. Функциональная гипотонусная дисфония

Абсцесс височной доли мозга образуется из-за

- А. Разлитого гнойного воспаления мягких оболочек головного мозга, развивающегося в результате бактериального инфицирования
- Б. Патологического симптомокомплекса, обусловленного постоянным поступлением в кровь микроорганизмов из очага воспаления
- В. Ограниченного скопления гноя в веществе головного мозга, возникающего вторично
- Г. Воспаления оболочек головного мозга, развивающегося в результате распространения инфекции

Нехарактерным признаком заглоточного абсцесса является

- А. Отказ ребенка от пищи
- Б. Заболеваемость преимущественно у взрослых
- В. Затруднение дыхания
- Г. Флюктуирующее выпячивание задней стенки глотки

К основным симптомам абсцесса мозга относят головную боль, субфебрильную лихорадку и

- А. Головокружение
- Б. Ликворею
- В. Очаговую неврологическую симптоматику
- Г. Менингеальные знаки

Клетка галлера распространяется в

- А. Дно полости носа
- Б. Верхнечелюстную пазуху
- В. Клиновидную пазуху
- Г. Лобную пазуху

Лечение гематомы перегородки носа состоит из

- А. Вскрытия и дренирования полости
- Б. Передней тампонады носа
- В. Лазеротерапии и антибактериальной терапии
- Г. Дренирования полости и терапии

Головная боль при абсцессе мозжечка чаще локализуется в _____ области

- А. Височной
- Б. Лобной
- В. Теменной
- Г. Затылочной

К клиническим проявлениям лакунарной ангины относят

- А. Наличие плотно спаянных с поверхностью миндалин пленок серого цвета
- Б. Бледность слизистой оболочки небных миндалин
- В. Наличие язв покрытых белым налетом
- Г. Желтовато-белый налет в виде очагов или пленку на поверхности миндалин

В явной стадии отогенных абсцессов головного мозга и мозжечка выделяют общеинфекционные, общемозговые, проводниковые, _____ группы симптомов

- А. Общие
- Б. Местные
- В. Специальные
- Г. Очаговые

Выделение из полости носа серой и вязкой слизи с точечными чёрными фрагментами характерно для синусита

- А. Грибкового
- Б. Аллергического
- В. Вирусного
- Г. Бактериального

При дифтерии налёты характеризует

- А. Лёгкое отслоение
- Б. Грязно-серый цвет
- В. Белый цвет
- Г. Гной

Показанием для хирургического лечения деформации перегородки носа является

- А. Хронический гипертрофический ринит
- Б. Атрофический ринит
- В. Наличие деформации перегородки носа
- Г. Затруднение носового дыхания

Исследование обонятельной функции является

- А. Эндоскопия
- Б. Риноскопия
- В. Ольфактометрия
- Г. Риноманометрия

Хронический тонзиллит является

- А. Хроническим воспалением слизистой оболочки трахеи
- Б. Общим инфекционно-аллергическим заболеванием с местными проявлениями в виде стойкого хронического воспаления миндалин
- В. Воспалением слизистой оболочки гортани
- Г. Хроническим воспалением слизистой оболочки глотки

При абсцессе правой височной доли мозга головная боль наиболее часто локализуется в области

- А. Височно-теменной слева
- Б. Лобной
- В. Затылочной
- Г. Височно-теменной справа

К регионарным лимфатическим узлам первого порядка для нёбных миндалин относят

- А. Верхний узел глубокой яремной цепи шеи
- Б. Параларингеальные лимфатические узлы
- В. Верхние боковые шейные лимфатические узлы
- Г. Зачелюстные лимфатические узлы

Репозицию костей носа предпочтительней выполнять в срок, не превышающий _____ после травмы

- А. 72 Часа
- Б. 24 Часа
- В. 10-14 Суток
- Г. 1 Месяц

Невринома слухового нерва клинически проявляется патологией слуха, вестибулярного аппарата и

- А. Мозжечка
- Б. Тройничного нерва
- В. Лицевого нерва
- Г. Коркового центра слуха

Острый гнойный отит является воспалением барабанной полости, слуховой трубы и

- А. Улитки
- Б. Сосцевидного отростка
- В. Барабанной перепонки
- Г. Лабиринта

При истинном крупе голос бывает вначале хриплый, затем

- А. Развивается полная афония
- Б. Высокий
- В. Осиплый
- Г. Чистый

Шваннома гортани может быть проявлением

- А. Нейрофиброматоза Реклинхаузена
- Б. Синдрома Мунье - Куна
- В. Болезни Шенлейна - Геноха
- Г. Васкулита Кавасаки

Возбудителями фарингомикоза являются

- А. Staphylococcus aureus
- Б. Грибы рода Candida
- В. Haemophilus influenzae
- Г. Chlamydia pneumoniae

Локализацией контактных абсцессов отогенного происхождения у детей является

- А. Височная доля
- Б. Ствол мозга
- В. Лобная доля
- Г. Затылочная доля

Стартовая антибактериальная терапия у детей с острым гнойным средним отитом включает назначение

- А. Азитромицина 10 мг/кг 1 раз в день
- Б. Гентамицина 3-5 мг × 3 раза в день
- В. Метронидазола 20-30 мг/кг в день
- Г. Амоксициллина 40-90 мг/кг/сут в 3 приема

Сикоз носа вызывается

- А. Грибковой флорой
- Б. Demodex folliculorum
- В. Стрептококками и стафилококками
- Г. Анаэробной флорой

Юношеская фиброма носоглотки исходит из

- А. Надкостницы
- Б. Фасциального листка носоглотки
- В. Мышцы
- Г. Слизистой оболочки

Поражение слизистой оболочки носа от действия хрома проходит стадии

- А. Поверхностного изъязвления, глубокой язвы, перфорации носовой перегородки
- Б. Сенсебилизации, воспаления, некроза
- В. Воспаления и ожога
- Г. Ожога, воспаления, некроза

Симптом баллотирования характерен для инородного тела

- А. Бронха
- Б. Глотки
- В. Пищевода
- Г. Трахеи

Скопление крови при гематоме носовой перегородки возникает между

- А. Перегородкой носа и нижней носовой раковиной
- Б. Хрящом и надхрящницей
- В. Слизистой оболочкой и надхрящницей
- Г. Хрящом и слизистой оболочкой

Прорыв гноя через верхушку сосцевидного отростка и скопление его под грудино-ключично-сосцевидной мышцей развивается при

- А. Мастоидите Бецольда
- Б. Зигоматиците
- В. Фурункуле наружного слухового прохода
- Г. Петрозите

При наличии у работника I (легкой) степени снижения слуха медицинским противопоказанием к работе является

- А. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения
- Б. Отрицательная аудиологическая динамика (в течение года)
- В. Сопутствующая сердечно-сосудистая патология
- Г. Ухудшение разборчивости шепотной речи (в течение года)

Образованием голосовой складки сосочкового строения, напоминающим цветную капусту, является

- А. Полип
- Б. Гранулема
- В. Киста
- Г. Папиллома

Эндолимфа и перилимфа различаются по

- А. Ионному составу
- Б. Количеству
- В. По окраске
- Г. Удельному весу

Лакунарную ангину чаще всего вызывают

- А. Коронавирусы
- Б. β -Гемолитические стрептококки группы А
- В. Аденовирусы
- Г. Спирохета щечная и веретенообразная палочка

К методам остановки носового кровотечения в амбулаторных условиях относят

- А. Перевязку наружной сонной артерии
- Б. Гидравлическую отсепаровку
- В. Переднюю и заднюю тампонаду
- Г. Селективную эмболизацию сосудов

Двигательными волокнами мышц гортани управляет _____ нерв

- А. Лицевой
- Б. Тройничный
- В. Подъязычный
- Г. Блуждающий

При носовом кровотечении через _____ показано удалять переднюю тампонаду

- А. 7 Дней
- Б. Несколько часов
- В. 2 Недели
- Г. 2-3 Дня

При остром среднем отите, осложненном мастоидитом, проводят

- А. Антродренаж
- Б. Антротомию
- В. Общеполостную санирующую операцию
- Г. Антромастоидотомию

Число отверстий, которыми полукружные каналы открываются в преддверие, равно

- А. 2
- Б. 1
- В. 5
- Г. 3

Резонаторами постоянного типа, влияющими на тембр, являются

- А. Мягкое нёбо, мышцы нижней челюсти
- Б. Твердое нёбо, околоносовые пазухи
- В. Диафрагма, мышцы шеи
- Г. Губы, щеки, язык

Среди бактериальных возбудителей острого риносинусита к наиболее значимым относят

- А. Streptococcus pneumoniae
- Б. Хламидии
- В. Микоплазмы
- Г. Aureus

Отёк подкожной клетчатки шеи, распространяющийся ниже ключиц, характерен для

- А. Токсической дифтерии ротоглотки III степени
- Б. Тяжёлого течения скарлатины
- В. Паротитной инфекции с субмаксиллитом
- Г. Инфекционного мононуклеоза

Что является основным в лечении токсической дифтерии ротоглотки?

- А. Противодифтерийная сыворотка
- Б. Плазмоферез
- В. Глюкокортикоиды
- Г. Антибиотики

Показанием к тонзиллэктомии являются рецидивирующие ангины, паратонзиллиты, паратонзиллярные абсцессы и

- А. Метатонзиллярные осложнения
- Б. Рецидивирующие респираторные заболевания
- В. Субфебрильная температура
- Г. Местные признаки хронического тонзиллита

К общим осложнениям острого тонзиллита относят ревматизм, миокардит, эндокардит, гломерулонефрит, ревматоидный полиартрит и

- А. Аденогепатоспленомегалию
- Б. Тонзиллогенный сепсис
- В. Острый шейный лимфаденит
- Г. Стеноз гортани

К грозным, часто фатальным осложнениям, при резаных ранах гортани относят

- А. Парез гортани
- Б. Кровотечение из крупных сосудов шеи
- В. Кровоизлияние в мышцы
- Г. Эмфизему в области шеи

Сифилитическое поражение гортани при вторичном сифилисе характеризуется

- А. Корками в просвете голосовой щели
- Б. Расположением гуммы в верхнем этаже гортани
- В. Отеком подскладочного пространства
- Г. Эритемой истинных голосовых складок

При неосложненной форме риносинусита стартовым препаратом для детей является

- А. Левофлоксацин
- Б. Ампициллин
- В. Гентамицин
- Г. Амоксициллин

Первой помощью при инородном теле бронхов является проведение

- А. Обезболивания
- Б. Коникотомии
- В. Противоотечной терапии
- Г. Бронхоскопии

Решётчатая воронка ограничена спереди и сзади

- А. Крючковидным отростком и bulla ethmoidalis
- Б. Agger nasi и bulla ethmoidalis
- В. Крючковидным отростком и передним краем средней носовой раковиной
- Г. Крючковидным отростком и agger nasi

Круглые инородные тела из полости носа удаляют

- А. Анатомическим пинцетом
- Б. Корнцангом
- В. Крючком
- Г. Щипцами Блейсли