

Тесты с вопросами по специальности «Оториноларингология» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/lor/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Оториноларингология» для аккредитации и других экзаменов (3900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/otorinolaringolog/

2) Тесты для аккредитации «Сурдология-оториноларингология» (1100 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/surdologiya/

3) Сурдология-оториноларингология (аттестация — тесты с ответами)

→ medik-otvet.ru/product/surdolog/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте фарингоскопические признаки хронического тонзиллита с названием их по автору:

1. Признак зака.

А. Инфильтрация и гиперплазия краев передних дужек;

Б. Гиперемия краев небных дужек;

В. Отечность краев верхних отделов небных дужек.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Формы аллергического ринита:

1. Среднетяжелая форма:

А. Проявления ринита беспокоят больного менее 4-х дней в неделю или менее 4-х недель в году;

Б. Симптомы настолько выражены, что пациент не может нормально работать, учиться, заниматься спортом и спать ночью, если не получает лечение;

В. Симптомы нарушают сон пациента, препятствуют работе, учебе, занятиям спортом. Качество жизни существенно ухудшается;

Г. Проявления ринита беспокоят больного более 4-х дней в неделю, или более 4-х недель в году;

Д. У пациента имеются лишь незначительные клинические признаки болезни, не нарушающие дневную активность или сон.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Наиболее часто микроорганизмы проникают в среднее ухо через

А. слуховую трубу (ринотубарный путь)

Б. наружный слуховой проход при травме барабанной перепонки

В. кровь (гематогенный путь)

Г. из полости черепа по преддверно - улитковому и лицевому нервам (периневрально)

Первый нейрон звукового анализатора располагается в

- А. в преддверии
- Б. в полукружных каналах
- В. в улитке
- Г. в продолговатом мозге

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте иннервацию глотки:

1. Гортань у взрослого человека.

- А. III – IV;
- Б. IV – VI.
- А. 1-А
- Б. 1-Б

Заглочное пространство у детей содержит

- А. сосудисто-нервный пучок
- Б. лимфатические узлы
- В. слизистые железы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте возбудителей и заболевания, основным этиологическим фактором которого они являются:

1. Bacteriae leptotrix.

- А. Ангина вульгарная;
- Б. Ангина симановского – венсана – плаута;
- В. Гиперкератоз глотки;
- Г. Эпиглоттит;
- Д. Озена.
- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Соотнесите анатомические образования, составляющие скелет наружного носа и носовой перегородки:

1. Скелет перегородки носа.

- А. Лобная кость;
- Б. Носовая кость;
- В. Передняя носовая ость;
- Г. Сошник;
- Д. Гребень клиновидной кости.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Какие из форм микозов относятся к инвазивным, а какие к неинвазивным формам грибкового поражения носа и онп:

1. Инвазивная форма.

- А. Поверхностный синоназальный микоз;
- Б. Острая молниеносная форма;
- В. Грибковый шар;
- Г. Хроническая форма;
- Д. Аллергический грибковый синусит.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

При ожоге гортани в первую очередь поражается

- А. гортанная поверхность надгортанника
- Б. вестибулярные складки
- В. голосовые складки
- Г. язычная поверхность надгортанника

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Клинические особенности гиперчувствительности к различным аллергенам:

1. Аллергия на пыльцу растений.

А. Непереносимость дрожжесодержащих и других продуктов, ухудшение состояния во влажную погоду, а также при посещении сырых, плохо проветриваемых помещений;

Б. Возникновение симптомов при контакте с животными, усиление проявлений ринита при ношении одежды из шерсти и меха;

В. Облегчение или исчезновение симптомов Ринита, когда больной находится вне дома. Круглогодичное течение заболевания с обострениями в прохладное время года, появление симптомов ночью, манифестация симптомов при уборке квартиры, во время ремонта;

Г. Облегчение состояния в городских условиях и ухудшение при выезде за город, сезонность обострений, метеозависимость.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Клинические особенности гиперчувствительности к различным аллергенам:

1. Периферическое головокружение.

А. Поражение проводящих путей головного мозга;

Б. Поражение вестибулярного нерва;

В. Поражение вестибулярных ядер;

Г. Поражение лабиринта.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Наиболее вероятный путь при распространении инфекции из среднего уха при субдуральном абсцессе

А. гематогенный

Б. контактный

В. лимфогенный

Г. преформированный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте кистовидное растяжение околоносовых пазух и их содержимое:

1. Пиоцеле.

А. Гной;

Б. Слизь;

В. Кровь;

Г. Воздух.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Адекватный метод хирургического лечения нейро-вегетативной формы вазомоторного ринита

А. конхотомия

Б. гальванокаустика

В. подслизистая вазотомия

Г. подслизистая резекция носовой перегородки

Пункция верхнечелюстной пазухи проводится через носовой ход

А. общий

Б. нижний

В. средний

Г. верхний

У детей раннего возраста в среднем ухе происходит некролиз

А. соединительной ткани

Б. эпителия

В. миксоидной ткани

Г. хрящевой ткани

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Какие из перечисленных методов относятся к объективным, а какие к субъективным методам исследования слуховой функции:

1. Субъективные методы.

А. Акуметрия;

Б. Методы электрофизиологической аудиометрии (квп,свп,дсвп);

В. Тональная пороговая аудиометрия;

Г. Тональная надпороговая аудиометрия;

Д. Методы электроакустической аудиометрии (оаэ, акустическая рефлектометрия).

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Нижняя стенка полости носа образована

А. крыловидный отросток клиновидной кости и небный отросток верхней челюсти

Б. небный отросток верхней челюсти и горизонтальная пластинка небной кости

В. горизонтальная пластинка небной кости и крыловидный отросток клиновидной кости

Г. крыловидный отросток клиновидной кости и сошник

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте расположение физиологических отверстий глотки:

1. Хоана.

А. Носоглотка;

Б. Ротоглотка;

В. Гортаноглотка.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Клинические проявления певческих узелков

А. болевые ощущения

Б. приступообразный кашель

В. стойкая дисфония

Г. клинически не проявляются

Диагноз агранулоцитарной ангины устанавливается после исследования

- А. мочи
- Б. крови
- В. гистологического
- Г. бактериологического

Дыхательная функция полости носа исследуется с помощью

- А. эндоскопии полости носа
- Б. ринопневмометрии
- В. передней риноскопии
- Г. задней риноскопии

Глотка проецируется на шейные позвонки

- А. 01--03
- Б. 01--04
- В. 01--05
- Г. 01--06

Сигмовидный синус находится

- А. в задней черепной ямке
- Б. в передней черепной ямке
- В. в средней черепной ямке
- Г. основании черепа

При фурункуле носа возможно осложнение

- А. тромбоз сигмовидного синуса
- Б. тромбоз кавернозного синуса
- В. мастоидит
- Г. абсцесс височной доли

Отток венозной крови из гортани осуществляется в

- А. наружную яремную
- Б. переднюю яремную вену
- В. внутреннюю яремную
- Г. позадичелюстную вену

В клинике абсцесса височной доли головного мозга выделяют стадий

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

Для промывания серной пробки следует применять воду имеющую температуру

- А. 27 °C
- Б. 37 °C
- В. 20 °C
- Г. 49 °C

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и возбудителем. Заболевание:

1. Лакунарная ангина. Возбудитель:

- А. Бацилла леффлера;
 - Б. Веретенообразная палочка + спирохета полости рта;
 - В. Стрептококк.
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1- В

Передние клетки решетчатого лабиринта открываются в носовой ход

- А. верхний
- Б. средний
- В. нижний
- Г. общий

При отосклерозе выполняется операция

- А. антромастотомия
- Б. стапедопластика
- В. аттикоантромия
- Г. тимпанопластика

Кровоснабжение полости носа обеспечивается ветвями

- А. внутренней сонной артерии
- Б. наружной сонной артерии
- В. внутренней и наружной сонной артерии

Сила шепотной речи соответствует примерно

- А. 20 дБ
- Б. 30 дБ
- В. 40 дБ
- Г. 50 дБ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Соотнесите структуры, обеспечивающие соответствующие функции звукового анализатора:

1. Звукопроводение.

- А. Ушная раковина;
- Б. Улитка;
- В. Наружный слуховой проход;
- Г. Кортиев орган;
- Д. Слуховые косточки.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте заболевание и адекватный метод хирургического лечения:

1. Искривление перегородки носа.

- А. Подслизистая конхотомия;
- Б. Подслизистая резекция носовой перегородки;
- В. Подслизистая вазотомия.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте иннервацию глотки:

1. Ротоглотка.

А. Тройничный нерв;

Б. Языкоглоточный;

В. Блуждающий.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Выберите правильные соответствия между стенками наружного слухового прохода и образованиями, с которыми они граничат:

1. Передняя стенка.

А. Граничит с капсулой околоушной слюнной железы;

Б. Граничит с височно-нижнечелюстным суставом;

В. Граничит с воздухоносными клетками сосцевидного отростка, с пещерой;

Г. Граничит со средней черепной ямкой.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Причина возникновения постинтубационной гранулемы гортани

А. использование интубационной трубки несоответствующего размера

Б. несоблюдение голосового режима пациентом

В. острый ларингит в послеоперационном период

Г. длительная интубация гортани

В глотке располагается миндалин

А. три

Б. четыре

В. пять

Г. шесть

кт признак, характерный для синдрома молчащего синуса является

- А. растяжение стенок клетки решетчатого лабиринта
- Б. наличие дополнительного соустья
- В. латерализация крючковидного отростка
- Г. наличие тени полувоальной формы

Воспаление всех придаточных пазух носа называется

- А. полисинусит
- Б. пансинусит
- В. гемисинусит
- Г. риносинусит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. В функциональном (физиологическом) отношении в слуховом анализаторе различают две части. Выберите соответствия:

1. Звуковоспринимающая часть.

- А. Спиральный (кортиев) орган;
- Б. Ушная раковина;
- В. Улитка;
- Г. Нервный путь до мозгового центра;
- Д. Наружный слуховой проход.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте парные и непарные хрящи гортани:

1. Непарные хрящи.

А. Щитовидный;

Б. Черпаловидный;

В. Надгортанник;

Г. Рожковидный;

Д. Перстневидный.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Прессорная пробы проводится при исследовании анализатора

А. звукового

Б. обонятельного

В. вестибулярного

Г. вкусового

Степени отклонения туловища при пробе воячека

А. одна

Б. две

В. три

Г. четыре

Паралич мягкого неба сопровождается

А. нарушением обоняния

Б. закрытой гнусавостью

В. открытой гнусавостью

Г. затруднением носового дыхания

В формировании ската носа участвует

А. носовая кость

Б. лобная кость

В. продырявленная пластинка решетчатой кости

Г. передняя стенка клиновидной пазухи

Положение больного в позе «ружейного курка» или «легавой собаки» наблюдается при

- А. отосклерозе
- Б. менингите
- В. лабиринтите
- Г. аэроотите

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте онп и носовые ходы, в которые открываются их соустья:

1. Средний носовой ход.

- А. Клиновидная пазуха;
- Б. Верхнечелюстная пазуха;
- В. Лобная пазуха;
- Г. Передние клетки решетчатого лабиринта;
- Д. Средние клетки решетчатого лабиринта.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Выберите правильные соответствия:

1. Антрохоанальный полип.

- А. Поллиноз;
- Б. Муковисцидоз (кистозный фиброз);
- В. Синдром Янга;
- Г. Бронхиальная астма;
- Д. Аллергический ринит.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Симптом кернига наблюдается при

- А. арахноидите
- Б. лабиринтите
- В. менингите
- Г. сифилисе

В средний носовой ход открываются

- А. верхнечелюстная пазуха, лобная пазуха, клиновидная пазуха
- Б. носо-слезный канал, верхнечелюстная пазуха, передние клетки решетчатого лабиринта
- В. лобная пазуха, передние и средние клетки решетчатого лабиринта, верхнечелюстная пазуха
- Г. клиновидная пазуха, задние клетки решетчатого лабиринта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте вид лечения, адекватный для стадии стеноза гортани:

1. Стадия компенсации.

- А. Консервативная терапия;
 - Б. Трахеотомия;
 - В. Коникотомия.
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1- В

Брадикардия характерна для

- А. менингита
- Б. лабиринтита
- В. абсцесса височной доли головного мозга
- Г. синустромбоза

Для поперечного перелома височной кости наиболее характерно

- А. ликворея
- Б. кровотечение из уха
- В. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва
- Г. гемианопсия

Холестеатома характерна для

- А. отосклероза
- Б. адгезивного отита
- В. хронического гнойного мезотимпанита
- Г. хронического гнойного эптитимпанита

Проникновение инфекции в среднее ухо при остром среднем отите происходит чаще всего

- А. транстимпанальным путем
- Б. тубарным путем
- В. гематогенным путем
- Г. лимфогенным путем

Для флегмонозного ларингита наиболее характерно

- А. дисфония и боль в гортани
- Б. дисфония, дисфагия, боль в гортани, лихорадка, нарастающая дыхательная недостаточность
- В. дисфагия, боль за грудиной
- Г. дисфагия, боль при глотании

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между исследуемым органом и методом исследования. Орган:

1. Нос и онп. Метод исследования:

- А. Диафаноскопия;
- Б. R- графия;
- В. Задняя риноскопия;
- Г. Передняя риноскопия.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

Характерным симптомом озоны является

- А. зловонный насморк
- Б. гипертрофия носовых раковин
- В. вязкий секрет
- Г. узкие носовые ходы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. При исследовании слуха с помощью камертона используют несколько опытов. Выберите правильные соответствия, для чего проводятся эти опыты:

1. Опыт вебера.

- А. Изучение состояния звуковоспринимающего аппарата;
- Б. Выявление фиксации стремени в окне преддверия при отосклерозе;
- В. Выявление «латерализации» звука в одном или другом ухе;
- Г. Сравнение длительности восприятия звука камертона через воздух и через кость.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Задние клетки решетчатого лабиринта открываются в носовой ход

- А. верхний
- Б. средний
- В. нижний
- Г. общий

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте отклонение туловища при проведении опыта воячека со степенью реакции:

1. Первая степень.

- А. 0 – 5 °;
- Б. 5 – 30 °;
- В. Более 30 °.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Для гемисинуита характерно

- А. воспаление всех околоносовых пазух
- Б. лево- или правостороннее воспаление всех пазух на одноименной стороне
- В. поражение нескольких околоносовых пазух
- Г. поражение одной околоносовой пазухи

Больным с гортанной ангиной показано лечение в

- А. лор отделении
- Б. в поликлинике
- В. в инфекционном отделении
- Г. в реанимации

Границей между ротоглоткой и гортаноглоткой является

- А. нижний край мягкого неба
- Б. корень языка и надгортанник
- В. нижние полюса небных миндалин
- Г. дно полости рта

Сила громкой разговорной речи составляет

- А. 30 дБ
- Б. 50 дБ
- В. 65 дБ
- Г. 80 дБ

Острый ринит имеет стадии

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

При адгезивном среднем отите наблюдается

- А. перфорация барабанной перепонки
- Б. слизисто-гнойное отделяемое в слуховом проходе
- В. отложение извести на барабанной перепонке
- Г. грануляции, полипы в барабанной полости

Гортань у детей находится на уровне шейных позвонков

- А. VI-VII
- Б. IV-VI
- В. III-IV
- Г. II-III

Воспаление слизистой оболочки глотки называется

- А. фарингит
- Б. ларингит
- В. тонзиллит
- Г. ринит

Для хронического гнойного эпитимпанита характерны изменения барабанной перепонки в виде

- А. центральной перфорации
- Б. втянутости
- В. краевой перфорации в ненатянутой части
- Г. выбухание

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Что относится к риногенным и отогенным внутричерепным осложнениям?

1. Отогенные.

- А. Менингит;
- Б. Абсцесс мозга;
- В. Экстрадуральный абсцесс;
- Г. Субдуральный абсцесс;
- Д. Синустромбоз.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Для юношеской ангиофибромы основания черепа характерн

- А. затруднение носового дыхания
- Б. налет на небных миндалинах
- В. стекание гноя по задней стенке глотки
- Г. деформация лица

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте симптомы, характерные для стадии стеноза гортани:

1. Стадия компенсации.

А. Урежение и углубление дыхания, выпадение пауз между вдохом и выдохом;

Б. Инспираторная одышка в покое, бледность кожных покровов, беспокойное состояние больного;

В. Пульс становится частым, слабым, кожа бледно-серого цвета, состояние усугубляется экзофтальмом – выпячиванием глаз, потерей сознания, непроизвольным мочеиспусканием, дефекацией, возможна остановка сердца.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Начало пищевода соответствует проекции

А. верхнего края щитовидного хряща

Б. подъязычной кости

В. нижнего края перстневидного хряща

Г. нижнего края щитовидного хряща

Диагноз агранулоцитарной ангины устанавливается после исследования

А. бактериологического

Б. цитологического

В. крови

Г. мочи

Парацентез барабанной перепонки производится в квадранте

А. задне-верхнем

Б. передне-нижнем

В. передне-верхнем

Г. задне-нижнем

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Соотнесите анатомические образования, отвечающие за восприятие ускорения:

1. Преддверие.

А. Угловое ускорение;

Б. Прямолинейное ускорение;

В. Ускорение силы тяжести.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Первый нейрон проводящих путей вестибулярного анализатора располагается

А. в преддверии

Б. в полукружных каналах

В. во внутреннем слуховом проходе

Г. в наружном слуховом проходе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите правильные соответствия между основными типами назальных полипов:

1. Антрохоанальный полип.

А. Односторонний;

Б. Двухсторонний;

В. Возникает из гайморовой пазухи;

Г. Возникает из решётчатого лабиринта;

Д. Обычно бывает у детей.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Иннервация внутреннего уха осуществляется черепными нервами

А. V

Б. VI

В. VII

Г. VIII

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Соотнесите значения силы звука и вида речи:

1. Шепотная речь.

А. 30 дБ;

Б. До 60 дБ;

В. 80 дБ.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте формы воспаления онп:

1. Смешанная форма.

А. Кистозная;

Б. Гнойно – полипозная;

В. Катаральная;

Г. Пристеночно - гиперпластическая;

Д. Гребень клиновидной кости.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Адекватный метод лечения при токсико-аллергической форме I степени хронического тонзиллита

А. промывание лакун небных миндалин

Б. тонзиллотомия

В. тонзиллэктомия

Г. физиотерапевтическое лечение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Выберите правильные соответствия: что происходит с голосовой щелью:

1. При спокойном дыхании.

А. Приобретает форму овала;

Б. Приобретает форму треугольника;

В. Приобретает форму ромба.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Рейснерова мембрана располагается в

А. полукружных каналах

Б. улитке

В. преддверии

Г. барабанной полости

Гортань у детей находится на уровне шейных позвонков

А. II-III

Б. IV-VI

В. III-IV

Г. IV-VII

Предрасполагающим фактором к возникновению фурункула носа является

А. бронхиальная астма

Б. гипертоническая болезнь

В. сахарный диабет

Г. псориаз

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Периферический отдел слухового анализатора состоит из трёх частей. Выберите соответствия:

1. Наружное ухо.

А. Барабанная перепонка;

Б. Ушная раковина;

В. Полости сосцевидного отростка;

Г. Улитка;

Д. Наружный слуховой проход.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Цваардемакер.

А. Химическая теория;

Б. Физическая теория;

В. Физико-химическая теория.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Клиновидная пазуха открывается в носовой ход

А. верхний

Б. средний

В. нижний

Г. общий

Коникотомия при остром стенозе гортани показана в стадии

А. компенсации

Б. стадии неполной компенсации

В. стадии декомпенсации

Г. терминальной стадии

Наиболее часто риногенные внутричерепные осложнения возникают как осложнение

- А. гайморита
- Б. фронтита
- В. этмоидита
- Г. сфеноидита

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Местные и общие причины носовых кровотечений:

1. Общие причины.

- А. Хирургические вмешательства;
- Б. Заболевания печени;
- В. Гипертоническая болезнь;
- Г. Злокачественные и доброкачественные новообразования полости носа и носоглотки.
- Д. Нефросклероз.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Лимфатическая сеть гортани более развита в этаже

- А. верхнем
- Б. среднем
- В. нижнем
- Г. верхнем и нижнем

Пункцию верхнечелюстной пазухи проводят через

- А. верхний носовой ход
- Б. нижний носовой ход
- В. средний носовой ход
- Г. общий носовой ход

Через зев полость рта сообщается с отделом глотки

- А. верхним
- Б. средним
- В. нижним

В опыте вебера при двустороннем заболевании звуковоспринимающего аппарата звук латерализуется в

- А. хуже слышащее ухо
- Б. в оба уха одинаково
- В. в центре головы
- Г. лучше слышащее ухо

Границы трахеи

- А. 4-5 шейный позвонок и 5-6 грудной позвонок
- Б. 6-7 шейный позвонок и 4-5 грудной позвонок
- В. 4-5 шейный позвонок и 6 грудной позвонок
- Г. нижний край перстневидного хряща и 6 грудной позвонок

При закрытии обонятельной щели наступает

- А. эссенциальная гипо- или аносмия
- Б. респираторная гипо-или аносмия
- В. кокасмия

В клинике отогенного абсцесса головного мозга выделяют стадий

- А. одну
- Б. две
- В. три
- Г. четыре

Располагающиеся в небных миндалинах под эпителием желтые «просяные» точки характерны для ангины

- А. дифтеритической
- Б. лакунарной
- В. фолликулярной
- Г. агранулоцитарной

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Выберите правильные соответствия между заболеваниями глотки и их симптомами:

1. Ангина.

А. Грязно-серые налеты на небных миндалинах, дужках;

Б. Гиперемия небных миндалин и дужек;

В. Болезненность регионарных лимфоузлов;

Г. На поверхности миндалин видны желтовато-белые точки;

Д. Налеты распространяются на заднюю стенку глотки, в гортань.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Трепанопункция лобной пазухи проводится через стенку

А. нижнюю

Б. медиальную

В. переднюю

Г. заднюю

Отоскопическим признаком отосклероза является

А. перфорация барабанной перепонки в ненапрянутой части

Б. нормальный вид или истончение барабанной перепонки

В. перфорация барабанной перепонки в натянутой части

Г. наличие петрификатов на барабанной перепонке

Адекватный раздражитель рецепторов полукружных каналов

А. прямолинейное ускорение

Б. угловое ускорение

В. прямолинейное и угловое ускорение

Носовую перегородку образуют

А. треугольный хрящ, решетчатый лабиринт, сошник

Б. перпендикулярная пластинка решетчатой кости, сошник, четырехугольный хрящ, носовой гребешок верхней челюсти

В. небная кость, сошник, четырехугольный хрящ

Г. носовая кость, четырехугольный хрящ, сошник

Рыхлый подслизистый слой лучше развит в этаже гортани

- А. верхнем
- Б. среднем
- В. нижнем

Периферическим рецептором звукового анализатора является

- А. отолитовый аппарат
- Б. кортиева орган
- В. ампулярный аппарат
- Г. барабанная перепонка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте характеристики сенсоневральной тугоухости:

1. I степень.

- А. Потеря слуха 26 – 40 дБ;
- Б. Потеря слуха 41 – 55 дБ;
- В. Потеря слуха 56 – 70 дБ;
- Г. Потеря слуха 71 – 90 дБ;
- Д. Потеря слуха более 91 дБ.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Чувствительная иннервация глотки осуществляется

- А. второй веточкой тройничного нерва, блуждающим и подъязычным нервами
- Б. блуждающим нервом, первой и второй ветвями тройничного нерва
- В. первой и второй ветвями тройничного нерва и языкоглоточным нервом
- Г. языкоглоточным, блуждающим нервами и второй веточкой тройничного нерва

Ампулофугальное направление движения эндолимфы – это движение

- А. к ампуле
- Б. от ампулы
- В. вокруг ампулы
- Г. внутри ампулы

Чтобы определить продолжительность нистагма взгляд исследуемого фиксируют

- А. в сторону медленного компонента нистагма
- Б. в сторону быстрого компонента нистагма
- В. прямо перед собой

Для продольного перелома височной кости наиболее характерно

- А. кровотечение из уха
- Б. выпадение функций внутреннего уха и паралич лицевого нерва
- В. гемианопсия
- Г. системное головокружение

При гнойном сфеноидите отделяемое при риноскопии наблюдается в носовом ходе

- А. общем
- Б. нижнем
- В. среднем
- Г. верхнем

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Соотнесите этажи глотки шейным позвонкам.

- А. I – III;
- Б. III;
- В. IV – VI.
- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Симптом гизе характерен для

- А. атрофического фарингита
- Б. острого ларингита
- В. хронического тонзиллита
- Г. ангины

Расширяет просвет гортани мышца

- А. парная боковая перстнечерпаловидная
- Б. парная задняя перстнечерпаловидная
- В. парная косая черпаловидная
- Г. непарная поперечная черпаловидная

признаком гнойного воспаления клиновидной пазухи является наличие гноя в

- А. верхнем носовом ходе
- Б. среднем носовом ходе
- В. нижнем носовом ходе
- Г. общем носовом ходе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте вегетативные реакции при проведении отолитовой пробы по воячку:

1. Первая степень.

- А. Изменение сердечной и дыхательной деятельности, рвота, обморок;
- Б. Холодный пот, тошнота;
- В. Побледнение лица, изменение пульса.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Патогенетической основой болезни меньера считается

- А. гидропс лабиринта
- Б. наличие холестеатомы
- В. нарушения в эндокринной системе
- Г. артериальная гипертензия

При проведении вращательной пробы в кресле барани голову больного наклоняют

- А. на 60 градусов назад
- Б. на 30 градусов вперед
- В. на левый бок
- Г. на правый бок

Круглое окно располагается на стенке барабанной полости

- А. медиальной
- Б. латеральной
- В. передней
- Г. задней

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Укажите, в каких анатомических образованиях находятся рецепторы:

1. Вестибулярного анализатора.

А. Преддверие;

Б. Полукружные каналы;

В. Перепончатая улитка.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Кистовидное растяжение околоносовых пазух содержащее гной называется

А. пиоцеле

Б. гемоцеле

В. пневмоцеле

Г. мукоцеле

Углубления между складками преддверия и голосовыми складками называются

А. грушевидные синусы

Б. гортанные желудочки

В. ямки розенмюллера

Г. валлекулы

Адиадохокинез определяется при

А. тромбозе кавернозного синуса

Б. абсцессе лобной доли головного мозга

В. абсцессе мозжечка

Г. абсцессе височной доли головного мозга

Гемианопсия наблюдается при

А. абсцессе лобной доли головного мозга

Б. абсцессе височной доли головного мозга

В. абсцессе мозжечка

Г. тромбозе кавернозного синуса

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте стенки полости носа и образования, с которыми они граничат:

1. Нижняя.

А. Сошник;

Б. Четырехугольный хрящ;

В. Горизонтальная пластинка небной кости;

Г. Решетчатая кость;

Д. Продырявленная пластинка решетчатой кости.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения. Заболевание:

1. Отосклероз. Метод лечения:

А. Радикальная операция на ухе;

Б. Стапедопластика;

В. Операция на эндолимфатическом мешке.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

У новорожденных отсутствуют околоносовые пазухи

А. лобные

Б. верхнечелюстные

В. решетчатый лабиринт

Г. лобные и клиновидные

Гортань у детей соответствует уровню шейных позвонков

А. IV-VI

Б. II-III

В. III-IV

Г. IV-VII

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте стадию воспаления среднего уха и отоскопическую картину:

1. Острый тубоотит.

А. Мг гиперемизирована, инфильтрирована, отечна, выбухает, пульсирует;

Б. Мг перфорирована, гиперемизирована;

В. Втяжение мт – укорочение рукоятки молоточка, укорочение/исчезновение светового конуса;

Г. Мг местами петрифицирована, утолщена;

Д. Мг гиперемизирована, отечна.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и тактикой лечения. Заболевание:

1. Острый катаральный средний отит. Тактика лечения:

А. Обезболивающие и противовоспалительные капли;

Б. Продувание слуховых труб;

В. Турунды с антибактериальной мазью в ухо.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Срочная трахеостомия показана при остром стенозе гортани в стадии

А. компенсации

Б. субкомпенсации

В. декомпенсации

Г. асфиксии

Инородные тела чаще встречаются в

А. гортани

Б. трахее

В. бронхах

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Выберите правильные соответствия: постановка тимпаностомических трубок:

1. Проводится.

А. Детям до 6 мес.;

Б. Детям с хроническим экссудативным средним отитом;

В. Детям с баротравмой;

Г. Детям с осложнениями острого среднего отита (ателектаз, адгезивный средний отит);

Д. Детям с нейросенсорной тугоухостью.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Клинические особенности центрального и периферического головокружения:

1. Центральное головокружение.

А. Горизонтальный или горизонтально-ротаторный нистагм;

Б. Наличие симптомов поражения ствола головного мозга/или мозжечка;

В. Горизонтальный, вертикальный, альтернирующий нистагм;

Г. Фиксация взора уменьшает головокружение или нистагм;

Д. Нарушение слуха/или звон, шум в ухе.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Причины различных форм стенозов гортани:

1. Молниеносный.

А. Воспалительный отек гортани, травматический отек гортани, гематома гортани;

Б. Инородное тело гортани, аллергический отек, парезы гортани;

В. Новообразования гортани, рубцовые изменения, парезы гортани.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

При травме гортани, осложненной кровотечением, пострадавший должен находиться в положении

А. сидя

Б. лежа на спине

В. лежа на противоположной повреждению стороне

Г. лежа на стороне повреждения или на животе

Размер тампона для задней тампонады носа должен соответствовать размеру

А. ногтевых фаланг больших пальцев врача

Б. ногтевых фаланг больших пальцев пациента

В. ногтевых фаланг указательных пальцев врача

Г. ногтевых фаланг указательных пальцев пациента

Заглочные абсцессы чаще развиваются в возрасте

А. от 20 до 30 лет

Б. от 10 до 20 лет

В. от 3 до 10 лет

Г. до 3 лет

При опыте швабаха определяют

А. длительность восприятия звука по воздуху

Б. длительность восприятия звука по кости

В. разницу в длительности восприятия звука по воздуху и по кости

Г. латерализацию звука

Вход в гортань ограничен спереди

- А. верхушками черпаловидных хрящей
- Б. надгортанником
- В. черпалонадгортанными складками
- Г. хоанами

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте частотные характеристики звуков:

1. Звуки низкой частоты.

- А. 16 – 800 гц;
 - Б. 800 – 4000 гц;
 - В. 4000 – 10000 гц;
 - Г. 10000 – 20000 гц.
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1- В
 - Г. 1-Г

Паракузис willisii наблюдается при

- А. болезни меньера
- Б. отосклерозе
- В. нейросенсорной тугоухости
- Г. адгезивном отите

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Соотнесите анатомические образования и локализацию:

1. Кавернозный синус.

- А. Передняя черепная ямка;
 - Б. Средняя черепная ямка;
 - В. Задняя черепная ямка.
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1- В

Риногенные абсцессы чаще всего возникают

- А. в височной доле
- Б. в лобной доле
- В. в теменной доле
- Г. в затылочной доле

С латеральной стенкой клиновидной пазухи граничит синус

- А. продольный
- Б. поперечный
- В. сигмовидный
- Г. пещеристый

Опыт ринне при отосклерозе будет

- А. укорочен
- Б. удлинен
- В. положительный
- Г. отрицательный

Детям обычно делают трахеотомию

- А. нижнюю
- Б. среднюю
- В. верхнюю

Направление нистагма определяется

- А. направлением медленного компонента нистагма
- Б. направлением быстрого компонента нистагма
- В. самым больным
- Г. аудиометрией

Положение больного в позе «ружейного курка» характерно для внутричерепного осложнения

- А. менингита
- Б. абсцесса мозжечка
- В. абсцесса лобной доли головного мозга
- Г. абсцесса височной доли головного мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте костные и хрящевые составляющие носовой перегородки:

1. Костная часть перегородки носа.

А. Сошник;

Б. Слезная кость;

В. Перпендикулярная пластинка решетчатой кости;

Г. Четырехугольный хрящ.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Типичной локализацией кровотока полипа полости носа является

А. перпендикулярная пластинка решетчатого лабиринта

Б. дно полости носа

В. хрящевая часть носовой перегородки

Г. костная часть носовой перегородки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте группы врожденных дефектов носа:

1. Гипергенезия.

А. Избыточное развития органа;

Б. Недоразвитие органа;

В. Нарушение нормального положения органа;

Г. Неправильное развитие органа;

Д. Сохранение эмбриональных структур.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Средняя часть глотки (ротоглотка) соответствует позвонкам

А. 2 шейному

Б. 3 шейному

В. 4 шейному

Г. 5 шейному

Выявление нистагма при взгляде в сторону медленного компонента нистагма указывает на то, что он

- А. первой степени
- Б. второй степени
- В. третьей степени

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте функцию носа и метод ее оценки:

- 1. Дыхательная.**
- А. Ольфактометрия;
 - Б. Риноскопия;
 - В. Ринопневмометрия;
 - Г. Сахаринный тест.
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1- В
Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте иннервацию носа:

- 1. Кожа наружного носа.**
- А. Тройничный нерв;
 - Б. Лицевой нерв;
 - В. Языкоглоточный нерв.
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1- В

Средние клетки решетчатого лабиринта открываются в носовую ход

- А. общий
- Б. нижний
- В. средний
- Г. верхний

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения. Заболевание:

1. Искривление носовой перегородки. Метод лечения:

А. Вазотомия н/носовых раковин;

Б. Подслизистая резекция перегородки носа;

В. Подслизистая конхотомия.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Разлитая гиперемия слизистой оболочки глотки характерна для

А. катаральной ангины

Б. острого фарингита

В. лакунарной ангины

Г. ангины симановского-венсана

Боль при остром среднем отите вызывается раздражением нерва

А. лицевого

Б. блуждающего

В. языкоглоточного

Г. преддверно-улиткового

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Сопоставьте стенки барабанной полости и образования, с которыми они граничат:

1. Верхняя стенка.

А. Внутренняя сонная артерия;

Б. Внутреннее ухо;

В. Сосцевидный отросток;

Г. Средняя черепная ямка.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Пункцию верхнечелюстной пазухи проводят через носовой ход

- А. общий
- Б. нижний
- В. средний
- Г. верхний

Анемизация слизистой оболочки полости носа проводится для дифференциальной диагностики

- А. вазомоторного и атрофического ринита
- Б. вазомоторного и гипертрофического ринита
- В. вазомоторного и катарального ринита
- Г. катарального и гипертрофического ринита

Нижняя гортанная артерия является ветвью

- А. внутренней сонной артерии
- Б. наружной сонной артерии
- В. нижней щитовидной артерии
- Г. подключичной артерии

Естественное отверстие клиновидной пазухи располагается в носовом ходе

- А. нижнем
- Б. среднем
- В. верхнем
- Г. общем

Аудиометрический признак тимпанальной формы отосклероза

- А. перцептивная тугоухость
- Б. смешанная тугоухость
- В. кондуктивная тугоухость
- Г. скалярная тугоухость

Направление нистагма определяется

- А. направлением его медленного компонента
- Б. направлением его быстрого компонента
- В. силой нистагма
- Г. плоскостью нистагма

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Дайте определение различным формам ринита:

1. Инфекционный ринит:

А. Хроническое заболевание, в основе которого лежит воспалительная *ig-e* опосредованная реакция, вызванная попаданием аллергенов на слизистую оболочку полости носа;

Б. Неаллергическое воспаление слизистой полости носа, связанное с нарушением метаболизма арахидоновой кислоты. Является предвестником развития тяжелой формы полипозного риносинусита, аспириновой бронхиальной астмы, непереносимости НПВС. характеризуется эозинофилией носового секрета при отсутствии повышенного уровня *ig-e* в сыворотке крови и отрицательным эндоназальным провокационным тестом;

В. Воспаление слизистой оболочки полости носа, вызванное вирулентными микроорганизмами и проявляющееся затруднением носового дыхания, выделениями из носа и чиханьем;

Г. Хронический неаллергический ринит, основными симптомами которого являются заложенность носа и затруднение носового дыхания, связанные с лабильностью и повышенным кровенаполнением сосудов носовых раковин.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1- В

Г. 1-Г

Здоровый человек должен воспринимать шепотную речь с расстояния не менее

А. 2 м

Б. 3 м

В. 6 м

Г. 4 м

Двигательная иннервация глотки осуществляется

А. возвратным и языкоглоточным нервом

Б. первой веточкой тройничного нерва и возвратным нервом

В. языкоглоточным и подъязычным нервом

Г. подъязычным и возвратным нервом

При стенозе гортани у детей чаще применяется

А. верхняя трахеостомия

Б. средняя трахеостомия

В. нижняя трахеостомия

Г. коникотомия

Спинно-мозговая пункция проводится в отделе позвоночника

- А. шейном
- Б. грудном
- В. поясничном

Звукопроводящий отдел звукового анализатора составляют

- А. наружное ухо, слуховая труба, улитка
- Б. слуховые косточки, слуховая труба, наружный слуховой проход
- В. наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо
- Г. наружное ухо, среднее ухо, перилимфа и эндолимфа улитки

Границей между носоглоткой и ротоглоткой является

- А. горизонтальная плоскость, проведенная через твердое небо
- Б. горизонтальная плоскость, проведенная через поверхность язык
- В. верхний полюс небных миндалин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между образованием и его локализацией. Образование:

1. Кровоточащий полип носа. Локализация:

- А. Носоглотка;
- Б. Носовая перегородка;
- В. В/ч пазуха;
- Г. Клетки решетчатого лабиринта.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В
- Г. 1-Г

Соотношение восприятия звучания камертона с 128 по воздушной и костной проводимости называется опытом

- А. вебера
- Б. швабаха
- В. ринне
- Г. желле

Основная этиологическая роль в возникновении ангины у детей принадлежит

- А. вирусам
- Б. спирохетам
- В. золотистому стафилококку
- Г. бета-гемолитическому стрептококку группы а

Кровоснабжение небных миндалин осуществляется из артериальной системы

- А. наружной сонной артерии
- Б. внутренней сонной артерии
- В. наружной и внутренней сонной артерии

Конической называется связка

- А. щито-перстневидная
- Б. перстне-трахеальная
- В. щито-подъязычная
- Г. надгортанно-щитовидная

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Сопоставьте термин и локализацию воспаления.

- А. Воспаление слизистой оболочки носа;
- Б. Воспаление слизистой оболочки глотки;
- В. Воспаление слизистой оболочки гортани.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Основная этиологическая роль в возникновении бактериальной ангины принадлежит

- А. бета-гемолитическому стрептококку группы а
- Б. золотистому стафилококку
- В. пневмококку
- Г. зеленышему стрептококку

Симптомом хронического тонзиллита является

- А. симптом кернига
- Б. симптом зака
- В. симптом оппенгейма
- Г. симптом гордона

Амнестическая афазия наблюдается при

- А. абсцессе лобной доли головного мозга
- Б. абсцессе мозжечка
- В. менингите
- Г. абсцессе височной доли головного мозга

Воздушные кисты гортани исходят из

- А. валлекул
- Б. грушевидных синусов
- В. гортанных желудочков
- Г. щито-подъязычной мембраны

Диагноз моноцитарной ангины устанавливается после исследования

- А. мочи
- Б. крови
- В. бактериологического
- Г. цитологического

К непарным хрящам гортани относят

- А. перстневидный
- Б. черпаловидный
- В. клиновидный
- Г. рожковидный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Сопоставьте автора и предложенную теорию обоняния:

1. Катаральный фарингит.

- А. Разлитая гиперемия слизистой оболочки;
- Б. Бледная и сухая слизистая оболочка;
- В. Утолщение боковых валиков глотки и увеличение лимфоидных гранул.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1- В

Амнестическая афазия наблюдается при

- А. тромбозе кавернозного синуса
- Б. тромбозе сигмовидного синуса
- В. абсцессе височной доли головного мозга
- Г. абсцессе мозжечка

Метод исследования остроты слуха с помощью камертонов называется

- А. аудиометрия
- Б. акуметрия
- В. импедансометрия
- Г. тимпанометрия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между образованием и его локализацией:

1. Глоточная миндалина:

- А. Носоглотка;
 - Б. Ротоглотка;
 - В. Гортаноглотка.
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1- В

Срочная трахеостомия показана при остром стенозе гортани в стадии

- А. компенсации
- Б. неполной компенсации
- В. декомпенсации
- Г. терминальной

Вторым названием ретрофарингеального абсцесса является абсцесс

- А. Окологлоточный
- Б. Паратонзиллярный
- В. Заглоточный
- Г. Крыло-челюстного пространства

Ретрофарингеальный (заглоточный) абсцесс чаще всего развивается в _____ возрасте

- А. Пожилом
- Б. Неонатальном
- В. Взрослом
- Г. Детском

Симптомы одностороннего паралича в первые дни после появления заболевания включают в себя: поперхивание, ощущение инородного тела в горле и

- А. Дисфагию
- Б. Дисфонию
- В. Боль в горле
- Г. Кашель

При рожистом воспалении наружного слухового прохода барабанная перепонка бывает

- А. Интактной
- Б. Гиперемированной
- В. Втянутой
- Г. Буллезно измененной

При мезофарингоскопии шпателем отдают _____ языка

- А. Передние две трети
- Б. Переднюю треть
- В. Задние две трети
- Г. Корень языка

В ближайший послеоперационный период после аденотомии ревизия носоглотки проводится при

- А. Носовом кровотечении
- Б. Отсутствии носового дыхания
- В. Тубоотите
- Г. Рецидивирующем аденоидите

К характерным симптомам отогенного абсцесса мозжечка относят

- А. Анамнестическую афазию
- Б. Адиадохокинез, атаксию
- В. Двустороннее промахивание при пальце-носовой пробе
- Г. Моторную афазию

Осмотр верхнего отдела глотки называется

- А. Эпифарингоскопией
- Б. Фарингоскопией
- В. Гипофарингоскопией
- Г. Передней риноскопией

Осложнением ангины у взрослых может быть абсцесс

- А. Височной доли мозга
- Б. Эпидуральный
- В. Надгортаника
- Г. Паратонзиллярный

Двусторонний паралич гортани может вызвать

- А. Опухоль мозга
- Б. Опухоль средостения
- В. Правосторонняя пневмония
- Г. Расширение диаметра аорты

Больных отогенным менингитом срочно госпитализируют в _____ отделение

- А. Инфекционное
- Б. Нейрохирургическое
- В. Оториноларингологическое
- Г. Неврологическое

Тактикой лечения сумки торнвальдта является

- А. Динамическое наблюдение
- Б. Удаление кисты
- В. Марсупиализация
- Г. Зондирование сумки

Ангины при дифтерии характеризуют умеренная гиперемия миндалин, покрытых сероватым налётом, умеренная болезненность при глотании и

- А. Глоссит, тошнота, потливость
- Б. Увеличение печени и селезёнки
- В. Умеренно увеличенные и болезненные зачелюстные лимфатические узлы
- Г. Быстро наступающий некротический распад, регионарный лимфаденит

Объективным методом диагностики патологического процесса в клиновидной пазухе является _____ околоносовых пазух

- А. Рентгенография
- Б. Ультразвуковое исследование
- В. Компьютерная томография
- Г. Диафаноскопия

Для юношеской ангиофибромы стадии iv характерно распространение опухоли

- А. В крылонёбную ямку или верхнечелюстную, решетчатую или клиновидную пазухи
- Б. Под твёрдой мозговой оболочкой без вовлечения кавернозного синуса, гипофиза и перекрёста зрительных нервов
- В. Под твёрдой мозговой оболочкой и вовлечение в опухолевый процесс кавернозного синуса, гипофиза или перекрёста зрительных нервов
- Г. В глазницу или подвисочную ямку с локализацией снаружи твёрдой мозговой оболочки

Препаратом выбора для ингаляций при стенозе гортани I степени является

- А. Дексаметазон
- Б. Будесонид
- В. Гидрокортизон
- Г. Преднизолон

При рубцовом стенозе в области комиссуры гортани протяженностью 4 мм применяют

- А. Многоэтапный метод хирургического лечения экстраларингеальным доступом
- Б. Многоэтапное бужирование гортани
- В. Удаление рубцов и установку эндопротеза эндоларингеальным доступом
- Г. Латерофиксацию голосовой складки

Наиболее значимым возбудителем острых бактериальных тонзиллофарингитов является

- А. *Staphylococcus aureus*
- Б. *Streptococcus pneumoniae*
- В. *Streptococcus viridans*
- Г. *Streptococcus pyogenes*

Наиболее распространенным видом консервативного лечения хронического неспецифического тонзиллита является

- А. Иглорефлексотерапия
- Б. Промывание лакун нёбных миндалин
- В. Гипосенсибилизирующая терапия
- Г. Иммуностимулирующее воздействие

При остром среднем отите системные антибиотики обязательно следует назначить

- А. У детей младше четырех лет
- Б. При сохранении симптомов более 72 часов
- В. При наличии ушного шума
- Г. При двустороннем процессе

«Лимфаденоидное глоточное кольцо» вальдейера - пирогова является

- А. Лимфоидным аппаратом носоглотки
- Б. Патологическим образованием
- В. Лимфоидным аппаратом глотки
- Г. Нёбными миндалинами

К современному эффективному методу лечения стойкой дисфункции слуховой трубы относится

- А. Баллонная дилатация глоточного устья
- Б. Электростимуляция мышц
- В. Катетеризация
- Г. Продувание баллоном Политцера

Понятие патологии гортани «ларингиты» объединяет

- А. Функциональные заболевания гортани
- Б. Органические заболевания дыхательной системы
- В. Органические заболевания гортани
- Г. Функциональные расстройства шейных мышц

Для одонтогенных синуситов характерной флорой являются

- А. Анаэробы
- Б. Аэробы
- В. Грибы
- Г. Простейшие

Распространенный цианоз, стридорозное дыхание, вынужденное положение, активное участие дополнительной мускулатуры в акте дыхания характеризует

- А. Бронхиальную астму
- Б. Эмфизему легких
- В. Субкомпенсированный стеноз гортани
- Г. Декомпенсированный стеноз гортани

Аллергическая форма вазомоторного ринита характеризуется увеличением в крови

- А. Эозинофилов
- Б. Макрофагов
- В. Нейтрофилов
- Г. Базофилов

Для ложного крупа характерен

- А. Истерический ларингоспазм
- Б. Отек слизистой оболочки подскладочного пространства
- В. Образование дифтеритических налетов на голосовых складках
- Г. Двусторонний паралич гортани

Ототоксическим действием обладают

- А. Макролиды
- Б. Цефалоспорины
- В. Аминопенициллины
- Г. Аминогликозиды

При хирургическом лечении срединных кист шеи у взрослых подъязычную кость

- А. Обязательно резецируют
- Б. Поднимают
- В. Сохраняют интактной
- Г. Не связывают со срединной кистой шеи

Глазная артерия принадлежит к системе _____ артерии

- А. Внутренней сонной
- Б. Клиновидно-нёбной
- В. Наружной сонной
- Г. Лицевой

Ринофима является осложнением

- А. Acne vulgooris
- Б. Acne rosacea
- В. Пемфигуса
- Г. Себорейного дерматита

К наиболее опасным для жизни осложнениям фурункула носа относят тромбоз кавернозного синуса и

- А. Тромбоз вен орбиты
- Б. Сепсис
- В. Тромбоз вен лица
- Г. Реактивный отёк мягких тканей носа

Отоскопическими признаками диагностики адгезивного среднего отита являются

- А. Перфорации барабанной перепонки и периодические выделения не гнойного характера из полостей среднего уха без признаков воспаления
- Б. Перфорации барабанной перепонки с орозоленными краями с постоянными выделениями гнойного характера
- В. Втянутость и ограничение подвижности барабанной перепонки, наличие рубцов и отложений извести на барабанной перепонке
- Г. Гипертрофия тканей вблизи барабанной перепонки, утолщение или выбухание барабанной перепонки

Открытая гнусавость появляется при дефектах твёрдого и мягкого нёба, парезах и параличах мягкого нёба и

- А. Аденоидах
- Б. Хоанальных полипах
- В. Укорочении мягкого нёба
- Г. Новообразованиях

Для аллергического ринита характерно увеличение в крови

- А. Моноцитов
- Б. Нейтрофилов
- В. Лимфоцитов
- Г. Эозинофилов

Верхняя и нижняя щитовидные артерии являются ветвями _____ артерии

- А. Подключичной
- Б. Наружной сонной
- В. Общей сонной
- Г. Внутренней сонной

Заглочные абсцессы чаще возникают в возрасте (лет)

- А. До 3
- Б. 20-30
- В. 10-20
- Г. 3-10

Высокие тоны воспринимаются в _____ завитке улитки

- А. Латеральном
- Б. Основном
- В. Верхнем
- Г. Среднем

К объективным методам исследования слуха относят

- А. Пороговую тональную аудиометрию
- Б. Импедансометрию
- В. Шепотную и разговорную речь
- Г. Речевую аудиометрию

К острой форме тонзиллита относят

- А. Атрофическую
- Б. Склеротическую
- В. Гипертрофическую
- Г. Лакунарную

Болезнь меньера характеризуется

- А. Нарушением походки
- Б. Повторяющимися приступами кохлеовестибулярных и вегетативных нарушений
- В. Головокружением при движении в транспорте
- Г. Нарушением координации движений

Одной из мышц, суживающих просвет голосовой щели, является

- А. Перстнещитовидная
- Б. Черпалонадгортанная
- В. Задняя перстнечерпаловидная
- Г. Боковая перстнечерпаловидная

При сфеноидите отделяемое обозревается в _____ носовом ходе

- А. Общем
- Б. Верхнем
- В. Среднем
- Г. Нижнем

Ложный круп характеризуется отеком _____ отдела гортани

- А. Подголосового
- Б. Голосового
- В. Области валекул
- Г. Вестибулярного

Струп в полости рта и в глотке при ожогах азотной кислотой имеет _____ окраску

- А. Белую
- Б. Черную
- В. Желтую
- Г. Бурую

Контроль барофункции уха обязательно проводят у

- А. Связистов
- Б. Водолазов
- В. Шоферов
- Г. Рабочих шумных цехов

Для экссудативного отита правильной тимпанограммой является тип

- А. Ad
- Б. B
- В. A
- Г. C

При фурункуле носа наиболее опасным осложнением выступает

- А. Образование свища
- Б. Реактивный отёк мягких тканей носа
- В. Тромбоз вен лица
- Г. Тромбоз пещеристой пазухи

Гноетечение при остром гнойном среднем отите обычно

- А. Длится 2 недели
- Б. Продолжается 3-4 недели
- В. Продолжается 5-7 дней
- Г. Не прекращается

При фиброме носоглотки лечение всегда является

- А. Хирургическим
- Б. Комбинированным
- В. Химиотерапевтическим
- Г. Консервативным

Для открытой резаной раны на уровне щито-подъязычной мембраны характерно

- А. Отсутствие голоса
- Б. Затрудненное дыхание
- В. Наличие подкожной эмфиземы
- Г. Зияние краев раны

«Лимфаденоидное глоточное кольцо» вальдейера - пирогова образуют две нёбные миндалины, одна глоточная, одна язычная и

- А. Лимфоидные гранулы
- Б. Боковые столбы глотки
- В. Гортанные миндалины
- Г. Две трубные миндалины

Сроки антибиотикотерапии затяжного острого среднего отита и рецидивирующего среднего отита при пероральном приеме препаратов должны составлять не менее (пороговое значение) _____ дней

- А. 7
- Б. 18
- В. 5
- Г. 14

При эндоскопической ревизии лобного кармана основным анатомическим ориентиром является

- А. Крючковидный отросток
- Б. Решетчатая булла
- В. Место прикрепления средней носовой раковины
- Г. Основание Agger nasi

Певческие узелки в гортани располагаются

- А. В средней трети гортанных желудочков
- Б. На границе передней и средней трети гортани
- В. На границе передней и средней трети голосовых складок
- Г. В задней трети гортани в области черпаловидных хрящей

Пансинусит является воспалением пазух

- А. Всех околоносовых
- Б. Околоносовых только одной стороны
- В. Верхнечелюстных
- Г. Только двух околоносовых

Твердые округлой формы инородные тела, как правило, извлекают из слухового прохода посредством применения

- А. Ушного пинцета
- Б. Промывания
- В. Ушных щипцов
- Г. Тупого крючка

При рентгенологическом исследовании у пациента с инородным телом в гортани хуже всего определяются кости

- А. Барана
- Б. Рыбы
- В. Курицы
- Г. Коровы

Латерализацию звука исследуют при пробе

- А. Федеричи
- Б. Швабаха
- В. Вебера
- Г. Ринне

Для разрыва цепи слуховых косточек характерна тимпанометрическая кривая типа

- А. Е
- Б. С
- В. А
- Г. В

Головные боли в области лба, затрудненное носовое дыхание, наличие гнойных полосок в среднем носовом ходе с обеих сторон позволяет заподозрить

- А. Риносклерому
- Б. Острый двусторонний гнойный гайморит
- В. Аденоидит
- Г. Острый ринит

Юношеская ангиофиброма является опухолью

- А. Гортани
- Б. Носоглотки
- В. Основания черепа
- Г. Наружного уха

Развитие рубцового стеноза дыхательных путей в местах физиологического сужения характеризует

- А. Новообразования
- Б. Склерому
- В. Туберкулез
- Г. Пневмонию

Чаще всего при эпитимпанитах имеют место выделения из полостей среднего уха

- А. Обильные светлые, тягучие
- Б. Без запаха, слизисто-гнойного характера, желтоватого цвета
- В. С неприятным запахом серого цвета или с неприятным запахом с чешуйками, напоминающие творожистые массы
- Г. Без запаха с примесью крови

Диагноз «моноцитарная ангина» устанавливается после исследования

- А. Мочи
- Б. Крови
- В. Цитологического
- Г. Бактериологического

Паракузис вилизии отмечается при

- А. Адгезивном отите
- Б. Болезни Меньера
- В. Отосклерозе
- Г. Мезотимпаните

Нижняя носовая раковина представляет собой

- А. Самостоятельную кость
- Б. Отросток верхней челюсти
- В. Отросток клиновидной кости
- Г. Отросток решетчатой кости

Гранулёмой стюарта является

- А. Летальная срединная гранулёма
- Б. Проявление туберкулёзного процесса
- В. Гранулёматозный процесс в третичном периоде сифилиса
- Г. Гранулёма при склероме

С барабанной полостью через слуховую трубу контактирует

- А. Боковая стенка ротоглотки
- Б. Ротоглотка
- В. Гортаноглотка
- Г. Носоглотка

Наиболее часто развивается паратонзиллярный абсцесс

- А. Передненижний
- Б. Передневерхний
- В. Боковой
- Г. Задний

Длительное пребывание инородного тела в слуховом проходе приводит к

- А. Нейросенсорной тугоухости
- Б. Образованию отолита
- В. Отосклерозу
- Г. Образованию ринолита

Гиперпластические узелки гортани чаще всего локализуются

- А. На свободном крае надгортанника
- Б. В межчерпаловидном пространстве
- В. В области передней комиссуры
- Г. В задней трети голосовых складок

Острый синусит является воспалением слизистой оболочки

- А. Околоносовых пазух
- Б. Носоглотки
- В. Гортани
- Г. Бронхов

К возбудителям отомикоза относят

- А. Стрептококки
- Б. Синегнойную палочку
- В. Грибы
- Г. Стафилококки

Парацентез барабанной перепонки при остром среднем отите обычно делают в

- А. Квadrante задне-нижнем
- Б. Месте наибольшего выбухания
- В. Квadrante передне-верхнем
- Г. Квadrante передне-нижнем

При поражении звукопроводящего аппарата при тональной пороговой аудиометрии выявляют

- А. Повышение порогов при костном проведении
- Б. Повышение порогов при воздушном проведении
- В. Костно-воздушный разрыв
- Г. Отсутствие костно-воздушного интервала

Волчанкой чаще поражаются

- А. Средние носовые раковины
- Б. Крылья носа и носовая перегородка
- В. Нижние носовые раковины
- Г. Область ситовидной пластинки

Причиной возникновения контактной язвы гортани является

- А. Сифилис
- Б. Перенапряжение голосовой функции
- В. Туберкулез
- Г. Вирусная инфекция

Характерной чертой первичного сифилиса глотки считают

- А. Изменения со стороны мягкого нёба
- Б. Односторонний характер поражения
- В. Открытую гнусавость
- Г. Симметричность расположения патологических элементов

Под реэдукацией слуха понимают

- А. Выпадение слуха на определенных частотах
- Б. Раздражение органа слуха звуковыми колебаниями разной интенсивности
- В. Восстановление восприятия звука на определенных частотах
- Г. Тренировку слуха различными тонами

Под аллергическим ринитом понимают

- А. Симптом системного заболевания соединительной ткани
- Б. Острый инфекционный процесс
- В. Хронический инфекционный процесс
- Г. Хроническое аллергическое воспаление слизистой оболочки носа

Больной гортанной ангиной госпитализируется

- А. Не всегда, возможно амбулаторное лечение
- Б. Обязательно
- В. Только в случае наличия у больного осложнений
- Г. При сопутствующей соматической патологии

Экранирующая функция первичной барабанной перепонки заключается в

- А. Препятствии попадания звуковой волны на вторичную барабанную перепонку
- Б. Предотвращении попадания инфекции в среднее ухо
- В. Защите овального окна и стремечка внутри него от громких звуков
- Г. Защите слуховых косточек от физических раздражителей

Ринолит представляет собой

- А. Опухоль носа
- Б. Хронический насморк
- В. Кисту носа
- Г. Носовой камень

Оксигенотерапия при остром обструктивном ларингите

- А. Показана только при стенозе гортани III степени
- Б. Показана при стенозе гортани II степени
- В. Показана при стенозе гортани I степени
- Г. Не показана

Местной причиной носового кровотечения наиболее часто является

- А. Атеросклероз
- Б. Острый лейкоз
- В. Травма носа
- Г. Риносинусит

При отсутствии патологии среднего уха регистрируется тимпанограмма типа

- А. Е
- Б. В
- В. А
- Г. С

Диагноз «менингит» устанавливается на основании данных

- А. Анализа крови
- Б. Спинномозговой пункции
- В. Анализа мочи
- Г. Стернальной пункции

Ангина является острым воспалением

- А. Задней стенки глотки
- Б. Передних нёбных дужек
- В. Всех отделов глотки
- Г. Нёбных миндалин

Признаками плоскоклеточного рака наружного слухового прохода на спиральной компьютерной томографии является

- А. Мягкотканное образование в слуховом проходе
- Б. Образование в слуховом проходе хрящевой плотности
- В. Объемное образование наружного слухового прохода с деструктивными изменениями его стенок
- Г. Объемное образование наружного слухового прохода без деструктивных изменений его стенок

Основные патологические изменения при отосклерозе заключаются в фиксации

- А. Стремени
- Б. Молоточка
- В. Вторичной мембраны окна улитки
- Г. Наковальни

Тенденцию к озлокачествлению имеет _____ уха

- А. Хондрома
- Б. Фиброма
- В. Невус
- Г. Аденома

Моноцитарная ангина диагностируется

- А. На основании мезофарингоскопии
- Б. С помощью тест-полоски
- В. На основании исследования крови
- Г. На основании микробиологического исследования

В полости носа задерживается _____ % вдыхаемой пыли и бактерий

- А. 40 – 60
- Б. 60 – 80
- В. 30 – 40
- Г. 10 – 20

Хронический тонзиллит характеризуется симптомом

- А. Гордона
- Б. Кёрнига
- В. Зака
- Г. Оппенгейма

Кровоснабжение клиновидной пазухи осуществляется из _____артерии

- А. Ушно-височной
- Б. Верхнечелюстной
- В. Слезной
- Г. Крылонёбной

Термин петроапигит означает

- А. Воспаление вершины пирамиды височной кости
- Б. Воспаление скулового отростка
- В. Гнойное расплавление внутренних ячеек вершины сосцевидного отростка
- Г. Воспаление сосцевидного отростка

Вращательная проба проводится в кресле

- А. Эвальди
- Б. Проетца
- В. Гельмгольца
- Г. Барани

Тактикой лечения при грибковом теле верхнечелюстной пазухи является

- А. Только эндоскопическое удаление
- Б. Только противогрибковая терапия
- В. Удаление с последующей системной противогрибковой терапией
- Г. Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе по Колдуэллу-Люку

К iii типу хордэктомии относят

- А. Чрезмышечную
- Б. Тотальную
- В. С включением подскладочного пространства
- Г. С включением черпаловидного хряща

[Вернуться в начало](#)