

Тесты с вопросами по специальности «Педиатрия» для аттестации 1, 2 и высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/pediatr/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Педиатрия» для аккредитации и других экзаменов (4700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/vrach_pediatriya/

2) Тесты для аккредитации «Неонатология» (3800 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/neonatologiya/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

Навигация по категориям

- [1 категория](#)
- [2 категория](#)
- [высшая категория](#)

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие этиологического фактора болезни:

1. Streptococcus pneumoniae
 2. Streptococcus pyogenes
 3. Pseudomonas aeruginosa
 4. Mycoplasma pneumoniae
 5. Klebsiella pneumoniae
- А. Внебольничная пневмония**
Б. Внутрибольничная пневмония
- А. 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А
Б. 1А, 2А, 3А, 4Б, 5Б
В. 1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5А
Г. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5Б

При подозрении на кровотечение из вен пищевода целесообразно прежде всего провести:

- А. Исследование гемостаза
Б. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
В. Эзофагогастродуоденоскопию
Г. Рентгеноконтрастное исследование пищевода с барием
Д. Исследование уровня гемоглобина в крови

Возраст ребенка 2 дня. Кожные покровы бледно-желтушные с рождения, подкожно-жировая клетчатка пастозна, печень выступает из-под реберной дуги на 3 см, селезенка - на 1 см, ребенок вялый. Мышечный тонус и рефлексы новорожденных снижены. Гемоглобин 150 г/л, свободный билирубин 210 мкмоль/л. У матери О (I) группа крови, резус-отрицательная. У ребенка – О (I) группа крови, резус-положительная. Наиболее вероятный диагноз?

- А. ГБН, отечная форма
Б. ГБН, желтушная форма
В. ГБН, анемическая форма
Г. Транзиторная желтуха новорожденных
Д. Анемия Минковского-Шоффара, гемолитический криз

Ребенок в возрасте 11 месяцев при отсутствии противопоказаний должен быть вакцинирован от:

1. Кори
 2. Дифтерии
 3. Гепатита В
 4. Пневмококковой инфекции
 5. Паротита
- А. 1,2,3,4
Б. 2,3,4
В. 2,3,4,5

Суперинфекция дельта-вирусом представляет опасность для больных:

- А. Гепатитом А
- Б. Гепатитом В
- В. Гепатитом С
- Г. Хроническим панкреатитом
- Д. Язвенной болезнью

Мальчик 8 лет, находится в бессознательном состоянии в течение 1 часа, дыхание Куссмауля, гиперемия щек, сухость кожи, глазные яблоки мягкие, запах ацетона изо рта. В течение 3 недель беспокоила жажда, частые мочеиспускания, похудел на 1 кг. Ваш предварительный диагноз:

- А. Гипогликемическая кома
- Б. Несахарный диабет
- В. Диабетическая кетоацидотическая кома
- Г. Острая почечная недостаточность

Для купирования анафилактического шока используют:

- 1. Адреналин
 - 2. Преднизолон
 - 3. Атропин
 - 4. Раствор хлорида натрия 0,9%
 - 5. Раствор глюкозы 5%
- А. 1,2,3
 - Б. 1,2,4
 - В. 1,2,3,4
 - Г. 1,2,5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между анатомическими особенностями врожденного порока сердца и особенностями гемодинамических нарушений:

- 1. Стеноз легочной артерии
 - 2. Дефект межжелудочковой перегородки
 - 3. Открытый артериальный проток
 - 4. Коарктация аорты
 - 5. Тетрада Фалло
- А. ВПС «бледного» типа
 - Б. ВПС «синего» типа
 - В. ВПС без сброса крови
- А. 1Б, 2Б, 3Б, 4В, 5А
 - Б. 1В, 2Б, 3А, 4В, 5Б
 - В. 1А, 2А, 3А, 4В, 5Б

Для какого порока сердца характерна артериальная гипертензия:

- А. Тетрада Фалло
- Б. Дефект межжелудочковой перегородки
- В. Открытый артериальный проток
- Г. Коарктация аорты
- Д. Стеноз легочной артерии

Абсолютное противопоказание к вскармливанию грудным молоком со стороны ребенка:

- А. Гемолитическая болезнь новорожденных
- Б. Галактоземия
- В. Внутривentricularное кровоизлияние
- Г. Недоношенность
- Д. Пороки челюстно-лицевой области

При хеликобактер - ассоциированном гастрите часто поражается:

- А. Кардиальная часть желудка
- Б. Антральная часть желудка
- В. Тело желудка
- Г. Весь желудок
- Д. Дно желудка

Для базисной терапии бронхиальной астмы назначают все перечисленные группы лекарств, кроме:

- А. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- Б. Короткодействующие β_2 -агонисты
- В. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов
- Г. Моноклональные антитела к IgE
- Д. Комбинация длительнодействующих β_2 -агонистов с глюкокортикостероидами

Соотношение артериального давления у здорового ребенка правильно в случаях, когда:

- А. АД на руках выше, чем на ногах на 10-15 мм рт.ст.
- Б. АД на руках и ногах одинаково
- В. АД на ногах выше, чем на руках на 10-15 мм рт.ст.
- Г. АД на правой руке на 10-15 мм рт.ст. выше, чем на левой руке.

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Укажите компоненты врожденного и приобретенного иммунитета:

1. Макрофаги
 2. Цитокины
 3. Специфические антитела
 4. Лейкоциты
 5. Система комплемента
- А. Врожденный иммунитет (естественный)**
Б. Приобретенный иммунитет (адаптивный)
- А. 1А, 2А, 3Б, 4Б, 5А
Б. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5А
В. 1Б, 2Б, 3Б, 4А, 5Б
Г. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5А

Укажите оптимальные сроки введения фруктового сока здоровому ребёнку, находящемуся на грудном вскармливании:

- А. В 2-3 месяца
Б. В 3-4 месяца
В. Не ранее 4-6 месяцев
Г. В 1-2 месяца
Д. В 3-4 недели

Симптомами, требующими оказания экстренной помощи являются все, кроме:

- А. Нарушение проходимости дыхательных путей
Б. Судороги
В. Дыхательная недостаточность
Г. Лихорадка
Д. Шок

Ребенок 1 года поступил в стационар с выраженной интоксикацией, одышкой смешанного характера, температурой 38*С. При перкуссии определяется коробочный оттенок перкуторного звука. Выслушиваются непостоянные сухие хрипы, справа под углом лопатки — стойкие мелкопузырчатые хрипы. Поставьте предварительный диагноз:

- А. Острый бронхит
Б. Острый бронхиолит
В. Инородное тело бронха
Г. Пневмония

Назовите антисекреторный препарат, относящийся к ингибиторам протонной помпы:

- А. Циметидин
- Б. Омепразол
- В. Ранитидин
- Г. Мебеверин
- Д. Роксатидин

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между группами здоровья и определяющими их критериями:

- 1. I
- 2. II
- 3. III
- 4. IV
- 5. V

А. Практически здоровые дети

Б. Дети перенесшие внутриутробно, во время родов какое либо заболевание

В. Больные дети с хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации

Г. Больные дети с хроническими заболеваниями в состоянии компенсации

Д. Больные дети с тяжелыми хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации

А. 1Д, 2В, 3Г, 4Б, 5А

Б. 1А, 2Г, 3В, 4Д, 5Б

В. 1А, 2Б, 3Г, 4В, 5Д

При гиповолемическом шоке пациенту следует ввести:

- А. Изотонический раствор хлорида натрия болюсно из расчета 20 мл/кг
- Б. Гипертонический раствор хлорида натрия болюсно из расчета 20 мл/кг
- В. Раствор глюкозы 5% из расчета 10 мл/кг
- Г. Раствор глюкозы 10% из расчета 5 мл/кг
- Д. Коллоидный раствор внутривенно медленно

Для расчета показателя младенческой смертности необходима информация о:

- А. Численности детей в возрасте до 1 года жизни
- Б. Численности детей, родившихся живыми в изучаемом году

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клиническими симптомами и заболеванием:

1. Грипп
 2. Парагрипп
 3. Аденовирусная инфекция
 4. Риновирусная инфекция
 5. РС-инфекция
- А. Острое начало заболевания с резко выраженными насморком и чиханием на фоне нормальной или субфебрильной температуры
- Б. Заболевание с выраженными экссудативными проявлениями, конъюнктивитом на фоне высокой температуры
- В. Острое начало заболевания с высокой лихорадкой и выраженными симптомами интоксикации
- Г. Заболевание с частым поражением нижних дыхательных путей, развитием бронхиолита
- Д. Заболевание с выраженными катаральными явлениями в виде сухого грубого кашля, осиплостью голоса
- А. 1Б, 2Д, 3Г, 4А, 5В
- Б. 1В, 2Д, 3Б, 4А, 5Г
- В. 1В, 2Г, 3Б, 4Д, 5А

Наиболее частым осложнением язвенной болезни у детей является:

- А. Кровотечение
- Б. Перфорация
- В. Пенетрация в поджелудочную железу
- Г. Малигнизация
- Д. Стеноз

Выберите препараты, которые могут быть назначены для лечения атипичной пневмонии у ребенка:

1. Амоксициллин
 2. Амоксициллин-клавуланат
 3. Кларитромицин
 4. Амикацин
 5. Ципрофлоксацин
- А. 1,2,3
- Б. 3,4
- В. 3,5
- Г. 3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. К какой группе антимикробных средств относятся перечисленные лекарственные препараты:

1. Амикацин
 2. Цефепим
 3. Ванкомицин
 4. Кларитромицин
 5. Меропенем
- А. Цефалоспорины
Б. Карбапенемы
В. Макролиды
Г. Аминогликозиды
Д. Гликопептиды
- А. 1Г, 2Б, 3Д, 4В, 5Б
Б. 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б
В. 1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между симптомами и заболеваниями:

1. Инфекция мочевыводящих путей
 2. Нефротический синдром
 3. Пиелонефрит
 4. Язвенная болезнь 12-перстной кишки
 5. Токсический гепатит
- А. Повышение уровня щелочной фосфатазы в крови
Б. Гипопротеинемия
В. Бактериурия
Г. Положительная реакция на хеликобактер методом ПЦР в копрофильtrate
Д. Снижение уровня холестерина в крови
- А. 1В, 2Б, 3В, 4Г, 5А
Б. 1Б, 2Б, 3В, 4Г, 5А
В. 1В, 2Д, 3В, 4Г, 5А

Какой показатель наиболее точно характеризует здравоохранение в стране:

- А. Показатель рождаемости
Б. Число медицинских организаций
В. Оборот койки в стационаре
Г. Охват профилактическими осмотрами населения
Д. Младенческая смертность

Объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) и максимальная скорость выдоха (ПСВ) у детей в возрасте старше 5 лет позволяют оценить:

- А. Степень рестриктивных изменений в легких
- Б. Степень бронхиальной обструкции
- В. Переносимость физической нагрузки
- Г. Снижение общей емкости легких

Укажите симптомы, которые встречаются при синдроме Кавасаки у детей:

- 1. Лихорадка более 5 дней
 - 2. Склерит
 - 3. Полиморфная сыпь
 - 4. Артериальная гипертензия
 - 5. Боль в горле
- А. 1,2,4,5
 - Б. 1,3,5
 - В. 1,2,3

Показанием к проведению микционной цистогграфии является:

- 1. Учащенное болезненное мочеиспускание
 - 2. Повторные эпизоды пиелонефрита у ребенка
 - 3. Энурез
 - 4. Подозрение на наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса по данным УЗИ
 - 5. Гематурия
- А. 1,2,3,4
 - Б. 1,2,3,4,5
 - В. 2,4
 - Г. 1,2,4

Синдром пролапса митрального клапана необходимо дифференцировать прежде всего с:

- А. Недостаточностью митрального клапана
- Б. Аортальным стенозом
- В. Недостаточностью трикуспидального клапана
- Г. Дефектом межжелудочковой перегородки
- Д. Кардитом

Макроцитоз отмечается при следующих состояниях:

- А. Дефицит витамина В12 и фолатов
- Б. После приёма вальпроатов, фенобарбитала, карбамазепинов
- В. Анемия Фанкони, Блэкфана-Даймонда
- Г. Неонатальный период
- Д. При всех указанных состояниях

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие результатов аускультации легких:

1. Симметричные сухие свистящие хрипы
2. Локальные крепитирующие хрипы
3. Локальное ослабление дыхания
4. Бронхиальное дыхание
5. Симметричные влажные разнокалиберные хрипы

А. Пневмония

Б. Бронхит

В. Обструктивный бронхит

А. 1В, 2А, 3А, 4А, 5Б

Б. 1Б, 2А, 3А, 4А, 5В

В. 1В, 2А, 3А, 4Б, 5В

У ребенка 6 месяцев на фоне ОРВИ на 4 день заболевания состояние ухудшилось, вновь повысилась температура до 37,8*С, появилась одышка экспираторного характера, втяжение уступчивых мест рудной клетки при дыхании. При аускультации — удлинённый выдох, сухие свистящие и крепитирующие хрипы с обеих сторон. Ваш предварительный диагноз:

А. Острый бронхит

Б. Острый бронхиолит

В. Инородное тело бронха

Г. Пневмония

Дети с лактазной недостаточностью не переносят:

А. Хлеб

Б. Овощи

В. Молоко

Г. Творог

Д. Мясо

Какие изменения в клиническом анализе мочи позволяют диагностировать инфекцию мочевых путей у ребенка:

А. Микрогематурия

Б. Пиурия

В. Оксалатурия

Г. Протеинурия

Д. Макрогематурия

Укажите препарат первого выбора для лечения обострения бронхиальной астмы у детей:

- А. Комбинация сальметерола с флутиказоном
- Б. Сальбутамол
- В. Фенотерол
- Г. Ипратропия бромид
- Д. Будесонид

У ребенка 8 мес диагностирован обструктивный бронхит, дыхательная недостаточность. При каком уровне насыщения крови кислородом следует начать кислородотерапию:

- 1. < 95%
 - 2. < 92%
 - 3. < 88%
 - 4. < 80%
- А. 1,2,3,4
 - Б. 2,3,4
 - В. 3,4
 - Г. 4

У ребенка 9 месяцев в тяжелом состоянии после перенесенной кишечной инфекции с олигурией, повышением мочевины крови, гемолитической анемией, петехиальными кровоизлияниями на коже и слизистых, тромбоцитопенией, можно думать о:

- А. Острой почечной недостаточности
- Б. Гемолитико-уремическом синдроме
- В. Остром гломерулонефрите
- Г. Геморрагической лихорадке с почечным синдромом
- Д. Остром пиелонефрите

Ребенку 8 мес, наблюдающемуся по поводу нейтропении (количество лейкоцитов в динамике 500-700 х 10⁹/л), противопоказана вакцинация:

- А. От пневмококка
- Б. От дифтерии, коклюша и столбняка
- В. От кори и паротита
- Г. От гриппа
- Д. Противопоказано введение любых вакцин

При энтеровирусной инфекции отмечается:

- А. Лихорадка
- Б. Некротическая ангина
- В. Артралгии
- Г. Конъюнктивит
- Д. Гепатоспленомегалия

Госпитальной называется пневмония, которая развивается:

- А. Не менее, чем через 24 часа после поступления пациента в стационар
- Б. Не менее, чем через 48 часов после поступления пациента в стационар
- В. После 72 часов нахождения пациента в стационаре
- Г. В стационаре вне зависимости от длительности пребывания в нем

Симптом, позволяющий заподозрить инвазивный характер диареи при кишечной инфекции:

- А. Лихорадка
- Б. Рвота
- В. Водянистый стул
- Г. Кровь в стуле
- Д. Боли в животе

Препарат первого выбора для лечения острого бактериального риносинусита у детей:

- А. Цефиксим
- Б. Ципрофлоксацин
- В. Кларитромицин
- Г. Амоксициллин-клавуланат
- Д. Амикацин

К характеристикам потенциала здоровья населения относятся показатели:

- А. Больничной летальности
- Б. Досуточной летальности
- В. Инвалидности
- Г. Охвата диспансерным наблюдением
- Д. Младенческой смертности

Укажите характерный признак кожных геморрагий при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре:

- А. Возникновение после механического воздействия
- Б. Полиморфизм (синяки, петехии, экхимозы)
- В. Симметричность
- Г. Излюбленная локализация – ягодицы и нижние конечности
- Д. Моноохромность

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие физикальных изменений различным нозологическим формам:

1. Гипертрофия и дилатация левого желудочка сердца
2. Гипертрофия и дилатация правого желудочка сердца
3. Миокардит
4. Ателектаз правого легкого
5. Экссудативный перикардит
- А. Ослабление верхушечного толчка
- Б. Смещение верхушечного толчка вправо
- В. Усиление верхушечного толчка
- Г. Появление выраженного сердечного толчка

- А. 1Г, 2В, 3В, 4Б, 5А
Б. 1В, 2Г, 3А, 4Б, 5А
В. 1В, 2В, 3Г, 4А, 5Б

Для пассивной иммунопрофилактики используют:

- А. Живые вакцины
Б. Иммуноглобулины
В. Анатоксины
Г. Инактивированные вакцины
Д. Бактериальные лизаты

Основным триггером обострения бронхиальной астмы в раннем возрасте является:

- А. Пыльца деревьев
Б. Прием нестероидных противовоспалительных средств
В. Вирусная инфекция
Г. Эпидермис животных
Д. Физическая нагрузка

При оценке физического развития восьмимесячного ребенка его масса тела составляла 7300 г, рост 68 см. Ребенок родился с массой тела 3200 г, ростом 50 см. До 4 мес был на грудном вскармливании, затем переведен на адаптированную смесь. С 5,5 мес введен один прикорм овсяной кашей, с 6 мес — овощное пюре, с 7 мес — мясо. До 5 мес. развитие соответствовало возрасту, затем отмечена низкая прибавка массы тела, а после 7 мес — потеря массы тела. Стул 2-3 раза в день, периодически до 5 раз. Ваш предположительный диагноз:

- А. Пищевая аллергия
Б. Болезнь Крона
В. Лимфангиоэктазия кишечника
Г. Целиакия
Д. Псевдомембранозный колит

В клиническом анализе крови при коклюше отмечается:

- А. Лейкопения
- Б. Тромбоцитоз
- В. Нейтрофильный лейкоцитоз
- Г. Лимфоцитоз
- Д. Атипичные мононуклеары

Укажите основную группу лекарственных средств для лечения острого обструктивного бронхита у детей:

- А. ингаляционные глюкокортикостероиды
- Б. бронходилататоры
- В. муколитики
- Г. аминопенициллины
- Д. макролиды

Врожденные пороки сердца являются классическим примером:

- А. Бластопатий
- Б. Эмбриопатий
- В. Ранних фетопатий
- Г. Поздних фетопатий
- Д. Патологией перинатального периода

Синдром Жильбера характеризуется:

- А. Повышением уровня трансаминаз в крови
- Б. Повышением уровня прямого билирубина в крови
- В. Повышением уровня непрямого билирубина в крови
- Г. Ретикулоцитозом

При артериальной гипертензии наблюдается:

- А. Снижение сердечного выброса и повышение общепериферического сосудистого сопротивления
- Б. Повышение сердечного выброса и понижение общепериферического сосудистого сопротивления
- В. Нормальный сердечный выброс и понижение общепериферического сосудистого сопротивления
- Г. Повышение сердечного выброса и повышение общепериферического сосудистого сопротивления
- Д. Снижение сердечного выброса и понижение общепериферического сосудистого сопротивления

Критерием пересмотра стартовой антибактериальной терапии при внебольничной пневмонии является:

- А. Отсутствие эффекта в течение 1 суток от начала лечения
- Б. Отсутствие эффекта в течение 2 суток от начала лечения
- В. Отсутствие эффекта в течение 3 суток от начала лечения
- Г. Отсутствие эффекта в течение 4 суток от начала лечения
- Д. Отсутствие эффекта в течение 5 суток от начала лечения

Стреловидный, венечный и затылочный швы начинают закрываться

- А. С 2 месяцев
- Б. С 3-4 месяцев
- В. С 4-5 месяцев
- Г. С 6 месяцев
- Д. С 12 месяцев

Истинный круп характерен для:

- А. РС-инфекции
- Б. Гриппа
- В. Аденовирусной инфекции
- Г. Стрептококковой ангины
- Д. Дифтерии

У ребенка 10 мес на фоне вирусного гастроэнтерита диагностировано умеренное обезвоживание. Выражена жажда, пьет охотно, рвоты на момент обращения нет. Какое стартовое лечение показано пациенту в этом случае?

- А. парентеральная регидратация из расчета 100 мл/кг веса за первые 6 часов в стационаре
- Б. парентеральная регидратация из расчета 75 мл/кг веса за 4 часа в стационаре
- В. парентеральная регидратация из расчета 100 мл/кг веса за сутки в стационаре
- Г. оральная регидратация из расчета 75 мл/кг веса за 4 часа в стационаре
- Д. восполнение текущих потерь и физиологической потребности в жидкости в амбулаторных условиях

Наиболее характерный морфологический вариант иммунного поражения клубочка для острого гломерулонефрита с нефротическим синдромом:

- А. Минимальный или мембранозный нефрит
- Б. Фокально-сегментарный гломерулосклероз
- В. Мезангиокапиллярный тип
- Г. Мезангиопролиферативный тип
- Д. Мембранопролиферативный тип

Повышение артериального давления в качестве побочного эффекта может отмечаться при приеме:

- А. Симпатомиметиков
- Б. Ганглиоблокаторов
- В. Ингибиторов АПФ
- Г. Бета-адреноблокаторов
- Д. Диуретиков

Синдром крупа у детей чаще всего вызывает:

- А. Вирус гриппа
- Б. Вирус парагриппа
- В. Пиогенный стрептококк
- Г. Гемофильная палочка
- Д. Пневмококк

Ребенку 5 месяцев. Родился от 1-х запоздалых, затяжных родов. Оценка по шкале Апгар 5/6 баллов. В течение первых дней состояние было тяжелым. Выписан домой на 19-й день жизни. В последующем регулярного врачебного наблюдения не было. Из перечисленного ниже, обнаруженного при осмотре, соответствует возрастной норме:

- А. Самостоятельно не садится
- Б. Гипертонус мышц рук и ног
- В. Тенденция к перекресту ног
- Г. Наличие ладонно-ротового рефлекса
- Д. Наличие хватательного рефлекса

При развитии у ребенка афебрильных судорог прежде всего необходимо исключить:

- А. Менингит
- Б. Гипокальциемию
- В. Гипогликемию
- Г. Гипокалиемию
- Д. Эпилепсию

Для лечения острой аллергической крапивницы и ангионевротического отека используют:

1. Антигистаминные препараты
2. Холинолитики
3. Системные глюкокортикостероиды
4. Ареналин
5. Нестероидные противовоспалительные средства

- А. 1,2,3
- Б. 1,3,5
- В. 1,3
- Г. 1,2,3,4

Максимальное число лейкоцитов в крови у здорового ребёнка на первом году жизни, выше которого говорят о лейкоцитозе, составляет:

- А. $9,0 \times 10^9/\text{л}$
- Б. $10,0 \times 10^9/\text{л}$
- В. $12,0 \times 10^9/\text{л}$
- Г. $13,0 \times 10^9/\text{л}$
- Д. $15,0 \times 10^9/\text{л}$

В общем анализе мочи при типичной форме вирусного гепатита А определяется:

- А. Непрямой билирубин
- Б. Глюкозурия
- В. Прямой билирубин
- Г. Протеинурия
- Д. Лейкоцитурия

Селективность протеинурии определяют для оценки состояния:

- А. Петли Генле
- Б. Дистальных канальцев
- В. Мембраны клубочков
- Г. Нефрона
- Д. Проксимальных канальцев

При подозрении на феномен «гипертензии на белый халат» у ребенка показано проведение

- А. Холтеровского мониторирования ЭКГ
- Б. Велоэргометрии
- В. Суточного мониторирования артериального давления
- Г. Исследование уровня кортизола в сыворотке крови

При анафилактической реакции прежде всего следует ввести:

- А. Преднизолон
- Б. Хлоропирамин
- В. Бикарбонат натрия
- Г. Адреналин
- Д. Допамин

Для транзиторной (физиологической) желтухи новорожденных не характерно:

- А. Появление желтухи на 3-й день жизни
- Б. Удовлетворительное состояние ребенка
- В. Умеренно повышенный уровень свободного билирубина
- Г. Нормальный уровень связанного билирубина
- Д. Умеренная анемия

Укажите минимальную продолжительность базисной терапии при бронхиальной астме:

- А. 1 месяц
- Б. 3 месяца
- В. 6 месяцев
- Г. 1 год
- Д. 2 года

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клиническими проявлениями и критериями диагностики острой ревматической лихорадки:

- 1. Кардит
- 2. Артралгии
- 3. Хорея
- 4. Лихорадка
- 5. Анулярная эритема
- А. Большие критерии
- Б. Малые критерии
- А. 1А, 2Б, 3А, 4Б, 5А
- Б. 1А, 2А, 3А, 4Б, 5А
- В. 1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5А
- Г. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5Б

Для лечения обструктивного ларинготрахеита со стенозом гортани 2 степени препаратом первого выбора является:

- А. Цетиризин внутрь
- Б. Амоксициллин внутрь
- В. Дексаметазон парентерально
- Г. Адреналин парентерально
- Д. Будесонид в ингаляциях

Выберите препарат, нормализующий моторную функцию желудочно-кишечного тракта:

- А. Висмута трикалия дицитрат
- Б. Домперидон
- В. Мебеверин
- Г. Ранитидин
- Д. Омепразол

Выберите стартовый антибактериальный препарат для лечения тяжелой внебольничной пневмонии у детей в стационаре:

- А. Азитромицин
- Б. Амикацин
- В. Меропенем
- Г. Амоксициллин-клавуланат
- Д. Ципрофлоксацин

Гипотрофия I степени у детей диагностируется при величине массы тела ниже:

- А. 3 центиля
- Б. 10 центиля
- В. 25 центиля
- Г. 50 центиля
- Д. 75 центиля

Какие вакцины являются инаktivированными (неживыми):

- 1. АКДС
 - 2. Вакцина против пневмококковой инфекции
 - 3. Вакцина против кори
 - 4. Вакцина против туберкулеза
 - 5. Вакцина против гриппа
- А. 1,2,5
 - Б. 1,2,4,5
 - В. 3,4
 - Г. 1,3,4,5

Пиелонефрит является вторичным, если:

- А. Верифицирован первичный очаг бактериального воспаления
- Б. При обследовании пациента зарегистрировано наличие аномалии развития мочевыводящей системы
- В. Возбудителем пиелонефрита является атипичная флора
- Г. После проведенного курса антибактериальной терапии в течение месяца симптомы пиелонефрита появляются вновь
- Д. Развился повторно вне зависимости от сроков болезни

Угроза билирубиновой энцефалопатии у доношенного новорожденного возникает при уровне билирубина:

- А. Более 80 мкмоль/л
- Б. Более 100 мкмоль/л
- В. Более 200 мкмоль/л
- Г. Более 340 мкмоль/л
- Д. Более 430 мкмоль/л

Родители 6-месячного ребенка обеспокоены быстрым увеличением его головы, так как шапочки, купленные заранее, оказались ему малы. Измерения, проведенные патронажной сестрой, показали, что окружность головы ребенка равна 43 см, окружность груди 43 см.

- А. Пропорциональны и соответствуют возрасту ребенка
- Б. Увеличены оба параметра
- В. Чрезмерно велики размеры головы
- Г. Чрезмерно велика окружность грудной клетки
- Д. Оба параметра ниже возрастных норм

Укажите факторы риска рахита, связанного с дефицитом витамина D:

- 1. Грудное вскармливание**
- 2. Недостаточная инсоляция**
- 3. Безмолочная диета у ребенка**
- 4. Вегетарианство**
- 5. Синдром мальабсорбции**

- А. 1,2,4,5
- Б. 1,2,3,4,5
- В. 2,4,5

При неспецифическом язвенном колите в патологический процесс вовлекается:

- А. Слизистая оболочка кишки
- Б. Слизистая и подслизистая оболочки кишки
- В. Серозная оболочка кишки
- Г. Вся стенка кишки
- Д. Мышечный слой кишки

Дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации, со значительно сниженными функциональными возможностями организма, относятся к группе здоровья:

- А. 1
- Б. 2
- В. 3
- Г. 4
- Д. 5

Гемолитическая болезнь новорожденного обусловлена:

- А. Нарушением конъюгации билирубина
- Б. Внутритроубной инфекцией
- В. Иммунологическим конфликтом
- Г. Гемоглобинопатией
- Д. Тромбоцитопатией

Артериальная гипертензия характерна для следующего врожденного порока сердца:

- А. Открытый артериальный проток
- Б. Дефект межжелудочковой перегородки
- В. Стеноз легочной артерии
- Г. Дефект межпредсердной перегородки
- Д. Коарктация аорты

Назовите продукт питания, относительно редко вызывающий гастроинтестинальную пищевую аллергию:

- А. Коровье молоко
- Б. Рисовая крупа
- В. Овсяная крупа
- Г. Козье молоко
- Д. Куриное яйцо

При проведении сердечно – лёгочной реанимации детям частота компрессий грудной клетки в минуту составляет:

- А. 60
- Б. 80
- В. 100
- Г. 120

Основой концепции развития здравоохранения и медицинской науки в РФ являются:

- А. Повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения
- Б. Развитие негосударственного сектора в здравоохранении

Каковы будут ваши рекомендации по диете на период болезни в случае острого вирусного гастроэнтерита у ребенка 7 месяцев, находящегося на грудном вскармливании и получающего прикорм в виде овощного пюре и безмолочных каш?

- А. Отмена грудного вскармливания и блюд прикорма, переход на кормление безлактозной смесью
- Б. Замена грудного молока безлактозной смесью, сохранение блюд прикорма
- В. Сохранение грудного вскармливания, блюда прикорма - по желанию ребенка
- Г. Переход на парентеральное питание на период болезни

Ревматическая хорея проявляется:

- А. Монопарезом
- Б. Спастическими параличами
- В. Фокальными судорогами
- Г. Гиперкинезами
- Д. «Писчим спазмом»

Для стрептококкового тонзиллита характерно все нижеперечисленное, кроме:

- А. Лихорадка и боль в горле
- Б. Яркая гиперемия задней стенки глотки, "пылающий зев"
- В. Симптомы интоксикации
- Г. Возраст пациентов до 3-х лет
- Д. Эффективность амоксициллина

Ребенка двух лет, у которого обнаружен крипторхизм в форме паховой эктопии, необходимо оперировать:

- А. Безотлагательно
- Б. До 5 лет
- В. До 10 лет
- Г. До 12 лет

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие следующих костных и мышечных аномалий:

1. Выраженное отложение жира в области мышц, симулирующее их хорошее развитие
2. Искривление свода стопы
3. Нижняя челюсть отходит назад, а верхняя выступает вперед
4. Уменьшение массы мышц, истончение и нарушение трофики мышечных волокон
5. Неодинаковая степень развития мышц верхних и нижних конечностей

- А. Плоскостопие
- Б. Прогнатизм
- В. Мышечная атрофия
- Г. Мышечная асимметрия
- Д. Псевдогипертрофия

- А. 1А, 2Д, 3В, 4Б, 5Г
- Б. 1Д, 2А, 3В, 4Б, 5Г
- В. 1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Г
- Г. 1Г, 2А, 3Б, 4В, 5Д

Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на:

- А. Микронодулярный цирроз печени
- Б. Холестаз
- В. Острый вирусный гепатит
- Г. Первичный билиарный цирроз
- Д. Аминазиновую желтуху

Для профилактики геморрагической болезни новорожденным вводят:

- А. Витамин А
- Б. Витамин К
- В. Препарат железа
- Г. Иммуноглобулин человека антирезус RhO(D)
- Д. Дексаметазон

Ученица 10 класса жалуется на резкий озноб, мучительную головную боль, жажду. Больна первый день. Температура тела 40,0°

С. Сознание спутанное. Кожные покровы цианотичные, на ягодицах, бедрах геморрагические высыпания от мелкоточечных петехий до кровоизлияний размером 3-4 см. Единичные розеолезные и розеолезно-папулезные элементы на коже живота, спины, верхних конечностей. Ригидность мышц затылка, симптом Кернига сомнительный, пульс 120 ударов в 1 мин, слабого наполнения, тоны сердца глухие, АД 85/55 мм рт. ст., ЧД 28 в 1 мин. Прежде всего следует предположить:

- А. Корь
- Б. Менингококцемию
- В. Осложненное течение гриппа
- Г. Менингит
- Д. Инфекционный мононуклеоз

Какие жаропонижающие средства безопасны для применения в детском возрасте?

- 1. Ибупрофен**
- 2. Ацетилсалициловая кислота**
- 3. Парацетамол**
- 4. Комбинация парацетамола с ибупрофеном**
- 5. Нимесулид**

- А. 1,3,4,5
- Б. 1,3,4
- В. 1,2,3,4
- Г. 1,3

При гемолитической болезни новорожденных желтуха появляется:

- А. В первые сутки жизни
- Б. На 3-и сутки жизни
- В. На 5-е сутки жизни
- Г. На 6-е сутки жизни
- Д. На 10-е сутки жизни

Каким нормативным документом гарантируется Право граждан РФ на охрану здоровья:

- А. Трудовым кодексом
- Б. Конституцией РФ
- В. Гражданским кодексом
- Г. Федеральным законом об охране здоровья граждан

Для купирования гипогликемии показано введение:

- А. Раствор глюкозы 5% из расчета 10 мл/кг внутривенно струйно
- Б. Раствор глюкозы 10% из расчета 5 мл/кг внутривенно струйно
- В. Изотонический раствор хлорида натрия из расчета 10 мл/кг внутривенно струйно
- Г. Раствор Рингера из расчета 20 мл/кг
- Д. Инфузионная терапия не показана

Для железодефицитной анемии характерны:

- 1. Низкий уровень железа в сыворотке крови
 - 2. Низкий уровень ферритина в сыворотке крови
 - 3. Высокий уровень ферритина в сыворотке крови
 - 4. Низкий уровень трансферрина в сыворотке крови
 - 5. Высокий уровень трансферрина в сыворотке крови
- А. 1,2,4
 - Б. 1,3,5
 - В. 1,2,5
 - Г. 2,4

Мочевой синдром при пиелонефрите характеризуется:

- А. Гематурией
- Б. Кристаллурией
- В. Протеинурией
- Г. Лейкоцитурией с бактериурией

Укажите препарат выбора для лечения скарлатины:

- А. Амоксициллин
- Б. Амоксициллин +клавулановая кислота
- В. Котримоксазол
- Г. Азитромицин
- Д. Цефтриаксон

Укажите симптомы, характерные для инфекции, вызванной парвовирусом В19:

- 1. Артралгии**
- 2. Симптом «нашлёпанных» щёк**
- 3. Нейтрофильный лейкоцитоз**
- 4. Инфекционная эритема**
- 5. Апластическая анемия**

А. 1,2,3

Б. 1,2,4,5

В. 2,4

Г. 2,3,4,5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие физикальных изменений различным нозологическим формам:

- 1. Пневмония**
 - 2. Обструктивный бронхит**
 - 3. Гидроторакс**
 - 4. Эмфизема легких**
 - 5. Образование больших полостей, содержащих воздух**
- А. Укорочение перкуторного звука над лёгким
Б. Коробочный оттенок перкуторного звука над лёгким
В. Тимпанический перкуторный звук над легким

А. 1А, 2Б, 3В, 4Б, 5Б

Б. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5В

В. 1А, 2Б, 3А, 4Б, 5В

Г. 1В, 2Б, 3А, 4Б, 5Б

Возможные осложнения при остром стрептококковом тонзиллите (ангине):

- 1. Острый гломерулонефрит**
- 2. Менингоэнцефалит**
- 3. Паратонзиллярный абсцесс**
- 4. Гепатит**
- 5. Ревматическая лихорадка**

А. 1,3,5

Б. 1,2,3,5

В. 2,4

Г. 1,5

Состояние, являющееся противопоказанием к кормлению грудью со стороны матери:

- А. Острая респираторная вирусная инфекция
Б. Гепатит А
В. Инсулинозависимый сахарный диабет
Г. Аутоиммунный тиреоидит
Д. Открытая форма туберкулеза

Укажите симптомы, характерные для ротавирусного гастроэнтерита:

1. Лихорадка
2. Диарея
3. Рвота
4. Примесь слизи и крови в стуле
5. Снижение аппетита

- А. 1,2,3,4
Б. 1,2,3,4,5
В. 1,2,3,5

Основным возбудителем бактериального тонзиллита у детей является:

- А. Пиогенный стрептококк
Б. Дифтерийная палочка
В. Анаэробные бактерии
Г. Золотистый стафилококк
Д. Пневмококк

Укажите препарат первого выбора для лечения острого среднего гнойного отита у детей:

- А. Азитромицин
Б. Кларитромицин
В. Амоксициллин-клавуланат
Г. Цефиксим
Д. Цефтриаксон

Выберите оптимальный метод верификации хеликобактериоза у детей

- А. Хелпил-тест
Б. Быстрый уреазный тест с биоптатом
В. Морфология биоптата
Г. Определение антигенов *H.pylori* в копроfiltrате методом ПЦР
Д. Микроскопия биоптата *ex tempore*

Проведение цистоскопии у детей в экстренном порядке показано при:

- А. Почечной колике
Б. Острой задержке мочи
В. Макрогематурии
Г. Анурии

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Дайте характеристику элементам кожной сыпи.

1. Эритема

2. Петехии

3. Экхимозы

4. Папула

5. Пузырёк

А. Сине-фиолетового цвета, неправильной формы

Б. Первичный, выступающий над уровнем кожи, образуется при скоплении воспалительного инфильтрата в коже

В. Полостной, расположен поверхностно, заполнен серозным или кровянистым содержимым

Г. Участки гиперемизированной кожи

Д. Невоспалительные пятна, размером 1-2 мм

А. 1Г, 2А, 3Д, 4Б, 5В

Б. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В

В. 1А, 2Д, 3А, 4В, 5Б

Г. 1Г, 2Б, 3В, 4А, 5Д

Наиболее частой причиной длительного кашля у ребенка раннего возраста является:

А. Бронхиальная астма

Б. Гастроэзофагеальный рефлюкс

В. Заболевания ЛОР-органов

Г. Коклюш

Д. Инфекция *Mycoplasma pneumoniae*

При церебральной ишемии I степени у новорожденного выявляются:

А. Судороги, гипорефлексия, тремор рук

Б. Тремор рук, гипорефлексия, мышечная дистония

В. Мышечная дистония, гипотония, вялость

Г. Адинамия

Д. Гипотония

Сниженная механическая защита и склонность кожи ребенка к более легкой травматизации обусловлена:

А. Тонкостью эпидермиса

Б. Тонкостью дермы

В. Преимущественно волокнистым составом дермы

Г. Недостаточным развитием подкожного жирового слоя.

Фарингоконъюнктивальная лихорадка наблюдается при:

- А. Гриппе
- Б. Аденовирусной инфекции
- В. РС-вирусной инфекции
- Г. Скарлатине
- Д. Риновирусной инфекции

Консервативное лечение кривошеи следует начинать:

- А. С рождения
- Б. В 2-5 мес
- В. В 6-12 мес
- Г. После 1 года

Какая частота сердечных сокращений в покое свидетельствуют о брадикардии у детей 7-9 лет:

- А. Менее 100 уд/мин
- Б. Менее 80 уд/мин
- В. Менее 60 уд/мин

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Выберите терапевтическую тактику при острых диарейных болезнях у детей:

1. Ротавирусный гастроэнтерит
 2. Дизентерия
 3. Кампилобактериоз
 4. Сальмонеллез
 5. Антибиотик-ассоциированная диарея
- А. Цефалоспорин 3 поколения
 - Б. Метронидазол
 - В. Макролид
 - Г. Оральная регидратация
 - Д. Аминогликозид
- А. 1Г, 2Д, 3В, 4А, 5Б
 - Б. 1А, 2В, 3А, 4А, 5Д
 - В. 1Г, 2А, 3В, 4А, 5Б

Основным симптомом синдрома укороченного интервала PQ является:

- А. Головные боли
- Б. Приступы тахикардии
- В. Артериальная гипертензия
- Г. Энурез
- Д. Эпизоды брадикардии

К группе риска по развитию бронхиальной астмы относятся:

- А. Часто болеющие дети
- Б. Дети с atopическими заболеваниями
- В. Дети, перенесшие пневмонию
- Г. Дети, имеющие хроническую патологию носоглотки
- Д. Дети, перенесшие РС-вирусный бронхиолит на первом году жизни

Неотложные мероприятия на месте происшествия при электротравме у детей включают:

- А. Отсоединение пострадавшего от источника тока
- Б. Проведение сердечно-легочной реанимации
- В. Введение кристаллоидов при шоке
- Г. Экстренная госпитализация
- Д. Все указанные мероприятия

Для коклюша у детей характерны:

- 1. Грубый лающий кашель
- 2. Приступообразный кашель с репризами
- 3. Кашель до рвоты
- 4. Дистанционные хрипы
- 5. Сухие свистящие хрипы на выдохе

- А. 1,2,3
- Б. 1,4,5
- В. 2,3
- Г. 4,5

Причиной гипоксемии может являться:

- 1. Пневмония
- 2. Тромбоэмболия легочной артерии
- 3. Метгемоглобинемия
- 4. Анемия
- 5. Гипервентиляция

- А. 1,2,3
- Б. 1,2,3,4
- В. 1,2,3,4,5
- Г. 1,3,5

Наиболее частая причина артериальной гипертензии у детей 7-12 лет

- А. Коарктация аорты
- Б. Паренхиматозные заболевания почек
- В. Эссенциальная артериальная гипертензия
- Г. Сахарный диабет

Больной

Д., 13 лет. В течение 2 лет беспокоят приступообразные боли в правой подвздошной области, различные по длительности. Несколько раз госпитализировался с подозрением на острый аппендицит, однако оперативное вмешательство не было произведено. При последнем обострении боли в животе сопровождались диареей с примесью крови. При осмотре кожные покровы обычной окраски, признаки узловой эритемы, при пальпации живота - умеренная болезненность в правой подвздошной области. В анализе крови: гемоглобин - 100 г/л, СОЭ - 40 мм/час. Необходимо выполнить следующие диагностические исследования:

- А. Рентгенологическое исследование толстой кишки
- Б. Колоноскопия с лестничной биопсией
- В. Лапароскопия
- Г. Копрологическое исследование
- Д. Бактериологическое исследование кала

Назовите один признак, наиболее характерный для синдрома поражения перикарда:

- А. Локальный гипергидроз, холодные, цианотичные конечности
- Б. Набухание вен шеи, кистей рук, кубитальных вен
- В. Ригидный пульс
- Г. Эпигастральная пульсация сверху-вниз
- Д. Артериальное давление на ногах равно давлению на руках

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите возможную этиологию бактериального тонзиллофарингита у детей:

1. *Streptococcus pneumoniae*
2. *Streptococcus pyogenes*
3. *Pseudomonas aeruginosa*
4. *Corynebacterium diphtheriae*
5. *Staphylococcus aureus*

- А. Вызывает бактериальный тонзиллофарингит у детей
 - Б. У иммунокомпетентных детей не вызывает тонзиллофарингита
- А. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5А
 - Б. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5Б
 - В. 1Б, 2А, 3Б, 4Б, 5А

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между группами и названиями лекарственных препаратов:

1. Дигоксин
 2. Амиодарон
 3. Натрия аденозинтрифосфат
 4. Эналаприл
 5. Каптоприл
- А. Антиаритмические**
Б. Сердечные гликозиды
В. Антигипертензивные
- А. 1Б, 2В, 3Б, 4В, 5В
Б. 1Б, 2А, 3В, 4В, 5А
В. 1Б, 2А, 3А, 4В, 5В

При коллапсе наблюдается:

- А. Падение сосудистого тонуса и увеличение объема циркулирующей крови
Б. Уменьшение притока венозной крови к сердцу и повышение сердечного выброса
В. Понижение артериального давления и повышение венозного давления
Г. Падение сосудистого тонуса и уменьшение объема циркулирующей крови
Д. Понижение артериального давления и повышение периферического сосудистого сопротивления

Лекарственным препаратом выбора для лечения болезни Вильсона-Коновалова является:

- А. Глюкокортикостероиды
Б. Азатиоприн
В. Метотрексат
Г. Пеницилламин
Д. Интерферон альфа-2а

Продолжительность антибактериальной терапии при пиелонефрите у детей должна составлять:

- А. 5 дней
Б. 7 дней
В. 10-14 дней
Г. 21 день
Д. Антибактериальная терапия отменяется через два дня после нормализации температуры

Для вирусного крупа характерны симптомы:

- 1. Стридор**
- 2. Тризм**
- 3. Осиплость голоса**
- 4. Гиперсаливация**
- 5. Грубый кашель**

А. 1,2,3,5

Б. 1,3,4,5

В. 1,3,5

Г. 2,4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между показателями психомоторного развития и возрастом ребенка :

1. Узнает мать, поворачивает голову на звук, направленные движения ручек, переворачивается со спины на живот

2. Следит за человеком, движущимися предметами, поворачивает голову, начинает улыбаться

3. Самостоятельно сидит, произносит 8-10 осмысленных слов, сам берет чашку и пьет

4. Знает свое имя, шагает при поддержке за обе руки, находит и достает предмет из множества игрушек

5. Ползает, легко садится, подолгу лепечет, пьет из чашки, которую держит взрослый

А. 1 месяц

Б. 4 месяца

В. 7 месяцев

Г. 9 месяцев

Д. 12 месяцев

А. 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В

Б. 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В

В. 1А, 2Б, 3Д, 4Г, 5В

У ребенка 1,5 лет с детским церебральным параличом отмечается ежедневный кашель, поперхивания при кормлении. В возрасте 11 мес перенес пневмонию, в возрасте 6 и 14 месяцев - обструктивный бронхит. Какова наиболее вероятная причина кашля у ребенка?

А. Бронхиальная астма

Б. Первичный иммунодефицит

В. Вторичный иммунодефицит

Г. Коклюш

Д. Хроническая аспирация пищи

При оказании экстренной помощи в случае анафилактической реакции врачу, не являющемуся анестезиологом-реаниматологом, следует ввести пациенту адреналин:

- А. Подкожно
- Б. Внутримышечно
- В. Внутривенно
- Г. Сублингвально

С чего следует начинать оценку состояния пациента по алгоритму ABCDE, если он без сознания:

- А. Оценить проходимость дыхательных путей
- Б. Оценить тяжесть дыхательной недостаточности
- В. Оценить наличие нарушений кровообращения
- Г. Оценить степень обезвоживания
- Д. Измерить температуру тела

Для какого заболевания характерны гемартрозы:

- А. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
- Б. Геморрагический васкулит
- В. Лейкоз
- Г. Гемофилия
- Д. Болезнь Виллебранда

Задачами системы охраны здоровья матери и ребенка являются:

- А. Забота государства о здоровье матери и ребенка
- Б. Обеспечение условий, необходимых для всестороннего гармоничного развития детей
- В. Разработка эффективной системы оказания медицинской помощи матери и ребенку

Иммобилизация верхней конечности при переломе костей предплечья в нижней трети производится:

- А. Гипсовой повязкой от лучезапястного сустава до средней трети плеча
- Б. Циркулярной гипсовой повязкой от лучезапястного до локтевого суставов
- В. Гипсовой повязкой от лучезапястного до локтевого суставов
- Г. Гипсовой лонгетой от пястно-фаланговых суставов до средней трети плеча

С чего следует начинать оценку состояния пациента по алгоритму ABCDE, если он в сознании:

- А. Оценить проходимость дыхательных путей
- Б. Оценить тяжесть дыхательной недостаточности
- В. Оценить наличие нарушений кровообращения
- Г. Оценить степень нарушения сознания
- Д. Оценить степень обезвоживания

Физическое развитие у детей в возрасте до 1 года должно быть оценено:

- А. 1 раз в год
- Б. 1 раз в полгода
- В. раз в 1 квартал
- Г. 1 раз в месяц
- Д. 1 раз в 10 дней

В каких случаях у ребенка следует исключать иммунодефицитное состояние:

- 1. Упорный кандидоз слизистых, микоз кожи и ногтей
 - 2. Частые острые респираторные заболевания
 - 3. Пневмоцистная пневмония
 - 4. Генерализованный БЦЖ-ит или БЦЖ-остеит
 - 5. Вакциноассоциированный полиомиелит
- А. 1,2,3,4,5
 - Б. 1,2,3,4
 - В. 1,3,4,5
 - Г. 2,3,4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между характером сыпи и заболеванием:

- 1. Мелкопятнистая сыпь на неизмененном фоне кожи
 - 2. Геморрагическая «звездчатая» сыпь
 - 3. Везикулярная сыпь с явлениями «ложного» полиморфизма
 - 4. Пятнистопапулезная сыпь на неизмененном фоне кожи
 - 5. Мелкоточечная сыпь на гиперемизированном фоне кожи
- А. Корь
 - Б. Краснуха
 - В. Скарлатина
 - Г. Ветряная оспа
 - Д. Менингококцемия
- А. 1А, 2Д, 3Г, 4Б, 5В
 - Б. 1Б, 2Д, 3Г, 4А, 5В
 - В. 1Б, 2Д, 3Г, 4В, 5А

Для халазии кардии характерно наличие:

- А. Боли натошак в эпигастрии
- Б. Боли натошак в правом подреберье
- В. Запоров
- Г. Рецидивирующей рвоты

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие симптомов сердечной недостаточности:

1. Набухание яремных вен
2. Расширение границ относительной сердечной тупости влево.
3. Увеличение размеров печени
4. Периферические отеки
5. Влажные разнокалиберные хрипы в легких

А. Левожелудочковая сердечная недостаточность

Б. Правожелудочковая сердечная недостаточность

А. 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 5А

Б. 1А, 2Б, 3А, 4А, 5Б

В. 1Б, 2А, 3Б, 4Б, 5А

Клинические проявления целиакии могут манифестировать при введении в рацион ребенка:

- А. Гречневой каши
- Б. Рисовой каши
- В. Манной каши
- Г. Всего вышеперечисленного
- Д. Манифестация целиакии не связана с введением определённых продуктов питания

В качестве предрасполагающих к инфекции мочевой системы факторов выступает все, кроме:

- А. Наследственная предрасположенность
- Б. Наличие уростаза
- В. Дефекты иммунного ответа (часто болеющий ребенок, аномалии конституции и т.д.)
- Г. Гельминтозы (энтеробиоз)
- Д. Вегето-сосудистая дистония

Для лечения острого вирусного бронхолита следует использовать:

1. Кислородотерапию
2. Бронходилататоры
3. Будесонид
4. Антибиотики
5. Муколитики

А. 2,3,4

Б. 1,2,3

В. 1,2

Г. 1,2,3,4,5

С помощью пикфлоуметра измеряется:

- А. Общий объем выдоха
- Б. Жизненная емкость легких
- В. Остаточный объем легких
- Г. Максимальная (пиковая) скорость выдоха
- Д. Объем форсированного выдоха за первую секунду

К лекарственным препаратам, используемым для достижения контроля бронхиальной астмы относят:

1. Бета2-агонисты короткого действия
2. Иммуномодуляторы
3. Ингаляционные холинолитики
4. Ингаляционные глюкокортикостероиды
5. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов

- А. 1,2,3
- Б. 2,4,5
- В. 4,5
- Г. 1,3,4,5

Ребенка с впервые выявленной частой желудочковой экстрасистолой следует:

- А. Оставить дома, назначить постельный режим и противовоспалительную терапию
- Б. Ограничить физические нагрузки
- В. Назначить антиаритмическую терапию
- Г. Госпитализировать для обследования

Укажите наиболее частые возбудители гнойного менингита:

1. Энтеровирусы
2. Менингококк
3. Синегнойная палочка
4. Пневмококк
5. Гемофильная палочка

- А. 1,2,4,5
- Б. 2,4,5
- В. 2,3,4,5
- Г. 2,5

Какова Ваша тактика кормления новорожденного ребенка при наличии гнойного мастита у матери:

- А. Исключается грудное вскармливание полностью, временно переводится на искусственную смесь
- Б. Можно кормить здоровой грудью, а ребенку назначить бифидумбактерин
- В. Можно кормить из обеих желез, но внутрь ребенку назначить антибиотик, бифидумбактерин
- Г. Кормить сцеженным грудным молоком матери, подвергнутым пастеризации

Какие препараты используются для лечения пациента с ротавирусным гастроэнтеритом:

- 1. Антибиотики**
- 2. Сорбенты**
- 3. Противодиарейные средства, уменьшающие перистальтику кишечника**
- 4. Препараты для оральной и внутривенной регидратации**
- 5. Иммуномодуляторы**

А. 1,2,3,4

Б. 2,3,4,5

В. 2,4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие изменений гемодинамики и характера врожденного порока сердца:

- 1. Дефект межжелудочковой перегородки**
- 2. Открытый артериальный проток**
- 3. Изолированный стеноз легочной артерии**
- 4. Тетрада Фалло**
- 5. Коарктация аорты**

А. Нецианотический с обогащением малого круга кровообращения

Б. Цианотический с обогащением малого круга кровообращения

В. Нецианотический с обеднением малого круга кровообращения

Г. Цианотический с обеднением малого круга кровообращения

Д. Нецианотический с обеднением большого круга кровообращения

А. 1А, 2А, 3В, 4Г, 5Д

Б. 1Б, 2А, 3В, 4Д, 5Г

В. 1Г, 2А, 3В, 4Д, 5В

Основной этиологический фактор эпиглотитта у детей:

А. Streptococcus pneumoniae

Б. Neisseria meningitides

В. Staphylococcus aureus

Г. Moraxella catarrhalis

Д. Haemophilus influenzae

Оценку физического развития ребенка первого года жизни следует проводить:

А. Ежемесячно

Б. Один раз в квартал

В. Один раз в полгода

Г. Один раз в год

Какой признак из перечисленных не является нормой на электрокардиограмме у ребенка 5 лет:

- А. Частота сердечных сокращений 100 в минуту
- Б. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса
- В. Дыхательная аритмия
- Г. Высокий зубец Т

Метаболический синдром у подростков, помимо артериальной гипертензии и ожирения, характеризуется:

- А. Гиперинсулинемией, гиперурикемией, гипогликемией
- Б. Гиперинсулинемией, гиперлипидемией, снижением толерантности к глюкозе
- В. Гипертриглицеридемией, гипербилирубинемией, гипохолестеринемией
- Г. Гипокоагуляцией, гипогликемией, гиперурикемией
- Д. Нормохромной анемией, гипергликемией, гиперкреатининемией

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между симптомами и заболеваниями:

1. Амимичное маскообразное лицо
 2. Алоpecia
 3. Фотосенсибилизация
 4. Лиловая окраска век с параорбитальным отеком
 5. Энтезопатии
- А. Системная склеродермия
 - Б. Системная красная волчанка
 - В. Ювенильный дерматомиозит
 - Г. Анкилозирующий спондилоартрит
- А. 1Г, 2Б, 3Б, 4В, 5Г
 - Б. 1Б, 2А, 3Б, 4В, 5Г
 - В. 1А, 2Б, 3Б, 4В, 5Г
 - Г. 1А, 2А, 3Г, 4В, 5Б

При транспортировке больного с переломом позвоночника оптимальным положением является:

- А. На щите, на животе
- Б. На щите, на спине с соблюдением «оси безопасности»
- В. На носилках, в положении лежа на животе
- Г. На носилках, на боку

Начинать выведение ребенка 8 лет из приступа пароксизмальной тахикардии при артериальном давлении 90/60 мм рт ст целесообразно с применения:

- А. Адреналина внутривенно
- Б. Дигоксина внутримышечно
- В. Изоптина внутривенно
- Г. Вагусных проб
- Д. АТФ внутривенно

В алгоритм диагностических процедур на догоспитальном этапе при выявлении лейкоцитурии входит все, кроме:

- А. Повторный клинический анализ мочи
- Б. Осмотр вульвы у девочек и крайней плоти у мальчиков
- В. Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам
- Г. Соскоб на энтеробиоз
- Д. ЭКГ

Серозный менингит может отмечаться при:

- А. Шигеллезе
- Б. Норовирусной инфекции
- В. Ротавирусной инфекции
- Г. Энтеровирусной инфекции

При гипергликемии (глюкоза в крови > 15 ммоль/л) показано внутривенное струйное введение инсулина короткого действия в дозе:

- А. 0,1 Ед/кг
- Б. 1,0 Ед/кг
- В. 0,5 Ед/кг
- Г. 0,75 Ед/кг

К какому возрасту должно сформироваться полное управление мочеиспусканием в течении суток:

- А. 2 года
- Б. 3 года
- В. 4 года
- Г. 5 лет
- Д. 6 лет

Хроническим является гломерулонефрит если:

- А. Течение острого гломерулонефрита, несмотря на проводимую терапию, длится больше 6 месяцев
- Б. В случае трехкратного увеличения показателя креатинина в крови в течение трёх последовательных дней
- В. У пациента зарегистрированы специфические морфологические изменения в биоптате ткани почек
- Г. В случае когда у пациента регистрируется протеинурия
- Д. В случае если регистрируется присоединение микстинфекции

Укажите препарат выбора для лечения менингококцемии:

- А. Цефалоспорин III поколения
- Б. Амоксициллин-клавуланат
- В. Ципрофлоксацин
- Г. Джозамицин
- Д. Триметоприм-сульфаметоксазол

При артериальной гипертензии у детей и подростков средние уровни систолического АД и диастолического АД из трех измерений равны или превышают возрастные значения:

- А. 25 перцентиля
- Б. 50 перцентиля
- В. 75 перцентиля
- Г. 90 перцентиля
- Д. 95 перцентиля

Для проведения заменного переливания крови при гемолитической болезни новорожденного по АВО-системе используют:

- А. Эритроцитарную массу 0(1) и плазму 0(1)
- Б. Эритроцитарную массу 0(1) и плазму группы крови ребенка
- В. Эритроцитарную массу 0(1) и плазму АВ(IV)
- Г. Эритроцитарную массу группы крови ребенка и плазму АВ(IV)
- Д. Эритроцитарную массу А(II) и плазму группы крови ребенка

Для проведения эффективного непрямого массажа сердца ладони следует расположить:

- А. С обеих сторон грудной клетки
- Б. На границе средней и нижней трети грудины
- В. В пятом межреберном промежутке слева
- Г. На верхней части грудины

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Дайте характеристику перечисленным костным аномалиям.

1. Размягчение и истончение плоских костей черепа
2. Ладьевидное углубление на переднебоковых поверхностях грудной клетки в области прикрепления диафрагмы
3. Нарушение минерализации и плотности костной ткани
4. Размягчение костей
5. Избыточное образование остеοидной ткани без её минерализации в зонах роста костей

- А. Остеопороз
- Б. Остеомаляция
- В. Остеοидная гиперплазия
- Г. Краниотабес
- Д. Борозда Филатова-Гаррисона

- А. 1Б, 2А, 3Д, 4В, 5Г
- Б. 1Г, 2А, 3В, 4Г, 5Д
- В. 1Б, 2Д, 3А, 4В, 5Г
- Г. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В

Укажите симптомы экзикоза у детей:

1. Западение большого родничка
2. Сухость кожи и слизистых оболочек
3. Полиурия
4. Жажда
5. Медленное расправление кожной складки

- А. 1,2,3,5
- Б. 1,2,3,4,5
- В. 1,2,4,5
- Г. 1,2,5

Какие вакцины противопоказаны ВИЧ-инфицированным детям?

- А. Вакцина против пневмококка
- Б. Вакцина против гепатита В
- В. Инактивированная полиοмиелитная вакцина
- Г. БЦЖ
- Д. Вакцина против дифтерии и столбняка

Укажите антигистаминные препараты 1 поколения:

- 1. Хлоропирамин**
- 2. Цетиризин**
- 3. Дифенгидрамин**
- 4. Клемастин**
- 5. Дезлоратадин**

- А. 1,3,4
Б. 1,2,3
В. 2,5
Г. 1,3,4,5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Выберите стартовую антибактериальную терапию при острых респираторных болезнях у детей:

- 1. Нетяжелая внебольничная пневмония, типичная**
- 2. Атипичная внебольничная пневмония**
- 3. Стрептококковый тонзиллит**
- 4. Острый средний гнойный отит**
- 5. Инфекционный мононуклеоз**

- А. Амоксициллин
Б. Цефтриаксон
В. Азитромицин
Г. Цефиксим
Д. Антибактериальная терапия не показана

- А. 1А, 2В, 3А, 4А, 5Д
Б. 1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5Б
В. 1Б, 2В, 3А, 4Б, 5Б
Г. 1А, 2В, 3А, 4Б, 5Б

Укажите наиболее часто встречающийся этиологический фактор инфекции мочевой системы у детей:

- А. Кишечная палочка
Б. Протей
В. Синегнойная палочка
Г. Стафилококк
Д. Клебсиелла

При муковисцидозе нарушается транспорт:

- А. Цинка
Б. Брома и натрия
В. Железа и натрия
Г. Хлора и натрия
Д. Водорода

При полной атриовентрикулярной блокаде желудочки сокращаются:

- А. Чаше, чем предсердия
- Б. Реже, чем предсердия

Наличие каких заболеваний позволяет выявить неонатальный скрининг:

1. Фенилкетонурия
2. Галактоземия
3. Целиакия
4. Гипотериоз
5. Муковисцидоз

- А. 1,2,3,4
- Б. 1,2,4
- В. 1,2,4,5
- Г. 1,2,3

Одышечно-цианотические приступы наблюдаются при:

- А. Аномалии Эбштейна и открытом артериальном протоке
- Б. Коррегированной транспозиции магистральных сосудов и стенозе аорты
- В. Тетраде Фалло и транспозиции магистральных сосудов со стенозом легочной артерии
- Г. Коарктации аорты и общем артериальном стволе
- Д. Большом дефекте межжелудочковой перегородки и открытом артериальном протоке

Нижняя граница абсолютного количества нейтрофилов у детей старше одного года составляет:

- А. $0,5 \times 10^9/\text{л}$
- Б. $1,0 \times 10^9/\text{л}$
- В. $1,5 \times 10^9/\text{л}$
- Г. $2,0 \times 10^9/\text{л}$

В этиологии внебольничной пневмонии у детей ведущее значение имеет:

- А. Пневмококк
- Б. Пиогенный стрептококк
- В. Протей
- Г. Клебсиелла
- Д. Бордетелла

Выберите препараты, которые могут быть назначены для стартового лечения острого пиелонефрита у ребенка:

1. Амоксициллин
2. Амоксициллин-клавуланат
3. Джозамицин
4. Цефуроксим
5. Цефотаксим

А. 1,2,3

Б. 2,4,5

В. 1,2,3,5

Для синдрома острой почечной недостаточности (стадия олигоанурии) характерно:

1. Ацидоз
2. Азотемия
3. Гиперкалиемия
4. Гипопротеинемия
5. Гипогликемия

А. 1,2,3,4,5

Б. 1,2,3,4

В. 1,2,3

Г. 1,2,4

Микроцитоз эритроцитов может отмечаться при следующих заболеваниях:

- А. Железодефицитная анемия
- Б. Талассемия
- В. Анемия при хронических заболеваниях
- Г. При всех указанных заболеваниях

Наиболее грозным осложнением врожденных пороков сердца с гемодинамически значимым обогащением малого круга кровообращения является:

- А. Нарушение ритма сердца
- Б. Артериальная гипертензия
- В. Легочная гипертензия
- Г. Инсульт
- Д. Ишемия миокарда

Основным клиническим проявлением фенилкетонурии является поражение:

- А. Системы кровотока
- Б. Центральной нервной системы
- В. Печени
- Г. Костной системы
- Д. Иммунной системы

Какой вид иммуноглобулинов обеспечивает развитие вторичного иммунного ответа?

- А. Ig G
- Б. IgA
- В. IgM
- Г. IgE
- Д. Ig Д

Какой из симптомов позволяет наиболее точно предположить атипичную этиологию внебольничной пневмонии у ребенка:

- А. Субфебрильная температура
- Б. Локальные крепитирующие хрипы в легких
- В. Невысокие маркеры бактериального воспаления в лабораторных анализах крови
- Г. Негомогенный характер инфильтративных теней на рентгенограмме
- Д. Неэффективность лечения бета-лактамом антибиотиком

Нормальная частота сердечных сокращений у ребенка 1 месяца жизни составляет:

- А. 200 уд/мин
- Б. 180 уд/мин
- В. 140 уд/мин
- Г. 110 уд/мин
- Д. 100 уд/мин

Укажите симптом, не характерный для атопического дерматита:

- А. Отсутствие зуда кожи
- Б. Полиморфизм кожных высыпаний
- В. Возрастная стадийность клинических симптомов
- Г. Локализация аллергической сыпи на коже лица, конечностей
- Д. Плохой ночной сон

К группе врожденных пороков сердца с обогащением малого круга кровообращения относится:

- А. Высокий дефект межжелудочковой перегородки
- Б. Коарктация аорты
- В. Тетрада Фалло
- Г. Стеноз легочной артерии
- Д. Болезнь Эбштейна

Доза для внутримышечного введения адреналина ребенку 3-х лет с анафилактической реакцией составляет:

- А. 0,1 мг
- Б. 0,15 мг
- В. 0,3 мг
- Г. 0,5 мг
- Д. 1 мг

Диагноз хронического гастродуоденита у подростков верифицируется

- А. Наличием характерных жалоб
- Б. Анамнестическими данными
- В. Объективным осмотром
- Г. Эзофагогастродуоденоскопия
- Д. Морфологическим исследованием биоптата слизистой оболочки

Диарейный синдром при шигеллезе является следствием:

- А. Развития дисахаридазной недостаточности, повышения осмотической активности и нарушения всасывания воды и электролитов энтероцитами
- Б. Воспалительного процесса на всем протяжении желудочно-кишечного тракта
- В. Инвазии шигелл в колоноциты и развитием воспалительного процесса
- Г. Нарушений в системе циклических нуклеотидов и простагландинов
- Д. Гиперосмолярности химуса и нарушения реабсорбции воды

К наиболее важным признакам менингита у детей первых месяцев жизни относится

- А. Головная боль
- Б. Рвота
- В. Лихорадка
- Г. Выбухание большого родничка

Наиболее активное участие в регуляции минерального обмена принимают _____

- А. Органы дыхания
- Б. Паращитовидные железы
- В. Половые железы
- Г. Органы пищеварения

При железодефицитной анемии снижается уровень

- А. Растворимого трансферринового рецептора
- Б. Сывороточного ферритина
- В. Общей железосвязывающей способности сыворотки
- Г. Трансферрина

Наиболее частой причиной артериальной гипертензии у подростков является

- А. Эссенциальная артериальная гипертензия
- Б. Паренхиматозное заболевание почек
- В. Тромбоз почечных артерий и вен
- Г. Коарктация аорты

К препаратам, используемым в лечении аутоиммунных гепатитов, относят

- А. Нестероидные противовоспалительные препараты
- Б. Аминосалицилаты
- В. Глюкокортикостероиды
- Г. Препараты урсодезоксихолевой кислоты

К методам обследования, используемым при острой сердечной недостаточности, относят

- А. Кардиоритмографию, денситометрию
- Б. Дуплексное сканирование, общий анализ крови
- В. Электрокардиографию, эхокардиографию
- Г. Велоэргометрию, реопульмонографию

Поступление жалоб граждан по вопросам качества и доступности медицинской помощи является основанием для

- А. Проведения целевой (внеплановой) проверки внутреннего контроля качества
- Б. Проведения общего собрания
- В. Приобретения нового оборудования
- Г. Увольнения заведующего отделением, на которое поступают жалобы

«Визитной карточкой» клинических проявлений аденовирусной инфекции является

- А. Конъюнктивит
- Б. Пневмония
- В. Бронхит
- Г. Диарея

Для токсикоза с эксикозом 2-3 степени характерно наличие

- А. Высокой лихорадки
- Б. Микроциркуляторных нарушений
- В. Головной боли
- Г. Полиурии

Количество критериев оценки состояния новорожденного по шкале apgar составляет

- А. 6
- Б. 3
- В. 5
- Г. 4

Тяжесть обострения бронхиальной астмы будет оценена как тяжелая при насыщении крови кислородом (sao₂) менее (в %)

- А. 90
- Б. 85
- В. 95
- Г. 80

Наступление периода полового созревания у мальчиков начинается с

- А. Увеличения яичек
- Б. Мутации голоса
- В. Увеличения полового члена в длину
- Г. Пигментации мошонки

Рентгенологическая картина сердца в виде «снежной бабы» характерна для

- А. Корригированной транспозиции магистральных сосудов
- Б. Аномального дренажа легочных вен
- В. Полной формы атриовентрикулярного канала
- Г. Атрезии трикуспидального клапана

У новорожденного ребенка наиболее частой причиной повышения артериального давления является

- А. Коарктация аорты
- Б. Феохромоцитома
- В. Ожирение
- Г. Гломерулонефрит

Основным фактором, определяющим прогноз и характер терапии при вирусном гепатите с, является

- А. Активность трансаминаз в крови
- Б. Уровень билирубина в крови
- В. Уровень белка в крови
- Г. Фенотип вируса

Стрессовая язва желудка проявляется чаще

- А. Пенетрацией
- Б. Малигнизацией
- В. Кровотечением
- Г. Перфорацией

На фоне массовой вакцинации изменяется вирулентность возбудителя коклюша вследствие

- А. Формирования преимущественно постинфекционного иммунитета
- Б. Формирования недостаточно напряженного длительного поствакцинального иммунитета
- В. Низкого охвата детского населения прививками
- Г. Формирования чрезмерно напряженного поствакцинального иммунитета

Препаратом, относящимся к группе нитрофуранов, является

- А. Пипемидовая кислота
- Б. Нифурател
- В. Амикацин
- Г. Нитроксолин

При достаточном уровне антитоксического иммунитета в момент заражения стрептококковая инфекция протекает в виде

- А. Миокардита
- Б. Ангины
- В. Эндокардита
- Г. Диффузного гломерулонефрита

Больному менингококковым менингитом целесообразно назначить

- А. Цефотаксима натриевую соль
- Б. Офлоксацин
- В. Левомецетина-сукцинат-натрия
- Г. Гентамицин

При вирусном гепатите d имеет место _____ путь инфицирования

- А. Парентеральный
- Б. Воздушно-капельный
- В. Контактный
- Г. Алиментарный

Основным разделом организационной работы врача-педиатра участкового является

- А. Ведение учётно-отчётной документации
- Б. Диспансеризация детского населения
- В. Санитарно-просветительная работа
- Г. Формирование основ здорового образа жизни

Клинически ахалазия пищевода проявляется

- А. Вытеканием нествороженного молока сразу после кормления
- Б. Рвотой с желчью
- В. Рвотой во время еды и дисфагией
- Г. Рвотой с желудочным содержимым

К быстрому бронходилатирующему эффекту приводит сочетанное применение ипратропия бромида и

- А. В2-агонистов
- Б. Эпинефрина
- В. Кромоглициевой кислоты
- Г. М-холинолитиков

При пробе с дозированной физической нагрузкой адекватной реакцией считается

- А. Учащение пульса на 20-25%
- Б. Учащение пульса на 50-55%
- В. Урежение пульса на 30-40%
- Г. Отсутствие изменения частоты пульса

При обструктивном бронхите у детей выявляется _____ одышка

- А. Экспираторная
- Б. Рестриктивная
- В. Инспираторная
- Г. Смешанная

Для приготовления пищи при глютен-индуцированной целиакии следует использовать _____ муку

- А. Пшеничную
- Б. Кукурузную
- В. Манную
- Г. Ржаную

Пиелонефрит сопровождается

- А. Болями в начале мочеиспускания
- Б. Анурией
- В. Болями в конце мочеиспускания
- Г. Безболезненными мочеиспусканиями

Аутоиммунный гепатит первого типа характеризуется наличием в сыворотке антител

- А. Антинуклеарных (ANA) и/или антигладкомышечных (SMA)
- Б. К двуспиральной (нативной) ДНК (анти- ds DNA)
- В. К растворимому печеночному антигену (anti-SLA)
- Г. К микросомам печени и почек типа 1 (anti-LKM 1)

Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма №025/у), оформляется в поликлинике на пациента

- А. При первичном обращении
- Б. Один раз в год
- В. Один раз в пять лет
- Г. При каждом обращении

При ахалазии пищевода при рентгенографии отмечается

- А. Отсутствие газового пузыря желудка
- Б. Симптом мишени
- В. Расширение тени средостения
- Г. Увеличение желудка в размерах

Для гриппа нехарактерным симптомом является

- А. Желтуха
- Б. Лихорадка
- В. Гипертермия
- Г. Судорожный синдром

Проведение профилактических прививок ребёнку, перенёвшему острое респираторное заболевание, возможно не ранее, чем через _____ после выздоровления

- А. 2 Недели
- Б. 3 Месяца
- В. 2 Месяца
- Г. 1 Месяц

К критериям системной воспалительной реакции при течении неонатального сепсиса у новорожденных относят

- А. Снижение концентрации интерлейкина-8 в сыворотке крови ниже 100 пг/мл
- Б. Повышение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови более 6 мг/л
- В. Нейтрофильный индекс < 0,2
- Г. Лейкопению 9 /л

Введение вакцины бцж осуществляется для профилактики

- А. Коклюша
- Б. Кори
- В. Дифтерии
- Г. Туберкулеза

В первую очередь при врожденной диафрагмальной грыже проводят

- А. Искусственную вентиляцию лёгких
- Б. Зондирование желудка
- В. Срочную операцию
- Г. Кислородотерапию через маску

Анализ спинномозговой жидкости: прозрачная, бесцветная, цитоз – 7 клеток (100% лимфоциты), сахар – 2,4 ммоль/л, хлориды – 120 ммоль/л – характерен для

- А. Нормального состава ликвора
- Б. Серозного менингита
- В. Туберкулезного менингита
- Г. Гнойного менингита

Для профилактики возникновения железодефицитной анемии у детей первого полугодия, находящихся на искусственном вскармливании, используют ____ смеси

- А. Начальные молочные
- Б. Неадаптированные молочные
- В. Последующие молочные
- Г. Частично гидролизированные

Для сыпи при ветряной оспе характерны особенности в виде

- А. Пятнисто-папулезных высыпаний на неизмененном фоне кожи
- Б. Одномоментных (в течение дня) пузырьковых высыпаний, многокамерность элемента
- В. Полиморфизма с преобладанием везикул, их легкое опорожнение после прокола, пупковидное вдавливание у отдельных элементов
- Г. Геморрагических высыпаний и их слияние с образованием некрозов

К характерным клиническим симптомам острого холецистита у детей относят боли

- А. В эпигастрии, тошноту, изжогу
- Б. В правом подреберье, симптомы токсикоза, тошноту
- В. Опоясывающего характера, повторную рвоту
- Г. В животе, жидкий стул, метеоризм

Основным побочным эффектом применения аминогликозидов является

- А. Нарушение функции почек
- Б. Агранулоцитоз
- В. Анемия
- Г. Нарушение функции печени

Коробочный (тимпанический) оттенок перкуторного звука определяется при

- А. Ателектазе
- Б. Синдроме скопления жидкости в полости плевры
- В. Полисегментарной инфильтрации лёгочной ткани
- Г. Бронхообструктивном синдроме

Методом оценки состояния слизистой оболочки толстой кишки является

- А. Копрограмма
- Б. Ректороманоскопия
- В. Ирригография
- Г. Бактериологическое исследование фекалий

Причиной кардиогенного шока является

- А. Обезвоживание
- Б. Дыхательная недостаточность
- В. Острая митральная недостаточность при инфекционном эндокардите
- Г. Острая недостаточность трикуспидального клапана при инфекционном эндокардите

Эндемический зоб развивается в результате дефицита

- А. Железа
- Б. Йода
- В. Селена
- Г. Кальция

Под консилиумом понимают совещание

- А. Представителей администрации медицинской организации для решения вопроса об эвакуации пациента
- Б. Несколько врачей одной или нескольких специальностей, необходимое для установления состояния здоровья пациента
- В. Представителей страховых компаний по решению спорных вопросов лечения пациентов
- Г. Сотрудников клинической кафедры по профилю заболевания пациента

К продуктам с высокой сенсibilизирующей активностью относят

- А. Мясо индейки, картофель
- Б. Коровье молоко, рыбу, яйца, арахис
- В. Рис, мясо кролика, гречку
- Г. Тыкву, арбуз, огурец, малину

Степень нарушений функций организма при заболеваниях сердечно-сосудистой системы определяется

- А. Социальными факторами
- Б. Выраженностью недостаточности кровообращения
- В. Наличием сопутствующих заболеваний
- Г. Физическим развитием ребёнка

Наиболее типичная локализация сыпи при скарлатине проявляется на

- А. Грудь
- Б. Дистальных отделах рук
- В. Разгибательных поверхностях ног
- Г. Естественных складках кожи

Кислородотерапия должна проводиться любому ребенку с сатурацией крови кислородом ниже (%)

- А. 92
- Б. 98
- В. 80
- Г. 85

В этиотропной терапии врождённой герпетической инфекции используют

- А. Ампициллин
- Б. Азитромицин
- В. Ацикловир
- Г. Амфотерицин В

Рубчик после вакцинации бцж свидетельствует о/об

- А. Осложнении вакцинации БЦЖ
- Б. Инфицировании микобактериями туберкулеза
- В. Эффективности лечения
- Г. Сформировавшемся иммунитете

Увеличение затылочных лимфатических узлов характерно для

- А. Ангины
- Б. Гриппа
- В. Назофарингита
- Г. Краснухи

Промывание желудка у ребенка с отравлением в бессознательном состоянии допустимо

- А. В положении на боку с опущенной головой
- Б. В положении на спине
- В. После идентификации яда
- Г. После интубации трахеи

Одним из условий для вынесения заключения о признании инвалидом при проведении медико-социальной экспертизы является

- А. Ходатайство предприятия, на котором работает больной
- Б. Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма
- В. Возраст пациента
- Г. Допущенные дефекты в лечении

К формированию врожденного порока сердца может привести воздействие вредных факторов в/во _____ триместре беременности

- А. Втором
- Б. Третьем
- В. Втором или третьем
- Г. Первом

Местная реакция на пробу манту с 2 те оценивается через (в часах)

- А. 24
- Б. 6
- В. 72
- Г. 48

Основной внелегочной причиной дыхательных расстройств у недоношенных детей является

- А. Перинатальное поражение центральной нервной системы
- Б. Гипофункция щитовидной железы
- В. Метаболическое нарушение (гипокалиемия, гипомагниемия)
- Г. Врожденный порок сердца

Рахит - полиэтиологическое заболевание, связанное с нарушением в растущем организме обмена

- А. Кальция и калия
- Б. Кальция и фосфора
- В. Натрия и фосфора
- Г. Магния и натрия

Глубина введения газоотводной трубки у детей первого года жизни должна быть до (в сантиметрах)

- А. 18-20
- Б. 6-8
- В. 4-5
- Г. 10-15

Дефект межжелудочковой перегородки может располагаться _____ перегородки

- А. Только в приточной части межжелудочковой
- Б. Только в мембранозной части
- В. Только в мышечной части межжелудочковой
- Г. В любом анатомическом отделе межжелудочковой

Критерием системной воспалительной реакции при течении неонатального сепсиса у новорожденных является лейкопения ____ $\times 10^9$ /л

- А. < 4
- Б. < 2
- В. < 5
- Г. < 3

Максимальное время наложения кровоостанавливающего жгута на конечность в зимнее время сокращают на (в минутах)

- А. 90
- Б. 60
- В. 30
- Г. 20

Клинические симптомы раннего менингита у новорожденных выявляются _____ жизни

- А. В первые 4 суток
- Б. После 10 суток
- В. На 7-10 сутки
- Г. На 5-7 сутки

Агглютинины а и в находятся на поверхности

- А. Эозинофилов
- Б. Лимфоцитов
- В. Эритроцитов
- Г. Тромбоцитов

Оптимальной величиной реер (пдкв) в течение перевода новорожденного с ивл на спонтанное дыхание считается (в см вод. Ст.)

- А. 5-10
- Б. 5
- В. 2-3
- Г. 10

Легкость повреждения и инфицирования кожи у грудных детей связана с

- А. Толстым, рыхлым роговым слоем, склонностью к мацерации
- Б. Тонкостью кожи, склонностью к мацерации, незрелостью местного иммунитета
- В. Толстым, рыхлым роговым слоем, незрелостью местного иммунитета
- Г. Тонкостью кожи, кислой реакцией секрета кожи

Для лечения больного скарлатиной назначают

- А. Линкомицин
- Б. Хлорамфеникол
- В. Пенициллины
- Г. Олеандомицин+терациклин

Анатомическая облитерация открытого артериального протока у ребенка происходит к _____ жизни

- А. 1 Году
- Б. 14 Дню
- В. 3-4 Месяцу
- Г. 6-7 Месяцам

С целью определения гидрофильности тканей используется

- А. Анализ Аддиса – Каковского
- Б. Проба Зимницкого
- В. Проба Сулковича
- Г. Проба Макклюра – Олдрича

Инсулин продуцируется _____ поджелудочной железы

- А. Бета-клетками
- Б. Альфа-клетками
- В. Дельта-клетками
- Г. РР-клетками

Патогномоничным признаком инфекции простого герпеса являются высыпания

- А. Уртикарные
- Б. Розеолезные
- В. Пятнисто-папулезные
- Г. Пузырьковые

Наиболее частым осложнением при подкожном введении вакцины бцж является

- А. Келлоидный рубец
- Б. Коллапс
- В. Холодный абсцесс
- Г. Остановка дыхания

Для расчёта количества молочных зубов у ребёнка до 1 года используют формулу (где n - возраст в месяцах)

- А. $N + 4$
- Б. $4N - 20$
- В. $20 - 2N$
- Г. $N - 4$

У пациентов с почечной недостаточностью с целью коррекции вторичного гиперпаратиреоза и предотвращения почечной остеодистрофии рекомендуется терапия

- А. Альфакальцитриолом или кальцитриолом
- Б. Витаминами группы В
- В. Препаратами магния
- Г. Кальция глюконатом или кальция хлоридом

Первичную вакцинацию против туберкулеза осуществляют здоровым новорожденным в возрасте ____ дней жизни

- А. 10-14
- Б. 3-7
- В. 24-28
- Г. 1-2

Наиболее частой формой ожирения у детей является

- А. Смешанная
- Б. Церебрально-спинальная
- В. Экзогенно-конституциональная
- Г. Диенцефально-неврогенная

При констриктивном перикардите на ЭКГ отмечается

- А. Атриовентрикулярная блокада II степени
- Б. Увеличение амплитуды комплексов QRS
- В. Атриовентрикулярная блокада III степени
- Г. Снижение амплитуды комплексов QRS

Лекарственным средством, обладающим антихеликобактерным действием, является

- А. Цетиризин
- Б. Кларитромицин
- В. Метоклопрамид
- Г. Гентамицин

Для акросклеротического варианта системной склеродермии характерно наличие

- А. Эрозивного артрита мелких суставов кистей
- Б. Проксимального полимиозита
- В. Склеродактилии
- Г. Энтезопатий

Средний показатель окружности головы в 6 месяцев составляет (в см)

- А. 39-41
- Б. 36-38
- В. 45-46
- Г. 42-44

Остронефритический синдром является проявлением

- А. Болезни минимальных изменений
- Б. Острого пиелонефрита
- В. Болезни тонких базальных мембран
- Г. Острого постстрептококкового гломерулонефрита

Колбообразное расширение и инфильтрация тканей в области ногтевой фаланги, резкая болезненность при пальпации, гиперемия и гипертермия у ребенка характерны для _____

- А. Кожного
- Б. Костного
- В. Подкожного
- Г. Подногтевого

Наиболее активно снижают риск эрозий от нестероидных противовоспалительных средств (НПВС)

- А. Спазмолитики
- Б. Ингибиторы протонной помпы
- В. Препараты висмута
- Г. Н-2 блокаторы

Первичным элементом сыпи является

- А. Эрозия
- Б. Пятно
- В. Язва
- Г. Чешуйка

Оценку пробы манту с 2 тт пд-л проводят через (в часах)

- А. 48
- Б. 24
- В. 72
- Г. 12

Диффузное ослабление дыхания характерно для

- А. Острой пневмонии
- Б. Острого простого бронхита
- В. Острого ринофарингита
- Г. Приступного периода бронхиальной астмы

Боли опоясывающего характера с иррадиацией в левую половину грудной клетки наблюдают у ребенка с

- А. Хроническим активным гепатитом
- Б. Желчной коликой
- В. Острым холецистохолангитом
- Г. Острым панкреатитом

К симптомам острой сосудистой недостаточности по типу ортостатического коллапса относят

- А. Резкую слабость, бледность, головокружение, тахикардию, нитевидный пульс, снижение АД
- Б. Сопор, тонические судороги, артериальную гипотензию, гипотермию, снижение диуреза
- В. Внезапную потерю сознания, судороги, непроизвольное мочеиспускание
- Г. Отсутствие сознания, цианоз, мышечную гипотонию, асистолию

Субдуральные кровоизлияния чаще других происходят у

- А. Переношенных с внутриутробной гипотрофией
- Б. Доношенных с большой массой тела
- В. Доношенных с внутриутробной гипотрофией
- Г. Доношенных со средними массо-ростовыми показателями

Ребенку, имеющему хронический гастрит в стадии обострения, с физическим развитием, отстающим от возраста, с гармоничным, соответствующим возрасту психическим развитием, перенесшему 3 ОРВИ и парагрипп за год, предшествовавший обследованию, определяют _____ группу здоровья

- А. 1
- Б. 3
- В. 4
- Г. 2

Наиболее частой причиной лактостаза при грудном вскармливании является

- А. Первичная гипогалактия матери
- Б. Кормление по требованию
- В. Смешанное вскармливание ребенка
- Г. Нарушение техники вскармливания

Детям со сниженной массой тела в виде первого основного прикорма в соответствии с национальной программой оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации целесообразно назначать

- А. Мясные блюда промышленного производства
- Б. Овощные пюре домашнего приготовления
- В. Каши домашнего приготовления
- Г. Каши промышленного производства

Ревакцинации бцж подлежат здоровые неинфицированные микобактерией туберкулеза дети в возрасте (в годах)

- А. 14
- Б. 5
- В. 7
- Г. 12

Плазматические клетки, непосредственно синтезирующие антитела, формируются из

- А. Макрофагов
- Б. В-лимфоцитов
- В. Нейтрофилов
- Г. Т-лимфоцитов

Характерным кашлем при коклюше является

- А. Беззвучный
- Б. Битональный
- В. «Лающий»
- Г. Приступообразный с репризами

Артериальная гипертензия на верхних конечностях характерна для

- А. Транспозиции магистральных артерий
- Б. Коарктации аорты
- В. Дефекта аорто-легочной перегородки
- Г. Стеноза легочной артерии

При исследовании функции внешнего дыхания у больного с полисегментарной пневмонией в первую очередь снижается

- А. ОФВ1
- Б. МОС 25-75
- В. Индекс Тиффно
- Г. ЖЁЛ

Для выхаживания маловесных детей наиболее подходит смесь

- А. НАН гипоаллергенный
- Б. Нутрилак соя
- В. Симилак с железом
- Г. Альфаре

При отравлении фосфорорганическими препаратами в качестве антидотной терапии применяется

- А. Димеркапрол
- Б. Метоклопрамид
- В. Атропин
- Г. Тиосульфат натрия

Хирургическая коррекция в плановом порядке показана при

- А. Атрезии легочной артерии
- Б. Дефекте межжелудочковой перегородки
- В. Атрезии трикуспидального клапана
- Г. Болезни Толочинова-Рожде

В основе болезни Гиршпрунга лежит

- А. Токсическая дилатация толстой кишки
- Б. Поражение подслизистого и слизистого слоев кишки
- В. Врожденный аганглиоз участка толстой кишки
- Г. Гипертрофия мышечного слоя кишки

Лица, незаконно занимающиеся медицинской и фармацевтической деятельностью, в соответствии с законодательством Российской Федерации могут привлекаться к _____ ответственности

- А. Материальной
- Б. Процессуальной
- В. Уголовной
- Г. Персональной

Ребенку с гармоничным, соответствующим возрасту физическим и психическим развитием, перенесшему 3 ОРВИ и катаральную ангину за год, предшествовавший обследованию, определяют ____ группу здоровья

- А. 1
- Б. 3
- В. 4
- Г. 2

Для верификации диагноза «острый лейкоз» наиболее достоверно проведение

- А. Общего анализа крови
- Б. Иммунологического анализа крови
- В. Миелограммы
- Г. Биохимического анализа крови

При железодефицитной анемии мясо в рацион ребёнка следует вводить в возрасте не позднее (в месяцах)

- А. 6
- Б. 4
- В. 7
- Г. 8

2 категория

[Вернуться в начало](#)

При ювенильном идиопатическом артрите всегда отмечается:

- А. Поражение мелких суставов
- Б. Наличие кардиальных изменений
- В. Длительное течение артрита
- Г. «Летучесть» суставных болей
- Д. Циклическое течение с полным и быстрым обратным развитием

Препаратами первого выбора для купирования острого приступа удушья при бронхиальной астме являются:

- А. Бета2-адреномиметики короткого действия
- Б. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- В. М-холинолитики
- Г. Метилксантины замедленного высвобождения
- Д. Антибиотики

Для острого постинфекционного нефрита характерно:

- А. Благоприятный прогноз
- Б. Циклическое течение
- В. Гематурия
- Г. Артериальная гипертензия
- Д. Все перечисленное верно

Термин «внебольничная пневмония» отражает:

- А. Выраженность пневмонических изменений на рентгенограмме
- Б. Условия, в которых произошло инфицирование
- В. Тяжесть состояния больного
- Г. Отсутствие необходимости в госпитализации больного
- Д. Необходимость организации лечения в дневном стационаре

Мальчик 6 лет, на приеме у участкового врача-педиатра с жалобами на генерализованные отеки, боли в пояснице, снижение диуреза. Из анамнеза известно, что ребенок месяц назад перенес острый тонзиллит с повышением температуры. Каков наиболее вероятный диагноз?

- А. Мочекаменная болезнь
- Б. Острый гломерулонефрит, острая почечная недостаточность
- В. Острый пиелонефрит
- Г. Острый миокардит, острая левожелудочковая сердечная недостаточность
- Д. Ревматическая лихорадка

Инкубационный период при скарлатине составляет:

- А. Несколько часов
- Б. 1-3 дня
- В. 1-7 дней
- Г. 1-14 дней
- Д. 10-21 день

У матери девочки 15 лет обнаружен рак шейки матки. Мать обратилась к педиатру для разъяснения вопросов профилактики данного заболевания у дочери. Какова наиболее верная тактика врача?

- А. Направить девочку к гинекологу для обследования
- Б. Направить девочку для проведения вакцинации против ВПЧ
- В. Направить девочку на консультацию к инфекционисту
- Г. Успокоить мать, так как это не генетическое заболевание
- Д. Принять решение после результатов УЗИ малого таза

Причиной развития железодефицитной анемии у детей может быть все, кроме:

- А. Синдром мальабсорбции
- Б. Неадекватный рацион питания
- В. Инфекционные заболевания
- Г. Аплазия костного мозга
- Д. Ювенильные маточные кровотечения у девочек

Основная причина высокой концентрации билирубина у новорожденных от матерей, страдающих сахарным диабетом:

- А. Гемолиз эритроцитов
- Б. Запоздывание созревания глюкоронилтрансферазы
- В. Внепеченочная обструкция желчевыводящих путей
- Г. Внутрипеченочная обструкция желчевыводящих путей
- Д. Нарушение захвата билирубина печеночной клеткой

Дополнительными критериями биологической зрелости здорового доношенного новорожденного ребенка (40 недель гестации) являются следующие особенности придатков кожи:

- А. Ногти не достают дистальных окончаний последней фаланги
- Б. Пушковые волосы (lanugo) выражены только на половине площади спины
- В. На фоне сохраняющегося пушкового оволосения (lanugo) появляются участки, лишенные пушка
- Г. Наличие бледно-желтых точек, выступающих над уровнем кожи в области носа (milla)
- Д. Пушковые волосы (lanugo) выражены на всей площади спины

Причина кровоточивости при гемофилии?

- А. Тромбоцитопения
- Б. Тромбоцитопатия
- В. Нарушение проницаемости сосудистой стенки
- Г. Дефицит факторов свертывающей системы
- Д. Активация противосвертывающей системы

Ребенок 8 месяцев. Отмечаются распространенные костные деформации (увеличение теменных и затылочных бугров, расширение нижней апертуры грудной клетки, «четки» на ребрах), мышечная гипотония. В биохимическом анализе крови - повышение уровня щелочной фосфатазы и снижение уровня кальция и фосфора. Какое заболевание необходимо заподозрить в первую очередь?

- А. Рахит в стадии разгара
- Б. Рахит в периоде реконвалесценции
- В. Дисплазия соединительной ткани
- Г. Гипервитаминоз Д
- Д. Несовершенный остеогенез

Ребенку 4 месяца. Родился от 1-х родов в 35 лет, роды затяжные. Оценка по шкале Апгар 5/6 баллов. В течение первых дней состояние тяжелое, за счет неврологической симптоматики. Выписан домой на 19-й день жизни. В последующем регулярного врачебного наблюдения не было. Что из перечисленного ниже, обнаруженного при осмотре, соответствует возрастной норме?

- А. Самостоятельно не садится
- Б. Гипертонус мышц рук и ног
- В. Тенденция к перекресту ног
- Г. Наличие ладонно-ротового рефлекса
- Д. Наличие хватательного рефлекса

В первую очередь в диагностических целях при тромбоцитопенической пурпуре необходимо выполнить:

- А. Коагулограмму
- Б. Клинический анализ крови с определением количества тромбоцитов
- В. Исследование уровня протромбина
- Г. Биохимическое исследование крови
- Д. Иммунограмму

Для диагностики воспалительного заболевания кишечника целесообразно исследовать:

- А. Уровень панкреатической эластазы в кале
- Б. Уровень кальпротектина в кале
- В. Антитела к трансклутаминазе в сыворотке крови
- Г. Уровень хлоридов пота
- Д. Уровень альфа1-антитрипсина в кале

Для нефротического синдрома характерны:

- А. Значительная протеинурия, гипоальбуминемия, гипопроteinемия
- Б. Гиполипидемия, гипохолестеринемия
- В. Артериальная гипертензия, гипертоническая энцефалопатия
- Г. Гипофибриногенемия, тромбоцитопатия
- Д. Гематурия, лейкоцитурия

Второй дородовой патронаж проводится:

- А. После поступления сведений о постановке беременной на учет
- Б. Участковой медицинской сестрой на 8 - 13 неделе беременности
- В. Участковой медицинской сестрой на 31 - 32 неделе беременности
- Г. Участковой медицинской сестрой после 36 недель беременности
- Д. Участковым педиатром при неблагополучном акушерском анамнезе

К местным глюкокортикостероидам, применяемым для наружной терапии atopического дерматита у детей, относится:

- А. Пиритион цинка
- Б. Мометазон
- В. Пимекролимус
- Г. Такролимус
- Д. Декспантенол

Каким нормативным документом гарантируется Право граждан РФ на охрану здоровья:

- А. Трудовым кодексом
- Б. Конституцией РФ
- В. Гражданским кодексом
- Г. Основами законодательства об охране здоровья граждан

Какие причины уменьшения частоты обструктивного бронхита с возрастом ребенка:

- А. Увеличение силы дыхательной мускулатуры
- Б. Снижение частоты респираторной аллергии
- В. Увеличение просвета бронхов
- Г. Иммунитет к респираторным вирусам
- Д. Увеличение содержания Т-лимфоцитов в сыворотке крови

Ребенок 7 месяцев. Родился на 38-39 неделе беременности. Вскармливается кефиром и коровьим молоком, прикорма не получает. Часто болеет. При диспансерном наблюдении выявлена бледность кожи и слизистых. В анализе крови Нв 92 г/л, эр. $4,1 \times 10^{12}/л$, MCV 0,67, лейкоциты $9,0 \times 10^9/л$, нейтрофилы 48%, тромбоциты $225 \times 10^9/л$. Какая анемия наиболее вероятна в данном случае?

- А. Железодефицитная
- Б. Наследственная гемолитическая
- В. Врожденная апластическая
- Г. Поздняя анемия недоношенных
- Д. В12 и фолиево-дефицитная

Для лабораторной верификации целиакии назначают:

- А. Анализ мочи на суточную экскрецию оксалатов
- Б. Исследование длительности кровотечения и свертываемости крови
- В. Исследование белковых фракций сыворотки и уровня трансаминаз
- Г. Исследование антител к тканевой трансглутаминазе
- Д. Определение хлоридов пота

Фототерапия применяется для лечения:

- А. Гипербилирубинемии новорожденного
- Б. Инфекционных заболеваний кожи
- В. Фетального гепатита
- Г. Атрезии желчных путей
- Д. Гиповитаминоза Д

Состояние, являющееся противопоказанием к кормлению грудью со стороны матери:

- А. Острая респираторная вирусная инфекция
- Б. Гепатит А
- В. Инсулинозависимый сахарный диабет
- Г. Аутоиммунный тиреоидит
- Д. Открытая форма туберкулеза

В каких случаях следует прекратить грудное вскармливание ребенка:

- 1. Гнойный мастит у матери**
- 2. Мастит новорожденных у ребенка**
- 3. Распространенный атопический дерматит у ребенка**
- 4. Везикулопустулез у ребенка**
- 5. Низкая прибавка в весе у ребенка**

А. 1

Б. 1,3

В. 1,3,4

Г. 1,3,5

Д. 1,2,3,4,5

Причиной артериальной гипертензии в детском возрасте наиболее часто является:

А. Эссенциальная артериальная гипертония

Б. Заболевания почек

В. Заболевания центральной нервной системы

Г. Сахарный диабет

В каких случаях у ребенка следует исключать иммунодефицит:

1. Упорный кандидоз слизистых, микоз кожи и ногтей

2. Частые острые респираторные заболевания

3. Пневмоцистная пневмония

4. Генерализованный БЦЖ-ит или БЦЖ-остеит

5. Вакциноассоциированный полиомиелит

А. 1,2,3,4,5

Б. 1,3,4,5

В. 1,2,3,4

Г. 3,4,5

Суточное мониторирование артериального давления позволяет:

А. Исключить гипертензию «белого халата»

Б. Оценить тяжесть артериальной гипертензии

В. Оценить длительность артериальной гипертензии в течение суток

Г. Оценить эффективность терапии

Д. все перечисленное верно

На прием к педиатру обратилась мать с ребенком 3-х лет, у которого 2 дня назад был контакт в детском дошкольном учреждении по ветряной оспе. Каковы должны быть действия врача?

- А. Осмотреть ребенка, оформить карантин с 11 дня от контакта
- Б. Предложить экстренную вакцинацию
- В. Ввести иммуноглобулин
- Г. Осмотреть ребенка и оформить карантин сразу
- Д. Назначить противовирусное лечение

В декабре 2021 г были внесены изменения в Национальный календарь профилактических прививок (приказ МЗ 1122н). Какие изменения появились в данном приказе?

- А. Включена вакцинация против пневмококковой инфекции
- Б. Включена вакцинация против менингококковой инфекции
- В. Включена вакцинация против ветряной оспы
- Г. Изменена схема вакцинации против коклюша
- Д. Изменены сроки введения и виды вакцин против полиомиелита

Родители 6-месячного ребенка обеспокоены быстрым увеличением его головы, так как шапочки, купленные заранее, оказались ему малы. Измерения, проведенные патронажной сестрой, показали, что окружность головки ребенка равна 43 см, грудной клетки - 44 см. Оцените параметры.

- А. Пропорциональны и соответствуют возрасту ребенка
- Б. Увеличены оба параметра
- В. Чрезмерно велики размеры головки
- Г. Чрезмерно велика окружность грудной клетки
- Д. Оба параметра ниже возрастных норм

Небулайзер применяется для ингаляционного введения:

- 1. Глюкокортикостероидов**
- 2. Фитопрепаратов**
- 3. Бронходилататоров**
- 4. Аминофиллина**
- 5. Раствора NaHCO₃**

- А. 1,2,3,4,5
- Б. 1,3
- В. 1,2,3,5
- Г. 2,4,5
- Д. 2,5

У ребенка 1,5 лет диагностирована острая респираторная вирусная инфекция в форме острого назофарингита. Какое лечение показано этому пациенту:

- А. Антибактериальная терапия амоксициллином
- Б. Жаропонижающие средства, туалет носа, деконгестанты
- В. Жаропонижающие средства, муколитики, туалет носа
- Г. Жаропонижающие средства, туалет носа, деконгестанты, бронходилататоры, муколитики
- Д. Жаропонижающие средства, туалет носа, деконгестанты, антигистаминные препараты

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие этиологического фактора болезни:

- 1. *Streptococcus pneumoniae*
- 2. *Streptococcus pyogenes*
- 3. *Pseudomonas aeruginosa*
- 4. *Mycoplasma pneumoniae*
- 5. *Klebsiella pneumoniae*
- А. Внебольничная пневмония
- Б. Внутрибольничная пневмония
- А. 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А
- Б. 1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5А
- В. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5Б

У ребенка 6 месяцев в течение недели нарастает приступообразный кашель с репризами, иногда после приступа кашля возникает рвота. Лихорадки нет. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Обструктивный бронхит
- Б. Обструктивный ларинготрахеит
- В. Коклюш
- Г. Эпиглоттит
- Д. Острый РС-вирусный бронхиолит

У ребенка 10 месяцев на фоне острого респираторного заболевания повышение температуры тела до 39,8*С. Кожа горячая, влажная на ощупь, на щеках эритема, конечности теплые. Какой препарат выбора для купирования лихорадки в данном случае:

- А. Парацетамол перорально или ректально
- Б. Метамизол натрия внутримышечно
- В. Метамизол натрия в сочетании с хлоропирамином и дротаверином внутримышечно
- Г. Нимесулид перорально
- Д. Парацетамол внутривенно капельно

При гипербилирубинемии у доношенного новорожденного возможно развитие ядерной желтухи, если уровень непрямого билирубина повысился:

- А. Выше 56 мкмоль/л
- Б. Выше 100 мкмоль/л
- В. Выше 150 мкмоль/л
- Г. Выше 250 мкмоль/л
- Д. Выше 340 мкмоль/л

К признакам гемолитической болезни новорожденных не относится:

- А. Желтуха
- Б. Анемия
- В. Геморрагическая сыпь
- Г. Ретикулоцитоз
- Д. Повышение уровня непрямого билирубина

Физическое развитие у детей в возрасте до 1 года должно быть оценено:

- А. 1 раз в год
- Б. 1 раз в полгода
- В. 1 раз в квартал
- Г. 1 раз в месяц
- Д. 1 раз в 10 дней

Антибиотик выбора для лечения стрептококкового тонзиллита:

- А. Азитромицин
- Б. Цефтриаксон
- В. Ванкомицин
- Г. Амикацин
- Д. Амоксициллин

Для аллергического конъюнктивита у детей характерно все, кроме:

- А. Жжения в глазах
- Б. Зуда
- В. Слезотечения
- Г. Кровоизлияния в склеру
- Д. Отека век и параорбитальных тканей

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Укажите препарат выбора для лечения острого заболевания:

1. Внебольничная пневмония
2. Бронхиолит
3. Острый обструктивный бронхит
4. Обструктивный ларинготрахеит
5. Стрептококковый тонзиллит

А. Антибиотики

Б. Бронходилататоры

В. Будесонид в ингаляциях

Г. Иммуномодуляторы

А. 1А, 2В, 3Б, 4Б, 5А

Б. 1В, 2В, 3Б, 4В, 5А

В. 1А, 2Б, 3Б, 4В, 5А

Для железодефицитной анемии характерны:

1. Низкий уровень железа в сыворотке крови
2. Низкий уровень ферритина в сыворотке крови
3. Высокий уровень ферритина в сыворотке крови
4. Низкий уровень трансферрина в сыворотке крови
5. Высокий уровень трансферрина в сыворотке крови

А. 1,2,4

Б. 1,3,5

В. 1,2,5

Г. 2,4

Д. 3,5

Выберите препараты, которые могут быть назначены для лечения атипичной пневмонии у ребенка:

1. Амоксициллин
2. Амоксициллин-клавуланат
3. Кларитромицин
4. Цефотаксим
5. Ципрофлоксацин

А. 1,2,3

Б. 1,2,4

В. 3

Г. 3,4,5

Возможные осложнения при остром стрептококковом тонзиллите /ангине/:

- 1. Острый гломерулонефрит**
- 2. Менингоэнцефалит**
- 3. Паратонзиллярный абсцесс**
- 4. Гепатит**
- 5. Ревматическая лихорадка**

А. 1,3,5

Б. 1,2,3,5

В. 2,4

Г. 1,5

Д. 1,2,3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. К какой группе антимикробных средств относятся перечисленные лекарственные препараты:

1. Амикацин

2. Цефепим

3. Ванкомицин

4. Кларитромицин

5. Меропенем

А. Цефалоспорины

Б. Карбапенемы

В. Макролиды

Г. Аминогликозиды

Д. Гликопептиды

А. 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б

Б. 1Г, 2Б, 3Д, 4В, 5Б

В. 1Д, 2А, 3Д, 4В, 5Б

Плевриты, возникающие одновременно с пневмонией, называются:

А. Синпневмоническими

Б. Метапневмоническими

В. Аллергическими

Г. Серозными

Д. Эксудативными

Первый прикорм здоровым детям, находящимся на естественном вскармливании, дают в возрасте не ранее:

А. 2-3 месяцев

Б. 3-4 месяцев

В. 5-6 месяцев

Г. 7-8 месяцев

Д. 8-9 месяцев

Для синдрома острой почечной недостаточности (стадия олигоанурии) характерны:

- 1. Ацидоз**
- 2. Азотемия**
- 3. Гиперкалиемия**
- 4. Гипопротеинемия**
- 5. Гипогликемия**

А. 1,2,3,4,5

Б. 1,2,3,4

В. 1,2,3

Г. 1,2,4

Ребенок 10 месяцев на приеме у педиатра. Отмечается повышение температуры, интоксикация, прорезываются зубы. В крови - лейкоцитоз, высокая СОЭ, в моче - лейкоцитурия, бактериурия. Какой предположительный диагноз?

А. Острый пиелонефрит

Б. Острый гломерулонефрит

В. Острый цистит

Г. Синдром прорезывания зубов

У детей раннего возраста наиболее часто встречается:

А. Лекарственная аллергия

Б. Пищевая аллергия

В. Пыльцевая аллергия

Г. Бытовая аллергия

Д. Контактный аллергический дерматит

Физиологическая роль бурой жировой ткани у новорожденных и детей первых месяцев жизни:

А. Обеспечивает хороший тургор тканей

Б. Обеспечивает теплопродукцию (несократительный термогенез)

В. Хорошее развитие бурой жировой ткани в брюшной полости и забрюшинном пространстве препятствует легкой смещаемости внутренних органов

Г. Активное участие в энергетическом обмене

Д. Обеспечивает теплоотдачу

Основной причиной развития болезней накопления являются:

А. Врожденные энзимопатии

Б. Хроническое бактериальное воспаление

В. Вирусные инфекции

Г. Приобретенные энзимопатии

Д. Онкологические заболевания

Везикулезный характер сыпи характерен для:

- А. Скарлатины
- Б. Парвовирусной инфекции
- В. Ветряной оспы
- Г. Крапивницы
- Д. Инфекционного мононуклеоза

Выберите препараты, которые могут быть назначены для стартового лечения острого пиелонефрита у ребенка:

- 1. Амоксициллин
 - 2. Амоксициллин-клавуланат
 - 3. Кларитромицин
 - 4. Цефуроксим
 - 5. Цефотаксим
- А. 1,2,4,5
Б. 2,4,5
В. 1,2,5

Для острого гломерулонефрита характерно:

- А. Олигурия, отеки на лице, повышение артериального давления
- Б. Олигурия, увеличение печени и селезенки
- В. Повышение артериального давления на руках, снижение артериального давления на ногах
- Г. Артралгии, петехиальные высыпания на коже
- Д. Макрогематурия

Начинать выведение ребенка 8 лет из приступа пароксизмальной тахикардии при артериальном давлении 90/60 мм рт. ст. целесообразно с применения:

- А. Адреналина внутривенно
- Б. Дигоксина внутримышечно
- В. Верапамила внутривенно
- Г. Вагальных проб
- Д. АТФ внутривенно

Ребенок в возрасте 11 месяцев должен быть вакцинирован от:

- 1. Кори
 - 2. Дифтерии
 - 3. Гепатита В
 - 4. Пневмококковых инфекций
 - 5. Паротита
- А. 1,2,3,5
Б. 2,3,4
В. 2,3,4,5

На консультацию к невропатологу направлен мальчик семи лет с остро развившейся мышечной слабостью и нарушением походки. Невропатолог обнаружил у ребенка признаки дистрофии, параорбитальный отек и эритему, гнусавый оттенок голоса, поперхивание, отек и уплотнение мышц плечевого пояса и бедер. Мальчик не мог поднять руки, сесть из положения лежа, выполнить приседание. Симптомы поражения центральной и периферической нервной системы не выявлены. Врач предположил:

- А. Системную красную волчанку
- Б. Системную склеродермию
- В. Гранулематоз Вегенера
- Г. Дерматомиозит
- Д. Смешанное заболевание соединительной ткани

Показанием для назначения кислородотерапии у ребенка является:

- А. Уровень $SpO_2 < 98\%$
- Б. Уровень $SpO_2 < 95\%$
- В. Уровень $SpO_2 < 90\%$
- Г. Уровень $SpO_2 < 88\%$
- Д. Уровень $SpO_2 < 85\%$

Ребенок 3-х месяцев не был привит в роддоме и в настоящее время мать планирует начать вакцинацию. Выберите наиболее верную тактику врача.

- А. Сделать реакцию Манту, затем БЦЖ-м, затем АКДС
- Б. Сделать одновременно все необходимые прививки
- В. Привить сначала от туберкулеза, через месяц другие прививки
- Г. Перед принятием решения обследовать ребенка
- Д. Оформить медотвод до 6 месяцев

К симптомам нарушения функции канальцев не относится:

- А. Снижение концентрационной функции почек
- Б. Аминоацидурия
- В. Глюкозурия
- Г. Гипергликемия
- Д. Метаболический ацидоз

Вызов участкового педиатра к ребенку 3-х месяцев. Болен второй день, повышение температуры до $38,7^{\circ}C$, снижение аппетита, мутная моча с неприятным запахом. Тактика участкового врача:

- А. Госпитализация в стационар
- Б. Назначение антибиотиков, антигистаминных и жаропонижающих
- В. Назначение анализов крови и мочи, УЗИ почек и мочевыводящих путей
- Г. Назначение парацетамола, повторный осмотр на следующий день

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между показателями психомоторного развития и возрастом ребенка :

1. Узнает мать, поворачивает голову на звук, направленные движения ручек, переворачивается со спины на живот
2. Следит за человеком, движущимися предметами, поворачивает голову, начинает улыбаться
3. Самостоятельно сидит, произносит 8-10 осмысленных слов, сам берет чашку и пьет
4. Знает свое имя, шагает при поддержке за обе руки, находит и достает предмет из множества игрушек
5. Ползает, легко садится, подолгу лепечет, пьет из чашки, которую держит взрослый

- А. 1 месяц
- Б. 4 месяца
- В. 7 месяцев
- Г. 9 месяцев
- Д. 12 месяцев

- А. 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В
- Б. 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В
- В. 1А, 2Б, 3Д, 4Г, 5В

Для хронического гастрита ассоциированного с хеликобактером пилорическим (НР+) характерно:

- А. Локализация процесса в теле желудка
- Б. Эрозивный антральный гастрит
- В. Наличие в крови антител к париетальным клеткам желудка
- Г. В12-дефицитная анемия
- Д. Базальная секреция – РН выше 2,5

Лямблии паразитируют:

- А. В печеночных протоках
- Б. В желчном пузыре
- В. В проксимальных отделах тонкой кишки
- Г. В толстой кишке
- Д. В желудке

В комплекс лечебных мероприятий при укусах ядовитых змей не входит:

- А. Введение поливалентной противозмеиной сыворотки
- Б. Отсасывание яда из ранки
- В. Наложение жгута на конечность выше укуса
- Г. Иммобилизация конечности
- Д. Наложение стерильной повязки на место укуса

Девочка, 4 года. Из анамнеза: болеет более недели, когда повысилась температура до 39 С, получала ибупрофен, обильное питье. Накануне появилась инъектированность склер и сыпь, мама вызвала педиатра на дом. При осмотре: температура 39С, склеры инъектированы, губы сухие в трещинах, «земляничный» язык, слизистая ротовой полости и глотки гиперемирована, миндалины без налетов, кожа на кистях и стопах плотная, отечна, ладони и подошвы гиперемированы, на коже туловища и конечностей полиморфная сыпь без везикул. В легких дыхание пуэрильное, проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются, тоны сердца приглушены. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Стул и диурез со слов мамы не нарушены. Каков наиболее вероятный диагноз врача-педиатра участкового?

- А. Скарлатина
- Б. Краснуха
- В. Инфекционный мононуклеоз
- Г. Синдром Кавасаки
- Д. Геморрагический васкулит

Укажите наиболее частую причину водянистой инфекционной диареи:

- А. Шигеллы
- Б. Сальмонеллы
- В. Кампилобактер
- Г. Ротавирусы
- Д. Токсины клостридий

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между характером сыпи и заболеванием:

1. Мелкопятнистая сыпь на неизмененном фоне кожи
2. Геморрагическая «звездчатая» сыпь
3. Везикулярная сыпь с явлениями «ложного» полиморфизма
4. Пятнистопапулезная сыпь на неизмененном фоне кожи
5. Мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне кожи

- А. Корь
- Б. Краснуха
- В. Скарлатина
- Г. Ветряная оспа
- Д. Менингококцемия

- А. 1Б, 2Д, 3Г, 4А, 5В
- Б. 1А, 2Д, 3Г, 4Б, 5В
- В. 1Б, 2Д, 3Г, 4В, 5А

При полной атриовентрикулярной блокаде желудочки сокращаются:

- А. Чаше, чем предсердия
- Б. Реже, чем предсердия

Укажите биохимический маркер холестаза:

- А. Повышение уровня трансаминаз в сыворотке крови
- Б. Повышение уровня гаммаглутаминтрансферазы в сыворотке крови
- В. Гипоальбуминемия
- Г. Снижение уровня протромбина в плазме крови
- Д. Снижение уровня холестерина в сыворотке крови

К какому возрасту должно сформироваться полное управление мочеиспусканием в течении суток:

- А. К 1 году
- Б. К 2 годам
- В. К 3 годам
- Г. К 4 годам
- Д. К 5 годам

Для оценки эффективности диспансерного наблюдения за детьми используются следующие показатели:

- А. Показатель частоты обострений
- Б. Число случаев и дней временной нетрудоспособности

Абсолютное противопоказание к вскармливанию грудным молоком со стороны ребенка:

- А. Гемолитическая болезнь новорожденных
- Б. Галактоземия
- В. Внутривentricularное кровоизлияние
- Г. Недоношенность
- Д. Пороки челюстно-лицевой области

Критериями контроля над симптомами бронхиальной астмы относятся все ниже перечисленные, кроме

- А. Наличие ночных приступов удушья
- Б. Отсутствие дневных симптомов или менее 2 эпизодов удушья в неделю
- В. Отсутствие изменений на рентгенограмме легких
- Г. Переносимость физической нагрузки
- Д. Применение препаратов для неотложной помощи более 2 раз в неделю

Ревматическая хорея проявляется:

- А. Монопарезом
- Б. Спастическими параличами
- В. Фокальными судорогами
- Г. Гиперкинезами
- Д. «Писчим спазмом»

Пикфлоуметр - это:

- А. Прибор для мониторингирования частоты сердечных сокращений
- Б. Прибор для проведения ингаляций
- В. Прибор для определения газового состава крови
- Г. Прибор для определения пиковой скорости выдоха
- Д. Прибор для измерения насыщения крови кислородом

Для коклюша у детей характерны:

1. Грубый лающий кашель
2. Приступообразный кашель с репризами
3. Кашель до рвоты
4. Дистанционные хрипы при дыхании
5. Сухие свистящие хрипы на выдохе

- А. 1,2,3
- Б. 1,4,5
- В. 2,3
- Г. 4,5
- Д. 2,3,5

В этиологии внебольничной пневмонии у детей ведущее значение имеет:

- А. Пневмококк
- Б. Пиогенный стрептококк
- В. Протей
- Г. Клебсиелла
- Д. Бордетелла

В качестве первого прикорма в рацион здорового ребенка вводят:

- А. Овощное пюре или кашу
- Б. Кефир
- В. Творог
- Г. Фруктовое пюре
- Д. Желток куриного яйца

К внелегочным осложнениям пневмонии относят:

- А. Плеврит
- Б. Легочную деструкцию
- В. Пневмоторакс
- Г. Инфекционно-токсический шок
- Д. Эмпиему плевры

Какая частота сердечных сокращений в покое свидетельствует о брадикардии у детей 7-9 лет:

- А. Менее 120 ударов в минуту
- Б. Менее 100 ударов в минуту
- В. Менее 80 ударов в минуту
- Г. Менее 60 ударов в минуту
- Д. Менее 40 ударов в минуту

Укажите антигистаминные препараты 2 поколения:

- 1. Хлоропирамин
- 2. Цетиризин
- 3. Дифенгидрамин
- 4. Клемастин
- 5. Дезоратадин

- А. 1,3,4
- Б. 1,2,3,4
- В. 2,5
- Г. 2,4,5
- Д. 2,3,4

Ребенок в возрасте 8-ми месяцев с проявлениями атопического дерматита болен острым респираторным заболеванием. На 3-й день болезни появились грубый лающий кашель, общее беспокойство, одышка с втяжением уступчивых мест грудной клетки на вдохе, шумное дыхание, осиплость голоса. Появившиеся симптомы наиболее вероятно свидетельствуют о:

- А. Стенозирующем ларинготрахеите
- Б. Коклюше
- В. Аспирации инородного тела
- Г. Пневмонии
- Д. Неосложненном течении острого респираторного заболевания

К лекарственным препаратам, используемым для достижения контроля бронхиальной астмы, относятся:

- 1. β 2-агонисты короткого действия
- 2. Иммуномодуляторы
- 3. Ингаляционные холинолитики
- 4. Ингаляционные глюкокортикостероиды в комбинации с бронходилататорами длительного действия
- 5. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов

- А. 1,2,3
- Б. 2,4,5
- В. 4,5
- Г. 1,3,4,5
- Д. 3,4,5

У ребенка 6 месяцев жалобы на рвоту, отказ от еды, стул в виде "малинового желе". Каков наиболее вероятный диагноз:

- А. Острый вирусный гастроэнтерит
- Б. Дизентерия
- В. Сальмонеллез
- Г. Кишечная инвагинация
- Д. Острый аппендицит

Ваша тактика при выявлении лактазной недостаточности у ребёнка, находящегося на искусственном вскармливании:

- А. Перевод на вскармливание козьим молоком
- Б. Перевод на низко- и безлактозные смеси
- В. Использование адаптированных молочных смесей
- Г. Перевод на смесь на основе гидролизата белка коровьего молока
- Д. Использование казеиновых формул

Укажите симптомы, которые встречаются при синдроме Кавасаки у детей:

- 1. Лихорадка более 5 дней
 - 2. Склерит
 - 3. Полиморфная сыпь
 - 4. Артериальная гипертензия
 - 5. Боль в горле
- А. 1,2,4,5
 - Б. 1,3,5
 - В. 1,2,3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеваниями и их симптомами:

- 1. Полиморфная сыпь
 - 2. Выраженное затруднение носового дыхания
 - 3. Наложения на миндалинах
 - 4. Склерит
 - 5. Тромбоцитоз
 - 6. Наличие широкоплазменных лимфоцитов
- А. Синдром Кавасаки
 - Б. Инфекционный мононуклеоз
- А. 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А, 6Б
 - Б. 1Б, 2Б, 3А, 4А, 5Б, 6Б
 - В. 1Б, 2А, 3А, 4Б, 5Б, 6А

У ребенка 2-х лет, посещающего ДДУ, катаральные симптомы в виде насморка, кашля влажного и температуры 37,5 в течение 2-х дней. Какова наиболее верная тактика педиатра?

- А. Назначить противовирусное лечение
- Б. Назначить антибактериальное лечение
- В. Назначить симптоматическое лечение
- Г. Перед назначением лечения, направить на обследование
- Д. Не назначать лечения для выработки иммунитета

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеваниями суставов и их основными проявлениями:

1. Связь с инфекцией по времени (через 1 –4 недели)
2. Поражение мелких суставов кистей и стоп
3. Преимущественное поражение средних и крупных суставов нижних конечностей
4. Асимметричность поражения
5. Симметричность поражения
6. Деструкция хряща в суставе
7. Вовлечение в процесс новых суставов

- А. Реактивный артрит
- Б. Ювенильный ревматоидный артрит

А. 1Б, 2А, 3Б, 4Б, 5А, 6А, 7А

Б. 1А, 2Б, 3А, 4А, 5Б, 6Б, 7Б

В. 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6Б, 7Б

Для лечения острого вирусного бронхолита следует использовать:

1. Кислородотерапию
2. Бронходилататоры
3. Будесонид
4. Антибиотики
5. Муколитики

А. 2,3,4

Б. 1,2,3

В. 1,2

Г. 1,2,3,4,5

Дисахаридазная недостаточность чаще всего проявляется:

- А. В первые месяцы жизни
- Б. В первые три года жизни
- В. В дошкольном возрасте
- Г. В школьном возрасте
- Д. В подростковом периоде

У девочки 9 лет седьмые сутки фебрильной лихорадки; резко затруднено носовое дыхание, отделяемого из носовых ходов нет; боль в горле при глотании; на небных миндалинах обширные белые наложения; увеличены шейные лимфоузлы; увеличены печень и селезенка. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Стрептококковый тонзиллит
- Б. Острый бактериальный риносинусит
- В. Инфекционный мононуклеоз
- Г. Вирусный гепатит А
- Д. Аденовирусная инфекция

Хроническая дыхательная недостаточность I степени клинически определяется наличием:

- А. Одышки при физической нагрузке
- Б. Одышки в покое
- В. Втяжения межреберных промежутков, эпигастральной области;
- Г. Раздувания крыльев носа
- Д. Бронхообструктивного синдрома

При гипергликемии (глюкоза > 15 ммоль/л) показано в/в струйное введение инсулина короткого действия в дозе:

- А. 0,1 Ед/кг
- Б. 1,0 Ед/кг
- В. 0,5 Ед/кг
- Г. 0,75 Ед/кг

Для решения вопроса о проведении заменного переливания крови при ГБН в первые двое суток жизни ориентируются в первую очередь на:

- А. Абсолютные цифры билирубина в пуповинной крови
- Б. Уровень билирубина в периферической крови
- В. Почасовой прирост билирубина
- Г. Появление желтухи в первые часы жизни
- Д. Тяжелая анемия с рождения

При каком заболевании госпитализация является обязательной:

- А. Корь
- Б. Ангина
- В. Коклюш у ребенка первых 6 месяцев жизни
- Г. Ветряная оспа
- Д. Острое респираторное заболевание

Препарат выбора для лечения обструктивного ларинготрахеита со стенозом гортани 1 степени:

- А. Сальбутамол в ингаляциях
- Б. Фенотерол + ипратропия бромид в ингаляциях
- В. Будесонид в низкой дозе в ингаляциях
- Г. Будесонид в высокой дозе в ингаляциях
- Д. Дексаметазон в ингаляциях

Появление артериальной гипертензии у ребенка с вторичным пиелонефритом на фоне пузырно-мочеточникового рефлюкса является признаком:

- А. Присоединения гломерулонефрита
- Б. Развития септических осложнений
- В. Сморщивания почки
- Г. Обострения пиелонефрита
- Д. Присоединения эссенциальной гипертензии

Мальчик, 13 лет. Наблюдается с рождения с вторичным пиелонефритом на фоне пузырно-мочеточникового рефлюкса III степени справа, I степени слева. В течение последних трех месяцев цифры АД до 140/85. О чем может свидетельствовать артериальная гипертензия у ребенка?

- А. Присоединении гломерулонефрита
- Б. Развитии септических осложнений
- В. Сморщивании почки
- Г. Обострении пиелонефрита
- Д. Присоединении эссенциальной гипертензии

Какая форма бронхиальной астмы у детей встречается наиболее часто:

- А. Атопическая
- Б. Неатопическая
- В. Астма физического усилия
- Г. Аспириновая астма
- Д. Бронхит с астматическим компонентом

Ребенок 6 лет, госпитализирован в стационар в связи с обострением бронхиальной астмы с сухим приступообразным кашлем, экспираторной одышкой, в легких выслушиваются сухие свистящие хрипы с обеих сторон, SpO₂ 90%, ЧД 36 в минуту, ЧСС 115 в минуту. Какая неотложная помощь должна быть прежде всего оказана в приемном отделении?

- А. Будесонид 500 мг в ингаляции через небулайзер
- Б. Кислород, сальбутамол 2,5 мг в ингаляции через небулайзер, будесонид 500 мг в ингаляции через небулайзер
- В. Аминофиллин 5 мг/кг внутривенно болюсно
- Г. Преднизолон 2-3 мг/кг внутривенно или внутримышечно
- Д. Сальбутамол 2,5 мг в ингаляции через небулайзер

Для синдрома цитолиза характерно:

- А. Повышение уровня АЛТ, АСТ в сыворотке крови
- Б. Гиперхолестеринемия
- В. Гипербилирубинемия
- Г. Гипопротеинемия
- Д. Гипергаммаглобулинемия

На дому участковым врачом-педиатром осмотрена девочка 5-ти месяцев. Со слов матери, ребенок болен первые сутки, температура повысилась до 38,7 С (принимали нурофен). При осмотре: выраженное беспокойство в том числе и при кормлении, затруднение дыхания через нос, трагус симптом положительный. По остальным органам без патологии, стул и диурез не нарушены. Каков наиболее вероятный диагноз?

- А. О.стоматит
- Б. О. ринит
- В. О.отит
- Г. О.ринофарингит

Для ювенильного ревматоидного артрита не характерно:

- А. Поражение мелких суставов
- Б. «Летучесть» болей
- В. Длительное течение артрита
- Г. Утренняя скованность суставов
- Д. Наличие в крови ревматоидного фактора

Назовите один признак, наиболее характерный для синдрома поражения перикарда:

- А. Локальный гипергидроз, холодные, цианотичные конечности
- Б. Набухание вен шеи, кистей рук, кубитальных вен
- В. Ригидный пульс
- Г. Эпигастральная пульсация сверху-вниз
- Д. Артериальное давление на ногах равно давлению на руках

Гемолитическая болезнь новорожденного может быть обусловлена:

- А. Внутриутробной инфекцией
- Б. Иммунологическим конфликтом
- В. Гемоглобинопатией
- Г. Нарушением конъюгации билирубина
- Д. Функциональной незрелостью печени

Наиболее достоверным методом диагностики хронического гепатита является:

- А. Клинико-биохимический
- Б. Вирусологический
- В. Иммунологический
- Г. Морфологический
- Д. Все вышеперчисленные

При сенсibilизации к пыльце березы имеется перекрестная аллергическая реакция на:

- 1. Яблоки
- 2. Орехи
- 3. Морковь
- 4. Злаки
- 5. Креветки

- А. 1,2,3,4
- Б. 1,2,3
- В. 4
- Г. 1,2
- Д. 4,5

Наиболее частые побочные действия глюкокортикостероидных препаратов:

- А. Нарушения сердечного ритма и проводимости
- Б. Нарушения сердечного ритма, проводимости, лейкопения
- В. Прибавка массы тела, стрии, повышение артериального давления, эрозивный гастрит, остеопороз
- Г. Сонливость, диарея, дизурические явления

Укажите первичный элемент кожных высыпаний при крапивнице:

- А. Пятна
- Б. Папулы
- В. Везикулы
- Г. Волдыри
- Д. Пулсулы

Для нефротического синдрома при гломерулонефрите у детей характерно:

- А. Массивная протеинурия и гипоальбуминемия
- Б. Гиполипидемия и артериальная гипертензия
- В. Массивные отёки и гипопротромбинемия
- Г. Гипофибриногенемия
- Д. Гипернатриемия

Нефритический синдром характерен для следующих болезней:

- А. Синдром Альпорта
- Б. Геморрагический васкулит
- В. Болезнь тонких базальных мембран
- Г. IgA-нефропатия
- Д. Все перечисленное верно

Сепсис новорожденного чаще всего вызывают

- А. Вирусы
- Б. Бактерии
- В. Простейшие
- Г. Вирусно-бактериальные ассоциации
- Д. Грибы

Участковый педиатр вызван на дом к девочке 10 дней жизни. При осмотре ребенка: молочные железы увеличены в размерах, припухлость в области левой молочной железы выражена больше, кожа над ней гиперемирована, горячая, болезненная при прикосновении. Какова тактика врача-педиатра:

- А. Наблюдение в динамике, согревающие компрессы на молочную железу
- Б. Консультация хирурга, назначение антибактериальной терапии
- В. Данное состояние является физиологическим и не требует дополнительных назначений
- Г. Сдавливающие повязки на молочные железы, повторный осмотр через 2-3 дня

Причиной гипоксемии может являться:

- 1. Пневмония
 - 2. Тромбоэмболия легочной артерии
 - 3. Метгемоглобинемия
 - 4. Анемия
 - 5. Гипервентиляция
- А. 1, 2, 3
 - Б. 1, 2, 3, 4
 - В. 1, 2, 3, 4, 5
 - Г. 1, 3, 5

У мальчика 9 лет лихорадка, боль в горле, тошнота, отсутствие аппетита. Положительный стрептатест. Аллергией не страдает. Препарат выбора для лечения острого стрептококкового тонзиллита:

- А. Амоксициллин 50 мг/кг в сутки
- Б. Амоксициллин 80 - 90 мг/кг в сутки
- В. Цефтриаксон 50 мг/кг в сутки парентерально
- Г. Азитромицин 10 мг/кг в сутки
- Д. Цефуроксим 40 мг/кг в сутки

При заболевании ОРВИ ребенок первого года жизни наблюдается на педиатрическом участке:

- А. Участковым педиатром совместно с медицинской сестрой
- Б. Активно педиатром на дому ежедневно, до выздоровления
- В. Врачом инфекционистом на дому
- Г. Приглашается на прием педиатра на 3-й день заболевания
- Д. Приглашается на прием педиатра в день выздоровления

Ребенок 5 лет госпитализирован в кардиоревматологическое отделение детской больницы. При осмотре: верхушечный толчок в 5 межреберье на 2 см кнаружи от левой среднеключичной линии, разлитой, ослаблен; левая граница сердца на 2,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии; верхняя - 2 ребро; правая - по парастеральной линии; тоны сердца приглушены, трехчленный ритм на верхушке, умеренной интенсивности непродолжительный систолический шум на основании сердца. Что из перечисленного ниже может быть расценено как вариант возрастной нормы:

- А. Пульс 130 ударов в минуту
- Б. АД 100/50 мм рт.ст.
- В. Характеристика верхушечного толчка
- Г. Характеристика границ сердца
- Д. Данные аускультации

Подросток 15 лет обратился к педиатру с жалобами на приступообразные боли в животе в течение недели, тошноту по утрам, неприятный запах изо рта. Интенсивные боли начались после употребления энергетиков на дне рождения друга. В семье у отца язвенная болезнь 12-перстной кишки. Боли усиливаются ночью, купируются после приема пищи. Периодические боли в животе подросток отмечает уже в течение 1 года. Каков наиболее вероятный диагноз?

- А. Острый гастродуоденит
- Б. Язвенная болезнь желудка/12-пк
- В. Острый холецистит
- Г. Дискинезия желчевыводящих путей
- Д. Ротавирусная инфекция

Ведущим симптомом при нефротическом синдроме является:

- А. Гематурия
- Б. Отеки
- В. Артериальная гипертензия
- Г. Лейкоцитурия
- Д. Всё вышеперечисленное

Ребенок от женщины с резус-отрицательной кровью, страдающей анемией неясной этиологии, от 3-й беременности. Состояние при рождении расценено как очень тяжелое: стонет, беспокоен, периодически судороги, отечность мягких тканей, желтушность кожи, гепатоспленомегалия. В анализе крови: гемоглобин 180 г/л, эритроциты $4,6 \times 10^{12}/л$, цветовой показатель 1,2. Какой диагноз наиболее вероятен у ребенка?

- А. Гемолитическая болезнь новорожденного, анемическая форма
- Б. Гемолитическая болезнь новорожденного, желтушная форма
- В. Гемолитическая болезнь новорожденного, отечная форма
- Г. Наследственная сфероцитарная анемия Минковского-Шоффара
- Д. Менингоэнцефалит

При оказании неотложной помощи при обморожениях не рекомендуется:

- А. Постепенно согревать поражённый участок
- Б. Вскрывать пузыри на обмороженном участке
- В. Накладывать теплоизолирующую повязку
- Г. Накладывать повязку с антисептиком
- Д. Внутримышечно вводить преднизолон в дозе 3-5 мг/кг

Для профилактики и лечения гипокальциемии при рахите применяют препараты кальция. Какая из нижеперечисленных солей содержит максимальное количество элементарного кальция?

- А. Карбонат
- Б. Хлорид
- В. Цитрат
- Г. Фосфат
- Д. Нитрат

При проведении скрининга на выявление врожденной дисфункции коры надпочечников у новорожденных определяют:

- А. Кортизол
- Б. Адренокортикотропный гормон
- В. 17-оксипрогестерон
- Г. 17-кетостероиды
- Д. Тестостерон

У новорожденного в возрасте одних суток жизни отмечено появление желтухи. Кровь матери В(III) группы, резус-отрицательная, ребенка – АВ (IV) группы, резус положительная. Наиболее вероятный диагноз?

- А. Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-несовместимости
- Б. Гемолитическая болезнь новорожденного по АВО-системе
- В. Гемолитическая болезнь новорожденного по резус- и АВО-несовместимости
- Г. Транзиторная желтуха новорожденных
- Д. Ни один из перечисленных выше

Для тетрады Фалло характерно:

- А. Нормальное физическое развитие
- Б. Наличие повышенного аппетита
- В. Бессимптомное течение
- Г. Одышечно-цианотические приступы
- Д. Отставание в психическом развитии

Для диагностики язвенной болезни наиболее важным в обследовании является:

- А. Общий анализ крови
- Б. Кoproграмма
- В. Электролиты сыворотки крови
- Г. Эзофагогастрододеноскопия
- Д. Ультразвуковое обследование органов брюшной полости

Симптомами муковисцидоза могут быть все перечисленные, кроме:

- А. Стеаторея
- Б. Выпадение прямой кишки
- В. Гипотрофия
- Г. Учащенное мочеиспускание
- Д. Повторные пневмонии

Артериальная гипертензия характерна для следующего врожденного порока сердца:

- А. Двойная дуга аорты
- Б. Коарктация аорты
- В. Стеноз легочной артерии
- Г. Открытый артериальный проток
- Д. Дефект межжелудочковой перегородки

Геморрагический характер сыпи характерен для:

- А. Гриппа
- Б. Скарлатины
- В. Краснухи
- Г. Менингококцемии
- Д. Внезапной экзантемы

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Дайте характеристику элементам кожной сыпи.

1. Эритема

2. Петехии

3. Экхимозы

4. Папула

5. Пузырёк

А. Сине-фиолетового цвета, неправильной формы

Б. Первичный, выступающий над уровнем кожи, образуется при скоплении воспалительного инфильтрата в коже

В. Полостной, расположен поверхностно, заполнен серозным или кровянистым содержимым

Г. Участки гиперемии

Д. Невоспалительные пятна, размером 1-2 мм

А. 1Г, 2А, 3Д, 4Б, 5В

Б. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В

В. 1А, 2Д, 3А, 4В, 5Б

Ребенок 11 месяцев наблюдается с аллергией к белкам коровьего молока. От каких инфекций он должен быть уже привит согласно Национальному календарю профилактических прививок?

А. Дифтерии, гепатита В, пневмококковой инфекции, вируса папилломы человека

Б. Дифтерии, гепатита В, пневмококковой инфекции, кори

В. Туберкулеза, дифтерии, гепатита В, пневмококковой инфекции

Г. Туберкулеза, дифтерии, гепатита В, пневмококковой инфекции, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции

Д. Дифтерии, гепатита В, пневмококковой инфекции, паротита

Ребенок 9 месяцев, обратились на профилактический осмотр к педиатру. Запланирована также вакцинация от гриппа во время визита. Возможно ли провести дополнительно вакцинацию от менингококковой инфекции данному ребенку?

А. Да, если прививка включена в региональный календарь

Б. Да, прививка входит в Национальный календарь

В. Нет, ребенок не подлежит по возрасту

Г. Нет, запрещено совмещать данные вакцины

Д. привить только от менингококковой инфекции

Сниженная механическая защита и склонность кожи ребенка к более легкой травматизации обусловлена:

А. Тонкостью эпидермиса

Б. Тонкостью дермы

В. Преимущественно волокнистым составом дермы

Г. Недостаточным развитием подкожного жирового слоя.

Для первичного иммунодефицита характерны:

- 1. Рецидивирующие бактериальные инфекции кожи**
- 2. Грибковое поражение ногтей**
- 3. Повторные респираторные вирусные инфекции**
- 4. Повторные пневмонии**
- 5. Атопический дерматит**

- А. 1,2,3,4
Б. 1,2,4
В. 1,2,4,5
Г. 2,3,4
Д. 2,4

Клинические проявления целиакии могут манифестировать при введении в рацион ребенка:

- А. Гречневой каши
Б. Рисовой каши
В. Манной каши
Г. Всего вышеперечисленного
Д. Манифестация целиакии не связана с введением определённых продуктов питания

Риск заболевания туберкулезом после первичного инфицирования наиболее высок:

- А. В раннем возрасте
Б. В дошкольном возрасте
В. В младшем школьном возрасте
Г. У подростков
Д. У взрослых людей

Ребенок родился от матери с хроническим гепатитом

В. Какова наиболее верная тактика педиатра?

- А. Оформить медицинский отвод от вакцинации гепатита В
Б. Привить ребенка 3-хкратно
В. Привить ребенка по 4-хкратной схеме
Г. Достаточно введения гамма-глобулина в роддоме
Д. Необходимо наблюдение в течение 1 месяца

Пиелонефрит является вторичным если:

- А. Верифицирован первичный очаг бактериального воспаления
Б. При обследовании пациента зарегистрировано наличие аномалии развития мочевыводящей системы
В. Возбудителем пиелонефрита является атипичная флора
Г. После проведенного курса антибактериальной терапии в течение месяца симптомы пиелонефрита появляются вновь
Д. Острый и хронический пиелонефрит являются разными морфологическими вариантами

Ребенок 6 лет госпитализирован в стационар в связи с обострением бронхиальной астмы. Беспокоит сухой приступообразный кашель, экспираторная одышка, в легких выслушиваются сухие свистящие хрипы с обеих сторон, SpO2 90%, ЧД 36 в минуту, ЧСС 115 в минуту. Какая неотложная помощь должна быть прежде всего оказана в приемном отделении:

- А. Будесонид 500 мг в ингаляции через небулайзер
- Б. Кислород, сальбутамол 2,5 мг в ингаляции через небулайзер, будесонид 500 мг в ингаляции через небулайзер
- В. Аминофиллин 5 мг/кг внутривенно болюсно
- Г. Преднизолон 2-3 мг/кг внутривенно или внутримышечно
- Д. Сальбутамол 2,5 мг в ингаляции через небулайзер

Какие заболевания входят в неонатальный скрининг с 2006 г.?

- А. Фенилкетонурия
- Б. Фенилкетонурия, гипотиреоз
- В. Фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия
- Г. Фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия, муковисцидоз
- Д. Фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром

Битональный кашель характерен для:

- А. Обструктивного бронхита
- Б. Коклюша
- В. Инородного тела бронха, увеличения внутригрудных лимфоузлов
- Г. Обострения бронхиальной астмы
- Д. Эпиглоттита

Девочка 3-х лет на осмотре у дежурного врача в поликлинике. Болеет вторые сутки. Отмечаются лихорадка до 39,5°C, грубый лающий кашель, осиплость голоса, гиперсаливация, стрidor, боль в горле при глотании. В легких дыхание жесткое, проводится во все отделы. Тоны сердца звучные, ритмичные. Каков наиболее вероятный диагноз?

- А. Обструктивный ларинготрахеит, стеноз гортани 1 степени
- Б. Обструктивный ларинготрахеит, стеноз гортани 2 степени
- В. Стрептококковый тонзиллит
- Г. Эпиглоттит
- Д. Инородное тело гортани

Какие значения дефицита массы тела в % должны быть у грудного ребенка, если у него гипотрофия 2 степени:

- А. 5-9%
- Б. 10-19%
- В. 20-29%
- Г. 30-39%
- Д. 40% и более

Для лечения типичной внебольничной неосложненной пневмонии у ребенка целесообразно назначить:

- А. Азитромицин
- Б. Амоксициллин
- В. Цефазолин
- Г. Цефтриаксон
- Д. Ципрофлоксацин

Суперинфекция дельта-вирусом представляет опасность для больных:

- А. Гепатитом А
- Б. Гепатитом В
- В. Гепатитом С
- Г. Хроническим панкреатитом
- Д. Язвенной болезнью

Хроническим является гломерулонефрит если:

- А. Течение острого гломерулонефрита, несмотря на проводимую терапию, длится больше 6 месяцев
- Б. Имеет место трехкратное увеличение уровня креатинина в крови в течение трёх последовательных дней
- В. У пациента зарегистрированы специфические морфологические изменения в биоптате ткани почек
- Г. У пациента регистрируется протеинурия
- Д. Регистрируется присоединение инфекции мочевыводящих путей

Развитие отеков при нефротическом синдроме обусловлено:

- А. Артериальной гипертензией
- Б. Гипопротеинемией
- В. Гиперкальциемией
- Г. Гиперхолестеринемией

Для острой сосудистой недостаточности характерно:

- А. Влажный кашель
- Б. Влажные хрипы в легких
- В. Сухие хрипы в легких
- Г. Падение артериального давления
- Д. Повышение артериального давления

Мальчик 4 года, при осмотре на дому: болен 3 сутки, повышение температуры до 38,7С. выраженные экссудативные проявления с конъюнктивитом. По органам без особенностей. Для какой вирусной инфекции характерны данные проявления.

- А. Парагрипп
- Б. Грипп
- В. Аденовирусная инфекция
- Г. Риновирусная инфекция
- Д. РС-инфекция

У доношенного ребенка, который хорошо берет грудь, имеет небольшую потерю массы тела, розовые кожные покровы, на 3-й день появилась иктеричность кожи. Укажите наиболее вероятную причину желтухи.

- А. Гемолитическая болезнь новорожденных
- Б. Транзиторная (физиологическая) желтуха
- В. Врожденный гепатит
- Г. Каротиновая пигментация из-за употребления матерью моркови
- Д. Атрезия желчных путей

Ревакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи здоровому ребенку проводится в возрасте:

- А. 12 месяцев
- Б. 18 месяцев
- В. 6 лет
- Г. 7 лет
- Д. 9 лет

Мать с ребенком 1 года обратилась к врачу с жалобами на неустойчивый стул у ребенка со слизью в течение 3-х дней. Неделю назад прекратила кормить грудью. Растет и развивается ребенок по возрасту, аппетит сохранен. Каков наиболее вероятный диагноз в данном случае?

- А. Функциональное нарушение кишечника
- Б. Инфекционный энтерит
- В. Лактазная недостаточность
- Г. Целиакия
- Д. Рахит

О чем можно думать, если у ребенка 8 месяцев отмечаются распространенные костные деформации (увеличение теменных и затылочных бугров, расширение нижней апертуры грудной клетки, «четки» на ребрах), мышечная гипотония, задержка моторного развития при нормальном психическом развитии, повышение в крови уровня щелочной фосфатазы и снижение уровня кальция и фосфора?

- А. Рахит в стадии разгара
- Б. Рахит в периоде реконвалесценции
- В. Дисплазия соединительной ткани
- Г. Гипервитаминоз Д
- Д. Несовершенный остеогенез

Для лечения острой аллергической крапивницы и ангионевротического отека используют:

- 1. Антигистаминные препараты**
- 2. Холинолитики**
- 3. Системные глюкокортикостероиды**
- 4. Адреналин**
- 5. Нестероидные противовоспалительные средства**

- А. 1,2,3
- Б. 1,3,5
- В. 1,3
- Г. 1,2,3,4
- Д. 1,3,4,5

Фиброэластоз эндокарда является тяжелым заболеванием сердца и чаще всего является морфологическим субстратом:

- А. Раннего врожденного кардита
- Б. Позднего врожденного кардита
- В. Острого приобретенного кардита
- Г. Подострого приобретенного кардита
- Д. Хронического приобретенного кардита

У ребенка в возрасте 15 месяцев диагностирована лихорадка без очага инфекции (ЛБОИ). Какие лабораторные исследования следует назначить в этом случае в первую очередь:

- А. Рентгенография органов грудной клетки
- Б. Клинические анализы крови и мочи
- В. Клинические анализы крови и мочи, исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
- Г. УЗИ почек
- Д. Исследование респираторных вирусов в назофарингеальном мазке методом ПЦР

Что включается в понятие «перинатальная смертность»?

- А. Число детей, умерших до 1 года, на 1000 родившихся живыми
- Б. Число мертворожденных детей и детей, умерших на первой неделе жизни, от общего числа родившихся живыми и мертвыми
- В. Число мертворожденных
- Г. Число мертворожденных детей и детей, умерших на первом месяце жизни, от общего числа родившихся живыми и мертвыми
- Д. Число детей, умерших до 1 года, на 10 000 родившихся живыми

Ребенок 3-х лет болен вторые сутки. Отмечаются лихорадка до 39,5*С; грубый лающий кашель, осиплость голоса, гиперсаливация, стридор, боль в горле при глотании. Наиболее вероятный диагноз?

- А. Обструктивный ларинготрахеит, стеноз гортани 1 степени
- Б. Обструктивный ларинготрахеит, стеноз гортани 2 степени
- В. Стрептококковый тонзиллит
- Г. Эпиглоттит
- Д. Инородное тело гортани

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Выберите оптимальную терапию диарейного заболевания:

- 1. Ротавирусный гастроэнтерит
- 2. Дизентерия
- 3. Антиботик-ассоциированная диарея
- 4. Сальмонеллез
- 5. Кампилобактериоз
- А. Оральный регидратационный раствор
- Б. Метронидазол
- В. Макролид
- Г. Цефалоспорин 3 поколения
- А. 1Г, 2Г, 3В, 4Г, 5В
- Б. 1А, 2В, 3Б, 4В, 5Г
- В. 1А, 2Г, 3Б, 4Г, 5В

О снижении клубочковой фильтрации почек свидетельствует:

- А. Появление протеинурии и/или гематурии
- Б. Повышение уровня калия сыворотки
- В. Повышение уровня креатинина сыворотки
- Г. Снижение относительной плотности мочи

Девочка 14 лет обратилась к врачу с жалобами на слабость, боли и припухание суставов, выпадение волос, красные пятна на коже щек, усиливающиеся после пребывания на солнце. При обследовании выявлены некоторое расширение границ, приглушение тонов сердца, единичные экстрасистолы, лейкопения, СОЭ - 32 мм/час. Каков наиболее вероятный диагноз?

- А. Ювенильный ревматоидный артрит
- Б. Ревматизм
- В. Дерматомиозит
- Г. Системная красная волчанка
- Д. Фотодерматоз

При суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии препаратом выбора для купирования приступа является:

- А. Дигоксин
- Б. Амiodарон
- В. АТФ
- Г. Прокаинамида гидрохлорид
- Д. Пропранолол

При лечении больного цитостатиками необходимо регулярно назначать:

- А. Консультацию офтальмолога
- Б. Клинический анализ крови
- В. Рентгенографию костей для выявления остеопороза
- Г. Измерение артериального давления
- Д. Стерильную пункцию

Метамизол натрия не рекомендован для применения у детей из-за опасности развития:

- А. Аллергических реакций
- Б. Синдрома отмены
- В. Агранулоцитоза
- Г. Острой почечной недостаточности
- Д. Токсического гепатита

Здорового доношенного новорожденного ребенка в роддоме вакцинируют от:

- А. Кори
- Б. Полиомиелита
- В. Коклюша
- Г. Туберкулеза и гепатита В
- Д. Пневмококковой инфекции

Проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему острое респираторное заболевание, можно разрешить после выздоровления через:

- А. 2-3 недели
- Б. 1 месяц
- В. 2 месяца
- Г. 3 месяца
- Д. 6 месяцев

Для лечения инфекций мочевыводящих путей используют:

- А. Противовирусные препараты
- Б. Иммуномодуляторы
- В. Нестероидные противовоспалительные препараты
- Г. Антибактериальные препараты
- Д. Мочегонные средства

Для пиелонефрита характерен симптомокомплекс:

- А. Повышение температуры, боли в животе, лимфоцитарная лейкоцитурия
- Б. Повышение температуры, отеки, протеинурия, гематурия
- В. Повышение температуры, боли в животе, нейтрофильная лейкоцитурия
- Г. Отеки, головная боль, протеинурия, гематурия
- Д. Повышение артериального давления, отеки, протеинурия, гематурия

Основной причиной аспирации новорожденных является:

- А. Недоношенность
- Б. Гипоксия плода
- В. Инфекционные заболевания матери
- Г. Гемолитическая болезнь новорожденных
- Д. Врожденный порок сердца

Для купирования анафилактической реакции прежде всего необходимо ввести:

- А. Преднизолон
- Б. Аминофиллин
- В. Атропин
- Г. Адреналин
- Д. Хлоропирамин

В обязанности участкового педиатра не входит:

- А. Проведение патронажа новорожденного на дому
- Б. Ведение амбулаторных приемов
- В. Проведение дезинфекции в инфекционном очаге
- Г. Оказание врачебной помощи ребенку на дому
- Д. Поддержка грудного вскармливания

Противопоказанием к биопсии почки не является:

- А. Единственная почка
- Б. Поликистоз почек
- В. Туберкулез почек
- Г. Стероидрезистентный гломерулонефрит
- Д. Острый постстрептококковый гломерулонефрит

Патогномоничным признаком муковисцидоза является:

- А. Увеличение трансаминаз
- Б. Повышение общего билирубина
- В. Увеличение натрия и хлора в потовой жидкости
- Г. Повышение мочевой кислоты
- Д. Наличие крови в стуле

Образование инфильтрата и некроза после вакцинации БЦЖ происходит:

- А. Через 10 дней
- Б. Через 2 недели
- В. Через 1-3 месяца
- Г. Через 6 месяцев
- Д. Через 12 месяцев

Специфическая профилактика инфекционных болезней включает:

- А. Поддержку грудного вскармливания
- Б. Адекватное возрасту питание ребенка
- В. Вакцинацию
- Г. Закаливание
- Д. Прием иммуномодуляторов

Ребенку 5 месяцев. Родился от 1-х запоздалых, затяжных родов. Оценка по шкале Апгар 5/6 баллов. В течение первых дней состояние было тяжелым. Выписан домой на 19-й день жизни. В последующем регулярного врачебного наблюдения не было. Из перечисленного ниже, обнаруженного при осмотре, соответствует возрастной норме:

- А. Самостоятельно не садится
- Б. Гипертонус мышц рук и ног
- В. Тенденция к перекресту ног
- Г. Наличие ладонно-ротового рефлекса
- Д. Наличие хватательного рефлекса

Для увеличения количества молока у матери следует:

- А. Временно перевести ребёнка на искусственное вскармливание
- Б. Увеличить частоту прикладывания ребёнка к груди
- В. Уменьшить частоту прикладывания ребёнка к груди
- Г. Допаивать ребёнка раствором глюкозы
- Д. Увеличить физические нагрузки матери

Ребенок 6 мес на приеме у участкового педиатра перед вакцинацией. Ранее вакцинирован в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Симптомов острого заболевания нет. В клиническом анализе крови число нейтрофилов составляет 800 / мкл.

Тактика врача-педиатра:

- А. Не вакцинировать, повторить клинический анализ крови в динамике
- Б. Вакцинировать, повторить клинический анализ крови в динамике
- В. Медицинский отвод от вакцинации на 6 месяцев
- Г. Госпитализировать ребенка

Укажите оптимальный раствор для парентеральной регидратации ребенка с эксикозом на фоне вирусного гастроэнтерита:

- А. Раствор глюкозы 5%
- Б. Раствор глюкозы 10%
- В. Раствор Рингера
- Г. Раствор NaHCO_3 5%
- Д. Ацесоль

Для вирусного крупа характерны симптомы:

- 1. Стридор
- 2. Тризм
- 3. Осиплость голоса
- 4. Гиперсаливация
- 5. Грубый кашель

- А. 1,2,3,5
- Б. 1,3,5
- В. 1,3,4,5
- Г. 2,4

Девочка 14 лет обратилась к врачу с жалобами на слабость, боли и припухание суставов, выпадение волос, красные пятна на коже щек, усиливающиеся после пребывания на солнце. При обследовании выявлены некоторое расширение границ, приглушение тонов сердца, единичные экстрасистолы, лейкопения, СОЭ - 32 мм/час. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Ювенильный ревматоидный артрит
- Б. Ревматизм
- В. Системная красная волчанка
- Г. Дерматомиозит
- Д. Фотодерматоз

Наличие мелкопятнистой сыпи характерно для:

- А. Скарлатины
- Б. Инфекционного мононуклеоза
- В. Ветряной оспы
- Г. Крапивницы
- Д. Парвовирусной инфекции

При церебральной ишемии I степени у новорожденного выявляются:

- А. Судороги, гипорефлексия, тремор рук
- Б. Тремор рук, гипорефлексия, мышечная дистония
- В. Мышечная дистония, гипотония, вялость
- Г. Адинамия
- Д. Гипотония

Мать с ребенком 6 месяцев обратились на прием к врачу с профилактической целью. Беременность без осложнений, роды в срок с весом 3500 гр, рост 52 см. До визита к врачу все навыки сформированы по возрасту. Участковый врач предложил матери провести профилактическую вакцинацию от гриппа. В поликлинике в наличии оказался только препарат Ультрикс-квадри. Каковы должны быть действия врача перед вакцинацией?

- А. Направить пациента на обследование
- Б. Назначить подготовку
- В. оформить информированное согласие и вакцинировать
- Г. Дождаться поступления другой вакцины
- Д. Оформить медицинский отвод до 1 года

Для измерения уровня сатурации кислорода в крови используют:

- А. Тонометр
- Б. Пульсоксиметр
- В. Спейсер
- Г. Пикфлоуметр
- Д. Холтеровское мониторирование

Причиной мегалобластной анемии является:

- А. Дефицит железа в сыворотке крови
- Б. Гемолиз эритроцитов
- В. Дефицит витамина В12
- Г. Дефицит цинка в сыворотке крови
- Д. Рахит

Диагностически значимая бактериурия для подтверждения инфекции мочевыводящих путей – это:

- А. Наличие более 1 000 КОЕ в 1 мл мочи при посеве мочи
- Б. «Много бактерий» в общем анализе мочи
- В. Наличие более 10 000 КОЕ в 1 мл мочи при посеве мочи
- Г. «Сплошь бактерии» в общем анализе мочи

У ребенка 7 лет отсутствует рубчик после вакцинации БЦЖ. Ваша тактика:

- А. Провести обязательную ревакцинацию
- Б. Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту
- В. Ребенок ревакцинации не подлежит
- Г. Провести ревакцинацию только в случае положительной реакции Манту
- Д. Ревакцинировать в случае сомнительной реакции Манту

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Укажите компоненты врожденного и приобретенного иммунитета:

1. Макрофаги
 2. Цитокины
 3. Специфические антитела
 4. Лейкоциты
 5. Система комплемента
- А. Врожденный иммунитет (естественный)**
Б. Приобретенный иммунитет (адаптивный)
- А. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5А
 - Б. 1А, 2А, 3Б, 4Б, 5А
 - В. 1Б, 2Б, 3Б, 4А, 5Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между синдромом и его клинико-лабораторными проявлениями:

1. Нефритический синдром
 2. Макрогематурия
 3. Нефротический синдром
 4. Нефротический синдром + гематурия
- А. Протеинурия 4,8 г/л, общий белок крови 34 г/л, асцит
Б. Периферические отеки голеней, моча цвета «мясных помоев», общий белок крови 65 г/л, протеинурия 1,8 г/л
В. Моча темно коричневого цвета
Г. Протеинурия 3,7 г/л, гематурия 65-70 в п/зр, общий белок крови 35 г/л
- А. 1А, 2В, 3Б, 4Г
Б. 1Б, 2В, 3А, 4Г
В. 1Г, 2Б, 3В, 4А

Синдром пролапса митрального клапана необходимо дифференцировать прежде всего с:

- А. Недостаточностью митрального клапана
Б. Аортальным стенозом
В. Недостаточностью трикуспидального клапана
Г. Дефектом межжелудочковой перегородки
Д. Кардитом

На приеме педиатра ребенок 8 месяцев. Мать жалуется, что ребенок в последние 3-4 недели стал бледным, вялым, много спит, капризен, плохо ест, утратил некоторые сформировавшиеся ранее моторные навыки. В рационе ребенка грудное молоко в большом количестве, безмолочные каши и овощное пюре. Мать ребенка вегетарианка. Наиболее вероятная причина болезни ребенка:

- А. Железодефицитная анемия
Б. В12-дефицитная анемия
В. Рахит
Г. Менингоэнцефалит
Д. Перинатальное поражение ЦНС, поздний восстановительный период

У детей в возрасте до 1 года лейкоцитозом следует считать повышение количества лейкоцитов в периферической крови выше:

- А. 9 тыс / мкл
Б. 10 тыс / мкл
В. 12 тыс/мкл
Г. 14 тыс /мкл
Д. 15 тыс /мкл

Мать с ребенком 3-х лет обратилась на прием к врачу с жалобами на приступообразный кашель, субфебрильную температуру, отказ от еды. От вакцинации отказ от всех прививок. При осмотре лицо одутловатое, дыхание в легких жесткое, по остальным органам без изменений. Какое заболевание необходимо исключить у пациента в первую очередь?

- А. Бронхиальная астма
- Б. Хламидийная пневмония
- В. Коклюш
- Г. Риносинтициальная инфекция
- Д. Острый обструктивный бронхит

Что является противопоказанием для применения живых вакцин?:

- А. Частые респираторные инфекции
- Б. Судороги в анамнезе
- В. Иммунодефицитные состояния
- Г. Синдром внезапной смерти в семье
- Д. Дисбактериоз кишечника

Девочка, 14 лет. Обратилась с жалобами на повторяющиеся, приступы интенсивной, чаще односторонней и пульсирующей головной боли преимущественно в области виска, глаза и темени, но нередко могут начинаться в области затылка, часто сопровождаются тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету, звукам и усиливаются при физической нагрузке. Продолжительность приступа – от 2-3 часов до 3 суток; частота дней с головной болью в среднем 2-4 дня в месяц. Консультирована неврологом: неврологической симптоматики не выявлено. Инструментальная диагностика без патологии. Каков наиболее вероятный диагноз?

- А. Опухоль головного мозга
- Б. Мигрень без ауры
- В. Мигрень с аурой
- Г. Головная боль напряжения
- Д. Персистирующая инфекция

Биохимическими маркерами активности цирроза печени являются:

- А. Гиперпротеинемия
- Б. Метаболический ацидоз
- В. Повышение уровня прямого билирубина, гиперглобулинемия, повышение печеночных трансаминаз
- Г. Повышение уровня щелочной фосфатазы, микропротеидов
- Д. Повышение уровня холестерина

Ребенку 4 месяца. С первого месяца жизни отмечаются зудящие кожные высыпания на разгибательных поверхностях конечностей, на щеках, на шее. Периодически стул со слизью. В связи с гипогалактией у матери возникла необходимость перехода на смешанное вскармливание. Какое питание в этом случае следует назначить в качестве докорма:

- А. Гипоаллергенную молочную смесь
- Б. Цельный кефир
- В. Кисломолочную смесь для грудных детей
- Г. Смесь с высокой степенью гидролиза белка коровьего молока
- Д. Смесь на основе белка козьего молока

Показанием к гемодиализу при острой почечной недостаточности у детей являются:

- А. Массивные отёки
- Б. Уровень креатинина
- В. Прирост уровня креатинина за сутки и гиперкалиемия
- Г. Гипернатриемия в сочетании с артериальной гипертензией
- Д. Высокий уровень прямого билирубина в сочетании с повышенными показателями трансаминаз

Для верификации диагноза неспецифического язвенного колита необходимо проведение:

- А. Ультразвукового исследования брюшной полости
- Б. Копрограммы
- В. Ирригографии
- Г. Фиброколоноскопии с лестничной биопсией слизистой толстой кишки
- Д. Компьютерной томографии органов брюшной полости

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клиническими симптомами и заболеванием:

1. Грипп

2. Парагрипп

3. Аденовирусная инфекция

4. Риновирусная инфекция

5. РС-инфекция

А. Острое начало заболевания с резко выраженными насморком и чиханием на фоне нормальной или субфебрильной температуры

Б. Заболевание с выраженными экссудативными проявлениями, конъюнктивитом на фоне высокой температуры

В. Острое начало заболевания с высокой лихорадкой и выраженными симптомами интоксикации

Г. Заболевание с частым поражением нижних дыхательных путей, развитием бронхиолита

Д. Заболевание с выраженными катаральными явлениями в виде сухого грубого кашля, осиплостью голоса

А. 1Б, 2Д, 3Г, 4А, 5В

Б. 1В, 2Д, 3Б, 4А, 5Г

В. 1В, 2Г, 3Б, 4Д, 5А

Для лечения острой респираторной вирусной инфекции показано все, кроме:

А. Удаление слизи из носовых ходов

Б. Жаропонижающие

В. Деконгестанты

Г. Антибиотики

Для врожденного гипотиреоза у новорожденного ребенка характерно все, кроме:

А. Низкой массы тела при рождении

Б. Затяжной желтухи

В. Низкого тембра голоса

Г. Ослабления сосательного рефлекса

Д. Повышения уровня тиреотропного гормона в крови

При целиакии в рацион можно включать:

А. Пшеничную муку

Б. Перловую крупу

В. Овсяные хлопья

Г. Рисовую крупу

Д. Не использовать никакие виды круп

Верифицирующим критерием диагноза пневмонии является:

- А. Притупление перкуторного звука над легкими
- Б. Локальные мелкопузырчатые хрипы при аускультации легких
- В. Ослабление дыхания при аускультации легких
- Г. Консолидация легочной ткани на рентгенограмме органов грудной клетки
- Д. Снижение уровня SpO₂

Нозокомиальной называется пневмония, которая развивается

- А. В течение всего периода нахождения в стационаре
- Б. В течение 72 часов после выписки из стационара
- В. После 48 часов пребывания в стационаре
- Г. Во время пребывания в отделении реанимации
- Д. После 72 часов пребывания в стационаре до истечения 72 часов после выписки из стационара

Для купирования анафилактического шока используют:

- 1. Адреналин
 - 2. Преднизолон
 - 3. Атропин
 - 4. Раствор хлорида натрия 0,9%
 - 5. Раствор глюкозы 5%
- А. 1,2,3
 - Б. 1,2,4
 - В. 1,2,3,4
 - Г. 1,2,5
 - Д. 2,4

Мать девочки-подростка 13 лет отмечает, что в последнее время дочь стала очень раздражительной и неуравновешенной, нарушился сон (спит беспокойно, часто просыпается), похудела, стала быстро уставать. Жалуется на повышенную потливость, непереносимость жары, урчание и периодические боли в животе, учащение стула до двух раз в сутки. При осмотре врач выявил у больной тахикардию, тремор пальцев рук, повышение сухожильных рефлексов. Прежде всего можно заподозрить:

- А. Вегетативную дисфункцию
- Б. Гастродуоденит
- В. Хроническую туберкулезную интоксикацию
- Г. Тиреотоксикоз
- Д. Недостаточность надпочечников

Аутоинвазия возможна при:

- А. Аскаридозе
- Б. Дифиллоботриозе
- В. Трихоцефалезе
- Г. Энтеробиозе
- Д. Эхинококкозе

Критерий диагностики анемии у детей от 6 месяцев до 5 лет (по нормативам ВОЗ):

- А. Гемоглобин менее 120 г/л
- Б. Гемоглобин менее 110 г/л
- В. Гемоглобин менее 100 г/л
- Г. Гемоглобин менее 90 г/л
- Д. Гемоглобин менее 80 г/л

Проба Зимницкого оценивает:

- А. Функцию клубочка почки
- Б. Функцию канальцев почки
- В. Уровень секреции антидиуретического гормона
- Г. Выраженность бактериурии в течение суток

Пассивной иммунизацией называется:

- А. Вакцинация живой вакциной
- Б. Вакцинация инактивированной вакциной
- В. Введение анатоксина
- Г. Введение иммуноглобулинов
- Д. Лечение иммуномодуляторами

У детей старше одного года жизни усвояемость белка из мяса, хлеба, круп без овощей составляет 70%. При введении в рацион овощей этот процент:

- А. Не изменяется
- Б. Повышается
- В. Снижается

Неотложные мероприятия на месте происшествия при электротравме у детей включают:

- А. Отсоединение пострадавшего от источника тока
- Б. Проведение сердечно-легочной реанимации
- В. Инфузионная терапия для поддержания витальных функций; онко-, осмотерапия при угрозе отёка мозга
- Г. Экстренная госпитализация
- Д. Все указанные мероприятия

При каком заболевании обязательно госпитализировать ребенка школьного возраста:

- А. Коклюш
- Б. Менингококковая инфекция
- В. Корь
- Г. Ветряная оспа
- Д. Ангина

Ребенок 8-недельного возраста, от матери 38 лет, кормится грудью через 3,5 часа. Сосет вяло. В вечерние часы проявляет беспокойство между кормлениями. Излишков молока у матери нет. Диагностирована гипотрофия 1 степени. Ведущая причина гипогалактии у женщины:

- А. Ограничение жидкости и приема углеводов во время беременности
- Б. Родоразрешение на 1 месяц раньше срока путем кесарева сечения
- В. Кормление ребенка грудью с пятого дня после рождения
- Г. Возраст матери
- Д. Вялое сосание ребенка, отказ матери от сцеживания молока

Абсолютным противопоказанием к вакцинации является:

- А. Нейтропения
- Б. Первичный иммунодефицит
- В. Анафилактическая реакция на вакцину при предыдущем введении
- Г. Обострение хронического заболевания
- Д. Острое респираторное заболевание

Экссудативная энтеропатия связана с:

- А. Дисахаридазной недостаточностью
- Б. Непереносимостью белков коровьего молока
- В. Дефицитом пептидаз в кишечнике
- Г. Врожденной лимфангиоэктазией кишки
- Д. Повышенной вязкостью секретов экзокринных желез

Какой из растворов показан для оральной регидратации у детей с эксикозом при острой диарее?

- А. Раствор Рингера
- Б. Раствор для оральной регидратации
- В. 5% раствор глюкозы
- Г. Раствор соды
- Д. 20% раствор глюкозы

После проведения рентгенографии органов грудной клетки, назначенной ребенку 12 лет врачом-педиатром после осмотра, диагностирована пневмония. По данным анализа крови выявлено увеличение IgM к *Mycoplasma pneumoniae*. Какой из антибактериальных препаратов необходимо назначить для лечения пневмонии?

- А. Амоксициллин
- Б. Амоксициллин-клавуланат
- В. Ципрофлоксацин
- Г. Цефотаксим
- Д. Кларитромицин

У ребенка в возрасте 4-х недель жизни участились срыгивания, ежедневно после кормления стала возникать рвота фонтаном. Ребенок беспокоен, не прибавляет в весе. Какое заболевание следует исключить в первую очередь:

- А. Аэрофагия
- Б. Пилороспазм
- В. Пилоростеноз
- Г. Кишечные колики
- Д. Пищевая аллергия

Активации инфекции в желчных путях способствует

- А. Повышение уровня билирубина в желчи
- Б. Нарушение оттока желчи
- В. Сдвиг pH желчи в кислую сторону
- Г. Повышение уровня холестерина в желчи

Предпочтительным типом ингалятора для детей до 4 лет, страдающих бронхиальной астмой, является

- А. Дозирующий аэрозольный ингалятор с соответствующим спейсером с мундштуком
- Б. Дозирующий порошковый ингалятор, активируемый дыханием
- В. Дозирующий аэрозольный ингалятор с соответствующим спейсером с лицевой маской
- Г. Небулайзер с мундштуком

При затяжном рековалесцентном бактериовыделении возбудителей бактериальных диарей препаратами выбора являются

- А. Иммуноглобулины
- Б. Таргетные пробиотики
- В. Специфические бактериофаги
- Г. Антибиотики резерва

Иностранным гражданам, работающим по трудовому договору в организациях РФ, для удостоверения временной нетрудоспособности

- А. Выдаётся справка установленного образца
- Б. Не выдаётся никакой документ
- В. Формируется (выдаётся) листок нетрудоспособности
- Г. Выдаётся справка произвольной формы

Нарушение толерантности к глюкозе (углеводам) ставится при гликемии _____ ммоль/л через 2 часа после нагрузки глюкозой

- А. Ниже 5,5
- Б. 7,8-11,1
- В. 5,5-6,0
- Г. 6,1-7,5

Тяжелая дегидратация обусловлена

- А. Ротавирусами
- Б. Норовирусами
- В. Аденовирусами
- Г. Коронавирусами

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы используют функциональную пробу

- А. Щипковую
- Б. Молоточковую
- В. Шалкова
- Г. Мак-Клюра

Пневмония при ВИЧ-инфекции наиболее часто обусловлена

- А. Пневмококками
- Б. Пневмоцистами
- В. Стафилококками
- Г. Энтерококками

Вакциной против дифтерии, столбняка, коклюша, которая разрешена к применению с 4 до 64 лет, является

- А. АДС-М
- Б. АКДС
- В. Адасель
- Г. Инфанрикс

В развитии внутрибольничной деструктивной пневмонии у детей раннего возраста играет роль

- А. Пневмоциста карини
- Б. Пневмококк IV группы
- В. Клебсиелла пневмония
- Г. Золотистый стафилококк

В группу риска по развитию инфекционного эндокардита входят пациенты с

- А. Первичной артериальной гипертензией
- Б. Цианотическими врождёнными пороками сердца
- В. Проплапсом митрального клапана 1 степени
- Г. Дефектом межпредсердной перегородки

Рвота фонтаном у детей первых месяцев жизни наблюдается при

- А. Пилоростенозе
- Б. Гепатите
- В. Атрезии желчных путей
- Г. Токсикозе

Серологическим маркером вирусного гепатита а является

- А. Anti-HEV IgM
- Б. Anti-HAV IgM
- В. Anti-HBe
- Г. Anti-HCV IgM

При портальной гипертензии наблюдается

- А. Пониженный уровень сахара крови
- Б. Расширение вен пищевода
- В. Изолированная гепатомегалия
- Г. Высокий уровень IgG

К наиболее значимым показателям, позволяющим дифференцировать острые гепатиты а и в, относят

- А. Уровень активности печеночно-клеточных ферментов
- Б. Результаты УЗИ органов брюшной полости
- В. Содержание свободного и связанного билирубина в крови
- Г. Специфические маркеры вирусов гепатита А и В

Заподозрить нарушения сердечного ритма у детей можно при

- А. Отеках, повышении температуры тела
- Б. Болях в животе, диспепсических явлениях
- В. Гематурии, повышении артериального давления
- Г. Синкопальных состояниях, эпизодах резкой бледности

При инфекционном мононуклеозе в периферической крови выявляются

- А. Нейтрофилез, лимфопения
- Б. Нейтрофилез, эозинофилия
- В. Атипичные мононуклеары, лимфоцитоз
- Г. Лимфопения, атипичные мононуклеары

Результатом гистологического исследования, позволяющим дифференцировать болезнь Крона и язвенный колит, является наличие

- А. Псевдополипов
- Б. Атрофии слизистой
- В. Саркоидных гранул в подслизистом слое
- Г. Диффузного воспаления слизистой

Входными воротами инфекции при экстрафарингеальной скарлатине является

- А. Ожоговая поверхность
- Б. Кровяное русло
- В. Глотка
- Г. Кишечник

Бемегрид как антидот применяют у детей при отравлении

- А. Солями тяжелых металлов
- Б. Барбитуратами
- В. Парацетамолом
- Г. Сердечными гликозидами

При менингококкемии на догоспитальном этапе целесообразно вводить

- А. Антибактериальные препараты
- Б. Жаропонижающие препараты
- В. Сердечные гликозиды
- Г. Антикоагулянты

Заключительная дезинфекция проводится специализированной бригадой при

- А. Токсокарозе
- Б. Менингококковой инфекции
- В. Гриппе
- Г. Холере

Ангиотензиновые рецепторы сосудов (ат-1) блокирует

- А. Лозартан
- Б. Пропранолол
- В. Фозиноприл
- Г. Каптоприл

Зрелое молоко начинает вырабатываться у женщины

- А. На 5 день лактации
- Б. Сразу после родов
- В. Через 1-1,5 мес. после родов
- Г. К началу 3 недели после родов

Наиболее часто локализация гнойного очага при пупочном сепсисе происходит в

- А. Пупочных сосудах
- Б. Околопупочной области
- В. Передней брюшной стенке
- Г. Пупочной ранке

Оптимальным методом неинвазивной дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний кишечника и функциональных расстройств толстой кишки у детей является определение

- А. Фекального кальпротектина
- Б. Возбудителей кишечных инфекций в кале
- В. Эластазы кала
- Г. Ультрасонографии толстой кишки

Затяжная пневмония диагностируется при отсутствии разрешения пневмонического процесса в течение более (в неделях)

- А. 6
- Б. 3
- В. 5
- Г. 4

Наиболее часто встречающейся формой злокачественной опухоли головного мозга у детей является

- А. Медуллобластома
- Б. Астроцитомы
- В. Эпендимомы
- Г. Краниофарингиомы

Механизм действия антигистаминных препаратов заключается в _____ гистамина

- А. Усиленном выведении
- Б. Высвобождении
- В. Блокаде рецепторов
- Г. Торможении образования

Решающее значение для ликвидации полиомиелита имеет

- А. Наблюдение за контактными в очаге инфекции в течение трех недель
- Б. Экстренная вакцинация непривитых
- В. Плановый охват прививками на 96 и более процентов
- Г. Очаговая дезинфекция

При лечении легких форм бактериальных кишечных инфекций на дому преимущество отдается

- А. Противовирусным препаратам
- Б. Бактериофагам
- В. Антибиотикам
- Г. Ферментам

Атропин используют при

- А. Острой задержке мочи
- Б. Кишечной непроходимости
- В. Нарушении атриовентрикулярной проводимости
- Г. Передозировке наркотических препаратов

Результатом высокой степени связывания препарата с белками плазмы выступает

- А. Повышение концентрации свободной фракции препарата
- Б. Уменьшение $T_{1/2}$
- В. Лучшая эффективность препарата
- Г. Снижение концентрации свободной фракции препарата

К симптомам сердечной недостаточности по правожелудочковому типу относят

- А. Приступы потери сознания, судороги
- Б. Отёки нижних конечностей, увеличение печени
- В. Тахикардию, одышку
- Г. Боль в области сердца, экстрасистолию

Уровень гемоглобина при средней степени анемии равен (в г/л)

- А. 90-110
- Б. 110-112
- В. 70-89
- Г. Менее 70

Аллергическая стадия патогенеза при стрептококковой инфекции наиболее выражена

- А. На 4-5 неделях болезни
- Б. В первые дни болезни
- В. В конце 1 недели
- Г. На 2-3 неделях болезни

Введение в рацион ребенка овощей рекомендовано в возрасте _____ месяцев

- А. 8-9
- Б. 3-4
- В. 4-5
- Г. 6-7

Защитный рефлекс у новорожденного ребенка угасает к _____ месяцам жизни

- А. 2
- Б. 12
- В. 6
- Г. 5

К патогенетическим средствам лечения острого панкреатита относятся

- А. Холинолитики
- Б. Ферменты
- В. Ингибиторы ферментов
- Г. Антибактериальные препараты

Первичный дефект межпредсердной перегородки располагается в _____ части перегородки

- А. Нижней
- Б. Верхней
- В. Средней
- Г. Любой

Для вирусного гепатита а типичной является _____ форма

- А. Инаппарантная
- Б. Стертая
- В. Желтушная
- Г. Безжелтушная

Наиболее частым ранним осложнением язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки является

- А. Кровотечение
- Б. Пенетрация
- В. Стеноз
- Г. Малигнизация

Для купирования гипогликемии без потери сознания, развившейся у ребенка с инсулинозависимым сахарным диабетом, необходимо дать ребенку

- А. Молока
- Б. Напиток с сахарозаменителем
- В. Сахар или сладкий напиток
- Г. Воды

Наиболее частой формой желчного пузыря у грудных детей является

- А. S-образная
- Б. Цилиндрическая
- В. Округлая
- Г. Веретенообразная

При диссеминированных процессах в легких характер одышки является

- А. Смешанным
- Б. Рестриктивным
- В. Экспираторным
- Г. Инспираторным

Прибор для измерения толщины кожной складки называют

- А. Толстотным циркулем
- Б. Динамометром
- В. Калиперометром
- Г. Пикфлоуметром

Ребенок устойчиво сидит с поддержкой, устойчиво держа голову с _____ месяцев

- А. 5
- Б. 6,5
- В. 5,5
- Г. 6

Препаратами выбора при стрептококковой пневмонии являются

- А. Аминогликозиды
- Б. Макролиды
- В. Фторхинолоны
- Г. Аминопенициллины

Ребёнок с железодефицитной анемией средней степени тяжести относится к группе здоровья

- А. I
- Б. IV
- В. V
- Г. III

Для профилактики пищевой аллергии предпочтительны смеси

- А. Адаптированные кисломолочные
- Б. На основе сои
- В. На основе козьего молока
- Г. Частичногидролизированные

Типичным клиническим изменением при токсокарозе является

- А. Снижение остроты зрения
- Б. Зуд в области заднего прохода
- В. Боль при движении в суставах
- Г. Гемоколит

Из врожденных аномалий костной системы наиболее часто

- А. Встречается врожденный вывих бедра
- Б. Встречаются врожденные остеодисплазии
- В. Встречаются наследственные хондродисплазии
- Г. Встречаются пороки развития костей

Частыми дерматологическими изменениями при ВИЧ-инфекции у детей являются

- А. Трофические изменения, некрозы
- Б. Опухоли
- В. Участки депигментации
- Г. Грибковые, бактериальные и вирусные поражения кожи

К лабораторным признакам фазы коагулопатии и тромбоцитопении потребления синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови у новорожденных детей относят

- А. Удлинение времени свертывания крови
- Б. Укорочение времени свертывания и времени кровотечения
- В. Укорочение активированного частичного тромбопластинового времени
- Г. Нормальный уровень тромбоцитов в крови

Внезапное появление цианоза у новорожденного в горизонтальном положении и его исчезновение в вертикальном положении свидетельствует о

- А. Болезни гиалиновых мембран
- Б. Врожденном пороке сердца
- В. Диафрагмальной грыже
- Г. Аспирационном синдроме

Ревакцинация против туберкулеза в условиях детской поликлиники

- А. Проводится только по эпидпоказаниям
- Б. Проводится в возрасте 6-7 лет
- В. Проводится в возрасте 14 лет
- Г. Не проводится

К лекарственным препаратам, применяемым для этиотропной терапии кори, относят

- А. Интерфероны
- Б. Антимикотики
- В. Антибиотики
- Г. Антипротозойные препараты

Плазматические клетки, непосредственно вырабатывающие антитела, образуются из

- А. В-лимфоцитов
- Б. Базофилов
- В. Макрофагов
- Г. Нейтрофилов

Сочетание абактериальной лейкоцитурии, протеинурии, гематурии характерно для

- А. Интерстициального нефрита
- Б. Цистита
- В. Гломерулонефрита
- Г. Пиелонефрита

Количество нефронов в почках новорождённого составляет (млн)

- А. 1
- Б. 2
- В. 4-5
- Г. 6-7

Значимое повышение сывороточной амилазы указывает на

- А. Перитонит
- Б. Острый аппендицит
- В. Острый гастрит
- Г. Острый панкреатит

В развитии острого панкреатита главенствующая роль принадлежит

- А. Микроциркуляторным нарушениям
- Б. Нарушению лимфооттока
- В. Микробной флоре
- Г. Аутоферментной агрессии

Через 2 часа после нагрузки глюкозой диагноз «сахарный диабет» ставится при гликемии более (в ммоль/л)

- А. 6,1
- Б. 11,1
- В. 7,8
- Г. 10

Для гемодинамической коррекции вПС с единственным полноценным желудочком сердца показано выполнение операции

- А. Фонтена
- Б. Растелли
- В. Росса
- Г. Рашкинда

Правое легкое имеет

- А. 2 Доли
- Б. 3 Доли
- В. 1 Долю
- Г. 5 Долей

Вакцинацию против ротавирусной инфекции проводят

- А. Однократно
- Б. Двукратно с интервалом 3 месяца
- В. Двукратно с интервалом 1,5 месяца
- Г. Трехкратно с интервалом не менее 1 месяца

При конституционально-экзогенном ожирении у детей избыточное отложение жира

- А. Выявляется на конечностях
- Б. Распределяется равномерно
- В. Определяется в области лица
- Г. Отмечается в области пупка

Какая используется схема вакцинации ребёнка 7 месяцев против гемофильной инфекции?

- А. 2 Раза с интервалом 1-2 месяца, с ревакцинацией через 1 год
- Б. 1 Раз с интервалом 1-2 месяца, без ревакцинации
- В. 2 Раза с интервалом 1-2 месяца, без ревакцинации
- Г. 3 Раза с интервалом 1-2 месяца, с ревакцинацией через 1 год

Антибиотикотерапия при язвенном колите применяется

- А. Для профилактики рецидивов заболевания
- Б. Для остановки выраженных кровотечений
- В. При неэффективности салицилатов
- Г. При наличии септических осложнений

Мама заметила у месячной дочери прозрачную жидкость в пупке, педиатр проверил наличие отделяемого в пупке и пропальпировал образование в области пупка, при операции выявлено кистозное образование, которое соединяется с мочевым пузырем, диагноз _____ наиболее вероятный

- А. Незаращение желточного протока
- Б. Омфалоцеле
- В. Киста урахуса
- Г. Экстрофия мочевого пузыря

Для болевого синдрома при дисфункции билиарного тракта, связанного с повышением тонуса сфинктеров, характерны _____ боли в

- А. Постоянные интенсивные; правом подреберье
- Б. Опоясывающие; области желудка и спины
- В. Приступообразные кратковременные; правом подреберье
- Г. Тупые; околопупочной области

Характерным для крапивницы элементом сыпи является

- А. Волдырь
- Б. Эрозия
- В. Язва
- Г. Гнойник

Дебют клинических проявлений целиакии происходит преимущественно после введения

- А. Фруктового пюре
- Б. Каш
- В. Молочных смесей
- Г. Овощного пюре

Уробилиноген образуется в

- А. Почках
- Б. Мочевом пузыре
- В. Печени
- Г. Кишечнике

Больные с целиакией могут употреблять

- А. Кукурузную кашу
- Б. Ржаной хлеб
- В. Изделия из пшеничного теста
- Г. Ячменную кашу

Происхождение мочекаменной болезни у детей определяется

- А. Полиэтиологической теорией
- Б. Нарушением водно-электролитного баланса
- В. Аномалией развития органов мочевой системы
- Г. Эндокринными нарушениями

Нейтрофилёз отмечается при

- А. Пневмонии
- Б. Коклюше
- В. Гриппе
- Г. Краснухе

Анализ мочи по нечипоренко следует проводить при

- А. Бактериурии
- Б. Оксалурии
- В. Протеинурии
- Г. Лейкоцитурии

Показанием к плановой холецистэктомии является наличие

- А. Камней в печеночных протоках
- Б. Аномалии желчного пузыря
- В. Камней в желчном пузыре
- Г. Хронического холецистита

Дневной сон у ребёнка в целях профилактики когнитивных и поведенческих расстройств необходимо сохранять до (в годах)

- А. 2-3
- Б. 5-6
- В. 1-2
- Г. 3-4

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Для синдрома Жильбера характерно:

- А. Повышение уровня трансаминаз в крови
- Б. Повышение уровня прямого билирубина в крови
- В. Повышение уровня непрямого билирубина в крови
- Г. Ретикулоцитоз

Девочка 14 лет обратилась к врачу с жалобами на слабость, боли и припухание суставов, выпадение волос, красные пятна на коже щек, усиливающиеся после пребывания на солнце. При обследовании выявлены некоторое расширение границ, приглушение тонов сердца, единичные экстрасистолы, лейкопения, СОЭ - 32 мм/час. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Ювенильный ревматоидный артрит
- Б. Ревматизм
- В. Системная красная волчанка
- Г. Дерматомиозит
- Д. Фотодерматоз

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие этиологического фактора болезни:

1. *Streptococcus pneumoniae*
 2. *Streptococcus pyogenes*
 3. *Pseudomonas aeruginosa*
 4. *Mycoplasma pneumoniae*
 5. *Klebsiella pneumoniae*
- А. Внебольничная пневмония
Б. Внутрибольничная пневмония
- А. 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А
Б. 1А, 2А, 3А, 4Б, 5Б
В. 1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5А
Г. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5Б

В общем анализе мочи при типичной форме вирусного гепатита А определяется:

- А. Непрямой билирубин
- Б. Глюкоза
- В. Прямой билирубин
- Г. Белок
- Д. Лейкоциты

Серозный менингит может отмечаться при:

- А. Шигеллезе
- Б. Норовирусной инфекции
- В. Ротавирусной инфекции
- Г. Энтеровирусной инфекции

К характеристикам потенциала здоровья населения относятся показатели:

- А. Больничной летальности
- Б. Досуточной летальности
- В. Инвалидности
- Г. Охвата диспансерным наблюдением
- Д. Младенческой смертности

Выберите показатель, являющийся интегрированным показателем состояния здоровья детей в настоящее время:

- А. Показатель охвата профилактическими осмотрами
- Б. Распространенность заболеваний
- В. Показатель охвата диспансерным наблюдением

Дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации, со значительно сниженными функциональными возможностями организма, относятся к группе здоровья:

- А. 1
- Б. 2
- В. 3
- Г. 4
- Д. 5

Возраст ребенка 2 дня. Кожные покровы бледно-желтушные с рождения, подкожно-жировая клетчатка пастозна, печень выступает из-под реберной дуги на 3 см, селезенка - на 1 см, ребенок вялый. Мышечный тонус и рефлексы новорожденных снижены. Гемоглобин 150 г/л, свободный билирубин 210 мкмоль/л. У матери О (I) группа крови, резус-отрицательная. У ребенка – О (I) группа крови, резус-положительная. Наиболее вероятный диагноз?

- А. ГБН, отечная форма
- Б. ГБН, желтушная форма
- В. ГБН, анемическая форма
- Г. Транзиторная желтуха новорожденных
- Д. Анемия Минковского-Шоффара, гемолитический криз

Метаболический синдром у подростков, помимо артериальной гипертензии и ожирения, характеризуется:

- А. Гиперинсулинемией, гиперурикемией, гипогликемией
- Б. Гиперинсулинемией, гиперлипидемией, снижением толерантности к глюкозе
- В. Гипертриглицеридемией, гипербилирубинемией, гиперхолестеринемией
- Г. Гипокоагуляцией, гипогликемией, гиперурикемией
- Д. Нормохромной анемией, гипергликемией, гиперкреатинемией

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие физикальных изменений различным нозологическим формам:

1. Пневмония
 2. Обструктивный бронхит
 3. Гидроторакс
 4. Эмфизема легких
 5. Образование больших полостей, содержащих воздух
- А. Укорочение перкуторного звука над лёгким
Б. Коробочный оттенок перкуторного звука над лёгким
В. Тимпанический перкуторный звук над легким

А. 1А, 2Б, 3В, 4Б, 5Б

Б. 1А, 2Б, 3А, 4Б, 5В

В. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5В

Г. 1В, 2Б, 3А, 4Б, 5Б

Ребенка двух лет, у которого обнаружен крипторхизм в форме паховой эктопии, необходимо оперировать:

- А. Безотлагательно
Б. До 5 лет
В. До 10 лет
Г. До 12 лет

Показанием к экстренной госпитализации ребенка с болями в животе является:

- А. Двукратная рвота желудочным содержимым
Б. Стул по типу мелены
В. Стул по типу «овечьего»
Г. Дизурия
Д. Кашицеобразный стул до 4 раз в сутки

Основой улучшения первичной медико-санитарной помощи детям является:

- А. Введение общей врачебной практики (семейного врача)
Б. Повышение эффективности профилактической работы
В. Создание отделений неотложной помощи на базе детских поликлиник
Г. Патронаж больных детей на дому

Девочка 14 лет жалуется на мучительную головную боль, жажду, озноб. Больна первый день. температура тела 40,0*С. Сонливая, вялая. Кожные покровы цианотичные, на ягодицах, бедрах геморрагические высыпания от мелкоточечных петехий до кровоизлияний размером 3-4 см. Единичные розеолезные и розеолезно-папулезные элементы на коже живота, спины, верхних конечностей. Ригидность мышц затылка, симптом Кернига сомнительный. Пульс 120 ударов в минуту, слабого наполнения, тоны сердца глухие, АД 85/55 мм рт.ст., ЧД 28 в минуту. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Корь
- Б. Менингококцемия
- В. Осложненное течение гриппа
- Г. Менингит
- Д. Инфекционный мононуклеоз

Основным возбудителем бактериального тонзиллита у детей является:

- А. Дифтерийная палочка
- Б. Пиогенный стрептококк
- В. Анаэробные бактерии
- Г. Золотистый стафилококк
- Д. Пневмококк

Для лечения обструктивного ларинготрахеита со стенозом гортани 2 степени препаратом первого выбора является:

- А. Цетиризин внутрь
- Б. Амоксициллин внутрь
- В. Дексаметазон парентерально
- Г. Адреналин парентерально
- Д. Будесонид в ингаляциях

Какой признак из перечисленных не является нормой на электрокардиограмме у ребенка 5 лет:

- А. Частота сердечных сокращений 100 в минуту
- Б. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса
- В. Дыхательная аритмия
- Г. Высокий зубец Т

Ребенок в возрасте 8-ми месяцев с проявлениями атопического дерматита болен острым респираторным заболеванием. На 4-й день болезни появились лающий грубый кашель, одышка с втяжением уступчивых мест грудной клетки на вдохе, шумное дыхание, осиплость голоса. Появившиеся симптомы наиболее вероятно свидетельствуют о:

- А. Стенозирующем ларинготрахеите
- Б. Коклюше
- В. Аспирации инородного тела
- Г. Пневмонии
- Д. ОРВИ

Препарат первого выбора для лечения острого бактериального риносинусита у детей:

- А. Цефиксим
- Б. Ципрофлоксацин
- В. Кларитромицин
- Г. Амоксициллин + клавулановая кислота
- Д. Амикацин

Укажите оптимальные сроки введения мясного прикорма здоровому ребенку, находящемуся на грудном вскармливании:

- А. В 3 мес
- Б. В 4 мес
- В. В 6 мес
- Г. В 7-8 мес
- Д. После 10 мес

Ребенок 4-х месяцев болен первые сутки. Снижен аппетит. Отмечается резкая бледность кожных покровов. Дважды рвота после кормления. Стул по типу "малинового желе".

Наиболее вероятный диагноз:

- А. Пилоростеноз
- Б. Кишечная инвагинация
- В. Ротавирусный гастроэнтерит
- Г. Сальмонеллез
- Д. Дизентерия

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между анатомическими особенностями врожденного порока сердца и особенностями гемодинамических нарушений:

1. Стеноз легочной артерии
 2. Дефект межжелудочковой перегородки
 3. Открытый артериальный проток
 4. Коарктация аорты
 5. Тетрада Фалло
- А. ВПС «бледного» типа
Б. ВПС «синего» типа
В. ВПС без сброса крови
- А. 1Б, 2Б, 3Б, 4В, 5А
Б. 1А, 2А, 3А, 4В, 5Б
В. 1В, 2Б, 3А, 4В, 5Б

Мальчик 8 лет, находится в бессознательном состоянии в течение 1 часа, дыхание Куссмауля, гиперемия щек, сухость кожи, глазные яблоки мягкие, запах ацетона изо рта. В течение 3 недель беспокоила жажда, частые мочеиспускания, похудел на 1 кг. Ваш предварительный диагноз:

- А. Гипогликемическая кома
Б. Несахарный диабет
В. Диабетическая кетоацидотическая кома
Г. Острая почечная недостаточность

При гемолитической болезни новорожденных желтуха появляется:

- А. В первые сутки жизни
Б. На 3-и сутки жизни
В. На 5-е сутки жизни
Г. На 6-е сутки жизни
Д. На 10-е сутки жизни

Укажите симптомы, характерные для ротавирусного гастроэнтерита:

1. Лихорадка
 2. Диарея
 3. Рвота
 4. Примесь слизи и крови в стуле
 5. Снижение аппетита
- А. 1,2,3,4
Б. 1,2,3,4,5
В. 1,2,3,5

Для проведения эффективного непрямого массажа сердца ладони следует расположить:

- А. С обеих сторон грудной клетки
- Б. На границе средней и нижней трети грудины
- В. В пятом межреберном промежутке слева
- Г. На верхней части грудины

При целиакии противопоказаны:

- А. Грудное молоко
- Б. Адаптированные молочные смеси
- В. Злаки
- Г. Мясо
- Д. Овощи

Выберите препараты, которые могут быть назначены для лечения атипичной пневмонии у ребенка:

- 1. Амоксициллин
- 2. Амоксициллин-клавуланат
- 3. Кларитромицин
- 4. Амикацин
- 5. Ципрофлоксацин

- А. 1,2,3
- Б. 3,4
- В. 3,5
- Г. 3

Гемолитическая болезнь новорожденных обусловлена:

- А. Нарушением конъюгации билирубина
- Б. Внутриутробной инфекцией
- В. Иммунологическим конфликтом
- Г. Гемоглобинопатией
- Д. Тромбоцитопатией

Для тетрады Фалло характерно:

- А. Нормальное физическое развитие
- Б. Наличие повышенного аппетита
- В. Бессимптомное течение
- Г. Одышечно-цианотические приступы
- Д. Отставание в психическом развитии

Ребенок от женщины с резус-отрицательной кровью, страдающей анемией неясной этиологии, от 3-й беременности. Состояние при рождении расценено как очень тяжелое: стонет, беспокоен, периодически судороги, отечность мягких тканей, желтушность кожных покровов, гепатоспленомегалия. В анализе крови: гемоглобин 180 г/л, эритроциты $4,6 \times 10^{12}/л$, цветовой показатель 1,2. какой диагноз наиболее вероятен у ребенка?

- А. Гемолитическая болезнь новорожденного, анемическая форма
- Б. Гемолитическая болезнь новорожденного, желтушная форма
- В. Гемолитическая болезнь новорожденного, отечная форма
- Г. Наследственная сфероцитарная анемия Минковского-Шоффара
- Д. Менингоэнцефалит

Повышение артериального давления в качестве побочного эффекта может отмечаться при приеме:

- А. Симпатомиметиков
- Б. Ганглиоблокаторов
- В. Ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента
- Г. Бета-адреноблокаторов
- Д. Диуретиков

Для лечения острой аллергической крапивницы и ангионевротического отека используют:

- 1. Антигистаминные препараты
- 2. Холинолитики
- 3. Системные глюкокортикостероиды
- 4. Ареналин
- 5. Нестероидные противовоспалительные средства

- А. 1,2,3
- Б. 1,3,5
- В. 1,3
- Г. 1,2,3,4

Для пассивной иммунопрофилактики используют:

- А. Живые вакцины
- Б. Иммуноглобулины
- В. Анатоксины
- Г. Инактивированные вакцины
- Д. Бактериальные лизаты

Об эффективности профилактической работы в детской поликлинике можно судить по:

- А. Полноте и своевременности проведения профилактических осмотров
- Б. Динамике показателей здоровья детей
- В. Частоте госпитализаций в стационар
- Г. Количеству вызовов врача на дом

Доза для внутримышечного введения адреналина ребенку 8 лет с анафилактической реакцией составляет:

- А. 0,1 мг
- Б. 0,15 мг
- В. 0,3 мг
- Г. 0,5 мг
- Д. 1 мг

Выберите препараты, которые могут быть назначены для стартового лечения острого пиелонефрита у ребенка:

1. Амоксициллин
 2. Амоксициллин-клавуланат
 3. Джозамицин
 4. Цефуроксим
 5. Цефотаксим
- А. 1,2,3
 - Б. 2,4,5
 - В. 1,2,3,5

При развитии у ребенка афебрильных судорог прежде всего необходимо исключить:

- А. Менингит
- Б. Гипокальциемию
- В. Гипогликемию
- Г. Гипокалиемию
- Д. Эпилепсию

Для колитического синдрома характерно наличие в копрограмме:

- А. Мышечных волокон
- Б. Нейтрального жира
- В. Крахмала
- Г. Слизи, эритроцитов, лейкоцитов
- Д. Жирных кислот

Девочка 7 лет больна с 3-х лет бронхиальной астмой. В течение последних 2-х лет отмечаются ежедневные приступы, в том числе ночные, а также непродуктивный кашель. Принимает эпизодически эуфиллин. Какая базисная терапия показана ребенку?

- А. Монтелукаст натрия
- Б. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- В. Комбинация ингаляционных глюкокортикостероидов и бронходилататоров длительного действия
- Г. Системные глюкокортикостероиды
- Д. Базисная терапия не показана

Гипотрофия I степени у детей диагностируется при величине массы тела ниже:

- А. 3 центиля
- Б. 10 центиля
- В. 25 центиля
- Г. 50 центиля
- Д. 75 центиля

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между характером сыпи и заболеванием:

1. Мелкопятнистая сыпь на неизмененном фоне кожи
2. Геморрагическая «звездчатая» сыпь
3. Везикулярная сыпь с явлениями «ложного» полиморфизма
4. Пятнистопапулезная сыпь на неизмененном фоне кожи
5. Мелкоточечная сыпь на гиперемизированном фоне кожи

- А. Корь
- Б. Краснуха
- В. Скарлатина
- Г. Ветряная оспа
- Д. Менингококцемия

- А. 1А, 2Д, 3Г, 4Б, 5В
- Б. 1Б, 2Д, 3Г, 4А, 5В
- В. 1Б, 2Д, 3Г, 4В, 5А

На приеме педиатра подросток с жалобами на боль в горле, фебрильную температуру в течение 6 дней, затруднение носового дыхания. При осмотре: отек верхней половины лица, обширные наложения на небных миндалинах, увеличение шейных лимфоузлов, увеличение печени. каков наиболее вероятный диагноз:

- А. Стрептококковый тонзиллит
- Б. Аденовирусная инфекция
- В. Синдром Кавасаки
- Г. Инфекционный мононуклеоз
- Д. Острый бактериальный риносинусит

Какие вакцины противопоказаны ВИЧ-инфицированным детям:

- А. Вакцина против пневмококка
- Б. Вакцина против гепатита В
- В. Инактивированная полиомиелитная вакцина
- Г. БЦЖ
- Д. Вакцина против дифтерии и столбняка

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите возможную этиологию бактериального тонзиллофарингита у детей:

1. *Streptococcus pneumoniae*
2. *Streptococcus pyogenes*
3. *Pseudomonas aeruginosa*
4. *Corynebacterium diphtheriae*
5. *Staphylococcus aureus*

А. Вызывает бактериальный тонзиллофарингит у детей

Б. У иммунокомпетентных детей не вызывает тонзиллофарингита

А. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5А

Б. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5Б

В. 1Б, 2А, 3Б, 4Б, 5А

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клиническими симптомами и заболеванием:

1. Грипп
2. Парагрипп
3. Аденовирусная инфекция
4. Риновирусная инфекция
5. РС-инфекция

А. Острое начало заболевания с резко выраженными насморком и чиханием на фоне нормальной или субфебрильной температуры

Б. Заболевание с выраженными экссудативными проявлениями, конъюнктивитом на фоне высокой температуры

В. Острое начало заболевания с высокой лихорадкой и выраженными симптомами интоксикации

Г. Заболевание с частым поражением нижних дыхательных путей, развитием бронхолита

Д. Заболевание с выраженными катаральными явлениями в виде сухого грубого кашля, осиплостью голоса

А. 1Б, 2Д, 3Г, 4А, 5В

Б. 1В, 2Д, 3Б, 4А, 5Г

В. 1В, 2Г, 3Б, 4Д, 5А

Для нефротического синдрома у детей характерно:

- А. Массивная протеинурия и гипоальбуминемия
- Б. Гиполипидемия и артериальная гипертензия
- В. Массивные отёки и гипопротромбинемия
- Г. Гипофибриногенемия
- Д. Гипернатриемия

Для проведения заменного переливания крови при гемолитической болезни новорожденного по ABO-системе используют:

- А. Эритроцитарную массу 0(1) и плазму 0(1)
- Б. Эритроцитарную массу 0(1) и плазму группы крови ребенка
- В. Эритроцитарную массу 0(1) и плазму AB(IV)
- Г. Эритроцитарную массу группы крови ребенка и плазму AB(IV)
- Д. Эритроцитарную массу A(II) и плазму группы крови ребенка

У ребенка 1,5 лет фебрильная температура в течение 4-х дней, появились афты на слизистой оболочке полости рта и кровоточивость десен. Укажите предполагаемый диагноз:

- А. Цитомегаловирусная инфекция
- Б. Первичная герпетическая инфекция
- В. Герпангина
- Г. Кандидоз слизистых оболочек ротовой полости
- Д. Аденовирусная инфекция

При артериальной гипертензии наблюдается:

- А. Снижение сердечного выброса и повышение общепериферического сосудистого сопротивления
- Б. Повышение сердечного выброса и снижение общепериферического сосудистого сопротивления
- В. Нормальный сердечный выброс и снижение общепериферического сосудистого сопротивления
- Г. Повышение сердечного выброса и повышение общепериферического сосудистого сопротивления
- Д. Снижение сердечного выброса и снижение общепериферического сосудистого сопротивления

Объем форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) и максимальная пиковая скорость выдоха (ПСВ) у детей в возрасте старше 5 лет позволяют оценить:

- А. Степень рестриктивных нарушений в легких
- Б. Степень бронхиальной обструкции
- В. Переносимость физической нагрузки
- Г. Снижение общей емкости легких

Симптомами, требующими оказания экстренной помощи, являются все перечисленные, кроме:

- А. Нарушение проходимости дыхательных путей
- Б. Судороги
- В. Дыхательная недостаточность
- Г. Лихорадка
- Д. Шок

Для острого гломерулонефрита характерно:

- А. Олигурия, отеки на лице, повышение артериального давления
- Б. Олигурия, увеличение печени и селезенки
- В. Повышение артериального давления на руках, снижение артериального давления на ногах
- Г. Артралгии, петехиальные высыпания на коже

Каким нормативным документом гарантируется право граждан РФ на охрану здоровья:

- А. Трудовым кодексом
- Б. Конституцией РФ
- В. Гражданским кодексом
- Г. Федеральным законом об охране здоровья граждан

Показанием к гемодиализу при острой почечной недостаточности у детей являются:

- А. Массивные отёки
- Б. Уровень креатинина
- В. Прирост уровня креатинина за сутки и гиперкалиемия
- Г. Гипернатриемия в сочетании с артериальной гипертензией
- Д. Высокий уровень прямого билирубина в сочетании с повышенными показателями трансаминаз

При анафилактической реакции прежде всего следует ввести пациенту:

- А. Преднизолон
- Б. Хлоропирамин
- В. Бикарбонат натрия
- Г. Адреналин
- Д. Допамин

У ребенка 9 месяцев в тяжелом состоянии после перенесенной кишечной инфекции с олигурией, повышением мочевины крови, гемолитической анемией, петехиальными кровоизлияниями на коже и слизистых, тромбоцитопенией, можно думать о:

- А. Острой почечной недостаточности
- Б. Гемолитико-уремическом синдроме
- В. Остром гломерулонефрите
- Г. Геморрагической лихорадке с почечным синдромом
- Д. Остром пиелонефрите

Ребенок 7 лет перенес ангину. Через 10 дней появилась макрогематурия, периферические отеки. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Острый постстрептококковый гломерулонефрит
- Б. Геморрагический цистит
- В. Пиелонефрит
- Г. Мочекаменная болезнь

Наиболее грозным осложнением врожденных пороков сердца с гемодинамически значимым обогащением малого круга кровообращения является:

- А. Нарушение ритма сердца
- Б. Артериальная гипертензия
- В. Легочная гипертензия
- Г. Инсульт
- Д. Ишемия миокарда

У новорожденного в возрасте одних суток жизни отмечено появление желтухи. Кровь матери В(III) группы, резус-отрицательная, ребенка – АВ (IV) группы, резус положительная. Наиболее вероятный диагноз?

- А. Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-несовместимости
- Б. Гемолитическая болезнь новорожденного по АВО-системе
- В. Гемолитическая болезнь новорожденного по резус- и АВО-несовместимости
- Г. Транзиторная желтуха новорожденных

Укажите симптом, не характерный для атопического дерматита:

- А. Полиморфизм кожных высыпаний
- Б. Отсутствие зуда кожи
- В. Возрастная стадийность клинических проявлений
- Г. Локализация аллергической сыпи на коже лица, конечностей

У ребенка 1,5 лет фебрильная температура в течение 4-х дней, появились афты на слизистой полости рта и кровоточивость десен. Каков наиболее вероятный диагноз:

- А. Цитомегаловирусная инфекция
- Б. Первичная герпетическая инфекция
- В. Герпангина
- Г. Кандидоз слизистых ротовой полости
- Д. Аденовирусная инфекция

Причина кровоточивости при гемофилии?

- А. Тромбоцитопения
- Б. Тромбоцитопатия
- В. Нарушение проницаемости сосудистой стенки
- Г. Дефицит факторов свертывающей системы
- Д. Активация противосвертывающей системы

Основным физикальным признаком очаговой пневмонии является:

- А. Рассеянные разнокалиберные влажные хрипы
- Б. Выраженное притупление перкуторного звука
- В. Сухие рассеянные хрипы
- Г. Локальные мелкопузырчатые или крепитирующие хрипы
- Д. Дыхание с удлиненным выдохом

Какой показатель наиболее точно характеризует здравоохранение в стране:

- А. Показатель рождаемости
- Б. Младенческая смертность
- В. Оборот койки в стационаре
- Г. Охват профилактическими осмотрами населения
- Д. Число медицинских организаций

У ребенка 6 месяцев на фоне ОРВИ на 4 день болезни состояние ухудшилось, повысилась температура до 37,6*С, появилась одышка экспираторного характера, отмечается втяжение уступчивых мест грудной клетки при дыхании. При аускультации - удлиненный выдох, сухие свистящие и крепитирующие хрипы с обеих сторон. Ваш предположительный диагноз:

- А. Острый бронхит
- Б. Острый бронхиолит
- В. Инородное тело бронха
- Г. Пневмония

Для базисной терапии бронхиальной астмы назначают все перечисленные группы лекарств, кроме:

- А. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- Б. Короткодействующие бронходилататоры
- В. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов
- Г. Моноклональные антитела к IgE
- Д. Комбинация длительнодействующих бета2-агонистов с глюкокортикостероидами

Для острого постинфекционного нефрита характерно:

- А. Благоприятный прогноз
- Б. Циклическое течение
- В. Гематурия
- Г. Артериальная гипертензия
- Д. Все перечисленное верно

Выберите препарат, нормализующий моторную функцию желудочно-кишечного тракта:

- А. Висмута трикалия дицитрат
- Б. Домперидон
- В. Мебеверин
- Г. Ранитидин
- Д. Омепразол

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между биохимическими показателями крови и болезнью:

- 1. Низкий уровень общего белка
- 2. Снижение содержания ферритина
- 3. Высокий уровень кальция
- 4. Повышение уровня щелочной фосфатазы
- 5. Высокий уровень трансферрина
- А. Рахит, период разгара
- Б. Гипотрофия
- В. Железодефицитная анемия
- Г. Гипервитаминоз Д

- А. 1А, 2В, 3Г, 4Б, 5В
- Б. 1В, 2Б, 3А, 4Г, 5В
- В. 1Б, 2В, 3Г, 4А, 5В
- Г. 1Б, 2В, 3А, 4Г, 5В

Какие причины снижения частоты обструктивного бронхита с возрастом ребенка:

- А. Увеличение силы дыхательной мускулатуры
- Б. Уменьшение бактериальной аллергии
- В. Увеличение просвета бронхов
- Г. Уменьшение реактивности лимфатической ткани
- Д. Увеличение содержания Т-лимфоцитов в сыворотке крови

Причиной гипоксемии может являться:

1. Пневмония
2. Тромбоэмболия легочной артерии
3. Метгемоглобинемия
4. Анемия
5. Гипервентиляция

А. 1,2,3

Б. 1,2,3,4

В. 1,2,3,4,5

Г. 1,2,5

Начинать выведение ребенка 8 лет из приступа пароксизмальной тахикардии при артериальном давлении 90/60 мм рт ст целесообразно с применения:

А. Адреналина внутривенно

Б. Дигоксина внутримышечно

В. Изоптина внутривенно

Г. Вагусных проб

Д. АТФ внутривенно

При оценке физического развития восьмимесячного ребенка его масса тела составляла 7300 г, рост 68 см. Ребенок родился с массой тела 3200 г, ростом 50 см. До 4 мес был на грудном вскармливании, затем переведен на адаптированную молочную смесь. с 5,5 мес введен первый прикорм овсяной кашей, с 6 мес - овощное пюре, с 7 мес - мясо. До 5 мес развитие соответствовало возрасту, затем отмечена низкая прибавка массы тела, а после 7 мес - потеря массы тела. Стул 2-3 раза в день, периодически до 5 раз. Ваш предположительный диагноз:

А. Пищевая аллергия

Б. Болезнь Крона

В. Лимфангиоэктазия кишечника

Г. Целиакия

Д. Псевдомембранозный колит

Препарат первого выбора для купирования дыхательной недостаточности при обострении бронхиальной астмы у детей:

А. Будесонид

Б. Аминофиллин

В. Сальбутамол

Г. Ипратропия бромид

Д. Монтелукаст натрия

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между симптомами и заболеваниями:

1. Амимичное маскообразное лицо
 2. Алопеция
 3. Фотосенсибилизация
 4. Лиловая окраска век с параорбитальным отеком
 5. Энтезопатии
- А. Системная склеродермия
Б. Системная красная волчанка
В. Ювенильный дерматомиозит
Г. Анкилозирующий спондилоартрит

- А. 1Г, 2Б, 3Б, 4В, 5Г
Б. 1Б, 2А, 3Б, 4В, 5Г
В. 1А, 2Б, 3Б, 4В, 5Г
Г. 1А, 2А, 3Г, 4В, 5Б

Ребенок в возрасте 11 месяцев должен быть вакцинирован от:

1. Кори
 2. Дифтерии
 3. Гепатита В
 4. Пневмококковой инфекции
 5. Паротита
- А. 1,2,3,4
Б. 2,3,4
В. 2,3,4,5

Угроза билирубиновой энцефалопатии у доношенного новорожденного возникает при уровне билирубина в крови:

- А. Выше 100 мкмоль/л
Б. Выше 170 мкмоль/л
В. Выше 250 мкмоль/л
Г. Выше 340 мкмоль/л
Д. Выше 430 мкмоль/л

У ребенка 6 недель жизни в течение 2-х недель отмечается рвота после кормления. В весе не прибавляет. Какую патологию необходимо исключить в первую очередь:

- А. Пищевая аллергия
Б. Гастроэзофагеальный рефлюкс
В. Пилоростеноз
Г. Инвагинация кишечника
Д. Вирусный гастроэнтерит

Состояние, являющееся противопоказанием к кормлению грудью со стороны матери:

- А. Острая респираторная вирусная инфекция
- Б. Гепатит А
- В. Инсулинозависимый сахарный диабет
- Г. Аутоиммунный тиреоидит
- Д. Открытая форма туберкулеза

Укажите симптомы экзикоза у детей:

- 1. Западение большого родничка
 - 2. Сухость кожи и слизистых оболочек
 - 3. Полиурия
 - 4. Жажда
 - 5. Медленное расправление кожной складки
- А. 1,2,3,5
 - Б. 1,2,3,4,5
 - В. 1,2,4,5
 - Г. 1,2,5

Больной

Д., 13 лет. В течение 2 лет беспокоят приступообразные боли в правой подвздошной области, различные по длительности. Несколько раз госпитализировался с подозрением на острый аппендицит, однако оперативное вмешательство не было произведено. При последнем обострении боли в животе сопровождались диареей с примесью крови. При осмотре кожные покровы обычной окраски, признаки узловой эритемы, при пальпации живота - умеренная болезненность в правой подвздошной области. В анализе крови: гемоглобин - 100 г/л, СОЭ - 40 мм/час. Необходимо выполнить следующие диагностические исследования:

- А. Рентгенологическое исследование толстой кишки
- Б. Колоноскопия с лестничной биопсией
- В. Лапароскопия
- Г. Копрологическое исследование
- Д. Бактериологическое исследование кала

К лекарственным препаратам, используемым для достижения контроля бронхиальной астмы, относятся:

- А. β_2 -агонисты короткого действия
- Б. Иммуномодуляторы
- В. Ингаляционные холинолитики
- Г. Ингаляционные глюкокортикостероиды в комбинации с бронходилататорами длительного действия
- Д. β_2 -агонисты короткого действия в комбинации с холинолитиками

При гиповолемическом шоке пациенту следует ввести:

- А. Изотонический раствор хлорида натрия болюсно из расчета 20 мл/кг
- Б. Гипертонический раствор хлорида натрия болюсно из расчета 20 мл/кг
- В. Раствор глюкозы 5% из расчета 10 мл/кг
- Г. Раствор глюкозы 10% из расчета 5 мл/кг
- Д. Коллоидный раствор внутривенно медленно

Мочевой синдром при пиелонефрите характеризуется:

- А. Гематурией
- Б. Кристаллурией
- В. Протеинурией
- Г. Лейкоцитурией с бактериурией

Для вирусного крупа характерны симптомы:

- 1. Стридор
 - 2. Тризм
 - 3. Осиплость голоса
 - 4. Гиперсаливация
 - 5. Грубый кашель
- А. 1,2,3,5
 - Б. 1,3,4,5
 - В. 1,3,5
 - Г. 2,4

У ребенка 1,5 лет с детским церебральным параличом отмечается ежедневный кашель, поперхивания при кормлении. В возрасте 11 мес перенес пневмонию, в возрасте 6 и 14 месяцев - обструктивный бронхит. Какова наиболее вероятная причина кашля у ребенка?

- А. Бронхиальная астма
- Б. Первичный иммунодефицит
- В. Вторичный иммунодефицит
- Г. Коклюш
- Д. Хроническая аспирация пищи

Расширение сети медицинских реабилитационных центров для детей позволяет:

- А. Рационально использовать имеющийся коечный фонд
- Б. Более эффективно осуществлять медико-социальную реабилитацию детей

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между симптомами и заболеваниями:

1. Инфекция мочевыводящих путей
 2. Нефротический синдром
 3. Пиелонефрит
 4. Язвенная болезнь 12-перстной кишки
 5. Токсический гепатит
- А. Повышение уровня щелочной фосфатазы в крови
Б. Гипопротеинемия
В. Бактериурия
Г. Положительная реакция на хеликобактер методом ПЦР в копрофильtrate
Д. Снижение уровня холестерина в крови
- А. 1В, 2Б, 3В, 4Г, 5А
Б. 1Б, 2Б, 3В, 4Г, 5А
В. 1В, 2Д, 3В, 4Г, 5А

В каких случаях у ребенка следует исключать иммунодефицитное состояние:

1. Упорный кандидоз слизистых, микоз кожи и ногтей
 2. Частые острые респираторные заболевания
 3. Пневмоцистная пневмония
 4. Генерализованный БЦЖ-ит или БЦЖ-остеит
 5. Вакциноассоциированный полиомиелит
- А. 1,2,3,4,5
Б. 1,2,3,4
В. 1,3,4,5
Г. 2,3,4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клиническими проявлениями и критериями диагностики острой ревматической лихорадки:

1. Кардит
 2. Артралгии
 3. Хорея
 4. Лихорадка
 5. Анулярная эритема
- А. Большие критерии
Б. Малые критерии
- А. 1А, 2Б, 3А, 4Б, 5А
Б. 1А, 2А, 3А, 4Б, 5А
В. 1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5А
Г. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между группами здоровья и определяющими их критериями:

1. I

2. II

3. III

4. IV

5. V

А. Практически здоровые дети

Б. Дети перенесшие внутриутробно, во время родов какое либо заболевание

В. Больные дети с хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации

Г. Больные дети с хроническими заболеваниями в состоянии компенсации

Д. Больные дети с тяжелыми хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации

А. 1Д, 2В, 3Г, 4Б, 5А

Б. 1А, 2Г, 3В, 4Д, 5Б

В. 1А, 2Б, 3Г, 4В, 5Д

Для халазии кардии характерно наличие:

А. Боли натошак в эпигастрии

Б. Боли натошак в правом подреберье

В. Запоров

Г. Рецидивирующей рвоты

Укажите характерный признак кожных геморрагий при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре:

А. Возникновение после механического воздействия

Б. Полиморфизм (синяки, петехии, экхимозы)

В. Симметричность

Г. Излюбленная локализация - ягодицы и нижние конечности

Д. Монохромность

Для профилактики геморрагической болезни новорожденным вводят:

А. Витамин А

Б. Витамин К

В. Препарат железа

Г. Иммуноглобулин человека антирезус Rh0(D)

Д. Дексаметазон

Основным клиническим проявлением фенилкетонурии является поражение:

- А. Системы кроветворения
- Б. Центральной нервной системы
- В. Печени
- Г. Костной системы
- Д. Иммунной системы

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие следующих костных и мышечных аномалий:

1. Выраженное отложение жира в области мышц, симулирующее их хорошее развитие
2. Искривление свода стопы
3. Нижняя челюсть отходит назад, а верхняя выступает вперёд
4. Уменьшение массы мышц, истончение и нарушение трофики мышечных волокон
5. Неодинаковая степень развития мышц верхних и нижних конечностей

- А. Плоскостопие
- Б. Прогнатизм
- В. Мышечная атрофия
- Г. Мышечная асимметрия
- Д. Псевдогипертрофия

- А. 1А, 2Д, 3В, 4Б, 5Г
- Б. 1Д, 2А, 3В, 4Б, 5Г
- В. 1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Г
- Г. 1Г, 2А, 3Б, 4В, 5Д

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. К какой группе антимикробных средств относятся перечисленные лекарственные препараты:

1. Амикацин
 2. Цефепим
 3. Ванкомицин
 4. Кларитромицин
 5. Меропенем
- А. Цефалоспорины
 - Б. Карбапенемы
 - В. Макролиды
 - Г. Аминогликозиды
 - Д. Гликопептиды
- А. 1Г, 2Б, 3Д, 4В, 5Б
 - Б. 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б
 - В. 1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Б

Дефицит гуморального иммунитета чаще всего проявляется:

- А. Грибковыми заболеваниями
- Б. Частыми заболеваниями микробной этиологии
- В. Частыми вирусными заболеваниями
- Г. Задержкой психофизического развития

Какой из симптомов позволяет наиболее точно предположить атипичную этиологию внебольничной пневмонии у ребенка:

- А. Субфебрильная температура
- Б. Локальные крепитирующие хрипы в легких
- В. Невысокие маркеры бактериального воспаления в лабораторных анализах крови
- Г. Негомогенный характер инфильтративных теней на рентгенограмме
- Д. Неэффективность лечения бета-лактамом антибиотиком

При артериальной гипертензии у детей и подростков средние уровни систолического артериального давления и диастолического артериального давления из трех измерений равны или превышают возрастные значения:

- А. 25 перцентиля
- Б. 50 перцентиля
- В. 75 перцентиля
- Г. 90 перцентиля
- Д. 95 перцентиля

При энтеровирусной инфекции обычно отмечается:

- А. Некротическая ангина
- Б. Гингивостоматит
- В. Артралгии
- Г. Конъюнктивит
- Д. Лихорадка

Оценку физического развития ребенка первого года жизни следует проводить:

- А. Ежемесячно
- Б. Один раз в квартал
- В. Один раз в полгода
- Г. Один раз в год

Для железодефицитной анемии характерны:

1. Низкий уровень железа в сыворотке крови
2. Низкий уровень ферритина в сыворотке крови
3. Высокий уровень ферритина в сыворотке крови
4. Низкий уровень трансферрина в сыворотке крови
5. Высокий уровень трансферрина в сыворотке крови

А. 1,2,4

Б. 1,3,5

В. 1,2,5

Г. 2,4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие симптомов сердечной недостаточности:

1. Набухание яремных вен
2. Расширение границ относительной сердечной тупости влево.
3. Увеличение размеров печени
4. Периферические отеки
5. Влажные разнокалиберные хрипы в легких

А. Левожелудочковая сердечная недостаточность

Б. Правожелудочковая сердечная недостаточность

А. 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 5А

Б. 1А, 2Б, 3А, 4А, 5Б

В. 1Б, 2А, 3Б, 4Б, 5А

В клиническом анализе при коклюше обычно отмечается:

- А. Лейкопения
- Б. Тромбоцитопения
- В. Нейтрофильный лейкоцитоз
- Г. Лимфоцитоз
- Д. Атипичные мононуклеары

При проведении скрининга на выявление врожденной дисфункции коры надпочечников у новорожденных определяют:

- А. Кортизол
- Б. Адrenокортикотропный гормон
- В. 17-оксипрогестерон
- Г. 17 кетостероиды
- Д. Тестостерон

Фпрингоконъюнктивальная лихорадка наблюдается при:

- А. Гриппе
- Б. Аденовирусной инфекции
- В. РС-вирусной инфекции
- Г. Скарлатине
- Д. Кори

Для лечения острого вирусного бронхолита следует использовать:

- 1. Кислородотерапию**
 - 2. Бронходилататоры**
 - 3. Будесонид**
 - 4. Антибиотики**
 - 5. Муколитики**
- А. 2,3,4
 - Б. 1,2,3
 - В. 1,2
 - Г. 1,2,3,4,5

Каковы будут ваши рекомендации по диете на период болезни в случае острого вирусного гастроэнтерита у ребенка 7 месяцев, находящегося на грудном вскармливании и получающего прикорм в виде овощного пюре и безмолочных каш?

- А. Отмена грудного вскармливания и блюд прикорма, переход на кормление безлактозной смесью
- Б. Замена грудного молока безлактозной смесью, сохранение блюд прикорма в рационе
- В. Сохранение грудного вскармливания, блюда прикорма - по желанию ребенка
- Г. Переход на парентеральное питание на период болезни ребенка

Сепсис новорожденного чаще всего вызывают

- А. Вирусы
- Б. Бактерии
- В. Простейшие
- Г. Вирусно-бактериальные ассоциации
- Д. Грибы

Ребенку 8 мес, наблюдающемуся по поводу нейтропении (количество лейкоцитов в динамике 500-700 x 10⁹/л), противопоказана вакцинация:

- А. От пневмококка
- Б. От дифтерии, коклюша и столбняка
- В. От кори и паротита
- Г. От гриппа
- Д. Противопоказано введение любых вакцин

К группе риска по развитию бронхиальной астмы относятся:

- А. Часто болеющие дети
- Б. Дети с atopическими заболеваниями
- В. Дети, перенесшие пневмонию
- Г. Дети, имеющие хроническую патологию носоглотки
- Д. Дети, перенесшие РС-вирусный бронхиолит на первом году жизни

Укажите антигистаминные препараты 1 поколения:

- 1. Хлоропирамин
 - 2. Цетиризин
 - 3. Дифенгидрамин
 - 4. Клемастин
 - 5. Дезлоратадин
- А. 1,3,4
 - Б. 1,2,3
 - В. 2,5
 - Г. 1,3,4,5

На приеме педиатра подросток с жалобами на боль в горле, фебрильную температуру в течение 6 дней, затруднение носового дыхания. При осмотре: отек верхней половины лица, обширные наложения на небных миндалинах, увеличение шейных лимфатических узлов, увеличение печени. Установите диагноз:

- А. Стрептококковый тонзиллит
- Б. Аденовирусная инфекция
- В. Синдром Кавасаки
- Г. Инфекционный мононуклеоз
- Д. Острый бактериальный риносинусит

Показанием к проведению микционной цистогграфии является:

- 1. Учащенное болезненное мочеиспускание
 - 2. Повторные эпизоды пиелонефрита у ребенка
 - 3. Энурез
 - 4. Подозрение на наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса по данным УЗИ
 - 5. Гематурия
- А. 1,2,3,4
 - Б. 1,2,3,4,5
 - В. 2,4
 - Г. 1,2,4

При полной атриовентрикулярной блокаде желудочки сокращаются:

- А. Чаше, чем предсердия
- Б. Реже, чем предсердия

Для ювенильного артриа характерно:

- А. Циклическое течение с полным и быстрым обратным развитием
- Б. Наличие кардиальных изменений
- В. Длительное течение артрита
- Г. «Летучесть» суставной боли

Наиболее частой причиной длительного кашля у детей раннего возраста является:

- А. Бронхиальная астма
- Б. Гастроэзофагеальный рефлюкс
- В. Заболевания ЛОР-органов
- Г. Коклюш

Экссудативная энтеропатия связана с:

- А. Дисахаридазной недостаточностью
- Б. Непереносимостью белков коровьего молока
- В. Дефицитом пептидаз в кишечнике
- Г. Врожденной лимфангиозктазией
- Д. Повышенной вязкостью секретов экзокринных желез

При оказании неотложной помощи при обморожениях не рекомендуется:

- А. Постепенно согревать поражённый участок
- Б. Вскрывать пузыри на обмороженном участке
- В. Накладывать теплоизолирующую повязку
- Г. Накладывать повязку с антисептиком
- Д. Внутримышечно вводить преднизолон в дозе 3-5 мг/кг

В первую очередь в диагностических целях при тромбоцитопенической пурпуре необходимо исследовать?

- А. Коагулограмму
- Б. Общий анализ крови с определением количества тромбоцитов
- В. Исследование уровня протромбина
- Г. Биохимическое исследование крови
- Д. Иммунограмму

У мальчика 7 лет жалобы фебрильную температуру в течение 3-х недель, боли в костях, суставах, снижение аппетита. В клиническом анализе крови анемия, тромбоцитопения, лейкопения. Какое заболевание необходимо исключить прежде всего:

- А. Инфекционный мононуклеоз
- Б. Ревматоидный артрит с системным началом
- В. Лейкоз
- Г. Остеомиелит

Дисахаридазная недостаточность чаще всего проявляется в:

- А. Первые месяцы жизни
- Б. Первые три года жизни
- В. Дошкольном возрасте
- Г. Школьном возрасте
- Д. Подростковый период

Препарат выбора для лечения стрептококковой ангины:

- А. Амоксициллин
- Б. Джозамицин
- В. Цефиксим
- Г. Клиндамицин
- Д. Цефтриаксон

При подозрении на кровотечение из вен пищевода целесообразно прежде всего провести:

- А. Исследование гемостаза
- Б. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
- В. Эзофагогастродуоденоскопию
- Г. Рентгеноконтрастное исследование пищевода с барием
- Д. Исследование уровня гемоглобина в крови

Укажите симптомы эксикоза у детей:

1. Западение большого родничка
2. Сухость кожи и слизистых оболочек
3. Полиурия
4. Жажда
5. Медленное расправление кожной складки

- А. 1,2,4,5
- Б. 1,2,3,5
- В. 1,2,3,4,5
- Г. 1,2,5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Дайте характеристику перечисленным костным аномалиям.

1. Размягчение и истончение плоских костей черепа
2. Ладьевидное углубление на переднебоковых поверхностях грудной клетки в области прикрепления диафрагмы
3. Нарушение минерализации и плотности костной ткани
4. Размягчение костей
5. Избыточное образование остеοидной ткани без её минерализации в зонах роста костей

- А. Остеопороз
Б. Остеомаляция
В. Остеοидная гиперплазия
Г. Краниотабес
Д. Борозда Филатова-Гаррисона
- А. 1Б, 2А, 3Д, 4В, 5Г
Б. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В
В. 1Г, 2А, 3В, 4Г, 5Д
Г. 1Б, 2Д, 3А, 4Б, 5В

Укажите основной патоген, вызывающий бактериальный тонзиллит у детей:

- А. Пневмококк
Б. Гемофильная палочка
В. Бета-гемолитический стрептококк группы А
Г. Золотистый стафилококк
Д. Хламидии

Укажите симптомы, которые встречаются при синдроме Кавасаки у детей:

1. Лихорадка более 5 дней
 2. Склерит
 3. Полиморфная сыпь
 4. Артериальная гипертензия
 5. Боль в горле
- А. 1,2,4,5
Б. 1,3,5
В. 1,2,3

Укажите минимальную продолжительность базисной терапии бронхиальной астмы:

- А. 2 недели
Б. 1 месяц
В. 3 месяца
Г. 6 месяцев
Д. 1 год

Основным физикальным признаком полисегментарной пневмонии является:

- А. Притупление перкуторного звука
- Б. Рассеянные мелкопузырчатые хрипы
- В. Рассеянные сухие свистящие хрипы
- Г. Коробочный звук при перкуссии
- Д. Локальные разнокалиберные влажные хрипы

Продолжительность антибактериальной терапии при пиелонефрите у детей должна составлять:

- А. 5 дней
- Б. 7 дней
- В. 10-14 дней
- Г. 21 день

Основной этиологический фактор эпиглоттита у детей:

- А. *Streptococcus pneumoniae*
- Б. *Neisseria meningitidis*
- В. *Haemophilus influenzae*
- Г. *Staphylococcus aureus*
- Д. *Moraxella catarrhalis*

Наиболее частым возбудителем водянистой диареи являются:

- А. Шигеллы
- Б. Сальмонеллы
- В. Ротавирусы
- Г. Энтеровирусы
- Д. Аденовирусы

Основной причиной развития болезней накопления являются:

- А. Врожденные энзимопатии
- Б. Хроническое бактериальное воспаление
- В. Вирусные инфекции
- Г. Приобретенные энзимопатии
- Д. Онкологические заболевания.

С чего следует начинать оценку состояния пациента по алгоритму ABCDE, если он в сознании:

- А. Оценить проходимость дыхательных путей
- Б. Оценить тяжесть дыхательной недостаточности
- В. Оценить наличие нарушений кровообращения
- Г. Оценить степень нарушения сознания
- Д. Измерить температуру тела

Назовите основного возбудителя внебольничной пневмонии у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет

- А. Стафилококк
- Б. Стрептококк
- В. Пневмококк
- Г. Моракселла
- Д. Грам-отрицательная флора

Какие препараты используются для лечения пациента с ротавирусным гастроэнтеритом:

- 1. Антибиотики**
- 2. Сорбенты**
- 3. Противодиарейные средства, уменьшающие перистальтику кишечника**
- 4. Препараты для оральной и внутривенной регидратации**
- 5. Иммуномодуляторы**

- А. 1,2,3,4
- Б. 2,3,4,5
- В. 2,4
- Г. 2,4,5

С помощью пикфлоуметра измеряется:

- А. Общий объем выдоха
- Б. Жизненная емкость легких
- В. Остаточный объем легких
- Г. Максимальная скорость выдоха
- Д. Объем форсированного выдоха за первую секунду

Девочка 7 лет больна с 3-х лет бронхиальной астмой. В течение последних 2-х лет отмечаются ежедневные приступы, в том числе ночные, а также непродуктивный кашель.

Принимает эпизодически эуфиллин. Какая базисная терапия показана ребенку:

- А. Монтелукаст натрия
- Б. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- В. Комбинация ингаляционных глюкокортикостероидов и бронходилататоров длительного действия
- Г. Системные глюкокортикостероиды
- Д. Базисная терапия не показана

Девочка 14 лет обратилась к врачу с жалобами на слабость, боли и припухание суставов, выпадение волос, красные пятна на коже щек, усиливающиеся после пребывания на солнце. При обследовании выявлены некоторое расширение границ, приглушение тонов сердца, единичные экстрасистолы, лейкопения, СОЭ - 32 мм/час. Укажите предполагаемый диагноз:

- А. Ювенильный ревматоидный артрит
- Б. Ревматизм
- В. Системная красная волчанка
- Г. Дерматомиозит
- Д. Фотодерматоз

При лечении больного цитостатиками необходимо назначать регулярно:

- А. Консультацию окулиста
- Б. Полный анализ крови
- В. Рентгенографию костей для выявления остеопороза
- Г. Измерение артериального давления
- Д. Стерильную пункцию

У ребенка 10 мес на фоне вирусного гастроэнтерита диагностировано умеренное обезвоживание. Выражена жажда, пьет охотно, рвоты на момент обращения нет. Какое стартовое лечение показано пациенту в этом случае?

- А. парентеральная регидратация из расчета 100 мл/кг веса за первые 6 часов в стационаре
- Б. парентеральная регидратация из расчета 75 мл/кг веса за 4 часа в стационаре
- В. парентеральная регидратация из расчета 100 мл/кг веса за сутки в стационаре
- Г. оральная регидратация из расчета 75 мл/кг веса за 4 часа в стационаре
- Д. восполнение текущих потерь и физиологической потребности в жидкости в амбулаторных условиях

Доза для внутримышечного введения адреналина подростку 15 лет с анафилактической реакцией составляет:

- А. 0,1 мг
- Б. 0,15 мг
- В. 0,3 мг
- Г. 0,5 мг
- Д. 1 мг

Укажите препарат выбора для лечения менингококцемии:

- А. Цефалоспорин III поколения
- Б. Амоксициллин + клавулановая кислота
- В. Ципрофлоксацин
- Г. Джозамицин
- Д. Триметоприм-сульфаметоксазол

Для транзиторной (физиологической) желтухи новорожденных не характерно:

- А. Появление желтухи на 3-й день жизни
- Б. Удовлетворительное состояние ребенка
- В. Умеренно повышенный уровень свободного билирубина
- Г. Нормальный уровень связанного билирубина
- Д. Умеренная анемия

Что включается в понятие «перинатальная смертность»?

- А. Число детей, умерших до 1 года, на 1000 родившихся живыми
- Б. Число мертворожденных детей и детей, умерших на первой неделе жизни, от общего числа родившихся живыми и мертвыми
- В. Число мертворожденных
- Г. Число мертворожденных детей и детей, умерших на первом месяце жизни, от общего числа родившихся живыми и мертвыми
- Д. Число детей, умерших до 1 года, на 10 000 родившихся живыми

Для какого заболевания характерны гемартрозы:

- А. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
- Б. Геморрагический васкулит
- В. Лейкоз
- Г. Гемофилия
- Д. Болезнь Виллебранда

У ребенка 1,5 лет фебрильная температура, грубый лающий кашель, стридор, осиплость голоса, гиперсаливация, тризм. Укажите предполагаемый диагноз:

- А. Обструктивный ларинготрахеит
- Б. Эпиглоттит
- В. Обструктивный бронхит
- Г. Бронхиолит
- Д. Ларингит

При подозрении на феномен "гипертензии на белый халат" у ребенка показано проведение:

- А. Холтеровского мониторирования ЭКГ
- Б. Велоэргометрии
- В. Суточного мониторирования артериального давления
- Г. Исследование уровня кортизола в сыворотке крови

На консультацию к невропатологу направлен мальчик семи лет с остро развившейся мышечной слабостью и нарушением походки. Невропатолог обнаружил у ребенка признаки дистрофии, параорбитальный отек и гиперемию, гнусавый оттенок голоса, поперхивание, отек и плотность мышц плечевого пояса и бедер. Мальчик не мог поднять руки, сесть из положения лежа, выполнить приседание. Симптомы поражения центральной и периферической нервной системы не выявлены. Укажите предполагаемый диагноз:

- А. Системную красную волчанку
- Б. Системную склеродермию
- В. Гранулематоз Вегенера
- Г. Дерматомиозит
- Д. Смешанное заболевание соединительной ткани

На фоне лечения антибиотиками необходима диетическая коррекция путем:

- А. Ограничения поваренной соли
- Б. Введение продуктов, содержащих пре- и пробиотики
- В. Введение продуктов, обладающих защитными свойствами по отношению к слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта
- Г. Введение продуктов, богатых калием
- Д. Дополнительное введение белков, жиров и углеводов

Наиболее частая причина пищевой аллергии у детей первого года жизни:

- А. Белок коровьего молока
- Б. Желток куриного яйца
- В. Белок куриного яйца
- Г. Рыба
- Д. Глютен

Мама с мальчиком 1,5 года обратилась к участковому врачу-педиатру с жалобами на жидкий, обильный, зловонный стул, сниженный аппетит, отсутствие прибавки в весе. Изменение характера стула появилось через 1-1,5 месяца после расширения рациона ребенка, введения хлебобулочных изделий. Появился периодически жидкий стул, иногда обильный, зловонный. Ребенок при этом оставался активен. В течение 2-3 месяцев до обращения вес ребенка не меняется независимо от употребляемых продуктов. В это же период 3 раза отмечалась рвота без явных причин. В настоящее время мальчик получает ясельный стол. Предположительный диагноз:

- А. Целиакия
- Б. Гастроинтестинальная форма пищевой аллергии
- В. Дисбактериоз
- Г. Пищевая аллергия

Наиболее значимый побочный эффект фототерапии при гемолитической болезни новорожденного:

- А. Потеря жидкости
- Б. Диарея
- В. Сыпь на коже
- Г. Респираторные нарушения
- Д. Снижение аппетита

Абсолютное противопоказание к вскармливанию грудным молоком со стороны ребенка:

- А. Гемолитическая болезнь новорожденных
- Б. Галактоземия
- В. Внутривентрикулярное кровоизлияние
- Г. Недоношенность
- Д. Пороки челюстно-лицевой области

Проведение цистоскопии у детей в экстренном порядке показано при:

- А. Почечной колике
- Б. Острой задержке мочи
- В. Макрогематурии
- Г. Анурии

Для купирования гипогликемии показано введение:

- А. Раствор глюкозы 5% из расчета 10 мл/кг внутривенно струйно
- Б. Раствор глюкозы 10% из расчета 5 мл/кг внутривенно струйно
- В. Изотонический раствор хлорида натрия из расчета 10 мл/кг внутривенно струйно
- Г. Раствор Рингера из расчета 20 мл/кг
- Д. Инфузионная терапия не показана

Наличие каких заболеваний позволяет выявить неонатальный скрининг:

1. Фенилкетонурия
2. Галактоземия
3. Целиакия
4. Гипотериоз
5. Муковисцидоз

- А. 1,2,3,4
- Б. 1,2,4
- В. 1,2,4,5
- Г. 1,2,3

Селективность протеинурии определяют для оценки состояния:

- А. Петли Генле
- Б. Дистальных канальцев
- В. Мембраны клубочков
- Г. Нефрона
- Д. Проксимальных канальцев

У доношенного ребенка, который хорошо берет грудь, имеет небольшую потерю массы тела, розовые кожные покровы, на 3-й день жизни появилась иктеричность кожи. Укажите наиболее вероятную причину желтухи.

- А. Гемолитическая болезнь новорожденных
- Б. Транзиторная (физиологическая) желтуха
- В. Врожденный гепатит
- Г. Каротиновая пигментация из-за употребления матерью моркови
- Д. Атрезия желчных путей

К симптомам нарушения функции канальцев не относится:

- А. Снижение концентрационной функции почек
- Б. Аминоацидурия
- В. Глюкозурия
- Г. Гипергликемия
- Д. Метаболический ацидоз

Укажите основную группу лекарственных средств для лечения обструктивного бронхита у детей:

- А. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- Б. Бронходилататоры
- В. Муколитики
- Г. Аминопенициллины
- Д. Макролиды

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Дайте характеристику элементам кожной сыпи.

1. Эритема
 2. Петехии
 3. Экхимозы
 4. Папула
 5. Пузырёк
- А. Сине-фиолетового цвета, неправильной формы
Б. Первичный, выступающий над уровнем кожи, образуется при скоплении воспалительного инфильтрата в коже
В. Полостной, расположен поверхностно, заполнен серозным или кровянистым содержимым
Г. Участки гиперемии
- Д. Невоспалительные пятна, размером 1-2 мм
- А. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В
Б. 1Г, 2А, 3Д, 4Б, 5В
В. 1А, 2Д, 3А, 4В, 5Б
Г. 1Г, 2Б, 3В, 4А, 5Д

Для синдрома острой почечной недостаточности (стадия олигоанурии) характерно:

1. Ацидоз
 2. Азотемия
 3. Гиперкалиемия
 4. Гипопротеинемия
 5. Гипогликемия
- А. 1,2,3,4,5
Б. 1,2,3,4
В. 1,2,3
Г. 1,2,4

Для купирования анафилактического шока используют:

1. Адреналин
 2. Преднизолон
 3. Атропин
 4. Раствор хлорида натрия 0,9%
 5. Раствор глюкозы 5%
- А. 1,2,3
Б. 1,2,4
В. 1,2,3,4
Г. 1,2,5

Какой из растворов наиболее эффективен для оральной регидратации у детей с острой диареей?

- А. Раствор Рингера
- Б. Раствор для оральной регидратации
- В. 5% раствор глюкозы
- Г. Боржоми
- Д. Энтеродез

Доза для внутримышечного введения адреналина ребенку 3-х лет с анафилактической реакцией составляет:

- А. 0,1 мг
- Б. 0,15 мг
- В. 0,3 мг
- Г. 0,5 мг
- Д. 1 мг

При гипергликемии (глюкоза в крови > 15 ммоль/л) показано внутривенное струйное введение инсулина короткого действия в дозе:

- А. 0,1 Ед/кг
- Б. 1,0 Ед/кг
- В. 0,5 Ед/кг
- Г. 0,75 Ед/кг

Ребенок 1 года поступил в стационар с выраженной интоксикацией, одышкой смешанного характера, температурой 39*С. при перкуссии определяется коробочный оттенок перкуторного звука. Выслушиваются непостоянные сухие хрипы, справа под углом лопатки - стойкие мелкопузырчатые хрипы. Ваш предварительный диагноз:

- А. Пневмония
- Б. Острый бронхит
- В. Инородное тело бронха
- Г. Острый бронхиолит

При проведении сердечно-легочной реанимации детям частота компрессий грудной клетки в минуту составляет:

- А. 60
- Б. 80
- В. 100
- Г. 120

При муковисцидозе нарушается транспорт:

- А. Цинка
- Б. Брома и натрия
- В. Железа и натрия
- Г. Хлора и натрия
- Д. Водорода

Какая частота сердечных сокращений в покое свидетельствует о брадикардии у детей 7-9 лет:

- А. Менее 100 ударов в минуту
- Б. Менее 80 ударов в минуту
- В. Менее 60 ударов в минуту
- Г. Менее 40 ударов в минуту

Итоговая оценка состояния здоровья ребенка при проведении диспансеризации является функцией:

- А. Врачей-специалистов
- Б. Участкового педиатра
- В. Заотделением детской поликлиники

Для коклюша у детей характерны:

- 1. Грубый лающий кашель
 - 2. Приступообразный кашель с репризами
 - 3. Кашель до рвоты
 - 4. Дистанционные хрипы
 - 5. Сухие свистящие хрипы на выдохе
- А. 1,2,3
 - Б. 1,4,5
 - В. 2,3
 - Г. 4,5

Какие жаропонижающие средства безопасны для применения в детском возрасте?

- 1. Ибупрофен
 - 2. Ацетилсалициловая кислота
 - 3. Парацетамол
 - 4. Комбинация парацетамола с ибупрофеном
 - 5. Нимесулид
- А. 1,3,4,5
 - Б. 1,3,4
 - В. 1,2,3,4
 - Г. 1,3

Деятельность детских амбулаторно-поликлинических учреждений включает:

- А. Лечебно-диагностическую работу
- Б. Медико-социальную экспертизу
- В. Экспертизу стойкой нетрудоспособности

Какой из признаков наиболее значим для верификации диагноза пневмонии у ребенка:

- А. Лихорадка более 3-х дней
- Б. Локальные физикальные изменения в легких
- В. Нейтрофильный лейкоцитоз в клиническом анализе крови
- Г. Консолидация легочной ткани на рентгенограмме легких
- Д. Выраженная дыхательная недостаточность

Укажите симптомы, характерные для инфекции, вызванной парвовирусом В19:

- 1. Артралгии
 - 2. Симптом «нашлёпанных» щёк
 - 3. Нейтрофильный лейкоцитоз
 - 4. Инфекционная эритема
 - 5. Апластическая анемия
- А. 1,2,3
 - Б. 1,2,4,5
 - В. 2,4
 - Г. 2,3,4,5

Для решения вопроса о проведении заменного переливания крови при гемолитической болезни новорожденных в первые двое суток жизни ориентируются в первую очередь на:

- А. Абсолютные цифры билирубина в пуповинной крови
- Б. Уровень билирубина в периферической крови
- В. Почасовой прирост билирубина
- Г. Появление желтухи в первые часы жизни
- Д. Тяжелая анемия с рождения

У ребенка 1,5 лет фебрильная температура, грубый лающий кашель, стридор, осиплость голоса, гиперсаливация, тризм. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Обструктивный ларинготрахеит
- Б. Эпиглоттит
- В. Обструктивный бронхит
- Г. Бронхиолит
- Д. Ларингит

Для стрептококкового тонзиллита характерно все нижеперечисленное, кроме:

- А. Лихорадка и боль в горле
- Б. Яркая гиперемия задней стенки глотки (
- В. Симптомы интоксикации
- Г. Возраст пациентов до 3-х лет
- Д. Эффективность амоксициллина

У новорожденного в возрасте одних суток жизни отмечено появление желтухи. Кровь матери В(III) группы, резус-отрицательная, ребенка – АВ (IV) группы, резус положительная. Наиболее вероятный диагноз?

- А. Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-несовместимости
- Б. Гемолитическая болезнь новорожденного по ABO-системе
- В. Гемолитическая болезнь новорожденного по резус- и ABO-несовместимости
- Г. Транзиторная желтуха новорожденных
- Д. Ни один из перечисленных выше

Укажите препарат выбора для лечения скарлатины:

- А. Амоксициллин
- Б. Амоксициллин + клавулановая кислота
- В. Котримоксазол
- Г. Азитромицин
- Д. Цефтриаксон

Микроцитоз эритроцитов может встречаться при следующих заболеваниях:

- А. Железобдефицитная анемия
- Б. Талассемия
- В. Анемия при хронических заболеваниях
- Г. При всех указанных состояниях

Симптом, позволяющий заподозрить инвазивный характер диареи при кишечной инфекции:

- А. Лихорадка
- Б. Рвота
- В. Водянистый стул
- Г. Кровь в стуле

С чего следует начинать оценку состояния пациента по алгоритму ABCDE, если он без сознания:

- А. Оценить проходимость дыхательных путей
- Б. Оценить тяжесть дыхательной недостаточности
- В. Оценить наличие нарушений микроциркуляции
- Г. Оценить степень обезвоживания
- Д. Измерить температуру тела

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие изменений гемодинамики и характера врожденного порока сердца:

- 1. Дефект межжелудочковой перегородки
 - 2. Открытый артериальный проток
 - 3. Изолированный стеноз легочной артерии
 - 4. Тетрада Фалло
 - 5. Коарктация аорты
- А. Нецианотический с обогащением малого круга кровообращения
 - Б. Цианотический с обогащением малого круга кровообращения
 - В. Нецианотический с обеднением малого круга кровообращения
 - Г. Цианотический с обеднением малого круга кровообращения
 - Д. Нецианотический с обеднением большого круга кровообращения
- А. 1А, 2А, 3В, 4Г, 5Д
 - Б. 1Б, 2А, 3В, 4Д, 5Г
 - В. 1Г, 2А, 3В, 4Д, 5В

Укажите факторы риска рахита, связанного с дефицитом витамина D:

- 1. Грудное вскармливание
 - 2. Недостаточная инсоляция
 - 3. Безмолочная диета у ребенка
 - 4. Вегетарианство
 - 5. Синдром мальабсорбции
- А. 1,2,4,5
 - Б. 1,2,3,4,5
 - В. 2,4,5

Истинный круп развивается при:

- А. РС-инфекции
- Б. Парагриппе
- В. Аденовирусной инфекции
- Г. Стрептококковой ангине
- Д. Дифтерии

Для какого порока сердца характерна артериальная гипертензия:

- А. Тетрада Фалло
- Б. Дефект межжелудочковой перегородки
- В. Открытый артериальный проток
- Г. Коарктация аорты
- Д. Стеноз легочной артерии

Для коклюша характерным изменением в лабораторных анализах является:

- А. Нейтрофильный лейкоцитоз
- Б. Лимфоцитарный лейкоцитоз
- В. Тромбоцитоз
- Г. Лейкопения
- Д. Наличие атипичных мононуклеаров

Укажите препарат первого выбора для лечения острого среднего гнойного отита у детей:

- А. Азитромицин
- Б. Кларитромицин
- В. Амоксициллин + клавулановая кислота
- Г. Цефиксим
- Д. Цефтриаксон

Основная причина высокой концентрации билирубина у новорожденных от матерей, страдающих сахарным диабетом:

- А. Гемолиз эритроцитов
- Б. Запоздывание созревания глюкуронилтрансферазы
- В. Внепеченочная обструкция желчевыводящих путей
- Г. Внутрпеченочная обструкция желчевыводящих путей
- Д. Нарушение захвата билирубина печеночной клеткой

Возможные осложнения при остром стрептококковом тонзиллите (ангине):

1. Острый гломерулонефрит
2. Менингоэнцефалит
3. Паратонзиллярный абсцесс
4. Гепатит
5. Ревматическая лихорадка

- А. 1,3,5
- Б. 1,2,3,5
- В. 2,4
- Г. 1,5

У ребенка 8 мес диагностирован обструктивный бронхит, дыхательная недостаточность. При каком уровне насыщения крови кислородом следует начать кислородотерапию:

- 1. < 95%
- 2. < 92%
- 3. < 88%
- 4. < 80%

А. 1,2,3,4

Б. 2,3,4

В. 3,4

Г. 4

Суточное мониторирование артериального давления позволяет:

- А. Исключить гипертензию «белого халата»
- Б. Оценить тяжесть артериальной гипертензии
- В. Оценить длительность артериальной гипертензии в течение суток
- Г. Оценить эффективность терапии
- Д. все перечисленное верно

Основным симптомом синдрома укороченного интервала PQ является:

- А. Головная боль
- Б. Приступы тахикардии
- В. Артериальная гипертензия
- Г. Энурез
- Д. Эпизоды брадикардии

На консультацию к невропатологу направлен мальчик семи лет с остро развившейся мышечной слабостью и нарушением походки. Невропатолог обнаружил у ребенка признаки дистрофии, параорбитальный отек и гиперемию, гнусавый оттенок голоса, поперхивание, отек и плотность мышц плечевого пояса и бедер. Мальчик не мог поднять руки, сесть из положения лежа, выполнить приседание. Симптомы поражения центральной и периферической нервной системы не выявлены. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Системную красную волчанку
- Б. Системную склеродермию
- В. Гранулематоз Вегенера
- Г. Дерматомиозит
- Д. Смешанное заболевание соединительной ткани

Стойкое повышение артериального давления в детском возрасте наиболее часто связано с:

- А. Эссенциальной артериальной гипертензией
- Б. Ожирением
- В. Системными заболеваниями соединительной ткани
- Г. Патологией мочевыделительной системы

Нефритический синдром характерен для следующих болезней:

- А. Синдром Альпорта
- Б. Геморрагический васкулит
- В. Болезнь тонких базальных мембран
- Г. IgA-нефропатия
- Д. Все перечисленное верно

К лекарственным препаратам, используемым для достижения контроля бронхиальной астмы относят:

1. Бета2-агонисты короткого действия
2. Иммуномодуляторы
3. Ингаляционные холинолитики
4. Ингаляционные глюкокортикостероиды
5. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов

- А. 1,2,3
- Б. 2,4,5
- В. 4,5
- Г. 1,3,4,5

Основным триггером обострения бронхиальной астмы в раннем возрасте является:

- А. Пыльца деревьев
- Б. Прием нестероидных противовоспалительных средств
- В. Эпидермис животных
- Г. Вирусная инфекция
- Д. Физическая нагрузка

Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье подростков:

- А. Генетические
- Б. Наличие вредных привычек
- В. Все варианты

Наиболее эффективная форма работы детской поликлиники по формированию здоровья ребенка в возрасте до 3-х лет:

- А. Чтение лекций
- Б. Анкетирование родителей
- В. Патронаж

Укажите препарат выбора для лечения скарлатины:

- А. Котримоксазол
- Б. Амоксициллин
- В. Амоксициллин + клавулановая кислота
- Г. Азитромицин
- Д. Цефтриаксон

Укажите наиболее часто встречающийся этиологический фактор инфекции мочевой системы у детей:

- А. Золотистый стафилококк
- Б. Протей
- В. Синегнойная палочка
- Г. Бета-гемолитический стрептококк группы А
- Д. Кишечная палочка

Какие заболевания входят в неонатальный скрининг с 2006 г.?

- А. Фенилкетонурия
- Б. Фенилкетонурия, гипотиреоз
- В. Фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия
- Г. Фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия, муковисцидоз
- Д. Фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром.

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие физикальных изменений различным нозологическим формам:

1. Гипертрофия и дилатация левого желудочка сердца
2. Гипертрофия и дилатация правого желудочка сердца
3. Миокардит
4. Ателектаз правого легкого
5. Экссудативный перикардит

- А. Ослабление верхушечного толчка
- Б. Смещение верхушечного толчка вправо
- В. Усиление верхушечного толчка
- Г. Появление выраженного сердечного толчка

- А. 1В, 2Г, 3А, 4Б, 5Б
- Б. 1Г, 2В, 3В, 4Б, 5А
- В. 1В, 2В, 3Г, 4А, 5Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между показателями психомоторного развития и возрастом ребенка :

1. Узнает мать, поворачивает голову на звук, направленные движения ручек, переворачивается со спины на живот
2. Следит за человеком, движущимися предметами, поворачивает голову, начинает улыбаться
3. Самостоятельно сидит, произносит 8-10 осмысленных слов, сам берет чашку и пьет
4. Знает свое имя, шагает при поддержке за обе руки, находит и достает предмет из множества игрушек
5. Ползает, легко садится, подолгу лепечет, пьет из чашки, которую держит взрослый

- А. 1 месяц
- Б. 4 месяца
- В. 7 месяцев
- Г. 9 месяцев
- Д. 12 месяцев

- А. 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В
- Б. 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В
- В. 1А, 2Б, 3Д, 4Г, 5В

Выберите наиболее часто встречающегося возбудителя гнойного менингита у новорожденного ребенка:

- А. Гемофильная палочка
- Б. Пневмококк
- В. Гемолитический стрептококк (str. Agalactiae)
- Г. Менингококк

Врач-педиатр вызван экстренно в процедурный кабинет поликлиники к ребенку 7 лет с жалобами на высыпания по всему телу с зудом, затрудненное дыхание, кашель, першение в горле, головокружение, резкая слабость. До появления жалоб была выполнена внутримышечная инъекция 1 г цефтриаксона, разведенного в 3,5 мл 1% лидокаина, в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы глубоко. Предположительный диагноз:

- А. Анафилактический шок
- Б. Острая крапивница
- В. Синдром токсического шока
- Г. Острая сердечно-сосудистая недостаточность

Для аллергической крапивницы характерен ____ тип аллергической реакции

- А. Немедленный
- Б. Замедленный
- В. Цитотоксический
- Г. Иммунокомплексный

Датой установления инвалидности является

- А. Следующий день после регистрации документов в бюро
- Б. Дата регистрации документов в бюро МСЭ
- В. Дата непосредственного освидетельствования
- Г. Дата открытия больничного листа

Для диагностики гемофилии информативным является определение

- А. Количества D-димеров
- Б. Длительности кровотечения
- В. Уровня плазминогена в плазме
- Г. Времени свёртываемости

При анафилактическом шоке парентеральное введение лекарственных препаратов группы системных глюкокортикостероидов должно быть выполнено с момента установления диагноза не позднее (в минутах)

- А. 10
- Б. 3
- В. 5
- Г. 15

Болезнь вильсона развивается вследствие избыточного накопления в организме

- А. Железа
- Б. Меди
- В. Цинка
- Г. Кальция

Основным путем распространения вируса из спинальных ганглиев при опоясывающем герпесе является

- А. Неврогенный
- Б. Лимфогенный
- В. Воздушно-капельный
- Г. Гематогенный

У здорового ребёнка пальпируются лимфоузлы в количестве до _____ групп

- А. 2
- Б. 4
- В. 5
- Г. 3

Дизентерия по механизму развития диарейного синдрома (согласно классификации ВОЗ) относится к диарее

- А. Смешанной
- Б. Осмотической
- В. Инвазивной
- Г. Секреторной

У больного опоясывающим герпесом заразный период заканчивается на _____ высыпаний

- А. 10 День от начала
- Б. 5 День от момента окончания
- В. 5 День от начала
- Г. 21 День от начала

Для диагностики нарушения диастолической функции сердца наиболее информативным исследованием является

- А. Электрокардиография
- Б. Рентгенография сердца
- В. Электромиография
- Г. Допплерэхокардиография

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью _____ помощи

- А. Первичной медико-санитарной
- Б. Паллиативной
- В. Скорой
- Г. Специализированной

Наиболее типичным вариантом экзантемы при скарлатине является

- А. Пятнисто-папулезная
- Б. Везикулезная
- В. Буллезная
- Г. Розеолезно-папулезная

Суммарная оценка 3 балла по шкале комы Глазго соответствует

- А. Сопору
- Б. Глубокой коме
- В. Ясному сознанию
- Г. Смерти мозга

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) характеризуется

- А. Обнаружением частицы клеточных мембран возбудителей
- Б. Детекцией ДНК живого и погибшего возбудителя
- В. Диагностикой условно-патогенной флоры
- Г. Низкой специфичностью

Для больных гипотиреозом характерно наличие

- А. Диареи
- Б. Аритмии
- В. Запора
- Г. Артериальной гипертензии

В органах и тканях при туберкулезе образуются

- А. Везикулы
- Б. Пустулы
- В. Эрозии
- Г. Бугорки

Фактором, который в большей степени определяет клиническую картину при внутриутробных инфекциях, является

- А. Срок внутриутробного поражения
- Б. Путь проникновения инфекции
- В. Состояние реактивности организма плода
- Г. Токсичность возбудителя

Левая граница относительной сердечной тупости по отношению к срединно-ключичной линии у детей 6 лет находится

- А. На 1 см кнаружи
- Б. На 2 см кнутри
- В. На 1 см кнаружи
- Г. На 2 см кнаружи

Ребенку 3 месяцев с атопическим дерматитом и аллергией на белки коровьего молока, находящемуся на грудном вскармливании, следует рекомендовать

- А. Смесь на основе частичногидролизованного молочного белка
- Б. Смесь на основе высокогидролизованного молочного белка
- В. Адаптированную молочную смесь с пребиотиками
- Г. Грудное молоко и соблюдение мамой безмолочной диеты

Для базисной терапии персистирующей астмы у детей применяют

- А. Пролонгированные β -адреномиметики (монотерапия)
- Б. Короткодействующие β -адреномиметики
- В. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- Г. Ксантины

К территориям, неблагополучным по гепатиту а, относятся страны

- А. Австралии и Новой Зеландии
- Б. Юго-Восточной Азии, Африки
- В. Европы
- Г. Центральной Америки

Назначение у детей с лихорадкой ацетисалициловой кислоты (аспирина) противопоказано из-за

- А. Опасности развития синдрома Рея
- Б. Частых аллергических реакций
- В. Опасности развития агранулоцитоза
- Г. Частых диспептических нарушений

Суточная потребность в жирах ребенка в возрасте 4-6 месяцев составляет _____ г/кг/сутки

- А. 6
- Б. 7
- В. 8
- Г. 6,5

Для специфической профилактики коклюша используется

- А. Сыворотка реконвалесцента
- Б. АД-анатоксин
- В. АКДС-вакцина
- Г. АДС-М-анатоксин

Ребёнок с железодефицитной анемией средней степени тяжести относится к _____ группе здоровья

- А. III
- Б. IV
- В. I
- Г. V

Лимфоцитурия наиболее характерна для

- А. Почечной недостаточности
- Б. Гломерулонефрита
- В. Цистита
- Г. Пиелонефрита

Клинические проявления целиакии манифестируют после введения в рацион ребёнка _____ каши

- А. Гречневой
- Б. Овсяной
- В. Рисовой
- Г. Кукурузной

Лимфаденопатия при инфекционном мононуклеозе

- А. Генерализованная, с первых дней болезни до периода реконвалесценции
- Б. Генерализованная, с конца первой недели, сохраняется в течение нескольких месяцев
- В. Локализованная (любая группа лимфоузлов), продолжается весь лихорадочный период
- Г. Локализованная (шейная, подчелюстная), с первых дней болезни и до конца 2 недели заболевания

Типичным вариантом стула при энтеровирусной диарее является

- А. Жидкий, водянистый, с небольшим количеством слизи
- Б. Кашицеобразный, ярко-оранжевого цвета
- В. Скудный, с примесью зелени и крови
- Г. Ярко-оранжевый, брызжущий, непереваренный

Препаратом, который замедляет пассаж по тонкой кишке, является

- А. Вазелиновое масло
- Б. Панкреатин
- В. Лоперамид
- Г. Бетаин+пепсин

Причиной гипоосмолярной дегидратации является потеря жидкости

- А. Из желудочно-кишечного тракта
- Б. При гипервентиляции (тахипноэ)
- В. При кровопотере
- Г. При ожогах

В рационе детей второго полугодия жизни дефицит белков корректируется

- А. Сахарным сиропом
- Б. Сливками 10%
- В. Творогом
- Г. Подсолнечным маслом

Величина pq , характеризующая замедление атриовентрикулярной проводимости у детей школьного возраста, равна

- А. 0,18
- Б. 0,14
- В. 0,16
- Г. 0,20

Для лечения желудочковой тахикардии нельзя использовать

- А. Дигоксин
- Б. Амiodарон
- В. Прокаиnamид
- Г. Лидокаин

Самой частой причиной остановки сердца у детей является

- А. Артериальная гипертензия
- Б. Нарушение сердечного ритма
- В. Гипоксемия
- Г. Артериальная гипотензия

Наиболее неблагоприятное влияние на внутриутробное развитие плода в первые 2 месяца беременности оказывает

- А. Вирусная инфекция
- Б. Токсикоз беременности
- В. Повышенная физическая нагрузка
- Г. Неправильное питание

К вторичным иммунодефицитным состояниям относятся

- А. Инфекции (ВИЧ, ВЭБ, ЦМВ)
- Б. Дефекты системы фагоцитоза
- В. Дефекты системы комплемента
- Г. Аутовоспалительные заболевания

Сезонный характер коклюша выражен небольшим ростом заболеваемости в _____ период

- А. Весенне-летний
- Б. Осенне-зимний
- В. Зимний
- Г. Осенний

Альвеолоциты II порядка выполняют функцию синтеза

- А. Сурфактанта
- Б. Слизи
- В. Простагландинов
- Г. IgA

Число кругов кровообращения у плода

- А. 1
- Б. 4
- В. 3
- Г. 2

Этиология моногенных форм ожирения состоит в

- А. Наличии опухоли гипоталамуса
- Б. Сниженной функции щитовидной железы
- В. Мутации генов, контролирующих синтез анорексигенных пептидов
- Г. Низкой физической активности

Частота осмотра врачом-педиатром участковым при диспансерном наблюдении ребёнка с врождённым пороком сердца на первом месяце жизни составляет _____ раз (раза)

- А. 1
- Б. 3
- В. 4
- Г. 2

Высота стридора помогает определить характеристику обструкции в виде

- А. Фазы
- Б. Выраженности
- В. Степени
- Г. Уровня

Среди блокаторов кальциевых каналов у детей разрешён к применению в качестве гипотензивного

- А. Лацидипин
- Б. Амлодипин
- В. Верапамил
- Г. Нифедипин

«Первый перекрест» содержания лимфоцитов и нейтрофилов в периферической крови наблюдается в возрасте (в днях)

- А. 9-10
- Б. 2-3
- В. 15-16
- Г. 4-5

Этиология острого (простого) бронхита чаще всего

- А. Микоплазменная
- Б. Вирусная
- В. Хламидийная
- Г. Бактериальная

Для выявления уровня жидкости в полости плевры необходимо, в первую очередь, провести

- А. Рентгенографию лёгких в вертикальном положении
- Б. Латерографию
- В. Плевральную пункцию
- Г. Томографию лёгких в вертикальном положении

Препаратом первой линии в терапии анафилактического шока является

- А. Допамин
- Б. Атропин
- В. Эпинефрин
- Г. Фенилэфрин

Белково-энергетическая недостаточность имеет _____ степени/степеней

- А. 4
- Б. 3
- В. 6
- Г. 2

Созревание лёгких плода ускоряет

- А. Дексаметазон
- Б. Эуфиллин
- В. Гинипрал
- Г. Партусистен

К основным принципам диетотерапии при дисфункции билиарного тракта по гиперкинетическому типу относят

- А. Ограничение животных и растительных жиров
- Б. Ограничение объема белка
- В. Увеличение животных и растительных жиров
- Г. Увеличение объема грубой клетчатки

Основным УЗИ критерием обострения хронического бескаменного холецистита считается

- А. Увеличение желчного пузыря в размерах
- Б. Утолщение стенки желчного пузыря
- В. Деформация желчного пузыря
- Г. Признак застоя желчи

Показанием к проведению колоноскопии является наличие

- А. Атонического запора
- Б. Спастического запора
- В. Повторных кишечных кровотечений
- Г. Болей по ходу толстого кишечника

Для выявления билиарной недостаточности наиболее информативным методом является

- А. Копрологический анализ кала
- Б. Динамическая гепатобилисцинтиграфия
- В. Биохимическое исследование крови
- Г. УЗИ органов брюшной полости

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимается на (в годах)

- А. 2
- Б. 1
- В. 4
- Г. 3

Потребность в белке доношенного ребёнка второго полугодия жизни при естественном вскармливании составляет (в г/кг)

- А. 1,5-2,0
- Б. 2,6-2,9
- В. 2,2-2,5
- Г. 3,0-3,5

Препаратом, применяемым при проведении базисной терапии бронхиальной астмы у детей, является

- А. Аминофиллин
- Б. Сальбутамол
- В. Фенотерол
- Г. Флутиказон

Рентгенологическая картина сердца в виде «деревянного башмачка» характерна для

- А. Транспозиции магистральных артерий
- Б. Тетрады Фалло
- В. Тотального аномального дренажа легочных вен
- Г. Открытого атриовентрикулярного канала

Клиническим симптомом, характерным для ларингомалации, является

- А. Экспираторная одышка
- Б. Врожденный стридор
- В. Инспираторная одышка
- Г. Упорный навязчивый кашель

Причиной экспираторной одышки является

- А. Вирусный фарингит
- Б. Стенозирующий ларингит
- В. Бронхиальная обструкция
- Г. Долевая пневмония

Ведущую роль в лечении функциональных запоров у детей раннего возраста выполняет

- А. Фитотерапия
- Б. Лекарственная терапия
- В. Физиотерапия
- Г. Нормализация режима и диеты

У ребенка 2 лет с грубой варусной деформацией ног, отставанием в росте, гипофосфатемией, фосфатурией необходимо заподозрить

- А. Болезнь де-Тони-Дебре-Фанкони
- Б. Витамин-Д-зависимый рахит
- В. Витамин-Д-резистентный рахит
- Г. Почечный тубулярный ацидоз

Дегтеобразный стул появляется при повреждении

- А. Слепой кишки
- Б. Сигмовидной кишки
- В. Верхних отделов пищеварительного тракта
- Г. Прямой кишки

Карпопедальный спазм является характерным симптомом

- А. Эписиндрома
- Б. Гипокальциемии
- В. Гипофосфатемии
- Г. Фебрильных судорог

К методу, подтверждающему диагноз «целиакия», относят

- А. Биопсию слизистой оболочки тонкой кишки
- Б. Определение антител к клеткам желудка в крови
- В. Биопсию слизистой оболочки толстой кишки
- Г. Определение антистрептококковых антител в крови

Здоровому ребенку в возрасте 3 месяцев проводится вакцинация против

- А. Туберкулеза, полиомиелита, гемофильной инфекции
- Б. Дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции
- В. Гепатита В, полиомиелита, гемофильной инфекции
- Г. Кори, краснухи, эпидемического паротита

Показателем, наиболее точно отражающим состояние здравоохранения в стране, является

- А. Младенческая смертность
- Б. Уровень смертности
- В. Уровень рождаемости
- Г. Количество врачей на душу населения

При холангите характерными симптомами являются

- А. Приступы рвоты непереваренной пищей
- Б. Периодические ознобы
- В. Изжога, боли за грудиной
- Г. Тошнотковые боли

Длинноцепочечные жирные кислоты и моноглицериды всасываются

- А. В кровь
- Б. С предварительным эмульгированием желчными кислотами
- В. Без эмульгирования
- Г. Без ресинтеза в кишечной стенке

Первая вакцинация против гепатита В проводится в возрасте (в днях)

- А. 21
- Б. 14
- В. 1
- Г. 30

Наиболее часто злокачественные опухоли лор-органов у детей локализуются в

- А. Гортани и гортаноглотке
- Б. Ротоглотке
- В. Полости уха
- Г. Полости носа и околоносовых пазухах

Констриктивный перикардит чаще развивается при

- А. Грибковой инфекции
- Б. Туберкулезе
- В. Неопластическом процессе
- Г. Вирусной инфекции

У детей с недостаточностью соматотропного гормона (СТГ) наблюдают

- А. Горбинку на переносице
- Б. Макрогнатию
- В. Кукольное лицо
- Г. Низкое расположение ушей

Ахалазия кардии сопровождается

- А. Срыгиванием через 1 час после еды
- Б. Рвотой переваренной пищей
- В. Рвотой непереваренной пищей
- Г. Рвотой с примесью желчи

Энтеровирусная инфекция может осложниться у новорожденных

- А. Пиелонефритом и циститом
- Б. Серозным менингитом и миокардитом
- В. Отоанtritом и мастоидитом
- Г. Пневмонией и бронхитом

Диарея в первые недели жизни характерна при

- А. Дефиците энтерокиназы
- Б. Муковисцидозе
- В. Недостаточности лактазы
- Г. Целиакии

Мерой профилактики отставания в нервно-психическом развитии ребёнка с фенилкетонурией является

- А. Соблюдение аглиадиновой диеты
- Б. Назначение лечебных смесей
- В. Заместительная энзимотерапия
- Г. Назначение безлактозных смесей

Гиперлипидемия характерна для

- А. Тубулоинтерстициального нефрита
- Б. Нефротического синдрома
- В. Нефритического синдрома
- Г. Хронического пиелонефрита

К наиболее вероятным источникам коклюшной инфекции для новорожденных детей и детей первого года жизни относят

- А. Патронажную медсестру
- Б. Детей из организованных учреждений с круглосуточным пребыванием
- В. Медицинский персонал родильных домов
- Г. Родителей и всех членов семьи

Основным проявлением первичного иммунодефицита является склонность к

- А. Инфекциям
- Б. Метаболическим болезням
- В. Аутоиммунным заболеваниям
- Г. Аллергическим заболеваниям

Здоровым детям на естественном вскармливании первый прикорм дают в возрасте не ранее (в месяцах)

- А. 4
- Б. 8
- В. 5
- Г. 7

Аускультативная картина недостаточности митрального клапана характеризуется

- А. Диастолическим шумом в V точке
- Б. Дующим систолическим шумом на верхушке
- В. Усилением I тона на верхушке
- Г. Дующим диастолическим шумом на верхушке

Ранним признаком гиповолемического шока у детей является

- А. Олигурия
- Б. Тахикардия
- В. Брадикардия
- Г. Гипотония

При шигеллезе характерен стул

- А. Скудный, с грубой слизью, патологическими примесями
- Б. Жидкий, обильный, зловонный, с примесью жира
- В. Обильный, водянистый, типа «рисового отвара»
- Г. Жидкий, пенистый, без патологических примесей

Иностранным гражданам листок нетрудоспособности может быть выдан

- А. После оперативного вмешательства
- Б. Если он является застрахованным
- В. При заболевании туберкулезом
- Г. Во всех случаях нетрудоспособности

Наиболее частой формой поражения печени при гемохроматозе является

- А. Перипортальный гепатит
- Б. Гемосидероз
- В. Жировая дистрофия
- Г. Цирроз печени

Геморрагический синдром при геморрагическом васкулите связан преимущественно с/со

- А. Дефицитом факторов свёртывания
- Б. Снижением гемоглобина
- В. Тромбоцитопенией
- Г. Патологией сосудистой стенки

Доза микронизированной суспензии будесонида при стенозированном ларинготрахеите составляет ____ мг однократно

- А. 1
- Б. 2
- В. 0,5
- Г. 1,5

Домперидон относится к

- А. Прокинетикам
- Б. Антацидам
- В. Блокаторам H₂-гистаминорецепторов
- Г. Спазмолитикам

Абсолютным противопоказанием к проведению чрескожной биопсии печени является

- А. Острый гепатит
- Б. Инфекция
- В. Коагулопатия
- Г. Гепатомегалия

Для вакцинопрофилактики у детей вирусного гепатита а используют вакцину на основе

- А. Рекомбинантного антигена
- Б. Живого ослабленного вируса
- В. Противовирусного иммуноглобулина
- Г. Инаktivированного вируса

[Вернуться в начало](#)