

Тесты с вопросами по специальности «Педиатрия» для аттестации 1 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/pediatr/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Педиатрия» для аккредитации и других экзаменов (4700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/vrach_pediatriya/

2) Тесты для аккредитации «Неонатология» (3800 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/neonatologiya/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие этиологического фактора болезни:

1. Streptococcus pneumoniae
 2. Streptococcus pyogenes
 3. Pseudomonas aeruginosa
 4. Mycoplasma pneumoniae
 5. Klebsiella pneumoniae
- А. Внебольничная пневмония
Б. Внутрибольничная пневмония
- А. 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А
Б. 1А, 2А, 3А, 4Б, 5Б
В. 1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5А
Г. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5Б

При подозрении на кровотечение из вен пищевода целесообразно прежде всего провести:

- А. Исследование гемостаза
- Б. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
- В. Эзофагогастродуоденоскопию
- Г. Рентгеноконтрастное исследование пищевода с барием
- Д. Исследование уровня гемоглобина в крови

Возраст ребенка 2 дня. Кожные покровы бледно-желтушные с рождения, подкожно-жировая клетчатка пастозна, печень выступает из-под реберной дуги на 3 см, селезенка - на 1 см, ребенок вялый. Мышечный тонус и рефлексы новорожденных снижены. Гемоглобин 150 г/л, свободный билирубин 210 мкмоль/л. У матери О (I) группа крови, резус-отрицательная. У ребенка – О (I) группа крови, резус-положительная. Наиболее вероятный диагноз?

- А. ГБН, отечная форма
- Б. ГБН, желтушная форма
- В. ГБН, анемическая форма
- Г. Транзиторная желтуха новорожденных
- Д. Анемия Минковского-Шоффара, гемолитический криз

Ребенок в возрасте 11 месяцев при отсутствии противопоказаний должен быть вакцинирован от:

- 1. Кори
 - 2. Дифтерии
 - 3. Гепатита В
 - 4. Пневмококковой инфекции
 - 5. Паротита
- А. 1,2,3,4
 - Б. 2,3,4
 - В. 2,3,4,5

Суперинфекция дельта-вирусом представляет опасность для больных:

- А. Гепатитом А
- Б. Гепатитом В
- В. Гепатитом С
- Г. Хроническим панкреатитом
- Д. Язвенной болезнью

Мальчик 8 лет, находится в бессознательном состоянии в течение 1 часа, дыхание Куссмауля, гиперемия щек, сухость кожи, глазные яблоки мягкие, запах ацетона изо рта. В течение 3 недель беспокоила жажда, частые мочеиспускания, похудел на 1 кг. Ваш предварительный диагноз:

- А. Гипогликемическая кома
- Б. Несахарный диабет
- В. Диабетическая кетоацидотическая кома
- Г. Острая почечная недостаточность

Для купирования анафилактического шока используют:

- 1. Адреналин
- 2. Преднизолон
- 3. Атропин
- 4. Раствор хлорида натрия 0,9%
- 5. Раствор глюкозы 5%

- А. 1,2,3
- Б. 1,2,4
- В. 1,2,3,4
- Г. 1,2,5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между анатомическими особенностями врожденного порока сердца и особенностями гемодинамических нарушений:

- 1. Стеноз легочной артерии
- 2. Дефект межжелудочковой перегородки
- 3. Открытый артериальный проток
- 4. Коарктация аорты
- 5. Тетрада Фалло

- А. ВПС «бледного» типа
- Б. ВПС «синего» типа
- В. ВПС без сброса крови
- А. 1Б, 2Б, 3Б, 4В, 5А
- Б. 1В, 2Б, 3А, 4В, 5Б
- В. 1А, 2А, 3А, 4В, 5Б

Для какого порока сердца характерна артериальная гипертензия:

- А. Тетрада Фалло
- Б. Дефект межжелудочковой перегородки
- В. Открытый артериальный проток
- Г. Коарктация аорты
- Д. Стеноз легочной артерии

Абсолютное противопоказание к вскармливанию грудным молоком со стороны ребенка:

- А. Гемолитическая болезнь новорожденных
- Б. Галактоземия
- В. Внутрижелудочковое кровоизлияние
- Г. Недоношенность
- Д. Пороки челюстно-лицевой области

При хеликобактер - ассоциированном гастрите часто поражается:

- А. Кардиальная часть желудка
- Б. Антральная часть желудка
- В. Тело желудка
- Г. Весь желудок
- Д. Дно желудка

Для базисной терапии бронхиальной астмы назначают все перечисленные группы лекарств, кроме:

- А. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- Б. Короткодействующие β_2 -агонисты
- В. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов
- Г. Моноклональные антитела к IgE
- Д. Комбинация длительнодействующих β_2 -агонистов с глюкокортикостероидами

Соотношение артериального давления у здорового ребенка правильно в случаях, когда:

- А. АД на руках выше, чем на ногах на 10-15 мм рт.ст.
- Б. АД на руках и ногах одинаково
- В. АД на ногах выше, чем на руках на 10-15 мм рт.ст.
- Г. АД на правой руке на 10-15 мм рт.ст. выше, чем на левой руке.

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Укажите компоненты врожденного и приобретенного иммунитета:

1. Макрофаги
 2. Цитокины
 3. Специфические антитела
 4. Лейкоциты
 5. Система комплемента
- А. Врожденный иммунитет (естественный)**
Б. Приобретенный иммунитет (адаптивный)
- А. 1А, 2А, 3Б, 4Б, 5А
 - Б. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5А
 - В. 1Б, 2Б, 3Б, 4А, 5Б
 - Г. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5А

Укажите оптимальные сроки введения фруктового сока здоровому ребёнку, находящемуся на грудном вскармливании:

- А. В 2-3 месяца
- Б. В 3-4 месяца
- В. Не ранее 4-6 месяцев
- Г. В 1-2 месяца
- Д. В 3-4 недели

Симптомами, требующими оказания экстренной помощи являются все, кроме:

- А. Нарушение проходимости дыхательных путей
- Б. Судороги
- В. Дыхательная недостаточность
- Г. Лихорадка
- Д. Шок

Ребенок 1 года поступил в стационар с выраженной интоксикацией, одышкой смешанного характера, температурой 38*С. При перкуссии определяется коробочный оттенок перкуторного звука. Выслушиваются непостоянные сухие хрипы, справа под углом лопатки — стойкие мелкопузырчатые хрипы. Поставьте предварительный диагноз:

- А. Острый бронхит
- Б. Острый бронхиолит
- В. Инородное тело бронха
- Г. Пневмония

Назовите антисекреторный препарат, относящийся к ингибиторам протонной помпы:

- А. Циметидин
- Б. Омепразол
- В. Ранитидин
- Г. Мебеверин
- Д. Роксатидин

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между группами здоровья и определяющими их критериями:

1. I
2. II
3. III
4. IV
5. V

А. Практически здоровые дети

Б. Дети перенесшие внутриутробно, во время родов какое либо заболевание

В. Больные дети с хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации

Г. Больные дети с хроническими заболеваниями в состоянии компенсации

Д. Больные дети с тяжелыми хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации

А. 1Д, 2В, 3Г, 4Б, 5А

Б. 1А, 2Г, 3В, 4Д, 5Б

В. 1А, 2Б, 3Г, 4В, 5Д

При гиповолемическом шоке пациенту следует ввести:

- А. Изотонический раствор хлорида натрия болюсно из расчета 20 мл/кг
- Б. Гипертонический раствор хлорида натрия болюсно из расчета 20 мл/кг
- В. Раствор глюкозы 5% из расчета 10 мл/кг
- Г. Раствор глюкозы 10% из расчета 5 мл/кг
- Д. Коллоидный раствор внутривенно медленно

Для расчета показателя младенческой смертности необходима информация о:

- А. Численности детей в возрасте до 1 года жизни
- Б. Численности детей, родившихся живыми в изучаемом году

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клиническими симптомами и заболеванием:

1. Грипп

2. Парагрипп

3. Аденовирусная инфекция

4. Риновирусная инфекция

5. РС-инфекция

А. Острое начало заболевания с резко выраженными насморком и чиханием на фоне нормальной или субфебрильной температуры

Б. Заболевание с выраженными экссудативными проявлениями, конъюнктивитом на фоне высокой температуры

В. Острое начало заболевания с высокой лихорадкой и выраженными симптомами интоксикации

Г. Заболевание с частым поражением нижних дыхательных путей, развитием бронхолита

Д. Заболевание с выраженными катаральными явлениями в виде сухого грубого кашля, осиплостью голоса

А. 1Б, 2Д, 3Г, 4А, 5В

Б. 1В, 2Д, 3Б, 4А, 5Г

В. 1В, 2Г, 3Б, 4Д, 5А

Наиболее частым осложнением язвенной болезни у детей является:

А. Кровотечение

Б. Перфорация

В. Пенетрация в поджелудочную железу

Г. Малигнизация

Д. Стеноз

Выберите препараты, которые могут быть назначены для лечения атипичной пневмонии у ребенка:

1. Амоксициллин

2. Амоксициллин-клавуланат

3. Кларитромицин

4. Амикацин

5. Ципрофлоксацин

А. 1,2,3

Б. 3,4

В. 3,5

Г. 3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. К какой группе антимикробных средств относятся перечисленные лекарственные препараты:

1. Амикацин
 2. Цефепим
 3. Ванкомицин
 4. Кларитромицин
 5. Меропенем
 - А. Цефалоспорины
 - Б. Карбапенемы
 - В. Макролиды
 - Г. Аминогликозиды
 - Д. Гликопептиды
- А. 1Г, 2Б, 3Д, 4В, 5Б
Б. 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б
В. 1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между симптомами и заболеваниями:

1. Инфекция мочевыводящих путей
 2. Нефротический синдром
 3. Пиелонефрит
 4. Язвенная болезнь 12-перстной кишки
 5. Токсический гепатит
 - А. Повышение уровня щелочной фосфатазы в крови
 - Б. Гипопротеинемия
 - В. Бактериурия
 - Г. Положительная реакция на хеликобактер методом ПЦР в копрофильtrate
 - Д. Снижение уровня холестерина в крови
- А. 1В, 2Б, 3В, 4Г, 5А
Б. 1Б, 2Б, 3В, 4Г, 5А
В. 1В, 2Д, 3В, 4Г, 5А

Какой показатель наиболее точно характеризует здравоохранение в стране:

- А. Показатель рождаемости
- Б. Число медицинских организаций
- В. Оборот койки в стационаре
- Г. Охват профилактическими осмотрами населения
- Д. Младенческая смертность

Объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) и максимальная скорость выдоха (ПСВ) у детей в возрасте старше 5 лет позволяют оценить:

- А. Степень рестриктивных изменений в легких
- Б. Степень бронхиальной обструкции
- В. Переносимость физической нагрузки
- Г. Снижение общей емкости легких

Укажите симптомы, которые встречаются при синдроме Кавасаки у детей:

- 1. Лихорадка более 5 дней
 - 2. Склерит
 - 3. Полиморфная сыпь
 - 4. Артериальная гипертензия
 - 5. Боль в горле
- А. 1,2,4,5
 - Б. 1,3,5
 - В. 1,2,3

Показанием к проведению микционной цистографии является:

- 1. Учащенное болезненное мочеиспускание
 - 2. Повторные эпизоды пиелонефрита у ребенка
 - 3. Энурез
 - 4. Подозрение на наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса по данным УЗИ
 - 5. Гематурия
- А. 1,2,3,4
 - Б. 1,2,3,4,5
 - В. 2,4
 - Г. 1,2,4

Синдром пролапса митрального клапана необходимо дифференцировать прежде всего с:

- А. Недостаточностью митрального клапана
- Б. Аортальным стенозом
- В. Недостаточностью трикуспидального клапана
- Г. Дефектом межжелудочковой перегородки
- Д. Кардитом

Макроцитоз отмечается при следующих состояниях:

- А. Дефицит витамина В12 и фолатов
- Б. После приёма вальпроатов, фенобарбитала, карбамазепинов
- В. Анемия Фанкони, Блэкфана-Даймонда
- Г. Неонатальный период
- Д. При всех указанных состояниях

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие результатов аускультации легких:

1. Симметричные сухие свистящие хрипы
2. Локальные крепитирующие хрипы
3. Локальное ослабление дыхания
4. Бронхиальное дыхание
5. Симметричные влажные разнокалиберные хрипы

А. Пневмония

Б. Бронхит

В. Обструктивный бронхит

А. 1В, 2А, 3А, 4А, 5Б

Б. 1Б, 2А, 3А, 4А, 5В

В. 1В, 2А, 3А, 4Б, 5В

У ребенка 6 месяцев на фоне ОРВИ на 4 день заболевания состояние ухудшилось, вновь повысилась температура до 37,8*С, появилась одышка экспираторного характера, втяжение уступчивых мест рудной клетки при дыхании. При аускультации — удлиненный выдох, сухие свистящие и крепитирующие хрипы с обеих сторон. Ваш предварительный диагноз:

А. Острый бронхит

Б. Острый бронхиолит

В. Инородное тело бронха

Г. Пневмония

Дети с лактазной недостаточностью не переносят:

А. Хлеб

Б. Овощи

В. Молоко

Г. Творог

Д. Мясо

Какие изменения в клиническом анализе мочи позволяют диагностировать инфекцию мочевых путей у ребенка:

А. Микрогематурия

Б. Пиурия

В. Оксалатурия

Г. Протеинурия

Д. Макрогематурия

Укажите препарат первого выбора для лечения обострения бронхиальной астмы у детей:

- А. Комбинация сальметерола с флутиказоном
- Б. Сальбутамол
- В. Фенотерол
- Г. Ипратропия бромид
- Д. Будесонид

У ребенка 8 мес диагностирован обструктивный бронхит, дыхательная недостаточность. При каком уровне насыщения крови кислородом следует начать кислородотерапию:

- 1. < 95%
 - 2. < 92%
 - 3. < 88%
 - 4. < 80%
- А. 1,2,3,4
 - Б. 2,3,4
 - В. 3,4
 - Г. 4

У ребенка 9 месяцев в тяжелом состоянии после перенесенной кишечной инфекции с олигурией, повышением мочевины крови, гемолитической анемией, петехиальными кровоизлияниями на коже и слизистых, тромбоцитопенией, можно думать о:

- А. Острой почечной недостаточности
- Б. Гемолитико-уремическом синдроме
- В. Остром гломерулонефрите
- Г. Геморрагической лихорадке с почечным синдромом
- Д. Остром пиелонефрите

Ребенку 8 мес, наблюдающемуся по поводу нейтропении (количество лейкоцитов в динамике 500-700 х 10⁹/л), противопоказана вакцинация:

- А. От пневмококка
- Б. От дифтерии, коклюша и столбняка
- В. От кори и паротита
- Г. От гриппа
- Д. Противопоказано введение любых вакцин

При энтеровирусной инфекции отмечается:

- А. Лихорадка
- Б. Некротическая ангина
- В. Артралгии
- Г. Конъюнктивит
- Д. Гепатоспленомегалия

Госпитальной называется пневмония, которая развивается:

- А. Не менее, чем через 24 часа после поступления пациента в стационар
- Б. Не менее, чем через 48 часов после поступления пациента в стационар
- В. После 72 часов нахождения пациента в стационаре
- Г. В стационаре вне зависимости от длительности пребывания в нем

Симптом, позволяющий заподозрить инвазивный характер диареи при кишечной инфекции:

- А. Лихорадка
- Б. Рвота
- В. Водянистый стул
- Г. Кровь в стуле
- Д. Боли в животе

Препарат первого выбора для лечения острого бактериального риносинусита у детей:

- А. Цефиксим
- Б. Ципрофлоксацин
- В. Кларитромицин
- Г. Амоксициллин-клавуланат
- Д. Амикацин

К характеристикам потенциала здоровья населения относятся показатели:

- А. Больничной летальности
- Б. Досуточной летальности
- В. Инвалидности
- Г. Охвата диспансерным наблюдением
- Д. Младенческой смертности

Укажите характерный признак кожных геморрагий при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре:

- А. Возникновение после механического воздействия
- Б. Полиморфизм (синяки, петехии, экхимозы)
- В. Симметричность
- Г. Излюбленная локализация – ягодицы и нижние конечности
- Д. Мононохромность

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие физикальных изменений различным нозологическим формам:

1. Гипертрофия и дилатация левого желудочка сердца
2. Гипертрофия и дилатация правого желудочка сердца

3. Миокардит

4. Ателектаз правого легкого

5. Экссудативный перикардит

А. Ослабление верхушечного толчка

Б. Смещение верхушечного толчка вправо

В. Усиление верхушечного толчка

Г. Появление выраженного сердечного толчка

А. 1Г, 2В, 3В, 4Б, 5А

Б. 1В, 2Г, 3А, 4Б, 5А

В. 1В, 2В, 3Г, 4А, 5Б

Для пассивной иммунопрофилактики используют:

А. Живые вакцины

Б. Иммуноглобулины

В. Анатоксины

Г. Инактивированные вакцины

Д. Бактериальные лизаты

Основным триггером обострения бронхиальной астмы в раннем возрасте является:

А. Пыльца деревьев

Б. Прием нестероидных противовоспалительных средств

В. Вирусная инфекция

Г. Эпидермис животных

Д. Физическая нагрузка

При оценке физического развития восьмимесячного ребенка его масса тела составляла 7300 г, рост 68 см. Ребенок родился с массой тела 3200 г, ростом 50 см. До 4 мес был на грудном вскармливании, затем переведен на адаптированную смесь. С 5,5 мес введен один прикорм овсяной кашей, с 6 мес — овощное пюре, с 7 мес — мясо. До 5 мес. развитие соответствовало возрасту, затем отмечена низкая прибавка массы тела, а после 7 мес — потеря массы тела. Стул 2-3 раза в день, периодически до 5 раз. Ваш предположительный диагноз:

А. Пищевая аллергия

Б. Болезнь Крона

В. Лимфангиозектазия кишечника

Г. Целиакия

Д. Псевдомембранозный колит

В клиническом анализе крови при коклюше отмечается:

- А. Лейкопения
- Б. Тромбоцитоз
- В. Нейтрофильный лейкоцитоз
- Г. Лимфоцитоз
- Д. Атипичные мононуклеары

Укажите основную группу лекарственных средств для лечения острого обструктивного бронхита у детей:

- А. ингаляционные глюкокортикостероиды
- Б. бронходилататоры
- В. муколитики
- Г. аминопенициллины
- Д. макролиды

Врожденные пороки сердца являются классическим примером:

- А. Бластопатий
- Б. Эмбриопатий
- В. Ранних фетопатий
- Г. Поздних фетопатий
- Д. Патологией перинатального периода

Синдром Жильбера характеризуется:

- А. Повышением уровня трансаминаз в крови
- Б. Повышением уровня прямого билирубина в крови
- В. Повышением уровня непрямого билирубина в крови
- Г. Ретикулоцитозом

При артериальной гипертензии наблюдается:

- А. Снижение сердечного выброса и повышение общепериферического сосудистого сопротивления
- Б. Повышение сердечного выброса и понижение общепериферического сосудистого сопротивления
- В. Нормальный сердечный выброс и понижение общепериферического сосудистого сопротивления
- Г. Повышение сердечного выброса и повышение общепериферического сосудистого сопротивления
- Д. Снижение сердечного выброса и понижение общепериферического сосудистого сопротивления

Критерием пересмотра стартовой антибактериальной терапии при внебольничной пневмонии является:

- А. Отсутствие эффекта в течение 1 суток от начала лечения
- Б. Отсутствие эффекта в течение 2 суток от начала лечения
- В. Отсутствие эффекта в течение 3 суток от начала лечения
- Г. Отсутствие эффекта в течение 4 суток от начала лечения
- Д. Отсутствие эффекта в течение 5 суток от начала лечения

Стреловидный, венечный и затылочный швы начинают закрываться

- А. С 2 месяцев
- Б. С 3-4 месяцев
- В. С 4-5 месяцев
- Г. С 6 месяцев
- Д. С 12 месяцев

Истинный круп характерен для:

- А. РС-инфекции
- Б. Гриппа
- В. Аденовирусной инфекции
- Г. Стрептококковой ангины
- Д. Дифтерии

У ребенка 10 мес на фоне вирусного гастроэнтерита диагностировано умеренное обезвоживание. Выражена жажда, пьет охотно, рвоты на момент обращения нет. Какое стартовое лечение показано пациенту в этом случае?

- А. парентеральная регидратация из расчета 100 мл/кг веса за первые 6 часов в стационаре
- Б. парентеральная регидратация из расчета 75 мл/кг веса за 4 часа в стационаре
- В. парентеральная регидратация из расчета 100 мл/кг веса за сутки в стационаре
- Г. оральная регидратация из расчета 75 мл/кг веса за 4 часа в стационаре
- Д. восполнение текущих потерь и физиологической потребности в жидкости в амбулаторных условиях

Наиболее характерный морфологический вариант иммунного поражения клубочка для острого гломерулонефрита с нефротическим синдромом:

- А. Минимальный или мембранозный нефрит
- Б. Фокально-сегментарный гломерулосклероз
- В. Мезангиокапиллярный тип
- Г. Мезангиопролиферативный тип
- Д. Мембранопролиферативный тип

Повышение артериального давления в качестве побочного эффекта может отмечаться при приеме:

- А. Симпатомиметиков
- Б. Ганглиоблокаторов
- В. Ингибиторов АПФ
- Г. Бета-адреноблокаторов
- Д. Диуретиков

Синдром крупа у детей чаще всего вызывает:

- А. Вирус гриппа
- Б. Вирус парагриппа
- В. Пиогенный стрептококк
- Г. Гемофильная палочка
- Д. Пневмококк

Ребенку 5 месяцев. Родился от 1-х запоздалых, затяжных родов. Оценка по шкале Апгар 5/6 баллов. В течение первых дней состояние было тяжелым. Выписан домой на 19-й день жизни. В последующем регулярного врачебного наблюдения не было. Из перечисленного ниже, обнаруженного при осмотре, соответствует возрастной норме:

- А. Самостоятельно не садится
- Б. Гипертонус мышц рук и ног
- В. Тенденция к перекресту ног
- Г. Наличие ладонно-ротового рефлекса
- Д. Наличие хватательного рефлекса

При развитии у ребенка афебрильных судорог прежде всего необходимо исключить:

- А. Менингит
- Б. Гипокальциемию
- В. Гипогликемию
- Г. Гипокалиемию
- Д. Эпилепсию

Для лечения острой аллергической крапивницы и ангионевротического отека используют:

1. Антигистаминные препараты
2. Холинолитики
3. Системные глюкокортикостероиды
4. Ареналин
5. Нестероидные противовоспалительные средства

- А. 1,2,3
- Б. 1,3,5
- В. 1,3
- Г. 1,2,3,4

Максимальное число лейкоцитов в крови у здорового ребёнка на первом году жизни, выше которого говорят о лейкоцитозе, составляет:

- А. $9,0 \times 10^9/\text{л}$
- Б. $10,0 \times 10^9/\text{л}$
- В. $12,0 \times 10^9/\text{л}$
- Г. $13,0 \times 10^9/\text{л}$
- Д. $15,0 \times 10^9/\text{л}$

В общем анализе мочи при типичной форме вирусного гепатита А определяется:

- А. Непрямой билирубин
- Б. Глюкозурия
- В. Прямой билирубин
- Г. Протеинурия
- Д. Лейкоцитурия

Селективность протеинурии определяют для оценки состояния:

- А. Петли Генле
- Б. Дистальных канальцев
- В. Мембраны клубочков
- Г. Нефрона
- Д. Проксимальных канальцев

При подозрении на феномен «гипертензии на белый халат» у ребенка показано проведение

- А. Холтеровского мониторирования ЭКГ
- Б. Велозргометрии
- В. Суточного мониторирования артериального давления
- Г. Исследование уровня кортизола в сыворотке крови

При анафилактической реакции прежде всего следует ввести:

- А. Преднизолон
- Б. Хлоропирамин
- В. Бикарбонат натрия
- Г. Адреналин
- Д. Допамин

Для транзиторной (физиологической) желтухи новорожденных не характерно:

- А. Появление желтухи на 3-й день жизни
- Б. Удовлетворительное состояние ребенка
- В. Умеренно повышенный уровень свободного билирубина
- Г. Нормальный уровень связанного билирубина
- Д. Умеренная анемия

Укажите минимальную продолжительность базисной терапии при бронхиальной астме:

- А. 1 месяц
- Б. 3 месяца
- В. 6 месяцев
- Г. 1 год
- Д. 2 года

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клиническими проявлениями и критериями диагностики острой ревматической лихорадки:

- 1. Кардит
- 2. Артралгии
- 3. Хорея
- 4. Лихорадка
- 5. Анулярная эритема
- А. Большие критерии
- Б. Малые критерии
- А. 1А, 2Б, 3А, 4Б, 5А
- Б. 1А, 2А, 3А, 4Б, 5А
- В. 1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5А
- Г. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5Б

Для лечения обструктивного ларинготрахеита со стенозом гортани 2 степени препаратом первого выбора является:

- А. Цетиризин внутрь
- Б. Амоксициллин внутрь
- В. Дексаметазон парентерально
- Г. Адреналин парентерально
- Д. Будесонид в ингаляциях

Выберите препарат, нормализующий моторную функцию желудочно-кишечного тракта:

- А. Висмута трикалия дицитрат
- Б. Домперидон
- В. Мебеверин
- Г. Ранитидин
- Д. Омепразол

Выберите стартовый антибактериальный препарат для лечения тяжелой внебольничной пневмонии у детей в стационаре:

- А. Азитромицин
- Б. Амикацин
- В. Меропенем
- Г. Амоксициллин-клавуланат
- Д. Ципрофлоксацин

Гипотрофия I степени у детей диагностируется при величине массы тела ниже:

- А. 3 центиля
- Б. 10 центиля
- В. 25 центиля
- Г. 50 центиля
- Д. 75 центиля

Какие вакцины являются инаktivированными (неживыми):

1. АКДС
2. Вакцина против пневмококковой инфекции
3. Вакцина против кори
4. Вакцина против туберкулеза
5. Вакцина против гриппа

- А. 1,2,5
- Б. 1,2,4,5
- В. 3,4
- Г. 1,3,4,5

Пиелонефрит является вторичным, если:

- А. Верифицирован первичный очаг бактериального воспаления
- Б. При обследовании пациента зарегистрировано наличие аномалии развития мочевыводящей системы
- В. Возбудителем пиелонефрита является атипичная флора
- Г. После проведенного курса антибактериальной терапии в течение месяца симптомы пиелонефрита появляются вновь
- Д. Развился повторно вне зависимости от сроков болезни

Угроза билирубиновой энцефалопатии у доношенного новорожденного возникает при уровне билирубина:

- А. Более 80 мкмоль/л
- Б. Более 100 мкмоль/л
- В. Более 200 мкмоль/л
- Г. Более 340 мкмоль/л
- Д. Более 430 мкмоль/л

Родители 6-месячного ребенка обеспокоены быстрым увеличением его головы, так как шапочки, купленные заранее, оказались ему малы. Измерения, проведенные патронажной сестрой, показали, что окружность головы ребенка равна 43 см, окружность груди 43 см.

- А. Пропорциональны и соответствуют возрасту ребенка
- Б. Увеличены оба параметра
- В. Чрезмерно велики размеры головы
- Г. Чрезмерно велика окружность грудной клетки
- Д. Оба параметра ниже возрастных норм

Укажите факторы риска рахита, связанного с дефицитом витамина D:

- 1. Грудное вскармливание
- 2. Недостаточная инсоляция
- 3. Безмолочная диета у ребенка
- 4. Вегетарианство
- 5. Синдром мальабсорбции

- А. 1,2,4,5
- Б. 1,2,3,4,5
- В. 2,4,5

При неспецифическом язвенном колите в патологический процесс вовлекается:

- А. Слизистая оболочка кишки
- Б. Слизистая и подслизистая оболочки кишки
- В. Серозная оболочка кишки
- Г. Вся стенка кишки
- Д. Мышечный слой кишки

Дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации, со значительно сниженными функциональными возможностями организма, относятся к группе здоровья:

- А. 1
- Б. 2
- В. 3
- Г. 4
- Д. 5

Гемолитическая болезнь новорожденного обусловлена:

- А. Нарушением конъюгации билирубина
- Б. Внутриутробной инфекцией
- В. Иммунологическим конфликтом
- Г. Гемоглобинопатией
- Д. Тромбоцитопатией

Артериальная гипертензия характерна для следующего врожденного порока сердца:

- А. Открытый артериальный проток
- Б. Дефект межжелудочковой перегородки
- В. Стеноз легочной артерии
- Г. Дефект межпредсердной перегородки
- Д. Коарктация аорты

Назовите продукт питания, относительно редко вызывающий гастроинтестинальную пищевую аллергию:

- А. Коровье молоко
- Б. Рисовая крупа
- В. Овсяная крупа
- Г. Козье молоко
- Д. Куриное яйцо

При проведении сердечно – лёгочной реанимации детям частота компрессий грудной клетки в минуту составляет:

- А. 60
- Б. 80
- В. 100
- Г. 120

Основой концепции развития здравоохранения и медицинской науки в РФ являются:

- А. Повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения
- Б. Развитие негосударственного сектора в здравоохранении

Каковы будут ваши рекомендации по диете на период болезни в случае острого вирусного гастроэнтерита у ребенка 7 месяцев, находящегося на грудном вскармливании и получающего прикорм в виде овощного пюре и безмолочных каш?

- А. Отмена грудного вскармливания и блюд прикорма, переход на кормление безлактозной смесью
- Б. Замена грудного молока безлактозной смесью, сохранение блюд прикорма
- В. Сохранение грудного вскармливания, блюда прикорма - по желанию ребенка
- Г. Переход на парентеральное питание на период болезни

Ревматическая хорея проявляется:

- А. Монопарезом
- Б. Спастическими параличами
- В. Фокальными судорогами
- Г. Гиперкинезами
- Д. «Писчим спазмом»

Для стрептококкового тонзиллита характерно все нижеперечисленное, кроме:

- А. Лихорадка и боль в горле
- Б. Яркая гиперемия задней стенки глотки, "пылающий зев"
- В. Симптомы интоксикации
- Г. Возраст пациентов до 3-х лет
- Д. Эффективность амоксициллина

Ребенка двух лет, у которого обнаружен крипторхизм в форме паховой эктопии, необходимо оперировать:

- А. Безотлагательно
- Б. До 5 лет
- В. До 10 лет
- Г. До 12 лет

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие следующих костных и мышечных аномалий:

1. Выраженное отложение жира в области мышц, симулирующее их хорошее развитие
2. Искривление свода стопы
3. Нижняя челюсть отходит назад, а верхняя выступает вперед
4. Уменьшение массы мышц, истончение и нарушение трофики мышечных волокон
5. Неодинаковая степень развития мышц верхних и нижних конечностей

- А. Плоскостопие
- Б. Прогнатизм
- В. Мышечная атрофия
- Г. Мышечная асимметрия
- Д. Псевдогипертрофия

- А. 1А, 2Д, 3В, 4Б, 5Г
- Б. 1Д, 2А, 3В, 4Б, 5Г
- В. 1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Г
- Г. 1Г, 2А, 3Б, 4В, 5Д

Высокий уровень трансаминаз в сыворотке крови указывает на:

- А. Микронодулярный цирроз печени
- Б. Холестаз
- В. Острый вирусный гепатит
- Г. Первичный билиарный цирроз
- Д. Аминазиновую желтуху

Для профилактики геморрагической болезни новорожденным вводят:

- А. Витамин А
- Б. Витамин К
- В. Препарат железа
- Г. Иммуноглобулин человека антирезус RhO(D)
- Д. Дексаметазон

Ученица 10 класса жалуется на резкий озноб, мучительную головную боль, жажду. Больна первый день. Температура тела 40,0°

С. Сознание спутанное. Кожные покровы цианотичные, на ягодицах, бедрах геморрагические высыпания от мелкоточечных петехий до кровоизлияний размером 3-4 см. Единичные розеолезные и розеолезно-папулезные элементы на коже живота, спины, верхних конечностей. Ригидность мышц затылка, симптом Кернига сомнительный, пульс 120 ударов в 1 мин, слабого наполнения, тоны сердца глухие, АД 85/55 мм рт. ст., ЧД 28 в 1 мин. Прежде всего следует предположить:

- А. Корь
- Б. Менингококцемию
- В. Осложненное течение гриппа
- Г. Менингит
- Д. Инфекционный мононуклеоз

Какие жаропонижающие средства безопасны для применения в детском возрасте?

- 1. Ибупрофен
- 2. Ацетилсалициловая кислота
- 3. Парацетамол
- 4. Комбинация парацетамола с ибупрофеном
- 5. Нимесулид

- А. 1,3,4,5
- Б. 1,3,4
- В. 1,2,3,4
- Г. 1,3

При гемолитической болезни новорожденных желтуха появляется:

- А. В первые сутки жизни
- Б. На 3-и сутки жизни
- В. На 5-е сутки жизни
- Г. На 6-е сутки жизни
- Д. На 10-е сутки жизни

Каким нормативным документом гарантируется Право граждан РФ на охрану здоровья:

- А. Трудовым кодексом
- Б. Конституцией РФ
- В. Гражданским кодексом
- Г. Федеральным законом об охране здоровья граждан

Для купирования гипогликемии показано введение:

- А. Раствор глюкозы 5% из расчета 10 мл/кг внутривенно струйно
- Б. Раствор глюкозы 10% из расчета 5 мл/кг внутривенно струйно
- В. Изотонический раствор хлорида натрия из расчета 10 мл/кг внутривенно струйно
- Г. Раствор Рингера из расчета 20 мл/кг
- Д. Инфузионная терапия не показана

Для железодефицитной анемии характерны:

- 1. Низкий уровень железа в сыворотке крови
 - 2. Низкий уровень ферритина в сыворотке крови
 - 3. Высокий уровень ферритина в сыворотке крови
 - 4. Низкий уровень трансферрина в сыворотке крови
 - 5. Высокий уровень трансферрина в сыворотке крови
- А. 1,2,4
 - Б. 1,3,5
 - В. 1,2,5
 - Г. 2,4

Мочевой синдром при пиелонефрите характеризуется:

- А. Гематурией
- Б. Кристаллурией
- В. Протеинурией
- Г. Лейкоцитурией с бактериурией

Укажите препарат выбора для лечения скарлатины:

- А. Амоксициллин
- Б. Амоксициллин +клавулановая кислота
- В. Котримоксазол
- Г. Азитромицин
- Д. Цефтриаксон

Укажите симптомы, характерные для инфекции, вызванной парвовирусом В19:

- 1. Артралгии**
- 2. Симптом «нашлёпанных» щёк**
- 3. Нейтрофильный лейкоцитоз**
- 4. Инфекционная эритема**
- 5. Апластическая анемия**

А. 1,2,3

Б. 1,2,4,5

В. 2,4

Г. 2,3,4,5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие физикальных изменений различным нозологическим формам:

- 1. Пневмония**
- 2. Обструктивный бронхит**
- 3. Гидроторакс**
- 4. Эмфизема легких**
- 5. Образование больших полостей, содержащих воздух**

А. Укорочение перкуторного звука над лёгким

Б. Коробочный оттенок перкуторного звука над лёгким

В. Тимпанический перкуторный звук над легким

А. 1А, 2Б, 3В, 4Б, 5Б

Б. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5В

В. 1А, 2Б, 3А, 4Б, 5В

Г. 1В, 2Б, 3А, 4Б, 5Б

Возможные осложнения при остром стрептококковом тонзиллите (ангине):

- 1. Острый гломерулонефрит**
- 2. Менингоэнцефалит**
- 3. Паратонзиллярный абсцесс**
- 4. Гепатит**
- 5. Ревматическая лихорадка**

А. 1,3,5

Б. 1,2,3,5

В. 2,4

Г. 1,5

Состояние, являющееся противопоказанием к кормлению грудью со стороны матери:

- А. Острая респираторная вирусная инфекция
- Б. Гепатит А
- В. Инсулинозависимый сахарный диабет
- Г. Аутоиммунный тиреоидит
- Д. Открытая форма туберкулеза

Укажите симптомы, характерные для ротавирусного гастроэнтерита:

1. Лихорадка
2. Диарея
3. Рвота
4. Примесь слизи и крови в стуле
5. Снижение аппетита

- А. 1,2,3,4
Б. 1,2,3,4,5
В. 1,2,3,5

Основным возбудителем бактериального тонзиллита у детей является:

- А. Пиогенный стрептококк
Б. Дифтерийная палочка
В. Анаэробные бактерии
Г. Золотистый стафилококк
Д. Пневмококк

Укажите препарат первого выбора для лечения острого среднего гнойного отита у детей:

- А. Азитромицин
Б. Кларитромицин
В. Амоксициллин-клавуланат
Г. Цефиксим
Д. Цефтриаксон

Выберите оптимальный метод верификации хеликобактериоза у детей

- А. Хелпил-тест
Б. Быстрый уреазный тест с биоптатом
В. Морфология биоптата
Г. Определение антигенов *H. pylori* в копрофильtrate методом ПЦР
Д. Микроскопия биоптата *ex tempore*

Проведение цистоскопии у детей в экстренном порядке показано при:

- А. Почечной колике
Б. Острой задержке мочи
В. Макрогематурии
Г. Анурии

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Дайте характеристику элементам кожной сыпи.

1. Эритема
 2. Петехии
 3. Экхимозы
 4. Папула
 5. Пузырёк
- А. Сине-фиолетового цвета, неправильной формы
Б. Первичный, выступающий над уровнем кожи, образуется при скоплении воспалительного инфильтрата в коже
В. Полостной, расположен поверхностно, заполнен серозным или кровянистым содержимым
Г. Участки гиперемии
- Д. Невоспалительные пятна, размером 1-2 мм
- А. 1Г, 2А, 3Д, 4Б, 5В
Б. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В
В. 1А, 2Д, 3А, 4В, 5Б
Г. 1Г, 2Б, 3В, 4А, 5Д

Наиболее частой причиной длительного кашля у ребенка раннего возраста является:

- А. Бронхиальная астма
Б. Гастроэзофагеальный рефлюкс
В. Заболевания ЛОР-органов
Г. Коклюш
Д. Инфекция *Mycoplasma pneumoniae*

При церебральной ишемии I степени у новорожденного выявляются:

- А. Судороги, гипорефлексия, тремор рук
Б. Тремор рук, гипорефлексия, мышечная дистония
В. Мышечная дистония, гипотония, вялость
Г. Адинамия
Д. Гипотония

Сниженная механическая защита и склонность кожи ребенка к более легкой травматизации обусловлена:

- А. Тонкостью эпидермиса
Б. Тонкостью дермы
В. Преимущественно волокнистым составом дермы
Г. Недостаточным развитием подкожного жирового слоя.

Фарингоконъюнктивальная лихорадка наблюдается при:

- А. Гриппе
- Б. Аденовирусной инфекции
- В. РС-вирусной инфекции
- Г. Скарлатине
- Д. Риновирусной инфекции

Консервативное лечение кривошеи следует начинать:

- А. С рождения
- Б. В 2-5 мес
- В. В 6-12 мес
- Г. После 1 года

Какая частота сердечных сокращений в покое свидетельствуют о брадикардии у детей 7-9 лет:

- А. Менее 100 уд/мин
- Б. Менее 80 уд/мин
- В. Менее 60 уд/мин

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Выберите терапевтическую тактику при острых диарейных болезнях у детей:

- 1. Ротавирусный гастроэнтерит
- 2. Дизентерия
- 3. Кампилобактериоз
- 4. Сальмонеллез
- 5. Антибиотик-ассоциированная диарея
- А. Цефалоспорин 3 поколения
- Б. Метронидазол
- В. Макролид
- Г. Оральная регидратация
- Д. Аминогликозид
- А. 1Г, 2Д, 3В, 4А, 5Б
- Б. 1А, 2В, 3А, 4А, 5Д
- В. 1Г, 2А, 3В, 4А, 5Б

Основным симптомом синдрома укороченного интервала PQ является:

- А. Головные боли
- Б. Приступы тахикардии
- В. Артериальная гипертензия
- Г. Энурез
- Д. Эпизоды брадикардии

К группе риска по развитию бронхиальной астмы относятся:

- А. Часто болеющие дети
- Б. Дети с atopическими заболеваниями
- В. Дети, перенесшие пневмонию
- Г. Дети, имеющие хроническую патологию носоглотки
- Д. Дети, перенесшие РС-вирусный бронхит на первом году жизни

Неотложные мероприятия на месте происшествия при электротравме у детей включают:

- А. Отсоединение пострадавшего от источника тока
- Б. Проведение сердечно-легочной реанимации
- В. Введение кристаллоидов при шоке
- Г. Экстренная госпитализация
- Д. Все указанные мероприятия

Для коклюша у детей характерны:

- 1. Грубый лающий кашель
- 2. Приступообразный кашель с репризами
- 3. Кашель до рвоты
- 4. Дистанционные хрипы
- 5. Сухие свистящие хрипы на выдохе

- А. 1,2,3
- Б. 1,4,5
- В. 2,3
- Г. 4,5

Причиной гипоксемии может являться:

- 1. Пневмония
- 2. Тромбоэмболия легочной артерии
- 3. Метгемоглобинемия
- 4. Анемия
- 5. Гипервентиляция

- А. 1,2,3
- Б. 1,2,3,4
- В. 1,2,3,4,5
- Г. 1,3,5

Наиболее частая причина артериальной гипертензии у детей 7-12 лет

- А. Коарктация аорты
- Б. Паренхиматозные заболевания почек
- В. Эссенциальная артериальная гипертензия
- Г. Сахарный диабет

Больной

Д., 13 лет. В течение 2 лет беспокоят приступообразные боли в правой подвздошной области, различные по длительности. Несколько раз госпитализировался с подозрением на острый аппендицит, однако оперативное вмешательство не было произведено. При последнем обострении боли в животе сопровождались диареей с примесью крови. При осмотре кожные покровы обычной окраски, признаки узловой эритемы, при пальпации живота - умеренная болезненность в правой подвздошной области. В анализе крови: гемоглобин - 100 г/л, СОЭ - 40 мм/час. Необходимо выполнить следующие диагностические исследования:

- А. Рентгенологическое исследование толстой кишки
- Б. Колоноскопия с лестничной биопсией
- В. Лапароскопия
- Г. Копрологическое исследование
- Д. Бактериологическое исследование кала

Назовите один признак, наиболее характерный для синдрома поражения перикарда:

- А. Локальный гипергидроз, холодные, цианотичные конечности
- Б. Набухание вен шеи, кистей рук, кубитальных вен
- В. Ригидный пульс
- Г. Эпигастральная пульсация сверху-вниз
- Д. Артериальное давление на ногах равно давлению на руках

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите возможную этиологию бактериального тонзиллофарингита у детей:

1. *Streptococcus pneumoniae*
2. *Streptococcus pyogenes*
3. *Pseudomonas aeruginosa*
4. *Corynebacterium diphtheriae*
5. *Staphylococcus aureus*

- А. Вызывает бактериальный тонзиллофарингит у детей**
- Б. У иммунокомпетентных детей не вызывает тонзиллофарингита**

- А. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5А
- Б. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5Б
- В. 1Б, 2А, 3Б, 4Б, 5А

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между группами и названиями лекарственных препаратов:

1. Дигоксин
 2. Амиодарон
 3. Натрия аденозинтрифосфат
 4. Эналаприл
 5. Каптоприл
- А. Антиаритмические
Б. Сердечные гликозиды
В. Антигипертензивные
- А. 1Б, 2В, 3Б, 4В, 5В
Б. 1Б, 2А, 3В, 4В, 5А
В. 1Б, 2А, 3А, 4В, 5В

При коллапсе наблюдается:

- А. Падение сосудистого тонуса и увеличение объема циркулирующей крови
Б. Уменьшение притока венозной крови к сердцу и повышение сердечного выброса
В. Понижение артериального давления и повышение венозного давления
Г. Падение сосудистого тонуса и уменьшение объема циркулирующей крови
Д. Понижение артериального давления и повышение периферического сосудистого сопротивления

Лекарственным препаратом выбора для лечения болезни Вильсона-Коновалова является:

- А. Глюкокортикостероиды
Б. Азатиоприн
В. Метотрексат
Г. Пеницилламин
Д. Интерферон альфа-2а

Продолжительность антибактериальной терапии при пиелонефрите у детей должна составлять:

- А. 5 дней
Б. 7 дней
В. 10-14 дней
Г. 21 день
Д. Антибактериальная терапия отменяется через два дня после нормализации температуры

Для вирусного крупа характерны симптомы:

- 1. Стридор**
- 2. Тризм**
- 3. Осиплость голоса**
- 4. Гиперсаливация**
- 5. Грубый кашель**

А. 1,2,3,5

Б. 1,3,4,5

В. 1,3,5

Г. 2,4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между показателями психомоторного развития и возрастом ребенка :

- 1. Узнает мать, поворачивает голову на звук, направленные движения ручек, переворачивается со спины на живот**
- 2. Следит за человеком, движущимися предметами, поворачивает голову, начинает улыбаться**
- 3. Самостоятельно сидит, произносит 8-10 осмысленных слов, сам берет чашку и пьет**
- 4. Знает свое имя, шагает при поддержке за обе руки, находит и достает предмет из множества игрушек**
- 5. Ползает, легко садится, подолгу лепечет, пьет из чашки, которую держит взрослый**

А. 1 месяц

Б. 4 месяца

В. 7 месяцев

Г. 9 месяцев

Д. 12 месяцев

А. 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В

Б. 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В

В. 1А, 2Б, 3Д, 4Г, 5В

У ребенка 1,5 лет с детским церебральным параличом отмечается ежедневный кашель, поперхивания при кормлении. В возрасте 11 мес перенес пневмонию, в возрасте 6 и 14 месяцев - обструктивный бронхит. Какова наиболее вероятная причина кашля у ребенка?

А. Бронхиальная астма

Б. Первичный иммунодефицит

В. Вторичный иммунодефицит

Г. Коклюш

Д. Хроническая аспирация пищи

При оказании экстренной помощи в случае анафилактической реакции врачу, не являющемуся анестезиологом-реаниматологом, следует ввести пациенту адреналин:

- А. Подкожно
- Б. Внутримышечно
- В. Внутривенно
- Г. Сублингвально

С чего следует начинать оценку состояния пациента по алгоритму ABCDE, если он без сознания:

- А. Оценить проходимость дыхательных путей
- Б. Оценить тяжесть дыхательной недостаточности
- В. Оценить наличие нарушений кровообращения
- Г. Оценить степень обезвоживания
- Д. Измерить температуру тела

Для какого заболевания характерны гемартрозы:

- А. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
- Б. Геморрагический васкулит
- В. Лейкоз
- Г. Гемофилия
- Д. Болезнь Виллебранда

Задачами системы охраны здоровья матери и ребенка являются:

- А. Забота государства о здоровье матери и ребенка
- Б. Обеспечение условий, необходимых для всестороннего гармоничного развития детей
- В. Разработка эффективной системы оказания медицинской помощи матери и ребенку

Иммобилизация верхней конечности при переломе костей предплечья в нижней трети производится:

- А. Гипсовой повязкой от лучезапястного сустава до средней трети плеча
- Б. Циркулярной гипсовой повязкой от лучезапястного до локтевого суставов
- В. Гипсовой повязкой от лучезапястного до локтевого суставов
- Г. Гипсовой лонгетой от пястно-фаланговых суставов до средней трети плеча

С чего следует начинать оценку состояния пациента по алгоритму ABCDE, если он в сознании:

- А. Оценить проходимость дыхательных путей
- Б. Оценить тяжесть дыхательной недостаточности
- В. Оценить наличие нарушений кровообращения
- Г. Оценить степень нарушения сознания
- Д. Оценить степень обезвоживания

Физическое развитие у детей в возрасте до 1 года должно быть оценено:

- А. 1 раз в год
- Б. 1 раз в полгода
- В. раз в 1 квартал
- Г. 1 раз в месяц
- Д. 1 раз в 10 дней

В каких случаях у ребенка следует исключать иммунодефицитное состояние:

- 1. Упорный кандидоз слизистых, микоз кожи и ногтей
- 2. Частые острые респираторные заболевания
- 3. Пневмоцистная пневмония
- 4. Генерализованный БЦЖ-ит или БЦЖ-остеит
- 5. Вакциноассоциированный полиомиелит

- А. 1,2,3,4,5
- Б. 1,2,3,4
- В. 1,3,4,5
- Г. 2,3,4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между характером сыпи и заболеванием:

- 1. Мелкопятнистая сыпь на неизмененном фоне кожи
- 2. Геморрагическая «звездчатая» сыпь
- 3. Везикулярная сыпь с явлениями «ложного» полиморфизма
- 4. Пятнистопапuleзная сыпь на неизмененном фоне кожи
- 5. Мелкоточечная сыпь на гиперемизованном фоне кожи

- А. Корь
- Б. Краснуха
- В. Скарлатина
- Г. Ветряная оспа
- Д. Менингококцемия

- А. 1А, 2Д, 3Г, 4Б, 5В
- Б. 1Б, 2Д, 3Г, 4А, 5В
- В. 1Б, 2Д, 3Г, 4В, 5А

Для халазии кардии характерно наличие:

- А. Боли натошак в эпигастррии
- Б. Боли натошак в правом подреберье
- В. Запоров
- Г. Рецидивирующей рвоты

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие симптомов сердечной недостаточности:

1. Набухание яремных вен
2. Расширение границ относительной сердечной тупости влево.
3. Увеличение размеров печени
4. Периферические отеки
5. Влажные разнокалиберные хрипы в легких

- А. Левожелудочковая сердечная недостаточность**
Б. Правожелудочковая сердечная недостаточность

А. 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 5А

Б. 1А, 2Б, 3А, 4А, 5Б

В. 1Б, 2А, 3Б, 4Б, 5А

Клинические проявления целиакии могут манифестировать при введении в рацион ребенка:

- А. Гречневой каши
Б. Рисовой каши
В. Манной каши
Г. Всего вышеперечисленного
Д. Манифестация целиакии не связана с введением определённых продуктов питания

В качестве предрасполагающих к инфекции мочевой системы факторов выступает все, кроме:

- А. Наследственная предрасположенность
Б. Наличие уростаза
В. Дефекты иммунного ответа (часто болеющий ребенок, аномалии конституции и т.д.)
Г. Гельминтозы (энтеробиоз)
Д. Вегето-сосудистая дистония

Для лечения острого вирусного бронхолита следует использовать:

1. Кислородотерапию
2. Бронходилататоры
3. Будесонид
4. Антибиотики
5. Муколитики

А. 2,3,4

Б. 1,2,3

В. 1,2

Г. 1,2,3,4,5

С помощью пикфлоуметра измеряется:

- А. Общий объем выдоха
- Б. Жизненная емкость легких
- В. Остаточный объем легких
- Г. Максимальная (пиковая) скорость выдоха
- Д. Объем форсированного выдоха за первую секунду

К лекарственным препаратам, используемым для достижения контроля бронхиальной астмы относят:

- 1. Бета2-агонисты короткого действия
- 2. Иммуномодуляторы
- 3. Ингаляционные холинолитики
- 4. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- 5. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов

- А. 1,2,3
- Б. 2,4,5
- В. 4,5
- Г. 1,3,4,5

Ребенка с впервые выявленной частой желудочковой экстрасистолой следует:

- А. Оставить дома, назначить постельный режим и противовоспалительную терапию
- Б. Ограничить физические нагрузки
- В. Назначить антиаритмическую терапию
- Г. Госпитализировать для обследования

Укажите наиболее частые возбудители гнойного менингита:

- 1. Энтеровирусы
- 2. Менингококк
- 3. Синегнойная палочка
- 4. Пневмококк
- 5. Гемофильная палочка

- А. 1,2,4,5
- Б. 2,4,5
- В. 2,3,4,5
- Г. 2,5

Какова Ваша тактика кормления новорожденного ребенка при наличии гнойного мастита у матери:

- А. Исключается грудное вскармливание полностью, временно переводится на искусственную смесь
- Б. Можно кормить здоровой грудью, а ребенку назначить бифидумбактерин
- В. Можно кормить из обеих желез, но внутрь ребенку назначить антибиотик, бифидумбактерин
- Г. Кормить сцеженным грудным молоком матери, подвергнутым пастеризации

Какие препараты используются для лечения пациента с ротавирусным гастроэнтеритом:

- 1. Антибиотики
- 2. Сорбенты
- 3. Противодиарейные средства, уменьшающие перистальтику кишечника
- 4. Препараты для оральной и внутривенной регидратации
- 5. Иммуномодуляторы

А. 1,2,3,4

Б. 2,3,4,5

В. 2,4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие изменений гемодинамики и характера врожденного порока сердца:

- 1. Дефект межжелудочковой перегородки
- 2. Открытый артериальный проток
- 3. Изолированный стеноз легочной артерии
- 4. Тетрада Фалло
- 5. Коарктация аорты
- А. Нецианотический с обогащением малого круга кровообращения
- Б. Цианотический с обогащением малого круга кровообращения
- В. Нецианотический с обеднением малого круга кровообращения
- Г. Цианотический с обеднением малого круга кровообращения
- Д. Нецианотический с обеднением большого круга кровообращения

А. 1А, 2А, 3В, 4Г, 5Д

Б. 1Б, 2А, 3В, 4Д, 5Г

В. 1Г, 2А, 3В, 4Д, 5В

Основной этиологический фактор эпиглотитта у детей:

- А. Streptococcus pneumoniae
- Б. Neisseria meningitidis
- В. Staphylococcus aureus
- Г. Moraxella catarrhalis
- Д. Haemophilus influenzae

Оценку физического развития ребенка первого года жизни следует проводить:

- А. Ежемесячно
- Б. Один раз в квартал
- В. Один раз в полгода
- Г. Один раз в год

Какой признак из перечисленных не является нормой на электрокардиограмме у ребенка 5 лет:

- А. Частота сердечных сокращений 100 в минуту
- Б. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса
- В. Дыхательная аритмия
- Г. Высокий зубец Т

Метаболический синдром у подростков, помимо артериальной гипертензии и ожирения, характеризуется:

- А. Гиперинсулинемией, гиперурикемией, гипогликемией
- Б. Гиперинсулинемией, гиперлипидемией, снижением толерантности к глюкозе
- В. Гипертриглицеридемией, гипербилирубинемией, гипохолестеринемией
- Г. Гипокоагуляцией, гипогликемией, гиперурикемией
- Д. Нормохромной анемией, гипергликемией, гиперкреатининемией

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между симптомами и заболеваниями:

1. Амимичное маскообразное лицо
2. Алопеция
3. Фотосенсибилизация
4. Лиловая окраска век с параорбитальным отеком
5. Энтезопатии

- А. Системная склеродермия
- Б. Системная красная волчанка
- В. Ювенильный дерматомиозит
- Г. Анкилозирующий спондилоартрит

- А. 1Г, 2Б, 3Б, 4В, 5Г
- Б. 1Б, 2А, 3Б, 4В, 5Г
- В. 1А, 2Б, 3Б, 4В, 5Г
- Г. 1А, 2А, 3Г, 4В, 5Б

При транспортировке больного с переломом позвоночника оптимальным положением является:

- А. На щите, на животе
- Б. На щите, на спине с соблюдением «оси безопасности»
- В. На носилках, в положении лежа на животе
- Г. На носилках, на боку

Начинать выведение ребенка 8 лет из приступа пароксизмальной тахикардии при артериальном давлении 90/60 мм рт ст целесообразно с применения:

- А. Адреналина внутривенно
- Б. Дигоксина внутримышечно
- В. Изоптина внутривенно
- Г. Вагусных проб
- Д. АТФ внутривенно

В алгоритм диагностических процедур на догоспитальном этапе при выявлении лейкоцитурии входит все, кроме:

- А. Повторный клинический анализ мочи
- Б. Осмотр вульвы у девочек и крайней плоти у мальчиков
- В. Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам
- Г. Соскоб на энтеробиоз
- Д. ЭКГ

Серозный менингит может отмечаться при:

- А. Шигеллезе
- Б. Норовирусной инфекции
- В. Ротавирусной инфекции
- Г. Энтеровирусной инфекции

При гипергликемии (глюкоза в крови > 15 ммоль/л) показано внутривенное струйное введение инсулина короткого действия в дозе:

- А. 0,1 Ед/кг
- Б. 1,0 Ед/кг
- В. 0,5 Ед/кг
- Г. 0,75 Ед/кг

К какому возрасту должно сформироваться полное управление мочеиспусканием в течении суток:

- А. 2 года
- Б. 3 года
- В. 4 года
- Г. 5 лет
- Д. 6 лет

Хроническим является гломерулонефрит если:

- А. Течение острого гломерулонефрита, несмотря на проводимую терапию, длится больше 6 месяцев
- Б. В случае трехкратного увеличения показателя креатинина в крови в течение трёх последовательных дней
- В. У пациента зарегистрированы специфические морфологические изменения в биоптате ткани почек
- Г. В случае когда у пациента регистрируется протеинурия
- Д. В случае если регистрируется присоединение микстинфекции

Укажите препарат выбора для лечения менингококцемии:

- А. Цефалоспорин III поколения
- Б. Амоксициллин-клавуланат
- В. Ципрофлоксацин
- Г. Джозамицин
- Д. Триметоприм-сульфаметоксазол

При артериальной гипертензии у детей и подростков средние уровни систолического АД и диастолического АД из трех измерений равны или превышают возрастные значения:

- А. 25 перцентиля
- Б. 50 перцентиля
- В. 75 перцентиля
- Г. 90 перцентиля
- Д. 95 перцентиля

Для проведения заменного переливания крови при гемолитической болезни новорожденного по ABO-системе используют:

- А. Эритроцитарную массу O(1) и плазму O(1)
- Б. Эритроцитарную массу O(1) и плазму группы крови ребенка
- В. Эритроцитарную массу O(1) и плазму AB(IV)
- Г. Эритроцитарную массу группы крови ребенка и плазму AB(IV)
- Д. Эритроцитарную массу A(II) и плазму группы крови ребенка

Для проведения эффективного непрямого массажа сердца ладони следует расположить:

- А. С обеих сторон грудной клетки
- Б. На границе средней и нижней трети грудины
- В. В пятом межреберном промежутке слева
- Г. На верхней части грудины

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Дайте характеристику перечисленным костным аномалиям.

1. Размягчение и истончение плоских костей черепа
2. Ладьевидное углубление на переднебоковых поверхностях грудной клетки в области прикрепления диафрагмы
3. Нарушение минерализации и плотности костной ткани
4. Размягчение костей
5. Избыточное образование остеοидной ткани без её минерализации в зонах роста костей

- А. Остеопороз
- Б. Остеомалация
- В. Остеοидная гиперплазия
- Г. Краниотабес
- Д. Борозда Филатова-Гаррисона

- А. 1Б, 2А, 3Д, 4В, 5Г
- Б. 1Г, 2А, 3В, 4Г, 5Д
- В. 1Б, 2Д, 3А, 4В, 5Г
- Г. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В

Укажите симптомы экзикоза у детей:

1. Западение большого родничка
2. Сухость кожи и слизистых оболочек
3. Полиурия
4. Жажда
5. Медленное расправление кожной складки

- А. 1,2,3,5
- Б. 1,2,3,4,5
- В. 1,2,4,5
- Г. 1,2,5

Какие вакцины противопоказаны ВИЧ-инфицированным детям?

- А. Вакцина против пневмококка
- Б. Вакцина против гепатита В
- В. Инактивированная полиοмиелитная вакцина
- Г. БЦЖ
- Д. Вакцина против дифтерии и столбняка

Укажите антигистаминные препараты 1 поколения:

1. Хлоропирамин
2. Цетиризин
3. Дифенгидрамин
4. Клемастин
5. Дезлоратадин

А. 1,3,4

Б. 1,2,3

В. 2,5

Г. 1,3,4,5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Выберите стартовую антибактериальную терапию при острых респираторных болезнях у детей:

1. Нетяжелая внебольничная пневмония, типичная

2. Атипичная внебольничная пневмония

3. Стрептококковый тонзиллит

4. Острый средний гнойный отит

5. Инфекционный мононуклеоз

А. Амоксициллин

Б. Цефтриаксон

В. Азитромицин

Г. Цефиксим

Д. Антибактериальная терапия не показана

А. 1А, 2В, 3А, 4А, 5Д

Б. 1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5Б

В. 1Б, 2В, 3А, 4Б, 5Б

Г. 1А, 2В, 3А, 4Б, 5Б

Укажите наиболее часто встречающийся этиологический фактор инфекции мочевой системы у детей:

А. Кишечная палочка

Б. Протей

В. Синегнойная палочка

Г. Стафилококк

Д. Клебсиелла

При муковисцидозе нарушается транспорт:

А. Цинка

Б. Брома и натрия

В. Железа и натрия

Г. Хлора и натрия

Д. Водорода

При полной атриовентрикулярной блокаде желудочки сокращаются:

- А. Чаше, чем предсердия
- Б. Реже, чем предсердия

Наличие каких заболеваний позволяет выявить неонатальный скрининг:

1. Фенилкетонурия
2. Галактоземия
3. Целиакия
4. Гипотериоз
5. Муковисцидоз

- А. 1,2,3,4
- Б. 1,2,4
- В. 1,2,4,5
- Г. 1,2,3

Одышечно-цианотические приступы наблюдаются при:

- А. Аномалии Эбштейна и открытом артериальном протоке
- Б. Коррегированной транспозиции магистральных сосудов и стенозе аорты
- В. Тетраде Фалло и транспозиции магистральных сосудов со стенозом легочной артерии
- Г. Коарктации аорты и общем артериальном стволе
- Д. Большом дефекте межжелудочковой перегородки и открытом артериальном протоке

Нижняя граница абсолютного количества нейтрофилов у детей старше одного года составляет:

- А. $0,5 \times 10^9/\text{л}$
- Б. $1,0 \times 10^9/\text{л}$
- В. $1,5 \times 10^9/\text{л}$
- Г. $2,0 \times 10^9/\text{л}$

В этиологии внебольничной пневмонии у детей ведущее значение имеет:

- А. Пневмококк
- Б. Пиогенный стрептококк
- В. Протей
- Г. Клебсиелла
- Д. Бордетелла

Выберите препараты, которые могут быть назначены для стартового лечения острого пиелонефрита у ребенка:

1. Амоксициллин
2. Амоксициллин-клавуланат
3. Джозамицин
4. Цефуроксим
5. Цефотаксим

- А. 1,2,3
Б. 2,4,5
В. 1,2,3,5

Для синдрома острой почечной недостаточности (стадия олигоанурии) характерно:

1. Ацидоз
2. Азотемия
3. Гиперкалиемия
4. Гипопротеинемия
5. Гипогликемия

- А. 1,2,3,4,5
Б. 1,2,3,4
В. 1,2,3
Г. 1,2,4

Микроцитоз эритроцитов может отмечаться при следующих заболеваниях:

- А. Железодефицитная анемия
Б. Талассемия
В. Анемия при хронических заболеваниях
Г. При всех указанных заболеваниях

Наиболее грозным осложнением врожденных пороков сердца с гемодинамически значимым обогащением малого круга кровообращения является:

- А. Нарушение ритма сердца
Б. Артериальная гипертензия
В. Легочная гипертензия
Г. Инсульт
Д. Ишемия миокарда

Основным клиническим проявлением фенилкетонурии является поражение:

- А. Системы кроветворения
Б. Центральной нервной системы
В. Печени
Г. Костной системы
Д. Иммунной системы

Какой вид иммуноглобулинов обеспечивает развитие вторичного иммунного ответа?

- А. Ig G
- Б. IgA
- В. IgM
- Г. IgE
- Д. Ig Д

Какой из симптомов позволяет наиболее точно предположить атипичную этиологию внебольничной пневмонии у ребенка:

- А. Субфебрильная температура
- Б. Локальные крепитирующие хрипы в легких
- В. Невысокие маркеры бактериального воспаления в лабораторных анализах крови
- Г. Негомогенный характер инфильтративных теней на рентгенограмме
- Д. Неэффективность лечения бета-лактамом антибиотиком

Нормальная частота сердечных сокращений у ребенка 1 месяца жизни составляет:

- А. 200 уд/мин
- Б. 180 уд/мин
- В. 140 уд/мин
- Г. 110 уд/мин
- Д. 100 уд/мин

Укажите симптом, не характерный для атопического дерматита:

- А. Отсутствие зуда кожи
- Б. Полиморфизм кожных высыпаний
- В. Возрастная стадийность клинических симптомов
- Г. Локализация аллергической сыпи на коже лица, конечностей
- Д. Плохой ночной сон

К группе врожденных пороков сердца с обогащением малого круга кровообращения относится:

- А. Высокий дефект межжелудочковой перегородки
- Б. Коарктация аорты
- В. Тетрада Фалло
- Г. Стеноз легочной артерии
- Д. Болезнь Эбштейна

Доза для внутримышечного введения адреналина ребенку 3-х лет с анафилактической реакцией составляет:

- А. 0,1 мг
- Б. 0,15 мг
- В. 0,3 мг
- Г. 0,5 мг
- Д. 1 мг

Диагноз хронического гастродуоденита у подростков верифицируется

- А. Наличием характерных жалоб
- Б. Анамнестическими данными
- В. Объективным осмотром
- Г. Эзофагогастродуоденоскопия
- Д. Морфологическим исследованием биоптата слизистой оболочки

Диарейный синдром при шигеллезе является следствием:

- А. Развития дисахаридазной недостаточности, повышения осмотической активности и нарушения всасывания воды и электролитов энтероцитами
- Б. Воспалительного процесса на всем протяжении желудочно-кишечного тракта
- В. Инвазии шигелл в колоноциты и развитием воспалительного процесса
- Г. Нарушений в системе циклических нуклеотидов и простагландинов
- Д. Гиперосмолярности химуса и нарушения реабсорбции воды

К наиболее важным признакам менингита у детей первых месяцев жизни относится

- А. Головная боль
- Б. Рвота
- В. Лихорадка
- Г. Выбухание большого родничка

Наиболее активное участие в регуляции минерального обмена принимают _____

- А. Органы дыхания
- Б. Паращитовидные железы
- В. Половые железы
- Г. Органы пищеварения

При железодефицитной анемии снижается уровень

- А. Растворимого трансферринового рецептора
- Б. Сывороточного ферритина
- В. Общей железосвязывающей способности сыворотки
- Г. Трансферрина

Наиболее частой причиной артериальной гипертензии у подростков является

- А. Эссенциальная артериальная гипертензия
- Б. Паренхиматозное заболевание почек
- В. Тромбоз почечных артерий и вен
- Г. Коарктация аорты

К препаратам, используемым в лечении аутоиммунных гепатитов, относят

- А. Нестероидные противовоспалительные препараты
- Б. Аминосалицилаты
- В. Глюкокортикостероиды
- Г. Препараты урсодезоксихолевой кислоты

К методам обследования, используемым при острой сердечной недостаточности, относят

- А. Кардиоритмографию, денситометрию
- Б. Дуплексное сканирование, общий анализ крови
- В. Электрокардиографию, эхокардиографию
- Г. Велоэргометрию, реопульмонографию

Поступление жалоб граждан по вопросам качества и доступности медицинской помощи является основанием для

- А. Проведения целевой (внеплановой) проверки внутреннего контроля качества
- Б. Проведения общего собрания
- В. Приобретения нового оборудования
- Г. Увольнения заведующего отделением, на которое поступают жалобы

«Визитной карточкой» клинических проявлений аденовирусной инфекции является

- А. Конъюнктивит
- Б. Пневмония
- В. Бронхит
- Г. Диарея

Для токсикоза с эксикозом 2-3 степени характерно наличие

- А. Высокой лихорадки
- Б. Микроциркуляторных нарушений
- В. Головной боли
- Г. Полиурии

Количество критериев оценки состояния новорожденного по шкале apgar составляет

- А. 6
- Б. 3
- В. 5
- Г. 4

Тяжесть обострения бронхиальной астмы будет оценена как тяжелая при насыщении крови кислородом (sao2) менее (в %)

- А. 90
- Б. 85
- В. 95
- Г. 80

Наступление периода полового созревания у мальчиков начинается с

- А. Увеличения яичек
- Б. Мутации голоса
- В. Увеличения полового члена в длину
- Г. Пигментации мошонки

Рентгенологическая картина сердца в виде «снежной бабы» характерна для

- А. Корригированной транспозиции магистральных сосудов
- Б. Аномального дренажа легочных вен
- В. Полной формы атриовентрикулярного канала
- Г. Атриезии трикуспидального клапана

У новорожденного ребенка наиболее частой причиной повышения артериального давления является

- А. Коарктация аорты
- Б. Феохромацитома
- В. Ожирение
- Г. Гломерулонефрит

Основным фактором, определяющим прогноз и характер терапии при вирусном гепатите с, является

- А. Активность трансаминаз в крови
- Б. Уровень билирубина в крови
- В. Уровень белка в крови
- Г. Фенотип вируса

Стрессовая язва желудка проявляется чаще

- А. Пенетрацией
- Б. Малигнизацией
- В. Кровотечением
- Г. Перфорацией

На фоне массовой вакцинации изменяется вирулентность возбудителя коклюша вследствие

- А. Формирования преимущественно постинфекционного иммунитета
- Б. Формирования недостаточно напряженного длительного поствакцинального иммунитета
- В. Низкого охвата детского населения прививками
- Г. Формирования чрезмерно напряженного поствакцинального иммунитета

Препаратом, относящимся к группе нитрофуранов, является

- А. Пипемидовая кислота
- Б. Нифурател
- В. Амикацин
- Г. Нитроксолин

При достаточном уровне антитоксического иммунитета в момент заражения стрептококковая инфекция протекает в виде

- А. Миокардита
- Б. Ангины
- В. Эндокардита
- Г. Диффузного гломерулонефрита

Больному менингококковым менингитом целесообразно назначить

- А. Цефотаксима натриевую соль
- Б. Офлоксацин
- В. Левомецетина-сукцинат-натрия
- Г. Гентамицин

При вирусном гепатите d имеет место _____ путь инфицирования

- А. Парентеральный
- Б. Воздушно-капельный
- В. Контактный
- Г. Алиментарный

Основным разделом организационной работы врача-педиатра участкового является

- А. Ведение учётно-отчётной документации
- Б. Диспансеризация детского населения
- В. Санитарно-просветительная работа
- Г. Формирование основ здорового образа жизни

Клинически ахалазия пищевода проявляется

- А. Вытеканием нествороженного молока сразу после кормления
- Б. Рвотой с желчью
- В. Рвотой во время еды и дисфагией
- Г. Рвотой с желудочным содержимым

К быстрому бронходилатирующему эффекту приводит сочетанное применение ипратропия бромида и

- А. В2-агонистов
- Б. Эпинефрина
- В. Кромоглициевой кислоты
- Г. М-холинолитиков

При пробе с дозированной физической нагрузкой адекватной реакцией считается

- А. Учащение пульса на 20-25%
- Б. Учащение пульса на 50-55%
- В. Урежение пульса на 30-40%
- Г. Отсутствие изменения частоты пульса

При обструктивном бронхите у детей выявляется _____ одышка

- А. Экспираторная
- Б. Рестриктивная
- В. Инспираторная
- Г. Смешанная

Для приготовления пищи при глютен-индуцированной целиакии следует использовать _____ муку

- А. Пшеничную
- Б. Кукурузную
- В. Манную
- Г. Ржаную

Пиелонефрит сопровождается

- А. Болями в начале мочеиспускания
- Б. Анурией
- В. Болями в конце мочеиспускания
- Г. Безболезненными мочеиспусканиями

Аутоиммунный гепатит первого типа характеризуется наличием в сыворотке антител

- А. Антинуклеарных (ANA) и/или антигладкомышечных (SMA)
- Б. К двуспиральной (нативной) ДНК (анти- ds DNA)
- В. К растворимому печеночному антигену (anti-SLA)
- Г. К микросомам печени и почек типа 1 (anti-LKM 1)

Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма №025/у), оформляется в поликлинике на пациента

- А. При первичном обращении
- Б. Один раз в год
- В. Один раз в пять лет
- Г. При каждом обращении

При ахалазии пищевода при рентгенографии отмечается

- А. Отсутствие газового пузыря желудка
- Б. Симптом мишени
- В. Расширение тени средостения
- Г. Увеличение желудка в размерах

Для гриппа нехарактерным симптомом является

- А. Желтуха
- Б. Лихорадка
- В. Гипертермия
- Г. Судорожный синдром

Проведение профилактических прививок ребёнку, перенёвшему острое респираторное заболевание, возможно не ранее, чем через _____ после выздоровления

- А. 2 Недели
- Б. 3 Месяца
- В. 2 Месяца
- Г. 1 Месяц

К критериям системной воспалительной реакции при течении неонатального сепсиса у новорожденных относят

- А. Снижение концентрации интерлейкина-8 в сыворотке крови ниже 100 пг/мл
- Б. Повышение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови более 6 мг/л
- В. Нейтрофильный индекс < 0,2
- Г. Лейкопению 9 /л

Введение вакцины бцж осуществляется для профилактики

- А. Коклюша
- Б. Кори
- В. Дифтерии
- Г. Туберкулеза

В первую очередь при врожденной диафрагмальной грыже проводят

- А. Искусственную вентиляцию лёгких
- Б. Зондирование желудка
- В. Срочную операцию
- Г. Кислородотерапию через маску

Анализ спинномозговой жидкости: прозрачная, бесцветная, цитоз – 7 клеток (100% лимфоциты), сахар – 2,4 ммоль/л, хлориды – 120 ммоль/л – характерен для

- А. Нормального состава ликвора
- Б. Серозного менингита
- В. Туберкулезного менингита
- Г. Гнойного менингита

Для профилактики возникновения железодефицитной анемии у детей первого полугодия, находящихся на искусственном вскармливании, используют ____ смеси

- А. Начальные молочные
- Б. Неадаптированные молочные
- В. Последующие молочные
- Г. Частично гидролизированные

Для сыпи при ветряной оспе характерны особенности в виде

- А. Пятнисто-папулезных высыпаний на неизмененном фоне кожи
- Б. Одномоментных (в течение дня) пузырьковых высыпаний, многокамерность элемента
- В. Полиморфизма с преобладанием везикул, их легкое опорожнение после прокола, пупковидное вдавливание у отдельных элементов
- Г. Геморрагических высыпаний и их слияние с образованием некрозов

К характерным клиническим симптомам острого холецистита у детей относят боли

- А. В эпигастрии, тошноту, изжогу
- Б. В правом подреберье, симптомы токсикоза, тошноту
- В. Опоясывающего характера, повторную рвоту
- Г. В животе, жидкий стул, метеоризм

Основным побочным эффектом применения аминогликозидов является

- А. Нарушение функции почек
- Б. Агранулоцитоз
- В. Анемия
- Г. Нарушение функции печени

Коробочный (тимпанический) оттенок перкуторного звука определяется при

- А. Ателектазе
- Б. Синдроме скопления жидкости в полости плевры
- В. Полисегментарной инфильтрации лёгочной ткани
- Г. Бронхообструктивном синдроме

Методом оценки состояния слизистой оболочки толстой кишки является

- А. Копрограмма
- Б. Ректороманоскопия
- В. Ирригография
- Г. Бактериологическое исследование фекалий

Причиной кардиогенного шока является

- А. Обезвоживание
- Б. Дыхательная недостаточность
- В. Острая митральная недостаточность при инфекционном эндокардите
- Г. Острая недостаточность трикуспидального клапана при инфекционном эндокардите

Эндемический зоб развивается в результате дефицита

- А. Железа
- Б. Йода
- В. Селена
- Г. Кальция

Под консилиумом понимают совещание

- А. Представителей администрации медицинской организации для решения вопроса об эвакуации пациента
- Б. Несколько врачей одной или нескольких специальностей, необходимое для установления состояния здоровья пациента
- В. Представителей страховых компаний по решению спорных вопросов лечения пациентов
- Г. Сотрудников клинической кафедры по профилю заболевания пациента

К продуктам с высокой сенсibiliзирующей активностью относят

- А. Мясо индейки, картофель
- Б. Коровье молоко, рыбу, яйца, арахис
- В. Рис, мясо кролика, гречку
- Г. Тыкву, арбуз, огурец, малину

Степень нарушений функций организма при заболеваниях сердечно-сосудистой системы определяется

- А. Социальными факторами
- Б. Выраженностью недостаточности кровообращения
- В. Наличием сопутствующих заболеваний
- Г. Физическим развитием ребёнка

Наиболее типичная локализация сыпи при скарлатине проявляется на

- А. Грудь
- Б. Дистальных отделах рук
- В. Разгибательных поверхностях ног
- Г. Естественных складках кожи

Кислородотерапия должна проводиться любому ребенку с сатурацией крови кислородом ниже (%)

- А. 92
- Б. 98
- В. 80
- Г. 85

В этиотропной терапии врождённой герпетической инфекции используют

- А. Ампициллин
- Б. Азитромицин
- В. Ацикловир
- Г. Амфотерицин В

Рубчик после вакцинации бцж свидетельствует о/об

- А. Осложнении вакцинации БЦЖ
- Б. Инфицировании микобактериями туберкулеза
- В. Эффективности лечения
- Г. Сформировавшемся иммунитете

Увеличение затылочных лимфатических узлов характерно для

- А. Ангины
- Б. Гриппа
- В. Назофарингита
- Г. Краснухи

Промывание желудка у ребенка с отравлением в бессознательном состоянии допустимо

- А. В положении на боку с опущенной головой
- Б. В положении на спине
- В. После идентификации яда
- Г. После интубации трахеи

Одним из условий для вынесения заключения о признании инвалидом при проведении медико-социальной экспертизы является

- А. Ходатайство предприятия, на котором работает больной
- Б. Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма
- В. Возраст пациента
- Г. Допущенные дефекты в лечении

К формированию врожденного порока сердца может привести воздействие вредных факторов в/во _____ триместре беременности

- А. Втором
- Б. Третьем
- В. Втором или третьем
- Г. Первом

Местная реакция на пробу манту с 2 те оценивается через (в часах)

- А. 24
- Б. 6
- В. 72
- Г. 48

Основной внелегочной причиной дыхательных расстройств у недоношенных детей является

- А. Перинатальное поражение центральной нервной системы
- Б. Гипофункция щитовидной железы
- В. Метаболическое нарушение (гипокалиемия, гипомагниемия)
- Г. Врожденный порок сердца

Рахит - полиэтиологическое заболевание, связанное с нарушением в растущем организме обмена

- А. Кальция и калия
- Б. Кальция и фосфора
- В. Натрия и фосфора
- Г. Магния и натрия

Глубина введения газоотводной трубки у детей первого года жизни должна быть до (в сантиметрах)

- А. 18-20
- Б. 6-8
- В. 4-5
- Г. 10-15

Дефект межжелудочковой перегородки может располагаться _____ перегородки

- А. Только в приточной части межжелудочковой
- Б. Только в мембранозной части
- В. Только в мышечной части межжелудочковой
- Г. В любом анатомическом отделе межжелудочковой

Критерием системной воспалительной реакции при течении неонатального сепсиса у новорожденных является лейкопения ____ $\times 10^9$ /л

- А. < 4
- Б. < 2
- В. < 5
- Г. < 3

Максимальное время наложения кровоостанавливающего жгута на конечность в зимнее время сокращают на (в минутах)

- А. 90
- Б. 60
- В. 30
- Г. 20

Клинические симптомы раннего менингита у новорожденных выявляются _____ жизни

- А. В первые 4 суток
- Б. После 10 суток
- В. На 7-10 сутки
- Г. На 5-7 сутки

Агглютинины а и в находятся на поверхности

- А. Эозинофилов
- Б. Лимфоцитов
- В. Эритроцитов
- Г. Тромбоцитов

Оптимальной величиной реер (пдкв) в течение перевода новорожденного с ивл на спонтанное дыхание считается (в см вод. Ст.)

- А. 5-10
- Б. 5
- В. 2-3
- Г. 10

Легкость повреждения и инфицирования кожи у грудных детей связана с

- А. Толстым, рыхлым роговым слоем, склонностью к мацерации
- Б. Тонкостью кожи, склонностью к мацерации, незрелостью местного иммунитета
- В. Толстым, рыхлым роговым слоем, незрелостью местного иммунитета
- Г. Тонкостью кожи, кислой реакцией секрета кожи

Для лечения больного скарлатиной назначают

- А. Линкомицин
- Б. Хлорамфеникол
- В. Пенициллины
- Г. Олеандомицин+терациклин

Анатомическая облитерация открытого артериального протока у ребенка происходит к _____ жизни

- А. 1 Году
- Б. 14 Дню
- В. 3-4 Месяцу
- Г. 6-7 Месяцам

С целью определения гидрофильности тканей используется

- А. Анализ Аддиса – Каковского
- Б. Проба Зимницкого
- В. Проба Сулковича
- Г. Проба Макклюра – Олдрича

Инсулин продуцируется _____ поджелудочной железы

- А. Бета-клетками
- Б. Альфа-клетками
- В. Дельта-клетками
- Г. РР-клетками

Патогномоничным признаком инфекции простого герпеса являются высыпания

- А. Уртикарные
- Б. Розеолезные
- В. Пятнисто-папулезные
- Г. Пузырьковые

Наиболее частым осложнением при подкожном введении вакцины бцж является

- А. Келлоидный рубец
- Б. Коллапс
- В. Холодный абсцесс
- Г. Остановка дыхания

Для расчёта количества молочных зубов у ребёнка до 1 года используют формулу (где n - возраст в месяцах)

- А. $N + 4$
- Б. $4N - 20$
- В. $20 - 2N$
- Г. $N - 4$

У пациентов с почечной недостаточностью с целью коррекции вторичного гиперпаратиреоза и предотвращения почечной остеодистрофии рекомендуется терапия

- А. Альфакальцидолом или кальцитриолом
- Б. Витаминами группы В
- В. Препаратами магния
- Г. Кальция глюконатом или кальция хлоридом

Первичную вакцинацию против туберкулеза осуществляют здоровым новорожденным в возрасте ____ дней жизни

- А. 10-14
- Б. 3-7
- В. 24-28
- Г. 1-2

Наиболее частой формой ожирения у детей является

- А. Смешанная
- Б. Церебрально-спинальная
- В. Экзогенно-конституциональная
- Г. Диенцефально-неврогенная

При констриктивном перикардите на ЭКГ отмечается

- А. Атриовентрикулярная блокада II степени
- Б. Увеличение амплитуды комплексов QRS
- В. Атриовентрикулярная блокада III степени
- Г. Снижение амплитуды комплексов QRS

Лекарственным средством, обладающим антихеликобактерным действием, является

- А. Цетиризин
- Б. Кларитромицин
- В. Метоклопрамид
- Г. Гентамицин

Для акросклеротического варианта системной склеродермии характерно наличие

- А. Эрозивного артрита мелких суставов кистей
- Б. Проксимального полимиозита
- В. Склеродактилии
- Г. Энтезопатий

Средний показатель окружности головы в 6 месяцев составляет (в см)

- А. 39-41
- Б. 36-38
- В. 45-46
- Г. 42-44

Остронефритический синдром является проявлением

- А. Болезни минимальных изменений
- Б. Острого пиелонефрита
- В. Болезни тонких базальных мембран
- Г. Острого постстрептококкового гломерулонефрита

Колбообразное расширение и инфильтрация тканей в области ногтевой фаланги, резкая болезненность при пальпации, гиперемия и гипертермия у ребенка характерны для _____ панариция

- А. Кожного
- Б. Костного
- В. Подкожного
- Г. Подногтевого

Наиболее активно снижают риск эрозий от нестероидных противовоспалительных средств (НПВС)

- А. Спазмолитики
- Б. Ингибиторы протонной помпы
- В. Препараты висмута
- Г. Н-2 блокаторы

Первичным элементом сыпи является

- А. Эрозия
- Б. Пятно
- В. Язва
- Г. Чешуйка

Оценку пробы манту с 2 те ппд-л проводят через (в часах)

- А. 48
- Б. 24
- В. 72
- Г. 12

Диффузное ослабление дыхания характерно для

- А. Острой пневмонии
- Б. Острого простого бронхита
- В. Острого ринофарингита
- Г. Приступного периода бронхиальной астмы

Боли опоясывающего характера с иррадиацией в левую половину грудной клетки наблюдают у ребенка с

- А. Хроническим активным гепатитом
- Б. Желчной коликой
- В. Острым холецистохолангитом
- Г. Острым панкреатитом

К симптомам острой сосудистой недостаточности по типу ортостатического коллапса относят

- А. Резкую слабость, бледность, головокружение, тахикардию, нитевидный пульс, снижение АД
- Б. Сопор, тонические судороги, артериальную гипотензию, гипотермию, снижение диуреза
- В. Внезапную потерю сознания, судороги, непроизвольное мочеиспускание
- Г. Отсутствие сознания, цианоз, мышечную гипотонию, асистолию

Субдуральные кровоизлияния чаще других происходят у

- А. Переношенных с внутриутробной гипотрофией
- Б. Доношенных с большой массой тела
- В. Доношенных с внутриутробной гипотрофией
- Г. Доношенных со средними массо-ростовыми показателями

Ребенку, имеющему хронический гастрит в стадии обострения, с физическим развитием, отстающим от возраста, с гармоничным, соответствующим возрасту психическим развитием, перенесшему 3 ОРВИ и парагрипп за год, предшествовавший обследованию, определяют ____ группу здоровья

- А. 1
- Б. 3
- В. 4
- Г. 2

Наиболее частой причиной лактостаза при грудном вскармливании является

- А. Первичная гипогалактия матери
- Б. Кормление по требованию
- В. Смешанное вскармливание ребенка
- Г. Нарушение техники вскармливания

Детям со сниженной массой тела в виде первого основного прикорма в соответствии с национальной программой оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации целесообразно назначать

- А. Мясные блюда промышленного производства
- Б. Овощные пюре домашнего приготовления
- В. Каши домашнего приготовления
- Г. Каши промышленного производства

Ревакцинации бцж подлежат здоровые неинфицированные микобактерией туберкулеза дети в возрасте (в годах)

- А. 14
- Б. 5
- В. 7
- Г. 12

Плазматические клетки, непосредственно синтезирующие антитела, формируются из

- А. Макрофагов
- Б. В-лимфоцитов
- В. Нейтрофилов
- Г. Т-лимфоцитов

Характерным кашлем при коклюше является

- А. Беззвучный
- Б. Битональный
- В. «Лающий»
- Г. Приступообразный с репризами

Артериальная гипертензия на верхних конечностях характерна для

- А. Транспозиции магистральных артерий
- Б. Коарктации аорты
- В. Дефекта аорто-легочной перегородки
- Г. Стеноза легочной артерии

При исследовании функции внешнего дыхания у больного с полисегментарной пневмонией в первую очередь снижается

- А. ОФВ1
- Б. МОС 25-75
- В. Индекс Тиффно
- Г. ЖЁЛ

Для выхаживания маловесных детей наиболее подходит смесь

- А. НАН гипоаллергенный
- Б. Нутрилак соя
- В. Симилак с железом
- Г. Альфаре

При отравлении фосфорорганическими препаратами в качестве антидотной терапии применяется

- А. Димеркапрол
- Б. Метоклопрамид
- В. Атропин
- Г. Тиосульфат натрия

Хирургическая коррекция в плановом порядке показана при

- А. Атрезии легочной артерии
- Б. Дефекте межжелудочковой перегородки
- В. Атрезии трикуспидального клапана
- Г. Болезни Толочинова-Роже

В основе болезни гиршпрунга лежит

- А. Токсическая дилатация толстой кишки
- Б. Поражение подслизистого и слизистого слоев кишки
- В. Врожденный аганглиоз участка толстой кишки
- Г. Гипертрофия мышечного слоя кишки

Лица, незаконно занимающиеся медицинской и фармацевтической деятельностью, в соответствии с законодательством Российской Федерации могут привлекаться к _____ ответственности

- А. Материальной
- Б. Процессуальной
- В. Уголовной
- Г. Персональной

Ребенку с гармоничным, соответствующим возрасту физическим и психическим развитием, перенесшему 3 ОРВИ и катаральную ангину за год, предшествовавший обследованию, определяют ____ группу здоровья

- А. 1
- Б. 3
- В. 4
- Г. 2

Для верификации диагноза «острый лейкоз» наиболее достоверно проведение

- А. Общего анализа крови
- Б. Иммунологического анализа крови
- В. Миелограммы
- Г. Биохимического анализа крови

При железодефицитной анемии мясо в рацион ребёнка следует вводить в возрасте не позднее (в месяцах)

- А. 6
- Б. 4
- В. 7
- Г. 8