

Тесты с вопросами по специальности «Педиатрия» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/pediatr/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Педиатрия» для аккредитации и других экзаменов (4700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/vrach_pediatriya/

2) Тесты для аккредитации «Неонатология» (3800 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/neonatologiya/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

При ювенильном идиопатическом артрите всегда отмечается:

- А. Поражение мелких суставов
- Б. Наличие кардиальных изменений
- В. Длительное течение артрита
- Г. «Летучесть» суставных болей
- Д. Циклическое течение с полным и быстрым обратным развитием

Препаратами первого выбора для купирования острого приступа удушья при бронхиальной астме являются:

- А. Бета2-адреномиметики короткого действия
- Б. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- В. М-холинолитики
- Г. Метилксантины замедленного высвобождения
- Д. Антибиотики

Для острого постинфекционного нефрита характерно:

- А. Благоприятный прогноз
- Б. Циклическое течение
- В. Гематурия
- Г. Артериальная гипертензия
- Д. Все перечисленное верно

Термин «внебольничная пневмония» отражает:

- А. Выраженность пневмонических изменений на рентгенограмме
- Б. Условия, в которых произошло инфицирование
- В. Тяжесть состояния больного
- Г. Отсутствие необходимости в госпитализации больного
- Д. Необходимость организации лечения в дневном стационаре

Мальчик 6 лет, на приеме у участкового врача-педиатра с жалобами на генерализованные отеки, боли в пояснице, снижение диуреза. Из анамнеза известно, что ребенок месяц назад перенес острый тонзиллит с повышением температуры. Каков наиболее вероятный диагноз?

- А. Мочекаменная болезнь
- Б. Острый гломерулонефрит, острая почечная недостаточность
- В. Острый пиелонефрит
- Г. Острый миокардит, острая левожелудочковая сердечная недостаточность
- Д. Ревматическая лихорадка

Инкубационный период при скарлатине составляет:

- А. Несколько часов
- Б. 1-3 дня
- В. 1-7 дней
- Г. 1-14 дней
- Д. 10-21 день

У матери девочки 15 лет обнаружен рак шейки матки. Мать обратилась к педиатру для разъяснения вопросов профилактики данного заболевания у дочери. Какова наиболее верная тактика врача?

- А. Направить девочку к гинекологу для обследования
- Б. Направить девочку для проведения вакцинации против ВПЧ
- В. Направить девочку на консультацию к инфекционисту
- Г. Успокоить мать, так как это не генетическое заболевание
- Д. Принять решение после результатов УЗИ малого таза

Причиной развития железодефицитной анемии у детей может быть все, кроме:

- А. Синдром мальабсорбции
- Б. Неадекватный рацион питания
- В. Инфекционные заболевания
- Г. Аплазия костного мозга
- Д. Ювенильные маточные кровотечения у девочек

Основная причина высокой концентрации билирубина у новорожденных от матерей, страдающих сахарным диабетом:

- А. Гемолиз эритроцитов
- Б. Запоздывание созревания глюкоронилтрансферазы
- В. Внепеченочная обструкция желчевыводящих путей
- Г. Внутривнепеченочная обструкция желчевыводящих путей
- Д. Нарушение захвата билирубина печеночной клеткой

Дополнительными критериями биологической зрелости здорового доношенного новорожденного ребенка (40 недель гестации) являются следующие особенности придатков кожи:

- А. Ногти не достают дистальных окончаний последней фаланги
- Б. Пушковые волосы (lanugo) выражены только на половине площади спины
- В. На фоне сохраняющегося пушкового оволосения (lanugo) появляются участки, лишенные пушка
- Г. Наличие бледно-желтых точек, выступающих над уровнем кожи в области носа (milla)
- Д. Пушковые волосы (lanugo) выражены на всей площади спины

Причина кровоточивости при гемофилии?

- А. Тромбоцитопения
- Б. Тромбоцитопатия
- В. Нарушение проницаемости сосудистой стенки
- Г. Дефицит факторов свертывающей системы
- Д. Активация противосвертывающей системы

Ребенок 8 месяцев. Отмечаются распространенные костные деформации (увеличение теменных и затылочных бугров, расширение нижней апертуры грудной клетки, «четки» на ребрах), мышечная гипотония. В биохимическом анализе крови - повышение уровня щелочной фосфатазы и снижение уровня кальция и фосфора. Какое заболевание необходимо заподозрить в первую очередь?

- А. Рахит в стадии разгара
- Б. Рахит в периоде реконвалесценции
- В. Дисплазия соединительной ткани
- Г. Гипервитаминоз Д
- Д. Несовершенный остеогенез

Ребенку 4 месяца. Родился от 1-х родов в 35 лет, роды затяжные. Оценка по шкале Апгар 5/6 баллов. В течение первых дней состояние тяжелое, за счет неврологической симптоматики. Выписан домой на 19-й день жизни. В последующем регулярного врачебного наблюдения не было. Что из перечисленного ниже, обнаруженного при осмотре, соответствует возрастной норме?

- А. Самостоятельно не садится
- Б. Гипертонус мышц рук и ног
- В. Тенденция к перекресту ног
- Г. Наличие ладонно-ротового рефлекса
- Д. Наличие хватательного рефлекса

В первую очередь в диагностических целях при тромбоцитопенической пурпуре необходимо выполнить:

- А. Коагулограмму
- Б. Клинический анализ крови с определением количества тромбоцитов
- В. Исследование уровня протромбина
- Г. Биохимическое исследование крови
- Д. Иммунограмму

Для диагностики воспалительного заболевания кишечника целесообразно исследовать:

- А. Уровень панкреатической эластазы в кале
- Б. Уровень кальпротектина в кале
- В. Антитела к транскламиназе в сыворотке крови
- Г. Уровень хлоридов пота
- Д. Уровень альфа1-антитрипсина в кале

Для нефротического синдрома характерны:

- А. Значительная протеинурия, гипоальбуминемия, гипопроteinемия
- Б. Гиполипидемия, гипохолестеринемия
- В. Артериальная гипертензия, гипертоническая энцефалопатия
- Г. Гипофибриногенемия, тромбоцитопатия
- Д. Гематурия, лейкоцитурия

Второй дородовой патронаж проводится:

- А. После поступления сведений о постановке беременной на учет
- Б. Участковой медицинской сестрой на 8 - 13 неделе беременности
- В. Участковой медицинской сестрой на 31 - 32 неделе беременности
- Г. Участковой медицинской сестрой после 36 недель беременности
- Д. Участковым педиатром при неблагополучном акушерском анамнезе

К местным глюкокортикостероидам, применяемым для наружной терапии атопического дерматита у детей, относится:

- А. Пиритион цинка
- Б. Мометазон
- В. Пимекролимус
- Г. Такролимус
- Д. Декспантенол

Каким нормативным документом гарантируется Право граждан РФ на охрану здоровья:

- А. Трудовым кодексом
- Б. Конституцией РФ
- В. Гражданским кодексом
- Г. Основами законодательства об охране здоровья граждан

Какие причины уменьшения частоты обструктивного бронхита с возрастом ребенка:

- А. Увеличение силы дыхательной мускулатуры
- Б. Снижение частоты респираторной аллергии
- В. Увеличение просвета бронхов
- Г. Иммунитет к респираторным вирусам
- Д. Увеличение содержания Т-лимфоцитов в сыворотке крови

Ребенок 7 месяцев. Родился на 38-39 неделе беременности. Вскармливается кефиром и коровьим молоком, прикорма не получает. Часто болеет. При диспансерном наблюдении выявлена бледность кожи и слизистых. В анализе крови Нв 92 г/л, эр. $4,1 \times 10^{12}/л$, MCV 0,67, лейкоциты $9,0 \times 10^9/л$, нейтрофилы 48%, тромбоциты $225 \times 10^9/л$. Какая анемия наиболее вероятна в данном случае?

- А. Железодефицитная
- Б. Наследственная гемолитическая
- В. Врожденная апластическая
- Г. Поздняя анемия недоношенных
- Д. В12 и фолиево-дефицитная

Для лабораторной верификации целиакии назначают:

- А. Анализ мочи на суточную экскрецию оксалатов
- Б. Исследование длительности кровотечения и свертываемости крови
- В. Исследование белковых фракций сыворотки и уровня трансаминаз
- Г. Исследование антител к тканевой трансглутаминазе
- Д. Определение хлоридов пота

Фототерапия применяется для лечения:

- А. Гипербилирубинемии новорожденного
- Б. Инфекционных заболеваний кожи
- В. Фетального гепатита
- Г. Атрезии желчных путей
- Д. Гиповитаминоза Д

Состояние, являющееся противопоказанием к кормлению грудью со стороны матери:

- А. Острая респираторная вирусная инфекция
- Б. Гепатит А
- В. Инсулинозависимый сахарный диабет
- Г. Аутоиммунный тиреоидит
- Д. Открытая форма туберкулеза

В каких случаях следует прекратить грудное вскармливание ребенка:

1. Гнойный мастит у матери
2. Мастит новорожденных у ребенка
3. Распространенный атопический дерматит у ребенка
4. Везикулопустулез у ребенка
5. Низкая прибавка в весе у ребенка

- А. 1
- Б. 1,3
- В. 1,3,4
- Г. 1,3,5
- Д. 1,2,3,4,5

Причиной артериальной гипертензии в детском возрасте наиболее часто является:

- А. Эссенциальная артериальная гипертония
- Б. Заболевания почек
- В. Заболевания центральной нервной системы
- Г. Сахарный диабет

В каких случаях у ребенка следует исключать иммунодефицит:

1. Упорный кандидоз слизистых, микоз кожи и ногтей
2. Частые острые респираторные заболевания
3. Пневмоцистная пневмония
4. Генерализованный БЦЖ-ит или БЦЖ-остеит
5. Вакциноассоциированный полиомиелит

- А. 1,2,3,4,5
- Б. 1,3,4,5
- В. 1,2,3,4
- Г. 3,4,5

Суточное мониторирование артериального давления позволяет:

- А. Исключить гипертензию «белого халата»
- Б. Оценить тяжесть артериальной гипертензии
- В. Оценить длительность артериальной гипертензии в течение суток
- Г. Оценить эффективность терапии
- Д. все перечисленное верно

На прием к педиатру обратилась мать с ребенком 3-х лет, у которого 2 дня назад был контакт в детском дошкольном учреждении по ветряной оспе. Каковы должны быть действия врача?

- А. Осмотреть ребенка, оформить карантин с 11 дня от контакта
- Б. Предложить экстренную вакцинацию
- В. Ввести иммуноглобулин
- Г. Осмотреть ребенка и оформить карантин сразу
- Д. Назначить противовирусное лечение

В декабре 2021 г были внесены изменения в Национальный календарь профилактических прививок (приказ МЗ 1122н). Какие изменения появились в данном приказе?

- А. Включена вакцинация против пневмококковой инфекции
- Б. Включена вакцинация против менингококковой инфекции
- В. Включена вакцинация против ветряной оспы
- Г. Изменена схема вакцинации против коклюша
- Д. Изменены сроки введения и виды вакцин против полиомиелита

Родители 6-месячного ребенка обеспокоены быстрым увеличением его головы, так как шапочки, купленные заранее, оказались ему малы. Измерения, проведенные патронажной сестрой, показали, что окружность головки ребенка равна 43 см, грудной клетки - 44 см. Оцените параметры.

- А. Пропорциональны и соответствуют возрасту ребенка
- Б. Увеличены оба параметра
- В. Чрезмерно велики размеры головки
- Г. Чрезмерно велика окружность грудной клетки
- Д. Оба параметра ниже возрастных норм

Небулайзер применяется для ингаляционного введения:

1. Глюкокортикостероидов
2. Фитопрепаратов
3. Бронходилататоров
4. Аминофиллина
5. Раствора NaHCO_3

А. 1,2,3,4,5

Б. 1,3

В. 1,2,3,5

Г. 2,4,5

Д. 2,5

У ребенка 1,5 лет диагностирована острая респираторная вирусная инфекция в форме острого назофарингита. Какое лечение показано этому пациенту:

А. Антибактериальная терапия амоксициллином

Б. Жаропонижающие средства, туалет носа, деконгестанты

В. Жаропонижающие средства, муколитики, туалет носа

Г. Жаропонижающие средства, туалет носа, деконгестанты, бронходилататоры, муколитики

Д. Жаропонижающие средства, туалет носа, деконгестанты, антигистаминные препараты

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие этиологического фактора болезни:

1. *Streptococcus pneumoniae*

2. *Streptococcus pyogenes*

3. *Pseudomonas aeruginosa*

4. *Mycoplasma pneumoniae*

5. *Klebsiella pneumoniae*

А. Внебольничная пневмония

Б. Внутрибольничная пневмония

А. 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А

Б. 1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5А

В. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5Б

У ребенка 6 месяцев в течение недели нарастает приступообразный кашель с репризами, иногда после приступа кашля возникает рвота. Лихорадки нет. Наиболее вероятный диагноз:

А. Обструктивный бронхит

Б. Обструктивный ларинготрахеит

В. Коклюш

Г. Эпиглоттит

Д. Острый РС-вирусный бронхиолит

У ребенка 10 месяцев на фоне острого респираторного заболевания повышение температуры тела до 39,8*С. Кожа горячая, влажная на ощупь, на щеках эритема, конечности теплые. Какой препарат выбора для купирования лихорадки в данном случае:

- А. Парацетамол перорально или ректально
- Б. Метамизол натрия внутримышечно
- В. Метамизол натрия в сочетании с хлоропирамином и дротаверином внутримышечно
- Г. Нимесулид перорально
- Д. Парацетамол внутривенно капельно

При гипербилирубинемии у доношенного новорожденного возможно развитие ядерной желтухи, если уровень непрямого билирубина повысился:

- А. Выше 56 мкмоль/л
- Б. Выше 100 мкмоль/л
- В. Выше 150 мкмоль/л
- Г. Выше 250 мкмоль/л
- Д. Выше 340 мкмоль/л

К признакам гемолитической болезни новорожденных не относится:

- А. Желтуха
- Б. Анемия
- В. Геморрагическая сыпь
- Г. Ретикулоцитоз
- Д. Повышение уровня непрямого билирубина

Физическое развитие у детей в возрасте до 1 года должно быть оценено:

- А. 1 раз в год
- Б. 1 раз в полгода
- В. 1 раз в квартал
- Г. 1 раз в месяц
- Д. 1 раз в 10 дней

Антибиотик выбора для лечения стрептококкового тонзиллита:

- А. Азитромицин
- Б. Цефтриаксон
- В. Ванкомицин
- Г. Амикацин
- Д. Амоксициллин

Для аллергического конъюнктивита у детей характерно все, кроме:

- А. Жжения в глазах
- Б. Зуда
- В. Слезотечения
- Г. Кровоизлияния в склеру
- Д. Отека век и параорбитальных тканей

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Укажите препарат выбора для лечения острого заболевания:

1. Внебольничная пневмония
2. Бронхиолит
3. Острый обструктивный бронхит
4. Обструктивный ларинготрахеит
5. Стрептококковый тонзиллит

- А. Антибиотики
- Б. Бронходилататоры
- В. Будесонид в ингаляциях
- Г. Иммуномодуляторы

А. 1А, 2В, 3Б, 4Б, 5А

Б. 1В, 2В, 3Б, 4В, 5А

В. 1А, 2Б, 3Б, 4В, 5А

Для железодефицитной анемии характерны:

1. Низкий уровень железа в сыворотке крови
2. Низкий уровень ферритина в сыворотке крови
3. Высокий уровень ферритина в сыворотке крови
4. Низкий уровень трансферрина в сыворотке крови
5. Высокий уровень трансферрина в сыворотке крови

А. 1,2,4

Б. 1,3,5

В. 1,2,5

Г. 2,4

Д. 3,5

Выберите препараты, которые могут быть назначены для лечения атипичной пневмонии у ребенка:

1. Амоксициллин
2. Амоксициллин-клавуланат
3. Кларитромицин
4. Цефотаксим
5. Ципрофлоксацин

- А. 1,2,3
Б. 1,2,4
В. 3
Г. 3,4,5

Возможные осложнения при остром стрептококковом тонзиллите /ангине/:

1. Острый гломерулонефрит
2. Менингоэнцефалит
3. Паратонзиллярный абсцесс
4. Гепатит
5. Ревматическая лихорадка

- А. 1,3,5
Б. 1,2,3,5
В. 2,4
Г. 1,5
Д. 1,2,3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. К какой группе антимикробных средств относятся перечисленные лекарственные препараты:

1. Амикацин
 2. Цефепим
 3. Ванкомицин
 4. Кларитромицин
 5. Меропенем
- А. Цефалоспорины
Б. Карбапенемы
В. Макролиды
Г. Аминогликозиды
Д. Гликопептиды

- А. 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б
Б. 1Г, 2Б, 3Д, 4В, 5Б
В. 1Д, 2А, 3Д, 4В, 5Б

Плевриты, возникающие одновременно с пневмонией, называются:

- А. Синпневмоническими
- Б. Метапневмоническими
- В. Аллергическими
- Г. Серозными
- Д. Эксудативными

Первый прикорм здоровым детям, находящимся на естественном вскармливании, дают в возрасте не ранее:

- А. 2-3 месяцев
- Б. 3-4 месяцев
- В. 5-6 месяцев
- Г. 7-8 месяцев
- Д. 8-9 месяцев

Для синдрома острой почечной недостаточности (стадия олигоанурии) характерны:

- 1. Ацидоз
- 2. Азотемия
- 3. Гиперкалиемия
- 4. Гипопротеинемия
- 5. Гипогликемия

- А. 1,2,3,4,5
- Б. 1,2,3,4
- В. 1,2,3
- Г. 1,2,4

Ребенок 10 месяцев на приеме у педиатра. Отмечается повышение температуры, интоксикация, прорезываются зубы. В крови - лейкоцитоз, высокая СОЭ, в моче - лейкоцитурия, бактериурия. Какой предположительный диагноз?

- А. Острый пиелонефрит
- Б. Острый гломерулонефрит
- В. Острый цистит
- Г. Синдром прорезывания зубов

У детей раннего возраста наиболее часто встречается:

- А. Лекарственная аллергия
- Б. Пищевая аллергия
- В. Пыльцевая аллергия
- Г. Бытовая аллергия
- Д. Контактный аллергический дерматит

Физиологическая роль бурой жировой ткани у новорожденных и детей первых месяцев жизни:

- А. Обеспечивает хороший тургор тканей
- Б. Обеспечивает теплопродукцию (несократительный термогенез)
- В. Хорошее развитие бурой жировой ткани в брюшной полости и забрюшинном пространстве препятствует легкой смещаемости внутренних органов
- Г. Активное участие в энергетическом обмене
- Д. Обеспечивает теплоотдачу

Основной причиной развития болезней накопления являются:

- А. Врожденные энзимопатии
- Б. Хроническое бактериальное воспаление
- В. Вирусные инфекции
- Г. Приобретенные энзимопатии
- Д. Онкологические заболевания

Везикулезный характер сыпи характерен для:

- А. Скарлатины
- Б. Парвовирусной инфекции
- В. Ветряной оспы
- Г. Крапивницы
- Д. Инфекционного мононуклеоза

Выберите препараты, которые могут быть назначены для стартового лечения острого пиелонефрита у ребенка:

- 1. Амоксициллин
- 2. Амоксициллин-клавуланат
- 3. Кларитромицин
- 4. Цефуроксим
- 5. Цефотаксим
- А. 1,2,4,5
- Б. 2,4,5
- В. 1,2,5

Для острого гломерулонефрита характерно:

- А. Олигурия, отеки на лице, повышение артериального давления
- Б. Олигурия, увеличение печени и селезенки
- В. Повышение артериального давления на руках, снижение артериального давления на ногах
- Г. Артралгии, петехиальные высыпания на коже
- Д. Макрогематурия

Начинать выведение ребенка 8 лет из приступа пароксизмальной тахикардии при артериальном давлении 90/60 мм рт. ст. целесообразно с применения:

- А. Адреналина внутривенно
- Б. Дигоксина внутримышечно
- В. Верапамила внутривенно
- Г. Вагальных проб
- Д. АТФ внутривенно

Ребенок в возрасте 11 месяцев должен быть вакцинирован от:

- 1. Кори
 - 2. Дифтерии
 - 3. Гепатита В
 - 4. Пневмококковых инфекций
 - 5. Паротита
- А. 1,2,3,5
 - Б. 2,3,4
 - В. 2,3,4,5

На консультацию к невропатологу направлен мальчик семи лет с остро развившейся мышечной слабостью и нарушением походки. Невропатолог обнаружил у ребенка признаки дистрофии, параорбитальный отек и эритему, гнусавый оттенок голоса, поперхивание, отек и уплотнение мышц плечевого пояса и бедер. Мальчик не мог поднять руки, сесть из положения лежа, выполнить приседание. Симптомы поражения центральной и периферической нервной системы не выявлены. Врач предположил:

- А. Системную красную волчанку
- Б. Системную склеродермию
- В. Гранулематоз Вегенера
- Г. Дерматомиозит
- Д. Смешанное заболевание соединительной ткани

Показанием для назначения кислородотерапии у ребенка является:

- А. Уровень $SpO_2 < 98\%$
- Б. Уровень $SpO_2 < 95\%$
- В. Уровень $SpO_2 < 90\%$
- Г. Уровень $SpO_2 < 88\%$
- Д. Уровень $SpO_2 < 85\%$

Ребенок 3-х месяцев не был привит в роддоме и в настоящее время мать планирует начать вакцинацию. Выберите наиболее верную тактику врача.

- А. Сделать реакцию Манту, затем БЦЖ-м, затем АКДС
- Б. Сделать одновременно все необходимые прививки
- В. Привить сначала от туберкулеза, через месяц другие прививки
- Г. Перед принятием решения обследовать ребенка
- Д. Оформить медотвод до 6 месяцев

К симптомам нарушения функции канальцев не относится:

- А. Снижение концентрационной функции почек
- Б. Аминоацидурия
- В. Глюкозурия
- Г. Гипергликемия
- Д. Метаболический ацидоз

Вызов участкового педиатра к ребенку 3-х месяцев. Болен второй день, повышение температуры до 38,7*С, снижение аппетита, мутная моча с неприятным запахом. Тактика участкового врача:

- А. Госпитализация в стационар
- Б. Назначение антибиотиков, антигистаминных и жаропонижающих
- В. Назначение анализов крови и мочи, УЗИ почек и мочевыводящих путей
- Г. Назначение парацетамола, повторный осмотр на следующий день

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между показателями психомоторного развития и возрастом ребенка :

1. Узнает мать, поворачивает голову на звук, направленные движения ручек, переворачивается со спины на живот
2. Следит за человеком, движущимися предметами, поворачивает голову, начинает улыбаться
3. Самостоятельно сидит, произносит 8-10 осмысленных слов, сам берет чашку и пьет
4. Знает свое имя, шагает при поддержке за обе руки, находит и достает предмет из множества игрушек
5. Ползает, легко садится, подолгу лепечет, пьет из чашки, которую держит взрослый

- А. 1 месяц
- Б. 4 месяца
- В. 7 месяцев
- Г. 9 месяцев
- Д. 12 месяцев

- А. 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В
- Б. 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В
- В. 1А, 2Б, 3Д, 4Г, 5В

Для хронического гастрита ассоциированного с хеликобактером пилорическим (HP+) характерно:

- А. Локализация процесса в теле желудка
- Б. Эрозивный антральный гастрит
- В. Наличие в крови антител к париетальным клеткам желудка
- Г. В12-дефицитная анемия
- Д. Базальная секреция – РН выше 2,5

Лямблии паразитируют:

- А. В печеночных протоках
- Б. В желчном пузыре
- В. В проксимальных отделах тонкой кишки
- Г. В толстой кишке
- Д. В желудке

В комплекс лечебных мероприятий при укусах ядовитых змей не входит:

- А. Введение поливалентной противозмеиной сыворотки
- Б. Отсасывание яда из ранки
- В. Наложение жгута на конечность выше укуса
- Г. Иммобилизация конечности
- Д. Наложение стерильной повязки на место укуса

Девочка, 4 года. Из анамнеза: болеет более недели, когда повысилась температура до 39 С, получала ибупрофен, обильное питье. Накануне появилась инъектированность склер и сыпь, мама вызвала педиатра на дом. При осмотре: температура 39С, склеры инъектированы, губы сухие в трещинах, «земляничный» язык, слизистая ротовой полости и глотки гиперемирована, миндалины без налетов, кожа на кистях и стопах плотная, отечна, ладони и подошвы гиперемированы, на коже туловища и конечностей полиморфная сыпь без везикул. В легких дыхание пуэрильное, проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются, тоны сердца приглушены. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Стул и диурез со слов мамы не нарушены. Каков наиболее вероятный диагноз врача-педиатра участкового?

- А. Скарлатина
- Б. Краснуха
- В. Инфекционный мононуклеоз
- Г. Синдром Кавасаки
- Д. Геморрагический васкулит

Укажите наиболее частую причину водянистой инфекционной диареи:

- А. Шигеллы
- Б. Сальмонеллы
- В. Кампилобактер
- Г. Ротавирусы
- Д. Токсины клостридий

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между характером сыпи и заболеванием:

1. Мелкопятнистая сыпь на неизмененном фоне кожи
2. Геморрагическая «звездчатая» сыпь
3. Везикулярная сыпь с явлениями «ложного» полиморфизма
4. Пятнистопапулезная сыпь на неизмененном фоне кожи
5. Мелкоточечная сыпь на гиперемизированном фоне кожи

- А. Корь
- Б. Краснуха
- В. Скарлатина
- Г. Ветряная оспа
- Д. Менингококцемия

А. 1Б, 2Д, 3Г, 4А, 5В

Б. 1А, 2Д, 3Г, 4Б, 5В

В. 1Б, 2Д, 3Г, 4В, 5А

При полной атриовентрикулярной блокаде желудочки сокращаются:

- А. Чаше, чем предсердия
- Б. Реже, чем предсердия

Укажите биохимический маркер холестаза:

- А. Повышение уровня трансаминаз в сыворотке крови
- Б. Повышение уровня гаммаглутаминтрансферазы в сыворотке крови
- В. Гипоальбуминемия
- Г. Снижение уровня протромбина в плазме крови
- Д. Снижение уровня холестерина в сыворотке крови

К какому возрасту должно сформироваться полное управление мочеиспусканием в течении суток:

- А. К 1 году
- Б. К 2 годам
- В. К 3 годам
- Г. К 4 годам
- Д. К 5 годам

Для оценки эффективности диспансерного наблюдения за детьми используются следующие показатели:

- А. Показатель частоты обострений
- Б. Число случаев и дней временной нетрудоспособности

Абсолютное противопоказание к вскармливанию грудным молоком со стороны ребенка:

- А. Гемолитическая болезнь новорожденных
- Б. Галактоземия
- В. Внутривentricularное кровоизлияние
- Г. Недоношенность
- Д. Пороки челюстно-лицевой области

Критериями контроля над симптомами бронхиальной астмы относятся все ниже перечисленные, кроме

- А. Наличие ночных приступов удушья
- Б. Отсутствие дневных симптомов или менее 2 эпизодов удушья в неделю
- В. Отсутствие изменений на рентгенограмме легких
- Г. Переносимость физической нагрузки
- Д. Применение препаратов для неотложной помощи более 2 раз в неделю

Ревматическая хорея проявляется:

- А. Монопарезом
- Б. Спастическими параличами
- В. Фокальными судорогами
- Г. Гиперкинезами
- Д. «Писчим спазмом»

Пикфлоуметр - это:

- А. Прибор для мониторингирования частоты сердечных сокращений
- Б. Прибор для проведения ингаляций
- В. Прибор для определения газового состава крови
- Г. Прибор для определения пиковой скорости выдоха
- Д. Прибор для измерения насыщения крови кислородом

Для коклюша у детей характерны:

1. Грубый лающий кашель
2. Приступообразный кашель с репризами
3. Кашель до рвоты
4. Дистанционные хрипы при дыхании
5. Сухие свистящие хрипы на выдохе

А. 1,2,3

Б. 1,4,5

В. 2,3

Г. 4,5

Д. 2,3,5

В этиологии внебольничной пневмонии у детей ведущее значение имеет:

А. Пневмококк

Б. Пиогенный стрептококк

В. Протей

Г. Клебсиелла

Д. Бордетелла

В качестве первого прикорма в рацион здорового ребенка вводят:

А. Овощное пюре или кашу

Б. Кефир

В. Творог

Г. Фруктовое пюре

Д. Желток куриного яйца

К внелегочным осложнениям пневмонии относят:

А. Плеврит

Б. Легочную деструкцию

В. Пневмоторакс

Г. Инфекционно-токсический шок

Д. Эмпиему плевры

Какая частота сердечных сокращений в покое свидетельствует о брадикардии у детей 7-9 лет:

А. Менее 120 ударов в минуту

Б. Менее 100 ударов в минуту

В. Менее 80 ударов в минуту

Г. Менее 60 ударов в минуту

Д. Менее 40 ударов в минуту

Укажите антигистаминные препараты 2 поколения:

- 1. Хлоропирамин**
- 2. Цетиризин**
- 3. Дифенгидрамин**
- 4. Клемастин**
- 5. Дезоратадин**

- А. 1,3,4
Б. 1,2,3,4
В. 2,5
Г. 2,4,5
Д. 2,3,4

Ребенок в возрасте 8-ми месяцев с проявлениями атопического дерматита болен острым респираторным заболеванием. На 3-й день болезни появились грубый лающий кашель, общее беспокойство, одышка с втяжением уступчивых мест грудной клетки на вдохе, шумное дыхание, осиплость голоса. Появившиеся симптомы наиболее вероятно свидетельствуют о:

- А. Стенозирующем ларинготрахеите
Б. Коклюше
В. Аспирации инородного тела
Г. Пневмонии
Д. Неосложненном течении острого респираторного заболевания

К лекарственным препаратам, используемым для достижения контроля бронхиальной астмы, относятся:

- 1. β_2 -агонисты короткого действия**
- 2. Иммуномодуляторы**
- 3. Ингаляционные холинолитики**
- 4. Ингаляционные глюкокортикостероиды в комбинации с бронходилататорами длительного действия**
- 5. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов**

- А. 1,2,3
Б. 2,4,5
В. 4,5
Г. 1,3,4,5
Д. 3,4,5

У ребенка 6 месяцев жалобы на рвоту, отказ от еды, стул в виде "малинового желе". Каков наиболее вероятный диагноз:

- А. Острый вирусный гастроэнтерит
Б. Дизентерия
В. Сальмонеллез
Г. Кишечная инвагинация
Д. Острый аппендицит

Ваша тактика при выявлении лактазной недостаточности у ребёнка, находящегося на искусственном вскармливании:

- А. Перевод на вскармливание козьим молоком
- Б. Перевод на низко- и безлактозные смеси
- В. Использование адаптированных молочных смесей
- Г. Перевод на смесь на основе гидролизата белка коровьего молока
- Д. Использование казеиновых формул

Укажите симптомы, которые встречаются при синдроме Кавасаки у детей:

- 1. Лихорадка более 5 дней
- 2. Склерит
- 3. Полиморфная сыпь
- 4. Артериальная гипертензия
- 5. Боль в горле

- А. 1,2,4,5
- Б. 1,3,5
- В. 1,2,3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеваниями и их симптомами:

- 1. Полиморфная сыпь
- 2. Выраженное затруднение носового дыхания
- 3. Наложения на миндалинах
- 4. Склерит
- 5. Тромбоцитоз
- 6. Наличие широкоплазменных лимфоцитов

- А. Синдром Кавасаки
- Б. Инфекционный мононуклеоз

- А. 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А, 6Б
- Б. 1Б, 2Б, 3А, 4А, 5Б, 6Б
- В. 1Б, 2А, 3А, 4Б, 5Б, 6А

У ребенка 2-х лет, посещающего ДДУ, катаральные симптомы в виде насморка, кашля влажного и температуры 37,5 в течение 2-х дней. Какова наиболее верная тактика педиатра?

- А. Назначить противовирусное лечение
- Б. Назначить антибактериальное лечение
- В. Назначить симптоматическое лечение
- Г. Перед назначением лечения, направить на обследование
- Д. Не назначать лечения для выработки иммунитета

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеваниями суставов и их основными проявлениями:

1. Связь с инфекцией по времени (через 1 –4 недели)
2. Поражение мелких суставов кистей и стоп
3. Преимущественное поражение средних и крупных суставов нижних конечностей
4. Асимметричность поражения
5. Симметричность поражения
6. Деструкция хряща в суставе
7. Вовлечение в процесс новых суставов

А. Реактивный артрит

Б. Ювенильный ревматоидный артрит

А. 1Б, 2А, 3Б, 4Б, 5А, 6А, 7А

Б. 1А, 2Б, 3А, 4А, 5Б, 6Б, 7Б

В. 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6Б, 7Б

Для лечения острого вирусного бронхолита следует использовать:

1. Кислородотерапию
2. Бронходилататоры
3. Будесонид
4. Антибиотики
5. Муколитики

А. 2,3,4

Б. 1,2,3

В. 1,2

Г. 1,2,3,4,5

Дисахаридазная недостаточность чаще всего проявляется:

- А. В первые месяцы жизни
- Б. В первые три года жизни
- В. В дошкольном возрасте
- Г. В школьном возрасте
- Д. В подростковом периоде

У девочки 9 лет седьмые сутки фебрильной лихорадки; резко затруднено носовое дыхание, отделяемого из носовых ходов нет; боль в горле при глотании; на небных миндалинах обширные белые наложения; увеличены шейные лимфоузлы; увеличены печень и селезенка. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Стрептококковый тонзиллит
- Б. Острый бактериальный риносинусит
- В. Инфекционный мононуклеоз
- Г. Вирусный гепатит А
- Д. Аденовирусная инфекция

Хроническая дыхательная недостаточность I степени клинически определяется наличием:

- А. Одышки при физической нагрузке
- Б. Одышки в покое
- В. Втяжения межреберных промежутков, эпигастральной области;
- Г. Раздувания крыльев носа
- Д. Бронхообструктивного синдрома

При гипергликемии (глюкоза > 15 ммоль/л) показано в/в струйное введение инсулина короткого действия в дозе:

- А. 0,1 Ед/кг
- Б. 1,0 Ед/кг
- В. 0,5 Ед/кг
- Г. 0,75 Ед/кг

Для решения вопроса о проведении заменного переливания крови при ГБН в первые двое суток жизни ориентируются в первую очередь на:

- А. Абсолютные цифры билирубина в пуповинной крови
- Б. Уровень билирубина в периферической крови
- В. Почасовой прирост билирубина
- Г. Появление желтухи в первые часы жизни
- Д. Тяжелая анемия с рождения

При каком заболевании госпитализация является обязательной:

- А. Корь
- Б. Ангина
- В. Коклюш у ребенка первых 6 месяцев жизни
- Г. Ветряная оспа
- Д. Острое респираторное заболевание

Препарат выбора для лечения обструктивного ларинготрахеита со стенозом гортани 1 степени:

- А. Сальбутамол в ингаляциях
- Б. Фенотерол + ипратропия бромид в ингаляциях
- В. Будесонид в низкой дозе в ингаляциях
- Г. Будесонид в высокой дозе в ингаляциях
- Д. Дексаметазон в ингаляциях

Появление артериальной гипертензии у ребенка с вторичным пиелонефритом на фоне пузырно-мочеточникового рефлюкса является признаком:

- А. Присоединения гломерулонефрита
- Б. Развития септических осложнений
- В. Сморщивания почки
- Г. Обострения пиелонефрита
- Д. Присоединения эссенциальной гипертонии

Мальчик, 13 лет. Наблюдается с рождения с вторичным пиелонефритом на фоне пузырно-мочеточникового рефлюкса III степени справа, I степени слева. В течение последних трех месяцев цифры АД до 140/85. О чем может свидетельствовать артериальная гипертензия у ребенка?

- А. Присоединении гломерулонефрита
- Б. Развитии септических осложнений
- В. Сморщивании почки
- Г. Обострении пиелонефрита
- Д. Присоединении эссенциальной гипертонии

Какая форма бронхиальной астмы у детей встречается наиболее часто:

- А. Атопическая
- Б. Неатопическая
- В. Астма физического усилия
- Г. Аспириновая астма
- Д. Бронхит с астматическим компонентом

Ребенок 6 лет, госпитализирован в стационар в связи с обострением бронхиальной астмы с сухим приступообразным кашлем, экспираторной одышкой, в легких выслушиваются сухие свистящие хрипы с обеих сторон, SpO₂ 90%, ЧД 36 в минуту, ЧСС 115 в минуту. Какая неотложная помощь должна быть прежде всего оказана в приемном отделении?

- А. Будесонид 500 мг в ингаляции через небулайзер
- Б. Кислород, сальбутамол 2,5 мг в ингаляции через небулайзер, будесонид 500 мг в ингаляции через небулайзер
- В. Аминофиллин 5 мг/кг внутривенно болюсно
- Г. Преднизолон 2-3 мг/кг внутривенно или внутримышечно
- Д. Сальбутамол 2,5 мг в ингаляции через небулайзер

Для синдрома цитолиза характерно:

- А. Повышение уровня АЛТ, АСТ в сыворотке крови
- Б. Гиперхолестеринемия
- В. Гипербилирубинемия
- Г. Гипопроотеинемия
- Д. Гипергаммаглобулинемия

На дому участковым врачом-педиатром осмотрена девочка 5-ти месяцев. Со слов матери, ребенок болен первые сутки, температура повысилась до 38,7 С (принимали нурофен). При осмотре: выраженное беспокойство в том числе и при кормлении, затруднение дыхания через нос, трагус симптом положительный. По остальным органам без патологии, стул и диурез не нарушены. Каков наиболее вероятный диагноз?

- А. О.стоматит
- Б. О. ринит
- В. О.отит
- Г. О.ринофарингит

Для ювенильного ревматоидного артрита не характерно:

- А. Поражение мелких суставов
- Б. «Летучесть» болей
- В. Длительное течение артрита
- Г. Утренняя скованность суставов
- Д. Наличие в крови ревматоидного фактора

Назовите один признак, наиболее характерный для синдрома поражения перикарда:

- А. Локальный гипергидроз, холодные, цианотичные конечности
- Б. Набухание вен шеи, кистей рук, кубитальных вен
- В. Ригидный пульс
- Г. Эпигастральная пульсация сверху-вниз
- Д. Артериальное давление на ногах равно давлению на руках

Гемолитическая болезнь новорожденного может быть обусловлена:

- А. Внутриутробной инфекцией
- Б. Иммунологическим конфликтом
- В. Гемоглобинопатией
- Г. Нарушением конъюгации билирубина
- Д. Функциональной незрелостью печени

Наиболее достоверным методом диагностики хронического гепатита является:

- А. Клинико-биохимический
- Б. Вирусологический
- В. Иммунологический
- Г. Морфологический
- Д. Все вышеперчисленные

При сенсibilизации к пыльце березы имеется перекрестная аллергическая реакция на:

- 1. Яблоки
- 2. Орехи
- 3. Морковь
- 4. Злаки
- 5. Креветки

А. 1,2,3,4

Б. 1,2,3

В. 4

Г. 1,2

Д. 4,5

Наиболее частые побочные действия глюкокортикостероидных препаратов:

А. Нарушения сердечного ритма и проводимости

Б. Нарушения сердечного ритма, проводимости, лейкопения

В. Прибавка массы тела, стрии, повышение артериального давления, эрозивный гастрит, остеопороз

Г. Сонливость, диарея, дизурические явления

Укажите первичный элемент кожных высыпаний при крапивнице:

А. Пятна

Б. Папулы

В. Везикулы

Г. Волдыри

Д. Путсулы

Для нефротического синдрома при гломерулонефрите у детей характерно:

А. Массивная протеинурия и гипоальбуминемия

Б. Гиполипидемия и артериальная гипертензия

В. Массивные отёки и гипопротромбинемия

Г. Гипофибриногенемия

Д. Гипернатриемия

Нефритический синдром характерен для следующих болезней:

А. Синдром Альпорта

Б. Геморрагический васкулит

В. Болезнь тонких базальных мембран

Г. IgA-нефропатия

Д. Все перечисленное верно

Сепсис новорожденного чаще всего вызывают

- А. Вирусы
- Б. Бактерии
- В. Простейшие
- Г. Вирусно-бактериальные ассоциации
- Д. Грибы

Участковый педиатр вызван на дом к девочке 10 дней жизни. При осмотре ребенка: молочные железы увеличены в размерах, припухлость в области левой молочной железы выражена больше, кожа над ней гиперемирована, горячая, болезненная при прикосновении. Какова тактика врача-педиатра:

- А. Наблюдение в динамике, согревающие компрессы на молочную железу
- Б. Консультация хирурга, назначение антибактериальной терапии
- В. Данное состояние является физиологическим и не требует дополнительных назначений
- Г. Сдавливающие повязки на молочные железы, повторный осмотр через 2-3 дня

Причиной гипоксемии может являться:

- 1. Пневмония
 - 2. Тромбоэмболия легочной артерии
 - 3. Метгемоглобинемия
 - 4. Анемия
 - 5. Гипервентиляция
- А. 1, 2, 3
 - Б. 1, 2, 3, 4
 - В. 1, 2, 3, 4, 5
 - Г. 1, 3, 5

У мальчика 9 лет лихорадка, боль в горле, тошнота, отсутствие аппетита. Положительный стрептатест. Аллергией не страдает. Препарат выбора для лечения острого стрептококкового тонзиллита:

- А. Амоксициллин 50 мг/кг в сутки
- Б. Амоксициллин 80 - 90 мг/кг в сутки
- В. Цефтриаксон 50 мг/кг в сутки парентерально
- Г. Азитромицин 10 мг/кг в сутки
- Д. Цефуроксим 40 мг/кг в сутки

При заболевании ОРВИ ребенок первого года жизни наблюдается на педиатрическом участке:

- А. Участковым педиатром совместно с медицинской сестрой
- Б. Активно педиатром на дому ежедневно, до выздоровления
- В. Врачом инфекционистом на дому
- Г. Приглашается на прием педиатра на 3-й день заболевания
- Д. Приглашается на прием педиатра в день выздоровления

Ребенок 5 лет госпитализирован в кардиоревматологическое отделение детской больницы. При осмотре: верхушечный толчок в 5 межреберье на 2 см кнаружи от левой среднеключичной линии, разлитой, ослаблен; левая граница сердца на 2,5 см кнаружи от левой среднеключичной линии; верхняя - 2 ребро; правая - по парастеральной линии; тоны сердца приглушены, трехчленный ритм на верхушке, умеренной интенсивности непродолжительный систолический шум на основании сердца. Что из перечисленного ниже может быть расценено как вариант возрастной нормы:

- А. Пульс 130 ударов в минуту
- Б. АД 100/50 мм рт.ст.
- В. Характеристика верхушечного толчка
- Г. Характеристика границ сердца
- Д. Данные аускультации

Подросток 15 лет обратился к педиатру с жалобами на приступообразные боли в животе в течение недели, тошноту по утрам, неприятный запах изо рта. Интенсивные боли начались после употребления энергетиков на дне рождения друга. В семье у отца язвенная болезнь 12-перстной кишки. Боли усиливаются ночью, купируются после приема пищи. Периодические боли в животе подросток отмечает уже в течение 1 года. Каков наиболее вероятный диагноз?

- А. Острый гастродуоденит
- Б. Язвенная болезнь желудка/12-пк
- В. Острый холецистит
- Г. Дискинезия желчевыводящих путей
- Д. Ротавирусная инфекция

Ведущим симптомом при нефротическом синдроме является:

- А. Гематурия
- Б. Отеки
- В. Артериальная гипертензия
- Г. Лейкоцитурия
- Д. Всё вышеперечисленное

Ребенок от женщины с резус-отрицательной кровью, страдающей анемией неясной этиологии, от 3-й беременности. Состояние при рождении расценено как очень тяжелое: стонет, беспокоен, периодически судороги, отечность мягких тканей, желтушность кожи, гепатоспленомегалия. В анализе крови: гемоглобин 180 г/л, эритроциты $4,6 \times 10^{12}/л$, цветовой показатель 1,2. Какой диагноз наиболее вероятен у ребенка?

- А. Гемолитическая болезнь новорожденного, анемическая форма
- Б. Гемолитическая болезнь новорожденного, желтушная форма
- В. Гемолитическая болезнь новорожденного, отечная форма
- Г. Наследственная сфероцитарная анемия Минковского-Шоффара
- Д. Менингоэнцефалит

При оказании неотложной помощи при обморожениях не рекомендуется:

- А. Постепенно согревать поражённый участок
- Б. Вскрывать пузыри на обмороженном участке
- В. Накладывать теплоизолирующую повязку
- Г. Накладывать повязку с антисептиком
- Д. Внутримышечно вводить преднизолон в дозе 3-5 мг/кг

Для профилактики и лечения гипокальциемии при рахите применяют препараты кальция. Какая из нижеперечисленных солей содержит максимальное количество элементарного кальция?

- А. Карбонат
- Б. Хлорид
- В. Цитрат
- Г. Фосфат
- Д. Нитрат

При проведении скрининга на выявление врожденной дисфункции коры надпочечников у новорожденных определяют:

- А. Кортизол
- Б. Адrenокортикотропный гормон
- В. 17-оксипрогестерон
- Г. 17-кетостероиды
- Д. Тестостерон

У новорожденного в возрасте одних суток жизни отмечено появление желтухи. Кровь матери В(III) группы, резус-отрицательная, ребенка – АВ (IV) группы, резус положительная. Наиболее вероятный диагноз?

- А. Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-несовместимости
- Б. Гемолитическая болезнь новорожденного по ABO-системе
- В. Гемолитическая болезнь новорожденного по резус- и ABO-несовместимости
- Г. Транзиторная желтуха новорожденных
- Д. Ни один из перечисленных выше

Для тетрады Фалло характерно:

- А. Нормальное физическое развитие
- Б. Наличие повышенного аппетита
- В. Бессимптомное течение
- Г. Одышно-цианотические приступы
- Д. Отставание в психическом развитии

Для диагностики язвенной болезни наиболее важным в обследовании является:

- А. Общий анализ крови
- Б. Копрограмма
- В. Электролиты сыворотки крови
- Г. Эзофагогастрододеноскопия
- Д. Ультразвуковое обследование органов брюшной полости

Симптомами муковисцидоза могут быть все перечисленные, кроме:

- А. Стеаторея
- Б. Выпадение прямой кишки
- В. Гипотрофия
- Г. Учащенное мочеиспускание
- Д. Повторные пневмонии

Артериальная гипертензия характерна для следующего врожденного порока сердца:

- А. Двойная дуга аорты
- Б. Коарктация аорты
- В. Стеноз легочной артерии
- Г. Открытый артериальный проток
- Д. Дефект межжелудочковой перегородки

Геморрагический характер сыпи характерен для:

- А. Гриппа
- Б. Скарлатины
- В. Краснухи
- Г. Менингококцемии
- Д. Внезапной экзантемы

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Дайте характеристику элементам кожной сыпи.

1. Эритема

2. Петехии

3. Экхимозы

4. Папула

5. Пузырёк

А. Сине-фиолетового цвета, неправильной формы

Б. Первичный, выступающий над уровнем кожи, образуется при скоплении воспалительного инфильтрата в коже

В. Полостной, расположен поверхностно, заполнен серозным или кровянистым содержимым

Г. Участки гиперемии

Д. Невоспалительные пятна, размером 1-2 мм

А. 1Г, 2А, 3Д, 4Б, 5В

Б. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В

В. 1А, 2Д, 3А, 4В, 5Б

Ребенок 11 месяцев наблюдается с аллергией к белкам коровьего молока. От каких инфекций он должен быть уже привит согласно Национальному календарю профилактических прививок?

А. Дифтерии, гепатита В, пневмококковой инфекции, вируса папилломы человека

Б. Дифтерии, гепатита В, пневмококковой инфекции, кори

В. Туберкулеза, дифтерии, гепатита В, пневмококковой инфекции

Г. Туберкулеза, дифтерии, гепатита В, пневмококковой инфекции, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции

Д. Дифтерии, гепатита В, пневмококковой инфекции, паротита

Ребенок 9 месяцев, обратились на профилактический осмотр к педиатру. Запланирована также вакцинация от гриппа во время визита. Возможно ли провести дополнительно вакцинацию от менингококковой инфекции данному ребенку?

А. Да, если прививка включена в региональный календарь

Б. Да, прививка входит в Национальный календарь

В. Нет, ребенок не подлежит по возрасту

Г. Нет, запрещено совмещать данные вакцины

Д. привить только от менингококковой инфекции

Сниженная механическая защита и склонность кожи ребенка к более легкой травматизации обусловлена:

А. Тонкостью эпидермиса

Б. Тонкостью дермы

В. Преимущественно волокнистым составом дермы

Г. Недостаточным развитием подкожного жирового слоя.

Для первичного иммунодефицита характерны:

- 1. Рецидивирующие бактериальные инфекции кожи**
- 2. Грибковое поражение ногтей**
- 3. Повторные респираторные вирусные инфекции**
- 4. Повторные пневмонии**
- 5. Атопический дерматит**

А. 1,2,3,4

Б. 1,2,4

В. 1,2,4,5

Г. 2,3,4

Д. 2,4

Клинические проявления целиакии могут манифестировать при введении в рацион ребенка:

А. Гречневой каши

Б. Рисовой каши

В. Манной каши

Г. Всего вышеперечисленного

Д. Манифестация целиакии не связана с введением определённых продуктов питания

Риск заболевания туберкулезом после первичного инфицирования наиболее высок:

А. В раннем возрасте

Б. В дошкольном возрасте

В. В младшем школьном возрасте

Г. У подростков

Д. У взрослых людей

Ребенок родился от матери с хроническим гепатитом

В. Какова наиболее верная тактика педиатра?

А. Оформить медицинский отвод от вакцинации гепатита В

Б. Привить ребенка 3-хкратно

В. Привить ребенка по 4-хкратной схеме

Г. Достаточно введения гамма-глобулина в роддоме

Д. Необходимо наблюдение в течение 1 месяца

Пиелонефрит является вторичным если:

- А. Верифицирован первичный очаг бактериального воспаления
- Б. При обследовании пациента зарегистрировано наличие аномалии развития мочевыводящей системы
- В. Возбудителем пиелонефрита является атипичная флора
- Г. После проведенного курса антибактериальной терапии в течение месяца симптомы пиелонефрита появляются вновь
- Д. Острый и хронический пиелонефрит являются разными морфологическими вариантами

Ребенок 6 лет госпитализирован в стационар в связи с обострением бронхиальной астмы. Беспокоит сухой приступообразный кашель, экспираторная одышка, в легких выслушиваются сухие свистящие хрипы с обеих сторон, SpO2 90%, ЧД 36 в минуту, ЧСС 115 в минуту. Какая неотложная помощь должна быть прежде всего оказана в приемном отделении:

- А. Будесонид 500 мг в ингаляции через небулайзер
- Б. Кислород, сальбутамол 2,5 мг в ингаляции через небулайзер, будесонид 500 мг в ингаляции через небулайзер
- В. Аминофиллин 5 мг/кг внутривенно болюсно
- Г. Преднизолон 2-3 мг/кг внутривенно или внутримышечно
- Д. Сальбутамол 2,5 мг в ингаляции через небулайзер

Какие заболевания входят в неонатальный скрининг с 2006 г.?

- А. Фенилкетонурия
- Б. Фенилкетонурия, гипотиреоз
- В. Фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия
- Г. Фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия, муковисцидоз
- Д. Фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром

Битональный кашель характерен для:

- А. Обструктивного бронхита
- Б. Коклюша
- В. Инородного тела бронха, увеличения внутригрудных лимфоузлов
- Г. Обострения бронхиальной астмы
- Д. Эпиглоттита

Девочка 3-х лет на осмотре у дежурного врача в поликлинике. Болея вторые сутки. Отмечаются лихорадка до 39,5*С, грубый лающий кашель, осиплость голоса, гиперсаливация, стридор, боль в горле при глотании. В легких дыхание жесткое, проводится во все отделы. Тоны сердца зычные, ритмичные. Каков наиболее вероятный диагноз?

- А. Обструктивный ларинготрахеит, стеноз гортани 1 степени
- Б. Обструктивный ларинготрахеит, стеноз гортани 2 степени
- В. Стрептококковый тонзиллит
- Г. Эпиглоттит
- Д. Инородное тело гортани

Какие значения дефицита массы тела в % должны быть у грудного ребенка, если у него гипотрофия 2 степени:

- А. 5-9%
- Б. 10-19%
- В. 20-29%
- Г. 30-39%
- Д. 40% и более

Для лечения типичной внебольничной неосложненной пневмонии у ребенка целесообразно назначить:

- А. Азитромицин
- Б. Амоксициллин
- В. Цефазолин
- Г. Цефтриаксон
- Д. Ципрофлоксацин

Суперинфекция дельта-вирусом представляет опасность для больных:

- А. Гепатитом А
- Б. Гепатитом В
- В. Гепатитом С
- Г. Хроническим панкреатитом
- Д. Язвенной болезнью

Хроническим является гломерулонефрит если:

- А. Течение острого гломерулонефрита, несмотря на проводимую терапию, длится больше 6 месяцев
- Б. Имеет место трехкратное увеличение уровня креатинина в крови в течение трёх последовательных дней
- В. У пациента зарегистрированы специфические морфологические изменения в биоптате ткани почек
- Г. У пациента регистрируется протеинурия
- Д. Регистрируется присоединение инфекции мочевыводящих путей

Развитие отеков при нефротическом синдроме обусловлено:

- А. Артериальной гипертензией
- Б. Гипопротеинемией
- В. Гиперкальциемией
- Г. Гиперхолестеринемией

Для острой сосудистой недостаточности характерно:

- А. Влажный кашель
- Б. Влажные хрипы в легких
- В. Сухие хрипы в легких
- Г. Падение артериального давления
- Д. Повышение артериального давления

Мальчик 4 года, при осмотре на дому: болен 3 сутки, повышение температуры до 38,7С. выраженные экссудативные проявления с конъюнктивитом. По органам без особенностей. Для какой вирусной инфекции характерны данные проявления.

- А. Парагрипп
- Б. Грипп
- В. Аденовирусная инфекция
- Г. Риновирусная инфекция
- Д. РС-инфекция

У доношенного ребенка, который хорошо берет грудь, имеет небольшую потерю массы тела, розовые кожные покровы, на 3-й день появилась иктеричность кожи. Укажите наиболее вероятную причину желтухи.

- А. Гемолитическая болезнь новорожденных
- Б. Транзиторная (физиологическая) желтуха
- В. Врожденный гепатит
- Г. Каротиновая пигментация из-за употребления матерью моркови
- Д. Атрезия желчных путей

Ревакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи здоровому ребенку проводится в возрасте:

- А. 12 месяцев
- Б. 18 месяцев
- В. 6 лет
- Г. 7 лет
- Д. 9 лет

Мать с ребенком 1 года обратилась к врачу с жалобами на неустойчивый стул у ребенка со слизью в течение 3-х дней. Неделю назад прекратила кормить грудью. Растет и развивается ребенок по возрасту, аппетит сохранен. Каков наиболее вероятный диагноз в данном случае?

- А. Функциональное нарушение кишечника
- Б. Инфекционный энтерит
- В. Лактазная недостаточность
- Г. Целиакия
- Д. Рахит

О чем можно думать, если у ребенка 8 месяцев отмечаются распространенные костные деформации (увеличение теменных и затылочных бугров, расширение нижней апертуры грудной клетки, «четки» на ребрах), мышечная гипотония, задержка моторного развития при нормальном психическом развитии, повышение в крови уровня щелочной фосфатазы и снижение уровня кальция и фосфора?

- А. Рахит в стадии разгара
- Б. Рахит в периоде реконвалесценции
- В. Дисплазия соединительной ткани
- Г. Гипервитаминоз Д
- Д. Несовершенный остеогенез

Для лечения острой аллергической крапивницы и ангионевротического отека используют:

- 1. Антигистаминные препараты**
- 2. Холинолитики**
- 3. Системные глюкокортикостероиды**
- 4. Адреналин**
- 5. Нестероидные противовоспалительные средства**

- А. 1,2,3
- Б. 1,3,5
- В. 1,3
- Г. 1,2,3,4
- Д. 1,3,4,5

Фиброэластоз эндокарда является тяжелым заболеванием сердца и чаще всего является морфологическим субстратом:

- А. Раннего врожденного кардита
- Б. Позднего врожденного кардита
- В. Острого приобретенного кардита
- Г. Подострого приобретенного кардита
- Д. Хронического приобретенного кардита

У ребенка в возрасте 15 месяцев диагностирована лихорадка без очага инфекции (ЛБОИ).

Какие лабораторные исследования следует назначить в этом случае в первую очередь:

- А. Рентгенография органов грудной клетки
- Б. Клинические анализы крови и мочи
- В. Клинические анализы крови и мочи, исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
- Г. УЗИ почек
- Д. Исследование респираторных вирусов в назофарингеальном мазке методом ПЦР

Что включается в понятие «перинатальная смертность»?

- А. Число детей, умерших до 1 года, на 1000 родившихся живыми
- Б. Число мертворожденных детей и детей, умерших на первой неделе жизни, от общего числа родившихся живыми и мертвыми
- В. Число мертворожденных
- Г. Число мертворожденных детей и детей, умерших на первом месяце жизни, от общего числа родившихся живыми и мертвыми
- Д. Число детей, умерших до 1 года, на 10 000 родившихся живыми

Ребенок 3-х лет болен вторые сутки. Отмечаются лихорадка до 39,5*С; грубый лающий кашель, осиплость голоса, гиперсаливация, стридор, боль в горле при глотании. Наиболее вероятный диагноз?

- А. Обструктивный ларинготрахеит, стеноз гортани 1 степени
- Б. Обструктивный ларинготрахеит, стеноз гортани 2 степени
- В. Стрептококковый тонзиллит
- Г. Эпиглоттит
- Д. Инородное тело гортани

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Выберите оптимальную терапию диарейного заболевания:

- 1. Ротавирусный гастроэнтерит
 - 2. Дизентерия
 - 3. Антибиотик-ассоциированная диарея
 - 4. Сальмонеллез
 - 5. Кампилобактериоз
- А. Оральный регидратационный раствор
 - Б. Метронидазол
 - В. Макролид
 - Г. Цефалоспорин 3 поколения
- А. 1Г, 2Г, 3В, 4Г, 5В
 - Б. 1А, 2В, 3Б, 4В, 5Г
 - В. 1А, 2Г, 3Б, 4Г, 5В

О снижении клубочковой фильтрации почек свидетельствует:

- А. Появление протеинурии и/или гематурии
- Б. Повышение уровня калия сыворотки
- В. Повышение уровня креатинина сыворотки
- Г. Снижение относительной плотности мочи

Девочка 14 лет обратилась к врачу с жалобами на слабость, боли и припухание суставов, выпадение волос, красные пятна на коже щек, усиливающиеся после пребывания на солнце. При обследовании выявлены некоторое расширение границ, приглушение тонов сердца, единичные экстрасистолы, лейкопения, СОЭ - 32 мм/час. Каков наиболее вероятный диагноз?

- А. Ювенильный ревматоидный артрит
- Б. Ревматизм
- В. Дерматомиозит
- Г. Системная красная волчанка
- Д. Фотодерматоз

При суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии препаратом выбора для купирования приступа является:

- А. Дигоксин
- Б. Амиодарон
- В. АТФ
- Г. Прокаинамида гидрохлорид
- Д. Пропранолол

При лечении больного цитостатиками необходимо регулярно назначать:

- А. Консультацию офтальмолога
- Б. Клинический анализ крови
- В. Рентгенографию костей для выявления остеопороза
- Г. Измерение артериального давления
- Д. Стернальную пункцию

Метамизол натрия не рекомендован для применения у детей из-за опасности развития:

- А. Аллергических реакций
- Б. Синдрома отмены
- В. Агранулоцитоза
- Г. Острой почечной недостаточности
- Д. Токсического гепатита

Здорового доношенного новорожденного ребенка в роддоме вакцинируют от:

- А. Кори
- Б. Полиомиелита
- В. Коклюша
- Г. Туберкулеза и гепатита В
- Д. Пневмококковой инфекции

Проведение профилактических прививок ребенку, перенесшему острое респираторное заболевание, можно разрешить после выздоровления через:

- А. 2-3 недели
- Б. 1 месяц
- В. 2 месяца
- Г. 3 месяца
- Д. 6 месяцев

Для лечения инфекций мочевыводящих путей используют:

- А. Противовирусные препараты
- Б. Иммуномодуляторы
- В. Нестероидные противовоспалительные препараты
- Г. Антибактериальные препараты
- Д. Мочегонные средства

Для пиелонефрита характерен симптомокомплекс:

- А. Повышение температуры, боли в животе, лимфоцитарная лейкоцитурия
- Б. Повышение температуры, отеки, протеинурия, гематурия
- В. Повышение температуры, боли в животе, нейтрофильная лейкоцитурия
- Г. Отеки, головная боль, протеинурия, гематурия
- Д. Повышение артериального давления, отеки, протеинурия, гематурия

Основной причиной аспирации новорожденных является:

- А. Недоношенность
- Б. Гипоксия плода
- В. Инфекционные заболевания матери
- Г. Гемолитическая болезнь новорожденных
- Д. Врожденный порок сердца

Для купирования анафилактической реакции прежде всего необходимо ввести:

- А. Преднизолон
- Б. Аминофиллин
- В. Атропин
- Г. Адреналин
- Д. Хлоропирамин

В обязанности участкового педиатра не входит:

- А. Проведение патронажа новорожденного на дому
- Б. Ведение амбулаторных приемов
- В. Проведение дезинфекции в инфекционном очаге
- Г. Оказание врачебной помощи ребенку на дому
- Д. Поддержка грудного вскармливания

Противопоказанием к биопсии почки не является:

- А. Единственная почка
- Б. Поликистоз почек
- В. Туберкулез почек
- Г. Стероидрезистентный гломерулонефрит
- Д. Острый постстрептококковый гломерулонефрит

Патогномоничным признаком муковисцидоза является:

- А. Увеличение трансаминаз
- Б. Повышение общего билирубина
- В. Увеличение натрия и хлора в потовой жидкости
- Г. Повышение мочево́й кислоты
- Д. Наличие крови в стуле

Образование инфильтрата и некроза после вакцинации БЦЖ происходит:

- А. Через 10 дней
- Б. Через 2 недели
- В. Через 1-3 месяца
- Г. Через 6 месяцев
- Д. Через 12 месяцев

Специфическая профилактика инфекционных болезней включает:

- А. Поддержку грудного вскармливания
- Б. Адекватное возрасту питание ребенка
- В. Вакцинацию
- Г. Закаливание
- Д. Прием иммуномодуляторов

Ребенку 5 месяцев. Родился от 1-х запоздалых, затяжных родов. Оценка по шкале Апгар 5/6 баллов. В течение первых дней состояние было тяжелым. Выписан домой на 19-й день жизни. В последующем регулярного врачебного наблюдения не было. Из перечисленного ниже, обнаруженного при осмотре, соответствует возрастной норме:

- А. Самостоятельно не садится
- Б. Гипертонус мышц рук и ног
- В. Тенденция к перекресту ног
- Г. Наличие ладонно-ротового рефлекса
- Д. Наличие хватательного рефлекса

Для увеличения количества молока у матери следует:

- А. Временно перевести ребёнка на искусственное вскармливание
- Б. Увеличить частоту прикладывания ребёнка к груди
- В. Уменьшить частоту прикладывания ребёнка к груди
- Г. Допаивать ребёнка раствором глюкозы
- Д. Увеличить физические нагрузки матери

Ребенок 6 мес на приеме у участкового педиатра перед вакцинацией. Ранее вакцинирован в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Симптомов острого заболевания нет. В клиническом анализе крови число нейтрофилов составляет 800 / мкл. Тактика врача-педиатра:

- А. Не вакцинировать, повторить клинический анализ крови в динамике
- Б. Вакцинировать, повторить клинический анализ крови в динамике
- В. Медицинский отвод от вакцинации на 6 месяцев
- Г. Госпитализировать ребенка

Укажите оптимальный раствор для парентеральной регидратации ребенка с эксикозом на фоне вирусного гастроэнтерита:

- А. Раствор глюкозы 5%
- Б. Раствор глюкозы 10%
- В. Раствор Рингера
- Г. Раствор NaHCO_3 5%
- Д. Ацесоль

Для вирусного крупа характерны симптомы:

- 1. Стридор**
- 2. Тризм**
- 3. Осиплость голоса**
- 4. Гиперсаливация**
- 5. Грубый кашель**

А. 1,2,3,5

Б. 1,3,5

В. 1,3,4,5

Г. 2,4

Девочка 14 лет обратилась к врачу с жалобами на слабость, боли и припухание суставов, выпадение волос, красные пятна на коже щек, усиливающиеся после пребывания на солнце. При обследовании выявлены некоторое расширение границ, приглушение тонов сердца, единичные экстрасистолы, лейкопения, СОЭ - 32 мм/час. Наиболее вероятный диагноз:

А. Ювенильный ревматоидный артрит

Б. Ревматизм

В. Системная красная волчанка

Г. Дерматомиозит

Д. Фотодерматоз

Наличие мелкопятнистой сыпи характерно для:

А. Скарлатины

Б. Инфекционного мононуклеоза

В. Ветряной оспы

Г. Крапивницы

Д. Парвовирусной инфекции

При церебральной ишемии I степени у новорожденного выявляются:

А. Судороги, гипорефлексия, тремор рук

Б. Тремор рук, гипорефлексия, мышечная дистония

В. Мышечная дистония, гипотония, вялость

Г. Адинамия

Д. Гипотония

Мать с ребенком 6 месяцев обратились на прием к врачу с профилактической целью. Беременность без осложнений, роды в срок с весом 3500 гр, рост 52 см. До визита к врачу все навыки сформированы по возрасту. Участковый врач предложил матери провести профилактическую вакцинацию от гриппа. В поликлинике в наличии оказался только препарат Ультрикс-квадри. Каковы должны быть действия врача перед вакцинацией?

- А. Направить пациента на обследование
- Б. Назначить подготовку
- В. оформить информированное согласие и вакцинировать
- Г. Дождаться поступления другой вакцины
- Д. Оформить медицинский отвод до 1 года

Для измерения уровня сатурации кислорода в крови используют:

- А. Тонометр
- Б. Пульсоксиметр
- В. Спейсер
- Г. Пикфлоуметр
- Д. Холтеровское мониторирование

Причиной мегалобластной анемии является:

- А. Дефицит железа в сыворотке крови
- Б. Гемолиз эритроцитов
- В. Дефицит витамина B12
- Г. Дефицит цинка в сыворотке крови
- Д. Рахит

Диагностически значимая бактериурия для подтверждения инфекции мочевыводящих путей – это:

- А. Наличие более 1 000 КОЕ в 1 мл мочи при посеве мочи
- Б. «Много бактерий» в общем анализе мочи
- В. Наличие более 10 000 КОЕ в 1 мл мочи при посеве мочи
- Г. «Сплошь бактерии» в общем анализе мочи

У ребенка 7 лет отсутствует рубчик после вакцинации БЦЖ. Ваша тактика:

- А. Провести обязательную ревакцинацию
- Б. Провести ревакцинацию только в случае отрицательной реакции Манту
- В. Ребенок ревакцинации не подлежит
- Г. Провести ревакцинацию только в случае положительной реакции Манту
- Д. Ревакцинировать в случае сомнительной реакции Манту

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Укажите компоненты врожденного и приобретенного иммунитета:

1. Макрофаги
2. Цитокины
3. Специфические антитела
4. Лейкоциты
5. Система комплемента
- А. Врожденный иммунитет (естественный)
- Б. Приобретенный иммунитет (адаптивный)

А. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5А

Б. 1А, 2А, 3Б, 4Б, 5А

В. 1Б, 2Б, 3Б, 4А, 5Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между синдромом и его клинико-лабораторными проявлениями:

1. Нефритический синдром
2. Макрогематурия
3. Нефротический синдром
4. Нефротический синдром + гематурия
- А. Протеинурия 4,8 г/л, общий белок крови 34 г/л, асцит
- Б. Периферические отеки голеней, моча цвета «мясных помоев», общий белок крови 65 г/л, протеинурия 1,8 г/л
- В. Моча темно коричневого цвета
- Г. Протеинурия 3,7 г/л, гематурия 65-70 в п/зр, общий белок крови 35 г/л

А. 1А, 2В, 3Б, 4Г

Б. 1Б, 2В, 3А, 4Г

В. 1Г, 2Б, 3В, 4А

Синдром пролапса митрального клапана необходимо дифференцировать прежде всего с:

- А. Недостаточностью митрального клапана
- Б. Аортальным стенозом
- В. Недостаточностью трикуспидального клапана
- Г. Дефектом межжелудочковой перегородки
- Д. Кардитом

На приеме педиатра ребенок 8 месяцев. Мать жалуется, что ребенок в последние 3-4 недели стал бледным, вялым, много спит, капризен, плохо ест, утратил некоторые сформировавшиеся ранее моторные навыки. В рационе ребенка грудное молоко в большом количестве, безмолочные каши и овощное пюре. Мать ребенка вегетарианка. Наиболее вероятная причина болезни ребенка:

- А. Железодефицитная анемия
- Б. В12-дефицитная анемия
- В. Рахит
- Г. Менингоэнцефалит
- Д. Перинатальное поражение ЦНС, поздний восстановительный период

У детей в возрасте до 1 года лейкоцитозом следует считать повышение количества лейкоцитов в периферической крови выше:

- А. 9 тыс / мкл
- Б. 10 тыс / мкл
- В. 12 тыс/мкл
- Г. 14 тыс /мкл
- Д. 15 тыс /мкл

Мать с ребенком 3-х лет обратилась на прием к врачу с жалобами на приступообразный кашель, субфебрильную температуру, отказ от еды. От вакцинации отказ от всех прививок. При осмотре лицо одутловатое, дыхание в легких жесткое, по остальным органам без изменений. Какое заболевание необходимо исключить у пациента в первую очередь?

- А. Бронхиальная астма
- Б. Хламидийная пневмония
- В. Коклюш
- Г. Риносинтициальная инфекция
- Д. Острый обструктивный бронхит

Что является противопоказанием для применения живых вакцин?:

- А. Частые респираторные инфекции
- Б. Судороги в анамнезе
- В. Иммунодефицитные состояния
- Г. Синдром внезапной смерти в семье
- Д. Дисбактериоз кишечника

Девочка, 14 лет. Обратилась с жалобами на повторяющиеся, приступы интенсивной, чаще односторонней и пульсирующей головной боли преимущественно в области виска, глаза и темени, но нередко могут начинаться в области затылка, часто сопровождаются тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету, звукам и усиливаются при физической нагрузке. Продолжительность приступа – от 2-3 часов до 3 суток; частота дней с головной болью в среднем 2-4 дня в месяц. Консультирована неврологом: неврологической симптоматики не выявлено. Инструментальная диагностика без патологии. Каков наиболее вероятный диагноз?

- А. Опухоль головного мозга
- Б. Мигрень без ауры
- В. Мигрень с аурой
- Г. Головная боль напряжения
- Д. Персистирующая инфекция

Биохимическими маркерами активности цирроза печени являются:

- А. Гиперпротеинемия
- Б. Метаболический ацидоз
- В. Повышение уровня прямого билирубина, гиперглобулинемия, повышение печеночных трансаминаз
- Г. Повышение уровня щелочной фосфатазы, микропротеидов
- Д. Повышение уровня холестерина

Ребенку 4 месяца. С первого месяца жизни отмечаются зудящие кожные высыпания на разгибательных поверхностях конечностей, на щеках, на шее. Периодически стул со слизью. В связи с гипогалактией у матери возникла необходимость перехода на смешанное вскармливание. Какое питание в этом случае следует назначить в качестве докорма:

- А. Гипоаллергенную молочную смесь
- Б. Цельный кефир
- В. Кисломолочную смесь для грудных детей
- Г. Смесь с высокой степенью гидролиза белка коровьего молока
- Д. Смесь на основе белка козьего молока

Показанием к гемодиализу при острой почечной недостаточности у детей являются:

- А. Массивные отёки
- Б. Уровень креатинина
- В. Прирост уровня креатинина за сутки и гиперкалиемия
- Г. Гипернатриемия в сочетании с артериальной гипертензией
- Д. Высокий уровень прямого билирубина в сочетании с повышенными показателями трансаминаз

Для верификации диагноза неспецифического язвенного колита необходимо проведение:

- А. Ультразвукового исследования брюшной полости
- Б. Копрограммы
- В. Ирригографии
- Г. Фиброколоноскопии с лестничной биопсией слизистой толстой кишки
- Д. Компьютерной томографии органов брюшной полости

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клиническими симптомами и заболеванием:

- 1. Грипп
- 2. Парагрипп
- 3. Аденовирусная инфекция
- 4. Риновирусная инфекция
- 5. РС-инфекция

А. Острое начало заболевания с резко выраженными насморком и чиханием на фоне нормальной или субфебрильной температуры

Б. Заболевание с выраженными экссудативными проявлениями, конъюнктивитом на фоне высокой температуры

В. Острое начало заболевания с высокой лихорадкой и выраженными симптомами интоксикации

Г. Заболевание с частым поражением нижних дыхательных путей, развитием бронхолита

Д. Заболевание с выраженными катаральными явлениями в виде сухого грубого кашля, осиплостью голоса

А. 1Б, 2Д, 3Г, 4А, 5В

Б. 1В, 2Д, 3Б, 4А, 5Г

В. 1В, 2Г, 3Б, 4Д, 5А

Для лечения острой респираторной вирусной инфекции показано все, кроме:

- А. Удаление слизи из носовых ходов
- Б. Жаропонижающие
- В. Деконгестанты
- Г. Антибиотики

Для врожденного гипотиреоза у новорожденного ребенка характерно все, кроме:

- А. Низкой массы тела при рождении
- Б. Затяжной желтухи
- В. Низкого тембра голоса
- Г. Ослабления сосательного рефлекса
- Д. Повышения уровня тиреотропного гормона в крови

При целиакии в рацион можно включать:

- А. Пшеничную муку
- Б. Перловую крупу
- В. Овсяные хлопья
- Г. Рисовую крупу
- Д. Не использовать никакие виды круп

Верифицирующим критерием диагноза пневмонии является:

- А. Притупление перкуторного звука над легкими
- Б. Локальные мелкопузырчатые хрипы при аускультации легких
- В. Ослабление дыхания при аускультации легких
- Г. Консолидация легочной ткани на рентгенограмме органов грудной клетки
- Д. Снижение уровня SpO₂

Нозокомиальной называется пневмония, которая развивается

- А. В течение всего периода нахождения в стационаре
- Б. В течение 72 часов после выписки из стационара
- В. После 48 часов пребывания в стационаре
- Г. Во время пребывания в отделении реанимации
- Д. После 72 часов пребывания в стационаре до истечения 72 часов после выписки из стационара

Для купирования анафилактического шока используют:

1. Адреналин
 2. Преднизолон
 3. Атропин
 4. Раствор хлорида натрия 0,9%
 5. Раствор глюкозы 5%
- А. 1,2,3
 - Б. 1,2,4
 - В. 1,2,3,4
 - Г. 1,2,5
 - Д. 2,4

Мать девочки-подростка 13 лет отмечает, что в последнее время дочь стала очень раздражительной и неуравновешенной, нарушился сон (спит беспокойно, часто просыпается), похудела, стала быстро уставать. Жалуется на повышенную потливость, непереносимость жары, урчание и периодические боли в животе, учащение стула до двух раз в сутки. При осмотре врач выявил у больной тахикардию, тремор пальцев рук, повышение сухожильных рефлексов. Прежде всего можно заподозрить:

- А. Вегетативную дисфункцию
- Б. Гастродуоденит
- В. Хроническую туберкулезную интоксикацию
- Г. Тиреотоксикоз
- Д. Недостаточность надпочечников

Аутоинвазия возможна при:

- А. Аскаридозе
- Б. Дифиллоботриозе
- В. Трихоцефалезе
- Г. Энтеробиозе
- Д. Эхинококкозе

Критерий диагностики анемии у детей от 6 месяцев до 5 лет (по нормативам ВОЗ):

- А. Гемоглобин менее 120 г/л
- Б. Гемоглобин менее 110 г/л
- В. Гемоглобин менее 100 г/л
- Г. Гемоглобин менее 90 г/л
- Д. Гемоглобин менее 80 г/л

Проба Зимницкого оценивает:

- А. Функцию клубочка почки
- Б. Функцию канальцев почки
- В. Уровень секреции антидиуретического гормона
- Г. Выраженность бактериурии в течение суток

Пассивной иммунизацией называется:

- А. Вакцинация живой вакциной
- Б. Вакцинация инактивированной вакциной
- В. Введение анатоксина
- Г. Введение иммуноглобулинов
- Д. Лечение иммуномодуляторами

У детей старше одного года жизни усвояемость белка из мяса, хлеба, круп без овощей составляет 70%. При введении в рацион овощей этот процент:

- А. Не изменяется
- Б. Повышается
- В. Снижается

Неотложные мероприятия на месте происшествия при электротравме у детей включают:

- А. Отсоединение пострадавшего от источника тока
- Б. Проведение сердечно-легочной реанимации
- В. Инфузионная терапия для поддержания витальных функций; онко-, осмотерапия при угрозе отёка мозга
- Г. Экстренная госпитализация
- Д. Все указанные мероприятия

При каком заболевании обязательно госпитализировать ребенка школьного возраста:

- А. Коклюш
- Б. Менингококковая инфекция
- В. Корь
- Г. Ветряная оспа
- Д. Ангина

Ребенок 8-недельного возраста, от матери 38 лет, кормится грудью через 3,5 часа. Сосет вяло. В вечерние часы проявляет беспокойство между кормлениями. Излишков молока у матери нет. Диагностирована гипотрофия 1 степени. Ведущая причина гипогалактии у женщины:

- А. Ограничение жидкости и приема углеводов во время беременности
- Б. Родоразрешение на 1 месяц раньше срока путем кесарева сечения
- В. Кормление ребенка грудью с пятого дня после рождения
- Г. Возраст матери
- Д. Вялое сосание ребенка, отказ матери от сцеживания молока

Абсолютным противопоказанием к вакцинации является:

- А. Нейтропения
- Б. Первичный иммунодефицит
- В. Анафилактическая реакция на вакцину при предыдущем введении
- Г. Обострение хронического заболевания
- Д. Острое респираторное заболевание

Экссудативная энтеропатия связана с:

- А. Дисахаридазной недостаточностью
- Б. Непереносимостью белков коровьего молока
- В. Дефицитом пептидаз в кишечнике
- Г. Врожденной лимфангиоэктазией кишки
- Д. Повышенной вязкостью секретов экзокринных желез

Какой из растворов показан для оральной регидратации у детей с эксикозом при острой диарее?

- А. Раствор Рингера
- Б. Раствор для оральной регидратации
- В. 5% раствор глюкозы
- Г. Раствор соды
- Д. 20% раствор глюкозы

После проведения рентгенографии органов грудной клетки, назначенной ребенку 12 лет врачом-педиатром после осмотра, диагностирована пневмония. По данным анализа крови выявлено увеличение IgM к *Mycoplasma pneumoniae*. Какой из антибактериальных препаратов необходимо назначить для лечения пневмонии?

- А. Амоксициллин
- Б. Амоксициллин-клавуланат
- В. Ципрофлоксацин
- Г. Цефотаксим
- Д. Кларитромицин

У ребенка в возрасте 4-х недель жизни участились срыгивания, ежедневно после кормления стала возникать рвота фонтаном. Ребенок беспокоен, не прибавляет в весе. Какое заболевание следует исключить в первую очередь:

- А. Аэрофагия
- Б. Пилороспазм
- В. Пилоростеноз
- Г. Кишечные колики
- Д. Пищевая аллергия

Активации инфекции в желчных путях способствует

- А. Повышение уровня билирубина в желчи
- Б. Нарушение оттока желчи
- В. Сдвиг pH желчи в кислую сторону
- Г. Повышение уровня холестерина в желчи

Предпочтительным типом ингалятора для детей до 4 лет, страдающих бронхиальной астмой, является

- А. Дозирующий аэрозольный ингалятор с соответствующим спейсером с мундштуком
- Б. Дозирующий порошковый ингалятор, активируемый дыханием
- В. Дозирующий аэрозольный ингалятор с соответствующим спейсером с лицевой маской
- Г. Небулайзер с мундштуком

При затяжном рековалесцентном бактериовыделении возбудителей бактериальных диарей препаратами выбора являются

- А. Иммуноглобулины
- Б. Таргетные пробиотики
- В. Специфические бактериофаги
- Г. Антибиотики резерва

Иностранным гражданам, работающим по трудовому договору в организациях РФ, для удостоверения временной нетрудоспособности

- А. Выдаётся справка установленного образца
- Б. Не выдаётся никакой документ
- В. Формируется (выдаётся) листок нетрудоспособности
- Г. Выдаётся справка произвольной формы

Нарушение толерантности к глюкозе (углеводам) ставится при гликемии _____ ммоль/л через 2 часа после нагрузки глюкозой

- А. Ниже 5,5
- Б. 7,8-11,1
- В. 5,5-6,0
- Г. 6,1-7,5

Тяжелая дегидратация обусловлена

- А. Ротавирусами
- Б. Норовирусами
- В. Аденовирусами
- Г. Коронавирусами

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы используют функциональную пробу

- А. Щипковую
- Б. Молоточковую
- В. Шалкова
- Г. Мак-Клюра

Пневмония при ВИЧ-инфекции наиболее часто обусловлена

- А. Пневмококками
- Б. Пневмоцистами
- В. Стафилококками
- Г. Энтерококками

Вакциной против дифтерии, столбняка, коклюша, которая разрешена к применению с 4 до 64 лет, является

- А. АДС-М
- Б. АКДС
- В. Адасель
- Г. Инфанрикс

В развитии внутрибольничной деструктивной пневмонии у детей раннего возраста играет роль

- А. Пневмоциста карини
- Б. Пневмококк IV группы
- В. Клебсиелла пневмония
- Г. Золотистый стафилококк

В группу риска по развитию инфекционного эндокардита входят пациенты с

- А. Первичной артериальной гипертензией
- Б. Цианотическими врождёнными пороками сердца
- В. Проплазмом митрального клапана 1 степени
- Г. Дефектом межпредсердной перегородки

Рвота фонтаном у детей первых месяцев жизни наблюдается при

- А. Пилоростенозе
- Б. Гепатите
- В. Атрезии желчных путей
- Г. Токсикозе

Серологическим маркером вирусного гепатита а является

- А. Anti-HEV IgM
- Б. Anti-HAV IgM
- В. Anti-HBe
- Г. Anti-HCV IgM

При портальной гипертензии наблюдается

- А. Пониженный уровень сахара крови
- Б. Расширение вен пищевода
- В. Изолированная гепатомегалия
- Г. Высокий уровень IgG

К наиболее значимым показателям, позволяющим дифференцировать острые гепатиты а и в, относят

- А. Уровень активности печеночно-клеточных ферментов
- Б. Результаты УЗИ органов брюшной полости
- В. Содержание свободного и связанного билирубина в крови
- Г. Специфические маркеры вирусов гепатита А и В

Заподозрить нарушения сердечного ритма у детей можно при

- А. Отеках, повышении температуры тела
- Б. Болях в животе, диспепсических явлениях
- В. Гематурии, повышении артериального давления
- Г. Синкопальных состояниях, эпизодах резкой бледности

При инфекционном мононуклеозе в периферической крови выявляются

- А. Нейтрофилез, лимфопения
- Б. Нейтрофилез, эозинофилия
- В. Атипичные мононуклеары, лимфоцитоз
- Г. Лимфопения, атипичные мононуклеары

Результатом гистологического исследования, позволяющим дифференцировать болезнь Крона и язвенный колит, является наличие

- А. Псевдополипов
- Б. Атрофии слизистой
- В. Саркоидных гранул в подслизистом слое
- Г. Диффузного воспаления слизистой

Входными воротами инфекции при экстрафарингеальной скарлатине является

- А. Ожоговая поверхность
- Б. Кровяное русло
- В. Глотка
- Г. Кишечник

Бемеград как анддот применяют у детей при отравлении

- А. Солями тяжелых металлов
- Б. Барбитуратами
- В. Парацетамолем
- Г. Сердечными гликозидами

При менингококкемии на догоспитальном этапе целесообразно вводить

- А. Антибактериальные препараты
- Б. Жаропонижающие препараты
- В. Сердечные гликозиды
- Г. Антикоагулянты

Заклучительная дезинфекция проводится специализированной бригадой при

- А. Токсокарозе
- Б. Менингококковой инфекции
- В. Гриппе
- Г. Холере

Ангиотензиновые рецепторы сосудов (ат-1) блокирует

- А. Лозартан
- Б. Пропранолол
- В. Фозиноприл
- Г. Каптоприл

Зрелое молоко начинает вырабатываться у женщины

- А. На 5 день лактации
- Б. Сразу после родов
- В. Через 1-1,5 мес. после родов
- Г. К началу 3 недели после родов

Наиболее часто локализация гнойного очага при пупочном сепсисе происходит в

- А. Пупочных сосудах
- Б. Околупупочной области
- В. Передней брюшной стенке
- Г. Пупочной ранке

Оптимальным методом неинвазивной дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний кишечника и функциональных расстройств толстой кишки у детей является определение

- А. Фекального кальпротектина
- Б. Возбудителей кишечных инфекций в кале
- В. Эластазы кала
- Г. Ультрасонографии толстой кишки

Затяжная пневмония диагностируется при отсутствии разрешения пневмонического процесса в течение более (в неделях)

- А. 6
- Б. 3
- В. 5
- Г. 4

Наиболее часто встречающейся формой злокачественной опухоли головного мозга у детей является

- А. Медуллобластома
- Б. Астроцитома
- В. Эпендимома
- Г. Краниофарингиома

Механизм действия антигистаминных препаратов заключается в _____ гистамина

- А. Усиленном выведении
- Б. Высвобождении
- В. Блокаде рецепторов
- Г. Торможении образования

Решающее значение для ликвидации полиомиелита имеет

- А. Наблюдение за контактными в очаге инфекции в течение трех недель
- Б. Экстренная вакцинация непривитых
- В. Плановый охват прививками на 96 и более процентов
- Г. Очаговая дезинфекция

При лечении легких форм бактериальных кишечных инфекций на дому преимущество отдается

- А. Противовирусным препаратам
- Б. Бактериофагам
- В. Антибиотикам
- Г. Ферментам

Атропин используют при

- А. Острой задержке мочи
- Б. Кишечной непроходимости
- В. Нарушении атриовентрикулярной проводимости
- Г. Передозировке наркотических препаратов

Результатом высокой степени связывания препарата с белками плазмы выступает

- А. Повышение концентрации свободной фракции препарата
- Б. Уменьшение $T_{1/2}$
- В. Лучшая эффективность препарата
- Г. Снижение концентрации свободной фракции препарата

К симптомам сердечной недостаточности по правожелудочковому типу относят

- А. Приступы потери сознания, судороги
- Б. Отёки нижних конечностей, увеличение печени
- В. Тахикардию, одышку
- Г. Боль в области сердца, экстрасистолию

Уровень гемоглобина при средней степени анемии равен (в г/л)

- А. 90-110
- Б. 110-112
- В. 70-89
- Г. Менее 70

Аллергическая стадия патогенеза при стрептококковой инфекции наиболее выражена

- А. На 4-5 неделях болезни
- Б. В первые дни болезни
- В. В конце 1 недели
- Г. На 2-3 неделях болезни

Введение в рацион ребенка овощей рекомендовано в возрасте _____ месяцев

- А. 8-9
- Б. 3-4
- В. 4-5
- Г. 6-7

Защитный рефлекс у новорожденного ребенка угасает к _____ месяцам жизни

- А. 2
- Б. 12
- В. 6
- Г. 5

К патогенетическим средствам лечения острого панкреатита относятся

- А. Холинолитики
- Б. Ферменты
- В. Ингибиторы ферментов
- Г. Антибактериальные препараты

Первичный дефект межпредсердной перегородки располагается в _____ части перегородки

- А. Нижней
- Б. Верхней
- В. Средней
- Г. Любой

Для вирусного гепатита а типичной является _____ форма

- А. Инаппарантная
- Б. Стертая
- В. Желтушная
- Г. Безжелтушная

Наиболее частым ранним осложнением язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки является

- А. Кровотечение
- Б. Пенетрация
- В. Стеноз
- Г. Малигнизация

Для купирования гипогликемии без потери сознания, развившейся у ребенка с инсулинозависимым сахарным диабетом, необходимо дать ребенку

- А. Молока
- Б. Напиток с сахарозаменителем
- В. Сахар или сладкий напиток
- Г. Воды

Наиболее частой формой желчного пузыря у грудных детей является

- А. S-образная
- Б. Цилиндрическая
- В. Округлая
- Г. Веретенообразная

При диссеминированных процессах в легких характер одышки является

- А. Смешанным
- Б. Рестриктивным
- В. Экспираторным
- Г. Инспираторным

Прибор для измерения толщины кожной складки называют

- А. Толстотным циркулем
- Б. Динамометром
- В. Калиперометром
- Г. Пикфлоуметром

Ребенок устойчиво сидит с поддержкой, устойчиво держа голову с _____ месяцев

- А. 5
- Б. 6,5
- В. 5,5
- Г. 6

Препаратами выбора при стрептококковой пневмонии являются

- А. Аминогликозиды
- Б. Макролиды
- В. Фторхинолоны
- Г. Аминопенициллины

Ребёнок с железодефицитной анемией средней степени тяжести относится к группе здоровья

- А. I
- Б. IV
- В. V
- Г. III

Для профилактики пищевой аллергии предпочтительны смеси

- А. Адаптированные кисломолочные
- Б. На основе сои
- В. На основе козьего молока
- Г. Частичногидролизированные

Типичным клиническим изменением при токсокарозе является

- А. Снижение остроты зрения
- Б. Зуд в области заднего прохода
- В. Боль при движении в суставах
- Г. Гемоколит

Из врожденных аномалий костной системы наиболее часто

- А. Встречается врожденный вывих бедра
- Б. Встречаются врожденные остеодисплазии
- В. Встречаются наследственные хондродисплазии
- Г. Встречаются пороки развития костей

Частыми дерматологическими изменениями при ВИЧ-инфекции у детей являются

- А. Трофические изменения, некрозы
- Б. Опухоли
- В. Участки депигментации
- Г. Грибковые, бактериальные и вирусные поражения кожи

К лабораторным признакам фазы коагулопатии и тромбоцитопении потребления синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови у новорожденных детей относят

- А. Удлинение времени свертывания крови
- Б. Укорочение времени свертывания и времени кровотечения
- В. Укорочение активированного частичного тромбопластинового времени
- Г. Нормальный уровень тромбоцитов в крови

Внезапное появление цианоза у новорожденного в горизонтальном положении и его исчезновение в вертикальном положении свидетельствует о

- А. Болезни гиалиновых мембран
- Б. Врожденном пороке сердца
- В. Диафрагмальной грыже
- Г. Аспирационном синдроме

Ревакцинация против туберкулеза в условиях детской поликлиники

- А. Проводится только по эпидпоказаниям
- Б. Проводится в возрасте 6-7 лет
- В. Проводится в возрасте 14 лет
- Г. Не проводится

К лекарственным препаратам, применяемым для этиотропной терапии кори, относят

- А. Интерфероны
- Б. Антимикотики
- В. Антибиотики
- Г. Антипротозойные препараты

Плазматические клетки, непосредственно вырабатывающие антитела, образуются из

- А. В-лимфоцитов
- Б. Базофилов
- В. Макрофагов
- Г. Нейтрофилов

Сочетание абактериальной лейкоцитурии, протеинурии, гематурии характерно для

- А. Интерстициального нефрита
- Б. Цистита
- В. Гломерулонефрита
- Г. Пиелонефрита

Количество нефронов в почках новорождённого составляет (млн)

- А. 1
- Б. 2
- В. 4-5
- Г. 6-7

Значимое повышение сывороточной амилазы указывает на

- А. Перитонит
- Б. Острый аппендицит
- В. Острый гастрит
- Г. Острый панкреатит

В развитии острого панкреатита главенствующая роль принадлежит

- А. Микроциркуляторным нарушениям
- Б. Нарушению лимфооттока
- В. Микробной флоре
- Г. Аутоферментной агрессии

Через 2 часа после нагрузки глюкозой диагноз «сахарный диабет» ставится при гликемии более (в ммоль/л)

- А. 6,1
- Б. 11,1
- В. 7,8
- Г. 10

Для гемодинамической коррекции впс с единственным полноценным желудочком сердца показано выполнение операции

- А. Фонтена
- Б. Растелли
- В. Росса
- Г. Рашкинда

Правое легкое имеет

- А. 2 Доли
- Б. 3 Доли
- В. 1 Долю
- Г. 5 Долей

Вакцинацию против ротавирусной инфекции проводят

- А. Однократно
- Б. Двукратно с интервалом 3 месяца
- В. Двукратно с интервалом 1,5 месяца
- Г. Трехкратно с интервалом не менее 1 месяца

При конституционально-экзогенном ожирении у детей избыточное отложение жира

- А. Выявляется на конечностях
- Б. Распределяется равномерно
- В. Определяется в области лица
- Г. Отмечается в области пупка

Какая используется схема вакцинации ребёнка 7 месяцев против гемофильной инфекции?

- А. 2 Раза с интервалом 1-2 месяца, с ревакцинацией через 1 год
- Б. 1 Раз с интервалом 1-2 месяца, без ревакцинации
- В. 2 Раза с интервалом 1-2 месяца, без ревакцинации
- Г. 3 Раза с интервалом 1-2 месяца, с ревакцинацией через 1 год

Антибиотикотерапия при язвенном колите применяется

- А. Для профилактики рецидивов заболевания
- Б. Для остановки выраженных кровотечений
- В. При неэффективности салицилатов
- Г. При наличии септических осложнений

Мама заметила у месячной дочери прозрачную жидкость в пупке, педиатр проверил наличие отделяемого в пупке и пропальпировал образование в области пупка, при операции выявлено кистозное образование, которое соединяется с мочевым пузырем, диагноз _____ наиболее вероятный

- А. Незаращение желточного протока
- Б. Омфалоцеле
- В. Киста урахуса
- Г. Экстрофия мочевого пузыря

Для болевого синдрома при дисфункции билиарного тракта, связанного с повышением тонуса сфинктеров, характерны _____ боли в

- А. Постоянные интенсивные; правом подреберье
- Б. Опоясывающие; области желудка и спины
- В. Приступообразные кратковременные; правом подреберье
- Г. Тупые; околопупочной области

Характерным для крапивницы элементом сыпи является

- А. Волдырь
- Б. Эрозия
- В. Язва
- Г. Гнойник

Дебют клинических проявлений целиакии происходит преимущественно после введения

- А. Фруктового пюре
- Б. Каш
- В. Молочных смесей
- Г. Овощного пюре

Уробилиноген образуется в

- А. Почках
- Б. Мочевом пузыре
- В. Печени
- Г. Кишечнике

Больные с целиакией могут употреблять

- А. Кукурузную кашу
- Б. Ржаной хлеб
- В. Изделия из пшеничного теста
- Г. Ячменную кашу

Происхождение мочекаменной болезни у детей определяется

- А. Полиэтиологической теорией
- Б. Нарушением водно-электролитного баланса
- В. Аномалией развития органов мочевой системы
- Г. Эндокринными нарушениями

Нейтрофилёз отмечается при

- А. Пневмонии
- Б. Коклюше
- В. Гриппе
- Г. Краснухе

Анализ мочи по нечипоренко следует проводить при

- А. Бактериурии
- Б. Оксалурии
- В. Протеинурии
- Г. Лейкоцитурии

Показанием к плановой холецистэктомии является наличие

- А. Камней в печеночных протоках
- Б. Аномалии желчного пузыря
- В. Камней в желчном пузыре
- Г. Хронического холецистита

Дневной сон у ребёнка в целях профилактики когнитивных и поведенческих расстройств необходимо сохранять до (в годах)

А. 2-3

Б. 5-6

В. 1-2

Г. 3-4