

Тесты с вопросами по специальности «Педиатрия» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/pediatr/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Педиатрия» для аккредитации и других экзаменов (4700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/vrach_pediatriya/

2) Тесты для аккредитации «Неонатология» (3800 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/neonatologiya/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Для синдрома Жильбера характерно:

- А. Повышение уровня трансаминаз в крови
- Б. Повышение уровня прямого билирубина в крови
- В. Повышение уровня непрямого билирубина в крови
- Г. Ретикулоцитоз

Девочка 14 лет обратилась к врачу с жалобами на слабость, боли и припухание суставов, выпадение волос, красные пятна на коже щек, усиливающиеся после пребывания на солнце. При обследовании выявлены некоторое расширение границ, приглушение тонов сердца, единичные экстрасистолы, лейкопения, СОЭ - 32 мм/час. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Ювенильный ревматоидный артрит
- Б. Ревматизм
- В. Системная красная волчанка
- Г. Дерматомиозит
- Д. Фотодерматоз

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие этиологического фактора болезни:

1. *Streptococcus pneumoniae*
 2. *Streptococcus pyogenes*
 3. *Pseudomonas aeruginosa*
 4. *Mycoplasma pneumoniae*
 5. *Klebsiella pneumoniae*
- А. Внебольничная пневмония
Б. Внутрибольничная пневмония
- А. 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5А
Б. 1А, 2А, 3А, 4Б, 5Б
В. 1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5А
Г. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5Б

В общем анализе мочи при типичной форме вирусного гепатита А определяется:

- А. Непрямой билирубин
- Б. Глюкоза
- В. Прямой билирубин
- Г. Белок
- Д. Лейкоциты

Серозный менингит может отмечаться при:

- А. Шигеллезе
- Б. Норовирусной инфекции
- В. Ротавирусной инфекции
- Г. Энтеровирусной инфекции

К характеристикам потенциала здоровья населения относятся показатели:

- А. Больничной летальности
- Б. Досуточной летальности
- В. Инвалидности
- Г. Охвата диспансерным наблюдением
- Д. Младенческой смертности

Выберите показатель, являющийся интегрированным показателем состояния здоровья детей в настоящее время:

- А. Показатель охвата профилактическими осмотрами
- Б. Распространенность заболеваний
- В. Показатель охвата диспансерным наблюдением

Дети, больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации, со значительно сниженными функциональными возможностями организма, относятся к группе здоровья:

- А. 1
- Б. 2
- В. 3
- Г. 4
- Д. 5

Возраст ребенка 2 дня. Кожные покровы бледно-желтушные с рождения, подкожно-жировая клетчатка пастозна, печень выступает из-под реберной дуги на 3 см, селезенка - на 1 см, ребенок вялый. Мышечный тонус и рефлексы новорожденных снижены. Гемоглобин 150 г/л, свободный билирубин 210 мкмоль/л. У матери О (I) группа крови, резус-отрицательная. У ребенка – О (I) группа крови, резус-положительная. Наиболее вероятный диагноз?

- А. ГБН, отечная форма
- Б. ГБН, желтушная форма
- В. ГБН, анемическая форма
- Г. Транзиторная желтуха новорожденных
- Д. Анемия Минковского-Шоффара, гемолитический криз

Метаболический синдром у подростков, помимо артериальной гипертензии и ожирения, характеризуется:

- А. Гиперинсулинемией, гиперурикемией, гипогликемией
- Б. Гиперинсулинемией, гиперлипидемией, снижением толерантности к глюкозе
- В. Гипертриглицеридемией, гипербилирубинемией, гиперхолестеринемией
- Г. Гипокоагуляцией, гипогликемией, гиперурикемией
- Д. Нормохромной анемией, гипергликемией, гиперкреатинемией

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие физикальных изменений различным нозологическим формам:

1. Пневмония
 2. Обструктивный бронхит
 3. Гидроторакс
 4. Эмфизема легких
 5. Образование больших полостей, содержащих воздух
- А. Укорочение перкуторного звука над лёгким
Б. Коробочный оттенок перкуторного звука над лёгким
В. Тимпанический перкуторный звук над легким
- А. 1А, 2Б, 3В, 4Б, 5Б
Б. 1А, 2Б, 3А, 4Б, 5В
В. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5В
Г. 1В, 2Б, 3А, 4Б, 5Б

Ребенка двух лет, у которого обнаружен крипторхизм в форме паховой эктопии, необходимо оперировать:

- А. Безотлагательно
Б. До 5 лет
В. До 10 лет
Г. До 12 лет

Показанием к экстренной госпитализации ребенка с болями в животе является:

- А. Двукратная рвота желудочным содержимым
Б. Стул по типу мелены
В. Стул по типу «овечьего»
Г. Дизурия
Д. Кашицеобразный стул до 4 раз в сутки

Основой улучшения первичной медико-санитарной помощи детям является:

- А. Введение общей врачебной практики (семейного врача)
Б. Повышение эффективности профилактической работы
В. Создание отделений неотложной помощи на базе детских поликлиник
Г. Патронаж больных детей на дому

Девочка 14 лет жалуется на мучительную головную боль, жажду, озноб. Больна первый день. температура тела 40,0*С. Сонливая, вялая. Кожные покровы цианотичные, на ягодицах, бедрах геморрагические высыпания от мелкоточечных петехий до кровоизлияний размером 3-4 см. Единичные розеолезные и розеолезно-папулезные элементы на коже живота, спины, верхних конечностей. Ригидность мышц затылка, симптом Кернига сомнительный. Пульс 120 ударов в минуту, слабого наполнения, тоны сердца глухие, АД 85/55 мм рт.ст., ЧД 28 в минуту. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Корь
- Б. Менингококцемия
- В. Осложненное течение гриппа
- Г. Менингит
- Д. Инфекционный мононуклеоз

Основным возбудителем бактериального тонзиллита у детей является:

- А. Дифтерийная палочка
- Б. Пиогенный стрептококк
- В. Анаэробные бактерии
- Г. Золотистый стафилококк
- Д. Пневмококк

Для лечения обструктивного ларинготрахеита со стенозом гортани 2 степени препаратом первого выбора является:

- А. Цетиризин внутрь
- Б. Амоксициллин внутрь
- В. Дексаметазон парентерально
- Г. Адреналин парентерально
- Д. Будесонид в ингаляциях

Какой признак из перечисленных не является нормой на электрокардиограмме у ребенка 5 лет:

- А. Частота сердечных сокращений 100 в минуту
- Б. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса
- В. Дыхательная аритмия
- Г. Высокий зубец Т

Ребенок в возрасте 8-ми месяцев с проявлениями атопического дерматита болен острым респираторным заболеванием. На 4-й день болезни появились лающий грубый кашель, одышка с втяжением уступчивых мест грудной клетки на вдохе, шумное дыхание, осиплость голоса. Появившиеся симптомы наиболее вероятно свидетельствуют о:

- А. Стенозирующем ларинготрахеите
- Б. Коклюше
- В. Аспирации инородного тела
- Г. Пневмонии
- Д. ОРВИ

Препарат первого выбора для лечения острого бактериального риносинусита у детей:

- А. Цефиксим
- Б. Ципрофлоксацин
- В. Кларитромицин
- Г. Амоксициллин + клавулановая кислота
- Д. Амикацин

Укажите оптимальные сроки введения мясного прикорма здоровому ребенку, находящемуся на грудном вскармливании:

- А. В 3 мес
- Б. В 4 мес
- В. В 6 мес
- Г. В 7-8 мес
- Д. После 10 мес

Ребенок 4-х месяцев болен первые сутки. Снижен аппетит. Отмечается резкая бледность кожных покровов. Дважды рвота после кормления. Стул по типу "малинового желе". Наиболее вероятный диагноз:

- А. Пилоростеноз
- Б. Кишечная инвагинация
- В. Ротавирусный гастроэнтерит
- Г. Сальмонеллез
- Д. Дизентерия

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между анатомическими особенностями врожденного порока сердца и особенностями гемодинамических нарушений:

1. Стеноз легочной артерии
 2. Дефект межжелудочковой перегородки
 3. Открытый артериальный проток
 4. Коарктация аорты
 5. Тетрада Фалло
- А. ВПС «бледного» типа
Б. ВПС «синего» типа
В. ВПС без сброса крови
- А. 1Б, 2Б, 3Б, 4В, 5А
Б. 1А, 2А, 3А, 4В, 5Б
В. 1В, 2Б, 3А, 4В, 5Б

Мальчик 8 лет, находится в бессознательном состоянии в течение 1 часа, дыхание Куссмауля, гиперемия щек, сухость кожи, глазные яблоки мягкие, запах ацетона изо рта. В течение 3 недель беспокоила жажда, частые мочеиспускания, похудел на 1 кг. Ваш предварительный диагноз:

- А. Гипогликемическая кома
Б. Несахарный диабет
В. Диабетическая кетоацидотическая кома
Г. Острая почечная недостаточность

При гемолитической болезни новорожденных желтуха появляется:

- А. В первые сутки жизни
Б. На 3-и сутки жизни
В. На 5-е сутки жизни
Г. На 6-е сутки жизни
Д. На 10-е сутки жизни

Укажите симптомы, характерные для ротавирусного гастроэнтерита:

1. Лихорадка
 2. Диарея
 3. Рвота
 4. Примесь слизи и крови в стуле
 5. Снижение аппетита
- А. 1,2,3,4
Б. 1,2,3,4,5
В. 1,2,3,5

Для проведения эффективного непрямого массажа сердца ладони следует расположить:

- А. С обеих сторон грудной клетки
- Б. На границе средней и нижней трети грудины
- В. В пятом межреберном промежутке слева
- Г. На верхней части грудины

При целиакии противопоказаны:

- А. Грудное молоко
- Б. Адаптированные молочные смеси
- В. Злаки
- Г. Мясо
- Д. Овощи

Выберите препараты, которые могут быть назначены для лечения атипичной пневмонии у ребенка:

- 1. Амоксициллин
- 2. Амоксициллин-клавуланат
- 3. Кларитромицин
- 4. Амикацин
- 5. Ципрофлоксацин

- А. 1,2,3
- Б. 3,4
- В. 3,5
- Г. 3

Гемолитическая болезнь новорожденных обусловлена:

- А. Нарушением конъюгации билирубина
- Б. Внутриутробной инфекцией
- В. Иммунологическим конфликтом
- Г. Гемоглобинопатией
- Д. Тромбоцитопатией

Для тетрады Фалло характерно:

- А. Нормальное физическое развитие
- Б. Наличие повышенного аппетита
- В. Бессимптомное течение
- Г. Одышечно-цианотические приступы
- Д. Отставание в психическом развитии

Ребенок от женщины с резус-отрицательной кровью, страдающей анемией неясной этиологии, от 3-й беременности. Состояние при рождении расценено как очень тяжелое: стонет, беспокоен, периодически судороги, отечность мягких тканей, желтушность кожных покровов, гепатоспленомегалия. В анализе крови: гемоглобин 180 г/л, эритроциты $4,6 \times 10^{12}/л$, цветовой показатель 1,2. какой диагноз наиболее вероятен у ребенка?

- А. Гемолитическая болезнь новорожденного, анемическая форма
- Б. Гемолитическая болезнь новорожденного, желтушная форма
- В. Гемолитическая болезнь новорожденного, отечная форма
- Г. Наследственная сфероцитарная анемия Минковского-Шоффара
- Д. Менингоэнцефалит

Повышение артериального давления в качестве побочного эффекта может отмечаться при приеме:

- А. Симпатомиметиков
- Б. Ганглиоблокаторов
- В. Ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента
- Г. Бета-адреноблокаторов
- Д. Диуретиков

Для лечения острой аллергической крапивницы и ангионевротического отека используют:

1. Антигистаминные препараты
 2. Холинолитики
 3. Системные глюкокортикостероиды
 4. Ареналин
 5. Нестероидные противовоспалительные средства
- А. 1,2,3
 - Б. 1,3,5
 - В. 1,3
 - Г. 1,2,3,4

Для пассивной иммунопрофилактики используют:

- А. Живые вакцины
- Б. Иммуноглобулины
- В. Анатоксины
- Г. Инактивированные вакцины
- Д. Бактериальные лизаты

Об эффективности профилактической работы в детской поликлинике можно судить по:

- А. Полноте и своевременности проведения профилактических осмотров
- Б. Динамике показателей здоровья детей
- В. Частоте госпитализаций в стационар
- Г. Количеству вызовов врача на дом

Доза для внутримышечного введения адреналина ребенку 8 лет с анафилактической реакцией составляет:

- А. 0,1 мг
- Б. 0,15 мг
- В. 0,3 мг
- Г. 0,5 мг
- Д. 1 мг

Выберите препараты, которые могут быть назначены для стартового лечения острого пиелонефрита у ребенка:

1. Амоксициллин
2. Амоксициллин-клавуланат
3. Джозамицин
4. Цефуроксим
5. Цефотаксим

- А. 1,2,3
- Б. 2,4,5
- В. 1,2,3,5

При развитии у ребенка афебрильных судорог прежде всего необходимо исключить:

- А. Менингит
- Б. Гипокальциемию
- В. Гипогликемию
- Г. Гипокалиемию
- Д. Эпилепсию

Для колитического синдрома характерно наличие в копрограмме:

- А. Мышечных волокон
- Б. Нейтрального жира
- В. Крахмала
- Г. Слизи, эритроцитов, лейкоцитов
- Д. Жирных кислот

Девочка 7 лет больна с 3-х лет бронхиальной астмой. В течение последних 2-х лет отмечаются ежедневные приступы, в том числе ночные, а также непродуктивный кашель. Принимает эпизодически эуфиллин. Какая базисная терапия показана ребенку?

- А. Монтелукаст натрия
- Б. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- В. Комбинация ингаляционных глюкокортикостероидов и бронходилататоров длительного действия
- Г. Системные глюкокортикостероиды
- Д. Базисная терапия не показана

Гипотрофия I степени у детей диагностируется при величине массы тела ниже:

- А. 3 центиля
- Б. 10 центиля
- В. 25 центиля
- Г. 50 центиля
- Д. 75 центиля

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между характером сыпи и заболеванием:

1. Мелкопятнистая сыпь на неизмененном фоне кожи
2. Геморрагическая «звездчатая» сыпь
3. Везикулярная сыпь с явлениями «ложного» полиморфизма
4. Пятнистопапулезная сыпь на неизмененном фоне кожи
5. Мелкоточечная сыпь на гиперемизированном фоне кожи

- А. Корь
- Б. Краснуха
- В. Скарлатина
- Г. Ветряная оспа
- Д. Менингококцемия

- А. 1А, 2Д, 3Г, 4Б, 5В
- Б. 1Б, 2Д, 3Г, 4А, 5В
- В. 1Б, 2Д, 3Г, 4В, 5А

На приеме педиатра подросток с жалобами на боль в горле, фебрильную температуру в течение 6 дней, затруднение носового дыхания. При осмотре: отек верхней половины лица, обширные наложения на небных миндалинах, увеличение шейных лимфоузлов, увеличение печени. каков наиболее вероятный диагноз:

- А. Стрептококковый тонзиллит
- Б. Аденовирусная инфекция
- В. Синдром Кавасаки
- Г. Инфекционный мононуклеоз
- Д. Острый бактериальный риносинусит

Какие вакцины противопоказаны ВИЧ-инфицированным детям:

- А. Вакцина против пневмококка
- Б. Вакцина против гепатита В
- В. Инактивированная полиомиелитная вакцина
- Г. БЦЖ
- Д. Вакцина против дифтерии и столбняка

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите возможную этиологию бактериального тонзиллофарингита у детей:

1. Streptococcus pneumoniae
2. Streptococcus pyogenes
3. Pseudomonas aeruginosa
4. Corynebacterium diphtheriae
5. Staphylococcus aureus

А. Вызывает бактериальный тонзиллофарингит у детей

Б. У иммунокомпетентных детей не вызывает тонзиллофарингита

А. 1А, 2А, 3Б, 4А, 5А

Б. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5Б

В. 1Б, 2А, 3Б, 4Б, 5А

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клиническими симптомами и заболеванием:

1. Грипп
2. Парагрипп
3. Аденовирусная инфекция
4. Риновирусная инфекция
5. РС-инфекция

А. Острое начало заболевания с резко выраженными насморком и чиханием на фоне нормальной или субфебрильной температуры

Б. Заболевание с выраженными экссудативными проявлениями, конъюнктивитом на фоне высокой температуры

В. Острое начало заболевания с высокой лихорадкой и выраженными симптомами интоксикации

Г. Заболевание с частым поражением нижних дыхательных путей, развитием бронхиолита

Д. Заболевание с выраженными катаральными явлениями в виде сухого грубого кашля, осиплостью голоса

А. 1Б, 2Д, 3Г, 4А, 5В

Б. 1В, 2Д, 3Б, 4А, 5Г

В. 1В, 2Г, 3Б, 4Д, 5А

Для нефротического синдрома у детей характерно:

- А. Массивная протеинурия и гипоальбуминемия
- Б. Гиполипидемия и артериальная гипертензия
- В. Массивные отёки и гипопротромбинемия
- Г. Гипофибриногенемия
- Д. Гипернатриемия

Для проведения заменного переливания крови при гемолитической болезни новорожденного по ABO-системе используют:

- А. Эритроцитарную массу O(1) и плазму O(1)
- Б. Эритроцитарную массу O(1) и плазму группы крови ребенка
- В. Эритроцитарную массу O(1) и плазму AB(IV)
- Г. Эритроцитарную массу группы крови ребенка и плазму AB(IV)
- Д. Эритроцитарную массу A(II) и плазму группы крови ребенка

У ребенка 1,5 лет фебрильная температура в течение 4-х дней, появились афты на слизистой оболочке полости рта и кровоточивость десен. Укажите предполагаемый диагноз:

- А. Цитомегаловирусная инфекция
- Б. Первичная герпетическая инфекция
- В. Герпангина
- Г. Кандидоз слизистых оболочек ротовой полости
- Д. Аденовирусная инфекция

При артериальной гипертензии наблюдается:

- А. Снижение сердечного выброса и повышение общепериферического сосудистого сопротивления
- Б. Повышение сердечного выброса и снижение общепериферического сосудистого сопротивления
- В. Нормальный сердечный выброс и снижение общепериферического сосудистого сопротивления
- Г. Повышение сердечного выброса и повышение общепериферического сосудистого сопротивления
- Д. Снижение сердечного выброса и снижение общепериферического сосудистого сопротивления

Объем форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) и максимальная пиковая скорость выдоха (ПСВ) у детей в возрасте старше 5 лет позволяют оценить:

- А. Степень рестриктивных нарушений в легких
- Б. Степень бронхиальной обструкции
- В. Переносимость физической нагрузки
- Г. Снижение общей емкости легких

Симптомами, требующими оказания экстренной помощи, являются все перечисленные, кроме:

- А. Нарушение проходимости дыхательных путей
- Б. Судороги
- В. Дыхательная недостаточность
- Г. Лихорадка
- Д. Шок

Для острого гломерулонефрита характерно:

- А. Олигурия, отеки на лице, повышение артериального давления
- Б. Олигурия, увеличение печени и селезенки
- В. Повышение артериального давления на руках, снижение артериального давления на ногах
- Г. Артралгии, петехиальные высыпания на коже

Каким нормативным документом гарантируется право граждан РФ на охрану здоровья:

- А. Трудовым кодексом
- Б. Конституцией РФ
- В. Гражданским кодексом
- Г. Федеральным законом об охране здоровья граждан

Показанием к гемодиализу при острой почечной недостаточности у детей являются:

- А. Массивные отёки
- Б. Уровень креатинина
- В. Прирост уровня креатинина за сутки и гиперкалиемия
- Г. Гипернатриемия в сочетании с артериальной гипертензией
- Д. Высокий уровень прямого билирубина в сочетании с повышенными показателями трансаминаз

При анафилактической реакции прежде всего следует ввести пациенту:

- А. Преднизолон
- Б. Хлоропирармин
- В. Бикарбонат натрия
- Г. Адреналин
- Д. Допамин

У ребенка 9 месяцев в тяжелом состоянии после перенесенной кишечной инфекции с олигурией, повышением мочевины крови, гемолитической анемией, петехиальными кровоизлияниями на коже и слизистых, тромбоцитопенией, можно думать о:

- А. Острой почечной недостаточности
- Б. Гемолитико-уремическом синдроме
- В. Остром гломерулонефрите
- Г. Геморрагической лихорадке с почечным синдромом
- Д. Остром пиелонефрите

Ребенок 7 лет перенес ангину. Через 10 дней появилась макрогематурия, периферические отеки. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Острый постстрептококковый гломерулонефрит
- Б. Геморрагический цистит
- В. Пиелонефрит
- Г. Мочекаменная болезнь

Наиболее грозным осложнением врожденных пороков сердца с гемодинамически значимым обогащением малого круга кровообращения является:

- А. Нарушение ритма сердца
- Б. Артериальная гипертензия
- В. Легочная гипертензия
- Г. Инсульт
- Д. Ишемия миокарда

У новорожденного в возрасте одних суток жизни отмечено появление желтухи. Кровь матери В(III) группы, резус-отрицательная, ребенка – АВ (IV) группы, резус положительная. Наиболее вероятный диагноз?

- А. Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-несовместимости
- Б. Гемолитическая болезнь новорожденного по ABO-системе
- В. Гемолитическая болезнь новорожденного по резус- и ABO-несовместимости
- Г. Транзиторная желтуха новорожденных

Укажите симптом, не характерный для атопического дерматита:

- А. Полиморфизм кожных высыпаний
- Б. Отсутствие зуда кожи
- В. Возрастная стадийность клинических проявлений
- Г. Локализация аллергической сыпи на коже лица, конечностей

У ребенка 1,5 лет фебрильная температура в течение 4-х дней, появились афты на слизистой полости рта и кровоточивость десен. Каков наиболее вероятный диагноз:

- А. Цитомегаловирусная инфекция
- Б. Первичная герпетическая инфекция
- В. Герпангина
- Г. Кандидоз слизистых ротовой полости
- Д. Аденовирусная инфекция

Причина кровоточивости при гемофилии?

- А. Тромбоцитопения
- Б. Тромбоцитопатия
- В. Нарушение проницаемости сосудистой стенки
- Г. Дефицит факторов свертывающей системы
- Д. Активация противосвертывающей системы

Основным физикальным признаком очаговой пневмонии является:

- А. Рассеянные разнокалиберные влажные хрипы
- Б. Выраженное притупление перкуторного звука
- В. Сухие рассеянные хрипы
- Г. Локальные мелкопузырчатые или крепитирующие хрипы
- Д. Дыхание с удлиненным выдохом

Какой показатель наиболее точно характеризует здравоохранение в стране:

- А. Показатель рождаемости
- Б. Младенческая смертность
- В. Оборот койки в стационаре
- Г. Охват профилактическими осмотрами населения
- Д. Число медицинских организаций

У ребенка 6 месяцев на фоне ОРВИ на 4 день болезни состояние ухудшилось, повысилась температура до 37,6*С, появилась одышка экспираторного характера, отмечается втяжение уступчивых мест грудной клетки при дыхании. При аускультации - удлиненный выдох, сухие свистящие и крепитирующие хрипы с обеих сторон. Ваш предположительный диагноз:

- А. Острый бронхит
- Б. Острый бронхиолит
- В. Инородное тело бронха
- Г. Пневмония

Для базисной терапии бронхиальной астмы назначают все перечисленные группы лекарств, кроме:

- А. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- Б. Короткодействующие бронходилататоры
- В. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов
- Г. Моноклональные антитела к IgE
- Д. Комбинация длительнодействующих бета2-агонистов с глюкокортикостероидами

Для острого постинфекционного нефрита характерно:

- А. Благоприятный прогноз
- Б. Циклическое течение
- В. Гематурия
- Г. Артериальная гипертензия
- Д. Все перечисленное верно

Выберите препарат, нормализующий моторную функцию желудочно-кишечного тракта:

- А. Висмута трикалия дицитрат
- Б. Домперидон
- В. Мебеверин
- Г. Ранитидин
- Д. Омепразол

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между биохимическими показателями крови и болезнью:

1. Низкий уровень общего белка
 2. Снижение содержания ферритина
 3. Высокий уровень кальция
 4. Повышение уровня щелочной фосфатазы
 5. Высокий уровень трансферрина
- А. Рахит, период разгара
 - Б. Гипотрофия
 - В. Железодефицитная анемия
 - Г. Гипервитаминоз Д
- А. 1А, 2В, 3Г, 4Б, 5В
 - Б. 1В, 2Б, 3А, 4Г, 5В
 - В. 1Б, 2В, 3Г, 4А, 5В
 - Г. 1Б, 2В, 3А, 4Г, 5В

Какие причины снижения частоты обструктивного бронхита с возрастом ребенка:

- А. Увеличение силы дыхательной мускулатуры
- Б. Уменьшение бактериальной аллергии
- В. Увеличение просвета бронхов
- Г. Уменьшение реактивности лимфатической ткани
- Д. Увеличение содержания Т-лимфоцитов в сыворотке крови

Причиной гипоксемии может являться:

- 1. Пневмония
 - 2. Тромбоэмболия легочной артерии
 - 3. Метгемоглобинемия
 - 4. Анемия
 - 5. Гипервентиляция
- А. 1,2,3
 - Б. 1,2,3,4
 - В. 1,2,3,4,5
 - Г. 1,2,5

Начинать выведение ребенка 8 лет из приступа пароксизмальной тахикардии при артериальном давлении 90/60 мм рт ст целесообразно с применения:

- А. Адреналина внутривенно
- Б. Дигоксина внутримышечно
- В. Изоптина внутривенно
- Г. Вагусных проб
- Д. АТФ внутривенно

При оценке физического развития восьмимесячного ребенка его масса тела составляла 7300 г, рост 68 см. Ребенок родился с массой тела 3200 г, ростом 50 см. До 4 мес был на грудном вскармливании, затем переведен на адаптированную молочную смесь. с 5,5 мес введен первый прикорм овсяной кашей, с 6 мес - овощное пюре, с 7 мес - мясо. До 5 мес развитие соответствовало возрасту, затем отмечена низкая прибавка массы тела, а после 7 мес - потеря массы тела. Стул 2-3 раза в день, периодически до 5 раз. Ваш предположительный диагноз:

- А. Пищевая аллергия
- Б. Болезнь Крона
- В. Лимфангиоэктазия кишечника
- Г. Целиакия
- Д. Псевдомембранозный колит

Препарат первого выбора для купирования дыхательной недостаточности при обострении бронхиальной астмы у детей:

- А. Будесонид
- Б. Аминофиллин
- В. Сальбутамол
- Г. Ипратропия бромид
- Д. Монтелукаст натрия

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между симптомами и заболеваниями:

1. Амимичное маскообразное лицо
2. Алопеция
3. Фотосенсибилизация
4. Лиловая окраска век с параорбитальным отеком
5. Энтезопатии

- А. Системная склеродермия
- Б. Системная красная волчанка
- В. Ювенильный дерматомиозит
- Г. Анкилозирующий спондилоартрит

- А. 1Г, 2Б, 3Б, 4В, 5Г
- Б. 1Б, 2А, 3Б, 4В, 5Г
- В. 1А, 2Б, 3Б, 4В, 5Г
- Г. 1А, 2А, 3Г, 4В, 5Б

Ребенок в возрасте 11 месяцев должен быть вакцинирован от:

1. Кори
2. Дифтерии
3. Гепатита В
4. Пневмококковой инфекции
5. Паротита

- А. 1,2,3,4
- Б. 2,3,4
- В. 2,3,4,5

Угроза билирубиновой энцефалопатии у доношенного новорожденного возникает при уровне билирубина в крови:

- А. Выше 100 мкмоль/л
- Б. Выше 170 мкмоль/л
- В. Выше 250 мкмоль/л
- Г. Выше 340 мкмоль/л
- Д. Выше 430 мкмоль/л

У ребенка 6 недель жизни в течение 2-х недель отмечается рвота после кормления. В весе не прибавляет. Какую патологию необходимо исключить в первую очередь:

- А. Пищевая аллергия
- Б. Гастроэзофагеальный рефлюкс
- В. Пилоростеноз
- Г. Инвагинация кишечника
- Д. Вирусный гастроэнтерит

Состояние, являющееся противопоказанием к кормлению грудью со стороны матери:

- А. Острая респираторная вирусная инфекция
- Б. Гепатит А
- В. Инсулинозависимый сахарный диабет
- Г. Аутоиммунный тиреоидит
- Д. Открытая форма туберкулеза

Укажите симптомы эксикоза у детей:

- 1. Западение большого родничка
- 2. Сухость кожи и слизистых оболочек
- 3. Полиурия
- 4. Жажда
- 5. Медленное расправление кожной складки

- А. 1,2,3,5
- Б. 1,2,3,4,5
- В. 1,2,4,5
- Г. 1,2,5

Больной

Д., 13 лет. В течение 2 лет беспокоят приступообразные боли в правой подвздошной области, различные по длительности. Несколько раз госпитализировался с подозрением на острый аппендицит, однако оперативное вмешательство не было произведено. При последнем обострении боли в животе сопровождались диареей с примесью крови. При осмотре кожные покровы обычной окраски, признаки узловатой эритемы, при пальпации живота - умеренная болезненность в правой подвздошной области. В анализе крови: гемоглобин - 100 г/л, СОЭ - 40 мм/час. Необходимо выполнить следующие диагностические исследования:

- А. Рентгенологическое исследование толстой кишки
- Б. Колоноскопия с лестничной биопсией
- В. Лапароскопия
- Г. Кoproлогическое исследование
- Д. Бактериологическое исследование кала

К лекарственным препаратам, используемым для достижения контроля бронхиальной астмы, относятся:

- А. β 2-агонисты короткого действия
- Б. Иммуномодуляторы
- В. Ингаляционные холинолитики
- Г. Ингаляционные глюкокортикостероиды в комбинации с бронходилататорами длительного действия
- Д. β 2-агонисты короткого действия в комбинации с холинолитиками

При гиповолемическом шоке пациенту следует ввести:

- А. Изотонический раствор хлорида натрия болюсно из расчета 20 мл/кг
- Б. Гипертонический раствор хлорида натрия болюсно из расчета 20 мл/кг
- В. Раствор глюкозы 5% из расчета 10 мл/кг
- Г. Раствор глюкозы 10% из расчета 5 мл/кг
- Д. Коллоидный раствор внутривенно медленно

Мочевой синдром при пиелонефрите характеризуется:

- А. Гематурией
- Б. Кристаллурией
- В. Протеинурией
- Г. Лейкоцитурией с бактериурией

Для вирусного крупа характерны симптомы:

- 1. Стридор
 - 2. Тризм
 - 3. Осиплость голоса
 - 4. Гиперсаливация
 - 5. Грубый кашель
- А. 1,2,3,5
 - Б. 1,3,4,5
 - В. 1,3,5
 - Г. 2,4

У ребенка 1,5 лет с детским церебральным параличом отмечается ежедневный кашель, поперхивания при кормлении. В возрасте 11 мес перенес пневмонию, в возрасте 6 и 14 месяцев - обструктивный бронхит. Какова наиболее вероятная причина кашля у ребенка?

- А. Бронхиальная астма
- Б. Первичный иммунодефицит
- В. Вторичный иммунодефицит
- Г. Коклюш
- Д. Хроническая аспирация пищи

Расширение сети медицинских реабилитационных центров для детей позволяет:

- А. Рационально использовать имеющийся коечный фонд
- Б. Более эффективно осуществлять медико-социальную реабилитацию детей

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между симптомами и заболеваниями:

1. Инфекция мочевыводящих путей

2. Нефротический синдром

3. Пиелонефрит

4. Язвенная болезнь 12-перстной кишки

5. Токсический гепатит

А. Повышение уровня щелочной фосфатазы в крови

Б. Гипопротеинемия

В. Бактериурия

Г. Положительная реакция на хеликобактер методом ПЦР в копрофильtrate

Д. Снижение уровня холестерина в крови

А. 1В, 2Б, 3В, 4Г, 5А

Б. 1Б, 2Б, 3В, 4Г, 5А

В. 1В, 2Д, 3В, 4Г, 5А

В каких случаях у ребенка следует исключать иммунодефицитное состояние:

1. Упорный кандидоз слизистых, микоз кожи и ногтей

2. Частые острые респираторные заболевания

3. Пневмоцистная пневмония

4. Генерализованный БЦЖ-ит или БЦЖ-остеит

5. Вакциноассоциированный полиомиелит

А. 1,2,3,4,5

Б. 1,2,3,4

В. 1,3,4,5

Г. 2,3,4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клиническими проявлениями и критериями диагностики острой ревматической лихорадки:

1. Кардит
 2. Артралгии
 3. Хорея
 4. Лихорадка
 5. Анулярная эритема
- А. Большие критерии
Б. Малые критерии
- А. 1А, 2Б, 3А, 4Б, 5А
Б. 1А, 2А, 3А, 4Б, 5А
В. 1Б, 2Б, 3А, 4Б, 5А
Г. 1Б, 2А, 3Б, 4А, 5Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между группами здоровья и определяющими их критериями:

1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
 5. V
- А. Практически здоровые дети
Б. Дети перенесшие внутриутробно, во время родов какое либо заболевание
В. Больные дети с хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации
Г. Больные дети с хроническими заболеваниями в состоянии компенсации
Д. Больные дети с тяжелыми хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации
- А. 1Д, 2В, 3Г, 4Б, 5А
Б. 1А, 2Г, 3В, 4Д, 5Б
В. 1А, 2Б, 3Г, 4В, 5Д

Для халазии кардии характерно наличие:

- А. Боли натошак в эпигастрии
Б. Боли натошак в правом подреберье
В. Запоров
Г. Рецидивирующей рвоты

Укажите характерный признак кожных геморрагий при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре:

- А. Возникновение после механического воздействия
- Б. Полиморфизм (синяки, петехии, экхимозы)
- В. Симметричность
- Г. Излюбленная локализация - ягодицы и нижние конечности
- Д. Монохромность

Для профилактики геморрагической болезни новорожденным вводят:

- А. Витамин А
- Б. Витамин К
- В. Препарат железа
- Г. Иммуноглобулин человека антирезус Rh0(D)
- Д. Дексаметазон

Основным клиническим проявлением фенилкетонурии является поражение:

- А. Системы кроветворения
- Б. Центральной нервной системы
- В. Печени
- Г. Костной системы
- Д. Иммунной системы

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие следующих костных и мышечных аномалий:

1. Выраженное отложение жира в области мышц, симулирующее их хорошее развитие
2. Искривление свода стопы
3. Нижняя челюсть отходит назад, а верхняя выступает вперед
4. Уменьшение массы мышц, истончение и нарушение трофики мышечных волокон
5. Неодинаковая степень развития мышц верхних и нижних конечностей

- А. Плоскостопие
- Б. Прогнатизм
- В. Мышечная атрофия
- Г. Мышечная асимметрия
- Д. Псевдогипертрофия

- А. 1А, 2Д, 3В, 4Б, 5Г
- Б. 1Д, 2А, 3В, 4Б, 5Г
- В. 1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Г
- Г. 1Г, 2А, 3Б, 4В, 5Д

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. К какой группе антимикробных средств относятся перечисленные лекарственные препараты:

1. Амикацин
 2. Цефепим
 3. Ванкомицин
 4. Кларитромицин
 5. Меропенем
 - А. Цефалоспорины
 - Б. Карбапенемы
 - В. Макролиды
 - Г. Аминогликозиды
 - Д. Гликопептиды
- А. 1Г, 2Б, 3Д, 4В, 5Б
Б. 1Г, 2А, 3Д, 4В, 5Б
В. 1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Б

Дефицит гуморального иммунитета чаще всего проявляется:

- А. Грибковыми заболеваниями
- Б. Частыми заболеваниями микробной этиологии
- В. Частыми вирусными заболеваниями
- Г. Задержкой психофизического развития

Какой из симптомов позволяет наиболее точно предположить атипичную этиологию внебольничной пневмонии у ребенка:

- А. Субфебрильная температура
- Б. Локальные крепитирующие хрипы в легких
- В. Невысокие маркеры бактериального воспаления в лабораторных анализах крови
- Г. Негомогенный характер инфильтративных теней на рентгенограмме
- Д. Неэффективность лечения бета-лактамом антибиотиком

При артериальной гипертензии у детей и подростков средние уровни систолического артериального давления и диастолического артериального давления из трех измерений равны или превышают возрастные значения:

- А. 25 перцентиля
- Б. 50 перцентиля
- В. 75 перцентиля
- Г. 90 перцентиля
- Д. 95 перцентиля

При энтеровирусной инфекции обычно отмечается:

- А. Некротическая ангина
- Б. Гингивостоматит
- В. Артралгии
- Г. Конъюнктивит
- Д. Лихорадка

Оценку физического развития ребенка первого года жизни следует проводить:

- А. Ежемесячно
- Б. Один раз в квартал
- В. Один раз в полгода
- Г. Один раз в год

Для железодефицитной анемии характерны:

- 1. Низкий уровень железа в сыворотке крови
- 2. Низкий уровень ферритина в сыворотке крови
- 3. Высокий уровень ферритина в сыворотке крови
- 4. Низкий уровень трансферрина в сыворотке крови
- 5. Высокий уровень трансферрина в сыворотке крови

- А. 1,2,4
- Б. 1,3,5
- В. 1,2,5
- Г. 2,4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие симптомов сердечной недостаточности:

- 1. Набухание яремных вен
- 2. Расширение границ относительной сердечной тупости влево.
- 3. Увеличение размеров печени
- 4. Периферические отеки
- 5. Влажные разнокалиберные хрипы в легких

- А. Левожелудочковая сердечная недостаточность
- Б. Правожелудочковая сердечная недостаточность

- А. 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 5А
- Б. 1А, 2Б, 3А, 4А, 5Б
- В. 1Б, 2А, 3Б, 4Б, 5А

В клиническом анализе при коклюше обычно отмечается:

- А. Лейкопения
- Б. Тромбоцитопения
- В. Нейтрофильный лейкоцитоз
- Г. Лимфоцитоз
- Д. Атипичные мононуклеары

При проведении скрининга на выявление врожденной дисфункции коры надпочечников у новорожденных определяют:

- А. Кортизол
- Б. Адrenокортикотропный гормон
- В. 17-оксипрогестерон
- Г. 17 кетостероиды
- Д. Тестостерон

Фрингоконъюнктивальная лихорадка наблюдается при:

- А. Гриппе
- Б. Аденовирусной инфекции
- В. РС-вирусной инфекции
- Г. Скарлатине
- Д. Кори

Для лечения острого вирусного бронхиолита следует использовать:

- 1. Кислородотерапию
 - 2. Бронходилататоры
 - 3. Будесонид
 - 4. Антибиотики
 - 5. Муколитики
- А. 2,3,4
 - Б. 1,2,3
 - В. 1,2
 - Г. 1,2,3,4,5

Каковы будут ваши рекомендации по диете на период болезни в случае острого вирусного гастроэнтерита у ребенка 7 месяцев, находящегося на грудном вскармливании и получающего прикорм в виде овощного пюре и безмолочных каш?

- А. Отмена грудного вскармливания и блюд прикорма, переход на кормление безлактозной смесью
- Б. Замена грудного молока безлактозной смесью, сохранение блюд прикорма в рационе
- В. Сохранение грудного вскармливания, блюда прикорма - по желанию ребенка
- Г. Переход на парентеральное питание на период болезни ребенка

Сепсис новорожденного чаще всего вызывают

- А. Вирусы
- Б. Бактерии
- В. Простейшие
- Г. Вирусно-бактериальные ассоциации
- Д. Грибы

Ребенку 8 мес, наблюдающемуся по поводу нейтропении (количество лейкоцитов в динамике 500-700 х 10⁹/л), противопоказана вакцинация:

- А. От пневмококка
- Б. От дифтерии, коклюша и столбняка
- В. От кори и паротита
- Г. От гриппа
- Д. Противопоказано введение любых вакцин

К группе риска по развитию бронхиальной астмы относятся:

- А. Часто болеющие дети
- Б. Дети с atopическими заболеваниями
- В. Дети, перенесшие пневмонию
- Г. Дети, имеющие хроническую патологию носоглотки
- Д. Дети, перенесшие РС-вирусный бронхолит на первом году жизни

Укажите антигистаминные препараты 1 поколения:

- 1. Хлоропирамин
- 2. Цетиризин
- 3. Дифенгидрамин
- 4. Клемастин
- 5. Дезлоратадин

- А. 1,3,4
- Б. 1,2,3
- В. 2,5
- Г. 1,3,4,5

На приеме педиатра подросток с жалобами на боль в горле, фебрильную температуру в течение 6 дней, затруднение носового дыхания. При осмотре: отек верхней половины лица, обширные наложения на небных миндалинах, увеличение шейных лимфатических узлов, увеличение печени. Установите диагноз:

- А. Стрептококковый тонзиллит
- Б. Аденовирусная инфекция
- В. Синдром Кавасаки
- Г. Инфекционный мононуклеоз
- Д. Острый бактериальный риносинусит

Показанием к проведению микционной цистографии является:

1. Учащенное болезненное мочеиспускание
2. Повторные эпизоды пиелонефрита у ребенка
3. Энурез
4. Подозрение на наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса по данным УЗИ
5. Гематурия

А. 1,2,3,4

Б. 1,2,3,4,5

В. 2,4

Г. 1,2,4

При полной атриовентрикулярной блокаде желудочки сокращаются:

А. Чаше, чем предсердия

Б. Реже, чем предсердия

Для ювенильного артрита характерно:

А. Циклическое течение с полным и быстрым обратным развитием

Б. Наличие кардиальных изменений

В. Длительное течение артрита

Г. «Летучесть» суставной боли

Наиболее частой причиной длительного кашля у детей раннего возраста является:

А. Бронхиальная астма

Б. Гастроэзофагеальный рефлюкс

В. Заболевания ЛОР-органов

Г. Коклюш

Экссудативная энтеропатия связана с:

А. Дисахаридазной недостаточностью

Б. Непереносимостью белков коровьего молока

В. Дефицитом пептидаз в кишечнике

Г. Врожденной лимфангиоэктазией

Д. Повышенной вязкостью секретов экзокринных желез

При оказании неотложной помощи при обморожениях не рекомендуется:

А. Постепенно согревать поражённый участок

Б. Вскрывать пузыри на обмороженном участке

В. Накладывать теплоизолирующую повязку

Г. Накладывать повязку с антисептиком

Д. Внутримышечно вводить преднизолон в дозе 3-5 мг/кг

В первую очередь в диагностических целях при тромбоцитопенической пурпуре необходимо исследовать?

- А. Коагулограмму
- Б. Общий анализ крови с определением количества тромбоцитов
- В. Исследование уровня протромбина
- Г. Биохимическое исследование крови
- Д. Иммунограмму

У мальчика 7 лет жалобы фебрильную температуру в течение 3-х недель, боли в костях, суставах, снижение аппетита. В клиническом анализе крови анемия, тромбоцитопения, лейкопения. Какое заболевание необходимо исключить прежде всего:

- А. Инфекционный мононуклеоз
- Б. Ревматоидный артрит с системным началом
- В. Лейкоз
- Г. Остеомиелит

Дисахаридазная недостаточность чаще всего проявляется в:

- А. Первые месяцы жизни
- Б. Первые три года жизни
- В. Дошкольном возрасте
- Г. Школьном возрасте
- Д. Подростковый период

Препарат выбора для лечения стрептококковой ангины:

- А. Амоксициллин
- Б. Джозамицин
- В. Цефиксим
- Г. Клиндамицин
- Д. Цефтриаксон

При подозрении на кровотечение из вен пищевода целесообразно прежде всего провести:

- А. Исследование гемостаза
- Б. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
- В. Эзофагогастродуоденоскопию
- Г. Рентгеноконтрастное исследование пищевода с барием
- Д. Исследование уровня гемоглобина в крови

Укажите симптомы экзикоза у детей:

- 1. Западение большого родничка**
- 2. Сухость кожи и слизистых оболочек**
- 3. Полиурия**
- 4. Жажда**
- 5. Медленное расправление кожной складки**

А. 1,2,4,5

Б. 1,2,3,5

В. 1,2,3,4,5

Г. 1,2,5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Дайте характеристику перечисленным костным аномалиям.

- 1. Размягчение и истончение плоских костей черепа**
- 2. Ладьевидное углубление на переднебоковых поверхностях грудной клетки в области прикрепления диафрагмы**
- 3. Нарушение минерализации и плотности костной ткани**
- 4. Размягчение костей**
- 5. Избыточное образование остеонной ткани без её минерализации в зонах роста костей**

А. Остеопороз

Б. Остеомалация

В. Остеонная гиперплазия

Г. Краниотабес

Д. Борозда Филатова-Гаррисона

А. 1Б, 2А, 3Д, 4В, 5Г

Б. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В

В. 1Г, 2А, 3В, 4Г, 5Д

Г. 1Б, 2Д, 3А, 4Б, 5В

Укажите основной патоген, вызывающий бактериальный тонзиллит у детей:

А. Пневмококк

Б. Гемофильная палочка

В. Бета-гемолитический стрептококк группы А

Г. Золотистый стафилококк

Д. Хламидии

Укажите симптомы, которые встречаются при синдроме Кавасаки у детей:

1. Лихорадка более 5 дней
2. Склерит
3. Полиморфная сыпь
4. Артериальная гипертензия
5. Боль в горле

А. 1,2,4,5

Б. 1,3,5

В. 1,2,3

Укажите минимальную продолжительность базисной терапии бронхиальной астмы:

А. 2 недели

Б. 1 месяц

В. 3 месяца

Г. 6 месяцев

Д. 1 год

Основным физикальным признаком полисегментарной пневмонии является:

А. Притупление перкуторного звука

Б. Рассеянные мелкопузырчатые хрипы

В. Рассеянные сухие свистящие хрипы

Г. Коробочный звук при перкуссии

Д. Локальные разнокалиберные влажные хрипы

Продолжительность антибактериальной терапии при пиелонефрите у детей должна составлять:

А. 5 дней

Б. 7 дней

В. 10-14 дней

Г. 21 день

Основной этиологический фактор эпиглоттита у детей:

А. *Streptococcus pneumoniae*

Б. *Neisseria meningitidis*

В. *Haemophilus influenzae*

Г. *Staphylococcus aureus*

Д. *Moraxella catarrhalis*

Наиболее частым возбудителем водянистой диареи являются:

- А. Шигеллы
- Б. Сальмонеллы
- В. Ротавирусы
- Г. Энтеровирусы
- Д. Аденовирусы

Основной причиной развития болезней накопления являются:

- А. Врожденные энзимопатии
- Б. Хроническое бактериальное воспаление
- В. Вирусные инфекции
- Г. Приобретенные энзимопатии
- Д. Онкологические заболевания.

С чего следует начинать оценку состояния пациента по алгоритму ABCDE, если он в сознании:

- А. Оценить проходимость дыхательных путей
- Б. Оценить тяжесть дыхательной недостаточности
- В. Оценить наличие нарушений кровообращения
- Г. Оценить степень нарушения сознания
- Д. Измерить температуру тела

Назовите основного возбудителя внебольничной пневмонии у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет

- А. Стафилококк
- Б. Стрептококк
- В. Пневмококк
- Г. Моракселла
- Д. Грам-отрицательная флора

Какие препараты используются для лечения пациента с ротавирусным гастроэнтеритом:

1. Антибиотики
 2. Сорбенты
 3. Противодиарейные средства, уменьшающие перистальтику кишечника
 4. Препараты для оральной и внутривенной регидратации
 5. Иммуномодуляторы
- А. 1,2,3,4
 - Б. 2,3,4,5
 - В. 2,4
 - Г. 2,4,5

С помощью пикфлоуметра измеряется:

- А. Общий объем выдоха
- Б. Жизненная емкость легких
- В. Остаточный объем легких
- Г. Максимальная скорость выдоха
- Д. Объем форсированного выдоха за первую секунду

Девочка 7 лет больна с 3-х лет бронхиальной астмой. В течение последних 2-х лет отмечаются ежедневные приступы, в том числе ночные, а также непродуктивный кашель. Принимает эпизодически эуфиллин. Какая базисная терапия показана ребенку:

- А. Монтелукаст натрия
- Б. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- В. Комбинация ингаляционных глюкокортикостероидов и бронходилататоров длительного действия
- Г. Системные глюкокортикостероиды
- Д. Базисная терапия не показана

Девочка 14 лет обратилась к врачу с жалобами на слабость, боли и припухание суставов, выпадение волос, красные пятна на коже щек, усиливающиеся после пребывания на солнце. При обследовании выявлены некоторое расширение границ, приглушение тонов сердца, единичные экстрасистолы, лейкопения, СОЭ - 32 мм/час. Укажите предполагаемый диагноз:

- А. Ювенильный ревматоидный артрит
- Б. Ревматизм
- В. Системная красная волчанка
- Г. Дерматомиозит
- Д. Фотодерматоз

При лечении больного цитостатиками необходимо назначать регулярно:

- А. Консультацию окулиста
- Б. Полный анализ крови
- В. Рентгенографию костей для выявления остеопороза
- Г. Измерение артериального давления
- Д. Стернальную пункцию

У ребенка 10 мес на фоне вирусного гастроэнтерита диагностировано умеренное обезвоживание. Выражена жажда, пьет охотно, рвоты на момент обращения нет. Какое стартовое лечение показано пациенту в этом случае?

- А. парентеральная регидратация из расчета 100 мл/кг веса за первые 6 часов в стационаре
- Б. парентеральная регидратация из расчета 75 мл/кг веса за 4 часа в стационаре
- В. парентеральная регидратация из расчета 100 мл/кг веса за сутки в стационаре
- Г. оральная регидратация из расчета 75 мл/кг веса за 4 часа в стационаре
- Д. восполнение текущих потерь и физиологической потребности в жидкости в амбулаторных условиях

Доза для внутримышечного введения адреналина подростку 15 лет с анафилактической реакцией составляет:

- А. 0,1 мг
- Б. 0,15 мг
- В. 0,3 мг
- Г. 0,5 мг
- Д. 1 мг

Укажите препарат выбора для лечения менингококцемии:

- А. Цефалоспорин III поколения
- Б. Амоксициллин + клавулановая кислота
- В. Ципрофлоксацин
- Г. Джозамицин
- Д. Триметоприм-сульфаметоксазол

Для транзиторной (физиологической) желтухи новорожденных не характерно:

- А. Появление желтухи на 3-й день жизни
- Б. Удовлетворительное состояние ребенка
- В. Умеренно повышенный уровень свободного билирубина
- Г. Нормальный уровень связанного билирубина
- Д. Умеренная анемия

Что включается в понятие «перинатальная смертность»?

- А. Число детей, умерших до 1 года, на 1000 родившихся живыми
- Б. Число мертворожденных детей и детей, умерших на первой неделе жизни, от общего числа родившихся живыми и мертвыми
- В. Число мертворожденных
- Г. Число мертворожденных детей и детей, умерших на первом месяце жизни, от общего числа родившихся живыми и мертвыми
- Д. Число детей, умерших до 1 года, на 10 000 родившихся живыми

Для какого заболевания характерны гемартрозы:

- А. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
- Б. Геморрагический васкулит
- В. Лейкоз
- Г. Гемофилия
- Д. Болезнь Виллебранда

У ребенка 1,5 лет фебрильная температура, грубый лающий кашель, стридор, осиплость голоса, гиперсаливация, тризм. Укажите предполагаемый диагноз:

- А. Обструктивный ларинготрахеит
- Б. Эпиглоттит
- В. Обструктивный бронхит
- Г. Бронхиолит
- Д. Ларингит

При подозрении на феномен "гипертензии на белый халат" у ребенка показано проведение:

- А. Холтеровского мониторирования ЭКГ
- Б. Велоэргометрии
- В. Суточного мониторирования артериального давления
- Г. Исследование уровня кортизола в сыворотке крови

На консультацию к невропатологу направлен мальчик семи лет с остро развившейся мышечной слабостью и нарушением походки. Невропатолог обнаружил у ребенка признаки дистрофии, параорбитальный отек и гиперемию, гнусавый оттенок голоса, поперхивание, отек и плотность мышц плечевого пояса и бедер. Мальчик не мог поднять руки, сесть из положения лежа, выполнить приседание. Симптомы поражения центральной и периферической нервной системы не выявлены. Укажите предполагаемый диагноз:

- А. Системную красную волчанку
- Б. Системную склеродермию
- В. Гранулематоз Вегенера
- Г. Дерматомиозит
- Д. Смешанное заболевание соединительной ткани

На фоне лечения антибиотиками необходима диетическая коррекция путем:

- А. Ограничения поваренной соли
- Б. Введение продуктов, содержащих пре- и пробиотики
- В. Введение продуктов, обладающих защитными свойствами по отношению к слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта
- Г. Введение продуктов, богатых калием
- Д. Дополнительное введение белков, жиров и углеводов

Наиболее частая причина пищевой аллергии у детей первого года жизни:

- А. Белок коровьего молока
- Б. Желток куриного яйца
- В. Белок куриного яйца
- Г. Рыба
- Д. Глютен

Мама с мальчиком 1,5 года обратилась к участковому врачу-педиатру с жалобами на жидкий, обильный, зловонный стул, сниженный аппетит, отсутствие прибавки в весе. Изменение характера стула появилось через 1-1,5 месяца после расширения рациона ребенка, введения хлебобулочных изделий. Появился периодически жидкий стул, иногда обильный, зловонный. Ребенок при этом оставался активен. В течение 2-3 месяцев до обращения вес ребенка не меняется независимо от употребляемых продуктов. В это же период 3 раза отмечалась рвота без явных причин. В настоящее время мальчик получает ясельный стол. Предположительный диагноз:

- А. Целиакия
- Б. Гастроинтестинальная форма пищевой аллергии
- В. Дисбактериоз
- Г. Пищевая аллергия

Наиболее значимый побочный эффект фототерапии при гемолитической болезни новорожденного:

- А. Потеря жидкости
- Б. Диарея
- В. Сыпь на коже
- Г. Респираторные нарушения
- Д. Снижение аппетита

Абсолютное противопоказание к вскармливанию грудным молоком со стороны ребенка:

- А. Гемолитическая болезнь новорожденных
- Б. Галактоземия
- В. Внутривentricularное кровоизлияние
- Г. Недоношенность
- Д. Пороки челюстно-лицевой области

Проведение цистоскопии у детей в экстренном порядке показано при:

- А. Почечной колике
- Б. Острой задержке мочи
- В. Макрогематурии
- Г. Анурии

Для купирования гипогликемии показано введение:

- А. Раствор глюкозы 5% из расчета 10 мл/кг внутривенно струйно
- Б. Раствор глюкозы 10% из расчета 5 мл/кг внутривенно струйно
- В. Изотонический раствор хлорида натрия из расчета 10 мл/кг внутривенно струйно
- Г. Раствор Рингера из расчета 20 мл/кг
- Д. Инфузионная терапия не показана

Наличие каких заболеваний позволяет выявить неонатальный скрининг:

- 1. Фенилкетонурия
- 2. Галактоземия
- 3. Целиакия
- 4. Гипотериоз
- 5. Муковисцидоз

- А. 1,2,3,4
- Б. 1,2,4
- В. 1,2,4,5
- Г. 1,2,3

Селективность протеинурии определяют для оценки состояния:

- А. Петли Генле
- Б. Дистальных канальцев
- В. Мембраны клубочков
- Г. Нефрона
- Д. Проксимальных канальцев

У доношенного ребенка, который хорошо берет грудь, имеет небольшую потерю массы тела, розовые кожные покровы, на 3-й день жизни появилась иктеричность кожи.

Укажите наиболее вероятную причину желтухи.

- А. Гемолитическая болезнь новорожденных
- Б. Транзиторная (физиологическая) желтуха
- В. Врожденный гепатит
- Г. Каротиновая пигментация из-за употребления матерью моркови
- Д. Атрезия желчных путей

К симптомам нарушения функции канальцев не относится:

- А. Снижение концентрационной функции почек
- Б. Аминоацидурия
- В. Глюкозурия
- Г. Гипергликемия
- Д. Метаболический ацидоз

Укажите основную группу лекарственных средств для лечения обструктивного бронхита у детей:

- А. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- Б. Бронходилататоры
- В. Муколитики
- Г. Аминопенициллины
- Д. Макролиды

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Дайте характеристику элементам кожной сыпи.

- 1. Эритема
 - 2. Петехии
 - 3. Экхимозы
 - 4. Папула
 - 5. Пузырёк
 - А. Сине-фиолетового цвета, неправильной формы
 - Б. Первичный, выступающий над уровнем кожи, образуется при скоплении воспалительного инфильтрата в коже
 - В. Полостной, расположен поверхностно, заполнен серозным или кровянистым содержимым
 - Г. Участки гиперемизированной кожи
 - Д. Невоспалительные пятна, размером 1-2 мм
- А. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В
 - Б. 1Г, 2А, 3Д, 4Б, 5В
 - В. 1А, 2Д, 3А, 4В, 5Б
 - Г. 1Г, 2Б, 3В, 4А, 5Д

Для синдрома острой почечной недостаточности (стадия олигоанурии) характерно:

- 1. Ацидоз
- 2. Азотемия
- 3. Гиперкалиемия
- 4. Гипопротеинемия
- 5. Гипогликемия
- А. 1,2,3,4,5
- Б. 1,2,3,4
- В. 1,2,3
- Г. 1,2,4

Для купирования анафилактического шока используют:

- 1. Адреналин**
- 2. Преднизолон**
- 3. Атропин**
- 4. Раствор хлорида натрия 0,9%**
- 5. Раствор глюкозы 5%**

- А. 1,2,3
Б. 1,2,4
В. 1,2,3,4
Г. 1,2,5

Какой из растворов наиболее эффективен для оральной регидратации у детей с острой диареей?

- А. Раствор Рингера
Б. Раствор для оральной регидратации
В. 5% раствор глюкозы
Г. Боржоми
Д. Энтеродез

Доза для внутримышечного введения адреналина ребенку 3-х лет с анафилактической реакцией составляет:

- А. 0,1 мг
Б. 0,15 мг
В. 0,3 мг
Г. 0,5 мг
Д. 1 мг

При гипергликемии (глюкоза в крови > 15 ммоль/л) показано внутривенное струйное введение инсулина короткого действия в дозе:

- А. 0,1 Ед/кг
Б. 1,0 Ед/кг
В. 0,5 Ед/кг
Г. 0,75 Ед/кг

Ребенок 1 года поступил в стационар с выраженной интоксикацией, одышкой смешанного характера, температурой 39*С. при перкуссии определяется коробочный оттенок перкуторного звука. Выслушиваются непостоянные сухие хрипы, справа под углом лопатки - стойкие мелкопузырчатые хрипы. Ваш предварительный диагноз:

- А. Пневмония
Б. Острый бронхит
В. Инородное тело бронха
Г. Острый бронхиолит

При проведении сердечно-легочной реанимации детям частота компрессий грудной клетки в минуту составляет:

- А. 60
- Б. 80
- В. 100
- Г. 120

При муковисцидозе нарушается транспорт:

- А. Цинка
- Б. Брома и натрия
- В. Железа и натрия
- Г. Хлора и натрия
- Д. Водорода

Какая частота сердечных сокращений в покое свидетельствует о брадикардии у детей 7-9 лет:

- А. Менее 100 ударов в минуту
- Б. Менее 80 ударов в минуту
- В. Менее 60 ударов в минуту
- Г. Менее 40 ударов в минуту

Итоговая оценка состояния здоровья ребенка при проведении диспансеризации является функцией:

- А. Врачей-специалистов
- Б. Участкового педиатра
- В. Заотделением детской поликлиники

Для коклюша у детей характерны:

1. Грубый лающий кашель
2. Приступообразный кашель с репризами
3. Кашель до рвоты
4. Дистанционные хрипы
5. Сухие свистящие хрипы на выдохе

- А. 1,2,3
- Б. 1,4,5
- В. 2,3
- Г. 4,5

Какие жаропонижающие средства безопасны для применения в детском возрасте?

- 1. Ибупрофен**
- 2. Ацетилсалициловая кислота**
- 3. Парацетамол**
- 4. Комбинация парацетамола с ибупрофеном**
- 5. Нимесулид**

А. 1,3,4,5

Б. 1,3,4

В. 1,2,3,4

Г. 1,3

Деятельность детских амбулаторно-поликлинических учреждений включает:

А. Лечебно-диагностическую работу

Б. Медико-социальную экспертизу

В. Экспертизу стойкой нетрудоспособности

Какой из признаков наиболее значим для верификации диагноза пневмонии у ребенка:

А. Лихорадка более 3-х дней

Б. Локальные физикальные изменения в легких

В. Нейтрофильный лейкоцитоз в клиническом анализе крови

Г. Консолидация легочной ткани на рентгенограмме легких

Д. Выраженная дыхательная недостаточность

Укажите симптомы, характерные для инфекции, вызванной парвовирусом В19:

1. Артралгии

2. Симптом «нашлёпанных» щёк

3. Нейтрофильный лейкоцитоз

4. Инфекционная эритема

5. Апластическая анемия

А. 1,2,3

Б. 1,2,4,5

В. 2,4

Г. 2,3,4,5

Для решения вопроса о проведении заменного переливания крови при гемолитической болезни новорожденных в первые двое суток жизни ориентируются в первую очередь на:

А. Абсолютные цифры билирубина в пуповинной крови

Б. Уровень билирубина в периферической крови

В. Почасовой прирост билирубина

Г. Появление желтухи в первые часы жизни

Д. Тяжелая анемия с рождения

У ребенка 1,5 лет фебрильная температура, грубый лающий кашель, стридор, осиплость голоса, гиперсаливация, тризм. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Обструктивный ларинготрахеит
- Б. Эпиглоттит
- В. Обструктивный бронхит
- Г. Бронхиолит
- Д. Ларингит

Для стрептококкового тонзиллита характерно все нижеперечисленное, кроме:

- А. Лихорадка и боль в горле
- Б. Яркая гиперемия задней стенки глотки (
- В. Симптомы интоксикации
- Г. Возраст пациентов до 3-х лет
- Д. Эффективность амоксициллина

У новорожденного в возрасте одних суток жизни отмечено появление желтухи. Кровь матери В(III) группы, резус-отрицательная, ребенка – АВ (IV) группы, резус положительная. Наиболее вероятный диагноз?

- А. Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-несовместимости
- Б. Гемолитическая болезнь новорожденного по АВО-системе
- В. Гемолитическая болезнь новорожденного по резус- и АВО-несовместимости
- Г. Транзиторная желтуха новорожденных
- Д. Ни один из перечисленных выше

Укажите препарат выбора для лечения скарлатины:

- А. Амоксициллин
- Б. Амоксициллин + клавулановая кислота
- В. Котримоксазол
- Г. Азитромицин
- Д. Цефтриаксон

Микроцитоз эритроцитов может встречаться при следующих заболеваниях:

- А. Железобдефицитная анемия
- Б. Талассемия
- В. Анемия при хронических заболеваниях
- Г. При всех указанных состояниях

Симптом, позволяющий заподозрить инвазивный характер диареи при кишечной инфекции:

- А. Лихорадка
- Б. Рвота
- В. Водянистый стул
- Г. Кровь в стуле

С чего следует начинать оценку состояния пациента по алгоритму ABCDE, если он без сознания:

- А. Оценить проходимость дыхательных путей
- Б. Оценить тяжесть дыхательной недостаточности
- В. Оценить наличие нарушений микроциркуляции
- Г. Оценить степень обезвоживания
- Д. Измерить температуру тела

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие изменений гемодинамики и характера врожденного порока сердца:

1. Дефект межжелудочковой перегородки
 2. Открытый артериальный проток
 3. Изолированный стеноз легочной артерии
 4. Тетрада Фалло
 5. Коарктация аорты
- А. Нецианотический с обогащением малого круга кровообращения
 - Б. Цианотический с обогащением малого круга кровообращения
 - В. Нецианотический с обеднением малого круга кровообращения
 - Г. Цианотический с обеднением малого круга кровообращения
 - Д. Нецианотический с обеднением большого круга кровообращения
- А. 1А, 2А, 3В, 4Г, 5Д
Б. 1Б, 2А, 3В, 4Д, 5Г
В. 1Г, 2А, 3В, 4Д, 5В

Укажите факторы риска рахита, связанного с дефицитом витамина D:

1. Грудное вскармливание
 2. Недостаточная инсоляция
 3. Безмолочная диета у ребенка
 4. Вегетарианство
 5. Синдром мальабсорбции
- А. 1,2,4,5
Б. 1,2,3,4,5
В. 2,4,5

Истинный круп развивается при:

- А. РС-инфекции
- Б. Парагриппе
- В. Аденовирусной инфекции
- Г. Стрептококковой ангине
- Д. Дифтерии

Для какого порока сердца характерна артериальная гипертензия:

- А. Тетрада Фалло
- Б. Дефект межжелудочковой перегородки
- В. Открытый артериальный проток
- Г. Коарктация аорты
- Д. Стеноз легочной артерии

Для коклюша характерным изменением в лабораторных анализах является:

- А. Нейтрофильный лейкоцитоз
- Б. Лимфоцитарный лейкоцитоз
- В. Тромбоцитоз
- Г. Лейкопения
- Д. Наличие атипичных мононуклеаров

Укажите препарат первого выбора для лечения острого среднего гнойного отита у детей:

- А. Азитромицин
- Б. Кларитромицин
- В. Амоксициллин + клавулановая кислота
- Г. Цефиксим
- Д. Цефтриаксон

Основная причина высокой концентрации билирубина у новорожденных от матерей, страдающих сахарным диабетом:

- А. Гемолиз эритроцитов
- Б. Запоздывание созревания глюкуронилтрансферазы
- В. Внепеченочная обструкция желчевыводящих путей
- Г. Внутрпеченочная обструкция желчевыводящих путей
- Д. Нарушение захвата билирубина печеночной клеткой

Возможные осложнения при остром стрептококковом тонзиллите (ангине):

1. Острый гломерулонефрит
2. Менингоэнцефалит
3. Паратонзиллярный абсцесс
4. Гепатит
5. Ревматическая лихорадка

А. 1,3,5

Б. 1,2,3,5

В. 2,4

Г. 1,5

У ребенка 8 мес диагностирован обструктивный бронхит, дыхательная недостаточность. При каком уровне насыщения крови кислородом следует начать кислородотерапию:

1. < 95%

2. < 92%

3. < 88%

4. < 80%

А. 1,2,3,4

Б. 2,3,4

В. 3,4

Г. 4

Суточное мониторирование артериального давления позволяет:

А. Исключить гипертензию «белого халата»

Б. Оценить тяжесть артериальной гипертензии

В. Оценить длительность артериальной гипертензии в течение суток

Г. Оценить эффективность терапии

Д. все перечисленное верно

Основным симптомом синдрома укороченного интервала PQ является:

А. Головная боль

Б. Приступы тахикардии

В. Артериальная гипертензия

Г. Энурез

Д. Эпизоды брадикардии

На консультацию к невропатологу направлен мальчик семи лет с остро развившейся мышечной слабостью и нарушением походки. Невропатолог обнаружил у ребенка признаки дистрофии, параорбитальный отек и гиперемию, гнусавый оттенок голоса, поперхивание, отек и плотность мышц плечевого пояса и бедер. Мальчик не мог поднять руки, сесть из положения лежа, выполнить приседание. Симптомы поражения центральной и периферической нервной системы не выявлены. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Системную красную волчанку
- Б. Системную склеродермию
- В. Гранулематоз Вегенера
- Г. Дерматомиозит
- Д. Смешанное заболевание соединительной ткани

Стойкое повышение артериального давления в детском возрасте наиболее часто связано с:

- А. Эссенциальной артериальной гипертензией
- Б. Ожирением
- В. Системными заболеваниями соединительной ткани
- Г. Патологией мочевыделительной системы

Нефритический синдром характерен для следующих болезней:

- А. Синдром Альпорта
- Б. Геморрагический васкулит
- В. Болезнь тонких базальных мембран
- Г. IgA-нефропатия
- Д. Все перечисленное верно

К лекарственным препаратам, используемым для достижения контроля бронхиальной астмы относят:

1. Бета2-агонисты короткого действия
2. Иммуномодуляторы
3. Ингаляционные холинолитики
4. Ингаляционные глюкокортикостероиды
5. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов

- А. 1,2,3
- Б. 2,4,5
- В. 4,5
- Г. 1,3,4,5

Основным триггером обострения бронхиальной астмы в раннем возрасте является:

- А. Пыльца деревьев
- Б. Прием нестероидных противовоспалительных средств
- В. Эпидермис животных
- Г. Вирусная инфекция
- Д. Физическая нагрузка

Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье подростков:

- А. Генетические
- Б. Наличие вредных привычек
- В. Все варианты

Наиболее эффективная форма работы детской поликлиники по формированию здоровья ребенка в возрасте до 3-х лет:

- А. Чтение лекций
- Б. Анкетирование родителей
- В. Патронаж

Укажите препарат выбора для лечения скарлатины:

- А. Котримоксазол
- Б. Амоксициллин
- В. Амоксициллин + клавулановая кислота
- Г. Азитромицин
- Д. Цефтриаксон

Укажите наиболее часто встречающийся этиологический фактор инфекции мочевой системы у детей:

- А. Золотистый стафилококк
- Б. Протей
- В. Синегнойная палочка
- Г. Бета-гемолитический стрептококк группы А
- Д. Кишечная палочка

Какие заболевания входят в неонатальный скрининг с 2006 г.?

- А. Фенилкетонурия
- Б. Фенилкетонурия, гипотиреоз
- В. Фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия
- Г. Фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия, муковисцидоз
- Д. Фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром.

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие физикальных изменений различным нозологическим формам:

1. Гипертрофия и дилатация левого желудочка сердца
2. Гипертрофия и дилатация правого желудочка сердца

3. Миокардит

4. Ателектаз правого легкого

5. Экссудативный перикардит

А. Ослабление верхушечного толчка

Б. Смещение верхушечного толчка вправо

В. Усиление верхушечного толчка

Г. Появление выраженного сердечного толчка

А. 1В, 2Г, 3А, 4Б, 5Б

Б. 1Г, 2В, 3В, 4Б, 5А

В. 1В, 2В, 3Г, 4А, 5Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между показателями психомоторного развития и возрастом ребенка :

1. Узнает мать, поворачивает голову на звук, направленные движения ручек, переворачивается со спины на живот

2. Следит за человеком, движущимися предметами, поворачивает голову, начинает улыбаться

3. Самостоятельно сидит, произносит 8-10 осмысленных слов, сам берет чашку и пьет

4. Знает свое имя, шагает при поддержке за обе руки, находит и достает предмет из множества игрушек

5. Ползает, легко садится, подолгу лепечет, пьет из чашки, которую держит взрослый

А. 1 месяц

Б. 4 месяца

В. 7 месяцев

Г. 9 месяцев

Д. 12 месяцев

А. 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В

Б. 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В

В. 1А, 2Б, 3Д, 4Г, 5В

Выберите наиболее часто встречающегося возбудителя гнойного менингита у новорожденного ребенка:

А. Гемофильная палочка

Б. Пневмококк

В. Гемолитический стрептококк (str. Agalactiae)

Г. Менингококк

Врач-педиатр вызван экстренно в процедурный кабинет поликлиники к ребенку 7 лет с жалобами на высыпания по всему телу с зудом, затрудненное дыхание, кашель, першение в горле, головокружение, резкая слабость. До появления жалоб была выполнена внутримышечная инъекция 1 г цефтриаксона, разведенного в 3,5 мл 1% лидокаина, в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы глубоко.

Предположительный диагноз:

- А. Анафилактический шок
- Б. Острая крапивница
- В. Синдром токсического шока
- Г. Острая сердечно-сосудистая недостаточность

Для аллергической крапивницы характерен ____ тип аллергической реакции

- А. Немедленный
- Б. Замедленный
- В. Цитотоксический
- Г. Иммунокомплексный

Датой установления инвалидности является

- А. Следующий день после регистрации документов в бюро
- Б. Дата регистрации документов в бюро МСЭ
- В. Дата непосредственного освидетельствования
- Г. Дата открытия больничного листа

Для диагностики гемофилии информативным является определение

- А. Количества D-димеров
- Б. Длительности кровотечения
- В. Уровня плазминогена в плазме
- Г. Времени свёртываемости

При анафилактическом шоке парентеральное введение лекарственных препаратов группы системных глюкокортикостероидов должно быть выполнено с момента установления диагноза не позднее (в минутах)

- А. 10
- Б. 3
- В. 5
- Г. 15

Болезнь вильсона развивается вследствие избыточного накопления в организме

- А. Железа
- Б. Меди
- В. Цинка
- Г. Кальция

Основным путем распространения вируса из спинальных ганглиев при опоясывающем герпесе является

- А. Неврогенный
- Б. Лимфогенный
- В. Воздушно-капельный
- Г. Гематогенный

У здорового ребёнка пальпируются лимфоузлы в количестве до _____ групп

- А. 2
- Б. 4
- В. 5
- Г. 3

Дизентерия по механизму развития диарейного синдрома (согласно классификации ВОЗ) относится к диарее

- А. Смешанной
- Б. Осмотической
- В. Инвазивной
- Г. Секреторной

У больного опоясывающим герпесом заразный период заканчивается на _____ высыпаний

- А. 10 День от начала
- Б. 5 День от момента окончания
- В. 5 День от начала
- Г. 21 День от начала

Для диагностики нарушения диастолической функции сердца наиболее информативным исследованием является

- А. Электрокардиография
- Б. Рентгенография сердца
- В. Электромиография
- Г. Допплерэхокардиография

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью _____ помощи

- А. Первичной медико-санитарной
- Б. Паллиативной
- В. Скорой
- Г. Специализированной

Наиболее типичным вариантом экзантемы при скарлатине является

- А. Пятнисто-папулезная
- Б. Везикулезная
- В. Буллезная
- Г. Розеолезно-папулезная

Суммарная оценка 3 балла по шкале комы Глазго соответствует

- А. Сопору
- Б. Глубокой коме
- В. Ясному сознанию
- Г. Смерти мозга

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) характеризуется

- А. Обнаружением частицы клеточных мембран возбудителей
- Б. Детекцией ДНК живого и погибшего возбудителя
- В. Диагностикой условно-патогенной флоры
- Г. Низкой специфичностью

Для больных гипотиреозом характерно наличие

- А. Диареи
- Б. Аритмии
- В. Запора
- Г. Артериальной гипертензии

В органах и тканях при туберкулезе образуются

- А. Везикулы
- Б. Пустулы
- В. Эрозии
- Г. Бугорки

Фактором, который в большей степени определяет клиническую картину при внутриутробных инфекциях, является

- А. Срок внутриутробного поражения
- Б. Путь проникновения инфекции
- В. Состояние реактивности организма плода
- Г. Токсичность возбудителя

Левая граница относительной сердечной тупости по отношению к срединно-ключичной линии у детей 6 лет находится

- А. На 1 см кнаружи
- Б. На 2 см кнутри
- В. На 1 см кнаружи
- Г. На 2 см кнаружи

Ребенку 3 месяцев с атопическим дерматитом и аллергией на белки коровьего молока, находящемуся на грудном вскармливании, следует рекомендовать

- А. Смесь на основе частичногидролизованного молочного белка
- Б. Смесь на основе высокогидролизованного молочного белка
- В. Адаптированную молочную смесь с пребиотиками
- Г. Грудное молоко и соблюдение мамой безмолочной диеты

Для базисной терапии персистирующей астмы у детей применяют

- А. Пролонгированные β -адреномиметики (монотерапия)
- Б. Короткодействующие β -адреномиметики
- В. Ингаляционные глюкокортикостероиды
- Г. Ксантины

К территориям, неблагополучным по гепатиту а, относятся страны

- А. Австралии и Новой Зеландии
- Б. Юго-Восточной Азии, Африки
- В. Европы
- Г. Центральной Америки

Назначение у детей с лихорадкой ацетисалициловой кислоты (аспирина) противопоказано из-за

- А. Опасности развития синдрома Рея
- Б. Частых аллергических реакций
- В. Опасности развития агранулоцитоза
- Г. Частых диспептических нарушений

Суточная потребность в жирах ребенка в возрасте 4-6 месяцев составляет _____ г/кг/сутки

- А. 6
- Б. 7
- В. 8
- Г. 6,5

Для специфической профилактики коклюша используется

- А. Сыворотка реконвалесцента
- Б. АД-анатоксин
- В. АКДС-вакцина
- Г. АДС-М-анатоксин

Ребёнок с железодефицитной анемией средней степени тяжести относится к _____ группе здоровья

- А. III
- Б. IV
- В. I
- Г. V

Лимфоцитурия наиболее характерна для

- А. Почечной недостаточности
- Б. Гломерулонефрита
- В. Цистита
- Г. Пиелонефрита

Клинические проявления целиакии манифестируют после введения в рацион ребёнка _____ каши

- А. Гречневой
- Б. Овсяной
- В. Рисовой
- Г. Кукурузной

Лимфаденопатия при инфекционном мононуклеозе

- А. Генерализованная, с первых дней болезни до периода реконвалесценции
- Б. Генерализованная, с конца первой недели, сохраняется в течение нескольких месяцев
- В. Локализованная (любая группа лимфоузлов), продолжается весь лихорадочный период
- Г. Локализованная (шейная, подчелюстная), с первых дней болезни и до конца 2 недели заболевания

Типичным вариантом стула при энтеровирусной диарее является

- А. Жидкий, водянистый, с небольшим количеством слизи
- Б. Кашицеобразный, ярко-оранжевого цвета
- В. Скудный, с примесью зелени и крови
- Г. Ярко-оранжевый, брызжущий, непереваренный

Препаратом, который замедляет пассаж по тонкой кишке, является

- А. Вазелиновое масло
- Б. Панкреатин
- В. Лоперамид
- Г. Бетаин+пепсин

Причиной гипоосмолярной дегидратации является потеря жидкости

- А. Из желудочно-кишечного тракта
- Б. При гипервентиляции (тахипноэ)
- В. При кровопотере
- Г. При ожогах

В рационе детей второго полугодия жизни дефицит белков корректируется

- А. Сахарным сиропом
- Б. Сливками 10%
- В. Творогом
- Г. Подсолнечным маслом

Величина r_q , характеризующая замедление атриовентрикулярной проводимости у детей школьного возраста, равна

- А. 0,18
- Б. 0,14
- В. 0,16
- Г. 0,20

Для лечения желудочковой тахикардии нельзя использовать

- А. Дигоксин
- Б. Амiodарон
- В. Прокаинамид
- Г. Лидокаин

Самой частой причиной остановки сердца у детей является

- А. Артериальная гипертензия
- Б. Нарушение сердечного ритма
- В. Гипоксемия
- Г. Артериальная гипотензия

Наиболее неблагоприятное влияние на внутриутробное развитие плода в первые 2 месяца беременности оказывает

- А. Вирусная инфекция
- Б. Токсикоз беременности
- В. Повышенная физическая нагрузка
- Г. Неправильное питание

К вторичным иммунодефицитным состояниям относятся

- А. Инфекции (ВИЧ, ВЭБ, ЦМВ)
- Б. Дефекты системы фагоцитоза
- В. Дефекты системы комплемента
- Г. Аутовоспалительные заболевания

Сезонный характер коклюша выражен небольшим ростом заболеваемости в _____ период

- А. Весенне-летний
- Б. Осенне-зимний
- В. Зимний
- Г. Осенний

Альвеолоциты II порядка выполняют функцию синтеза

- А. Сурфактанта
- Б. Слизи
- В. Простагландинов
- Г. IgA

Число кругов кровообращения у плода

- А. 1
- Б. 4
- В. 3
- Г. 2

Этиология моногенных форм ожирения состоит в

- А. Наличии опухоли гипоталамуса
- Б. Сниженной функции щитовидной железы
- В. Мутации генов, контролирующих синтез анорексигенных пептидов
- Г. Низкой физической активности

Частота осмотра врачом-педиатром участковым при диспансерном наблюдении ребёнка с врождённым пороком сердца на первом месяце жизни составляет _____ раз (раза)

- А. 1
- Б. 3
- В. 4
- Г. 2

Высота стридора помогает определить характеристику обструкции в виде

- А. Фазы
- Б. Выраженности
- В. Степени
- Г. Уровня

Среди блокаторов кальциевых каналов у детей разрешён к применению в качестве гипотензивного

- А. Лацидипин
- Б. Амлодипин
- В. Верапамил
- Г. Нифедипин

«Первый перекрест» содержания лимфоцитов и нейтрофилов в периферической крови наблюдается в возрасте (в днях)

- А. 9-10
- Б. 2-3
- В. 15-16
- Г. 4-5

Этиология острого (простого) бронхита чаще всего

- А. Микоплазменная
- Б. Вирусная
- В. Хламидийная
- Г. Бактериальная

Для выявления уровня жидкости в полости плевры необходимо, в первую очередь, провести

- А. Рентгенографию лёгких в вертикальном положении
- Б. Латерографию
- В. Плевральную пункцию
- Г. Томографию лёгких в вертикальном положении

Препаратом первой линии в терапии анафилактического шока является

- А. Допамин
- Б. Атропин
- В. Эпинефрин
- Г. Фенилэфрин

Белково-энергетическая недостаточность имеет _____ степени/степеней

- А. 4
- Б. 3
- В. 6
- Г. 2

Созревание лёгких плода ускоряет

- А. Дексаметазон
- Б. Эуфиллин
- В. Гинипрал
- Г. Партусистен

К основным принципам диетотерапии при дисфункции билиарного тракта по гиперкинетическому типу относят

- А. Ограничение животных и растительных жиров
- Б. Ограничение объема белка
- В. Увеличение животных и растительных жиров
- Г. Увеличение объема грубой клетчатки

Основным УЗИ критерием обострения хронического бескаменного холецистита считается

- А. Увеличение желчного пузыря в размерах
- Б. Утолщение стенки желчного пузыря
- В. Деформация желчного пузыря
- Г. Признак застоя желчи

Показанием к проведению колоноскопии является наличие

- А. Атонического запора
- Б. Спастического запора
- В. Повторных кишечных кровотечений
- Г. Болей по ходу толстого кишечника

Для выявления билиарной недостаточности наиболее информативным методом является

- А. Копрологический анализ кала
- Б. Динамическая гепатобилисцинтиграфия
- В. Биохимическое исследование крови
- Г. УЗИ органов брюшной полости

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимается на (в годах)

- А. 2
- Б. 1
- В. 4
- Г. 3

Потребность в белке доношенного ребёнка второго полугодия жизни при естественном вскармливании составляет (в г/кг)

- А. 1,5-2,0
- Б. 2,6-2,9
- В. 2,2-2,5
- Г. 3,0-3,5

Препаратом, применяемым при проведении базисной терапии бронхиальной астмы у детей, является

- А. Аминофиллин
- Б. Сальбутамол
- В. Фенотерол
- Г. Флутиказон

Рентгенологическая картина сердца в виде «деревянного башмачка» характерна для

- А. Транспозиции магистральных артерий
- Б. Тетрады Фалло
- В. Тотального аномального дренажа легочных вен
- Г. Открытого атриовентрикулярного канала

Клиническим симптомом, характерным для ларингомаляции, является

- А. Экспираторная одышка
- Б. Врожденный стридор
- В. Инспираторная одышка
- Г. Упорный навязчивый кашель

Причиной экспираторной одышки является

- А. Вирусный фарингит
- Б. Стенозирующий ларингит
- В. Бронхиальная обструкция
- Г. Долевая пневмония

Ведущую роль в лечении функциональных запоров у детей раннего возраста выполняет

- А. Фитотерапия
- Б. Лекарственная терапия
- В. Физиотерапия
- Г. Нормализация режима и диеты

У ребенка 2 лет с грубой варусной деформацией ног, отставанием в росте, гипофосфатемией, фосфатурией необходимо заподозрить

- А. Болезнь де-Тони-Дебре-Фанкони
- Б. Витамин-Д-зависимый рахит
- В. Витамин-Д-резистентный рахит
- Г. Почечный тубулярный ацидоз

Дегтеобразный стул появляется при повреждении

- А. Слепой кишки
- Б. Сигмовидной кишки
- В. Верхних отделов пищеварительного тракта
- Г. Прямой кишки

Карпопедальный спазм является характерным симптомом

- А. Эписиндрома
- Б. Гипокальциемии
- В. Гипофосфатемии
- Г. Фебрильных судорог

К методу, подтверждающему диагноз «целиакия», относят

- А. Биопсию слизистой оболочки тонкой кишки
- Б. Определение антител к клеткам желудка в крови
- В. Биопсию слизистой оболочки толстой кишки
- Г. Определение антистрептококковых антител в крови

Здоровому ребенку в возрасте 3 месяцев проводится вакцинация против

- А. Туберкулеза, полиомиелита, гемофильной инфекции
- Б. Дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции
- В. Гепатита В, полиомиелита, гемофильной инфекции
- Г. Кори, краснухи, эпидемического паротита

Показателем, наиболее точно отражающим состояние здравоохранения в стране, является

- А. Младенческая смертность
- Б. Уровень смертности
- В. Уровень рождаемости
- Г. Количество врачей на душу населения

При холангите характерными симптомами являются

- А. Приступы рвоты непереваренной пищей
- Б. Периодические ознобы
- В. Изжога, боли за грудиной
- Г. Тошноты

Длинноцепочечные жирные кислоты и моноглицериды всасываются

- А. В кровь
- Б. С предварительным эмульгированием желчными кислотами
- В. Без эмульгирования
- Г. Без ресинтеза в кишечной стенке

Первая вакцинация против гепатита В проводится в возрасте (в днях)

- А. 21
- Б. 14
- В. 1
- Г. 30

Наиболее часто злокачественные опухоли лор-органов у детей локализируются в

- А. Гортани и гортаноглотке
- Б. Ротоглотке
- В. Полости уха
- Г. Полости носа и околоносовых пазухах

Констриктивный перикардит чаще развивается при

- А. Грибковой инфекции
- Б. Туберкулезе
- В. Неопластическом процессе
- Г. Вирусной инфекции

У детей с недостаточностью соматотропного гормона (стг) наблюдают

- А. Горбинку на переносице
- Б. Макрогнатию
- В. Кукольное лицо
- Г. Низкое расположение ушей

Ахалазия кардии сопровождается

- А. Срыгиванием через 1 час после еды
- Б. Рвотой переваренной пищей
- В. Рвотой непереваренной пищей
- Г. Рвотой с примесью желчи

Энтеровирусная инфекция может осложниться у новорожденных

- А. Пиелонефритом и циститом
- Б. Серозным менингитом и миокардитом
- В. Отоанtritом и мастоидитом
- Г. Пневмонией и бронхитом

Диарея в первые недели жизни характерна при

- А. Дефиците энтерокиназы
- Б. Муковисцидозе
- В. Недостаточности лактазы
- Г. Целиакии

Мерой профилактики отставания в нервно-психическом развитии ребёнка с фенилкетонурией является

- А. Соблюдение аглиадиновой диеты
- Б. Назначение лечебных смесей
- В. Заместительная энзимотерапия
- Г. Назначение безлактозных смесей

Гиперлипидемия характерна для

- А. Тубулоинтерстициального нефрита
- Б. Нефротического синдрома
- В. Нефритического синдрома
- Г. Хронического пиелонефрита

К наиболее вероятным источникам коклюшной инфекции для новорожденных детей и детей первого года жизни относят

- А. Патронажную медсестру
- Б. Детей из организованных учреждений с круглосуточным пребыванием
- В. Медицинский персонал родильных домов
- Г. Родителей и всех членов семьи

Основным проявлением первичного иммунодефицита является склонность к

- А. Инфекциям
- Б. Метаболическим болезням
- В. Аутоиммунным заболеваниям
- Г. Аллергическим заболеваниям

Здоровым детям на естественном вскармливании первый прикорм дают в возрасте не ранее (в месяцах)

- А. 4
- Б. 8
- В. 5
- Г. 7

Аускультативная картина недостаточности митрального клапана характеризуется

- А. Диастолическим шумом в V точке
- Б. Дующим систолическим шумом на верхушке
- В. Усилением I тона на верхушке
- Г. Дующим диастолическим шумом на верхушке

Ранним признаком гиповолемического шока у детей является

- А. Олигурия
- Б. Тахикардия
- В. Брадикардия
- Г. Гипотония

При шигеллезе характерен стул

- А. Скудный, с грубой слизью, патологическими примесями
- Б. Жидкий, обильный, зловонный, с примесью жира
- В. Обильный, водянистый, типа «рисового отвара»
- Г. Жидкий, пенистый, без патологических примесей

Иностранным гражданам листок нетрудоспособности может быть выдан

- А. После оперативного вмешательства
- Б. Если он является застрахованным
- В. При заболевании туберкулезом
- Г. Во всех случаях нетрудоспособности

Наиболее частой формой поражения печени при гемохроматозе является

- А. Перипортальный гепатит
- Б. Гемосидероз
- В. Жировая дистрофия
- Г. Цирроз печени

Геморрагический синдром при геморрагическом васкулите связан преимущественно с/со

- А. Дефицитом факторов свёртывания
- Б. Снижением гемоглобина
- В. Тромбоцитопенией
- Г. Патологией сосудистой стенки

Доза микронизированной суспензии будесонида при стенозированном ларинготрахеите составляет ____ мг однократно

- А. 1
- Б. 2
- В. 0,5
- Г. 1,5

Домперидон относится к

- А. Прокинетикам
- Б. Антацидам
- В. Блокаторам H₂-гистаминорецепторов
- Г. Спазмолитикам

Абсолютным противопоказанием к проведению чрескожной биопсии печени является

- А. Острый гепатит
- Б. Инфекция
- В. Коагулопатия
- Г. Гепатомегалия

Для вакцинопрофилактики у детей вирусного гепатита а используют вакцину на основе

- А. Рекомбинантного антигена
- Б. Живого ослабленного вируса
- В. Противовирусного иммуноглобулина
- Г. Инаktivированного вируса

[Вернуться в начало](#)