

Тесты с вопросами по специальности «Профпатология» для аттестации 1 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/profpatolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Профпатология» для аккредитации и других экзаменов (1900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/profpatologiya/

2) Тесты для аккредитации «Гигиена труда» (800 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/gigiena_truda/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Наиболее информативным методом для выявления нейросенсорной тугоухости при проведении ПМО является является:

- А. отоскопическое обследование
- Б. исследование шепотной речи
- В. исследование вестибулярного аппарата
- Г. аудиометрия
- Д. исследование разговорной речи

Для интоксикации свинцом и его соединениями характерным изменением в крови является

- А. снижение уровня сывороточного железа
- Б. лейкопения
- В. повышение уровня протопорфирина эритроцитов
- Г. снижение уровня аминолевулиновой кислоты
- Д. все перечисленное

Основными клиническими проявлениями острого отравления органическими растворителями являются

- А. боли в грудной клетке
- Б. психомоторное возбуждение, вестибулярные нарушения, тошнота и рвота
- В. боли и онемение конечностей
- Г. схваткообразные боли в животе
- Д. все перечисленное

Дифференциально-диагностическими признаками профессиональной нейросенсорной тугоухости являются все перечисленные, кроме:

- А. раннего повышения порогов слуха на частоте 4000 Гц
- Б. постепенного развития
- В. одностороннего поражения слуха
- Г. двустороннего поражения слуха
- Д. медленно прогрессирующего течения

Клинические проявления острого отравления пестицидами определяются

- А. химическим составом, способом поступления в организм работника, характером и механизмом действия, классом опасности
- Б. химическим составом и агрегатным состоянием
- В. способом поступления в организм работника и депонирования
- Г. классом химической опасности
- Д. ничем из перечисленного

Для диагностики вибрационной болезни используются методы исследования

- А. кожная термометрия, холодовая проба, паллестезиометрия
- Б. кожная термометрия, холодовая проба, паллестезиометрия, реовазография, электронейромиография
- В. бодиплетизмография, эхокардиография, бронхоскопия
- Г. кожная термометрия, холодовая проба, паллестезиометрия, реовазография, электронейромиография, альгезиметрия
- Д. все перечисленное

В обязательный перечень документов при проведении экспертизы связи заболевания с профессией входят

- А. результаты обязательных предварительного и периодических медицинских осмотров
- Б. копия трудовой книжки
- В. санитарно-гигиеническая характеристика условий труда
- Г. выписка из медицинской карты больного, получающего помощь в амбулаторных условиях
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями острого отравления несимметричным диметилгидразином, продуктами его синтеза и разложения не являются

- А. острая нефропатия, токсическая анемия
- Б. острый токсический гепатит, острый эрозивный гастрит, острый ларинготрахеобронхит, токсическая кома, ожоги кожи
- В. острый токсический гепатит, острый эрозивный гастрит, острый ларинготрахеобронхит, токсическая энцефалопатия, ожоги кожи
- Г. острый токсический гепатит, острый эрозивный гастрит, острый ларинготрахеобронхит, токсическая энцефалопатия, острая сердечно-сосудистая недостаточность
- Д. все перечисленное

Профессиональными заболеваниями верхних дыхательных путей, вызванных производственными аллергенами, являются

- А. аллергический ринит, аллергический синусит, аллергический фарингит, аллергический ларингит, отек Квинке
- Б. субатрофический ринит, хронический фарингит, хронический ларингит
- В. хронический синусит, хронический фарингит
- Г. хронический фарингит, хронический ларингит
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации оловом и его соединениями характерно все перечисленное, кроме

- А. токсический гепатит, токсическая нефропатия, токсический бронхит
- Б. хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмокониоз, токсический гепатит
- В. хронический бронхит, повторные литейные лихорадки, хроническая обструктивная болезнь легких
- Г. повторные литейные лихорадки, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмокониоз
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации дисульфидом углерода не характерны

- А. генерализованное тревожное расстройство
- Б. токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, генерализованное тревожное расстройство
- В. хронический гепатит, хронический бронхит
- Г. вегетативная дисфункция, токсическая полинейропатия
- Д. все перечисленное

Носительством ртути, свинца и других металлов считают

- А. повышение их содержания в биологических средах при отсутствии клинических признаков интоксикации
- Б. повышение их содержания в биологических средах при наличии отдельных клинических признаков интоксикации
- В. Содержание их в биологических средах в пределах референтных значений при отсутствии клинических признаков интоксикации
- Г. содержание их в биологических средах в пределах референтных значений при наличии отдельных клинических признаков интоксикации
- Д. все перечисленное

Профессиональную этиологию бронхиальной астмы исключают

- А. положительные тесты с бактериальными и пылевыми аллергенами
- Б. отрицательные тесты с бронхолитиками при спирометрии
- В. отрицательные тесты с профессиональными аллергенами
- Г. отрицательные результаты лабораторных иммунологических тестов с профессиональными аллергенами
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями хронического пылевого бронхита умеренной степени являются

- А. анемия, астенический синдром, астматический синдром
- Б. лейкопения, астматический синдром, вегетативная дисфункция
- В. анемия, инфекционно-воспалительный синдром, обструктивная эмфизема
- Г. астматический, обструктивная эмфизема, инфекционно-воспалительный
- Д. лейкопения, гипоксемия, эмфизема

Наиболее характерными для флюороза являются все перечисленные жалобы, кроме

- А. болей в костях
- Б. диспепсических расстройств
- В. резей при мочеиспускании
- Г. кашля
- Д. слабости, недомогания

К основным синдромам вибрационной болезни, связанной с воздействием общей вибрации относятся

- А. полинейропатия верхних и нижних конечностей с сенсорными нарушениями
- Б. синдром мультифокальной энцефалопатии
- В. синдром паркинсонизма
- Г. полинейропатия верхних и нижних конечностей с сенсорными и вегето-трофическими нарушениями
- Д. полинейропатия верхних конечностей с сенсорными нарушениями в сочетании с пояснично-крестцовой радикулопатией

Клиническими проявлениями острого отравления растворимыми соединениями бериллия являются

- А. острый гастрит, острый гепатит, острый токсический бронхит
- Б. острый гепатит, острый ринит, острый конъюнктивит, острый токсический бронхит
- В. острый токсический ринит и ларингит, острый токсический бронхиолит, острый конъюнктивит, ожоги кожи
- Г. острый трахеит, острый ларингит, острый токсический бронхит, острый токсический гепатит
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации пестицидами не характерны

- А. токсический гастроэнтерит, токсический гепатит, токсическая энцефалопатия, токсическая нефропатия, миелополлинейропатия, токсическая кардиомиопатия, контактный дерматит
- Б. анемия, токсический гастроэнтерит, токсический гепатит, вегетативная дисфункция, полинейропатия
- В. анемия, токсический гепатит, полинейропатия, токсическая энцефалопатия
- Г. хронический ринит, хронический фарингит, хронический конъюнктивит, хронический бронхит
- Д. все перечисленное

Проявлениями острого отравления хромом и его соединениями являются

- А. острый ринит, полинейропатия, синдром раздраженного кишечника
- Б. острый ринофаринголарингит, острый токсический бронхит, острый токсический бронхиолит, токсическая пневмония, отек легких
- В. острый бронхит, астенический синдром
- Г. острый ринофаринголарингит, острый токсический бронхит, токсическая пневмония
- Д. острый гастроэнтерит, токсический гепатит

Клиническими проявлениями ранней стадии силикоза являются все, кроме

- А. сухого кашля
- Б. синдрома интоксикации
- В. одышки при незначительной физической нагрузке
- Г. болей в грудной клетке при дыхании
- Д. ослабленного жесткого дыхания в нижнебоковых отделах легких

Масляные фолликулиты чаще локализуются

- А. на местах контакта со смазочными маслами
- Б. на лице
- В. на туловище
- Г. избирательной локализации нет
- Д. все перечисленное

Синдром Рейно при вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, развивается при воздействии

- А. локальной вибрации на руки низких частот
- Б. локальной вибрации на руки разных частот
- В. локальной вибрации на руки высоких частот
- Г. общей вибрации разных частот
- Д. все перечисленное

Для развития силикоза является неверным

- А. наличие крупноузловых форм
- Б. соответствие клинических проявлений рентгенологическим изменениям
- В. длительный контакт с кварцсодержащей пылью выше ПДК
- Г. нарушение функции внешнего дыхания
- Д. наличие прикорневых лимфоузлов в виде яичной скорлупы

Клиническими проявлениями острого отравления медью и ее соединениями являются

- А. острый токсический гепатит, острый токсический бронхит, острый ринофарингит
- Б. литейная лихорадка, острый ринофарингит, токсический отек легких, острый токсический альвеолит
- В. литеная лихорадка, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, острый токсический альвеолит
- Г. литейная лихорадка, острый ринофарингит, острый токсический альвеолит, токсический отек легких
- Д. острый токсический гепатит, острый токсический бронхит, токсическая нефропатия
- Е. все перечисленное, кроме 1,5

Для развития силикоза не является характерным

- А. ранее развитие синдрома интоксикации
- Б. прогрессирующее течение
- В. симметричный пневмофиброз,
- Г. нарушение перфузионно-диффузионной способности легких
- Д. развитие легочного сердца

Клиническими проявлениями полинейропатии верхних конечностей являются

- А. ноющие боли в руках, онемение и парестезии в кистях, гипалгезия полиневритического типа, гипотермия и мраморность кистей
- Б. ноющие боли в руках, парестезии в кистях, гипалгезия полиневритического типа, мраморность кистей
- В. ноющие боли, парестезии в кистях, гипалгезия полиневритического типа, снижение вибрационной чувствительности, гипотермия и мраморность кистей
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Для диагностики свинцовой интоксикации необходимо исследовать в моче:

- А. белок
- Б. аминолевулиновую кислоту
- В. мочевую кислоту
- Г. уробилин
- Д. все перечисленное

Синдром Рейно при вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, характеризуется

- А. несимметричным побелением пальцев рук
- Б. несимметричным цианозом пальцев рук
- В. симметричным побелением пальцев рук
- Г. симметричным побелением пальцев рук и ног
- Д. генерализованным акроангиоспазмом

К физическим факторам, характеризующим состояние производственного микроклимата, относятся:

- А. температура воздуха
- Б. влажность воздуха
- В. инфракрасные излучения
- Г. скорость движения воздуха
- Д. все перечисленное

Злокачественные новообразования костей вызываются следующими производственными канцерогенами

- А. бета-нафтиламином, хромом и его соединениями, поливинилхлоридом
- Б. коксами, сажами черными промышленными, формальдегидом, дифенилами, этиленом оксидом, бензолом и его производными
- В. радиоактивными веществами с большим периодом полураспада
- Г. бета-нафтиламином, хромом и его соединениями, поливинилхлоридом, вирусами гепатита В и С
- Д. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями хронической интоксикации хромом и его соединениями не являются

- А. эрозия и перфорация носовой перегородки, хронический атрофический ринофаринголарингит, аллергический дерматит и экзема
- Б. хронический токсический бронхит, бронхиальная астма, аллергический дерматит и экзема
- В. хронический токсический гепатит, хронический ринит
- Г. хронический ринофаринголарингит, хронический токсический бронхит, пневмосклероз, аллергический дерматит
- Д. эрозия и перфорация носовой перегородки, хронический атрофический ринофаринголарингит, аллергический дерматит

По степени влияния на тепловой баланс человека микроклимат подразделяют на

- А. нагревающий
- Б. охлаждающий
- В. нейтральный
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями острого отравления фосфором и его соединениями не являются

- А. острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, острый токсический бронхит, ожоги кожи
- Б. токсическая энцефалопатия, острый токсический гепатит, острый ринит
- В. острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, ожоги кожи
- Г. острый ринит, острый фарингит, острый токсический бронхит
- Д. все перечисленное

Проявлениями острого поражения отравляющими веществами кожно-нарывного действия являются все, кроме

- А. острого токсического бронхита, контактного дерматита, вегетативной дисфункции
- Б. эритроматозно-буллезного дерматита, острого ларинготрахеобронхита, токсической комы
- В. эритроматозно-буллезного дерматита, острого ларинготрахеобронхита, токсической энцефалопатии, токсической комы
- Г. эритроматозно-буллезного дерматита, острого ларинготрахеобронхита, вегетативной дисфункции
- Д. всего перечисленного

Для хронической интоксикации сурьмой и ее соединениями характерны

- А. хронический токсический гепатит
- Б. хронический бронхит
- В. аллергические заболевания кожи
- Г. ирритативный дерматит
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации бензолом и его гомологами не характерно в периферической крови

- А. гипер- или нормохромная анемия
- Б. лейкопения с относительным лимфоцитозом
- В. тромбоцитопения
- Г. значительное повышение сывороточного железа
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации кобальтом и его соединениями характерны

- А. хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз
- Б. хронический токсический бронхит, хронический гепатит
- В. хронический бронхит, эрозия и перфорация носовой перегородки
- Г. пневмосклероз, эмфизема легких, хронический ринит
- Д. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями острого отравлением таллием и его соединениями являются

- А. аллопеция, токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, острый дерматит
- Б. острый токсический бронхит, острый токсический гепатит
- В. острый токсический гепатит, токсическая полинейропатия, острый дерматит
- Г. аллопеция, токсический гепатит, острый дерматит
- Д. ничего из перечисленного

В состав сварочного аэрозоля входит все перечисленное, исключая

- А. железо
- Б. окись углерода
- В. мышьяк
- Г. марганец
- Д. озон

Клиническими синдромами вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, являются все кроме

- А. пояснично-крестцовой радикулопатии
- Б. периферического ангиодистонического синдрома верхних конечностей, в том числе синдром Рейно
- В. полинейропатии верхних конечностей с сенсорными и вегето-трофическими нарушениями
- Г. полинейропатии периферической с сенсорными и моторными нарушениями
- Д. полинейропатии верхних конечностей с сенсорными нарушениями

Хроническая интоксикация парами металлической ртути характеризуется

- А. приступами сердцебиения, колебаниями артериального давления, повышенной потливостью
- Б. головной болью, сердцебиением, повышением артериального давления
- В. головной болью, повышенной истощаемостью, эмоциональной лабильностью, нарушением ритма сна, тахикардией, колебанием артериального давления
- Г. головной болью, повышенной нервной истощаемостью, эмоциональной лабильностью
- Д. повышенной нервной истощаемостью, снижением настроения, нарушением ритма сна

Для хронической интоксикации бензолом и его гомологами характерно развитие анемии

- А. железодефицитной
- Б. связанной с нарушением синтеза порфиринов
- В. гипопластической
- Г. гемолитической
- Д. все перечисленное

Патоморфологическими признаками изменения слизистых верхних дыхательных путей (ВДП) при воздействии фиброгенной пыли являются

- А. Лимфоидная инфильтрация и метаплазия мерцательного эпителия ВДП
- Б. Гипертрофия и атрофия эпителия
- В. Воспалительные изменения в слизистых ВДП
- Г. отсутствие изменений слизистых

Для злокачественных новообразований органов дыхания характерны

- А. короткий период экспозиции канцерогена, отсутствие латентного периода, полиорганность поражения
- Б. длительный период экспозиции, отсутствие латентного периода, сочетание с раком кожи
- В. длительный период экспозиции, длительный латентный (постконтактный) период, частое сочетание с раком кожи
- Г. короткий период экспозиции канцерогена, длительный латентный период, полиорганность поражения
- Д. ничего из перечисленного

Синдром Рейно пальцев рук развивается при воздействии локальной вибрации

- А. низких частот
- Б. средних частот
- В. высоких частот
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

К факторам, вызывающим профессиональные заболевания, относятся

- А. химические
- Б. физические
- В. биологические
- Г. факторы трудового процесса
- Д. все перечисленное

К профессиональным заболеваниям периферических нервов относятся все перечисленные, кроме:

- А. мононевропатии
- Б. полиневропатии
- В. острая демиелизирующая нейропатия Гийена-Барре
- Г. пояснично-крестцовых радикулопатий

Клиническими проявлениями острого отравления фосforoорганическими отравляющими веществами не являются

- А. острый токсический гепатит, острый энтероколит, токсическая анемия
- Б. токсическая энцефалопатия с миозом, токсическая кома, токсический отек легких
- В. токсическая энцефалопатия с миозом, бронхоспазм, токсическая полинейропатия с вялыми парезами и параличами
- Г. вегетативно-сосудистая дисфункция, токсическая полинейропатия, бронхоспазм
- Д. все перечисленное

Для действия лазерного излучения характерно развитие следующих клинических синдромов

- А. астенического
- Б. астено-вегетативного
- В. вегетативно-сосудистой дисфункции
- Г. гипоталамического синдрома
- Д. ничего из перечисленного

Целью экспертизы профессиональной пригодности является определение соответствия

- А. состояния здоровья работника (лица, поступающего на работу) возможности выполнения им отдельных видов работ
- Б. уровня трудовых навыков работника возможности выполнения им отдельных видов работ
- В. уровня профессионального образования работника возможности выполнения им отдельных видов работ
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Химическими веществами, вызывающими перфорацию носовой перегородки, являются

- А. фосген
- Б. пропан
- В. хром и его соединения
- Г. фтор и его соединения
- Д. окислы азота

В лечении выраженной стадии интоксикации свинцом и его соединениями наиболее показано

- А. переливание крови
- Б. комплексоны (тетрациклин кальция)
- В. препараты железа
- Г. витамины группы В
- Д. спазмолитики

Декомпрессионная болезнь может приводить:

- А. к стойким нарушениям центральной нервной системы
- Б. к заболеваниям типа синдрома Меньера
- В. к хроническим заболеваниям костно-суставной системы
- Г. к заболеваниям сердца и сосудов
- Д. ко всему перечисленному

К первичной профилактике профессиональных пылевых бронхитов относится

- А. профилактика воздействия неблагоприятного микроклимата
- Б. проведение курсов антибактериальной терапии работающим в условиях запыленности
- В. совершенствование технологических процессов, направленных на подавление пылевыделения в воздух рабочей зоны
- Г. проведение курсов противовирусной терапии работающим в условиях повышенной запыленности
- Д. проведение профилактической вакцинации против респираторных инфекций работающих в условиях запыленности

Для хронической интоксикации таллием и его соединениями характерны

- А. токсическая энцефалопатия, астенический и депрессивный синдромы, хронический токсический гепатит, хронический дерматит, аллопеция
- Б. токсическая энцефалопатия, астенический и депрессивный синдромы, хронический токсический гепатит
- В. токсическая энцефалопатия, депрессивный синдром, хронический токсический гепатит
- Г. астенический и депрессивный синдромы, хронический токсический гепатит, хронический дерматит, аллопеция
- Д. токсическая энцефалопатия, токсический гепатит

Для хронической интоксикации несимметричным диметилгидразином, продуктами его синтеза и разложения не характерны

- А. токсическая энцефалопатия, хронический токсический гепатит, язвенная болезнь желудка и 12ти перстной кишки
- Б. хронический токсический гепатит, хронический эрозивный гастрит, вегетативная дисфункция
- В. токсическая энцефалопатия, хронический токсический гепатит, хронический эрозивный гастрит, вегетативная дисфункция
- Г. хронический токсический бронхит, хронический ринофарингит
- Д. все перечисленное

Наиболее часто поражаемой (наряду с кровью) системой при хронической интоксикации углеводородами является

- А. бронхо-легочная система
- Б. нервная система
- В. опорно-двигательный аппарат
- Г. печень

Для интоксикации медным купоросом характерны

- А. хронический токсический гепатит, токсическая нефропатия
- Б. хронический оксический гепатит, хронический токсический бронхит
- В. хроническая нефропатия, токсическая полинейропатия
- Г. хронический токсический бронхит, токсическая полинейропатия
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями острого отравления органическими цианидами не являются

- А. токсический гепатит, токсическая энцефалопатия, токсический бронхит
- Б. острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, вегетативная дисфункция
- В. острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, токсическая энцефалопатия, кома
- Г. острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, токсическая энцефалопатия
- Д. все перечисленное

Для воздействия лазерного излучения характерным является поражение

- А. органа зрения и гепатобилиарной системы
- Б. гепатобилиарной системы и костного мозга
- В. органа зрения и кожных покровов
- Г. кожных покровов и органа слуха
- Д. органа зрения и органа слуха

Клиническими проявления острого отравления пестицидами не являются

- А. токсический гастроэнтерит, токсический гепатит токсическая энцефалопатия, токсическая кома, токсическая нефропатия, токсический бронхит, токсическая кардиомиопатия, контактный дерматит
- Б. острый ринит, острый фарингит, острый конъюнктивит, токсический бронхит
- В. токсический гастроэнтерит, токсический гепатит токсическая энцефалопатия, контактный дерматит
- Г. токсический гастроэнтерит, токсическая энцефалопатия, полинейропатия, контактный дерматит
- Д. все перечисленное

Хроническая интоксикация марганцем и его соединениями клинически характеризуется

- А. деменцией, тетрапарезом
- Б. вегетативной дисфункцией, токсической энцефалопатией (паркинсонизм), деменцией
- В. гемиплегией, деменцией
- Г. токсической анемией, вегетативной дисфункцией
- Д. ничего из перечисленного

Профессиональным заболеванием кожи, сопровождающимся значительной гиперпигментацией кожных покровов, являются

- А. Фотодерматит
- Б. масляный фолликулит
- В. токсическая меланодермия
- Г. микоз гладкой кожи
- Д. экзема

Профессиональным заболеванием, для развития которого не требуется длительный контакт с производственным фактором, является

- А. силикоз
- Б. талькоз
- В. бронхиальная астма
- Г. вибрационная болезнь
- Д. силикатоз

Хронический пылевой бронхит развивается при стаже работы

- А. 6 месяцев
- Б. 2-5 лет
- В. 7-10 лет
- Г. не зависит от стажа работы
- Д. в период через 5-10 лет после прекращения работы

После прекращения контакта с производственными факторами могут развиваться следующие профессиональные заболевания

- А. вибрационная болезнь
- Б. хроническая интоксикация бензолом и его гомологами
- В. силикоз поздние формы
- Г. онкологические заболевания с локализацией по пути поступления производственного канцерогена
- Д. профессиональная бронхиальная астма

При хронической интоксикации свинцом и его соединениями анемия является

- А. железодефицитной
- Б. гипопластической
- В. гемолитической
- Г. связанной с нарушением синтеза порфиринов
- Д. связана с нарушением синтеза ДНК и РНК

Клиническими проявлениями острого отравления кобальтом и его соединениями являются

- А. острый токсический бронхит, отек легких, токсическая нефропатия
- Б. острый токсический бронхит, острый токсический гепатит
- В. литейная лихорадка, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит
- Г. острый токсический бронхит, острый ринит, токсическая нефропатия
- Д. ничего из перечисленного

Начальной стадией профессиональной токсической меланодермии является

- А. гиперемия
- Б. сетчатая пигментация
- В. фолликулярный гиперкератоз
- Г. везикулярный элемент
- Д. все перечисленное

Для рентгенологических изменений при силикозе характерно наличие

- А. округлых неомогенных теней с нечеткими контурами
- Б. мономорфность теней
- В. симметричное затемнение преимущественно в нижних отделах легких
- Г. буллезной эмфиземы
- Д. изменение прикорневых лимфоузлов по типу "яичной скорлупы"

Для злокачественных профессиональных заболеваний кожи является характерным

- А. наличие фоновых предопухолевых заболеваний кожи; локализация в местах наиболее частого воздействия производственного канцерогена; гистологически базальноклеточный или плоскоклеточный рак
- Б. наличие фоновых предопухолевых заболеваний кожи; локализация различная, гистологически все формы рака без поражения придатков кожи
- В. наличие фоновых предопухолевых заболеваний кожи; локализация различная, поражение придатков кожи
- Г. наличие фоновых предопухолевых заболеваний кожи; локализация нижняя часть туловища, поражение придатков кожи и лимфоузлов
- Д. ничего из перечисленного

Основными принципами лечения профессиональных заболеваний являются

- А. патогенетический
- Б. этиологический
- В. симптоматический
- Г. все перечисленное

Для хронической интоксикации хлоридом, сульфидом цинка характерны

- А. хронический токсический бронхит, токсический гепатит
- Б. ирритантный дерматит, ожоги, язвы при попадании на кожу с исходом в рубцы
- В. хронический токсический бронхит
- Г. хронический токсический гепатит
- Д. ничего из перечисленного

К вредным производственным факторам, вызывающим депрессию гемопоэза, не относится

- А. хлорбензол
- Б. гексахлоциклогексан
- В. гексаметилендиамин
- Г. монооксид углерода
- Д. бензол

Для хронической интоксикации окислами азота не характерны

- А. токсическая анемия, келлоидные рубцы, токсический гепатит
- Б. токсический пневмосклероз, хронический токсический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких
- В. токсический пневмосклероз, хронический токсический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, келлоидные рубцы
- Г. хроническая обструктивная болезнь легких, келлоидные рубцы
- Д. все перечисленное

Для хронического поражения отравляющими веществами кожно-нарывного действия не характерны

- А. хронический обструктивный бронхит, токсический пневмосклероз, хронический дерматит, рубцовый кератит
- Б. хронический обструктивный бронхит, токсический пневмосклероз, хронический дерматит
- В. хронический обструктивный бронхит, хронический дерматит, рубцовый кератит
- Г. токсическая энцефалопатия, полинейропатия, контактный дерматит
- Д. все перечисленное

Злокачественные новообразования органов дыхания не вызываются следующими вредными производственными факторами

- А. хром и его соединения, никель, асбест, тальковая пыль, ПАУ, формальдегиды, уран, радон, соединения бериллия и кадмия, диоксид кремния
- Б. винилхлорид и продукты его полимеризации, афлатоксины, технический углерод, паразиты
- В. хром и его соединения, никель, мышьяк, асбест, тальковая пыль, ПАУ, формальдегиды, уран, радон, соединения бериллия и кадмия, диоксид кремния
- Г. хром и его соединения, никель, мышьяк, асбест, тальковая пыль, ПАУ, формальдегиды, уран, радон, соединения бериллия и кадмия, диоксид кремния, акрилонитрил
- Д. все перечисленное

Для профессиональной нейросенсорной тугоухости не является характерным

- А. двустороннее поражение органа слуха
- Б. постепенное начало
- В. начало поражения слуха с высоких частот
- Г. несимметричное поражение слуха
- Д. симметричное поражение слуха

Признаками астенопии являются все перечисленные, кроме:

- А. быстрого утомления при чтении
- Б. более режущего и ломящего характера в области глаз, лба, темени
- В. ухудшения зрения
- Г. головокружения
- Д. двоения предметов

Для острого отравления двуокисью углерода характерны

- А. токсическая энцефалопатия, кома
- Б. гипоксическая энцефалопатия, кома, летальный исход
- В. токсическая энцефалопатия, токсическая полинейропатия
- Г. токсическая энцефалопатия, токсическая пневмония
- Д. синкопальный синдром, токсическая энцефалопатия, токсическая пневмония

Возникновение синдрома Рейно при вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации не провоцируется

- А. общим озноблением организма
- Б. воздействием локальной вибрации на руки работника
- В. психо-эмоциональными нагрузками
- Г. общим перегреванием организма
- Д. местным охлаждением кистей рук

Все утверждения по силикозу являются верными за исключением

- А. интерстициальная болезнь легких
- Б. вовлечение в процесс прикорневых лимфоузлов
- В. вовлечение в процесс плевры
- Г. частое осложнение туберкулезом
- Д. развитие легочной эмболии

Для хронической интоксикации бензолом и его гомологами характерно поражение функции кроветворения

- А. эритропоэтической
- Б. лейкопоэтической
- В. мегакариоцитарной
- Г. всех отростков одновременно
- Д. все перечисленное

Диагностический алгоритм вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, включает в себя

- А. гипалгезию дистальных отделов рук, снижение сухожильных рефлексов и периферические вегетативно-трофические расстройства кистей
- Б. гипалгезию дистальных отделов рук, периферические сосудистые и вегето-трофические расстройства кистей, повышение порогов вибрационной и болевой чувствительности
- В. гипалгезия дистальных отделов рук, периферические вегетативно-трофические расстройства кистей, повышение порогов только болевой чувствительности
- Г. периферические сосудистые и вегетативно-трофические расстройства на кистях, повышение порогов вибрационной чувствительности
- Д. отсутствие нарушений чувствительности, угнетение сухожильных рефлексов рук и атрофия мышц кистей

По клиническому течению воздействие теплового излучения, нагревающего микроклимата является

- А. острым
- Б. подострым
- В. хроническим
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Расследования случая развития острого профессионального заболевания (отравления) должно быть проведено в течение

- А. одной недели
- Б. одного месяца
- В. одних суток
- Г. трех суток
- Д. пяти суток

Для хронической интоксикации газообразным хлором не характерны

- А. хронический конъюнктивит, хронический кератит, хронический ринит, хронический фарингит, хронический ларингит, хронический необструктивный бронхит
- Б. Хронический нефрит, хронический гепатит
- В. Хронический ринит, хронический фарингит, хронический ларингит, хронический конъюнктивит, хронический кератит, хроническая обструктивная болезнь легких
- Г. хронический конъюнктивит, хронический кератит, хронический ринит, хронический фарингит, хронический ларингит, бронхиальная астма
- Д. все перечисленное

К изменениям органа зрения при воздействии лазерного излучения относятся все перечисленные, кроме

- А. миопии
- Б. ожога роговицы
- В. помутнения в различных слоях хрусталика
- Г. скотомы
- Д. центральной дегенерации сетчатки

К обязательным методам исследования слуха при периодических медицинских осмотрах относятся

- А. пороговая тональная аудиометрия
- Б. исследование слуха с помощью камертона
- В. альгезиметрия
- Г. паллестезиометрия
- Д. проба Вебера

Клиническими проявлениями острого отравления газообразным хлором являются

- А. острый конъюнктивит, острый кератит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит,
- Б. острый конъюнктивит, острый кератит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, острый необструктивный бронхит
- В. острый конъюнктивит, острый кератит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, острый необструктивный бронхит, токсическая пневмония, отек легких
- Г. токсическая энцефалопатия, ожоги кожи
- Д. все перечисленное

Профессиональными заболеваниями кожи, вызванных аллергенами, являются

- А. витилиго, масляные угри, токсическая меланодермия
- Б. раздражительный контактный дерматит, химические ожоги кожи
- В. витилиго, меланодермия
- Г. аллергический контактный дерматит, экзема, аллергическая крапивница, фотоконтактный дерматит
- Д. ничего из перечисленного

Злокачественные новообразования почек и мочевого пузыря вызываются следующими вредными производственными факторами канцерогенного действия

- А. диоксидом кремния, тальковой пылью
- Б. ароматическими аминосоединениями, ПАУ, содержащими 3,4-без(а)пирен, смазочными охлаждающими жидкостями, содержащими ПАУ и нитрозоаминами
- В. свинцом и его соединениями, диоксидом кремния, дисульфидом углерода, железом и его соединениями
- Г. свинцом и его соединениями, диоксидом кремния, дисульфидом углерода, железом и его соединениями, ванадием и его соединениями
- Д. ничего из перечисленного

Определение степени утраты трудоспособности при профессиональных заболеваниях возложено на

- А. Врачебную комиссию медицинской организации
- Б. центры профессиональной патологии
- В. фонд социального страхования
- Г. бюро медико-социальной экспертизы
- Д. все перечисленное

Степень выраженности дыхательной недостаточности при силикатозах определяется

- А. выраженностью фиброза
- Б. наличием осложнений
- В. выраженностью фиброза и развитием осложнений
- Г. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями синдрома Рейно при воздействии локальной вибрации являются

- А. гипотермия и мраморность кистей
- Б. приступы онемения дистальных фаланг пальцев рук
- В. приступы побеления дистальных фаланг пальцев рук, гипотермия и мраморность кистей
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Легкая степень декомпрессионной (кессонной) болезни характеризуется:

- А. сыпью на коже и зудом
- Б. мышечными и суставными болями
- В. общим недомоганием
- Г. учащением пульса и дыхания
- Д. всем перечисленным

Экспертиза профессиональной пригодности проводится по результатам

- А. диспансерного наблюдения
- Б. предварительного медицинского осмотра
- В. периодического медицинского осмотра
- Г. обследования в условиях стационара
- Д. все перечисленное

К основным этиологическим производственным факторам профессиональной бронхиальной астмы относятся

- А. химические и биологические
- Б. метеорологические
- В. физические
- Г. психоэмоциональные
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями острого отравления мышьяковистым водородом

- А. острый токсический гепатит, острая токсическая нефропатия
- Б. внутрисосудистый гемолиз, гемолитическая анемия, острый токсический гепатит, токсическая нефропатия, токсическая энцефалопатия
- В. острый токсический гепатит, токсическая полинейропатия, острый дерматит
- Г. анемия гипохромная, токсический гепатит, токсическая полинейропатия
- Д. ничего из перечисленного

Для силикоза и диссеминированного туберкулеза легких не характерно

- А. симметричность поражения легких
- Б. локализация очаговых теней в кортикальном отделе легких
- В. увеличение прикорневых лимфоузлов
- Г. асимметрия поражения легких
- Д. вовлечение в патологический процесс плевры

Злокачественные новообразования желудка вызываются следующими вредными производственными факторами канцерогенного действия

- А. свинцом и его соединениями, диоксидом кремния, дисульфидом углерода, ванадием и его соединениями
- Б. свинцом и его соединениями, диоксидом кремния, дисульфидом углерода, железом и его соединениями
- В. хромом шестивалентным, никелем, асбестом, угольными и графитовыми изделиями, этилированным бензином, ионизирующим излучением, трасурановыми нуклидами
- Г. диоксидом кремния, тальковой пылью, железом и его соединениями
- Д. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями острого токсического воздействия кадмия и его соединений являются

- А. острый токсический бронхит, отек легких, токсическая нефропатия, острый токсический гепатит
- Б. острый трахеит, токсическая пневмония, острый токсический гепатит
- В. острый ринофаринголарингит, острый трахеит, острый бронхит
- Г. острый токсический бронхолит, отек легких, токсическая пневмония, токсическая нефропатия, острый токсический гепатит
- Д. острый токсический гепатит, токсическая нефропатия, астенический синдром
- Е. все перечисленное, кроме 3,5

Для хронической интоксикации мышьяком и его соединениями характерны

- А. токсическая полинейропатия и миелополинейропатия, энцефалопатия, токсический гепатит, анемия гемолитическая, аллопеция, депигментация ногтей, дерматиты, меланодермия, эрозия и перфорация носовой перегородки
- Б. токсическая полинейропатия и миелополинейропатия, энцефалопатия, токсический гепатит, анемия гипохромная, дерматиты, меланодермия, эрозия и перфорация носовой перегородки
- В. токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, аллопеция
- Г. токсическая полинейропатия, дерматиты, меланодермия, эрозия и перфорация носовой перегородки
- Д. токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия

Причиной развития профессиональной дискинезии являются

- А. локальная вибрация
- Б. стереотипные движения пальцами рук в быстром темпе
- В. физические нагрузки общего характера
- Г. охлаждение кистей рук
- Д. свинец и его соединения

Для острого воздействия аэрозодем цинка характерно

- А. острый токсический бронхит
- Б. литейная лихорадка
- В. острый токсический гепатит
- Г. острая токсическая нефропатия
- Д. ничего из перечисленного

Хром обладает всеми перечисленными действиями, кроме

- А. первичного раздражающего
- Б. сенсibiliзирующего
- В. гемолитического
- Г. канцерогенного
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации тринитротолуолом не характерны

- А. хронический токсический гепатит, токсическая нефропатия
- Б. токсическая катаракта, хронический токсический гепатит, анемия нормохромная
- В. токсическая катаракта, анемия нормохромная
- Г. токсическая катаракта
- Д. все перечисленное

Острые формы профессиональных заболеваний (отравлений) расследуются

- А. участковым врачом терапевтом
- Б. врачом токсикологом
- В. санитарным врачом управления Роспотребнадзора
- Г. специалистом по охране труда и промышленной безопасности
- Д. работодателем- руководителем организации

Целью периодических медицинских осмотров является

- А. выявление заболеваний, являющихся медицинским противопоказанием для работы во вредных условиях труда
- Б. динамическое наблюдение за состоянием здоровья работающих во вредных/или опасных условиях труда
- В. своевременное выявление начальных признаков профессиональных заболеваний
- Г. выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного

В основу современной классификации профессиональной бронхиальной астмы положен принцип

- А. профессиональной принадлежности
- Б. этиологический
- В. патогенетический
- Г. прогностический
- Д. все перечисленное

Для профессионального эпикондилеза плечевой кости характерно

- А. постепенное начало в период работы с физическими перегрузками, нарастание боли и слабости в руке, положительные симптомы натяжения
- Б. острое начало в период отпуска, положительные симптомы натяжения
- В. постепенное начало, нарастание болевого синдрома, ограничение объема движений в локтевом суставе
- Г. нарушение конфигурации локтевого сустава, боли в руке
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями острого отравления никелем и его соединениями не являются

- А. острый ринит, острый фарингит, острый ларингит,
- Б. литейная лихорадка, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит
- В. литейная лихорадка, острый ринит, острый фарингит
- Г. острый токсический бронхит, отек легкого
- Д. ничего из перечисленного

Острое отравление нерастворимыми соединениями бериллия не проявляется

- А. острый гастрит, острый токсический гепатит, острый токсический бронхит
- Б. литейная лихорадка, острый бронхиолит, острый токсический альвеолит, отек легкого
- В. литейная лихорадка, острый токсический альвеолит, отек легкого
- Г. острый токсический альвеолит, отек легкого
- Д. все перечисленное

целью предварительного медицинского осмотра является

- А. определение соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой работе
- Б. раннее выявление заболеваний
- В. профилактика заболеваний
- Г. все перечисленное

Для острого отравления и хронических интоксикаций, связанных с воздействием комплекса химических веществ характерны

- А. токсическая энцефалопатия и полинейропатия
- Б. токсический гепатит, анемия, вегетативная дисфункция
- В. токсический бронхит, токсическая энцефалопатия, анемия
- Г. поражение различных органов и систем, определяемое химическим составом токсикантов
- Д. ничто из перечисленного

Основными изменениями системы крови при воздействии свинца являются

- А. ретикулоцитоз и увеличение эритроцитов с базофильной зернистостью
- Б. снижение количества эритроцитов и уровня гемоглобина
- В. лейкоцитоз и нейтропения
- Г. лейкоцитопения и тромбоцитопения

клиническими проявлениями острого отравления фтором и его соединениями не являются

- А. острый конъюнктивит, ожог глаз; острый ринит, в том числе эрозивный; острый фарингит, острый ларингит, острый токсический бронхит, ожоги кожи
- Б. острый конъюнктивит, ожог глаз; острый ринит, в том числе эрозивный; острый фарингит, острый ларингит, острый токсический бронхиолит, отек легких
- В. острый гепатит, токсическая энцефалопатия, ожоги кожи
- Г. острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, острый трахеит, токсическая пневмония, отек легких, ожог кожи
- Д. все перечисленное

Для "Свинцовой колики" характерно все кроме

- А. артериальной гипертензии
- Б. брадикардии
- В. схваткообразных болей в животе
- Г. симптома раздражения брюшины
- Д. длительных запоров

Санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания составляет

- А. работодатель
- Б. врач-специалист, установившей предварительный диагноз профессионального заболевания
- В. цеховой врач-терапевт
- Г. санитарный врач управления Роспотребнадзора
- Д. врач профпатолог

Профессиональными заболеваниями от воздействия пониженной температуры могут являться

- А. облитерирующий эндартериит
- Б. полиневропатия с сенсорными нарушениями
- В. варикозное расширение вен нижних конечностей
- Г. периферический ангиодистонический синдром
- Д. все перечисленное

При локальной вибрации поражаются органы и системы, кроме:

- А. периферических нервов, периферических сосудов
- Б. периферических нервов, периферических сосудов, скелетно-мышечной системы
- В. желудочно-кишечного тракта, обоняния
- Г. периферических нервов, скелетно-мышечной системы
- Д. всего перечисленного

Для хронической интоксикации таллием и его соединениями характерны

- А. хронический токсический гепатит, хроническая полинейропатия,
- Б. аллопеция, токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, хронический дерматит
- В. аллопеция, хронический гепатит, хронический дерматит
- Г. токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, токсическая нефропатия
- Д. ничего из перечисленного

Интоксикация тетраэтилсвинцом характеризуется

- А. астеническим синдромом, токсической энцефалопатией и психозом
- Б. токсической энцефалопатией и токсическим психозом
- В. астеническим синдромом, токсической энцефалопатией при сохранности психики
- Г. токсической энцефалопатией и токсической полинейропатией
- Д. астеническим синдромом и полинейропатией

Начальными клиническими проявлениями пневмокониозов являются

- А. одышка в покое и отсутствие аускультативных изменений в легких
- Б. нерезко выраженные диффузные изменения на рентгенограмме в легких
- В. локальные изменения на рентгенограмме органов грудной клетки справа
- Г. отсутствие жалоб на здоровье

Для острого отравления мышьяком и его соединениями характерны

- А. токсическая энцефалопатия, гастроэнтерит, токсический гепатит, вегетативные нарушения
- Б. токсический миелополиневрит, энцефалопатия, острый гастроэнтерит, токсический гепатит, вегетативные нарушения
- В. острый гастроэнтерит, токсический гепатит, вегетативные нарушения
- Г. токсическая полинейропатия, токсический гепатит, вегетативные нарушения
- Д. токсическая энцефалопатия, острый гастроэнтерит

К обязательным методам исследования при воздействии вибрации при периодических медицинских осмотрах относятся

- А. исследование вибрационной чувствительности с помощью камертона
- Б. паллестезиометрия
- В. холодовая проба, динамометрия
- Г. биохимический анализ крови
- Д. психологическое тестирование
- Е. холодовая проба

Особенностью профпатологии как клинической дисциплины является взаимодействие с

- А. гигиеной труда
- Б. другими клиническими дисциплинами
- В. фондом социального страхования
- Г. службой охраны труда и промышленной безопасности
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации нитро- и аминопроизводными бензола и его гомологов не характерны

- А. анемия умеренная, вегетативная дисфункция
- Б. анемия умеренная, токсическая энцефалопатия, хронический токсический гепатит
- В. анемия легкая, вегетативная дисфункция
- Г. хронический токсический бронхит, токсическая остеопатия
- Д. все перечисленное

К этиологическим факторам, способствующим развитию профессиональных заболеваний периферических нервов и опорно-двигательного аппарата, относятся все перечисленные, кроме:

- А. физических нагрузок
- Б. переохлаждения
- В. нервно-психического напряжения
- Г. вибрации
- Д. вынужденной рабочей позы

Лейкозы вызываются следующими вредными производственными факторами канцерогенного действия

- А. железом и его соединениями, ванадием и его соединениями, дисульфид углерода
- Б. ионизирующим излучением, в том числе радионуклидами; бензолом, этиленоксидом, хлорорганическими соединениями, винилхлоридом
- В. свинцом и его соединениями, диоксидом кремния, железом и его соединениями, ванадием и его соединениями
- Г. диоксидом кремния, тальковой пылью, железом и его соединениями
- Д. ничего из перечисленного

Острое отравление парами металлической ртути характеризуется

- А. металлическим вкусом во рту, головной болью, общим недомоганием, лихорадочным состоянием, рвотой и поносом
- Б. головной болью, общим недомоганием, лихорадочным состоянием, рвотой и поносом
- В. металлическим вкусом во рту, общим недомоганием, рвотой и поносом
- Г. общим недомоганием, лихорадочным состоянием, рвотой и поносом
- Д. головной болью, общим недомоганием, лихорадочным состоянием, тошнотой и рвотой

Клиническими проявлениями поражения верхних дыхательных путей, связанные с воздействием аэрозолей сложного состава являются

- А. хронический синусит
- Б. хронический фарингит
- В. хронический ринофаринголарингит, хронический гиперпластический ларингит
- Г. хронический ларингит
- Д. ничего из перечисленного

При контакте с пылью асбеста развивается

- А. мезотелиома плевры и брюшины
- Б. асбестоз
- В. рак легкого
- Г. бронхит
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации фосфором и его соединениями не характерны

- А. хронический токсический бронхит, пневмосклероз, токсическая анемия, рубцы на коже
- Б. хронический токсический бронхит, пневмосклероз, остеопатия костей нижней челюсти, токсическая энцефалопатия
- В. хронический токсический бронхит, токсическая анемия, помутнение роговицы, хронический токсический гепатит
- Г. токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия
- Д. все перечисленное

Заболеванием исключительно женщин, включенным в Перечень профессиональных заболеваний, является

- А. миома матки
- Б. опущение и выпадение матки и стенок влагалища
- В. хронический аднексит
- Г. аденомиоз
- Д. все перечисленное

При диагностике вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, необходимо исключить

- А. Болезнь Рейно и синдром Рейно другой этиологии, токсические и метаболические полинейропатии, острые и хронические ХДПН
- Б. Заболевания соединительной ткани, лимфогрануломатоз, системные васкулиты
- В. Заболевания периферических сосудов при атеросклерозе и сахарном диабете
- Г. Заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания мочевыделительной системы
- Д. все перечисленное, кроме Г (4)

К основным клиническим симптомам острого теплового поражения тяжелой степени относятся все перечисленные, кроме

- А. гипертермии
- Б. гипертензии
- В. гипотонии
- Г. судорог
- Д. остановки дыхания

К профессиональным заболеваниям, связанных с физическим функциональным перенапряжением относят

- А. миофиброз, теносиновиты предплечья, эпикондилиты
- Б. периартрозы, бурситы, остеоартрозы локтевых, плечевых и коленных суставов
- В. мышечно-тонический синдром шейного и пояснично-крестцового уровня
- Г. радикулопатия(компрессионно-ишемический) синдром шейного и пояснично-крестцового уровня
- Д. все перечисленное

Для острого отравления окисью углерода характерны

- А. энцефалопатия, кома, летальный исход
- Б. карбоксигемоглобинемия, энцефалопатия, синкопальный синдром, кома, летальный исход
- В. энцефалопатия, синкопальный синдром, кома, летальный исход
- Г. синкопальный синдром, депрессивный синдром
- Д. энцефалопатия, синкопальный синдром

Из перечисленных препаратов комплексоном не является

- А. глютаминовая кислота
- Б. D-пеницилламин
- В. тетацин кальция
- Г. унитиол
- Д. тиосульфат натрия

Для лечение силикоза никогда не применяют

- А. ингаляции натрия бикарбоната 2%
- Б. УФО грудной клетки
- В. преднизолон
- Г. гипербарическую оксигенацию
- Д. лечебну. Физкультуру

Для хронической интоксикации никелем и его соединениями не характерны

- А. хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз, эрозия и перфорация носовой перегородки
- Б. хронический ринит, хронический бронхит, хронический гепатит
- В. хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, эрозия носовой перегородки
- Г. хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз, эрозия и перфорация носовой перегородки
- Д. все перечисленное

К профессиональным заболеваниям опорно-двигательного аппарата относятся все, кроме

- А. крепитирующего тендовагинита предплечья
- Б. миофасцитов (миопатозов)
- В. эпикондилеза плеча
- Г. контрактуры Дюпюитрена
- Д. бурситов

Алгоритм диагностики профессиональной сенсоневральной тугоухости включает в себя

- А. Двусторонний характер поражения, наличие зубца Кархарта при аудиометрии и стаж работы в условиях производственного шума выше ПДУ свыше 10 лет
- Б. односторонний характер поражения, наличие зубца Кархарта при аудиометрии и стаж работы в условиях производственного шума выше ПДУ свыше 10 лет
- В. Двусторонний характер поражения, наличие костно-воздушной диссоциации и стаж работы в условиях производственного шума выше ПДУ свыше 10 лет
- Г. Односторонний характер поражения, наличие костно-воздушной диссоциации и работа в условиях воздействия шума в пределах ПДУ
- Д. Двусторонний характер поражения, наличие зубца Кархарта при аудиометрии, стаж работы в условиях воздействия шума в пределах ПДУ более 10 лет

Патогенез развития интоксикации свинцом и его соединениями включает

- А. угнетение стволовой клетки костного мозга
- Б. нарушение биосинтеза порфиринов и гема
- В. образование метгемоглобина
- Г. гемолиз эритроцитов
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации фтором и его соединениями характерно все, кроме

- А. Хронического эрозивного ринита с перфорацией носовой перегородки, пневмосклероза, хронической обструктивной болезни легких, остеопатии длинных трубчатых костей
- Б. Хронического эрозивного ринита, пневмосклероза, хронического бронхита, остеопатии длинных трубчатых костей
- В. Хронического эрозивного ринита с перфорацией носовой перегородки, пневмосклероза, хронического токсического альвеолита, остеопатии длинных трубчатых костей
- Г. Хронического гепатита, полинейропатии, энцефалопатии
- Д. всего перечисленного

Для острого отравления сероводородом низких концентраций характерны

- А. острый ринит, фарингит, конъюнктивит, блефарит, головная боль, головокружение
- Б. сенсорная полинейропатия, токсическая энцефалопатия, генерализованное тревожное расстройство
- В. Сенсо-моторная полинейропатия, депрессивный синдром
- Г. токсическая энцефалопатия, миелополинейропатия
- Д. токсическая энцефалопатия, депрессивный синдром

Полинейропатия верхних конечностей при вибрационной болезни от локальной вибрации начальной степени характеризуется

- А. сенсорными нарушениями
- Б. моторными нарушениями
- В. сенсо-моторными нарушениями
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Причиной развития синдрома запястного канала является:

- А. лигаментит тыльной связки запястья
- Б. лигаментит поперечной связки запястья
- В. крепитирующий тендовагинит предплечья
- Г. невринома срединного нерва
- Д. все перечисленное

Начало вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации

- А. острое
- Б. подострое
- В. хроническое
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Синдром карпального канала при вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, характерен для

- А. умеренно выраженной степени заболевания
- Б. начальной степени заболевания
- В. начальной и умеренной степени заболевания
- Г. развитие синдрома не характерно
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации растворимыми соединениями бериллия характерны

- А. хронический бронхит, пневмосклероз, хроническая обструктивная болезнь легких, бериллиоз
- Б. хронический бронхит, токсический гепатит, хронический ларингит
- В. хронический конъюнктивит, хронический дерматит, хронический гепатит
- Г. хронический бронхит, хронический дерматит, хронический гепатит
- Д. ничего из перечисленного

К веществу, входящему в состав сварочного аэрозоля, который может приводить к развитию литейной лихорадки, относится

- А. аэрозоль железа
- Б. аэрозоль цинка
- В. окись углерода
- Г. любой из перечисленных

Клиническими проявлениями острого отравления цианистым водородом являются

- А. острый ларингит, острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, Вегетативная дисфункция, кома
- Б. острая токсическая полинейропатия, острая токсическая нефропатия
- В. острый токсический гепатит, токсическая полинейропатия
- Г. вегетативно-сосудистая дисфункция, токсическая полинейропатия
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации цианистым водородом характерна

- А. полинейропатия токсическая
- Б. нефропатия токсическая
- В. энцефалопатия токсическая
- Г. анемия токсическая
- Д. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями острого отравления формальдегидом не являются

- А. острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, острый бронхит, отек легких, ирритантный дерматит, острый конъюнктивит
- Б. ожоги кожи, токсическая анемия, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит
- В. острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, ирритантный дерматит
- Г. острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, токсический бронхит, ирритантный дерматит
- Д. все перечисленное

Клиническими формами профессиональной дискинезии является все перечисленные синдромы, кроме:

- А. судорожного
- Б. дрожательного
- В. паретического (паралитического)
- Г. ангиодистонического
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации марганцем характерна

- А. сенсо-моторная полинейропатия
- Б. токсическая энцефалопатия (марганцовый паркинсонизм)
- В. токсическая полинейропатия
- Г. полинейропатия с сенсорными нарушениями
- Д. токсическая энцефалопатия с явлениями гемипареза/паралича

Клиническими проявлениями острого отравления ванадием и его соединениями является

- А. литейная лихорадка, токсический альвеолит
- Б. литейная лихорадка
- В. острый токсический бронхит, токсическая пневмония, отек легких
- Г. острый токсический альвеолит
- Д. ничего из перечисленного

При пылевом бронхите бронхоспазм обусловлен

- А. гиперсекрецией и деформацией бронхов
- Б. рефлекторным раздражением слизистых бронхов и сенсibilизацией организма
- В. атрофией слизистых бронхов и бронхиальных желез
- Г. атрофией слизистой бронхов и сенсibilизацией организма
- Д. атрофией слизистых бронхов и гиперсекрецией

При диагностике профессиональной бронхиальной астмы в первую очередь следует исключить

- А. тиреотоксикоз
- Б. тромбоэмболию легочной артерии
- В. инфекционно-аллергическую бронхиальную астму
- Г. гипервентиляционный синдром
- Д. острую пневмонию
- Е. все перечисленное

К металлоконииозу, при котором отсутствует зависимость дозы воздействующего вещества и эффекта действия, относится

- А. сидероз
- Б. алюминоз
- В. бериллиоз

Клиническими проявлениями острого отравления металлическим оловом не являются

- А. литейная лихорадка, токсический альвеолит
- Б. острый токсический гепатит, токсическая нефропатия
- В. литейная лихорадка
- Г. острый токсический альвеолит
- Д. все перечисленное

Для острого отравления сероводородом высоких концентраций характерны

- А. головная боль, головокружение, адинамия, патологические рефлексy
- Б. головная боль, головокружение, преходящее нарушение сознания
- В. головная боль, головокружение, цианоз лица и конечностей, адинамия, утрата сознания, летальный исход
- Г. цианоз лица и конечностей, адинамия, утрата сознания, летальный исход
- Д. адинамия, утрата сознания, летальный исход

Основным документом, подтверждающим инфекционный характер профессионального заболевания является

- А. копия трудовой книжки
- Б. санитарно-гигиеническая характеристика условий труда
- В. результаты обязательных предварительного и периодических медицинских осмотров
- Г. карта эпидемиологического обследования
- Д. все перечисленное

При экспертизе профпригодности врачебная комиссия выносит одно из следующих решений о признании работника по состоянию здоровья

- А. постоянно непригодным к выполнению отдельных видов работ
- Б. пригодным к выполнению отдельных видов работ
- В. временно непригодным к выполнению отдельных видов работ
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Для диагностики профессиональной бронхиальной астмы концентрация в воздухе рабочей зоны производственного аллергена имеет решающее значение

- А. не имеет
- Б. имеет
- В. все перечисленное
- Г. ничего из перечисленного

Острое отравление парами металлической ртути развивается при воздействии

- А. низких концентраций паров ртути в течение нескольких рабочих смен
- Б. высоких концентраций паров ртути в течение нескольких рабочих смен
- В. однократном высоких концентраций паров ртути в течение одной рабочей смены
- Г. однократном невысоких концентраций паров ртути в течении одной рабочей смены
- Д. однократном металлической ртути на кожу кистей рук во время работы

Полинейропатия верхних конечностей при вибрационной болезни от локальной вибрации умеренной степени характеризуется

- А. моторными нарушениями
- Б. сенсо-моторными нарушениями
- В. сенсорными и вегетативно-трофическими нарушениями
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Острое отравление окислами азота не проявляется

- А. острым конъюнктивитом, острым ринитом, острым фарингитом, острым ларингитом, острым трахеитом, острым токсическим бронхолитом
- Б. острым конъюнктивитом, острым ринофаринголарингитом, острым токсическим бронхолитом, отеком легких, острым дерматитом, ожогами кожи
- В. острым токсическим бронхолитом, токсической пневмонией, отеком легких, острым дерматитом, ожогами кожи
- Г. острым токсическим гепатитом, острым дерматитом
- Д. всем перечисленным

Основной гистологической структурой бериллиоза является

- А. кониофаги
- Б. эксудативное воспаление
- В. гранулема
- Г. множественные кисты
- Д. все перечисленное

Злокачественные новообразования печени вызываются следующими вредными производственными факторами канцерогенного действия

- А. мышьяком, афлатоксинами, радиоактивными веществами, винилхлоридом и продуктами его полимеризации, формальдегидами, техническим углеродом, вирусами, паразитами
- Б. диоксидом кремния, тальковой пылью
- В. свинцом и его соединениями, диоксидом кремния, дисульфидом углерода, железом и его соединениями
- Г. свинцом и его соединениями, диоксидом кремния, дисульфидом углерода, ванадием и его соединениями
- Д. ничего из перечисленного

Клиническим проявлениями острого отравления нитро- и аминопроизводными бензола и его гомологов не являются

- А. метгемоглобинемия, вегетативная дисфункция
- Б. метгемоглобинемия, токсическая энцефалопатия, кома
- В. метгемоглобинемия, токсическая энцефалопатия, острый токсический гепатит
- Г. острый токсический бронхит, токсическая энцефалопатия
- Д. все перечисленное, кроме 4

Для периферического ангиодистонического синдрома верхних конечностей характерна

- А. нормальная температура кожи, сухость кожных покровов, нормальная окраска кожных покровов
- Б. гипотермия кожи, сухость кожных покровов, нормальная окраска кожных покровов
- В. нормальная температура кожи, влажность ладоней, нормальная окраска кожных покровов
- Г. гипотермия кожи, влажность ладоней, мраморная или мраморно-цианотичная окраска кожных покровов
- Д. ничено из перечисленного

Для хронической интоксикации органическими цианидами характерно все, кроме

- А. гипохромной анемии умеренной, токсической энцефалопатии, ожогов кожи
- Б. гиперхромной анемии, хронического бронхита
- В. гипохромной анемии умеренной, токсической энцефалопатии
- Г. гипохромной анемии умеренной
- Д. всего перечисленного

Клиническими особенностями профессионального лейкоза являются

- А. острый миелобластный лейкоз при длительной предшествующей цитопении, экспозиция 10 лет и более производственных канцерогенов, возможность развития в постконтактный период
- Б. острое развитие лейкоза при короткой экспозиции производственных канцерогенов
- В. хроническое течение лейкоза при короткой экспозиции производственных канцерогенов
- Г. лейкоз лимфобластный, короткая экспозиция производственных канцерогенов, развитие в постконтактный период
- Д. ничего из перечисленного

Заболеваниями кожи, связанными с воздействием химических веществ, являются

- А. псориаз
- Б. меланома
- В. термические ожоги
- Г. контактная крапивница, токсикодермия
- Д. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями острого отравления дисульфидом углерода являются все, кроме

- А. токсической энцефалопатии, комы
- Б. вегетативно-сосудистой дисфункции
- В. токсической энцефалопатии
- Г. острого токсического гепатита, токсического бронхита
- Д. всего перечисленного

Основными изменениями системы крови при хронической интоксикации бензолом и его гомологами являются

- А. цитопения, ретикулоцитоз и сокращение продолжительности жизни эритроцитов
- Б. нормохромная анемия и ускоренное СОЭ
- В. лейкоцитоз и ускоренное СОЭ
- Г. эритроцитоз и лейкоцитоз
- Д. все перечисленное

Основными диагностическими методами профессионального бронхита являются

- А. спирометрия
- Б. спирометрия, бронхоскопия
- В. компьютерная томография органов грудной клетки
- Г. бодиплетизмография
- Д. биохимический и иммунологический анализы крови

Комплексное лечение вибрационной болезни включает все кроме

- А. витаминов группы В
- Б. сосудорасширяющих препаратов миотропного действия
- В. нестероидных противовоспалительных средств
- Г. комплексонов
- Д. всего перечисленного

Для хронической интоксикации медью и ее соединениями не характерны

- А. Хронический бронхит, хронический токсический альвеолит, хронический токсический гепатит,
- Б. токсическая нефропатия, токсический гепатит, хронический токсический бронхит
- В. хронический бронхит, хронический токсический альвеолит, повторные литейные лихорадки
- Г. повторные литейные лихорадки, хронический токсический альвеолит
- Д. все перечисленное

В перечень документов для экспертизы связи заболевания с профессией входит все перечисленное, кроме

- А. направление врача-профпатолога
- Б. копия трудовой книжки
- В. санитарно-гигиеническая характеристика условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания
- Г. результаты предварительного при приеме на работу и периодических медицинских осмотров
- Д. выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- Е. производственная характеристика

При хронической интоксикации бензолом в периферической крови наблюдаются

- А. лейкоцитоз, тромбоцитоз, эритропения
- Б. тромбоцитоз, лейкопения, эритроцитопения
- В. лейкопения, тромбоцитопения, эритроцитопения
- Г. лейкоцитоз, тромбоцитопения, эритропения
- Д. все перечисленное

Характерной для флюороза формой поражения зубов является

- А. кариес
- Б. крапчатость эмали
- В. пульпит
- Г. все перечисленное

Для профессионального злокачественного новообразования костей (саркомы) характерны

- А. редкая локализация, наличие предшествующих производственных травм той же локализации
- Б. частая локализация, генетическая предрасположенность
- В. генетическая предрасположенность, кратковременная экспозиция производственных канцерогенов
- Г. частая локализация, кратковременная экспозиция производственных канцерогенов
- Д. ничего из перечисленного

Наиболее характерным течением фиброзного процесса при силикатозах является

- А. медленно прогрессирующее
- Б. быстро прогрессирующее
- В. регрессирующее
- Г. стабильное
- Д. все перечисленное

Для острого отравления таллием и его соединениями характерны

- А. острый энтероколит, острый токсический гепатит, острый дерматит
- Б. аллопеция, токсическая полинейропатия, энцефалопатия, острый энтероколит, острый токсический гепатит, острый дерматит
- В. токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, острый токсический гепатит
- Г. токсическая полинейропатия, энцефалопатия, острый энтероколит
- Д. аллопеция, острый энтероколит, острый гепатит

Наиболее типичным для асбестоза рентгенологическим типом фиброза является

- А. узелковый
- Б. интерстициальный
- В. все перечисленное
- Г. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации мышьяковистым водородом характерны

- А. вегетативная дисфункция, хронический токсический гепатит, токсическая нефропатия
- Б. токсическая полинейропатия, токсический гепатит
- В. токсическая энцефалопатия, токсическая полинейропатия
- Г. хронический токсический гепатит, токсическая нефропатия
- Д. ничего из перечисленного

К наиболее тяжелой форме пневмокониоза из группы силикатозов относится

- А. асбестоз
- Б. талькоз
- В. коалиноз
- Г. цементный пневмокониоз
- Д. оливировый пневмокониоз

Диагностический алгоритм вибрационной болезни, связанной с воздействием общей вибрации, включает в себя

- А. гипалгезию дистальных отделов рук и ног, периферические сосудистые и вегетативно-трофические расстройства кистей и стоп, повышение порогов вибрационной и болевой чувствительности
- Б. гипалгезию дистальных отделов рук и ног, периферические сосудистые и вегетативно-трофические расстройства кистей, повышение порогов только болевой чувствительности
- В. гипалгезия дистальных отделов рук и ног, снижение сухожильных рефлексов верхних и нижних конечностей, восприятие вибрации не нарушено
- Г. отсутствие нарушений чувствительности, повышение сухожильных рефлексов верхних и нижних конечностей, снижение силы в конечностях
- Д. отсутствие нарушений чувствительности, угнетение сухожильных рефлексов верхних и нижних конечностей, атрофия мышц кистей и стоп

Злокачественные новообразования кожи вызываются следующими вредными производственными факторами канцерогенного действия

- А. бензолом и его производными, этиленоксидом, хлорорганическими соединениями, винилхлоридом
- Б. бета-нафтиламином, поливинилхлоридом, вирусами гепатита В и С, этиленоксидом
- В. нефтепродуктами, каменноугольными смолами, мышьяком и его соединениями, никелем, хромом и его соединениями, ультрафиолетовым излучением, ионизирующим излучением
- Г. бета-нафтиламином, поливинилхлоридом, вирусами гепатита В и С
- Д. ничего из перечисленного

К основным механизмам патогенеза острого теплового поражения относят

- А. микроциркуляторные нарушения и полнокровие всех органов
- Б. нарушение водного и микроэлементного состава
- В. нарушение обмена веществ
- Г. нарушение терморегуляции
- Д. все перечисленное

Тепловой удар развивается при сочетании:

- А. высокой температуры и ионизирующего излучения
- Б. высокой температуры и лазерного излучения
- В. высокой температуры и высокой влажности
- Г. высокой температуры и высокой скорости движения воздуха
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации фосфорорганическими отравляющими веществами не характерны

- А. токсическая энцефалопатия, когнитивные нарушения, хронический токсический гепатит, гипохромная анемия
- Б. токсический гепатит, гиперхромная анемия, вегетативная дисфункция
- В. токсическая энцефалопатия, хронический токсический гепатит, гипохромная анемия
- Г. вегетативная дисфункция, хронический токсический гепатит, гипохромная анемия
- Д. все перечисленное

Профессиональный эпидермоз клинически проявляется

- А. сетчатой пигментацией
- Б. сухостью и шелушением
- В. инфильтрацией и гиперемией
- Г. везикулярными элементами
- Д. все перечисленное

Профессиональными заболеваниями от воздействия биологических факторов является все, кроме

- А. туберкулеза легких
- Б. дизентерии
- В. бруцеллеза
- Г. сибирской язвы
- Д. гепатита В и С

Для вибрационной болезни от воздействия высокочастотной вибрации 1 степени характерен синдром

- А. Периферический ангиодистонический с редкими приступами акроангиоспазма
- Б. Вегетомиофасцита
- В. Радикулополиневропатии
- Г. Периферический ангиодистонический с частыми приступами акроангиоспазма

Комбинированную терапию игкс+ кдба больному профессиональной астмой следует назначать при

- А. Легком персистирующем течении
- Б. Средне-тяжелом течении
- В. Сочетании с ХОБЛ
- Г. Тяжелом течении

Прогноз при хроническом токсическом гепатите после устранения токсико-химического воздействия считается

- А. Сомнительным
- Б. Не понятным
- В. Неблагоприятным
- Г. Благоприятным

Кумуляция диоксина в организме происходит в основном в

- А. Жировой ткани
- Б. Костной ткани
- В. Желудочно-кишечном тракте
- Г. Мышечной ткани

Основным механизмом аллергических реакций, вызванных растительной пылью является ____ -индуцированный

- А. IgG
- Б. IgM
- В. IgA
- Г. IgE

Заболеванием, которое может быть вызвано волокнистой органической пылью, является

- А. Биссиноз
- Б. Легочный васкулит
- В. Бериллиоз
- Г. Контактный дерматит

Ветвью шейного сплетения является _____ нерв

- А. Подкрыльцовый
- Б. Лучевой
- В. Малый затылочный
- Г. Срединный

Прогрессирование фиброзного процесса до узловых форм характерно для

- А. Силикоза
- Б. Силикатозов
- В. Пневмокониоза газосварщика
- Г. Антракоза

К противопоказанию для продолжения работы в условиях воздействия промышленных аэрозолей больного профессиональной хронической обструктивной болезнью легких относят

- А. Гипертрофию правого предсердия
- Б. Одно легкое обострение в течение предыдущего года
- В. Два и более обострений в течение предыдущего года
- Г. Дыхательную недостаточность 1 степени

При остром отравлении монооксидом углерода средней степени тяжести преобладают проявления _____ гипоксии

- А. Гипоксической
- Б. Тканевой
- В. Циркуляторной
- Г. Гемической

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится лечащим врачом, который _____ формирует (выдает) гражданам листки нетрудоспособности сроком до пятнадцати календарных дней включительно

- А. Единолично
- Б. С учетом пожеланий пациента
- В. По решению врачебной комиссии
- Г. По согласованию с заведующим отделением

К общей экологии относится

- А. Медицинская экология
- Б. Биоэкология
- В. Экология человека
- Г. Экология биосферы

Письменное обращение гражданина, поступившее в государственные органы, органы местного самоуправления, должно быть рассмотрено в течение _____ дней со дня _____ письменного обращения

- А. 30; Регистрации
- Б. 22; Поступления
- В. 32; Написания
- Г. 48; Отправления

При ожоге, концентрированной щелочью, выявляются

- А. Нечеткие границы
- Б. Фолликулы
- В. Уплотнения
- Г. Четкие границы

Выявление заболевания посредством массового обследования практически здоровых пациентов называется

- А. Скрининг
- Б. Диспансеризация
- В. Первичная профилактика
- Г. Мониторинг

При работе в условиях контакта с природными асбестами (хризотил) программа периодического медицинского осмотра включает

- А. Магнитно-резонансную томографию грудной клетки
- Б. Рентгенографию грудной клетки в двух проекциях
- В. Флюорографию грудной клетки в двух проекциях
- Г. Позитронно-эмиссионную томографию грудной клетки

К требованиям, предъявляемым к защитным мазям и пастам, относится

- А. Легкая удаляемость с кожи
- Б. Надежность защиты кожи от производственных раздражителей
- В. Сохранность на коже в течение всего рабочего дня
- Г. Приятный запах и доступная цена

К развитию плеврита может приводить воздействие пыли

- А. Асбеста
- Б. Кадмия
- В. Кремния карбида
- Г. Аморфного диоксида кремния

Сроком более вероятной регрессии процесса при пневмокониозе сварщика является (в годах)

- А. 2
- Б. 5-6
- В. Более 10
- Г. 1

Для снижения интенсивности воздействия вредных факторов на организм работающих необходимо применять

- А. Изменение технологии
- Б. Усиленное питание
- В. Защиту временем, рационализация режимов труда, изменение технологии
- Г. Рациональное трудоустройство

Заболевание, которое вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой жизни и здоровью, либо становится причиной смерти, является _____ заболеванием

- А. Рецидивирующим
- Б. Сопутствующим
- В. Прогрессирующим
- Г. Основным

Предельно допустимая концентрация ртути в воздухе рабочей зоны составляет (в мг/м³)

- А. 0,04
- Б. 0,02
- В. 0,03
- Г. 0,01

При узелковой форме силикоза

- А. Имеется стойкая утрата трудоспособности
- Б. Противопоказана работа в контакте с пылью, веществами токсического, раздражающего действия, в неблагоприятных метеорологических условиях, связанная с тяжелым физическим трудом
- В. Можно продолжать работу на прежнем месте при условии динамического наблюдения
- Г. Имеется временная утрата трудоспособности

Фактором риска, имеющим первостепенную роль в развитии агравированной астмы, является

- А. Наличие атопии
- Б. Работа в контакте с аллергенами
- В. Наличие сопутствующей бронхолегочной патологии
- Г. Физическая нагрузка

К профессиям, считающимся редкими для развития пневмокониозов, относят

- А. Землекопа и строителя
- Б. Скульптора и зубного техника
- В. Фермера и растениевода
- Г. Работника керамических мастерских

При тяжелой профессиональной бронхиальной астме с отсутствием терапевтического эффекта от базисных препаратов показано добавление препаратов группы

- А. Анти-IgE-антител
- Б. Стабилизаторов мембран тучных клеток
- В. Антилейкотриенов
- Г. Антибиотиков широкого спектра действия

Анемия у женщин характеризуется количеством эритроцитов _____ и гемоглобина

- А. $4,0 \times 10^{12}$ /л; 140 г/л
- Б. $3,9 \times 10^{12}$ /л; 120 г/л
- В. $3,5 \times 10^{12}$ /л; 130 г/л
- Г. $3,9 \times 10^{12}$ /л; 108 г/л

Экспертиза связи заболевания с профессией проводится в

- А. Государственной медицинской организации, имеющей лицензию на медицинскую деятельность
- Б. Бюро медико-социальной экспертизы
- В. Специализированной медицинской организации, имеющей лицензию на медицинскую деятельность по «профпатологии» и «экспертизе связи заболевания с профессией»
- Г. Бюро судебно-медицинской экспертизы

К лицензированию медицинского учреждения относят

- А. Определение объема медицинской помощи в ЛПУ
- Б. Оценку квалификации медицинского персонала
- В. Выдачу документов на право заниматься определенным видом лечебно-профилактической деятельности в системе медицинского страхования
- Г. Определение соответствия качества медицинской помощи

Высокой летучестью обладают/обладает

- А. Бутиловый спирт
- Б. Этиловый спирт и бензин
- В. Метиловый спирт
- Г. Этиленгликоль

Характерным для интоксикации диоксином у человека считают

- А. Кашель с большим количеством пенистой мокроты, выраженный цианоз кожи и слизистых оболочек, повышение температуры тела
- Б. Металлический привкус во рту, сухость и жжение губ и слизистой оболочки полости рта, геморрагическая диарея, обезвоживание организма
- В. Появление угревидной сыпи (хоракне) через 1 - 2 недели после контакта, прогрессирующее истощение, поражение внутренних органов, отёчный синдром
- Г. Стремительное начало, бурное течение, быстрое выздоровление без дефекта

Отказ в предоставлении средствам массовой информации сведений возможен, если они содержат

- А. Врачебную тайну
- Б. Показатели заболеваемости населения
- В. Данные о летальности пациентов в стационаре
- Г. Анализ качества оказания медицинской помощи

Противопоказанием для проведения магнитно-резонансной томографии считают

- А. Открытую черепно-мозговую травму
- Б. Аллергию к йоду
- В. Наличие инородных металлических тел
- Г. Выраженную внутричерепную гипертензию

Наиболее часто у медицинских работников устанавливается профессиональный

- А. Бруцеллез
- Б. Дерматит
- В. Туберкулез
- Г. Кандидоз

Основным путем элиминации ртути из организма считают

- А. Потовые железы
- Б. Слюнные железы
- В. Почки
- Г. Кишечник

Диагностические возможности компьютерной томографии головного мозга определяются

- А. Визуализацией сосудов мозга и оболочек
- Б. Выявлением различий между костной тканью черепа и мозга
- В. Определением петрификатов в ткани мозга
- Г. Возможностью сравнить показатели поглощения рентгеновских лучей разными структурами мозга

К производственным аллергенам относится

- А. Аммиак
- Б. Формальдегид
- В. Сероуглерод
- Г. Азотная кислота

При проведении аттестации по присвоению квалификационной категории медицинским работникам определяющим является стаж работы

- А. Медицинский
- Б. Непрерывный
- В. По специальности
- Г. Во вредных (опасных) условиях труда

Для синдрома компрессии корешка I4 характерным является

- А. Выпадение ахиллова рефлекса
- Б. Снижение ахиллова рефлекса
- В. Отсутствие коленного рефлекса
- Г. Боль в области внутренней поверхности бедра

Письменное обращение гражданина, поступившее в государственные органы, органы местного самоуправления, должно быть рассмотрено в течение ____ дней со дня ____ письменного обращения

- А. 30; Регистрации
- Б. 48; Отправления
- В. 32; Написания
- Г. 22; Поступления

В составе базисной терапии тяжелой бронхиальной астмы используется препарат моноклональных антител к иммуноглобулину е

- А. Фенспирид
- Б. Зафирлукаст
- В. Омализумаб
- Г. Монтелукаст

Лечение тяжелой острой интоксикации тринитротолуолом проводят путем введения

- А. Антибиотиков широкого спектра действия
- Б. Магния сульфата на изотоническом растворе
- В. Метиленового синего
- Г. Кальция хлорида на растворе глюкозы

Для вибрационной полинейропатии характерным является поражение волокон периферических нервов

- А. Двигательных и вегетативных
- Б. Чувствительных
- В. Чувствительных и вегетативных
- Г. Вегетативных

Предельно допустимая концентрация монооксида углерода в воздухе рабочей зоны (в мг/м³)

- А. 50
- Б. 5
- В. 100
- Г. 20

Интоксикации хрома могут регистрироваться среди работников цехов (производств)

- А. Металлургического, кожевенного, гальванического
- Б. Формного, печатного, отделочного
- В. Лесопильного, деревообрабатывающего, мебельного
- Г. Швейного, трикотажного, текстильного

К обязательной составной части реабилитации при заболеваниях органов дыхания относят

- А. Дыхательные тренажеры
- Б. Физические тренировки
- В. Рациональное трудоустройство
- Г. Закаливание организма

Показанием к санаторно-курортной реабилитации при профессиональных заболеваниях является

- А. Смена времени года
- Б. Обострение заболевания
- В. Период ремиссии
- Г. Дообследование пациента

К маркерам, указывающим на активность воспалительного процесса при пневмокониозе, относят

- А. Лимфоцитоз и тромбоцитоз в периферической крови
- Б. Наличие булл на рентгенограмме
- В. Нейтрофильный лейкоцитоз и ускорение СОЭ
- Г. Повышение содержания цитокинов в крови и лаважной жидкости

Основные клинические проявления при отравлении фос связаны с накоплением в синапсах нервной системы

- А. Ацетилхолина
- Б. Серотонина
- В. ГАМК
- Г. Норадреналина

Порядок отбора мочи для химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ устанавливает приказ

- А. Минздрава России от 15.12.2014 № 835н
- Б. Минздрава СССР от 29.09.1989 № 555
- В. Минздрава России от 27.01.2006 г. № 40
- Г. Минздрава России от 18.12.2015 № 933н

Синдром полинейропатии верхних конечностей в сочетании с частыми приступами акроангиоспазмов встречается при воздействии вибрации

- А. Общей низкочастотной, толчкообразной
- Б. Общей низкочастотной
- В. Локальной низкочастотной
- Г. Локальной высокочастотной

К клиническим симптомам, наиболее рано возникающим при острой лучевой болезни, относят

- А. Тошноту и рвоту
- Б. Лейкопению
- В. Эритему кожи
- Г. Выпадение волос

К системам организма человека, в которых развиваются профессиональные заболевания от перенапряжения, относят

- А. Опорно-двигательный аппарат
- Б. Кроветворную
- В. Лимфатическую
- Г. Пищеварительную

Профессиональный кандидоз редко развивается у

- А. Работников фруктово-консервных предприятий
- Б. Лаборантов медицинских лабораторий, проводящих исследования на чувствительность к антибиотикам
- В. Работников швейных фабрик
- Г. Зубных врачей, работников производства белково-витаминных концентратов

При тяжелом персистирующем течении профессиональной бронхиальной астмы пикфлоу или офв1 составляют _____ от должных

- А. 59-35%
- Б. Менее 80 %
- В. 60-79%
- Г. 80 % и более

Повышение остаточного объёма лёгких у больных с обструктивными заболеваниями лёгких свидетельствует о

- А. Наличии воздушных ловушек
- Б. Гиперинфляции лёгких
- В. Лёгкой степени обструкции
- Г. Повышении сопротивления дыхательных путей

К основным клиническим синдромам вибрационной болезни 2 ст. От воздействия общей вибрации относят

- А. Дисциркуляторную энцефалопатию в сочетании с приступами акроангиоспазма
- Б. Периферический ангиодистонический с приступами акроангиоспазма
- В. Дисциркуляторную энцефалопатию в сочетании с поражением суставов
- Г. Полиневропатию в сочетании с полирадикулярными нарушениями

Неаллергическая профессиональная бронхиальная астма характеризуется

- А. Синдромом элиминации
- Б. Постепенным началом
- В. Отсутствием четкого синдрома элиминации при наличии симптома реэкспозиции
- Г. Отсутствием симптома реэкспозиции

При хронической интоксикации ртутью отмечают

- А. Гиперфункцию щитовидной железы
- Б. Гипофункцию щитовидной железы
- В. Гипогликемию
- Г. Гипергликемию

Для диагностики аллергического ринита применяют

- А. Специфическую иммунотерапию, рентгенографию органов грудной клетки и функцию внешнего дыхания
- Б. Скарификационные кожные тесты, исследование IgE в крови и цитологию носового секрета
- В. Провокационные тесты, пробное лечение гормональными препаратами и бактериологическое исследование полости носа
- Г. Рентгенографию околоносовых пазух, общий анализ мочи и кала на яйца глистов

К функциям врача здравпункта относят

- А. Проведение амбулаторного приема, организацию консультации специалистов и госпитализации в стационар, динамическое наблюдение за состоянием здоровья хронических больных и участие в комиссии по проведению периодических медицинских осмотров
- Б. Участие в предварительных и периодических осмотрах
- В. Проведение экспертизы профессиональной пригодности
- Г. Лечение и реабилитацию больных и инвалидов

Тератогенное действие на плод

- А. Оказывает пыль алюминия
- Б. Оказывает пыль асбеста
- В. Оказывают соединения свинца
- Г. Оказывает пыль хлопка

Острая интоксикация бензолом характеризуется поражением

- А. Нервной системы
- Б. Эндокринной системы
- В. Органа слуха
- Г. Опорно-двигательного аппарата

Для второй стадии марганцевой интоксикации характерны

- А. Функциональные изменения
- Б. Явления паркинсонизма
- В. Микроорганические изменения
- Г. Расстройства эмоциональной сферы

Синдром полиневропатии с миофиброзом плечевого пояса при вибрационной болезни по выраженности заболевания относится к ____ степени

- А. 3
- Б. 2
- В. 0
- Г. 1

К химическим соединениям раздражающе-удушающего действия, являющимися аллергенами, относят

- А. Соляную кислоту
- Б. Серную кислоту
- В. Диизоцианаты
- Г. Уксусную кислоту

При поражении фос средней степени для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи приемлема схема атропинизации _____ мл атропина сульфата 0,1 % _____ однократно, затем по _____ мл через каждые

- А. 2 Мл атропина сульфата 0,1% п/к однократно, затем по 1 мл через каждые; 3-5 часов до переатропинизации и далее поддерживающая фаза в течение 3 суток
- Б. 4 Мл атропина сульфата 0,1% в/м однократно, затем по 1-2 мл через каждые 10-15 мин, до легкой переатропинизации и далее на госпитальном этапе поддерживающая фаза в течение 2 суток
- В. 1-2 Мл атропина сульфата 0,1% в/м однократно, затем по 1 мл через каждые 30 мин, до симптомов легкой переатропинизации и далее поддерживающая фаза в течение суток
- Г. 6 - 8 Мл атропина сульфата 0,1% в/в однократно, затем по 2 мл через каждые 3-5 мин, до симптомов легкой переатропинизации и далее поддерживающая фаза в течение 3 суток

Для выявления обструктивных нарушений функции внешнего дыхания в первую очередь необходимо назначить проведение

- А. Шестиминутного нагрузочного теста
- Б. Спирометрии
- В. Диффузионного теста
- Г. Бодиплетизмографии

Профессиональное витилиго от истинного отличается

- А. Восстановлением пигментации в постконтактный период
- Б. Распространенностью
- В. Клиническими проявлениями
- Г. Локализацией

Наиболее важным клиническим признаком для диагностики алюминиевой астмы является

- А. Эффект раздражения дыхательных путей через сутки после контакта с агентом
- Б. Наличие антител к металлам-аллергенам
- В. Развитие фиброза в легких за короткий период работы
- Г. Появление респираторных симптомов на работе

Профессиональные заболевания кожи от факультативных раздражителей возникают

- А. Немедленно после контакта
- Б. При обострении заболеваний желудка
- В. При обострении хронического гепатита
- Г. После продолжительного контакта в процессе работы

Чаще всего причиной субарахноидального кровоизлияния является

- А. Артериальная гипертония
- Б. Аневризма или артериовенозная мальформация
- В. Прием антиагрегантов
- Г. Прием антикоагулянтов

Кровоточивость возникает при содержании тромбоцитов в крови менее _____ тысяч в мкл

- А. 50
- Б. 100
- В. 10
- Г. 40

Для типичной формы «свинцовой колики» характерны

- А. Жгучие боли в области сердца
- Б. Приступообразные боли в надлобковой области
- В. Схваткообразные боли в животе
- Г. Ноющие боли в поясничной области

К обязательным исследованиям для установления диагноза вибрационной болезни относят

- А. Динамометрию и аудиометрию
- Б. Общий анализ крови и мочи
- В. Паллестезиометрию и электронейромиографию
- Г. Рентгенографию органов грудной клетки

К симптомам, наиболее типичным для интерстициальных болезней легких, относят

- А. Сухой приступообразный кашель
- Б. Одышку инспираторного характера
- В. Обильное выделение мокроты
- Г. Боль в грудной клетке при глубоком вдохе

К химическим соединениям раздражающе-удушающего действия с сенсibiliзирующим эффектом относят

- А. Фталевый ангидрид, азотистую кислоту
- Б. Серную кислоту, соляную кислоту
- В. Диизоцианаты, фталевый ангидрид
- Г. Диоксид серы, плавиковую кислоту

К основным проявлениям наследственной полиневропатии относят

- А. Мышечные атрофии
- Б. Когнитивное снижение
- В. Эпилептический синдром
- Г. Болевой синдром

Лицам, работающим в контакте с промышленными аэрозолями, обязательно проведение

- А. Целевого медицинского обследования
- Б. Профилактического медицинского осмотра
- В. Диспансерного обследования
- Г. Периодического медицинского осмотра

К химическим соединениям, вызывающим некротические процессы в носовой полости с развитием перфорации носовой перегородки, относят

- А. Окись азота
- Б. Хром
- В. Фосген
- Г. Фосфор

К производственным процессам, при которых возможно отравление оксидом углерода, относят

- А. Горения, обжиг, испытания двигателей
- Б. Добычу угля открытым способом, транспортировку и хранение
- В. Лесозаготовку, транспортировку и хранение
- Г. Сборку автомобилей, их покраску и сушку

Основным путем выведения этиленгликоля из организма является

- А. С потом
- Б. Лёгочный
- В. Кишечный
- Г. Почечный

Поверхностная трихофития может быть профессиональным заболеванием у

- А. Животноводов
- Б. Парикмахеров
- В. Медицинских работников
- Г. Работников вивариев, зоопарков

Для аэрозолей высоко - и умеренно фиброгенного действия установлены пдксс не более (в мг/м³)

- А. 2,0
- Б. 5,0
- В. 1,0
- Г. 4,0

К обязательным медицинским противопоказаниям при пмо для работы в контакте с марганцем и его соединениями относят

- А. Острый инфаркт миокарда
- Б. Аллергические заболевания различных органов и систем
- В. Искривление носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию
- Г. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы

Согласно современной классификации пневмокониозов, второй стадии процесса соответствует кодовое обозначение размера узелков и степени распространенности процесса

- А. Q, p,s
- Б. S
- В. P
- Г. 3Q, 2p

Лечение больных интермиттирующей профессиональной бронхиальной астмой включает

- А. Применение системных глюкокортикостероидов
- Б. Применение бронходилататоров пролонгированного действия
- В. Ингаляции β 2-агонистов короткого действия по потребности
- Г. Ежедневное введение противовоспалительных препаратов

В основе бронхоспазма при atopической профессиональной астме лежит _____ тип гиперчувствительности

- А. Реагиновый
- Б. Смешанный
- В. Двойной
- Г. Замедленный

Условием для возникновения профессиональных изъязвлений кожи является

- А. Однократный контакт кожи с химическими веществами
- Б. УФО кожных покровов
- В. Длительный контакт кожи с химическими веществами
- Г. Повреждение кожных покровов

Для вибрационной болезни от воздействия высокочастотной вибрации 1 ст. Характерным является синдром

- А. Вегетомиофасцита
- Б. Периферический ангиодистонический с частыми приступами акроангиоспазма
- В. Периферический ангиодистонический с редкими приступами акроангиоспазма
- Г. Радикулополиневропатии

К преимущественному действию ароматических углеводов, при острой профессиональной интоксикации, относят

- А. Наркотическое
- Б. Гипоксическое
- В. Гемолитическое
- Г. Удушающее

Для обоснования профессиональной природы заболевания к критериям не относят

- А. Длительность стажа работы в контакте с профессиональной вредностью
- Б. Превышения ПДК, ПДУ на рабочем месте
- В. Возраст больного
- Г. Клиническую картину заболевания

Согласно номенклатуре к лечебно-профилактическим медицинским организациям относят

- А. Медико-санитарную часть
- Б. Центр военно-врачебной экспертизы
- В. Бюро медицинской статистики
- Г. Центр мобилизационных резервов

Злокачественные опухоли профессионального генеза вызываются агентами

- А. Только физическими и биологическими
- Б. Только химическими и биологическими
- В. Химическими, физическими и биологическими
- Г. Только химическими и физическими