

Тесты с вопросами по специальности «Профпатология» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/profpatolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Профпатология» для аккредитации и других экзаменов (1900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/profpatologiya/

2) Тесты для аккредитации «Гигиена труда» (800 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/gigiena_truda/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Для хронической интоксикации свинцом характерны

- А. токсическая энцефалопатия
- Б. синдром моторной дискинезии
- В. токсическая полинейропатия
- Г. сидероахристическая анемия
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации сурьмой и ее соединениями характерным является

- А. хронический токсический гепатит
- Б. хронический токсический бронхит
- В. аллергические заболевания кожи
- Г. токсическая полинейропатия
- Д. все перечисленное

Профессиональными заболеваниями кожи, вызванных аллергенами, являются

- А. витилиго, масляные угри, токсическая меланодермия
- Б. ирритантный контактный дерматит, химические ожоги кожи
- В. витилиго, меланодермия
- Г. аллергический контактный дерматит, экзема, аллергическая крапивница, фотоконтактный дерматит
- Д. ничего из перечисленного

Клиническим синдромом вибрационной болезни, связанной с воздействием общей вибрации, не является

- А. полинейропатия верхних и нижних конечностей с сенсорными нарушениями
- Б. мультифокальная энцефалопатия
- В. полинейропатия конечностей с сенсорными нарушениями в сочетании с пояснично-крестцовой радикулопатией
- Г. полинейропатия верхних и нижних конечностей с сенсорными и вегето-трофическими нарушениями
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации бензолом и его гомологами характерно развитие анемии

- А. железодефицитной
- Б. связанной с нарушением синтеза порфиринов
- В. гипопластической
- Г. гемолитической
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации хлоридом, сульфидом цинка характерны

- А. хронический токсический бронхит
- Б. ирритантный дерматит
- В. ожоги, язвы при попадании на кожу с исходом в рубцы
- Г. хронический токсический гепатит
- Д. все перечисленное

Основными изменениями системы крови при воздействии свинца являются

- А. ретикулоцитоз и увеличение эритроцитов с базофильной зернистостью
- Б. снижение количества эритроцитов и уровня гемоглобина
- В. лейкоцитоз и нейтропения
- Г. лейкоцитопения и тромбоцитопения
- Д. все перечисленное

Хронические профессиональные заболевания крови вызывают

- А. свинец и его соединения
- Б. мышьяковистый водород
- В. бензол и его гомологи
- Г. ионизирующее излучение
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями острого отравления цианистым водородом являются

- А. острый ларингит, острый ринит, острый фарингит
- Б. острый конъюнктивит
- В. вегетативная дисфункция, кома
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Клиническим проявлением острого отравления фосфором и его соединениями не является

- А. острый ринит, острый фарингит, острый ларингит
- Б. токсическая энцефалопатия
- В. ожоги кожи
- Г. острый трахеит, острый токсический бронхит
- Д. вегетативная дисфункция

Острое отравление нерастворимыми соединениями бериллия проявляется всем перечисленным, кроме

- А. острого токсического гепатита
- Б. литейной лихорадки
- В. острого токсического альвеолита
- Г. острого токсического бронхиолита
- Д. отека легких

Хронический пылевой бронхит развивается при стаже работы

- А. 6 месяцев
- Б. 2-5 лет
- В. 7-10 лет
- Г. не зависит от стажа работы
- Д. в постконтактный период через 5-10 лет

Необратимым компонентом бронхиальной обструкции является

- А. гипер- и дискриния
- Б. ларингоспазм
- В. склероз стенки бронхов
- Г. бронхоспазм
- Д. отек слизистой оболочки бронхов

Клиническими проявлениями острого отравления ванадием и его соединениями являются

- А. токсический альвеолит
- Б. литейная лихорадка
- В. острый токсический бронхит
- Г. острый токсический альвеолит
- Д. ничего из перечисленного

Для диагностики профессиональной бронхиальной астмы концентрация в воздухе рабочей зоны производственного аллергена имеет решающее значение

- А. не имеет
- Б. имеет
- В. все перечисленное
- Г. ничего из перечисленного

К обязательным методам исследования слуха при периодических медицинских осмотрах относятся

- А. пороговая тональная аудиометрия
- Б. исследование слуха с помощью камертона
- В. альгезиметрия
- Г. паллестезиометрия
- Д. проба Вебера

Для хронической интоксикации цианистым водородом характерна

- А. токсическопатия полинейропатия
- Б. токсическая нефропатия
- В. энцефалопатия токсическая
- Г. анемия токсическая
- Д. ничего из перечисленного

К профилактике профессиональных пылевых бронхитов не относится

- А. исключение воздействия неблагоприятного микроклимата
- Б. вакцинация против основных респираторных инфекций работающих в условиях запыленности
- В. внедрение технологий с подавлением пылевыделения в воздух рабочей зоны
- Г. курсы противовирусной терапии работающих в условиях запыленности
- Д. все перечисленное

Эрозии и перфорацию носовой перегородки вызывают все перечисленные химические вещества, кроме:

- А. фтора и его соединений
- Б. никеля и его соединений
- В. хрома и его соединений
- Г. кадмия и его соединений
- Д. мышьяка и его соединений

К профессиональным факторам, вызывающим депрессию кроветворения, относится

- А. хлорбензол
- Б. мышьяковистый водород
- В. свинец
- Г. монооксид углерода
- Д. гидроперекись изопропилбензола

Соединения хрома могут вызывать развитие всего перечисленного, исключая

- А. бронхит
- Б. бронхиальную астму
- В. рак легких
- Г. склеродермию
- Д. экзему

Злокачественные новообразования органов почек и мочевого пузыря вызываются

- А. диоксидом кремния, тальковой пылью
- Б. ароматическими аминосоединениями, ПАУ, содержащими 3,4-без(а)пирен, смазочными охлаждающими жидкостями, содержащими ПАУ и нитрозоамины
- В. свинцом и его соединениями, железом и его соединениями
- Г. диоксидом кремния, дисульфидом углерода
- Д. ванадием и его соединениями

Острое отравление окислами азота проявляется

- А. острым конъюнктивитом
- Б. острым ринофаринголарингитом, острым трахеитом
- В. острым токсическим бронхолитом, токсической пневмонией, отеком легких
- Г. острым дерматитом, ожогами кожи
- Д. всем перечисленным

Для острого отравления окисью углерода характерно все, кроме

- А. синкопального синдрома
- Б. карбоксигемоглобинемии
- В. энцефалопатии, комы
- Г. синдрома психомоторного возбуждения
- Д. летального исхода

Интоксикация тетраэтилсвинцом характеризуется

- А. астеническим синдромом, токсической энцефалопатией и психозом (делирием)
- Б. токсической нефропатией
- В. астеническим синдромом
- Г. токсической полинейропатией
- Д. острым депрессивным синдромом

Для диагностики вибрационной болезни не используются методы исследования

- А. кожная термометрия, холодовая проба
- Б. реовазография, электронейромиография
- В. паллестезиометрия
- Г. альгезиметрия, ВАШ
- Д. бодиплетизмография, эхокардиография, бронхоскопия

К проявлениям воздействия интенсивного производственного шума относятся

- А. хроническая ишемия головного мозга
- Б. болезнь Меньера
- В. нейросенсорная тугоухость
- Г. шумовые эффекты внутреннего уха
- Д. кондуктивная тугоухость

Для острого отравления сероводородом низких концентраций характерны

- А. острый ринит, фарингит, конъюнктивит, блефарит, головная боль, головокружение
- Б. сенсорная полинейропатия, токсическая энцефалопатия, генерализованное тревожное расстройство
- В. Сенсо-моторная понейропатия, депрессивный синдром
- Г. токсическая энцефалопатия, миелополинейропатия
- Д. токсическая энцефаопатия, депрессивный синдром

Литейная лихорадка характеризуется всем, кроме

- А. гипотонии
- Б. гипертермии
- В. сухого кашля
- Г. головной боли
- Д. общего недомогания

Профессиональными заболеваниями от воздействия биологического фактора являются все, кроме

- А. туберкулеза легких
- Б. ревматизма
- В. бруцеллеза
- Г. сибирской язвы
- Д. гепатита В и С

Для хронической интоксикации фтором и его соединениями не характерны

- А. Хронический эрозивный ринит с перфорацией носовой перегородки
- Б. остеопатия длинных трубчатых костей (флюороз скелета)
- В. хронический токсический бронхит, хронический токсический альвеолит,
- Г. хронический гепатит, хроническая нефропатия
- Д. хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз

Наиболее часто поражаемой (наряду с кровью) системой при хронической интоксикации углеводородами является

- А. бронхо-легочная система
- Б. нервная система
- В. опорно-двигательный аппарат
- Г. печень
- Д. ничего из перечисленного

Клинические проявления острого отравления пестицидами определяются

- А. способом поступления в организм работника
- Б. химическим составом
- В. способом поступления в организм работника
- Г. классом химической опасности
- Д. характером и механизмом действия
- Е. всем перечисленным

Клиническим синдромом вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, не является

- А. пояснично-крестцовая радикулопатия
- Б. периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей
- В. полинейропатия верхних конечностей с сенсорными и вегето-трофическими нарушениями
- Г. синдром карпального канала
- Д. полинейропатия верхних конечностей с сенсорными нарушениями

Для острого отравления двуокисью углерода характерны

- А. токсическая нефропатия, кома
- Б. гипоксическая энцефалопатия, кома, летальный исход
- В. токсическая полинейропатия
- Г. токсическая пневмония
- Д. токсическая анемия, токсическая энцефалопатия

После прекращения контакта с производственными факторами могут развиваться следующие профессиональные -заболевания

- А. вибрационная болезнь
- Б. хроническая интоксикация бензолом и его гомологами
- В. силикоз поздние формы
- Г. онкологические заболевания с локализацией по пути поступления производственного канцерогена
- Д. профессиональная бронхиальная астма

При хронической интоксикации окислами азота не развивается

- А. токсическая анемия
- Б. токсический пневмосклероз, хронический токсический бронхит
- В. хроническая обструктивная болезнь легких
- Г. келлоидные рубцы кожи
- Д. все перечисленное

Основными клиническими проявлениями неосложненных форм пневмокониозов являются

- А. Длительное бессимптомное течение заболевания и изменения вентиляционных показателей по рестриктивному типу
- Б. длительное бессимптомное течение заболевания и изменения вентиляционных показателей по обструктивному или смешанному типу
- В. Острое начало заболевания с высокой лихорадкой, кашель, одышка
- Г. Длительное бессимптомное течение заболевания и раннее формирование эмфиземы легких
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации бензолом и его гомологами не характерно в периферической крови

- А. гипер- или нормохромная анемия
- Б. лейкопения с относительным лимфоцитозом
- В. тромбоцитопения
- Г. значительное повышение сывороточного железа
- Д. ничего из перечисленного

Начальной стадией профессиональной токсической меланодермии является

- А. гиперемия
- Б. сетчатая пигментация
- В. фолликулярный гиперкератоз
- Г. везикулярный элемент
- Д. все перечисленное

При лазерном излучении поражаются

- А. орган зрения, печень
- Б. печень, костный мозг
- В. костный мозг, кожные покровы
- Г. кожные покровы, орган слуха
- Д. орган зрения, кожные покровы

Для острого воздействия аэрозолем цинка характерно развитие

- А. острого токсического бронхита
- Б. литейной лихорадки
- В. острого токсического гепатита
- Г. токсической нефропатии
- Д. ничего из перечисленного

Для развития силикоза является верным все перечисленное, кроме

- А. наличие крупноузловых форм
- Б. соответствие клинических проявлений рентгенологическим изменениям
- В. длительный контакт с кварцсодержащей пылью выше ПДК
- Г. нарушение функции внешнего дыхания
- Д. наличие прикорневых лимфоузлов в виде яичной скорлупы

Комплексное лечение вибрационной болезни включает все кроме

- А. витаминов группы В
- Б. сосудорасширяющих препаратов миотропного действия
- В. нестероидных противовоспалительных средств
- Г. комплексонов
- Д. ничего из перечисленного

Профессиональная пояснично-крестцовая радикулопатия развивается при воздействии

- А. инфракрасного излучения
- Б. общей вибрации рабочих мест
- В. физических нагрузок общего характера
- Г. локальной вибрации
- Д. ультразвука

Хром обладает всеми перечисленными действиями, кроме

- А. первичного раздражающего
- Б. sensibilizing
- В. гемолитического
- Г. канцерогенного
- Д. общетоксического

Клиническими проявлениями профессионального синдрома карпального канала являются

- А. односторонний характер поражения
- Б. постепенное развитие заболевания
- В. стаж работы не менее 5 лет с локальными нагрузками на руку
- Г. признаки компрессии срединного нерва на уровне луче-запястного сустава
- Д. все перечисленное

Профессиональными заболеваниями верхних дыхательных путей, вызванных производственными аллергенами, являются

- А. аллергический ринит, аллергический синусит, аллергический фарингит, аллергический ларингит, отек Квинке
- Б. субатрофический ринит, хронический фарингит
- В. хронический синусит, хронический фарингит
- Г. хронический фарингит, хронический ларингит
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации кобальтом и его соединениями не характерны

- А. хронический бронхит
- Б. хроническая обструктивная болезнь легких
- В. хронический гепатит
- Г. пневмосклероз
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации мышьяковистым водородом характерны

- А. вегетативная дисфункция
- Б. хронический токсический гепатит
- В. токсическая нефропатия
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Для "Свинцовой колики" характерно все кроме

- А. артериальной гипертензии
- Б. брадикардии
- В. схваткообразных болей в животе
- Г. симптома раздражения брюшины
- Д. длительных запоров

При хронической интоксикации бензолом наблюдаются

- А. лейкоцитоз, тромбоцитоз, эритроцитопения
- Б. тромбоцитоз, лейкопения, эритроцитопения
- В. лейкопения, тромбоцитопения, эритроцитопения
- Г. лейкоцитоз, тромбоцитопения, эритроцитопения
- Д. ничего из перечисленного

При диагностике пневмокониоза не учитывают следующие характеристики промышленной пыли

- А. степень фиброгенности
- Б. величина концентрации в воздухе рабочей зоны
- В. токсико-аллергические свойства
- Г. величина пылевой нагрузки
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями синдрома Рейно при воздействии локальной вибрации являются

- А. гипотермия и мраморность кистей
- Б. приступы побеления дистальных фаланг пальцев рук
- В. онемение и парестезии в кистях рук
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Особенностями профессиональной нейросенсорной тугоухости являются:

- А. двустороннее поражение органа слуха
- Б. постепенное начало
- В. начало поражения слуха с высоких частот
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации бензолом и его гомологами характерным являются

- А. цитопения, ретикулоцитоз и сокращение продолжительности жизни эритроцитов
- Б. нормохромная анемия и ускоренное СОЭ
- В. лейкоцитоз и ускоренное СОЭ
- Г. эритроцитоз и лейкоцитоз
- Д. все перечисленное

При остром отравлении металлическим оловом не развивается

- А. литейная лихорадка
- Б. острый токсический гепатит
- В. острый токсический альвеолит
- Г. острая токсическая пневмония
- Д. все перечисленное

Профессиональные злокачественные заболевания крови - лейкозы вызываются

- А. железом и его соединениями, ванадием и его соединениями
- Б. ионизирующим излучением, в том числе радионуклидами; бензолом, этиленоксидом, хлорорганическими соединениями, винилхлоридом
- В. свинцом и его соединениями, диоксидом кремния
- Г. тальковой пылью, фтором и его соединениями
- Д. ничего из перечисленного

За качество проведения периодического медицинского осмотра отвечает

- А. врач общей (семейной) практики
- Б. врач токсиколог
- В. врач профпатолог
- Г. врач терапевт участковый
- Д. все перечисленные

К осложнениям пневмокониозов, снижающих трудоспособность пациентов, не относится

- А. хронический ларингит
- Б. туберкулез легких
- В. сердечная и легочно-сердечная недостаточность
- Г. эмфизема легких
- Д. бронхоэктазы

Острые профессиональные заболевания крови вызывают

- А. свинец и его соединения
- Б. бензол и его гомологи
- В. висмут и его соединения
- Г. ртуть и ее соединения
- Д. все перечисленное

Легкая степень декомпрессионной (кессонной) болезни характеризуется:

- А. сыпью на коже и зудом
- Б. мышечными и суставными болями
- В. общим недомоганием
- Г. учащением пульса и дыхания
- Д. всем перечисленным

Профессиональным скелетно-мышечным заболеванием не является

- А. миофиброз предплечий
- Б. остеонекроз полулунной кости точной сборки
- В. эпикондилез плечевой кости
- Г. крепитирующий теносиновит предплечья
- Д. теносиновит тыльной связки запястья

Наиболее характерными для флюороза являются все перечисленные жалобы, кроме

- А. болей в костях
- Б. диспепсических расстройств
- В. резей при мочеиспускании
- Г. кашля
- Д. слабости, недомогания

К производственным факторам, ускоряющим развитие вибрационной болезни, относят все перечисленное кроме

- А. инфракрасного излучения
- Б. охлаждающего микроклимата
- В. статико-динамических физических нагрузок
- Г. токсических веществ (винилхлорид)
- Д. всего перечисленного

Для хронической интоксикации растворимыми соединениями бериллия не характерны

- А. хроническая обструктивная болезнь легких
- Б. токсический гепатит
- В. бериллиоз
- Г. хронический токсический бронхит
- Д. токсический пневмосклероз

В Перечень профессиональных заболеваний входят компрессионные нейропатии, за исключением

- А. синдрома запястного канала
- Б. синдрома кубитального канала
- В. синдрома верхней апертуры грудной клетки
- Г. компрессионной невропатии малого берцового нерва
- Д. всего перечисленного

Проявлениями острого отравления мышьяковистым водородом не является

- А. острый токсический гепатит
- Б. внутрисосудистый гемолиз, гемолитическая анемия
- В. токсическая полинейропатия
- Г. токсическая энцефалопатия
- Д. токсическая нефропатия

Для хронической интоксикации отравляющими веществами кожно-нарывного действия характерны

- А. хронический обструктивный бронхит, токсический пневмосклероз
- Б. хронический дерматит
- В. рубцовый кератит (помутнение роговицы)
- Г. ничего из перечисленного
- Д. все перечисленное

К заболеваниям, связанным с воздействием охлаждающего производственного климата относят все перечисленное, кроме

- А. хронической обструктивной болезни легких
- Б. облитерирующего эндартериита
- В. полинейропатии конечностей (сенсорная форма)
- Г. периферического ангиодистонического синдрома конечностей
- Д. всего перечисленного

Клиническими проявлениями острого отравления отравляющими веществами кожно-нарывного действия являются

- А. вегетативная дисфункция, токсическая энцефалопатия
- Б. острый ларинготрахеобронхит
- В. эритроматозно-буллезный дерматит
- Г. токсическая кома
- Д. все перечисленное

Для злокачественных профессиональных заболеваний кожи не является характерным

- А. локализация в местах наиболее частого воздействия производственного канцерогена
- Б. наличие фоновых предопухолевых заболеваний кожи
- В. различная локализация, поражение придатков кожи
- Г. гистологически базально-клеточный или плоскоклеточный рак
- Д. все перечисленное

Патогенез развития интоксикации свинцом и его соединениями включает

- А. угнетение стволовой клетки костного мозга
- Б. нарушение биосинтеза порфиринов и гема
- В. образование метгемоглобина
- Г. гемолиз эритроцитов
- Д. ничего из перечисленного

Какой показатель спирометрии лучше показывает бронхиальную обструкцию при профессиональном ХОБЛ

- А. диффузионная способность (по CO_2)
- Б. остаточный объем
- В. максимальная вентиляция легких (МВЛ)
- Г. проба Тиффно
- Д. жизненная емкость легких (ЖЕЛ)

Для злокачественного новообразования костей (саркомы) профессиональной характерны

- А. редкая локализация, наличие предшествующих производственных травм той же локализации
- Б. частая локализация, генетическая предрасположенность
- В. генетическая предрасположенность, кратковременная экспозиция производственных канцерогенов
- Г. частая локализация, кратковременная экспозиция производственных канцерогенов
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации пестицидами является характерным все перечисленное, кроме

- А. токсического гастроэнтерита, хронического токсического колита, токсический гепатита
- Б. вегетативной дисфункции, токсической энцефалопатии, хронического энцефаломиелита, полинейропатии
- В. хронического контактного дерматита
- Г. хронической нефропатии, анемии
- Д. хронического парадонтита, гингивита

К физическим факторам, характеризующим состояние производственного микроклимата, относятся

- А. температура воздуха
- Б. влажность воздуха
- В. инфракрасные излучения
- Г. скорость движения воздуха
- Д. все перечисленное

Для силикоза и диссеминированного туберкулеза легких не характерно

- А. симметричность поражения легких
- Б. локализация очаговых теней в кортикальном отделе легких
- В. увеличение прикорневых лимфоузлов
- Г. асимметрия поражения легких
- Д. вовлечение в патологический процесс плевры

Злокачественные новообразования кожи вызываются следующими вредными производственными факторами канцерогенного действия

- А. бензолом и его производными, этиленоксидом, хлорорганическими соединениями, винилхлоридом
- Б. бета-нафтиламином, поливинилхлоридом, вирусами гепатита В и С, этиленоксидом
- В. нефтепродуктами, каменноугольными смолами, мышьяком и его соединениями, никелем, хромом и его соединениями, ультрафиолетовым излучением, ионизирующим излучением
- Г. бета-нафтиламином, поливинилхлоридом, вирусами гепатита В и С,
- Д. ничем из перечисленного

Для интоксикации свинцом и его соединениями характерным изменением в крови является

- А. снижение уровня сывороточного железа
- Б. лейкопения
- В. повышение уровня протопорфирина эритроцитов
- Г. снижение уровня аминолевулиновой кислоты
- Д. все перечисленное

клиническими проявлениями острого отравления органическими цианидами являются все перечисленное, кроме

- А. токсического гепатита
- Б. острого конъюнктивита
- В. острого ринита, острого фарингита
- Г. токсической энцефалопатии, комы
- Д. вегетативной дисфункции

Декомпрессионная (кессонная) болезнь не может приводить к развитию

- А. стойких нарушений центральной нервной системы
- Б. синдрома Меньера
- В. хронических заболеваний костно-суставной системы (остеонекрозов)
- Г. заболеваниям сердца и сосудов
- Д. хронического гепатита

Какое утверждение не характерно для профессионального остеоартроза

- А. острое начало заболевания, множественность поражения суставов
- Б. постепенное развитие заболевания, множественность поражения суставов
- В. постепенное развитие заболевания, избирательность поражения сустава (-ов)
- Г. острое начало заболевания, избирательность поражения сустава
- Д. все перечисленное

К виброопасным профессиям относятся все перечисленные, кроме

- А. обрубщика
- Б. проходчика
- В. полировщика
- Г. оператора машинного зала
- Д. слесаря механо-сборочных работ

Характерной для флюороза формой поражения зубов является

- А. кариес
- Б. крапчатость эмали
- В. пульпит
- Г. парадонтит
- Д. ничего из перечисленного

Профессиональным заболеванием, для развития которого не требуется длительный контакт с производственным фактором, является

- А. бронхиальная астма
- Б. талькоз
- В. силикоз
- Г. вибрационная болезнь
- Д. силикатоз

Для периферического ангиодистонического синдрома верхних конечностей характерна

- А. нормальная температура кожи
- Б. сухость кожных покровов
- В. нормальная окраска кожных покровов
- Г. гипотермия кожи, влажность ладоней, мраморно-цианотичная окраска кожных покровов
- Д. ничего из перечисленного

К наиболее тяжелой форме пневмокониоза из группы силикатозов относится

- А. асбестоз
- Б. талькоз
- В. коалиноз
- Г. цементный пневмокониоз
- Д. оливинный пневмокониоз

Начало вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации

- А. острое
- Б. подострое
- В. хроническое
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Веществами раздражающего действия являются все перечисленные, кроме

- А. азота диоксид и азота оксид
- Б. фтора и его соединений
- В. хлора и его соединений
- Г. дигидросульфид (Сернистый газ)
- Д. ртути и ее соединений

Клиническими проявлениями острого отравления никелем и его соединениями являются

- А. острый ринит
- Б. острый ларингит
- В. литейная лихорадка
- Г. острый фарингит
- Д. все перечисленное

Санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания составляет

- А. работодатель -администрация предприятия
- Б. главный врач медицинской организации, установившей диагноз профессионального заболевания
- В. цеховой врач-терапевт
- Г. санитарный врач управления Роспотребнадзора
- Д. врач профпатолог

Диагностическими признаками профессиональной нейросенсорной тугоухости являются все перечисленные, кроме:

- А. раннего повышения порогов слуха на частоте 4000 Гц
- Б. постепенного снижения слуха
- В. одностороннего поражения слуха
- Г. двустороннего поражения слуха
- Д. медленного прогрессирующего течения заболевания

Для острого отравления и хронических интоксикаций, связанных с воздействием комплекса химических веществ характерны

- А. токсическая энцефалопатия и полинейропатия
- Б. токсический гепатит, анемия, вегетативная дисфункция
- В. токсический бронхит, токсическая энцефалопатия, анемия
- Г. поражение различных органов и систем, определяемое химическим составом токсикантов
- Д. ничено из перечисленного

В лечении выраженной стадии интоксикации свинцом и его соединениями наиболее показано

- А. переливание крови
- Б. комплексоны (тетацин кальция)
- В. препараты железа
- Г. витамины группы В
- Д. спазмолитики

Для рентгенологических изменений при силикозе не характерно наличие

- А. округлых негомогенных теней с нечеткими контурами
- Б. мономорфность теней
- В. симметричное затемнение преимущественно в нижних отделах легких
- Г. буллезной эмфиземы
- Д. изменение прикорневых лимфоузлов по типу "яичной скорлупы"

Полинейропатия верхних конечностей при вибрационной болезни от локальной вибрации умеренной степени характеризуется

- А. моторными нарушениями
- Б. сенсо-моторными нарушениями
- В. сенсорными и вегетативно-трофическими нарушениями
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями хронической интоксикации бензолом средней степени являются

- А. головная боль, кашель с мокротой
- Б. кашель с мокротой, приступы острых болей в животе
- В. головная боль, артериальная гипертензия
- Г. головная боль, артериальная гипотония
- Д. приступы острых болей в животе, артериальная гипотония

Для хронической интоксикации фосфором и его соединениями характерно все перечисленное, кроме

- А. хронического токсического бронхита, пневмосклероза
- Б. остеопатии костей нижней челюсти, токсической анемии
- В. помутнения роговицы, рубцов на коже, хронического токсического гепатита
- Г. токсической полинейропатии
- Д. токсической энцефалопатии, вегетативной дисфункции

При локальной вибрации не поражаются

- А. периферические нервы
- Б. периферические сосуды
- В. желудочно-кишечный тракт
- Г. скелетно-мышечная система
- Д. все перечисленное

Злокачественные новообразования органов дыхания вызываются следующими вредными производственными факторами канцерогенного действия

- А. хром и его соединения, никель, асбест, тальковая пыль, ПАУ, формальдегиды, уран, радон, соединения бериллия и кадмия, диоксид кремния
- Б. винилхлорид и продукты его полимеризации, афлатоксины, технический углерод, паразиты
- В. хром и его соединения, никель, мышьяк, асбест, тальковая пыль, ПАУ, формальдегиды, уран, радон, соединения бериллия и кадмия, диоксид кремния
- Г. хром и его соединения, никель, мышьяк, асбест, тальковая пыль, ПАУ, формальдегиды, уран, радон, соединения бериллия и кадмия, диоксид кремния, акрилонитрил
- Д. все перечисленное, кроме 2

Начальными проявлениями пневмокониозов являются

- А. одышка в покое и отсутствие аускультативных изменений в легких
- Б. нерезко выраженные диффузные изменения на рентгенограмме в легких
- В. локальные изменения на рентгенограмме органов грудной клетки справа
- Г. отсутствие жалоб на здоровье
- Д. все перечисленное

Острое отравление парами металлической ртути характеризуется

- А. металлическим вкусом во рту
- Б. головной болью и общим недомоганием
- В. лихорадочным состоянием
- Г. рвотой и поносом
- Д. всем перечисленным

Рациональными комбинациями для лечения Вибрационной болезни являются все перечисленные, кроме

- А. Витамины группы В, спазмолитики
- Б. Спазмолитики, витамины группы В, НПВС
- В. Спазмолитики, витамины группы В, НПВС, антидепрессанты
- Г. Спазмолитики, антибиотики, метаболики
- Д. Витамины группы В, антиагреганты

Для развития силикоза не является характерным

- А. ранее развитие синдрома интоксикации
- Б. прогрессирующее течение
- В. симметричный пневмофиброз,
- Г. нарушение перфузионно-диффузионной способности легких
- Д. развитие легочного сердца

Для острого отравления сероводородом высоких концентраций характерны

- А. головная боль, головокружение, адинамия, патологические рефлексy
- Б. головная боль, головокружение, преходящее нарушение сознания
- В. головная боль, головокружение, цианоз лица и конечностей, адинамия, утрата сознания, летальный исход
- Г. цианоз лица и конечностей, адинамия, утрата сознания, летальный исход
- Д. адинамия, утрата сознания, летальный исход

Течение фиброзного процесса при силикозах является

- А. медленно прогрессирующим
- Б. быстро прогрессирующим
- В. регрессирующим
- Г. стабильным
- Д. все перечисленное

Синдром Рейно пальцев рук развивается при воздействии локальной вибрации

- А. низких частот
- Б. средних частот
- В. высоких частот
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Хроническая интоксикация марганцем и его соединениями клинически характеризуется

- А. деменцией, тетрапарезом
- Б. вегетативной дисфункцией, токсической энцефалопатией (марганцовый паркинсонизм), деменцией
- В. гемиплегией, деменцией
- Г. токсической анемией, вегетативной дисфункцией
- Д. всем перечисленным

Для профессиональной нейросенсорной тугоухости не является характерным

- А. Двусторонний характер поражения
- Б. Наличие зубца Кархарта при аудиометрии
- В. Стаж работы в условиях производственного шума выше ПДУ свыше 10 лет
- Г. Наличие костно-воздушной диссоциации при аудиометрии
- Д. постепенное начало заболевания

Синдром Рейно вибрационной этиологии развивается при воздействии на руки

- А. локальной вибрации низких частот
- Б. локальной вибрации разных частот
- В. локальной вибрации высоких частот
- Г. общей вибрации разных частот
- Д. все перечисленное

К заболеваниям, связанным с воздействием интенсивного теплового излучения, нагревающего производственного климата относят

- А. тепловой удар
- Б. тепловой обморок
- В. тепловая судорога
- Г. тепловое обезвоживание
- Д. все перечисленное

Профессиональную гипопластическую анемию вызывают

- А. сероуглерод, ионизирующее излучение
- Б. ионизирующее излучение, электросварочный аэрозоль
- В. ионизирующее излучение, бензол
- Г. ванадий и его соединения, железо и его соединения
- Д. диоксид углерода, окислы азота

Для синдрома Рейно от воздействия локальной вибрации характерно

- А. несимметричное побеление пальцев рук
- Б. несимметричный цианоз пальцев рук
- В. симметричное побеление пальцев рук
- Г. симметричное побеление пальцев рук и ног
- Д. генерализованный акроангиоспазм

Особенностью профпатологии как клинической дисциплины является тесная связь с

- А. гигиеной труда
- Б. службой охраны труда и промышленной безопасности
- В. общей клинической патологией
- Г. фондом социального страхования
- Д. всем перечисленным

Острое отравление газообразным хлором проявляется всем перечисленным, кроме

- А. острого конъюнктивита, острого кератита
- Б. острого ринита, острого фарингита, острого ларингита
- В. острого токсического гепатита
- Г. острого необструктивного токсического бронхита
- Д. токсической пневмонии, отека легких

Уровни воздействия вредного производственного фактора (ПДК, ПДУ) влияют на

- А. сроки развития профессионального заболевания
- Б. тяжесть течения профессионального заболевания
- В. клинические проявления профессионального заболевания
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями поражения верхних дыхательных путей, связанные с воздействием аэрозолей сложного состава являются

- А. хронический синусит
- Б. хронический фарингит
- В. хронический ринофаринголарингит, хронический гиперпластический ларингит
- Г. хронический ларингит
- Д. ничего из перечисленного

Ведущими клиническими синдромами при хроническом воздействии ЭМИ радиочастот, являются все перечисленные, исключая:

- А. гематологический (лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения)
- Б. полинейропатии
- В. вегетативной дисфункции
- Г. гипоталамический
- Д. все перечисленное

Злокачественные новообразования печени вызываются следующими вредными производственными факторами канцерогенного действия

- А. мышьяком, афлатоксинами, радиоактивными веществами, винилхлоридом, формальдегидом, техническим углеродом, вирусами, паразитами
- Б. диоксидом кремния, тальковой пылью
- В. свинцом и его соединениями, дисульфидом углерода, железом и его соединениями
- Г. свинцом и его соединениями, железом и его соединениями, ванадием и его соединениями
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации кадмием и его соединениями не характерны

- А. эрозия носовой перегородки
- Б. хронический бронхит, пневмосклероз, эмфизема легких
- В. токсическая остеопатия
- Г. гипохромная анемия
- Д. хронический токсический гепатит, хроническая нефропатия

Причиной дыхательной недостаточности при силикатозах чаще является

- А. выраженность фиброза легочной ткани
- Б. развитие бронхолегочных осложнений
- В. развитие сердечной недостаточности
- Г. слабость дыхательной мускулатуры
- Д. ничего из перечисленного

При пылевом бронхите бронхоспазм обусловлен

- А. гиперсекрецией и деформацией бронхов
- Б. рефлекторным раздражением слизистых бронхов и сенсibilизацией организма
- В. атрофией слизистых бронхов и бронхиальных желез
- Г. атрофией слизистой бронхов и сенсibilизацией организма
- Д. атрофией слизистых бронхов и гиперсекрецией

К симптомам, характерным для острого воздействия ЭМИ радиочастот, относятся все перечисленные, кроме:

- А. мышечной слабости
- Б. повышенной жажды
- В. болей в эпигастральной области
- Г. нарушения сердечной деятельности
- Д. гипоталамических кризов

При диагностике профессиональной бронхиальной астмы следует исключить

- А. тиреотоксикоз
- Б. тромбоэмболию легочной артерии
- В. инфекционно-аллергическую бронхиальную астму
- Г. гипервентиляционный синдром
- Д. острую пневмонию
- Е. все перечисленное

Анемия развивается при следующих профессиональных заболеваниях:

- А. силикозе
- Б. хронической интоксикации свинцом и его соединениями
- В. хронической лучевой болезни
- Г. вибрационной болезни
- Д. хронической интоксикации ванадием

Основными диагностическими методами профессионального бронхита являются

- А. спирометрия
- Б. бронхоскопия
- В. компьютерная томография органов грудной клетки
- Г. бодиплетизмография
- Д. биохимический и иммунологический анализы крови
- Е. все перечисленное

Этиологическими производственными факторами профессиональной бронхиальной астмы являются

- А. химические и биологические
- Б. метеорологические
- В. физические
- Г. психоэмоциональные
- Д. все перечисленное

Злокачественные новообразования костей вызываются следующими вредными производственными факторами канцерогенного действия

- А. бета-нафтиламином, хромом и его соединениями, поливинилхлоридом
- Б. формальдегидом, дифенилами, этилен оксидом, бензолом и его производными
- В. радиоактивными веществами с большим периодом полураспада
- Г. бета-нафтиламином, ванадием и его соединениями, поливинилхлоридом, вирусами гепатита В и С
- Д. ничем из перечисленного

Поражение следующих суставов не входит в Перечень профессиональных заболеваний

- А. локтевых
- Б. плечевых
- В. тазобедренных
- Г. коленных
- Д. все перечисленное

Факторами труда, вызывающими развитие теносиновита предплечья, являются все перечисленные, кроме

- А. физических нагрузок локального характера
- Б. региональных физических нагрузок
- В. стереотипных рабочих движений пальцами рук
- Г. общей вибрации разных частот
- Д. ультрафиолетового излучения

Диагностический алгоритм вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, включает в себя

- А. гипалгезию дистальных отделов рук
- Б. периферические сосудистые и вегето-трофические расстройства кистей
- В. повышение порогов болевой и вибрационной чувствительности
- Г. гипотермию кистей и положительную холодовую пробу
- Д. все перечисленное

Для злокачественных новообразований органов дыхания характерно все перечисленное, кроме

- А. отсутствия латентного периода
- Б. длительного периода экспозиции
- В. длительного латентного (постконтактного) периода
- Г. частого сочетания с раком кожи

Для хронической интоксикации таллием и его соединениями не характерны

- А. токсическая энцефалопатия
- Б. астенический и депрессивный синдромы
- В. хронический токсический гепатит
- Г. аллопеция
- Д. хронический гастрит

Клиническим проявлениями острого отравления формальдегидом не являются

- А. острый конъюнктивит
- Б. токсическая анемия
- В. острый ринит, острый фарингит, острый ларингит
- Г. острый бронхит, отек легких
- Д. ирритантный дерматит

Синдром карпального канала при вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, характерен для

- А. умеренно выраженной степени заболевания
- Б. начальной степени заболевания
- В. начальной и умеренной степени заболевания
- Г. развитие синдрома не характерно
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации газообразным хлором не характерны

- А. хронический конъюнктивит, хронический кератит
- Б. хронический гепатит
- В. Хронический ринит, хронический фарингит, хронический ларингит
- Г. бронхиальная астма
- Д. хронический необструктивный бронхит, токсический пневмосклероз, хроническая обструктивная болезнь легких

Профессиональный эпидермоз клинически проявляется

- А. сетчатой пигментацией
- Б. сухостью и шелушением
- В. инфильтрацией и гиперемией
- Г. везикулярными элементами
- Д. всем перечисленным

Клиническими проявлениями острого отравления медью и ее соединениями являются

- А. острый токсический гепатит
- Б. литейная лихорадка, острый ринофарингит, токсический отек легких, острый токсический альвеолит
- В. токсическая нефропатия
- Г. острый энтероколит
- Д. острый лейкоз

Профессиональную этиологию бронхиальной астмы исключают

- А. положительные тесты с бактериальными и пылевыми аллергенами
- Б. отрицательные тесты с бронхолитиками при спирометрии
- В. отрицательные тесты с профессиональными аллергенами
- Г. отрицательные иммунологические тесты с профессиональными аллергенами
- Д. все перечисленное

Диагностический алгоритм вибрационной болезни, связанной с воздействием общей вибрации, не включает в себя

- А. гипалгезию дистальных отделов рук и ног
- Б. периферические сосудистые и вегето-трофические расстройства кистей и стоп
- В. угнетение сухожильных рефлексов с верхних и нижних конечностей, атрофию мышц кистей и стоп
- Г. повышение порогов болевой и вибрационной чувствительности
- Д. гипотермию кистей и стоп

Проявлениями острого отравления хромом и его соединениями не является

- А. синдром раздраженного кишечника
- Б. острый токсический бронхит, отек легких
- В. острый токсический бронхит
- Г. токсическая пневмония
- Д. острый ринофаринголарингит

При хронической интоксикации свинцом и его соединениями анемия является

- А. железодефицитной
- Б. гипопластической
- В. гемолитической
- Г. связанной с нарушением синтеза порфиринов
- Д. связана с нарушением синтеза ДНК и РНК

При хронической интоксикации ароматическими углеводородами поражаются в основном

- А. верхние дыхательные пути и моче-выделительная система
- Б. органы кроветворения и нервная система
- В. органы дыхания и нервная система
- Г. желудочно-кишечный тракт и органы кроветворения
- Д. ничего из перечисленного

Основными органами и системами, страдающими при хроническом воздействии ЭМИ радиочастот, являются все перечисленные, за исключением:

- А. сердечно-сосудистой системы
- Б. ЦНС
- В. органа зрения
- Г. органов дыхания

Острое отравление парами металлической ртути развивается при

- А. длительном воздействии низких концентраций паров ртути
- Б. воздействии высоких концентраций паров ртути в течение нескольких рабочих смен
- В. воздействии высоких концентраций паров ртути в течение одной рабочей смены
- Г. однократном воздействии металлической ртути на кожу кистей рук во время работы
- Д. все перечисленное

Острые формы профессиональных заболеваний (отравлений) расследуются

- А. участковым врачом терапевтом
- Б. врачом токсикологом
- В. санитарным врачом управления Роспотребнадзора
- Г. специалистом по охране труда и промышленной безопасности
- Д. работодателем- руководителем организации

Для хронической интоксикации медью и ее соединениями не характерны

- А. Хронический бронхит
- Б. токсическая нефропатия
- В. хронический токсический альвеолит
- Г. повторные литейные лихорадки
- Д. хронический гепатит

клиническими проявлениями острого отравления фтором и его соединениями являются все перечисленное, кроме

- А. острого конъюнктивита, ожога глаз
- Б. острого ринита, в том числе эрозивного; острого фарингита, острого ларингита, ларингоспазма
- В. токсической энцефалопатии, токсической полинейропатии
- Г. острого трахеита, токсического бронхита и бронхиолита, токсической пневмонии, отека легких
- Д. ожога кожи, эпидермоза

Какое профессиональное заболевание из перечисленных протекает с синдромом Рейно?

- А. вибрационная болезнь
- Б. хроническая интоксикация бензолом и его гомологами
- В. Хроническая интоксикация свинцом
- Г. Острая лучевая болезнь
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации тринитротолуолом не является характерным

- А. хронический токсический гепатит
- Б. анемия нормохромная
- В. токсическая энцефалопатия
- Г. токсическая катаракта
- Д. все перечисленное

Клиническими проявления острого отравления пестицидами не являются

- А. токсический гастроэнтерит, токсический колит, токсический гепатит
- Б. острый стоматит, парадонтит
- В. токсическая энцефалопатия, токсическая кома, энцефаломиелит, полинейропатия
- Г. острый контактный дерматит
- Д. токсическая кардиомиопатия
- Е. острый бронхит, токсическая пневмония, отек легких

Субъективными проявлениями профессиональной нейросенсорной тугоухости являются

- А. боль в ушах
- Б. головокружение
- В. головная боль
- Г. снижение слуха на оба уха
- Д. шум в обоих ушах

Наиболее информативным методом для выявления нейросенсорной тугоухости при проведении ПМО является:

- А. отоскопическое обследование
- Б. исследование шепотной речи
- В. исследование вестибулярного аппарата
- Г. аудиометрия
- Д. все перечисленное

При асбестозе характерным рентгенологическим типом фиброза является

- А. узелковый
- Б. интерстициальный
- В. узелковый и интерстициальный
- Г. ничего из перечисленного
- Д. все перечисленное

При диагностике вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, необходимо исключить

- А. Болезнь Рейно и синдром Рейно другой этиологии, токсические и метаболические полинейропатии, острые и хронические ХДПН
- Б. Заболевания соединительной ткани, лимфогрануломатоз, системные васкулиты
- В. Заболевания периферических сосудов при атеросклерозе и сахарном диабете
- Г. Заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания мочевыделительной системы
- Д. все перечисленное, кроме 4

Для хронической интоксикации бензолом и его гомологами характерно поражение следующей функции кроветворения

- А. эритропоэтической
- Б. лейкопоэтической
- В. мегакариоцитарной
- Г. всех отростков одновременно
- Д. ничего из перечисленного

К медицинским организациям, имеющим право связи заболевания с профессией относятся

- А. муниципальные диагностические центры
- Б. городские поликлиники
- В. центры профессиональной патологии
- Г. центры профилактической медицины
- Д. все перечисленное

К обязательным методам исследования при воздействии вибрации при периодических медицинских осмотрах относятся

- А. исследование вибрационной чувствительности с помощью камертона
- Б. паллестезиометрия
- В. холодовая проба
- Г. биохимический анализ крови
- Д. психологическое тестирование

Носительством ртути, свинца и других металлов считают

- А. повышение их содержания в биологических средах при отсутствии клинических признаков интоксикации
- Б. повышение их содержания в биологических средах при наличии отдельных клинических признаков интоксикации
- В. Содержание их в биологических средах в пределах референтных значений при отсутствии клинических признаков интоксикации
- Г. содержание их в биологических средах в пределах референтных значений при наличии отдельных клинических признаков интоксикации
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации фосфорорганическими отравляющими веществами не характерны

- А. токсическая энцефалопатия, когнитивные нарушения
- Б. гиперхромная анемия
- В. хронический токсический гепатит
- Г. вегетативная дисфункция
- Д. гипохромная анемия

Клиническими проявлениями острого отравления фосфоорганическими отравляющими веществами не являются

- А. острый токсический гепатит, острый энтероколит
- Б. токсическая энцефалопатия с миозом, токсическая полинейропатия токсическая кома
- В. бронхоспазм, токсический отек легких
- Г. вегетативно-сосудистая дисфункция
- Д. все перечисленное

При хронической интоксикации органическими цианидами не развивается

- А. ожоги при попадании на кожу
- Б. хронический бронхит
- В. токсическая энцефалопатия
- Г. гипохромная анемия умеренная
- Д. все перечисленное

Из перечисленных препаратов комплексонами являются

- А. глютаминовая кислота
- Б. D-пеницилламин
- В. тетацин кальция
- Г. унитиол
- Д. тиосульфат натрия

Клиническими проявлениями полинейропатии верхних конечностей являются

- А. ноющие боли в руках, онемение и парестезии в кистях
- Б. гипалгезия полиневритического типа, снижение вибрационной чувствительности
- В. гипотермия и мраморность кистей
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации пара-трет-бутилфенолом характерно развитие

- А. ирритативного дерматита
- Б. витилиго
- В. токсической анемии
- Г. токсической полинейропатии
- Д. ничего из перечисленного

Тепловой удар развивается при сочетании:

- А. повышенной температуры воздуха и ионизирующего излучения
- Б. повышенной температуры воздуха и лазерного излучения
- В. повышенной температуры и высокой влажности воздуха
- Г. инфракрасного излучения и высокой скорости движения воздуха
- Д. ничего из перечисленного

Злокачественные новообразования желудка вызываются следующими вредными производственными факторами канцерогенного действия

- А. диоксидом кремния, дисульфидом углерода, железом и его соединениями
- Б. свинцом и его соединениями, дисульфидом углерода, ванадием и его соединениями
- В. хромом шестивалентным, никелем, асбестом, угольными и графитовыми изделиями, ионизирующим излучением
- Г. диоксидом кремния, тальковой пылью, железом и его соединениями
- Д. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями ранней стадии силикоза является все перечисленное кроме

- А. сухого кашля
- Б. синдрома интоксикации
- В. одышки при незначительной физической нагрузке
- Г. боли в грудной клетке при дыхании
- Д. ослабленного жесткого дыхания над нижнебоковыми отделами легких

Для хронической интоксикации оловом и его соединениями характерно все перечисленное, кроме

- А. токсической нефропатии
- Б. токсического гепатита
- В. хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких
- Г. повторных литейных лихорадок
- Д. пневмокониоза

Клиническими проявлениями острого токсического воздействия кадмия и его соединений являются

- А. острый токсический трахеит и бронхит, токсический бронхиолит, токсическая пневмония, отек легких
- Б. острый токсический гепатит
- В. острый ринофаринголарингит, острый трахеит, острый бронхит
- Г. токсическая нефропатия
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации нитро- и аминопроизводными бензола и его гомологов характерно все перечисленное, кроме

- А. вегетативной дисфункции
- Б. рецидивирующей анемии умеренной
- В. хронического токсического бронхита
- Г. токсической энцефалопатии
- Д. хронического токсического гепатита

Возникновение синдрома Рейно при воздействии локальной вибрации не провоцируется

- А. общим озноблением организма
- Б. воздействием локальной вибрации на руки работника
- В. психо-эмоциональными нагрузками
- Г. общим перегреванием организма
- Д. местным охлаждением кистей рук

Для лечение силикоза никогда не применяют

- А. ингаляции натрия бикарбоната 2%
- Б. УФО грудной клетки
- В. преднизолон
- Г. гипербарическую оксигенацию
- Д. лечебную физкультуру

Для хронической интоксикации марганцем характерна

- А. сенсо-моторная полинейропатия
- Б. токсическая энцефалопатия (марганцовый паркинсонизм)
- В. токсическая полинейропатия
- Г. полинейропатия с сенсорными нарушениями
- Д. токсическая энцефалопатия с явлениями гемипареза/паралича

В основу современной классификации профессиональной бронхиальной астмы положен принцип

- А. профессиональной принадлежности
- Б. этиологический
- В. патогенетический
- Г. прогностический
- Д. все перечисленное

Клиническими особенностями профессионального лейкоза являются

- А. часто развитие острого лейкоза миелобластного, длительная предшествующая цитопения, длительная экспозиция 10 лет и более производственных канцерогенов, возможность развития в постконтактный период
- Б. острое развитие лейкоза при короткой экспозиции производственных канцерогенов
- В. хроническое течение лейкоза при короткой экспозиции производственных канцерогенов
- Г. лейкоз лимфобластный, короткая экспозиция производственных канцерогенов, развитие в постконтактный период
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации дисульфидом углерода характерны

- А. генерализованное тревожное расстройство
- Б. токсическая полинейропатия
- В. вегетативная дисфункция
- Г. токсическая энцефалопатия
- Д. все перечисленное

Для диагностики свинцовой интоксикации необходимо исследовать в моче:

- А. белок
- Б. аминолевулиновую кислоту
- В. мочевую кислоту
- Г. уробилин
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями острого отравления дисульфидом углерода являются все перечисленное, кроме

- А. комы
- Б. вегетативно-сосудистой дисфункции
- В. токсической энцефалопатии
- Г. острого токсического гепатита
- Д. всего перечисленного

Для хронической интоксикации парами металлической ртути не характерно появление

- А. навязчивых мыслей
- Б. головной боли
- В. тахикардии, колебаний артериального давления
- Г. повышенной нервной истощаемости, эмоциональной лабильности
- Д. нарушение ритма сна

При воздействии фиброгенной пыли изменения слизистых верхних дыхательных путей (ВДП) проявляются

- А. Эрозии слизистых ВДП
- Б. Гипертрофией и атрофией эпителия
- В. Воспалительными изменениями
- Г. отсутствием изменений слизистых
- Д. ничего из перечисленного

профессиональные заболевания скелетно-мышечной системы вызываются всем перечисленным, кроме:

- А. динамических физических нагрузок
- Б. статических физических нагрузок
- В. вынужденной, неудобной или фиксированной рабочей позы
- Г. вибрации
- Д. все перечисленные

Расследования случая развития острого профессионального заболевания (отравления) должно быть проведено в течение

- А. одной недели
- Б. одного месяца
- В. одних суток
- Г. трех суток
- Д. пяти суток

Полинейропатия верхних конечностей при вибрационной болезни от локальной вибрации начальной степени характеризуется

- А. сенсорными нарушениями
- Б. моторными нарушениями
- В. сенсо-моторными нарушениями
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Профессиональные заболевания периферических нервов вызываются всем перечисленным, кроме:

- А. динамических физических нагрузок
- Б. статических физических нагрузок
- В. нервно-психического напряжения
- Г. вибрации
- Д. нейротропных химических веществ

Клиническим проявлениями острого отравления нитро- и аминопроизводными бензола и его гомологов не является

- А. метгемоглобинемия
- Б. токсическая кома
- В. токсическая энцефалопатия
- Г. острый токсический гепатит
- Д. острый токсический бронхит

Основными клиническими проявлениями острого отравления органическими растворителями являются

- А. боли в грудной клетке
- Б. психомоторное возбуждение, вестибулярные нарушения, тошнота и рвота
- В. боли и онемение конечностей
- Г. схваткообразные боли в животе
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями хронической интоксикации хромом и его соединениями являются

- А. эрозия и перфорация носовой перегородки
- Б. бронхиальная астма
- В. хронический токсический бронхит
- Г. аллергический дерматит, экзема
- Д. хронический атрофический ринофаринголарингит
- Е. все перечисленное

Для хронической интоксикации никелем и его соединениями не характерны

- А. хронический бронхит
- Б. хронический гепатит
- В. хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз
- Г. эрозии и перфорация носовой перегородки
- Д. все перечисленное

К факторам, вызывающим профессиональные заболевания, относятся

- А. химические и биологические
- Б. промышленные аэрозоли
- В. физические
- Г. перетруживание, перенапряжение отдельных органов и систем
- Д. все перечисленное

К методам диагностики профессиональных компрессионных нейропатий не относится

- А. электронейромиография
- Б. электроэнцефалография
- В. УЗИ периферических нервов
- Г. магнитно-резонансная томография
- Д. физикальное врачебное обследование

Для острого отравления таллием и его соединениями характерны

- А. острый энтероколит
- Б. аллопеция
- В. токсическая полинейропатия
- Г. токсическая энцефалопатия
- Д. острый токсический гепатит
- Е. все перечисленное

При хроническом поражении веществами удушающего действия основной патологией являются

- А. вазомоторный ринит, хроническая гипопластическая анемия
- Б. хроническая гипопластическая анемия, поликистоз легких
- В. поликистоз легких, вазомоторный ринит
- Г. поликистоз легких, токсический пневмосклероз
- Д. хронический токсический бронхит, токсический пневмосклероз

Для острого отравления мышьяком и его соединениями характерны

- А. острый конъюнктивит, острый ринит, фарингит и ларингит
- Б. токсический миелополиневрит, токсическая энцефалопатия
- В. острый гастрит, острый энтерит, токсический гепатит
- Г. вегетативные нарушения
- Д. все перечисленное

Профессиональным заболеванием кожи со значительной гиперпигментацией кожных покровов является

- А. Фотодерматит
- Б. масляный фолликулит
- В. токсическая меланодермия
- Г. микоз гладкой кожи
- Д. экзема

Клиническими проявлениями острого отравления кобальтом и его соединениями являются

- А. острый ринит
- Б. острый ларингит
- В. литейная лихорадка
- Г. острый фарингит
- Д. все перечисленное

Для интоксикации медным купоросом характерны

- А. хронический токсический гепатит, токсическая нефропатия
- Б. хронический токсический бронхит
- В. токсическая полинейропатия
- Г. литейные лихорадки
- Д. ничего из перечисленного

Все утверждения по силикозу являются верными за исключением

- А. интерстициальная болезнь легких
- Б. вовлечение в процесс прикорневых лимфоузлов
- В. вовлечение в процесс плевры
- Г. частое осложнение туберкулезом
- Д. развитие легочной эмболии

К причине обострения профессиональной астмы после отстранения от контакта с агентом относят

- А. Низкие дозы или полное отсутствие приема ингаляционных глюкокортикоидов
- Б. Отсутствие приема десенсибилизирующих
- В. Отсутствие приема антибиотиков
- Г. Отсутствие физиолечения

К костномозговой группе промышленных ядов относят

- А. Акрилаты
- Б. Окись углерода
- В. Бензол
- Г. Мышьяковистый водород

Стандарт медицинской помощи включает

- А. План диспансерного наблюдения пациента с указанием кратности осмотра врачами-специалистами, выполнения лабораторных и инструментальных исследований
- Б. Усредненные показатели частоты предоставления медицинских услуг и кратности применения лекарственных препаратов
- В. Информацию об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике конкретного заболевания
- Г. Рекомендуемое штатное расписание структурных подразделений медицинской организации

К группе с подозрением на вибрационную болезнь относят лиц с

- А. Стажем работы 10 лет и более
- Б. Симптоматикой вегетативно-сенсорной полиневропатии
- В. Рентгенологическими признаками остеопороза в кистях и стопах
- Г. Рентгенологическими признаками распространенной дорсопатии

К аускультативным признакам бронхиальной астмы относят

- А. Амфорическое дыхание
- Б. Бронхиальное дыхание
- В. Свистящие хрипы на выдохе
- Г. Влажные звонкие мелкопузырчатые хрипы

К производственным аллергенам относят

- А. Формальдегид
- Б. Аммиак
- В. Сероуглерод
- Г. Азотную кислоту

Поражения фолликулярного аппарата вызывают _____ фракции углеводородов нефти и каменного угля

- А. Твердые
- Б. Летучие
- В. Тяжелые
- Г. Средние

Кардинальными признаками хронической ртутной интоксикации являются

- А. Повышенное содержание АЛК и КП в моче
- Б. Стоматит и гингивит
- В. Ретикулоцитоз, определение в моче более 0,05 мг/л ртути
- Г. Ртутный тремор, ртутный эретизм

Должные значения показателей спирометрии вычисляются с учётом _____ пациента

- А. Только роста и веса
- Б. Роста, веса, пола, возраста
- В. Только возраста и пола
- Г. Только возраста и веса

К наиболее частой причине профессиональных заболеваний органов дыхания работающего населения России относят

- А. Воздействие только высоких температур воздуха
- Б. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
- В. Воздействие только низких температур воздуха
- Г. Воздействие перепадов высоких и низких температур воздуха

Если работники проводят работы с возбудителями (или имеют контакт с больными) особо опасных инфекционных заболеваний условия труда работников относят

- А. Ко 2 классу допустимых условий труда
- Б. К 4 классу опасных (экстремальных) условий
- В. К 1 классу вредных условий труда
- Г. К 3 классу вредных условий труда

Санитарно-гигиеническую характеристику подписывают _____ лица/лиц

- А. 5
- Б. 3
- В. 4
- Г. 2

При аллергическом дерматите в отличие от контактного не характерна

- А. Быстрая регрессия после прекращения контакта с аллергеном
- Б. Наличие поражения близлежащих участков кожи (по отношению к подвергавшимся воздействию аллергена)
- В. Четкость границ
- Г. Нечеткость границ

Подтверждением неблагоприятного прогноза при профессиональной бронхиальной астме служит

- А. Атопический вариант
- Б. Позднее отстранение от контакта с причинным фактором
- В. Отсутствие антибактериальной терапии
- Г. Преждевременный прием глюкокортикоидов

Диабетическая полиневропатия возникает

- А. В результате токсического повреждения миелина периферических нервов
- Б. В результате поражения сосудов периферических нервов и нарушение метаболизма глюкозы
- В. Только в результате поражения сосудов периферических нервов
- Г. Только в результате нарушения метаболизма глюкозы

При развитии бронхообструктивного синдрома происходит

- А. Нарушение носового дыхания
- Б. Бронхиальная гиперсекреция
- В. Дисфункция бронхиальных желез
- Г. Снижение бронхиального тонуса

К опасности включения асбеста в состав некоторых строительных материалов (асбоцемент, асбопластмассы и т.п.) относится усиление

- А. Фиброгенности
- Б. Канцерогенности
- В. Аллергического действия
- Г. Раздражающего действия

К высокочастотным относят шум

- А. С частотой ниже 400 Гц
- Б. В спектре которого имеются слышимые дискретные тона
- В. С частотой выше 1000 Гц
- Г. С непрерывным спектром шириной более одной октавы

Наиболее вероятно развитие профессионального туберкулёза у медицинских работников в течение _____ лет работы в контакте с микобактерией

- А. Первых 5
- Б. Более 10
- В. Первых 3
- Г. Первых 10

К эссенциальным микроэлементам относят

- А. Свинец, ртуть, железо
- Б. Фтор и хром
- В. Ртуть и кадмий
- Г. Кальций, калий, железо

Бронходилатационный тест с сальбутамолом считается положительным, если прирост ОФВ_1 и/или ФЖЕЛ составляет не менее

- А. 10% И не менее 100 мл
- Б. 20%
- В. 15%
- Г. 12% И не менее 200 мл

Если у животновода возникла лихорадка после рабочего дня, кашель, одышка и боли в грудной клетке, то предположительным диагнозом является

- А. Экзогенный аллергический альвеолит
- Б. Острый респираторный синдром
- В. Пневмония
- Г. Биссиноз

Приоритетным направлением структурных преобразований в здравоохранении Российской Федерации является развитие _____ помощи

- А. Первичной медико-санитарной
- Б. Скорой медицинской
- В. Специализированной медицинской
- Г. Паллиативной

Характерным аллергическим ответом при экзогенном аллергическом альвеолите является реакция

- А. Полузамедленного типа
- Б. Замедленного типа
- В. Аллергическая
- Г. Немедленного типа

Периодические медицинские осмотры лиц, контактирующих с производственной вибрацией, проводят

- А. 1 Раз в 2 года
- Б. 2 Раза в год
- В. 1 Раз в 3 года
- Г. 1 Раз в год

Дополнительным медицинским противопоказанием для работы с вибрацией является наличие хронических воспалительных заболеваний матки и придатков с частотой обострений ____ за календарный год

- А. 3 Раза и более
- Б. Менее 2 раз
- В. 2 Раза и более
- Г. 1 Раз и более

В медицинской организации в реабилитационном процессе могут участвовать медицинские работники, психологи и

- А. Юристы
- Б. Работники пенсионного фонда
- В. Социологи
- Г. Специалисты по социальной работе

К функциональному исследованию, которое позволяет оценить бронхиальное сопротивление, относят

- А. Диффузионный тест
- Б. Спирометрию с бронходилатационным тестом
- В. Спирометрию
- Г. Бодиплетизмографию

Порядок оказания медицинской помощи включает

- А. Усредненные показатели частоты предоставления медицинских услуг и кратности применения лекарственных препаратов
- Б. План диспансерного наблюдения пациента с указанием кратности осмотра врачами-специалистами, выполнения лабораторных и инструментальных исследований
- В. Этапы оказания медицинской помощи, правила организации деятельности, стандарт оснащения, рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации
- Г. Информацию об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике конкретного заболевания

Фиброгенный эффект приводит к развитию

- А. Пневмокониозов
- Б. Бронхитов
- В. Пневмонии
- Г. Бронхиальной астмы

Отравления этиленгликолем чаще всего возникают при

- А. Вдыхании заражённого воздуха
- Б. Попадании на слизистые оболочки
- В. Накожной аппликации
- Г. Приёме внутрь

Степень тяжести лучевого поражения определяется

- А. Количеством «горячих» частиц в легких
- Б. Количеством радионуклидов в организме
- В. Степенью угнетения кроветворения
- Г. Содержанием радионуклидов на месте облучения

К органам и системам поражения при хронической интоксикации хромом относят

- А. Нейроэндокринную, центральную периферическую нервную системы
- Б. Репродуктивную, женскую половую и мочевыделительную системы
- В. Сердечно-сосудистую, кроветворную, иммунную системы
- Г. Органы дыхания, кожу, желудочно-кишечный тракт

К осложнениям и последствиям острой интоксикации хлорвинилдихлорарсином, возникающим в ранние сроки, можно отнести

- А. Выраженное нарушение обмена веществ с развитием кахексии
- Б. Развитие психоорганического синдрома
- В. Тератогенные и мутагенные эффекты
- Г. Развитие токсического отёка лёгких

Целью программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи является

- А. Обеспечение прав граждан РФ на бесплатное оказание медицинской помощи
- Б. Строгое соблюдение стандартов медицинской помощи
- В. Снижение затрат на здравоохранение
- Г. Рациональное использование бюджетных средств

Острое поражение бериллием проявляется

- А. Токсическим пневмонитом
- Б. Респираторным дистресс-синдромом
- В. Почечной коликой
- Г. Анафилактическим шоком

В период воздействия фосгена к основным симптомам относят

- А. Осиплость голоса, явления выраженного раздражения слизистых верхних дыхательных путей
- Б. Резко выраженные конъюнктивит, блефароспазм
- В. «Немой» контакт
- Г. Лёгкое раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, ощущение запаха прелого сена

Значение показателя оФв1 менее 35% от должн. При обструктивных нарушениях свидетельствует о _____ обструкции

- А. Лёгкой степени
- Б. Умеренно выраженной
- В. Средней степени
- Г. Крайне тяжёлой степени

Бронхиальная обструкция может быть выявлена с помощью

- А. Исследования газов крови
- Б. Рентгенологического исследования
- В. Бронхоскопии
- Г. Спирографии

Дополнительным фактором риска развития профессиональной патологии опорно-двигательного аппарата является тип телосложения

- А. Брюшной
- Б. Грудной
- В. Обычный
- Г. Мускульный

При интоксикации фосфорорганическими соединениями поражается преимущественно

- А. Мочевыделительная система
- Б. Опорно-двигательный аппарат
- В. Система крови
- Г. Нервная система

В состав сварочного аэрозоля входит

- А. Марганец
- Б. Асбест
- В. Магний
- Г. Свинец

В основе методов определения токсичности лежит нахождение зависимости

- А. «Химическая структура вещества - эффект»
- Б. «Время - эффект»
- В. «Доза - эффект»
- Г. «Концентрация в среде - эффект»

Контактный простой дерматит характеризуется

- А. Большой распространенностью
- Б. Острым воспалением кожи, выходящим за пределы участка, подвергнувшегося действию раздражителя
- В. Нарушением общего состояния
- Г. Острым воспалением кожи на месте соприкосновения с раздражителем

Ведущим методом в диагностике пневмокониозов является

- А. Фибробронхоскопия
- Б. Спирометрия
- В. Рентгенография легких
- Г. Тест шестиминутной ходьбы

К сенсibiliзирующим факторам относят

- А. Синтетические моющие средства
- Б. Свинец и ртуть
- В. Мышьяк и ртуть
- Г. Сероводород и оксид азота

Второй уровень профилактического режима ведения больных может быть выполнен

- А. В специализированной клинике по лечению пострадавших с лучевой патологией
- Б. В МСЧ обслуживающее персонал радиационно-опасных объектов
- В. В отделении стационара, в котором введен первый уровень ПРВБ для всего отделения при наличии нескольких особо устроенных одноместных палат-изоляторов, в которых организуется «обратная изоляция» пациента
- Г. Только в ФМБЦ им А.И. Бурназяна ФМБА России

В лечении аллергических заболеваний используют блокатор антилейкотриеновых рецепторов

- А. Эбастин
- Б. Хлоропирамин
- В. Монтелукаст
- Г. Фенспирид

Ацизол из аптечки индивидуальной предназначен для

- А. Профилактики поражений фосфорорганическими соединениями
- Б. Купирования симптомов поражения фосфорорганическими соединениями
- В. Профилактики или оказания первой помощи при поражении оксидом углерода
- Г. Профилактики поражения синильной кислотой

При осуществлении государственного контроля (надзора) и установлении фактов увеличения содержания токсических веществ или продуктов их распада в биосредах приоритетным по отношению к контрольным (надзорным) мероприятиям является проведение

- А. Диагностики интоксикации и проведения лечения пострадавших
- Б. Компенсационных выплат за счет средств социального страхования
- В. Профилактических мероприятий по снижению риска причинения вреда (ущерба)
- Г. Дополнительных лабораторных и функциональных исследований

К возможному характеру действия бериллия на организм относят

- А. Раздражающее
- Б. Аллергическое
- В. Гемолитическое
- Г. Моделирующее

При остром отравлении ртути развиваются

- А. Схваткообразные боли в желудке и кишечнике, кишечные колики, диарея
- Б. Вегето-сосудистая дистония и падение артериального давления, головокружения, потеря сознания
- В. Геморрагический синдром с воспалительными изменениями полости рта, десен, поражение ЖКТ и почек
- Г. Нарушения со стороны центральной и периферической нервной системы, психической сферы, атаксия

При тяжелом персистирующем течении профессиональной бронхиальной астмы симптомы проявляются

- А. Реже 1 раза в неделю
- Б. Несколько раз в день
- В. Чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день
- Г. Реже 1 раза в 2 недели

Дозами облучения, вызывающими легкую степень костно-мозговой формы острой лучевой болезни, являются

- А. 400-1000 Рад и более
- Б. 5-4.0 Гр (250-400 Рад)
- В. 0-10.0 Гр
- Г. 0-2.0 Гр (100-200 Рад)

Клиническая картина стадии «серой» гипоксемии при токсическом отёке лёгких может быть описана таким образом: сознание

- А. Утрачено, относительно стабильная гемодинамика, приступы клонико-тонических судорог, температуры тела не изменена
- Б. Утрачено, снижение АД, повышение температуры тела, кожные покровы гиперемированы
- В. Утрачено, резкое снижение АД, землистый цвет кожи, температуры тела снижена, при исследовании газов крови – гипоксемия и гипокапния
- Г. Сохранено, цианоз кожи и слизистых оболочек, обильная пенистая мокрота, повышение температуры тела, относительно стабильная гемодинамика, при исследовании газов крови – гипоксемия и гиперкапния

Медицинские заключения выдаются без согласия гражданина или его законного представителя

- А. Органам суда, имеющим право на получение сведений о факте состояния его здоровья и диагнозе
- Б. Работодателю
- В. Мужу или жене
- Г. Родителям

Извещение о предварительном диагнозе острого профессионального заболевания (отравления) отсылается в течение (в часах)

- А. 12
- Б. 72
- В. 24
- Г. 48

Для лечения вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации назначают

- А. Цитостатики
- Б. Кардиотонические средства
- В. Глюкокортикостероиды
- Г. Сосудорасширяющие средства

Врачебная комиссия в медицинской организации создается и работает на основании

- А. Наличия лицензии по экспертизе профессиональной пригодности
- Б. Приказа руководителя медицинской организации
- В. Постановления органов местного самоуправления
- Г. Распоряжения органа исполнительной власти субъекта Федерации

При определении симптома «белого пятна» при вибрационной болезни, проба считается положительной, если образовавшиеся пятна побеления на ладонях и пальцах рук держаться более (в секундах)

- А. 20
- Б. 5
- В. 15
- Г. 10

Корешковый синдром обусловлен

- А. Мышечным спазмом
- Б. Гипертрофией желтой связки
- В. Грыжей межпозвонкового диска
- Г. Остеоартрозом фасеточных суставов

Среднесменная концентрация вредных веществ усредненная за

- А. Рабочий год
- Б. Рабочий стаж
- В. Рабочую неделю
- Г. 8-Часовую рабочую смену

Дополнительным медицинским противопоказанием для работы с вибрацией является наличие тяжелой или осложненной близорукости выше

- А. 8,0 Д
- Б. 9,0 Д
- В. 10,0 Д
- Г. 11,0 Д

К основным видам воздействия органической пыли на органы дыхания относят

- А. Гистаминолибераторное
- Б. Раздражающее
- В. Токсическое
- Г. Аллергическое

Свойства метгемоглобинообразователей

- А. Относятся к депообразующим токсическим веществам
- Б. Не относятся к депообразующим токсическим веществам
- В. Депонируются в почках
- Г. Депонируются в костях и печени

Значительная степень (3 степень) потери слуха для лиц, работающих в условиях воздействия шума, укладывается в пределы на речевые частоты ____ дБ, высокие частоты ____ дБ

- А. 21-55; 31+/30
- Б. 41-55; 41+/40
- В. 31-65; 21+/50
- Г. 56-70; 65+/20

При отравлении фос средней степени тяжести преобладает _____ гипоксия

- А. Гемическая
- Б. Циркуляторная
- В. Тканевая
- Г. Гипоксическая

Препарат б-190 применяют при

- А. Проведении неотложных мероприятий
- Б. Проведении первоочередных мероприятий
- В. Проведении экстренных мероприятий
- Г. Поступлении в специализированное лечебное учреждение

Литейную лихорадку надо дифференцировать с

- А. Дисбактериозом
- Б. Острым гастритом
- В. Гриппом
- Г. Панкреатитом

Характерным симптомом для третьей стадии интоксикации марганцем считают

- А. Кататонию
- Б. Парез
- В. Паркинсонизм
- Г. Делирий

Кожные покровы при острой интоксикации метгемоглобинообразователями имеют окраску

- А. Синюшную
- Б. Желтушную
- В. Бледную
- Г. Розовую

Наиболее вероятным исходом экзогенного аллергического альвеолита в случае неадекватной терапии является

- А. Фиброзирование
- Б. Абсцедирование
- В. Выздоровление
- Г. Обсеменение

Основополагающим документом о проведении периодического медицинского осмотра является приказ по

- А. Предприятию
- Б. Предприятию, медицинской организации и по центру Роспотребнадзора
- В. Предприятию и медицинской документации
- Г. Центру Роспотребнадзора

К категориям на которые разделены аллергены относят _____ аллерген

- А. Слишком опасный аллерген, слабо опасный
- Б. Умеренно опасный аллерген, незначительно опасный
- В. Высоко и умеренно опасный
- Г. Опасный и неопасный

Относительно слабый раздражающий эффект при контакте характерен для воздействия

- А. Аммиака
- Б. Фосгена
- В. Хлорпикрина
- Г. Хлора

Составной частью сварочного аэрозоля является

- А. Асбест
- Б. Монооксид углерода
- В. Железо
- Г. Кремний

Наиболее частой формой профессионального туберкулеза у медицинских работников является

- А. Инфильтративный туберкулез
- Б. Очаговый туберкулез
- В. Туберкулема
- Г. Костный туберкулез

Обязательный для всех работников женского пола объем предварительного (периодического) медицинского осмотра включает осмотр

- А. Эндокринолога и травматолога
- Б. Гинеколога, гинекологические исследования на флору и гинекологические исследования на атипичные клетки
- В. Травматолога и паразитолога
- Г. Эндокринолога и паразитолога

Легкая степень (1 степень а) потери слуха для лиц, работающих в условиях воздействия шума, укладывается в пределы на речевые частоты ____ дБ, высокие частоты ____ дБ

- А. 15; 50+\\20
- Б. 16-25; 41-50
- В. 10; 50+\\20
- Г. 20; 50+\\20

К медицинским противопоказаниям (к дополнительным) для приема на работу с канцерогенами относят

- А. Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи
- Б. Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей
- В. Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин
- Г. Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению

Целью предварительного, при поступлении на работу, медицинского осмотра, является

- А. Предупреждение общих заболеваний
- Б. Определение соответствия (пригодности) рабочих и служащих поручаемой им работе
- В. Предупреждение профессиональных заболеваний
- Г. Предупреждение общих и профессиональных заболеваний

Причиной тяжести дыхательной недостаточности у больных силикатозами чаще всего является

- А. Патология верхних дыхательных путей
- Б. Осложнение туберкулезом
- В. Осложнение хроническим бронхитом
- Г. Выраженность фиброза

Тяжелая форма острой интоксикации сероуглеродом проявляется

- А. Гастро-интестинальным синдромом
- Б. Геморрагическим синдромом
- В. Лихорадочным синдромом
- Г. Токсической комой

К объективным данным, подтверждающим диагноз вибрационная болезнь, относят

- А. Нарушение речи
- Б. Нарушение координации движений
- В. Повышение порога вибрационной чувствительности
- Г. Тремор конечностей

Применение натрия тиосульфата при отравлениях цианидами преследует цель образования

- А. В крови допустимых уровней метгемоглобина и связывание цианида
- Б. Нетоксичного циангидрина
- В. Нетоксичных цианкобаламинов
- Г. Нетоксичного тиоцианата

При низкой активности холинэстеразы при острых отравлениях фосфорорганическими соединениями показано введение антидотов-реактиваторов холинэстеразы в течение

- А. Первых суток
- Б. 1 Месяца
- В. 1 Недели
- Г. 2 - 3 Суток

Лабораторная диагностика острого отравления монооксидом углерода заключается в проведении

- А. Определения уровня карбоксигемоглобина
- Б. Клинического анализа крови
- В. Определения монооксида углерода в крови и в моче
- Г. Определения активности холинэстеразы

Работников не допускают к работе с источниками ионизирующих излучений при наличии

- А. Язвенной болезни желудка
- Б. Пояснично-крестцового радикулита
- В. Облитерирующих заболеваний сосудов вне зависимости от степени компенсации
- Г. Аллергического ренита

В комплексном лечении вибрационной болезни используют

- А. Антиаритмическую терапию
- Б. Массаж грудной клетки
- В. Вибротерапию
- Г. Нафталановые ванночки для рук и ног

Риск развития пылевого заболевания легких оценивают в соответствии с

- А. Возрастом работника
- Б. Данными специальной оценки условий труда
- В. Наличие в воздухе рабочей зоны аэрозолей фиброгенного действия выше ПДК
- Г. Перенесенными легочными заболеваниями

При воздействии полных антигенов (продукты растительного происхождения) реакины, индуцирующие аллергический бронхоспазм, в основном представлены антителами типа

- А. IgG
- Б. IgM
- В. IgE
- Г. IgA

Эпилептиформной активностью считают

- А. Только гипсаритмию
- Б. Острую волну и полипики
- В. Спайки, гипсаритмию и полипики
- Г. Только спайки

В соответствии с фз № 323 от

21.11.2011 г. «об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пациент имеет право на выбор

- А. Методик инструментального обследования
- Б. Методик лабораторного исследования
- В. Врача и медицинской организации
- Г. Лекарственных средств при лечении в стационаре