

Тесты с вопросами по специальности «Профпатология» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/profpatolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Профпатология» для аккредитации и других экзаменов (1900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/profpatologiya/

2) Тесты для аккредитации «Гигиена труда» (800 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/gigiena_truda/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Для лечение силикоза никогда не применяют

- А. ингаляции натрия бикарбоната 2%
- Б. УФО грудной клетки
- В. преднизолон
- Г. гипербарическую оксигенацию
- Д. лечебну. Физкультуру

Для развития силикоза является верным

- А. наличие крупноузловых форм
- Б. соответствие клинических проявлений рентгенологическим изменениям
- В. длительный контакт с кварцосодержащей пылью выше ПДК
- Г. нарушение функции внешнего дыхания
- Д. наличие прикорневых лимфоузлов в виде яичной скорлупы

Заболеваниями кожи, связанными с воздействием химических веществ, являются

- А. псориаз
- Б. меланома
- В. термические ожоги
- Г. контактная крапивница, токсикодермия
- Д. ничего из перечисленного

Для "Свинцовой колики" характерно все кроме

- А. артериальной гипертензии
- Б. брадикардии
- В. схваткообразных болей в животе
- Г. симптома раздражения брюшины
- Д. длительных запоров
- Е. все перечисленное

Для клиники хронического крептирующего теносиновита кисти и запястья характерно

- А. онемение, парестезии в кисти, ноющая боль
- Б. наличие сильной распирающей боли и онемение кисти
- В. неприятной болью, усиливающуюся при движении пальцами и кистью, припухлость на тыле предплечья, крепитация по ходу сухожилий, односторонний процесс
- Г. сильной распирающей болью, онемением кисти, отсутствие движений в лучезапястном суставе
- Д. ничего из перечисленного

К обязательным методам исследования при воздействии вибрации при периодических медицинских осмотрах относятся

- А. исследование вибрационной чувствительности с помощью камертона
- Б. паллестезиометрия
- В. холодовая проба, динамометрия
- Г. биохимический анализ крови
- Д. психологическое тестирование
- Е. холодовая проба

Клиническими проявлениями острого отравления нитро- и аминопроизводными бензола и его гомологов не являются

- А. метгемоглобинемия, вегетативная дисфункция
- Б. метгемоглобинемия, токсическая энцефалопатия, кома
- В. метгемоглобинемия, токсическая энцефалопатия, острый токсический гепатит
- Г. острый токсический гепатит, токсическая энцефалопатия
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями острого отравления несимметричным диметилгидразином, продуктами его синтеза и разложения являются

- А. острая нефропатия, токсическая энцефалопатия
- Б. острый токсический гепатит, острый эрозивный гастрит, острый ларинготрахеобронхит, токсическая кома, ожоги кожи
- В. острый токсический гепатит, острый эрозивный гастрит, острый ларинготрахеобронхит, токсическая энцефалопатия, ожоги кожи
- Г. острый токсический гепатит, острый эрозивный гастрит, острый ларинготрахеобронхит, токсическая энцефалопатия, острая сердечно-сосудистая недостаточность
- Д. все перечисленное, кроме 1

Для хронической интоксикации тринитротолуолом характерны

- А. хронический токсический гепатит, токсическая энцефалопатия
- Б. токсическая катаракта, хронический токсический гепатит, анемия нормохромная
- В. токсическая катаракта, анемия нормохромная
- Г. токсическая катаракта
- Д. все перечисленное, кроме 1

Клиническими проявлениями поражения органа зрения лазерным излучением являются

- А. ожог роговицы
- Б. скотомы
- В. центральная дегенерация сетчатки
- Г. катаракта
- Д. миопия

Клиническим проявлениями острого отравления формальдегидом не являются

- А. острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, острый бронхит, отек легких, ирритантный дерматит, острый конъюнктивит
- Б. ожоги кожи, токсическая анемия, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит
- В. острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, ирритантный дерматит
- Г. острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, токсический бронхит, ирритантный дерматит
- Д. все перечисленное

Для острого отравления двуокисью углерода характерны

- А. токсическая энцефалопатия, кома
- Б. токсическая энцефалопатия, кома, летальный исход
- В. токсическая энцефалопатия, токсическая полинейропатия
- Г. токсическая энцефалопатия, токсическая пневмония
- Д. синкопальный синдром, токсическая энцефалопатия, токсическая пневмония

К основным этиологическим производственным факторам профессиональной бронхиальной астмы относятся

- А. химические и биологические
- Б. метеорологические
- В. физические
- Г. психоэмоциональные
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного

Для острого отравления окисью углерода характерны

- А. энцефалопатия, кома, летальный исход
- Б. карбоксигемоглобинемия, энцефалопатия, синкопальный синдром, кома, летальный исход
- В. энцефалопатия, синкопальный синдром, кома, летальный исход
- Г. энцефалопатия, полинейропатия, синкопальный синдром
- Д. энцефалопатия, синкопальный синдром

Острые формы профессиональных заболеваний (отравлений) расследуются

- А. участковым врачом терапевтом
- Б. врачом токсикологом
- В. санитарным врачом управления Роспотребнадзора
- Г. специалистом по охране труда и промышленной безопасности
- Д. работодателем- руководителем организации

Основным фактором, усиливающим отрицательное воздействие шума на орган слуха является

- А. неблагоприятные микроклиматические факторы
- Б. вибрация
- В. токсические вещества
- Г. вынужденная рабочая поза
- Д. напряженность трудового процесса

Для профессионального эпикондилеза плечевой кости характерно

- А. постепенное начало в период работы с физическими перегрузками, нарастание боли и слабости в руке, положительные симптомы натяжения
- Б. острое начало в период отпуска, положительные симптомы натяжения
- В. постепенное начало, нарастание болевого синдрома, ограничение объема движений в локтевом суставе
- Г. нарушение конфигурации локтевого сустава, боли в руке
- Д. все перечисленное

Основными изменениями системы крови при хронической интоксикации бензолом и его гомологами являются

- А. цитопения, ретикулоцитоз и сокращение продолжительности жизни эритроцитов
- Б. нормохромная анемия и ускоренное СОЭ
- В. лейкоцитоз и ускоренное СОЭ
- Г. эритроцитоз и лейкоцитоз
- Д. все перечисленное

Для профессиональной нейросенсорной тугоухости от воздействия производственного шума характерно все, кроме

- А. постепенное развитие
- Б. двусторонний характер поражения
- В. ранне повышение порогов слуха на частоте 4000 Гц
- Г. медленно прогрессирующее течение
- Д. односторонний характер поражения

При остром отравлении бензином применяют лечение

- А. купренилом
- Б. тиосульфатом натрия
- В. унитиолом
- Г. витаминами группы В
- Д. симптоматическую терапию

Для хронической интоксикации мышьяковистым водородом характерны

- А. вегетативная дисфункция, хронический токсический гепатит, токсическая нефропатия
- Б. токсическая полинейропатия, токсический гепатит
- В. токсическая энцефалопатия, токсическая полинейропатия
- Г. хронический токсический гепатит, токсическая нефропатия
- Д. ничего из перечисленного, кроме 1

Клиническими проявлениями острого отравления мышьяковистым водородом

- А. острый токсический гепатит, острая токсическая нефропатия
- Б. внутрисосудистый гемолиз, гемолитическая анемия, острый токсический гепатит, токсическая нефропатия, токсическая энцефалопатия
- В. острый токсический гепатит, токсическая полинейропатия, острый дерматит
- Г. анемия гипохромная, токсический гепатит, токсическая полинейропатия
- Д. ничего из перечисленного, кроме 2

Клиническими проявлениями острого отравления газообразным хлором являются

- А. острый конъюнктивит, острый кератит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит,
- Б. острый конъюнктивит, острый кератит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, острый необструктивный бронхит
- В. острый конъюнктивит, острый кератит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, острый необструктивный бронхит, токсическая пневмония, отек легких
- Г. острый конъюнктивит, острый кератит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, ожоги кожи
- Д. все перечисленное, кроме 4

Злокачественные новообразования кожи вызываются следующими вредными производственными факторами канцерогенного действия

- А. бензол и его производные, этиленоксид, хлорорганические соединения, винилхлорид
- Б. бета-нафтиламин, поливинилхлорид, вирусы гепатита В и С, этиленоксид
- В. нефтепродукты, каменноугольные смолы, мышьяк и его соединения, никель, хром и его соединения, ультрафиолетовое излучение, ионизирующее излучение
- Г. бета-нафтиламин, поливинилхлорид, вирусы гепатита В и С,
- Д. все перечисленное

Масляные фолликулиты чаще локализуются

- А. на местах контакта со смазочными маслами
- Б. на лице
- В. на туловище
- Г. избирательной локализации нет
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации кадмием и его соединениями характерны

- А. эрозия носовой перегородки, хронический бронхит, астенический синдром
- Б. эрозия носовой перегородки, хронический бронхит, пневмофиброз
- В. эрозия носовой перегородки, хронический бронхит, пневмофиброз, хроническая токсическая нефропатия и гепатит, токсическая остеопатия
- Г. эрозия носовой перегородки, хронический бронхит, эмфизема легких, токсическая нефропатия, токсическая остеопатия
- Д. хроническая нефропатия, астенический синдром
- Е. все перечисленное, кроме Д (5)

Для острого отравления и хронических интоксикаций, связанных с воздействием комплекса химических веществ характерны

- А. токсическая энцефалопатия и полинейропатия
- Б. токсический гепатит, анемия, вегетативная дисфункция
- В. токсический бронхит, токсическая энцефалопатия, анемия
- Г. поражение различных органов и систем, определяемое химическим составом токсикантов
- Д. все перечисленное

клиническими проявлениями острого отравления органическими цианидами являются

- А. токсический гепатит, токсическая энцефалопатия, токсический бронхит
- Б. острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, вегетативная дисфункция
- В. острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, токсическая энцефалопатия, кома
- Г. острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, токсическая энцефалопатия
- Д. все перечисленное, кроме 1

Для развития силикоза является характерным

- А. раннее развитие синдрома интоксикации
- Б. прогрессирующее течение
- В. симметричный пневмофиброз,
- Г. нарушение перфузионно-диффузионной способности легких
- Д. развитие легочного сердца

Для хронической интоксикации фосфорорганическими отравляющими веществами не характерны

- А. токсическая энцефалопатия, когнитивные нарушения, хронический токсический гепатит, гипохромная анемия
- Б. токсический гепатит, гиперхромная анемия, вегетативная дисфункция
- В. токсическая энцефалопатия, хронический токсический гепатит, гипохромная анемия
- Г. вегетативная дисфункция, хронический токсический гепатит, гипохромная анемия
- Д. все перечисленное

К химическим соединениям, проникающих через плаценту и выделяющихся с молоком кормящей матери, относятся

- А. свинец и его соединения
- Б. ртуть
- В. дисульфид углерода (сероуглерод)
- Г. марганец и его соединения
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации никелем и его соединениями характерны

- А. хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз, эрозия и перфорация носовой перегородки
- Б. хронический ринит, хронический бронхит, хронический гепатит
- В. хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, эрозия носовой перегородки
- Г. хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз, эрозия и перфорация носовой перегородки
- Д. все перечисленное, кроме 2

Клиническими проявления острого отравления пестицидами не являются

- А. токсический гастроэнтерит, токсический гепатит токсическая энцефалопатия, токсическая кома, токсическая нефропатия, токсический бронхит, токсическая кардиомиопатия, контактный дерматит
- Б. острый ринит, острый фарингит, острый конъюнктивит, токсический бронхит
- В. токсический гастроэнтерит, токсический гепатит токсическая энцефалопатия, контактный дерматит
- Г. токсический гастроэнтерит, токсическая энцефалопатия, полинейропатия, контактный дерматит
- Д. токсический гастроэнтерит, токсический гепатит токсическая энцефалопатия, токсическая нефропатия, токсическая кардиомиопатия, контактный дерматит

Синдром карпального канала при вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, характерен для

- А. умеренно выраженной степени заболевания
- Б. начальной степени заболевания
- В. начальной и умеренной степени заболевания
- Г. развитие синдрома не характерно
- Д. ничего из перечисленного

Для злокачественных профессиональных заболеваний кожи является характерным

- А. наличие фоновых предопухолевых заболеваний кожи; локализация в местах наиболее частого воздействия производственного канцерогена; гистологически базальноклеточный или плоскоклеточный рак
- Б. наличие фоновых предопухолевых заболеваний кожи; локализация различная, гистологически все формы рака без поражения придатков кожи
- В. наличие фоновых предопухолевых заболеваний кожи; локализация различная , поражение придатков кожи
- Г. наличие фоновых предопухолевых заболеваний кожи; локализация нижняя часть туловища , поражение придатков кожи и лимфоузлов
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации таллием и его соединениями характерны

- А. токсическая энцефалопатия, астенический и депрессивный синдромы, хронический токсический гепатит, хронический дерматит, аллопеция
- Б. токсическая энцефалопатия, астенический и депрессивный синдромы, хронический токсический гепатит
- В. токсическая энцефалопатия, депрессивный синдром, хронический токсический гепатит
- Г. астенический и депрессивный синдромы, хронический токсический гепатит, хронический дерматит, аллопеция
- Д. токсическая энцефалопатия, токсический гепатит

В обязательный перечень документов при проведении экспертизы связи заболевания с профессией входят

- А. результаты обязательных предварительного и периодических медицинских осмотров
- Б. копия трудовой книжки
- В. санитарно-гигиеническая характеристика условий труда
- Г. выписка из медицинской карты больного, получающего помощь в амбулаторных условиях
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного

При диагностике вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, необходимо исключить

- А. Болезнь Рейно и синдром Рейно другой этиологии, токсические и метаболические полинейропатии, острые и хронические ХДПН
- Б. Заболевания соединительной ткани, лимфогранулематоз, системные васкулиты
- В. Заболевания периферических сосудов при атеросклерозе и сахарном диабете
- Г. Заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания мочевыделительной системы
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями острого отравления растворимыми соединениями бериллия являются

- А. острый гастрит, острый гепатит, острый токсический бронхит
- Б. острый гепатит, острый ринит, острый конъюнктивит, острый токсический бронхит
- В. острый токсический ринит и ларингит, острый токсический бронхиолит, острый конъюнктивит, ожоги кожи
- Г. острый трахеит, острый ларингит, острый токсический бронхит, острый токсический гепатит
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями острого отравления цианистым водородом являются

- А. острый ларингит, острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, Вегетативная дисфункция, кома
- Б. острая токсическая полинейропатия, острая токсическая нефропатия
- В. острый токсический гепатит, токсическая полинейропатия
- Г. вегетативно-сосудистая дисфункция, токсическая полинейропатия
- Д. ничего из перечисленного

Для злокачественных новообразований органов дыхания характерны

- А. короткий период экспозиции канцерогена, отсутствие латентного периода, полиорганность поражения
- Б. длительный период экспозиции, отсутствие латентного периода, сочетание с раком кожи
- В. длительный период экспозиции, длительный латентный (постконтактный) период, частое сочетание с раком кожи
- Г. короткий период экспозиции канцерогена, длительный латентный период, полиорганность поражения
- Д. ничего из перечисленного

При свинцовой интоксикации к характерным изменениям периферической крови относят

- А. лейкоцитоз
- Б. панцитопению
- В. гипохромную анемию
- Г. тромбоцитопению
- Д. гемолитическую анемию

Наиболее частым осложнением пылевого бронхита является

- А. легочная недостаточность
- Б. рак легкого
- В. легочное кровотечение
- Г. бронхиальная астма
- Д. туберкулез

Для острого воздействия аэрозолями цинка характерно

- А. острый токсический бронхит
- Б. литейная лихорадка
- В. острый токсический гепатит
- Г. острая токсическая нефропатия
- Д. все перечисленное

пневмокониозом,относящимся к группе металлоконииозов, является

- А. сидероз
- Б. графитоз
- В. антракоз
- Г. асбестоз
- Д. все перечисленное

Для рентгенологических изменений при силикозе не характерно наличие

- А. округлых неомогенных теней с нечеткими контурами
- Б. мономорфность теней
- В. симметричное затемнение преимущественно в нижних отделах легких
- Г. буллезной эмфиземы
- Д. изменение прикорневых лимфоузлов по типу "яичной скорлупы"

Полинейропатия верхних конечностей при вибрационной болезни от локальной вибрации умеренной степени характеризуется

- А. моторными нарушениями
- Б. сенсо-моторными нарушениями
- В. сенсорными и вегетативно-трофическими нарушениями
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

К основным клиническим проявлениям неосложненных форм пневмокониозов относятся

- А. Длительное бессимптомное течение заболевания и изменения вентиляционных показателей при рестриктивному типу
- Б. длительное бессимптомное течение заболевания и изменения вентиляционных показателей по обструктивному или смешанному типу
- В. Острое начало заболевания с высокой лихорадкой и кашель, одышка
- Г. Длительное бессимптомное течение заболевания и раннее формирование эмфиземы легких

Злокачественные новообразования желудка вызываются следующими производственными канцерогенами

- А. свинец и его соединения, диоксид кремния, дисульфид углерода, железо и его соединения
- Б. свинец и его соединения, диоксид кремния, дисульфид углерода, железо и его соединения, ванадий и его соединения
- В. хром шестивалентный, никель, асбест, угольные и графитовые изделия, этилированный бензин, ионизирующее излучение, трасурановые нуклиды
- Г. диоксидом кремния, тальковой пылью, железом и его соединениями
- Д. ничего из перечисленного

Медицинскими организациями, имеющими право проводить экспертизу связи заболевания с профессией, являются

- А. медицинские организации любой формы собственности
- Б. центры профессиональной патологии
- В. клинические больницы
- Г. клиники НИИ, оказывающие специализированную помощь по профпатологии
- Д. все перечисленное, кроме А (1), В (3)

Причиной нарушения бронхиальной проходимости при профессиональном пылевом бронхите является

- А. бронхоспазм
- Б. отек и инфильтрация стенки бронхов
- В. гиперсекреция и нарушение выделения мокроты
- Г. трахеобронхиальная дискинезия
- Д. все перечисленное

Начальными клиническими проявлениями пневмокониозов являются

- А. одышка в покое и отсутствие аускультативных изменений в легких
- Б. нерезко выраженные диффузные изменения на рентгенограмме в легких
- В. локальные изменения на рентгенограмме органов грудной клетки справа
- Г. отсутствие жалоб на здоровье

Клиническими проявлениями острого отравления ванадием и его соединениями

- А. литейная лихорадка, токсический альвеолит
- Б. литейная лихорадка
- В. острый токсический бронхит, токсическая пневмония, отек легких
- Г. острый токсический альвеолит
- Д. все перечисленное

Заключение по результатам предварительного медицинского осмотра при приеме на работу выдает

- А. врач участковый терапевт
- Б. врач общей практики
- В. врач профпатолог
- Г. санитарный врач по гигиене труда Роспотребнадзора
- Д. все перечисленное

Злокачественные новообразования органов почек и мочевого пузыря вызываются следующими производственными канцерогенами

- А. диоксидом кремния, тальковой пылью
- Б. ароматическими аминосоединениями, ПАУ, содержащими 3,4-без(а)пирен, смазочными охлаждающими жидкостями, содержащими ПАУ и нитрозоамины
- В. свинец и его соединения, диоксид кремния, дисульфид углерода, железо и его соединения
- Г. свинец и его соединения, диоксид кремния, дисульфид углерода, железо и его соединения, ванадий и его соединения
- Д. все перечисленное

К основным поражениям плеча, связанных с физическими перегрузками, относят все, кроме

- А. тендиоз длинной головки двуглавой мышцы плеча
- Б. адгезивный капсулит плеча
- В. тендиозы подостной, малой круглой и надлопаточной мышц
- Г. асептический некроз головки плечевой кости
- Д. синдром сдавления ротаторов плеча

Клиническими проявлениями острого отравления фосфоорганическими отравляющими веществами являются

- А. острый токсический гепатит, острый энтероколит, токсическая полиневропатия
- Б. токсическая энцефалопатия с миозом, токсическая кома, токсический отек легких
- В. токсическая энцефалопатия с миозом, бронхоспазм, токсическая полинейропатия с вялыми парезами и параличами
- Г. вегетативно-сосудистая дисфункция, токсическая полинейропатия, бронхоспазм
- Д. все перечисленное, кроме 1

Для хронической интоксикации несимметричным диметилгидразином, продуктами его синтеза и разложения не характерны

- А. токсическая энцефалопатия, хронический токсический гепатит, язвенная болезнь желудка и 12ти перстной кишки
- Б. токсическая энцефалопатия, хронический токсический гепатит, вегетативная дисфункция
- В. токсическая энцефалопатия, хронический токсический гепатит, хронический эрозивный гастрит, вегетативная дисфункция
- Г. хронический атрофический гастрит
- Д. все перечисленное

Профессиональным заболеванием, для развития которого не требуется длительный контакт с производственным фактором, является

- А. силикоз
- Б. талькоз
- В. бронхиальная астма
- Г. вибрационная болезнь
- Д. силикатоз

Острое отравление окислами азота проявляется

- А. острым конъюнктивитом, острым ринитом, острым фарингитом, острым ларингитом, острым трахеитом, острым токсическим бронхиолитом
- Б. острым конъюнктивитом, острым ринофаринголарингитом, острым токсическим бронхиолитом, отеком легких, острым дерматитом, ожогами кожи
- В. острым токсическим бронхиолитом, токсической пневмонией, отеком легких, острым дерматитом, ожогами кожи
- Г. острым токсическим бронхитом, острым токсическим гепатитом, острым дерматитом
- Д. все перечисленное, кроме 4

Профессиональными заболеваниями кожи, вызванных аллергенами, являются

- А. витилиго, масляные угри, токсическая меланодермия
- Б. ирритантный контактный дерматит, химические ожоги кожи
- В. витилиго, меланодермия
- Г. аллергический контактный дерматит, экзема, аллергическая крапивница, фотоконтактный дерматит
- Д. все перечисленное

К порокам развития новорожденных от внутриутробного воздействия репротоксикантов относят

- А. микроцефалию
- Б. "заячью губу"
- В. патологию строения ушей, расположения глаз
- Г. нарушение соответствия длины туловища и конечностей
- Д. ничего из перечисленного
- Е. все перечисленное

К факторам, вызывающим профессиональные заболевания, относятся

- А. химические
- Б. физические
- В. биологические
- Г. факторы трудового процесса
- Д. все перечисленное

Основными клиническими проявлениями острого отравления органическими растворителями являются

- А. боли в грудной клетке
- Б. психомоторное возбуждение, вестибулярные нарушения, тошнота и рвота
- В. боли и онемение конечностей
- Г. схваткообразные боли в животе
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного кроме Б (2)

Профессиональный эпидермоз клинически проявляется

- А. сетчатой пигментацией
- Б. сухостью и шелушением
- В. инфильтрацией и гиперемией
- Г. везикулярными элементами
- Д. все перечисленное

Начальной стадией профессиональной токсической меланодермии является

- А. гиперемия
- Б. сетчатая пигментация
- В. фолликулярный гиперкератоз
- Г. везикулярный элемент
- Д. все перечисленное

К основным синдромам вибрационной болезни, связанной с воздействием общей вибрации относятся

- А. полинейропатия верхних и нижних конечностей с сенсорными нарушениями
- Б. синдром мультифокальной энцефалопатии
- В. синдром паркинсонизма
- Г. полинейропатия верхних и нижних конечностей с сенсорными и вегето-трофическими нарушениями
- Д. полинейропатия верхних конечностей с сенсорными нарушениями в сочетании с пояснично-крестцовой радикулопатией
- Е. все перечисленное кроме Б (2), В (3)

Для хронической интоксикации газообразным хлором не характерны

- А. хронический конъюнктивит, хронический кератит, хронический ринит, хронический фарингит, хронический ларингит, хронический необструктивный бронхит
- Б. Хроническая нефропатия, хронический гепатит
- В. Хронический ринит, хронический фарингит, хронический ларингит, хронический конъюнктивит, хронический кератит, хроническая обструктивная болезнь легких
- Г. хронический конъюнктивит, хронический кератит, хронический ринит, хронический фарингит, хронический ларингит, бронхиальная астма
- Д. хронический конъюнктивит, хронический кератит, хронический ринит, хронический фарингит, бронхиальная астма

Клиническими проявлениями острого отравления металлическим оловом являются

- А. литейная лихорадка, токсический альвеолит
- Б. острый токсический гепатит, токсическая нефропатия
- В. литейная лихорадка
- Г. острый токсический альвеолит
- Д. все перечисленное, кроме 2

Для хронической интоксикации медью и ее соединениями характерны

- А. Хронический бронхит, хронический токсический альвеолит, хронический токсический гепатит,
- Б. токсическая нефропатия, токсический гепатит, хронический токсический бронхит
- В. хронический бронхит, хронический токсический альвеолит, повторные литейные лихорадки
- Г. повторные литейные лихорадки, хронический токсический альвеолит
- Д. все перечисленное, кроме 2

К основным клиническим симптомам острого теплового поражения тяжелой степени относятся все перечисленные, кроме

- А. гипертермии
- Б. гипертензии
- В. гипотонии
- Г. судорог
- Д. остановки дыхания

Клиническим проявлением ранней стадии силикоза не является

- А. сухой кашель
- Б. синдром интоксикации
- В. одышка при незначительной физической нагрузке
- Г. боли в грудной клетке при дыхании
- Д. ослабленное жесткое дыхание над нижнебоковыми отделами легких

Ревматоидный артрит может осложнять течение

- А. антракоза
- Б. силикоза
- В. асбестоза
- Г. пылевого бронхита
- Д. профессиональной бронхиальной астмы

Для злокачественного новообразования костей (саркомы) профессиональной характерны

- А. редкая локализация, наличие предшествующих производственных травм той же локализации
- Б. частая локализация, генетическая предрасположенность
- В. генетическая предрасположенность, кратковременная экспозиция производственных канцерогенов
- Г. частая локализация, кратковременная экспозиция производственных канцерогенов
- Д. все перечисленное

К профессиональным остеоартрозам относят поражение

- А. локтевых суставов
- Б. коленных суставов
- В. тазобедренных суставов
- Г. плечевых суставов
- Д. все перечисленное, кроме В (3)

Профессиональные фотодерматиты характеризуются всем перечисленным кроме:

- А. гиперемии, отека, пузырей на коже
- Б. конъюнктивита, ринита, фарингита
- В. возникновение спустя несколько часов после одновременного контакта с фотодинамическим веществом и инсоляцией
- Г. возникновение спустя несколько дней после одновременного контакта с фотодинамическим веществом и инсоляцией
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации фосфором и его соединениями характерны

- А. хронический токсический бронхит, пневмосклероз, токсическая анемия, рубцы на коже
- Б. хронический токсический бронхит, пневмосклероз, остеопатия костей нижней челюсти, токсическая энцефалопатия
- В. хронический токсический бронхит, токсическая анемия, помутнение роговицы, хронический токсический гепатит
- Г. токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, токсическая анемия
- Д. все перечисленное, кроме 4

Для диагностики свинцовой интоксикации необходимо исследовать в моче:

- А. белок
- Б. аминолевулиновую кислоту
- В. мочевую кислоту
- Г. уробилин
- Д. все перечисленное

Определение степени утраты трудоспособности при профессиональных заболеваниях возложено на

- А. Врачебную комиссию медицинской организации
- Б. центры профессиональной патологии
- В. фонд социального страхования
- Г. бюро медико-социальной экспертизы
- Д. все перечисленное

Патогенез развития интоксикации свинцом и его соединениями включает

- А. угнетение стволовой клетки костного мозга
- Б. нарушение биосинтеза порфиринов и гема
- В. образование метгемоглобина
- Г. гемолиз эритроцитов
- Д. ничего из перечисленного

Особенностями профпатологии как клинической дисциплины являются

- А. тесная связь с гигиеной труда
- Б. тесная связь с общей клинической патологией
- В. взаимодействие с охраной труда и промышленной безопасностью
- Г. взаимодействие с фондом социального страхования
- Д. все перечисленное

Основными изменениями системы крови при воздействии свинца являются

- А. ретикулоцитоз и увеличение эритроцитов с базофильной зернистостью
- Б. снижение количества эритроцитов и уровня гемоглобина
- В. лейкоцитоз и нейтропения
- Г. лейкоцитопения и тромбоцитопения
- Д. все перечисленное

Из перечисленных препаратов комплексонами не является

- А. глутаминовая кислота
- Б. D-пеницилламин
- В. тетацин кальция
- Г. унитиол
- Д. тиосульфат натрия
- Е. все перечисленное

К профессиональным заболеваниям репродуктивных органов у женщин относят

- А. хронический аднексит
- Б. миома матки
- В. опущение стенок влагалища и матки, связанных со значительными физическим нагрузками
- Г. ничего из перечисленного
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями хронической интоксикации хромом и его соединениями являются

- А. эрозия и перфорация носовой перегородки, хронический атрофический ринофаринголарингит, аллергический дерматит и экзема
- Б. хронический токсический бронхит, бронхиальная астма, аллергический дерматит и экзема
- В. хронический токсический гепатит, полинейропатия, дерматит, хронический ринофарингит
- Г. бронхиальная астма, пневмосклероз, аллергический дерматит
- Д. хронический ринофаринголарингит, хронический токсический бронхит, пневмосклероз, аллергический дерматит
- Е. все перечисленное кроме В (3)

целью предварительного медицинского осмотра является

- А. определение соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой работе
- Б. раннее выявление заболеваний
- В. профилактика заболеваний
- Г. все перечисленное

Начало вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации

- А. острое
- Б. подострое
- В. хроническое
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Клинической особенностью пылевого бронхита является

- А. острое начало
- Б. раннее развитие субфебрилитета
- В. раннее и частое присоединение бронхообструктивного синдрома
- Г. редкое присоединение бронхообструктивного синдрома
- Д. все перечисленное

Для интоксикации свинцом и его соединениями характерным изменением в крови является

- А. снижение уровня сывороточного железа
- Б. лейкопения
- В. повышение уровня протопорфирина эритроцитов
- Г. снижение уровня аминолевулиновой кислоты
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями острого отравления медью и ее соединениями являются

- А. литейная лихорадка, острый токсический бронхит, острый ринофарингит
- Б. литейная лихорадка, острый ринофарингит, токсический отек легких, острый токсический альвеолит
- В. литеная лихорадка, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, острый токсический альвеолит
- Г. литейная лихорадка, острый ринофарингит, острый токсический альвеолит, токсический отек легких
- Д. острый токсический гепатит, токсическая нефропатия
- Е. все перечисленное, кроме Д (5)

Расследования случая развития острого профессионального заболевания (отравления) должно быть проведено в течение

- А. одной недели
- Б. одного месяца
- В. одних суток
- Г. трех суток
- Д. пяти суток

Клиническими проявлениями острого токсического воздействия кадмия и его соединений являются

- А. острый токсический бронхит, отек легких, токсическая нефропатия, острый токсический гепатит
- Б. острый трахеит, токсическая пневмония, острый токсический гепатит
- В. острый ринофаринголарингит, острый трахеит, острый бронхит, токсическая нефропатия
- Г. острый токсический бронхолит, отек легких, токсическая пневмония, токсическая нефропатия, острый токсический гепатит
- Д. острый токсический гепатит, астенический синдром
- Е. все перечисленное, кроме Д (5)

Для интоксикации медным купоросом характерны

- А. хронический токсический гепатит, токсическая нефропатия
- Б. хронический оксический гепатит, хронический токсический бронхит
- В. хроническая нефропатия, токсическая полинейропатия
- Г. хронический токсический бронхит, токсическая полинейропатия
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями хронического пылевого бронхита умеренной степени являются

- А. анемия, астенический синдром, астматический синдром
- Б. лейкопения, астматический синдром, вегетативная дисфункция
- В. анемия, инфекционно-воспалительный синдром, обструктивная эмфизема
- Г. астматический, обструктивная эмфизема, инфекционно-воспалительный
- Д. лейкопения, гипоксемия, эмфизема
- Е. все перечисленное

Для хронической интоксикации фтором и его соединениями не характерны

- А. Хронический эрозивный ринит с перфорацией носовой перегородки, пневмосклероз, хроническая обструктивная болезнь легких, остеопатия длинных трубчатых костей
- Б. Хронический эрозивный ринит, пневмосклероз, хронический бронхит, остеопатия длинных трубчатых костей
- В. Хронический эрозивный ринит с перфорацией носовой перегородки, пневмосклероз, хронический токсический альвеолит, остеопатия длинных трубчатых костей
- Г. Хронический ринит, хронический гепатит, полинейропатия
- Д. Пневмосклероз, хроническая обструктивная болезнь легких, остеопатия длинных трубчатых костей

Носительством ртути, свинца и других металлов считают

- А. повышение их содержания в биологических средах при отсутствии клинических признаков интоксикации
- Б. повышение их содержания в биологических средах при наличии отдельных клинических признаков интоксикации
- В. Содержание их в биологических средах в пределах референтных значений при отсутствии клинических признаков интоксикации
- Г. содержание их в биологических средах в пределах референтных значений при наличии отдельных клинических признаков интоксикации
- Д. все перечисленное

Профессиональными заболеваниями, вызванными биологическим фактором, являются

- А. туберкулез
- Б. бруцеллез
- В. гепатит В и С
- Г. СПИД
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями острого отравления кобальтом и его соединениями являются

- А. острый токсический бронхит, отек легких, токсическая нефропатия
- Б. острый токсический бронхит, острый токсический гепатит
- В. литейная лихорадка, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит
- Г. острый токсический бронхит, острый ринит
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации кобальтом и его соединениями характерны

- А. хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз
- Б. хронический токсический бронхит, хронический гепатит
- В. хронический бронхит, эрозия и перфорация носовой перегородки
- Г. пневмосклероз, эмфизема легких, хронический ринит
- Д. все перечисленное

К характерным рентгенологическим изменениям узелковой формы силикоза относят

- А. наличие большого количества узелковых теней размером до 10 мм
- Б. диффузное усиление и деформация легочного рисунка
- В. гомогенные интенсивные затемнения размером 2-10 мм в диаметре
- Г. ячеистый характер легочного рисунка
- Д. инфильтрация легочной ткани с нечеткими контурами

Полинейропатия верхних конечностей при вибрационной болезни от локальной вибрации начальной степени характеризуется

- А. сенсорными нарушениями
- Б. моторными нарушениями
- В. сено-моторными нарушениями
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации бензолом и его гомологами характерно развитие анемии

- А. железодефицитной
- Б. связанной с нарушением синтеза порфиринов
- В. гипопластической
- Г. гемолитической
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации окислами азота характерны

- А. токсическая анемия, келлоидные рубцы, токсический гепатит
- Б. токсический пневмосклероз, хронический токсический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких
- В. токсический пневмосклероз, хронический токсический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, келлоидные рубцы
- Г. хроническая обструктивная болезнь легких, келлоидные рубцы
- Д. все перечисленное, кроме 1

Для периферического ангиодистонического синдрома верхних конечностей от воздействия локальной вибрации характерно

- А. нормальная температура кожи, сухость кожных покровов, нормальная окраска кожных покровов
- Б. гипотермия кожи, сухость кожных покровов, нормальная окраска кожных покровов
- В. нормальная температура кожи, влажность ладоней, нормальная окраска кожных покровов
- Г. гипотермия кожи, влажность ладоней, мраморная или мраморно-цианотичная окраска кожных покровов
- Д. ничено из перечисленного

Клиническими проявлениями острого отравления отравляющими веществами кожно-нарывного действия являются

- А. острый токсический бронхит, контактный дерматит, вегетативная дисфункция
- Б. эритроматозно-буллезный дерматит, острый ларинготрахеобронхит, токсическая кома
- В. эритроматозно-буллезный дерматит, острый ларинготрахеобронхит, токсическая энцефалопатия, токсическая кома
- Г. эритроматозно-буллезный дерматит, острый ларинготрахеобронхит, вегетативная дисфункция
- Д. все перечисленное, кроме 1

Целью периодических медицинских осмотров является

- А. выявление заболеваний, являющихся медицинским противопоказанием для работы во вредных условиях труда
- Б. динамическое наблюдение за состоянием здоровья работающих во вредных/или опасных условиях труда
- В. своевременное выявление начальных признаков профессиональных заболеваний
- Г. выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного

Синдром Рейно ("синдром белых пальцев") при вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, характеризуется

- А. несимметричным побелением пальцев рук
- Б. несимметричным цианозом пальцев рук
- В. симметричным побелением пальцев рук
- Г. симметричным побелением пальцев рук и ног
- Д. генерализованным акроангиоспазмом

Профессиональным заболеванием кожи, сопровождающимся значительной гиперпигментацией кожных покровов, являются

- А. Фотодерматит
- Б. масляный фолликулит
- В. токсическая меланодермия
- Г. микоз гладкой кожи
- Д. экзема

Для хронической интоксикации отравляющими веществами кожно-нарывного действия не характерны

- А. хронический обструктивный бронхит, токсический пневмосклероз, хронический дерматит, рубцовый кератит
- Б. хронический обструктивный бронхит, токсический пневмосклероз, хронический дерматит
- В. хронический обструктивный бронхит, хронический дерматит, рубцовый кератит
- Г. токсическая энцефалопатия, полинейропатия, контактный дерматит
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации таллием и его соединениями характерны

- А. хронический токсический гепатит, хроническая полинейропатия,
- Б. аллопеция, токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, хронический дерматит
- В. аллопеция, хронический гепатит, хронический дерматит
- Г. токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, токсическая нефропатия
- Д. все перечисленное

После прекращения контакта с производственными факторами могут развиваться профессиональные заболевания

- А. вибрационная болезнь
- Б. хроническая интоксикация бензолом и его гомологами
- В. силикоз поздние формы
- Г. онкологические заболевания с локализацией по пути поступления производственного канцерогена
- Д. профессиональная бронхиальная астма

К первичной профилактике профессиональных пылевых бронхитов относится

- А. профилактика воздействия неблагоприятного микроклимата
- Б. проведение курсов антибактериальной терапии работающим в условиях запыленности
- В. совершенствование технологических процессов, направленных на подавление пылевыделения в воздух рабочей зоны
- Г. проведение курсов противовирусной терапии работающим в условиях повышенной запыленности
- Д. проведение профилактической вакцинации против респираторных инфекций работающих в условиях запыленности

Основным документом, подтверждающим инфекционный характер профессионального заболевания является

- А. копия трудовой книжки
- Б. санитарно-гигиеническая характеристика условий труда
- В. результаты обязательных предварительного и периодических медицинских осмотров
- Г. карта эпидемиологического обследования
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации бензолом и его гомологами не характерно в периферической крови

- А. гипер- или нормохромная анемия
- Б. лейкопения с относительным лимфоцитозом
- В. тромбоцитопения
- Г. значительное повышение сывороточного железа
- Д. все перечисленное

В основу современной классификации профессиональной бронхиальной астмы положен принцип

- А. профессиональной принадлежности
- Б. этиологический
- В. патогенетический
- Г. прогностический
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного

Клиническими особенностями профессионального лейкоза являются

- А. преобладание острого лейкоза миелобластного, длительная предшествующая цитопения, длительная экспозиция 10 лет и более производственных канцерогенов, возможность развития в постконтактный период
- Б. острое развитие лейкоза при короткой экспозиции производственных канцерогенов
- В. хроническое течение лейкоза при короткой экспозиции производственных канцерогенов
- Г. лейкоз лимфобластный, короткая экспозиция производственных канцерогенов, развитие в постконтактный период
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации нитро- и аминопроизводными бензола и его гомологов характерны

- А. анемия умеренная, вегетативная дисфункция
- Б. анемия умеренная, токсическая энцефалопатия, хронический токсический гепатит
- В. анемия легкая, вегетативная дисфункция
- Г. хронический гепатит, токсическая энцефалопатия, полинейропатия
- Д. все перечисленное, кроме 4

Для хронической интоксикации оловом и его соединениями характерны

- А. токсический гепатит, токсическая нефропатия, токсический бронхит
- Б. хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмокониоз, токсический гепатит
- В. хронический бронхит, повторные литейные лихорадки, хроническая обструктивная болезнь легких
- Г. повторные литейные лихорадки, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмокониоз
- Д. все перечисленное, кроме 1

При воздействии локальной вибрации поражаются органы и системы, кроме:

- А. периферические нервы, периферические сосуды
- Б. периферические нервы, периферические сосуды, скелетно-мышечная система
- В. желудочно-кишечный тракт
- Г. периферические нервы, скелетно-мышечная система
- Д. все перечисленное

клиническими проявлениями острого отравления фтором и его соединениями являются

- А. острый конъюнктивит, ожог глаз; острый ринит, в том числе эрозивный; острый фарингит, острый ларингит, острый токсический бронхит, ожоги кожи
- Б. острый конъюнктивит, ожог глаз; острый ринит, в том числе эрозивный; острый фарингит, острый ларингит, острый токсический бронхиолит, отек легких
- В. острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, ларингоспазм, токсическая энцефалопатия, ожоги кожи
- Г. острый конъюнктивит, острый ринит, острый фарингит, острый трахеит, токсическая пневмония, отек легких, ожог кожи
- Д. все перечисленное, кроме 3

Для хронической интоксикации пестицидами характерны

- А. токсический гастроэнтерит, токсический гепатит, токсическая энцефалопатия, токсическая нефропатия, миелополлинейропатия, токсическая кардиомиопатия, контактный дерматит
- Б. анемия, токсический гастроэнтерит, токсический гепатит, вегетативная дисфункция, полинейропатия
- В. анемия, токсический гепатит, полинейропатия, токсическая энцефалопатия
- Г. хронический ринит, хронический фарингит, хронический конъюнктивит, хронический бронхит
- Д. все перечисленное, кроме 4

Негативное воздействие на гемопоэз работника оказывают следующие вредные производственные факторы

- А. свинец
- Б. бензол и его гомологи
- В. ионизирующее излучение
- Г. мышьяк и его соединения
- Д. все перечисленное

Хроническая интоксикация марганцем и его соединениями клинически характеризуется

- А. деменцией, тетрапарезом
- Б. вегетативной дисфункцией, токсической энцефалопатией (марганцовый паркинсонизм), деменцией
- В. гемиплегией, деменцией
- Г. токсической анемией, вегетативной дисфункцией
- Д. все перечисленное

Хронический пылевой бронхит развивается при стаже работы

- А. 6 месяцев
- Б. 2-5 лет
- В. 7-10 лет
- Г. не зависит от стажа работы
- Д. в постконтактный период через 5-10 лет
- Е. все перечисленное

Наиболее характерным поражением верхних дыхательных путей при воздействии пыли является

- А. атрофический
- Б. гипертрофический
- В. катаральный
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Для острого отравления таллием и его соединениями характерны

- А. острый энтероколит, острый токсический гепатит, острый дерматит
- Б. аллопеция, токсическая полинейропатия, энцефалопатия, острый энтероколит, острый токсический гепатит, острый дерматит
- В. токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, острый токсический гепатит
- Г. токсическая полинейропатия, энцефалопатия, острый энтероколит
- Д. аллопеция, острый энтероколит, острый гепатит

Комплексное лечение вибрационной болезни включает все кроме

- А. витаминов группы В
- Б. сосудорасширяющих препаратов миотропного действия
- В. нестероидных противовоспалительных средств
- Г. комплексонов
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного

При отравлении фосфорорганическим пестицидами антидотом является

- А. тиосульфат натрия
- Б. пентацин
- В. унитиол
- Г. атропин
- Д. купренил

К профессиональным заболеваниям, связанных с физическим функциональным перенапряжением относят

- А. миофиброз, теносиновиты предплечья, эпикондилиты
- Б. миофиброз, теносиновиты предплечья, эпикондилиты, периартрозы, бурситы
- В. мышечно-тонический синдром шейного и пояснично-крестцового уровня
- Г. радикулопатия(компрессионно-ишемический) синдром шейного и пояснично-крестцового уровня
- Д. все перечисленное

Клиническими проявлениями острого отравления нерастворимыми соединениями бериллия

- А. острый гастрит, острый токсический гепатит, острый токсический бронхит
- Б. литейная лихорадка, острый бронхиолит, острый токсический альвеолит, отек легкого
- В. литейная лихорадка, острый токсический альвеолит, отек легкого
- Г. острый токсический альвеолит, отек легкого
- Д. все перечисленное, кроме 1

Для хронической интоксикации марганцем характерна

- А. сенсо-моторная полинейропатия
- Б. токсическая энцефалопатия (марганцовый паркинсонизм)
- В. токсическая полинейропатия
- Г. полинейропатия с сенсорными нарушениями
- Д. токсическая энцефалопатия с явлениями гемипареза/паралича

Декомпрессионная (кессонная) болезнь легкой степени характеризуется

- А. сыпью на коже и зудом
- Б. мышечными и суставными болями
- В. общим недомоганием
- Г. учащением дыхания и сердечных сокращений
- Д. все перечисленное

Диагностика профессиональных миофиброзов не включает

- А. физикальное пальпаторное обследование, УЗИ мягких тканей, миография глобальная, мышечный кровоток
- Б. рентгенографию мягких тканей, паллестезиометрию
- В. физикальное пальпаторное обследование, миография глобальная, мышечный кровоток
- Г. физикальное пальпаторное обследование, УЗИ мягких тканей, миография глобальная, динамометрия
- Д. все перечисленное

Алгоритм связи заболевания с физическими перегрузками включает наличие соответствия

- А. нозологической формы заболевания и интенсивности физических нагрузок
- Б. характера, локализации, степени выраженности патологического процесса и направленности физических нагрузок выше допустимых показателей
- В. клинического течения заболевания и интенсивностью физических нагрузок
- Г. интенсивностью физических нагрузок и отсутствием других причин для развития заболевания
- Д. все перечисленное

Острое отравление парами металлической ртути характеризуется

- А. металлическим вкусом во рту, головной болью, общим недомоганием, лихорадочным состоянием, рвотой и поносом
- Б. головной болью, общим недомоганием, лихорадочным состоянием, рвотой и поносом
- В. металлическим вкусом во рту, общим недомоганием, рвотой и поносом
- Г. общим недомоганием, лихорадочным состоянием, рвотой и поносом
- Д. головной болью, общим недомоганием, лихорадочным состоянием, тошнотой и рвотой

При хронической интоксикации свинцом и его соединениями анемия является

- А. железодефицитной
- Б. гипопластической
- В. гемолитической
- Г. связанной с нарушением синтеза порфиринов
- Д. связанной с нарушением синтеза ДНК и РНК
- Е. все перечисленное

Злокачественные новообразования костей вызываются следующими производственными факторами канцерогенного действия

- А. бета-нафтиламин, хром и его соединения, поливинилхлорид
- Б. коксы, сажи черные промышленные, формальдегид, дифенилы, этилен оксид, бензол и его производные
- В. радиоактивными веществами с большим периодом полураспада
- Г. бета-нафтиламин, хром и его соединения, поливинилхлорид, вирусы гепатита В и С
- Д. ничего из перечисленного

При диагностике профессиональной бронхиальной астмы в первую очередь следует исключить

- А. тиреотоксикоз
- Б. тромбоэмболию легочной артерии
- В. инфекционно-аллергическую бронхиальную астму
- Г. гипервентиляционный синдром
- Д. острую пневмонию
- Е. все перечисленное
- Ж. ничего из перечисленного

Алгоритм диагностики профессиональной сенсоневральной тугоухости включает в себя

- А. Двусторонний характер поражения, наличие зубца Кархарта при аудиометрии и стаж работы в условиях производственного шума выше ПДУ свыше 10 лет
- Б. односторонний характер поражения, наличие зубца Кархарта при аудиометрии и стаж работы в условиях производственного шума выше ПДУ свыше 10 лет
- В. Двусторонний характер поражения, наличие костно-воздушной диссоциации и стаж работы в условиях производственного шума выше ПДУ свыше 10 лет
- Г. Односторонний характер поражения, наличие костно-воздушной диссоциации и работа в условиях воздействия шума в пределах ПДУ
- Д. Двусторонний характер поражения, наличие зубца Кархарта при аудиометрии, стаж работы в условиях воздействия шума в пределах ПДУ более 10 лет

Выраженным гепатотропным действием обладает

- А. бензин
- Б. четыреххлористый углерод
- В. бензол и его гомологи
- Г. мышьяк и его соединения
- Д. ртуть

Клиническими проявлениями воздействия охлаждающего микроклимата не является

- А. периферический ангиодистонический синдром верхних/нижних конечностей
- Б. гипоталамический синдром
- В. полинейропатия с сенсорными нарушениями
- Г. полинейропатия с сенсорными и вегетативно-трофическими нарушениями
- Д. все перечисленное

Синдром Рейно ("синдром белых пальцев") при вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, развивается при воздействии

- А. локальной вибрации на руки низких частот
- Б. локальной вибрации на руки разных частот
- В. локальной вибрации на руки высоких частот
- Г. общей вибрации разных частот
- Д. все перечисленное

Для профессиональной компрессионной невропатии характерно

- А. постепенное начало в период работы с вредным производственным фактором
- Б. стаж работы не менее 5 лет
- В. воздействие статико-динамических и позных нагрузок выше допустимых значений
- Г. воздействие локальной вибрации
- Д. все перечисленное

К производственной пыли, вызывающий рак легкого, относят

- А. асбесты, кремния диоксид
- Б. пеньковую
- В. хлопковую
- Г. льняную
- Д. глину, шамот, бокситы

К профессиональным заболеваниям опорно-двигательного аппарата не относится

- А. миофиброз предплечий и плечевого пояса
- Б. контрактура Дюпюитрена
- В. эпикондилезы плечевых костей
- Г. бурситы
- Д. крепитирующий теносиновит предплечья

В лечении выраженной стадии интоксикации свинцом и его соединениями наиболее показано

- А. переливание крови
- Б. комплексоны (тетрациклин кальция)
- В. препараты железа
- Г. витамины группы В
- Д. спазмолитики
- Е. все перечисленное

Клиническими проявлениями полинейропатии верхних конечностей являются

- А. ноющие боли в руках, онемение и парестезии в кистях, гипалгезия полиневритического типа, нормальная окраска кожи кистей
- Б. ноющие боли в руках, парестезии в кистях, гипалгезия полиневритического типа, мраморность кистей
- В. ноющие боли, парестезии в кистях, гипалгезия полиневритического типа, снижение вибрационной чувствительности, гипотермия и мраморность кистей
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Для теносинита шиловидного отростка лучевой кости клинически характерно

- А. острое начало, болезненная пальпация шиловидного отростка лучевой кости
- Б. постепенное начало, боли в области шиловидного отростка, усиливающиеся при отведении 1-го пальца, припухлость, односторонний процесс
- В. острое начало, боли в области шиловидного отростка, усиливающиеся при отведении 1-го пальца, припухлость, односторонний процесс
- Г. постепенное начало, болезненная пальпация шиловидного отростка лучевой кости, двусторонний процесс
- Д. ничего из перечисленного

Для острого отравления сероводородом высоких концентраций характерны

- А. головная боль, головокружение, адинамия, патологические рефлексy
- Б. головная боль, головокружение, преходящее нарушение сознания
- В. головная боль, головокружение, цианоз лица и конечностей, адинамия, утрата сознания, летальный исход
- Г. цианоз лица и конечностей, адинамия, утрата сознания, летальный исход
- Д. адинамия, утрата сознания, летальный исход

Для хронической интоксикации бензолом и его гомологами характерно поражение следующей функции кроветворения

- А. эритропоэтической
- Б. лейкопоэтической
- В. мегакариоцитарной
- Г. всех отростков одновременно
- Д. все перечисленное

Для острого отравления мышьяком и его соединениями характерны

- А. токсическая энцефалопатия, гастроэнтерит, токсический гепатит, вегетативные нарушения
- Б. токсический миелополиневрит, энцефалопатия, острый гастроэнтерит, токсический гепатит, вегетативные нарушения
- В. острый гастроэнтерит, токсический гепатит, вегетативные нарушения
- Г. токсическая полинейропатия, токсический гепатит, вегетативные нарушения
- Д. токсическая энцефалопатия, острый гастроэнтерит

Для хронической интоксикации дисульфидом углерода характерны

- А. генерализованное тревожное расстройство
- Б. токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, генерализованное тревожное расстройство
- В. вегетативная дисфункция, токсическая полинейропатия
- Г. хронический гепатит, токсическая энцефалопатия, полинейропатия
- Д. все перечисленное, кроме 4

Диагностический алгоритм вибрационной болезни, связанной с воздействием общей вибрации, включает в себя

- А. гипалгезию дистальных отделов рук и ног, периферические сосудистые и вегетативно-трофические расстройства кистей и стоп, повышение порогов вибрационной и болевой чувствительности
- Б. гипалгезию дистальных отделов рук и ног, периферические сосудистые и вегетативно-трофические расстройства кистей, повышение порогов только болевой чувствительности
- В. гипалгезия дистальных отделов рук и ног, снижение сухожильных рефлексов верхних и нижних конечностей, восприятие вибрации не нарушено
- Г. отсутствие нарушений чувствительности, повышение сухожильных рефлексов верхних и нижних конечностей, снижение силы в конечностях
- Д. отсутствие нарушений чувствительности, угнетение сухожильных рефлексов верхних и нижних конечностей, атрофия мышц кистей и стоп

Клиническими проявлениями острого отравления фосфором и его соединениями являются

- А. острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, острый токсический бронхит, ожоги кожи
- Б. токсическая энцефалопатия, острый токсический бронхит, острый ринит
- В. острый ринит, острый фарингит, острый ларингит, ожоги кожи
- Г. острый ринит, острый фарингит, острый токсический бронхит
- Д. все перечисленное

Хроническая интоксикация парами металлической ртути характеризуется

- А. приступами сердцебиения, колебаниями артериального давления, повышенной потливостью
- Б. головной болью, сердцебиением, повышением артериального давления
- В. головной болью, повышенной истощаемостью, эмоциональной лабильностью, нарушением ритма сна, тахикардией, колебанием артериального давления
- Г. головной болью, повышенной нервной истощаемостью, эмоциональной лабильностью
- Д. повышенной нервной истощаемостью, снижением настроения, нарушением ритма сна

Основными диагностическими методами профессионального бронхита являются

- А. спирометрия
- Б. спирометрия, бронхоскопия
- В. компьютерная томография органов грудной клетки
- Г. бодиплетизмография
- Д. биохимический и иммунологический анализы крови

Клиническими проявлениями синдрома Рейно при воздействии локальной вибрации являются

- А. гипотермия и мраморность кистей
- Б. приступы побеления дистальных фаланг пальцев рук
- В. гипотермия и мраморность кистей, приступы побеления дистальных фаланг пальцев рук
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Синдром Рейно пальцев рук развивается при воздействии локальной вибрации

- А. низких частот
- Б. средних частот
- В. высоких частот
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

Для хронической интоксикации органическими цианидами характерны

- А. гипохромная анемия умеренная, токсическая энцефалопатия, ожоги кожи
- Б. гиперхромная анемия, токсическая энцефалопатия, хронический бронхит
- В. гипохромная анемия умеренная, токсическая энцефалопатия
- Г. гипохромная анемия умеренная
- Д. все перечисленное, кроме 2

Клиническими проявлениями поражения верхних дыхательных путей, связанные с воздействием аэрозолей сложного состава являются

- А. хронический синусит
- Б. хронический фарингит
- В. хронический ринофаринголарингит, хронический гиперпластический ларингит
- Г. хронический ларингит
- Д. ничего из перечисленного

Клиническими проявлениями острого отравления таллием и его соединениями являются

- А. аллопеция, токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, острый дерматит
- Б. острый токсический бронхит, острый токсический гепатит
- В. острый токсический гепатит, токсическая полинейропатия, острый дерматит
- Г. аллопеция, токсический гепатит, острый дерматит
- Д. все перечисленное

Все утверждения по силикозу являются верными за исключением

- А. интерстициальная болезнь легких
- Б. вовлечение в процесс прикорневых лимфоузлов
- В. вовлечение в процесс плевры
- Г. частое осложнение туберкулезом
- Д. развитие легочной эмболии

Для хронической интоксикации растворимыми соединениями бериллия характерны

- А. хронический бронхит, пневмосклероз, хроническая обструктивная болезнь легких, бериллиоз
- Б. хронический бронхит, токсический гепатит, хронический ларингит
- В. хронический конъюнктивит, хронический дерматит, хронический гепатит
- Г. хронический бронхит, хронический дерматит, хронический гепатит
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации цианистым водородом характерна

- А. токсический гепатит
- Б. нефропатия токсическая
- В. энцефалопатия токсическая
- Г. анемия токсическая
- Д. ничего из перечисленного

Извещение об установлении заключительного диагноза профессионального заболевания, его изменении или отмене направляется в

- А. территориальное управление Роспотребнадзора
- Б. медицинскую организацию, направившую больного
- В. фонд социального страхования
- Г. бюро медико-социальной экспертизы
- Д. работодателю
- Е. все перечисленное, кроме 4

Для хронической интоксикации мышьяком и его соединениями характерны

- А. токсическая полинейропатия и миелополинейропатия, энцефалопатия, токсический гепатит, анемия гемолитическая, аллопеция, депигментация ногтей, дерматиты, меланодермия, эрозия и перфорация носовой перегородки
- Б. миелополинейропатия, энцефалопатия, токсический гепатит, анемия гипохромная, дерматиты, меланодермия, эрозия носовой перегородки
- В. токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, аллопеция
- Г. токсическая полинейропатия, дерматиты, меланодермия, эрозия и перфорация носовой перегородки
- Д. токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия

Диагностический алгоритм вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, включает в себя

- А. гипалгезию дистальных отделов рук, снижение сухожильных рефлексов и периферические вегетативно-трофические расстройства кистей
- Б. гипалгезию дистальных отделов рук, периферические сосудистые и вегето-трофические расстройства кистей, повышение порогов вибрационной и болевой чувствительности
- В. гипалгезия дистальных отделов рук, периферические вегетативно-трофические расстройства кистей, повышение порогов только болевой чувствительности
- Г. периферические сосудистые и вегетативно-трофические расстройства на кистях, повышение порогов вибрационной чувствительности
- Д. отсутствие нарушений чувствительности, угнетение сухожильных рефлексов рук и атрофия мышц кистей
- Е. ничего из перечисленного, кроме Б(2), Г(4)

Профессиональную этиологию бронхиальной астмы исключают

- А. положительные тесты с бактериальными и пылевыми аллергенами
- Б. отрицательные тесты с бронхолитиками при спирометрии
- В. отрицательные тесты с профессиональными аллергенами
- Г. отрицательные результаты лабораторных иммунологических тестов с профессиональными аллергенами
- Д. все перечисленное

Воздействие общей вибрации на организм работающей женщины не вызывает

- А. меноррагии
- Б. самопроизвольные выкидыши
- В. преждевременные роды
- Г. кисту яичника
- Д. опущение стенок влагалища и матки

Основными принципами лечения профессиональных заболеваний являются

- А. патогенетический
- Б. этиологический
- В. симптоматический
- Г. все перечисленное

При пылевом бронхите бронхоспазм обусловлен

- А. гиперсекрецией и деформацией бронхов
- Б. рефлекторным раздражением слизистых бронхов и сенсibilизацией организма
- В. атрофией слизистых бронхов и бронхиальных желез
- Г. атрофией слизистой бронхов и сенсibilизацией организма
- Д. атрофией слизистых бронхов и гиперсекрецией
- Е. ничего из перечисленного

Наиболее ранней жалобой при силикозе является

- А. кровохарканье
- Б. кашель с мокротой
- В. боль в грудной клетке
- Г. сердцебиение
- Д. субфебрилитет по вечерам

Острое отравление парами металлической ртути развивается при

- А. систематическом воздействии низких концентраций паров ртути в течение нескольких рабочих смен
- Б. воздействии высоких концентраций паров ртути в течение нескольких рабочих смен
- В. однократном воздействии высоких концентраций паров ртути в течение одной рабочей смены
- Г. однократном разовом воздействии невысоких концентраций паров ртути в течении одной рабочей смены
- Д. однократном разовом воздействии металлической ртути на кожу кистей рук во время работы

Репротоксиканты при воздействии на организм работающих женщин могут вызывать

- А. самопроизвольные аборты
- Б. атония матки в родах, кровотечение
- В. внутриутробная асфиксия плода
- Г. мертворождение
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного

Санитарно-гигиеническую характеристику условий труда работника при подозрении у него профессионального заболевания составляет

- А. работодатель -администрация предприятия
- Б. главный врач медицинской организации, установившей диагноз профессионального заболевания
- В. цеховой врач-терапевт
- Г. санитарный врач управления Роспотребнадзора
- Д. врач профпатолог

К основным клиническим синдромам вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации, относятся

- А. пояснично-крестцовая радикулопатия
- Б. периферический ангиодистонический синдром верхних конечностей, в том числе с синдромом Рейно
- В. полинейропатия верхних конечностей с сенсорными и вегето-трофическими нарушениями
- Г. полинейропатия периферическая с сенсорными и моторными нарушениями
- Д. полинейропатия верхних конечностей с сенсорными нарушениями
- Е. все перечисленное, кроме А (1)

Клиническими проявлениями острого отравления дисульфидом углерода не являются

- А. токсическая энцефалопатия, кома
- Б. вегетативно-сосудистая дисфункция
- В. токсическая энцефалопатия
- Г. острый токсический гепатит
- Д. все перечисленное

Для хронической интоксикации свинцом характерны

- А. токсическая энцефалопатия, токсическая полинейропатия, токсический гепатит
- Б. сидероахристическая анемия, токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, синдром моторной дискинезии
- В. сидероахристическая анемия, токсическая полинейропатия, токсическая энцефалопатия, хронический токсический гепатит
- Г. астенический синдром, сидероахристическая анемия
- Д. астенический синдром, полинейропатия, перемежающаяся порфириурия

Наиболее частыми осложнениями силикоза являются

- А. пневмония
- Б. туберкулез
- В. рак легкого
- Г. бронхиальная астма
- Д. все перечисленное
- Е. ничего из перечисленного, кроме 2

Кишечная колика характерна для токсического действия

- А. ртути
- Б. бензина
- В. мышьяка
- Г. свинца
- Д. нафтиламина

Для острого отравления сероводородом низких концентраций характерны

- А. насморк, кашель, першение в горле, субфебрильная температура
- Б. насморк, кашель, першение в горле, слезотечение
- В. слезотечение, ощущение песка в глазах, гиперемия конъюнктив, блефароспазм
- Г. насморк, кашель, ощущение песка в глазах, гиперемия конъюнктив, блефароспазм
- Д. насморк, кашель, головная боль, общая слабость

Профессиональными заболеваниями верхних дыхательных путей, вызванных производственными аллергенами, являются

- А. аллергический ринит, аллергический синусит, аллергический фарингит, аллергический ларингит, отек Квинке
- Б. субатрофический ринит, хронический фарингит, хронический ларингит
- В. хронический синусит, хронический фарингит
- Г. хронический фарингит, хронический ларингит
- Д. ничего из перечисленного

Злокачественные новообразования органов дыхания вызываются следующими производственными канцерогенами

- А. хром и его соединения, никель, асбест, тальковая пыль, ПАУ, формальдегиды, уран, радон, соединения бериллия и кадмия, диоксид кремния
- Б. винилхлорид и продукты его полимеризации, афлатоксины, технический углерод, паразиты
- В. хром и его соединения, никель, мышьяк, асбест, тальковая пыль, ПАУ, формальдегиды, уран, радон, соединения бериллия и кадмия, диоксид кремния
- Г. хром и его соединения, никель, мышьяк, асбест, тальковая пыль, ПАУ, формальдегиды, уран, радон, соединения бериллия и кадмия, диоксид кремния, акрилонитрил
- Д. все перечисленное, кроме 2

Для диагностики вибрационной болезни не используются методы исследования

- А. кожная термометрия, холодовая проба, паллестезиометрия
- Б. кожная термометрия, холодовая проба, паллестезиометрия, реовазография, электронейромиография
- В. бодиплетизмография, эхокардиография, бронхоскопия
- Г. кожная термометрия, холодовая проба, паллестезиометрия, реовазография, электронейромиография, альгезиметрия
- Д. все перечисленное

Возникновение синдрома Рейно при вибрационной болезни, связанной с воздействием локальной вибрации провоцируется

- А. общим озноблением организма
- Б. воздействием локальной вибрации на руки работника
- В. психо-эмоциональными нагрузками
- Г. общим перегреванием организма
- Д. местным охлаждением кистей рук
- Е. все, кроме Г (4)

Проявлениями острого отравления хромом и его соединениями являются

- А. острый ринит, острый фарингит, полинейропатия, синдром раздраженного кишечника
- Б. острый ринофаринголарингит, острый токсический бронхит, острый токсический бронхиолит, токсическая пневмония, отек легких
- В. острый токсический бронхит, токсическая пневмония, отек легких
- Г. острый ринофаринголарингит, головная боль, общее недомогание
- Д. острая токсическая пневмония, отек легких

Клинические проявления острого отравления пестицидами определяются

- А. химическим составом, способом поступления в организм работника, характером и механизмом действия, классом опасности
- Б. химическим составом
- В. способом поступления в организм работника
- Г. классом химической опасности
- Д. ничего из перечисленного

Интоксикация тетраэтилсвинцом характеризуется

- А. астеническим синдромом, токсической энцефалопатией и психозом
- Б. токсической энцефалопатией и токсическим психозом
- В. астеническим синдромом, токсической энцефалопатией при сохранности психики
- Г. токсической энцефалопатией и токсической полинейропатией
- Д. астеническим синдромом и полинейропатией

Для диагностики профессиональной бронхиальной астмы концентрация в воздухе рабочей зоны производственного аллергена имеет решающее значение

- А. не имеет
- Б. имеет
- В. все перечисленное
- Г. ничего из перечисленного

Профессиональные лейкозы вызываются следующими производственными факторами канцерогенного действия

- А. железо и его соединения, ванадий и его соединения, дисульфид углерода
- Б. ионизирующее излучение, в том числе радионуклиды; бензол, этиленоксид, хлорорганические соединения, винилхлорид
- В. свинец и его соединения, диоксид кремния, железо и его соединения, ванадий и его соединения
- Г. диоксидом кремния, тальковой пылью, железом и его соединениями
- Д. все перечисленное

При хронической интоксикации органическими растворителями не развивается

- А. астено-невротический синдром
- Б. полинейропатия
- В. артериальная гипертензия
- Г. геморрагический синдром
- Д. панцитопенический синдром

Клиническими проявлениями острого отравления никелем и его соединениями являются

- А. острый ринит, острый фарингит, острый ларингит,
- Б. литейная лихорадка, острый ринит, острый фарингит, острый ларингит
- В. литейная лихорадка, острый ринит, острый фарингит
- Г. острый токсический бронхит, отек легкого
- Д. все перечисленное, кроме 4

К обязательным методам исследования слуха при периодических медицинских осмотрах относятся

- А. пороговая тональная аудиометрия
- Б. исследование слуха с помощью камертона
- В. альгезиметрия
- Г. паллестезиометрия
- Д. проба Вебера

Патоморфологическими признаками изменения слизистых верхних дыхательных путей (ВДП) при воздействии фиброгенной пыли являются

- А. Лимфоидная инфильтрация и метаплазия мерцательного эпителия ВДП
- Б. Гипертрофия и атрофия эпителия
- В. Воспалительные изменения в слизистых ВДП
- Г. отсутствие изменений слизистых

Злокачественные новообразования печени вызываются следующими вредными производственными факторами канцерогенного действия

- А. мышьяк, афлатоксины, радиоактивные вещества (полоний, торий и др.), винилхлорид и продукты его полимеризации, формальдегиды, технический углерод, вирусы, паразиты
- Б. диоксидом кремния, тальковой пылью
- В. свинец и его соединения, диоксид кремния, дисульфид углерода, железо и его соединения
- Г. свинец и его соединения, диоксид кремния, дисульфид углерода, железо и его соединения, ванадий и его соединения
- Д. ничего из перечисленного

Осложнением, которое не развивается при пылевом бронхите, является

- А. легочная недостаточность
- Б. эмфизема легких
- В. анемия
- Г. легочное сердце
- Д. бронхиальная астма

Для хронической интоксикации хлоридом, сульфидом цинка характерны

- А. хронический токсический бронхит, токсический гепатит
- Б. ирритантный дерматит, ожоги, язвы при попадании на кожу с исходом в рубцы
- В. хронический токсический бронхит
- Г. хронический токсический гепатит
- Д. все перечисленное

Для силикоза и диссеминированного туберкулеза легких не характерно

- А. симметричность поражения легких
- Б. локализация очаговых теней в кортикальном отделе легких
- В. увеличение прикорневых лимфоузлов
- Г. асимметрия поражения легких
- Д. вовлечение в патологический процесс плевры

Развитию астенопии (зрительного утомления) при зрительных нагрузках способствуют

- А. дефекты оптической системы глаз (аметропия)
- Б. дефекты мышечного равновесия (гетерофории)
- В. снижение резервов аккомодации, конвергенции, содружественного движения глаз
- Г. все перечисленное
- Д. ничего из перечисленного

К системам организма, наиболее подверженным поражению при интоксикации свинцом, относят

- А. Мочевыделительную систему
- Б. Кожу
- В. Органы пищеварения
- Г. Систему крови, нервную систему

Объем доврачебной первичной медико-санитарной помощи при отравлении фос вне очага поражения включает

- А. Применение амилнитрита, кислородную терапию
- Б. Надевание противогаза и средств защиты кожи
- В. Надевание противогаза, применение профилактического антидота П-10М
- Г. Введение пеликсима, проведение частичной санитарной обработки, оксигенотерапию с помощью переносных ингаляторов кислорода

Патологическим ритмом ээг является _____ амплитудой _____ мкв

- А. Δ-ритм; свыше 40
- Б. В-ритм; до 15
- В. М-ритм; до 50
- Г. А-ритм; до 100

Лечение больных персистирующей профессиональной бронхиальной астмой среднетяжелого течения включает

- А. Применение бронходилататоров короткими курсами по потребности
- Б. Ежедневные ингаляции β₂-агонистов в сочетании с антихолинергическими препаратами пролонгированного действия
- В. Применение системных глюкокортикостероидов
- Г. ИГКС в комбинациях с формотеролом в высоких дозах

Наиболее характерным для острой интоксикации тетраэтилсвинцом синдромом является

- А. Токсическая пневмония
- Б. Интоксикационный психоз
- В. Токсическая кома
- Г. Токсическая энцефалопатия

При профессиональных заболеваниях верхних дыхательных путей эндоскопически выявляют

- А. Суб-и атрофические изменения слизистой
- Б. Деформации язычка
- В. Отек и кровоизлияния
- Г. Гипертрофию слизистой

Медицинские работники имеют право на

- А. Выпуску лекарственных препаратов на бланках, содержащих рекламную информацию
- Б. Оплату отдыха, проезда к месту отдыха за счет организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов
- В. Предоставление пациенту образцов лекарственных препаратов, полученных бесплатно от фармацевтических компаний
- Г. Стимулирование труда в соответствии со спецификой и сложностью работы

Профессиональные заболевания среди медицинских работников чаще устанавливаются

- А. Врачами-инфекционистами
- Б. Врачами-фтизиатрами
- В. Врачами-анестезиологами
- Г. Врачами-хирургами

Степень тяжести острой интоксикации монооксидом углерода определяется

- А. Частотой сердечных сокращений
- Б. Уровнем артериального давления
- В. Изменением окраски кожных покровов
- Г. Сохранностью сознания

К веществам с остронаправленным механизмом действия относятся

- А. Фтор
- Б. Железо
- В. Хлор, тетраэтилсвинец
- Г. Магний

Медицинской организации присваивается статус клинической, если на базе организации

- А. Ведется научно-исследовательская деятельность
- Б. Проводится подготовка информационно-аналитических материалов
- В. Осуществляется практическая подготовка медицинских работников
- Г. Проводятся клинические испытания

Дополнительным противопоказанием к работе в условиях воздействия кремния диоксида кристаллического является

- А. Искривление носовой перегородки без нарушения функции носового дыхания
- Б. Простой контактный дерматит в случае трех обострений в течение года
- В. Хронический бронхит в случае двух и более обострений в течение года
- Г. Хроническая обструктивная болезнь легких без обострений

На механизаторов сельского хозяйства преимущественно воздействует вибрация

- А. Общая
- Б. Комбинированная
- В. Высокочастотная
- Г. Локальная

К профессиям, в которых наиболее часто встречаются интоксикации хромом, относят

- А. Инженера-механика
- Б. Слесаря -сантехника
- В. Электросварщика, гальваника
- Г. Строителя-монтажника

К нерезко выраженному уменьшению содержания гемоглобина у мужчин относится показатель (в г/л)

- А. 150-160
- Б. 142-145
- В. 125
- Г. 160-180

Начальная стадия хронической ртутной интоксикации характеризуется

- А. Ртутным эретизмом
- Б. Нарушением почерка
- В. Вегетативными нарушениями
- Г. Тремором пальцев вытянутых рук

Инфекционные осложнения у больных острой лучевой болезнью вероятны при уровне нейтрофилов в крови менее

- А. Нормы
- Б. 100 В мкл
- В. 500 В мкл
- Г. 3 000 В мкл

У пациента с биссинозом при жел - 69%, офв1 - 40%, ведущим типом нарушения фвд является

- А. Обтурационный
- Б. Смешанный
- В. Рестриктивный
- Г. Обструктивный

Преимущественная локализация остеопороза при хронической интоксикации фосфором происходит в

- А. Таз
- Б. Челюсти
- В. Длинные трубчатые кости
- Г. Позвоночник

Вибрационная болезнь чаще возникает у

- А. Пекаря
- Б. Столяра
- В. Обрубщика
- Г. Стропальщика

Канцерогенным действием обладает

- А. Алюминий
- Б. Тальк
- В. Титан
- Г. Хром

Документом, устанавливающим перечень профессиональных заболеваний в РФ, является

- А. Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 417н
- Б. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н
- В. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 г № 426-ФЗ
- Г. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967

При длительном воздействии веществ раздражающего действия в высоких концентрациях причиной летального исхода чаще всего является

- А. Острая сердечная недостаточность
- Б. Токсический отёк лёгких
- В. Острая почечная недостаточность
- Г. Токсическая гепатопатия

Свинец применяется в производстве

- А. Деревообрабатывающем
- Б. Лекарств
- В. Красок и глазури для гончарных изделий
- Г. Продуктов питания

По фиброгенным свойствам пыль, содержащую более 10% свободной двуокиси кремния, относят к

- А. Высокофиброгенной
- Б. Слабофиброгенной
- В. Пыли с умеренной фиброгенной активностью
- Г. Афиброгенной

Показателем зрительно напряжённой работы является занятость точной измерительной работой в течение рабочего времени ____% и более

- А. 80
- Б. 90
- В. 60
- Г. 50

Масляные фолликулы чаще локализуются на

- А. Лице
- Б. Всей поверхности тела
- В. Местах контакта со смазочными маслами
- Г. Спине

К особенностям поражения ирритантом хлорацетофеноном относят

- А. Отсутствие скрытого периода, преобладание симптомов поражения глаз, быстрое исчезновение симптомов поражения после прекращения контакта с ядом
- Б. Преобладание симптомов поражения дыхательных путей
- В. Преобладание симптомов поражения верхних дыхательных путей, замедленное исчезновение симптомов поражения после прекращения контакта с ядом, наличие скрытого периода
- Г. Наличие скрытого периода, замедленное исчезновение симптомов поражения после прекращения контакта с ядом

Инвалидом признается лицо, имеющее _____ нарушение здоровья, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость

- А. Обратимое; его санаторно-курортного лечения и реабилитации
- Б. Незначительное; его стационарного лечения
- В. Временное; выдачи ему листка нетрудоспособности
- Г. Стойкое; его социальной защиты

При обосновании пдк раздражающий эффект определяют по

- А. Порогу острого действия вещества (L_{imac})
- Б. Растворимости
- В. Реакционной способности
- Г. Дисперсности

Для выявления сенситивной динамической атаксии больному необходимо

- А. Стать в позу Ромберга с закрытыми глазами
- Б. Стоя отклониться назад
- В. Осуществить фланговую походку
- Г. Пройти с закрытыми глазами

При хронических профессиональных молибденозах кроме повышения содержания молибдена всегда повышается содержание

- А. Щелочной фосфатазы
- Б. АЛТ и АСТ
- В. Мочевой кислоты
- Г. Креатинфосфокиназы

Основным санитарно-гигиеническим мероприятием, направленным на предупреждение интоксикации amino- и нитросоединениями бензола, является

- А. Соблюдение температурного режима в производственных помещениях
- Б. Обработка стен хлорамином
- В. Ношение берушей, наушников
- Г. Приточно-вытяжная вентиляция

При сварочных работах марганец находится в воздухе рабочей зоны в виде

- А. Аэрозоля дезинтеграции
- Б. Аэрозоля конденсации
- В. Пара
- Г. Газа

Если мощность дозы гамма-излучения от пострадавшего, одежды, раневых поверхностей выше 0,1 сгр/ч должна быть организована защита персонала, при которой необходимо

- А. Планировать защиту «временем» и «расстоянием» с организацией индивидуального дозиметрического контроля
- Б. Организовать индивидуальный дозиметрический контроль
- В. Планировать защиту только «временем»
- Г. Планировать защиту только «расстоянием»

Для интоксикации ароматическими углеводородами характерно преимущественное поражение _____ системы

- А. Кроветворной
- Б. Мочеполовой
- В. Пищеварительной
- Г. Дыхательной

О синдроме гепатоцеллюлярной недостаточности при воздействии гепатотропных ядов свидетельствует

- А. Повышение активности сывороточных трансаминаз
- Б. Уменьшение альбуминов в сыворотке крови
- В. Увеличение активности щелочной фосфатазы
- Г. Изменение показателей осадочных проб

Абсолютным признаком острого отравления оксидом углерода (ii) является повышение

- А. Концентрации гликированного гемоглобина
- Б. Концентрации карбоксигемоглобина
- В. Уровня мочевой кислоты
- Г. Уровня калия, натрия

Контрастное усиление при компьютерной томографии мозга применяют для

- А. Определения геморрагического инфаркта мозга
- Б. Оценки состояния гематоэнцефалического барьера независимо от характера церебрального процесса
- В. Установления геморрагического пропитывания очага ушиба мозга
- Г. Выявления отека мозга, сопутствующего инсульту

Стадией канцерогенеза, во время которой происходит процесс эволюции опухоли, является

- А. Прогрессия
- Б. Инициация
- В. Регрессия
- Г. Промоция

Летальной дозой при отравлении дихлорэтаном является (в мл)

- А. Более 100-150
- Б. 20-30
- В. 50-100
- Г. Более 150-200

К основному фактору, усиливающему действие шума на организм работающего, относят

- А. Неблагоприятные метеоусловия
- Б. Вибрацию
- В. Контактный ультразвук
- Г. Токсические вещества

К лечебным мероприятиям, необходимым для купирования свинцовой колики, относят

- А. Назначение седативных препаратов
- Б. Назначение слабительных средств
- В. Введение комплексона тетацина-кальция
- Г. Паранефральную новокаиновую блокаду

Плохое выделение с мочой жирорастворимых веществ обусловлено

- А. Снижением реабсорбции натрия
- Б. Изменением pH мочи
- В. Плохой растворимостью в воде
- Г. Снижением образования первичной мочи

Холодовая проба при вибрационной болезни считается положительной, если отмечается

- А. Цианоз кистей
- Б. Повышение кожной температуры на кистях на 1-1,5 С°
- В. Цианоз кистей и пальцев рук
- Г. Побеление пальцев рук

Для острого отравления диоксином характерен скрытый период продолжительностью

- А. 1-2 Суток
- Б. 1-2 Часа
- В. 1-2 Минуты
- Г. 1-2 Недели

Методом исследования, который используют для диагностики полиневропатии является

- А. Рентгенография
- Б. Ультразвуковая доплерография
- В. Электронейромиография
- Г. Магнитно-резонансная томография

К веществам - эффективным дегазаторам для фосфорорганических инсектицидов относят

- А. Хлорсодержащие окислители
- Б. Перекись водорода
- В. Перманганат калия
- Г. Водные растворы щелочей

Первоочередным в профилактике осложнений профессиональной астмы является

- А. Десенсибилизирующая терапия
- Б. Базисная терапия бронхиальной астмы
- В. Использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей
- Г. Своевременное отстранение от контакта с производственными агентами

По химическому составу в группу ртутьорганических пестицидов входят

- А. Соли ртути
- Б. Фосфорорганические соединения
- В. Органические соединения
- Г. Пиретроиды и хлорорганические соединения

Удаление радиоактивных веществ с загрязненных поверхностей и из различных сред до допустимого уровня называют

- А. Дегазацией
- Б. Дезактивацией
- В. Дезинфекцией
- Г. Детоксикацией

Учетной формой 058/у является

- А. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, психического заболевания
- Б. Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов
- В. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования
- Г. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку

При жел - 72%, офв - 70%, нарушение фвд

- А. III степени по обструктивному типу
- Б. Не наблюдается
- В. По рестриктивному типу умеренной степени
- Г. По смешанному типу

Группу риска развития профессионального заболевания следует формировать

- А. В процессе диспансерного наблюдения за работниками
- Б. При анализе данных амбулаторно-поликлинического обследования
- В. По результатам периодического медицинского осмотра
- Г. По заключениям врачей лечебно-профилактических учреждений

Для подтверждения профессионального генеза бронхиальной астмы необходимо проведение

- А. Биохимического исследования крови (острофазовые реакции)
- Б. Теста с реэкспозицией производственного аллергена
- В. Бронхологического обследования
- Г. Цитологического исследования мокроты

Уменьшение объема легочной ткани при экзофитном росте рака легкого чаще наблюдается при

- А. Клапанной эмфиземе
- Б. Обтурационной пневмонии
- В. Ателектазе
- Г. Гиповентиляции

Работа на конвейере характеризуется

- А. Отсутствием монотонии
- Б. Значительным физическим напряжением
- В. Перемещениями на большие дистанции
- Г. Повторяющимися операциями

Диагноз профессиональной нейроинтоксикации вероятен при стаже работы

- А. До 5 лет в допустимых условиях труда
- Б. До 5 лет с токсическим профессиональным фактором во вредных и опасных условиях труда
- В. До 5 лет и контакте с аллергеном на рабочем месте
- Г. Длительном с токсическим профессиональным фактором во вредных и опасных условиях труда

Антидотом для оказания первой помощи при острых поражениях фосфорорганическими соединениями у спасателей является

- А. Пеликсим
- Б. Ацизол
- В. Фицилин
- Г. Амилнитрит

При хронической интоксикации бензолом наблюдается анемия

- А. В12- и фолиево-дефицитная
- Б. Железодефицитная
- В. Апластическая
- Г. Гемолитическая

Для нейропатии локтевого нерва характерным является

- А. \"Свисающая кисть\" и невозможность приведения IV, V пальцев
- Б. \"Свисающая кисть\" и невозможность приведения V пальца
- В. Невозможность приведения IV, V пальцев
- Г. Нарушение чувствительности в области I, II пальцев кисти

Отличительной особенностью ртутного тремора является

- А. Ритмичность
- Б. Симметрия в степени выраженности
- В. Крупноразмашистость
- Г. Неритмичность и асимметрия в степени выраженности

К случаям группового поражения относятся те, при которых получили острое отравление _____ человек

- А. 2 и более
- Б. 15
- В. 5
- Г. 10

В проявлениях профессиональных бронхитов считают характерным

- А. Синдром экспозиции и элиминации
- Б. Наличие инфекционного воспаления
- В. Острое течение
- Г. Первично хроническое течение

Профилактика профессиональных дерматозов включает _____ мероприятия

- А. Лечебные
- Б. Технологические
- В. Санитарно-гигиенические
- Г. Санитарно-технические

К показаниям для экстренной госпитализации в специализированный стационар при поступлении радионуклидов внутрь относят

- А. Установление показаний к переводу в специализированную радиологическую клинику
- Б. Необходимость оперативного вмешательства в условиях специализированного хирургического стационара
- В. Необходимость интенсивного лечения в условиях специализированной радиологической клиники
- Г. Наличие данных клинико-дозиметрического обследования о содержании радионуклидов в критических органах и системах свыше 2,5 ПГП

Вместе с беталейкином нельзя применять

- А. Латран
- Б. Димедрол
- В. Диклофенак
- Г. Дексаметазона фосфат

Антидотами для лечения отравлений метанолом являются

- А. Унитиол и тиосульфат натрия
- Б. Активированный уголь или другие энтеросорбенты
- В. Фолиевая кислота и этиловый спирт
- Г. Амилнитрит и ацизол

Медицинские работники обязаны

- А. Предоставлять информацию в письменном виде по просьбе родственников о состоянии и диагнозе пациента
- Б. Сообщать работодателю о заболевании сотрудника
- В. Соблюдать врачебную тайну
- Г. Рассказывать представителям средств массовой информации о случаях поступления пациентов с криминальными травмами

К случаям групповых острых отравлений относятся поражения, при которых пострадали _____ и более работников

- А. 5
- Б. 2
- В. 20
- Г. 10

Наиболее эффективным путем борьбы с вибрацией на производстве является уменьшение её интенсивности

- А. Путём применения средств коллективной защиты
- Б. По пути распространения
- В. В источнике образования
- Г. Путём применения средств индивидуальной защиты

К формам хронического токсикохимического поражения органов дыхания можно отнести

- А. Истинную хроническую интоксикацию
- Б. Токсический фиброзирующий пневмонит
- В. Отдаленные последствия острой интоксикации
- Г. Бронхиальную астму

Для подтверждения диагноза «хроническое профессиональное заболевание» больного следует направить

- А. В медучреждение, оказывающее специализированную помощь по выявленным заболеваниям
- Б. В центр профпатологии
- В. В центр гигиены и эпидемиологии
- Г. К участковому врачу по месту жительства

Антидот для лечения при остром отравлении фосфорорганическим соединением

- А. Тиосульфат натрия
- Б. Активированный уголь
- В. Унитиол
- Г. Атропин

Наличие при профессиональной бронхиальной астме бактериальной аллергии

- А. Никогда не встречается
- Б. Возможно вне зависимости от условий труда
- В. Полностью исключается
- Г. Зависит от характера условий труда

При солнечном дерматите скрытый период составляет (в днях)

- А. 1-2
- Б. 0
- В. 6
- Г. 3-4

Диагноз «малого» инсульта ставят при полном регрессе неврологической симптоматики через

- А. 24 Часа
- Б. 3 Суток
- В. 21 Сутки
- Г. 7 Суток

Профессиональные аллергические конъюнктивиты вызываются

- А. Солями металлов
- Б. Свинцовой пылью
- В. Лакокрасочными покрытиями
- Г. Косметическими средствами

Преимущественно нейротропным действием обладает

- А. Кадмий
- Б. Никель
- В. Ртуть
- Г. Хром

Этиологическим фактором для пневмокониозов считают

- А. Пыль растительного происхождения (хлопка, сизали и т.д.)
- Б. Неорганическую пыль, содержащую диоксид кремния кристаллический
- В. Химические вещества, обладающие токсическим действием
- Г. Вещества сенсibiliзирующего действия

К промышленным аллергенам относят вещества

- А. Органической, химической природы
- Б. Минеральной природы
- В. Газообразные и парообразные вещества
- Г. Токсические

При частоте дыхания – 16 в минуту, жел – 90%, офв1 – 70%, индексе тифно – 60% функция дыхания

- А. Не нарушена
- Б. Нарушена по обструктивному типу
- В. Нарушена по смешанному типу
- Г. Нарушена по рестриктивному типу

Смертность детей в течение первых 12 месяцев жизни называется

- А. Детской
- Б. Перинатальной
- В. Младенческой
- Г. Неонатальной

Одним из методов диагностики бронхиальной астмы, вызванной агентами высокомолекулярной массы, является подсчет количества

- А. Нейтрофилов в периферической крови и мокроте
- Б. Эозинофилов в периферической крови
- В. Эозинофилов в мокроте
- Г. Эозинофилов в периферической крови и мокроте

К нозологической форме, при которой формируются эпителиоидно-клеточные гранулемы, относят

- А. Бериллиоз
- Б. Саркоидоз
- В. Экзогенный аллергический альвеолит
- Г. Асбестоз

В крови при хронической интоксикации оксидом углерода (ii) выявляется

- А. Эритроцитоз с увеличением содержания гемоглобина
- Б. Тромбоцитопения
- В. Лейкопения
- Г. Увеличение копропорфирина в эритроцитах

Организация разных профилей медицинской помощи регламентируется

- А. Программой обязательного медицинского страхования
- Б. Порядками оказания медицинской помощи
- В. Лицензией
- Г. Программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи

Заключение по результатам предварительного медицинского осмотра выдается лицу, поступающему на работу

- А. Через 1 день
- Б. Через 3 дня
- В. Через 2 дня
- Г. Незамедлительно после завершения осмотра

Предел ежегодной эффективной дозы для работающих в условиях производственного облучения составляет

- А. 10 Гр
- Б. 20 МЗв
- В. 5 Бэр
- Г. 1 Гр

Дополнительным медицинским противопоказанием для работы с вибрацией является наличие хронических заболеваний периферической нервной системы с частотой обострений _____ за календарный год

- А. 2 Раза
- Б. 3 Раза
- В. 1 Раз
- Г. 4 Раза

Каждый случай хронического профессионального заболевания (отравления) подлежит расследованию с момента получения экстренного извещения в течение

- А. 72 Часов
- Б. 10 Дней
- В. 24 Часов
- Г. 48 Часов

Линейные малые затемнения шириной от 1,5 до 3 мм по классификации мот кодируют символом

- А. R
- Б. Q
- В. T
- Г. P

На периодических медицинских осмотрах работающих в условиях воздействия общей вибрации обязательным исследованием является

- А. Паллестезиометрия
- Б. Электротермометрия
- В. Электронейромиография
- Г. Динамометрия

[Вернуться в начало](#)