

Тесты с вопросами по специальности «Психиатрия-наркология» для аттестации 1 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/psihiatr-narkolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Психиатрия-наркология» для аккредитации и других экзаменов (4000 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/psihiatriya_narkologiya/

2) Психиатрия-наркология — ситуационные задачи

→ medik-otvet.ru/product/nar/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Количество участников психотерапевтической малой группы:

- А. не более 5 человек
- Б. 2 – 10 человек
- В. 11 - 12 человек
- Г. 11 – 20 человек
- Д. 15 – 25 человек

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Для депрессивного синдрома характерно: А - моторная заторможенность; быстрая истощаемость, снижение настроения; Б- моторная заторможенность, идеаторная заторможенность, аспонтанность; В - моторная заторможенность, идеаторная заторможенность, снижение настроения; Г- моторная заторможенность, идеаторная заторможенность, безынициативность

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

В клинической структуре алкогольного абстинентного синдрома наиболее специфичным является:

А. Расстройство сна

Б. Аффективные проявления

В. Вегетативные расстройства

Г. Вторичные формы влечения к алкоголю

Д. Комплекс соматоневрологических расстройств

Состояние опьянения у женщин, больных алкоголизмом, проявляется:

А. Выраженным истерическим поведением

Б. Агрессивностью поступков

В. Возбужденностью, плаксивостью

Г. Легко возникающей бредовой настроенностью

Д. Суицидальными попытками и самоповреждениями

Состояние острой интоксикации у барбитуровых наркоманов опасно из-за свойственных им:

А. Застойного злобного аффекта

Б. Приступов гнева, агрессии

В. Дисфоричности

Г. Подвижности аффекта

Д. Брутальности

Маркёром употребления героина и отличия от морфина и кодеина, является метаболит:

А. Морфин-6-глюкуронид

Б. 6-моноацетилморфин

В. Норморфин

Г. Морфин

Д. Морфин-3-глюкуронид

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Шифр МКБ-10 F13 соответствует: А - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя; Б - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств; В - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов; Г - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов; Д - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите правильную последовательность: Изменения толерантности к ПАВ в динамике заболевания

- А. Плато толерантности
- Б. Максимальный рост толерантности
- В. Возможный возврат к исходной толерантности
- Г. Снижение толерантности
- Д. Начальный рост толерантности

Синдром сверхценных идей характеризуется:

- А. Наличием суждений, возникающих вследствие реальных событий, обстоятельств
- Б. Доминирующим положением этих идей в сознании
- В. Возможностью их коррекции
- Г. Невозможностью коррекции
- Д. Полной ошибочностью

Патологическое мышление характеризуется:

- А. Соединением несопоставимых обстоятельств, явлений, положений
- Б. Длительным преобладанием какой-либо одной мысли, представления
- В. Объединением противоречивых идей, образов, утратой логических связей
- Г. Произвольной подменой одних понятий другими
- Д. Соскальзываниями с основного ряда мышления на побочный

Изменения личности у больных алкогольной зависимостью обусловлены:

- А. Длительностью заболевания
- Б. Токсическим действием алкоголя и его метаболитов
- В. Психосоциальными факторами
- Г. Преморбидными характерологическими особенностями

Что является содержанием каждого личностного статуса?

- А. Оценочные суждения окружающих людей
- Б. Определенные смыслы, ценности, установки и стереотипы восприятия и поведения, характерные для того социокультурального окружения, в котором человек живет
- В. Архетипы
- Г. Комплексы
- Д. Особенности эмоционально-волевого реагирования, приобретенные в процессе воспитания в родительской семье

Полинаркомания формируется при употреблении нескольких ПАВ, которые:

- А. По типу действия на ЦНС обладают одинаковыми эффектами у больных
- Б. При комбинированном приеме способны усиливать действие друг друга
- В. Обладают разной продолжительностью действия
- Г. Оказывают разнонаправленные эффекты
- Д. Обладают одинаковой продолжительностью действия

К признакам висцеральных галлюцинаций относятся:

- А. Ощущение присутствия в полостях тела или под кожей инородных предметов, насекомых и т.д.
- Б. Ощущение ползания насекомых по телу
- В. Возможность точного описания источника ощущений
- Г. Беспредметность ощущений
- Д. Ощущение холода, жара внутри тела

Установите правильную последовательность: Динамика формирования семейных отношений при созависимости:

- А. Фаза адаптации
- Б. Фаза озабоченности
- В. Фаза самозащиты
- Г. Фаза истощения

Ассертивное поведение:

- А. позволяет добиться цели любой ценой
- Б. присуще большинству пациентов до развития болезни
- В. учитывает интересы всех участников взаимодействия
- Г. даёт возможность управлять другими людьми
- Д. свойственно, преимущественно, представителям власти

Оглушение возникает в результате:

- А. Тяжелой интоксикации
- Б. Расстройств обмена веществ
- В. Фебрильной шизофрении
- Г. Черепно-мозговых травм
- Д. Сосудистых и других органических поражений ЦНС

Для клиники абстинентного синдрома у кокаиновых наркоманов характерно:

- А. Сухость слизистых носоглотки
- Б. Головная боль в затылочной области, головокружение
- В. Резкое сужение зрачков
- Г. Анизорефлексия
- Д. Парестезии

Основными клиническими признаками олигофрении являются:

- А. Диффузное «тотальное» недоразвитие
- Б. Нарушение развития наиболее онтогенетически молодых функций психики при относительной сохранности древних
- В. Нарушение развития наиболее онтогенетически древних функций психики при относительной сохранности молодых
- Г. Недоразвитие познавательной деятельности, интеллекта и мышления
- Д. Верно А и Б

Для кардиалгии при алкогольном поражении сердца характерно

- А. Появление, как правило, после физической нагрузки
- Б. Сопровождение суетливостью больного и массой жалоб
- В. Приступообразность
- Г. Появление на следующий день после алкогольного эксцесса
- Д. Исчезновение после приема нитроглицерина

Для судорожного припадка в структуре алкогольного абстинентного синдрома, в отличие от эпилептического припадка, характерно:

- А. Преобладание тонической фазы в картине припадка
- Б. Стереотипность проявления
- В. Развитие психомоторного возбуждения после припадка
- Г. Отсутствие на ЭЭГ характерных для эпилепсии изменений
- Д. Развернутость или abortивность судорожного припадка

Связь алкоголизма и диэнцефальных расстройств проявляется:

- А. Формированием патологического влечения к алкоголю
- Б. Формированием абстинентного синдрома
- В. Появлением аффективных расстройств
- Г. Формированием алкогольной деградации личности
- Д. Появлением сексуальных расстройств

Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена

- А. Крепостью и качеством алкоголя
- Б. Активностью фермента алкогольдегидрогеназы (АДГ)
- В. Культурально-этническими факторами
- Г. Возрастным фактором
- Д. Половыми различиями

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Фокус воздействия и направленность санитарно-просветительской работы на субъекта (подросток, психолог, педагог, врач): А - лекции Б - издание научно-популярной литературы В - доклады; Г - беседы Д - выступления

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Среди различных психотропных эффектов этанола в острой алкогольной интоксикации для личности наибольшее субъективное значение имеет эффект:

- А. Анксиолитический
- Б. Стресс лимитирующий
- В. Эйфоризирующий
- Г. Седативный
- Д. Гипнотический

Клиника гипоталамического синдрома при алкоголизме проявляется:

- А. Жалобами больных на приступ боли в сердце, сердцебиение
- Б. Ощущением нехватки воздуха и онемения пальцев рук
- В. Дрожанием тела
- Г. Задержкой мочеиспускания
- Д. Чувством страха остановки сердца, смерти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Продолжительность интеграционного этапа реабилитации: А - 2-4 недели; Б - 1-3 месяца; В - 6 месяцев; Г - не менее одного года;

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

К прямому токсическому действию этанола относят:

- А. Мембранотропное действие
- Б. Конформационное действие
- В. Взаимодействие с неэтерифицированными жирными кислотами
- Г. Метаболические расстройства.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

1. Рациональная психотерапия (групповая или индивидуальная) наиболее часто применяется при: А - Семейный конфликт, стресс; Б - нарушение режима терапии; В - интеллектуально-мнестический дефект, актуализация влечения.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения водителя могут осуществлять:

- А. Сотрудники ГИБДД
- Б. Врачи-наркологи, прошедшие специальную подготовку
- В. Руководители автопредприятий, отвечающие за эксплуатацию транспортных средств;
- Г. Любой медработник Гос.мед. учреждения
- Д. Участковый врач

Токсикогенная фаза острого отравления алкоголем проявляется:

- А. Нарушением сознания
- Б. Нарушением функции внешнего дыхания
- В. Нарушением функции сердечно-сосудистой системы
- Г. Нарушением дыхания по центральному типу
- Д. Комплексом неврологических расстройств

Сенестопатии - это

- А. Локализованные, неприятные тягостные ощущения
- Б. Необычные, часто алгические, ощущения с меняющейся локализацией
- В. Тягостные болевые ощущения в утраченной конечности
- Г. Тягостные ощущения ползания насекомых, червей и т.д. под кожей, внутри тела
- Д. Ощущение искажения формы и величины своего тела

Основными техниками психотерапии в малых группах являются:

- А. Групповая дискуссия
- Б. Групповое интервью
- В. Анализ группового процесса
- Г. Групповой остракизм
- Д. Групповая поляризация

Клинические признаки алкогольного опьянения начинают отчетливо проявляться при концентрации алкоголя в крови:

- А. 0,2 промилле
- Б. 0,3 промилле
- В. 0,5 промилле
- Г. 1,0 промилле
- Д. 2,0 промилле

Анамнестические сведения собирают, соблюдая принцип получения данных:

- А. От настоящего к прошлому
- Б. О настоящем состоянии больного
- В. О родственниках больного
- Г. От прошлого к настоящему
- Д. Не только о болезни, но и о жизни больного

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Определение "Наркомания" включает следующие критерии: А - наличие синдрома патологического влечения к наркотическому средству, изменение толерантности, развитие физической зависимости и медико-социальных последствий; Б - Употребление 2-х и более наркотических средств одновременно или в определенной последовательности при отсутствии признаков синдрома отмены к какому-либо из них; В - Одновременное влечение и употребление другого ПАВ, не признанное наркотическим; Г - Сформировавшееся патологическое влечение к каждому из нескольких употребляемых средств.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Для определения состояния новорожденного, мать которого принимала наркотики во время беременности, используют термины:

А. Неонатальный синдром лишения наркотика

Б. Наркомания новорожденного

В. Врожденный синдром зависимости

Г. Врожденный абстинентный синдром

К особенностям наркомании у девочек относятся:

А. Значительная соматическая отягощенность в преморбидном периоде

Б. Ускоренное развитие большого наркоманического синдрома

В. Высокая частота депрессивных расстройств и аутоагрессии

Г. Значительная приближенность состояния отмены к таковому у взрослых

Д. Ранняя психосоциальная дезадаптация

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Терминологическое определение понятия "Наркомания" включает следующие критерии: А - Употребление ПАВ, которые входят в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (Список 1,2,3)»; Б - Употребление ПАВ, которые не входят в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (Список 1,2,3)»; В - Употребление ПАВ, обладающих эйфоризирующим действием.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Шифр МКБ-10 F10 соответствует: А - Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя; Б - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств; В - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов; Г - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов; Д - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Глубокая алкогольная кома клинически проявляется:

- А. Невозможностью речевого контакта
- Б. Угнетением зрачковых и корнеальных рефлексов
- В. Угнетением мышечной и болевой чувствительности
- Г. Снижением АД и появлением синусовой брадикардии

Установите правильную последовательность: Изменений картины опьянения в динамике зависимости от ПАВ

- А. С преобладанием тонизирующего эффекта
- Б. С преобладанием стимулирующего эффекта
- В. С преобладанием эйфоризирующего эффекта
- Г. С переходом эйфоризирующего в стимулирующий эффект
- Д. С переходом стимулирующего в тонизирующий эффект

Алкогольные психозы, возникающие у подростков, чаще всего обусловлены

- А. Дополнительным употреблением тем или иным ПАВ
- Б. Продолжительностью и интенсивностью употребления алкоголя
- В. Вяло текущим эндогенным заболеванием
- Г. Наличием резидуальных явлений органического генеза
- Д. Наличием расстройств личности (психопатии)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Наиболее часто с употреблением ингалянтов (летучих органических веществ) связано развитие следующих осложнений: А - Поражения дыхательной системы, расстройства сердечно-сосудистой деятельности, хромосомные aberrации, нарушения эндокринной системы; Б - Инфаркт миокарда, фибрилляция желудочков сердца, нарушения мозгового кровообращения, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек; кариес, тромбозы, сексуальная дисфункция; В - Инфекционные и токсические гепатиты, кардиомиопатия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, нарушения обмена кальция; Г - Энцефалопатия, пневмонии, болезни крови, мочекаменная болезнь.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

При развитии алкогольной комы характерно:

А. Нарушение сознания

Б. Понижение температуры тела и появление цианоза

В. Резкое снижение мышечного тонуса

Г. Двигательное возбуждение

Импульсивные действия проявляются:

А. Совершением действия без контроля сознания

Б. Возникновением при глубоком нарушении психической деятельности

В. Внезапным и стремительным началом

Г. Характером сделанности

Д. Немотивированным и бессмысленным действием

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. К оценке эффективности медицинской реабилитации имеет отношение следующий критерий: А - психическое расстройство наркологического или иного профиля; Б - семейный статус; В - патологические личностные ресурсы; Г - психологическая компетентность.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Различия в скорости окисления алкоголя в организме женщины в сравнении с мужчинами, обусловлены тем, что у них:

- А. Скорость окисления алкоголя в слизистой желудка и относительное содержание воды в организме ниже
- Б. Скорость окисления алкоголя в слизистой желудка и относительное содержание воды в организме выше
- В. Скорость окисления алкоголя в слизистой желудка выше, а относительное содержание воды в организме ниже
- Г. Скорость окисления алкоголя в слизистой желудка ниже, а относительное содержание воды в организме выше
- Д. Алкоголь окисляется не в слизистой желудка, а в слизистой кишечника

Внутренняя картина болезни включает в себя:

- А. объективные знания больного о своей болезни, а также субъективно переживаемые болезненные и тягостные ощущения
- Б. результаты биохимического исследования
- В. симптомы, выявляемые у больного
- Г. данные рентгенологического исследования
- Д. клинику внутренних болезней

Аттестация врача психиатра-нарколога на присвоение высшей квалификационной категории проводится при стаже работы по специальности не менее:

- А. 3 лет
- Б. 5 лет
- В. 7 лет
- Г. 8 лет
- Д. 10 лет

К алкогольному судорожному синдрому относят следующие проявления:

- А. Припадки, возникающие в связи с предшествующей алкоголизацией и в первые дни абстинентного синдрома
- Б. Припадки в дебюте манифестных проявлений делирия и энцефалопатии Гайе-Вернике
- В. Припадки в случае сочетания алкоголизма и симптоматической эпилепсии органического генеза
- Г. Припадки в дебюте манифестных проявлений энцефалопатии Гайе-Вернике
- Д. Верно А и Б

Установите правильную последовательность: Стадии гипноза по

А. Форелю

- А. Сонливость
- Б. Сомнамбулизм
- В. Гипотаксия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Шифр МКБ-10 F14.2 соответствует: А -психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей, психотическое расстройство; Б - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов, острая интоксикация; В - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина, синдром зависимости; Г - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов, абстинентное состояние.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Особенностью хронического алкогольного галлюциноза является:

- А. Угасание аффекта
- Б. Сохранение внешних форм поведения без каких-либо странностей
- В. Сохранение способности к выполнению повседневных, а в ряде случаев и профессиональных обязанностей
- Г. Сохранение сознания болезни
- Д. Все перечисленное

При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует назначать:

- А. Полиионные растворы
- Б. Крово- и плазмозаменители
- В. Транквилизаторы
- Г. Нейролептики
- Д. Ноотропы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**.

1. Наиболее часто с употреблением опиоидов связано развитие следующих осложнений:

А - Поражения дыхательной системы, расстройства сердечно-сосудистой деятельности, хромосомные aberrации, нарушения эндокринной системы; **Б** - Инфаркт миокарда, фибрилляция желудочков сердца, нарушения мозгового кровообращения, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек; кариес, тромбозы, сексуальная дисфункция; **В** - Инфекционные и токсические гепатиты, кардиомиопатия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, нарушения обмена кальция; **Г** - Энцефалопатия, пневмонии, болезни крови, мочекаменная болезнь.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Препаратами первой линии выбора при купировании алкогольного абстинентного синдрома являются:

А. Бензодиазепиновые транквилизаторы

Б. Антипсихотические препараты

В. Снотворные - производные барбитуровой кислоты

Г. Противосудорожные препараты

Д. Витамины группы "Б"

Признаками паранойяльной ипохондрии являются:

А. Убежденность в наличии заболевания

Б. Существование системы доказательств наличия болезни

В. Настойчивое требование проведения разнообразных обследований

Г. Доказательство возникновения болезни под влиянием гипноза, радиоволн, излучений и т.д.

Д. Указание на конкретных лиц или группы лиц, причастных к «наведению» болезни

При злоупотреблении препаратами, содержащими фенилпропаноламин, к медицинским осложнениям относятся:

А. Миокардиодистрофия с нарушениями ритма сердца

Б. Внезапная сердечная смерть

В. Трофические нарушения

Г. Вегетативная лабильность, общая скованность, дизартричная, мало модулированная речь

Д. Паркинсоноподобный синдром, внутричерепная гипертензия

Наиболее частыми проявлениями хронической интоксикации каннабисом являются:

- А. Амотивационный синдром
- Б. Ощущение усталости, разбитости
- В. Упорные (в течение недель) и интенсивные головные боли
- Г. Агрессивность
- Д. Корсаковский синдром

Основой для заключения о состоянии опьянения водителя является:

- А. Результаты комплексного медицинского освидетельствования
- Б. Наличие запаха алкоголя изо рта
- В. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определенное алкотестором
- Г. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,3% и более
- Д. Признание водителя в приеме алкоголя

Галлюцинаторно-параноидный синдром это:

- А. Фантастический бред в сочетании с галлюцинациями
- Б. Бред преследования, воздействия с кататоническими включениями
- В. Бред преследования, воздействия с психическими автоматизмами и псевдогаллюцинациями
- Г. Персекуторный бред с галлюцинациями и помрачением сознания
- Д. Бред одержимости с тактильными галлюцинациями

Существующие общества трезвости являются:

- А. Самостоятельным госучреждением
- Б. Общественной организацией
- В. Подразделениями дневного стационара
- Г. Структурными подразделениями наркологических диспансеров
- Д. Структурным подразделением реабилитационных центров

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Цель первичной профилактики злоупотребления ПАВ: А-Восстановление нормативного медицинского, психологического и социального статуса, позволяющего пациенту ресоциализироваться в обществе на основе отказа от ПАВ; Б-Нормализация биологического, психологического и социального статуса зависимого от ПАВ посредством дезактуализации наркологических расстройств; В -Предупреждение приобщения к ПАВ и формирование здорового образа жизни.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

К кратковременным расстройствам сознания по типу исключительных состояний относятся:

- А. Патологическое опьянение
- Б. Сумеречные состояния
- В. Патологические просоночные состояния
- Г. Патологический аффект
- Д. Психосенсорная аура

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Глубокая межполушарная асимметрия на ЭЭГ характерна для: 1 - атрофические процессы; Б - арахноидиты; В - опухоли поверхностно расположенные; Г - повышенное внутричерепное давление; Д - церебро-вазкулярные нарушения

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

У лиц, длительно злоупотребляющих алкоголем, при развитии острой сердечной недостаточности основанием для беспокойства врача является АД даже в пределах:

- А. 120/90 - 130/90 мм рт.ст.
- Б. 110/80 - 120-90 мм.рт.ст.
- В. 110/90 - 80/60 мм.рт.ст.
- Г. 100/80 – 80/60 мм.рт.ст.
- Д. 80/50-80/40 мм.рт.ст.

К кататимному бреду относят бред:

- А. Преследования
- Б. Воздействия
- В. Отравления
- Г. Самообвинения, виновности
- Д. Интерметаморфозы

Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена:

- А. Крепостью и качеством алкоголя
- Б. Культурально-этническими факторами
- В. Поло-возрастным фактором
- Г. Активностью фермента алкогольдегидрогеназы (АДГ)
- Д. Активностью фермента альдегиддегидрогеназы (АльдГ)

К основным этапам психотерапевтического процесса в наркологии относятся:

- А. Этап поиска
- Б. Этап установления контакта
- В. Предварительный этап
- Г. Этап работы с нормативными структурами личности
- Д. Этап заместительной терапии

Наиболее отличительной особенностью алкоголизма у женщин является:

- А. Злокачественность течения
- Б. Раннее появление психотических форм заболевания.
- В. Низкая курательность
- Г. Аффективная окрашенность клинической симптоматики
- Д. раннее появление и быстро нарастающая социальная дезадаптация

Предпочтительный стиль взаимодействия врача с пациентом в процессе реабилитации:

- А. Авторитарный
- Б. Конфронтационный
- В. Патерналистский
- Г. Мотивационный
- Д. Директивный

В состоянии острой алкогольной интоксикации (состояние опьянения) расстройства памяти могут проявляться:

- А. Тотальными амнезиями
- Б. Наркотическими амнезиями
- В. Лакунарными амнезиями
- Г. Ретроградными амнезиями

В протоколе медицинского освидетельствования граждан не используется формулировка:

- А. Трезв, признаков потребления алкоголя нет
- Б. Установлен факт употребления алкоголя, признаков опьянения не выявлено
- В. Алкогольное опьянение
- Г. Алкогольной опьянение легкой, средней или тяжелой степени
- Д. Трезв, имеются нарушения функционального состояния требующие отстранения от работы с источником повышенной опасности по состоянию здоровья

Острые интоксикационные психозы при злоупотреблении амфетаминами чаще протекают по типу:

- А. Острого параноида
- Б. Острого галлюциноза
- В. Делирия
- Г. Онейроида

Среди больных алкогольной зависимостью наиболее часто встречаются следующие черты характера в преморбиде:

- А. неустойчивые
- Б. астенические
- В. возбудимые
- Г. шизоидные

Высокий темп прогрессивности алкоголизма определяется влиянием:

- А. Началом употребления алкоголя в подростковом возрасте
- Б. Перенесенным ранее гепатитом
- В. Изначальным употреблением крепких спиртных напитков и суррогатов алкоголя
- Г. Преобладанием в структуре характера черт неустойчивости, незрелости
- Д. Нарушений жирового обмена

Бредовое настроение характеризуется:

- А. Напряженностью, предчувствием надвигающейся катастрофы
- Б. Необъяснимым, непреходящим беспокойством
- В. Ощущением изменения себя и окружающего мира
- Г. Полным пониманием происходящего с бредовых позиций
- Д. Настроением борьбы за правду, справедливость и т.д.

У новорожденных от матерей, злоупотребляющих амфетаминами, отмечают:

- А. Повышенная потливость
- Б. Общее беспокойство
- В. Судорожные припадки
- Г. Явления гипергликемии
- Д. Врожденные уродства

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Для характеристики ПАВ, как одурманивающего (токсикоманического) средства необходимо наличие критериев: А - медицинского; Б - юридического; В - социального; Г - медицинского и юридического; Д - медицинского и социального.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Аддикция определяется как:

- А. Пароксизмальные нарушения поведения в рамках здоровья
- Б. Навязчивая потребность в использовании привычных стимулов, сопровождающаяся ростом толерантности, а также выраженными физическими и психическими симптомами
- В. Помрачение сознания на фоне органических повреждений головного мозга
- Г. Аффективное расстройство в виде смещения страха, злобы и тоски
- Д. Психологическая защита, которая активизируется при попадании в неблагоприятные жизненные условия.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. "Негативная" эйфория, ее основные характеристики: А - состояние интоксикации, когда ПАВ снимает субъективно тягостные ощущения и выравнивает явления дискомфорта; Б - повышенное благодушное настроение, сочетающееся с беспечностью и недостаточной критической оценкой своего состояния; В - состояние интоксикации приводит к изменению восприятия окружающего и собственных ощущений в сторону экстремально положительного для субъекта значения; Г - подъем эмоционального фона, безмятежное, благодушное настроение, определенные психические и физические ощущения, изменения мышления и восприятия, нарушения сознания различной степени.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

На начальных стадиях алкоголизма сексуальные нарушения могут проявляться:

- А. Общей дезорганизацией половой жизни
- Б. Половыми извращениями
- В. Повышением сексуальной активности
- Г. Утратой тонкости эротических переживаний
- Д. Снижением либидо

Установите правильную последовательность: Изменение формы употребления алкоголя в динамике заболевания

- А. Постоянное пьянство на фоне высокой толерантности
- Б. Частые однократные эксцессы
- В. Истинные запои
- Г. Перемежающаяся форма пьянства
- Д. Псевдозапои

Временная нетрудоспособность в связи с бытовой травмой в состоянии опьянения оформляется:

- А. Справкой
- Б. Больничным листом без условий
- В. Справкой на 7 дней, а затем больничным листом
- Г. больничным листом с соответствующей пометкой
- Д. Вопрос решается индивидуально

В состоянии острой алкогольной интоксикации (состояние опьянения) у больных алкоголизмом расстройство памяти могут проявляться:

- А. Тотальными амнезиями
- Б. Наркотическими амнезиями
- В. Лакунарными амнезиями
- Г. Ретроградными амнезиями

Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля это:

- А. Комплекс медицинских мер, направленных на предупреждение вредных последствий употребления ПАВ
- Б. Система медицинских мер, направленных на предупреждение заболеваний, охрану здоровья населения
- В. Система мер, направленных на выявление групп лиц повышенного риска и применение лечебных и корригирующих мероприятий
- Г. Система мер воздействия на причины и условия развития заболеваний или на повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам
- Д. Система мер, направленных на сдерживание прогрессивности и предупреждение рецидивов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Наиболее часто с употреблением каннабиноидов связано развитие следующих осложнений: А - Поражения дыхательной системы, расстройства сердечно-сосудистой деятельности, хромосомные аберрации, нарушения эндокринной системы; Б - Инфаркт миокарда, фибрилляция желудочков сердца, нарушения мозгового кровообращения, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек; кариес, тромбофлебиты, сексуальная дисфункция; В - Инфекционные и токсические гепатиты, кардиомиопатия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, нарушения обмена кальция; Г - Энцефалопатия, пневмонии, болезни крови, мочекаменная болезнь.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Кабинет врача психиатра-нарколога предназначен для: А - Предотвращение повторных рецидивов наркомании; Б - Участие и проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований отдельных категорий граждан; В - Проведение лабораторного и функционального мониторинга за адекватностью интенсивной терапии; Д - оказание медико-социальной реабилитационной помощи пациентам с наркологическими заболеваниями

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

В клинической картине классического варианта острого алкогольного (металкогольного) психоза истинные императивные вербальные галлюцинации характерны при:

А. Энцефалопатии Гайе-Вернике

Б. Алкогольном параноиде

В. Алкогольном галлюцинозе

Г. Алкогольном делирии

Кто ввёл в употребление в России термин «аддикция»:

А. Иванец Н.Н.

Б. Москаленко В.Д.

В. Карпов А.М.

Г. Короленко Ц.П.

Д. Альтшулер В.Б.

Лечение артериальной гипотонии, обусловленное сердечной недостаточностью, проводится:

А. Вазопрессорами

Б. Кардиотониками

В. Изотоническими растворами

Г. Гипертоническими растворами

Д. Аналептиками

В 2007 г. Правительством Российской Федерации была принята:

- А. Теория демографического развития Российской Федерации
- Б. Концепция демографической политики Российской Федерации
- В. Постановление о демографической политике в Российской Федерации
- Г. Концепция увеличения народонаселения Российской Федерации.
- Д. Программа здорового образа жизни.

Установите правильную последовательность: Появление амнезий в опьянении в динамике заболевания

- А. Тотальные
- Б. Наркотические
- В. Локальные
- Г. Наркотические и локальные
- Д. Локальные и тотальные

Под дефицитностью личности, предрасполагающей к формированию аддиктивных расстройств, подразумевается недостаточность или повреждение:

- А. В морально-этической сфере
- Б. В интеллектуальной сфере
- В. На четырех уровнях функционирования человека: биологическом, психологическом, социальном и духовном
- Г. На культурном уровне функционирования человека
- Д. Резидуально-органические повреждения нервной системы

Санитарно-просветительская работа является направлением:

- А. Педагогического воспитания
- Б. Социального воспитания
- В. Правового воспитания
- Г. Патриотического воспитания
- Д. Гигиенического воспитания

становите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**.

1. Шифр МКБ-10 F18.5 соответствует: А -Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей, психотическое расстройство; Б - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов, острая интоксикация; В - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина, синдром зависимости; Г - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов, абстинентное состояние.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

В клинической картине классического варианта острого алкогольного (металкогольного) психоза истинные зрительные галлюцинации доминируют при:

- А. Алкогольном галлюцинозе
- Б. Алкогольной депрессии
- В. Алкогольном делирии.
- Г. Алкогольном параноиде

Профилактическому учету не подлежат:

- А. Лица, замеченные в единичных случаях употребления токсикоманических веществ
- Б. Лица, у которых были зарегистрированы отдельные случаи немедицинского употребления наркотических средств
- В. Больные алкоголизмом с длительной ремиссией
- Г. Злоупотребляющие алкоголем без признаков зависимости.
- Д. Злоупотребляющие ПАВ без признаков зависимости.

Вербальные и пантомимические стигмы (ужимки, жаргон и др.) в статусе больных могут свидетельствовать о:

- А. Наличии токсической энцефалопатии
- Б. Признаках снижения уровня личности
- В. Неблагоприятном микросоциальном окружении
- Г. Отравлении марганцово-кислым калием
- Д. Об олигофрении

Противорецидивный тренинг больных синдромом зависимости включает:

- А. Обучение асертивности
- Б. Обучение контролируемому употреблению спиртного
- В. Элементы психической саморегуляции
- Г. психоаналитическую работу

Патогенетические механизмы формирования зависимости от алкоголя обуславливаются

- А. Врожденной недостаточностью системы эндогенный этанол/ацетальдегид
- Б. Деградацией системы эндогенного синтеза ацетальдегида/этанола
- В. Нарушением обмена катехоламинов
- Г. Нарушением обмена гистамина
- Д. Нарушением обмена серотонина

В клинической картине классического варианта острого алкогольного (металкогольного) психоза глазодвигательные расстройства характерны:

- А. Алкогольному параноиду
- Б. Алкогольному галлюцинозу.
- В. Алкогольному делирию
- Г. Энцефалопатии типа Гайе-Вернике.
- Д. Алкогольной депрессии

Нарушение углеводного обмена при острой интоксикации алкоголем обуславлено

- А. Подавлением потребления глюкозы клетками
- Б. Снижением уровня инсулина в крови
- В. Замедлением процесса бескислородного, ферментативного окисления глюкозы
- Г. Верно все перечисленное
- Д. Верно А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Терминологическое определение понятия "Токсикомания" включает следующие критерии: А - Употребление ПАВ, которые входят в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (Список 1,2,3)»; Б - Употребление ПАВ, которые не входят в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (Список 1,2,3)»; В - Употребление ПАВ, обладающих эйфоризирующим действием.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**.

1. "Позитивная" эйфория, ее основные характеристики: А - состояние интоксикации, когда ПАВ снимает субъективно тягостные ощущения и выравнивает явления дискомфорта; Б - повышенное благодушное настроение, сочетающееся с беспечностью и недостаточной критической оценкой своего состояния; В - состояние интоксикации приводит к изменению восприятия окружающего и собственных ощущений в сторону экстремально положительного для субъекта значения; Г - подъем эмоционального фона, безмятежное, благодушное настроение, определенные психические и физические ощущения, изменения мышления и восприятия, нарушения сознания различной степени.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Использование медикаментозной терапии в процессе реабилитации лиц с зависимостью от психоактивных веществ:

А. Категорически запрещено

Б. Является приоритетным

В. Осуществляется на завершающих этапах программы

Г. Осуществляется по показаниям

Д. Осуществляется в порядке самопомощи и взаимопомощи

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**.

1. Шифр МКБ-10 F10.3 соответствует: А - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей, психотическое расстройство; Б - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов, острая интоксикация; В - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина, синдром зависимости; Г - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, абстинентное состояние.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Наиболее важным гемодинамическим параметром является:

- А. ОЦК
- Б. Сердечный выброс
- В. Периферическое сопротивление сосудов
- Г. Сократительная способность миокарда
- Д. Частота сердечных сокращений

Прогрессирующая амнезия проявляется:

- А. Утратой способности запомнить событие и т.д.
- Б. Полным отсутствием памяти на текущие события
- В. Постепенным опустошением запасов памяти
- Г. Определенной закономерностью в развитии нарушений памяти
- Д. Утратой в первую очередь недавно приобретенного материала, событий последних лет жизни

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Цель первичной профилактики злоупотребления ПАВ: А-Восстановление нормативного медицинского, психологического и социального статуса, позволяющего пациенту ресоциализироваться в обществе на основе отказа от ПАВ; Б-Нормализация биологического, психологического и социального статуса зависимого от ПАВ посредством дезактуализации расстройств, связанных с наркологическим заболеванием; В - Предупреждение приобщения к ПАВ и формирование здорового образа жизни.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

В случае разногласий между членами экспертной комиссии, несогласный член комиссии:

- А. Подписывает акт с пометкой о своем несогласии
- Б. Составляет собственное заключение
- В. Не подписывает акт
- Г. Мотивированно настаивает на повторной экспертизе
- Д. Добивается подготовки компромиссного заключения

В случае, когда в процессе проведения судебно-наркологической экспертизы обнаруживаются данные о наличии у испытуемого психических расстройств, эксперты обязаны:

- А. Дать им экспертную оценку
- Б. Ограничиться заключением в пределах своей компетентности
- В. Указать в заключении о необходимости проведения судебно- психиатрической экспертизы
- Г. Ходатайствовать о продлении сроков экспертизы
- Д. Ходатайствовать о продлении сроков экспертизы и введения в состав комиссии психиатра

В случае явки больного, находящегося на больничном листе на очередной прием в состоянии опьянения, при сохраняющемся болезненном состоянии, не связанным с опьянением, больничный лист:

- А. Закрывается и больной выписывается на работу
- Б. Закрывается, а вместо него выдается справка
- В. Продолжается с пометкой об опьянении
- Г. Продолжается с пометкой в амбулаторной карте
- Д. Открывается новый с пометкой об опьянении

Стационарная судебно-наркологическая экспертиза назначается:

- А. По уголовным делам
- Б. По гражданским и уголовным делам
- В. Лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
- Г. В исключительных случаях, когда средства и методы амбулаторной экспертизы исчерпаны
- Д. Во всех перечисленных случаях

Состояние острой алкогольной интоксикации (простое алкогольное опьянение) сопровождается изменениями в:

- А. эмоционально-волевой сфере
- Б. поведенческой сфере
- В. неврологической сфере
- Г. вегетативной сфере

Мотивированием к отказу от употребления ПАВ и участию в программе реабилитации занимаются :

- А. Врач-психиатр-нарколог и врач-психотерапевт
- Б. Врач-психотерапевт и психолог
- В. Все специалисты
- Г. Психологи и специалисты по социальной работе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**.

1. Наиболее полно определению "Полинаркомания" отвечают следующие критерии: А - Наличие синдрома патологического влечения к наркотическому средству, изменение толерантности, развитие физической зависимости и медико-социальных последствий; Б - Употребление 2-х и более наркотических средств одновременно или в определенной последовательности при отсутствии признаков синдрома отмены к какому-либо из них, сформировавшееся патологическое влечение к каждому из них; В - Сформировавшееся патологическое влечение в какому-либо ПАВ и употребление другого ПАВ, не признанное наркотическим.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Карбамазепин в наркологической практике применяют для:

А. Коррекции аффективных нарушений

Б. Снижения интенсивности патологического влечения

В. Лечения судорожных расстройств

Г. Профилактики судорожных расстройств

Д. Коррекции психопатоподобных нарушений

К транквилизаторам относятся:

А. Производные бензамида

Б. Производные бензодиаземина

В. Производные ГАМК

Г. Производные пропандиола

Д. Ингибиторы моноаминооксидазы

Одним из наиболее эффективных методов преодоления анозогнозии у больных алкоголизмом является:

А. Специфическая лекарственная терапия

Б. Социотерапия

В. Психотерапия

Г. Комплексная фармакотерапия

Д. Трудотерапия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Виды нехимических аддикций: А - шопинг; Б - опиоидная; В - пищевая; Г - алкогольная; Д - табачная.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Антисоциальным называют поведение подростков, которое характеризуется:

А. Непризнанием норм поведения в обществе

Б. Морально осуждаемыми обществом манерами поведения и формой одежды

В. Бродяжничеством, сексуальными эксцессами, курением

Г. Отказом от соблюдения дисциплины в школе

Д. Употреблением алкоголя и одурманивающих средств

Аттестация врача психиатра-нарколога на присвоение 1-ой квалификационной категории проводится при стаже работы по специальности не менее:

А. 2 лет

Б. 3 лет

В. 5 лет

Г. 7 лет

Д. 10 лет

При сформировавшейся у больных алкоголизмом зависимости от седативных или снотворных средств, прежде всего:

А. Изменяется характер острой интоксикации лекарственным средством

Б. К спаду острой интоксикации появляется выраженное влечение к продолжению состояния интоксикации, приводящее к изменению ритма наркотизации

В. Возрастает толерантность к лекарственному средству

Г. Снижается толерантность к алкоголю

Д. Через 2-3 месяца от начала злоупотребления лекарственным средством формируется физическая зависимость

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**.

1. Антинаркотическая деятельность: А -Построение социокультурного пространства, которое предполагает вовлечение в профилактику разнообразных ресурсов – личностных, интеллектуальных, нравственно-волевых, культурно-ценностных и профессиональных; Б - Система привития полезных навыков на основе знания правил здорового образа жизни и убежденности в необходимости их соблюдения; В - Совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья и трудоспособности людей, продление их активной жизни.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Кодеиновое опьянение отличается от опийного:

А. Гиперемией и отечностью лица

Б. Более сильным и длительным зудом не только кожи лица, но и туловища

В. Психомоторной ажитацией, напоминающей алкогольное опьянение

Г. Менее острым, но более длительным «приходом»

Д. Снижением устойчивости к боли

К признакам изменения поведения больного в период актуализации патологического влечения к алкоголю относятся:

А. Затруднения в профессиональной деятельности

Б. Активное стремление противоречить, неуступчивость

В. Стремление к деятельности, снимающей напряжение

Г. Учащение пребывания в ситуациях, связанных с употреблением алкоголя

Д. Учащение курения

При лечении больных ятрогенной зависимостью от препаратов из группы бензодиазепинов, прежде всего, следует учитывать, что:

А. Они должны лечиться в психиатрических или специализированных отделениях для больных с зависимостью от ПАВ

Б. Они требуют не лечения, а лишь официального документа, «узаконивающего необходимую суточную дозу бензодиаземина»

В. Они намеренно заостряют симптомы основного заболевания

Г. С ними необходимо обсуждать назначаемое лечение

Д. Они относятся сверхценно к своим переживаниям или ощущениям

Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе:

- А. заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических исследований);
- Б. получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований);
- В. осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований
- Г. выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия;
- Д. все выше перечисленное

Понятие «терапевтическое окно» - это:

- А. Рекомендованная разовая доза препарата
- Б. Рекомендованная суточная доза препарата
- В. Эмпирически найденная суточная доза препарата
- Г. Интервал между лечебной и токсической дозой
- Д. Интервал между разовой и суточной дозой

Купирование опиоидного абстинентного синдрома предполагает назначение

- А. обезболивающих лекарственных средств
- Б. транквилизаторов
- В. антидепрессантов
- Г. антипсихотических препаратов
- Д. антагонистов опиатных рецепторов

К особенностям клиники наркоманий у подростков относятся:

- А. Практически синхронное развитие синдрома психической зависимости и синдрома измененной реактивности
- Б. Преобладание в структуре абстинентного синдрома симптомов возбуждения парасимпатического отдела нервной системы
- В. Трудности дифференциации неуправляемости в компульсивном влечении к одурманивающему веществу с изначальными нарушениями поведения
- Г. Определение дозы употребляемого одурманивающего средства не толерантностью, а иерархией в группе
- Д. Преобладание изначально одиночного употребления одурманивающего вещества

Злокачественность зависимости от летучих органических соединений наиболее ярко проявляется в:

- А. Высокой прогрессивности
- Б. Тяжести психической и социальной инвалидизации
- В. Тяжелых соматических осложнениях и последствиях интоксикации
- Г. Тяжести состояний отмены
- Д. Переходе больных на другие виды зависимости

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Наиболее часто с употреблением стимуляторов связано развитие следующих осложнений: А - Поражения дыхательной системы, расстройства сердечно-сосудистой деятельности, хромосомные аберрации, нарушения эндокринной системы; Б - Инфаркт миокарда, фибрилляция желудочков сердца, нарушения мозгового кровообращения, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек; кариез, тромбозы, сексуальная дисфункция; В - Инфекционные и токсические гепатиты, кардиомиопатия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, нарушения обмена кальция; Г - Энцефалопатия, пневмонии, болезни крови, мочекаменная болезнь.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Для характеристики ПАВ, как наркотического средства необходимо наличие критериев: А - медицинского и юридического; Б - юридического; В - медицинского, социального и юридического; Г - социального и юридического; Д - медицинского и социального

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Аддиктивное поведение является одной из форм:

- А. Нормативного поведения
- Б. Отклоняющегося поведения
- В. Агрессивного поведения
- Г. Ассертивного поведения
- Д. Пассивного поведения

В подростковом возрасте знакомство с ПАВ:

- А. Происходит в случайной группе сверстников
- Б. Определяется чувственным побуждением, стремлением к эйфории
- В. В значительной степени обуславливается бравадой, легко снимающей инстинктивную осторожность
- Г. Характеризуется высокой частотой отравлений
- Д. Чаще всего обуславливается любопытством

Как правило, в начале реабилитационной программы в условиях реабилитационного центра каждый новый пациент

- А. Находится в наблюдательной палате
- Б. Не имеет права носить верхнюю одежду
- В. Может общаться только с другими новичками
- Г. Получает опекуна из числа старших пациентов
- Д. Может покидать реабилитационный центр не более, чем на 2 суток

В процессе реабилитации редко используется:

- А. Рациональная психотерапия
- Б. Поведенческая психотерапия
- В. Суггестивная психотерапия
- Г. Психическая саморегуляция
- Д. Групповая терапия

Понятие, характеризующее начало развития аддиктивного поведения:

- А. Употребление
- Б. Влечение
- В. Фиксация
- Г. Звисимость
- Д. Абстиненция

Основными характеристиками группы ограничивающих (манипулятивных) методов психотерапии являются:

- А. Адресованность к психической и личностной патологии
- Б. Партнерские отношения между психотерапевтом и пациентом
- В. Быстрое достижение результатов
- Г. Оценка пациента как субъекта воздействия
- Д. Эмпатическое взаимодействие

При дифференциальной диагностике острого алкогольного гепатита от острого гепатита другой этиологии следует ориентироваться на:

- А. Отсутствие продромального периода
- Б. Увеличение печени и желтушность кожных покровов
- В. Повышение уровня молочной кислоты в крови в 2-3 раза
- Г. Повышение содержания мочевой кислоты в крови
- Д. Значительный подъем ГГТ и ГДГ в сыворотке крови

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Шифр МКБ-10 F11.3 соответствует: А - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей, психотическое расстройство; Б - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов, острая интоксикация; В - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина, синдром зависимости; Г - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов, абстинентное состояние.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Уровень эндогенного ацетальдегида обуславливает

- А. Развитие феномена предпочтения алкоголя
- Б. Состояние метаболического комфорта
- В. Развитие аверсивного действия
- Г. Все перечисленное
- Д. Верно А и Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Катарсические гипно-суггестивные техники, гештальт-терапия в индивидуальной форме наиболее эффективна: А - для больных с импульсивным характером употребления ПАВ; Б - для больных со стеническими и возбудимыми чертами; В - для больных с астеническими и сенситивными чертами; Г - для больных с эмоционально-неустойчивыми чертами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Особенности мышления подростка выражаются:

- А. Тяготением к общим теориям, формулам
- Б. Преобладанием общего над частным
- В. Созданием собственных теорий, формул
- Г. «Философической интоксикацией»
- Д. Преобладанием категории возможности, а не действительности

Под вторичной профилактикой зависимости понимают:

- А. Систему мер, направленных на раннюю диагностику зависимости, выявление групп риска, применение лечебных и корригирующих мероприятий
- Б. Систему мер воздействия на причины и условия развития зависимости или повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам
- В. Превентивную терапию, направленную на купирование актуализации патологического влечения
- Г. Лечение больных, направленное на сдерживание прогрессивности и предупреждение рецидивов
- Д. Систему мероприятий, направленную на поддержание реактивности организма

Об актуализации патологического влечения к алкоголю у лиц с астеническими характерологическими особенностями свидетельствует появление:

- А. Тревожности
- Б. Психического дискомфорта
- В. Повышенной психической и физической утомляемости
- Г. Пониженного настроения или кратковременных вспышек раздражения, повышенной обидчивости
- Д. Вегетативных расстройств

Психотерапии в системе психогигиенических мероприятий можно дать следующую оценку

- А. Полностью исчерпывает систему психогигиенических мероприятий
- Б. Не входит в систему психогигиенических мероприятий
- В. Не используется до установления диагноза
- Г. Является частью психогигиенических мероприятий
- Д. Применяется в стационарных условиях

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

1. Движение "12 шагов. АА" - это: А - программа для родственников лиц, зависимых от ПАВ; Б - программа для детей лиц, зависимых от ПАВ; В - Программа для лиц, зависимых от наркотиков; Г - программа для лиц, зависимых от алкоголя.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Метамфетамин выводится из организма:

А. Медленнее, чем амфетамин

Б. Быстрее, чем амфетамин

В. С одинаковой с амфетамином скоростью

Г. Быстрее, чем кокаин

Д. С одинаковой с кокаином скоростью

Понятие «первичное патологическое влечение к алкоголю» соответствует утверждению: А

-

1. Неспособность больного прекратить употребление алкоголя в пределах экстаза, независимо от изначально принятой дозы; Б - Неодолимая потребность продолжить употребление после определённой дозы; В - Потребность употребления алкоголя на фоне соматоневрологических и психических расстройств после алкогольного экстаза; Г - Активное желание больного алкогольной зависимостью употребить алкоголь вне интоксикации

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Для первой стадии наркомании НЕ характерно: А - изменение характера влечения; Б - влечение к психическому комфорту в интоксикации; В - отсутствие физической зависимости; Г - наличие медико-социальных последствий

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Прием больными эфедроновой наркоманией на спаде интоксикации транквилизаторов, обуславливает

- А. Нарушение типичной для данной формы зависимости цикличности
- Б. Нормализацию сна
- В. Появление судорожных припадков
- Г. Купирование дисфорических расстройств в абстинентном состоянии
- Д. Резкое ослабление патологического влечения к эфедрону

Наибольшей отличительной особенностью алкоголизма у женщин является:

- А. Злокачественность течения
- Б. Раннее появление психотических форм
- В. Низкая курабельность
- Г. Аффективная окрашенность клинической симптоматики
- Д. Раннее появление и быстро нарастающая социальная дезадаптация

К основным принципам купирования патологического влечения к наркотику с помощью психофармакологических средств, относится:

- А. Назначение психофармакологических средств в соответствии с психопатологическим оформлением влечения
- Б. Применение антиконвульсантов
- В. Назначение нейролептиков
- Г. Преимущественное назначение транквилизаторов
- Д. Применение антидепрессантов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Вторичные формы патологического влечения к алкоголю это: А - Потребность в алкоголе вне интоксикации; Б - Неспособность удерживаться от употребления алкоголя в интоксикации; В - Употребление алкоголя в стрессовой ситуации; Г - Потребность в опохмелении после алкогольного абзуса.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Изначально высокая толерантность к алкоголю в большей степени обусловлена:

- А. Употреблением качественных алкогольных напитков
- Б. Семейными алкогольными традициями
- В. Функциональным состоянием организма
- Г. Изначально высокой (преморбидной) активностью альдегидокисляющих ферментов

Больные наркотической зависимостью чаще всего имеют преморбидные личностные особенности в виде:

- А. Психического инфантилизма
- Б. Психического заболевания
- В. Органического поражения головного мозга
- Г. Нарушений социальной адаптации
- Д. Интеллектуального снижения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Шифр МКБ-10 F17 соответствует: А - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя; Б - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств; В - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов; Г - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов; Д - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Единственным условием членства в обществе Анонимных Алкоголиков является:

- А. Обязанность регулярно посещать собрания общества
- Б. Желание бросить пить
- В. Материальная поддержка общества
- Г. Принадлежность к определенной сословной группе
- Д. Наличие алкогольной зависимости

Одним из симптомов синдрома профессионального выгорания является:

- А. Симптом потери контроля
- Б. Симптом юношеского максимализма
- В. Завышенная самооценка
- Г. Симптом «расширения сферы экономии эмоций»
- Д. Симптом морально-этического снижения

О начале формирования аддиктивного поведения свидетельствует следующий признак:

- А. Употребление
- Б. Влечение
- В. Фиксация
- Г. Зависимость
- Д. Абстиненция

Наиболее адекватно понятию «Профилактика» отвечает следующая формулировка:

- А. Система медицинских мер, направленная на предупреждение заболеваний, охрану здоровья населения
- Б. Комплексная система государственных, социально-экономических, медико-санитарных, психолого-педагогических мероприятий, направленных на всемерное улучшение здоровья населения
- В. Система санитарно-гигиенических, медицинских и государственных мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний и укрепление здоровья населения
- Г. Система санитарно-гигиенических и медицинских мер, направленных на предупреждение заболеваний и уменьшение вредных последствий
- Д. Система медицинских, правовых и воспитательных мер, направленная на предупреждение заболеваний и наступление вредных последствий

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Шифр МКБ-10 F12 соответствует: А - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя; Б - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств; В - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов; Г - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов; Д - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Патохарактерологические реакции:

- А. Являются новыми личностными реакциями
- Б. Проявляются стереотипными отклонениями поведения
- В. Имеют тенденцию к превышению определенного «потолка» нарушений поведения, возможных у сверстников
- Г. Сопровождаются сомато-вегетативными расстройствами и ведут к нарушениям социальной адаптации
- Д. Определяются всем перечисленным

Хронический нефрит алкогольной этиологии проявляется:

- А. Двухсторонней гематурией
- Б. Гипериммуноглобулинемией
- В. Артериальной гипертензией
- Г. Сочетанием с внепочечными проявлениями висцерального алкоголизма
- Д. Обострением в связи с алкогольным эксцессом

Идеаторный компонент актуализации патологического влечения к алкоголю проявляется

- А. Защитой «права» употреблять алкоголь, как одного из неотъемлемых прав личности
- Б. Ощущением вкуса алкоголя на корне языка
- В. Отрицанием или преуменьшением собственного пьянства, убежденностью в возможности контролировать употребление алкоголя
- Г. Потребностью во всем противоречить окружающим
- Д. Эмоциональной лабильностью

Чаще всего острая (токсическая) гепатопатия протекает с цитолитическим синдромом, под которым понимают:

- А. Дистрофические изменения паренхимы печени
- Б. Нарушения проницаемости клеточных и нутриклеточных мембран гепатоцитов
- В. Снижение синтетической функции печени
- Г. Некротические изменения паренхимы печени
- Д. Снижение детоксицирующей функции печени

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Цель когнитивно-поведенческого подхода: А - выработать негативную реакцию на прием алкоголя/наркотиков; Б - усилить реальные свойства манипуляций и процедур, назначенных больному; В - заложить в сознание больного новую программу на основе развития существующих функциональных возможностей, для чего необходимо многократное повторение и закрепление необходимых реакций.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Клиника ремиссий у больных со II стадией алкоголизма характеризуется:

- А. Ситуационно и спонтанно актуализирующимся патологическим влечением к алкоголю
- Б. Развернутым и более стойким астеническим симптомокомплексом
- В. Алкогольными изменениями личности
- Г. Развитием псевдоабстинентных состояний
- Д. Алкогольной анозогнозией с формальным признанием наличия какого-либо конкретного расстройства (псевдозапой, абстиненция и т.д.)

О том, что у больного с острым алкогольным отравлением осталось нераспознанное осложнение, либо это не острое отравление алкоголем, свидетельствует то, что на фоне правильно проведенного лечения больной не пришел в сознание через:

- А. 1 час
- Б. 2 часа
- В. 3 часа
- Г. 4 часа
- Д. 5 часов

Из выделяемых клинических проявлений (компонентов) патологического влечения к алкоголю относительно мало специфичным является:

- А. Эмоциональные и вегетативные проявления
- Б. Идеаторный компонент
- В. Сенсорный компонент
- Г. Поведенческий компонент
- Д. Сновидения с алкогольной тематикой

Распитие спиртных напитков в общественных местах влечет за собой:

- А. Общественное порицание, сообщение по месту работы, учебы или жительства
- Б. Постановку на диспансерное наблюдение с регулярной явкой в течение 1 года
- В. Административную ответственность
- Г. Уголовную ответственность
- Д. Помещение в медвытрезвитель

При лечении алкоголизма у лиц, страдающих язвенной болезнью желудка нежелательно пользоваться:

- А. витаминами группы Б
- Б. витаминами Е, Р
- В. метронидазолом
- Г. условно-рефлекторной терапией
- Д. тетурамом

Клиника хронического панкреатита у больных алкоголизмом характеризуется следующими особенностями:

- А. Преобладанием латентных форм
- Б. Редкостью типичного болевого синдрома
- В. Сочетанием с гепатомегалией
- Г. Необязательным повышением уровня диастазы в крови и моче
- Д. Ранним появлением синдрома кишечной и желудочной диспепсии

Понятие «ремиссия» при алкоголизме отражает утверждение:

- А. Ремиссия – форма проявления болезни в отсутствии интоксикации
- Б. Ремиссия – полное воздержание больного алкоголизмом от употребления спиртных напитков не менее 1 месяца с сохранением в латентном состоянии всех расстройств, свойственных алкоголизму
- В. Ремиссия – полное воздержание больного алкоголизмом от употребления спиртных напитков в интервалах между запоями
- Г. Ремиссия – полное воздержание больного алкоголизмом от употребления спиртных напитков не менее 3-х месяцев после последнего приема алкоголя
- Д. Эпизодическое употребление алкоголя в контролируемых дозах у больного алкоголизмом между запоями

Резидуальный бред это:

- А. Убежденность в действительности, реальном существовании пережитых в психозе бредовых переживаний
- Б. Фрагмент бредовых переживаний, сохраняющийся после значительной редукции психоза
- В. Актуализация прежних бредовых переживаний на фоне их полной редукции
- Г. Сохранение в качестве моносимптома после перенесенного психоза
- Д. Новая бредовая идея в структуре стабилизированной бредовой фабулы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Для второй стадии наркомании наркомании НЕ характерно: А - изменение толерантности; Б - присоединение психотических осложнений; В - отсутствие физической зависимости; Г - наличие физической зависимости

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Как называется наука о трезвости:

- А. Наркология
- Б. Теология
- В. Этимология
- Г. Собриология
- Д. Петрология

Бредовое настроение

- А. Предшествует «кристаллизации бреда»
- Б. Сопровождает бред на всем протяжении
- В. Выражает суть бредового синдрома
- Г. Возникает после редукции бредовых переживаний
- Д. Отражает картину дефекта после психотического приступа

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Наиболее полно определению понятия "эйфория" соответствует следующее: А - состояние интоксикации, когда ПАВ снимает субъективно тягостные ощущения и выравнивает явления дискомфорта; Б - повышенное благодушное настроение, сочетающееся с беспечностью и недостаточной критической оценкой своего состояния; В - состояние интоксикации приводит к изменению восприятия окружающего и собственных ощущений в сторону экстремально положительного для субъекта значения; Г - подъем эмоционального фона, безмятежное, благодушное настроение, определенные психические и физические ощущения, изменения мышления и восприятия, нарушения сознания различной степени.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Одной из главных задач обязательного медицинского страхования (ОМС) является:

- А. Обеспечение финансирования медицинских учреждений
- Б. Дифференциация медицинской помощи
- В. Рациональное использование медицинских кадров и финансовых средств
- Г. Обеспечение устойчивого финансирования медицинской помощи застрахованным в объеме и на условиях территориальной программы ОМС
- Д. Контроль за рациональным использованием финансовых и материальных средств

Для формирования нормативных личностных статусов необходимо:

- А. Взаимодействие со значимыми другими лицами, приобретение опыта взаимного удовлетворения потребностей человека и его конкретного ЗДЛ
- Б. Наличие полной родительской семьи.
- В. Наличие позитивного жизненного сценария
- Г. Отсутствие психотравмирующих ситуаций в анальной фазе психосексуального развития.
- Д. Наличие материального благополучия в семье

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Для астении характерно: А - быстрая истощаемость, снижение настроения; Б- моторная заторможенность, идеаторная заторможенность, аспонтанность; В - моторная заторможенность, идеаторная заторможенность, снижение настроения; Г- моторная заторможенность, идеаторная заторможенность, безынициативность

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Лечение артериальной гипотонии, обусловленной острой сосудистой недостаточностью, проводится:

- А. Кардиотониками
- Б. Изотоническими растворами
- В. Вазопрессорами
- Г. Аналептиками
- Д. Крово- или плазмозаменителями

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Шифр МКБ-10 F12.0 соответствует: А -психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей, психотическое расстройство; Б - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов, острая интоксикация; В - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина, синдром зависимости; Г - психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов, абстинентное состояние.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Самостоятельная наркологическая служба в России была создана:

- А. в 1965 году
- Б. в 1970 году
- В. в 1975 году
- Г. в 1980 году
- Д. в 1985 году

«Дома на полпути» необходимы:

- А. Для постепенной реинтеграции и ресоциализации пациентов
- Б. Для изоляции пациентов от родственников
- В. Для проживания малоимущих пациентов
- Г. Для контроля над пациентами
- Д. Для получения прибыли

Малый истерический припадок характеризуется состоянием, при котором наблюдаются:

- А. Тонические и клонические судороги
- Б. Внезапная потеря сознания
- В. Массивная тоническая судорога с изгибанием тела в дугу
- Г. Приступы рыдания, хохота
- Д. Секундная потеря сознания с судорожными подергиваниями отдельных групп мышц.

Средство, сенсibiliзирующей к алкоголю терапии:

- А. Тетурам
- Б. Эметин
- В. Темпозил
- Г. экстракт баранца
- Д. экстракт чабреца

В чем заключается мотивационный стиль взаимодействия врача с пациентом:

- А. Соблюдаются принципы мотивационного интервью
- Б. Врач доброжелательно относится к пациенту
- В. Соблюдаются принципы деонтологической этики
- Г. Корректно назначается терапия, направленная на купирование патологического влечения
- Д. Врач демонстрирует пациенту пагубность и недопустимость его стиля жизни

К наиболее тяжелым осложнениям хронической интоксикации эфедроном относится развитие:

- А. Миокардиодистрофии
- Б. Хронического гастрита
- В. Паркинсоноподобного синдрома
- Г. Нарушения функции почек
- Д. Спастического энтероколита

Приоритетным в работе реабилитационного подразделения является создание:

- А. Очереди на прием
- Б. Атмосферы взаимного наблюдения
- В. Терапевтической среды
- Г. Отрицательного отношения к наркоманам
- Д. Общества терапевтов

Наиболее выраженной способностью к перекрестной толерантности обладают:

- А. Антидепрессанты
- Б. Транквилизаторы
- В. Психостимуляторы
- Г. Нейролептики
- Д. Ноотропы

Температурный мониторинг при неотложных состояниях обязателен в связи с тем, что:

- А. Температурные отклонения типичны для неотложных состояний
- Б. Отклонения температуры часто являются самым ранним симптомом осложнения состояния
- В. Гипотермия и гипертермия ассоциируются со значительной летальностью и осложнениями
- Г. Температурные отклонения могут быть следствием поздней стадии аллергии
- Д. Температурные отклонения могут быть клиническим проявлением делириев, стационарных психозов

Для алкоголизма у подростков характерно:

- А. Формирование заболевания в сжатые сроки
- Б. Быстрый рост изначально высокой толерантности
- В. Высокая интенсивность первичного патологического влечения к алкоголю
- Г. Преобладание вторичных форм влечения к алкоголю
- Д. Отсутствие тяжелых похмельных состояний

Наиболее значимым из непрямых биохимических маркеров злоупотребления алкоголем, согласно данным биохимического анализа крови, является уровень содержания

- А. Триглицеридов
- Б. Аланинаминотрансферазы
- В. Гамма-глутамилтрансферазы
- Г. Щелочной фосфатазы

Влияние на такие психологические функции, как настроение, познавательная способность, сознание, умственные способности и такие побуждения как голод, жажда, половое влечение характерны для

- А. Ноотропных препаратов
- Б. Амфетамина
- В. Кокаина
- Г. Синтетических каннабиноидов

Рекомендуемым штатным нормативом наркологического диспансера (наркологической больницы) предусмотрено наличие одной ставки врача –психиатра-нарколога на _____ коек для больных наркоманией

- А. 20
- Б. 25
- В. 15
- Г. 35

Непосредственной причиной длительного действия этанола и его дериватов на плод даже при их элиминации из крови матери является

- А. Суммарная длительность злоупотребления алкоголем
- Б. Слабость разрушающих алкоголь ферментных систем матери
- В. Накопление в амниотической жидкости
- Г. Количество предшествующих беременностей

Циклодол относится к группе

- А. Серотонинергических галлюциногенов
- Б. Метилых амфетаминов
- В. Антихолинергических галлюциногенов
- Г. Диссоциативных анестетиков

К высокотехнологичной медицинской помощи для лечения синдрома алкогольной зависимости, проводимой за счет бюджетных средств, относится

- А. Экстракорпоральная детоксикация
- Б. Назначение медикаментозного лечения
- В. Школа психологической профилактики для пациентов и родственников
- Г. Осуществление физиотерапевтических процедур

В третьей фазе барбитурового синдрома отмены появляются

- А. Нарушения сна
- Б. Психозы
- В. Большие судорожные припадки
- Г. Боли в крупных суставах

Качество медицинской помощи напрямую зависит от выполнения

- А. Порядков, стандартов и клинических рекомендаций
- Б. Правил внутреннего распорядка
- В. Плана посещений
- Г. Административных регламентов

В качестве психостимулятора применяется

- А. Кодеин
- Б. Прегабалин
- В. Трамадол
- Г. Кофеин

Настораживающим симптомом, свидетельствующим о формировании зависимости к наркотическим анальгетикам у хронических соматических больных с выраженным болевым синдромом , является

- А. Наличие жалоб на непрекращающиеся боли
- Б. Наличие грубых расстройства памяти
- В. Восстановление состояния больного после приема наркотика
- Г. Сосредоточенность на поиске обезболивания, а не на поиске причин болей

Дезинтоксикационный раствор применяется для лечения

- А. Больных в фазе ремиссии
- Б. На этапе поддерживающего лечения
- В. Острого психотического состояния при употреблении психостимуляторов
- Г. Абстинентного синдрома при отмене психостимуляторов

Профилактика алкогольного синдрома плода состоит в

- А. Исключении употребления биологическими отцами детей алкоголя или других психоактивных веществ
- Б. Проведении инфузионной терапии на 6-9 месяце беременности
- В. Исключении употребления беременными алкоголя или других психоактивных веществ
- Г. Проведении в учебных заведениях семинаров и лекций о вреде злоупотребления алкоголем и другими психоактивными веществами

Рекомендуемым штатным нормативом наркологического отделения предусмотрена одна ставка врача-психиатра-нарколога на _____ коек для больных алкоголизмом

- А. 35
- Б. 40
- В. 20
- Г. 25

Степень никотиновой зависимости определяется

- А. Со слов родственников и друзей
- Б. По тесту Фагерстрема
- В. Визуально-аналоговой шкалой
- Г. Путем сбора объективного статуса

На занятия в семейном клубе трезвости обычно собираются

- А. 1-2 Семьи
- Б. От 10 до 12 семей
- В. 40-60 Семей
- Г. Без ограничения числа участников

Эйфоризирующее действие алкоголя у подростков проявляется усилением

- А. Тревожности
- Б. Мнительности
- В. Пассивности
- Г. Агрессивности

Передозировка героина приводит к смерти от

- А. Угнетения дыхательного центра
- Б. Тяжелой аритмии сердца
- В. Острой надпочечниковой недостаточности
- Г. Острой печеночной недостаточности

Для зависимости от снотворных препаратов не характерно наличие

- А. Однообразной речевой продукции
- Б. Персеверации
- В. Мании
- Г. Олигофазии

При лечении ас первоочередной задачей является

- А. Интенсивная терапия острых состояний, устранение нарушений, вызванных хронической интоксикацией
- Б. Подавление синдрома патологического влечения к ПАВ
- В. Терапия соматоневрологических последствий хронической интоксикации ПАВ
- Г. Индивидуальная рациональная ПТ для создания достаточной мотивации к лечению

Симптом липмана определяется как симптом

- А. Блестящих предметов
- Б. Телефонной трубки
- В. Чистого листа
- Г. Глазных яблок

Психологическая травматизация в генезе алкоголизма у женщин является фактором

- А. Облигатным в большинстве случаев
- Б. Как правило, не значимым
- В. Факультативным
- Г. Чаще всего, субъективно-оправдательным

Клинико-генеалогический метод исследования

- А. Анализирует родословную пациента, позволяет установить тип наследования заболевания
- Б. Оценивает вклад наследственных факторов в этиологию психических расстройств, определяет конкордантность
- В. Изучает хромосомный набор – число хромосом, особенности их строения
- Г. Исследует распространение отдельных генов и хромосомных аномалий в популяциях

При выявлении в биологическом материале освидетельствуемого лица новых потенциально опасных психоактивных веществ в результате медицинского освидетельствования на состояние опьянения медицинское заключение «установлено состояние опьянения» выносится в отношении лиц

- А. Без клинических признаков опьянения, являющихся водителями транспортных средств
- Б. Всех категорий, подлежащих данному виду медицинского освидетельствования, у которых определяется хотя бы один клинический признак опьянения
- В. Без клинических признаков опьянения, совершивших административное правонарушение
- Г. У которых определяется не менее трех клинических признаков опьянения и не относящихся к категории водителей транспортных средств

Основным метаболитом героина в моче является

- А. Морфин-3-глюкуронид
- Б. Морфин-6-глюкуронид
- В. 6-О-моноацетилморфин
- Г. Морфин

Убежденность пациента в изменении окружающей обстановки – перевоплощении людей, животных, характерна для бреда

- А. Одержимости
- Б. Метаморфозы
- В. Инсценировки
- Г. Интерметаморфозы

К клиническим признакам опьянения «изменения психической деятельности», приведенным в приложении № 2 приказа минздрава России от 18.12.2015 года № 933н относятся

- А. Адекватность поведения; соскальзывания; расторможенность влечений
- Б. Неадекватность поведения, заторможенность, сонливость или возбуждение, эмоциональная неустойчивость, ускорение или замедление темпа мышления
- В. Глубокий сон, эмоциональная выхолощенность, безразличие, парадоксальность мышления
- Г. Импульсивность; эмоциональная холодность, паралогичность мышления

Автоматическое повторение услышанных слов называется

- А. Стереотипия
- Б. Парамимия
- В. Эхолалия
- Г. Эхопраксия

Поддерживающая противорецидивная терапия

- А. Включает в себя только симптоматическое поддерживающее лечение
- Б. Имеет цель нормализации поведенческих адаптационных механизмов при максимально возможной редукции патологического влечения к ПАВ
- В. Включает в себя только психофармакотерапию
- Г. Может проводится в тайне от пациента

Начальная (i) стадия алкогольной зависимости характеризуется _____ толерантности

- А. Снижением
- Б. Плато
- В. Ростом
- Г. Отсутствием динамики

Длительность выявления единичного употребления каннабиноидов при проведении иммунно-ферментного анализа составляет (в днях)

- А. 10-15
- Б. 7-14
- В. 3
- Г. 5-7

Половое влечение усиливается при приеме

- А. Опиоидов
- Б. Амфетаминов
- В. Нейролептиков
- Г. Бензодиазепинов

При проведении исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя результаты измерения указываются в

- А. Промилле
- Б. Мг/л
- В. Мг/мл
- Г. Г/л

Определение понятия «полинаркомания» включает

- А. Злоупотребление двумя или более наркотическими средствами одновременно или попеременно
- Б. Переход к употреблению другого наркотического средства после длительного периода употребления какого-то определенного наркотика
- В. Сочетание приема наркотика и алкоголя
- Г. Потребление больным наркоманией другого лекарственного средства или вещества, не отнесенного к наркотическим

При нарастании дефицитарной симптоматики у пациентов с сочетанным течением алкоголизма и шизофрении

- А. Пьянство значительно усиливается
- Б. Пьянство уменьшается или прекращается
- В. Появляются длительные запои
- Г. Характер употребления алкоголя не меняется

Действия, направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических веществ и (или) растений определяются как _____ наркотических средств и психотропных препаратов

- А. Распределение
- Б. Переработка
- В. Производство
- Г. Изготовление

Наряду с гемблингом к рубрике мкб-10 «расстройства привычек и влечений» (f63) относят

- А. Трансвестизм
- Б. Повышенное половое влечение
- В. Булимию
- Г. Пироманию

К сенсibiliзирующим средствам относят

- А. Налтрексон, налуксон
- Б. Эметин, апоморфин
- В. Дисульфирам, цианамид
- Г. Варениклин, цитизин

Наиболее вероятным сочетанием признаков синдрома отмены табака является

- А. Общее недомогание, слабость, сонливость
- Б. Боли в суставах, озноб
- В. Сильное желание употребить табак, дисфория, усиление кашля
- Г. Снижение аппетита, повышение АД

В соответствии с приказом росстата от

22.11.2010 № 409 «об утверждении практического инструктивно-методического пособия по статистике здравоохранения» посещением считается контакт пациента с врачом

- А. Независимо от состояния его здоровья в амбулаторно-поликлиническом учреждении или на дому
- Б. В стационаре многопрофильного или специализированного медицинского учреждения, наркологического реабилитационного центра
- В. При оказании скорой и неотложной медицинской помощи бригадой скорой помощи или медико-санитарной авиацией
- Г. В приемном отделении многопрофильного или специализированного стационара, наркологического реабилитационного центра

Угнетение дыхательного центра при передозировке опиоидов связано с токсическим действием на рецепторы

- А. К (OP2)
- Б. Δ (OP1)
- В. NOP (OP4)
- Г. М (OP3)

«Каскад награды» включает выделение серотонина, эндорфина, эндогенных каннабиноидов и глутамата, способствующих высвобождению

- А. Дофамина
- Б. Глицина
- В. Ацетилхолина
- Г. Динорфина

Синдром отмены от табака, включает в себя

- А. Появление вторичного патологического влечение, суточные колебания АД, раздражительной слабостью, обсессивно-компульсивным влечением
- Б. Влечение к табаку или другим никотинсодержащим продуктам, аффективные расстройства, снижение концентрации внимания, недомогание и слабость, усиление кашля, афтозный стоматит, усиление аппетита, бессонницу
- В. Конфликтное поведение в семье или с близким окружением, преобладанием выраженных когнитивных нарушений, с неспособностью самостоятельно оценивать свое будущее
- Г. Преобладание выраженной психической патологии, преимущественно в вечернее время, склонностью к антисоциальному поведению, приводящему к проблемам с законом

Патологическое влечение к азартным играм (патологический гемблинг) имеет шифр ____ по МКБ-10

- А. F 63.0
- Б. F 10.2
- В. F17.2
- Г. F 21

Нейрофизиологические механизмы развития зависимости от алкоголя связаны с

- А. Высокой токсичностью этанола
- Б. Высокой энергетической ценностью алкоголя
- В. Конденсацией продукта метаболизма этанола – ацетальдегида
- Г. Системой подкрепления

К наркотическим веществам, резко усиливающим половое влечение и сексуальную потенцию, относится

- А. Метадон
- Б. Метамфетамин
- В. Фенобарбитал
- Г. Героин

Острая интоксикация алкоголем является состоянием преходящего характера, возникающим

- А. Вслед за приемом алкоголя
- Б. У лиц, впервые употребивших алкоголь
- В. У пациентов, страдающих алкогольной зависимостью
- Г. При употреблении алкоголя с содержанием спирта не менее 40%

Для лечения аас препараты группы «блокаторы кальциевых каналов» назначаются

- А. В монотерапии как препараты патогенетической направленности
- Б. В комплексной терапии как дополнительная составляющая к проводимой инфузионной терапии
- В. Для профилактики развития эпилептических приступов
- Г. Как препараты первой линии выбора

Средний корпускулярный объем эритроцитов у лиц с алкогольной зависимостью выше _____ мкм³

- А. 46
- Б. 74
- В. 55
- Г. 98

Осмотр врачом-психиатром-наркологом (врачом-психиатром-наркологом участковым) пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением и находящихся в ремиссии свыше 2 лет, осуществляется не реже одного раза в

- А. Два месяца
- Б. Три месяца
- В. Месяц
- Г. Шесть недель

В период острой интоксикации амфетамином отсутствует

- А. Физическая активность
- Б. Бессонница
- В. Эйфория
- Г. Замедление ассоциативного процесса

Болевой компонент «ломки» у наркоманов обусловлен

- А. Повышением синтеза антиноцицептивных медиаторов
- Б. Избыточной секрецией катехоламинов
- В. Снижением порога чувствительности опиоидных рецепторов
- Г. Повышением возбудимости ноцицептивных рецепторов

К первичной негативной симптоматике относится

- А. Алогия
- Б. Алекситимия
- В. Акатизия
- Г. Астазия-абазия

Соматоневрологическая патология у лиц, злоупотребляющих пивом

- А. Характеризуется вовлечением всех органов и систем
- Б. Чаще протекает бессимптомно и не требует медикаментозной коррекции
- В. Проявляется на поздних этапах заболевания
- Г. Не имеет тенденции к утяжелению при отсутствии терапии основного заболевания

К симптомам второй стадии синдрома зависимости от алкоголя относят формирование

- А. Аллопсихической дезориентировки
- Б. Психической зависимости
- В. Аутопсихической дезориентировки
- Г. Абстинентного синдрома

К последствиям длительного приема чифиря относится

- А. Раннее старение
- Б. Социальная дезадаптация
- В. Психоорганический синдром
- Г. Недержание аффектов

Клонидин (стимулятор постсинаптических альфа-2-адренорецепторов) используют в терапии

- А. Опиоидного абстинентного синдрома
- Б. Рецидива опиоидной зависимости
- В. Передозировки опиоидами
- Г. Опиоидной интоксикации

При амфетаминовом психозе особенно затруднена дифференциальная диагностика с

- А. Параноидной шизофренией
- Б. Интоксикацией барбитуратами, бензодиазепинами
- В. Паническими расстройствами
- Г. Биполярными аффективными расстройствами

Скорая специализированная медико-санитарная помощь оказывается

- А. Врачами отделений неотложной наркологической помощи
- Б. Медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов
- В. Врачами-психиатрами-наркологами и врачами психиатрами-наркологами участковыми
- Г. Выездными бригадами скорой медицинской помощи

К клиническим признакам каннабиноидного абстинентного синдрома относится

- А. Гипомания
- Б. Тревога
- В. Повышенная сонливость
- Г. Повышенный аппетит

К особенностям социализации современного общества относят

- А. Быстрые коренные перемены в укладе жизни общества, которые могут являться причиной межпоколенческого непонимания
- Б. Возвращение к традиционным особенностям уклады жизни, после периода быстрого технического прогресса во второй половине прошлого века
- В. Ускорение темпов социализации, раннее начало ее трудового этапа
- Г. Замедление научно-технического прогресса и темпов социализации

Выявлением факторов риска развития наркологических расстройств у несовершеннолетних в рамках первичной медико-санитарной помощи при проведении медицинских осмотров занимается

- А. Врач-психиатр-нарколог (врач-психиатр-нарколог участковый)
- Б. Врач-педиатр (врач-педиатр участковый)
- В. Врач-терапевт (врач-терапевт участковый)
- Г. Врач общей практики (семейный врач)

Непосредственной целью сенсibiliзирующей к алкоголю терапии при лечении синдрома зависимости является создание

- А. Условий для восстановления нарушенных семейных отношений
- Б. Мотива к нормативному социальному функционированию
- В. Повышенной терапевтической комплаентности больного
- Г. Условно-рефлекторного отвращения

Реабилитация ВИЧ-инфицированных пациентов

- А. Проводится совместно с врачом-эпидемиологом
- Б. Проводится в обычных реабилитационных структурах
- В. Не проводится
- Г. Проводится в специализированных структурах

Наибольший токсический эффект ацетальдегида проявляется при таком сочетании активностей алкогольдегидрогеназы (адг) и альдегиддегидрогеназы (алдг) в организме, как

- А. Низкая активность АДГ, высокая – АЛДГ
- Б. Высокая активность АДГ, высокая – АЛДГ
- В. Низкая активность АДГ, низкая – АЛДГ
- Г. Высокая активность АДГ, низкая – АЛДГ

Активация к-опиоидных рецепторов приводит в основном к

- А. Судорогам
- Б. Общей активации
- В. Эйфории
- Г. Спинальной анальгезии

К медицинским противопоказаниям к управлению транспортным средством относят

- А. Употребление с немедицинской целью психоактивных веществ с пагубными последствиями и синдром зависимости от психоактивных веществ
- Б. Синдром зависимости от алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ
- В. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ
- Г. Употребление алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ с пагубными последствиями

Влияние пассивного курения на здоровье заключается в

- А. Отсутствии существенного влияния на организм
- Б. Провоцировании конфликтных отношений в семейном кругу
- В. Развитии заболеваний со стороны респираторной, сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний
- Г. Возникновении стойких поведенческих нарушениях, преимущественно в утренние часы

Социотерапевтическая практика исключает

- А. Трудоустройство и ходатайство за пациента перед работодателем
- Б. Повышение социально-приемлемого уровня притязаний и законопослушания
- В. Создание мотивации на участие в реабилитационных программах
- Г. Создание объективного отношения к заболеванию и к своему социальному статусу

Направление пациента в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» осуществляется врачом-психиатром-наркологом (врачом-психиатром-наркологом участковым) и

- А. Врачом-педиатром (врачом-педиатром участковым)
- Б. Выездной бригадой скорой медицинской помощи
- В. Врачом общей практики (семейным врачом)
- Г. Врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым)

Высокая коморбидность аффективных расстройств и болезней зависимости связана с влиянием психоактивных веществ на _____ систему мозга

- А. Серотониновую
- Б. Норадреналиновую
- В. Вазопрессиновую
- Г. Ацетилхолиновую

Социальное функционирование у пациентов с шизофренией

- А. Не изменяется
- Б. Ухудшается
- В. Улучшается
- Г. Не изучено

Рекомендуемыми штатными нормативами диспансерно-поликлинического отделения наркологического диспансера (наркологической больницы) предусмотрено наличие одной ставки врача-психотерапевта на _____ ставки врача-психиатра-нарколога

- А. 4
- Б. 3
- В. 1
- Г. 2

При наличии у больных шизофренией симптоматического алкоголизма наиболее важным является

- А. Проведение семейной психотерапии
- Б. Устранение эндогенной симптоматики
- В. Проведение противоалкогольной терапии
- Г. Проведение эмоционально-стрессовой психотерапии

У злоупотребляющих алкоголем лиц обострение хронического панкреатита характеризуется появлением

- А. Гемолитической анемии
- Б. Синдрома Бадда-Киари
- В. Желтухи
- Г. Артралгии

Искажения восприятия, связанные с необычным эмоциональным состоянием, определяются как иллюзии

- А. Парейдолические
- Б. Физические
- В. Аффектогенные
- Г. Физиологические

К противопоказаниям для применения заменителей никотина относят

- А. Аллергические реакции
- Б. Воспалительные заболевания мочеполовой системы
- В. Воспалительные заболевания кожных покровов
- Г. Любую патологию дыхательной системы

Переход от эпизодической к систематической алкоголизации проявляется

- А. В традиционных, социально приемлемых формах употребления алкоголя
- Б. В интенсивных алкогольных абзусах
- В. В псевдозапоях
- Г. Формированием определенной закономерности злоупотребления алкоголем

К терапевтическому действию налтрексона относится

- А. Купирование тревоги
- Б. Стабилизация настроения
- В. Избирательное влияние на патологическое влечения к алкоголю
- Г. Нейрометаболический эффект

Опросник sage используется для выявления лиц, употребляющих ____ на опасном для здоровья уровне

- А. Алкоголь
- Б. Опиаты
- В. Седативно-снотворные вещества
- Г. Курительные смеси

Парейдолии характерны для

- А. Обнубленияции
- Б. Оглушения
- В. Аменции
- Г. Делирия

В опьянении больная проявляет стремление быть в центре внимания, желая произвести яркое впечатление на окружающих с демонстрацией театрализованного горестного аффекта с бурными сценами отчаяния. Такие проявления характерны для

- А. Алкогольного опьянения с истерическими чертами
- Б. Алкогольного опьянения с гебефренными чертами
- В. Дисфорического варианта алкогольного опьянения
- Г. Параноидного варианта алкогольного опьянения

В структуре синдрома алкогольной психической деградации

- А. Преобладает интеллектуально-мнестическое снижение
- Б. Преобладают аффективные нарушения
- В. Преобладает нравственно-этическое снижение
- Г. Преобладают поведенческие нарушения

Немотивированное противодействие любому воздействию извне определяется как

- А. Кататония
- Б. Мутизм
- В. Негативизм
- Г. Ступор

После прохождения медицинской реабилитации в стационарных условиях лица с наркологическим расстройством направляются

- А. Под диспансерное наблюдение к врачу психиатру-наркологу или врачу психиатру-наркологу участковому медицинской наркологической организации
- Б. В медицинскую наркологическую организацию для проведения лечения в амбулаторных условиях и организации диспансерного наблюдения
- В. На программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях или в реабилитационные наркологические центры
- Г. В реабилитационные наркологические центры любой организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности

К тенденциям последних лет в сфере злоупотребления наркотиками и психотропными веществами относится

- А. Разрешение в некоторых странах легального употребления опиоидов и психостимуляторов с рекреационными целями
- Б. Разрешение в некоторых странах легального употребления галлюциногенов с рекреационными целями
- В. Широкое распространение «дизайнерских» наркотиков с механизмами действия такими же, как у уже известных
- Г. Появление новых ПАВ, с принципиально отличными от ранее известных механизмами наркотического действия

Вторая фаза интоксикации амфетаминами характеризуется

- А. Импульсивностью
- Б. Дисфорией
- В. Сексуальным возбуждением
- Г. Эйфорией

«Стержневым», наиболее мощным фактором, провоцирующим рецидивирование, является

- А. Обострение соматических заболеваний
- Б. Актуализация вторичного влечения к ПАВ
- В. Актуализация первичного влечения к ПАВ
- Г. Аффективные колебания

Каждый гражданин имеет право выбора врача-терапевта, врача общей практики, врача-педиатра в выбранной медицинской организации ____ в год

- А. 2 Раза
- Б. 1 Раз
- В. 3 Раза
- Г. 4 Раза

Тревожная субдепрессия у больных с алкогольной зависимостью характеризуется

- А. Сниженным, тоскливым фоном настроения, тревогой, беспокойством, раздражительностью, ощущением «давящих стен», «безвыходности», хаотичным психомоторным возбуждением («тоскливое буйство», «тоскливое неистовство»)
- Б. Отсутствием активных жалоб, пассивностью, вялостью, безразличием, затруднением в выполнении физических и умственных нагрузок, снижением побуждений, бездеятельностью, переживанием собственной «апатии»
- В. Жалобами на тревогу, беспокойство, неусидчивость, снижение настроения без четких суточных колебаний
- Г. Аутохтонной идеомоторной заторможенностью, апатией, депрессивной деперсонализацией (чувство глубокой собственной изменённости, болезненная психическая анестезия), телесной тоской, идеями самообвинения, улучшением состояния во второй половине дня

Употребление эфедрона, как правило, носит _____ характер

- А. Эпизодический
- Б. Несистематический
- В. Циклический
- Г. Непрерывный

Трамадол относят к группе

- А. Нейролептиков
- Б. Антидепрессантов
- В. Анальгетиков
- Г. Психостимуляторов

Злоупотребление алкоголем часто сочетается с употреблением комбинированных лекарственных препаратов в форме капель для приема внутрь, в состав которых входит

- А. Валериана
- Б. Зверобой
- В. Фенобарбитал
- Г. Красавка

К клиническим проявлениям, отсутствующим при острой амфетаминовой интоксикации, относят

- А. Прилив энергии, суетливость, переоценку собственных сил
- Б. Угнетение аппетита
- В. Успокоение, ровное «солнечное» настроение
- Г. Гипергидроз, гиперрефлексию, тремор, мидриаз

Основные изучаемые параметры созависимости, как болезненного проявления, определяют

- А. Национально-этническая принадлежность
- Б. Этиология, патогенез, клиника
- В. Морально-этический статус созависимого
- Г. Интеллектуальный статус созависимого