

Тесты с вопросами по специальности «Психиатрия-наркология» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/psihiatr-narkolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Психиатрия-наркология» для аккредитации и других экзаменов (4000 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/psihiatriya_narkologiya/

2) Психиатрия-наркология — ситуационные задачи

→ medik-otvet.ru/product/nar/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Клинические признаки алкогольного опьянения начинают отчетливо проявляться при концентрации алкоголя в крови:

- А. 0,2 промилле
- Б. 0,3 промилле
- В. 0,5 промилле
- Г. 1,0 промилле
- Д. 2,0 промилле

Под дефицитарностью личности, предрасполагающей к формированию аддиктивных расстройств, подразумевается недостаточность или повреждения:

- А. В морально-этической сфере
- Б. В интеллектуальной сфере
- В. На четырех уровнях функционирования человека: биологическом, психологическом, социальном и духовном
- Г. На культурном уровне функционирования человека
- Д. Резидуально-органические повреждения нервной системы

Состояние острой алкогольной интоксикации (простое алкогольное опьянение), сопровождается изменениями

- А. В эмоционально-волевой сфере
- Б. Поведенческой
- В. Неврологической.
- Г. Вегетативной

Противопоказаниями к проведению аутогенной тренировки являются

- А. Неврозы
- Б. Гипертоническая болезнь
- В. Астенические состояния
- Г. Параноидные реакции
- Д. Нарушения сна

При опросе подростков, страдающих зависимостью от ПАВ, приемлемо:

- А. Общение в форме непринужденной беседы
- Б. Обсуждение тем, интересующих подростка
- В. Отсутствие видимой схемы опроса
- Г. Ведение записей в присутствии подростка
- Д. Обращение на «ты»

Основным диагностическим критерием алкогольного абстинентного синдрома с обратимыми психоорганическими расстройствами является

- А. Развитие в 3-й стадии заболевания
- Б. Затяжное течение
- В. Двухфазное течение
- Г. Наличие алкогольной энцефалопатии
- Д. Наличие судорожных припадков

В случае разногласий между членами экспертной комиссии, несогласный член комиссии:

- А. Подписывает акт с пометкой о своем несогласии
- Б. Составляет собственное заключение
- В. Не подписывает акт
- Г. Мотивированно настаивает на повторной экспертизе
- Д. Добивается подготовки компромиссного заключения

Преморбидный характерологический склад наркоманов, как правило, определяется индивидуальными особенностями, отражающими:

- А. Темперамент, аффективность
- Б. Общение индивида
- В. Способность к адаптации
- Г. Уровень развития личности
- Д. Психический инфантилизм

В случае явки больного, находящегося на больничном листе на очередной прием в состоянии опьянения, при сохраняющемся болезненном состоянии, не связанным с опьянением, больничный лист:

- А. Закрывается и больной выписывается на работу
- Б. Закрывается, а вместо него выдается справка
- В. Продолжается с пометкой об опьянении
- Г. Продолжается с пометкой в амбулаторной карте
- Д. Открывается новый с пометкой об опьянении

Лечение артериальной гипотонии, обусловленной острой сосудистой недостаточностью, проводится:

- А. Кардиотониками
- Б. Изотоническими растворами
- В. Вазопрессорами
- Г. Аналептиками
- Д. Крово- или плазмозаменителями

Проявлениями синдрома измененной реактивности во II стадии опийной наркомании являются все перечисленные, исключая

- А. Падение интенсивности «прихода»
- Б. Нормализация физического и психического состояния в интоксикации наркотиком
- В. Рост толерантности
- Г. Подавление кашлевого рефлекса
- Д. Отсутствие постинтоксикационного сна

Факторами, способствующими при неблагоприятных условиях формированию алкоголизма у женщин, могут быть

- А. Наследственная отягощенность алкоголизмом или психическими заболеваниями
- Б. Неправильное воспитание
- В. Психогении
- Г. Эмоциональная депривация
- Д. Все перечисленное

К прямому токсическому действию этанола относят:

- А. Мембранотропное действие
- Б. Конформационное действие
- В. Взаимодействие с неэтерифицированными жирными кислотами
- Г. Метаболические расстройства.

Учет характерологических особенностей при анализе состояния больного алкоголизмом позволяет

- А. Более четко решать вопросы прогноза заболевания
- Б. Проводить целенаправленную дифференцированную терапию
- В. Строить программы первичной профилактики зависимости от алкоголя
- Г. Осуществлять профилактику рецидивов заболевания
- Д. Все перечисленное

Глубокая алкогольная кома характеризуется отсутствием специфических признаков и клинически проявляется:

- А. Невозможностью речевого контакта
- Б. Угнетением зрачковых и корнеальных рефлексов
- В. Угнетением мышечной и болевой чувствительности
- Г. Снижением АД и появлением синусовой брадикардии

Для депрессивной триады характерно

- А. Двигательная заторможенность
- Б. Идеаторная заторможенность
- В. Пониженное настроение
- Г. Меланхолический раптус
- Д. Апатичность

О наличии синдрома измененной реактивности можно говорить при отсутствии у больного алкоголизмом

- А. Утраты рвотного рефлекса
- Б. Изменения толерантности к алкоголю
- В. Изменения характера опьянения, амнестических форм опьянения
- Г. Абстинентного синдрома
- Д. Изменения формы употребления алкоголя

Ранняя алкоголизация возможна при всех перечисленных особенностях личности подростков, кроме

- А. Повышенной внушаемости и подчиняемости в поведении
- Б. Ранимости и неуверенности в себе
- В. Низкого интеллектуального уровня
- Г. Нестойкости и кратковременности подражательных действий и послушания
- Д. Отсутствия познавательных интересов и любопытства

Критерии характеристики аддиктивной личности:

- А. Безответственность и необязательность
- Б. Отсутствие сопереживания и сочувствия
- В. Уход от эмоциональных контактов и любых переживаний
- Г. Стремление к поверхностным отношениям и связям
- Д. Низкая фрустрационная толерантность

В клинической картине классического варианта острого алкогольного (металкогольного) психоза истинные императивные вербальные галлюцинации характерны при:

- А. Энцефалопатии Гайе-Вернике
- Б. Алкогольном параноиде
- В. Алкогольном галлюцинозе
- Г. Алкогольном делирии

Аттестация врача психиатра-нарколога на присвоение ему звания врача-специалиста 2-ой квалификационной категории проводится:

- А. По окончании специализации
- Б. После 1 года работы по специальности
- В. После 2-х лет работы по специальности
- Г. После 3 лет работы по специальности
- Д. После 5 лет работы по специальности

Отличительными признаками профессионального делирия являются все перечисленные, исключая

- А. Скудность, немногочисленность зрительных галлюцинаций
- Б. Двигательное возбуждение
- В. Оглушенность
- Г. Сохранение воспоминаний после выхода из психоза
- Д. Ложные узнавания

Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля это:

- А. Комплекс медицинских мер, направленных на предупреждение вредных последствий употребления ПАВ
- Б. Система медицинских мер, направленных на предупреждение заболеваний, охрану здоровья населения
- В. Система мер, направленных на выявление групп лиц повышенного риска и применение лечебных и корригирующих мероприятий
- Г. Система мер воздействия на причины и условия развития заболеваний или на повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам
- Д. Система мер, направленных на сдерживание прогрессивности и предупреждение рецидивов

Аддиктивное поведение является одной из форм:

- А. Нормативного поведения
- Б. Отклоняющегося поведения
- В. Агрессивного поведения
- Г. Ассертивного поведения
- Д. Пассивного поведения

В каком году советское правительство сделало попытку восстановить «сухой закон» в стране:

- А. 1917 год
- Б. 1919год
- В. 1921 год
- Г. 1923 год
- Д. 1925год

Основной особенностью парциальной (локализованной) формы патологического влечения к ПАВ является:

- А. Преобладание в эмоциональной сфере тревоги, лабильности настроения
- Б. Осознание наличия тяги к ПАВ
- В. Сходство с навязчивым состоянием
- Г. Напряженность и утомительная борьба за сохранение трезвости
- Д. Противопоставление влечения личности больного

К основным критериям, определяющим состояние простого алкогольного опьянения, относятся

- А. Изменения в эмоциональной сфере
- Б. Функциональные изменения моторики
- В. Изменения ассоциативного процесса и характера восприятия окружающего
- Г. Верно все
- Д. Верно А и В

При терапии алкогольных делириев с особой осторожностью следует назначать:

- А. Полиионные растворы
- Б. Крово- и плазмозаменители
- В. Транквилизаторы
- Г. Нейролептики
- Д. Ноотропы

При актуализации ситуационно-обусловленного первичного патологического влечения к алкоголю у больных появляются все перечисленные признаки, исключая

- А. Повышенную двигательную активность, суетливость
- Б. Отчетливое желание выпить
- В. Расширение контактов с окружающими
- Г. Сновидения с алкогольной тематикой
- Д. Беспочинную раздражительность

Средство, сенсibiliзирующей к алкоголю терапии:

- А. Тетурам
- Б. Эметин
- В. Темпозил
- Г. экстракт баранца
- Д. экстракт чабреца

Амбулаторные реабилитационные программы противопоказаны:

- А. Для пациентов из малоимущих семей
- Б. Для социально декомпенсированных пациентов
- В. Для пациентов с пониженной свертываемостью крови
- Г. Для пациентов молодого возраста
- Д. Для холостых пациентов

Понятие «перекрестная толерантность» у больных алкоголизмом это:

- А. Способность переносить высокие дозы транквилизаторов
- Б. Способность переносить высокие дозы производных барбитуровой кислоты.
- В. Способность переносить высокие дозы антигистаминных препаратов
- Г. Способность переносить высокие дозы нейролептиков

Состояние острой алкогольной интоксикации (простое алкогольное опьянение), сопровождается изменениями

- А. В эмоционально-волевой сфере
- Б. Поведенческой
- В. Неврологической
- Г. Вегетативной
- Д. Все перечисленное верно

К патогенетическим факторам формирования алкоголизма относят

- А. Нарушение обмена катехоламинов и серотонина
- Б. Изменение функций эндогенной опиоидной системы
- В. Преморбидную структуру характера индивида
- Г. Верно все
- Д. Верно А и В

Мотивированием к отказу от употребления ПАВ и участию в программе реабилитации занимаются :

- А. Врач-психиатр-нарколог и врач-психотерапевт
- Б. Врач-психотерапевт и психолог
- В. Все специалисты МДК
- Г. Психологи и специалисты по социальной работе

Алкоголизм, развившийся в позднем возрасте, характеризуется

- А. Замедленным течением с ограничением клинической картины симптомами преимущественно 1 стадии
- Б. Ускоренным течением с ранним появлением специфических алкогольных изменений
- В. Течением, мало отличающимся от популяционного
- Г. Верно А и В
- Д. Верно все

К основам функционирования терапевтических сообществ относится

- А. Иерархичность
- Б. Структурирование времени
- В. Нормы и правила
- Г. Электротранквилизация
- Д. Двойной диагноз

В случае отказа испытуемого от выполнения тех или иных инструкций или лабораторного обследования, необходимо

- А. Убедить его в целесообразности обследования или провести его с принуждением
- Б. Заполнить все пункты протокола медицинского освидетельствования, сделав соответствующую пометку об отказе
- В. Госпитализировать испытуемого для проведения соответствующего обследования
- Г. Отказать в проведении экспертизы
- Д. Возможно любое решение

Диагноз зависимости от ПАВ (наркомании) ставится только, если есть

- А. Медицинский, социальный и юридический критерии
- Б. Факт употребления ПАВ
- В. Клинические признаки болезни
- Г. Рубцовые изменения тканей в местах инъекций
- Д. Поражения внутренних органов

К основам функционирования терапевтических сообществ относится

- А. Иерархичность
- Б. Структурирование времени
- В. Нормы и правила
- Г. Электротранквилизация
- Д. Двойной диагноз
- Е. Верно А, Б, В.

Особенно велик риск развития алкоголизма у женщин при следующих преморбидных особенностях характера

- А. Неустойчивости
- Б. Аффективной лабильности, склонности к пониженному настроению
- В. Возбудимости
- Г. Истеричности
- Д. Шизоидности

Среди социальных факторов, влияющих на формирование алкоголизма, наиболее значимыми являются:

- А. Алкогольная политика государства
- Б. Социальное положение индивидуума и его экономическая обеспеченность
- В. Устойчивые обычаи ближайшего окружения
- Г. Семейное положение
- Д. Верно А и В

Признаками патологических форм нарушения поведения у подростков являются все перечисленные, исключая

- А. Проявления нарушений поведения и за пределами микросоциальной среды
- Б. Стереотипный характер нарушений поведения
- В. Полиморфизм девиантного поведения у одного и того же лица
- Г. Преходящие характерологические ситуационные реакции
- Д. Присоединение к особенностям поведения невротических расстройств

Клиническая картина состояния острой алкогольной интоксикации у подростков проявляется

- А. Двигательной активностью, расторможенностью и дурашливостью
- Б. Отставленным оглушением разной степени выраженности
- В. Дисфоричностью и агрессивностью
- Г. Истерическими чертами (демонстративностью)
- Д. Всем перечисленным

Объектом профилактики в наркологии являются

- А. Больные люди, страдающие зависимостью от ПАВ
- Б. Подростки из неблагополучных семей
- В. Подростки, замеченные в употреблении ПАВ
- Г. Все контингенты населения
- Д. Школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ

Аттестация врача психиатра-нарколога на присвоение высшей квалификационной категории проводится при стаже работы по специальности не менее:

- А. 3 лет
- Б. 5 лет
- В. 7 лет
- Г. 10 лет

При актуализации патологического влечения к алкоголю, возникающего на фоне «пограничных состояний», характерно все, исключая

- А. Тоскливость, угнетенность
- Б. Пессимизм, неверие в свои силы
- В. Ощущение посасывания в желудке, вкус алкоголя во рту
- Г. Неприятные ощущения в виде нестойких мигрирующих болей
- Д. Мало мотивированное ожидание беды, неприятностей

Ведущим патогенетическим механизмом формирования зависимости от алкоголя и других ПАВ является:

- А. Врожденная недостаточность системы эндогенный этанол-ацетальдегид
- Б. Дегенерация системы эндогенного синтеза ацетальдегида и этанола
- В. Нарушение обмена катехоламинов
- Г. Нарушение обмена серотонина
- Д. Нарушение обмена гистамина

Последствиями злоупотребления галлюциногенами являются все перечисленные, кроме

- А. Агрессивности
- Б. Суицидов
- В. Лейкемии
- Г. Хромосомных нарушений
- Д. Острых депрессивных реакций

Наркомания – это хроническое заболевание, характеризующееся развитием

- А. Зависимости от препаратов или средств, официально отнесенных к списку наркотических
- Б. Зависимости от препаратов или средств, способных вызывать зависимость
- В. Психофизической зависимости и медико-социальных последствий
- Г. Специфических поражений внутренних органов
- Д. Верно все

Интерпретативный бред (бред толкования) характеризуется всем перечисленным, кроме

- А. Нарушения абстрактного познания действительности
- Б. Построения системы бреда на цепи доказательств, обнаруживающих субъективную логику
- В. Крайне одностороннего трактования фактов доказательств и игнорирования фактов, противоречащих излагаемой концепции
- Г. Нарушения чувственного познания окружающего мира
- Д. Непрерывной внутренней работы над содержанием бреда

Индивидуально-психологические факторы риска формирования аддиктивных расстройств

- А. Отсутствие нормативных установок
- Б. Органические поражения головного мозга
- В. Низкий самоконтроль
- Г. Хронические соматические заболевания
- Д. Наличие в ближайшем окружении лиц, употребляющих ПАВ или лиц, с девиантным поведением

Одним из симптомов синдрома профессионального выгорания является:

- А. Симптом потери контроля
- Б. Симптом юношеского максимализма
- В. Завышенная самооценка
- Г. Симптом «расширения сферы экономии эмоций»
- Д. Симптом морально-этического снижения

По классификации, предложенной

Г.Е. Сухаревой, выделяют олигофрении

- А. Эндогенной природы
- Б. Обусловленные эмбрио- и фетопатией
- В. Связанные с вредностями интернатального и раннего Постнатального периода
- Г. Верно А и Б
- Д. Верно все перечисленное

Для интеллектуально-мнестических расстройств, развивающихся у подростков страдающих алкоголизмом, характерно все, кроме

- А. Утраты способности осмысления несложных текстов, простых ситуаций и т.д.
- Б. Фиксационной амнезии
- В. Пассивности, незаинтересованности в решении каких-либо задач
- Г. Отвращения к интеллектуальному труду
- Д. Скудости словарного запаса

Лечение артериальной гипотонии, обусловленное сердечной недостаточностью, проводится:

- А. Вазопрессорами
- Б. Кардиотониками
- В. Изотоническими растворами
- Г. Гипертоническими растворами
- Д. Аналептиками

Приоритетным в работе реабилитационного подразделения является создание:

- А. Очереди на прием
- Б. Атмосферы взаимного наблюдения
- В. Терапевтического сообщества
- Г. Отрицательного отношения к наркоманам
- Д. Общества терапевтов

Алкогольная зависимость заметно отличается от других видов химической зависимости наличием:

- А. Влечения к алкоголю в опьянении
- Б. Влечением к алкоголю в похмелье
- В. Утраты количественного контроля
- Г. Симптомов поражения внутренних органов
- Д. Психоорганического синдрома

С ростом алкоголизма резко увеличивается все перечисленное, кроме

- А. Преступности
- Б. Деторождаемости
- В. Автодорожного травматизма
- Г. Производственного травматизма
- Д. Общей смертности населения

Противоречия между возможностями личности и завышенными требованиями к себе приводят к возникновению

- А. Истерических расстройств
- Б. Ипохондрических расстройств
- В. Депрессивных расстройств
- Г. Неврастенических расстройств
- Д. Невроза навязчивых состояний

При злоупотреблении алкоголем возможны следующие поражения органов дыхания

- А. Трахеобронхит
- Б. Бронхоэктазы
- В. Пневмосклероз
- Г. Эмфизема легких
- Д. Все перечисленное

Какой основной механизм психологической защиты зависимых от ПАВ и созависимых лиц:

- А. Проекция
- Б. Агрессия
- В. Рационализация
- Г. Деваляция
- Д. Отрицание

Наиболее общие свойства патологического влечения к алкоголю включают все перечисленное, кроме

- А. Изменения суждений больного
- Б. Направленности интересов, приобретающих мировоззренческий характер
- В. Доминирующего характера поведения
- Г. Формирования жизненных позиций под влиянием алкоголя
- Д. Постоянной аффективной заряженности и напряженности

Установите правильную последовательность: Методики лечебного воздействия в едином сеансе групповой психотерапии по

В.М. Бехтереву:

- А. Внушение
- Б. Самовнушение
- В. Убеждение

При развитии алкогольной комы характерно:

- А. Нарушение сознания
- Б. Понижение температуры тела и появление цианоза
- В. Резкое снижение мышечного тонуса
- Г. Двигательное возбуждение

Для острого алкогольного гепатита характерно все перечисленное, исключая

- А. Диспептические расстройства
- Б. Резкое увеличение печени
- В. Боли в правом подреберье
- Г. Повышение активности ГГТ, АСТ, АЛТ
- Д. Гипергликемию

Буквальный перевод термина «аддикт» означает

- А. Алкоголик
- Б. Наркоман
- В. Токсикоман
- Г. Игрок
- Д. Трудоголик

Санитарно-гигиеническая работа по профилактике табакокурения должна быть адресована к:

- А. Детям и подросткам
- Б. Лицам, пробующим табак
- В. Недавно курящим
- Г. Родителям потенциальных курящих
- Д. Всем контингентам населения

Основным психическим нарушением в продромальном периоде алкогольной энцефалопатии является

- А. Депрессия
- Б. Астения
- В. Деперсонализация
- Г. Обсессии
- Д. Дисморфофобии

К простым вариантам депрессивного синдрома относятся все перечисленные, кроме

- А. Анестетической депрессии
- Б. Тревожной депрессии
- В. Ступорозной депрессии
- Г. Депрессии с бредом осуждения
- Д. Депрессии с идеями самообвинения

Меры профилактики алкоголизма у подростков включают

- А. Правильное воспитание, отрезвление общества
- Б. Повышение культуры населения
- В. Раннее выявление и лечение
- Г. Немедленную госпитализацию при возникновении рецидива
- Д. Все перечисленное

Автор методики коллективной эмоционально-стрессовой гипнотерапии:

- А. В.М. Бехтерев
- Б. И.М. Виш
- В. С.С. Либих
- Г. В.Е. Рожнов
- Д. А.Р. Довженко

Алкоголизм – это хроническое заболевание, характеризующееся:

- А. Развитием зависимости от спиртных напитков
- Б. Прогредиентным течением
- В. Формированием абстинентного синдрома
- Г. Развитием стойких Соматоневрологических расстройств и психической деградации
- Д. Всем перечисленным

Клинически пароксизмальный вариант первичного патологического влечения к алкоголю проявляется:

- А. Внезапностью
- Б. Крайней интенсивностью влечения к алкоголю
- В. Приступообразностью
- Г. Редукцией идеаторного компонента влечения к алкоголю

Характеристики аддиктивной личности:

- А. Безответственность и необязательность
- Б. Отсутствие сопереживания и сочувствия
- В. Уход от эмоциональных контактов и любых переживаний
- Г. Стремление к поверхностным отношениям и связям
- Д. Низкая фрустрационная толерантность
- Е. Все перечисленное верно

Состояние психического комфорта в интоксикации наркотиком – это:

- А. Синоним эйфории
- Б. Восстановление психических функций
- В. Состояние оптимального психического функционирования наркомана
- Г. Условие благополучного психического состояния у наркомана

Основой для заключения о состоянии опьянения водителя является:

- А. Результаты комплексного медицинского освидетельствования
- Б. Наличие запаха алкоголя изо рта
- В. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определенное алкотестором
- Г. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,3% и более
- Д. Признание водителя в приеме алкоголя

В процессе реабилитации редко используется:

- А. Рациональная психотерапия
- Б. Поведенческая психотерапия
- В. Суггестивная психотерапия
- Г. Психическая саморегуляция
- Д. Групповая терапия

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя не допускается:

- А. в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю
- Б. в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной власти контроля за исполнением лицами, признанными больными наркоманией либо потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, возложенной на них при назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение от наркомании, диагностику, профилактические мероприятия и (или) медицинскую реабилитацию
- В. в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба
- Г. при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных
- Д. по запросу органов опеки и попечительства в целях подтверждения наличия или отсутствия заболеваний, представляющих опасность для окружающих, у лиц, с которыми гражданин, выразивший желание стать усыновителем, опекуном, попечителем или приемным родителем, совместно проживает в жилом помещении.

Семьи подростков, больных алкоголизмом отличаются всем перечисленным, кроме

- А. Отсутствия одного из родителей
- Б. Конфликтно-нестабильных отношений
- В. Бедности и многодетности
- Г. Нарушения межличностных отношений, отсутствия поддержки
- Д. Соматической отягощенности

Интервизия – это:

- А. Регулярные собрания специалистов МДК
- Б. «Взаимное видение», способ взаимообучения специалистов МДК
- В. Наблюдение специалистов МДК друг за другом
- Г. Приглашение в МДК специалиста из другой организации с целью выявления ошибок в работе
- Д. Подведение итогов работы членами МДК за определенный период времени.

Соматические нарушения при алкоголизме характеризуются особенностями

- А. Системностью поражения
- Б. Формированием специфических «алкогольных» признаков поражения внутренних органов
- В. Возможностью полной редукции соматических нарушений при условии длительной ремиссии
- Г. Формированием синдромов сочетанного поражения нескольких органов
- Д. Всем перечисленным

Особенность реабилитации несовершеннолетних, зависимых от ПАВ, заключается в:

- А. Более суровых правилах реабилитационных программ
- Б. Приоритете религиозных воздействий
- В. Систематизации наказаний
- Г. Приоритете педагогических воздействий
- Д. Свободном самоопределении

Изначальная толерантность к алкоголю обусловлена:

- А. Крепостью и качеством алкоголя
- Б. Культурально-этническими факторами
- В. Поло-возрастным фактором
- Г. Активностью фермента алкогольдегидрогеназы (АДГ)
- Д. Активностью фермента альдегиддегидрогеназы (АльдГ)

Наиболее значимым критерием при определении степени прогрессивности алкоголизма является

- А. Возраст начала злоупотребления алкоголем и вид употребляемых спиртных напитков
- Б. Пол индивидуума
- В. Преморбидные личностные особенности
- Г. Наличие в анамнезе черепно-мозговых травм
- Д. Перенесенные в прошлом или сопутствующие соматические заболевания

Для клиники алкоголизма у лиц пожилого возраста характерно все перечисленное, кроме

- А. Снижения интенсивности влечения и толерантности к алкоголю
- Б. Укорочения и урежения запоев
- В. Преобладания соматических расстройств в структуре похмельного синдрома
- Г. Преобладания в опьянении эксплозивности
- Д. Затяжного характера абстинентного синдрома

Острые и хронические психозы в III стадии алкоголизма характеризуются

- А. Приступообразным и затяжным течением
- Б. Развитием на фоне алкогольной энцефалопатии
- В. Трансформацией клинической картины
- Г. Преобладанием в клинической картине вербального галлюциноза или систематизированного бреда
- Д. Всем перечисленным

Критерии характеристики созависимой личности

- А. Низкий самоконтроль
- Б. Желание контролировать жизнь других
- В. Желание заботиться о других, спасать их
- Г. Искажение эмоций и чувств
- Д. Склонность к отрицанию

Объектом санитарно-гигиенического антиалкогольного просвещения являются:

- А. Школьники, студенты, учащиеся техникумов, ПТУ
- Б. Педагоги, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений
- В. Работники юстиции, прокуратуры, милиции, торговли
- Г. Пьющие граждане
- Д. Все граждане

Юридическим документом, регламентирующим использование лекарственных средств в клинической практике является:

- А. Инструкция по применению лекарственного средства
- Б. Руководство (справочник) по применению лекарственных средств
- В. Методические рекомендации
- Г. Памятка по применению лекарственных средств
- Д. Справочник по применению лекарственных средств

Форма пищевой аддикции:

- А. Избирательность
- Б. Переедание
- В. Требовательность
- Г. Контроль
- Д. Пренебрежение

При лечении острой токсической энцефалопатии препаратами выбора являются

- А. Витамины группы «В»
- Б. Ноотропы
- В. Психотропные препараты
- Г. Препараты фосфора
- Д. Все возможно

Глубокая алкогольная кома характеризуется отсутствием специфических признаков и клинически проявляется:

- А. Невозможностью речевого контакта
- Б. Угнетением зрачковых и корнеальных рефлексов
- В. Угнетением мышечной и болевой чувствительности
- Г. Снижением АД и появлением синусовой брадикардии
- Д. Все перечисленное верно

Как называется наука о трезвости

- А. Наркология
- Б. Теология
- В. Этимология
- Г. Собриология
- Д. Петрология

При сформировавшейся зависимости форма употребления алкоголя проявляется всем перечисленным, исключая

- А. Псевдозапой
- Б. Постоянное пьянство (с высокой и низкой толерантностью)
- В. Частые однократные абзусы
- Г. Перемежающееся пьянство
- Д. Все перечисленное

Заболеваемость населения определяют как показатель, отражающий:

- А. Общее число обратившихся за медицинской помощью в данном году
- Б. Общее число посещений мед. учреждений в данном году
- В. Общее количество больных с данным конкретным заболеванием, стоящих на учете
- Г. Совокупность вновь возникших в данном году заболеваний
- Д. Вероятность возникновения заболевания в определенном регионе

Для коматозного опьянения характерно все перечисленное, кроме

- А. Нарушения сознания
- Б. Сохранения зрачковых и корнеальных рефлексов
- В. Понижения температуры тела
- Г. Резкого снижения мышечного тонуса
- Д. Урежения и ослабления дыхания

Для синдрома психической зависимости при алкоголизме у подростков характерно все, исключая

- А. Формирование на этапе систематического пьянства
- Б. Отсутствие «борьбы мотивов»
- В. Полную некритичность к изменяющемуся состоянию
- Г. Выраженность идеаторного компонента влечения
- Д. Актуализацию влечения к алкоголю внешней средой

Наиболее отличительной особенностью алкоголизма у женщин является:

- А. Злокачественность течения.
- Б. Раннее появление психотических форм заболевания
- В. Низкая курабельность
- Г. Аффективная окрашенность клинической симптоматики
- Д. раннее появление и быстро нарастающая социальная дезадаптация

При острой интоксикации смерть наиболее вероятно наступает при концентрации алкоголя в крови:

- А. 200 – 300 мг%
- Б. 300 – 400 мг%
- В. 400 – 500 мг%
- Г. 500 – 600 мг%
- Д. 600 – 700 мг%

В стандарт оснащения отделения неотложной наркологической помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 929н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "наркология", не входит:

- А. аппарат для искусственной вентиляции легких
- Б. централизованная система подводки кислорода к каждой кровати или концентраторы кислорода
- В. дефибриллятор кардиосинхронизированный
- Г. автоматические дозаторы лекарственных средств шприцевые
- Д. анализатор наркотических и сильнодействующих лекарственных средств

Анамнестические сведения собирают, соблюдая принцип получения данных:

- А. От настоящего к прошлому
- Б. О настоящем состоянии больного
- В. О родственниках больного
- Г. От прошлого к настоящему
- Д. Не только о болезни, но и о жизни больного

Употребление алкоголя подростками характеризуется

- А. Отсутствием какой-либо определенной формы
- Б. Однодневными алкогольными эксцессами
- В. Короткими (2-3 дня) запоями
- Г. Непрерывным длительным употреблением алкоголя
- Д. Всем перечисленным

К внешним характерным признакам алкогольного синдрома плода относятся все перечисленные, кроме

- А. Уменьшения окружности головы
- Б. Широкой уплотненной переносицы, короткого носа
- В. «Заячьей» губы
- Г. Узких глазных щелей
- Д. Длинной верхней губы

Деонтология – наука о долге врача и среднего медицинского персонала, который состоит в том, чтобы:

- А. Обеспечить наилучшее лечение
- Б. Создать благоприятную обстановку для выздоровления больного
- В. Установить доверительные отношения: больной-врач, врач-больной
- Г. Установить профессиональные отношения: врач-медперсонал, врач- другой врач
- Д. Создать в медицинском учреждении комфортные для больного бытовые условия

Диагностическими критериями синдрома помрачения сознания являются все перечисленные, исключая

- А. Нарушения отражения реального мира
- Б. Отрешенность от окружающего мира
- В. Дезориентировку во времени, месте и окружающих лицах
- Г. Сохранение воспоминаний о перенесенном состоянии
- Д. Нарушения мышления

Понятие, характеризующее начало развития аддиктивного поведения:

- А. Употребление
- Б. Влечение
- В. Фиксация
- Г. Зависимость
- Д. Абстиненция

Использование медикаментозной терапии в процессе реабилитации лиц с зависимостью от психоактивных веществ:

- А. Категорически запрещено
- Б. Является приоритетным
- В. Осуществляется на завершающих этапах программы
- Г. Осуществляется по показаниям
- Д. Осуществляется в порядке самопомощи и взаимопомощи

В соответствии со «Стандартами лечения» длительность лечения острой алкогольной интоксикации тяжелой степени определена:

- А. Не более 5 дней
- Б. 4 дня
- В. 3 дня
- Г. 2 дня
- Д. 1 ДЕНЬ

В протоколе медицинского освидетельствования граждан не используется формулировка:

- А. Трезв, признаков потребления алкоголя нет
- Б. Установлен факт употребления алкоголя, признаков опьянения не выявлено
- В. Алкогольное опьянение
- Г. Алкогольной опьянение легкой, средней или тяжелой степени
- Д. Трезв, имеются нарушения функционального состояния требующие отстранения от работы с источником повышенной опасности по состоянию здоровья

Признаками быстро наступившей смерти при острой интоксикации алкоголем являются

- А. Жидкое состояние крови
- Б. Интерстициальный фиброз
- В. Застойное полноокровие внутренних органов
- Г. Множественные очаги выпадения нервных клеток
- Д. Очаги клеточного опустошения

Создание оптимальных взаимоотношений в системе врач-больной-семья позволяет:

- А. Прогнозировать стабильную терапевтическую ремиссию
- Б. Осуществлять проведение реабилитационных программ
- В. Проводить семейную психотерапию
- Г. Избежать формирования созависимости
- Д. Все перечисленное

В клинической картине классического варианта острого алкогольного (металкогольного) психоза глазодвигательные расстройства характерны:

- А. Алкогольному параноиду.
- Б. Алкогольному галлюцинозу
- В. Алкогольному делирию
- Г. Энцефалопатии типа Гайе-Вернике.
- Д. Алкогольной депрессии

Показанием к проведению условно-рефлекторной терапии является:

- А. Наличие рвотного рефлекса
- Б. Установка больного именно на этот вид лечения
- В. Внушаемость больного
- Г. Неэффективность других методов лечения
- Д. первая попытка лечения

Состояние отмены при героиновой наркомании характеризуется

- А. Лавинообразным нарастанием симптомов
- Б. Алгическими и диспептическими расстройствами
- В. Профузным потом, «леденящим» ознобом, слезотечением, светобоязнью
- Г. Подавленным настроением с тревогой, приступами отчаяния
- Д. Быстрой, практически, критической редукцией симптомов

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения водителя могут осуществлять:

- А. Сотрудники ГИБДД
- Б. Врачи-наркологи, прошедшие специальную подготовку
- В. Руководители автопредприятий, отвечающие за эксплуатацию транспортных средств;
- Г. Любой медработник Гос.мед. учреждения
- Д. Участковый врач

Поводом для отказа в медицинском освидетельствовании на опьянение может служить

- А. Отказ освидетельствуемого от выполнения инструкций
- Б. Отсутствие бланков протоколов
- В. Отсутствие реактивов или приборов для лабораторной диагностики
- Г. Личное обращение без документа, удостоверяющего личность
- Д. Отсутствие сопровождающего

Преобладание одиночного пьянства у женщин, страдающих алкоголизмом, вероятнее всего объясняется

- А. Интенсивностью первичного патологического влечения
- Б. Стремлением скрыть пьянство
- В. Особенностью преморбидного характерологического склада
- Г. Особенностью клинических проявлений (измененностью) состояния опьянения
- Д. Всем перечисленным

Фактор наследственной отягощенности обуславливает:

- А. Клинические особенности заболевания
- Б. Степень прогрессивности
- В. Преморбидные характерологические черты
- Г. Возраст начала заболевания
- Д. Все перечисленное

Среди социальных факторов, влияющих на формирование алкоголизма, наиболее значимыми являются:

- А. Алкогольная политика государства
- Б. Социальное положение индивидуума и его экономическая Обеспеченность
- В. Устойчивые обычаи ближайшего окружения
- Г. Семейное положение

Аттестация врача психиатра-нарколога на присвоение 1-ой квалификационной категории проводится при стаже работы по специальности не менее

- А. 2 ЛЕТ
- Б. 3 лет
- В. 5 лет
- Г. 7 лет
- Д. 10 лет

Начальным регистрам позитивных нарушений относятся все перечисленные, исключая

- А. Эмоционально-гиперстетические, астенические
- Б. Аффективные
- В. Невротические
- Г. Паранойяльные
- Д. Дисгармонию личности

Наиболее характерным для патологического влечения к алкоголю у женщин является

- А. Пассивное непротивление
- Б. Редуцированность идеаторного компонента
- В. Преобладание аффективного компонента
- Г. Пароксизмальность возникновения
- Д. Все перечисленное

Понятие «патологическое влечение к алкоголю» соответствует

- А. Активному стремлению больных алкоголизмом к употреблению спиртного вне интоксикации
- Б. Неспособности прекратить употребление спиртного в пределах алкогольного эксцесса, независимо от изначально выпитой дозы и ситуации
- В. Неодолимому стремлению продолжить выпивку после определенной дозы
- Г. Стремлению к употреблению алкоголя на фоне физических, неврологических или психических расстройств после абзуса
- Д. Всему перечисленному

Внутренняя картина болезни включает в себя:

- А. объективные знания больного о своей болезни, а также субъективно переживаемые болезненные и тягостные ощущения
- Б. результаты биохимического исследования
- В. симптомы, выявляемые у больного
- Г. данные рентгенологического исследования
- Д. клинику внутренних болезней

Существующие общества трезвости являются:

- А. Самостоятельным госучреждением
- Б. Общественной организацией
- В. Подразделениями дневного стационара
- Г. Структурными подразделениями наркологических диспансеров
- Д. Структурным подразделением реабилитационных центров

К основным задачам, решаемым в процессе групповой дискуссионной психотерапии относятся:

- А. Отработка элементов коммуникации
- Б. Тренировка нарушенных функций
- В. Переоценка иерархии значимых ценностей
- Г. Овладение навыками психической саморегуляции
- Д. Экзистенциальный анализ
- Е. Верно А, Б, В.

Форма эмоционального стресса

- А. импульсивная
- Б. тормозная
- В. интерактивная
- Г. сверхценная
- Д. генерализованная

Клинико-экспертная комиссия наркодиспансеров решает задачи:

- А. Определение противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности;
- Б. Направление наркологических больных на медико-социальную экспертизу
- В. Принятие экспертного решения в сложных, конфликтных случаях
- Г. Экспертизы алкогольного или наркотического опьянения

Особенности клиники симптоматического алкоголизма зависят от:

- А. Клинических проявлений сочетающегося с ним психического заболевания
- Б. Первичности того или другого из двух заболеваний
- В. Характерологических особенностей больного
- Г. Верно А, Б и В
- Д. Верно А, Б

При развитии алкогольной комы характерно:

- А. Нарушение сознания
- Б. Понижение температуры тела и появление цианоза
- В. Резкое снижение мышечного тонуса
- Г. Двигательное возбуждение
- Д. Верно А, Б, В.

Изменения психики у подростков, злоупотребляющих алкоголем, проявляются всем перечисленным, за исключением

- А. Олигофреноподобного дефекта
- Б. Сглаживания черт акцентуации
- В. Задержки психического развития
- Г. Опустошенности личности
- Д. Хронической эйфорической установки

Индивидуально-психологические факторы риска формирования аддиктивных расстройств

- А. Отсутствие нормативных установок
- Б. Органические поражения головного мозга
- В. Низкий самоконтроль
- Г. Хронические соматические заболевания
- Д. Наличие в ближайшем окружении лиц, употребляющих ПАВ или лиц, с девиантным поведением
- Е. Верно А и В.

Для формирования нормативных личностных статусов необходимо:

- А. Взаимодействие со значимыми другими лицами, приобретение опыта взаимного удовлетворения потребностей человека и его конкретного ЗДЛ
- Б. Наличие полной родительской семьи.
- В. Наличие позитивного жизненного сценария
- Г. Отсутствие психотравмирующих ситуаций в анальной фазе психосексуального развития.
- Д. Наличие материального благополучия в семье

К кататимному бреду относят бред

- А. Преследования
- Б. Воздействия
- В. Отравления
- Г. Самообвинения, виновности
- Д. Интерметаморфозы

Количество участников психотерапевтической малой группы:

- А. не более 5 человек
- Б. 2 – 9 человек
- В. 10 - 12 человек
- Г. 10 – 20 человек
- Д. 15 – 25 человек

В задачу подросткового наркологического кабинета входит:

- А. Выявление и диспансерный учет подростков, больных алкоголизмом и наркоманией
- Б. Выявление и профилактический учет подростков, склонных к злоупотреблению алкоголем, но не больных алкоголизмом
- В. Выявление и профилактический учет подростков из групп высокого риска
- Г. Проведение экспертизы алкогольного опьянения
- Д. Все перечисленное

Распитие спиртных напитков в общественных местах влечет за собой:

- А. Общественное порицание, сообщение по месту работы, учебы или жительства
- Б. Постановку на диспансерное наблюдение с регулярной явкой в течение 1 года
- В. Административную ответственность
- Г. Уголовную ответственность
- Д. Помещение в медвытрезвитель

Общее усовершенствование врачей психиатров-наркологов проводится не реже 1 раза в:

- А. 2 года
- Б. 3 лет
- В. 5 лет
- Г. 7 лет

Пубертатный период и инволюция – возраст, когда часто манифестируют:

- А. Эндогенные психические заболевания
- Б. Аффективные расстройства
- В. Токсикомании
- Г. Верно все
- Д. Верно А и В

Наиболее верное определение симптома утраты количественного контроля у больного алкоголизмом соответствует

- А. Неодолимому стремлению продолжить выпивку после определенной «критической» для каждого конкретного больного дозы
- Б. Невозможности прекратить употребление алкоголя в связи с этическими или социальными моментами
- В. Активному стремлению к продолжению употребления алкоголя вне данного алкогольного эксцесса
- Г. Неодолимому стремлению к употреблению алкоголя после абзуса на фоне различного рода физических и психических расстройств
- Д. Верно все

Предпочтительный стиль общения в терапевтическом сообществе:

- А. Авторитарный
- Б. Тоталитарный
- В. Патерналистский
- Г. Демократический
- Д. Директивный

Ассертивное поведение

- А. позволяет добиться цели любой ценой
- Б. присуще большинству пациентов до развития болезни
- В. учитывает интересы всех участников взаимодействия
- Г. даёт возможность управлять другими людьми
- Д. свойственно, преимущественно, представителям власти

К основным задачам, решаемым в процессе групповой дискуссионной Психотерапии относятся

- А. Отработка элементов коммуникации
- Б. Тренировка нарушенных функций
- В. Переоценка иерархии значимых ценностей
- Г. Овладение навыками психической саморегуляции
- Д. Экзистенциальный анализ

Малый истерический припадок характеризуется состоянием, при котором наблюдаются:

- А. Тонические и клонические судороги
- Б. Внезапная потеря сознания
- В. Массивная тоническая судорога с изгибанием тела в дугу
- Г. Приступы рыдания, хохота
- Д. Секундная потеря сознания с судорожными подергиваниями отдельных групп мышц

Наиболее характерной чертой абстинентного состояния в клинике алкоголизма у подростков является

- А. Малая длительность
- Б. Отсутствие тремора, малая выраженность соматовегетативных расстройств
- В. Сходство с состоянием постинтоксикации у взрослых
- Г. Преобладание пониженного настроения с раздражительностью
- Д. Все перечисленное

В скольких личностных статусах одновременно может пребывать человек?

- А. В шести.
- Б. В четырех
- В. В двух комплементарных
- Г. В одном
- Д. В трех

Для характеристики алкогольной невропатии можно отнести все перечисленное, за исключением

- А. Парестезий
- Б. Снижения болевой и температурной чувствительности
- В. Наличия трофических язв
- Г. Утраты ахилловых и повышения коленных рефлексов
- Д. Болей по ходу периферических нервов

Санитарно-просветительская работа является направлением:

- А. Педагогического воспитания
- Б. Социального воспитания
- В. Правового воспитания
- Г. Патриотического воспитания
- Д. Гигиенического воспитания

В клинической картине классического варианта острого алкогольного (металкогольного) психоза истинные зрительные галлюцинации доминируют при:

- А. Алкогольном галлюцинозе
- Б. Алкогольной депрессии
- В. Алкогольном делирии
- Г. Алкогольном параноиде

Нейролептическая желтуха обусловлена

- А. Повреждающим действием препаратов на клетки печени
- Б. Стимуляцией продукции билирубина
- В. Гемолизом эритроцитов
- Г. Токсико-аллергическим эффектом
- Д. Повреждающим действием препаратов на стенки желчных протоков

«Дома на полпути» необходимы:

- А. Для постепенной реинтеграции и ресоциализации пациентов
- Б. Для изоляции пациентов от родственников
- В. Для проживания малоимущих пациентов
- Г. Для контроля над пациентами
- Д. Для получения прибыли

Среди психологических предпосылок алкоголизма первостепенное значение имеют такие личностные особенности индивида, как

- А. Способность адаптироваться к окружающей обстановке и разрешать конфликты, умение противостоять стрессовым воздействиям
- Б. Астеничность
- В. Стеничность
- Г. Повышенная тревожность
- Д. Неустойчивость, подверженность внешним влияниям

При лечении алкоголизма у лиц, страдающих язвенной болезнью желудка нежелательно пользоваться:

- А. витаминами группы Б
- Б. витаминами Е, Р
- В. метронидазолом
- Г. условно-рефлекторной терапией
- Д. тетурамом

Кто ввёл в употребление в России термин «аддикция»:

- А. Иванец Н.Н.
- Б. Москаленко В.Д.
- В. Карпов А.М.
- Г. Короленко Ц.П.
- Д. Менделевич В.Д.

Что является содержимым каждого личностного статуса?

- А. Оценочные суждения окружающих людей
- Б. Определенные смыслы, ценности, установки и стереотипы восприятия и поведения, характерные для того социокультурального окружения, в котором человек живет
- В. Архетипы
- Г. Комплексы
- Д. Особенности эмоционально-волевого реагирования, приобретенные в процессе воспитания в родительской семье

К работе МДК по третичной профилактике относится :

- А. Работа со СМИ
- Б. Аутрич-работа
- В. Создание реабилитационной среды
- Г. Разработка антинаркотической и антиалкогольной рекламы
- Д. Тестирование школьников на наличие в моче ПАВ

Клинически пароксизмальный вариант первичного патологического влечения к алкоголю проявляется:

- А. Внезапностью
- Б. Крайней интенсивностью влечения к алкоголю
- В. Приступообразностью
- Г. Редукцией идеаторного компонента влечения к алкоголю
- Д. Все перечисленное верно

К факультативным симптомам алкогольного абстинентного синдрома относятся

- А. Тремор, потливость, жажда
- Б. Диспептические расстройства
- В. Чувство разбитости, нарушение сна
- Г. Чувство тревоги
- Д. Влечение к опохмелению

Фитотерапия алкоголизма, наркоманий и токсикоманий предусматривает применение настоев или отваров лекарственных растений, обладающих

- А. Способностью уменьшить выраженность алгического компонента абстинентного синдрома
- Б. Способностью купировать диспептические расстройства в структуре абстиненции
- В. Стимулирующим действием
- Г. Верно А, Б и В
- Д. Верно А, Б

Клиническим критерием попадания в рамках «терапевтического окна» является ориентация на:

- А. Рекомендуемую среднюю терапевтическую дозу
- Б. Быстро наступающие эффекты
- В. Относительно медленно наступающие эффекты
- Г. Отставленные эффекты
- Д. Побочные эффекты

Наиболее характерными последствиями хронической интоксикации гашишом являются все перечисленные, исключая

- А. Высокую частоту рака легких
- Б. Подавление репродуктивной функции
- В. Подавление иммунной системы
- Г. Изменения со стороны крови, развитие анемии
- Д. Грубые соматические нарушения

Принятие решения о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допускается консилиумом врачей:

- А. если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители
- Б. в отношении несовершеннолетних в возрасте младше пятнадцати лет или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте младше шестнадцати лет
- В. в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами
- Г. отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления)
- Д. при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы

Психотерапии в системе психогигиенических мероприятий можно дать следующую оценку:

- А. не используется до установления диагноза
- Б. не входит в систему психогигиенических мероприятий
- В. является частью психогигиенических мероприятий
- Г. полностью исчерпывает систему психогигиенических мероприятий
- Д. применяется в стационарных условиях

Описание психического статуса не должно содержать

- А. Специальных психиатрических терминов
- Б. Анамнестических сведений
- В. Квалификации (оценки) обнаруженных у больного расстройств
- Г. Верно все
- Д. Верно А и Б

К прямому токсическому действию этанола относят:

- А. Мембранотропное действие
- Б. Конfirmaционное действие
- В. Взаимодействие с неэтерифицированными жирными кислотами
- Г. Метаболические расстройства
- Д. Все перечисленное верно

Критерии характеристики созависимой личности

- А. Низкий самоконтроль
- Б. Желание контролировать жизнь других
- В. Желание заботиться о других, спасти их
- Г. Искажение эмоций и чувств
- Д. Склонность к отрицанию
- Е. Все перечисленное верно

Диагноз зависимости от психоактивных веществ (наркомании) ставится только, если есть

- А. Медицинский, социальный, юридический критерии
- Б. Факт употребления психоактивных веществ
- В. Клинические признаки болезни
- Г. Рубцовые изменения тканей в местах инъекций
- Д. Поражение внутренних органов

Самостоятельная наркологическая служба в России была создана:

- А. в 1965 году
- Б. в 1970 году
- В. в 1975 году
- Г. в 1980 году
- Д. в 1985 году

Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе:

- А. заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических исследований)
- Б. получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований)
- В. осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований
- Г. выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия
- Д. все выше перечисленное

Клиника дисфорического варианта измененного простого алкогольного опьянения характеризуется всем перечисленным, кроме

- А. Напряженности, сопровождаемой недовольством, угрюмостью в сочетании с неприязнью и злобой
- Б. Пониженно-тоскливого аффекта
- В. Придирчивости с агрессивностью
- Г. Суицидальных мыслей, нередко сопровождаемых суицидальным поведением
- Д. Ощущения соматического дискомфорта и выраженной гиперестезии

Сексуальные нарушения при алкоголизме проявляются всеми перечисленными расстройствами, кроме

- А. Снижения чувственного компонента оргазма
- Б. Снижения либидо
- В. Преждевременной эякуляции
- Г. Приапизма
- Д. Ослабления эрекции

Аддиктивное поведение выражается в уходе от реальности посредством изменения какого состояния

- А. Преморбидного
- Б. Абстинентного
- В. Соматического
- Г. Неврологического
- Д. Психического

Абстинентный синдром у подростков-олигофренов, страдающих алкоголизмом, проявляется

- А. Кошмарными сновидениями
- Б. Раздражительностью, неприязнью к окружающим
- В. Дисфориями, тревогой
- Г. Фобиями с конкретно-жизненным содержанием
- Д. Всем перечисленным

Наличие палимпсестов в клинике алкоголизма характерно для

- А. I стадии заболевания
- Б. I -II стадии заболевания
- В. II стадии заболевания
- Г. II-III стадии заболевания
- Д. III стадии заболевания

Аналгезирующее действие опиоидного анальгетика Трамадола при внутривенном введении наступает через:

- А. 5-10 минут и длится 2-3 часа
- Б. 10-15 минут и длится 3-4 часа
- В. 15-20 минут и длится 4-5 часов
- Г. 15-30 минут и длится 5-6 часов

Медицинское освидетельствование граждан на употребление ПАВ и состояния опьянения оформляется:

- А. Актом медицинского освидетельствования
- Б. Протоколом освидетельствования на состояние опьянения
- В. Протоколом контроля трезвости
- Г. Протоколом медицинского освидетельствования

Самый высокий риск развития зависимости характерен для транквилизаторов с:

- А. Наличием активных метаболитов
- Б. Коротким периодом полувыведения
- В. Преобладанием седативного эффекта
- Г. Наличием активных метаболитов и коротким периодом полувыведения
- Д. Коротким периодом полувыведения и преобладанием седативного эффекта

Аддикция определяется как:

- А. Пароксизмальные нарушения поведения в рамках здоровья
- Б. Систематическое повторение действий, лишенных целесообразности и реального приспособительного значения, возникающее у дефицитарных личностей, как свидетельство психологической декомпенсации и ведущее к снижению социальной адаптации или дезадаптации.
- В. Помрачение сознания на фоне органических повреждений головного мозга
- Г. Аффективное расстройство в виде смещения страха, злобы и тоски
- Д. Психологическая защита, которая активизируется при попадании в неблагоприятные жизненные условия.

Основным противопоказанием к назначению метронидазола у больных алкоголизмом является:

- А. Язвенная болезнь желудка
- Б. Лейкопения
- В. Бронхиальная астма
- Г. Гипертоническая болезнь II степени
- Д. Депрессия

С интоксикацией алкоголем связано:

- А. Задержка ионов натрия в организме
- Б. Дефицит ионов калия
- В. Дефицит ионов магния
- Г. Нарушения в обмене кальция
- Д. Все перечисленное

К медицинским и социальным последствиям наркоманий и токсикоманий относятся все перечисленные, исключая

- А. Высокую смертность от заболеваний, полученных в результате злоупотребления ПАВ
- Б. Большое число суицидов
- В. Сокращение продолжительности жизни
- Г. Убытки по бюджету здравоохранения
- Д. Большое число преступлений

Систему аддиктологических координат образуют:

- А. Аддиктивный потенциал аддиктивного агента и индивида
- Б. Влечение к аддиктивному агенту
- В. Утрата контроля над использованием аддиктивного агента
- Г. Синдром отмены аддиктивного агента
- Д. Повышение толерантности к аддиктивному агенту

Понятие «перекрестная толерантность» у больных алкоголизмом это:

- А. Способность переносить высокие дозы транквилизаторов
- Б. Способность переносить высокие дозы производных барбитуровой кислоты
- В. Способность переносить высокие дозы антигистаминных препаратов
- Г. Способность переносить высокие дозы наркотических средств
- Д. Все вышеперечисленное

Рвотное вещество, используемое в ходе условнорефлекторной терапии:

- А. Апоморфин
- Б. Тетурам
- В. Кольме
- Г. Фурагин
- Д. Фуразолидон

Сумеречное помрачение сознания по особенностям клинических проявлений подразделяется на все перечисленные формы, кроме

- А. Простой
- Б. Мозаичной
- В. Психотической
- Г. Ориентированной
- Д. Истерической (психогенной)

Функциональные обязанности участкового врача психиатра-нарколога предполагают:

- А. Организацию и проведение лечебно-диагностической работы больным с зависимостью от алкоголя и других ПАВ
- Б. Ведение регистрационной, учетной и отчетной документации
- В. Ведение профилактической работы в контакте с правоохранительными органами, администрацией предприятий, общественностью
- Г. Оказание консультативной помощи пациентам, их родственникам, медработникам общей лечебной сети участка обслуживания
- Д. Все перечисленное

Постинтоксикационные состояния у подростков проявляются преимущественно

- А. Психической и двигательной заторможенностью
- Б. Тошнотой, рвотой
- В. Расстройствами со стороны вегетативной нервной системы
- Г. Выраженной сонливостью
- Д. Вялостью, отсутствием аппетита

Одним из самых чувствительных показателей состояния конкретного больного с зависимостью в данное время является:

- А. Идеаторный компонент влечения
- Б. Поведенческий компонент влечения
- В. Эмоциональный компонент влечения
- Г. Вегетативный компонент влечения
- Д. Сенсорный компонент влечения

Наибольший риск развития алкоголизма у подростков связан с:

- А. Наличием алкоголизма у матери
- Б. Наличием алкоголизма у отца
- В. Наличием алкоголизма у обоих родителей
- Г. Наследственной отягощенностью алкоголизмом по родственной линии матери
- Д. Наследственной отягощенностью по родственной линии отца

Патологическое формирование личности от микросоциально-педагогической запущенности ограничивает

- А. Неблагоприятные условия воспитания
- Б. Наличие патохарактерологического синдрома
- В. Асоциальное поведение
- Г. Избирательность форм поведения
- Д. Характерологические ситуационные реакции

Задачами наркологического кабинета являются:

- А. Осуществление лечебно-диагностической и профилактической работ на участке обслуживания
- Б. Осуществление лечебно-диагностической, профилактической, организационно-методической, консультативной, экспертной работы
- В. Ведение амбулаторного приема
- Г. Оказание амбулаторной специализированной помощи
- Д. Все перечисленное

К расстройствам процесса мышления относят все перечисленное, исключая

- А. Ускорение процесса мышления
- Б. Аграмматизм
- В. Ментизм
- Г. Заторможение процесса мышления
- Д. Неясное (расплывчатое) мышление

В основе формирования толерантности и физической зависимости от ПАВ лежат

- А. Изменения синтеза и метаболизма белков и биогенных аминов в ЦНС
- Б. Нарушения структуры наркотических рецепторов мозга
- В. Нарушение транспорта ионов кальция через мембраны нервных клеток
- Г. Нарушения метаболизма катехоламинов
- Д. Все перечисленные механизмы

Согласно международным критериям ремиссии при шизофрении нарушение спонтанности и плавности речи

- А. Относится к диагностическим критериям
- Б. Является диагностическим критерием только при простой форме заболевания
- В. Не является диагностическим критерием
- Г. Считается диагностическим критерием только при кататонической форме заболевания

К формам групповой психотерапии относят

- А. Самораскрытие в процессе психотерапии
- Б. Снижение эгоцентризма и чувство общности с группой
- В. Эмпатию с группой и ведущим
- Г. Групповую систематическую десенситизацию фобий

Чаще всего отказ от спиртного при эндогенных аффективных расстройствах происходит при возникновении _____ депрессии

- А. Апатической
- Б. Дисфорической
- В. Тоскливой
- Г. Тревожной

Табачный абстинентный синдром преимущественно проявляется

- А. Болями в мышцах, суставах, животе
- Б. Тремором, атаксией
- В. Тошнотой, рвотой
- Г. Неврозоподобными и аффективными расстройствами

Основой клинической картины алкоголизма являются синдромы

- А. Алкогольный абстинентный, алкогольный психоорганический, Гайе – Вернике
- Б. Задержки психического развития, алкогольной анозогнозии, алкогольный абстинентный
- В. Патологического влечения к алкоголю, алкогольный абстинентный, алкогольной деградации личности
- Г. Патологического влечения к алкоголю, алкогольный психоорганический, алкогольной деградации личности

В соответствии с приказом росстата от

22.11.2010 №409 «об утверждении практического инструктивно-методического пособия по статистике здравоохранения» диагноз определяется как

- А. Заболевание или состояние, по поводу которого пациент получал медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи
- Б. Заболевание или состояние, по поводу которого пациент получал медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинической медицинской организации или в медицинском стационаре
- В. Установленное врачом заболевание или состояние по его симптомам, синдромам, признакам, результатам лабораторных исследований или другим данным
- Г. Заболевание, по поводу которого пациент обратился в амбулаторно-поликлиническую медицинскую организацию или в медицинский стационар

При лечении синдрома отмены опиоидов в качестве противоболевого средства используется

- А. Лоперамид
- Б. Клофелин
- В. Метоклопрамид
- Г. Кеторолак

Социальным фактором, значительно осложняющим лечение туберкулеза в стационаре, является

- А. Бездомность
- Б. Наличие несовершеннолетних детей на попечении у больного
- В. Наличие актуальной зависимости от психоактивных веществ
- Г. Материальное неблагополучие больного

Согласно мкб-10, для установления диагноза «шизофрения» наличие эха мыслей или открытости мыслей

- А. Требуется, как минимум, еще двух диагностических признаков заболевания
- Б. Требуется, как минимум, еще одного диагностического признака заболевания
- В. Является достаточным
- Г. Является обязательным диагностическим признаком

Субмиссивная мотивация характеризует употребление алкоголя в связи с

- А. Низкой физической активностью, требующей алкоголя в качестве допинга
- Б. Неспособностью противостоять окружению
- В. Неуверенностью в себе, нерешительностью, излишней застенчивостью
- Г. Эмоциональным напряжением, тревогой, беспокойством

Полагают, что аддиктивный потенциал всех пав, которые способны вызывать формирование синдрома зависимости на нейрофизиологическом уровне, реализуется, главным образом, через

- А. Влияние на серотонинергические проекции из среднего в передний мозг
- Б. Дофаминергическую мезокортиколимбическую систему
- В. Влияние на холинергическую систему головного мозга
- Г. Воздействие на функции гипоталамо-гипофизарной системы

Высокое содержание карбоксигемоглобина во время беременности приводит к

- А. Появлению экстрасистолии плода и внутричерепного давления
- Б. Рisku развития бронхиальной астмы плода
- В. Частым обморочным состояниям
- Г. Развитию функциональной анемии

Задача трансактного анализа состоит в том, чтобы

- А. Исследовать проблемы, страхи и фантазии человека с помощью драматических сценариев
- Б. Дать человеку доступ к состояниям эго и возможность выбора, который соответствовал бы его нуждам и желаниям
- В. Дать возможность эмоциональной разрядке
- Г. Достигнуть нового понимания окружающих

В Российской Федерации наиболее распространена модель употребления алкоголя с преобладанием

- А. Пива и пивных напитков
- Б. Сидра и других слабоалкогольных напитков
- В. Виноградного вина и других природных вин
- Г. Крепких алкогольных напитков

Процедура медицинского или общественного характера, цель которой не лечение больного, а предотвращение болезни, называется

- А. Скринингом
- Б. Диагностикой
- В. Реабилитацией
- Г. Профилактикой

Основным показанием для лечения препаратом цианамид является _____ зависимость

- А. Каннабиноидная
- Б. Опиоидная
- В. Алкогольная
- Г. Кокаиновая

Психоделические эффекты классических галлюциногенов объясняются в настоящее время, главным образом, их

- А. Агонизмом к серотониновым рецепторам 2А типа (5-НТ 2А -р)
- Б. Антагонистическим действием на NMDA-рецепторы глутамата
- В. Антагонизмом к серотониновым рецепторам 2А типа (5-НТ 2А -р)
- Г. Агонизмом к серотониновым рецепторам 1А типа (5-НТ 1А -р)

К психозу, вызванному употреблением психоактивных веществ, сопровождающемуся помрачением сознания, относят

- А. Преимущественно бредовое расстройство
- Б. Онейроид
- В. Преимущественно галлюцинаторное расстройство
- Г. Психотическое расстройство с поздним дебютом

К факторам, влияющим на социализацию личности, относят

- А. Семью, включение в «группы равных», обучение, СМИ, трудовую деятельность
- Б. Место в социальной иерархии
- В. Моральные установки
- Г. Девиантное поведение

Гемблинг представляет собой аддикцию к

- А. Интернету
- Б. Спортивным командным играм
- В. Азартным играм
- Г. Модификации собственного тела

Методы социальной терапии основаны на

- А. Индивидуальной и групповой формах работы
- Б. Удалённом взаимодействии
- В. Индивидуальном взаимодействии
- Г. Групповом взаимодействии

При аас в случае недостаточности терапевтического эффекта производных бензодиазепина назначаются

- А. Антиконвульсанты
- Б. Антипсихотики
- В. Транквилизаторы
- Г. Барбитураты

Согласно мкб-10 острая интоксикация алкоголем тяжелой степени с комой кодируется шифром

- А. F 10.043
- Б. F 10.052
- В. F 10.042
- Г. F 10.053

Порядок стадий гипнотического транса в эриксоновском гипнозе, который может быть использован при коррекции созависимого поведения, включает

- А. Бессознательный поиск, фиксацию внимания, депотенциализацию установок сознания, гипнотический отклик
- Б. Фиксацию внимания, депотенциализацию установок сознания, бессознательный поиск
- В. Депотенциализацию установок сознания, гипнотический отклик, бессознательный поиск, фиксацию внимания
- Г. Фиксацию внимания, депотенциализацию установок сознания, гипнотический отклик, бессознательный поиск

Первым этапом диагностики психического расстройства является

- А. Квалификация симптомов
- Б. Установление нозологического диагноза
- В. Оценка динамики психического расстройства
- Г. Синдромальная оценка

У мужчин, страдающих патологическим гемблингом, чаще встречаются

- А. Случаи физического насилия
- Б. Шизофренические психозы
- В. Аффективные расстройства
- Г. Алкоголизм и антисоциальное расстройство личности

Энцефалопатия вернике при хроническом злоупотреблении алкоголем связана с дефицитом витамина

- А. Е
- Б. В 6
- В. В 1
- Г. В 12

Под определением синдрома зависимости от нехимических видов аддикции понимают

- А. Биосоциальную болезнь, охватывающую все сферы деятельности человека, приносящую в основном вред близким людям или окружению
- Б. Временное психическое расстройство, хроническое психическое расстройство (заболевание), слабоумие, а также иные болезненные состояния
- В. Определённую группу симптомов или поведенческих признаков, обычно причиняющих страдание и препятствующих функционированию личности
- Г. Ощущаемую человеком навязчивую потребность в определенной деятельности

Эндогенным агонистом каннабиноидных рецепторов является

- А. Тетрагидроканнабиол
- Б. Каннабидиол
- В. Каннабихромен
- Г. Анандамид

Алкогольный синдром плода закономерно возникает в случае ежедневного приема чистого этанола (в миллилитрах)

- А. 40-50
- Б. 15-30
- В. 30-40
- Г. 60-80

Курение во время беременности способствует

- А. Развитию деперсонализации личности в виде тревожности, чувство паники без причины, утрата индивидуальности и физическими проявления такими как: потеря пространственной ориентации, нарушенная двигательная координация, потеря аппетита
- Б. Активации канцерогенов, увеличивая риск онкологических заболеваний у детей
- В. Возникновению обсессивно-компульсивному расстройству, с периодически возникающими навязчивыми состояниями, в форме различных чувств, мыслей, представлений или страхов, от которых трудно избавиться самостоятельно
- Г. Увеличению сроков беременности характеризующуюся запоздало или вовсе не появляется родовой деятельности по окончании срока беременности

Первичное патологическое влечение к алкоголю возникает

- А. В периоде абстинентных расстройств, развивающихся при прекращении начатого потребления ПАВ
- Б. При отсутствии признаков интоксикации ПАВ
- В. Под влиянием уже принятого ПАВ
- Г. В периоде опьянения

Вторичное влечение к алкоголю определяется как стремление к приему алкоголя

- А. После приема его определенной дозы
- Б. Независимо от внешней ситуации
- В. В постабстинентном периоде
- Г. Ситуационно провоцируемое

Исчезновение патологического влечения к алкоголю на фоне физического истощения наблюдается при

- А. Окончании истинного запоя
- Б. Окончании псевдозапоя
- В. Постоянной форме употребления
- Г. Перемежающейся форме употребления

При лечении синдрома отмены седативных или снотворных веществ рекомендуется _____ вещества

- А. Постепенное снижение дозы
- Б. Переход на другие
- В. Увеличение дозы
- Г. Отмена

Способом предотвращения формирования у детей нарушений и расстройств, связанных с внутриутробным воздействием алкоголя, является

- А. Прием противовоспалительных веществ (ингибиторов простагландинов, антиоксидантов), а также препаратов холина и других низкомолекулярных веществ в целях снижения тератогенного действия этанола на плод
- Б. Профилактика употребления алкоголя среди женщин во время беременности
- В. Профилактика употребления алкоголя обоими родителями как минимум за 6 месяцев до наступления беременности
- Г. Профилактика употребления алкоголя среди женщин до беременности

Согласно стандарту специализированной медицинской помощи, под медицинской услугой для диагностики заболевания, состояния, обязательной для дифференциальной диагностики пагубного употребления алкоголя и синдрома зависимости, понимают

- А. Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза
- Б. Исследование уровня психоактивных веществ в моче
- В. Прием врача-психиатра-нарколога первичный
- Г. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

У терапевтов, работающих с зависимыми от пав лицами, с течением времени развивается

- А. Синдром эмоционального выгорания
- Б. Низкая толерантность к фрустрациям
- В. Ненависть к своим пациентам
- Г. Симптом зависимости

Согласно мкб-10, для диагностики острого и транзиторного психотического расстройства при наличии растерянности, ложных узнаваний и нарушений внимания необходимо исключить

- А. Смешанное тревожное и депрессивное расстройство
- Б. Органически обусловленное помрачение сознания
- В. Синдром деперсонализации-дереализации
- Г. Генерализованное тревожное расстройство

Наиболее часто встречающимся и приводящим к тяжелым последствиям является сочетанное употребление кокаина и

- А. Гашиша
- Б. Алкоголя
- В. Толуола
- Г. ЛСД

Препаратами выбора для купирования психомоторного возбуждения при развитии у принявшего лсд опьянения в форме «скверного путешествия» («bad trip`а») являются

- А. Бензодиазепиновые транквилизаторы
- Б. Антипсихотики из группы пиперазиновых фенотиазинов
- В. Антипсихотики из группы алифатических фенотиазинов
- Г. Антипсихотики из группы бутирофенонов

Потребление алкоголя повышается при

- А. Гиперактивности системы нейропептида Y
- Б. Гиперактивности нейромедиаторной системы кортикотропин-релизинг фактора
- В. Инактивации μ - и κ -опиоидных рецепторов
- Г. Снижении активности тормозной глицинергической системы

У ближайших кровных родственников патологических гемблеров достоверно чаще встречаются

- А. Умственную отсталость
- Б. Антисоциальное расстройство личности
- В. Другие формы химической зависимости
- Г. Алкоголизм

Тяжесть алкогольного абстинентного синдрома пропорциональна содержанию в крови

- А. Этанол
- Б. Дофамина
- В. Серотонина
- Г. Ацетальдегида

Целесообразность применения групповой терапии в реабилитации зависимых от пав обоснована

- А. Эмоциональной изоляцией зависимых от ПАВ, приводящей к поверхностным и манипулятивным отношениям с окружающими
- Б. Ускоренными сроками прохождения групповых программ
- В. Простотой выполнения групповых упражнений
- Г. Возможностью обеспечить большое количество реабилитантов

Стандарт медицинской помощи включает

- А. Информацию об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике конкретного заболевания
- Б. Рекомендуемое штатное расписание структурных подразделений медицинской организации
- В. План диспансерного наблюдения пациента с указанием кратности осмотра врачами-специалистами, выполнения лабораторных и инструментальных исследований
- Г. Усредненные показатели частоты предоставления медицинских услуг и кратности применения лекарственных препаратов

Антагонистом наркотиков опийного ряда является

- А. Седуксен
- Б. Налоксон
- В. Барбамил
- Г. Кофеин

Стандартом оснащения наркологического диспансера (наркологической больницы) предусмотрено наличие электроэнцефалографа в количестве не менее

- А. 4
- Б. 2
- В. 1
- Г. 3

Основной принцип профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (исмп), заключается в том, что нужно

- А. Всем работающим в медицинских организациях ежедневно менять домашнюю одежду на специальную одежду
- Б. Не осуществлять плановую госпитализацию пациентов без предъявления результатов обследования на инфекции
- В. Соблюдать все современные противоэпидемические и профилактические стандарты
- Г. Запрещать родственникам посещать пациентов без масок и специальной защитной обуви

При острой алкогольной интоксикации в отсутствие дальнейшего употребления алкоголя с каждым часом концентрация алкоголя в крови снижается на (в промилле)

- А. 0,1-0,2
- Б. 0,01-0,02
- В. 1-2
- Г. 0,5-1

Единицами измерения концентрации алкоголя в крови являются

- А. Миллиграммы на литр
- Б. Граммы на литр
- В. Фемтолитры
- Г. Единицы на литр

Веществом, содержащемся в высокой концентрации табачном дыме, и снижающем доставку кислорода к плоду является

- А. Никотин
- Б. Акролеин
- В. Оксид азота
- Г. Моноксид углерода

Антипсихотический эффект нейролептиков в адрес выраженных аффективно-поведенческих проявлений патологического влечения к алкоголю проявляется в

- А. Ухудшении когнитивных возможностей
- Б. Повышении комплаентности
- В. Нарастании силы эмоциональных расстройств
- Г. Возрастающем риске нарушения предписанного лечебного режима

Проявления гипостенического варианта астенического синдрома включают

- А. Резкое снижение фона настроения
- Б. Раздражительную слабость, нетерпеливость, взвинченность
- В. Повышенную утомляемость и истощаемость
- Г. Эмоциональную лабильность

К психологическим методикам для исследования мышления относят

- А. Тест Векслера, таблицы Равена
- Б. Запоминание 10 слов, повторение чисел в прямом и обратном порядке, пиктограмму, воспроизведение рассказов
- В. Корректирную пробу, счет по Крепелину, отсчитывание, таблицы Шульте
- Г. Классификацию предметов, сравнение понятий, методику Эббингауза, понимание переносного смысла пословиц и поговорок, ассоциативный эксперимент Юнга

Эфедреновое опьянение заканчивается

- А. Коматозным состоянием
- Б. Выраженным психомоторным возбуждением
- В. Глубоким сном
- Г. Сомноленным состоянием

Целью санитарно-просветительной работы в стационаре является

- А. Пропаганда вреда алкоголя
- Б. Формирование трезвеннической установки на период лечения
- В. Пропаганда здорового образа жизни
- Г. Замена зависимости на менее вредную

Чувствительность потребителей героина к заражению ВИЧ-инфекцией повышает

- А. Снижение числа Т-хелперных клеток (CD4 +)
- Б. Снижение числа Т-цитотоксических клеток (CD8 +)
- В. Увеличение числа Т-хелперных клеток (CD4 +)
- Г. Увеличение числа Т-цитотоксических клеток (CD8 +)

О формировании II стадии зависимости от опиоидов свидетельствует возникновение у пациента

- А. Абулического синдрома
- Б. Циклического характера злоупотребления опиоидами
- В. Резидуального психического расстройства
- Г. Синдрома отмены наркотика

Среди наиболее распространенных и тяжелых соматоневрологических осложнений хронического употребления растительного ката отсутствует

- А. Ликворная гипертензия
- Б. Сердечно-сосудистая недостаточность
- В. Орбитоокулярная боль
- Г. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Препарат перфеназин используется для лечения

- А. Алкогольной энцефалопатии
- Б. Алкогольного делирия
- В. Алкогольной депрессии
- Г. Алкогольного бреда ревности

При тяжелом течении опийного абстинентного синдрома наблюдаются

- А. Гипостезии
- Б. Гиперстезии
- В. Сенестопатии
- Г. Анестезии

Истерический вариант алкогольного опьянения характеризуется

- А. Демонстративными суицидальными попытками, театрализованным горестным аффектом, бурными сценами отчаяния, «сумасшествия» и пр.
- Б. Преобладанием дисфории (вместо эйфории) с начальных этапов алкогольного опьянения, даже при его легкой степени
- В. Преобладанием подозрительности, обидчивости, придирчивости, склонности толковать слова и поступки окружающих, как агрессивно направленные против личности
- Г. Дурашливостью, стереотипиями, кривлянием, хаотическим дебоширством, однообразным звукоподражанием, бессмысленным буйством

При хроническом злоупотреблении алкоголем в крови обнаруживают

- А. Повышение активности трансаминаз (АЛТ и АСТ)
- Б. Повышение активности холинэстеразы
- В. Снижение содержания кетоновых тел
- Г. Микроцитоз эритроцитов

Социально-гигиеническая концепция объясняет природу зависимостей от психоактивных веществ _____ индивида

- А. Социально-психологической несостоятельностью
- Б. Генетическими особенностями
- В. Условиями жизни
- Г. Характерологическими чертами

Требованием к результатам лечения больного в фазе ремиссии при зависимости вследствие употребления летучих растворителей является

- А. Редукция инсомнических расстройств
- Б. Социальная реабилитация
- В. Редукция аффективного расстройства
- Г. Полное купирование абстинентного расстройства

Взаимодействие антиретровирусных препаратов с метамфетамином может вызывать

- А. Усиление действия наркотика
- Б. Усиление эффективности противовирусных лекарств
- В. Ослабление эффективности противовирусных лекарств
- Г. Снижение действия наркотика

При непереносимости или недостаточной эффективности антиконвульсанта карбамазепина в качестве противосудорожного средства допустимо применение

- А. Ламотриджина
- Б. Этосуксимида
- В. Фенитоина
- Г. Тиагабина

Отравление алкоголем, которое может привести к летальному исходу, соответствует концентрации этанола в крови (в г/л)

- А. 0,5-1,5
- Б. 2,6-3,2
- В. 1,6-2,5
- Г. 3,3-5,0

К соматическим проявлениям опийного абстинентного синдрома относят

- А. Повышенную потливость
- Б. Мышечные и суставные боли
- В. Раздражительность
- Г. Ринорею

Наиболее часто в наркологической практике в качестве противосудорожного средства используют

- А. Карбамазепин
- Б. Этосуксимид
- В. Фенитоин
- Г. Тиагабин

Феномен психосоматической диссоциации характерен для

- А. Средней стадии зависимости
- Б. Конечной стадии зависимости
- В. Начальной стадии зависимости
- Г. Первых проб табака

Легкая степень острой алкогольной интоксикации характеризуется

- А. Ощущением психического и физического комфорта
- Б. Появлением психосенсорных расстройств
- В. Онейроидом
- Г. Галлюцинозом

Под подражанием понимают

- А. Произвольное и непроизвольное следование каким-либо примерам и образцам поведения, с которыми человек сталкивается во взаимодействии с окружающими его людьми (в первую очередь со значимыми лицами), а также предлагаемыми средствами массовой коммуникации
- Б. Особый вид эмоционально-волевого целенаправленного неаргументированного воздействия одного человека на другого или группу людей
- В. Внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные нормы, ценности, поведенческие сценарии, свойственные семье, значимым лицам, обществу сверстников, различным социально-профессиональным и этноконфессиональным слоям и т.д.
- Г. Эмоционально-когнитивный процесс усвоения человеком норм, установок, ценностей, моделей поведения как своих собственных во взаимодействии со значимыми лицами и референтными группами

К признакам церебрального варианта алкогольного абстинентного синдрома относится

- А. Наличие эпилептиформных припадков
- Б. Тотальная бессонница
- В. Сердечная аритмия
- Г. Дисфория

Состоянием сниженной способности принимать и выполнять требования среды как лично значимые, а также реализовывать свою индивидуальность в конкретных социальных условиях является

- А. Алекситимия
- Б. Деадаптация
- В. Дисфория
- Г. Дерекреация

На втором этапе барбитуровой зависимости выражена

- А. Раздражительность
- Б. Расторможенность
- В. Эйфория
- Г. Болтливость

Социальному работнику, применяющему различные виды и методы социальной терапии, необходимо строить свою работу учитывая _____ наркологического пациента

- А. Философские воззрения
- Б. Религиозную конфессию
- В. Культурологические особенности
- Г. Возрастные, профессиональные и личностные особенности

При положительном результате первого исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя проводится

- А. Повторное исследование выдыхаемого воздуха
- Б. Повторное исследование мочи
- В. Осмотр врача-специалиста
- Г. Повторное исследование крови

В процессе приспособления индивида к новой среде отсутствует стадия

- А. Функциональная
- Б. Ситуативная
- В. Отрицания
- Г. Организационная

Ведущими причинами связанной с алкоголем смертности среди женского населения являются

- А. Сердечно-сосудистые заболевания
- Б. Рискованные формы поведения и непреднамеренные травмы
- В. Инфекционные заболевания
- Г. Заболевания пищеварительной системы

Рекомендуемым штатным нормативом кабинета врача-психиатра-нарколога и кабинета врача-психиатра-нарколога участкового предусмотрена одна ставка врача-психиатра-нарколога (врача-психиатра-нарколога участкового) на _____ тысяч сельского населения

- А. 20
- Б. 30
- В. 15
- Г. 10

По с. Cloninger i тип алкоголизма

- А. Никогда не выявляется у женщин
- Б. Встречается только у мужчин
- В. Наблюдается у мужчин и у женщин
- Г. Отмечается преимущественно у мужчин

К блокаторам опиатных рецепторов относится

- А. Дисульфирам
- Б. Цитизин
- В. Налтрексон
- Г. Апоморфин

К особенностям преморбида подростков при формировании токсикомании относят

- А. Склонность к паранойяльным образованиям
- Б. Реакцию группирования по месту обитания
- В. Низкую толерантность к сверхсильным раздражителям
- Г. Склонность к сверхценным образованиям

При лечении синдрома отмены опиоидов в качестве противоболевого средства используют

- А. Метоклопрамид
- Б. Клофелин
- В. Лоперамид
- Г. Трамадол

Среди летучих органических растворителей, используемых для получения опьянения, отсутствует

- А. Этиловый спирт
- Б. Эфир
- В. Ацетон
- Г. Бензин

Наиболее значимыми факторами формирования химической зависимости в подростковом возрасте являются

- А. Неполные семьи
- Б. Семьи, находящиеся на грани развода
- В. Семьи, где ребенок растет в ситуации вседозволенности
- Г. Асоциальные семьи с пьянством, криминальными склонностями родителей

В семейном клубе трезвости каждый член семьи, испытывающий трудности в связи алкогольными проблемами, предлагает обсудить свою ситуацию в соответствии с принципом

- А. Реальности
- Б. «Здесь и сейчас»
- В. «Там и тогда»
- Г. «Никогда не поздно»

Патология беременности и родов у матери _____ развития шизофрении у потомства

- А. Увеличивает риск
- Б. Не изучена как фактор риска
- В. Уменьшает риск
- Г. Не влияет на риск

Конечная (iii) стадия алкогольной зависимости характеризуется _____ толерантности

- А. Ростом
- Б. Плато
- В. Отсутствием динамики
- Г. Снижением

В соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-психиатром-наркологом

- А. По направлению предприятий и иных организаций, в которых работает гражданин
- Б. По направлению прокуратуры, участкового инспектора, должностных лиц и структурных подразделений Министерства внутренних дел
- В. По направлению общественных организаций и общественных объединений
- Г. При самостоятельном обращении пациента, по направлению врачей-специалистов или по решению судьи

Выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации определенных групп взрослого населения

- А. Обязательно
- Б. Проводится по решению врача терапевта
- В. Проводится при подозрении на их наличие
- Г. Не предусмотрено

Из выделяемых клинических проявлений патологического влечения к алкоголю значительную долю специфичности несет _____ компонент

- А. Вегетативный
- Б. Идеаторный
- В. Эмоциональный
- Г. Поведенческий

Изменения личности в виде алкогольной деградации наиболее характерны для _____ стадии алкогольной зависимости

- А. Переходной (I-II)
- Б. Средней (II)
- В. Конечной (III)
- Г. Начальной (I)

На фоне роста толерантности к экстази исчезает

- А. Повышенное потоотделение
- Б. Бруксизм
- В. Сухость во рту
- Г. Эйфория

Быстро прогрессирующее снижение интеллекта наиболее характерно при хроническом употреблении

- А. Галлюциногенов
- Б. Кокаина
- В. Барбитуратов
- Г. Каннабиноидов

Чаще всего зависимость от алкоголя формируется у лиц с

- А. Нарушенными полоролевыми функциями
- Б. Хроническими соматическими заболеваниями
- В. Нарушениями социальной адаптации
- Г. Психиатрическими заболеваниями