

Тесты с вопросами по специальности «Психиатрия-наркология» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/psihiatr-narkolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Психиатрия-наркология» для аккредитации и других экзаменов (4000 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/psihiatriya_narkologiya/

2) Психиатрия-наркология — ситуационные задачи

→ medik-otvet.ru/product/nar/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

В стандарт оснащения отделения неотложной наркологической помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 929н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "наркология", не входит

- А. аппарат для искусственной вентиляции легких
- Б. централизованная система подводки кислорода к каждой кровати или концентраторы кислорода
- В. дефибриллятор кардиосинхронизированный
- Г. автоматические дозаторы лекарственных средств шприцевые
- Д. анализатор наркотических и сильнодействующих лекарственных средств

Основные инструменты воздействия психокоррекционного компонента реабилитации:

- А. Индивидуальная психотерапия
- Б. Групповая психотерапия
- В. «Интерфаза»
- Г. Распорядок дня
- Д. Самоорганизация

Участие гормональных систем в патогенезе алкоголизма подтверждается появлением у больных:

- А. Гипогонадизма
- Б. Дисфункции коры надпочечников
- В. Гипотиреозидизма
- Г. Транзиторной гипертензии
- Д. Реактивной гипогликемии

Хроническую интоксикацию алкоголем верифицируют, определяя показатели:

- А. ГГТ
- Б. АСТ
- В. АСТ/АЛТ
- Г. СКОЭ
- Д. ЛВП

В каком году советское правительство сделало попытку восстановить «сухой закон» в стране

- А. в 1917 году
- Б. в 1919 году
- В. в 1921 году
- Г. в 1923 году
- Д. в 1925 году

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Характеристика профессионального типа реабилитационной программы: А-Полное воздержание от ПАВ; заместительная терапия; обучение контролю над употреблением ПАВ. Б-Конфессиональная; трудовая; семейная.

- А. 1-А
- Б. 1-Б

Период становления зависимости от ПАВ у подростков отличается от такового у взрослых:

- А. Направленностью влечения не на определенное ощущение от наркотика, а на недифференцированное состояние оглушения («балдение»)
- Б. Незрелостью чувственной сферы
- В. Преобладанием группового мотива употребления ПАВ
- Г. Замедленным формированием влечения
- Д. Предпочтением средств с галлюцинаторным эффектом

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1

Высокоструктурированные реабилитационные структуры: А-Реабилитационные центры; терапевтические общины. Б-Группы само и взаимопомощи; комунны; поселения наркоманов.

- А. 1-А
- Б. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов: А-F11; Б-F16; В-F12; Г-F14; Д-F18.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

При передозировке кокаина смерть наступает от:

- А. Эпистатуса
- Б. Остановки сердца вследствие аритмии
- В. Остановки дыхания
- Г. Некронефроза
- Д. Печеночной комы

Основные модели наркологической реабилитации:

- А. Классическая модель 12-шаговой программы
- Б. Миннесотская модель стационарной и амбулаторной 12-шаговой программы
- В. Терапевтическое сообщество
- Г. Организация терапевтических реабилитационных направлений в структуре разных конфессий
- Д. Семейные клубы трезвости

Типы семей с повышенным риском формирования аддиктивных расстройств у детей:

- А. Семья с авторитарным родителем
- Б. Неполная семья
- В. Отягощенная семья
- Г. Функциональная семья
- Д. Нуклеарная семья

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Характеристика начальной (1) стадии наркомании: А-Отсутствие определенного ритма употребления ПАВ и изменения толерантности, возможность формирования психической зависимости. Б-Регулярный ритм приема ПАВ, рост толерантности. В-Рост толерантности, формирование физической зависимости, максимальная толерантность-плато толерантности, изменение качества эйфории. Г-Невозможность переносить прежние высокие дозы, снижение толерантности, исчезновение эйфории, введение ПАВ поддерживает организм в более или менее «комфортном» состоянии.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

В задачи стационарных наркологических отделений входит:

- А. Оказание специализированной лечебно-диагностической помощи
- Б. Купирование психозов, связанных с потреблением психоактивных веществ
- В. Недобровольное лечение наркологических больных в соответствующих случаях
- Г. Ведение профилактической и реабилитационной работы

Одним из самых чувствительных показателей состояния конкретного больного с зависимостью в данное время является компонент патологического влечения

- А. Идеаторный
- Б. Поведенческий
- В. Эмоциональный
- Г. Вегетативный
- Д. Сенсорный

Клиническая картина острого отравления опиатами характеризуется:

- А. Угнетением ЦНС (сопор, кома)
- Б. Угнетение дыхания с частотой до 4-6 в минуту или полной остановкой
- В. Сужением зрачков (симптом «точки») со снижением или полным отсутствием реакции на свет
- Г. Сохранением сухожильных и периостальных рефлексов
- Д. Сохранением корнеальных, кашлевых и глоточных рефлексов

Механизм роста толерантности к алкоголю у больных алкоголизмом обусловлен:

- А. Напряжением и адаптацией стрессовых гормонов
- Б. Адаптацией к алкоголю барбитуровых рецепторов мембраны клетки
- В. Адаптацией к алкоголю ГАМКА-рецепторов мембраны клетки
- Г. Адаптацией к алкоголю бензодиазепиновых рецепторов мембраны клетки
- Д. Активизацией альдегидокисляющих ферментов

Маркёром употребления героина и отличия от морфина и кодеина является метаболит

- А. Морфин-6-глюкуронид
- Б. 6-моноацетилморфин
- В. Норморфин
- Г. Морфин
- Д. Морфин-3-глюкуронид

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Когнитивно-поведенческий подход: А-Выработка негативной реакции на приём алкоголя и наркотиков. Б-Усиление реальных свойств манипуляций и процедур, назначенных больному. В-Закладка в наркологического больного новой программы на основе развития существующих функциональных возможностей, для чего необходимо многократное повторение и закрепление необходимых реакций.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Отмена наркотика при ятрогенной наркомании возможна в случаях:

- А. Достижения устойчивой ремиссии основного соматического заболевания
- Б. Возможности полного купирования болей ненаркотическими анальгетиками и спазмолитиками
- В. Отсутствия угрозы ухудшения течения соматического заболевания
- Г. Достижения неустойчивой ремиссии основного соматического заболевания
- Д. Госпитализации больного в психиатрический или наркологический стационар

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Скорая медицинская помощь: А-Оказывается медицинскими организациями независимо от их организационно-правовой формы бесплатно. Б-Медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается бесплатно. В-Оказывается в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг. Г-Оказывается в соответствии с договорами добровольного медицинского страхования. Д-Не оказывается.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Морфологическая картина жировой дистрофии печени: А-Выраженная жировая дистрофия гепатоцитов, инфильтрация склерозированной портальной стромы, формирование внутри печеночных доле кист, обнаружение в гепатоцитах гистолимфоцитарных элементов с примесью полиморфноядерных лейкоцитов ; Б-Крупная капля жира в цитоплазме, сдвигающая ядро к периферии, увеличение клетки в объеме, мелкозернистая жировая инфильтрация; В-Некроз, атрофия, гипертрофия и регенерация гепатоцитов, наличие клеток с 2-3-мя ядрами, перипортальное и интрабулярное разрастание соединительной ткани, обилие ложных долек; Г-Некроз гепатоцитов, алкогольный гиалиноз в клетках, воспалительный инфильтрат, состоящий преимущественно из полиморфноядерных лейкоцитов.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Санитарно-гигиеническая работа по профилактике табакокурения должна быть адресована к:

- А. Детям и подросткам
- Б. Лицам пробующим табак
- В. Недавно пробующим табак
- Г. Родителям потенциальных курящих

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Особенности формирования зависимости от ПАВ у женщин: А-Употребление ПАВ по собственной инициативе или после знакомства с зависимым лицом; активность в получении наркотика; мотив употребления ПАВ - устранение чувства одиночества, нервозности и депрессивности; мотив-благоприятный сдвиг в психическом и физическом самочувствии; употребление ПАВ на этапе систематического приема 1-2 раза в неделю; более низкая скорость формирования и более низкий темп прогрессивности заболевания в целом. Б-Мотивация первого употребления ПАВ и приобщения к ним под внешним влиянием; преимущественно ежедневная форма употребления ПАВ на этапе систематического приема; зависимая роль при получении наркотика; прием ПАВ как способ нивелировки низкой сексуальной привлекательности; мотив употребления ПАВ - устранение чувства одиночества, нервозности и депрессивности; минование этапа эпизодического употребления ПАВ.

- А. 1-А
- Б. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов-острая интоксикация: А-F11.3; Б-F16.6; В-12.0; Г-F14.2; Д-F18.5.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Различия в скорости окисления алкоголя в организме женщины в отличие от мужчин, обусловлены тем, что у них

- А. Скорость окисления алкоголя в слизистой желудка и относительное содержание воды в организме ниже
- Б. Скорость окисления алкоголя в слизистой желудка и относительное содержание воды в организме выше
- В. Скорость окисления алкоголя в слизистой желудка выше, а относительное содержание воды в организме ниже
- Г. Скорость окисления алкоголя в слизистой желудка ниже, а относительное содержание воды в организме выше
- Д. Алкоголь окисляется не в слизистой желудка, а в слизистой кишечника

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 мю-рецептор-эффекты: А-Аналгезия, угнетение дыхания; эйфория, зависимость, седативный эффект; миоз, угнетение кашлевого рефлекса, запор, брадикардия. Б-Мидриаз, стимуляция дыхания, тахикардия; дисфория, психозомиметические эффекты (галлюцинации и др.)

- А. 1-А
- Б. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1.Необходимость употребить алкоголь для снятия тягостного психического и физического состояния: А-Психоорганический синдром; Б-Делириозный синдром; В-Психопатоподобный синдром; Г-Синдром отмены (ААС); Д-Невротический синдром.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1

Антинаркотическая деятельность: А-Построение социокультурного пространства, которое предполагает вовлечение в профилактику разнообразных ресурсов – личностных, интеллектуальных, нравственно-волевых, культурно-ценностных и профессиональных. Б-Система привития полезных навыков на основе знания правил здорового образа жизни и убежденности в необходимости их соблюдения. В-Совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья и трудоспособности людей, продление их активной жизни.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

У больных алкоголизмом нарушения в сфере памяти проявляются:

А. Интерференцией кодировки сырой информации в системе немедленной памяти на селекцию и первичное обобщение информации в системе кратковременной памяти

Б. Изменением скорости распада удерживаемых в системе кратковременной памяти следов информации

В. Нарушением фиксации молекулярных изменений, происходящих в системе кратковременной памяти, в долговременные комплексы

Г. Нарушением фиксации молекулярных изменений, происходящих в системе долговременной памяти

Д. Нарушением фиксации памяти на текущие события

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1

Методы борьбы с паркинсоноподобным синдромом: А-Циклодол; ноотропил; амизил; тремарал; атурбан.

Б-Кофеин 20% - 2,0 мл п/к; панолид п/к; аминазин в/м. В-Отмена препарата; динезин (депаркин). Г-циклодол; ноотропил; амизил; атурбан. Д-вазотоники.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Практическое значение демографических показателей сводится к:

- А. Планированию социально-экономического развития страны
- Б. Планированию сети учреждений здравоохранения
- В. Оценке здоровья населения
- Г. Оценке качества медицинской помощи
- Д. Планирование лекарственного обеспечения населения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Период полужизни в плазме морфина: А-3,6 часа; Б-5,1 часа; В-2-3 часа; Г-около 20 часов; Д-7-16 часов.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Что происходит раньше всего при развитии синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови при острой алкогольной интоксикации

- А. Появление микротромбов
- Б. Выброс в сосудистое русло тканевого тромбопластина
- В. Замедление кровотока
- Г. Появление фибринолитической активности
- Д. Истощение факторов свертывания крови

Укажите начальную симптоматику при энцефалопатии Гайе-Вернике

- А. Кома
- Б. Тревога
- В. Сопор
- Г. Апатический ступор
- Д. Астения разной степени выраженности

Нейрофизиологические механизмы зависимости от ПАВ реализуются в

- А. Стволовых структурах мозга
- Б. Мезолимбических структурах мозга
- В. Областях стволовых и мезолимбических структур мозга, где располагается т.н. «система подкрепления»
- Г. Подкорковых структурах мозга
- Д. Диэнцефальных структурах мозга

При каком пути введения кокаин оказывает минимальное токсическое действие на организм?

- А. Интраназальное
- Б. Внутривенное
- В. Пероральное
- Г. Ингаляционное

Малый истерический припадок характеризуется состоянием, при котором наблюдаются

- А. Тонические и клонические судороги
- Б. Внезапная потеря сознания
- В. Массивная тоническая судорога с изгибанием тела в дугу
- Г. Приступы рыдания, хохота
- Д. Секундная потеря сознания с судорожными подергиваниями отдельных групп мышц

При постановке диагноза «Алкогольный цирроз печени» необходимо ориентироваться на такие клинические проявления, как:

- А. Асцит
- Б. Желтуха
- В. Увеличенная и плотная печень
- Г. Повышение активности ГГТ
- Д. Специфические соматические сопутствующие заболевания (язва желудка, сахарный диабет, панкреатит)

Аддикция определяется как

- А. Пароксизмальные нарушения поведения в рамках здоровья
- Б. Систематическое повторение действий, лишенных целесообразности и реального приспособительного значения, возникающее у дефицитарных личностей, как свидетельство психологической декомпенсации и ведущее к снижению социальной адаптации или дезадаптации.
- В. Помрачение сознания на фоне органических повреждений головного мозга
- Г. Аффективное расстройство в виде смещения страха, злобы и тоски
- Д. Психологическая защита, которая активизируется при попадании в неблагоприятные жизненные условия.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Тактика психотерапевтического воздействия. Компенсаторные методы: А-Для больных с импульсивным характером употребления ПАВ. Б-Для больных со стеническими, эксплозивными чертами. В-Для больных с астеническими и тревожно-сензитивными особенностями

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Дифференциально-диагностическими критериями острого алкогольного гепатита в отличие от вирусного гепатита, являются:

А. Резко выраженная астения

Б. Отсутствие продрома

В. Артериальная гипертензия

Г. Спленомегалия

Д. Увеличение активности ГГТ до 1000 и более ед/л

Барбитуровый делирий отличается от алкогольного

А. Меньшим двигательным возбуждением, но более глубоким помрачением сознания

Б. Интенсивностью цветовой окрашенности галлюцинаторных образов и преобладанием красного и синего цветов

В. Отсутствием «скачущего» аффекта и более глубокой степенью помрачения сознания, интенсивностью цветовой окрашенности галлюцинаторных образов

Г. Менее глубокой степенью помрачения сознания и меньшим двигательным возбуждением

Д. Эпилептиформными припадками

Укажите вторую фазу в динамике формирования семейных отношений при созависимости

А. Фаза адаптации

Б. Фаза озабоченности

В. Фаза самозащиты

Г. Фаза истощения

Универсальные компоненты аддикций:

А. Изменение толерантности

Б. Синдром отмены

В. Конфликт с нормативными значимыми другими лицами

Г. Особенность

Д. Эйфория

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Срок формирования психической героиновой зависимости в подростковом возрасте: А-1-2 года; Б-2-3 недели; В-3-4 месяца; Г-1-2 недели; Д-6-8 месяцев

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Обучение больных алкоголизмом аутогенной тренировке позволяет:

- А. Ослабить (притупить) интенсивность первичного патологического влечения к алкоголю
- Б. Устранить вторичное патологическое влечение к алкоголю
- В. Уменьшить эмоциональное напряжение
- Г. Мобилизовать ресурсы значимых других лиц
- Д. Развивать антиципацию

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Период полужизни героина в плазме: А-9 минут. Б-2-3 часа. В-2-4 часа.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

В формировании конституциональных психопатий в подростковом возрасте имеют значение

- А. Аномалии темперамента
- Б. Аномалии сферы инстинктов и влечений
- В. Элементарные психопатические реакции (злобность, агрессия и др.)
- Г. Ситуационные личностные реакции протеста, отказа, интеркомпенсации и др.
- Д. Все перечисленные утверждения

К основным факторам, участвующим в симптомообразовании алкоголизма, относят:

- А. Фактор почвы
- Б. Фактор фона
- В. Токсический фактор
- Г. Временной фактор
- Д. Этнический фактор

Возрастная психогигиена включает в себя:

- А. Изучение аномалий формирования личности
- Б. Разработку социальных мер оздоровления условий жизни в пенсионном возрасте
- В. Рекомендации системы мероприятий по укреплению психического здоровья школьников
- Г. Систему мероприятий по первичной профилактике психических заболеваний
- Д. Вакцинацию населения

Укажите II фазу динамики семейного реагирования на употребление ПАВ:

- А. Экстернализация
- Б. Индифферентная
- В. Аффективная
- Г. Гиперконтроля

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Какие препараты оказывают детоксикационный эффект: А-Унитиол, тиосульфат натрия, витамины группы "В", пирacetам. Б-Витамины группы "В", пирacetам. В-Седуксен, аминазин.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Какие действия необходимо произвести на первом этапе при оказании неотложной медицинской помощи больному с острым отравлением алкоголем?

- А. Постуральный дренаж и тяжелая перкуссия грудной клетки
- Б. Промывание желудка через зонд
- В. Восстановление адекватной легочной вентиляции
- Г. Противошоковая терапия при тяжелых гемодинамических расстройствах
- Д. Экстренная санационная бронхоскопия при выраженных аспирационно-обтурационных нарушениях дыхания

Для неврологических расстройств в рамках алкогольной энцефалопатии типа коркового ламинарного склероза (болезнь Мореля) характерно

- А. Астазия-абазия
- Б. Оппозиционная гипертония
- В. Глазные симптомы
- Г. Сухожильная гиперрефлексия
- Д. Мышечная гипотония

Объектом санитарно-гигиенического воспитания являются:

- А. Педагоги, преподаватели высших и средних специальных заведений
- Б. Работники юстиции, прокуратуры, милиции
- В. Родители, родственники больных
- Г. Дошкольники, студенты, учащиеся школ, техникумов, колледжей

Созависимость в семьях больных алкоголизмом проявляется в:

- А. Совместном распитии спиртного
- Б. Характерных личностных изменениях
- В. Патологических двигательных стереотипах
- Г. Извлечении вторичных выгод из болезни
- Д. Уклонении от конфликтов

Соматогенная фаза острого отравления алкоголем может проявиться:

- А. Воспалительным поражением органов дыхания
- Б. Психоневрологическими расстройствами
- В. Миоренальным синдромом
- Г. Острым поражением печени
- Д. Нарушением функции внешнего дыхания

При дифференциальной диагностике сумеречного помрачения сознания с продуктивными расстройствами («психотическая» форма) от классического сумеречного состояния, следует учитывать, что оно проявляется

- А. Сопровождается галлюцинациями, бредом и измененным аффектом
- Б. Относительно постепенным возникновением
- В. Восприятием больным окружающего в соответствии с существующими бредовыми расстройствами
- Г. Отражением в словах и действиях больного существующих патологических переживаний
- Д. Грёзоподобным бредом с преобладанием визуализированных фантастических представлений

Дифференциации хронических гашишных психозов помогает

- А. Гиперемия кожи, покраснение склер
- Б. Учащение пульса, дыхания
- В. Отсутствие аппетита
- Г. Сухость во рту, жажда
- Д. Тремор пальцев рук, неустойчивость в позе Ромберга, жалобы на головную боль, головокружение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Цель интеграционного этапа реабилитации: А-Приобретение личностной устойчивости и определённой зрелости, позволяющей функционировать в обществе без употребления ПАВ. Б-Максимально быстрое функциональное физическое и психическое восстановление, вовлечение больных в реабилитационную программу, приспособление к условиям реабилитационной среды и режиму работы учреждения. В-Максимальное восстановление физического и психического состояния больных, коррекция или формирование нормативных личностных и социальных качеств, нормализация семейных отношений.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Форма злоупотребления алкоголем: псевдозапой: А-II ст.; Б-II-III ст.; В-I ст.; Г-III ст.; Д-Бытовое пьянство.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Наиболее важным звеном в развитии нарушений при остром отравлении алкоголем является

- А. Расстройства функциональных систем организма
- Б. Формирование синдрома эндогенной интоксикации
- В. Формирование синдрома комплекса несостоятельности гомеостаза
- Г. Расстройства функции дыхания
- Д. Расстройства функции сердечно-сосудистой системы

Основными характеристиками группы развивающих методов психотерапии являются:

- А. Адресованность к ресурсам психики и личности
- Б. Партнерские отношения между психотерапевтом и пациентом
- В. Относительная стойкость полученных результатов
- Г. Авторитарная и доминирующая позиция психотерапевта
- Д. Поведенческие техники

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 В каком случае лучше использовать групповую психотерапию?: А-Семейный конфликт, стресс. Б-Нарушение режима терапии, недостаточная критик. В-Интеллектуально-мнестический дефект, актуализация патологического влечения.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Укажите III этап реабилитационного процесса

- А. Ресоциализация
- Б. Реинтеграция
- В. Реадаптация

Нарушение иммунной системы у больных алкоголизмом проявляется:

- А. Резким повышением В-клеток (лимфоцитов, продуцирующих антитела)
- Б. Появлением ацетальдегидных аддуктов
- В. Повышением количества Т-лимфоцитов
- Г. Повышением уровня иммуноглобулинов
- Д. Повышением активности моноцитов и макрофагов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Симптомы острой интоксикации опиумом: А-Ощущение волн тепла по телу, сухость во рту, сужение зрачков, зуд кожи лица; повышенный фон настроения; ощущение общей умиротворенности, лени и покоя. Б-Психомоторное возбуждение; резко и грубо выраженное ощущение «толчка» или удара в голове.

- А. 1-А
- Б. 1-Б

Состояние передозировки каннабиноидами проявляется:

- А. Гипертензией и тахикардией
- Б. Паническими реакциями
- В. Спутанностью сознания
- Г. Обилием парестезий и сенестопатий
- Д. Галлюцинаторными расстройствами

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Влияние опиатов (морфин, героин). Острое отравление: А-Гомогенные изменения нервных клеток; хроматолиз, острое набухание; Б-Вакуолизация, сморщивание клеток; липидная дистрофия; расплавление и распад клеточных элементов мозговой ткани.

А. 1-А

Б. 1-Б

Онейроидная кататония проявляется

А. Экстатическим, импульсивным возбуждением

Б. Гебефреническим возбуждением

В. Ступором с явлениями восковой гибкости, ступорозными состояниями

Г. Онейроидным помрачением сознания

Д. Всем перечисленным

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1

В.Е. Рожнов автор метода: А-Психодрамма. Б-Методика репродуктивной тренировки. В-Психотерапевтическая триада. Г-Эмоционально-стрессовая психотерапия. Д-Фракционный метод.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Симптомами марганцевой интоксикации у больных эфедроновой наркоманией являются:

А. Хореоформные движения мышц плечевого пояса, верхних конечностей

Б. Парезы мягкого нёба, языка, лицевых мышц

В. Параплегии

Г. Нарушения походки

Д. Буровато-зеленоватая окраска слизистой полости рта

При злоупотреблении препаратами, содержащими фенилпропранололин, быстро развиваются следующие осложнения:

- А. Миокардиодистрофия с нарушением ритма сердца
- Б. Трофические нарушения
- В. Паркинсоноподобный синдром, внутричерепная гипертензия
- Г. Поражение почек
- Д. Поражение печени

Укажите III стадию гипноза по

А. Форелю

- А. Сонливость
- Б. Сомнамбулизм
- В. Гипотаксия

Кто ввёл в употребление в России термин «аддикция»

- А. Иванец Н.Н.
- Б. Москаленко В.Д.
- В. Карпов А.М.
- Г. Короленко Ц.П.
- Д. Менделевич В.Д.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Признаки патологии клеток головного мозга при острой интоксикации алкоголем: А-Растворение тигроидного вещества, изменение формы и окраски клеток, явления перинуклеарного отека ; Б-Очаги клеточного опустошения и явлений нейронафагии, множественные очаги выпадения нервных клеток.

- А. 1-А
- Б. 1-Б

Зависимость от бензодиазепинов развивается у тех больных алкоголизмом, преморбидный статус которых отличается:

- А. Отягощенной наследственностью алкоголизмом или психическим заболеванием
- Б. Наличием признаков минимальной мозговой дисфункции в первые годы жизни
- В. Психопатиями или акцентуациями характера возбудимого или неустойчивого круга
- Г. Патологически протекавшим пубертатным периодом
- Д. Преобладанием в преморбидном периоде реакций группирования и имитации

Признаки II стадии алкогольной зависимости

- А. Алкогольная деградация
- Б. Алкогольный абстинентный синдром
- В. Синдром измененной реактивности

В отличие от пубертатного криза, пубертатная декомпенсация психопатии у подростков проявляется

- А. Гротескным характером
- Б. Состоянием, приближающимся по своему внешнему оформлению к метафизической интоксикации
- В. Огульным, бездумным отрицанием общепринятых авторитетов и норм поведения
- Г. Крайней эмоциональной лабильностью с неуправляемым поведением
- Д. Всем перечисленным

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Лечение АС, осложненного пневмонией: А-Не подлежат переводу из наркологического стационара; антибиотики и респираторная терапия. Б-Перевод в специализированный стационар; ИВЛ.

- А. 1-А
- Б. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Какая эйфория соответствует II ст. наркомании: А-Стимулирующая. Б-Нетрансформированная. В-Тонизирующая.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Общее усовершенствование врачей психиатров-наркологов проводится не реже 1 раза в

- А. 2 года
- Б. 3 года
- В. 5 лет
- Г. 7 лет

Анамнестические сведения собирают, соблюдая принцип получения данных

- А. От настоящего к прошлому
- Б. О настоящем состоянии больного
- В. О родственниках больного
- Г. От прошлого к настоящему
- Д. Не только о болезни, но и о жизни больного

Нарушения иммунной системы при хронической интоксикации алкоголем проявляются

- А. Снижением способности организма к освобождению от продуктов, образующихся при разрушении тканей
- Б. Высокой инфицированностью стрептококком
- В. Снижением фагоцитарной активности нейтрофилов
- Г. Повышением активности Т-лимфоцитов
- Д. Повышенной заболеваемостью больных алкоголизмом и более тяжелым протеканием заболеваний

Механизм действия барбитуратов определяется

- А. Тормозящим эффектом на синаптическую передачу нервных импульсов в клетке
- Б. Блокадой эффектов ацетилхолина
- В. Стимулирующим влиянием на систему тормозного медиатора - ГАМК
- Г. Активизированием дофаминового цикла
- Д. Разрушением липидной мембраны нервных клеток

При сравнительной оценке алкоголизма у женщин, в отличие от мужчин, следует ориентироваться на такие клинические проявления, как:

- А. Инкурабельность заболевания
- Б. Раннее появление циклических форм злоупотребления алкоголем
- В. Злокачественность течения заболевания
- Г. Аффективную окрашенность основных симптомов и синдромов
- Д. Выраженность идеаторной компоненты патологического влечения к алкоголю

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Тест Люшера: А-Дисинхронизация; сглаживание межполушарных различий; мозговая атрофия; межполушарная асимметрия. Б-Корково-подкорковые структуры; расширение желудочков мозга ; мозговая атрофия. В-Уровень правдивости; профиль личности. Г-Устойчивые черты личности; функциональное эмоциональное состояние. Д-Повышение ГГТ; повышение СКОЭ.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Эффекты взаимодействия ацетальдегида с гемоглобином: А-Образование тетрагидро-бета-карболинов выступающих в качестве естественных лигандо бензодиазепиновых и опиатных рецепторов ; Б-Утрата сродства к кислороду; В-Утрата специфичности; Г-Образование производных тетрагидроизохинолино, причастных к формированию зависимости

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Изменения на ЭКГ при трепетании предсердий: А-Укорочение интервала Р-Q; нерегулярные различные по форме желудочковые комплексы. Б-Измененный предсердный комплекс; отсутствие изменений желудочкового комплекса; частота желудочковых сокращений от 140 до 220 в мин. В-Волны трепетания одинаковой формы и правильного ритма; частота сокращений предсердий 220 – 450 в мин.. Г-Расширенные и деформированные желудочковые комплексы; зубец Р не определяется; аритмичные и различные по форме волны мерцания. Д-Отсутствие зубцов Р; частота сокращений желудочков 90 – 160 в мин..

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

О нарастании компульсивного влечения к опиатам у больных опишной наркоманией судят по:

- А. Неустойчивости АД с тенденцией к повышению его
- Б. Лабильности пульса и дыхания
- В. Усилению звучности сердечных тонов
- Г. Расширению зрачков
- Д. Появлению жалоб на «зубную боль», аллергию (зуд в области вен)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Биохимическая концентрация калия: А-2,5-8,3 ммоль/л; Б-3,5-5,5 ммоль/л; В-135-145 ммоль/л; Г-0,7-1,2 ммоль/л; Д-55-115 мкмоль/л.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Буквальный перевод термина «аддикт» означает

- А. Алкоголик
- Б. Наркоман
- В. Токсикоман
- Г. Игрок
- Д. Трудоголик

К биологическим патогенетическим факторам формирования зависимости от алкоголя относят:

- А. Нарушение обмена катехоламинов
- Б. Нарушения обмена серотонина
- В. Изменение функций эндогенной опиатной системы
- Г. Нарушения обмена в системе эндогенный этанол/эндогенный ацетальдегид
- Д. Нарушение обмена гормонов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Поведенческая психотерапия больных с зависимостью от ПАВ: А-Структурированная обучающая программа, формирующая навыки социального поведения, необходимые для создания сети социальных контактов и уменьшения стресса. Б-Комплекс психотерапевтических мероприятий, в основу которых заложена определённая концепция личности и её система отношений. В-Процесс направленного формирования желаемых, адаптивных форм поведения на основе принципов теории обучения.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Описательная группа эпидемиологических исследований наркологических заболеваний: А-Заболеваемость; потребность населения в наркологической помощи. Б-Условия, способствующие появлению и развитию наркозависимости; факторы, способствующие возникновению и развитию наркозаболеваний. В-Эффективность терапевтических мероприятий; эффективность профилактических мероприятий.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Психологические критерии эффективности реабилитации: А-Психическое расстройство наркологического профиля; психическое расстройство иного профиля; соматическое расстройство. Б-Нормативные личностные статусы; патологические личностные статусы; психологическая компетентность. В-Семейный статус; профессиональный (образовательный) статус; социальная компетентность.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

К сложной мании относятся:

- А. Спутанная мания
- Б. Веселая мания
- В. Дурашливая мания
- Г. Мания с онейроидом
- Д. Экзальтированная мания

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Тотальное (генерализованное) патологическое влечение к ПАВ: А-Инкапсулированность; меньшее постоянство и изменчивость; экзогенное состояние по отношению к психической структуре. Б-«Вырастает» на базе определенных общих патологических свойств психики; изменчивость и обратимость; отсутствие тенденции к саморазвитию.

- А. 1-А
- Б. 1-Б

Особенности реабилитации в амбулаторных условиях:

- А. Активная ответственная позиция пациента
- Б. Использование мотивационных стратегий всеми членами мультидисциплинарной команды на всех этапах реабилитации
- В. Значительный вклад (роль) социального компонента реабилитации
- Г. Клиент-центрированный подход
- Д. Взаимодействие в атмосфере доверия, ответственности и безопасности специалистов, пациента и его близкого окружения

Одним из основных индикаторов алкогольной ситуации и в России и во всем мире, является

- А. Рост числа правонарушений в состоянии алкогольного опьянения
- Б. Показатель обращаемости за медицинской помощью лиц с наркологическими расстройствами
- В. Уровень потребления алкоголя на душу населения
- Г. ДТП, совершенные в состоянии опьянения
- Д. Рост числа заболеваний, связанных с употреблением алкоголя

Специфичным осложнением гашишной наркомании является:

- А. Анергия
- Б. Брадипсия
- В. Хроническая эйфория
- Г. Амотивационный синдром
- Д. Психоорганический синдром

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Индивидуальная (личностная) психогигиена: А-Психогигиена умственного труда; психогигиена детства. Б-Психогигиена общественных отношений; психогигиена семейных отношений.

А. 1-А

Б. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Симптомы II фазы состояния отмены при опийной наркомании: А-Тоскливо-злое настроение, двигательное беспокойство, интенсивные боли в мышцах, бессонница. Б-Отсутствие аппетита и рвота, спазмы и боли в кишечнике. В-Чувство неудовлетворенности, напряженности, беспокойства, слезотечение, насморк, чихание. Г-Переменяющееся состояние жара и озноба «гусиная кожа», приступы чихания, чувство напряженности и влечение к наркотику.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Нарушение обмена липидов при интоксикации алкоголем обусловлено

А. Перекисным окислением их

Б. Перекисным окислением их, нарушением всасывания их в желудочно-кишечном тракте, мобилизацией жира из жировых депо в связи с возбуждающим действием алкоголя на симпатoadреналовую систему

В. Нарушением всасывания их в желудочно-кишечном тракте и мобилизацией жира из жировых депо в связи с возбуждающим действием алкоголя на симпатoadреналовую систему

Г. Перекисным окислением их и мобилизацией жира из жировых депо в связи с возбуждающим действием алкоголя на симпатoadреналовую систему

Д. Нарушением всасывания их в желудочно-кишечном тракте

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Глубокая межполушарная асимметрия. Показатели ЭЭГ: А-Арахноедиты; повышение внутричерепного давления; церебро-васкулярные нарушения; алкоголизм. Б-Опухоли поверхностно расположенные; инсульты; депрессии; алкоголизм. В-Атрофические процессы; опухоли поверхностно расположенные; субдуральные гематомы; алкоголизм. Г-Эпилепсия.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Форма эмоционального стресса

А. импульсивная

Б. тормозная

В. интерактивная

Г. сверхценная

Д. генерализованная

Укажите конечные изменения личности у больных алкоголизмом

А. Умеренное заострение характерологических особенностей

Б. Алкогольная деградация с дезадаптацией

В. Нивелировка преморбидных характерологических особенностей

Г. Алкогольная деградация с социальной адаптацией

Д. Карикатурное заострение характерологических особенностей

Неотложная помощь при кататоническом возбуждении включает

А. Неотложную госпитализацию

Б. Инъекционное введение нейролептиков преимущественно седативного действия (аминазин, тизерцин, хлорпротиксен)

В. Применение мощных нейролептиков-антипсихотиков (галоперидол и др.)

Г. Применение антидепрессантов

Д. Применение ЭСТ

С учетом высокой летальности больных с ААС, осложненным пневмонией, главным условием терапии является

А. Назначение гепарина при обнаружении стафилококковой инфекции

Б. Смена антибиотиков и других антибактериальных средств через каждые 5-7 дней

В. Лечение нестероидными противовоспалительными препаратами

Г. Назначение сердечно-сосудистых средств

Д. Лечение препаратами, улучшающими кровоток в тканях

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Бутирофеноны: А-Трифтазин, этаперазин. Б-Галоперидол, дроперидол. В-Эглонил, клопиксол, хлорпротиксен.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Для депрессивного варианта измененного простого алкогольного опьянения характерно:

- А. Преобладание подавленного настроения различной выраженности и оттенков
- Б. Появление идей самоуничижения
- В. Склонность к суицидальным попыткам
- Г. Тоскливо-злобное настроение
- Д. Моторная заторможенность

Основной задачей лечения больных наркоманией в 1-й стадии болезни является:

- А. Детоксикация
- Б. Купирование острых состояний
- В. Коррекция психических расстройств
- Г. Поддержание реактивности организма

Что является содержимым каждого личностного статуса?

- А. Оценочные суждения окружающих людей
- Б. Определенные смыслы, ценности, установки и стереотипы восприятия и поведения, характерные для того социокультурального окружения, в котором человек живет
- В. Архетипы
- Г. Комплексы
- Д. Особенности эмоционально-волевого реагирования, приобретенные в процессе воспитания в родительской семье.

К кататимному бреду относят бред

- А. Преследования
- Б. Воздействия
- В. Отравления
- Г. Самообвинения, виновности
- Д. Интерметаморфозы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**.

1. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина-абстинентное состояние с делирием: А-F11.5; Б-F16.7; В-12.1; Г-F14.4; Д-F18.6.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

В отличие от психопатии, для шизофрении с психопатоподобными (гебоидными) проявлениями, характерны

- А. Смена настроения от безразлично-вялого к веселому со склонностью к шутовству, дурашливости
- Б. Нерезкое падение психической активности
- В. Эмоциональное снижение
- Г. Ослабление способности к концентрации внимания
- Д. Все перечисленные признаки

Мусситирующий делирий характеризуется:

- А. Психомоторным возбуждением с хаотическими движениями в пределах постели
- Б. Невнятным, бессвязным бормотанием
- В. Карфологическими нарушениями
- Г. Возбуждением с совершением профессиональных действий
- Д. Эпизодами кататонического возбуждения

Наиболее отличительной особенностью алкоголизма у женщин является

- А. Злокачественность течения
- Б. Раннее появление психотических форм заболевания
- В. Низкая курабельность
- Г. Аффективная окрашенность клинической симптоматики
- Д. Раннее появление и быстро нарастающая социальная дезадаптация

Внутренняя картина болезни включает в себя

- А. объективные знания больного о своей болезни, а также субъективно переживаемые болезненные и тягостные ощущения
- Б. результаты биохимического исследования
- В. симптомы, выявляемые у больного
- Г. данные рентгенологического исследования
- Д. клинику внутренних болезней

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1

3. Фрейд автор метода: А-Психоанализ. Б-Имаготерапия. В-Прогрессирующая мышечная релаксация. Г-Наркогипноз. Д-Психотерапия, "центрированная" на клиенте.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1

Характеристика второй стадии наркомании: А-Синдром измененной реактивности. Б-Синдром психической зависимости; синдром физической зависимости. В-Нарастание истощения систем, определяющих симптоматику зависимости; последствия наркотизации.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1

Аддитивный потенциал аддитивного агента характеризуется: А-Способностью вызывать эйфорию и (или) прекращать страдание; доступностью; модой;терпимостью социума. Б-Генетической отягощенностью ; коморбидными психическими расстройствами; недостаточностью самоконтроля и саморегуляции;возможным пристрастием к аддитивным агентам в прошлом.

А. 1-А

Б. 1-Б

Чаще всего острая (токсическая) гепатопатия протекает с цитолитическим синдромом, под которым понимают

А. Дистрофические изменения паренхимы печени

Б. Нарушения проницаемости клеточных и нутриклеточных мембран гепатоцитов

В. Снижение синтетической функции печени

Г. Некротические изменения паренхимы печени

Д. Снижение детоксицирующей функции печени

Ориентированный онейроид проявляется

- А. Возникновением непроизвольного фантазирования с яркими представлениями о войнах, мировых катастрофах, полетах на луну и т.д.
- Б. Сосуществованием такого фантазирования с восприятием реального мира и ориентировкой в окружающем
- В. Наплывом истинных зрительных галлюцинаций
- Г. Легким изменением фантастических бредовых построений под влиянием изменений окружающего мира, нарушением чувства времени
- Д. Преобладанием растерянно-патетического возбуждения или субступора

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1Характеристика развернутой стадии наркомании: А-Желание получить удовольствие от наркотика (влечение к эйфории). Б-Влечение к психическому комфорту в интоксикации. В-Влечение, определяющееся желанием уйти от дискомфорта трезвости («уход от неудовольствия»).

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Не имеющее аналогов при других формах зависимости явление – взаимозаменяемость опиатов, эфедрона и транквилизаторов – наблюдается при

- А. Эфедроновой наркомании
- Б. Опиойной наркомании
- В. Токсикомании транквилизаторами
- Г. Верно А
- Д. Верно А.Б и В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Цель санитарно-просветительской работы: А-Улучшение здоровья и социального статуса потребителей наркотиков. Б-Выработка убеждения в необходимости соблюдения правил здорового образа жизни на основе знаний о причинах заболевания, методах их предупреждения и поддержания организма в здоровом состоянии. В-Формирование активного адаптивного функционального копинг-поведения, направленного на продвижение к здоровью, уменьшение числа лиц с психологическими факторами риска возникновения психосоциальных расстройств, формирование невосприимчивости к дисфункциональным паттернам поведения. Г-Выявление и нейтрализация психотравмирующих факторов, которые негативным образом влияют на психическое состояние человека.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Стационарная психотерапевтическая помощь показана контингентам больных:

- А. Страдающих психосоматическими расстройствами
- Б. С невротическими расстройствами на фоне органической патологии ЦНС
- В. С невротическими реакциями
- Г. Лицам, для которых повседневное социальное окружение является источником декомпенсации
- Д. Лицам молодого возраста

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Быстро нарастающие эффекты: А-Седативный, противосудорожный, снотворный, детоксикационный. Б-Антидепрессивный, корректирующий поведение, антибредовый. В-Профилактический.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Клинико-экспертная комиссия наркодиспансеров решает задачи:

- А. Определение противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности
- Б. Направление наркологических больных на медико-социальную экспертизу
- В. Принятие экспертного решения в сложных, конфликтных случаях
- Г. Экспертизы алкогольного или наркотического опьянения

Основным медиатором, обеспечивающим функции «системы подкрепления» является

- А. Серотонин
- Б. Опиаты
- В. Дофамин
- Г. ГАМК
- Д. Норадреналин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1Клинические признаки острой интоксикации эфедром: А-Ускоренная речь, неусидчивость, подвижность, неумеренная жестикуляция; гипертензия и тахикардия; непоследовательность мышления, высказывание множества нереальных планов, переоценка собственных возможностей; отсутствие потребности в еде и сне; сухость слизистых, вследствие чего опьяневший постоянно облизывает губы. Б-Ощущение необыкновенной ясности и красочности окружающего, запаха лесных фиалок; ощущение полета, невесомости; подъем настроения с ощущением особых способностей, стремлением к различным видам творческой деятельности; усиление полового влечения и сексуальной потенции; ощущение ясности того, что раньше казалось запутанным и непонятным.

- А. 1-А
- Б. 1-Б

В основе действия стимуляторов на мозг лежит

- А. Торможение высвобождения катехоламинов и стимулирование их обратного захвата
- Б. Стимулирование высвобождения катехоламинов и торможение их обратного захвата
- В. Стимулирование высвобождения катехоламинов и активация их обратного захвата
- Г. Торможение высвобождения катехоламинов и подавление их обратного захвата
- Д. Стимулирование высвобождения катехоламинов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1

Предреабилитационный этап реабилитации: А-Консультативный; диагностический, лечебный. Б-Адаптационный; интеграционный; стабилизационный. В-Профилактический.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных и снотворных средств: А-F11; Б-F10; В-F17; Г-F16; Д-F13.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Катаболизм алкоголя в организме человека происходит при непосредственном участии:

- А. Холецистокининовой системы
- Б. Системы МЭОС
- В. Катехоламиновой системы
- Г. Альдегидокисляющих ферментов
- Д. Серотониновой системы

Дифференцированный подход в проведении антиалкогольной санитарно - гигиенической работы предполагает учет факторов:

- А. Возраста слушателей
- Б. Образования
- В. Профессии, вида деятельности
- Г. Вида предпочитаемого спиртного напитка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Классификация патологического влечения к алкоголю: Обсессивное и компульсивное. Кто автор?: А-Е. Джеллинек; Б-Н.Н. Иванец; В-В.Б. Альтшулер; Г-А.А. Портнов; Д-И.Н. Пятницкая.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Основные особенности симптома психического автоматизма в структуре хронического алкогольного галлюциноза с психическими автоматизмами и парафренным изменением бреда, характеризуются

- А. Возникновением с самого начала заболевания
- Б. Сложностью сенсорного компонента
- В. Более редким возникновением идеаторного компонента
- Г. Верно А, Б и В
- Д. Верно А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Критерии 1ст. наркомании: А-Синдром измененной реактивности; синдром психической зависимости. Б-Синдром измененной реактивности; синдром физической зависимости. В-Синдром измененной реактивности; нарастание истощения систем, определяющих симптоматику болезни; Г-Нарастание последствий хронической наркотизации

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Стимуляторы (кокаин, амфетамины): А-Блокада обратного захвата дофамина и увеличение его выделения; блокада обратного захвата норадреналина и серотонина; Б-Агонисты мю-рецепторов; В-Усиление эффектов сигма-рецепторов, нарушение обмена ацетилхолина; Г-Усиление эффектов ГАМК-А-рецепторов; Д-Влияние на NMDA-рецепторы, блокада обратного захвата серотонина.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Опиаты: А-Анальгезия; замедление ритма дыхания; уменьшение секреции желчи; замедление ритма дыхания. Б-Бледность или покраснение кожных покровов; озноб. В-Колебания температуры тела; нарушение двигательных функций. Г-Сужение кровеносных сосудов; учащение ритма дыхания; повышение температуры тела.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Для неврологических расстройств при алкогольной энцефалопатии типа Маркиафава-Биньями характерно

А. Генерализованная мышечная гипертония

Б. Офтальмоплегия, достигающая степени тотальной

В. Дизартрия

Г. Астази-абазия

Д. Гипотония

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Морфологическая картина поражения головного мозга при хронической интоксикации алкоголем: А-Жировая дистрофия клетки, наличие кист и некрозов, обнаружение в клетке гистолимфоцитарных элементов; Б-Накопление в слизистой оболочке филаментов промежуточного типа, нарушение регенерации слизистой, набухание, гиперемия и отек слизистой; В-Очаги клеточного опустошения, явления перинуклеарного отека, растворение тигроидного вещества; Г-Атрофия ацинарных клеток, белковые массы и микрокальцинаты в протоках, очаги пролиферации, кисты, перии интралобулярный склероз; Д-Жировая инфильтрация клеток, большое число лизосом и липофусциновых гранул, атрофия фибрилл, кистообразное расширение саркоплазматического ретикулула

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Понятию «адекватная» наиболее отвечает терапия

- А. Комплексная
- Б. Интенсивная
- В. Специфическая
- Г. Эффективная
- Д. При которой спектр действия лекарств соответствует статусу больного

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Терапия состояния отмены седативно-снотворных препаратов: А-Агонист L2-адренорецепторов ЦНС (клонидин), атипичный нейролептик из группы замещенных бензаминов (тиаприд). Анагетик центрального действия (трамадола гидрохлорид). Б-Симптоматическая терапия. В-Комбинация средств, влияющих на дофаминергические механизмы (бромокриптин) и антидепрессантов, влияющих на серотонинергическую систему (флувоксамин). Г-Литическое отнятие ПАВ или заместительная терапия, производные карбамазепина (финлепсин).

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Нейрофизиологические механизмы зависимости от алкоголя и других ПАВ реализуются в

- А. Стволовых структурах мозга
- Б. Мезолимбических структурах мозга
- В. Облациях стволовых и мезолимбических структур мозга, где располагается т.н. «система подкрепления»
- Г. Подкорковых структурах мозга
- Д. Диэнцефальных структурах мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1.Острый алкогольный галлюциноз: А-Спутанность сознания, глагодвигательные нарушения,атаксия; Б-Истинные зрительные галлюцинации; В-Истинные вербальные галлюцинации; Г-Бред преследования; Д-Конфабуляции, фиксационная амнезия.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Классификация алкоголизма: α -алкоголизм, β -алкоголизм, γ -алкоголизм, δ -алкоголизм, ϵ -алкоголизм. Кто автор?: А-Н.Н. Иванец; Б-И.В. Стрельчук; В-М. Шакит; Г-Е. Джеллинек; Д-Р. Клонигер.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Движение "12 шагов" АН: А-Программа для родственников лиц, зависимых от ПАВ. Б-Программа для детей лиц, зависимых от ПАВ. В-Программа для лиц, зависимых от наркотиков. Г-Программа для лиц, зависимых от алкоголя.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Клинические признаки передозировки опиатами: А-Сужение зрачков (симптом «точки») со снижением или полным отсутствием реакции на свет; угнетение ЦНС от стадии засыпания до расстройства сознания в виде комы; угнетение дыхания до брадипное с частотой до 4-6 в минуту или полной его остановкой; снижение сухожильных и периостальных рефлексов или арефлексия; снижение или отсутствие реакции на болевое раздражение, корнеальных, кашлевых и глоточных рефлексов. Б-Гипертензия и тахикардия; панические реакции; спутанность сознания; галлюцинаторные расстройства, обилие парестезий и сенестопатий; резко выраженное чувство голода.

А. 1-А

Б. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Толерантность к алкоголю: Максимальные дозы алкоголя, не вызывающие выраженного опьянения. Кто автор?: А-Е. Джеллинек; Б-Н.Н. Иванец; В-Н.К. Фруентов; Г-DSM-III-R; Д-А.А. Портнов, И.Н. Пятницкая.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Методика системной интервенции предназначена для:

- А. Формирования мотивации
- Б. Применения санкций к больным, уклоняющимся от лечения
- В. Стимуляции нормативных личностных структур у пациентов
- Г. Развития рефлексии
- Д. Тренинга социальных умений

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 К трициклическим антидепрессантам относятся: А-Мелипрамин, амитриптилин. Б-Нуредат. В-Пиразидол. Г-Прозак.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Автор методики коллективной эмоционально-стрессовой гипнотерапии

- А. В.М. Бехтерев
- Б. И.М. Виш
- В. С.С. Либих
- Г. В.Е. Рожнов
- Д. А.Р. Довженко

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Эффекты от взаимодействия ацетальдегида с гемоглобином: А-утрата сродства к кислороду. Б-утрата специфичности действия. В-образование пролизводных тетрагидроизохинолинов – сальсолинола и др.. Г-образование тетрагидро-бета-карболинов.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Сведения со слов родственников: А-Отношение в коллективе; отношение родственников; наследственность; особенности протекания кризовых периодов; проводимая терапия и ее результаты; репутация среди сослуживцев; отношение к болезни; характерологические особенности. Б-Отношение родственников; наследственность; особенности протекания кризовых периодов; проводимая терапия и ее результаты; отношение к болезни; характерологические особенности. В-Отношение в коллективе; репутация среди сослуживцев; характерологические особенности. Г-Данные лабораторных исследований; проводимая терапия и ее результаты; отношение к болезни.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Таблица Шульте: А-Изучение опосредованного запоминания, целенаправленности мышления, продуктивности ассоциаций; Б-Исследование характерологических особенностей личности; В-Определение уровня интеллектуального развития; Г-Объем, распределение и устойчивость внимания; Д-Изучение расстройств поведения, профориентации испытуемого.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Биохимическая концентрация натрия: А-3,4-17 мкмоль/л; Б-2,2-2,65 ммоль/л; В-135-145 ммоль/л; Г-3,6 до 5,2 ммоль/л; Д-2,5-8,3 ммоль/л.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Эффективность использования психотерапии для лечения больных алкоголизмом женщин оценивается с помощью следующих критериев:

- А. Муж и члены семьи принимают и отстаивают идеи трезвости
- Б. Способность семьи отрешиться, отойти от всех употребляющих алкоголь семей
- В. Больная алкоголизмом женщина способна во время праздников спокойно пить сок или воду среди бутылок с вином и тостов
- Г. Успешное решение жизненных проблем на основе соблюдения трезвости
- Д. Способность больной неустанно искренне советовать своим детям жить совершенно трезво

Ассертивное поведение

- А. позволяет добиться цели любой ценой
- Б. присуще большинству пациентов до развития болезни
- В. учитывает интересы всех участников взаимодействия
- Г. даёт возможность управлять другими людьми
- Д. свойственно, преимущественно, представителям власти

Метамфетамин выводится из организма

- А. Медленнее, чем амфетамин
- Б. Быстрее, чем амфетамин
- В. С одинаковой с амфетамином скоростью
- Г. Быстрее, чем кокаин
- Д. С одинаковой с кокаином скоростью

Какой основной механизм психологической защиты зависимых от ПАВ и созависимых лиц

- А. Проекция
- Б. Агрессия
- В. Рационализация
- Г. Девальвация
- Д. Отрицание

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Цель первичной профилактики: А-Восстановление нормативного медицинского, психологического и социального статуса, позволяющего пациенту ресоциализироваться в обществе на основе отказа от ПАВ. Б-Нормализация биологического, психологического и социального статуса зависимого от ПАВ посредством дезактуализации наркологических расстройств. В-Предупреждение приобщения к ПАВ и формирование здорового образа жизни.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Острые интоксикационные психозы у больных эфедреновой наркоманией характеризуются

А. Длительностью от нескольких часов до нескольких дней и месяцев

Б. Повторяемостью и однотипностью клинической картины (по типу клише)

В. Бредовыми идеями отношения, преследования

Г. Сохранением бредовой настроенности после купирования острых расстройств в течение одной-двух недель

Д. Внезапностью развития

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Защитные биологические реакции при барбитуровой наркомании: А-Ощущение рези в глазах, слюнотечение, головокружение, тошнота, рвота. Б-Профузный пот, икота, слюнотечение, тошнота, рвота. В-«Меловая» бледность кожных покровов, сужение зрачков, зуд кожи лица. Г-Инъекция сосудов склер. Д-Брадикардное, тахипное.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

При актуализации влечения к алкоголю и другим ПАВ патогенетически оправдано назначение антипсихотических средств

- А. Блокирующих дофаминовые постсинаптические рецепторы в лимбической системе
- Б. Регулирующих серотониновую и дофаминовую нейромедиацию в мезолимбических структурах мозга
- В. Стимулирующих серотониновую и дофаминовую нейромедиацию в мезолимбических структурах мозга
- Г. Стимулирующих дофаминовые постсинаптические рецепторы в лимбической системе
- Д. Стимулирующих дофаминовые пресинаптические рецепторы в лимбической системе

Укажите первый блок в алгоритме санитарно-просветительской работы:

- А. Знания
- Б. Поступки
- В. Убеждения
- Г. Информация

К персекуторному бреду относится

- А. Бред преследования
- Б. Бред виновности, самообвинения
- В. Бред ревности
- Г. Бред изобретательства
- Д. Манихейский бред

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Укажите состояния при которых используются ноотропы: А-Интоксикация, мнестические расстройства. Б-Расстройства поведения, актуализация патологического влечения. В-Мания, нарушения сна.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Аддикции, связанные с использованием ПАВ: А-Опиоидная; алкогольная; каннабиноидная; табачная. Б-Шоппинг; компьютерная; гаджет; трудовая. В-Пищевая.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

В работе кабинета анонимного лечения медицинская документация на обратившегося:

- А. Не заводится
- Б. Заводится медицинская амбулаторная карта по общим правилам
- В. Письменная документация заводится по усмотрению обратившегося
- Г. Заводится медицинская карта под вымышленной фамилией и адресом

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Тревожно-параноидная установка : А-Галлюцинатроно-параноидный синдром; Б-Психоорганический синдром; В-Психопатоподобный синдром; Г-Алкогольный абстинентный синдром; Д-Невротический синдром.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Плато толерантности: А-Состояние адаптации к ПАВ, уменьшенная реакция на введение того же количества ПАВ, необходимость более высоких доз для достижения прежнего эффекта. Б-Состояние адаптации достигает максимума и длительное время остается постоянным; прием наивысших для больного доз ПАВ; увеличение доз не вызывает эйфории и может привести к передозировке. В-Неспособность переносить прежние высокие дозы, вынужденное снижение их, явления передозировки при увеличении дозы. Г-Адаптация, возникшая при приеме одного вещества, распространяется на другие вещества, которые больной ранее не применял.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ**. 1 Центральная форма нарушения дыхания при остром отравлении алкоголем. Восстановление адекватной легочной вентиляции осуществляется: А-Снижения саливации и бронхореи; туалета полости рта; отсасывания содержимого из верхних дыхательных путей в ходе терапевтических мероприятий. Б-Интубации трахеи; ИВЛ. В-ИВЛ; устранения аспирационно-обтурационных нарушений дыхания в начале терапевтических мероприятий.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

К характерным для хронической интоксикации алкоголем изменениям крови относится

- А. Тромбоцитопения
- Б. Изменение функции лейкоцитов (ослабление способности к фагоцитозу)
- В. Гемолитическая анемия
- Г. Миелоидная реакция
- Д. Изменение среднего корпускулярного объема эритроцитов

У умерших в состоянии острой интоксикации алкоголем чаще всего выявляется

- А. Гиперемия и отек мозга
- Б. Микроскопически обнаруживаемые микроциркуляторные расстройства
- В. Разной степени выраженности признаки токсической энцефалопатии
- Г. Жировая инфильтрация клеток
- Д. Кистообразное расширение саркоплазматического ретикулума

Какие действия необходимо произвести на первом этапе оказания помощи, при преобладании в картине анафилактического шока, явлений бронхоспазма или асфиксии?

- А. Венное введение лазикса (2 – 4 мл)
- Б. Восстановление и поддержание свободной проходимости дыхательных путей
- В. Венное струйное введение 10 мл 2,4% раствора эуфиллина
- Г. Улучшение альвеолярной вентиляции и легочного газообмена

Понятию «комплексной» в наибольшей степени отвечает терапия, которая включает в себя

- А. Несколько видов лекарственных средств вне зависимости от их групповой принадлежности
- Б. Несколько препаратов разных групп
- В. Лекарственные средства и психотерапевтические методики
- Г. Комбинацию психотерапевтических методик
- Д. Комплекс психокоррекционных и реабилитационных мероприятий

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1.Средняя суточная доза Флувоксамина: А-5-10 мг.; Б-50-100 мг.; В-20 мг.; Г-200 мг.; Д-20-40 мг..

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1.Наркотическая амнезия: А-Травматическое поражение головного мозга; Б-Корсаковский психоз; В-Алкоголизм 2ст.; Г-Церебральный атеросклероз; Д-Алкоголизм1ст..

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Положительным результатом пробы

А.М. Раппопорта является

- А. Частичное изменение цвета одной из пробирок
- Б. Полное обесцвечивание одной из пробирок
- В. Отсутствие изменений окраски в обеих пробирках
- Г. Изменение окраски обеих пробирок

Под дефицитарностью личности, предрасполагающей к формированию аддиктивных расстройств, подразумевается недостаточность или повреждения

- А. В морально-этической сфере
- Б. В интеллектуальной сфере
- В. На четырех уровнях функционирования человека: биологическом, психологическом, социальном и духовном
- Г. На культурном уровне функционирования человека.
- Д. Резидуально-органические повреждения нервной системы.

Основными клиническими дифференциально-диагностическими признаками, отличающими острые интоксикационные гашишные психозы от кокаиновых, являются

- А. Резкое чувство голода
- Б. Повышенная жажда
- В. Нарушение сознания
- Г. Активизация интеллектуальной деятельности
- Д. Снижение нейромускуляторной функции

Как называется наука о трезвости

- А. Наркология
- Б. Теология
- В. Этимология
- Г. Собриология
- Д. Петрология

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Клиника пароксизмальных нарушений ритма сердца при алкогольном поражении: А-Замирание, перебои в области сердца; общая слабость, чувство нехватки воздуха. Б-Тахикардия, одышка, головокружение; боли в области сердца. В-Нарастающие явления острой сердечной недостаточности; отек легких.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Основа феномена алекситимии у аддиктивной личности:

- А. Недифференцированное телесное напряжение
- Б. Недифференцированное душевное напряжение
- В. Нарушения самосознания идентичности «Я»
- Г. Отчуждение в эмоциональной сфере
- Д. Противоречивый характер самооценки

Клинические признаки алкогольного опьянения начинают отчетливо проявляться при концентрации алкоголя в крови

- А. 0,2 промилле
- Б. 0,3 промилле
- В. 0,5 промилле
- Г. 1,0 промилле
- Д. 2,0 промилле

Укажите начальные признаки классического алкогольного делирия

- А. Ложная ориентировка в месте.
- Б. Истинные зрительные галлюцинации
- В. Полная бессонница.
- Г. Парейдолии.
- Д. Возбужденность, неадекватная весёлость.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ.

1. Аверсивные средства: А-Налтрексон; Б-Клонидин; В-Апоморфин, эметин, отвар баранца; Г-Дисульфирам, цианамид, метронидазол; Д-Бромкриптин.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Основным нейромедиатором, обеспечивающим функции «системы подкрепления», является

- А. Серотонин
- Б. Опиаты
- В. Дофамин
- Г. ГАМК
- Д. Норадреналин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Укажите вид действия транквилизаторов: А-Седативный, антибредовый, антигаллюцинаторный, снотворный. Б-Седативный, транквилизирующий, противосудорожный, снотворный. В-Антидепрессивный, снотворный.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Вторичная профилактика: А-Универсальная. Б-Селективная. В-Индикаторная.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Период полужизни в плазме кокаина: А-8-12 часов; Б-14-55 часов; В-7,6 часа; Г-9 минут; Д-36-67 минут.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ. 1 Эффективность экспрессивной психодинамической психотерапии в наркологической сфере дает наибольшие результаты: А-У пациентов с истерическими акцентуациями характера; у пациентов с психастеническими акцентуациями характера; у пациентов с ананкастными акцентуациями характера. Б-У пациентов с диссоциальными свойствами личности; у пациентов с паранойяльными свойствами личности; у пациентов с признаками гипертимии и склонностью к псевдологии; у пациентов с аутодеструктивными тенденциями. В-У пациентов с признаками шизоидного расстройства личности.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Укажите какой синдром как правило формируется раньше всех при алкоголизме.

- А. Алкогольный абстинентный синдром
- Б. Синдром измененной реактивности
- В. Синдром патологического влечения к алкоголю
- Г. Алкогольная деградация
- Д. Синдром рассеянного энцефаломиелита

При наличии медицинских показаний после устранения угрожающих жизни состояний пациенты страдающие наркологическими расстройствами переводятся в наркологическое отделение медицинской организации для оказания специализированной медицинской помощи по профилю

- А. Анестезиология и реанимация
- Б. Психиатрия
- В. Психиатрия-наркология
- Г. Токсикология

Физическая зависимость от алкоголя характеризуется

- А. Навязчивым влечением к употреблению и достижением состояния психического комфорта в опьянении
- Б. Стремлением к непрерывному использованию или возврату к употреблению после попытки прекращения приема
- В. Невозможностью отказаться от употребления в провоцирующих ситуациях
- Г. Снижением настроения, подавленностью, неудовлетворённостью в трезвости, подъёмом настроения в предвкушении опьянения

Под импринтингом понимают

- А. Фиксирование человеком на рецепторном и подсознательном уровнях особенностей, воздействующих на него жизненно важных объектов
- Б. Особый вид эмоционально-волевого целенаправленного неаргументированного воздействия одного человека на другого или группу людей
- В. Эмоционально-когнитивный процесс усвоения человеком норм, установок, ценностей, моделей поведения как своих собственных во взаимодействии со значимыми лицами и референтными группами
- Г. Влияние условий бытия человека, определяющее овладение им родным языком (в раннем детстве) и неродными языками на других возрастных этапах (в ситуации изменения языковой среды), а также неосознаваемое усвоение норм социального поведения, непреложных в его социуме и необходимых для выживания в нем

Продромальный период алкогольного делирия, как правило, манифестирует в _____ время

- А. Полуденное
- Б. Утреннее
- В. Дневное
- Г. Вечернее

Правовое регулирование деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, осуществляют в пределах своей компетенции

- А. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- Б. Органы дознания
- В. Главные внештатные специалисты психиатры-наркологи субъектов Российской Федерации
- Г. Федеральные органы государственной власти

Триада вальтер – бюэля включает

- А. Аффективные нарушения, периферический полиневрит, снижение интеллекта
- Б. Расстройства памяти, аффективные нарушения, периферический полиневрит
- В. Расстройства памяти, периферический полиневрит, снижение интеллекта
- Г. Расстройства памяти, аффективные нарушения, снижение интеллекта

Для купирования бессонницы у пациента, страдающего алкогольной зависимостью, вне синдрома отмены алкоголя, противопоказано назначение

- А. Антидепрессантов со снотворным эффектом
- Б. Таблетированных седативных средств растительного происхождения
- В. Бензодиазепиновых транквилизаторов
- Г. Нейролептиков со снотворным эффектом

Специфическим антидотом при передозировке антихолинергических галлюциногенов является

- А. Налоксон
- Б. Флюмазенил
- В. Бемегрид
- Г. Неостигмин

Период полураспада никотина составляет (в часах)

- А. 4
- Б. 3
- В. 2
- Г. 1

К идеаторным проявлениям патологического влечения к табаку относят

- А. Навязчивые мысли, рассуждения о табаке
- Б. Выраженную дисфорию с преобладанием поведенческих нарушений
- В. Лабильный фон настроения при обсуждении потребления пациентом
- Г. Раздражающую слабость при невозможности употребления

Воздействие на сердечно-сосудистую систему – гибель клеток миокарда, фокальный миокардит, нарушение сердечного выброса, дилатационная кардиомиопатия, расслоение аорты характерно для токсического действия

- А. Синтетических каннабиноидов
- Б. Кокаина
- В. Кофеина и теобромина
- Г. Психостимуляторов амфетаминового ряда

Психомоторное возбуждение, опасное поведение, расстройства восприятия и бредовые суждения характерны для передозировки

- А. Бензодиазепинами
- Б. Психотомиметиками
- В. Алкоголем
- Г. Опиатами

К одной из целей применения международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10) относят

- А. Материально-техническое обеспечение медицинских организаций
- Б. Систематизированный анализ данных о заболеваемости и смертности населения
- В. Контроль качества оказания медицинской помощи населению
- Г. Организацию и планирование деятельности медицинских организаций

В основе создания условно-рефлекторного отвращения к этанолу в ходе проведения сенситизирующей терапии лежит

- А. Интолерантность
- Б. Рациональная психотерапия
- В. Исходная стадия алкогольной зависимости
- Г. Длительное злоупотребление алкоголем

К вегетативным проявлениям синдрома отмены опиоидов относят

- А. Урежение сердцебиения
- Б. Слезотечение
- В. Миоз
- Г. Сухость кожных покровов

К органическим расстройствам, соответствующим категории годности к военной службе «Б», относят

А. Состояния с умеренно выраженными астеническими, аффективными, диссоциативными, когнитивными, личностными и другими нарушениями, а также психотические состояния с благоприятным течением

Б. Состояния стойкой (не менее 1 года) компенсации болезненных проявлений после острого заболевания или травмы головного мозга при отсутствии психических расстройств и явлений органического поражения центральной нервной системы, когда имеются лишь отдельные рассеянные органические знаки, без нарушения функций

В. Резко выраженные, затяжные психотические состояния, а также психические расстройства, проявляющиеся стойкими выраженными интеллектуально-мнестическими нарушениями или резко выраженными изменениями личности по психоорганическому типу

Г. Преходящие, кратковременные психические расстройства, возникающие вследствие острых органических заболеваний или травм головного мозга, завершившиеся выздоровлением или незначительно выраженной астенией при отсутствии признаков органического поражения центральной нервной системы

При проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в случае отсутствия результата при первичном скрининге мочи на содержание пав методом ифа и наличии клинической картины употребления пав, рекомендуется провести

А. CDT

Б. АлАТ, АсАТ

В. MCV

Г. ГХ/МС или ВЭЖХ

Для обнаружения психоактивных веществ в организме наиболее часто используют

А. Кровь

Б. Волосы

В. Мочу

Г. Слюну

Для амбулаторного наблюдения и контроля посещений пациентов психиатрического и наркологического профиля приказом мз РФ от 31 декабря 2002 г. № 420 предусмотрено ведение статистической учетной формы №

А. 039/У-02 «Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, на дому»

Б. 030/У «Контрольная карта диспансерного наблюдения»

В. 025-1/У «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»

Г. 030-1/У-02 «Карта обратившегося за психиатрической (наркологической) помощью»

Первичной мишенью действия опиатов (морфин, героин, метадон) является _____
рецептор

- А. Дельта-опиатный
- Б. Мю-опиатный
- В. Ноцицептиновый
- Г. Каппа-опиатный

Согласно мкб-10 к негативным симптомам при шизофрении относят

- А. Депрессивную симптоматику
- Б. Прерывание мыслительных процессов или вмешательство в мысли
- В. Бедность речи
- Г. Эхо мыслей

В процессе транзактного анализа не происходит

- А. Избавление от склонности к манипулированию людьми
- Б. Укрепление исходных жизненных убеждений
- В. Исследование своих сценариев
- Г. Отказ от деструктивных планов жизни

Методом исследования лёгких, предусмотренным медицинскими услугами стандарта специализированной медицинской помощи при диагностике синдрома зависимости, является

- А. Микроскопическое исследование мокроты
- Б. Томографическое рентгенологическое исследование легких
- В. Рентгенография легких
- Г. Осмотр слизистой оболочки трахеи и бронхов с помощью бронхоскопа

Проявление агрессии при кататоническом двигательном возбуждении у пациентов с шизофренией

- А. Направлено на определенный круг лиц
- Б. Определяется поведением окружающих
- В. Носит нецеленаправленный характер
- Г. Ограничено исключительно ближайшим окружением

Абстинентные расстройства при героиновой зависимости в условиях лечения продолжаются в среднем не более в (днях)

- А. 10
- Б. 14
- В. 5
- Г. 2

Постинтоксикационное состояние при приеме амфетаминов характеризуется

- А. Состоянием астении
- Б. Физической активностью
- В. Состоянием эйфории
- Г. Отвращением к наркотику

При медицинском освидетельствовании на состояние опьянения при положительном результате первого исследования выдыхаемого воздуха

- А. Водитель отстраняется от управления транспортным средством
- Б. Выносится заключение об употреблении алкоголя
- В. Через 15-20 минут проводится повторное исследование
- Г. Выносится заключение о наличии состояния опьянения алкоголем

Аффективные расстройства в рамках патологического влечения к алкоголю, являющиеся показанием к назначению антидепрессантов-тимолептиков, выражаются в

- А. Сниженном настроении с психомоторным возбуждением
- Б. Психопатоподобном поведении с оппозиционностью к лечению и к близкому окружению
- В. Пассивности, вялости, безразличия, психофизической утомляемости
- Г. Лабильности настроения, обидчивости и слезливости, сопровождающихся вегетативными реакциями

Проявлением алкогольного цирроза печени является

- А. Снижение активности холинэстеразы
- Б. Снижение непрямого билирубина
- В. Определение HBsAg в крови
- Г. Снижение общего билирубина

В рамках синдрома отмены при эфедроновой наркомании отсутствует

- А. Сонливость днем и бессонница ночью
- Б. Выраженный болевой компонент
- В. Выраженное влечение к наркотику
- Г. Суицидальный риск

Степень достоверности взаимосвязи лекарственных средств - нежелательных явлений «ЛС-ня» по алгоритму наранжо определяется как «сомнительная» если_____ балла/баллов

- А. 1-4
- Б. 5-8
- В. 0 И меньше
- Г. 9 И более

Для алкогольного абстинентного синдрома характерно

- А. Снижение зрения
- Б. Снижение интеллекта
- В. Расстройство сна
- Г. Эмоциональное оскуднение

В 2014 г. В США количество подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет, которые употребили лсд хотя бы раз в течение месяца перед опросом, составило (в процентах)

- А. 10
- Б. 0,3
- В. 3
- Г. 0,05

Психомоторное возбуждение, суицидальное поведение, агрессия, сверхценные образования, асоциальные тенденции в поведении в клинической картине синдрома отмены являются показаниями для применения

- А. Анксиолитиков
- Б. Антиконвульсантов
- В. Антидепрессантов
- Г. Антипсихотических средств

Медицинские услуги для диагностики амнестического синдрома, вызванного употреблением психоактивных веществ, обязательно включают прием врача

- А. Невролога
- Б. Психиатра-нарколога
- В. Терапевта
- Г. Психиатра

Осмотр врачом-психиатром-наркологом (в том числе участковым) пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением в течение ремиссии свыше 2 лет, осуществляется не реже одного раза в

- А. Шесть недель
- Б. Шесть месяцев
- В. Месяц
- Г. Три месяца

Протрагированный алкогольный галлюциноз протекает не более (в годах)

- А. 4
- Б. 1
- В. 2
- Г. 3

К мишеням социального исследования жизни пациента не относят

- А. Межличностные отношения
- Б. Исследование количества ПАВ и продолжительность употребления
- В. Оценку социальной действительности
- Г. Коммуникативность

Наиболее часто наблюдается лекарственная зависимость от

- А. Барбитуратов
- Б. Антидепрессантов
- В. Нестероидных противовоспалительных препаратов
- Г. Транквилизаторов

Острый вербальный галлюциноз, возникший на фоне злоупотребления пав, характеризуется сохранением

- А. Всех видов ориентировки
- Б. Только ориентировки в месте
- В. Только ориентировки в собственной личности
- Г. Только ориентировки во времени

Для профилактики развития психомоторного возбуждения в структуре аас в первую очередь рекомендуется использовать

- А. Антikonвульсанты
- Б. Антипсихотики
- В. Антидепрессанты
- Г. Производные бензодиазеина

На ранних стадиях формирования зависимости основное влияние на алкогольную мотивацию оказывает _____ подкрепление

- А. Вторичное
- Б. Безусловное
- В. Отрицательное
- Г. Положительное

Согласно мкб-10, диагноз «острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении» должен быть изменен в случаях, когда длительность проявлений заболевания, исчисленная в месяцах, составляет не менее

- А. 3
- Б. 2
- В. 6
- Г. 1

Для поддержания стойкой медикаментозной ремиссии в случае алкогольной зависимости наиболее эффективны препараты из группы

- А. Агонистов дофаминовых рецепторов
- Б. Ингибиторов алкогольдегидрогеназы
- В. Агонистов опиатных рецепторов
- Г. Ингибиторов ацетальдегиддегидрогеназы

Больше всего метаболитов δ 9 - тгк (тетрагидроканнабинола) выделяется с

- А. Калом
- Б. Слюной
- В. Мочой
- Г. Желчью

Острое введение алкоголя активирует тормозные рецепторы

- А. Дофамина
- Б. Глутамата
- В. ГАМК
- Г. Гистамина

Снижение способности к концентрации внимания, дремотное состояние, психомоторная заторможенность наиболее вероятно свидетельствуют об острой интоксикации

- А. Опиоидами
- Б. Кокаином
- В. Психостимуляторами
- Г. Галлюциногенами

Среди последствий злоупотребления дезоморфином отсутствует

- А. Стремительное развитие социальной дезадаптации
- Б. Развитие марганцевой энцефалопатии
- В. Высокая частота развития медицинских осложнений
- Г. Криптогенный сепсис с высоким уровнем летальности

К облигатным признакам патологического опьянения относят

- А. Затяжной конфликт с эмоционально значимым окружением
- Б. Глубокую дезориентировку в окружающем и собственной личности
- В. Внезапно возникшую тревогу
- Г. Психогении

Дисульфирам – лекарственный препарат, применяемый при лечении алкогольной зависимости, официально зарегистрирован в России в форме

- А. Раствора для внутривенных инъекций
- Б. Таблеток для перорального приема
- В. Геля для подкожной имплантации
- Г. Капель для перорального приема

Основной медицинской проблемой, связанной с практикой внутривенного употребления опиатов, является

- А. Заболевание инфекционного характера
- Б. Появление септических осложнений
- В. Развитие эндокардитов
- Г. Развитие абсцессов

Для острого амфетаминового психоза характерно наличие

- А. Нарушений схемы тела
- Б. Ясного сознания
- В. Кататонических психомоторных расстройств
- Г. Синдрома психического и моторного автоматизма

Кабинет врача-психиатра-нарколога и кабинет врача-психиатра-нарколога участкового создаются для оказания

- А. Специализированной медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» в амбулаторных условиях
- Б. Профилактической помощи лицам с наркологическими расстройствами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара
- В. Медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» в амбулаторных условиях
- Г. Диспансерного наблюдения за лицами с наркологическими расстройствами

Синдром отмены амфетаминов возникает через (в часах)

- А. 12-24
- Б. 1-2
- В. 48
- Г. 72

К когнитивному механизму совладания, при коррекции созависимого поведения, относят

- А. Проблемный анализ
- Б. Равнодушие
- В. Покорность
- Г. Оптимизм

Повышенную склонность к формированию сверхценных идей имеют пациенты с ____ чертами характера

- А. Циклоидными
- Б. Паранойяльными
- В. Демонстративными
- Г. Психастеническими

Клиническим признаком 3 стадии синдрома зависимости от алкоголя является

- А. Деградация личности
- Б. Психическая зависимость
- В. Палимпсест
- Г. Рост толерантности

В настоящее время установлена корреляция между повышенной вероятностью формирования синдромов зависимости от пав и

- А. Шизоидной и психастенической акцентуациями личности
- Б. Нейротизмом и неустойчивостью к психосоциальным стрессам
- В. Чертами личности в виде экстраверсии и открытости всему новому
- Г. Антисоциальностью, своеволием и склонностью к непослушанию

Психиатрическая помощь включает в себя согласно «закону о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»

- А. Сеть учреждений здравоохранения и их подразделений, предназначенных для оказания специализированной медицинской помощи лицам с психическими расстройствами
- Б. Меры по активному выявлению и учету лиц с психическими расстройствами
- В. Обследование психического здоровья, диагностику психических расстройств, лечение, уход и медико-социальную реабилитацию
- Г. Диагностику, лечение и профилактику психических расстройств

Ремиссия высокого качества при синдроме зависимости от алкоголя предполагает

- А. Отдельные грубые нарушения режима трезвости (употребление алкоголя в опьяняющих, оглушающих дозах) без последующих абстинентных расстройств и при сохранении работоспособности
- Б. Отсутствие обострений патологического влечения к алкоголю при успешном функционировании больного во всех сферах жизнедеятельности (соматическая, психическая, социальная)
- В. Соблюдение больным режима полной трезвости, при наличии признаков частичного обострения патологического влечения к ПАВ
- Г. Отдельные нарушения режима трезвости – употребление спиртного без потери контроля, в умеренной дозе, без предшествующих признаков обострения патологического влечения и без последующих абстинентных расстройств

Симптом «критической дозы» определяется как

- А. Возникновение неодолимого влечения к алкоголю после употребления любой даже незначительной дозы
- Б. Неодолимое стремление продолжить употребление алкоголя после определенной для каждого конкретного больного дозы
- В. Активное стремление к употреблению алкоголя вне алкогольного экстаза
- Г. Неодолимое стремление к употреблению алкоголя после алкогольного экстаза на фоне различного рода физических и психических расстройств

Препаратами выбора для успокоения больного при развившемся на фоне передозировки лсд делирии являются

- А. Барбитураты
- Б. Бензодиазепины
- В. Блокаторы гистаминовых рецепторов 1 подтипа (H1)
- Г. Антипсихотики

К нейромедиаторам, играющим ведущую роль в патогенезе шизофрении, относят

- А. Таурин
- Б. Глутамат
- В. Аспаргинат
- Г. Аденозин

К основным признакам алкогольного гематурического нефрита относят

- А. Повышенный уровень гемоглобина
- Б. Безболезненный характер гематурии
- В. Гипокалиемию
- Г. Расширение чашечно-лоханочного аппарата

В целях исключения фальсификации образца биологического материала (мочи) при химико-токсикологическом исследовании на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием

- А. Осуществляется визуальный контроль за сбором мочи от освидетельствуемого лица
- Б. Осуществляется контроль за сбором мочи от освидетельствуемого лица с помощью технических средств
- В. Забор мочи у испытуемого лица проводится с использованием катетера
- Г. В течение 5 минут после отбора мочи проводится измерение ее температуры или pH или относительной плотности

Вопросами первичной профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и подростков

- А. Занимается система образования
- Б. Занимается система здравоохранения
- В. Занимается система социального сопровождения
- Г. Занимаются правоохранительные органы

Стандартом оснащения наркологического отделения предусмотрено наличие прибора для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве не менее

- А. 3
- Б. 5
- В. 2
- Г. 4

Согласно мкб-10, к типам шизоаффективного расстройства относится

- А. Депрессивный
- Б. Дистимический
- В. Тревожный
- Г. Апатический

Легкая степень опьянения соответствует концентрации этанола в крови (в г/л)

- А. 2,6-3,2
- Б. 0,5-1,5
- В. 1,6-2,5
- Г. 3,3-5,0

Истинные галлюцинации любой сферы чувств доминируют при

- А. Алкогольной энцефалопатии Гайе – Вернике
- Б. Алкогольном параноиде
- В. Алкогольном делирии
- Г. Алкогольном галлюцинозе

Медицинские и иные работники, участвующие в оказании психиатрической помощи, подлежат

- А. Страхованию ответственности врачей и медицинских работников в порядке, установленном Федеральным законом от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- Б. Страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
- В. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
- Г. Добровольному медицинскому страхованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

К наиболее распространенным ранним симптомам туберкулеза легких относят

- А. Сухой кашель
- Б. Хрипы в легких
- В. Боль в груди на вдохе
- Г. Продуктивный кашель, общее недомогание, потерю веса

В отличие от псевдозапоя истинный запой

- А. Развивается у лиц с врожденной органической патологией головного мозга
- Б. Происходит исключительно под воздействием внешних обстоятельств
- В. Обнаруживает чёткую связь с психотравмирующей ситуацией
- Г. Развивается аутохтонно

Биодоступность алкоголя и его опьяняющее действие выше у

- А. Здоровых женщин
- Б. Больных диабетом
- В. Больных алкоголизмом
- Г. Здоровых мужчин

К основным признакам выхода из состояния острой интоксикации кокаином относится

- А. Депрессия
- Б. Отсутствие аппетита
- В. Тремор
- Г. Расторможенность

Парциальная форма патологического влечения к алкоголю близка к такому психопатологическому состоянию, как

- А. Обсессивно-фобические расстройства
- Б. Синдром психического автоматизма
- В. Острое психотическое расстройство
- Г. Сумеречное помрачение сознания

Задачей психотерапевта в помощи ВИЧ-позитивным является

- А. Помощь наладить между членами семьи коммуникации, которые позволят им открыто обсуждать свои чувства по отношению друг к другу, не затрагивая при этом личность, а касаясь только поведения партнера по коммуникации
- Б. Раскрытие эмоции человека, максимально, желательно до полного катарсиса, тем самым облегчив его состояние
- В. Нацеливание человека на здоровый образ жизни, с целью предотвращения инфицирования других членов общества и ухудшения его состояния
- Г. Расставление жизненных целей и приоритетов, в связи с наличием у человека болезни

При средней степени курения табака значение so (угарного газа) выдыхаемого воздуха составляет (в ppm)

- А. Более 21
- Б. 6-10
- В. 11-20
- Г. До 6

Гебефренный вариант алкогольного опьянения характеризуется

- А. Демонстративными суицидальными попытками, театрализованным горестным аффектом, бурными сценами отчаяния, «сумасшествия» и пр.
- Б. Преобладанием подозрительности, обидчивости, придирчивости, склонности толковать слова и поступки окружающих, как агрессивно направленные против личности
- В. Дурашливостью, стереотипиями, кривлянием, хаотическим дебоширством, однообразным звукоподражанием, бессмысленным буйством
- Г. Преобладанием дисфории (вместо эйфории) с начальных этапов алкогольного опьянения, даже при его легкой степени

Концентрация этанола в крови в большей степени зависит от

- А. Режимы приёма алкоголя и пищи
- Б. Пола
- В. Наличия в алкогольных напитках углекислого газа
- Г. Возраста

Опьянение меткатиноном отличается от опьянения эфедромом

- А. Отсутствием скачки идей
- Б. Наличием тремора
- В. Продуктивной деятельностью
- Г. Большей моторной активностью

При ежедневном или почти ежедневном курении препаратов конопли в среднем через _____ появляются признаки зависимости

- А. 10 Дней
- Б. 1 Месяц
- В. 2 Недели
- Г. 3 Месяца

Неспособность осмыслить ситуацию, растерянность, бессвязность мышления, дезориентировка характерны для

- А. Делирия
- Б. Онейроида
- В. Сумеречного помрачения сознания
- Г. Аменции

Автоматическое повторение услышанных слов свойственно

- А. Стереотипии
- Б. Вербигерации
- В. Речевой итерации
- Г. Эхолалии

При лечении синдрома отмены опиоидов, протекающего без осложнений, используется

- А. Аминазин
- Б. Налоксон
- В. Налмефен
- Г. Клофелин

Новые потенциально опасные психоактивные вещества включены в

- А. Список III наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
- Б. Список I наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
- В. Список II наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
- Г. Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен

Галлюциногенное действие лекарственных препаратов – агонистов каппа опиоидных рецепторов наблюдается

- А. Часто при их медицинском применении, но к галлюциногенам их относить не принято, так как исторически сложилось, что их квалифицируют как опиоиды
- Б. Только у 1-2% лиц, принимающих их в терапевтических дозах, являясь их побочным эффектом, и поэтому их не относят к галлюциногенам
- В. Менее, чем у 0,01% лиц, принимающих их в терапевтических дозах, т.е. в редчайших случаях, что не позволяет относить их к галлюциногенам
- Г. Только, когда они употребляются в дозах, вызывающих нарушения дыхания и кровообращения и опасных для жизни

При развитии «резистентного» алкогольного делирия галоперидол вводят перорально, внутримышечно или внутривенно каждые 2-4 часа по мере необходимости в дозе (в микрограммах)

- А. 5-10
- Б. 4-6
- В. 1-2
- Г. 3-4

К диагностическим критериям острой интоксикации летучими растворителями относят

- А. Психомоторное возбуждение
- Б. Нарушение суждений
- В. Головную боль
- Г. Бессонницу

ВИЧ может размножаться

- А. Только в клетках иммунной системы
- Б. В эритроцитах
- В. В любых клетках организма человека
- Г. В сперматозоидах

К морфологическим признакам алкогольной болезни печени относят

- А. Макровезикулярный стеатоз
- Б. Эмболию поллой вены
- В. Тромбоз печеночной вены
- Г. Кариорексис ядер гепатоцитов

К центральным тормозящим эффектам морфина относят

- А. Задержку мочи
- Б. Миоз
- В. Депрессию дыхания
- Г. Запоры

Продукты метаболизма $\delta 9$ -thc можно обнаружить в моче в течение

- А. Не более 24 часов после прекращения курения
- Б. 10 Неделей после прекращения курения
- В. 2-3 Суток после прекращения курения
- Г. Не более недели после прекращения курения

Основу формирования всех типов зависимости составляют расстройства нейромедиации

- А. Аминокислот
- Б. Анандамида
- В. Катехоламинов
- Г. Серотонина

Первичное патологическое влечение к алкоголю характеризуется

- А. Потребностью в опьянении в трезвом состоянии
- Б. Стремлением к употреблению алкоголя в привычных, традиционных ситуациях
- В. Неудержимым желанием продолжить потребление алкоголя при наличии его в организме
- Г. Физической потребностью в потреблении алкоголя, несмотря на существующие препятствия

[Вернуться в начало](#)