

# Тесты с вопросами по специальности «Стоматология детская» для аттестации 1, 2 и высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ [medik-otvet.ru/product/detskii-stomatolog/](https://medik-otvet.ru/product/detskii-stomatolog/) ←

## Полезные ссылки

1) Тесты «Стоматология детская» для аккредитации и других экзаменов (3100 вопросов)

→ [medik-otvet.ru/product/stomatolog\\_detskii/](https://medik-otvet.ru/product/stomatolog_detskii/)

2) Тесты для аккредитации «Стоматология терапевтическая» (2700 вопросов)

→ [medik-otvet.ru/product/stomatolog\\_terapevt/](https://medik-otvet.ru/product/stomatolog_terapevt/)

**Обратите внимание:** вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

**Быстрый поиск:** нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

## Навигация по категориям

- [1 категория](#)
- [2 категория](#)
- [высшая категория](#)

## 1 категория

[Вернуться в начало](#)

**Заболевание, при котором прорезывается один зуб измененной формы:**

- А. Флюороз
- Б. системная гипоплазия
- В. местная гипоплазия
- Г. тетрациклиновые зубы
- Д. синдром Стентона-Капдепона

**Системная гипоплазия эмали постоянных зубов у детей развивается вследствие:**

- А. заболеваний матери во время беременности
- Б. травматических повреждений временных зубов
- В. нарушения состава микроэлементов в воде
- Г. болезней ребенка после рождения
- Д. множественного осложненного кариеса временных зубов

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и симптомом:**

**А) Обострение хронического гангренозного пульпита**

**Б) Обострение хронического периодонтита**

1. Боли постоянные, усиливающиеся от воздействия тёплых раздражителей
2. Изменен цвет коронки зуба
3. Переходная складка гиперемирована и болезненна при пальпации
4. Переходная складка инфильтрирована, возможна флюктуация
5. Зондирование пульпы зуба безболезненно
6. Зондирование болезненно в глубине полости зуба

А. А1236,Б245

Б. А245,Б1236

В. А126,Б345

Г. А345,Б126

Д. А123,Б456

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и соответствующей рентгенологической картиной:

А) Средний кариес

Б) Хронический гангренозный пульпит

В) Хронический гранулирующий периодонтит

1. Разволокнение кортикальной пластинки

2. Ослабление рисунка костных балочек в межкорневом пространстве

3. Остеопороз вокруг корня зуба

4. Нет видимых изменений

5. Остеомалация в межкорневом пространстве

6. Расширение периодонтальной щели

7. Остеосклероз вокруг корня зуба

А. А126,Б35,В47

Б. А35,Б4,В126

В. А4,Б126,В35

Г. А135,Б26,В4

Д. А76,Б4,В135

Установите правильную последовательность лечения декубитальной язвы слизистой оболочки нижней губы:

А) аппликации кератопластических средств

Б) аппликации растворами ферментов

В) устранение травмирующего слизистую оболочку фактора

Г) обезболивание слизистой оболочки топик-анестетиком

А. В,Г,Б,А

Б. Г,В,Б,А

В. В,А,Б,Г

Г. А,Б,Г,В

Д. Б,Г,В,А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом заболевания и причинным фактором:

А) Системная гипоплазия эмали.

Б) Дисплазия Капдепона

В) Флюороз

Г) Местная гипоплазия эмали

1. Хронический периодонтит временного зуба

2. Интоксикация фторидами

3. Заболевания, нарушающие минеральный обмен в период формирования эмали

4. Генетические факторы, болезни матери во время беременности

А. А1,Б2,В3,Г4

Б. А2,Б3,В4,Г1

В. А3,Б4,В2,Г1

Г. А3,Б4,В1,Г2

Д. А4,Б1,В2,Г3

Установите правильную последовательность стадий формирования корня зуба:

А) Стадия незакрытой верхушки

Б) Сформированный корень

В) Стадия закрытой верхушки зуба. Неоконченное формирование апикальной части периодонта

Г) Стадия несформированного корня

Д) Стадия несформированной верхушки

А. Д,Г,А,В,Б

Б. Г,Д,А,В,Б

В. А,В,Д,Г,Б

Г. Б,Д,А,Г,В

Д. В,Г,А,Б,Д

Глубокий кариес дифференцируют от:

А. среднего кариеса

Б. поверхностного кариеса

В. хронического фиброзного пульпита

Г. острого диффузного пульпита

Д. несовершенного амелогенеза

**Перечислите возрастные показания к пластике уздечки языка у детей с периода новорожденности до окончания роста и формирования лицевого отдела черепа:**

- А) нарушение прикуса**
- Б) нарушение речи**
- В) нарушение сосания и малая прибавка в весе**

А. АБВ  
Б. ВБА  
В. ВАБ  
Г. БВА  
Д. АВБ

**Непрямой массаж сердца с использованием двух рук проводят детям старше**

- А. трёх лет**
- Б. пяти лет**
- В. семи лет**
- Г. десяти лет**
- Д. двенадцати лет**

**Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами**

- А) острый гнойный периостит нижней челюсти одонтогенной этиологии**
  - Б) острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти**
- 1) общее состояние тяжелое**
  - 2) общее состояние средней тяжести**
  - 3) температура тела до 38°**
  - 4) подвижен причинный зуб**
  - 5) подвижны причинный и рядом расположенные зубы**
  - 6) поднадкостничные абсцессы с обеих сторон альвеолярного отростка**
  - 7) наличие окологлазничной флегмоны**
  - 8) септический характер температуры тела**

А. А 1,2,3,4 Б5,6,7,8  
Б. А5,6,7,8 Б1,2,3,4  
В. А2,3,4 Б1,5,6,7,8  
Г. А1,5,6,7,8 Б2,3,4  
Д. А1,3,5,7 Б2,4,6,8

**Кариес в стадии пятна дифференцируют от:**

- А. поверхностного кариеса**
- Б. деструктивной формы флюороза**
- В. эрозии эмали**
- Г. несовершенного амелогенеза**
- Д. бороздчатой формы системной гипоплазии**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. ЗАБОЛЕВАНИЕ

А) хронический лимфаденит в стадии обострения (абсцедирования)

Б) хронический гиперпластический лимфаденит КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

1) лимфоузел увеличен

2) кожа гиперемирована

3) лимфоузел подвижен

4) пальпация болезненная

5) наличие очага флюктуации

А. А1245, Б13

Б. А35 Б24

В. А125,Б34

Г. А34,Б125

Д. А35,Б124

Укажите правильную последовательность этапов при пломбировании композитами:

А) внесение пломбировочного материала

Б) нанесение бондинга

В) протравливание эмали

Г) наложение прокладки

Д) полирование пломбы

А. А,Г,Б,В,Д

Б. Б,А,В,Г,Д

В. Г,В,Б,А,Д

Г. В,Г,Д,А,Б

Д. Б,В,А,Д,Г

Установите соответствие последовательности действий. Этапы операции - удаление ретенционной кисты слюнной железы нижней губы

А) анестезия

Б) разрез,сепарация мягких тканей, выделение и экстирпация кисты

В) наложение швов

Г) оформление направления на патоморфологические исследование операционного материала

Д) холод местно

Е) противовоспалительная и гипосенсибилизирующая терапия

А. Б,Д,А,Е,В,Г

Б. А,Г,Б,Е,В,Д

В. А,Б,В,Д,Е,Г

Г. В,Г,Д,А,Е,Б

Д. Б,В,Г,А,Д,Е

**Возможные изменения при местной гипоплазии эмали:**

- А. облитерация полости зуба
- Б. пигментированное пятно на эмали
- В. «рифленные» зубы
- Г. поражение эмали всех моляров и фронтальных зубов
- Д. «гипсовые» зубы

**Препарат, действие которого наиболее эффективно при воспалительных процессах полости рта**

- А. Мепивакаин
- Б. Лидокаин
- В. Артикаин
- Г. Бупивакаин
- Д. Прокаин (новокаин)

**Для поверхностного обезболивания слизистой оболочки при язвенно-некротическом стоматите используется анестетик**

- А. Бупивакаин
- Б. Мепивакаин
- В. Артикаин
- Г. Прокаин (новокаин)
- Д. Лидокаин

**Географический язык характеризуется клиническими признаками:**

- А. нитевидные сосочки тёмного цвета резко увеличены в размере
- Б. неравномерная десквамация эпителия на спинке языка
- В. глубокие борозды, выстланные нормальным эпителием
- Г. гладкий «малиновый» язык
- Д. разрастание в центре языка в виде «цветной капусты»

**Для поверхностной анестезии слизистой оболочки у детей может применяться**

- А. мепивакин
- Б. тетракаин (дикаин)
- В. бупивакаин (маркаин)
- Г. анестезин (бензокаин)
- Д. артикаин

**Клиническая характеристика эмали при тетрациклиновых зубах:**

- А. окрашивание коронок зубов в желтый цвет
- Б. изменения цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки зуба
- В. симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации
- Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- Д. стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба

**При лечении полного вывиха временных зубов необходимо:**

- А. пломбирование корня зуба
- Б. реплантация зуба
- В. шинирование зуба на 3-4 недели
- Г. рациональное протезирование
- Д. динамическое наблюдение

**Индекс ИГР-У позволяет выявить наличие:**

- А. мягкого зубного налета
- Б. зубного камня
- В. мягкого зубного налета и зубного камня
- Г. воспаления в тканях пародонта
- Д. нуждаемость в лечении заболеваний пародонта

**Установите соответствие последовательности действий. Этапы оказания помощи ребенку 4 лет с неполным вывихом зуба**

**6.1:**

- А) щадящая диета**
- Б) рентгенологическое обследование**
- В) шинирование**
- Г) обезболивание**
- Д) противовоспалительная терапия**
- Е) репозиция зуба**

- А. Б,Г,Е,В,Д,А
- Б. Е,В,Б,А,Д,Г
- В. А,Г,Д,В,Е,Б
- Г. Г,Д,В,Е,Б,А
- Д. В,Б,Д,Г,Е,А

**Для временного пломбирования корневых каналов используют пасты на основе:**

- А. фенол-формалина
- Б. гидроокиси кальция
- В. эпоксидных смол
- Г. резорцин-формалина
- Д. гуттаперчи



**Клинические проявления, характерные для пиодермии:**

- А. пустулы, толстые соломенно-желтые корки на коже лица и красной каймы губ
- Б. единичные эрозии округлой формы, покрытые фибринозным налетом
- В. творожистый налет на слизистой оболочке губ, языка
- Г. эрозии неправильных очертаний
- Д. пузырьки на красной кайме губ и коже лица

**При пиодермии на красной кайме и коже губ обнаруживаются:**

- А. пустулы, толстые соломенно-желтые корки
- Б. эрозии, покрытые фибринозным налетом
- В. творожистый налет на слизистой оболочке губ и языка
- Г. прозрачные корочки, фиксированные в центре
- Д. полиморфные высыпания

**Установите соответствие последовательности действий. При переломе нижней челюсти справа у ребенка 11 лет проводятся следующие мероприятия:**

- А) антибактериальная терапия
- Б) клинико-рентгенологическое обследование
- В) щадящая диета
- Г) шинирование
- Д) общеукрепляющая терапия
- Е) обезболивание
- Ж) госпитализация

- А. Б,Е,Г,Ж,А,Д,В
- Б. Г,Ж,Д,В,Е,Б,А
- В. В,Б,Д,Г,Е,А,Ж
- Г. В,Ж,Г,Д,А,Е,Б
- Д. Б,А,Г,Ж,Д,В,Е

**Кровоточивость из корневого канала при лечении хронического гранулирующего периодонтита несформированного зуба объясняется:**

- А. обострением воспалительного процесса
- Б. врастанием грануляционной ткани в корневой канал
- В. травмой пульпы инструментом, имеющим агрессивную верхушку
- Г. нерациональным применением медикаментов
- Д. физиотерапевтическим воздействием

**Удаление сверхкомплектного зуба, располагающего в области зубов 11 21 и обуславливающего наличие диастемы следует производить в возрасте**

- А. 5-7 лет
- Б. 7-8 лет
- В. 8-9 лет
- Г. 9-10 лет
- Д. независимо от возраста сразу после диагностирования

**Образование дентина происходит за счет деятельности клеток:**

- А. амелобластов
- Б. цементобластов
- В. остеобластов
- Г. ретикулоцитов
- Д. одонтобластов

**Срок, в течении которого происходит полная костная регенерация в лунке после удаления постоянного зуба**

- А. 2-4 недели
- Б. 4-6 недель
- В. 6-8 недель
- Г. 2-3 месяца
- Д. 3-6 месяцев

**Предпочтительный метод лечения однокорневого зуба с несформированными корнями при хроническом фиброзном пульпите:**

- А. девитальная ампутация
- Б. девитальная экстирпация
- В. витальная ампутация
- Г. витальная экстирпация
- Д. биологический

**Апексификация определяется рентгенологически при благоприятном исходе лечения постоянных зубов с несформированными корнями:**

- А. глубокого кариеса
- Б. хронического фиброзного пульпита
- В. хронического гангренозного пульпита
- Г. хронического гранулирующего периодонтита
- Д. отлома части коронки с обнажением пульпы спустя 48 часов после травмы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между временными зубами и их минерализацией к моменту рождения:

А) Резцы

Б) Клыки

В) Моляры

1. Бугры

2. 1/2 коронки

3. Вся коронка, кроме пришеечной области

4. Жевательная поверхность

А. А1,Б2,В3

Б. А2,Б3,В1

В. А3,Б2,В1

Г. А3,Б2,В4

Д. А2,Б1,В2

Препарат, используемый для всех видов местной анестезии:

А. мепивакаин

Б. лидокаин

В. бензокаин (анестезин)

Г. прокаин (новокаин)

Д. артикаин

Форма пульпита, преобладающая в постоянных зубах у детей:

А. острый диффузный пульпит

Б. хронический фиброзный

В. хронический гангренозный

Г. хронический гипертрофический

Д. хронический в стадии обострения

Клиническая характеристика эмали зубов при системной гипоплазии:

А. окрашивание коронок зубов в желтый цвет

Б. изменения цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки зуба

В. симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации

Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации

Д. хрупкая, слущивающаяся эмаль

**Наиболее частой причиной пульпита во временных зубах является:**

- А. механическая травма пульпы
- Б. термическая травма пульпы
- В. химическая травма пульпы
- Г. инфицирование из кариозной полости
- Д. ретроградное инфицирование пульпы

**Гематогенный остеомиелит наблюдается чаще в области**

- А. нижней челюсти
- Б. верхней челюсти
- В. скуловой кости
- Г. теменной кости
- Д. височной кости

**Устранение грубых рубцовых деформаций мягких тканей лица у детей показано**

- А. через 1 – 2 мес. после заживления раны
- Б. через 4 – 5 мес. после заживления раны
- В. не ранее 18-летнего возраста
- Г. не ранее 6 месяцев после заживления раны
- Д. не позднее 1 мес. после момента травмы

**Установите соответствие между заболеванием и соответствующей клинко-рентгенологической картиной:**

**А) хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит**

**Б) хронический калькулезный сиаладенит**

**1) чередование периодов обострения с ремиссией**

**2) как правило поражается одна железа**

**3) боль перед или во время еды**

**4) на контрастной сиалограмме основной выводной проток расширен, вместо протоков 3-4 порядка округлые полости**

**5) на контрастной сиалограмме проток “разорван”, на остальном протяжении протоки резко расширены**

**6) частые обострения заболевания**

А. А1,2,3 Б4,5,6

Б. А4,5,6 Б1,2,3

В. А1,2,3,5 Б1,4,6

Г. А1,4,6, Б1,2,3,5

Д. А1,3,5 Б2,4,6

**Предложите порядок действий по оказанию неотложной помощи ребенку 7 лет при коллапсе:**

- А) очистить полость рта от инородных тел**
- Б) введение медикаментозных средств**
- В) прекращение операции**
- Г) освободить грудь, шею, живот от стесняющей одежды**
- Д) придать ребенку горизонтальное положение**
- Е) вызвать неотложную медицинскую помощь для госпитализации ребенка**

А. Б,В,Г,Д,А,Е,Б

Б. В,Д,Г,А,Б,Е

В. А,Г,Д,В,Е,Б

Г. Г,Д,В,Е,Б,А

Д. В,Б,Д,Г,Е,А

**Замедленное, поверхностное дыхание характерно для**

- А. сердечно-сосудистого коллапса**
- Б. анафилактического шока**
- В. обморока**
- Г. болевого шока**
- Д. эпилептического припадка**

**Укажите последовательность периодов течения ОГС:**

- А) катаральный**
- Б) высыпаний**
- В) продромальный**
- Г) угасания**

А. Г,В,А,Б

Б. В,А,Б,Г

В. А,Б,Г,В

Г. Б,Г,В,А

Д. А,Б,В,Г

**Для контроля качества чистоты канала используют:**

- А. фурацилин**
- Б. йодоформ**
- В. перекись водорода**
- Г. раствор ферментов**
- Д. хлорофиллипт**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между этиологией и заболеванием:

- А) Грибковая
- Б) Бактериальная
- В) Вирусная
- Г) Инфекционно-аллергическая

- 1. ОГС
- 2. Пиодермия
- 3. ХРАС
- 4. Герпангина
- 5. Кандидоз
- 6. МЭЭ
- А. А1,Б2,В14,Г36
- Б. А2,Б36,В14,Г5
- В. А1,Б14,В2,Г36
- Г. А5,Б2,В14,Г36
- Д. А1,Б2,В3,Г14

**Препарат, растворяющий некротические участки тканей в канале зуба:**

- А. перекись водорода
- Б. йодиол
- В. гипохлорит натрия
- Г. марганцево-кислый калий
- Д. хлорамин

**Тактика врача по оказанию неотложной помощи при остром периодонтите постоянного зуба:**

- А. препарирование кариозной полости и расширение устьевой части корневого канала
- Б. проведение резорцин-формалинового метода
- В. раскрытие полости зуба, удаление распада из канала, промывание канала растворами антисептиков, раскрытие верхушки корня
- Г. механическая и медикаментозная обработка канала с последующим пломбированием в это же посещение
- Д. удаление зуба

**К генерализованным заболеваниям пародонта приводят**

- А. аномалии прикрепления уздечек языка, губ
- Б. мелкое преддверие полости рта
- В. некоторые системные заболевания ребенка
- Г. частичная адентия
- Д. скученность зубов

**При остром гнойном периостите причинный постоянный многокорневой зуб**

- А. всегда удаляется
- Б. трепанируется и пломбируется
- В. пломбируется и производится резекция верхушки корня
- Г. удаляется при невозможности консервативного лечения
- Д. трепанируется и шинируется

**Установите правильную последовательность стадий минерализации коронки зуба:**

- А) Минерализация бугров коронки**
- Б) Закладка фолликула зуба**
- В) Минерализация дна полости зуба**
- Г) «Эмалевое кольцо»**
- Д) Минерализация стенок коронки зуба**
- Е) Минерализация шейки зуба**
- Ж) Формирование рогов полости зуба**

- А. А,Г,Ж,Д,В,Е,Б
- Б. Г,Ж,Д,В,Е,Б,А
- В. А,Б,В,Г,Д,Е,Ж
- Г. В,Ж,Г,Д,А,Е,Б
- Д. Б,А,Г,Ж,Д,В,Е

**Укажите препараты, применяемые в первые дни лечения ОГС:**

- А) противовирусные препараты**
- Б) противовоспалительные средства**
- В) кератопластические препараты**
- Г) обезболивающие препараты**

- А. А,Г
- Б. Б,В
- В. А,В
- Г. А,Б
- Д. А,Б,В,Г

**Укажите формулу зуба, для лечения которого у пациента 16 лет достаточно проведение инфильтрационной анестезии с анестетиком на основе артикаина**

- А. зуб 31
- Б. зуб 48
- В. зуб 37
- Г. зуб 46
- Д. зуб 38

**Деструктивная форма флюороза развивается при содержании фторидов в питьевой воде:**

- А. 0,5 мг/л
- Б. 1 мг/л
- В. 2-3 мг/л
- Г. 4-6 мг/л
- Д. 7-9 мг/л и выше

**Установите соответствие между методом анестезии и показаниями к их применению.**

**А. Интралигаментарная**

**Б. Инфильтрационная**

1. лечение кариеса;
2. лечение пульпита;
3. удаление зубов по поводу хронического апикального периодонтита (вне обострения);
4. депульпирование интактных зубов;
5. лечение пародонтита;
6. лечение острого апикального периодонтита.

- А. А 123456 Б1234
- Б. А 456 Б123
- В. А 1234, Б 123456
- Г. А 2346 Б1234
- Д. А 3456 Б1234

**При отсроченном лечении глубокого кариеса в постоянных зубах с незаконченными процессами минерализации на дно кариозной полости накладывают:**

- А. препараты, содержащие гидроксид кальция
- Б. некротизирующий препарат
- В. вазелин-глицериновую смесь
- Г. мумифицирующий препарат
- Д. изолирующую прокладку

**Истинной доброкачественной опухолью является**

- А. глобуломаксиллярная киста
- Б. синдром Олбрайта
- В. оссифицирующая фиброма
- Г. травматическая костная киста
- Д. херувизм

**Болезненное зондирование в глубине полости зуба характерно для пульпита:**

- А. острого очагового
- Б. острого диффузного
- В. хронического фиброзного
- Г. хронического гангренозного
- Д. хронического гипертрофического



**Для дезинфекции корневых каналов применяют:**

- А. 0,02% раствор перманганата калия
- Б. 70%спиртовой раствор
- В. дистиллированную воду
- Г. 3 % гипохлорит натрия
- Д. раствор бриллиантового зеленого

**Установите правильную последовательность обследования пациента при заболеваниях пародонта:**

- А) установление предварительного диагноза
- Б) выяснение жалоб и анамнеза заболевания
- В) установление окончательного диагноза
- Г) составление плана лечения
- Д) внешний осмотр и осмотр полости рта
- Е) специальные методы исследования

- А. Б,Д,А,Е,В,Г
- Б. А,Г,Б,Е,В,Д
- В. Б,А,Е,В,Г,Д
- Г. В,Г,Д,А,Е,Б
- Д. Б,В,Г,А,Д,Е

**Патогномоничным рентгенологическим симптомом хронического неспецифического паренхиматозного паротита является**

- А. сужение основного выводного протока
- Б. тень конкремента в области выводного протока
- В. наличие округлых полостей вместо протоков III – IV порядка
- Г. сужение всех протоков
- Д. расширение всех протоков

**При атопическом (экзематозном) хейлите целесообразно рекомендовать:**

- А. антибактериальную терапию
- Б. гипосенсибилизирующую терапию
- В. антигрибковую терапию
- Г. противовирусную терапию
- Д. антисептическую обработку

**Для хронического рецидивирующего афтозного стоматита (ХРАС) характерны:**

- А. множественные пузырьковые высыпания, в том числе на красной кайме губ
- Б. острый катаральный гингивит
- В. афты округлой или овальной формы, покрытые фибринозным налетом
- Г. пузыри на разных участках слизистой оболочки рта
- Д. разлитая эритема, уртикарная сыпь

Установите правильную последовательность обработки и импрегнации поверхностного кариеса во временных зубах:

- А) механическая обработка пораженной поверхности ручными инструментами
- Б) очищение зуба от налета
- В) изоляция от слюны
- Г) изоляция десневого края
- Д) высушивание
- Е) импрегнация раствора нитрата серебра

А. Б,В,Г,А,Д,Е

Б. Г,Б,Е,В,А,Д

В. А,Г,Б,Е,В,Д

Г. Б,А,Е,В,Г,Д

Д. В,Г,Д,А,Е,Б

Распределите пломбировочные материалы по мере уменьшения их эстетических свойств:

- А) стеклоиономерные цементы
- Б) цементы
- В) компомеры
- Г) композиты

А. В,А,Б,Г

Б. Г,В,А,Б

В. А,Б,Г,В

Г. Б,Г,В,А

Д. А,Б,В,Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между возрастом и прорезавшимися зубами:

- А) Конец первого года
- Б) Конец второго года
- В) К 2,5 - 3 годам
- 1. Все временные зубы
- 2. Все временные и первые постоянные моляры
- 3. Только нижние центральные временные резцы
- 4. Все временные резцы
- 5. Временные резцы, клыки и первые моляры

А. А4,Б5,В1

Б. А5,Б1,В4

В. А1,Б4,В5

Г. А4,Б3,В2

Д. А2,Б2,В3

**При лечении зуба методом высокой ампутации на оставшуюся часть корневой пульпы воздействуют лекарственными веществами с целью:**

- А. прекращения воспалительного процесса
- Б. прекращения воспалительного процесса и обеспечения дальнейшего формирования корня
- В. обеспечения дальнейшего формирования зуба
- Г. прекращения дальнейшего формирования корня
- Д. ускорения формирования корня

**К первично-костным заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава относится**

- А. острый артрит
- Б. неоартроз
- В. привычный вывих
- Г. хронический артрит
- Д. юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

**Успех лечения травматических эрозий и декубитальных язв определяет:**

- А. выбор обезболивающих средств
- Б. устранение травмирующего слизистую оболочку фактора
- В. применение определенных дезинфицирующих средств
- Г. применение определенных кератопластических средств
- Д. применение определенных антибактериальных средств

**Очаговая деминерализация выявляется методом витального окрашивания при:**

- А. эрозии эмали
- Б. белом кариозном пятне
- В. пятнистой форме гипоплазии
- Г. пигментированном кариозном пятне
- Д. флюорозе

**Наиболее частая локализация переломов нижней челюсти по типу “зеленой ветки” это**

- А. угол нижней челюсти
- Б. мышечковый отросток
- В. подбородочный отдел нижней челюсти
- Г. тело нижней челюсти
- Д. венечный отросток

**Для протравливания эмали перед постановкой композиционных материалов используют раствор кислоты:**

- А. 10% малеиновой
- Б. 20% ортофосфорной
- В. 70% соляной
- Г. 37% ортофосфорной
- Д. 9% уксусной

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. РЕБЕНКУ 7 ЛЕТ, ДИАГНОЗ**

**А) перелом обоих мышечковых отростков нижней челюсти**

**Б) перелом левого мышечкового отростка нижней челюсти ВИД ШИНЫ И ФИКСАЦИИ**

**1) пластмассовая зубонадесневая шина на нижнюю челюсть с пелотом слева**

**2) пластмассовая зубонадесневая шина на нижнюю челюсть с пелотом справа**

**3) проволочные шины с зацепными петлями на обе челюсти с межчелюстной фиксацией**

**4) моноблок на область жевательных зубов справа**

**5) 2 моноблока на жевательные зубы с обеих сторон**

А. А134,Б25

Б. А3,5 Б2,4

В. А125,Б34

Г. А34,Б125

Д. А35,Б124

**Причины несовершенного дентиногенеза:**

- А. болезни матери в I половине беременности
- Б. болезни матери в II половине беременности
- В. болезни ребенка в первые годы жизни
- Г. травматические повреждения зубов
- Д. генетические факторы

**Для кариозного процесса у детей до 3 лет характерно:**

- А. циркулярный и плоскостной кариес
- Б. локализация полостей на контактных поверхностях
- В. поражение бугров моляров
- Г. медленное течение процесса
- Д. тенденция к стабилизации

**Укажите, какие инструменты используются для расширения корневого канала зуба:**

- А. пульпоэкстрактор
- Б. корневая игла
- В. ример
- Г. Н-файл
- Д. плаггер

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и соответствующей рентгенологической картиной:**

- А) Средний кариес
- Б) Хронический гангренозный пульпит
- В) Хронический фиброзный периодонтит
- 1. Разволокнение кортикальной пластинки
- 2. Ослабление рисунка костных балочек в межкорневом пространстве
- 3. Остеопороз вокруг корня зуба
- 4. Нет видимых изменений
- 5. Остеомаляция в межкорневом пространстве
- 6. Расширение периодонтальной щели
- 7. Остеосклероз вокруг корня зуба

- А. А126,Б35,В47
- Б. А4,Б167,В136
- В. А4,Б126,В35
- Г. А735,Б26,В4
- Д. А26,Б4,В135

**Установите соответствие последовательности действий. Этапы удаления постоянного зуба:**

- А) кюретаж
- Б) отсепаровка круговой связки зуба
- В) продвижение щечек щипцов
- Г) фиксация щечек щипцов
- Д) наложение щечек щипцов
- Е) вывихивание (вращение) зуба
- Ж) сближение краев лунки
- З) извлечение зуба из лунки

- А. Б,Д,В,Г,Е,З,А,Ж
- Б. З,В,Д,Г,А,Б,Е
- В. А,Г,Ж,Д,В,Е,Б,З
- Г. Г,Ж,З,Д,В,Е,Б,А
- Д. В,Б,Д,Г,Е,А,З,Ж

**Обтурационную асфиксию у ребёнка купируют**

- А. переворачиванием пациента вниз головой и энергичным встряхиванием
- Б. поколачиванием раскрытой ладонью в области межлопаточного пространства
- В. инструментально удаляя инородное тело из-за корня языка
- Г. приёмом Геймлиха
- Д. удаляя инородное тело гортанными щипцами при ларингоскопии

**При частичной пульпотомии на рану наносят препараты содержащие**

- А. эвгенол
- Б. тимол
- В. гидроокись кальция
- Г. хлоргексидин
- Д. глюкокортикоиды

**Развитие тканей периодонта заканчивается после завершения роста корня зуба через:**

- А. месяц
- Б. 6 – 9 месяцев
- В. 1 – 2 года
- Г. 3-6 месяцев
- Д. 4 года

**Установите соответствие между заболеванием и соответствующей клинικο-рентгенологической характеристикой:**

- А) периостит острый
  - Б) периостит хронический
  - В) остеомиелит острый
  - 1) серозный
  - 2) деструктивный
  - 3) гнойный
  - 4) гиперпластический
  - 5) оссифицирующий
  - 6) деструктивно-продуктивный
  - 7) простой
- А. А1,3 Б5,7 В2,4,6
  - Б. А5,7 Б1,3 В1,2,4,6
  - В. А1,2,4,6 Б1,3 В5,7
  - Г. А1,3 Б1,2,4,6 В5,7
  - Д. А2,5,7 Б1,3 В4,6

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и возрастом пациента:

А) ОГС

Б) Афты Беднара

В) ХРАС

Г) МЭЭ

1. Первые месяцы жизни

2. Ясельный

3. Дошкольный

4. Подростковый

А. А1,Б2,В4,Г3

Б. А1,Б4,В3,Г2

В. А3,Б1,В4,Г2

Г. А2,Б1,В4,Г4

Д. А4,Б2,В3,Г1

Установите соответствие последовательности действий. Основные этапы проведения операции - цистотомии одонтогенной воспалительной кисты нижней челюсти справа с удалением причинного зуба

8.5

А) удаление причинного зуба

Б) удаление наружной стенки кисты

В) наложение давящей повязки

Г) анестезия

Д) проведение трапецевидного разреза

Е) сглаживание острых костных краев

Ж) удаление кортикальной пластинки

З) отсепаровка слизисто-надкостничного лоскута

И) тампонада полости йодоформным тампоном

А. В,Ж,Г,Д,А,И,Е,Б

Б. Г,А,Д,З,Ж,Б,Е,И

В. А,И,Г,Ж,Д,В,Е,Б

Г. Г,Ж,И,Д,В,Е,Б,А

Д. В,Б,Д,Г,Е,А,Ж,И

**Реминерализация – это:**

А. частичное восстановление плотности поврежденной эмали

Б. потеря кальция, фосфора, магния из поврежденного подповерхностного участка эмали

В. увеличение частоты приема углеводов

Г. разрушение структуры эмали под действием органических кислот

Д. выход минеральных компонентов из кристаллической решетки

**При хроническом фиброзном периодонтите воспалительный процесс локализуется:**

- А. в периодонте
- Б. в кости и альвеоле
- В. поднадкостнично
- Г. в костной ткани челюсти
- Д. в прилежащих мягких тканях

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клетками зубного зачатка и тканью зуба:**

**А) Амелобласты (энамелобласты)**

**Б) Цементобласты**

**В) Одонтобласты**

**1. Периодонт**

**2. Дентин**

**3. Костная ткань альвеолы зуба**

**4. Эмаль**

**5. Цемент**

А. А1,Б2,В3

Б. А5,Б4,В1

В. А4,Б5,В2

Г. А4,Б2,В5

Д. А3,Б4,В2

**Пульс у пациента без сознания определяют над проекцией**

- А. лучевой артерии
- Б. плечевой артерии
- В. наружной сонной артерии
- Г. локтевой артерии
- Д. общей сонной артерии



**Установите соответствие последовательности действий. Этапы операции- пластика нижнего свода преддверия полости рта (вестибулопластика)**

**А) отслойка слизистого лоскута**

**Б) анестезия**

**В) разрез**

**Г) укладка и фиксация слизистого лоскута**

**Д) скелетирование наружной кортикальной пластинки**

**Е) давящая повязка**

**Ж) противовоспалительная и гипосенсибилизирующая терапия**

**З) холод местно**

А. В,Ж,Г,Д,А,Е,Б

Б. Б,В,А,Д,Г,Е,З,Ж

В. А,Г,Ж,Д,В,Е,Б

Г. Г,Ж,Д,В,Е,Б,А

Д. В,Б,Д,Г,Е,А,Ж

**Внутриротовое стоматологическое обследование включает в себя осмотр:**

А. задней стенки глотки, подчелюстных лимфатических узлов, переходной складки

Б. ретромолярной области, проекции гайморовых пазух, подчелюстных лимфатических узлов

В. слизистой оболочки полости рта, предверия полости рта, уздечек верхней и нижней губы

Г. предверия полости рта, уздечек верхней и нижней губы, слизистой оболочки полости рта, тканей пародонта, зубов, определение вида прикуса

Д. кожных покровов лица, слизистой оболочки преддверия полости рта, определение прикуса

**Для ускорения заживления элементов ХРАС применяют:**

А. флореналевую мазь

Б. масло шиповника

В. мазь клотримазол

Г. мазь ацикловир

Д. бутадионовую мазь

**Очаг деструкции костной ткани у верхушки корня сформированного постоянного зуба с нечеткими границами выявляется при:**

А. кистогранулемы

Б. хроническом фиброзном периодонтите

В. хроническом гранулирующем периодонтите

Г. хроническом гранулематозном периодонтите

Д. радикулярной кисте

**Рентгенологические критерии эффективности лечения пульпита в несформированных зубах методом витальной пульпотомии:**

- А. апексогенез
- Б. апексификация
- В. остеомалация
- Г. остеосклероз
- Д. остеопороз

**При кандидозе на слизистой оболочке полости рта выявляется:**

- А. белый творожистый налет
- Б. фибринозный налет
- В. папулы округлой или овальной формы
- Г. «пятна» Филатова-Коплика
- Д. уртикарная сыпь

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие цели применения:**

- А) КПУ
- Б) ОНI-S
- В) СРITN
- Г) кп
- Д) РМА

1. Оценка интенсивности кариеса временных зубов
2. Оценка интенсивности кариеса постоянных зубов
3. Оценка нуждаемости в лечении заболеваний пародонта
4. Оценка интенсивности и распространенности воспалительной реакции тканей пародонта
5. Количественная оценка зубного налета и зубного камня

- А. А1,Б2,В3,Г4,Д5
- Б. А2 Б5 В3 Г1 Д4
- В. А3,Б1,В2,Г5,Д4
- Г. А4,Б3,В1,Г2,Д5
- Д. А5,Б4,В5,Г3,Д1

**Установите соответствие последовательности действий. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КРЕСЛЕ**

- А) искусственное дыхание**
- Б) наружный массаж сердца**
- В) придание ребенку горизонтального положения**
- Г) очистить полость рта от рвотных масс**
- Д) растирание спиртовым раствором**

А. В,Г,Д,А,Б

Б. В,Д,Г,А,Б

В. В,Г,Б,А,Д

Г. А,Г,Б,В,Д

Д. А,Б,В,Д,Г

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между временными зубами и сроками формирования корней:**

- А) Резцы**
- Б) Клыки**
- В) Моляры**
- 1. Концу первого года**
- 2. Двум годам**
- 3. Четырём годам**
- 4. Пяти годам**
- 5. Шести годам**

А. А4,Б3,В2

Б. А3,Б2,В4

В. А2,Б4,В3

Г. А1,Б4,В5

Д. А5,Б1,В2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими лечением.

- А) острый паротит новорожденного  
Б) обострение хронического рецидивирующего паренхиматозного паротита  
В) острый калькулезный сиалоаденит
- 1) антибактериальное  
2) противовоспалительное  
3) десенсибилизирующее  
4) йодид калия внутрь  
5) инстиляция протеолитических ферментов, антибиотиков  
6) хирургическое (при неэффективности консервативного)  
7) гипербарическая оксигенация

- А. А1,2,3,4 Б1,2,3,4,5,7 В1,2,3,4,6  
Б. А1,2,3,4,6 Б1,2,3,4,5,7 В1,2,3,4  
В. А1,2,3,4,5,7 Б1,2,3,4 В1,2,3,4,6  
Г. А1,3,6 Б2,4,5 В1,2,5,7  
Д. А2,4,5 Б1,3,6 В1,2,5,7

Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами

- А) нейрофиброматоз  
Б) лимфангиома
- 1) нестабильность размеров  
2) нарушение эндокринной системы  
3) макродентия  
4) пигментные пятна на коже  
5) склонность к воспалению на фоне ОРВИ  
6) наличие болезненных плотных тяжей в толще опухоли

- А. А2346 Б15  
Б. А123 Б456  
В. А456 Б123  
Г. А15 Б234  
Д. А124 Б356

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеваниями и общим состоянием и самочувствием. Заболевания:

А) ОГС;

Б) ХРАС;

В) МЭЭ;

Г) Стрепто-стафилодермия;

Д) Хроническая травма слизистой рта. Общее состояние и самочувствие:

1. Не страдает;

2. Головная боль, боль в суставах, мышцах;

3. Температура тела нормальная;

4. Температура тела повышена;

5. Прием пищи не нарушен;

6. Прием пищи болезненный.

А. А5,Б2,В14,Г36,Д65

Б. А46,Б136,В246,Г46,Д136

В. А6,Б2,В15,Г36,Д4

Г. А5,Б2,В14,Г3,Д6

Д. А3,Б2,В5,Г34,Д12

**При вторичном деформирующем остеоартрозе правого височно-нижнечелюстного сустава средняя линия подбородка**

А. смещена влево

Б. смещена вправо

В. не смещена

Г. не определяется

Д. деформирована

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и применяемой мазью для лечения:

А) Пиодермия

Б) ОГС

В) Молочница

1. Ацикловир

2. Неомициновая

3. Оксолиновая

4. Клотримазол

5. Гиоксизон

6. Алпизарин

7. Нистатиновая

8. Канестен

А. А136,Б25,В478

Б. А478,Б136,В25

В. А25,Б136,В478

Г. А15,Б836,В247

Д. А247,Б836,В15

Установите правильную последовательность лечения глубокого кариеса постоянных зубов:

А) полирование

Б) препарирование кариозной полости

В) обезболивание

Г) наложение лечебной прокладки

Д) антисептическая обработка

Е) пломбирование

Ж) нанесение защитного лака

А. А,Г,Ж,Д,В,Е,Б

Б. Г,Ж,Д,В,Е,Б,А

В. В,Б,Д,Г,Е,А,Ж

Г. В,Ж,Г,Д,А,Е,Б

Д. Б,А,Г,Ж,Д,В,Е

Дентин при активном течении кариеса:

А. светлый, влажный, легко удаляется экскаватором

Б. светлый, влажный, удаляется экскаватором с трудом

В. пигментированный, легко удаляется экскаватором

Г. пигментированный, удаляется экскаватором с трудом

Д. светлый, при зондировании плотный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. **УДАЛЯЕМЫЕ ЗУБЫ**

- А) третьи большие коренные верхней челюсти  
Б) большие коренные нижней челюсти  
В) резцы верхней челюсти **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЩИПЦЫ**

- 1) S-образно изогнутые без шипика  
2) S-образно изогнутые с шипиком  
3) прямые несходящиеся  
4) байонетные  
5) клювовидные без шипиков, изогнутые по ребру  
6) клювовидные с шипиками, изогнутые по ребру

- А. А3 Б2 В4  
Б. А2,Б4,В6  
В. А4,Б3,В2  
Г. А6,Б4,В5  
Д. А4 Б6 В3,4

**Для сухой формы эксфолиативного хейлита характерно:**

- А. застойная гиперемия на красной кайме  
Б. прозрачные чешуйки, плотно фиксированные в центре и приподнятые по краям  
В. эрозии округлой формы  
Г. афты  
Д. папулы округлой или овальной формы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и предпочтительным исходом формирования корня:

- А) Хронический фиброзный пульпит  
Б) Хронический гранулирующий периодонтит  
В) Хронический гангренозный пульпит

1. Апексификация  
2. Апексогенез

- А. А1,Б2,В2  
Б. А1,Б1,В2  
В. А2,Б2,В1  
Г. А2,Б1,В2  
Д. А1,Б2,В1

**Направление, в котором преимущественно происходит рост воспалительных корневых кист от временных моляров нижней челюсти**

- А. в направлении ветви челюсти
- Б. в вестибулярном направлении
- В. в оральном направлении
- Г. в направлении подбородка
- Д. в направлении края тела нижней челюсти

**Для измерения длины корневых каналов используют аппарат:**

- А. «Пьезон-Мастер»
- Б. «Диагност»
- В. Апекслокатор
- Г. Глубиномер
- Д. Визиограф

**Цистэктомия с радикальной гайморотомией показана при кистах от временных зубов верхней челюсти**

- А. оттесняющих или проникающих в верхнечелюстную пазуху
- Б. при небольших кистах (менее 1,5 см)
- В. при кистах прилегающих к верхнечелюстной пазухе
- Г. при нагноившихся кистах
- Д. при рецидиве кисты

**Основной фактор возникновения кандидоза у детей грудного возраста:**

- А. дисбактериоз
- Б. острая или хроническая травма
- В. гиповитаминоз
- Г. нарушение режима кормления
- Д. дефицит веса при рождении ребёнка

**При проведении метода частичной пульпотомии необходимо:**

- А. иссечь только твердые ткани зуба с последующим прямым наложением препаратов гидроокиси кальция на обнаженную пульпу
- Б. иссечь небольшой участок поверхностно инфицированной ткани пульпы с последующим прямым наложением препаратов гидроокиси кальция на обнаженную пульпу
- В. иссечь коронковую пульпу с последующим прямым наложением препаратов гидроокиси кальция на обнаженную пульпу
- Г. иссечь коронковую и часть корневой пульпы с последующим прямым наложением препаратов гидроокиси кальция на обнаженную пульпу
- Д. удалить пульпу полностью



**Установите правильную последовательность лечения среднего кариеса временных зубов:**

- А) нанесение защитного лака**
- Б) обезболивание**
- В) препарирование кариозной полости**
- Г) нанесение кондиционера**
- Д) антисептическая обработка**
- Е) полирование**
- Ж) пломбирование СИЦ**

А. Г,Б,Е,Ж,В,А,Д

Б. А,Г,Б,Е,В,Д,Ж

В. Б,А,Ж,Е,В,Г,Д

Г. В,Г,Д,А,Ж,Е,Б

Д. Б,В,Г,А,Д,Ж,Е

**Отличительным клиническим признаком фолликулярной кисты является**

- А. отсутствие в зубной дуге постоянного зуба при наличии всех прорезавшихся**
- Б. наличие "причинного" зуба**
- В. гиперемия слизистой оболочки**
- Г. округлый очаг разрежения костной ткани с нечеткими границами при рентгенологическом обследовании**
- Д. быстро прогрессирующая деформация альвеолярного отростка**

**Кариеспрофилактическим действием обладают пасты:**

- А. гигиенические**
- Б. противовоспалительные**
- В. фторидсодержащие**
- Г. отбеливающие**
- Д. десенситайзеры**

**Установите соответствие последовательности действий. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ОСЛОЖНЕНИИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ЗУБА (АЛЬВЕОЛИТЕ) ВКЛЮЧАЕТ**

- А) струйное промывание растворами антисептиков**
- Б) нежный кюретаж лунки**
- В) введение в лунку антисептиков, антибактериальных препаратов**
- Г) обезболивание**
- Д) физиотерапевтические процедуры**
- Е) тугая тампонада лунки йодоформным тампоном**

А. В,Г,Д,А,Е

Б. Г,Б,А,В,Д

В. Г,В,Б,А,Д

Г. А,Г,Б,В,Д

Д. А,Б,В,Д,Е

**Предпочтительный метод лечения хронического гангренозного пульпита однокорневого временного зуба со сформированным корнем**

- А. девитальная ампутация
- Б. витальная экстирпация
- В. девитальная экстирпация
- Г. витальная ампутация
- Д. высокая ампутация

**Комплекс мер, направленных на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний и сохранение стоматологического здоровья населения:**

- А. Асептика
- Б. Антисептика
- В. Первичная профилактика
- Г. Вторичная профилактика
- Д. Дезинфекция

**Для удаления временных клыков верхней челюсти рекомендуются щипцы**

- А. байонетные
- Б. прямые
- В. S-образно изогнутые
- Г. клювовидные с несходящимися щечками
- Д. клювовидные со сходящимися щечками

**Этиология герпангины:**

- А. Грибковая
- Б. Инфекционная
- В. Инфекционно-аллергическая
- Г. Вирусная
- Д. Аллергическая

**Пришеечная область временных резцов минерализуется:**

- А. до рождения ребенка
- Б. в первые недели после рождения
- В. в первом полугодии первого года жизни
- Г. минерализация не происходит
- Д. после окончания формирования корня

**Установите соответствие последовательности действий. Перечислите этапы удаления временного зуба:**

- А) фиксация щечек щипцов**
- Б) анестезия**
- В) наложение щечек щипцов**
- Г) сближение краев лунки**
- Д) извлечение зуба из лунки**
- Е) кюретаж лунки**

- А. Б,В,А,Д,Г**
- Б. В,Б,А,Д,Г**
- В. А,Г,Д,В,Б**
- Г. Г,Д,В,Б,А**
- Д. Б,В,А,Д,Е,Г**

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методом лечения и заболеванием:**

- А) Витальная ампутация**
- Б) Высокая ампутация**
- 1. Все формы пульпита во временных молярах независимо от степени их развития**
- 2. Отлом коронки с обнажением пульпы в постоянных несформированных резцах спустя 48 ч после травмы**
- 3. Все формы пульпита в несформированных постоянных молярах**
- 4. Хронический гангренозный пульпит в несформированных постоянных однокорневых зубах**
- 5. Плоскостная форма среднего и глубокого кариеса молочных зубов, исключая фиксацию пломбы**
- 6. Хронический фиброзный пульпит в постоянных несформированных однокорневых зубах**
- 7. Отлом коронки с обнажением пульпы в течение первых 48 час**

- А. А24,Б567**
- Б. А56,Б247**
- В. А567,Б24**
- Г. А247,Б56**
- Д. А367,Б1245**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и клиническими проявлениями:

**А) Флюороз**

**Б) Несовершенный амелогенез**

**В) Местная гипоплазия эмали**

**1. Пигментированное пятно и углубление в эмали**

**2. Белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации**

**3. Случивание эмали с обнажением дентина на всех зубах**

**4. Множественные пятна у шеек многих зубов**

А. А1,Б2,В3

Б. А2,Б3,В4

В. А2,Б3,В1

Г. А3,Б4,В1

Д. А4,Б1,В2

**Для выявления кариозных пятен методом окрашивания применяют:**

А. раствор Шиллера-Писарева

Б. раствор йодистого калия

В. 2% раствор метиленового синего

Г. бриллиантовый зеленый

Д. раствор Боровского-Волкова

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и клиническими проявлениями:

**А) Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ)**

**Б) Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС)**

**В) Травматическая эрозия**

**1. Единичные эрозии округлой или овальной формы**

**2. Эрозии неправильной формы, слабая гиперемия**

**3. Массивные кровяные корки на красной кайме губ, папулы на коже**

А. А1,Б2,В3

Б. А2,Б3,В1

В. А2,Б1,В3

Г. А3,Б2,В1

Д. А3,Б1,В2

**При несовершенном амелогенезе имеются нарушения в строении:**

- А. только дентина
- Б. только эмали
- В. эмали и дентина
- Г. пульпы
- Д. периодонта

**При ушибе зуба на рентгенограмме периодонтальная щель:**

- А. расширена
- Б. сужена
- В. не изменена
- Г. отсутствует
- Д. неравномерно изменена

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой повреждения СОПР и повреждающим агентом:**

- А) Термический ожог**  
**Б) Лучевой ожог**  
**В) Фотохимический ожог**
- 1. УФ-излучение**
  - 2. Лазерное излучение**
  - 3.  $\alpha$ -излучение**
  - 4.  $\gamma$ -излучение**
  - 5. Температура воды 40°C – 45°C**
  - 6. Температура воды 50°C – 60°C**
- А. А34,Б12,В126  
Б. А126,Б34,В12  
В. А12,Б34,В126  
Г. А54,Б23,В16  
Д. А23,Б16,В54

**Частоту дыхания подсчитывают за период времени, составляющей не менее**

- А. 20 секунд
- Б. 30 секунд
- В. 60 секунд
- Г. 90 секунд
- Д. 120 секунд

**Перелом корня в верхней трети сопровождается:**

- А. болью от химических раздражителей
- Б. самопроизвольной болью
- В. подвижностью зуба II-III степени
- Г. наличием характерных изменений на рентгенограмме
- Д. безболезненной перкуссией

**Врожденный сифилис в полости рта может проявиться в виде:**

- А. узелков синюшного цвета, выделяющих казеозное содержимое
- Б. папул овальной или округлой формы
- В. эрозий с фестончатыми краями
- Г. пустулы, толстые соломенно-желтые корки
- Д. эрозии, покрытые фибринозным налетом

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью болезненности эрозий и заболеванием:**

**А) Слабая или отсутствует**

**Б) Сильная**

**1. ОГС**

**2. Пиодермия**

**3. Хроническая травма СОПР**

**4. ХРАС**

**5. МЭЭ**

А. А123,Б45

Б. А1245,Б3

В. А3,Б1245

Г. А45,Б123

Д. А234,Б15

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между элементом на слизистой оболочки и заболеванием:

- А) Пустулы, толстые соломенно-желтые корки  
Б) Одиночные эрозии округлой формы, покрытые фибринозным налетом  
В) Творожистый налет на слизистой оболочке губ, языка  
Г) Эрозии неправильных очертаний

1. Травматические повреждения

2. ХРАС

3. Кандидоз

4. Пиодермия

5. ОГС

А. А1,Б2,В1,Г3

Б. А2,Б3,В4,Г5

В. А4,Б2,В3,Г5

Г. А1,Б1,В2,Г3

Д. А5,Б2,В4,Г3

**Локализация изменений на коронке зуба при системной гипоплазии эмали зависит**

- А. от срока прорезывания  
Б. от возраста, в котором ребенок перенес заболевание  
В. от соматического здоровья ребенка  
Г. от длительности воздействия повреждающего фактора  
Д. от силы воздействия повреждающего фактора

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

- А) местное  
Б) общее АМБУЛАТОРНАЯ ОПЕРАЦИЯ  
1) вскрытие поднадкостничного абсцесса у ребенка до 3 лет  
2) удаление зуба у ребенка 6 лет  
3) срочная множественная санация зубов  
4) вскрытие флегмоны  
5) удаление ретенционной кисты

А. А134,Б25

Б. А2,5 Б1,3,4

В. А125,Б34

Г. А34,Б125

Д. А35,Б124

**Образование дентина происходит за счет деятельности клеток**

- А. Амелобластов
- Б. Цементобластов
- В. Остеобластов
- Г. Ретикулоцитов
- Д. Одонтобластов

**Установите правильную последовательность при обследовании пациента с кариесом и его осложнениями:**

- А) Выяснение жалоб и анамнеза заболевания
- Б) Постановка предварительного диагноза
- В) Составление плана лечения
- Г) Внешний осмотр и осмотр полости рта
- Д) Постановка окончательного диагноза
- Е) Дополнительные методы исследования

- А. Г,Б,Е,В,А,Д
- Б. А,Г,Б,Е,Д,В
- В. Б,А,Е,В,Г,Д
- Г. В,Г,Д,А,Е,Б
- Д. Е,Б,В,А,Д,Г

**При неполном вывихе временных резцов и подвижности первой степени у ребенка 5-ти лет рекомендуется**

- А. аккуратная репозиция, обеспечение покоя, наблюдение
- Б. зубы трепанировать, запломбировать до верхушек корней
- В. репозиция зубов, их фиксация, наблюдение
- Г. удаление зубов
- Д. ортодонтическое лечение

**Клиническая картина при полном вывихе временного или постоянного зуба:**

- А. укорочение видимой части коронки
- Б. увеличение видимой части коронки
- В. лунка зуба пустая
- Г. смещение коронки в сторону
- Д. видимых изменений нет

**Факторы, влияющие на развитие системной гипоплазии эмали постоянных зубов**

- А. болезни матери во II половине беременности
- Б. болезни ребенка после рождения, нарушение режима питания ребенка
- В. множественное поражение временных зубов осложненным кариесом
- Г. болезни матери в I половине беременности
- Д. травматическое повреждение временных зубов



**Причиной пульпита в постоянных резцах с несформированными корнями чаще является:**

- А. перелом части коронки зуба
- Б. нарушение техники препарирования кариозной полости
- В. инфицирование из кариозной полости
- Г. наследственная предрасположенность
- Д. ретроградное инфицирование пульпы

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между изменениями толщины твердых тканей зуба с увеличением возраста ребенка и тканью зуба:**

**А) Эмаль**

**Б) Дентин**

**1. Увеличивается в результате продолжения функции клеток, образующих ткани**

**2. Уменьшается в результате физиологического стирания**

**3. Не изменяется**

А. А1,Б2

Б. А1,Б3

В. А2,Б1

Г. А2,Б3

Д. А2,Б2

**При отломе коронки в пределах эмали во временных зубах (с несформированными и сформированными корнями):**

- А. реминерализирующая терапия
- Б. наблюдение за состоянием пульпы
- В. реставрация коронки цементными пломбами
- Г. реставрация коронки композитными пломбами
- Д. сошлифовывание острых краев дефекта, покрытие фторлаком и наблюдение за состоянием пульпы

**Для одновременного выключения нижнелуночкового, щечного и язычного нервов применяется анестезия**

- А. у большого небного отверстия
- Б. мандибулярная
- В. туберальная
- Г. торусальная
- Д. инфраорбитальная

**«Дентинный мост» - это:**

- А. равномерное отложение дентина на стенках корня
- Б. образование слоя дентина в области раневой поверхности культи пульпы
- В. отложение дентина в центральных участках корневой пульпы
- Г. отложение дентина в межкорневом пространстве
- Д. отложение дентина у апикального отверстия

**Высшая (максимально допустимая) разовая доза артикаина для детей:**

- А. 2,2 мг/кг
- Б. 3,0 мг/кг
- В. 4,4 мг/кг
- Г. 5,0 мг/кг
- Д. 7 мг/кг

**При лёгкой степени пародонтита на рентгенограмме выявляются следующие изменения:**

- А. резорбция костной ткани альвеолярного отростка на 1/2 корня
- Б. резорбция компактных пластинок и вершин межзубных перегородок
- В. убыль кости в области фуркации
- Г. нет изменений в костной ткани альвеолярного отростка
- Д. резорбция костной ткани альвеолярного отростка на 2/3 корня

**Для растворения продуктов распада пульпы применяют:**

- А. ортофосфорную кислоту
- Б. гипохлорит натрия
- В. 1% раствор хлоргексидина
- Г. йодиол
- Д. хлорофиллипт

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между жалобами пациента и формой хронического пульпита:

А) От воздействия температурных раздражителей

Б) Самопроизвольные боли

В) При накусывании на зуб

Г) Жалобы на кровоточивость

1. Фиброзный

2. Гангренозный

3. Гипертрофический

4. В стадии обострения

А. А124,Б4,В2,Г3

Б. А14,Б1,В4,Г234

В. А1,Б2,В3,Г4

Г. А24,Б1,В2,Г3

Д. А24,Б12,В3,Г4

Для удаления малых коренных зубов верхней челюсти используются щипцы

А. Байонетные

Б. Клювовидные со сходящимися щечками

В. Прямые

Г. S-образно изогнутые

Д. Клювовидные с несходящимися щечками

Во время эпилептического приступа, в стадию тонических судорог, важно предупредить

А. прикусывание языка

Б. переразгибание головы

В. длительную задержку дыхания

Г. развитие гипотонии

Д. развитие аритмии

Для снятия психоэмоционального напряжения в условиях стоматологической поликлиники используют:

А. снотворные

Б. анксиолитики (транквилизаторы)

В. наркотические анальгетики

Г. ненаркотические анальгетики

Д. антидепрессанты

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой пульпита и жалобами пациента:

**А) Острый очаговый**

**Б) Острый диффузный**

**1. Самопроизвольные боли**

**2. Приступообразные с длительными светлыми промежутками**

**3. Приступообразные с короткими светлыми промежутками**

**4. От температурных, химических и механических раздражителей**

**5. Иррадиирующие по ходу ветвей тройничного нерва**

**6. Локальные**

А. А1246,Б1345

Б. А1345,Б1246

В. А1245,Б465

Г. А135,Б246

Д. А146,Б235

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие метода лечения и срока, прошедшего с момента травмы:

**А) Высокая ампутация пульпы**

**Б) Частичная ампутация пульпы**

**В) Пульпотомия**

**Г) Биологический метод лечения**

**1. 1-3 часа**

**2. До 48 часов**

**3. Свыше 48 часов**

**4. 2-3 недели и более**

А. А4,Б2,В3,Г1

Б. А2,Б3,В1,Г4

В. А3,Б1,В4,Г2

Г. А1,Б4,В2,Г3

Д. А4,Б1,В2,Г3

Подтверждение диагноза хронического периодонтита базируется на данных:

А. клиники

Б. рентгенографии

В. реопародонтографии

Г. денситометрии

Д. реоплетизмографии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами.

**А) острый эпидемический паротит**

**Б) хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит в стадии обострения**

**1) осложнение у мальчиков - орхит**

**2) выделение гнойного секрета из устья протока**

**3) задержка секрета**

**4) высокая контагиозность**

**5) железа тестовато-пастозная**

**6) железа бугристая, плотная**

**7) одновременное поражение поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез**

**А. А2,3,6 Б1,3,4,5,7**

**Б. А1,3,4,5 Б2,3,6**

**В. А3,4,5 Б1,2,6,7**

**Г. А1,2,6,7 Б3,4,5**

**Д. А3,4,7 Б1,2,5,6**

**Инкубационный период при эпидемическом паротите составляет**

**А. не более 3-х суток**

**Б. 3-10 суток**

**В. 10-14 дней**

**Г. 2-3 недели**

**Д. от 4-х недель**

Установите соответствие последовательности действий. Составьте план лечения ребенка с диагнозом: Острый гнойный периостит верхней челюсти справа. Обострение хронического периодонтита зуба

**5.4.**

**А) гипосенсибилизирующая терапия**

**Б) симптоматическая терапия**

**В) удаление зуба**

**5.4**

**Г) антибактериальная терапия**

**Д) вскрытие и дренирование гнойного очага**

**Е) физиотерапевтические процедуры**

**А. Б,Д,А,Е,В,Г**

**Б. В,Д,Г,А,Б,Е**

**В. А,Г,Д,В,Е,Б**

**Г. Г,Д,В,Е,Б,А**

**Д. В,Б,Д,Г,Е,А**

**Наиболее вероятная причина обморока**

- А. неэффективная анестезия
- Б. передозировка адреналина
- В. непереносимость адреналина
- Г. психоэмоциональное напряжение
- Д. аллергическая реакция на анестетик

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие влияния на проницаемость эмали растворов. Препарат:**

- А) Ортофосфорная кислота**
- Б) Фторидсодержащие препараты**
- В) Молочная кислота**
- Г) Препараты содержащие кальций и фосфаты**
- Д) Физиологический раствор** Действие на проницаемость эмали:

- 1. Повышает
  - 2. Понижает
  - 3. Не изменяет
- А. А1,Б2,В3,Г1,Д2
  - Б. А1 Б2 В1 Г2 Д3
  - В. А2,Б3,В4,Г1,Д2
  - Г. А3,Б4,В1,Г2,Д3
  - Д. А4,Б1,В2,Г4,Д1

**Для фиксации лечебной повязки при отломе коронки с обнажением пульпы в постоянном зубе с несформированным корнем в первое посещение желательно применять:**

- А. компомеры
- Б. композиты химического отверждения
- В. композиты светового отверждения
- Г. стеклоиономерные цементы
- Д. силикатные цементы

**Предпочтительный метод лечения хронического гангренозного пульпита в несформированном однокорневом постоянном зубе:**

- А. девитальная ампутация
- Б. девитальная экстирпация
- В. высокая ампутация
- Г. витальная экстирпация
- Д. витальная ампутация

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. **УДАЛЯЕМЫЕ ЗУБЫ**

А) резцы верхней челюсти

Б) большие коренные верхней челюсти

В) малые коренные нижней челюсти **РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЩИПЦЫ**

1) S-образно изогнутые без шипика

2) S-образно изогнутые с шипиком

3) прямые

4) клювовидные без шипиков

5) клювовидные с шипиками

А. А3 Б2 В4

Б. А2,Б4,В3

В. А4,Б3,В2

Г. А1,Б4,В5

Д. А5,Б2,В3

Установите соответствие последовательности действий. Основные этапы лечения нагноившейся околокорневой воспалительной кисты нижней челюсти справа у ребенка 8 лет:

А) антибактериальная терапия

Б) вскрытие гнойного очага

В) удаление причинного зуба

Г) цистотомия после стихания явлений воспаления

Д) гипосенсибилизирующая и противовоспалительная терапия

Е) анестезия

А. Б,Д,А,Е,В,Г

Б. Е,В,Б,А,Д,Г

В. А,Г,Д,В,Е,Б

Г. Г,Д,В,Е,Б,А

Д. В,Б,Д,Г,Е,А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и клиническими проявлениями:

А) Системная гипоплазия эмали

Б) Флюороз – пятнистая форма

В) Тетрациклиновые зубы

1. Окрашивание в жёлтый цвет коронок зубов одного периода минерализации

2. Изменение цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки

3. Симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации

4. Стирание твёрдых тканей зубов без обнажения пульпы

А. А1,Б2,В3

Б. А2,Б3,В1

В. А3,Б1,В2

Г. А2,Б1,В4

Д. А3,Б2,В1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующей клинико-рентгенологической картиной:

А) околокорневая воспалительная киста

Б) нагноившаяся околокорневая воспалительная киста

В) острый гнойный периостит

1) самопроизвольная боль

2) боль при пальпации

3) сглаженность, выбухание по переходной складке

4) коллатеральный отек мягких тканей лица

5) общее состояние средней тяжести

6) общее состояние удовлетворительное

7) самочувствие не страдает

8) ухудшение самочувствия

9) температура тела нормальная

10) повышение температуры тела

11) на рентгенограмме очаг деструкции костной ткани округлой формы с четкими контурами

А. А3,6,7,9,11 Б1,2,3,4,5,10,11 В1,2,3,4,5,8,10

Б. А1,2,3,4,5,10 Б1,2,3,4,5,8,10 В3,6,7,9,11

В. А1,2,3,4,5,8,10 Б3,6,7,9,11 В1,2,3,4,5,10

Г. А2,7,8,5,Б10,11,1,4 В3,6,9

Д. А10,11,1,4 Б3,6,9 В2,7,8,5



**Кариозная полость всегда сообщается с полостью зуба при пульпите во временных зубах:**

- А. остром очаговом
- Б. остром диффузном
- В. хроническом фиброзном
- Г. хроническом гангренозном
- Д. хроническом гипертрофическом

**Выделите симптом, не укладывающийся в клиническую картину коллапса**

- А. артериальная гипотония
- Б. бледные, холодные и влажные кожные покровы
- В. гипотонус
- Г. расширенный зрачок
- Д. двигательное беспокойство

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между органом зубного зачатка и тканью зуба:**

- А) Зубной сосочек
- Б) Эмалевый орган
- В) Зубной мешочек
- 1. Эмаль
- 2. Дентин
- 3. Пульпа зуба
- 4. Цемент
- 5. Первичная кутикула эмали
- 6. Периодонт
- А. А23,Б15,В46
- Б. А13,Б6,В245
- В. А14,Б25,В36
- Г. А24,Б36,В15
- Д. А23,Б16,В45

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами

А) гемангиома (сосудистая ангиодисплазия, капиллярно-кавернозная мальформация)

Б) лимфангиома (капиллярно-кавернозная)

- 1) тестоватая консистенция
- 2) положительный симптом наливания
- 3) цвет кожи (слизистой) красно-багровый
- 4) кожа в цвете не изменена или слегка синюшная
- 5) отмечается симптом зыбления
- 6) нестабильность размеров
- 7) склонность к воспалению
- 8) пузырьковые высыпания на слизистой оболочке полости рта в виде "просяных зерен"
- 9) положительный симптом сжатия и наполнения

А. А1,2,3,4,8,9 Б1,2,3,4,5,7

Б. А2,3,9 Б1,4,5,6,7,8

В. А2,3,6,7 Б1,4,5,8,9

Г. А1,4,5,8,9 Б2,3,6,7

Д. А1,4,5,6,7,8 Б2,3,9

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой заболевания и рентгенологической картиной:

А) Хронический гангренозный пульпит

Б) Хронический гранулирующий периодонтит

1. Нечеткость кортикальной пластинки альвеолы в межкорневом пространстве
2. Очаг разрежения в кости у "раструба" корня с нечеткими контурами
3. Стадия формирования корня соответствует возрасту ребенка и такая же, как у одноименного зуба
4. Корень короче, а канал шире, чем у одноименного зуба

А. А13,Б24

Б. А24,Б13

В. А14,Б32

Г. А12,Б34

Д. А34,Б12

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами

**А) вторичный деформирующий остеоартроз левого височно-нижнечелюстного сустава**

**Б) анкилоз правого височно-нижнечелюстного сустава**

**В) привычный вывих левого сустава**

**1) недоразвитие правой половины челюсти**

**2) недоразвитие левой половины челюсти**

**3) девиация челюсти вправо**

**4) девиация челюсти влево**

**5) движения нижней челюсти отсутствуют**

**6) движения нижней челюсти свободные**

**7) движения нижней челюсти ограничены**

**А. А1,2,3,4 Б1,2,3,4,5,7 В1,2,3,4,6**

**Б. А2,3,9 Б1,4,5 В3,7**

**В. А2,7 Б1,5 В3,6**

**Г. А3,8 Б2,7 В1,5**

**Д. А1,5 Б3,6 В2,7**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой пульпита и симптомами:

**А) Острый диффузный пульпит**

**Б) Обострение хронического гангренозного пульпита**

**1. Боли самопроизвольные, длительные с короткими промежутками, иррадиирующие по ходу нерва**

**2. Боли постоянные, усиливающиеся при накусывании на зуб**

**3. Переходная складка гиперемирована и болезненна при пальпации**

**4. Переходная складка инфильтрирована, возможна флюктуация**

**5. Зондирование пульпы резко болезненно**

**6. Зондирование коронковой пульпы зуба безболезненно**

**А. А246,Б135**

**Б. А135,Б246**

**В. А146,Б235**

**Г. А125,Б436**

**Д. А123,Б456**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

А) аллергическая реакция

Б) острая сердечно-сосудистая недостаточность КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

1) бледность кожи лица

2) гиперемия кожи лица

3) отек губ, век

4) беспокойство, возбуждение

5) дыхание замедленное

6) сознание сохранено

7) сознание спутанное

8) дыхание учащенное, затруднено

А. А157,Б2346

Б. А2346, Б157

В. А146,Б325

Г. А1234,Б5678

Д. А5678,Б1234

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клиническими проявлениями и диагнозом:

А) Нитевидные сосочки темного цвета резко увеличены в размере

Б) Неравномерная десквамация эпителия на спинке языка

В) Глубокие борозды, выстланные нормальным эпителием

1. Географический язык

2. Складчатый язык

3. Черный волосатый язык

А. А1,Б2,В3

Б. А2,Б3,В1

В. А3,Б1,В2

Г. А2,Б1,В3

Д. А3,Б2,В1

**Установите соответствие между методами местного обезболивания и временем наступления анестезии**

**А. Инфильтрационная.**

**Б. Интралигаментарная.**

**В. Мандибулярная.**

**1) 15-45 с;**

**2) 1-2 мин.;**

**3) 10-15 мин.;**

**4) 30 мин.**

А. А 1, Б2, В3

Б. А 3, Б1, В2

В. А 2, Б3, В1

Г. А 2,Б 1, В 3

Д. А3, Б1, В2

**Укажите формулу зуба, для лечения которого у пациента 15 лет необходимо провести проводниковую анестезию с анестетиком на основе артикаина**

А. зуб 36

Б. зуб 14

В. зуб 25

Г. зуб 42

Д. зуб 33

**Каналы временных однокорневых сформированных зубов при лечении пульпита пломбируют:**

А. резорцин-формалиновой пастой

Б. пастой из окиси цинка на масляной основе

В. фосфат-цементом

Г. гуттаперчевыми штифтами

Д. серебряными штифтами

**При хроническом гипертрофическом пульпите характерны жалобы на боли:**

А. самопроизвольные

Б. постоянные

В. при попадании пищи в кариозную полость

Г. иррадиирующие

Д. от температурных раздражителей

**Укажите вид пародонтогенных бактерий:**

- А. Porphyromonas gingivalis
- Б. Streptococcus mutans
- В. Streptococcus oralis
- Г. Candida albicans
- Д. Staphylococcus aureus

**Основой лечебных прокладок “Дайкал”, “Кальци-пульп”, “Кальмецин” является:**

- А. антибиотик
- Б. гидроокись кальция
- В. антисептик
- Г. эвгенол
- Д. интерферон

**Иммунокорректирующие препараты (имудон) применяются при:**

- А. остром катаральном гингивите
- Б. пародонтозе
- В. атрофическом гингивите
- Г. пародонтите
- Д. гипертрофическом гингивите

**Отметьте механизм действия местных анестетиков**

- А. увеличение проницаемости клеточных мембран для ионов кальция и увеличение потенциала действия
- Б. снижение проницаемости клеточных мембран для ионов натрия, сопровождающееся мембраностабилизирующим эффектом
- В. угнетение проведения болевых импульсов на уровне задних рогов спинного мозга
- Г. угнетение проведения болевых импульсов на уровне таламуса
- Д. снижение проницаемости клеточных мембран для ионов калия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между активностью течения кариеса и внешним видом тканей зуба:

А) Дентин при медленном течении кариеса

Б) Дентин при активном течении кариеса

1. светлый, влажный легко удаляется экскаватором

2. светлый, влажный удаляется экскаватором с трудом

3. пигментированный, легко удаляется экскаватором

4. пигментированный, удаляется экскаватором с трудом

5. светлый, при зондировании плотный

А. А1,Б4

Б. А2,Б1

В. А4 Б1

Г. А4,Б3

Д. А1,Б2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и предпочтительным исходом формирования корня:

А) Хронический гангренозный пульпит

Б) Хронический гранулирующий периодонтит

В) Отлом части коронки с обнажением пульпы

1. Апексификация

2. Апексогенез

А. А1,Б2,В2

Б. А2,Б1,В2

В. А2,Б1,В1

Г. А1,Б2,В1

Д. А2,Б2,В1

Установите правильную последовательность применения эндодонтических инструментов:

А) Н-файл

Б) пульпоэкстрактор

В) каналонаполнитель

Г) К-файл

Д) плаггер

А. Б,А,Г,В,Д

Б. А,Г,Б,В,Д

В. Б,Г,В,А,Д

Г. Г,В,Б,А,Д

Д. Б,В,А,Д,Г

**Глубина очага поражения при бороздчатой форме системной гипоплазии эмали зависит от:**

- А. возраста, в котором ребенок перенес заболевание
- Б. срока прорезывания зуба
- В. микроэлементного состава воды
- Г. силы воздействия повреждающего фактора
- Д. длительности воздействия повреждающего фактора

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между проявлением хейлита и этиологией заболевания:**

- А) Эрозии с гнойным отделяемым
- Б) Массивные жёлтые корки
- В) Эрозии с влажным белым налётом

- 1. Грибковая
- 2. Бактериальная
- 3. Гиповитаминозная
- 4. Аллергическая

- А. А1,Б2,В3
- Б. А2,Б2,В1
- В. А2,Б2,В3
- Г. А1,Б2,В4
- Д. А2,Б3,В1

**Клиническая характеристика эмали зубов при местной гипоплазии:**

- А. пигментированное пятно или углубление в эмали одного зуба
- Б. белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации
- В. слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах
- Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- Д. стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба

**Ультракаин можно использовать у детей с**

- А. 6 месяцев
- Б. 1 года
- В. 2 лет
- Г. 4 лет
- Д. 5 лет



Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и частотой обработки полости рта:

**А) ОГС**

**Б) Кандидоз**

**В) Пиодермия**

**Г) ХРАС**

**Д) МЭЭ**

**1. Каждый час**

**2. Перед едой**

**3. После каждого приема пищи**

**4. Только перед сном**

А. А1 Б2 В3 Г4 Д5

Б. А1 Б2 В3 Г3 Д3

В. А1 Б1 В1 Г1 Д3

Г. А3 Б1 В3 Г3 Д1

Д. А4 Б2 В4 Г4 Д4

Установите правильную последовательность лечения кариеса в стадии пятна:

**А) высушивание**

**Б) очищение зуба от налета**

**В) антисептическая обработка**

**Г) изоляция от слюны**

**Д) аппликации реминерализующих растворов**

А. А,Г,Б,В,Д

Б. Б,Г,В,А,Д

В. Б,А,В,Г,Д

Г. Г,В,Б,А,Д

Д. Б,В,А,Д,Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между зубами и сроками минерализации:

А) Временные

Б) Постоянные первые моляры

В) Постоянные резцы и клыки

Г) Премоляры

Д) Постоянные вторые моляры

1. В первые недели после рождения

2. В первую половину беременности

3. Во второе полугодие первого года жизни

4. В возрасте 2х-3х лет

5. Во вторую половину беременности

А. А4,Б5,В1,Г2,Д3

Б. А1,Б5,В3,Г4,Д4

В. А1,Б4,В2,Г3,Д5

Г. А5,Б1,В3,Г4,Д4

Д. А1,Б3,В4,Г5,Д4

Наличие на слизистой пузырьковых высыпаний с серозным или кровянистым содержимым является патогномоничным признаком

А. лимфангиомы

Б. гемангиомы

В. нейрофиброматоза

Г. болезни Олбрайта

Д. синдрома Гольденхара

Гибридный стеклоиономерный цемент применяют у детей:

А. для пломбирования кариозных полостей временных и несформированных постоянных зубов

Б. для пломбирования кариозных полостей только временных зубов

В. для пломбирования кариозных полостей только постоянных зубов

Г. в качестве лечебной и изолирующей прокладки

Д. в качестве девитализирующего препарата

При несовершенном дентиногенезе имеются нарушения в строении:

А. только дентина

Б. только эмали

В. эмали и дентина

Г. пульпы

Д. периодонта

**При удалении сформированного интактного первого малого коренного зуба верхней челюсти по ортодонтическим показаниям кюретаж лунки**

- А. не проводится
- Б. проводится
- В. проводится при вестибулярном прорезывании первого премоляра верхней челюсти
- Г. проводится при фактуре корней временного зуба
- Д. проводится при наличии у ребенка сопутствующей патологии ЛОР-органов

**К клиническим характеристикам эмали зубов при пятнистой форме флюороза относят**

- А. Симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации
- Б. Меловидные пятна в пришеечной области зубов разных периодов минерализации
- В. Изменения цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки зуба
- Г. Окрашивание коронок зубов в жёлтый цвет

**К клиническим признакам при неполном вывихе временного и постоянного зубов в первые дни после травмы относят**

- А. Наличие пустой лунки зуба
- Б. Смещение коронки в различном направлении
- В. Отсутствие изменений в видимой части коронки, незначительную подвижность
- Г. Погруженность зуба в лунку до десны, подвижность зуба II-III степени

**По данным ВОЗ регион с кпу=1.0 у детей 12 лет можно отнести к \_\_\_\_\_ зоне интенсивности кариеса зубов**

- А. Высокой
- Б. Низкой
- В. Очень высокой
- Г. Очень низкой

**Адреналин в раствор анестетика не рекомендуется добавлять при проведении анестезии детям до (в годах)**

- А. 11
- Б. 7
- В. 14
- Г. 5

**Стандартные стальные защитные коронки — это коронки, изготовленные**

- А. В лаборатории из гильз нержавеющей стали путем штампования
- Б. В лаборатории из нержавеющей стали путем литья
- В. Промышленным способом из тонких листов нержавеющей стали
- Г. В лаборатории из нержавеющей стали путем фрезерования

**При проведении витального окрашивания пятен при пятнистой форме флюороза постоянных зубов отмечается**

- А. Окрашивание в темно-синий цвет
- Б. Окрашивание в голубой цвет
- В. Отсутствие окрашивания
- Г. Окрашивание в ярко-синий цвет

**Размер рабочей части зубной щетки для детей не должен превышать (в мм)**

- А. 10
- Б. 20
- В. 25
- Г. 40

**Удаление мягкого зубного налета у детей способствует профилактике**

- А. Кариеса
- Б. Флюороза
- В. Клиновидного дефекта
- Г. Зубочелюстных аномалий

**При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе граждан направляется на медико-социальную экспертизу не позднее \_\_\_\_\_ месяцев даты начала временной нетрудоспособности**

- А. Шести
- Б. Трех
- В. Четырех
- Г. Двух

**Наследственным заболеванием является**

- А. Эндемический флюороз
- Б. Несовершенный одонтогенез
- В. Системная гипоплазия
- Г. Тетрациклиновые зубы

**Чаще всего гематогенный остеомиелит встречается в возрасте**

- А. 1-2 Месяца
- Б. 9-10 Лет
- В. 7-8 Лет
- Г. 4-6 Лет

**Зубом, вызвавшим одонтогенный острый периостит и обязательно подлежащим удалению, является**

- А. Временный моляр
- Б. Постоянный моляр
- В. Постоянный клык
- Г. Постоянный резец

**Для антисептической обработки полости рта при заболеваниях пародонта применяют раствор (в процентах)**

- А. Кальция глюконата 10
- Б. Мирамистина 0.01
- В. Натрия гипохлорида 3
- Г. Пероксида водорода 3

**К рентгенологическим признакам вколоченного вывиха постоянного зуба относят**

- А. \"Отсутствие\" периодонтальной щели у верхушки корня
- Б. Расширение периодонтальной щели у верхушки корня
- В. Отсутствие периодонтальной щели в боковом отделе с одной стороны
- Г. Отсутствие изменений на рентгенограмме

**«Волосатый язык» характеризуется**

- А. Поверхностью языка гладкой, красной, лишенной сосочков
- Б. Глубокими бороздами, выстланными нормальным эпителием
- В. Удлиненными нитевидными сосочками белого, коричневого или черного цвета
- Г. Неравномерной десквамацией эпителия

**Клиническим признаком вколоченного вывиха временного или постоянного зуба является**

- А. Неизмененная видимая часть коронки
- Б. Удлинение видимой части коронки
- В. Укорочение видимой части коронки
- Г. Подвижность зуба II-III степени

**В районе с низким содержанием фторида в питьевой воде, наиболее эффективным методом фторидпрофилактики кариеса зубов у детей будет применение**

- А. Фторидсодержащих зубных паст
- Б. Таблеток фторида натрия
- В. Фторидсодержащих растворов для полосканий
- Г. Фторидсодержащего лака (геля)

**Причиной диастемы может быть**

- А. Мелкое преддверие полости рта
- Б. Низко прикрепленная уздечка верхней губы
- В. Макродентия
- Г. Укороченная уздечка языка

**Ведущим методом лечения доброкачественных новообразований у детей является**

- А. Гормонотерапия
- Б. Химиотерапия
- В. Хирургический
- Г. Криотерапия

**К рентгенологическим признакам заболеваний пародонта относят**

- А. Укорочение корней зубов
- Б. Остеопороз альвеолярного отростка челюсти
- В. Облитерацию корневых каналов
- Г. Истончение кортикального слоя челюсти

**Пломбирование кариозной полости при art-методе препарирования проводят**

- А. Наногибридным композитом
- Б. Микрогибридным композитом
- В. Цинкокси-фосфатным цементом
- Г. Стеклоиономерным цементом

**Типичной локализацией кариеса в стадии белого пятна у детей является**

- А. Бугры моляров
- Б. Пришеечная область
- В. Экватор коронки
- Г. Режущий край

**Обмен местами зубов называется**

- А. Вестибулярное
- Б. Транспозиция
- В. Супраположение
- Г. Инфраположение

**Полная полимеризация пломбы из гибридного стеклоиономерного цемента происходит в течение (в часах)**

- А. 24
- Б. 0,5
- В. 3
- Г. 3-5

**Изогнутые по плоскости клювовидные щипцы предназначены для удаления**

- А. Третьих моляров
- Б. Резцов
- В. Клыков
- Г. Премоляров

**Для определения качества раскрытия полости зуба врач использует стоматологические инструменты**

- А. Штопфер, зонд
- Б. Зеркало, зонд
- В. Пинцет, зеркало
- Г. Гладилку, пинцет

**К поражениям слизистой оболочки рта, наиболее часто связанным с ВИЧ-инфекцией, относят**

- А. Сухой синдром
- Б. Медикаментозный аллергический стоматит
- В. Синдром Папийона - Лефевра
- Г. «Волосатую» лейкоплакию

**Лимфоотток от зубов нижней челюсти происходит в лимфоузлы**

- А. Поднижнечелюстные и подподбородочные
- Б. Затылочные
- В. Околоушные
- Г. Только в поднижнечелюстные

**С увеличением возраста ребенка толщина дентина после прорезывания зуба**

- А. Не изменяется, т.к. одонтобласты после формирования коронки отсутствуют
- Б. Увеличивается в результате функционирования одонтобластов
- В. Увеличивается в результате функционирования энамелобластов
- Г. Увеличивается в результате проведения реминерализующей терапии

**В качестве активного компонента в состав противокариозных зубных паст вводят**

- А. Лаурилсульфат натрия
- Б. Карбонат кальция
- В. Диоксид кремния
- Г. Монофторфосфат натрия

**Смещение нижней челюсти в сторону вызывает**

- А. Ранняя потеря молочных зубов
- Б. Сон на высокой подушке
- В. Неравномерное стирание молочных зубов
- Г. Сосание пальца

**Препаратом, используемым для аппликационной анестезии у детей является**

- А. Примакаин
- Б. Лидокаин
- В. Артикаин-форте
- Г. Мепивакаин

**Дифференциальную диагностику острого герпетического стоматита проводят с**

- А. Многоформной эксудативной эритемой
- Б. Острой травмой слизистой оболочки
- В. Истинной пузырчаткой
- Г. Стрептостафилококковой пиодермией

**Сроки прорезывания первого постоянного моляра (в годах)**

- А. 8-9
- Б. 3-4
- В. 5-6
- Г. После 9

**Самыми распространенными из опухолей мягких тканей у детей являются**

- А. Сосудистые
- Б. Фибропластические
- В. Пигментные
- Г. Эпителиальные



**К общим кариесогенным факторам относят**

- А. Нарушение состава и свойств ротовой жидкости
- Б. Недостаточное содержание фтора в питьевой воде
- В. Кариесогенные микроорганизмы
- Г. Углеводистые липкие пищевые остатки в полости рта

**Афты беднара появляются в следствии \_\_\_\_\_ поражения слизистой**

- А. Инфекционного
- Б. Химического
- В. Травматического
- Г. Термического

**Электромиографией называется**

- А. Исследование гемодинамики пародонта
- Б. Регистрация движений височно-нижнечелюстного сустава
- В. Исследование лимфообращения
- Г. Функциональный метод исследования состояния мышц на основе регистрации биопотенциалов

**Из анамнеза ребенка с гипоплазией постоянных зубов необходимо обратить внимание на**

- А. Здоровье ребенка на первом году жизни
- Б. Наличие у матери профессиональных вредностей
- В. Характер течения родов
- Г. Состояние здоровья матери в период беременности

**К рентгенологическим критериям сохранения жизнеспособности пульпы относят**

- А. Расширение периодонтальной щели
- Б. Удлинение корня, утолщение его стенок, увеличение ширины канала и апикального отверстия
- В. Деструкции костной ткани и верхушки корня
- Г. Удлинение корня, утолщение его стенок, уменьшение ширины канала и апикального отверстия

**Нижняя макрогнатия чаще сочетается с аномалией положения резцов**

- А. Протрузией верхних и ретрузией нижних резцов
- Б. Протрузией верхних и нижних резцов
- В. Ретрузией верхних и протрузией нижних резцов
- Г. Положение резцов вариабельно

**Ведущим методом диагностики при обострении хронического неспецифического паренхиматозного паротита у детей является**

- А. Термография
- Б. Аксиография
- В. Ортопантомография
- Г. УЗИ

**По результатам первичного обследования школьников выделяют \_\_\_\_\_ диспансерных групп**

- А. 4
- Б. 2
- В. 5
- Г. 3

**Препаратом, растворяющим некротические фрагменты тканей в канале зуба является**

- А. Гипохлорит натрия
- Б. Йодиол
- В. Перекись водорода
- Г. Перманганат калия

**Эффектом от применения одонтотрапных препаратов, используемых для биологического метода, является**

- А. Мумификация пульпы
- Б. Образование дентинного мостика
- В. Антисептическая обработка пульпы
- Г. Девитализация пульпы

**«Складчатый» язык дифференцируют с**

- А. Обложенным языком
- Б. Сифилитическим интерстициальным глосситом
- В. Кандидозом
- Г. Химическим ожогом

**Состояние зубов по системе icdas регистрируется с помощью \_\_\_\_\_ кода**

- А. Четырехзначного
- Б. Двухзначного
- В. Однозначного
- Г. Трехзначного

**При отсутствии эффекта от консервативного лечения отежной формы гипертрофического гингивита проводят**

- А. Удаление зубов и протезирование
- Б. Склерозирующую терапию
- В. Открытый кюретаж
- Г. Антибактериальную терапию

**Некариозное поражение твердых тканей зубов, развивающееся при избыточном поступлении фторидов в организм в период формирования зубов**

- А. Эндемический флюороз
- Б. Системная гипоплазия эмали
- В. Тетрациклиновые зубы
- Г. Эктодермальная дисплазия

**Стоматологическое просвещение и санитарно-гигиеническое воспитание детей до 10 лет в рамках работы школьного стоматологического кабинета проводится с кратностью \_\_\_\_\_ в год**

- А. 4
- Б. 2
- В. 6
- Г. 1

**Тяжелая степень тяжести катарального гингивита у детей диагностируется при поражении**

- А. Десневого сосочка
- Б. Альвеолярной десны
- В. Маргинальной десны
- Г. Альвеолярной кости

**Основную ответственность за клинический диагноз несет**

- А. Врач-стоматолог
- Б. Врач-рентгенолог
- В. Помощник стоматолога, получивший сертификат
- Г. Помощник стоматолога (сестра)

**Абразивные компоненты в составе детских зубных паст способствуют**

- А. Пенообразованию
- Б. Удалению зубного налета
- В. Сохранению влаги
- Г. Увеличению срока годности

**Для острого диффузного пульпита характерны**

- А. Приступообразные, самопроизвольные боли; интервалы продолжительные, приступы короткие; боль усиливается от раздражителей, локализованная в пределах пораженного зуба
- Б. Боли кратковременные от раздражителей, быстро проходят после устранения раздражителя, кариозная полость глубокая, с размягченным дентином
- В. Приступообразные, иррадиирующие боли, самопроизвольного характера, которые усиливаются от холодного; интервалы между приступами короткие
- Г. Спонтанные боли, иррадиирующие, постоянные, нарастающие по интенсивности; боль от холодного стихает, от горячего усиливается

**Лица, незаконно занимающиеся медицинской и фармацевтической деятельностью, в соответствии с законодательством Российской Федерации могут привлекаться к \_\_\_\_\_ ответственности**

- А. Уголовной
- Б. Процессуальной
- В. Персональной
- Г. Материальной

**При остром гнойном периостите у ребенка 4 лет необходим следующий алгоритм лечения**

- А. Хирургическое лечение – вскрытие абсцесса в условиях поликлиники, антибактериальная и противовоспалительная терапия
- Б. Хирургическое лечение – вскрытие абсцесса в условиях поликлиники
- В. Госпитализация, хирургическое лечение – вскрытие субпериостального абсцесса, антибактериальная и противовоспалительная терапия
- Г. Госпитализация, хирургическое лечение – вскрытие абсцесса

**В методы стоматологического просвещения не входит**

- А. Проведение лекций
- Б. Лечение стоматологических заболеваний
- В. Проведение уроков здоровья
- Г. Осуществление бесед с детьми и родителями

**Метод определения рабочей длины корневого канала с помощью апекслокатора называется**

- А. Эндодонтический
- Б. Электрометрический
- В. Механический
- Г. Тактильный

**Для герметизации фиссур постоянных зубов у детей используют цемент**

- А. Силикатный
- Б. Цинк-фосфатный
- В. Стеклоиономерный
- Г. Поликарбоксилатный

**Признание человека инвалидом возможно только при проведении экспертизы**

- А. Медико-социальной
- Б. Трудоспособности
- В. Военно-врачебной
- Г. Судебно-медицинской

**Полное (тотальное) травление означает воздействие фосфорной кислоты на**

- А. Дентин и цемент
- Б. Эмаль и дентин
- В. Пульпу и цемент
- Г. Цемент

**Для временного пломбирования корневых каналов постоянных зубов при лечении хронического периодонтита предпочтительнее использовать**

- А. Пасты на основе гидроокиси кальция
- Б. Резорцин-формалиновую пасту
- В. Силанты и гуттаперчевые штифты
- Г. Пасты на основе эвгенола

**Ведущим рентгенологическим симптомом при поражениях пародонта является**

- А. Снижение высоты межальвеолярных перегородок
- Б. Смещение зубов
- В. Уплотнение вершин межальвеолярных перегородок
- Г. Деструкция кортикальных пластинок межальвеолярных перегородок

**Клиническая характеристика эмали зубов при наследственном несовершенном амелогенезе представляет из себя**

- А. Горизонтальные борозды, параллельно режущему краю на группе зубов одного периода минерализации
- Б. Вертикальные борозды от режущего края до шеек зубов
- В. Эмаль стирается, обнаженный дентин водянистого цвета
- Г. Меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации

**Для дифференциальной диагностики слабой формы флюороза и кариеса эмали используют**

- А. Термодиагностику
- Б. Электроодонтодиагностику
- В. Рентгенологический метод
- Г. Витальное окрашивание

**Для удаления пигментированного налёта воздушно-абразивным методом используется**

- А. Фторид натрия
- Б. Гидрокарбонат натрия
- В. Сульфат кальция
- Г. Карбонат кальция

**Шинирование зубов при неполном вывихе постоянного зуба проводят сроком на**

- А. 3-4 Недели
- Б. 2-3 Месяца
- В. 3-4 Месяца
- Г. 1-2 Недели

**У детей с высокой активностью кариозного процесса и недостаточной минерализацией твердых тканей зубов для пломбирования кариозных полостей в постоянных зубах необходимо применять**

- А. Амальгаму
- Б. Композитные материалы
- В. Силикатные цементы
- Г. Стеклоиономерные цементы

**Лимфадениты челюстно-лицевой области у детей по этиологии делятся на**

- А. Хронические гиперпластические
- Б. Тонзиллогенные
- В. Острые гнойные
- Г. Хронические абсцедирующие

**Аутотрансплантат для проведения костной пластики нижней челюсти у детей берут из**

- А. Малой берцовой кости
- Б. Лучевой кости
- В. Локтевой кости
- Г. Ключицы

**Профессиональная гигиена у детей с пятнистой формой флюороза должна проводиться не реже чем 1 раз в**

- А. 4-6 Месяцев
- Б. 1-2 Года
- В. Месяц
- Г. Год

**Показатели при проведении электроодонтодиагностики интактного постоянного моляра со сформированным корнем соответствуют (в мка)**

- А. 2-6
- Б. 26-31
- В. 12-25
- Г. 37-42

**Фолликулярные кисты челюстей у детей в отличие от одонтогенных воспалительных кист**

- А. Чаще нагнаиваются
- Б. Медленнее растут
- В. Быстрее растут
- Г. Чаще воспаляются

**К некариозным заболеваниям твердых тканей зубов относят**

- А. Пародонтит
- Б. Пародонтолиз
- В. Периодонтит
- Г. Несовершенное развитие дентина

**Если при определении индекса green – vermillion выявили, что зубной налёт покрывает  $\frac{1}{3}$  поверхности коронки зуба, то гигиену рта оценивают (в баллах)**

- А. 1
- Б. 2
- В. 0
- Г. 3

**Основным методом местного обезболивания при удалении молочных зубов является анестезия**

- А. Мандибулярная
- Б. Торусальная
- В. Туберальная
- Г. Инфильтрационная

**Для выявления зубного камня у детей используют**

- А. Зеркало и пинцет
- Б. Зеркало и экскаватор
- В. Зеркало и зонд
- Г. Зонд и пинцет

**Наиболее резистентны к кариесу участки эмали в области**

- А. Пришеечной области зубов
- Б. Бугров и режущего края
- В. Ямок зубов
- Г. Фиссур

**Оптимальная концентрация фтора в питьевой воде умеренных широт составляет (в мг/л)**

- А. 1,0-1,2
- Б. 0,5-0,9
- В. 2,0-3,0
- Г. 0,3-0,8

**Электромиография регистрирует**

- А. Движение ВНЧС
- Б. Гемодинамику мышц челюстно-лицевой области
- В. Движение нижней челюсти
- Г. Биопотенциалы мышц челюстно-лицевой области

**При вколоченном вывихе зуба**

**6.1 у ребёнка 1,5 лет рекомендуется**

- А. Эндодонтическое лечение
- Б. Динамическое наблюдение
- В. Удаление зуба
- Г. Репозиция и эндодонтическое лечение

**Коронковую часть пульпы удаляют**

- А. Зондом
- Б. Штопфером
- В. Экскаватором
- Г. Колесовидным бором



**При определении индекса рnr у детей окрашивают поверхности первых верхних моляров**

- А. Вестибулярные
- Б. Окклюзионные
- В. Оральные
- Г. Проксимальные

**Этапы удаления временного зуба и постоянного**

- А. Различны
- Б. Одинаковы
- В. Различны только на нижней челюсти
- Г. Различны только на верхней челюсти

**На характер смещения отломков при переломах нижней челюсти у детей решающее влияние оказывает**

- А. Вес отломков, обусловленный их размером
- Б. Возраст ребёнка
- В. Пол ребёнка
- Г. Направление тяги мышц, прикрепляемых к фрагментам челюсти

**Реминерализирующая терапия при системной гипоплазии эмали постоянных зубов приводит к**

- А. Исчезновению пятен и восстановлению эстетичного вида эмали
- Б. Исчезновению дефектов на эмали зубов
- В. Ускорению формирования корней зубов
- Г. Повышению резистентности твердых тканей зубов

**Бактериальная сенсibilизация к стрептококкам и стафилококкам выявляется чаще при**

- А. Остром герпетическом стоматите
- Б. Многоформной экссудативной эритеме
- В. Остром язвенно-некротическом стоматите
- Г. Хроническом рецидивирующем герпетическом стоматите

**Каждый гражданин имеет право выбора врача-терапевта, врача общей практики, врача-педиатра в выбранной медицинской организации \_\_\_\_ в год**

- А. 4 Раза
- Б. 1 Раз
- В. 3 Раза
- Г. 2 Раза

**Аномалии челюстных костей в сагиттальном направлении можно определить с помощью**

- А. ТРГ в боковой проекции
- Б. Томографии
- В. Панорамной рентгенографии
- Г. Ортопантомографии

**Наиболее предпочтительным материалом для восстановлении коронки сформированного зуба является**

- А. Цинкфосфатный цемент
- Б. Композитный материал
- В. Стеклоиономерный цемент
- Г. Силикатный цемент

**Амелобластома относится к группе**

- А. Опухолеподобных образований
- Б. Злокачественных одонтогенных опухолей
- В. Доброкачественных одонтогенных опухолей
- Г. Предраков

**При ожоге щелочами в качестве антидота применяют раствор (в процентах)**

- А. Лимонной кислоты 0,5
- Б. Пероксида водорода 3
- В. Уксусной кислоты 0,5
- Г. Натрия бикарбоната 1-2

## 2 категория

[Вернуться в начало](#)

**Для выявления кариозных пятен методом окрашивания применяют:**

- А. реактив Шиллера-Писарева
- Б. раствор йодистого калия
- В. 2% раствор метиленового синего
- Г. бриллиантовый зеленый
- Д. раствор Боровского-Волкова

**Для снятия психоэмоционального напряжения в условиях стоматологической поликлиники используют:**

- А. снотворные
- Б. анксиолитики (транквилизаторы)
- В. наркотические анальгетики
- Г. ненаркотические анальгетики
- Д. антидепрессанты

**В ближайшие часы после ранений языка, мягкого неба, тканей дна рта опасность для жизни ребенка представляет**

- А. нарушение речи
- Б. нарушение приема пищи
- В. асфиксия
- Г. нарушение сна
- Д. развитие гнойно-некротического процесса

**При диагностике костных новообразований челюстных костей у детей информативным методом не является**

- А. рентгенологический
- Б. макроскопия послеоперационного материала
- В. цитологический
- Г. морфологический
- Д. аксиография

**Замедленное, поверхностное дыхание характерно для:**

- А. сердечно-сосудистого коллапса
- Б. анафилактического шока
- В. обморока
- Г. болевого шока
- Д. эпилептического припадка

**Удаление временных центральных резцов верхней челюсти рекомендуется производить щипцами**

- А. прямыми
- Б. клювовидными со сходящимися щечками
- В. штыковидными
- Г. S-образно изогнутыми
- Д. клювовидными с несходящимися щечками

**Посттравматические воспалительные корневые кисты челюстей у детей с постоянным прикусом развиваются чаще от зубов**

- А. резцов верхней челюсти
- Б. клыков
- В. малых коренных
- Г. больших коренных
- Д. резцов нижней челюсти

**Индекс CPITN используют для определения:**

- А. уровня гигиены полости рта
- Б. степени активности кариеса
- В. стойкости капилляров десны
- Г. нуждаемости в лечении заболеваний пародонта
- Д. интенсивности кариеса

**Основой лечебных прокладок “Дайкал”, “Кальци-пульп”, “Кальмецин” является:**

- А. антибиотик
- Б. гидроокись кальция
- В. антисептик
- Г. эвгенол
- Д. интерферон

**Кариозная полость всегда сообщается с полостью зуба при пульпите во временных зубах:**

- А. острым очаговым
- Б. острым диффузным
- В. хроническом фиброзном
- Г. хроническом гангренозном
- Д. хроническом гипертрофическом

**Укажите препарат, применяемый для витальной пульпотомии:**

- А. резорцин-формалиновая смесь
- Б. солкосерил
- В. фенoplast
- Г. минеральный триоксиагрегат (МТА)
- Д. хлоргексидин

**Появление сыпи, кожного зуда, отёка губ, век является клиническим симптомом:**

- А. сердечно-сосудистого коллапса
- Б. обморока
- В. анафилактического шока
- Г. болевого шока
- Д. эпилептического припадка

**Подтверждение диагноза хронического периодонтита базируется на данных:**

- А. клиники
- Б. рентгенографии
- В. реопародонтографии
- Г. денситометрии
- Д. реоплетизмографии

**Симптомы, характерные для острого диффузного пульпита в сформированном постоянном зубе:**

- А. боли самопроизвольные, ночные, приступообразные, длительные, с короткими светлыми промежутками, иррадиирующие
- Б. боли постоянные, усиливающиеся при накусывании на зуб
- В. переходная складка гиперемированная, болезненная при пальпации
- Г. боли от раздражителей, приступообразные, с короткими болевыми приступами и длительными светлыми промежутками, локальные
- Д. боли и кровоточивость при попадании пищи в кариозную полость

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие влияния на проницаемость эмали растворов. Препарат:**

- А) Ортофосфорная кислота
  - Б) Фторидсодержащие препараты
  - В) Молочная кислота
  - Г) Препараты содержащие кальций и фосфаты
  - Д) Физиологический раствор
- Действие на проницаемость эмали:**

- 1. Повышает
  - 2. Понижает
  - 3. Не изменяет
- А. А) А1 Б2 В 1 Г2 Д3
  - Б. Б) А2 Б3 В1 Г3 Д1
  - В. В) А3 Б1 В2 Г1 Д2

**Ширина очага поражения при бороздчатой форме системной гипоплазии эмали зависит от:**

- А. возраста, в котором ребенок перенес заболевание
- Б. срока прорезывания зуба
- В. соблюдения правил гигиены полости рта
- Г. силы воздействия повреждающего фактора
- Д. длительности воздействия повреждающего фактора

**Травма зачатка постоянного зуба преимущественно наблюдается при травме временного зуба в виде**

- А. полного вывиха
- Б. неполного вывиха
- В. внедренного (вколоченного) вывиха
- Г. ушиба зуба
- Д. перелома корня

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между индексом и его назначением: Индекс

А) КПУ;

Б) ОНІ-S;

В) СРІТN;

Г) кп;

Д) РМА. Назначение:

1. Оценка интенсивности кариеса временных зубов;

2. Оценка интенсивности кариеса постоянных зубов;

3. Оценка нуждаемости в лечении заболеваний пародонта;

4. Оценка интенсивности и распространенности воспалительной реакции тканей пародонта;

5. Количественная оценка зубного налета и зубного камня

А. А)А1 Б3 В4 Г5 Д2

Б. Б) А3 Б1 В2 Г4 Д5

В. В)А2 Б5 В3 Г1 Д4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеваниями и общим состоянием и самочувствием. Заболевания:

А) ОГС;

Б) ХРАС;

В) МЭЭ;

Г) Стрепто-стафилодермия;

Д) Хроническая травма слизистой рта. Общее состояние и самочувствие:

1. Не страдает;

2. Головная боль, боль в суставах мышцах;

3. Температура тела нормальная;

4. Температура тела повышена;

5. Прием пищи не нарушен;

6. Прием пищи болезненный.

А. А) А16 Б126 В24 Г46 Д1256

Б. Б) А46 Б136 В246 Г46 Д136

В. В) А12 Б146 В235 Г46 Д1246

Операция цистэктомия предполагает удаление оболочки кисты

А. полное

Б. нижней ее стенки

В. вестибулярной ее стенки

Г. верхней ее стенки

Д. нижней ее стенки

**Заболевание, при котором прорезывается один зуб измененной формы:**

- А. флюороз
- Б. системная гипоплазия
- В. местная гипоплазия
- Г. тетрациклиновые зубы
- Д. синдром Стентона-Капдепона

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность применения эндодонтических инструментов:**

- А) Н-файл;**
  - Б) пульпоэкстрактор;**
  - В) каналонаполнитель;**
  - Г) К-файл;**
  - Д) спредер.**
- А. А) ДБАГВ
  - Б. Б) БАГВД
  - В. В) ГБАДВ

**Чередование периодов обострения и ремиссии характерно для паротита**

- А. острого эпидемического
- Б. хронического паренхиматозного
- В. постравматического
- Г. новорожденных
- Д. гангренозного

**После вскрытия субпериостального абсцесса дренаж в ране оставляют на**

- А. 1 сутки
- Б. 2 суток
- В. 3 суток
- Г. 7 суток
- Д. до прекращения гнойного отделяемого

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом в постоянных зубах с несформированными корнями и исходом. Диагноз:

- А) Хронический гангренозный пульпит;  
Б) Хронический гранулирующий периодонтит;  
В) Отлом части коронки с обнажением пульпы. Исход:  
1. Апексификация;  
2. Апексогенез.  
А. А) А2 Б1 В2  
Б. Б) А1 Б2 В1  
В. В) А2 Б1 В1

**Зондирование коронковой пульпы безболезненно при пульпите:**

- А. хроническом фиброзном  
Б. хроническом гангренозном  
В. хроническом гипертрофическом  
Г. хроническом в стадии обострения  
Д. остром очаговом

**При нарушении первого периода развития зуба отмечается:**

- А. гипоплазия  
Б. флюороз  
В. адентия  
Г. несовершенный одонтогенез  
Д. кариес

**Выбор метода лечения пульпита у детей зависит от:**

- А. формы пульпита, групповой принадлежности зубов, степени сформированности корней  
Б. возраста ребенка, наличия сопутствующей соматической патологии  
В. стадии развития зубов и их групповой принадлежности  
Г. от диагноза  
Д. от групповой принадлежности зубов

**Для одновременного выключения щечного и язычного нервов применяется анестезия:**

- А. у большого небного отверстия  
Б. мандибулярная  
В. туберальная  
Г. торусальная  
Д. инфраорбитальная



**Основным методом местного обезболивания при удалении временных фронтальных зубов верхней челюсти является анестезия:**

- А. туберальная
- Б. инфраорбитальная
- В. инфильтрационная
- Г. внутрикостная
- Д. у резцового отверстия

**Неотложная помощь ребенку с острым гнойным периоститом заключается в**

- А. срочной госпитализации
- Б. дезинтоксикационной терапии
- В. хирургической помощи
- Г. иммунотерапии
- Д. иглорефлексотерапии

**Герметизацию фиссур постоянных зубов рекомендуется проводить**

- А. в 6 лет
- Б. через 1 год после прорезывания
- В. через 1 год после окончания формирования корней
- Г. сразу после прорезывания коронки зуба
- Д. сразу после окончания формирования корней зуба

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами лечения и заболевания. Метод лечения:**

**А) Витальная ампутация;**

**Б) Витальная экстирпация. Заболевание:**

1. Хронический фиброзный пульпит во временном моляре с несформированным корнем;
2. Хронический фиброзный пульпит в постоянном моляре с несформированным корнем;
3. Хронический гангренозный пульпит в постоянном моляре со сформированным корнем;
4. Отлом коронки с обнажением пульпы во временном резце со сформированным корнем;
5. Отлом коронки с обнажением пульпы в постоянном резце с несформированным корнем.

А. А) А134 Б25

Б. Б) А125 Б34

В. В) А235 Б14

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между воспалительными заболеваниями тканей пародонта и симптомами. Заболевание:

А. Гингивит;

Б. Пародонтит. Симптомы:

1. подвижность зубов;
2. кровоточивость десны;
3. оголение шеек зубов;
4. пародонтальные карманы;
5. гиперемия, отечность десны;
6. деструкция альвеолы.

А. А) А25 Б1346

Б. Б) А25 Б123456

В. В) А1256 Б1346

Первичным элементом поражения при остром герпетическом стоматите (ОГС) является:

- А. папула
- Б. эрозия
- В. пузырек
- Г. корка
- Д. пятно

На постоянных молярах у детей в первые годы после прорезывания зуба кариес наиболее часто возникает:

- А. на буграх
- Б. на оральной поверхности
- В. на контактных поверхностях
- Г. на вестибулярной поверхности
- Д. в фиссурах, ямках

Очаговая деминерализация выявляется методом витального окрашивания при:

- А. эрозии эмали
- Б. белом кариозном пятне
- В. пятнистой форме гипоплазии
- Г. пигментированном кариозном пятне
- Д. флюорозе

**Байонетные щипцы предназначены для удаления зубов челюсти:**

- А. верхней
- Б. нижней
- В. обеих челюстей
- Г. верхней при ограниченном открывании рта
- Д. нижней при ограниченном открывании рта

**Выделите симптом, не укладывающийся в клиническую картину коллапса**

- А. артериальная гипотония
- Б. бледные, холодные и влажные кожные покровы
- В. гипотонус
- Г. расширенный зрачок
- Д. двигательное беспокойство

**Изогнутые по плоскости клювовидные щипцы предназначены для удаления зубов челюсти:**

- А. верхней
- Б. нижней
- В. обеих челюстей
- Г. верхней при ограниченном открывании рта
- Д. нижней при ограниченном открывании рта

**Язвенно-некротические поражения слизистой оболочки рта наблюдаются:**

- А. при гипervитаминозах
- Б. при хроническом гипоацидном гастрите
- В. при компенсированных заболеваниях почек
- Г. при хроническом бронхите
- Д. при заболеваниях крови и кроветворных органов

**При хроническом фиброзном периодонтите воспалительный процесс локализуется:**

- А. в периодонте
- Б. в кости и альвеоле
- В. поднадкостнично
- Г. в костной ткани челюсти
- Д. в прилежащих мягких тканях

**Пародонт включает в себя:**

- А. периодонт, костную ткань альвеолы, десну, цемент корня зуба
- Б. периодонт, костную ткань альвеолы, цемент корня зуба
- В. костную ткань альвеолы, десну, цемент корня зуба
- Г. периодонт, десну, цемент корня зуба
- Д. периодонт, костную ткань альвеолы, десну, цемент корня зуба, корень зуба.

**Укажите, какие инструменты используются для расширения корневого канала зуба:**

- А. пульпоэкстрактор
- Б. корневая игла
- В. ример
- Г. Н-файл
- Д. плаггер

**Наиболее частой причиной острых лимфаденитов челюстно-лицевой области у детей 2-3 лет является**

- А. острый пульпит
- Б. неодонтогенная инфекция
- В. острый периодонтит
- Г. острый периостит
- Д. множественный кариес

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом в постоянных зубах с несформированными корнями и исходом. Диагноз:**

- А) Хронический фиброзный пульпит;**  
**Б) Хронический гранулирующий периодонтит;**  
**В) Хронический гангренозный пульпит. Исход:**
- 1. Апексификация;**
  - 2. Апексогенез**
- А. А) А2 Б1 В2  
Б. Б) А1 Б2 В1  
В. В) А2 Б2 В1

**При гингивите на рентгенограмме наблюдается:**

- А. равномерная атрофия альвеол
- Б. снижение высоты межальвеолярных перегородок
- В. склеротические изменения
- Г. отсутствие изменений
- Д. ослабление рисунка костных балочек

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формами пульпита и симптомами. Формы пульпита:

А) Острый диффузный пульпит;

Б) Обострение хронического гангренозного пульпита. Симптомы:

1. Боли самопроизвольные, длительные с короткими промежутками, иррадиирующие по ходу нерва;

2. Боли постоянные, усиливающиеся при накусывании на зуб;

3. Болезненность при перкуссии;

4. Пульпа не кровоточит;

5. Зондирование пульпы резко болезненно;

6. Зондирование коронковой пульпы зуба безболезненно.

А. А) А135 Б246

Б. Б) А126 Б345

В. В) А236 Б145

Непрямой массаж сердца с использованием двух рук проводят детям старше

А. трёх лет

Б. пяти лет

В. семи лет

Г. десяти лет

Д. двенадцати лет

Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности возрастных показаний к пластике уздечки языка у детей с периода новорожденности до окончания роста и формирования лицевого отдела черепа:

А) нарушение прикуса;

Б) нарушение речи;

В) нарушение сосания и малая прибавка в весе.

А. А) БАВ

Б. Б) ВБА

В. В) АВБ

Установите соответствие последовательности действий. Оказания помощи при осложнении после удаления временного зуба - альвеолите - включает:

А) струйное промывание растворами антисептиков;

Б) нежный юретаж лунки

В) введение в лунку антисептиков, антибактериальных и обезболивающих препаратов;

Г) физиотерапевтические процедуры;

Д) тугая тампонада лунки йодоформным тампоном

А. А) БГАВД

Б. Б) БАВДГ

В. В) ГБВАД

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеваниями в постоянных зубах с несформированными корнями и рентгенологической картиной. Заболевания в постоянных зубах с несформированными корнями:

А) Хронический гангренозный пульпит;

Б) Хронический гранулирующий периодонтит. Рентгенологическая картина:

1. Нечеткость кортикальной пластинки альвеолы в межкорневом пространстве;

2. Очаг разрежения в кости у "раструба" корня с нечеткими контурами;

3. Стадия формирования корня соответствует возрасту ребенка и такая же, как у одноименного зуба;

4. Корень короче, а канал шире, чем у одноименного зуба.

А. А) А14 Б23

Б. Б) А23 Б14

В. В) А13 Б24

**Дентин при медленном течении кариеса:**

А. светлый, влажный, легко удаляется экскаватором

Б. светлый, влажный, удаляется экскаватором с трудом

В. пигментированный, легко удаляется экскаватором

Г. пигментированный, удаляется экскаватором с трудом

Д. светлый, при зондировании плотный

**По продолжительности действия артикаин относится к препаратам:**

А. короткого действия (30-40мин. с вазоконстриктором)

Б. среднего действия (120-130мин. с вазоконстриктором)

В. длительного действия (до 180мин. с вазоконстриктором)

Г. ультракороткого действия (5-10 мин. с вазоконстриктором)

Д. сверхдлинного действия (300 мин. с вазоконстриктором)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами фторид профилактики и способом введения. Пути введения:

А. Эндогенные;

Б. Экзогенные. Методы:

1. фторирование соли;
2. покрытие зубов фторлаком;
3. полоскание фторидсодержащими растворами;
4. фторирование питьевой воды;
5. применение фторидсодержащих таблеток.

А. А) А125 Б34

Б. Б) А145 Б23

В. В) А45 Б123

**Предпочтительный метод лечения хронического гангренозного пульпита в несформированном однокорневом постоянном зубе:**

- А. девитальная ампутация
- Б. девитальная экстирпация
- В. высокая ампутация
- Г. витальная экстирпация
- Д. витальная ампутация

**Предрасполагающим фактором вывиха резцов верхней челюсти у детей при острой травме является**

- А. множественный кариес этих зубов и его осложнения
- Б. нарушение окклюзии – глубокое резцовое перекрытие
- В. мелкое преддверие
- Г. низкое прикрепление уздечки верхней губы
- Д. короткая уздечка языка

**Предпочтительный метод лечения однокорневого зуба с несформированными корнями при хроническом фиброзном пульпите:**

- А. девитальная ампутация
- Б. девитальная экстирпация
- В. витальная ампутация
- Г. витальная экстирпация
- Д. биологический

**Возможные изменения при местной гипоплазии эмали:**

- А. облитерация полости зуба
- Б. пигментированное пятно на эмали
- В. «рифленные» зубы
- Г. поражение эмали всех моляров и фронтальных зубов
- Д. «гипсовые» зубы

**Глубокий кариес дифференцируют от:**

- А. среднего кариеса
- Б. поверхностного кариеса
- В. хронического фиброзного пульпита
- Г. острого диффузного пульпита
- Д. несовершенного амелогенеза

**Препарирование временных зубов показано при:**

- А. кариесе в стадии пятна при быстroteкущем кариесе
- Б. среднем кариесе
- В. кариесе в стадии пятна при медленнотекущем кариесе
- Г. любой форме кариеса
- Д. интактном зубе

**Прогрессирующий лизис тканей пародонта наблюдается при заболеваниях:**

- А. сахарный диабет
- Б. болезнь Крона
- В. хронический гепатит
- Г. ревматоидный артрит
- Д. болезнь Лайма

**Правила наложения щипцов при удалении временных и постоянных зубов**

- А. не отличаются
- Б. отличаются
- В. отличаются при удалении на верхней челюсти; не отличаются – на нижней
- Г. отличаются при удалении на нижней челюсти; не отличаются – на верхней
- Д. в зависимости от групповой принадлежности

**Кариозная полость всегда сообщается с полостью зуба при пульпите:**

- А. острым очаговым
- Б. острым диффузным
- В. хроническом фиброзном
- Г. хроническом гангренозном
- Д. хроническом гипертрофическом



**Для герметизации фиссур временных моляров преимущественно используют:**

- А. стеклоиономерные цементы
- Б. композитные герметики
- В. компомеры
- Г. поликарбоксилатные цементы
- Д. силикатные цементы

**Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного сустава чаще встречается в возрастной группе детей**

- А. 1-2 года
- Б. 3 – 7 лет
- В. 5-6 лет
- Г. 8 – 11 лет
- Д. 12 – 15 лет

**Тетрациклиновое окрашивание твердых тканей зубов возникает вследствие:**

- А. наследственной патологии твердых тканей
- Б. нарушения водно-солевого обмена в период формирования эмали
- В. приема тетрациклина в период минерализации зубов
- Г. травматических повреждений зубов
- Д. нарушения микроэлементного состава питьевой воды

**Жалобы пациента при хроническом гранулирующем периодонтите временного зуба на:**

- А. боль от сладкого
- Б. боль от температурных раздражителей
- В. наличие свищевого хода в проекции верхушки корня
- Г. повышение температуры тела, озноб
- Д. «ночные» боли

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формами пульпита и жалобами на боли. Формы пульпита:

А) Острый очаговый;

Б) Острый диффузный. Жалобы на боли:

1. Самопроизвольные боли;
2. Приступообразные с длительными светлыми промежутками;
3. Приступообразные с короткими светлыми промежутками;
4. От температурных, химических и механических раздражителей;
5. Иррадиирующие по ходу ветвей тройничного нерва;
6. Локальные.

А. А) А1245 Б1235

Б. Б) А1246 Б1345

В. В) А2346 Б1245

Кариес в стадии пятна дифференцируют от:

- А. поверхностного кариеса
- Б. деструктивной формы флюороза
- В. эрозии эмали
- Г. несовершенного амелогенеза
- Д. бороздчатой формы системной гипоплазии

Природа кандидоза (молочницы):

- А. аллергическая
- Б. вирусная
- В. травматическая
- Г. бактериальная
- Д. грибковая

Клювовидные щипцы предназначены для удаления зубов челюсти:

- А. верхней
- Б. нижней
- В. обеих челюстей
- Г. верхней при ограниченном открывании рта
- Д. нижней при ограниченном открывании рта

**Симптом “щелчка” при открывании рта характерен для**

- А. вторичного деформирующего остеоартроза височно-нижнечелюстного сустава
- Б. привычного вывиха суставной головки
- В. хронического артрита височно-нижнечелюстного сустава
- Г. юношеского деформирующего артроза
- Д. анкилоза ВНЧС

**Глубина очага поражения при бороздчатой форме системной гипоплазии эмали зависит от:**

- А. возраста, в котором ребенок перенес заболевание
- Б. срока прорезывания зуба
- В. микроэлементного состава воды
- Г. силы воздействия повреждающего фактора
- Д. длительности воздействия повреждающего фактора

**При лечении зуба методом высокой ампутации на оставшуюся часть корневой пульпы воздействуют лекарственными веществами с целью:**

- А. прекращения воспалительного процесса
- Б. прекращения воспалительного процесса и обеспечения дальнейшего формирования корня
- В. обеспечения дальнейшего формирования зуба
- Г. прекращения дальнейшего формирования корня
- Д. ускорения формирования корня

**Эффективность лечения пульпита несформированных зубов ампуационным методом контролируют рентгенологически:**

- А. на следующий день после лечения, а затем 1 раз в год
- Б. через 3 недели, а потом 1 раз в год
- В. через 3 недели, а затем не реже 1 раза в год до завершения формирования корня
- Г. через 3-6 месяцев, а затем не реже 1 раза в год до завершения формирования корня
- Д. через 12 месяцев

**Возбудителем острого герпетического стоматита (ОГС) является вирус:**

- А. простого герпеса
- Б. ветряной оспы
- В. Коксаки
- Г. гриппа
- Д. ВИЧ

**При дифференциальной диагностике острого периодонтита и обострения хронического используют:**

- А. ЭОД
- Б. окрашивание зубов раствором Шиллера-Писарева
- В. рентгенологический метод
- Г. анамнез
- Д. перкуссию зуба

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность обработки и импрегнации поверхностного кариеса во временных зубах:**

- А) механическая обработка пораженной поверхности ручными инструментами;
- Б) очищение зуба от налета;
- В) изоляция от слюны;
- Г) изоляция десневого края;
- Д) высушивание;
- Е) импрегнация раствора нитрата серебра.

- А. А) АЕБВГД
- Б. Б) БВГДАЕ
- В. В) ЕБВАГД

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами анестезии и возможностью её проведения у разных групп зубов. Методы анестезии:**

- А. Инфильтрационная;
- Б. Интралигаментарная. Группы зубов:
- 1. временные центральные резцы;
- 2. временные и постоянные клыки;
- 3. моляры нижней челюсти;
- 4. моляры верхней челюсти;
- 5. премоляры.

- А. А) А12345 Б345
- Б. Б) А345 Б12345
- В. В) А1245 Б34

**Наиболее частой причиной воспалительных корневых кист челюстей у детей является хронический периодонтит зубов**

- А. временных резцов
- Б. временных клыков
- В. временных коренных
- Г. постоянных резцов
- Д. постоянных коренных

**Рентгенологические признаки вколоченного вывиха постоянного сформированного зуба:**

- А. периодонтальная щель равномерно расширена
- Б. на рентгенограмме изменений нет
- В. периодонтальная щель расширена у верхушки
- Г. периодонтальная щель «отсутствует» у верхушки корня
- Д. отсутствие периодонтальной щели в боковом отделе с одной стороны

**Укажите формулу зуба, для лечения которого у пациента 16 лет достаточно проведение инфильтрационной анестезии с анестетиком на основе артикаина**

- А. зуб 31
- Б. зуб 48
- В. зуб 37
- Г. зуб 46
- Д. зуб 38

**Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности действий этапов проведения операции цистотомии одонтогенной воспалительной кисты нижней челюсти справа с удалением причинного зуба 8.5:**

- А) удаление причинного зуба;
  - Б) удаление наружной стенки кисты;
  - В) наложение давящей повязки;
  - Г) анестезия;
  - Д) проведение трапецевидного разреза;
  - Е) сглаживание острых костных краев;
  - Ж) удаление кортикальной пластинки;
  - З) отсепаровка слизисто-надкостничного лоскута;
  - И) тампонада полости йодоформным тампоном.
- А. А) ГАДЗЖБЕИВ
  - Б. Б) ГВАДЗИЖЕБ
  - В. В) ИВГАБЕДЗЖ

**Развитие тканей периодонта заканчивается после завершения роста корня зуба через:**

- А. месяц
- Б. 6 – 9 месяцев,
- В. 1 – 2 года
- Г. 3-6 месяцев
- Д. 4 года

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие показаний и противопоказаний к применению методов эндогенной фторидпрофилактики. Группы:

А. Показание;

Б. Противопоказание. Условия:

1. отсутствие поступления фторидов из других источников;
2. высокая заболеваемость кариесом зубов;
3. низкая заболеваемость кариесом зубов;
4. содержание фторидов в питьевой воде выше нормы;
5. содержание фторидов в питьевой воде ниже 50% от нормы.

А. А) А125 Б34

Б. Б) А25 Б134

В. В) А15 Б234

При хроническом гранулирующем периодонтите на рентгенограмме выявляют:

А. очаг разрежения костной ткани без четких границ

Б. очаг разрежения костной ткани округлой или овальной формы с четкими границами, размером до 5 мм

В. расширение периодонтальной щели у верхушки корня зуба

Г. очаг разрежения костной ткани округлой или овальной формы с четкими границами, размером свыше 1 см в диаметре

Д. сужение периодонтальной щели у верхушки корня зуба

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между морфологическими элементами на слизистой оболочке и заболеваниями.

Морфологические элементы:

А) Пустулы, толстые соломенно-желтые корки;

Б) Одиночные эрозии округлой формы, покрытые фибринозным налетом;

В) Творожистый налет на слизистой оболочке губ, языка;

Г) Эрозии неправильных очертаний. Заболевания:

1. Травматические повреждения;

2. ХРАС;

3. Кандидоз;

4. Пиодермия;

5. ОГС.

А. А) А1 Б3 В4 Г2

Б. Б) А4 Б2 В3 Г5

В. В) А2 Б4 В1 Г3

**При несовершенном амелогенезе имеются нарушения в строении:**

- А. только дентина
- Б. только эмали
- В. эмали и дентина
- Г. пульпы
- Д. периодонта

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между состоянием корня и рентгенологической картиной. Состояние корня:**

- А) Корень в стадии незакрытой верхушки**
  - Б) Корень в стадии несформированной верхушки**
  - В) Сформированный корень Рентгенологическая картина:**
    - 1) корень нормальной длины, с заостренной верхушкой, апикальное отверстие узкое**
    - 2) корень нормальной длины, с заостренной верхушкой, апикальное отверстие широкое**
    - 3) корень короче нормальной длины, корневого канал узкий**
    - 4) корень короче нормальной длины, корневого канал широкий, расширяющийся у верхушки корня**
- А. А) А1 Б2 В3
  - Б. Б) А2 Б4 В1
  - В. В) А3 Б1 В2

**Вторичным элементом поражения при остром герпетическом стоматите (ОГС) является:**

- А. папула
- Б. пузырьки
- В. пятно
- Г. эрозия
- Д. узелок

**Укажите препарат, используемый для аппликационной анестезии у детей:**

- А. мепивакаин
- Б. лидокаин.
- В. артикаин
- Г. бупивакаин
- Д. прокаин (новокаин)

**При кандидозе необходимо ограничить в пищевом рационе употребление:**

- А. белков
- Б. жиров
- В. минеральных солей
- Г. углеводов
- Д. воды

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность лечения глубокого кариеса постоянных зубов:**

- А) полирование;
- Б) препарирование кариозной полости;
- В) обезболивание;
- Г) наложение лечебной прокладки;
- Д) антисептическая обработка;
- Е) пломбирование;
- Ж) нанесение защитного лака.

- А. А) ВБДГЕАЖ
- Б. Б) ВЖАБДГЕ
- В. В) АВЕБДГЖ

**Центральные резцы верхней челюсти при вколоченном вывихе у ребенка трех лет рекомендуется**

- А. оставить под наблюдением
- Б. репонировать
- В. удалить
- Г. выдвинуть в зубной ряд ортодонтическими методами
- Д. репонировать и шинировать

**Проведение контрастной рентгенографии при хроническом неспецифическом паренхиматозном паротите показано**

- А. в период обострения
- Б. в период ремиссии
- В. в период активного роста ребенка
- Г. в летний период
- Д. не показано

**Клинические признаки при ушибе постоянного или временного зуба в первые 2-3 дня после травмы:**

- А. зуб короче симметричного, погружен в лунку
- Б. дефект эмали и дентина
- В. смещение коронки в различном направлении
- Г. подвижность зуба незначительная или отсутствует, болезненная перкуссия
- Д. подвижность 2-3 степени



**Для острого эпидемического паротита симметричное поражение обеих желез**

- А. характерно всегда
- Б. не характерно
- В. характерно только для детей с патологией органов дыхания
- Г. характерно только для детей с патологией ЛОР-органов
- Д. характерно только для детей с патологией ЖКТ

**Кровоточивость из корневого канала при лечении хронического гранулирующего периодонтита несформированного зуба объясняется:**

- А. обострением воспалительного процесса
- Б. врастанием грануляционной ткани в корневой канал
- В. травмой пульпы инструментом, имеющим агрессивную верхушку
- Г. нерациональным применением медикаментов
- Д. физиотерапевтическим воздействием

**Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного сустава свойственны детям телосложения**

- А. нормостенического
- Б. гиперстенического
- В. астенического
- Г. нет зависимости от телосложения
- Д. нормостенического и гиперстенического

**«Дентинный мост» - это:**

- А. равномерное отложение дентина на стенках корня
- Б. образование слоя дентина в области раневой поверхности культи пульпы
- В. отложение дентина в центральных участках корневой пульпы
- Г. отложение дентина в межкорневом пространстве
- Д. отложение дентина у апикального отверстия

**Тактика врача по оказанию неотложной помощи при остром периодонтите постоянного зуба:**

- А. препарирование кариозной полости и расширение устьевой части корневого канала,
- Б. проведение резорцин-формалинового метода
- В. раскрытие полости зуба, удаление распада из канала, промывание канала растворами антисептиков, раскрытие верхушки корня
- Г. механическая и медикаментозная обработка канала с последующим пломбированием в это же посещение
- Д. удаление зуба

**Наиболее частым источником инфекции при остром периостите челюстных костей в детском возрасте являются**

- А. зубы 16 55 54 64 65 26
- Б. зубы 36 75 74 84 85 46
- В. ОРВИ и детские инфекционные заболевания
- Г. заболевания ЛОР-органов (риниты, гаймориты и др.)
- Д. заболевания ВНЧС

**Установите соответствие последовательности действий. Укажите последовательность периодов течения ОГС:**

- А) катаральный;
- Б) высыпаний;
- В) продромальный;
- Г) угасания.

- А. А) БВАГ
- Б. Б) ГВАБ
- В. В) ВАБГ

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и нарушением в строении тканей зуба. Диагноз:**

- А) Несовершенный амелогенез;
- Б) Несовершенный дентиногенез;
- В) Несовершенный одонтогенез. Нарушение строения тканей зуба:
- 1. нарушение в строении пульпы;
- 2. нарушение в строении только дентина;
- 3. нарушение в строении только эмали;
- 4. нарушение в строении эмали и дентина.

- А. А) А3 Б2 В4
- Б. Б) А2 Б1 В3
- В. В) А4 Б3 В1

**Установите соответствие последовательности действий. Установите порядок действий по оказанию неотложной помощи ребенку 7 лет при коллапсе:**

- А) очистить полость рта от инородных тел;
- Б) введение медикаментозных средств;
- В) прекращение операции;
- Г) освободить грудь, шею, живот от стесняющей одежды;
- Д) придать ребенку горизонтальное положение;
- Е) вызвать неотложную медицинскую помощь для госпитализации ребенка.

- А. А) ВГДАБЕ
- Б. Б) ДЕГВБА
- В. В) ЕАВГБД

**ЭОД при хронических формах пульпита в постоянных зубах со сформированными корнями:**

- А. 2-6 мкА
- Б. 8-10 мкА
- В. 10-20 мкА
- Г. 20-60 мкА
- Д. свыше 150 мкА

**Абсолютным показанием к удалению причинного временного зуба является**

- А. обострение хронического пульпита
- Б. хронический остеомиелит
- В. хронический пульпит
- Г. кариес дентина
- Д. кариес эмали

**Гибридный стеклоиономерный цемент применяют у детей:**

- А. для пломбирования кариозных полостей временных и несформированных постоянных зубов
- Б. для пломбирования кариозных полостей только временных зубов
- В. для пломбирования кариозных полостей только постоянных зубов
- Г. в качестве лечебной и изолирующей прокладки
- Д. в качестве девитализирующего препарата

**Дентин при активном течении кариеса:**

- А. светлый, влажный, легко удаляется экскаватором
- Б. светлый, влажный, удаляется экскаватором с трудом
- В. пигментированный, легко удаляется экскаватором
- Г. пигментированный, удаляется экскаватором с трудом
- Д. светлый, при зондировании плотный

**Ростковую зону формирующегося корня рентгенологически следует дифференцировать от:**

- А. острого периодонтита
- Б. обострения хронического гранулирующего периодонтита
- В. хронического гранулематозного периодонтита
- Г. хронического фиброзного периодонтита
- Д. остеосклероза

**К проводниковому методу обезболивания на верхней челюсти у детей относится анестезия:**

- А. торусальная
- Б. мандибулярная
- В. туберальная
- Г. у ментального отверстия
- Д. по Берше-Дубову

**Укажите формулу зуба, для лечения которого у пациента 15 лет необходимо провести проводниковую анестезию с анестетиком на основе артикаина**

- А. зуб 36
- Б. зуб 14
- В. зуб 25
- Г. зуб 42
- Д. зуб 33

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методом фторидпрофилактики кариеса и возрастом, с которого рекомендуется использовать данный метод. Метод фторидпрофилактики кариеса:**

- А. Чистка зубов фторидсодержащими зубными пастами;
- Б. Полоскание фторидсодержащими растворами;
- В. Покрытие зубов фторидсодержащим лаком;
- Г. Прием фторидсодержащих таблеток. Возраст с которого рекомендуется использовать метод:

- 1. 2 года;
- 2. 3 года;
- 3. 6 лет;
- 4. 10 лет;
- 5. 12 лет.

- А. А) А1 Б3 В3 Г1
- Б. Б) А1 Б3 В2 Г5
- В. В) А5 Б3 В2 Г1

**Возбудителем герпангины является вирус:**

- А. простого герпеса
- Б. ветряной оспы
- В. Коксаки
- Г. гриппа
- Д. ВИЧ

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность обследования пациента при заболеваниях пародонта:**

- А) установление предварительного диагноза;**
- Б) выяснение жалоб и анамнеза заболевания;**
- В) установление окончательного диагноза;**
- Г) составление плана лечения;**
- Д) внешний осмотр и осмотр полости рта;**
- Е) специальные методы исследования.**

- А. А) ГБЕДАВ
- Б. Б) АБЕДВГ
- В. В) БДАЕВГ

**При лечении ушиба однокорневого постоянного зуба необходимо:**

- А. шинирование пластмассовой шиной-каппой на 2-4 недели
- Б. шинирование проволочно-композитной шиной на 2-4 недели
- В. удаление травмированного зуба
- Г. разобщение прикуса в переднем отделе с помощью ортодонтических аппаратов
- Д. щадящая диета, выведение зуба из прикуса, динамическое наблюдение

**Флюороз развивается вследствие:**

- А. недостаточного содержания фторидов в питьевой воде
- Б. воздействия наследственных факторов
- В. избыточного содержания фторидов в питьевой воде
- Г. заболеваний ребенка на первом году жизни
- Д. применения фторидсодержащих зубных паст

**Установите правильную последовательность лечения кариеса в стадии пятна:**

- А) высушивание;**
- Б) очищение зуба от налета;**
- В) антисептическая обработка;**
- Г) изоляция от слюны; Д) аппликации реминерализирующих растворов.**

- А. А) БГДВА
- Б. Б) ДАБГВ
- В. В) БГВАД

**Форма пульпита, преобладающая во временных зубах у детей:**

- А. острый очаговый
- Б. острый диффузный
- В. хронический фиброзный
- Г. хронический гангренозный
- Д. хронический гипертрофический

**Причины несовершенного дентиногенеза:**

- А. болезни матери в I половине беременности
- Б. болезни матери в II половине беременности
- В. болезни ребенка в первые годы жизни
- Г. травматические повреждения зубов
- Д. генетические факторы

**Стеклоиономерный цемент образует прочные связи с:**

- А. эмалью зуба
- Б. дентином
- В. эмалью зуба, после кислотного протравливания
- Г. любым реставрационным материалом
- Д. всеми твердыми тканями зуба

**Для хронического паренхиматозного паротита симметричное поражение обеих слюнных желез является признаком**

- А. характерным
- Б. нехарактерным
- В. характерным только для детей с патологией органов дыхания
- Г. характерным только для детей с патологией ЛОР-органов
- Д. характерным только для детей с патологией ЖКТ

**Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности основных этапов лечения нагноившейся околокорневой воспалительной кисты нижней челюсти справа у ребенка 8 лет:**

- А) антибактериальная терапия;
  - Б) вскрытие гнойного очага;
  - В) удаление причинного зуба;
  - Г) цистотомия после стихания явлений воспаления;
  - Д) гипосенсибилизирующая и противовоспалительная терапия;
  - Е) анестезия.
- А. А) ГЕВДАБ
  - Б. Б) ЕГВДАБ
  - В. В) ЕВБАДГ

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность лечения среднего кариеса временных зубов:**

- А) нанесение защитного лака;**
- Б) обезболивание;**
- В) препарирование кариозной полости;**
- Г) нанесение кондиционера;**
- Д) антисептическая обработка;**
- Е) полирование;**
- Ж) пломбирование СИЦ**

А. А) БВДГЖЕА

Б. Б) БЕВАДГЖ

В. В) АБВЕДГЖ

**Неотложная помощь ребенку с острым гематогенным остеомиелитом заключается в**

- А. антибактериальной терапии
- Б. срочной госпитализации и хирургической помощью в полном объеме
- В. десенсибилизирующей терапии
- Г. озонотерапии
- Д. электрофорезе с ионами Са в зоне поражения

**Расширение периодонтальной щели у верхушки корня на рентгенограмме характерно для периодонтита:**

- А. острого
- Б. хронического фиброзного
- В. хронического гранулирующего
- Г. хронического гранулематозного
- Д. для всех форм

**Кюретаж лунки при удалении временного зуба**

- А. не проводится
- Б. проводится
- В. проводится при наличии воспаления в периапикальных тканях
- Г. проводится при условии наличия у ребенка сопутствующей патологии ЛОР-органов
- Д. проводится после удаления зуба в связи с его вколоченным вывихом

**Продолжительность воздействия препаратов сульфата железа при витальной пульпотомии:**

- А. 5 минут
- Б. 30 минут
- В. 2-3 суток
- Г. 5-7 суток
- Д. До 2-х недель

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между жалобами на боли и формами хронического пульпита. Жалобы на боли:

А) От воздействия температурных раздражителей;

Б) Самопроизвольные боли;

В) При накусывании на зуб;

Г) Жалобы на кровоточивость. Формы хронического пульпита:

1. Фиброзный;

2. Гангренозный;

3. Гипертрофический;

4. В стадии обострения.

А. А) А1 Б4 В2 Г3

Б. Б) А2 Б3 В1 Г4

В. В) А3 Б1 В4 Г 2

**Афты Беднара встречаются у:**

А. детей первых месяцев жизни

Б. детей 2-3 лет

В. старших дошкольников

Г. детей школьного возраста

Д. подростков

**Клиническая характеристика эмали при тетрациклиновых зубах:**

А. окрашивание коронок зубов в желтый цвет

Б. изменения цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки зуба

В. симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации

Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации

Д. стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба

**Рентгенологические критерии эффективности лечения пульпита в несформированных зубах методом витальной пульпотомии:**

А. апексогенез

Б. апексификация

В. остеомалация

Г. остеосклероз

Д. остеопороз



**Низкая резистентность твердых тканей зуба связана с:**

- А. избыточным накоплением ионов кальция
- Б. недостаточной минерализацией
- В. недостаточной функциональной нагрузкой
- Г. отсутствием зубов антагонистов
- Д. избыточным накоплением фторид ионов

**Установите соответствие последовательности действий. Этапы оказания неотложной помощи ребенку при терминальных состояниях в стоматологическом кресле:**

- А) искусственное дыхание;**
- Б) наружный массаж сердца;**
- В) придание ребенку горизонтального положения;**
- Г) очистить полость рта от рвотных масс;**
- Д) растирание спиртовым раствором.**

- А. А) ВГБАД
- Б. Б) ДВГБА
- В. В) БДВГА

**Возможные изменения при местной гипоплазии эмали:**

- А. облитерация полости зуба
- Б. пятно белого или коричневого цвета вблизи режущего края или бугра зуба
- В. продольные бороздки
- Г. поражение эмали всех моляров, резцов и клыков
- Д. меловидное пятно в пришеечной области

**К идиопатическим заболеваниям пародонта с прогрессирующим лизисом относятся:**

- А. синдром Папийона-Лефевра
- Б. язвенно-некротический гингивостоматит Венсана
- В. синдром Пьера-Робена
- Г. гипертрофический гингивит
- Д. синдром Стентона-Капдепона

**Для хронического рецидивирующего афтозного стоматита (ХРАС) характерны:**

- А. множественные пузырьковые высыпания, в том числе на красной кайме губ
- Б. острый катаральный гингивит
- В. эрозии округлой или овальной формы на гиперемизованном фоне
- Г. пузыри на разных участках слизистой оболочки полости рта
- Д. эрозии разных размеров с фестончатыми краями

**Каналы временных однокорневых сформированных зубов при лечении пульпита пломбируют:**

- А. резорцин-формалиновой пастой
- Б. пастой из окиси цинка на масляной основе
- В. фосфат-цементом
- Г. гуттаперчевыми штифтами
- Д. серебряными штифтами

**Системная гипоплазия эмали постоянных зубов у детей развивается вследствие:**

- А. заболеваний матери во время беременности
- Б. травматических повреждений временных зубов
- В. нарушения состава микроэлементов в воде
- Г. болезней ребенка после рождения
- Д. множественного осложненного кариеса временных зубов

**Рентгенологические признаки вколоченного вывиха постоянного зуба:**

- А. изменений на рентгенограмме нет
- Б. периодонтальная щель сужена, прерывиста или отсутствует
- В. расширение периодонтальной щели у верхушки корня
- Г. равномерное расширение периодонтальной щели.
- Д. отсутствие зуба в лунке

**Препарат, растворяющий некротические участки тканей в канале зуба:**

- А. перекись водорода,
- Б. йодиол
- В. гипохлорит натрия
- Г. марганцево-кислый калий
- Д. хлорамин

**Наибольшим кариеспрофилактическим действием обладают пасты:**

- А. гигиенические
- Б. противовоспалительные
- В. фторидсодержащие
- Г. отбеливающие
- Д. десенсиайзеры

**Интенсивность поражения кариесом в период временного прикуса определяется индексом:**

- А. СРТИН
- Б. КПУ
- В. ГИ
- Г. ПМА
- Д. кп

**Для кариозного процесса у детей до 3 лет характерно:**

- А. циркулярный и плоскостной кариес
- Б. локализация полостей на контактных поверхностях
- В. поражение бугров моляров
- Г. медленное течение процесса
- Д. тенденция к стабилизации

**Орхит как осложнение наблюдается у мальчиков, страдающих**

- А. хроническим паренхиматозным паротитом
- Б. острым эпидемическим паротитом
- В. калькулёзным сиалоаденитом
- Г. новорожденных
- Д. гангренозного

**При хроническом гипертрофическом пульпите характерны жалобы на боли:**

- А. самопроизвольные
- Б. постоянные
- В. при попадании пищи в кариозную полость
- Г. иррадиирующие
- Д. от температурных раздражителей

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методом анестезии и показаниями к их применению. Методы анестезии:**

**А. Интралигаментарная;**

**Б. Инфильтрационная. Показания к проведению анестезии:**

1. лечение кариеса;
2. лечение пульпита;
3. удаление зубов по поводу хронического апикального периодонтита (вне обострения);
4. депульпирование интактных зубов;
5. лечение пародонтита;
6. лечение острого апикального периодонтита.

А. А) А124 Б2345

Б. Б) А12346 Б1235

В. В) А1234 Б123456

**Хронический периодонтит временного зуба может быть причиной развития:**

- А. системной гипоплазии эмали
- Б. местной гипоплазии эмали
- В. несовершенного амелогенеза
- Г. несовершенного дентиногенеза
- Д. несовершенного одонтогенеза

**Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности действий этапов удаления постоянного зуба:**

- А) кюретаж;
- Б) отсепаровка круговой связки зуба;
- В) продвижение щечек щипцов;
- Г) фиксация щечек щипцов;
- Д) наложение щечек щипцов;
- Е) вывихивание (вращение) зуба;
- Ж) сближение краев лунки;
- З) извлечение зуба из лунки.

- А. А) ЖБДАВГЕЗ
- Б. Б) БДВГЕЗАЖ
- В. В) ДВЖГБЕЗА

**Редкий, слабого наполнения пульс характерен для:**

- А. сердечно-сосудистого коллапса
- Б. обморока
- В. анафилактического шока
- Г. болевого шока
- Д. эпилептического припадка

**Рентгенологически при хронических формах пульпита в межкорневом пространстве у временных моляров выявляется:**

- А. значительное расширение периодонтальной щели
- Б. ослабление рисунка костных балочек
- В. остеосклероз
- Г. гиперцементоз
- Д. изменения отсутствуют

**При остром гнойном периостите причинный временный однокорневой зуб**

- А. всегда удаляется
- Б. трепанируется и пломбируется
- В. пломбируется и производится резекция верхушки корня
- Г. удаляется по показаниям
- Д. трепанируется и шинируется

**Содержимое ненагноившейся корневой кисты представлено**

- А. желтоватая прозрачная жидкость, опалесцирующая на свету
- Б. мутная жидкость
- В. кровянистое содержимое
- Г. творожистое содержимое белого цвета
- Д. желтоватое салоподобное содержимое

**Период физиологического покоя временного зуба длится от:**

- А. прорезывания временного зуба до его смены на постоянный
- Б. конца формирования корня до начала его резорбции
- В. момента прорезывания зуба до появления кариозной полости
- Г. конца формирования корня до появления кариозной полости
- Д. 9 месяцев

**Очаг деструкции костной ткани у верхушки корня сформированного постоянного зуба с нечеткими границами выявляется при:**

- А. кистогранулемы
- Б. хроническом фиброзном периодонтите
- В. хроническом гранулирующем периодонтите
- Г. хроническом гранулематозном периодонтите
- Д. радикулярной кисте

**Кариозные пятна чаще выявляются на поверхности зубов:**

- А. вестибулярной
- Б. контактной
- В. жевательной
- Г. на режущем крае
- Д. небной/язычной

**Наиболее достоверным признаком консолидации фрагментов нижней челюсти является**

- А. исчезновение боли
- Б. образование костной мозоли
- В. уменьшение подвижности фрагментов
- Г. отсутствие крепитации
- Д. исчезновение отека окружающих мягких тканей

**При переломе вблизи верхушки или средней части корня постоянного несформированного и сформированного зуба требуется выполнить:**

- А. высокую витальную ампутацию
- Б. пломбирование канала пастой
- В. пломбирование канала цементом
- Г. удаление зуба до линии отлома
- Д. шинирование

**Рентгенологические признаки ушиба временного или постоянного зуба в первые 2-3 дня после травмы:**

- А. периодонтальная щель равномерно расширена
- Б. периодонтальная щель расширена на одной стороне
- В. периодонтальная щель расширена у верхушки зуба
- Г. на рентгенограмме изменений нет
- Д. периодонтальная щель "отсутствует" у верхушки зуба.

**Болезненное зондирование в глубине полости зуба характерно для пульпита:**

- А. острого очагового
- Б. острого диффузного
- В. хронического фиброзного
- Г. хронического гангренозного
- Д. хронического гипертрофического

**Деструктивная форма флюороза развивается при содержании фторидов в питьевой воде:**

- А. 0,5 мг/л
- Б. 1 мг/л
- В. 2-3 мг/л
- Г. 4-6 мг/л
- Д. 7-9 мг/л и выше

**Жалобы при ушибах временных и постоянных зубов в первые 2-3 дня после травмы:**

- А. ноющие боли при накусывании
- Б. жалоб нет
- В. интенсивные приступообразные ночные боли
- Г. боли от холодного и горячего
- Д. подвижность 2-3 степени

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами местного обезболивания и временем наступления анестезии. Методы анестезии:

А. Инфильтрационная;

Б. Интралигаментарная;

В. Мандибулярная. Время наступления анестезии (латентный период):

1) 15-45 с;

2) 1-2 мин.;

3) 10-15 мин.;

4) 30 мин.

А. А) А3 Б4 В2

Б. Б) А2 Б1 В3

В. В) А2 Б3 В4

Для дезинфекции корневых каналов применяют:

А. 0,02% раствор перманганата калия,

Б. 70%спиртовой раствор

В. дистиллированную воду

Г. 3 %гипохлорит натрия

Д. раствор бриллиантового зеленого

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между этиологией и заболеваниями. Этиология:

А) Грибковая;

Б) Бактериальная;

В) Вирусная;

Г) Инфекционно-аллергическая. Заболевания:

1. ОГС;

2. Пиодермия;

3. ХРАС;

4. Герпангина;

5. Кандидоз;

6. МЭЭ

А. А) А35 Б2 В4 Г16

Б. Б) А1 Б2 В36 Г45

В. В)А5 Б2 В14 Г36

**При воспалительных корневых кистах от временных зубов на нижней челюсти преимущественно проводится операция**

- А. цистэктомия
- Б. цистотомия
- В. цистэктомия с резекцией верхушек корней причинного зуба
- Г. удаление зуба
- Д. цистаденэктомия

**При лёгкой степени пародонтита на рентгенограмме выявляются следующие изменения:**

- А. резорбция костной ткани альвеолярного отростка на 1/2 корня
- Б. резорбция компактных пластинок и вершин межзубных перегородок
- В. сохранность кортикальной пластинки лунок зубов
- Г. наличие очагов остеопороза альвеолярной кости
- Д. нет изменений в костной ткани альвеолярного отростка

**Форма пульпита, преобладающая в постоянных зубах у детей:**

- А. острый диффузный пульпит
- Б. хронический фиброзный
- В. хронический гангренозный
- Г. хронический гипертрофический
- Д. хронический в стадии обострения

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между средствами профессиональной гигиены и очищаемой поверхностью зуба. Средства:**

- А. Резиновые колпачки и полировочная паста;
  - Б. Вращающиеся щетки и полировочная паста;
  - В. Зубная нить. Поверхности зуба:
    - 1. жевательные;
    - 2. оральные;
    - 3. вестибулярные;
    - 4. контактные.
- А. А) А3 Б1 В24
  - Б. Б) А13 Б2 В4
  - В. В) А23 Б1 В4



**Противопоказанием к проведению операции пластики уздечки языка ребенку 5 лет в поликлинике под наркозом является:**

- А. заболевание ЦНС
- Б. острая респираторно-вирусная инфекция
- В. хронический гепатит
- Г. сахарный диабет
- Д. рахит

**Шипиками заканчиваются обе щёчки щипцов, предназначенных для удаления зубов челюсти**

- А. верхней
- Б. нижней
- В. обеих челюстей
- Г. верхней при ограниченном открывании рта
- Д. нижней при ограниченном открывании рта

**При рождении ребенка с центральными нижними резцами эти зубы необходимо**

- А. сохранить
- Б. удалить
- В. необходимо изготовить защитную пластинку на нижнюю челюсть
- Г. перевести на искусственное вскармливание
- Д. необходимо сошлифовать режущие края резцов

**Укажите правильную последовательность этапов при пломбировании композитами:**

- А) внесение пломбировочного материала;**
- Б) нанесение бондинга;**
- В) протравливание эмали;**
- Г) наложение прокладки;**
- Д) полирование пломбы.**

- А. А) ГВБАД
- Б. Б) АГВБД
- В. В) ДГВБА

**Хронический гипертрофический пульпит является следствием пульпита:**

- А. острого очагового
- Б. острого диффузного
- В. хронического фиброзного.
- Г. хронического гангренозного
- Д. хронического гангренозного в стадии обострения

**Пульс у пациента без сознания определяют над проекцией**

- А. лучевой артерии
- Б. плечевой
- В. наружной сонной
- Г. локтевой
- Д. общей сонной

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие в применении местных анестетиков при инъекционных и аппликационном способе обезболивания. Способы обезболивания:**

**А. инфильтрационная, проводниковая анестезия;**

**Б. аппликационная анестезия. Анестетики:**

**1. Тетракаин/дикаин;**

**2. Лидокаин;**

**3. Артикаин;**

**4. Мепивакаин;**

**5. Бензокаин/анестезин.**

А. А) А234 Б125

Б. Б) А135 Б245

В. В) А345 Б123

**У детей среднего и старшего возраста преобладает остеомиелит этиологии**

- А. посттравматической
- Б. одонтогенной
- В. гематогенной
- Г. тонзилогенной
- Д. отогенный

**Фолликулы третьего постоянного моляра на рентгенограмме определяются в возрасте:**

- А. при рождении ребёнка
- Б. 2,5 – 3-х лет
- В. 4 - 5 лет
- Г. 5 -6 лет
- Д. 7 -8 лет

**При лечении периодонтита временного однокорневого зуба со сформированным корнем канал пломбируют:**

- А. стеклоиономерным цементом
- Б. фосфат-цементом
- В. резорцин-формалиновой пастой
- Г. пастой на масляной основе содержащей гидроксид кальция
- Д. гуттаперчевыми штифтами

**Для контроля качества чистоты канала используют:**

- А. фурацилин
- Б. йодоформ
- В. перекись водорода
- Г. раствор ферментов
- Д. хлорофиллипт

**Для удаления временных зубов специальные наборы щипцов**

- А. не существуют
- Б. существуют
- В. в стадии разработки
- Г. существуют только для верхней челюсти
- Д. существуют только для верхней челюсти

**Образование дентина происходит за счет деятельности клеток:**

- А. амелобластов
- Б. цементобластов
- В. остеобластов
- Г. ретикулоцитов
- Д. одонтобластов

**Зубы Гетчинсона, Пфлюгера, Фурнье являются разновидностью:**

- А. системной гипоплазии эмали
- Б. эндемического флюороза
- В. патологического стирания эмали
- Г. несовершенного одонтогенеза
- Д. несовершенного амелогенеза

**Корень в стадии несформированной верхушки на рентгенограмме проецируется:**

- А. нормальной длины, с заострённой верхушкой, апикальное отверстие узкое
- Б. нормальной длины, с заострённой верхушкой, апикальное отверстие широкое
- В. нормальной длины, корневой канал в области верхушки в виде раструба
- Г. короче нормальной длины, корневой канал широкий, расширяющийся у верхушки корня
- Д. короче нормальной длины, апикальное отверстие облитерировано

**«Заместительный» дентин откладывается**

- А. по эмалево-дентинному соединению
- Б. у апикального отверстия
- В. в полости зуба, уменьшая её объём
- Г. в слое околопульпарного дентина
- Д. в кариозной полости

**Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности действий лечения ребенка с диагнозом: Острый гнойный периостит верхней челюсти справа. Обострение хронического периодонтита зуба**

**5.4:**

- А) гипосенсибилизирующая терапия;**
  - Б) симптоматическая терапия;**
  - В) удаление зуба**
- 5.4;**
- Г) антибактериальная терапия;**
  - Д) вскрытие и дренирование гнойного очага;**
  - Е) физиотерапевтические процедуры.**
- А. А) ВБДЕГА  
Б. Б) ЕБВДГА  
В. В) ВДГАБЕ

**После прорезывания зуба возникает:**

- А. гипоплазия эмали
- Б. флюороз
- В. перелом коронки в результате травмы
- Г. несовершенный амелогенез
- Д. тетрациклиновое окрашивание

**Калькулёзный сиалоаденит у детей преимущественно развивается в слюнных железах**

- А. околоушных
- Б. поднижнечелюстных
- В. малых слюнных губы
- Г. подъязычных
- Д. малых слюнных щек

**При несовершенном одонтогенезе (дисплазии Капдепона) поражены:**

- А. только временные зубы
- Б. временные и постоянные моляры
- В. временные и постоянные резцы
- Г. все временные и постоянные зубы
- Д. только постоянные зубы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и частотой обработки полости рта. Заболевания:

А) ОГС;

Б) Кандидоз;

В) Пиодермия;

Г) ХРАС;

Д) МЭЭ. Частота обработки полости рта:

1. Каждый час;

2. Перед едой;

3. После каждого приема пищи;

4. Только перед сном.

А. А) А1 Б2 В3 Г3 Д3

Б. Б) А2 Б1 В3 Г2 Д1

В. В) А3 Б2 В1 Г3 Д1

**В сменном прикусе при лечении вывихов зубов рекомендуется использовать шину**

А. проволочно-композитную

Б. пластмассовую назубную

В. пластмассовую зубонаддесневую

Г. ленточную шину

Д. ленточную шину Васильева

**Возбудителем острого герпетического стоматита (ОГС) является:**

А. актиномицеты

Б. палочка Леффлера

В. дрожжеподобные грибы

Г. вирус простого герпеса

Д. фузоспирохеты Венсана

**Клинические проявления инфекционного острого периодонтита:**

А. боль при накусывании на зуб, отек мягких тканей лица

Б. иррадиирующие приступообразные боли

В. свищ на десне с гнойным отделяемым

Г. ЭОД до 20мкА

Д. боли от температурных раздражителей

**Причиной пульпита в постоянных резцах с несформированными корнями чаще является:**

- А. перелом части коронки зуба
- Б. нарушение техники препарирования кариозной полости
- В. инфицирование из кариозной полости
- Г. наследственная предрасположенность
- Д. ретроградное инфицирование пульпы

**Наиболее информативным методом диагностики переломов челюстей является**

- А. реография
- Б. электромиография
- В. ортопантомография
- Г. компьютерная томография
- Д. аксиография

**Для лечения начальных форм кариеса постоянных зубов у детей применяется:**

- А. 30 % раствор нитрата серебра
- Б. препараты, содержащие кальций и фосфаты
- В. р-р Шиллера-Писарева
- Г. капрофер
- Д. 3 % гипохлорит натрия

**Растворы местных анестетиков, содержащие адреналин, не рекомендуется применять при проведении анестезии детям до:**

- А. трех лет
- Б. пяти лет
- В. шести лет
- Г. семи лет
- Д. десяти лет

**Диагностическим признаком неполного вывиха зуба является**

- А. Ночные самопроизвольные боли
- Б. Подвижность зуба
- В. Болезненность при пальпации по переходной складке в проекции верхушки корня
- Г. Отечность мягких тканей лица

**Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем**

- А. Соблюдения правил техники безопасности при осуществлении медицинской деятельности
- Б. Соблюдения норм трудовой дисциплины
- В. Рационального использования лекарственных средств у льготных категорий граждан
- Г. Соблюдения этических и моральных норм, уважительного и гуманного отношения к пациенту

**Силанты - материалы для**

- А. Герметизации фиссур
- Б. Пломбирования корневых каналов
- В. Изолирующих прокладок
- Г. Пломбирования кариозных полостей

**Изменения костной ткани межзубных перегородок на рентгенограммах выявляются при**

- А. Гипертрофическом гингивите
- Б. Атрофическом гингивите
- В. Катаральном гингивите
- Г. Хроническом пародонтите

**Дифференциальная диагностика фолликулярной кисты проводится с**

- А. Одонтомой
- Б. Радикулярной кистой
- В. Цементомой
- Г. Репаративной гранулемой

**Показанием к применению системных методов фторидпрофилактики кариеса является содержание фторидов в питьевой воде**

- А. Больше оптимального
- Б. Оптимальное
- В. Менее половины оптимального
- Г. Субоптимальное

**Мимические мышцы иннервируются нервом**

- А. Лицевым
- Б. Тройничным
- В. Тройничным и лицевым
- Г. Ушно-височным и тройничным

**Формирование корня центральных молочных резцов завершается в возрасте**

- А. 12-15 Месяцев
- Б. 10-12 Месяцев
- В. После 3 лет
- Г. 18-24 Месяцев

**Каждый зуб верхней челюсти антагонизирует с одноименным зубом**

- А. Верхней челюсти
- Б. Нижней челюсти и впередистоящим зубом
- В. Нижней челюсти
- Г. Нижней челюсти и позадистоящим зубом

**Высокое прикрепление уздечки нижней губы чаще приводит к**

- А. Уплотнению центрального отдела нижней челюсти
- Б. Веерообразному расхождению зубов
- В. Локальному пародонтиту
- Г. Нарушению соотношения челюстей

**Высота суставного бугорка**

- А. Зависит только от возраста
- Б. Не зависит от возраста
- В. Зависит только от окклюзии
- Г. Зависит от возраста и вида окклюзии

**Амелобласту следует дифференцировать с**

- А. Пародонтитом
- Б. Цементомой
- В. Твердой одонтомой
- Г. Радикулярной кистой

**Формирование корней постоянных клыков заканчивается в возрасте ребенка (в годах)**

- А. 12-14
- Б. 13-15
- В. 10-12
- Г. 9-10

**Образование и минерализация вершин и компактных пластинок межзубных перегородок жевательной группы зубов заканчивается к \_\_\_\_ годам**

- А. 8-9
- Б. 14-15
- В. 6-7
- Г. 10-11



**Наиболее частая локализация поражения лицевого черепа при гематогенном остеомиелите у детей**

- А. Тело нижней челюсти
- Б. Скуловой и лобный отростки верхней челюсти, мышелковый отросток нижней челюсти
- В. Носовые кости, решетчатый лабиринт
- Г. Альвеолярный отросток верхней и альвеолярная часть нижней челюстей

**Временные центральные резцы нижней челюсти прорезываются в возрасте**

- А. 6-8 Месяцев
- Б. 20-30 Месяцев
- В. 12-16 Месяцев
- Г. 5-6 Лет

**Осуществление стоматологического просвещения является основной обязанностью**

- А. Родителей
- Б. Гигиенистов стоматологических
- В. Педагогов
- Г. Медицинских сестер

**При шинировании и фиксации при переломе левого мышелкового отростка у ребёнка 7 лет применяют**

- А. Пластмассовую зубонаддесневую шину на нижнюю челюсть с пелотом справа
- Б. Проволочные шины с зацепными петлями на обе челюсти с межчелюстной тягой
- В. Гладкую шину-скобу
- Г. Пластмассовую зубонаддесневую шину на нижнюю челюсть с пелотом слева

**Индекс федорова-володкиной у детей используют для оценки**

- А. Гигиены полости рта
- Б. Некариозных поражений зубов
- В. Начальных кариозных поражений
- Г. Кровоточивости десневой борозды

**Клювовидные щипцы, щёчки которых заканчиваются шипиками, предназначены для удаления зубов**

- А. Премоляров
- Б. Резцов
- В. Моляров
- Г. Клыков

**Для выявления всех зачатков постоянных зубов у детей необходимо провести**

- А. Телерентгенограмму головы в прямой проекции
- Б. Ортопантомограмму
- В. Панорамный снимок
- Г. Прицельный снимок

**Разрабатывать и утверждать клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи могут только**

- А. Министерство здравоохранения РФ и Министерство юстиции РФ
- Б. Медицинские профессиональные некоммерческие организации
- В. Органы местного самоуправления
- Г. Органы исполнительной власти субъектов РФ

**При проведении системной антибактериальной терапии при лечении агрессивного пародонтита обязательным является назначение**

- А. Кортикостероидов
- Б. Пробиотиков
- В. Витаминов
- Г. Адаптогенов

**Метод витального окрашивания эмали используют для дифференциальной диагностики**

- А. Флюороза и эрозии зубов
- Б. Эрозии зубов и клиновидного дефекта
- В. Начального кариеса и кариеса дентина
- Г. Начального кариеса и флюороза зубов

**На рентгенограмме при несовершенном дентиногенезе выявляются**

- А. Корневые каналы и полости зубов облитерируются
- Б. Просвет корневых каналов зубов широкий
- В. Расширение периодонтальной щели у верхушки корня
- Г. Корни зубов нормальной длины

**Родители должны начинать чистить детям зубы**

- А. После прорезывания первого временного зуба
- Б. С 2 лет
- В. С 3 лет
- Г. С 1 года

**Термин аутотрансплантация обозначает трансплантацию**

- А. Небиологического субстрата
- Б. Между организмами, идентичными в генетическом отношении
- В. Между организмами одного вида
- Г. В пределах одного организма

**При средней степени гипертрофического гингивита десна закрывает \_\_\_\_\_ зуба**

- А. 1/2
- Б. 3/4
- В. 1/3
- Г. 2/3

**При переломе коронки с обнажением пульпы постоянного сформированного зуба в первые 6 часов необходимо провести**

- А. Экстирпацию пульпы
- Б. Биологический метод с одновременной защитой зуба ортодонтической коронкой
- В. Витальную ампутацию
- Г. Высокую ампутацию пульпы

**При несовершенном одонтогенезе поражены**

- А. Молочные резцы и моляры
- Б. Все молочные и постоянные резцы
- В. Все молочные и все постоянные зубы
- Г. Все молочные и постоянные моляры

**Первым этапом контролируемой чистки зубов является**

- А. Самостоятельная чистка зубов пациентом
- Б. Индивидуальный подбор пациенту средств гигиены полости рта
- В. Обучение пациента чистке зубов на моделях
- Г. Определение гигиенического состояния

**К постоянным зубам одного периода минерализации относятся**

- А. Резцы, клыки, первые моляры
- Б. Резцы, премоляры, вторые моляры
- В. Клыки, премоляры, первые моляры
- Г. Первые, вторые, третьи моляры

**Поверхность эмали при кариесе в стадии белого пятна**

- А. Матовая и шероховатая
- Б. Блестящая и шероховатая
- В. Гладкая и блестящая
- Г. Матовая и гладкая

**Четкие видимые изменения в эмали при регистрации в оценке тяжести кариозного поражения поверхности зуба по системе icdas соответствуют коду**

- А. 2
- Б. 5
- В. 0
- Г. 3

**Школьники, имеющие легкие формы хронических заболеваний слизистой оболочки полости рта, относятся к диспансерной группе**

- А. V
- Б. I
- В. IV
- Г. III

**Ночные иррадиирующие боли с короткими светлыми промежутками характерны для**

- А. Хронического периодонтита
- Б. Хронического пульпита
- В. Острого диффузного пульпита
- Г. Глубокого кариеса

**Показанием к применению эндогенных методов фторидпрофилактики кариеса у детей является**

- А. Высокая распространенность флюороза
- Б. Высокий уровень интенсивности кариеса
- В. Низкий уровень знаний о профилактике кариеса
- Г. Неудовлетворительный уровень гигиены полости рта

**У детей в воспалительный процесс могут вовлекаться окружающие зуб ткани (периодонт, кость, надкостница), региональные лимфоузлы и мягкие ткани лица при пульпите**

- А. Хроническом фиброзном
- Б. Хроническом гангренозном вне стадии обострения
- В. Остром гнойном (диффузном)
- Г. Хроническом гипертрофическом

**Наиболее легкой формой системной гипоплазии эмали является**

- А. Аплазия
- Б. Чашеобразная
- В. Бороздчатая
- Г. Пятнистая

**Атрофически-дистрофические процессы в тканях пародонта наблюдаются при**

- А. Пародонтозе
- Б. Гингивите
- В. Пародонтите
- Г. Фиброматозе

**Фактором успеха реплантации при полном вывихе зуба является**

- А. Адекватная среда для транспортировки
- Б. Отсутствие травмы соседних зубов
- В. Жесткое шинирование вывихнутого зуба
- Г. Отсутствие у ребенка зубо-челюстных аномалий

**Для планирования программы профилактики стоматологических заболеваний наиболее важной является информация о/об**

- А. Стоматологической заболеваемости населения
- Б. Состоянии окружающей среды
- В. Динамике демографических процессов в регионе
- Г. Имеющемся персонале и материальных ресурсах

**Полоскание раствором с концентрацией фторида 0,1% рекомендуется проводить детям**

- А. 2-3 Раза в неделю
- Б. 1 Раз в месяц
- В. 1 Раз в неделю
- Г. 1 Раз в две недели

**Первичный сифилис на слизистой оболочке рта проявляется как**

- А. Папулёзный сифилид
- Б. Твёрдый шанкр
- В. Пузырёк
- Г. Пятнистый сифилид

**Согласно рекомендациям ВОЗ очень низкий уровень интенсивности кариеса у 12-летних детей соответствует значению кпу**

- А. 0-1
- Б. 2,7-4,4
- В. 4,5-6,6
- Г. 1,1-2,6

**Хронический пульпит может быть**

- А. Гранулирующий
- Б. Гранулематозный
- В. Фиброзный
- Г. Гиперэргический

**Рабочая длина корневого канала определяется**

- А. Ортопантограммой
- Б. По ощущениям пациента
- В. По субъективным ощущениям врача
- Г. Рентгенограммой с иглой

**Для хронического рецидивирующего паренхиматозного паротита симметричное поражение обеих слюнных желез является признаком**

- А. Необязательным
- Б. Обязательным только для детей с патологией ЖКТ
- В. Обязательным
- Г. Обязательным только для детей с эндокринной патологией

**После удаления постоянного зуба лунку обрабатывают**

- А. Кюретажной ложкой
- Б. Экскаватором
- В. Гладилкой
- Г. Распатором

**При лечении острого герпетического стоматита ведущая роль принадлежит \_\_\_\_\_ терапии**

- А. Иммуномодулирующей
- Б. Противогрибковой
- В. Противовирусной
- Г. Антибактериальной

**В целях профилактики кариеса у детей следует ограничить в рационе питания**

- А. Творог
- Б. Овощи
- В. Конфеты
- Г. Мясо

**Вторая цифра двузначного кода по icdas характеризует**

- А. Состояние поверхностей зуба
- Б. Уровень гигиены полости рта
- В. Тяжесть кариозного поражения
- Г. Состояние тканей пародонта

**Ключевые возрастные группы программ оказания стоматологической помощи детям, обучающимся в детских образовательных учреждениях**

- А. 8 Лет, 12 лет, 15 лет
- Б. 6 Лет, 12 лет, 15 лет
- В. 6 Лет, 10 лет, 15 лет
- Г. 6 Лет, 12 лет, 18 лет

**S - образно изогнутые щипцы, имеющие на щечке шип, предназначены для удаления зубов**

- А. 4, 1.5, 2.4, 2.5
- Б. 4, 3.5, 4.4, 4.5
- В. 6, 1.7, 2.6, 2.7
- Г. 3, 2.3, 3.3, 4.3

**Травление эмали проводят перед наложением пломбы из**

- А. СИЦ
- Б. Композита
- В. Серебряной амальгамы
- Г. Поликарбоксилатного цемента

**Низкое содержание фторидов в питьевой воде является фактором риска возникновения**

- А. Кариеса
- Б. Флюороза
- В. Гипоплазии эмали
- Г. Эрозии

**Два корня и два канала имеют зубы**

- А. 4 и 4.4
- Б. 2 и 2.2
- В. 4 и 2.4
- Г. 2 и 4.2

**Под действием йода в зубном налете окрашиваются**

- А. Органические кислоты
- Б. Производные углеводов
- В. Микроорганизмы
- Г. Эпителиальные клетки

**Окончательное формирование корневого дентина постоянных зубов после прорезывания зубов завершается через (в годах)**

- А. 4-5
- Б. 6-7
- В. 2-3
- Г. 1,5-2

**После профессионального удаления зубных отложений у детей проводят**

- А. Окрашивание зубов йодсодержащим раствором
- Б. Контролируемую чистку зубов
- В. Покрытие зубов фторлаком
- Г. Определение индексов гигиены

**Пломбирование каналов временных резцов с разрушением коронки производят**

- А. Резорцин-формалиновой пастой
- Б. Серебряным штифтом
- В. Фосфат-цементом
- Г. Пастой из окиси цинка на масляной основе

**Школьники, имеющие среднюю степень активности кариеса, относятся к диспансерной группе**

- А. V
- Б. III
- В. I
- Г. IV



**Субпериостальная киста возникает при разрастании гранулемы причинного зуба, расположенной**

- А. С латеральной поверхности корня
- Б. Ближе к наружной поверхности челюсти
- В. У верхушки корня зуба
- Г. В толще челюсти

**Причиной развития системной гипоплазии эмали временных зубов можно считать**

- А. Неполноценное питание в первые три года жизни
- Б. Аллергические заболевания ребенка
- В. Инфекционные заболевания матери во время беременности
- Г. Гнойно-септические состояния у ребенка на втором году жизни

**Укороченная уздечка языка является причиной**

- А. Задержки прорезывания постоянных зубов
- Б. Нарушения глотания
- В. Лингвоокклюзии
- Г. Сужения верхнего зубного ряда

**К наследственным заболеваниям твердых тканей зуба относится**

- А. Несовершенное строение эмали и дентина
- Б. Тетрациклиновые зубы
- В. Местная гипоплазия эмали
- Г. Системная гипоплазия эмали

**Резорбция корней первых временных моляров начинается в возрасте \_\_\_\_\_ лет**

- А. 3
- Б. 6
- В. 8
- Г. 4

**Афты беднара возникают при**

- А. Хроническом рецидивирующем афтозном стоматите
- Б. Хронической травме слизистой
- В. Вторичном сифилисе
- Г. Остром герпетическом стоматити

**Профилактика местной гипоплазии постоянных зубов заключается в**

- А. Проведении реминерализующей терапии
- Б. Своевременном лечении молочных зубов
- В. Замене водоисточника с повышенным содержанием фтора
- Г. Полноценном питании ребенка на первом году жизни

**На рентгенограмме при несовершенном дентиногенезе выявляют**

- А. Корни зубов нормальной длины
- Б. Облитерацию корневых каналов и полостей зубов вскоре после прорезывания зуба
- В. Расширение периодонтальной щели у верхушки корня
- Г. Широкий просвет корневого канала

**Метод витального окрашивания эмали применяется для дифференциальной диагностики**

- А. Начального кариеса и флюороза
- Б. Флюороза и гипоплазии эмали
- В. Эрозии зубов и клиновидного дефекта
- Г. Кариеса эмали и кариеса дентина

**Эпителиальные островки маляссе наиболее часто локализуются в**

- А. Пришеечной области периодонта корня
- Б. Средней трети периодонта корня
- В. Дентине корня
- Г. Периапикальной костной ткани

**Для зубных щеток рекомендуют использовать \_\_\_\_\_ щетину**

- А. Редкую
- Б. Натуральную
- В. Густую
- Г. Искусственную

**Временная окклюзия формируется у ребенка к возрасту (лет)**

- А. 4
- Б. 3
- В. 6
- Г. 5

**При хронических формах пульпита обнаруживается \_\_\_\_\_ микрофлора**

- А. Смешанная
- Б. Стафилококковая
- В. Грибковая
- Г. Стрептококковая

**Причиной скученности зубов является**

- А. Макрогнатия
- Б. Макроглоссия
- В. Сужение и укорочение зубного ряда
- Г. Микрогения

**При вколоченном вывихе постоянного резца у ребенка 12 лет показано**

- А. Произвести репозицию, фиксацию, наблюдение с рентгенологическим контролем и ЭОД
- Б. Провести операцию удаления зуба
- В. Исключить нагрузки, наблюдение (рентгенограмма, ЭОД), по показаниям - эндодонтическое лечение
- Г. Динамическое наблюдение без вмешательства

**Клиническая характеристика эмали зубов при пятнистой форме флюороза представляет собой**

- А. Меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- Б. Симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации
- В. Изменение цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки зуба
- Г. Окрашивание коронок зубов в жёлтый цвет

**Для одонтогенной кисты характерно наличие**

- А. Нечетких контуров
- Б. Внутренних перегородок – септ
- В. Резорбции корней соседних зубов
- Г. Зуба – источника инфекции

**При остром остеомиелите причинный постоянный многокорневой зуб у детей**

- А. Удаляется по показаниям
- Б. Удаляется по настоянию родителей
- В. Не удаляется
- Г. Удаляется всегда

**Элеватор леклюза предназначен для удаления**

- А. Резцов верхней челюсти
- Б. Третьего моляра нижней челюсти
- В. Корней зубов верхней челюсти
- Г. Корней временных зубов

**Выделение фторида из стеклоиономерного цемента прямо пропорционально**

- А. Виду стеклоиономерного цемента
- Б. РН ротовой жидкости
- В. Размеру пломбы
- Г. Размеру коронковой части зуба

**Ведущим признаком, обуславливающим нарушение функции речи, является**

- А. Пониженный тонус круговой мышцы рта
- Б. Короткая уздечка языка
- В. Нарушение сроков прорезывания зубов
- Г. Мощная уздечка верхней губы

**При отломе части коронки зуба с обнажением пульпы пациенты жалуются на боли**

- А. При накусывании на зуб
- Б. Ночные
- В. От раздражителей
- Г. Самопроизвольные

**В результате воспаления в периапикальных тканях развивается**

- А. Одонтогенная воспалительная киста
- Б. Кератокиста
- В. Аневризмальная киста
- Г. Носоальвеолярная киста

**Для афт при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите характерен**

- А. Ободок из быстро лопающихся везикул
- Б. Предшествующий пузырь на слизистой
- В. Ободок из чешуек
- Г. Ярко-красный воспалительный ободок

**Связочный аппарат зуба представлен тканью**

- А. Соединительной
- Б. Нервной
- В. Грануляционной
- Г. Мышечной

**Калибровка специалистов, участвующих в эпидемиологическом стоматологическом обследовании, проводится в период**

- А. Обследования
- Б. Подведения итогов
- В. Подготовительный
- Г. Промежуточный

**Диспансерный осмотр ребенка дошкольного возраста, имеющего здоровую полость рта, проводится\_\_ раз/раза в год**

- А. 4
- Б. 1
- В. 3
- Г. 2

**У детей первичным морфологическим элементам поражения является**

- А. Чешуйка
- Б. Волдырь
- В. Рубец
- Г. Корка

**Незначительная болезненность при перкуссии и пальпации при отсутствии смещения и подвижности зуба характерна для**

- А. Вколоченного вывиха
- Б. Перелома альвеолярного отростка
- В. Вывиха зуба
- Г. Ушиба зуба

**К современному методу выявления пародонтопатогенных бактерий относят**

- А. Морфологический анализ
- Б. Бактериоскопическое исследование
- В. Биопсию тканей десны
- Г. ПЦР- диагностику

На профилактический осмотр дети и взрослые должны приходить не реже 1 раза в

- А. Год
- Б. 2 Года
- В. Месяц
- Г. 6 Месяцев

## высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Неотложные состояния

А) аллергическая реакция

Б) острая сердечно-сосудистая недостаточность Клинические признаки

1. бледность кожи лица
2. гиперемия кожи лица
3. отек губ, век
4. беспокойство, возбуждение
5. дыхание замедленное
6. сознание сохранено
7. сознание спутанное
8. дыхание учащенное, затруднено

А. А26 Б1345

Б. А2346 Б157

В. А3456 Б12

Г. А178 Б356

Д. А47 Б24

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность лечения среднего кариеса временных зубов:

- А) нанесение защитного лака
- Б) обезболивание
- В) препарирование кариозной полости
- Г) нанесение кондиционера
- Д) антисептическая обработка
- Е) полирование
- Ж) пломбирование

А. БЕДАГЖВ

Б. БВДГЖЕА

В. ДЖЕГВАБ

Г. АГВБДЖЕ

Д. ГБАДВЖЕ

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность проведения метода частичной пульпотомии во второе посещение:**

- А) удаление временной повязки**
- Б) изоляция от слюны**
- В) восстановление анатомической формы зуба**
- Г) наложение изолирующей прокладки**

А. БАВГ

Б. АБГВ

В. БАГВ

**У детей до семи лет в области мышелковых отростков нижней челюсти преобладают переломы**

- А. полные со смещением суставной головки кнутри
- Б. полные по типу “зеленой ветки”
- В. полные со смещением суставной головки кнаружи
- Г. оскольчатые переломы суставного отростка
- Д. полные без смещения

**Дентин при медленном течении кариеса:**

- А. светлый, влажный легко удаляется экскаватором
- Б. светлый, влажный удаляется экскаватором с трудом
- В. пигментированный, легко удаляется экскаватором
- Г. пигментированный, удаляется экскаватором с трудом
- Д. светлый, при зондировании плотный

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между временными зубами и их минерализацией к моменту рождения:**

**А) Резцы**

**Б) Клыки**

**В) Моляры**

**1. Бугры**

**2. 1/2 коронки**

**3. Вся коронка, кроме пришеечной области**

**4. Жевательная поверхность**

А. А1 Б4 В3

Б. А3 Б2 В4

В. А4 Б1 В2

Г. А2 Б1 В2

Д. А2 Б3 В1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между состоянием корня и рентгенологической картиной. Состояние корня:

А) Корень в стадии незакрытой верхушки

Б) Корень в стадии несформированной верхушки

В) Сформированный корень

Г) Физиологическая резорбция Рентгенологическая картина:

1) корень нормальной длины, с заостренной верхушкой, апикальное отверстие узкое

2) корень нормальной длины, с заостренной верхушкой, апикальное отверстие широкое

3) корень короче нормальной длины, корневой канал узкий

4) корень короче нормальной длины, корневой канал широкий, расширяющийся у верхушки корня

А. А2 Б4 В1 Г3

Б. А2 Б3 В4 Г1

В. А1 Б2 В4 Г3

Г. А4 Б1 В3 Г2

Д. А3 Б4 В1 Г2

**При проведении метода частичной пульпотомии необходимо:**

А. иссечь только твердые ткани зуба с последующим прямым наложением препаратов гидроокиси кальция на обнаженную пульпу

Б. иссечь небольшой участок поверхностно инфицированной ткани пульпы с последующим прямым наложением препаратов гидроокиси кальция на обнаженную пульпу

В. иссечь коронковую пульпу с последующим прямым наложением препаратов гидроокиси кальция на обнаженную пульпу

Г. иссечь коронковую и часть корневой пульпы с последующим прямым наложением препаратов гидроокиси кальция на обнаженную пульпу

Д. удалить пульпу полностью

**Рентгенологические признаки неэффективности лечения пульпита в зубах с несформированными корнями:**

А. формирование дентинного мостика

Б. прекращение формирования корня

В. уменьшение объема полости зуба

Г. гиперцементоз

Д. ускоренное формирование корня



**План лечения язвенно-некротического гингивита включает:**

- А. гигиена полости рта, удаление зубных отложений, склерозирующие средства, физиотерапия
- Б. гигиена полости рта, удаление зубных отложений, наложение лечебных повязок
- В. гигиена полости рта, устранение местных факторов (коррекция уздечек, пластика преддверия полости рта и др.), электрофорез витаминами, все виды массажа
- Г. обезболивание, аппликации протеолитическими ферментами, антибактериальные средства, кератопластические средства
- Д. гигиена полости рта, обезболивание, массаж

**При сердечно-сосудистом коллапсе зрачок**

- А. расширен
- Б. сужен
- В. не изменен
- Г. анизокория
- Д. клоническая судорога зрачка

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность проведения метода пульпотомии во второе посещение:**

- А) удаление временной повязки**
  - Б) восстановление анатомической формы зуба**
  - В) изоляция от слюны**
  - Г) наложение изолирующей прокладки**
- А. ГВБА
  - Б. ВАГБ
  - В. АВВГ
  - Г. БВГА
  - Д. ВБГА

**Замедленное, поверхностное дыхание характерно для**

- А. сердечно-сосудистого коллапса
- Б. анафилактического шока
- В. обморока
- Г. болевого шока
- Д. эпилептического припадка

**План лечения атрофического гингивита включает:**

- А. гигиена полости рта, удаление зубных отложений, склерозирующие средства, физиотерапия
- Б. гигиена полости рта, удаление зубных отложений, наложение лечебных повязок
- В. гигиена полости рта, устранение местных факторов (коррекция уздечек, пластика преддверия полости рта и др.), физиотерапевтическое лечение, все виды массажа
- Г. обезболивание, снятие зубных отложений, аппликации протеолитическими ферментами, антибактериальные средства
- Д. обезболивание, массаж, физиотерапия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методом лечения и заболеванием:

**А) Витальная ампутация**

**Б) Высокая ампутация**

**1. Все формы пульпита во временных молярах независимо от степени их развития**

**2. Отлом коронки с обнажением пульпы в постоянных несформированных резцах спустя 48 ч после травмы**

**3. Все формы пульпита в несформированных постоянных молярах**

**4. Хронический гангренозный пульпит в несформированных постоянных однокорневых зубах**

**5. Плоскостная форма среднего и глубокого кариеса молочных зубов, исключая фиксацию пломбы**

**6. Хронический фиброзный пульпит в постоянных несформированных однокорневых зубах**

**7. Отлом коронки с обнажением пульпы в течение первых 48 час**

**А. А236 Б145**

**Б. А567 Б24**

**В. А345 Б12**

**Г. А24 Б567**

**Д. А247 Б56**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Неотложные состояния

**А) обморок**

**Б) анафилактический шок Клинические признаки**

**1. потеря сознания**

**2. частый пульс**

**3. редкий пульс**

**4. побледнение кожи лица**

**5. покраснение кожи лица**

**6. затрудненное учащенное дыхание**

**А. А23 Б1356**

**Б. А34 Б1256**

**В. А134 Б256**

**Г. А356 Б124**

**Д. А16 Б12**

Установите соответствие последовательности действий. Перечислите этапы пластики уздечки языка:

- А) сближение краев раны и наложение швов
- Б) анестезия
- В) рассечение уздечки языка в средней трети
- Г) разрез
- Д) мобилизация мягких тканей, формирование ромбовидной формы операционной раны
- Е) противовоспалительная и гипосенсибилизирующая терапия
- Ж) холод местно

А. ДГЕВЖАБ

Б. БГВДАЖЕ

В. БЕДАГЖВ

Г. ЕБВАГДЖ

Д. БВДГАЕЖ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и соответствующей рентгенологической картиной при поражении временных моляров:

- А) Средний кариес
- Б) Хронический гангренозный пульпит
- В) Хронический гранулирующий периодонтит
- 1. Разволокнение кортикальной пластинки
- 2. Ослабление рисунка костных балочек в межкорневом пространстве
- 3. Остеопороз вокруг корня зуба
- 4. Нет видимых изменений
- 5. Остеомаляция в межкорневом пространстве
- 6. Расширение периодонтальной щели
- 7. Остеосклероз вокруг корня зуба

А. А5 Б123 В456

Б. А2 Б345 В123

В. А4 Б126 В35

Г. А126 Б35 В47

Д. А76 Б4 В135

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Рекомендуемое обезболивание

А) местное

Б) общее Амбулаторная операция

1. вскрытие поднадкостничного абсцесса у ребенка до 3 лет

2. удаление зуба

3. срочная множественная санация временных зубов

4. вскрытие флегмоны

5. удаление ретенционной кисты слизистой губы

А. А345 Б12

Б. А25 Б134

В. А236 Б145

Г. А123 Б45

Д. А5 Б1234

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие индекса и цели его применения:

А) КПУ

Б) ОНI-S

В) СРITN

Г) кп

Д) РМА

1. Оценка интенсивности кариеса временных зубов

2. Оценка интенсивности кариеса постоянных зубов

3. Оценка нуждаемости в лечении заболеваний пародонта

4. Оценка интенсивности и распространенности воспалительной реакции тканей пародонта

5. Количественная оценка зубного налета и зубного камня

А. А5 Б1 В3 Г4 Д4

Б. А3 Б1 В3 Г4 Д4

В. А2 Б5 В3 Г1 Д4

Г. А1 Б2 В3 Г4 Д5

Д. А4 Б3 В1 Г2 Д5

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность проведения метода пульпотомии в первое посещение:

- А) антисептическая обработка
- Б) некрэктомия
- В) изоляция от слюны
- Г) прокладка из цинк-оксид эвгеноловой пасты
- Д) временная повязка
- Е) экспозиция препарата сульфата железа
- Ж) раскрытие полости зуба
- З) ампутация
- И) обезболивание
- К) гемостаз

- А. ДГКЗЖАБВИЕ
- Б. АБВГДЕЖЗИК
- В. ИБВАЖЗКЕГД
- Г. ВАИБЕДЖЗКГ
- Д. ИВБЖЗКАГЕД

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клетками зубного зачатка и тканями зуба: Клетки зубного зачатка

- А) Амелобласты (энамелобласты)
  - Б) Цементобласты
  - В) Одонтобласты
- Ткани зуба

- 1. Периодонт
- 2. Дентин
- 3. Костная ткань альвеолы зуба
- 4. Эмаль
- 5. Цемент

- А. А2 Б4 В1
- Б. А4 Б5 В2
- В. А1 Б2 В3
- Г. А3 Б4 В2
- Д. А5 Б4 В1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и его проявлением на коже и СОПР: Заболевание

А) Эпидемический паротит

Б) Ветряная оспа

В) Дифтерия

Г) Грипп Проявление на коже и слизистой оболочке полости рта

1. Петехиальная сыпь, зернистость СОПР

2. Отек в области верхней части шеи и щеки, прикосновение к этому месту вызывает выраженную боль

3. Фибринозные пленчатые налеты

4. Зудящие пузырьки, наполненные прозрачным содержимым, в полости рта, на коже, на конъюнктиве

А. А3 Б1 В4 Г3

Б. А1 Б2 В4 Г3

В. А2 Б4 В3 Г1

Г. А4 Б3 В1 Г2

Д. А2 Б1 В4 Г3

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность стадий минерализации коронки зуба:

А) минерализация бугров коронки

Б) закладка фолликула зуба

В) минерализация дна полости зуба

Г) «эмалевое кольцо»

Д) минерализация стенок коронки зуба

Е) минерализация шейки зуба

Ж) формирование рогов полости зуба

А. ЕВБАЖГД

Б. ДГЖАБВЕ

В. БАГЖДВЕ

Г. АБДВЕЖГ

Д. ВДАБГЕЖ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между этиологией и заболеванием:

- А) Грибковая
- Б) Бактериальная
- В) Вирусная
- Г) Инфекционно-аллергическая

- 1. ОГС
  - 2. Пиодермия
  - 3. ХРАС
  - 4. Герпангина
  - 5. Кандидоз
  - 6. МЭЭ
- А. А5 Б2 В14 Г36  
Б. А12 Б3 В14 Г56  
В. А6 Б54 В3 Г21  
Г. А2,Б36,В14,Г5  
Д. А1 Б2 В3 Г14

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при полоскании рта фторидсодержащими растворами

Действие

- А. подготовка раствора фторида
  - Б. рекомендации
  - В. контролируемая чистка зубов
  - Г. полоскание полости рта
- А. ГВБА  
Б. БАВГ  
В. АВГБ  
Г. АГБВ  
Д. БВАГ

Предпочтительный метод лечения хронического гангренозного пульпита однокорневого постоянного зуба с несформированным корнем:

- А. девитальная ампутация
- Б. девитальная экстирпация
- В. витальная ампутация
- Г. витальная экстирпация
- Д. высокая ампутация

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующей частотой обработки полости рта: Частота обработки полости рта

А) Каждый час

Б) После каждого приема пищи Заболевания

1. ОГС

2. Кандидоз

3. Пиодермия

4. ХРАС

5. МЭЭ

А. А3 Б1245

Б. А234 Б15

В. А4 Б1235

Г. А14 Б235

Д. А25 Б134

Для уточнения диагноза «несовершенный дентиногенез» необходимо провести:

А. зондирование

Б. электроодонтодиагностику

В. витальное окрашивание эмали

Г. рентгеногенологическое исследование

Д. реографию

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Удаляемые зубы

А) третьи большие коренные верхней челюсти

Б) большие коренные нижней челюсти

В) резцы верхней челюсти Рекомендуемые щипцы

1. S-образно изогнутые без шипика

2. S-образно изогнутые с шипиком

3. прямые несходящиеся

4. байонетные

5. клювовидные без шипиков, изогнутые по ребру

6. клювовидные с шипиками, изогнутые по ребру

А. А1 Б4 В3

Б. А2 Б6 В3

В. А4 Б1 В2

Г. А1 Б5 В1

Д. А2 Б4 В5



Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и его проявлением на коже и СОПР: Заболевание

А) Корь

Б) Краснуха

В) Скарлатина Проявление на коже и слизистой оболочке полости рта

1. Слизистая зева имеет ярко-красный цвет, выражена отечность. Язык ярко розовый и крупно зернистый. Бледный носо-губный треугольник.

2. Плоские красные пятна, склонные к слиянию на СОПР и коже. В полости рта – пятна Филатова-Коплика.

3. Мелкоточечные розовые пятна, не склонные к слиянию на коже

А. А2 Б3 В1

Б. А1 Б2 В1

В. А3 Б1 В2

Г. А2 Б2 В3

Д. А1 Б3 В3

Установите соответствие последовательности действий. Этапы операции - удаление ретенционной кисты слюнной железы нижней губы

А) анестезия

Б) разрез, сепарация мягких тканей, выделение и экстирпация кисты

В) наложение швов

Г) оформление направления на патоморфологические исследование операционного материала

Д) холод местно

Е) противовоспалительная и гипосенсибилизирующая терапия

А. ВАГБЕД

Б. ГВЕБДА

В. АБВДЕГ

Г. ГДЕБВА

Д. БВГЕАД

При остром гнойном периостите у детей причинный постоянный многокорневой зуб

А. всегда удаляется

Б. трепанируется и пломбуется

В. пломбуется и производится резекция верхушки корня

Г. удаляется по показаниям

Д. трепанируется и шинируется

Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности действий этапов проведения операции цистотомии одонтогенной воспалительной кисты нижней челюсти справа с удалением причинного зуба

8.5:

- А) удаление причинного зуба;
- Б) удаление наружной стенки кисты;
- В) наложение давящей повязки;
- Г) анестезия;
- Д) проведение трапецевидного разреза;
- Е) сглаживание острых костных краев;
- Ж) удаление кортикальной пластинки;
- З) отсепаровка слизисто-надкостничного лоскута;
- И) тампонада полости йодоформным тампоном.

- А. ВДБАЕГЗЖ
- Б. ЖЗГЕАБДВИ
- В. ГАДЗЖБЕИВ
- Г. ГВАДЗИЖЕБ
- Д. ИВГАБЕДЗЖ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами

- А) гемангиома (сосудистая ангиодисплазия, капиллярно-кавернозная мальформация)
- Б) лимфангиома (капиллярно-кавернозная)
- 1) тестоватая консистенция
- 2) положительный симптом наливания
- 3) цвет кожи (слизистой) красно-багровый
- 4) кожа в цвете не изменена или слегка синюшная
- 5) отмечается симптом зыбления
- 6) нестабильность размеров
- 7) склонность к воспалению
- 8) пузырьковые высыпания на слизистой оболочке полости рта в виде “просяных зерен”
- 9) положительный симптом сжатия и наполнения

- А. А123 Б45678
- Б. А239 Б145678
- В. А567 Б1234569
- Г. А14589 Б2367
- Д. А123489 Б123457

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность обследования пациента при заболеваниях пародонта:**

- А) установление предварительного диагноза**
- Б) выяснение жалоб и анамнеза заболевания**
- В) установление окончательного диагноза**
- Г) составление плана лечения**
- Д) внешний осмотр и осмотр полости рта**
- Е) специальные методы исследования**

- А. БДАЕВГ
- Б. ГВЕБДА
- В. ВАГБЕД
- Г. АБВГЕД
- Д. ДГБАВЕ

**Артикаин можно использовать у детей с**

- А. 6 месяцев
- Б. 1 года
- В. 2 лет
- Г. 4 лет
- Д. 5 лет

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий проведения внутриротового осмотра Действие**

- А. определение состояния слизистой оболочки полости рта (языка, дна полости рта, щек, твердого и мягкого неба)**
- Б. определение прикуса**
- В. осмотр преддверия полости рта**
- Г. обследование зубных рядов и зубов**
- Д. оценка состояния тканей пародонта.**

- А. БДАВГ
- Б. ВБАДГ
- В. ГВАБД
- Г. АГДВБ
- Д. ДАБГВ

**Для хронического рецидивирующего афтозного стоматита (ХРАС) характерны:**

- А. множественные пузырьковые высыпания, в том числе на красной кайме губ
- Б. острый катаральный гингивит
- В. единичные эрозии округлой или овальной формы, покрытые фибринозным налетом
- Г. пузыри на разных участках слизистой оболочки рта
- Д. разлитая эритема, уртикарная сыпь

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом заболевания и причинным фактором:

А) Системная гипоплазия эмали.

Б) Дисплазия Капдепона

В) Флюороз

Г) Местная гипоплазия эмали

1. Хронический периодонтит временного зуба

2. Интоксикация фторидами

3. Заболевания, нарушающие минеральный обмен в период формирования эмали

4. Генетические факторы, болезни матери во время беременности

А. А2 Б3 В4 Г1

Б. А3 Б4 В2 Г1

В. А2 Б1 В4 Г3

Г. А1 Б2 В3 Г4

Д. А4 Б1 В2 Г3

Назовите препарат для перорального введения при остром герпетическом стоматите в период высыпаний:

А. алвитил

Б. ацикловир

В. амоксиклав

Г. трихопол

Д. доксициклин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и его этиологией: Заболевания:

А) ОГС

Б) Пиодермия

В) ХРАС

Г) Герпангина

Д) Кандидоз

Е) МЭЭ Этиология

1. Грибковая

2. Бактериальная

3. Вирусная

4. Инфекционно-аллергическая

А. А2 Б2 В1 Г1 Д2 Е2

Б. А2 Б1 В1 Г2 Д2 Е1

В. А3 Б2 В4 Г3 Д1 Е4

Г. А1 Б1 В2 Г4 Д3 Е3

Д. А3 Б4 В3 Г2 Д2 Е1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой пульпита и жалобами пациента:

А) Острый очаговый

Б) Острый диффузный

1. Самопроизвольные боли

2. Приступообразные с длительными светлыми промежутками

3. Приступообразные с короткими светлыми промежутками

4. От температурных, химических и механических раздражителей

5. Иррадиирующие по ходу ветвей тройничного нерва

6. Локальные

А. А345 Б1246

Б. А1246 Б1345

В. А2345 Б456

Г. А1345 Б1246

Д. А146 Б235

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при проведении реминерализующей процедуры с применением каппы Действие**

- А. высушивание зубов**
- Б. удаление мягкого зубного налета**
- В. внесение реминерализующего средства в каппу**
- Г. экспозиция реминерализующего средства**
- Д. изоляция зубов от слюны**
- Е. фиксация каппы на зубах**
- Ж. снятие каппы**

- А. ВДБАЕГЖ**
- Б. ЖГЕАБДВ**
- В. БДАВЕГЖ**
- Г. АБВГЕЖД**
- Д. ВГЕЖДАБ**

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность стадий течения кариозного процесса:**

- А) локальное уменьшение pH**
- Б) образование полости и вовлечение нижележащих тканей зуба**
- В) ферментативная деятельность бактерий зубной бляшки**
- Г) деминерализация**
- Д) образование органических кислот**
- Е) нарушаются микроскопические связи, появляются щели вдоль эмалевых призм**

- А. БАДГЕВ**
- Б. ВДАГЕБ**
- В. ДВЕГАБ**
- Г. АГВДЕБ**
- Д. ГАДВБЕ**

**Рациональная тактика лечения при хроническом периодонтите временного зуба с патологической резорбцией корней:**

- А. проведение резорцин-формалинового метода**
- Б. пломбирование каналов пастой на основе эвгенола**
- В. удаление зуба**
- Г. пломбирование каналов пастой на основе гидроокиси кальция**
- Д. пломбирование каналов резорцин-формалиновой пастой**

Установите соответствие последовательности действий. Установите порядок действий по оказанию неотложной помощи ребенку 7 лет при коллапсе:

- А) очистить полость рта от инородных тел;
- Б) введение медикаментозных средств;
- В) прекращение операции;
- Г) освободить грудь, шею, живот от стесняющей одежды;
- Д) придать ребенку горизонтальное положение;
- Е) вызвать неотложную медицинскую помощь для госпитализации ребенка.

- А. ДЕГВБА
- Б. ВГДАБЕ
- В. ЕАВГБД
- Г. БВАДГЕ
- Д. ЕБВАДГ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность этапов стоматологического просвещения Действие

- А. навык
- Б. умение
- В. привычка
- Г. знание
- Д. понимание
- Е. убеждение

- А. ВАГБЕД
- Б. БАВЕДГ
- В. ГДЕБАВ
- Г. АЕДГВБ
- Д. ДЕГВБА

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого буквенного элемента в левой колонке выберите цифровой компонент из правой колонки. Каждый цифровой компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и предпочтительным исходом формирования корня:

- А) Хронический гангренозный пульпит  
Б) Хронический гранулирующий периодонтит  
В) Отлом части коронки с обнажением пульпы

1. Апексификация

2. Апексогенез

А. А2 Б1 В2

Б. А1 Б2 В1

В. А2 Б2 В1

Г. А1 Б1 В2

Д. А1 Б1 В1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующей клинико-рентгенологической картиной:

А) хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит

Б) хронический калькулезный сиаладенит

1) чередование периодов обострения с ремиссией

2) как правило поражается одна железа

3) боль перед или во время еды

4) на контрастной сиалограмме основной выводной проток расширен, вместо протоков 3-4 порядка округлые полости

5) на контрастной сиалограмме проток "разорван", на остальном протяжении протоки резко расширены

6) частые обострения заболевания

А. А3456 Б12346

Б. А4325 Б156

В. А146 Б1235

Г. А123 Б456

Д. А1235 Б146



**Для герметизации фиссур временных моляров преимущественно используют:**

- А. композитные герметики
- Б. компомеры
- В. поликарбоксилатные цементы
- Г. стеклоиономерные цементы
- Д. силикатные цементы

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и симптомом:**

**А) Обострение хронического гангренозного пульпита**

**Б) Обострение хронического периодонтита**

1. Боли постоянные, усиливающиеся от воздействия тёплых раздражителей
2. Изменен цвет коронки зуба
3. Переходная складка гиперемирована и болезненна при пальпации
4. Переходная складка инфильтрирована, возможна флюктуация
5. Зондирование пульпы зуба безболезненно
6. Зондирование болезненно в глубине полости зуба

- А. А3456 Б12
- Б. А1236 Б245
- В. А26 Б1345
- Г. А245 Б1236
- Д. А123 Б456

**Местный анестетик, который обладает наибольшей длительностью действия и не используется у детей**

- А. мепивакаин
- Б. лидокаин
- В. артикаин
- Г. бупивакаин
- Д. прокаин (новокаин)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами анестезии и возможностью её проведения у разных групп зубов Методы анестезии

А. Инфильтрационная

Б. Интралигаментарная Группы зубов

1. временные центральные резцы

2. временные и постоянные клыки

3. моляры нижней челюсти

4. моляры верхней челюсти

5. премоляры

А. А3456 Б12

Б. А25 Б3456

В. А12345 Б345

Г. А12345 Б12345

Д. А34 Б12

При атопическом (экзематозном) хейлите целесообразно рекомендовать:

А. антибактериальную терапию

Б. гипосенсибилизирующую терапию

В. антигрибковую терапию

Г. противовирусную терапию

Д. антисептическую обработку

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой пульпита и жалобами при данной форме: Жалобы на боли

А) Самопроизвольные боли

Б) Приступообразные с длительными светлыми промежутками

В) Приступообразные с короткими светлыми промежутками

Г) От температурных, химических и механических раздражителей

Д) Иррадиирующие по ходу ветвей тройничного нерва

Е) Локальные Формы пульпита

1. Острый очаговый

2. Острый диффузный

А. А2 Б2 В2 Г2 Д1 Е1

Б. А12 Б1 В2 Г12 Д2 Е1

В. А21 Б21 В2 Г2 Д1 Е2

Г. А1 Б2 В1 Г2 Д1 Е2

Д. А2 Б12 В1 Г1 Д1 Е1

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность прорезывания постоянных зубов:**

- А) третьи моляры**
  - Б) первые моляры**
  - В) вторые резцы**
  - Г) первые резцы**
  - Д) вторые премоляры**
  - Е) первые премоляры**
  - Ж) клыки**
  - З) вторые моляры**
- А. ВЕЖДБАЗГ  
Б. БЗАГДЖЕВ  
В. БГВЕЖДЗА  
Г. ГВЕЖДБЗА  
Д. ГВЖЕДБЗА

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью болезненности эрозий и заболеванием:**

- А) Слабая или отсутствует**
  - Б) Сильная**
- 1. ОГС**
  - 2. Пиодермия**
  - 3. Хроническая травма СОПР**
  - 4. ХРАС**
  - 5. МЭЭ**
- А. А26 Б1345  
Б. А3456 Б12  
В. А3 Б1245  
Г. А123 Б45  
Д. А1245 Б3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между жалобами пациента и формой хронического пульпита:

А) От воздействия температурных раздражителей

Б) Самопроизвольные боли

В) При накусывании на зуб

Г) Жалобы на кровоточивость

1. Фиброзный

2. Гангренозный

3. Гипертрофический

4. В стадии обострения

А. А234 Б1 В4 Г2

Б. А124 Б4 В2 Г3

В. А12 Б3 В4 Г1

Г. А14 Б1 В4 Г234

Д. А1 Б2 В3 Г4

Установите соответствие последовательности действий. Перечислите последовательность этапов пластики нижнего преддверия полости рта (вестибулопластика)

А) разрез

Б) анестезия

В) скелетирование наружной кортикальной пластинки альвеолярного отростка

Г) давящая повязка

Д) укладка и фиксирование слизистого лоскута

Е) противовоспалительная и гипосенсибилизирующая терапия

Ж) холод на место операции

З) отсепаровка слизистого лоскута

А. БАЗВДГЖЕ

Б. ЗГАВЖЕДБ

В. ДАЕЗГВБЖ

Г. БАЕДВГЖЗ

Д. ЕБАВЗЖДГ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между рентгенологической картиной и стадией развития корня: Рентгенологическая картина

А) Корень нормальной длины с заострённой верхушкой, апикальное отверстие узкое

Б) Корень нормальной длины с заострённой верхушкой, апикальное отверстие определяется визуально

В) Корень короче нормальной длины, корневой канал широкий и расширяющийся у верхушки Стадия развития корня

1. Стадия незакрытой верхушки

2. Стадия несформированной верхушки

3. Сформированный корень зуба

А. А2 Б3 В1

Б. А1 Б3 В2

В. А3 Б1 В2

Г. А1 Б2 В3

Д. А3 Б2 В1

**Перелом корня в верхней трети сопровождается:**

А. болью от химических раздражителей

Б. самопроизвольной болью

В. подвижностью зуба II-III степени

Г. наличием характерных изменений на рентгенограмме

Д. безболезненной перкуссией

**Период физиологического покоя временного зуба составляет:**

А. один год

Б. два года

В. три года

Г. четыре года

Д. пять лет

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие влияния растворов на проницаемость эмали растворов. Действие на проницаемость эмали

А) Не изменяет проницаемость эмали

Б) Повышает проницаемость эмали

В) Понижает проницаемость эмали Препарат

1. Ортофосфорная кислота

2. Натрия фторид

3. Лимонная кислота

4. Глюконат кальция

5. «Tooth Mousse»

6. Дистиллированная вода

А. А45 Б56 В123

Б. А6 Б13 В245

В. А15 Б345 В236

Г. А23 Б16 В45

Д. А56 Б123 В4

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий герметизации фиссур зуба стеклоиономерным цементом (СИЦ) Действие

А. изоляция от слюны

Б. высушивание зуба

В. очищение жевательной поверхности зуба от налета

Г. проверка окклюзионной высоты прикуса

Д. внесение СИЦ и распределение по фиссурам, отверждение

А. ВАБДГ

Б. АДГБВ

В. ДАВГБ

Г. АБВГД

Д. АВДГБ

Установите соответствие между методом анестезии и показаниями к их применению.

А. Интралигаментарная

Б. Инфильтрационная

1. лечение кариеса;

2. лечение пульпита;

3. удаление зубов по поводу хронического апикального периодонтита (вне обострения);

4. депульпирование интактных зубов;

5. лечение пародонтита;

6. лечение острого апикального периодонтита.

А. А3456 Б12

Б. А1234 Б123456

В. А2345 Б456

Г. А 456 Б123

Д. А 2346 Б1234

Ростковую зону формирующегося корня рентгенологически следует дифференцировать от:

А. острого периодонтита

Б. обострения хронического гранулирующего периодонтита

В. хронического гранулематозного периодонтита

Г. хронического фиброзного периодонтита

Д. остеосклероза

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующим общим состоянием и самочувствием: Общее состояние и самочувствие

А) Не страдает

Б) Головная боль, боль в суставах мышцах

В) Температура тела нормальная

Г) Температура тела повышена

Д) Прием пищи не нарушен

Е) Прием пищи болезненный Заболевания

1. ОГС

2. ХРАС

3. МЭЭ

4. Стрептостафилодермии

5. Хронической травме слизистой рта

А. А25 Б1 В14 Г2 Д2 Е1345

Б. А5 Б14 В15 Г2 Д2 Е1345

В. А5 Б3 В25 Г134 Д5 Е1234

Г. А14 Б345 В123 Г45 Д123 Е45

Д. А3 Б4 В45 Г123 Д45 Е123

**Для фиксации лечебной повязки при отломе коронки с обнажением пульпы в постоянном зубе с несформированным корнем в первое посещение желательно применять:**

- А. компомеры
- Б. композиты химического отверждения
- В. композиты светового отверждения
- Г. стеклоиономерные цементы
- Д. силикатные цементы

**Установите соответствие последовательности действий. Перечислите этапы удаления временного зуба:**

- А) фиксация щечек щипцов**
- Б) анестезия**
- В) наложение щечек щипцов**
- Г) сближение краев лунки**
- Д) извлечение зуба из лунки**
- Е) кюретаж лунки**

- А. ВБАДГ
- Б. ГДВБА
- В. БВАДЕГ
- Г. АГДВБ
- Д. БВАДГ

**Для профилактической обработки эмали прорезавшихся постоянных зубов у детей с низким исходным уровнем минерализации применяется:**

- А. «Аргенат»
- Б. «Белгель Са/Р»
- В. капрофер
- Г. раствор Шиллера-Писарева
- Д. йодиол

**Установите соответствие последовательности действий. Расположите заболевания по степени нарастания тяжести процесса**

- А) пародонтоз**
- Б) пародонтит**
- В) гингивит**
- Г) пародонтолиз**

- А. ГАБВ
- Б. АВВГ
- В. ВБАГ
- Г. БВГА
- Д. ГВАБ



**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий покрытия зубов фторлаком Действие**

- А. высушивание зубов перед покрытием фторлаком**
- Б. нанесение фторлака на зубы тонким слоем**
- В. очищение зубов от налета**
- Г. изоляция от слюны ватными валиками**
- Д. высушивание зубов после покрытия фторлаком**
- Е. удаление избытка лака, попавшего на слизистую оболочку**
- Ж. рекомендации пациенту воздержаться от приема пищи в течение двух часов, от чистки зубов и приема очень твердой пищи в течение 12-24 часов**

- А. ВДБАЕГЖ**
- Б. ЖГЕАБДВ**
- В. ВГАБЕДЖ**
- Г. АБДЕГВЖ**
- Д. ЖГАБДЕВ**

**При множественном вывихе временных зубов с переломом альвеолярного отростка рекомендуется использовать шину**

- А. проволочную**
- Б. пластмассовую назубную**
- В. пластмассовую зубнаддесневую**
- Г. ленточную шину**
- Д. Тигерштедта**

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой повреждения СОПР и повреждающим агентом: Форма повреждения СОПР;**

- А) Коагуляционный ожог**
- Б) Колликативный ожог Повреждающий агент**

- 1. Фенол**
- 2. Формалин**
- 3. Каустическая сода**
- 4. Известь**
- 5. Метиленовый синий**
- 6. Бриллиантовый зелёный**

- А. А345 Б12**
- Б. А126 Б34**
- В. А236 Б145**
- Г. А34 Б126**
- Д. А56 Б13**

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность лечения декубитальной язвы слизистой оболочки нижней губы:

- А) аппликации кератопластических средств
- Б) аппликации растворами ферментов
- В) устранение травмирующего слизистую оболочку фактора
- Г) обезболивание слизистой оболочки топик-анестетиком

- А. АБВГ
- Б. ВГБА
- В. БАВГ
- Г. ВАГБ
- Д. ГАВБ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и применяемой мазью для лечения:

- А) Пиодермия
- Б) ОГС
- В) Молочница Мазь:

- 1. Ацикловир
- 2. Неомициновая
- 3. Оксолиновая
- 4. Клотримазол
- 5. Гиоксизон
- 6. Алпизарин
- 7. Нистатиновая
- 8. Канестен

- А. А15 Б345 В236
- Б. А25 Б136 В478
- В. А45 Б56 В123
- Г. А136 Б25 В478
- Д. А247 Б836 В15

Выделите симптом, не укладывающийся в клиническую картину коллапса

- А. артериальная гипотония
- Б. бледные, холодные и влажные кожные покровы
- В. гипотонус
- Г. расширенный зрачок
- Д. двигательное беспокойство

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой заболевания в постоянных зубах с несформированными корнями и рентгенологической картиной:

А) Хронический гангренозный пульпит

Б) Хронический гранулирующий периодонтит

1. Нечеткость кортикальной пластинки альвеолы в межкорневом пространстве

2. Очаг разрежения в кости у "раструба" корня с нечеткими контурами

3. Стадия формирования корня соответствует возрасту ребенка и такая же, как у одноименного зуба

4. Корень короче, а канал шире, чем у одноименного зуба

А. А13 Б24

Б. А34 Б12

В. А43 Б21

Г. А24 Б13

Д. А12 Б34

**Клинические признаки хронического гипертрофического гингивита:**

А. кровоточивость и отек зубодесневых сосочков

Б. десна увеличена в размере, деформирована

В. десна бледная, ретракция десны 1-3 мм

Г. десневой край изъязвлен, серый налет, гнилостный запах

Д. десна гиперемирована, отечна

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между индексом гигиены полости рта и его определением: Индекс гигиены полости рта

А) ИГ (по

Э.М. Кузьминой)

Б) Индекс гигиены Фёдорова-Володкиной

В) ИГР-У

Г) РНР Определение

1. Индекс оценки зубного налёта у детей раннего возраста

2. Индекс эффективности гигиены полости рта

3. Оценка зубного налёта на вестибулярных поверхностях зубов

4. Определение количества зубного налёта и зубного камня

А. А2 Б1 В4 Г3

Б. А1 Б3 В4 Г2

В. А2 Б3 В4 Г1

Г. А3 Б2 В1 Г4

Д. А4 Б1 В2 Г3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими лечением.

- А) острый паротит новорожденного  
Б) обострение хронического рецидивирующего паренхиматозного паротита  
В) острый калькулезный сиалоаденит
- 1) антибактериальное  
2) противовоспалительное  
3) десенсибилизирующее  
4) йодид калия внутрь  
5) инстиляция протеолитических ферментов, антибиотиков  
6) хирургическое (при неэффективности консервативного)  
7) гипербарическая оксигенация

- А. А123 Б123457 В12346  
Б. А457 Б234 В123567  
В. А3457 Б456 В127  
Г. А136 Б245 В1257  
Д. А245 Б136 В1257

**Для поверхностной анестезии слизистой оболочки может применяется**

- А. мепивакин  
Б. тетракаин (дикаин)  
В. бупивакаин (маркаин)  
Г. прокаин (новокаин)  
Д. артикаин

**Метод витальной окраски выявляет очаговую деминерализацию при:**

- А. эрозии эмали  
Б. белом кариозном пятне  
В. пятнистой форме гипоплазии  
Г. пигментированном кариозном пятне  
Д. флюорозе

**Факторы, влияющие на развитие системной гипоплазии эмали постоянных зубов:**

- А. болезни матери во II половине беременности  
Б. болезни ребенка после рождения, нарушение режима питания ребенка  
В. множественное поражение временных зубов осложненным кариесом  
Г. болезни матери в I половине беременности  
Д. травматическое повреждение временных зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Удаляемые зубы

А) временный резец верхней челюсти

Б) малый коренной нижней челюсти (премоляр) Действия

1. наложение щипцов

2. продвижение щечек щипцов

3. фиксация щечек

4. вывихивание зуба

5. вращение зуба

6. извлечение зуба

7. кюретаж лунки

8. сближение краев лунки

А. А78 Б123456

Б. А123568 Б1234678

В. А34 Б5678

Г. А1234678 Б1235678

Д. А123468 Б12354678

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом в постоянных зубах с несформированным корнем и предпочтительным исходом формирования корня:

А) Хронический фиброзный пульпит

Б) Хронический гранулирующий периодонтит

В) Хронический гангренозный пульпит

1. Апексификация

2. Апексогенез

А. А1 Б2 В1

Б. А1 Б1 В2

В. А2 Б1 В2

Г. А2 Б2 В1

Д. А1 Б1 В1

Наиболее достоверным признаком консолидации фрагментов нижней челюсти является

А. исчезновение боли

Б. образование костной мозоли

В. уменьшение подвижности фрагментов

Г. отсутствие крепитации

Д. исчезновение отека окружающих мягких тканей

**Индекс CPITN используют для определения:**

- А. уровня гигиены полости рта
- Б. степени активности кариеса
- В. стойкости капилляров десны
- Г. нуждаемости в лечении заболеваний пародонта
- Д. степени воспаления десны

**Клиническая характеристика эмали зубов при местной гипоплазии:**

- А. пигментированное пятно или углубление в эмали одного зуба
- Б. белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации
- В. слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах
- Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- Д. стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий определения гигиенического индекса РНР Действие**

- А. интерпретация значения индекса
- Б. окрашивание поверхностей индексных зубов
- В. расчет индекса РНР по формуле
- Г. определение кода для каждого зуба

- А. ГВБА
- Б. БГВА
- В. БАВГ
- Г. АВБГ
- Д. ВАГБ

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность обработки и импрегнации поверхностного кариеса во временных зубах:**

- А) механическая обработка пораженной поверхности ручными инструментами
- Б) очищение зуба от налета
- В) изоляция от слюны
- Г) изоляция десневого края
- Д) высушивание
- Е) импрегнация раствора нитрата серебра

- А. ГВЕБДА
- Б. ВАГБЕД
- В. БВГАДЕ
- Г. АВБГДЕ
- Д. БАГВЕД

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Клинико-рентгенологические формы хронического остеомиелита нижней челюсти

А) деструктивный

Б) первично-хронический гиперпластический Симптомы

1. увеличение объема кости
2. свищи на коже лица и слизистой рта
3. патологический перелом кости (R-гр.)
4. гибель зубного зачатка или нескольких(R-гр.)
5. наличие крупного секвестра (R-гр)
6. выраженная периостальная реакция (R-гр)
7. периостальная реакция отсутствует или слабо выражена (R-гр)
8. хронический гранулирующий периодонтит интактного зуба (зубов) (R-гр)

А. А23457 Б1468

Б. А3458 Б12348

В. А45325 Б187

Г. А23 Б16

Д. А1246 Б2357

Пациенту с язвенно-некротическим стоматитом необходимо обработать слизистую оболочку полости рта антибактериальным препаратом. Какой местный анестетик следует использовать для поверхностного обезболивания слизистой оболочки?

А. бупивакаин

Б. мепивакаин

В. артикаин

Г. прокаин (новокаин)

Д. лидокаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие в применении местных анестетиков при инъекционных и аппликационном способе обезболивания. Способы обезболивания:

А. инфильтрационная, проводниковая анестезия;

Б. аппликационная анестезия. Анестетики:

1. Тетракаин/дикаин;

2. Лидокаин;

3. Артикаин;

4. Мепивакаин;

5. Бензокаин/анестезин.

А. А345 Б234

Б. А25 Б3456

В. А234 Б125

Г. А34 Б125

Д. А23 Б5

Пломбирование каналов временных однокорневых сформированных зубов при лечении пульпита проводят:

А. резорцин-формалиновой пастой

Б. пастой на основе эвгенола

В. гуттаперчевыми штифтами

Г. силантами

Д. стеклоиономерными цементами

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом в постоянных зубах с несформированными корнями и исходом. Диагноз:

А) Хронический фиброзный пульпит;

Б) Хронический гранулирующий периодонтит;

В) Хронический гангренозный пульпит. Исход:

1. Апексификация;

2. Апексогенез

А. А1 Б2 В1

Б. А2 Б1 В2

В. А2 Б2 В1

Г. А1 Б1 В1

Д. А2 Б2 В2



**Первичный элемент при остром герпетическом стоматите:**

- А. папула
- Б. корка
- В. эрозия
- Г. пузырек
- Д. пятно

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между зубами и началом их минерализации: Зубы**

- А) Временные**
  - Б) Постоянные первые моляры**
  - В) Постоянные резцы и клыки**
  - Г) Премоляры**
  - Д) Постоянные вторые моляры**
- Начало минерализации**

- 1. В первые недели после рождения**
- 2. В первую половину беременности**
- 3. Во второе полугодие первого года жизни**
- 4. В возрасте 2х-3х лет**
- 5. Во вторую половину беременности**

- А. А3 Б3 В3 Г2 Д1
- Б. А2 Б2 В3 Г1 Д1
- В. А5 Б1 В3 Г4 Д4
- Г. А1 Б3 В4 Г5 Д4
- Д. А4 Б5 В1 Г2 Д3

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и клиническими проявлениями:**

- А) Системная гипоплазия эмали**
  - Б) Флюороз – пятнистая форма**
  - В) Тетрациклиновые зубы**
- 1. Окрашивание в жёлтый цвет коронок зубов одного периода минерализации**
  - 2. Изменение цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки**
  - 3. Симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации**
  - 4. Стирание твёрдых тканей зубов без обнажения пульпы**

- А. А1 Б3 В5
- Б. А5 Б1 В2
- В. А3 Б2 В1
- Г. А2 Б1 В4
- Д. А4 Б3 В2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующей клинико-рентгенологической характеристикой:

- А) периостит острый  
Б) периостит хронический  
В) остеомиелит острый  
1) серозный  
2) деструктивный  
3) гнойный  
4) гиперпластический  
5) оссифицирующий  
6) деструктивно-продуктивный  
7) простой

А. А13 Б57 В246

Б. А127 Б54 В3

В. А76 Б5 В43

Г. А57 Б13 В1246

Д. А257 Б13 В46

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующей клинико-рентгенологической картиной:

- А) околокорневая воспалительная киста  
Б) нагноившаяся околокорневая воспалительная киста  
В) острый гнойный периостит  
1) самопроизвольная боль  
2) боль при пальпации  
3) сглаженность, выбухание по переходной складке  
4) коллатеральный отек мягких тканей лица  
5) общее состояние средней тяжести  
6) общее состояние удовлетворительное  
7) самочувствие не страдает  
8) ухудшение самочувствия  
9) температура тела нормальная  
10) повышение температуры тела  
11) на рентгенограмме очаг деструкции костной ткани округлой формы с четкими контурами

А. А123478 Б234810

Б. А367911 Б1234581011 В12345810

В. А12345 Б5781011

Г. А12345810 Б367911 В1234510

Д. А2578 Б141011 В369

Установите соответствие последовательности действий. Распределите пломбировочные материалы по мере уменьшения их эстетических свойств:

**А) стеклоиономерные цементы**

**Б) цементы**

**В) компомеры**

**Г) композиты**

А. ГВАБ

Б. АБГВ

В. ВБАГ

Г. ГАБВ

Д. БГВА

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий проведения внешнего осмотра Действие

**А. визуальная оценка вида кожных покровов (цвет, целостность)**

**Б. оценка состояние красной каймы губ, видимых слизистых**

**В. визуальная оценка степени выраженности носогубных, подбородочных и шейных складок**

**Г. пальпация регионарных лимфатических узлов**

**Д. исследование височно-нижнечелюстного сустава**

**Е. оценка конфигурации и симметричности лица**

А. БАДГЕВ

Б. ЕАВБГД

В. БАВЕДГ

Г. ЕАБГВД

Д. ГДЕАБВ

Установите соответствие последовательности действий. Методика прямой постановки стандартных стальных коронок:

**А) примерка и припасовка стандартных коронок по ширине и длине клинической коронки**

**Б) препарирование зуба с апроксимальных поверхностей**

**В) препарирование зуба с окклюзионной поверхности**

**Г) фиксация стандартной коронки**

**Д) финишная обработка стандартной коронки**

А. БВАДГ

Б. ВГАБД

В. ДАВГБ

Г. АДБВГ

Д. ГБВАД

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами

А) вторичный деформирующий остеоартроз левого височно-нижнечелюстного сустава

Б) анкилоз правого височно-нижнечелюстного сустава

В) привычный вывих левого сустава

1) недоразвитие правой половины челюсти

2) недоразвитие левой половины челюсти

3) девиация челюсти вправо

4) девиация челюсти влево

5) движения нижней челюсти отсутствуют

6) движения нижней челюсти свободные

7) движения нижней челюсти ограничены

А. А67 Б345 В123

Б. А6 Б457 В127

В. А27 Б15 В36

Г. А38 Б27 В15

Д. А15 Б36 В27

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий проведения реминерализирующей процедуры Действие

А. обильное смачивание рыхлого ватного тампона реминерализирующим раствором и размещение его на поверхности зубов

Б. высушивание зубов воздухом

В. экспозиция реминерализирующего средства

Г. очищение зубов от зубных отложений

Д. изоляция зубов от слюны ватными валиками

Е. рекомендации пациенту

А. ГВЕБДА

Б. ГДБАВЕ

В. БАВЕДГ

Г. ДАВБГЕ

Д. ЕДГАВБ

**Клинические проявления, характерные для пиодермии:**

А. пустулы, толстые соломенно-желтые корки на коже лица и красной каймы губ

Б. единичные эрозии округлой формы, покрытые фибринозным налетом

В. творожистый налет на слизистой оболочке губ, языка

Г. эрозии неправильных очертаний

Д. пузырьки на красной кайме губ и коже лица

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой хронического пульпита и соответствующими жалобами: **Формы хронического пульпита**

**А) Фиброзный**

**Б) Гангренозный**

**В) Гипертрофический**

**Г) В стадии обострения** Жалобы на

**1. Боль от воздействия температурных раздражителей**

**2. Самопроизвольные боли**

**3. Боль при накусывании на зуб**

**4. Кровоточивость**

А. А2 Б1 В4 Г3

Б. А2 Б2 В4 Г3

В. А1 Б3 В4 Г2

Г. А3 Б4 В1 Г2

Д. А4 Б1 В2 Г3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между препаратами и соответствующим основным действующим компонентом: **Основной действующий компонент**

**А) МТА**

**Б) Кальция гидроокись**

**В) Гидроксиапатит** Препараты

**1. Триоксидент**

**2. Гидроксиапол**

**3. Calasept**

**4. ProRoot МТА**

**5. Кальцевит**

**6. Остим-100**

А. А14 Б35 В26

Б. А36 Б45 В12

В. А56 Б32 В14

Г. А23 Б14 В56

Д. А26 Б14 В35

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами

**А) нейрофиброматоз**

**Б) лимфангиома**

**1) нестабильность размеров**

**2) нарушение эндокринной системы**

**3) макродентия**

**4) пигментные пятна на коже**

**5) склонность к воспалению на фоне ОРВИ**

**6) наличие болезненных плотных тяжей в толще опухоли**

А. А2346 Б15

Б. А15 Б2346

В. А34 Б1256

Г. А123 Б456

Д. А456 Б123

Установите соответствие последовательности действий. Укажите правильную последовательность этапов при пломбировании композитами:

**А) внесение пломбировочного материала**

**Б) нанесение бондинга**

**В) протравливание эмали**

**Г) наложение прокладки**

**Д) полирование пломбы**

А. ГВБАД

Б. ВГАБД

В. АДГБВ

Г. БАГВД

Д. ДАВБГ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий обследования стоматологического пациента Действие

**А. проведение дополнительных методов обследования**

**Б. сбор анамнеза жизни**

**В. выявление жалоб**

**Г. внешний осмотр**

**Д. сбор анамнеза заболевания**

**Е. внутриротовой осмотр**

А. ВБДГЕА

Б. ВАГБЕД

В. ГВЕБДА

Г. ЕВАДБГ

Д. ВЕАДГБ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и соответствующей рентгенологической картиной при поражении постоянных моляров: **Диагноз**

**А) Средний кариес**

**Б) Хронический гангренозный пульпит**

**В) Хронический гранулирующий периодонтит** **Рентгенологическая картина**

**1. Разволокнение кортикальной пластинки**

**2. Ослабление рисунка костных балочек в межкорневом пространстве**

**3. Остеопороз вокруг корня зуба**

**4. Нет видимых изменений**

**5. Остеомаляция в межкорневом пространстве**

**6. Расширение периодонтальной щели**

**7. Остеосклероз вокруг корня зуба**

**А. А4 Б167 В136**

**Б. А347 Б2 В165**

**В. А56 Б71 В342**

**Г. А12 Б4 В 23**

**Д. А13 Б25 В 67**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого буквенного элемента в левой колонке выберите цифровой компонент из правой колонки. Каждый цифровой компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Характер хирургического вмешательства

**А) остеотомия ветви (ветвей) нижней челюсти с последующим костным вытяжением**

**Б) остеотомия ветви (ветвей) нижней челюсти с одномоментной костной пластикой** **Диагноз и возраст больного**

**1. вторичный деформирующий остеоартроз левого височно-нижнечелюстного сустава у ребёнка 3 лет**

**2. анкилоз правого височно-нижнечелюстного сустава у ребёнка 13 лет**

**3. анкилоз правого и левого височно-нижнечелюстных суставов у ребёнка 3 лет**

**4. вторичный деформирующий остеоартроз правого и левого височно-нижнечелюстных суставов у больного 13 лет**

**А. А1 Б234**

**Б. А2 Б134**

**В. А3 124**

**Г. А23 Б14**

**Д. А14 Б23**

**Во временных зубах чаще встречается:**

- А. кариес в стадии белого пятна
- Б. кариес в стадии пигментированного пятна
- В. поверхностный кариес
- Г. средний кариес
- Д. глубокий кариес

**Установите соответствие последовательности действий. Укажите последовательность периодов течения ОГС:**

- А) катаральный**
- Б) высыпаний**
- В) продромальный**
- Г) угасания**

- А. АВБГ
- Б. ГБВА
- В. ВАБГ
- Г. БГАВ
- Д. ВБАГ

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при удалении минерализованных наддесневых зубных отложений Действие**

- А. полирование поверхностей зубов**
- Б. удаление зубного камня**
- В. покрытие зубов фторлаком (фторгелем)**
- Г. антисептическая обработка десен**

- А. БАВГ
- Б. ГВБА
- В. ГБАВ
- Г. АБГВ
- Д. ВБАГ

**При лечении вколоченного вывиха временных сформированных резцов необходимо:**

- А. вытяжение с помощью ортодонтических аппаратов
- Б. репозиция зуба и его шинирование на 3-4 недели
- В. удаление зуба
- Г. динамическое наблюдение
- Д. щадящая диета



**Установите соответствие последовательности действий. Методика не прямой постановки стандартных стальных коронок:**

- А) снятие оттиска с зубов**
- Б) препарирование зуба с апроксимальных поверхностей**
- В) примерка и припасовка стандартных коронок**
- Г) препарирование зуба с окклюзионной поверхности**
- Д) фиксация стандартной коронки**
- Е) изготовление модели**

- А. ВАГБЕД**
- Б. ГВЕБДА**
- В. БГАЕВД**
- Г. АЕБГВД**
- Д. ДЕАВБГ**

**Для стимуляции апексификации при лечении хронического периодонтита постоянных зубов с несформированными корнями проводят:**

- А. удаление зуба**
- Б. временное пломбирование каналов пастой на основе гидроокиси кальция**
- В. пломбирование каналов резорцин-формалиновой пастой**
- Г. пломбирование каналов пастами на основе эвгенола**
- Д. пломбирование каналов методом латеральной конденсации гуттаперчи**

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Ребенок 12 лет, диагноз**

- А) перелом обоих мышечковых отростков нижней челюсти**
- Б) перелом правого мышечкового отростка нижней челюсти Вид шины и фиксации**
- 1. проволочная шина-скоба на нижнюю челюсть**
- 2. проволочные шины с зацепными петлями на обе челюсти с межчелюстной фиксацией**
- 3. костный шов**
- 4. пластмассовая зубонадесневая шина на нижнюю челюсть с пелотом слева**
- 5. пластмассовая зубонадесневая шина на нижнюю челюсть с пелотом справа**

- А. А2 Б4**
- Б. А1 Б3**
- В. А4 Б2**
- Г. А5 Б1**
- Д. А3 Б5**

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при герметизации фиссур зуба герметиком инвазивной методикой Действие

- А. протравливание фиссуры кислотой
- Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета
- В. изоляция от слюны, высушивание зуба
- Г. отмывание кислоты из фиссуры
- Д. проверка окклюзионной высоты прикуса
- Е. повторная изоляция зуба от слюны
- Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам, отверждение
- З. высушивание протравленной поверхности фиссуры
- И. раскрытие фиссуры алмазным бором

- А. БВИАГЕЗЖД
- Б. ЖИГЕБДАЗВ
- В. ДЗИВГЕБАЖ
- Г. ВБИГЕЖАДЗ
- Д. ДИЖЗАВБГЕ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность стадий формирования корня зуба:

- А) стадия незакрытой верхушки
- Б) сформированный корень
- В) стадия закрытой верхушки зуба, неоконченное формирование апикальной части периодонта
- Г) стадия несформированного корня
- Д) стадия несформированной верхушки

- А. ГДАВБ
- Б. ДАВГБ
- В. ВГАБД
- Г. АДГВБ
- Д. ГАВДБ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий этапов проведения профессиональной гигиены полости рта Действие

- А. удаление зубного налета с контактных поверхностей флоссами
- Б. антисептическая обработка
- В. контролируемая чистка зубов
- Г. шлифование пломб и полирование поверхностей зубов, в том числе корней
- Д. обработка зубов фторидсодержащими или реминерализирующими препаратами
- Е. удаление минерализованных зубных отложений

- А. БАВЕДГ
- Б. ВБЕАГД
- В. БАДГЕВ
- Г. ГАЕБДВ
- Д. ВДЕАГБ

**Клинические признаки ушиба временного или постоянного зуба:**

- А. зуб короче симметричного, погружен в лунку
- Б. дефект эмали и дентина
- В. болезненная перкуссия
- Г. смещение коронки в различных направлениях
- Д. подвижность зуба II-III степени

**Пульс у пациента без сознания определяют над проекцией**

- А. лучевой артерии
- Б. плечевой
- В. наружной сонной
- Г. локтевой
- Д. общей сонной

**Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности возрастных показаний к пластике уздечки языка у детей с периода новорожденности до окончания роста и формирования лицевого отдела черепа:**

- А) нарушение прикуса;**
- Б) нарушение речи;**
- В) нарушение сосания и малая прибавка в весе.**

- А. ВБА
- Б. АБВ
- В. БАА
- Г. АВБ
- Д. ВАБ

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Удаляемые зубы**

- А) резцы верхней челюсти**
- Б) большие коренные верхней челюсти**
- В) малые коренные нижней челюсти** Рекомендуемые щипцы

- 1. S-образно изогнутые без шипика**
- 2. S-образно изогнутые с шипиком**
- 3. прямые**
- 4. клювовидные без шипиков**
- 5. клювовидные с шипиками**

- А. А6 Б1 В2
- Б. А1 Б4 В3
- В. А4 Б6 В3
- Г. А3 Б2 В4
- Д. А2 Б5 В1

**Высшая (максимально допустимая) разовая доза артикаина для детей:**

- А. 2,2 мг/кг
- Б. 3,0 мг/кг
- В. 4,4 мг/кг
- Г. 5,0 мг/кг
- Д. 7 мг/кг

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие влияния растворов на проницаемость эмали. Препарат:**

- А) Ортофосфорная кислота
  - Б) Фторидсодержащие препараты
  - В) Молочная кислота
  - Г) Препараты содержащие кальций и фосфаты
  - Д) Физиологический раствор
- Действие на проницаемость эмали:**

- 1. Повышает
  - 2. Понижает
  - 3. Не изменяет
- А. А1 Б2 В1 Г2 Д3
  - Б. А3 Б3 В3 Г2 Д1
  - В. А2 Б2 В3 Г1 Д1
  - Г. А1 Б1 В2 Г2 Д2
  - Д. А2 Б1 В1 Г2 Д3

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами местного обезболивания и временем наступления анестезии Методы анестезии**

- А. Инфильтрационная.
  - Б. Интралигаментарная.
  - В. Мандибулярная. Время наступления анестезии (латентный период)
- 1) 15-45 с;
  - 2) 1-2 мин.;
  - 3) 10-15 мин.;
  - 4) 30 мин.
- А. А4 Б1 В2
  - Б. А2 Б1 В3
  - В. А1 Б4 В3
  - Г. А3 Б2 В4
  - Д. А2 Б4 В3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие метода лечения и срока, прошедшего с момента травмы:

- А) Высокая ампутация пульпы
- Б) Частичная ампутация пульпы
- В) Пульпотомия
- Г) Биологический метод лечения

- 1. 1-3 часа
- 2. До 48 часов
- 3. Свыше 48 часов
- 4. 2-3 недели и более

- А. А4 Б2 В3 Г1
- Б. А1 Б2 В4 Г3
- В. А2 Б3 В4 Г1
- Г. А3 Б1 В2 Г4
- Д. А2 Б4 В1 Г2

**Клинические проявления при меловидно-крапчатой форме флюороза:**

- А. пигментированное пятно и углубление в эмали одного зуба
- Б. белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации
- В. слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах
- Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- Д. борозды параллельные режущему краю

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между возрастом ребенка и средством гигиены: Средство гигиены

А) Гигиенические салфетки с ксилитом

Б) Силиконовая зубная щётка

В) Ручная зубная щетка

Г) Электрическая зубная щетка

Д) Зубная нить

Е) Ирригатор

1. С 3-5 лет

2. С 6 месяцев

3. С рождения

4. С 12 месяцев

5. С 6-8 лет

6. С 8-10 лет

А. А3 Б2 В4 Г5 Д6 Е1

Б. А2 Б1 В1 Г2 Д2 Е1

В. А2 Б2 В1 Г1 Д2 Е2

Г. А1 Б3 В2 Г6 Д4 Е5

Д. А4 Б5 В2 Г3 Д1 Е6

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и возрастом пациента:

А) ОГС

Б) Афты Беднара

В) ХРАС

Г) МЭЭ

1. Первые месяцы жизни

2. Ясельный

3. Дошкольный

4. Подростковый

А. А2 Б3 В4 Г1

Б. А3 Б1 В4 Г4

В. А1 Б2 В4 Г3

Г. А4 Б2 В1 Г3

Д. А1 Б4 В3 Г2

**Клиническая картина при полном вывихе временного или постоянного зуба:**

- А. укорочение видимой части коронки
- Б. удлинение видимой части коронки
- В. лунка зуба пустая
- Г. смещение коронки в сторону
- Д. видимых изменений нет

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между возрастом и прорезавшимися зубами: Возраст**

**А) Конец первого года**

**Б) Конец второго года**

**В) К 2,5 - 3 годам Прорезавшиеся зубы**

**1. Все временные зубы**

**2. Все временные и первые постоянные моляры**

**3. Только нижние центральные временные резцы**

**4. Все временные резцы**

**5. Временные резцы, клыки и первые моляры**

А. А1 В2 В3

Б. А5 В1 В2

В. А4 В5 В1

Г. А2 В2 В3

Д. А3 В4 В5

**Пародонтолиз наблюдается при:**

- А. синдроме Папийона-Лефевра
- Б. функциональной перегрузке зубов
- В. эндемическом зобе
- Г. заболевании желудочно-кишечного тракта
- Д. заболеваниях сердечно-сосудистой системы

**Форма пульпита преобладающая во временных зубах у детей:**

- А. острый очаговый
- Б. острый диффузный
- В. хронический фиброзный
- Г. хронический гангренозный
- Д. хронический гипертрофический

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность лечения глубокого кариеса постоянных зубов:

- А) полирование
- Б) препарирование кариозной полости
- В) обезболивание
- Г) наложение лечебной прокладки
- Д) антисептическая обработка
- Е) пломбирование
- Ж) нанесение защитного лака

- А. ВЖГАДЕБ
- Б. ВБДГЕАЖ
- В. ГВЕБЖАД
- Г. АВБГДЕЖ
- Д. ЖВГДБЕА

Для удаления временного второго коренного зуба нижней челюсти рекомендуется взять щипцы клювовидные

- А. сходящиеся
- Б. несходящиеся
- В. изогнутые по плоскости
- Г. в зависимости от стороны челюсти
- Д. в зависимости от степени резорбции корней

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеваниями в постоянных зубах с несформированными корнями и рентгенологической картиной. Заболевания в постоянных зубах с несформированными корнями:

- А) Хронический гангренозный пульпит;
- Б) Хронический гранулирующий периодонтит. Рентгенологическая картина:
  1. Нечеткость кортикальной пластинки альвеолы в межкорневом пространстве;
  2. Очаг разрежения в кости у "раструба" корня с нечеткими контурами;
  3. Стадия формирования корня соответствует возрасту ребенка и такая же, как у одноименного зуба;
  4. Корень короче, а канал шире, чем у одноименного зуба.

- А. А14 Б23
- Б. А13 Б24
- В. А23 Б14
- Г. А24 Б13
- Д. А12 Б34



Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеваниями и общим состоянием и самочувствием. Заболевания:

А) ОГС;

Б) ХРАС;

В) МЭЭ;

Г) Стрепто-стафилодермия;

Д) Хроническая травма слизистой рта. Общее состояние и самочувствие:

1. Не страдает;

2. Головная боль, боль в суставах, мышцах;

3. Температура тела нормальная;

4. Температура тела повышена;

5. Прием пищи не нарушен;

6. Прием пищи болезненный.

А. А12 Б345 В56 Г36

Б. А123 Б45 В56 Г16

В. А46 Б136 В246 Г46 Д136

Г. А5 Б2 В14 Г36 Д35

Д. А3 Б2 В5 Г34 Д25

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при проведении неинвазивной герметизации фиссур

Действие

А. протравливание фиссуры кислотой

Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета

В. изоляция от слюны, высушивание зуба

Г. отмывание кислоты из фиссуры

Д. проверка окклюзионной высоты прикуса

Е. повторная изоляция зуба от слюны

Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам, отверждение

З. высушивание протравленной поверхности фиссуры

И. раскрытие фиссуры алмазным бором

А. ДЖБВАГЕЗ

Б. ЕГАВДЖЗБ

В. БВАГЕЗЖД

Г. БВИАГЕЗЖД

Д. ДЖБВИАГЕЗ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при герметизации фиссур зуба герметиком химического отверждения Действие

- А. протравливание фиссуры кислотой
- Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета
- В. изоляция от слюны, высушивание зуба
- Г. отмывание кислоты из фиссуры
- Д. проверка окклюзионной высоты прикуса
- Е. повторная изоляция зуба от слюны
- Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам, отверждение
- З. высушивание протравленной поверхности фиссуры.

- А. БВАГЕЗЖД
- Б. БДЕЖВАГЗ
- В. ЖБВГЗЕАД
- Г. ДАГВБЕЗЖ
- Д. ГБАВЕЗДЖ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между изменениями толщины твердых тканей зуба с увеличением возраста ребенка и тканью зуба:

- А) Эмаль
- Б) Дентин
- 1. Увеличивается в результате продолжения функции клеток, образующих ткани
- 2. Уменьшается в результате физиологического стирания
- 3. Не изменяется

- А. А2 Б1
- Б. А3 Б2
- В. А2 Б3
- Г. А1 Б2
- Д. А3 Б3

Установите соответствие последовательности действий. Укажите последовательность действий при операции - удаление сверхкомплектного зуба во фронтальном отделе верхней челюсти

- А) трапецевидный разрез
  - Б) анестезия
  - В) удаление сверхкомплектного зуба
  - Г) ушивание раны и или проведение тампонады йодоформной турундой
  - Д) трепанирование кортикальной пластинки и создание костного окна с визуализацией сверхкомплектного зуба
  - Е) отслойка слизисто-надкостничного лоскута
  - Ж) противовоспалительная и гипосенсибилизирующая терапия
- З) давящая повязка

- А. ВДБАЕГЗЖ
- Б. ЖЗГЕАБДВ
- В. БАЕДВГЖЗ
- Г. БАВДЕЗГЖ
- Д. ЖЕБАДВГЗ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Ребёнку 7 лет, диагноз

- А) двойной перелом нижней челюсти на уровне зубов 74 и 84 со смещением
- Б) перелом левого мыщелкового отростка Вид шины и фиксации
1. комбинированные пластмассовые зубнадесневые шины с зацепными петлями на обе челюсти, межчелюстная фиксация
  2. проволочные шины с зацепными петлями на обе челюсти, межчелюстная фиксация
  3. пластмассовая зубнадесневая шина на нижнюю челюсть
  4. пластмассовая зубнадесневая шина на нижнюю челюсть с вестибулярным пелотом слева
  5. пластмассовая зубнадесневая шина на нижнюю челюсть с вестибулярным пелотом справа
  6. моноблок на область жевательных зубов на стороне, противоположной перелому

- А. А34 Б12
- Б. А1 Б56
- В. А56 Б12
- Г. А25 Б13
- Д. А24 Б36

Клиническая характеристика эмали зубов при системной гипоплазии:

- А. окрашивание коронок зубов в желтый цвет
- Б. изменения цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки зуба
- В. симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации
- Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- Д. хрупкая, слущивающаяся эмаль

**Установите соответствие последовательности действий. Укажите правильную последовательность лечения огс в первые дни заболевания:**

- А) противовирусные препараты**
- Б) антисептические средства**
- В) протеолитические препараты**
- Г) обезболивающие препараты**

- А. ГВБА
- Б. ВБАГ
- В. АБГВ
- Г. АВБГ
- Д. ГАБВ

**Непрямой массаж сердца с использованием двух рук проводят детям старше**

- А. трёх лет
- Б. пяти лет
- В. семи лет
- Г. десяти лет
- Д. двенадцати лет

**Перелом в средней части корня сопровождается:**

- А. болью от температурных раздражителей
- Б. жалобами на косметический дефект
- В. самопроизвольной болью
- Г. болью при накусывании
- Д. отсутствием изменений на рентгенограмме

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между клиническими проявлениями и диагнозом:**

- А) Нитевидные сосочки темного цвета резко увеличены в размере**
- Б) Неравномерная десквамация эпителия на спинке языка**
- В) Глубокие борозды, выстланные нормальным эпителием**

- 1. Географический язык**
- 2. Складчатый язык**
- 3. Черный волосатый язык**

- А. А1 Б3 В2
- Б. А2 Б1 В3
- В. А3 Б1 В2
- Г. А2 Б3 В2
- Д. А3 Б2 В1

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность применения эндодонтических инструментов:**

- А) Н-файл**
  - Б) пульпоэкстрактор**
  - В) каналонаполнитель**
  - Г) К-файл**
  - Д) плаггер**
- А. ГВДБА
  - Б. БАГВД
  - В. БДАВГ
  - Г. АБГДВ
  - Д. ВГБАД

**Частоту дыхания подсчитывают за период времени, составляющей не менее**

- А. 20 секунд
- Б. 30 секунд
- В. 60 секунд
- Г. 90 секунд
- Д. 120 секунд

**Смена йодоформных тампонов после цистотомии прекращается при:**

- А. эпителизации полости
- Б. прорезывании зачатков зубов
- В. способность полости к самоочищению
- Г. отсутствию болевого синдрома
- Д. заполнении полости грануляционной тканью

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность при обследовании пациента с кариесом и его осложнениями:**

- А) выяснение жалоб и анамнеза заболевания**
  - Б) постановка предварительного диагноза**
  - В) составление плана лечения**
  - Г) внешний осмотр и осмотр полости рта**
  - Д) постановка окончательного диагноза**
  - Е) дополнительные методы исследования**
- А. ДВЕГАБ
  - Б. АГБЕДВ
  - В. ГВЕБДА
  - Г. БАГВДЕ
  - Д. АБГДЕВ

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность проведения метода частичной пульпотомии в первое посещение:**

- А) механическая обработка**
- Б) изоляция от слюны**
- В) обезболивание**
- Г) временная повязка**
- Д) антисептическая обработка**
- Е) наложение препарата МТА**
- Ж) удаление части пульпы на 2-3 мм**

- А. ВЖГАДЕБ**
- Б. ВАБДЖЕГ**
- В. БЕДАГЖВ**
- Г. БАВЖЕДГ**
- Д. АДЖЕВБГ**

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при удалении зубного налета с контактных поверхностей зубов нижней челюсти с помощью флоссов Действие**

- А. перемещение зубной нити и очищение контактной поверхности другого рядом стоящего зуба**
- Б. замена использованного участка зубной нити на новый чистый**
- В. накручивание зубной нити на средние пальцы обеих рук и фиксирование ее указательными пальцами**
- Г. продвижение зубной нити по контактной поверхности одного из рядом стоящих зубов и ее очищение**
- Д. введение зубной нити в межзубный промежуток**
- Е. выведение зубной нити из межзубного промежутка**
- Ж. очищение контактных поверхностей следующих зубов**

- А. ГЕЖДАВБ**
- Б. ВАЖГБЕД**
- В. ВДГАЕБЖ**
- Г. ДГВАБЕЖ**
- Д. ДЖБЕАВГ**

**При лечении вколоченного вывиха временных несформированных резцов необходимо:**

- А. вытяжение с помощью ортодонтических аппаратов**
- Б. репозиция зуба и его шинирование на 3-4 недели**
- В. удаление зуба**
- Г. щадящая диета, противовоспалительная терапия, наблюдение**
- Д. рациональное протезирование**

**Сроки первичной отсроченной хирургической обработки ран мягких тканей лица с наложением глухого шва под прикрытием антибактериальной терапии**

- А. 24 часа
- Б. до 36 часов
- В. до 48 часов
- Г. до 72 часов
- Д. до 5-ти суток

**Отлом коронки в пределах эмали и дентина с обнажением пульпы сопровождается:**

- А. отеком по переходной складке
- Б. отсутствием жалоб
- В. серым цветом пульпы
- Г. болью от всех раздражителей
- Д. отсутствием болезненности при зондировании

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между парадонтальным индексом и его определением: Пародонтальный индекс**

**А) Проба Шиллера-Писарева**

**Б) РМА (ПМА)**

**В) GI**

**Г) CPITN и CPI Определение**

**1. Степень тяжести гингивита**

**2. Нуждаемость в лечении заболеваний пародонта**

**3. Определение воспалительного процесса и его распространенности**

**4. Оценка тяжести воспалительного процесса**

А. А1 Б2 В4 Г3

Б. А3 Б4 В1 Г2

В. А2 Б1 В4 Г3

Г. А4 Б3 В2 Г1

Д. А3 Б1 В2 Г4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой повреждения СОПР и повреждающим агентом: Форма повреждения СОПР

А) Термический ожог

Б) Лучевой ожог

В) Фотохимический ожог Повреждающий агент

1. УФ-излучение

2. Лазерное излучение

3.  $\alpha$ -излучение

4.  $\gamma$ -излучение

5. Температура воды 40°C – 50°C

6. Температура воды 50°C – 60°C

А. А45 Б56 В123

Б. А15 Б345 В236

В. А126 Б34 В12

Г. А156 Б234 В23

Д. А35 Б24 В16

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между материалом и целью его применения: Применение

А) Пломбирование временных зубов

Б) Фиксация эндоканальных штифтов

В) Реставрация передней группы зубов Препарат

1. Стеклоиономерный цемент

2. Микронаполненный композит

3. Компомер

А. А3 Б3 В12

Б. А3 Б32 В1

В. А13 Б1 В23

Г. А2 Б12 В13

Д. А1 Б2 В3



Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формами пульпита и симптомами. Формы пульпита:

А) Острый диффузный пульпит;

Б) Обострение хронического гангренозного пульпита. Симптомы:

1. Боли самопроизвольные, длительные с короткими промежутками, иррадиирующие по ходу нерва;

2. Боли постоянные, усиливающиеся при накусывании на зуб;

3. Болезненность при перкуссии;

4. Пульпа не кровоточит;

5. Зондирование пульпы резко болезненно;

6. Зондирование коронковой пульпы зуба безболезненно.

А. А135 Б246

Б. А126 Б345

В. А236 Б145

Г. А246 Б 135

Д. А345 Б126

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и частотой обработки полости рта:

А) ОГС

Б) Кандидоз

В) Пиодермия

Г) ХРАС

Д) МЭЭ

1. Каждый час

2. Перед едой

3. После каждого приема пищи

4. Только перед сном

А. А1 Б2 В3 Г3 Д3

Б. А3 Б3 В3 Г2 Д1

В. А2 Б2 В3 Г1 Д1

Г. А4 Б2 В4 Г4 Д4

Д. А3 Б1 В3 Г3 Д1

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность прорезывания временных зубов:

- А) вторые моляры
- Б) первые моляры
- В) клыки
- Г) вторые резцы
- Д) первые резцы

- А. ГВАБД
- Б. ДБАВГ
- В. ДГБВА
- Г. ДГВБА
- Д. БДГВА

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при применении реминерализующего мусса (gc tooth mousse) для зубов Действие

- А. рекомендации пациенту - воздержаться от приема пищи в течение 40-50 минут
- Б. очищение зубов от зубных отложений
- В. нанесение мусса на зубы
- Г. изоляция зубов от слюны
- Д. высушивание эмали зубов
- Е. экспозиция средства

- А. БГДВЕА
- Б. ГВЕБДА
- В. ВАГБЕД
- Г. АБВЕДГ
- Д. ВЕГДБА

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при проведении контролируемой чистки зубов Действие

- А. повторное определение гигиенического индекса
- Б. демонстрация пациенту метода чистки на обучающей модели зубов
- В. индивидуальный подбор средств гигиены полости рта
- Г. чистка зубов под контролем врача гигиениста стоматологического
- Д. определение гигиенического индекса

- А. ДБГАВ
- Б. ДАВГБ
- В. ВГАБД
- Г. БВГДА
- Д. ГДБВА

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между препаратами и соответствующим ему действием: Препараты

А) Сульфат железа

Б) «Пульпотек»

В) Гидроокись кальция

Г) МТА Действие

1. Одонтотропное

2. Мумифицирующее

3. Антисептическое

4. Гемостатическое

5. Бактерицидное

А. А123 Б345 В45 Г12

Б. А23 Б45 В45 Г45

В. А345 Б25 В1345 Г1345

Г. А1 Б35 В23 Г2

Д. А14 Б13 В2 Г123

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и методом диагностики: Заболевание

А) Пульпит

Б) Гингивит

В) Несовершенный дентиногенез Методы диагностики

1. Сбор анамнеза

2. Индекс ИГР-У

3. Методы лучевой диагностики

4. Метод люминесценции

5. Электроодонтодиагностика

6. Тест-диагностика pH полости рта

7. Реография

8. Допплерография

А. А23457 Б345 В6789

Б. А367 Б38 В45678

В. А13456 Б123678 В13

Г. А 1278 Б345 В56

Д. А13 Б167 В2458

**Препарат, используемый для всех видов местной анестезии:**

- А. мепивакаин
- Б. лидокаин
- В. бензокаин (анестезин)
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. артикаин

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами.**

- А) острый эпидемический паротит**  
**Б) хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит в стадии обострения**
- 1) осложнение у мальчиков - орхит
  - 2) выделение гнойного секрета из устья протока
  - 3) задержка секрета
  - 4) высокая контагиозность
  - 5) железа тестовато-пастозная
  - 6) железа бугристая, плотная
  - 7) одновременное поражение поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез

- А. А3456 Б12
- Б. А1345 Б236
- В. А2345 Б456
- Г. А1267 Б345
- Д. А347 Б1256

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при проведении «урока гигиены» в школе Действие**

- А. чистка зубов под контролем гигиениста стоматологического**  
**Б. повторное определение гигиенического индекса у школьников**  
**В. индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта**  
**Г. демонстрация гигиенистом техники чистки зубов на обучающей модели**  
**Д. определение гигиенического индекса у школьников**  
**Е. беседа со школьниками по вопросам рационального ухода за полостью рта**  
**Ж. отработка школьниками на демонстрационных моделях техники чистки зубов**

- А. ЕГЖДАБВ
- Б. ГЕЖДАВБ
- В. ВАЖГБЕД
- Г. ДАБВГЖЕ
- Д. АДГБВЖЕ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность проведения метода высокой ампутации во второе посещение:

- А) удаление временной повязки
- Б) изоляция от слюны
- В) удаление временного obturационного материала из канала зуба
- Г) восстановление анатомической формы зуба
- Д) наложение изолирующей прокладки
- Е) постоянная obturация канала
- Ж) рентгенологический контроль

- А. АБВЕЖДГ
- Б. ЖЕДВАГБ
- В. ГВАЖБЕД
- Г. БАВГДЕЖ
- Д. ВАБЖДЕГ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и исходом формирования корня: Исход формирования корня

- А) Апексификация
  - Б) Апексогенез
- Диагноз в постоянных зубах с несформированным корнем
- 1. Хронический гангренозный пульпит
  - 2. Хронический гранулирующий периодонтит
  - 3. Отлом части коронки с обнажением пульпы

- А. А1 Б23
- Б. А2 Б13
- В. А3 Б12
- Г. А2 Б23
- Д. А13 Б2

Причины несовершенного развития и строения эмали и дентина:

- А. болезни матери в I половине беременности
- Б. болезни матери в II половине беременности
- В. болезни ребенка в первые годы жизни
- Г. генетические факторы
- Д. травматические повреждения зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между элементом на слизистой оболочки и заболеванием:

- А) Пустулы, толстые соломенно-желтые корки  
Б) Одиночные эрозии округлой формы, покрытые фибринозным налетом  
В) Творожистый налет на слизистой оболочке губ, языка  
Г) Эрозии неправильных очертаний

1. Травматические повреждения

2. ХРАС

3. Кандидоз

4. Пиодермия

5. ОГС

А. А34 Б2 В15 Г3

Б. А4 Б25 В3 Г15

В. А1 Б23 В4 Г5

Г. А2 Б3 В4 Г5

Д. А5 Б2 В4 Г3

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность лечения кариеса в стадии пятна:

- А) высушивание  
Б) очищение зуба от налета  
В) антисептическая обработка  
Г) изоляция от слюны  
Д) аппликации реминерализующих растворов

А. ВГАБД

Б. АДГБВ

В. БГВАД

Г. ГВБДА

Д. ДАБГВ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при применении метода витального окрашивания эмали

- А. ополаскивание полости рта водой, регистрация данных  
Б. нанесение раствора метиленового синего на эмаль  
В. очищение зуба от налета  
Г. изоляция от слюны  
Д. высушивание эмали

А. ВГДБА

Б. АДГБВ

В. ДАВГБ

Г. АВДГБ

Д. ВБДГА

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между частью зубного зачатка и тканями зуба: Части зубного зачатка

- А) Зубной сосочек  
Б) Эмалевый орган  
В) Зубной мешочек Ткани зуба

1. Эмаль
2. Дентин
3. Пульпа зуба
4. Цемент
5. Первичная кутикула эмали
6. Периодонт

- А. А23 Б15 В46  
Б. А15 Б24 В16  
В. А46 Б23 В15  
Г. А23,Б16,В45  
Д. А24,Б36,В15

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и морфологическими элементами на слизистой оболочке:

Заболевания

- А) Травматические повреждения  
Б) ХРАС  
В) Кандидоз  
Г) Пиодермия,  
Д) ОГС Морфологические элементы на слизистой оболочке

1. Пустулы, толстые соломенно-желтые корки
2. Эрозии округлой формы, покрытые фибринозным налетом
3. Творожистый налет на слизистой оболочке губ, языка
4. Эрозии неправильных очертаний

- А. А4 Б2 В3 Г1 Д2  
Б. А2 Б2 В3 Г1 Д1  
В. А3 Б3 В3 Г2 Д1  
Г. А1 Б4 В1 Г3 Д3  
Д. А2 Б1 В2 Г4 Д4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и клиническими проявлениями:

**А) Флюороз**

**Б) Несовершенный амелогенез**

**В) Местная гипоплазия эмали**

**1. Пигментированное пятно и углубление в эмали**

**2. Белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации**

**3. Случивание эмали с обнажением дентина на всех зубах**

**4. Множественные пятна у шеек многих зубов**

А. А5 Б3 В1

Б. А1 Б3 В5

В. А2 Б3 В1

Г. А3 Б4 В1

Д. А4 Б1 В2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и методом диагностики: Заболевание

**А) Кариес**

**Б) Травма зуба**

**В) Пародонтит Методы диагностики**

**1. Сбор анамнеза**

**2. Окрашивание кариес-индикаторами**

**3. Методы лучевой диагностики**

**4. Метод трансиллюминации**

**5. Электроодонтодиагностика**

**6. ТЭР-тест диагностика**

**7. Реография**

**8. Допплерография**

А. А45678 Б234 В12345

Б. А123456 Б136 В1378

В. А678 Б2345 В3478

Г. А13 Б3678 В245

Д. А1378 Б1245678 В1236



Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Классификация заболеваний височно-нижнечелюстного сустава у детей и подростков

**А) первично-костные заболевания**

**Б) функциональные заболевания** Диагноз

1. привычный вывих
2. артрит острый
3. юношеский деформирующий артроз
4. хронический артрит
5. неоартроз
6. костный анкилоз
7. остеоартрит
8. болевой синдром дисфункции

А. А2345 Б456

Б. А567 Б12348

В. А123 Б45678

Г. А356 Б12478

Д. А248 Б13567

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и клиническими проявлениями:

**А) Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ)**

**Б) Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС)**

**В) Травматическая эрозия**

1. Единичные эрозии округлой или овальной формы
2. Эрозии неправильной формы, слабая гиперемия
3. Массивные кровяные корки на красной кайме губ, папулы на коже

А. А3 Б1 В2

Б. А2 Б3 В1

В. А1 Б2 В3

Г. А3 Б2 В1

Д. А1 Б3 В2

**Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий покрытия зубов фторгелем Действие**

- А. высушивание зубов перед покрытием фторгелем**
- Б. покрытие зубов фторгелем**
- В. очищение зубов от налета**
- Г. изоляция от слюны ватными валиками**
- Д. экспозиция фторгеля на зубах в течение 1-2 минут**
- Е. рекомендации пациенту воздержаться от приема пищи в течение двух часов, от чистки зубов и приема очень твердой пищи в течение 12-24 часов**

- А. ДВЕГАБ**
- Б. ВГАБДЕ**
- В. ГВЕБДА**
- Г. АБГВДЕ**
- Д. АВБГДЕ**

**Калькулёзный сиалоаденит преимущественно развивается в железах**

- А. околоушных**
- Б. поднижнечелюстных**
- В. малых слюнных губы**
- Г. подъязычных**
- Д. малых слюнных щек**

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между проявлением хейлита и этиологией заболевания:**

- А) Эрозии с гнойным отделяемым**
- Б) Массивные жёлтые корки**
- В) Эрозии с влажным белым налётом**

- 1. Грибковая**
- 2. Бактериальная**
- 3. Гиповитаминозная**
- 4. Аллергическая**

- А. А2 Б2 В1**
- Б. А1 Б1 В2**
- В. А1 Б2 В3**
- Г. А3 Б3 В2**
- Д. А2 Б1 В3**

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность проведения метода высокой ампутации в первое посещение:

- А) механическая обработка канала
- Б) гемостаз
- В) обезболивание
- Г) временная повязка
- Д) антисептическая обработка канала
- Е) obturation сформированной части канала временным материалом
- Ж) удаление сформированной части пульпы
- З) создание эндодонтического доступа
- И) рентгенологический контроль временной obturation

- А. ВЗЖАДБЕИГ
- Б. ВЗАДБЕГИЖ
- В. ЖАБЕГВИЗД
- Г. БВАЗЖДЕГИ
- Д. ИЗВАБДГЖЕ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между временными зубами и сроками формирования корней: Зубы

- А) Резцы
- Б) Клыки
- В) Моляры
- Сроки формирования корней временных зубов

- 1. Концу первого года
- 2. Двум годам
- 3. Четырём годам
- 4. Пяти годам
- 5. Шести годам

- А. А2 Б4 В3
- Б. А5 Б1 В2
- В. А1 Б2 В3
- Г. А3 Б2 В4
- Д. А4 Б3 В2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и объемом лучевого обследования: Заболевание

А) Местная гипоплазия

Б) Системная гипоплазия эмали

В) Кариес

Г) Несовершенный одонтогенез

Д) Травматическое повреждение Объем лучевого обследования

1. Внутриротовой контактный снимок

2. Ортопантомография

3. Компьютерная томография

4. Внеротовые в косой проекции

5. Внеротовые в боковой проекции

6. Панорамная рентгенография

А. А123 Б345 В45 Г12

Б. А23 Б45 В45 Г45

В. А145 Б26 В145 Г236 Д123456

Г. А45 Б23 В16 Г36

Д. А123 Б456 В456 Г45

Сроки появления клинических проявлений альвеолита после удаления зуба

А. 1-3 сутки

Б. 3-5 сутки

В. 5-7 сутки

Г. 7-9 сутки

Д. 9-11 сутки

Клиническая характеристика эмали зубов при наследственном несовершенном амелогенезе:

А. пигментированное пятно и углубление в эмали одного зуба

Б. белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации

В. слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах

Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации

Д. стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий аппликации фторидсодержащими растворами Действие

А. рекомендации

Б. очищение зубов от налета

В. нанесение раствора на зубы

Г. изоляция зубов от слюны

Д. высушивание эмали зубов

Е. экспозиция раствора

Ж. удаление средства из полости рта

А. ДЖЕГВАБ

Б. БГДВЕЖА

В. ВЖГАДЕБ

Г. АБВДГЖЕ

Д. ГАБДВЕЖ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой пульпита и симптомами:

А) Острый диффузный пульпит

Б) Обострение хронического гангренозного пульпита

1. Боли самопроизвольные, длительные с короткими промежутками, иррадиирующие по ходу нерва

2. Боли постоянные, усиливающиеся при накусывании на зуб

3. Переходная складка гиперемирована и болезненна при пальпации

4. Переходная складка инфильтрирована, возможна флюктуация

5. Зондирование пульпы резко болезненно

6. Зондирование коронковой пульпы зуба безболезненно

А. А34 Б23456

Б. А45 Б1234

В. А135 Б2456

Г. А125 Б436

Д. А245 Б135

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Заболевания

А) острый серозный лимфаденит

Б) острый гнойный лимфаденит

В) хронический лимфаденит одонтогенной этиологии вне обострения Клинические симптомы

1. общее состояние удовлетворительное

2. общее состояние средней тяжести

3. лимфоузел увеличен

4. температура тела повышена

5. гиперемия кожи

6. возможна слабая болезненность при пальпации

7. пальпация болезненна

8. наличие очага флюктуации

9. лимфоузел подвижен

А. А457 Б234 В123567

Б. А3457 Б456 В127

В. А13479 Б234578 В1369

Г. А245 Б269 В1378

Д. А168 Б3579 В24

При наследственном несовершенном амелогенезе эмаль зубов

А. Стирается, обнажая дентин водянистого цвета

Б. С меловидными пятнами в пришеечной области зубов разного срока минерализации

В. С вертикальными бороздами от режущего края до шеек зубов

Г. С белыми пятнами и крапинками

Дифференциальную диагностику язвенно-некротического стоматита венсана проводят с

А. Острым герпетическим стоматитом

Б. Острым псевдомембранозным кандидозом

В. Лейкоплакией

Г. Гингивитом

Законы прорезывания зубов можно сформулировать как

А. Парность, болезненность, последовательность, асимметрия

Б. Симметричность, ретенция, полуретенция, болезненность

В. Своевременность, парность, последовательность, симметричность

Г. Последовательность, безболезненность, несвоевременность

**Для создания апикального барьера из минералтриоксидаагрегата в зубах с несформированными корнями используют**

- А. Коревой бурав Хедстрема
- Б. Спредер
- В. Плагер
- Г. К-файл

**К ультразвуковым исследованиям относится**

- А. Томография
- Б. Эхография
- В. Эндоскопия
- Г. Сцинтиграфия

**Показанием к проведению импрегнационных методов являются**

- А. Каналы в стадии резорбции верхушечной части
- Б. Каналы однокорневых зубов
- В. Широкие каналы
- Г. Облитерированные каналы

**Потеря сознания характерна для**

- А. Тиреотоксического криза
- Б. Инсульта
- В. Обморока
- Г. Приступа стенокардии

**Зубы гетчинсона, пфлюгера и фурнье являются разновидностью**

- А. Наследственной патологии
- Б. Эндемического флюороза
- В. Местной гипоплазии
- Г. Системной гипоплазии

**При лечении кандидоза слизистой оболочки полости рта назначают**

- А. Амоксициллин
- Б. Рибавирин
- В. Сульфатазол
- Г. Клотримазол

**Пятна при флюорозе локализуются**

- А. На апроксимальных поверхностях
- Б. По режущему краю
- В. В области шейки зуба
- Г. По всей поверхности коронки зуба

**Ранним клиническим симптомом сужения зубных рядов является**

- А. Тесное положение зубов
- Б. Увеличение фронтального участка
- В. Уменьшение ширины зубного ряда
- Г. Уплотнение фронтального участка

**Устранение факторов риска относится к**

- А. Эпидемиологическому обследованию населения
- Б. Третичной профилактике стоматологических заболеваний
- В. Вторичной профилактике стоматологических заболеваний
- Г. Первичной профилактике стоматологических заболеваний

**При эпидемическом паротите инкубационный период составляет (в днях)**

- А. 14
- Б. 30
- В. 7-8
- Г. 3-5

**Одной из форм хронического пульпита является**

- А. Гранулематозный
- Б. Гипертрофический
- В. Гранулирующий
- Г. Гиперэргический

**При ударе в область тела нижней челюсти справа отражённый перелом локализуется в области**

- А. Правого венечного отростка
- Б. Левого мышечкового отростка
- В. Правого мышечкового отростка
- Г. Подбородка



**Процедура герметизации фиссур не предусматривает протравливание эмали при использовании**

- А. Низкомодульного композита
- Б. Герметика светового отверждения
- В. Герметика химического отверждения
- Г. Стеклоиономерного цемента

**При пятнистой форме системной гипоплазии эмали пациенты жалуются на**

- А. Боль от химических раздражителей
- Б. Невозможность откусывания пищи
- В. Боль от температурных раздражителей
- Г. Эстетические нарушения

**Какое свойство микроорганизмов играет важную роль в возникновении кариеса?**

- А. Способность вызывать дисбактериоз
- Б. Образование органических кислот
- В. Устойчивость к антибиотикам
- Г. Способность к размножению

**Изменить цвет кожи в подчелюстной области может**

- А. Гемангиома
- Б. Аплазия слюнной железы
- В. Боковая киста шеи
- Г. Лимфангиома

**К приобретенным первично-костным заболеваниям внчс, возникшим в результате остеоартрита, относится**

- А. Вторично-деформирующий остеоартроз
- Б. Синдром Гольденхара
- В. Хронический артрит
- Г. Синдром болевой дисфункции

**Период подготовки к смене зубов продолжается от \_\_\_\_ до \_\_\_\_ лет**

- А. 3; 4
- Б. 3; 9
- В. 4; 6
- Г. 5; 8

**К причинам системной гипоплазии молочных зубов относят**

- А. Заболевание ребенка на 2-3 году жизни
- Б. Искусственное вскармливание ребенка
- В. Травму молочных зубов
- Г. Болезни матери во второй половине беременности

**Диагноз «мелкий нижний свод преддверия полости рта» ставится на основании**

- А. Жалоб
- Б. Опроса
- В. Рентгенологического исследования
- Г. Клинического осмотра

**К истинным доброкачественным опухолям относится**

- А. Травматическая костная киста
- Б. Деформирующий остоз
- В. Зубосодержащая киста
- Г. Остеобластокластома

**Преимуществом лазерного препарирования является**

- А. Высокощелочная среда в зоне препарирования
- Б. Одонтотропное действие
- В. Отсутствие смазанного слоя
- Г. Профилактический эффект за счет выделения фторид-ионов

**О развитии аномалий прикуса, обусловленных нарушением носового дыхания, свидетельствует**

- А. Нарушение смыкания губ
- Б. Удлинение нижней трети лица в состоянии покоя
- В. Наклон головы вперед
- Г. Несмыкание губ

**К проводниковому методу обезболивания на верхней челюсти относится анестезия**

- А. Торусальная
- Б. Мандибулярная
- В. Туберальная
- Г. Апликационная

**При внеротовом обследовании челюстно-лицевой области выявляют**

- А. Изменение конфигурации лица и ограничение подвижности нижней челюсти
- Б. Цвет и влажность слизистой оболочки полости рта
- В. Состояние зубов больного
- Г. Наличие сверхкомплектных зубов

**Формирование корней центральных верхних постоянных резцов завершается в возрасте (в годах)**

- А. 6-7
- Б. 11-12
- В. 13-14
- Г. 8-10

**Реабилитационные мероприятия инвалида осуществляются на основании**

- А. Индивидуальной программы реабилитации инвалида
- Б. Полиса обязательного медицинского страхования
- В. Свидетельства об инвалидности
- Г. Программы добровольного медицинского страхования

**К характерным симптомам для хронического течения верхушечного периодонтита относят**

- А. Некротизированную пульпу зуба
- Б. Постоянную ноющую боль
- В. Неизменённую пульпу зуба
- Г. Гиперемию и отёк переходной складки

**Сложная одонтома относится к группе**

- А. Опухолеподобных образований
- Б. Злокачественных одонтогенных опухолей
- В. Воспалительных заболеваний
- Г. Доброкачественных одонтогенных опухолей

**При пятнистой форме флюороза постоянных зубов на рентгенограмме**

- А. Ограниченные полосы просветления на зубах одного срока минерализации, расположенные горизонтально
- Б. Патологические изменения твердых тканей зубов отсутствуют
- В. Короткие корни, облитерация пульповой камеры и каналов всех зубов
- Г. Ограниченные полосы просветления на зубах разного срока минерализации, расположенные вертикально

**Предметом гигиены для рта является**

- А. Скребок для языка
- Б. Зубная паста
- В. Зубной порошок
- Г. Ополаскиватель

**Профилактикой флюороза в эндемическом очаге является**

- А. Применение фторидсодержащих ополаскивателей
- Б. Профессиональная гигиена полости рта
- В. Контролируемая чистка зубов
- Г. Применение кальцийсодержащих зубных паст

**Специфическим методом профилактики кариеса жевательных поверхностей зубов у детей является**

- А. Стоматологическое просвещение
- Б. Чистка зубов фторидсодержащими пастами
- В. Герметизация фиссур
- Г. Обучение гигиене полости рта

**Для оценки пародонта боковой группы зубов целесообразно использовать**

- А. Томографию ВНЧС
- Б. ТРГ – боковую проекцию
- В. ТРГ – прямую проекцию
- Г. Ортопантомографию

**Лечение острого артрита внчс включает**

- А. Артропластику
- Б. Физиотерапию
- В. Создание ложного сустава
- Г. Редрессацию

**Положительный исход метода витальной ампутации возможен при длительности кровотечения из устья корневого канала не более \_\_\_\_ минут**

- А. 1-2
- Б. 6-8
- В. 4-5
- Г. 10

**Гидроксиапатит включают в состав зубных паст с целью**

- А. Реминерализации эмали
- Б. Отбеливания зубов
- В. Повышения пенообразования
- Г. Профилактики кровоточивости десен

**Пульпа зуба развивается из**

- А. Зубного мешочка
- Б. Зубного сосочка
- В. Костной ткани челюсти
- Г. Эмалевого органа

**При оценке тяжести кариозного поражения поверхности зуба код 4 по icdas соответствует критерию**

- А. Здоровая эмаль зуба
- Б. Локализованное разрушение эмали
- В. Первые видимые изменения в эмали
- Г. Под эмалью просвечивает потемнение дентина

**Дополнительным симптомом клиники одностороннего фиброзного анкилоза внчс является**

- А. Нарушение глотания
- Б. Смещение нижней челюсти в здоровую сторону
- В. Шум в ушах
- Г. Множественный кариес

**Согласно рекомендациям ВОЗ высокий уровень интенсивности кариеса у 12-летних детей соответствует значению кпу**

- А. 0-1
- Б. 2,7-4,4
- В. 1,1-2,6
- Г. 4,5-6,6

**Повышенное содержание фторидов в питьевой воде является фактором риска возникновения**

- А. Эрозии
- Б. Флюороза
- В. Гипоплазии эмали
- Г. Кариеса

**Появлению хронических, рецидивирующих афт на слизистой оболочке рта детей способствуют**

- А. Пломбы из разных металлов (галодент, серебряная и медная амальгамы), ортодонтические коронки
- Б. Имеющиеся вредные привычки прикусывать слизистую оболочку рта и щек
- В. Имеющиеся хронические заболевания ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта
- Г. Рецидивирующие герпетические поражения губ и кожи лица у членов семьи

**Наиболее информативным рентгенологическим методом исследования при диагностике слюннокаменной болезни поднижнечелюстной слюнной железы является**

- А. Ортопантомография
- Б. Рентгенография нижней челюсти в аксиальной проекции
- В. Фистулография
- Г. Панорамная рентгенография нижней челюсти

**Боковые молочные резцы прорезываются на \_\_\_\_\_ месяце жизни ребенка**

- А. 6-12
- Б. 7-8
- В. 12-17
- Г. 2-5

**При локализации одонтогенной воспалительной кисты на верхней челюсти в зависимости от расположения её по отношению к синусу выделяют**

- А. Диффузную
- Б. Проникающую
- В. Ограниченную
- Г. Полициклическую

**Дифференциальную диагностику очень слабой формы флюороза проводят с**

- А. Несовершенным дентиногенезом
- Б. Несовершенным одонтогенезом
- В. Системной гипоплазией эмали
- Г. Кариесом дентина

**Зубная нить используется для удаления налета с поверхностей \_\_\_\_\_ зубов**

- А. Контактных
- Б. Окклюзионных
- В. Оральных
- Г. Вестибулярных

**При пломбировании кариозной полости стеклоиономерными цементами обязательным этапом является**

- А. Протравливание эмали
- Б. Обработка дентин-кондиционером
- В. Наложение лечебной прокладки
- Г. Нанесение адгезивной системы

**Формой флюороза является**

- А. Аплазия
- Б. Меловидно-крапчатая
- В. Чашеобразная
- Г. Бороздчатая

**Для удаления зуба**

**8.1 рекомендуется взять щипцы**

- А. Прямые
- Б. Клювовидные несходящиеся без шипиков
- В. S-образно изогнутые с шипиком
- Г. S-образно изогнутые без шипика

**Гноетечение из носа при остеомиелите верхней челюсти у детей свидетельствует о преимущественном распространении воспаления в области**

- А. Передней и угловой вены лица
- Б. Латеральной
- В. Верхнечелюстной пазухи
- Г. Задней и решетчатой пазухи

**К положительным свойствам стеклоиономерного цемента относят**

- А. Короткое «рабочее» время
- Б. Низкую устойчивость к истиранию
- В. Низкую прочность на диаметральное растяжение
- Г. Профилактическое действие за счет выделения фторидов

**Для удаления налета с проксимальных поверхностей зубов целесообразно использовать**

- А. Жевательную резинку
- Б. Монопучковые щетки
- В. Ирригатор
- Г. Межзубные ершики

**Наиболее частой причиной пульпита во временных молярах является**

- А. Механическая травма пульпы
- Б. Термическая травма пульпы
- В. Химическая травма пульпы
- Г. Инфицирование из кариозной полости

**На каждое дополнительное кресло в кабинете необходима площадь не менее (в кв.м.)**

- А. 7
- Б. 14
- В. 10
- Г. 5

**Окрашивание зубов вызывает**

- А. Хлорид кальция
- Б. Тетрациклин
- В. Димедрол
- Г. Анальгин

**Неудовлетворительная гигиена полости рта является причиной возникновения у детей**

- А. Флюороза
- Б. Гингивита
- В. Пародонтоза
- Г. Эрозии зубов

**Противопоказанием к использованию фторидсодержащих зубных паст детьми является**

- А. Наличие у пациента большого количества пломб
- Б. Неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта
- В. Системная гипоплазия эмали
- Г. Высокое содержание фторида в питьевой воде

**Ранним клиническим признаком воспаления пародонта является**

- А. Клинический карман в 3 мм
- Б. Изменение формы десневого сосочка
- В. Кровоточивость десны
- Г. Неудовлетворительная гигиена полости рта



**Показанием к назначению системных методов фторидпрофилактики кариеса является уровень интенсивности кариеса у 12-летних детей**

- А. Низкий, средний, высокий
- Б. Очень низкий, низкий, средний
- В. Средний, высокий, очень высокий
- Г. Очень низкий, средний, высокий

**Средний возраст, в котором показана герметизация премоляров, составляет (в годах)**

- А. 10-11
- Б. 4-5
- В. 6-7
- Г. 8-9

**К видам остеомы относят**

- А. Боковую и срединную
- Б. Периферическую и центральную
- В. Капиллярную и кавернозную
- Г. Веррукозную и эрозивную

**Максимальная доза артикаина у ребенка составляет \_\_\_\_ мг на килограмм**

- А. 5
- Б. 2
- В. 4
- Г. 10

**Лечение язвенно-некротического гингивита состоит из**

- А. Гигиены полости рта, обезболивания, массажа
- Б. Гигиены полости рта, удаления зубных отложений, наложения лечебных повязок
- В. Обезболивания, снятия зубных отложений, аппликаций протеолитическими ферментами, антибактериальных средств
- Г. Гигиены полости рта, устранения местных факторов (коррекция уздечек, пластика преддверия полости рта и др.), электрофореза витаминами, всех видов массажа

**Ведущим и предпочтительным методом диагностики анкилоза внчс у детей является**

- А. КЛКТ
- Б. Ортопантомография
- В. ТРГ в боковой проекции
- Г. Панорамная рентгенография

**При бороздчатой форме системной гипоплазии эмали постоянных зубов борозды на эмали передних зубов расположены чаще на**

- А. Оральной поверхности зубов в вертикальном направлении
- Б. Вестибулярной поверхности зубов в вертикальном направлении
- В. Оральной поверхности зубов в пришеечной области
- Г. Вестибулярной поверхности зубов параллельно режущему краю

**Выздоровление после периодонтита постоянного зуба можно определить после пломбирования зуба через**

- А. 6-12 Месяцев
- Б. 7 Дней
- В. 1 Месяц
- Г. 1 Сутки

**Младенческая ретрогения представляет собой**

- А. Дистальное положение нижней челюсти во время рождения и в первые месяцы жизни
- Б. Дистальное положение нижней челюсти от 6 месяцев до 1 года
- В. Несмыкание зубных валиков по вертикали
- Г. Дистальное положение верхней челюсти при рождении и в первые месяцы жизни

**Одним из требований к детским зубным щеткам является наличие**

- А. Индикаторных щетинок
- Б. Щетины средней жесткости
- В. Мягкой щетины
- Г. Натуральной щетины

**Воспаление пульпы зуба возникает от воздействия**

- А. Микроорганизмов
- Б. Зубного налета
- В. Углеводов
- Г. Зубного камня

**Для удаления корневой части (экстирпации) пульпы в хорошо проходимых корневых каналах используют**

- А. Гуттаконденсор
- Б. Иглу Миллера
- В. К-файл
- Г. Пульпоэкстрактор

**При периодонтите временного зуба выраженный очаг деструкции костной ткани на рентгенограмме является показанием к проведению**

- А. Имплантации
- Б. Реплантации
- В. Удаления зуба
- Г. Лечения зуба

**Для антисептической обработки полости рта при заболеваниях пародонта используют (в процентах)**

- А. Калия перманганат 2
- Б. Хлоргексидин биглюконат 0,05
- В. Натрия фторид 0,2
- Г. Водорода пероксид 3

**Показанием для цистэктомии радикулярных кист челюстей считают**

- А. Прорастание кисты в верхнечелюстной синус
- Б. Небольшие размеры (до 3 зубов в полости)
- В. Прорастание кисты в полость носа
- Г. Большие размеры (более 3 зубов в полости)

**Анкетирование родителей дает возможность оценить**

- А. Уровень знаний о профилактике стоматологических заболеваний
- Б. Качество оказания стоматологической помощи
- В. Уровень стоматологического здоровья
- Г. Навыки по уходу за полостью рта детей

**Типичным признаком болезни при скарлатине считают**

- А. Пятна Бельского-Филатова-Коплика
- Б. Афты на слизистой оболочке полости рта
- В. Синюшно-красные пятна (кокарды) на коже
- Г. «Малиновый язык»

**При наследственном несовершенном амелогенезе на эмали выявляются**

- А. Горизонтальные борозды, параллельные режущему краю зубов одного периода минерализации
- Б. Вертикальные борозды от режущего края до шеек всех зубов
- В. Меловые пятна в пришеечной области зубов разного периода минерализации
- Г. Белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации

**S-образно изогнутые щипцы, щёчка которых заканчивается шипиком, предназначены для удаления \_\_\_\_\_ челюсти**

- А. Моляров верхней
- Б. Латеральных резцов верхней
- В. Латеральных резцов нижней
- Г. Моляров нижней

**При лечении молочного зуба методом витальной ампутации формокрезол накладывается на устья корневых каналов на**

- А. 30 Секунд
- Б. Сутки
- В. 3-5 Минут
- Г. 15 Минут

**Тактика лечения вколоченного вывиха временного сформированного резца с риском повреждения зачатка постоянного резца**

- А. Наблюдение с последующим эндодонтическим лечением
- Б. Удаление
- В. Наблюдение, удаление при появлении признаков воспаления
- Г. Репозиция

**К мышцам,двигающим нижнюю челюсть кпереди относят**

- А. Челюстно-язычную, височную
- Б. Латеральную крыловидную, челюстно-язычную
- В. Височную, жевательную, челюстно-язычную
- Г. Круговую мышцу рта, жевательную

**При хроническом периодонтите постоянного зуба пациенты жалуются на боль, усиливающуюся при**

- А. Открывании рта
- Б. Употреблении горячей пищи
- В. Надавливании на зуб
- Г. Употреблении холодной пищи

**Ребенок с привычкой прокладывания языка между зубами нуждается в**

- А. Наблюдении
- Б. Профилактических мероприятиях
- В. Хирургическом лечении
- Г. Лечебных мероприятиях

**При полном вывихе молочного зуба**

- А. Зуб обязательно должен быть реплантирован
- Б. Если до смены зуба остается менее одного года, зуб не репланируется
- В. Временные зубы реплантации не подлежат
- Г. Временный зуб должен быть реплантирован, если до его смены остается более двух лет

**Ведущая роль в лечении острого некротизирующего язвенного гингивита принадлежит**

- А. Ортодонтическому лечению
- Б. Общеукрепляющей терапии
- В. Профессиональной гигиене
- Г. Антибактериальной терапии

**Вскрытие полости зуба интактного первого премоляра нижней челюсти проводят в области**

- А. Фиссуры позади валика
- Б. Валика
- В. Фиссуры впереди валика
- Г. Щечного бугра

**Предпочтительным методом лечения несформированного однокорневого зуба при хроническом фиброзном пульпите является**

- А. Витальная ампутация
- Б. Девитальная экстирпация
- В. Витальная экстирпация
- Г. Девитальная ампутация

**При ушибе зуба может наблюдаться**

- А. Подвижность части коронки зуба
- Б. Изменение цвета зуба
- В. Укорочение высоты коронки зуба
- Г. Изменение положения зуба в зубном ряду

[Вернуться в начало](#)