

Тесты с вопросами по специальности «Стоматология детская» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/detskii-stomatolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Стоматология детская» для аккредитации и других экзаменов (3100 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_detskii/

2) Тесты для аккредитации «Стоматология терапевтическая» (2700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_terapevt/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Для выявления кариозных пятен методом окрашивания применяют:

- А. реактив Шиллера-Писарева
- Б. раствор йодистого калия
- В. 2% раствор метиленового синего
- Г. бриллиантовый зеленый
- Д. раствор Боровского-Волкова

Для снятия психоэмоционального напряжения в условиях стоматологической поликлиники используют:

- А. снотворные
- Б. анксиолитики (транквилизаторы)
- В. наркотические анальгетики
- Г. ненаркотические анальгетики
- Д. антидепрессанты

В ближайшие часы после ранений языка, мягкого неба, тканей дна рта опасность для жизни ребенка представляет

- А. нарушение речи
- Б. нарушение приема пищи
- В. асфиксия
- Г. нарушение сна
- Д. развитие гнойно-некротического процесса

При диагностике костных новообразований челюстных костей у детей информативным методом не является

- А. рентгенологический
- Б. макроскопия послеоперационного материала
- В. цитологический
- Г. морфологический
- Д. аксиография

Замедленное, поверхностное дыхание характерно для:

- А. сердечно-сосудистого коллапса
- Б. анафилактического шока
- В. обморока
- Г. болевого шока
- Д. эпилептического припадка

Удаление временных центральных резцов верхней челюсти рекомендуется производить щипцами

- А. прямыми
- Б. клювовидными со сходящимися щечками
- В. штыковидными
- Г. S-образно изогнутыми
- Д. клювовидными с несходящимися щечками

Посттравматические воспалительные корневые кисты челюстей у детей с постоянным прикусом развиваются чаще от зубов

- А. резцов верхней челюсти
- Б. клыков
- В. малых коренных
- Г. больших коренных
- Д. резцов нижней челюсти

Индекс CRITN используют для определения:

- А. уровня гигиены полости рта
- Б. степени активности кариеса
- В. стойкости капилляров десны
- Г. нуждаемости в лечении заболеваний пародонта
- Д. интенсивности кариеса

Основой лечебных прокладок “Дайкал”, “Кальци-пульп”, “Кальмецин” является:

- А. антибиотик
- Б. гидроокись кальция
- В. антисептик
- Г. эвгенол
- Д. интерферон

Кариозная полость всегда сообщается с полостью зуба при пульпите во временных зубах:

- А. острым очаговым
- Б. острым диффузным
- В. хроническом фиброзном
- Г. хроническом гангренозном
- Д. хроническом гипертрофическом

Укажите препарат, применяемый для витальной пульпотомии:

- А. резорцин-формалиновая смесь
- Б. солкосерил
- В. фенoplast
- Г. минеральный триоксиагрегат (МТА)
- Д. хлоргексидин

Появление сыпи, кожного зуда, отёка губ, век является клиническим симптомом:

- А. сердечно-сосудистого коллапса
- Б. обморока
- В. анафилактического шока
- Г. болевого шока
- Д. эпилептического припадка

Подтверждение диагноза хронического периодонтита базируется на данных:

- А. клиники
- Б. рентгенографии
- В. реопародонтографии
- Г. денситометрии
- Д. реоплетизмографии

Симптомы, характерные для острого диффузного пульпита в сформированном постоянном зубе:

- А. боли самопроизвольные, ночные, приступообразные, длительные, с короткими светлыми промежутками, иррадиирующие
- Б. боли постоянные, усиливающиеся при накусывании на зуб
- В. переходная складка гиперемированная, болезненная при пальпации
- Г. боли от раздражителей, приступообразные, с короткими болевыми приступами и длительными светлыми промежутками, локальные
- Д. боли и кровоточивость при попадании пищи в кариозную полость

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие влияния на проницаемость эмали растворов. Препарат:

- А) Ортофосфорная кислота
 - Б) Фторидсодержащие препараты
 - В) Молочная кислота
 - Г) Препараты содержащие кальций и фосфаты
 - Д) Физиологический раствор
- Действие на проницаемость эмали:**
- 1. Повышает
 - 2. Понижает
 - 3. Не изменяет
- А. А) А1 Б2 В 1 Г2 Д3
 - Б. Б) А2 Б3 В1 Г3 Д1
 - В. В) А3 Б1 В2 Г1 Д2

Ширина очага поражения при бороздчатой форме системной гипоплазии эмали зависит от:

- А. возраста, в котором ребенок перенес заболевание
- Б. срока прорезывания зуба
- В. соблюдения правил гигиены полости рта
- Г. силы воздействия повреждающего фактора
- Д. длительности воздействия повреждающего фактора

Травма зачатка постоянного зуба преимущественно наблюдается при травме временного зуба в виде

- А. полного вывиха
- Б. неполного вывиха
- В. внедренного (вколоченного) вывиха
- Г. ушиба зуба
- Д. перелома корня

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между индексом и его назначением: Индекс

А) КПУ;

Б) ОНІ-S;

В) СРІТN;

Г) кп;

Д) РМА. Назначение:

1. Оценка интенсивности кариеса временных зубов;

2. Оценка интенсивности кариеса постоянных зубов;

3. Оценка нуждаемости в лечении заболеваний пародонта;

4. Оценка интенсивности и распространенности воспалительной реакции тканей пародонта;

5. Количественная оценка зубного налета и зубного камня

А. А) А1 Б3 В4 Г5 Д2

Б. Б) А3 Б1 В2 Г4 Д5

В. В) А2 Б5 В3 Г1 Д4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеваниями и общим состоянием и самочувствием.

Заболевания:

А) ОГС;

Б) ХРАС;

В) МЭЭ;

Г) Стрепто-стафилодермия;

Д) Хроническая травма слизистой рта. Общее состояние и самочувствие:

1. Не страдает;

2. Головная боль, боль в суставах, мышцах;

3. Температура тела нормальная;

4. Температура тела повышена;

5. Прием пищи не нарушен;

6. Прием пищи болезненный.

А. А) А16 Б126 В24 Г46 Д1256

Б. Б) А46 Б136 В246 Г46 Д136

В. В) А12 Б146 В235 Г46 Д1246

Операция цистэктомия предполагает удаление оболочки кисты

- А. полное
- Б. нижней ее стенки
- В. вестибулярной ее стенки
- Г. верхней ее стенки
- Д. нижней ее стенки

Заболевание, при котором прорезывается один зуб измененной формы:

- А. флюороз
- Б. системная гипоплазия
- В. местная гипоплазия
- Г. тетрациклиновые зубы
- Д. синдром Стентона-Капдепона

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность применения эндодонтических инструментов:

- А) Н-файл;**
- Б) пульпоэкстрактор;**
- В) каналонаполнитель;**
- Г) К-файл;**
- Д) спредер.**
- А. А) ДБАГВ
- Б. Б) БАГВД
- В. В) ГБАДВ

Чередование периодов обострения и ремиссии характерно для паротита

- А. острого эпидемического
- Б. хронического паренхиматозного
- В. постравматического
- Г. новорожденных
- Д. гангренозного

После вскрытия субпериостального абсцесса дренаж в ране оставляют на

- А. 1 сутки
- Б. 2 суток
- В. 3 суток
- Г. 7 суток
- Д. до прекращения гнойного отделяемого

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом в постоянных зубах с несформированными корнями и исходом. Диагноз:

А) Хронический гангренозный пульпит;

Б) Хронический гранулирующий периодонтит;

В) Отлом части коронки с обнажением пульпы. Исход:

1. Апексификация;

2. Апексогенез.

А. А) А2 Б1 В2

Б. Б) А1 Б2 В1

В. В) А2 Б1 В1

Зондирование коронковой пульпы безболезненно при пульпите:

А. хроническом фиброзном

Б. хроническом гангренозном

В. хроническом гипертрофическом

Г. хроническом в стадии обострения

Д. остром очаговом

При нарушении первого периода развития зуба отмечается:

А. гипоплазия

Б. флюороз

В. адентия

Г. несовершенный одонтогенез

Д. кариес

Выбор метода лечения пульпита у детей зависит от:

А. формы пульпита, групповой принадлежности зубов, степени сформированности корней

Б. возраста ребенка, наличия сопутствующей соматической патологии

В. стадии развития зубов и их групповой принадлежности

Г. от диагноза

Д. от групповой принадлежности зубов

Для одновременного выключения щечного и язычного нервов применяется анестезия:

А. у большого небного отверстия

Б. мандибулярная

В. туберальная

Г. торусальная

Д. инфраорбитальная

Основным методом местного обезболивания при удалении временных фронтальных зубов верхней челюсти является анестезия:

- А. туберальная
- Б. инфраорбитальная
- В. инфильтрационная
- Г. внутрикостная
- Д. у резцового отверстия

Неотложная помощь ребенку с острым гнойным периоститом заключается в

- А. срочной госпитализации
- Б. дезинтоксикационной терапии
- В. хирургической помощи
- Г. иммунотерапии
- Д. иглорефлексотерапии

Герметизацию фиссур постоянных зубов рекомендуется проводить

- А. в 6 лет
- Б. через 1 год после прорезывания
- В. через 1 год после окончания формирования корней
- Г. сразу после прорезывания коронки зуба
- Д. сразу после окончания формирования корней зуба

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами лечения и заболевания. Метод лечения:

А) Витальная ампутация;

Б) Витальная экстирпация. Заболевание:

1. Хронический фиброзный пульпит во временном моляре с несформированным корнем;
2. Хронический фиброзный пульпит в постоянном моляре с несформированным корнем;
3. Хронический гангренозный пульпит в постоянном моляре со сформированным корнем;
4. Отлом коронки с обнажением пульпы во временном резце со сформированным корнем;
5. Отлом коронки с обнажением пульпы в постоянном резце с несформированным корнем.

- А. А) А134 Б25
- Б. Б) А125 Б34
- В. В) А235 Б14

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между воспалительными заболеваниями тканей пародонта и симптомами. Заболевание:

А. Гингивит;

Б. Пародонтит. Симптомы:

1. подвижность зубов;
2. кровоточивость десны;
3. оголение шеек зубов;
4. пародонтальные карманы;
5. гиперемия, отечность десны;
6. деструкция альвеолы.

А. А) А25 Б1346

Б. Б) А25 Б123456

В. В) А1256 Б1346

Первичным элементом поражения при остром герпетическом стоматите (ОГС) является:

А. папула

Б. эрозия

В. пузырек

Г. корка

Д. пятно

На постоянных молярах у детей в первые годы после прорезывания зуба кариес наиболее часто возникает:

А. на буграх

Б. на оральной поверхности

В. на контактных поверхностях

Г. на вестибулярной поверхности

Д. в фиссурах, ямках

Очаговая деминерализация выявляется методом витального окрашивания при:

А. эрозии эмали

Б. белом кариозном пятне

В. пятнистой форме гипоплазии

Г. пигментированном кариозном пятне

Д. флюорозе

Байонетные щипцы предназначены для удаления зубов челюсти:

- А. верхней
- Б. нижней
- В. обеих челюстей
- Г. верхней при ограниченном открывании рта
- Д. нижней при ограниченном открывании рта

Выделите симптом, не укладывающийся в клиническую картину коллапса

- А. артериальная гипотония
- Б. бледные, холодные и влажные кожные покровы
- В. гипотонус
- Г. расширенный зрачок
- Д. двигательное беспокойство

Изогнутые по плоскости клювовидные щипцы предназначены для удаления зубов челюсти:

- А. верхней
- Б. нижней
- В. обеих челюстей
- Г. верхней при ограниченном открывании рта
- Д. нижней при ограниченном открывании рта

Язвенно-некротические поражения слизистой оболочки рта наблюдаются:

- А. при гипervитаминозах
- Б. при хроническом гипоацидном гастрите
- В. при компенсированных заболеваниях почек
- Г. при хроническом бронхите
- Д. при заболеваниях крови и кроветворных органов

При хроническом фиброзном периодонтите воспалительный процесс локализуется:

- А. в периодонте
- Б. в кости и альвеоле
- В. поднадкостнично
- Г. в костной ткани челюсти
- Д. в прилежащих мягких тканях

Пародонт включает в себя:

- А. периодонт, костную ткань альвеолы, десну, цемент корня зуба
- Б. периодонт, костную ткань альвеолы, цемент корня зуба
- В. костную ткань альвеолы, десну, цемент корня зуба
- Г. периодонт, десну, цемент корня зуба
- Д. периодонт, костную ткань альвеолы, десну, цемент корня зуба, корень зуба.

Укажите, какие инструменты используются для расширения корневого канала зуба:

- А. пульпоэкстрактор
- Б. корневая игла
- В. ример
- Г. Н-файл
- Д. плаггер

Наиболее частой причиной острых лимфаденитов челюстно-лицевой области у детей 2-3 лет является

- А. острый пульпит
- Б. неодонтогенная инфекция
- В. острый периодонтит
- Г. острый периостит
- Д. множественный кариес

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом в постоянных зубах с несформированными корнями и исходом. Диагноз:

- А) Хронический фиброзный пульпит;**
- Б) Хронический гранулирующий периодонтит;**
- В) Хронический гангренозный пульпит. Исход:**

- 1. Апексификация;**
- 2. Апексогенез**

- А. А) А2 Б1 В2
- Б. Б) А1 Б2 В1
- В. В) А2 Б2 В1

При гингивите на рентгенограмме наблюдается:

- А. равномерная атрофия альвеол
- Б. снижение высоты межальвеолярных перегородок
- В. склеротические изменения
- Г. отсутствие изменений
- Д. ослабление рисунка костных балочек

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формами пульпита и симптомами. Формы пульпита:

А) Острый диффузный пульпит;

Б) Обострение хронического гангренозного пульпита. Симптомы:

1. Боли самопроизвольные, длительные с короткими промежутками, иррадиирующие по ходу нерва;

2. Боли постоянные, усиливающиеся при накусывании на зуб;

3. Болезненность при перкуссии;

4. Пульпа не кровоточит;

5. Зондирование пульпы резко болезненно;

6. Зондирование коронковой пульпы зуба безболезненно.

А. А) А135 Б246

Б. Б) А126 Б345

В. В) А236 Б145

Непрямой массаж сердца с использованием двух рук проводят детям старше

А. трёх лет

Б. пяти лет

В. семи лет

Г. десяти лет

Д. двенадцати лет

Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности возрастных показаний к пластике уздечки языка у детей с периода новорожденности до окончания роста и формирования лицевого отдела черепа:

А) нарушение прикуса;

Б) нарушение речи;

В) нарушение сосания и малая прибавка в весе.

А. А) БАВ

Б. Б) ВБА

В. В) АВБ

Установите соответствие последовательности действий. Оказания помощи при осложнении после удаления временного зуба - альвеолите - включает:

А) струйное промывание растворами антисептиков;

Б) нежный кюретаж лунки

В) введение в лунку антисептиков, антибактериальных и обезболивающих препаратов;

Г) физиотерапевтические процедуры;

Д) тугая тампонада лунки йодоформным тампоном

А. А) БГАВД

Б. Б) БАВДГ

В. В) ГБАВД

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеваниями в постоянных зубах с несформированными корнями и рентгенологической картиной. Заболевания в постоянных зубах с несформированными корнями:

А) Хронический гангренозный пульпит;

Б) Хронический гранулирующий периодонтит. Рентгенологическая картина:

1. Нечеткость кортикальной пластинки альвеолы в межкорневом пространстве;
2. Очаг разрежения в кости у "раструба" корня с нечеткими контурами;
3. Стадия формирования корня соответствует возрасту ребенка и такая же, как у одноименного зуба;
4. Корень короче, а канал шире, чем у одноименного зуба.

А. А) А14 Б23

Б. Б) А23 Б14

В. В) А13 Б24

Дентин при медленном течении кариеса:

А. светлый, влажный, легко удаляется экскаватором

Б. светлый, влажный, удаляется экскаватором с трудом

В. пигментированный, легко удаляется экскаватором

Г. пигментированный, удаляется экскаватором с трудом

Д. светлый, при зондировании плотный

По продолжительности действия артикаин относится к препаратам:

А. короткого действия (30-40мин. с вазоконстриктором)

Б. среднего действия (120-130мин. с вазоконстриктором)

В. длительного действия (до 180мин. с вазоконстриктором)

Г. ультракороткого действия (5-10 мин. с вазоконстриктором)

Д. сверхдлинного действия (300 мин. с вазоконстриктором)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между методами фторид профилактики и способом введения.

Пути введения:

А. Эндогенные;

Б. Экзогенные. Методы:

1. фторирование соли;
2. покрытие зубов фторлаком;
3. полоскание фторидсодержащими растворами;
4. фторирование питьевой воды;
5. применение фторидсодержащих таблеток.

А. А) А125 Б34

Б. Б) А145 Б23

В. В) А45 Б123

Предпочтительный метод лечения хронического гангренозного пульпита в несформированном однокорневом постоянном зубе:

А. девитальная ампутация

Б. девитальная экстирпация

В. высокая ампутация

Г. витальная экстирпация

Д. витальная ампутация

Предрасполагающим фактором вывиха резцов верхней челюсти у детей при острой травме является

А. множественный кариес этих зубов и его осложнения

Б. нарушение окклюзии – глубокое резцовое перекрытие

В. мелкое преддверие

Г. низкое прикрепление уздечки верхней губы

Д. короткая уздечка языка

Предпочтительный метод лечения однокорневого зуба с несформированными корнями при хроническом фиброзном пульпите:

А. девитальная ампутация

Б. девитальная экстирпация

В. витальная ампутация

Г. витальная экстирпация

Д. биологический

Возможные изменения при местной гипоплазии эмали:

- А. облитерация полости зуба
- Б. пигментированное пятно на эмали
- В. «рифленные» зубы
- Г. поражение эмали всех моляров и фронтальных зубов
- Д. «гипсовые» зубы

Глубокий кариес дифференцируют от:

- А. среднего кариеса
- Б. поверхностного кариеса
- В. хронического фиброзного пульпита
- Г. острого диффузного пульпита
- Д. несовершенного амелогенеза

Препарирование временных зубов показано при:

- А. кариесе в стадии пятна при быстroteкущем кариесе
- Б. среднем кариесе
- В. кариесе в стадии пятна при медленнотекущем кариесе
- Г. любой форме кариеса
- Д. интактном зубе

Прогрессирующий лизис тканей пародонта наблюдается при заболеваниях:

- А. сахарный диабет
- Б. болезнь Крона
- В. хронический гепатит
- Г. ревматоидный артрит
- Д. болезнь Лайма

Правила наложения щипцов при удалении временных и постоянных зубов

- А. не отличаются
- Б. отличаются
- В. отличаются при удалении на верхней челюсти; не отличаются – на нижней
- Г. отличаются при удалении на нижней челюсти; не отличаются – на верхней
- Д. в зависимости от групповой принадлежности

Кариозная полость всегда сообщается с полостью зуба при пульпите:

- А. остром очаговом
- Б. остром диффузном
- В. хроническом фиброзном
- Г. хроническом гангренозном
- Д. хроническом гипертрофическом

Для герметизации фиссур временных моляров преимущественно используют:

- А. стеклоиономерные цементы
- Б. композитные герметики
- В. компомеры
- Г. поликарбоксилатные цементы
- Д. силикатные цементы

Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного сустава чаще встречается в возрастной группе детей

- А. 1-2 года
- Б. 3 – 7 лет
- В. 5-6 лет
- Г. 8 – 11 лет
- Д. 12 – 15 лет

Тетрациклиновое окрашивание твердых тканей зубов возникает вследствие:

- А. наследственной патологии твердых тканей
- Б. нарушения водно-солевого обмена в период формирования эмали
- В. приема тетрацилина в период минерализации зубов
- Г. травматических повреждений зубов
- Д. нарушения микроэлементного состава питьевой воды

Жалобы пациента при хроническом гранулирующем периодонтите временного зуба на:

- А. боль от сладкого
- Б. боль от температурных раздражителей
- В. наличие свищевого хода в проекции верхушки корня
- Г. повышение температуры тела, озноб
- Д. «ночные» боли

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формами пульпита и жалобами на боли. Формы пульпита:

А) Острый очаговый;

Б) Острый диффузный. Жалобы на боли:

1. Самопроизвольные боли;

2. Приступообразные с длительными светлыми промежутками;

3. Приступообразные с короткими светлыми промежутками;

4. От температурных, химических и механических раздражителей;

5. Иррадиирующие по ходу ветвей тройничного нерва;

6. Локальные.

А. А) А1245 Б1235

Б. Б) А1246 Б1345

В. В) А2346 Б1245

Кариес в стадии пятна дифференцируют от:

А. поверхностного кариеса

Б. деструктивной формы флюороза

В. эрозии эмали

Г. несовершенного амелогенеза

Д. бороздчатой формы системной гипоплазии

Природа кандидоза (молочницы):

А. аллергическая

Б. вирусная

В. травматическая

Г. бактериальная

Д. грибковая

Клювовидные щипцы предназначены для удаления зубов челюсти:

А. верхней

Б. нижней

В. обеих челюстей

Г. верхней при ограниченном открывании рта

Д. нижней при ограниченном открывании рта

Симптом “щелчка” при открывании рта характерен для

- А. вторичного деформирующего остеоартроза височно-нижнечелюстного сустава
- Б. привычного вывиха суставной головки
- В. хронического артрита височно-нижнечелюстного сустава
- Г. юношеского деформирующего артроза
- Д. анкилоза ВНЧС

Глубина очага поражения при бороздчатой форме системной гипоплазии эмали зависит от:

- А. возраста, в котором ребенок перенес заболевание
- Б. срока прорезывания зуба
- В. микроэлементного состава воды
- Г. силы воздействия повреждающего фактора
- Д. длительности воздействия повреждающего фактора

При лечении зуба методом высокой ампутации на оставшуюся часть корневой пульпы воздействуют лекарственными веществами с целью:

- А. прекращения воспалительного процесса
- Б. прекращения воспалительного процесса и обеспечения дальнейшего формирования корня
- В. обеспечения дальнейшего формирования зуба
- Г. прекращения дальнейшего формирования корня
- Д. ускорения формирования корня

Эффективность лечения пульпита несформированных зубов ампутационным методом контролируют рентгенологически:

- А. на следующий день после лечения, а затем 1 раз в год
- Б. через 3 недели, а потом 1 раз в год
- В. через 3 недели, а затем не реже 1 раза в год до завершения формирования корня
- Г. через 3-6 месяцев, а затем не реже 1 раза в год до завершения формирования корня
- Д. через 12 месяцев

Возбудителем острого герпетического стоматита (ОГС) является вирус:

- А. простого герпеса
- Б. ветряной оспы
- В. Коксаки
- Г. гриппа
- Д. ВИЧ

При дифференциальной диагностике острого периодонтита и обострения хронического используют:

- А. ЭОД
- Б. окрашивание зубов раствором Шиллера-Писарева
- В. рентгенологический метод
- Г. анамнез
- Д. перкуссию зуба

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность обработки и импрегнации поверхностного кариеса во временных зубах:

- А) механическая обработка пораженной поверхности ручными инструментами;
- Б) очищение зуба от налета;
- В) изоляция от слюны;
- Г) изоляция десневого края;
- Д) высушивание;
- Е) импрегнация раствора нитрата серебра.

- А. А) АЕБВГД
- Б. Б) БВГДАЕ
- В. В) ЕБВАГД

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами анестезии и возможностью её проведения у разных групп зубов. Методы анестезии:

- А. Инфильтрационная;
- Б. Интралигаментарная. Группы зубов:
 - 1. временные центральные резцы;
 - 2. временные и постоянные клыки;
 - 3. моляры нижней челюсти;
 - 4. моляры верхней челюсти;
 - 5. премоляры.

- А. А) А12345 Б345
- Б. Б) А345 Б12345
- В. В) А1245 Б34

Наиболее частой причиной воспалительных корневых кист челюстей у детей является хронический периодонтит зубов

- А. временных резцов
- Б. временных клыков
- В. временных коренных
- Г. постоянных резцов
- Д. постоянных коренных

Рентгенологические признаки вколоченного вывиха постоянного сформированного зуба:

- А. периодонтальная щель равномерно расширена
- Б. на рентгенограмме изменений нет
- В. периодонтальная щель расширена у верхушки
- Г. периодонтальная щель «отсутствует» у верхушки корня
- Д. отсутствие периодонтальной щели в боковом отделе с одной стороны

Укажите формулу зуба, для лечения которого у пациента 16 лет достаточно проведение инфильтрационной анестезии с анестетиком на основе артикаина

- А. зуб 31
- Б. зуб 48
- В. зуб 37
- Г. зуб 46
- Д. зуб 38

Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности действий этапов проведения операции цистотомии одонтогенной воспалительной кисты нижней челюсти справа с удалением причинного зуба 8.5:

- А) удаление причинного зуба;
 - Б) удаление наружной стенки кисты;
 - В) наложение давящей повязки;
 - Г) анестезия;
 - Д) проведение трапецевидного разреза;
 - Е) сглаживание острых костных краев;
 - Ж) удаление кортикальной пластинки;
 - З) отсепаровка слизисто-надкостничного лоскута;
 - И) тампонада полости йодоформным тампоном.
- А. А) ГАДЗЖБЕИВ
 - Б. Б) ГВАДЗИЖЕБ
 - В. В) ИВГАБЕДЗЖ

Развитие тканей периодонта заканчивается после завершения роста корня зуба через:

- А. месяц
- Б. 6 – 9 месяцев,
- В. 1 – 2 года
- Г. 3-6 месяцев
- Д. 4 года

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие показаний и противопоказаний к применению методов эндогенной фторидпрофилактики. Группы:

А. Показание;

Б. Противопоказание. Условия:

1. отсутствие поступления фторидов из других источников;
2. высокая заболеваемость кариесом зубов;
3. низкая заболеваемость кариесом зубов;
4. содержание фторидов в питьевой воде выше нормы;
5. содержание фторидов в питьевой воде ниже 50% от нормы.

А. А) А125 Б34

Б. Б) А25 Б134

В. В) А15 Б234

При хроническом гранулирующем периодонтите на рентгенограмме выявляют:

А. очаг разрежения костной ткани без четких границ

Б. очаг разрежения костной ткани округлой или овальной формы с четкими границами, размером до 5 мм

В. расширение периодонтальной щели у верхушки корня зуба

Г. очаг разрежения костной ткани округлой или овальной формы с четкими границами, размером свыше 1 см в диаметре

Д. сужение периодонтальной щели у верхушки корня зуба

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между морфологическими элементами на слизистой оболочке и заболеваниями. Морфологические элементы:

А) Пустулы, толстые соломенно-желтые корки;

Б) Одиночные эрозии округлой формы, покрытые фибринозным налетом;

В) Творожистый налет на слизистой оболочке губ, языка;

Г) Эрозии неправильных очертаний. Заболевания:

1. Травматические повреждения;

2. ХРАС;

3. Кандидоз;

4. Пиодермия;

5. ОГС.

А. А) А1 Б3 В4 Г2

Б. Б) А4 Б2 В3 Г5

В. В) А2 Б4 В1 Г3

При несовершенном амелогенезе имеются нарушения в строении:

- А. только дентина
- Б. только эмали
- В. эмали и дентина
- Г. пульпы
- Д. периодонта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между состоянием корня и рентгенологической картиной.

Состояние корня:

А) Корень в стадии незакрытой верхушки

Б) Корень в стадии несформированной верхушки

В) Сформированный корень Рентгенологическая картина:

1) корень нормальной длины, с заостренной верхушкой, апикальное отверстие узкое

2) корень нормальной длины, с заостренной верхушкой, апикальное отверстие широкое

3) корень короче нормальной длины, корневого канал узкий

4) корень короче нормальной длины, корневого канал широкий, расширяющийся у верхушки корня

А. А) А1 Б2 В3

Б. Б) А2 Б4 В1

В. В) А3 Б1 В2

Вторичным элементом поражения при остром герпетическом стоматите (ОГС) является:

- А. папула
- Б. пузырек
- В. пятно
- Г. эрозия
- Д. узелок

Укажите препарат, используемый для аппликационной анестезии у детей:

- А. мепивакаин
- Б. лидокаин.
- В. артикаин
- Г. бупивакаин
- Д. прокаин (новокаин)

При кандидозе необходимо ограничить в пищевом рационе употребление:

- А. белков
- Б. жиров
- В. минеральных солей
- Г. углеводов
- Д. воды

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность лечения глубокого кариеса постоянных зубов:

- А) полирование;
- Б) препарирование кариозной полости;
- В) обезболивание;
- Г) наложение лечебной прокладки;
- Д) антисептическая обработка;
- Е) пломбирование;
- Ж) нанесение защитного лака.

- А. А) ВБДГЕАЖ
- Б. Б) ВЖАБДГЕ
- В. В) АВЕБДГЖ

Центральные резцы верхней челюсти при вколоченном вывихе у ребенка трех лет рекомендуется

- А. оставить под наблюдением
- Б. репонировать
- В. удалить
- Г. выдвинуть в зубной ряд ортодонтическими методами
- Д. репонировать и шинировать

Проведение контрастной рентгенографии при хроническом неспецифическом паренхиматозном паротите показано

- А. в период обострения
- Б. в период ремиссии
- В. в период активного роста ребенка
- Г. в летний период
- Д. не показано

Клинические признаки при ушибе постоянного или временного зуба в первые 2-3 дня после травмы:

- А. зуб короче симметричного, погружен в лунку
- Б. дефект эмали и дентина
- В. смещение коронки в различном направлении
- Г. подвижность зуба незначительная или отсутствует, болезненная перкуссия
- Д. подвижность 2-3 степени

Для острого эпидемического паротита симметричное поражение обеих желез

- А. характерно всегда
- Б. не характерно
- В. характерно только для детей с патологией органов дыхания
- Г. характерно только для детей с патологией ЛОР-органов
- Д. характерно только для детей с патологией ЖКТ

Кровоточивость из корневого канала при лечении хронического гранулирующего периодонтита несформированного зуба объясняется:

- А. обострением воспалительного процесса
- Б. вращением грануляционной ткани в корневой канал
- В. травмой пульпы инструментом, имеющим агрессивную верхушку
- Г. нерациональным применением медикаментов
- Д. физиотерапевтическим воздействием

Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного сустава свойственны детям телосложения

- А. нормостенического
- Б. гиперстенического
- В. астенического
- Г. нет зависимости от телосложения
- Д. нормостенического и гиперстенического

«Дентинный мост» - это:

- А. равномерное отложение дентина на стенках корня
- Б. образование слоя дентина в области раневой поверхности культи пульпы
- В. отложение дентина в центральных участках корневой пульпы
- Г. отложение дентина в межкорневом пространстве
- Д. отложение дентина у апикального отверстия

Тактика врача по оказанию неотложной помощи при остром периодонтите постоянного зуба:

- А. препарирование кариозной полости и расширение устьевой части корневого канала,
- Б. проведение резорцин-формалинового метода
- В. раскрытие полости зуба, удаление распада из канала, промывание канала растворами антисептиков, раскрытие верхушки корня
- Г. механическая и медикаментозная обработка канала с последующим пломбированием в это же посещение
- Д. удаление зуба

Наиболее частым источником инфекции при остром периостите челюстных костей в детском возрасте являются

- А. зубы 16 55 54 64 65 26
- Б. зубы 36 75 74 84 85 46
- В. ОРВИ и детские инфекционные заболевания
- Г. заболевания ЛОР-органов (риниты, гаймориты и др.)
- Д. заболевания ВНЧС

Установите соответствие последовательности действий. Укажите последовательность периодов течения ОГС:

- А) катаральный;
- Б) высыпаний;
- В) продромальный;
- Г) угасания.

- А. А) БВАГ
- Б. Б) ГВАБ
- В. В) ВАБГ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и нарушением в строении тканей зуба.

Диагноз:

- А) Несовершенный амелогенез;
- Б) Несовершенный дентиногенез;
- В) Несовершенный одонтогенез. Нарушение строения тканей зуба:

- 1. нарушение в строении пульпы;
- 2. нарушение в строении только дентина;
- 3. нарушение в строении только эмали;
- 4. нарушение в строении эмали и дентина.

- А. А) А3 Б2 В4
- Б. Б) А2 Б1 В3
- В. В) А4 Б3 В1

Установите соответствие последовательности действий. Установите порядок действий по оказанию неотложной помощи ребенку 7 лет при коллапсе:

- А) очистить полость рта от инородных тел;**
- Б) введение медикаментозных средств;**
- В) прекращение операции;**
- Г) освободить грудь, шею, живот от стесняющей одежды;**
- Д) придать ребенку горизонтальное положение;**
- Е) вызвать неотложную медицинскую помощь для госпитализации ребенка.**

А. А) ВГДАБЕ

Б. Б) ДЕГВБА

В. В) ЕАВГБД

ЭОД при хронических формах пульпита в постоянных зубах со сформированными корнями:

А. 2-6 мкА

Б. 8-10 мкА

В. 10-20 мкА

Г. 20-60 мкА

Д. свыше 150 мкА

Абсолютным показанием к удалению причинного временного зуба является

А. обострение хронического пульпита

Б. хронический остеомиелит

В. хронический пульпит

Г. кариес дентина

Д. кариес эмали

Гибридный стеклоиономерный цемент применяют у детей:

А. для пломбирования кариозных полостей временных и несформированных постоянных зубов

Б. для пломбирования кариозных полостей только временных зубов

В. для пломбирования кариозных полостей только постоянных зубов

Г. в качестве лечебной и изолирующей прокладки

Д. в качестве девитализирующего препарата

Дентин при активном течении кариеса:

А. светлый, влажный, легко удаляется экскаватором

Б. светлый, влажный, удаляется экскаватором с трудом

В. пигментированный, легко удаляется экскаватором

Г. пигментированный, удаляется экскаватором с трудом

Д. светлый, при зондировании плотный

Ростковую зону формирующегося корня рентгенологически следует дифференцировать от:

- А. острого периодонтита
- Б. обострения хронического гранулирующего периодонтита
- В. хронического гранулематозного периодонтита
- Г. хронического фиброзного периодонтита
- Д. остеосклероза

К проводниковому методу обезболивания на верхней челюсти у детей относится анестезия:

- А. торусальная
- Б. мандибулярная
- В. туберальная
- Г. у ментального отверстия
- Д. по Берше-Дубову

Укажите формулу зуба, для лечения которого у пациента 15 лет необходимо провести проводниковую анестезию с анестетиком на основе артикаина

- А. зуб 36
- Б. зуб 14
- В. зуб 25
- Г. зуб 42
- Д. зуб 33

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методом фторидпрофилактики кариеса и возрастом, с которого рекомендуется использовать данный метод. Метод фторидпрофилактики кариеса:

- А. Чистка зубов фторидсодержащими зубными пастами;
- Б. Полоскание фторидсодержащими растворами;
- В. Покрытие зубов фторидсодержащим лаком;
- Г. Прием фторидсодержащих таблеток. Возраст с которого рекомендуется использовать метод:

- 1. 2 года;
- 2. 3 года;
- 3. 6 лет;
- 4. 10 лет;
- 5. 12 лет.

- А. А) А1 Б3 В3 Г1
- Б. Б) А1 Б3 В2 Г5
- В. В) А5 Б3 В2 Г1

Возбудителем герпангины является вирус:

- А. простого герпеса
- Б. ветряной оспы
- В. Коксаки
- Г. гриппа
- Д. ВИЧ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность обследования пациента при заболеваниях пародонта:

- А) установление предварительного диагноза;
- Б) выяснение жалоб и анамнеза заболевания;
- В) установление окончательного диагноза;
- Г) составление плана лечения;
- Д) внешний осмотр и осмотр полости рта;
- Е) специальные методы исследования.

- А. А) ГБЕДАВ
- Б. Б) АБЕДВГ
- В. В) БДАЕВГ

При лечении ушиба однокорневого постоянного зуба необходимо:

- А. шинирование пластмассовой шиной-каппой на 2-4 недели
- Б. шинирование проволочно-композитной шиной на 2-4 недели
- В. удаление травмированного зуба
- Г. разобщение прикуса в переднем отделе с помощью ортодонтических аппаратов
- Д. щадящая диета, выведение зуба из прикуса, динамическое наблюдение

Флюороз развивается вследствие:

- А. недостаточного содержания фторидов в питьевой воде
- Б. воздействия наследственных факторов
- В. избыточного содержания фторидов в питьевой воде
- Г. заболеваний ребенка на первом году жизни
- Д. применения фторидсодержащих зубных паст

Установите правильную последовательность лечения кариеса в стадии пятна:

- А) высушивание;
- Б) очищение зуба от налета;
- В) антисептическая обработка;
- Г) изоляция от слюны; Д) аппликации реминерализирующих растворов.

- А. А) БГДВА
- Б. Б) ДАБГВ
- В. В) БГВАД

Форма пульпита, преобладающая во временных зубах у детей:

- А. острый очаговый
- Б. острый диффузный
- В. хронический фиброзный
- Г. хронический гангренозный
- Д. хронический гипертрофический

Причины несовершенного дентиногенеза:

- А. болезни матери в I половине беременности
- Б. болезни матери в II половине беременности
- В. болезни ребенка в первые годы жизни
- Г. травматические повреждения зубов
- Д. генетические факторы

Стеклоиономерный цемент образует прочные связи с:

- А. эмалью зуба
- Б. дентином
- В. эмалью зуба, после кислотного протравливания
- Г. любым реставрационным материалом
- Д. всеми твердыми тканями зуба

Для хронического паренхиматозного паротита симметричное поражение обеих слюнных желез является признаком

- А. характерным
- Б. нехарактерным
- В. характерным только для детей с патологией органов дыхания
- Г. характерным только для детей с патологией ЛОР-органов
- Д. характерным только для детей с патологией ЖКТ

Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности основных этапов лечения нагноившейся околокорневой воспалительной кисты нижней челюсти справа у ребенка 8 лет:

- А) антибактериальная терапия;
 - Б) вскрытие гнойного очага;
 - В) удаление причинного зуба;
 - Г) цистотомия после стихания явлений воспаления;
 - Д) гипосенсибилизирующая и противовоспалительная терапия;
 - Е) анестезия.
- А. А) ГЕВДАБ
 - Б. Б) ЕГВДАБ
 - В. В) ЕВБАДГ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность лечения среднего кариеса временных зубов:

- А) нанесение защитного лака;**
- Б) обезболивание;**
- В) препарирование кариозной полости;**
- Г) нанесение кондиционера;**
- Д) антисептическая обработка;**
- Е) полирование;**
- Ж) пломбирование СИЦ**

А. А) БВДГЖЕА

Б. Б) БЕВАДГЖ

В. В) АБВЕДГЖ

Неотложная помощь ребенку с острым гематогенным остеомиелитом заключается в

- А. антибактериальной терапии
- Б. срочной госпитализации и хирургической помощью в полном объеме
- В. десенсибилизирующей терапии
- Г. озонотерапии
- Д. электрофорезе с ионами Са в зоне поражения

Расширение периодонтальной щели у верхушки корня на рентгенограмме характерно для периодонтита:

- А. острого
- Б. хронического фиброзного
- В. хронического гранулирующего
- Г. хронического гранулематозного
- Д. для всех форм

Кюретаж лунки при удалении временного зуба

- А. не проводится
- Б. проводится
- В. проводится при наличии воспаления в периапикальных тканях
- Г. проводится при условии наличия у ребенка сопутствующей патологии ЛОР-органов
- Д. проводится после удаления зуба в связи с его вколоченными вывихом

Продолжительность воздействия препаратов сульфата железа при витальной пульпотомии:

- А. 5 минут
- Б. 30 минут
- В. 2-3 суток
- Г. 5-7 суток
- Д. До 2-х недель

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между жалобами на боли и формами хронического пульпита.

Жалобы на боли:

А) От воздействия температурных раздражителей;

Б) Самопроизвольные боли;

В) При накусывании на зуб;

Г) Жалобы на кровоточивость. Формы хронического пульпита:

1. Фиброзный;

2. Гангренозный;

3. Гипертрофический;

4. В стадии обострения.

А. А)А1 Б4 В2 Г3

Б. Б) А2 Б3 В1 Г4

В. В) А3 Б1 В4 Г 2

Афты Беднара встречаются у:

А. детей первых месяцев жизни

Б. детей 2-3 лет

В. старших дошкольников

Г. детей школьного возраста

Д. подростков

Клиническая характеристика эмали при тетрациклиновых зубах:

А. окрашивание коронок зубов в желтый цвет

Б. изменения цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки зуба

В. симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации

Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации

Д. стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба

Рентгенологические критерии эффективности лечения пульпита в несформированных зубах методом витальной пульпотомии:

А. апексогенез

Б. апексификация

В. остеомалация

Г. остеосклероз

Д. остеопороз

Низкая резистентность твердых тканей зуба связана с:

- А. избыточным накоплением ионов кальция
- Б. недостаточной минерализацией
- В. недостаточной функциональной нагрузкой
- Г. отсутствием зубов антагонистов
- Д. избыточным накоплением фторид ионов

Установите соответствие последовательности действий. Этапы оказания неотложной помощи ребенку при терминальных состояниях в стоматологическом кресле:

- А) искусственное дыхание;
- Б) наружный массаж сердца;
- В) придание ребенку горизонтального положения;
- Г) очистить полость рта от рвотных масс;
- Д) растирание спиртовым раствором.

- А. А) ВГБАД
- Б. Б) ДВГБА
- В. В) БДВГА

Возможные изменения при местной гипоплазии эмали:

- А. облитерация полости зуба
- Б. пятно белого или коричневого цвета вблизи режущего края или бугра зуба
- В. продольные бороздки
- Г. поражение эмали всех моляров, резцов и клыков
- Д. меловидное пятно в пришеечной области

К идиопатическим заболеваниям пародонта с прогрессирующим лизисом относятся:

- А. синдром Папийона-Лефевра
- Б. язвенно-некротический гингивостоматит Венсана
- В. синдром Пьера-Робена
- Г. гипертрофический гингивит
- Д. синдром Стентона-Капдепона

Для хронического рецидивирующего афтозного стоматита (ХРАС) характерны:

- А. множественные пузырьковые высыпания, в том числе на красной кайме губ
- Б. острый катаральный гингивит
- В. эрозии округлой или овальной формы на гиперемизованном фоне
- Г. пузыри на разных участках слизистой оболочки полости рта
- Д. эрозии разных размеров с фестончатыми краями

Каналы временных однокорневых сформированных зубов при лечении пульпита пломбируют:

- А. резорцин-формалиновой пастой
- Б. пастой из окиси цинка на масляной основе
- В. фосфат-цементом
- Г. гуттаперчевыми штифтами
- Д. серебряными штифтами

Системная гипоплазия эмали постоянных зубов у детей развивается вследствие:

- А. заболеваний матери во время беременности
- Б. травматических повреждений временных зубов
- В. нарушения состава микроэлементов в воде
- Г. болезней ребенка после рождения
- Д. множественного осложненного кариеса временных зубов

Рентгенологические признаки вколоченного вывиха постоянного зуба:

- А. изменений на рентгенограмме нет
- Б. периодонтальная щель сужена, прерывиста или отсутствует
- В. расширение периодонтальной щели у верхушки корня
- Г. равномерное расширение периодонтальной щели.
- Д. отсутствие зуба в лунке

Препарат, растворяющий некротические участки тканей в канале зуба:

- А. перекись водорода,
- Б. йодиол
- В. гипохлорит натрия
- Г. марганцево-кислый калий
- Д. хлорамин

Наибольшим кариеспрофилактическим действием обладают пасты:

- А. гигиенические
- Б. противовоспалительные
- В. фторидсодержащие
- Г. отбеливающие
- Д. десенсиитайзеры

Интенсивность поражения кариесом в период временного прикуса определяется индексом:

- А. СРТИН
- Б. КПУ
- В. ГИ
- Г. ПМА
- Д. кп

Для кариозного процесса у детей до 3 лет характерно:

- А. циркулярный и плоскостной кариес
- Б. локализация полостей на контактных поверхностях
- В. поражение бугров моляров
- Г. медленное течение процесса
- Д. тенденция к стабилизации

Орхит как осложнение наблюдается у мальчиков, страдающих

- А. хроническим паренхиматозным паротитом
- Б. острым эпидемическим паротитом
- В. калькулёзным сиалоаденитом
- Г. новорожденных
- Д. гангренозного

При хроническом гипертрофическом пульпите характерны жалобы на боли:

- А. самопроизвольные
- Б. постоянные
- В. при попадании пищи в кариозную полость
- Г. иррадиирующие
- Д. от температурных раздражителей

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методом анестезии и показаниями к их применению. Методы анестезии:

А. Интралигаментарная;

Б. Инфильтрационная. Показания к проведению анестезии:

1. лечение кариеса;

2. лечение пульпита;

3. удаление зубов по поводу хронического апикального периодонтита (вне обострения);

4. депульпирование интактных зубов;

5. лечение пародонтита;

6. лечение острого апикального периодонтита.

А. А) А124 Б2345

Б. Б) А12346 Б1235

В. В) А1234 Б123456

Хронический периодонтит временного зуба может быть причиной развития:

А. системной гипоплазии эмали

Б. местной гипоплазии эмали

В. несовершенного амелогенеза

Г. несовершенного дентиногенеза

Д. несовершенного одонтогенеза

Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности действий этапов удаления постоянного зуба:

А) кюретаж;

Б) отсепаровка круговой связки зуба;

В) продвижение щечек щипцов;

Г) фиксация щечек щипцов;

Д) наложение щечек щипцов;

Е) вывихивание (вращение) зуба;

Ж) сближение краев лунки;

З) извлечение зуба из лунки.

А. А) ЖБДАВГЕЗ

Б. Б) БДВГЕЗАЖ

В. В) ДВЖГБЕЗА

Редкий, слабого наполнения пульс характерен для:

А. сердечно-сосудистого коллапса

Б. обморока

В. анафилактического шока

Г. болевого шока

Д. эпилептического припадка

Рентгенологически при хронических формах пульпита в межкорневом пространстве у временных моляров выявляется:

- А. значительное расширение периодонтальной щели
- Б. ослабление рисунка костных балочек
- В. остеосклероз
- Г. гиперцементоз
- Д. изменения отсутствуют

При остром гнойном периостите причинный временный однокорневой зуб

- А. всегда удаляется
- Б. трепанируется и пломбируется
- В. пломбируется и производится резекция верхушки корня
- Г. удаляется по показаниям
- Д. трепанируется и шинируется

Содержимое ненагноившейся корневой кисты представлено

- А. желтоватая прозрачная жидкость, опалесцирующая на свету
- Б. мутная жидкость
- В. кровянистое содержимое
- Г. творожистое содержимое белого цвета
- Д. желтоватое салоподобное содержимое

Период физиологического покоя временного зуба длится от:

- А. прорезывания временного зуба до его смены на постоянный
- Б. конца формирования корня до начала его резорбции
- В. момента прорезывания зуба до появления кариозной полости
- Г. конца формирования корня до появления кариозной полости
- Д. 9 месяцев

Очаг деструкции костной ткани у верхушки корня сформированного постоянного зуба с нечеткими границами выявляется при:

- А. кистогранулем
- Б. хроническом фиброзном периодонтите
- В. хроническом гранулирующем периодонтите
- Г. хроническом гранулематозном периодонтите
- Д. радикулярной кисте

Кариозные пятна чаще выявляются на поверхности зубов:

- А. вестибулярной
- Б. контактной
- В. жевательной
- Г. на режущем крае
- Д. небной/язычной

Наиболее достоверным признаком консолидации фрагментов нижней челюсти является

- А. исчезновение боли
- Б. образование костной мозоли
- В. уменьшение подвижности фрагментов
- Г. отсутствие крепитации
- Д. исчезновение отека окружающих мягких тканей

При переломе вблизи верхушки или средней части корня постоянного несформированного и сформированного зуба требуется выполнить:

- А. высокую витальную ампутацию
- Б. пломбирование канала пастой
- В. пломбирование канала цементом
- Г. удаление зуба до линии отлома
- Д. шинирование

Рентгенологические признаки ушиба временного или постоянного зуба в первые 2-3 дня после травмы:

- А. периодонтальная щель равномерно расширена
- Б. периодонтальная щель расширена на одной стороне
- В. периодонтальная щель расширена у верхушки зуба
- Г. на рентгенограмме изменений нет
- Д. периодонтальная щель "отсутствует" у верхушки зуба.

Болезненное зондирование в глубине полости зуба характерно для пульпита:

- А. острого очагового
- Б. острого диффузного
- В. хронического фиброзного
- Г. хронического гангренозного
- Д. хронического гипертрофического

Деструктивная форма флюороза развивается при содержании фторидов в питьевой воде:

- А. 0,5 мг/л
- Б. 1 мг/л
- В. 2-3 мг/л
- Г. 4-6 мг/л
- Д. 7-9 мг/л и выше

Жалобы при ушибах временных и постоянных зубов в первые 2-3 дня после травмы:

- А. ноющие боли при накусывании
- Б. жалоб нет
- В. интенсивные приступообразные ночные боли
- Г. боли от холодного и горячего
- Д. подвижность 2-3 степени

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами местного обезболивания и временем наступления анестезии. Методы анестезии:

- А. Инфильтрационная;
 - Б. Интралигаментарная;
 - В. Мандибулярная. Время наступления анестезии (латентный период):
 - 1) 15-45 с;
 - 2) 1-2 мин.;
 - 3) 10-15 мин.;
 - 4) 30 мин.
- А. А) А3 Б4 В2
 - Б. Б) А2 Б1 В3
 - В. В) А2 Б3 В4

Для дезинфекции корневых каналов применяют:

- А. 0,02% раствор перманганата калия,
- Б. 70%спиртовой раствор
- В. дистиллированную воду
- Г. 3 %гипохлорит натрия
- Д. раствор бриллиантового зеленого

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между этиологией и заболеваниями. Этиология:

А) Грибковая;
Б) Бактериальная;
В) Вирусная;
Г) Инфекционно-аллергическая. Заболевания:

1. ОГС;
2. Пиодермия;
3. ХРАС;
4. Герпангина;
5. Кандидоз;
6. МЭЭ

А. А) А35 Б2 В4 Г16

Б. Б) А1 Б2 В36 Г45

В. В) А5 Б2 В14 Г36

При воспалительных корневых кистах от временных зубов на нижней челюсти преимущественно проводится операция

- А. цистэктомия
- Б. цистотомия
- В. цистэктомия с резекцией верхушек корней причинного зуба
- Г. удаление зуба
- Д. цистаденэктомия

При лёгкой степени пародонтита на рентгенограмме выявляются следующие изменения:

- А. резорбция костной ткани альвеолярного отростка на 1/2 корня
- Б. резорбция компактных пластинок и вершин межзубных перегородок
- В. сохранность кортикальной пластинки лунок зубов
- Г. наличие очагов остеопороза альвеолярной кости
- Д. нет изменений в костной ткани альвеолярного отростка

Форма пульпита, преобладающая в постоянных зубах у детей:

- А. острый диффузный пульпит
- Б. хронический фиброзный
- В. хронический гангренозный
- Г. хронический гипертрофический
- Д. хронический в стадии обострения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между средствами профессиональной гигиены и очищаемой поверхностью зуба. Средства:

- А. Резиновые колпачки и полировочная паста;
- Б. Вращающиеся щетки и полировочная паста;
- В. Зубная нить. Поверхности зуба:
- 1. жевательные;
- 2. оральные;
- 3. вестибулярные;
- 4. контактные.

- А. А) А3 Б1 В24
- Б. Б) А13 Б2 В4
- В. В) А23 Б1 В4

Противопоказанием к проведению операции пластики уздечки языка ребенку 5 лет в поликлинике под наркозом является:

- А. заболевание ЦНС
- Б. острая респираторно-вирусная инфекция
- В. хронический гепатит
- Г. сахарный диабет
- Д. рахит

Шипиками заканчиваются обе щёчки щипцов, предназначенных для удаления зубов челюсти

- А. верхней
- Б. нижней
- В. обеих челюстей
- Г. верхней при ограниченном открывании рта
- Д. нижней при ограниченном открывании рта

При рождении ребенка с центральными нижними резцами эти зубы необходимо

- А. сохранить
- Б. удалить
- В. необходимо изготовить защитную пластинку на нижнюю челюсть
- Г. перевести на искусственное вскармливание
- Д. необходимо сошлифовать режущие края резцов

Укажите правильную последовательность этапов при пломбировании композитами:

- А) внесение пломбировочного материала;
- Б) нанесение бондинга;
- В) протравливание эмали;
- Г) наложение прокладки;
- Д) полирование пломбы.

- А. А) ГВБАД
- Б. Б) АГВБД
- В. В) ДГВБА

Хронический гипертрофический пульпит является следствием пульпита:

- А. острого очагового
- Б. острого диффузного
- В. хронического фиброзного.
- Г. хронического гангренозного
- Д. хронического гангренозного в стадии обострения

Пульс у пациента без сознания определяют над проекцией

- А. лучевой артерии
- Б. плечевой
- В. наружной сонной
- Г. локтевой
- Д. общей сонной

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие в применении местных анестетиков при инъекционных и аппликационном способе обезболивания. Способы обезболивания:

- А. инфильтрационная, проводниковая анестезия;
- Б. аппликационная анестезия. Анестетики:
- 1. Тетракаин/дикаин;
- 2. Лидокаин;
- 3. Артикаин;
- 4. Мепивакаин;
- 5. Бензокаин/анестезин.

- А. А) А234 Б125
- Б. Б) А135 Б245
- В. В) А345 Б123

У детей среднего и старшего возраста преобладает остеомиелит этиологии

- А. посттравматической
- Б. одонтогенной
- В. гематогенной
- Г. тонзилогенной
- Д. отогенный

Фолликулы третьего постоянного моляра на рентгенограмме определяются в возрасте:

- А. при рождении ребёнка
- Б. 2,5 – 3-х лет
- В. 4 - 5 лет
- Г. 5 -6 лет
- Д. 7 -8 лет

При лечении периодонтита временного однокорневого зуба со сформированным корнем канал пломбируют:

- А. стеклоиономерным цементом
- Б. фосфат-цементом
- В. резорцин-формалиновой пастой
- Г. пастой на масляной основе содержащей гидроксид кальция
- Д. гуттаперчевыми штифтами

Для контроля качества чистоты канала используют:

- А. фурацилин
- Б. йодоформ
- В. перекись водорода
- Г. раствор ферментов
- Д. хлорофиллипт

Для удаления временных зубов специальные наборы щипцов

- А. не существуют
- Б. существуют
- В. в стадии разработки
- Г. существуют только для верхней челюсти
- Д. существуют только для верхней челюсти

Образование дентина происходит за счет деятельности клеток:

- А. амелобластов
- Б. цементобластов
- В. остеобластов
- Г. ретикулоцитов
- Д. одонтобластов

Зубы Гетчинсона, Пфлюгера, Фурнье являются разновидностью:

- А. системной гипоплазии эмали
- Б. эндемического флюороза
- В. патологического стирания эмали
- Г. несовершенного одонтогенеза
- Д. несовершенного амелогенеза

Корень в стадии несформированной верхушки на рентгенограмме проецируется:

- А. нормальной длины, с заострённой верхушкой, апикальное отверстие узкое
- Б. нормальной длины, с заострённой верхушкой, апикальное отверстие широкое
- В. нормальной длины, корневой канал в области верхушки в виде раструба
- Г. короче нормальной длины, корневой канал широкий, расширяющийся у верхушки корня
- Д. короче нормальной длины, апикальное отверстие облитерировано

«Заместительный» дентин откладывается

- А. по эмалево-дентинному соединению
- Б. у апикального отверстия
- В. в полости зуба, уменьшая её объём
- Г. в слое околопульпарного дентина
- Д. в кариозной полости

Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности действий лечения ребенка с диагнозом: Острый гнойный периостит верхней челюсти справа. Обострение хронического периодонтита зуба

5.4:

- А) гипосенсибилизирующая терапия;**
- Б) симптоматическая терапия;**
- В) удаление зуба**

5.4;

- Г) антибактериальная терапия;**
- Д) вскрытие и дренирование гнойного очага;**
- Е) физиотерапевтические процедуры.**

- А. А) ВБДЕГА
- Б. Б) ЕБВДГА
- В. В) ВДГАБЕ

После прорезывания зуба возникает:

- А. гипоплазия эмали
- Б. флюороз
- В. перелом коронки в результате травмы
- Г. несовершенный амелогенез
- Д. тетрациклиновое окрашивание

Калькулёзный сиалоаденит у детей преимущественно развивается в слюнных железах

- А. околоушных
- Б. поднижнечелюстных
- В. малых слюнных губы
- Г. подъязычных
- Д. малых слюнных щек

При несовершенном одонтогенезе (дисплазии Капдепона) поражены:

- А. только временные зубы
- Б. временные и постоянные моляры
- В. временные и постоянные резцы
- Г. все временные и постоянные зубы
- Д. только постоянные зубы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и частотой обработки полости рта.

Заболевания:

- А) ОГС;
- Б) Кандидоз;
- В) Пиодермия;
- Г) ХРАС;
- Д) МЭЭ. Частота обработки полости рта:

- 1. Каждый час;
- 2. Перед едой;
- 3. После каждого приема пищи;
- 4. Только перед сном.

- А. А) А1 Б2 В3 Г3 Д3
- Б. Б) А2 Б1 В3 Г2 Д1
- В. В) А3 Б2 В1 Г3 Д1

В сменном прикусе при лечении вывихов зубов рекомендуется использовать шину

- А. проволочно-композитную
- Б. пластмассовую назубную
- В. пластмассовую зубонаддесневую
- Г. ленточную шину
- Д. ленточную шину Васильева

Возбудителем острого герпетического стоматита (ОГС) является:

- А. актиномицеты
- Б. палочка Леффлера
- В. дрожжеподобные грибы
- Г. вирус простого герпеса
- Д. фузоспирохеты Венсана

Клинические проявления инфекционного острого периодонтита:

- А. боль при накусывании на зуб, отек мягких тканей лица
- Б. иррадирующие приступообразные боли
- В. свищ на десне с гнойным отделяемым
- Г. ЭОД до 20мкА
- Д. боли от температурных раздражителей

Причиной пульпита в постоянных резцах с несформированными корнями чаще является:

- А. перелом части коронки зуба
- Б. нарушение техники препарирования кариозной полости
- В. инфицирование из кариозной полости
- Г. наследственная предрасположенность
- Д. ретроградное инфицирование пульпы

Наиболее информативным методом диагностики переломов челюстей является

- А. реография
- Б. электромиография
- В. ортопантомография
- Г. компьютерная томография
- Д. аксиография

Для лечения начальных форм кариеса постоянных зубов у детей применяется:

- А. 30 % раствор нитрата серебра
- Б. препараты, содержащие кальций и фосфаты
- В. р-р Шиллера-Писарева
- Г. капрофер
- Д. 3 % гипохлорит натрия

Растворы местных анестетиков, содержащие адреналин, не рекомендуется применять при проведении анестезии детям до:

- А. трех лет
- Б. пяти лет
- В. шести лет
- Г. семи лет
- Д. десяти лет

Диагностическим признаком неполного вывиха зуба является

- А. Ночные самопроизвольные боли
- Б. Подвижность зуба
- В. Болезненность при пальпации по переходной складке в проекции верхушки корня
- Г. Отечность мягких тканей лица

Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем

- А. Соблюдения правил техники безопасности при осуществлении медицинской деятельности
- Б. Соблюдения норм трудовой дисциплины
- В. Рационального использования лекарственных средств у льготных категорий граждан
- Г. Соблюдения этических и моральных норм, уважительного и гуманного отношения к пациенту

Силанты - материалы для

- А. Герметизации фиссур
- Б. Пломбирования корневых каналов
- В. Изолирующих прокладок
- Г. Пломбирования кариозных полостей

Изменения костной ткани межзубных перегородок на рентгенограммах выявляются при

- А. Гипертрофическом гингивите
- Б. Атрофическом гингивите
- В. Катаральном гингивите
- Г. Хроническом пародонтите

Дифференциальная диагностика фолликулярной кисты проводится с

- А. Одонтомой
- Б. Радикулярной кистой
- В. Цементомой
- Г. Репаративной гранулемой

Показанием к применению системных методов фторидпрофилактики кариеса является содержание фторидов в питьевой воде

- А. Больше оптимального
- Б. Оптимальное
- В. Менее половины оптимального
- Г. Субоптимальное

Мимические мышцы иннервируются нервом

- А. Лицевым
- Б. Тройничным
- В. Тройничным и лицевым
- Г. Ушно-височным и тройничным

Формирование корня центральных молочных резцов завершается в возрасте

- А. 12-15 Месяцев
- Б. 10-12 Месяцев
- В. После 3 лет
- Г. 18-24 Месяцев

Каждый зуб верхней челюсти антагонизирует с одноименным зубом

- А. Верхней челюсти
- Б. Нижней челюсти и впереди стоящим зубом
- В. Нижней челюсти
- Г. Нижней челюсти и позади стоящим зубом

Высокое прикрепление уздечки нижней губы чаще приводит к

- А. Уплотнению центрального отдела нижней челюсти
- Б. Веерообразному расхождению зубов
- В. Локальному пародонтиту
- Г. Нарушению соотношения челюстей

Высота суставного бугорка

- А. Зависит только от возраста
- Б. Не зависит от возраста
- В. Зависит только от окклюзии
- Г. Зависит от возраста и вида окклюзии

Амелобластому следует дифференцировать с

- А. Пародонтитом
- Б. Цементомой
- В. Твердой одонтомой
- Г. Радикулярной кистой

Формирование корней постоянных клыков заканчивается в возрасте ребенка (в годах)

- А. 12-14
- Б. 13-15
- В. 10-12
- Г. 9-10

Образование и минерализация вершин и компактных пластинок межзубных перегородок жевательной группы зубов заканчивается к ____ годам

- А. 8-9
- Б. 14-15
- В. 6-7
- Г. 10-11

Наиболее частая локализация поражения лицевого черепа при гематогенном остеомиелите у детей

- А. Тело нижней челюсти
- Б. Скуловой и лобный отростки верхней челюсти, мыщелковый отросток нижней челюсти
- В. Носовые кости, решетчатый лабиринт
- Г. Альвеолярный отросток верхней и альвеолярная часть нижней челюстей

Временные центральные резцы нижней челюсти прорезываются в возрасте

- А. 6-8 Месяцев
- Б. 20-30 Месяцев
- В. 12-16 Месяцев
- Г. 5-6 Лет

Осуществление стоматологического просвещения является основной обязанностью

- А. Родителей
- Б. Гигиенистов стоматологических
- В. Педагогов
- Г. Медицинских сестер

При шинировании и фиксации при переломе левого мыщелкового отростка у ребёнка 7 лет применяют

- А. Пластмассовую зубонаддесневую шину на нижнюю челюсть с пелотом справа
- Б. Проволочные шины с зацепными петлями на обе челюсти с межчелюстной тягой
- В. Гладкую шину-скобу
- Г. Пластмассовую зубонаддесневую шину на нижнюю челюсть с пелотом слева

Индекс федорова-володкиной у детей используют для оценки

- А. Гигиены полости рта
- Б. Некариозных поражений зубов
- В. Начальных кариозных поражений
- Г. Кровоточивости десневой борозды

Клювовидные щипцы, щёчки которых заканчиваются шипиками, предназначены для удаления зубов

- А. Премоляров
- Б. Резцов
- В. Моляров
- Г. Клыков

Для выявления всех зачатков постоянных зубов у детей необходимо провести

- А. Телерентгенограмму головы в прямой проекции
- Б. Ортопантомограмму
- В. Панорамный снимок
- Г. Прицельный снимок

Разрабатывать и утверждать клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи могут только

- А. Министерство здравоохранения РФ и Министерство юстиции РФ
- Б. Медицинские профессиональные некоммерческие организации
- В. Органы местного самоуправления
- Г. Органы исполнительной власти субъектов РФ

При проведении системной антибактериальной терапии при лечении агрессивного пародонтита обязательным является назначение

- А. Кортикостероидов
- Б. Пробиотиков
- В. Витаминов
- Г. Адаптогенов

Метод витального окрашивания эмали используют для дифференциальной диагностики

- А. Флюороза и эрозии зубов
- Б. Эрозии зубов и клиновидного дефекта
- В. Начального кариеса и кариеса дентина
- Г. Начального кариеса и флюороза зубов

На рентгенограмме при несовершенном дентиногенезе выявляются

- А. Корневые каналы и полости зубов облитерируются
- Б. Просвет корневых каналов зубов широкий
- В. Расширение периодонтальной щели у верхушки корня
- Г. Корни зубов нормальной длины

Родители должны начинать чистить детям зубы

- А. После прорезывания первого временного зуба
- Б. С 2 лет
- В. С 3 лет
- Г. С 1 года

Термин аутотрансплантация обозначает трансплантацию

- А. Небиологического субстрата
- Б. Между организмами, идентичными в генетическом отношении
- В. Между организмами одного вида
- Г. В пределах одного организма

При средней степени гипертрофического гингивита десна закрывает _____ зуба

- А. 1/2
- Б. 3/4
- В. 1/3
- Г. 2/3

При переломе коронки с обнажением пульпы постоянного сформированного зуба в первые 6 часов необходимо провести

- А. Экстирпацию пульпы
- Б. Биологический метод с одновременной защитой зуба ортодонтической коронкой
- В. Витальную ампутацию
- Г. Высокую ампутацию пульпы

При несовершенном одонтогенезе поражены

- А. Молочные резцы и моляры
- Б. Все молочные и постоянные резцы
- В. Все молочные и все постоянные зубы
- Г. Все молочные и постоянные моляры

Первым этапом контролируемой чистки зубов является

- А. Самостоятельная чистка зубов пациентом
- Б. Индивидуальный подбор пациенту средств гигиены полости рта
- В. Обучение пациента чистке зубов на моделях
- Г. Определение гигиенического состояния

К постоянным зубам одного периода минерализации относятся

- А. Резцы, клыки, первые моляры
- Б. Резцы, премоляры, вторые моляры
- В. Клыки, премоляры, первые моляры
- Г. Первые, вторые, третьи моляры

Поверхность эмали при кариесе в стадии белого пятна

- А. Матовая и шероховатая
- Б. Блестящая и шероховатая
- В. Гладкая и блестящая
- Г. Матовая и гладкая

Четкие видимые изменения в эмали при регистрации в оценке тяжести кариозного поражения поверхности зуба по системе icdas соответствуют коду

- А. 2
- Б. 5
- В. 0
- Г. 3

Школьники, имеющие легкие формы хронических заболеваний слизистой оболочки полости рта, относятся к диспансерной группе

- А. V
- Б. I
- В. IV
- Г. III

Ночные иррадиирующие боли с короткими светлыми промежутками характерны для

- А. Хронического периодонтита
- Б. Хронического пульпита
- В. Острого диффузного пульпита
- Г. Глубокого кариеса

Показанием к применению эндогенных методов фторидпрофилактики кариеса у детей является

- А. Высокая распространенность флюороза
- Б. Высокий уровень интенсивности кариеса
- В. Низкий уровень знаний о профилактике кариеса
- Г. Неудовлетворительный уровень гигиены полости рта

У детей в воспалительный процесс могут вовлекаться окружающие зуб ткани (периодонт, кость, надкостница), региональные лимфоузлы и мягкие ткани лица при пульпите

- А. Хроническом фиброзном
- Б. Хроническом гангренозном вне стадии обострения
- В. Остром гнойном (диффузном)
- Г. Хроническом гипертрофическом

Наиболее легкой формой системной гипоплазии эмали является

- А. Аплазия
- Б. Чашеобразная
- В. Бороздчатая
- Г. Пятнистая

Атрофически-дистрофические процессы в тканях пародонта наблюдаются при

- А. Пародонтозе
- Б. Гингивите
- В. Пародонтите
- Г. Фиброматозе

Фактором успеха реплантации при полном вывихе зуба является

- А. Адекватная среда для транспортировки
- Б. Отсутствие травмы соседних зубов
- В. Жесткое шинирование вывихнутого зуба
- Г. Отсутствие у ребенка зубо-челюстных аномалий

Для планирования программы профилактики стоматологических заболеваний наиболее важной является информация о/об

- А. Стоматологической заболеваемости населения
- Б. Состоянии окружающей среды
- В. Динамике демографических процессов в регионе
- Г. Имеющемуся персонале и материальных ресурсах

Полоскание раствором с концентрацией фторида 0,1% рекомендуется проводить детям

- А. 2-3 Раза в неделю
- Б. 1 Раз в месяц
- В. 1 Раз в неделю
- Г. 1 Раз в две недели

Первичный сифилис на слизистой оболочке рта проявляется как

- А. Папулёзный сифилид
- Б. Твёрдый шанкр
- В. Пузырёк
- Г. Пятнистый сифилид

Согласно рекомендациям ВОЗ очень низкий уровень интенсивности кариеса у 12-летних детей соответствует значению кпу

- А. 0-1
- Б. 2,7-4,4
- В. 4,5-6,6
- Г. 1,1-2,6

Хронический пульпит может быть

- А. Гранулирующий
- Б. Гранулематозный
- В. Фиброзный
- Г. Гиперэргический

Рабочая длина корневого канала определяется

- А. Ортопантограммой
- Б. По ощущениям пациента
- В. По субъективным ощущениям врача
- Г. Рентгенограммой с иглой

Для хронического рецидивирующего паренхиматозного паротита симметричное поражение обеих слюнных желез является признаком

- А. Необязательным
- Б. Обязательным только для детей с патологией ЖКТ
- В. Обязательным
- Г. Обязательным только для детей с эндокринной патологией

После удаления постоянного зуба лунку обрабатывают

- А. Кюретажной ложкой
- Б. Экскаватором
- В. Гладилкой
- Г. Распатором

При лечении острого герпетического стоматита ведущая роль принадлежит _____ терапии

- А. Иммуномодулирующей
- Б. Противогрибковой
- В. Противовирусной
- Г. Антибактериальной

В целях профилактики кариеса у детей следует ограничить в рационе питания

- А. Творог
- Б. Овощи
- В. Конфеты
- Г. Мясо

Вторая цифра двузначного кода по icdas характеризует

- А. Состояние поверхностей зуба
- Б. Уровень гигиены полости рта
- В. Тяжесть кариозного поражения
- Г. Состояние тканей пародонта

Ключевые возрастные группы программ оказания стоматологической помощи детям, обучающимся в детских образовательных учреждениях

- А. 8 Лет, 12 лет, 15 лет
- Б. 6 Лет, 12 лет, 15 лет
- В. 6 Лет, 10 лет, 15 лет
- Г. 6 Лет, 12 лет, 18 лет

S - образно изогнутые щипцы, имеющие на щечке шип, предназначены для удаления зубов

- А. 4, 1.5, 2.4, 2.5
- Б. 4, 3.5, 4.4, 4.5
- В. 6, 1.7, 2.6, 2.7
- Г. 3, 2.3, 3.3, 4.3

Травление эмали проводят перед наложением пломбы из

- А. СИЦ
- Б. Композита
- В. Серебряной амальгамы
- Г. Поликарбоксилатного цемента

Низкое содержание фторидов в питьевой воде является фактором риска возникновения

- А. Кариеса
- Б. Флюороза
- В. Гипоплазии эмали
- Г. Эрозии

Два корня и два канала имеют зубы

- А. 4 и 4.4
- Б. 2 и 2.2
- В. 4 и 2.4
- Г. 2 и 4.2

Под действием йода в зубном налете окрашиваются

- А. Органические кислоты
- Б. Производные углеводов
- В. Микроорганизмы
- Г. Эпителиальные клетки

Окончательное формирование корневого дентина постоянных зубов после прорезывания зубов завершается через (в годах)

- А. 4-5
- Б. 6-7
- В. 2-3
- Г. 1,5-2

После профессионального удаления зубных отложений у детей проводят

- А. Окрашивание зубов йодсодержащим раствором
- Б. Контролируемую чистку зубов
- В. Покрытие зубов фторлаком
- Г. Определение индексов гигиены

Пломбирование каналов временных резцов с разрушением коронки производят

- А. Резорцин-формалиновой пастой
- Б. Серебряным штифтом
- В. Фосфат-цементом
- Г. Пастой из окиси цинка на масляной основе

Школьники, имеющие среднюю степень активности кариеса, относятся к диспансерной группе

- А. V
- Б. III
- В. I
- Г. IV

Субпериостальная киста возникает при разрастании гранулемы причинного зуба, расположенной

- А. С латеральной поверхности корня
- Б. Ближе к наружной поверхности челюсти
- В. У верхушки корня зуба
- Г. В толще челюсти

Причиной развития системной гипоплазии эмали временных зубов можно считать

- А. Неполноценное питание в первые три года жизни
- Б. Аллергические заболевания ребенка
- В. Инфекционные заболевания матери во время беременности
- Г. Гнойно-септические состояния у ребенка на втором году жизни

Укороченная уздечка языка является причиной

- А. Задержки прорезывания постоянных зубов
- Б. Нарушения глотания
- В. Лингвоокклюзии
- Г. Сужения верхнего зубного ряда

К наследственным заболеваниям твердых тканей зуба относится

- А. Несовершенное строение эмали и дентина
- Б. Тетрациклиновые зубы
- В. Местная гипоплазия эмали
- Г. Системная гипоплазия эмали

Резорбция корней первых временных моляров начинается в возрасте _____ лет

- А. 3
- Б. 6
- В. 8
- Г. 4

Афты беднара возникают при

- А. Хроническом рецидивирующем афтозном стоматите
- Б. Хронической травме слизистой
- В. Вторичном сифилисе
- Г. Остром герпетическом стоматити

Профилактика местной гипоплазии постоянных зубов заключается в

- А. Проведении реминерализующей терапии
- Б. Своевременном лечение молочных зубов
- В. Замене водоисточника с повышенным содержанием фтора
- Г. Полноценном питании ребенка на первом году жизни

На рентгенограмме при несовершенном дентиногенезе выявляют

- А. Корни зубов нормальной длины
- Б. Облитерацию корневых каналов и полостей зубов вскоре после прорезывания зуба
- В. Расширение периодонтальной щели у верхушки корня
- Г. Широкий просвет корневого канала

Метод витального окрашивания эмали применяется для дифференциальной диагностики

- А. Начального кариеса и флюороза
- Б. Флюороза и гипоплазии эмали
- В. Эрозии зубов и клиновидного дефекта
- Г. Кариеса эмали и кариеса дентина

Эпителиальные островки малассе наиболее часто локализуются в

- А. Пришеечной области периодонта корня
- Б. Средней трети периодонта корня
- В. Дентине корня
- Г. Периапикальной костной ткани

Для зубных щеток рекомендуют использовать _____ щетину

- А. Редкую
- Б. Натуральную
- В. Густую
- Г. Искусственную

Временная окклюзия формируется у ребенка к возрасту (лет)

- А. 4
- Б. 3
- В. 6
- Г. 5

При хронических формах пульпита обнаруживается _____ микрофлора

- А. Смешанная
- Б. Стафилококковая
- В. Грибковая
- Г. Стрептококковая

Причиной скученности зубов является

- А. Макрогнатия
- Б. Макроглоссия
- В. Сужение и укорочение зубного ряда
- Г. Микродензия

При вколоченном вывихе постоянного резца у ребенка 12 лет показано

- А. Произвести репозицию, фиксацию, наблюдение с рентгенологическим контролем и ЭОД
- Б. Провести операцию удаления зуба
- В. Исключить нагрузки, наблюдение (рентгенограмма, ЭОД), по показаниям - эндодонтическое лечение
- Г. Динамическое наблюдение без вмешательства

Клиническая характеристика эмали зубов при пятнистой форме флюороза представляет собой

- А. Меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- Б. Симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации
- В. Изменение цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки зуба
- Г. Окрашивание коронок зубов в желтый цвет

Для одонтогенной кисты характерно наличие

- А. Нечетких контуров
- Б. Внутренних перегородок – септ
- В. Резорбции корней соседних зубов
- Г. Зуба – источника инфекции

При остром остеомиелите причинный постоянный многокорневой зуб у детей

- А. Удаляется по показаниям
- Б. Удаляется по настоянию родителей
- В. Не удаляется
- Г. Удаляется всегда

Элеватор леклюза предназначен для удаления

- А. Резцов верхней челюсти
- Б. Третьего моляра нижней челюсти
- В. Корней зубов верхней челюсти
- Г. Корней временных зубов

Выделение фторида из стеклоиономерного цемента прямо пропорционально

- А. Виду стеклоиономерного цемента
- Б. РН ротовой жидкости
- В. Размеру пломбы
- Г. Размеру коронковой части зуба

Ведущим признаком, обуславливающим нарушение функции речи, является

- А. Пониженный тонус круговой мышцы рта
- Б. Короткая уздечка языка
- В. Нарушение сроков прорезывания зубов
- Г. Мощная уздечка верхней губы

При отломе части коронки зуба с обнажением пульпы пациенты жалуются на боли

- А. При накусывании на зуб
- Б. Ночные
- В. От раздражителей
- Г. Самопроизвольные

В результате воспаления в периапикальных тканях развивается

- А. Одонтогенная воспалительная киста
- Б. Кератокиста
- В. Аневризмальная киста
- Г. Носоальвеолярная киста

Для афт при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите характерен

- А. Ободок из быстро лопающихся везикул
- Б. Предшествующий пузырь на слизистой
- В. Ободок из чешуек
- Г. Ярко-красный воспалительный ободок

Связочный аппарат зуба представлен тканью

- А. Соединительной
- Б. Нервной
- В. Грануляционной
- Г. Мышечной

Калибровка специалистов, участвующих в эпидемиологическом стоматологическом обследовании, проводится в период

- А. Обследования
- Б. Подведения итогов
- В. Подготовительный
- Г. Промежуточный

Диспансерный осмотр ребенка дошкольного возраста, имеющего здоровую полость рта, проводится__ раз/раза в год

- А. 4
- Б. 1
- В. 3
- Г. 2

У детей первичным морфологическим элементом поражения является

- А. Чешуйка
- Б. Волдырь
- В. Рубец
- Г. Корка

Незначительная болезненность при перкуссии и пальпации при отсутствии смещения и подвижности зуба характерна для

- А. Вколоченного вывиха
- Б. Перелома альвеолярного отростка
- В. Вывиха зуба
- Г. Ушиба зуба

К современному методу выявления пародонтопатогенных бактерий относят

- А. Морфологический анализ
- Б. Бактериоскопическое исследование
- В. Биопсию тканей десны
- Г. ПЦР- диагностику

На профилактический осмотр дети и взрослые должны приходить не реже 1 раза в

- А. Год
- Б. 2 Года
- В. Месяц
- Г. 6 Месяцев