

Тесты с вопросами по специальности «Стоматология хирургическая» для аттестации 1, 2 и высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/hirurgicheskaya/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Стоматология хирургическая» для аккредитации и других экзаменов (2500 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_hirurg/

2) Тесты для аккредитации «Стоматология ортопедическая» (1900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/ortoped/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

Навигация по категориям

- [1 категория](#)
- [2 категория](#)
- [высшая категория](#)

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Хирургическо-ортопедические методы иммобилизации переломов верхней челюсти:

- А. А) дуга Энгля
- Б. Б) остеосинтез минипластинами
- В. В) метод Федершпиля-Дингмана
- Г. Г) наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
- Д. Д) остеосинтез по Макиенко

Установите последовательность обследования пациента при переломе нижней челюсти:

- А) сбор жалоб**
 - Б) объективный осмотр**
 - В) рентгенологическое обследование**
 - Г) определение симптома нагрузки**
 - Д) сбор анамнеза**
- А. А, Д, Б, В, Г.
Б. А, Д, Г, Б, В.
В. А, Д, Б, Г, В.

Возможные осложнения во время операции удаления моляров и премоляров верхней челюсти:

- А. А) синусит
- Б. Б) периостит
- В. В) альвеолит
- Г. Г) остеомиелит
- Д. Д) перфорация дна верхнечелюстной пазухи.

Пункция верхнечелюстной пазухи не проводится для:

- А. А) эвакуации гноя из пазухи
- Б. Б) эвакуации крови из пазухи
- В. В) удаления полипов из пазухи
- Г. Г) введение медикаментов в пазуху
- Д. Д) промывание пазухи антисептиками при отсутствии свищевого хода

Через какую слизистую оболочку вирус не может проникнуть в организм человека:

- А. А) носа
- Б. Б) полости рта
- В. В) небных миндалин
- Г. Г) желудка
- Д. Д) конъюнктиву глаза

При исследовании секреторной функции околоушной слюнной железы за 20 минут в норме должно выделяться:

- А. А) 1-3 мл
- Б. Б) 10-12 мл
- В. В) Не определяется
- Г. Г) 5-7 мл
- Д. Д) 15-20 мл

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между видом кисты и рентгенологической картиной:

Одонтогенные кисты

- А) Радикулярная киста
 - Б) Кератокиста
 - В) Фолликулярная киста
 - Г) Резидуальная киста
- Рентгенологическая картина**

- 1. Разряжение костной ткани с четкими контурами в области угла нижней челюсти
- 2. Разряжение костной ткани округлой формы с четкими контурами, проецируется верхушка корня
- 3. Деструкция костной ткани и отсутствие верхушки зуба в кисте
- 4. Разряжение костной ткани вокруг коронковой части зуба

- А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.
- Б. А-1, Б-2, В-4, Г-3.
- В. А-2, Б-1, В-3, Г-4.

Показанием к удалению зуба является:

- А. А) острый пульпит
- Б. Б) острый периодонтит
- В. В) средний кариес
- Г. Г) глубокий кариес
- Д. Д) хронический периодонтит

Пунктат радикулярной кисты вне воспаления имеет вид:

- А. А) гноя
- Б. Б) крови
- В. В) мутной жидкости
- Г. Г) опалесцирующей жидкости
- Д. Д) холестотомных масс

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между манипуляцией и способом проведения:

Манипуляция

А) Сразу после сложного удаления зуба

4.8 следует назначить.

Б) При удалении зуба на нижней челюсти больного усаживают.

В) При удалении зубов на верхней челюсти больного усаживают.

Г) После сложного удаления зуба

4.8 назначают. Способ проведения

1. На уровне локтевого сустава опущенной руки хирурга.

2. На уровне плечевого сустава руки доктора.

3. Антибактериальную и противовоспалительную терапию.

4. Холод на область угла нижней челюсти.

А. А-1, Б-4, В-2, Г-3.

Б. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-3, Г-2.

Если причиной периостита является однокорневой зуб, его следует:

А. А) удалить

Б. Б) запломбировать канал до вскрытия периоста

В. В) запломбировать резорцин-формалиновой пастой

Г. Г) раскрыть полость зуба перед вскрытием периоста

Д. Д) покрыть зуб искусственной коронкой

К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят:

А. А) химиотерапию

Б. Б) криодеструкция

В. В) лучевую терапию

Г. Г) комбинированное лечение

Д. Д) симптоматическую терапию

Основным этиологическим фактором в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта является:

А. А) гиперсаливация

Б. Б) частичная адентия

В. В) предраковые заболевания

Г. Г) массивные зубные отложения

Д. Д) заболевания желудочно-кишечного тракта

К хроническим воспалительным заболеваниям слюнных желез относится:

- А. А) Болезнь Шегрена
- Б. Б) Болезнь Микулича
- В. В) эпидемический паротит
- Г. Г) интерстициальный сиалоаденит
- Д. Д) острый паротит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Манипуляция:

- А) Во время удаления фронтальной группы зубов нижней челюсти
 - Б) При удалении премоляров на нижней челюсти
 - В) Удаление нижнего зуба мудрости
 - Г) Удаление премоляров на верхней челюсти
- Осложнение:**

- 1.Проталкивание зуба в мягкие ткани
- 2.Лентообразный разрыв слизистой с язычной стороны
- 3.Вывих или перелом нижней челюсти
- 4.Перфорация дна верхнечелюстного синуса

А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4.

В. А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Основным методом лечения врожденных кист и свищей шеи является:

- А. А) криотерапия
- Б. Б) химиотерапия
- В. В) лучевая терапия
- Г. Г) динамическое наблюдение
- Д. Д) оперативное вмешательство

Для удаления третьих моляров верхней челюсти используют:

- А. А) угловой элеватор
- Б. Б) прямой элеватор
- В. В) клювовидные щипцы со сходящимися щечками
- Г. Г) S- образные щипцы с несходящимися щечками
- Д. Д) S- образные щипцы с шипом слева

Показания к цистотомии:

- А. А) киста проникающая в верхнечелюстной синус
- Б. Б) киста в пределах двух зубов
- В. В) кистогранулема в области верхушки корня зуба
- Г. Г) амелобластома
- Д. Д) субпериостальная киста

При неблагоприятном течении абсцесса крыло-небной ямки инфекция распространяется в:

- А. А) лобные синусы
- Б. Б) заднее средостение
- В. В) переднее средостение
- Г. Г) полость внутреннего уха
- Д. Д) околоушную слюнную железу

К дополнительным методам обследования при одонтогенном синусите не относится:

- А. А) ортопантограмма
- Б. Б) рентгенограмма придаточных пазух носа
- В. В) ультразвуковое исследование
- Г. Г) компьютерная томография
- Д. Д) ЭОД «причинных» зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между одонтогенной кистой и её клиническим проявлением: Одонтогенные кисты

- А) Радикулярная киста в области зубов 23, 24 в стадии нагноения
 - Б) Зубосодержащая киста в области зуба 38, в стадии воспаления
 - В) Радикулярная киста верхней челюсти, проникающая в верхнечелюстной синус в стадии ремиссии
 - Г) Радикулярная киста в области зубов 32, 31, 41, 42 в стадии нагноения
- Клинические проявления**
- 1. Боль в подбородочной области, выбухание по переходной складке
 - 2. Боль в области верхней челюсти, отек в щечной области, сглаженность носогубной складки
 - 3. Боль в области нижней челюсти, ограничение открывания рта
 - 4. Признаки синусита
- А. А-2, Б-3, В-4, Г-1
 - Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1
 - В. А-1, Б-3, В-4, Г-2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Заболевание

А) Хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит

Б) Хронический калькулезный сиалоденит Клиническая картина

1) Чередование периодов обострения с ремиссией

2) Как правило, поражается одна железа

3) Боль перед или во время еды

4) На контрастной сиалогамме основной выводной проток расширен, вместо протоков 3-4 порядка

5) На контрастной сиалогамме проток «разорван», на остальном протяжении протоки, резко расширены

6) Обострения заболевания часто

А. А- 1,4,7; Б-1,2,3,5.

Б. А- 1,3,4,7; Б-1,2,5.

В. А- 1,2,4,7; Б-1,3,5.

Оронозальная цистотомия проводится при:

А. А) радикулярных кистах верхней челюсти, проникающих в верхнечелюстной синус

Б. Б) радикулярных кистах, проникающих в полость носа

В. В) резидуальных кистах

Г. Г) кистах верхней челюсти в пределах двух зубов

Д. Д) кератокисте

При синдроме Шегрена отмечается:

А. А) увеличение СОЭ

Б. Б) гипергаммаглобулинемия

В. В) положительный ревматоидный фактор

Г. Г) все ответы верны

Д. Д) все ответы неверны

Щипцы для удаления первого и второго правых моляров верхней челюсти называются s-образными:

А. А) сходящимися

Б. Б) с шипом слева

В. В) несходящимися

Г. Г) с шипом справа

Д. Д) прямыми несходящимися

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между кистой и её содержимым: Одонтогенные кисты

А) Радикулярная киста

Б) Зубосодержащая киста в области зуба 38

В) Кератокиста

Г) Пародонтальная киста

1. Не содержит жидкости

2. Опалесцирующая жидкость

3. Содержит зуб в полости кисты

4. Содержит кератиновые массы

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Для создания оттока из верхнечелюстного синуса при остром одонтогенном синусите проводится:

А. А) удаление «причинного» зуба и создание сообщения через лунку

Б. Б) радикальную синусотомию

В. В) разрез в области переходной складки на уровне моляров верхней челюсти

Г. Г) щадящую синусотомию

Д. Д) эндодонтическое лечение «причинного» зуба

Стадию злокачественного новообразования устанавливают на основании клинических признаков:

А. А) жалоб больного

Б. Б) размеров опухоли

В. В) жалоб больного, размеров опухоли

Г. Г) размеров опухоли, наличия близлежащих метастазов

Д. Д) размеров опухоли, наличия отдаленных и близлежащих метастазов

Для рентгенологической картины фолликулярной кисты характерна деструкция костной ткани:

А. А) в виде тающего сахара

Б. Б) с четкими контурами и тенью зуба в полости

В. В) в виде матового стекла

Г. Г) с нечеткими границами в области образования

Д. Д) в виде ячеистой структуры

Для острого одонтогенного синусита характерны морфологические изменения слизистой оболочки:

- А. А)пролиферативные
- Б. Б) полипозные
- В. В) отек
- Г. Г) полнокровие сосудов
- Д. Д) образование ретенционных кист

Боковой свищ шеи располагается в области:

- А. А) щитовидной артерии
- Б. Б) общей сонной артерии
- В. В) лицевой артерии и вены
- Г. Г) лицевой вены и верхней щитовидной артерии
- Д. Д) внутренней яремной вены и наружной сонной артерии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом:

Клинические показатели:

- А) Разрыв слизистой полости рта
 - Б) Гематома слизистой полости рта
 - В) Нарушение прикуса
 - Г) Нарушение положения зуба
 - Д) Уплощение скуловой области
 - Е.) Удлинение нижней трети лица
- Диагноз:**

- 1. Вывих зуба
 - 2. Перелом альвеолярного отростка
 - 3. Перелом нижней челюсти
 - 4. Перелом верхней челюсти
 - 5. Перелом скуловой кости
- А. 1-А, Б, В, Г; 2-А,Б; 3- А,Б,В; 4- А,Б,В,Е; 5- Б,Д.
Б. 1-А, Б, В, Г; 2-А,Б,В; 3- А,Б,В; 4- А,Б,Е; 5- Б,Д.
В. 1-А, Б, В, Г; 2-А,Б,В; 3- А,Б,В; 4- А,Б,В,Е; 5- Б,Д.

Внутреннее отверстие бокового свища шеи открывается в:

- А. А) носоглотке
- Б. Б) щечной области
- В. В) подъязычной области
- Г. Г) поднижнечелюстной области
- Д. Д) области верхнего полюса небной миндалины

Для удаления премоляров нижней челюсти используют:

- А. А) S-образные щипцы со сходящимися щечками
- Б. Б) прямые щипцы со сходящимися щечками
- В. В) клювовидные щипцы с несходящимися щечками
- Г. Г) прямой элеватор
- Д. Д) байонетные щипцы

К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят:

- А. А) химиотерапию
- Б. Б) лучевую терапию
- В. В) иссечение опухоли
- Г. Г) комбинированное лечение
- Д. Д) симптоматическую терапию

Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать с:

- А. А) острым отитом
- Б. Б) острым верхнечелюстным синуситом
- В. В) околоушным гипергидрозом
- Г. Г) переломом верхней челюсти
- Д. Д) флегмоной поднижнечелюстной области

Верхнечелюстной синус сообщается с полостью носа через соустье расположенное в носовом ходу:

- А. А) переднем
- Б. Б) среднем
- В. В) верхнем
- Г. Г) нижнем
- Д. Д) заднем

Возможное осложнение во время операции удаления моляров верхней челюсти:

- А. А) невралгия тройничного нерва
- Б. Б) паротит
- В. В) перфорация дна верхнечелюстного синуса
- Г. Г) артрит височно-нижнечелюстного сустава
- Д. Д) неврит тройничного нерва

К отдаленным осложнениям после операции удаления третьего нижнего моляра относятся:

- А. А) невралгия тройничного нерва
- Б. Б) отлом бугра верхней челюсти
- В. В) неврит тройничного нерва
- Г. Г) синусит
- Д. Д) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

Показанием для цистэктомии кист челюстей является:

- А. А) проникновение кисты в полость носа
- Б. Б) проникновение кисты в верхнечелюстной синус
- В. В) небольшие размеры кисты до трех зубов
- Г. Г) большие размеры кист, более трех зубов
- Д. Д) проникновение кисты в нижнечелюстной канал

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между одонтогенной кистой и её клиническим проявлением: Одонтогенные кисты

А) Радикулярная киста в области зубов 23,24 в стадии нагноения

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8, в стадии воспаления

В) Радикулярная киста верхней челюсти, проникающая в верхнечелюстной синус в стадии ремиссии

Г) Радикулярная киста в области зубов 32, 31, 41, 42 в стадии Клинические проявления

1. Боль в подбородочной области, выбухание по переходной складке

2. Боль в области верхней челюсти, отек в щечной области, сглаженность носогубной складки

3. Боль в области нижней челюсти, ограничение открывания рта

4. Признаки синусита

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между остеопластическим материалом и его составом:

Биокомпозиционные материалы

А) Коллапан

Б) Остим

В) Алломатрикс

Г) Био-Осс Состав

1. Бычья кость

2. Гидроксиапатит, коллаген

3. Гидроксиапатит

4. Трупная кость

А. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите последовательность действий: Удаление зубов

А) При удалении резцов и клыков

Б) При удалении премоляров на нижней челюсти справа

В) При удалении премоляров на нижней челюсти слева

Г) При удалении правых моляров на нижней челюсти Положение врача

1.сзади и несколько справа от пациента

2.справа и спереди от больного

3.справа и кзади от больного

4.стоит слева и несколько кпереди от больного

А. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Причиной для развития периостита является:

А. А) ушиб мягких тканей лица

Б. Б) фиброма альвеолярного отростка

В. В) обострение хронического синусита

Г. Г) обострение хронического периодонтита

Д. Д) перелом мышцелкового отростка нижней челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между видом операции и техникой её проведения: Вид операции:

А) Цистэктомия

Б) Цистотомия

В) Пластическая цистэктомия

Г) Двухэтапная операция Техника:

1. Проводим цистотомию, затем проводим цистэктомию

2. Удаление оболочки полностью

3. Удаление передней стенки оболочки кисты

4. Полное удаление оболочки кисты и дальнейшее ведение под йодоформным тампоном

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между аппаратами для иммобилизации при переломах в зависимости от классификации: Аппараты:

А) Шина Тигерштедта

Б) Шина Порта

В) Шина Вебера

Г) Спица Киршнера

Д) Шина Ванкевич

Е) Шина Васильева Классификация:

1. Назубные

2. Зубонадесневые

3. Надесневые

А. 1-А,Е; 2-В,Д; 3-Б.

Б. 1-А,Д; 2-В,Е; 3-Б.

В. 1-В,Е; 2-А,Д; 3-Б.

При ложном паротите:

А. А) устье выводного протока не изменено

Б. Б) имеется гиперемия и отек устья выводного протока

В. В) из протока околоушной железы выделяется гной

Г. Г) имеется гиперемия устья выводного протока и появление гнойного экссудата в слюне

Д. Д) из протока околоушной слюнной железы ничего не выделяется

О наличии ликвореи при кровотечении из носа или наружного слухового прохода свидетельствует:

- А. А) симптом Малевича
- Б. Б) положительная реакция Вассермана
- В. В) положительный тест двойного пятна
- Г. Г) снижение количества альбуминов в крови
- Д. Д) наличие крепитации в области сосцевидных отростков

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между методом иммобилизации и периодом применения:
Метод иммобилизации

- А) Теменно-подбородочная повязка
- Б) Межчелюстное лигатурное скрепление
- В) Назубные шины
- Г) Повязка Померанцевой-Урбанской
- Д) Шина Вебера
- Е) Шина Порты

1. Временная

2. Лечебная

3. Транспортная

А. 1-А,Б,Г; 2- Б,Д,Е; 3- А,В,Г.

Б. 1-А,Б,Г; 2- В,Д,Е; 3- А,Б,Г.

В. 1-А,Б,Г; 2- В,Д,Е; 3- А,Г.

Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать с:

- А. А) острым синуситом
- Б. Б) околоушным гипергидрозом
- В. В) переломом верхней челюсти
- Г. Г) флегмоной поднижнечелюстной области
- Д. Д) переломом мыщелкового отростка нижней челюсти

Типичным клиническим признаком периостита является:

- А. А) асимметрия лица
- Б. Б) подвижность всех зубов
- В. В) затруднённое открывание рта
- Г. Г) выбухание подъязычных валиков
- Д. Д) гиперемия и отек переходной складки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между распространением кисты и её классификационной группой: Распространение кисты

- А) На альвеолярный сегмент одного зуба распространяется
- Б) На альвеолярный сегмент двух-трех зубов
- В) На альвеолярный сегмент более трех зубов
- Г) Смещение и деформация дна верхнечелюстного синуса, при сохранении костной стенки

Классификация по группам

- 1. киста, оттесняющая верхнечелюстной синус
- 2. киста малого размера
- 3. киста среднего размера
- 4. киста большого размера

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Периостит челюстей необходимо дифференцировать с:

- А. А) тризмом
- Б. Б) переломом зуба
- В. В) острым сиалодохитом
- Г. Г) хроническим синуситом
- Д. Д) обострением хронического периодонтита

Зондирование протока НЕ позволяет определить:

- А. А) наличие сужения или его полного заращения
- Б. Б) направление хода протока железы
- В. В) присутствие в протоке конкремента и место его расположения
- Г. Г) наличие и характер новообразования
- Д. Д) топографию железы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Заболевание

А) Морфологические изменения в патогенезе интерстициального сиалоаденита
Б) Морфологические изменения в патогенезе паренхиматозного сиалоаденита
В) Морфологические изменения в патогенезе протокового сиалоаденита Морфологическая картина

1) Дистрофические изменения эпителиальной ткани ацинусов
2) Метаплазия цилиндрического эпителия в бокаловидные клетки
3) Явления склерозирования стромы железы

А. А-3, Б-2, В-1.

Б. А-2, Б-1, В-3.

В. А-3, Б-1, В-2.

Хирургическо-ортопедические методы иммобилизации переломов верхней челюсти:

А. А) дуга Энгля

Б. Б) остеосинтез минипластинами

В. В) метод Фальтина-Адамса

Г. Г) наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой

Д. Д) остеосинтез по Макиенко

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между показаниями и используемыми материалами:

Показания:

А) После цистэктомии костный дефект заполняется

Б) Для ускорения регенерации после цистэктомии костный дефект заполняют

В) После пластической цистэктомии костный дефект заполняют

Г) После ороназальной цистэктомии Используемые материалы:

1. Верхнечелюстной синус заполняют йодоформным тампоном

2. Кровяным сгустком

3. Остеопластическим материалом

4. Йодоформным тампоном

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

В. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Щипцы для удаления клыков нижней челюсти называются:

- А. А) клювовидные сходящиеся
- Б. Б) S-образные щипцы с шипом
- В. В) клювовидные несходящиеся
- Г. Г) горизонтальные коронковые
- Д. Д) штыковидные щипцы со сходящимися щечками

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между остеопластическими материалами и их происхождением: Биоконпозиционные материалы:

А) Алломатериалы

Б) Аутоматериал

В) Ксеноматериал

Г) Брефокость Происхождение:

1. Из эмбрионов

2. Из трупных костей

3. Из собственной кости

4. Из костей животных

А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

При подозрении на злокачественную опухоль челюстно-лицевой области больного необходимо направить к:

А. А) районному онкологу

Б. Б) специалисту-радиологу

В. В) участковому терапевту

Г. Г) хирургу общего профиля

Д. Д) специалисту-стоматологу

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между осложнением и причиной его возникновения:

Осложнения

- А) Отлом коронки удаляемого зуба**
 - Б) Вывих или перелом соседнего зуба**
 - В) Повреждение десны и мягких тканей полости рта**
 - Г) Проталкивание корня зуба в мягкие ткани**
- Причины**

- 1. Захват щипцами слизистой**
- 2. Недостаточное продвижение щечек щипцов**
- 3. Чрезмерное продвижение щипцов при анатомической близости верхнечелюстного синуса**
- 4. Грубая работа элеватора**

А. А-2, Б-1, В-3, Г-4.

Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

В. А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Показания для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти при:

- А. А) привычном вывихе**
- Б. Б) выраженной гиперсаливации**
- В. В) подозрении на тромбофлебит угловой вены**
- Г. Г) рефлекторной контрактуры жевательных мышц**
- Д. Д) гематома щечной области**

Для ускорения очищения гнойной раны назначают:

- А. А) УВЧ**
- Б. Б) массаж**
- В. В) электрофарез**
- Г. Г) гальванизацию**
- Д. Д) флюктуаризацию**

Под онкологической настороженностью понимают знание злокачественных новообразований:

- А. А) ранних симптомов**
- Б. Б) препаратов для лечения**
- В. В) профессиональных вредностей**
- Г. Г) допустимых доз лучевой терапии**
- Д. Д) путей метастазирования**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между одонтогенной кистой и соответствующей ей рентгенологической картине: **Одонтогенные кисты**

А) Радикулярная киста

Б) Кератокиста

В) Фолликулярная киста

Г) Резидуальная киста

1. Разряжение костной ткани с четкими контурами в области угла нижней челюсти

2. Разряжение костной ткани округлой формы с четкими контурами, проецируется верхушка корня

3. Деструкция костной ткани и отсутствие верхушки зуба в кисте

4. Разряжение костной ткани вокруг коронковой части зуба

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

В. А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Среди осложнений эпидемического паротита не бывает:

А. А) менингита

Б. Б) аметропии

В. В) пневмонии

Г. Г) отита

Д. Д) орхита

Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является:

А. А) шум в ушах

Б. Б) нарушение глотания

В. В) множественный кариес

Г. Г) выраженный болевой симптом

Д. Д) резкое ограничение подвижности нижней челюсти

Основной причиной вывихов нижней челюсти является:

А. А) артроз ВНЧС

Б. Б) нижняя макрогнатия

В. В) снижение высоты прикуса

Г. Г) глубокое резцовое перекрытие

Д. Д) слабость суставной капсулы и связочного аппарата ВНЧС

Для подтверждения диагноза "боковая киста шеи" проводится исследование:

- А. А) биохимическое
- Б. Б) цитологическое
- В. В) радиоизотопное
- Г. Г) реакция Вассермана

Основным методом лечения кист большого размера является:

- А. А) цистэктомия
- Б. Б) цистотомия
- В. В) периостотомия
- Г. Г) частичная резекция челюсти
- Д. Д) полная резекция челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Характеристика щипцов

- А) Признак стороны имеют щипцы S-образные
 - Б) Признак изгиба имеют щипцы
 - В) Изогнутыми по ребру являются
 - Г) Для удаления верхних третьих моляров используют
- Название Щипцов**
- 1. S-образные щипцы без шипов
 - 2. Клювовидные щипцы
 - 3. Штыковидные щипцы
 - 4. S-образные с шипом
- А. А-4, Б-1, В-2, Г-3.
 - Б. А-4, Б-2, В-1, Г-3.
 - В. А-4, Б-1, В-3, Г-2.

Синусотомия не проводится при:

- А. А) остром синусите
- Б. Б) хроническом полипозном синусите
- В. В) травматическом синусите
- Г. Г) частых рецидивах синусита вне периода обострения
- Д. Д) обширных ретенционных кистах верхнечелюстных пазух

Характерный симптом при двустороннем переломе мышечковых отростка нижней челюсти:

- А. А) открытый прикус
- Б. Б) кровотечение из носа
- В. В) разрыв слизистой альвеолярного отростка
- Г. Г) изменение прикуса моляров со стороны перелома
- Д. Д) изменение прикуса моляров с противоположной стороны от перелома

Под онкологической настороженностью понимают знание:

- А. А) профессиональных вредностей
- Б. Б) препаратов для лечения опухолей
- В. В) допустимых доз лучевой терапии
- Г. Г) специальных методов обследования, ранней диагностики
- Д. Д) все ответы верны

Причиной специфического артрита ВНЧС является:

- А. А) актиномикоз
- Б. Б) ревматическая атака
- В. В) околоушный гипергидроз
- Г. Г) хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
- Д. Д) острая травма ВНЧС

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Осложнения

- А) Невропатия
- Б) Проталкивание корня в верхнечелюстной синус
- В) Аспирация зуба
- Г) Перелом нижней челюсти Причина осложнений

- 1. Работа элеватором при отсутствии фиксации удаляемого зуба пальцами левой руки
- 2. Грубая работа щипцами и элеватором при удалении
- 3. Чрезмерное давление элеватора
- 4. Проталкивание корня в нижнечелюстной канал

- А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.
- Б. А-4, Б-3, В-2, Г-1.
- В. А-4, Б-3, В-1, Г-2.

Для иммобилизации переломов беззубых челюстей применяется шина:

- А. А) Порта
- Б. Б) Ванкевич
- В. В) Тигерштедта
- Г. Г) Вебера
- Д. Д) Васильева

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между показаниями и используемыми материалами:

Показания:

- А) Для направленной регенерации после цистэктомии используют
- Б) Для ускорения регенерации после цистэктомии используют
- В) Для профилактики осложнений после цистэктомии используют
- Г) После цистэктомии используют

Используемые материалы:

- 1. Йодоформный тампон
- 2. Мембрану
- 3. Остеопластический материал
- 4. Антибактериальную и противовоспалительную терапию

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-4, Б-3, В-2, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Боковая киста шеи локализуется:

- А. А) по средней линии шеи
- Б. Б) в подподбородочной области
- В. В) в поднижнечелюстной области
- Г. Г) по переднему краю m. trapezius
- Д. Д) в средней трети шеи, по переднему краю m. sternocleidomastoideus

Кровотечение из лунки во время удаления зуба возникает:

- А. А) при переломе челюсти
- Б. Б) синусите
- В. В) повышенном артериальном давлении
- Г. Г) пониженном артериальном давлении
- Д. Д) анафилактическом шоке

Установите последовательность действий при удалении ретинированного зуба

3.8 в горизонтальном положении:

- А) вывихивание корневой части зуба и удаление
 - Б) распиливание зуба бором на два фрагмента
 - В) отслоение слизисто-надкостичного лоскута
 - Г) вывихивание элеватором коронковой части зуба и удаление
 - Д) лоскут укладывают на место
 - Е) наложение швов и введение дренажа по кости
 - Ж) разрез слизистой в ретромолярной области
- З)анестезия
- И) кюретаж лунки

А. ЗЖВБГАИДЕ

Б. ЗЖВБГАДИЕ

В. ЗВЖБГАИДЕ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между применяемыми для репозиции инструментами и видом перелома: Инструменты:

- А) Крючок Лимберга
- Б) Элеватор Карапетяна
- В) Элеватор Леклюза
- Г) Элеватор Волкова
- Д) Крючок Фарабефа
- Е) Зажим Кохера Перелом:

1. Скуловая кость

2. Скуловая дуга

3. Кости носа

А. 1-А,Б; 2-А,Б;3-Г.

Б. 1-А,Б; 2-А,Г;3-Г.

В. 1-А,Г; 2-А,Б;3-Г.

Распространенность опухоли, ее метастазирование наиболее точно оценивает классификация:

А. А) Т N М

Б. Б) клиническая

В. В) пятибалльная

Г. Г) онкологического центра

Д. Д) универсальная ВОЗ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Осложнения после удаления

А) Альвеолит

Б) Остеомиелит лунки

В) Парестезия в области ментального отверстия

Г) Стоматит

1. Язвенные образования на слизистой и налет

2. Боль в лунке удаленного зуба через 1-3 дня, отсутствие сгустка

3. Сильные боли, отечность десны, повышение температуры

4. Онемение подбородка

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Синдромы

А) Синдром Шегрена

Б) Синдром Хеерфорда

1) Сиалорея

2) Ксерофтальмия

3) Гиперпротеинурия

4) Увеит

5) Двусторонний паротит

6) Парез лицевого нерва

А. А -1,2,3,4; Б -5,6.

Б. А -1,2,3; Б -4,5,6.

В. А -1,2; Б -3,4,5,6.

Установите последовательность обследования пациента при переломе скуловой кости:

А) сбор жалоб

Б) объективный осмотр

В) рентгенологическое обследование

Г) определение участка парестезии

Д) сбор анамнеза

А. А, Д, Г, Б, В.

Б. А, Б, Д, Г, В.

В. А, Д, Б, Г, В.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между применяемыми аппаратами и методами лечения переломов челюстей: Аппараты:

А) Шина Тигерштедта

Б) Шина Порта

В) Спица Киршнера

Г) Минипластины и минивинты

Д) Проволочный шов

Е) Шина Васильева Методы лечения:

1. Консервативные

2. Оперативные

А. 1-А, Б, Г; 2- В,Е,Д.

Б. 1-А, Б, Е; 2- В,Г,Д.

В. 1-Г, Б, Е; 2- В,А,Д.

При периостите гнойный процесс локализуется под:

А. А) кожей

Б. Б) мышцей

В. В) надкостницей

Г. Г) наружной кортикальной пластинкой челюсти

Д. Д) слизистой оболочкой альвеолярного отростка

К дополнительным методам исследования, проводимым для уточнения диагноза "злокачественное новообразование челюстно-лицевой области" относится:

А. А) физикальный

Б. Б) биохимический

В. В) цитологический

Г. Г) иммунологический

Д. Д) ангиографический

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Кистовидные образования:

А) Радикулярная киста в области зубов

1.6,

1.7

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8

В) Кератокиста

Г) Киста резцового канала Ошибки диагностики:

1. Радикулярная киста

2. Бухты верхнечелюстного синуса

3. Кератокиста

4. Амелобластома

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Для рентгенологической картины радикулярной кисты характерно:

А. А) резорбция костной ткани в виде тающего сахара

Б. Б) резорбция костной ткани в виде матового стекла

В. В) резорбция костной ткани с четкими контурами округлой формы в области верхушки корня зуба

Г. Г) резорбция костной ткани в виде нескольких полостей

Д. Д) резорбция костной ткани с нечеткими контурами

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между кистой и методом оперативного вмешательства при её лечении: Кисты:

А) Нагноившаяся радикулярная киста

Б) Радикулярная киста в области зубов 22, 23

В) Радикулярная киста в области зубов 16, 17, проникающая в верхнечелюстной синус на 2/3

Г) Радикулярная киста на беззубой челюсти в стадии нагноения Оперативное вмешательство:

1. Пластическая цистэктомия

2. Проводим разрез по типу периостомии

3. Цистэктомия

4. Ороназальная цистотомия

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Больные хроническим одонтогенным перфоративным синуситом жалуются на:

- А. А) боли в лобной области
- Б. Б) боли в области зубов верхней челюсти
- В. В) попадание жидкости из полости рта в полость носа
- Г. Г) боли при глотании
- Д. Д) онемение подглазничной области на стороне поражения

Основным симптомом перелома верхней челюсти является:

- А. А) головная боль
- Б. Б) носовое кровотечение
- В. В) патологическая подвижность нижней челюсти
- Г. Г) патологическая подвижность верхнечелюстных костей
- Д. Д) разрывы слизистой оболочки альвеолярных отростков

Больные острым синуситом жалуются на:

- А. А) сильные боли в лобной области
- Б. Б) боли при глотании
- В. В) гнойные выделения из носа
- Г. Г) ограничение открывания рта
- Д. Д) онемение подглазничной области на стороне поражения

Поздним местным осложнением абсцесса окологлоточного пространства является:

- А. А) слюнной свищ
- Б. Б) абсцесс головного мозга
- В. В) рубцовый выворот нижней губы
- Г. Г) стеноз верхних дыхательных путей
- Д. Д) тромбоз венозных синусов головного мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между кистой и методом её лечения: Локализация кист

А) Радикулярная киста в области зубов

1.1,1.2, проникающая в полость носа

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8

В) Радикулярная киста в области зубов

1.6,

1.7, оттесняющая верхнечелюстной синус

Г) Резидуальная киста в пределах удаленного зуба

3.6 Оперативное вмешательство

1.Даление оболочки полностью

2. Цистотомия

3. Цистэктомия с удалением зуба

4. Двухэтапная операция

А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом:

Клинические показатели:

А) Хемоз

Б) Гематома слизистой полости рта

В) Нарушение прикуса

Г) Симптом очков

Д) Уплотнение скуловой области

Е) Диплопия **Диагноз:**

1. Перелом альвеолярного отростка

2. Перелом нижней челюсти

3. Перелом верхней челюсти

4. Перелом скуловой кости

А. 1-Б; 2-Б,В; 3-А,В,Г,Е; 4- А,Б,Д,Е.

Б. 1-Б; 2-Б,В; 3-А,Б,В,Г,Е; 4- А,Б,Д,Е.

В. 1-Б; 2-Б,В; 3-А,Б,В,Г,Е; 4- А,Б,Е.

Осложнения, возникающие непосредственно после операции удаления зуба:

- А. А) паротит
- Б. Б) кровотечение из лунки удаленного зуба
- В. В) невралгия тройничного нерва
- Г. Г) артрит височно-нижнечелюстного сустава
- Д. Д) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

Срединная киста шеи локализуется:

- А. А) по средней линии шеи
- Б. Б) в области яремной вырезки
- В. В) в поднижнечелюстной области
- Г. Г) по переднему краю m. Trapezius
- Д. Д) в области корня языка

S - образными щипцами с шипом удаляют:

- А. А) резцы верхней челюсти
- Б. Б) третьи моляры верхней челюсти
- В. В) моляры верхней челюсти
- Г. Г) премоляры нижней челюсти
- Д. Д) премоляры верхней челюсти

Основным методом лечения кист небольшого размера является:

- А. А) цистэктомия
- Б. Б) склерозирующая терапия
- В. В) половинная резекция челюсти
- Г. Г) частичная резекция челюсти
- Д. Д) цистотомия

Основной симптом перелома костей носа:

- А. А) деформация носа
- Б. Б) подкожная эмфизема
- В. В) затруднение носового дыхания
- Г. Г) патологическая подвижность костей носа
- Д. Д) кровотечение из носовых ходов

В комплекс мероприятий при лечении хронического неспецифического артрита ВНЧС входят:

- А. А) химиотерапия, иглотерапия
- Б. Б) физиотерапия, нормализация окклюзии, разгрузка и покой ВНЧС
- В. В) физиотерапия, остеотомия нижней челюсти, иммобилизация
- Г. Г) иглорефлексотерапия
- Д. Д) физиотерапия, удаление мышечкового отростка, разгрузка и покой ВНЧС

Припухлость при гнойно-некротическом паротите чаще имеет характер:

- А. А) ограниченный;
- Б. Б) диффузный;
- В. В) любой
- Г. Д) не наблюдается припухлости

При отсутствии кровяного сгустка в лунке удаленного зуба развивается:

- А. А) синусит
- Б. Б) альвеолит
- В. В) неврит лицевого нерва
- Г. Г) невралгия тройничного нерва
- Д. Д) сиалоденит

Установите последовательность манипуляций при лечении перелома верхней челюсти без смещения отломков:

- А) клиническое обследование
- Б) иммобилизация отломков
- В) рентгенологическое обследование
- Г) консультация нейрохирурга
- Д) антибактериальная терапия

А. А, В, Г, Б, Д.

Б. А, В, Б, Г, Д.

В. А, В, Г, Д, Б.

Для диагностики конкремента в Вартоновом протоке выполняют рентгенографию

- А. А) ортопантограмму
- Б. Б) тела нижней челюсти
- В. В) внутриротовую дна полости рта
- Г. Г) поднижнечелюстной слюнной железы
- Д. Д) томографию поднижнечелюстной слюнной железы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между осложнением во время удаления и его признаком: Манипуляция

А) Удаление третьего моляра верхней челюсти

Б) Корни второго моляра верхней челюсти

В) Корни второго нижнего моляра

Г) Третий нижний моляр Осложнение

1.Проталкивание в верхнечелюстной синус

2. Перелом корня зуба

3. Перелом нижней челюсти

4.Отлом бугра верхней челюсти

А. А-3, Б-1, В-2, Г-4.

Б. А-4, Б-2, В-1, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

Лечение болезни Микулича и синдрома Шегрена проводится:

А. А) совместно с гастроэнтерологом

Б. Б) совместно с ревматологом

В. В) совместно с эндокринологом

Г. Г) все ответы верны

Д. Д) все ответы неверны

Установите последовательность действий при операции цистэктомии в области зубов 2.1,2.2:

А) удаление оболочки кисты и резекция верхушек корней зубов

Б) создание перфорационного отверстия

В) отслоение слизисто-надкостничного лоскута

Г) расширение перфорационного отверстия

Д) уложить лоскут на место

Ж) наложение швов

З) проведение разреза по альвеолярному отростку челюсти

К) инфильтрационная анестезия

Л) мобилизация лоскута

А. КЗБВГАЛДЖ

Б. КЗВБГЛАДЖ

В. КЗВБГАЛДЖ

К предраковым заболеваниям красной каймы губ относятся:

- А. А) рожистое воспаление
- Б. Б) термический и химические ожоги
- В. В) бородавчатый предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, хейлит Манганотти
- Г. Г) болезнь Боуэна, пигментная ксеродерма актинический кератоз, предраковый меланоз
- Д. Д) эритроплакия, лейкоплакия, красная волчанка, плоский лишай, подслизистый фиброз

К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят:

- А. А) синусит
- Б. Б) альвеолит
- В. В) остеомиелит
- Г. Г) гипертонический криз
- Д. Д) артрит височно-нижнечелюстного сустава

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом:

Клинические показатели:

- А) Нарушение целостности кожи
 - Б) Наличие гематомы
 - В) Целостность кожных покровов не нарушена
 - Г) Нарушение целостности кости
 - Д) Кровотечение
 - Е) Нарушение чувствительности
- Диагноз:**

1. Ушиб

2. Ссадина

3. Рана

А. 1-Б,Д; 2-А,В; 3-А,Д,Е.

Б. 1-Б,Е; 2-А,Д; 3-А,Д,В.

В. 1-Б,В; 2-А,Д; 3-А,Д,Е.

Лечение при вывихе нижней челюсти заключается в:

- А. А) иммобилизации
- Б. Б) резекции суставного бугорка
- В. В) прошивании суставной капсулы
- Г. Г) резекции мышечных отростков нижней челюсти
- Д. Д) введении суставной головки в суставную впадину

Возбудителями при абсцессе челюстно-язычного желобка чаще всего являются:

- А. А) анаэробы
- Б. Б) лучистые грибы
- В. В) бледные спирохеты
- Г. Г) стафилококки, стрептококки
- Д. Д) туберкулёзные микобактерии

После наложения бимаксиллярных шин с зацепными петлями резиновые кольца (тягу) меняют:

- А. А) ежедневно
- Б. Б) ежемесячно
- В. В) еженедельно
- Г. Г) 3 раза в месяц
- Д. Д) 2 раза в неделю

Фолликулярную кисту необходимо дифференцировать с:

- А. А) одонтомой
- Б. Б) амелобластомой
- В. В) цементомой
- Г. Г) репаративной гранулемой
- Д. Д) твердой одонтомой

Причиной хронического неспецифического артрита ВНЧС является:

- А. А) актиномикоз
- Б. Б) острая травма
- В. В) околоушный гипергидроз
- Г. Г) хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
- Д. Д) заболевания щитовидной железы

Причиной развития острого одонтогенного остеомиелита челюстей является:

- А. А) острый паротит
- Б. Б) перелом челюсти
- В. В) острый лимфаденит
- Г. Г) снижение реактивности организма
- Д. Д) травма плохо изготовленным протезом

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом:

Клинические показатели:

- А) Патологическая подвижность верхней челюсти
 - Б) Боли при давлении на крыловидный отросток клиновидной кости
 - В) Слезотечение
 - Г) Эмфизема лица
 - Д) Симптом очков
 - Е) Ликворея
- Диагноз:

- 1. Перелом верхней челюсти по Лефор I
- 2. Перелом верхней челюсти по Лефор II
- 3. Перелом верхней челюсти по Лефор III

А. 1-А, Б; 2-А,Б,Г; 3-А,В,Д,Е.

Б. 1-А, Б; 2-А,Б,В,Г; 3-А,Г,Д,Е.

В. 1-А, Б; 2-А,Б,В,Г; 3-А,Г,Е.

Наблюдаются ли изменения в паренхиме околоушной железы при лимфогенном сиалодохите:

- А. А) да
- Б. Б) нет

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Клиническая ситуация

- А) Разъединенные корни первого моляра верхней челюсти
 - Б) Разъединенные корни первого и второго нижних моляров
 - В) Нижний третий моляр
 - Г) Корни нижнего второго моляра при мощной межкорневой перегородке
- Используемый инструмент

- 1. Угловым элеватором
- 2. Элеватор Леклюза при сохраненном соседнем зубе
- 3. Разъединяют фиссурным бором и вывихивают элеватором
- 4. Удаляют прямым элеватором

А. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

Б. А-4, Б-2, В-1, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-3, Г-2.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Симптомы при ложном паротите

А) Симптом Хетчкока

Б) Симптом Тресильяна-Урсона Клиническая картина

1. Болезненность при надавливании в об-ласти угла нижней челюсти
2. Гиперемия каймы вокруг устья выводного протока околоушной железы
3. Асиалия на стороне поражения
4. Гипосаливация на стороне поражения
5. Выделение гнойного экссудата из устья выводного протока

А. А-1; Б-2.

Б. А-2; Б-1.

Вправление вывиха нижней челюсти проводится при положении больного:

А. А) лежа

Б. Б) сидя

В. В) стоя

Г. Г) полулежа

Д. Д) полусидя

Для удаления корней резцов верхней челюсти используют:

А. А) прямой элеватор

Б. Б) клювовидные щипцы

В. В) клювовидные с шипом

Г. Г) S-образные сходящиеся

Д. Д) S-образные несходящиеся

Основным этиологическим фактором в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта является:

А. А) гиперсаливация

Б. Б) частичная адентия

В. В) хроническая травма слизистой оболочки

Г. Г) массивные зубные отложения

Д. Д) заболевания желудочно-кишечного тракта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между локализацией кисты и возможным осложнением во время операции: Локализация кист

А) Радикулярная киста в области зубов

1.1,1.2

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8

В) Радикулярная киста в области зубов

1.6,

1.7

Г) Радикулярная киста в области зубов

4.5,

4.4 Осложнения во время операции

1. Травма подбородочного нерва

2. Перфорация дна полос носа

3. Перелом нижней челюсти

4. Перфорация дна верхнечелюстного синуса

А. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Перфорация дна верхнечелюстной пазухи не возникает вследствие:

А. А) грубой техники удаления зуба

Б. Б) низкого расположения дна пазухи и прилегания его к верхушкам корней зубов

В. В) деструкция нижней стенки пазухи вследствие периодонтита

Г. Г) удалении моляров нижней челюсти

Д. Д) деструкция нижней стенки пазухи вследствие образования одонтогенных кист

По происхождению верхнечелюстной синусит бывает:

А. А) одонтогенным

Б. Б) полипозным

В. В) хроническим

Г. Г) острым

Д. Д) диффузным

При эпидемическом паротите поражаются слюнные железы:

А. А) малые

Б. Б) околоушные

В. В) подъязычные

Г. Г) поднижнечелюстные

Д. Д) все

Наружное отверстие бокового свища шеи располагается в:

- А. А) носоглотке
- Б. Б) щечной области
- В. В) подъязычной области
- Г. Г) области корня языка
- Д. Д) поднижнечелюстной области

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между методами фиксации при различных переломах:

Метод:

- А) Остеосинтез минипластинами
- Б) Тампонада носовых ходов
- В) Метод Федершпиля
- Г) Наливной баллон
- Д) Метод Фальтина-Адамса
- Е) Гипсовая повязка Перелом:

1. Нижняя челюсть

2. Скуловая кость

3. Кости носа

4. Верхняя челюсть

А. 1-Д; 2-Г; 3-А,Б,Е; 4-В.

Б. 1-А; 2-В; 3-Б,Е; 4-Г,Д.

В. 1-А; 2-Г; 3-Б,Е; 4-В,Д.

Установите последовательность манипуляций при лечении перелома челюсти со смещением отломков:

- А) клиническое обследование
- Б) иммобилизация отломков
- В) рентгенологическое обследование
- Г) консультация нейрохирурга
- Д) репозиция отломков

А. А, В, Г, Д, Б

Б. А, Г, В, Д, Б

В. В, А, Г, Д, Б

К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят:

- А. А) химиотерапию
- Б. Б) СВЧ-гипертермию
- В. В) лучевую терапию
- Г. Г) комбинированное лечение
- Д. Д) симптоматическую терапию

Для ускорения абсцедирования назначают:

- А. А) парафинотерапия
- Б. Б) грязевые аппликации
- В. В) УВЧ в нетепловой дозе
- Г. Г) УВЧ в слаботепловой дозе
- Д. Д) УФО в субэритемных дозах

Типичный оперативный доступ при периостите заключается в разрезе:

- А. А) окаймляющем угол нижней челюсти
- Б. Б) в подподбородочной области по средней линии
- В. В) слизистой оболочке по крыло-челюстной складке
- Г. Г) слизистой и надкостницы по переходной складке
- Д. Д) в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти

Симптом нагрузки при переломах нижней челюсти определяется давлением на:

- А. А) скуловые кости снизу вверх
- Б. Б) подбородок снизу вверх
- В. В) подбородок спереди назад
- Г. Г) крючок крыловидного отростка снизу вверх
- Д. Д) альвеолярный отросток сверху вниз

При двустороннем переломе нижней челюсти в области углов смещение фрагмента происходит

- А. А) книзу
- Б. Б) кверху
- В. В) медиально
- Г. Г) латерально
- Д. Д) дистально

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между манипуляцией и используемым инструментом:

Манипуляция

А) Для удаления зубов на нижней челюсти с сохраненными коронками используют.

Б) Для удаления зубов

3.8,

4.8 используют.

В) Для удаления дистального корня зуба

4.7 используют.

Г) Для удаления

3.6 и

4.6 зубов с разрушенной коронкой наиболее приемлемы. инструмент

1. Клювовидные щипцы, изогнутые по плоскости.

2. Элеваторы от себя и к себе.

3. Клювовидные шпигцы с несходящимися щечками.

4. Клювовидные щипцы со сходящимися щечками.

А. А-3, Б-1, В-4, Г-2.

Б. А-3, Б-1, В-2, Г-4.

В. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Причиной развития острого одонтогенного остеомиелита челюстей является воспалительный процесс в:

А. А) лимфоузлах

Б. Б) слюнных железах

В. В) периапикальных тканях

Г. Г) верхнечелюстной пазухе

Д. Д) месте перелома челюсти

Установите последовательность действий при обследовании больных с радикулярной кистой в области интактных зубов

4.2, 4.1 и подготовке к операции цистэктомии:

А) шинирование ребондом

Б) проведение электроодонтодиагностики зубов

В) рентгенологическое обследование

Г) депульпирование зубов

Д) назначение антибактериальной терапии

Е) проведение операции не позднее 24 часов

Ж) клиническое обследование больного

З) выяснение жалоб у пациента

И) контрольная рентгенограмма

А. ЗЖВБГАДИЕ

Б. ЗЖВБГАИДЕ

В. ЗЖБВГАИДЕ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между оперативным вмешательством и показанием к нему:

Оперативное вмешательство

- А) Цистотомию в детском возрасте проводят
Б) Цистотомию при ретенции и дистопии клыка проводят
В) Цистотомию у пожилых людей проводят
Г) Цистотомию, с последующим изготовлением obturatora проводят
- Показания
1. Для исключения второго этапа оперативного вмешательства
 2. Во избежание травмы зачатков зубов
 3. С целью сохранения зуба и дальнейшего ортодонтического лечения
 4. При наличии сопутствующей патологии
- А. А-3, Б-2, В-4, Г-1.
Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.
В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Абсцесса челюстно-язычного желобка необходимо дифференцировать с:

- А. А) тризмом
Б. Б) карбункулом нижней губы
В. В) флегмоной щечной области
Г. Г) флегмоной височной области
Д. Д) абсцессом крыловидно-челюстного пространства

Ксеростомия является следствием

- А. А) гиперсаливации
Б. Б) приема кислой пищи
В. В) гипосаливации
Г. Г) выделения гноя из протока слюнной железы

В результате развития нарушения эмалевого органа в челюстных костях развивается:

- А. А) радикулярная киста
Б. Б) фолликулярная киста
В. В) кератокиста
Г. Г) киста резцового канала
Д. Д) резидуальная киста

Для удаления корней резцов верхней челюсти используют:

- А. А) элеватор Леклюза
- Б. Б) прямые щипцы с несходящимися щёчками
- В. В) прямые щипцы со сходящимися щечками
- Г. Г) элеватор от себя
- Д. Д) элеватор к себе

S- образными щипцами без шипов удаляют:

- А. А) корни зубов нижней челюсти
- Б. Б) вторые моляры нижней челюсти
- В. В) третьи моляры верхней челюсти
- Г. Г) премоляры верхней челюсти
- Д. Д) корни зубов верхней челюсти

Для удаления корней премоляров верхней челюсти используют:

- А. А) прямые несходящиеся щипцы
- Б. Б) S-образные щипцы со сходящимися щечками
- В. В) клювовидные щипцы , изогнутые по плоскости
- Г. Г) S- образные щипцы с несходящимися щечками
- Д. Д) S- образные щипцы с шипом слева

К дополнительным методам исследования проводимым для уточнения диагноза "злокачественное новообразование челюстно-лицевой области" относится:

- А. А) физикальный
- Б. Б) биохимический
- В. В) гистологический
- Г. Г) ангиографический
- Д. Д) иммунологический

Острый одонтогенный синусит не дифференцируют с:

- А. А) периоститом верхней челюсти
- Б. Б) остеомиелитом верхней челюсти
- В. В) ринитом
- Г. Г) лимфаденитом
- Д. Д) ретенционными кистами верхнечелюстных пазух

Может ли развиваться лимфогенный сиаладенит поднижнечелюстной железы:

- А. А) нет
- Б. Б) да
- В. В) может, но очень редко
- Г. Г) может, периодически

Цистотомия показана при:

- А. А) радикулярных кистах в пределах двух зубов
- Б. Б) носонебной кисте
- В. В) кисте, проникающей в нижнечелюстной канал
- Г. Г) кисте резцового канала
- Д. Д) радикулярных кистах в пределах одного зуба

Возникновению одонтогенного синусита не способствуют:

- А. А) близкое расположение одонтогенных гнойных очагов
- Б. Б) распространение апикального гранулирующего процесса на нижнюю стенку пазухи
- В. В) проталкивание корня в пазуху при удалении зуба
- Г. Г) искривление перегородки носа
- Д. Д) кариозное поражение моляров и премоляров верхней челюсти

Характерный симптом при одностороннем переломе мыщелкового отростка нижней челюсти:

- А. А) открытый прикус
- Б. Б) кровотечение из носа
- В. В) разрыв слизистой альвеолярного отростка
- Г. Г) изменение прикуса моляров со стороны перелома
- Д. Д) изменение прикуса моляров с противоположной стороны от перелома

Возможное осложнение во время операции удаления третьего моляра нижней челюсти:

- А. А) синусит
- Б. Б) периостит
- В. В) альвеолит
- Г. Г) остеомиелит
- Д. Д) перелом нижней челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между осложнениями и соответствующим им лечению:

Осложнение

А) Нагноение после операции цистэктомия

Б) Перелом челюсти после цистэктомии с удалением зуба

3.8

В) Прорыв в верхнечелюстной синус при цистэктомии

Г) Раннее закрытие входного отверстия после цистотомии **Лечение**

1. Повторно расширить и изготовить obturator

2. Переводим в цистотомию

3. Бимаксиллярное шинирование, остеосинтез

4. Ороназальная цистэктомия

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Показанием для проведения блокад по Вишневскому является:

А. А) отек

Б. Б) инфильтрат

В. В) эмпиема верхнечелюстной пазухи

Г. Г) инфильтрат с признаками абсцедирования

Д. Д) синусит

При обострении хронического синусита в верхнечелюстной пазухе содержится экссудат:

А. А) серозный

Б. Б) гнойный

В. В) геморрагический

Г. Г) кровяной

Д. Д) кистозная жидкость

Показания к цистотомии:

А. А) киста в пределах одного зуба

Б. Б) киста в пределах двух зубов

В. В) киста, проникающая в полость носа

Г. Г) киста в пределах трех и более зубов

Д. Д) в полости кисты находятся несколько депульпированных зубов

Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти:

- А. А) наркоз
- Б. Б) инфильтрационная анестезия
- В. В) нейролептаналгезия
- Г. Г) стволовая анестезия
- Д. Д) проводниковая анестезия

Установите последовательность обследования пациента при вывихе зуба:

- А) сбор жалоб
 - Б) объективный осмотр
 - В) рентгенологическое обследование
 - Г) ЭОД
 - Д) сбор анамнеза
- А. А, Д, Б, В, Г.
Б. А, Д, Б, Г, В.
В. А, В, Г, Б, Д.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Заболевание

- А) Острый эпидемический паротит
Б) Хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит в стадии обострения.
- Клиническая картина**
- 1) Выделение гнойного секрета из устья протока
 - 2) Задержка секрета
 - 3) Высокая контагиозность
 - 4) Железа тестовато-пастозная
 - 5) Железа бугристая, плотная
 - 6) Одновременное поражение поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез
- А. А- 2, 4, 6; Б-1, 2, 5.
Б. А- 2, 4, 3, 6; Б-1, 5.
В. А- 2, 4, 3, 6; Б-1, 2, 5.

Радикальная синусотомия отличается от щадящей синусотомии:

- А. А) наложением широкого сообщения с полостью носа
- Б. Б) дополнительными методами обследования
- В. В) пластикой ороантрального сообщения
- Г. Г) местной анестезией
- Д. Д) удалением или лечением «причинных» зубов

Прямыми щипцами удаляют:

- А. А) вторые моляры верхней челюсти
- Б. Б) премоляры верхней челюсти
- В. В) третьи моляры нижней челюсти
- Г. Г) резцы верхней челюсти
- Д. Д) резцы нижней челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между классифицированной по группе кистой и её распространением: Распространение кисты

- А) На альвеолярный сегмент одного зуба распространяется
- Б) На альвеолярный сегмент двух-трех зубов
- В) На альвеолярный сегмент более трех зубов
- Г) Смещение и деформация дна верхнечелюстного синуса, при сохранении костной стенки

Классификация по группам

- 1. Киста, оттесняющая верхнечелюстной синус
- 2. Киста малого размера
- 3. Киста среднего размера
- 4. Киста большого размера

А. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Большие пальцы рук врач при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливает на:

- А. А) углы нижней челюсти
- Б. Б) фронтальную группу зубов
- В. В) моляры справа и слева или альвеолярные отростки
- Г. Г) в поднижнечелюстную область
- Д. Д) премоляры верхней челюсти

Установите последовательность действий при нагноившейся радикулярной кисте в области зубов

2.3,

2.4:

А) назначение антибактериальной терапии

Б) введение дренажа

В) эвакуация гнойного содержимого

Г) холод местно

Д) удаление дренажа на пятые сутки

Е) оперативное вмешательство в плановом порядке после стихания воспалительных явлений

Ж) проведение разреза по типу периостотомии

З) проведение анестезии

И) динамическое наблюдение и перевязки

А. ЗЖВБГАИДЕ

Б. ЗЖВБГИАДЕ

В. ЗВЖБГАИДЕ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и соответствующему патогенезу:

Заболевание

А) Интрестициальный сиаладенит

Б) Паренхиматозный сиаладенит

1) Рыхлая соединительная ткань в междольковых прослойках

2) Паренхима железы замещена диффузными скоплениями лимфоидных элементов

3) Липоматозная атрофия долек железы

4) Сужение щелевидных просветов некоторых протоков с об-разованием фиброзных муфт

5) Отек и ангиоматоз в междольковых прослойках

6) Вокруг долек железы формируются диффузные, плотные: лимфогистиоцитарные инфильтраты

7) Эпителиальные клетки ацинусов имеют преимущественнф цилиндрическую форму, цитоплазма их вакуолизирована за счет накопления белкового секрета

А. А-1,2,3,4; Б-5, 6, 7.

Б. А-1,2,3; Б-4,5, 6, 7.

В. А-1,2,3,4,5; Б-6, 7.

Срединные и боковые свищи шеи по своему происхождению являются:

А. А) врождёнными

Б. Б) одонтогенными

В. В) травматическими

Г. Г) онкологическими

Д. Д) воспалительными

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между видом перелома и методом иммобилизации:

Метод иммобилизации:

А) Шина Тигерштедта

Б) Остеосинтез минипластинами

В) Шина Вебера

Г) Гладкая шина-скоба

Д) Шина Васильева

Е) Спица Киршнера Перелом:

1. Альвеолярного отростка

2. Нижней челюсти без смещения

3. Нижней челюсти в области угла со смещением

4. Нижней челюсти в области ветви без смещения

5. Нижней челюсти в области мышцелкового отростка со смещением

А. 1-А,Г; 2-В,Д; 3- А,В,Д; 4-Б,Е.

Б. 1-Г; 2-А,В,Д; 3- А,В,Д; 4-Б,Е.

В. 1-Г; 2-А,В,Д,Е; 3- А,В,Д; 4-Б.

Клиническая картина бородавчатого предрака красной каймы губ характеризуется наличием:

А. А) 2-3 эрозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации

Б. Б) эрозивной поверхностью с инфильтрацией подлежащих тканей

В. В) атрофичных уплощенных бляшек покрытых корками, "географический" рисунок

Г. Г) ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими, плотно сидящими чешуйками

Д. Д) болезненного узла с бугристой поверхностью, возвышающегося над эпителием на 3-5 мм

Установите последовательность обследования пациента при переломе верхней челюсти:

А) сбор жалоб

Б) объективный осмотр

В) рентгенологическое обследование

Г) определение симптома нагрузки

Д) сбор анамнеза

А. Д, А, Б, Г, В.

Б. А, Д, Б, Г, В.

В. А, Д, Б, В, Г.

Если причиной периостита является многокорневой зуб, его следует:

А. А) удалить

Б. Б) запломбировать канал до вскрытия периоста

В. В) запломбировать резорцин-формалиновой пастой

Г. Г) раскрыть полость зуба перед вскрытием периоста

Д. Д) покрыть зуб искусственной коронкой

При неблагоприятном течении абсцесса челюстно-язычного желобка инфекция распространяется в:

- А. А) околоушную слюнную железу
- Б. Б) субдуральное пространство
- В. В) крыло-небное венозное сплетение
- Г. Г) венозные синусы головного мозга
- Д. Д) крыловидно-челюстное пространство

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и лечением: Заболевание

- А) Прободение дна верхнечелюстного синуса во время удаления зуба**
 - Б) Невропатия**
 - В) Аспирация зуба или корня**
 - Г) Отлом альвеолярного отростка челюсти** **Лечение**
 - 1.анальгетики, физиолечение, витамины группы В**
 - 2. срочная госпитализация для бронхоскопии и удаления зуба из дыхательных путей**
 - 3. удаляют, а слизистую ушивают**
 - 4.наложение йодоформной турунды на устье лунки и фиксация щвами**
- А. А-4, Б-2, В-1, Г-3
Б. А-4, Б-1, В-2, Г-3
В. А-4, Б-1, В-3, Г-2

Больной с диагнозом "злокачественное новообразование" челюстно-лицевой области должен быть направлен к:

- А. А) районному онкологу
- Б. Б) специалисту-радиологу
- В. В) участковому терапевту
- Г. Г) хирургу общего профиля
- Д. Д) специалисту-стоматологу

Характерные симптомы острого артрита ВНЧС в начальной стадии:

- А. А) тризм жевательных мышц
- Б. Б) околоушный гипергидроз
- В. В) боль, ограничение открывания рта
- Г. Г) боль в шейном отделе позвоночника, иррадиирующая в ВНЧС
- Д. Д) гипермобильность нижней челюсти

В результате нарушения протокола операции удаления зуба образуется:

- А. А) фолликулярная киста
- Б. Б) радикулярная киста
- В. В) резидуальная киста
- Г. Г) амелобластома
- Д. Д) кератокиста

При цитомегалии слюнных желез вирус проникает в организм ребенка:

- А. А) гематогенным путем (травма, ссадины)
- Б. Б) лимфогенным путем
- В. В) через плаценту
- Г. Г) контактным путем
- Д. Д) воздушно-капельным путем

Типичным клиническим признаком абсцесса окологлоточного пространства является:

- А. А) асимметрия лица
- Б. Б) затруднение дыхания
- В. В) затруднённое открывание рта
- Г. Г) взбухание подъязычных валиков
- Д. Д) отек и гиперемия щечных областей

Ведущий симптом при вывихе нижней челюсти:

- А. А) слезотечение
- Б. Б) снижение высоты прикуса
- В. В) невозможность сомкнуть зубы
- Г. Г) гипермобильность нижней челюсти
- Д. Д) макрогнатия

При иссечении срединного свища шеи необходимо резецировать:

- А. А) щитовидный хрящ
- Б. Б) небную миндалину
- В. В) участок подъязычной кости
- Г. Г) подчелюстную слюнную железу
- Д. Д) проток подчелюстной слюнной железы

Рентгенография слюнных желез с искусственным контрастированием НЕ позволяет:

- А. А) судить о состоянии паренхимы железы
- Б. Б) выявить конкремент в протоке
- В. В) исследовать секреторную функцию железы
- Г. Г) диагностировать новообразование
- Д. Д) судить о состоянии протоков железы

Установите последовательность действий при проведении цистотомии в области зубов

3.4, 3.5,

3.6,

3.7:

А) удаление передней стенки кисты

Б) создание входного отверстия

В) отслоение слизисто-надкостничного лоскута

Г) расширение входного отверстия

Д) мобилизация лоскута

Е) введение йодоформного тампона

Ж) проведение разреза

З) проводниковая анестезия

И) эвакуация содержимого кисты

А. ЗЖБВГАИДЕ

Б. ЗЖВБГАИДЕ

В. ЗЖВБГАИЕД

Оперативный доступ при лечении абсцесса челюстно-язычного желобка заключается в разрезе:

А. А) окаймляющем угол нижней челюсти

Б. Б) слизистой оболочки челюстно-язычного желобка ближе к внутренней поверхности тела нижней челюсти

В. В) в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти

Г. Г) слизистой оболочки по крыловидно-челюстной складке

Д. Д) по переходной складке в области премоляров

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между признаками наличия ликвореи при переломе верхней челюсти и методами их верификации: Признаки

А) Наличие крови в ликворе

Б) Носовой платок, смоченный отделяемым, при высыхании остался мягким

В) Носовой платок, смоченный отделяемым, при высыхании стал жестким

Г) Отсутствие крови в ликворе

Д) При нанесении на салфетку отделяемого с примесью крови образуется красное пятно

Е) При нанесении на салфетку отделяемого с примесью крови образуется красное пятно со светлым ореолом по периферии Метод

1. Носового платка

2. Медицинской салфетки

3. Спинномозговая пункция

А. 1-А; 2-Е; 3-Б.

Б. 1-Б; 2-А; 3-Е.

В. 1-Б; 2-Е; 3-А.

Дополнительный метод исследования для диагностики переломов верхней челюсти:

- А. А) ЭОД
- Б. Б) биопсия
- В. В) рентгенография
- Г. Г) радиоизотопный
- Д. Д) цитологический

Установите последовательность манипуляций при лечении перелома нижней челюсти без смещения отломков:

- А) клиническое обследование
- Б) иммобилизация отломков
- В) рентгенологическое обследование
- Г) консультация нейрохирурга
- Д) антибактериальная терапия

А. А, В, Г, Б, Д.

Б. А, В, Д, Б, Г.

В. А, В, Г, Д, Б.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Осложнения после удаления

А) Вывихивание первого верхнего моляра начинают

Б) Вывихивание второго верхнего моляра начинают

В) Премоляры верхней челюсти

Г) Верхний центральный резец

1. Комбинируют ротационные движения и раскачивания в вестибулярную и небную стороны

2. В небную сторону

3. В щечную сторону

4. Движения производят в вестибулярную и небную сторону, первое движение наружу

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-4, Б-3, В-2, Г-1.

Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является:

- А. А) актиномикоз
- Б. Б) острая травма
- В. В) околоушный гипергидроз
- Г. Г) хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
- Д. Д) туберкулез

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и соответствующим лечением:

Заболевание

А) Обострение хронического рецидивирующего паренхиматозного паротита

Б) Острый калькулезный сиалоденит **Лечение**

1) Антибактериальное

2) Противовоспалительное

3) Десенсибилизирующее

4) Йодид калия внутрь

5) Инмтилляция протеолитических ферментов, антибиотиков

6) Хирургическое (при неэффективности консервативного)

7) Гипербарическая оксигенация

А. А-1, 2,3,4,5,7; Б-1,2,3,4,6.

Б. А-1, 2,3,4,5,7; Б-1,2,4,6.

В. А-1, 2,3,5,7; Б-1,2,3,4,6.

Появление припухлости околоушной железы при гнойно-некротическом паротите появляется на фоне:

А. А) резкого увеличения слюноотделения;

Б. Б) резкого снижения слюноотделения;

В. В) нормального выделения слюны

Г. Г) отсутствия слюноотделения

Остеосинтез по Макиенко проводится:

А. А) спицами

Б. Б) минипластинами

В. В) стальной проволокой

Г. Г) бронзо-алюминиевой лигатурой

Д. Д) компрессионно-дистракционным аппаратом

В результате воспаления в периапикальных тканях челюстей развивается:

А. А) фолликулярная киста

Б. Б) радикулярная киста

В. В) кератокиста

Г. Г) носогубная киста

Д. Д) амелобластома

Щипцы для удаления корней резцов верхней челюсти называются:

- А. А) клювовидными
- Б. Б) прямые сходящиеся
- В. В) S-образные сходящиеся
- Г. Г) S-образные - шип справа
- Д. Д) S-образные несходящиеся

Под онкологической настороженностью понимают знание:

- А. А) профессиональных вредностей
- Б. Б) допустимых доз лучевой терапии
- В. В) поздних симптомов злокачественных новообразований
- Г. Г) препаратов для лечения злокачественных новообразований
- Д. Д) системы организации помощи онкологическим больным

Причиной обострения хронического неспецифического артрита ВНЧС является:

- А. А) актиномикоз
- Б. Б) околоушный гипергидроз
- В. В) распространение инфекции из окружающих тканей
- Г. Г) хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
- Д. Д) туберкулез

К основным клиническим симптомам первичного рака нижней челюсти относят

- А. Эрозию, язву с инфильтрированными краями
- Б. Подвижность интактных зубов
- В. Обнажение кости
- Г. Гиперсаливацию

Наиболее частым осложнением затрудненного прорезывания третьего моляра является

- А. Лимфаденит
- Б. Перикоронит
- В. Сиалоаденит
- Г. Невралгия

Для 2 класса по классификации миллера характерна

- А. Циркулярная потеря десны и кости в межзубных промежутках
- Б. Рецессия во фронтальном отделе до 3 мм
- В. Рецессия (узкая и широкая) в пределах прикрепленной десны, без потери кости и десны в межзубных промежутках
- Г. Рецессия (узкая и широкая) в пределах свободной десны, без потери кости и десны в межзубных промежутках

Неблагоприятным вариантом исхода острого гнойного периостита челюсти при отсутствии хирургического лечения является распространение гноя в

- А. Мягкие ткани
- Б. Кость
- В. Пародонт
- Г. Кровеносные сосуды

Для удаления третьих верхних моляров используют

- А. Клювовидные щипцы без шипов
- Б. Штыковидный элеватор
- В. Специальные щипцы
- Г. Угловые элеваторы

Проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения обязаны медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, согласно

- А. Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ
- Б. Федеральному закону № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- В. Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
- Г. Программе добровольного медицинского страхования

Высокой активностью действия против неспорогенных анаэробов обладает

- А. Метронидазол
- Б. Офлоксацин
- В. Эритромицин
- Г. Нистатин

При одностороннем вывихе нижней челюсти подбородок смещен

- А. Симметрично вперед
- Б. Симметрично назад
- В. В противоположную от поражения сторону
- Г. В сторону поражения

Для острого одонтогенного остеомиелита челюстей к характерным признакам относят

- А. Жалобы на интенсивные боли в челюсти, возникающие приступообразно
- Б. Субфебрильную температуру тела, отсутствие нарушений общего состояния
- В. Высокую температуру тела, общее тяжелое состояние больного, подвижность причинного и соседних зубов
- Г. Жалобы на периодические ноющие боли в зубе

Анестезия у ментального отверстия наиболее эффективна при удалении

- А. Нижнего третьего моляра
- Б. Нижнего первого премоляра
- В. Верхнего второго моляра
- Г. Верхнего первого премоляра

При отсутствии положительной динамики нехирургических методов лечения при хроническом, продуктивном лимфадените необходимо

- А. Провести курс новокаиновых блокад
- Б. Провести короткофокусную рентген-терапию
- В. Удалить лимфоузел с последующим гистологическим исследованием
- Г. Провести склерозирующую терапию

Причиной ложного паротита герценберга является _____ околоушной слюнной железы

- А. Хронический интерстициальный сиалоаденит
- Б. Острый сиалоаденит
- В. Хронический паренхиматозный сиалоаденит
- Г. Острый лимфаденит в капсуле

Резекцию верхушки корня проводят

- А. Долотом
- Б. Шаровидным бором
- В. Сепарационным диском
- Г. Фиссурным бором

Осложнение при тромбофлебите угловой вены

- А. Острый гнойный верхнечелюстной синусит
- Б. Медиастинит
- В. Тромбоз пещеристого синуса
- Г. Пансинусит

Нарушение чувствительности у пациентов с переломом верхней челюсти по среднему типу отмечают в _____ области

- А. Щёчной
- Б. Подглазничной
- В. Лобной
- Г. Скуловой

К открытому остеосинтезу относят метод скрепления фрагментов челюсти

- А. С использованием внеротовых аппаратов
- Б. Без рассечения мягких тканей в области перелома
- В. С рассечением мягких тканей в области перелома
- Г. С использованием назубных стандартных шин

Суммарный объем вводимого анестетика при интралигаментарной анестезии однокорневого зуба не должен превышать (в мл)

- А. 0,06
- Б. 0,2
- В. 0,4
- Г. 0,7

Симптом венсана возникает при остеомиелите нижней челюсти в области

- А. Резцов и клыка
- Б. Премоляров и клыка
- В. Резцов и премоляров
- Г. Премоляров и моляров

После проведения мандибулярной анестезии происходит блокада

- А. Язычного и нижнего луночкового нервов
- Б. Язычного, щёчного и нижнего луночкового нервов
- В. Нижнего луночкового нерва
- Г. Щёчного и нижнего луночкового нервов

Суммарный объем вводимого анестетика при мандибулярной анестезии у взрослого пациента составляет (в мл)

- А. 0,5
- Б. 1
- В. 4
- Г. 1,7

Операция резекция верхушки корня противопоказана при

- А. Восстановлении твердых тканей зуба временной коронкой
- Б. Глубоком пародонтальном кармане
- В. Наличии ортодонтического ретейнера
- Г. Наличии культевой вкладки

Блокаду задних верхних луночковых нервов обеспечивает анестезия

- А. Туберальная
- Б. Поднадкостничная
- В. Инфраорбитальная
- Г. Палатинальная

Суставная щель внчс рентгенологически не прослеживается при

- А. Костном анкилозе
- Б. Хроническом артрите
- В. Артрозе
- Г. Фиброзном анкилозе

Основным патогенетическим фактором в течение фиброзной дисплазии является

- А. Острый пульпит
- Б. Перелом челюсти
- В. Рецидив кисты
- Г. Очаговое нарушение костеобразования

Забор аутооттрансплантата проводится в области

- А. Кожы
- Б. Слизистой щеки
- В. Переходной складки
- Г. Неба

Вторая ветвь тройничного нерва называется _____ нерв

- А. Подглазничный (n. infraorbitalis)
- Б. Глазной (n. ophtalmicus)
- В. Нижнечелюстной (n. mandibularis)
- Г. Верхнечелюстной (n. maxillaries)

Огнестрельные переломы челюсти всегда сопровождаются повреждением мягких тканей и являются

- А. Открытыми и всегда инфицированными
- Б. Инфицированными только при попадании в рану инородных предметов
- В. Сквозными и всегда инфицированными
- Г. Инфицированными только в случае вторичного инфицирования

Основным клиническим признаком калькулезного сиалоаденита является

- А. Припухание железы во время приема пищи
- Б. Воспаление устья протока
- В. Гиперсаливация
- Г. Гипосаливация

Характерной особенностью клинической картины ангины Людвига является

- А. Вид рожистого воспаления слизистой оболочки полости рта
- Б. Обильное гнойное отделяемое после вскрытия гнойного очага
- В. Гнилостно-гангренозная флегмона дна полости рта
- Г. Ограниченный воспалительный инфильтрат корня языка

К причинам рарефицирующего периостита относят

- А. Кисты челюстей
- Б. Травму
- В. Воспалительные процессы в верхнечелюстных пазухах
- Г. Периодонтитные зубы

Гемисекцией зуба называется

- А. Пересадка удаленного зуба в его же альвеолу
- Б. Удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба;
- В. Удаление верхушки корня зуба
- Г. Удаление корня вместе с прилегающей к нему коронковой частью зуба

Цитологическая картина при язвенной форме рака слизистой оболочки характеризуется наличием клеток

- А. Эпителия атипичных
- Б. Акантолитических
- В. Лангханса
- Г. Плазматических, лимфоидных элементов

Эмболизацию сосудистых мальформаций проводят с помощью препарата

- А. Галотан
- Б. Фибро-вейн
- В. Гидрозин
- Г. Спирт

Форма эозинофильной гранулемы

- А. Кистозная
- Б. Деструктивную
- В. Очаговая
- Г. Литическая

Диагноз «актиномикоз» устанавливается на основании

- А. Рентгенологических данных
- Б. Клинического анализа крови
- В. Цитологического исследования
- Г. Серологического исследования

Местным анестетиком, обладающим высокой кардиотоксичностью, является

- А. Прокаин (новокаин)
- Б. Мепивакаин
- В. Бупивакаин
- Г. Артикаин

Под вестибулопластикой понимается

- А. Пластика преддверия полости рта
- Б. Трансплантация соединительнотканного лоскута с бугра верхней челюсти или твердого неба
- В. Пластика уздечки губы
- Г. Пластика уздечки языка

Двухэтапная цистотомия на верхней челюсти проводится, когда киста больших размеров

- А. Разрушает костное дно полости носа
- Б. Прорастает поднадкостнично
- В. Прорастает в верхнечелюстную пазуху
- Г. Располагается в области премоляров

К вторичному туберкулёзному поражению челюстей может привести активный туберкулёз

- А. Слюнных желёз
- Б. Лёгких
- В. Печени
- Г. Почек

В отличие от перелома верхней челюсти при переломе скуловой кости отсутствует

- А. Кровоизлияние в слизистую оболочку по верхнему своду
- Б. Нарушение воздушности верхнечелюстной пазухи
- В. Нарушение прикуса
- Г. Онемение кожи в подглазничной области

В хронической стадии одонтогенного остеомиелита нижней челюсти следует опасаться

- А. Сиаденита поднижнечелюстной железы
- Б. Аденофлегмоны (поднижнечелюстных лимфатических) узлов
- В. Патологического перелома
- Г. Травматического перелома

Специальным аппаратом для проведения операции имплантации является

- А. Коагулятор
- Б. Диодный лазер
- В. Физиодиспенсер
- Г. ИВЛ

Норадреналин вызывает _____ артерий и _____ вен

- А. Спазм; расширение
- Б. Расширение; расширение
- В. Спазм; спазм
- Г. Расширение; спазм

Общими принципами лечения больных с переломами челюстей являются

- А. Медикаментозное лечение и физиотерапия
- Б. Хирургическое лечение
- В. Репозиция фрагментов, медикаментозное лечение
- Г. Репозиция, фиксация, иммобилизация фрагментов челюстей

Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении

- А. Формируется (выдается) на 10 дней
- Б. Формируется (выдается) на 7 дней
- В. Не формируется (не выдается)
- Г. Формируется (выдается) на 3 дня

Ведущим симптомом анкилоза височно-нижнечелюстного сустава является

- А. Резкое ограничение подвижности нижней челюсти
- Б. Шум в ушах при резком повороте/наклоне головы
- В. Множественный, быстро прогрессирующий, пришеечный кариес
- Г. Нарушение глотания в утренние часы и после нагрузки на сустав

Медицинской организации присваивается статус клинической, если на базе организации

- А. Проводится подготовка информационно-аналитических материалов
- Б. Проводятся клинические испытания
- В. Осуществляется практическая подготовка медицинских работников
- Г. Ведется научно-исследовательская деятельность

Наружные межмышечные промежутки дна полости рта располагаются между

- А. Челюстно-подъязычной мышцей и слизистой оболочкой дна полости рта
- Б. Подбородочно-язычной и подъязычно-язычной мышцами
- В. Челюстно-подъязычной мышцей и передними брюшками двубрюшных мышц
- Г. Подбородочно-язычными мышцами

К анатомическим нарушениям верхней челюсти при верхней микрогнатии относят

- А. Сагиттальный сдвиг
- Б. Смещение кзади
- В. Недоразвитие
- Г. Несимметричную деформацию

Штыковидным элеватором (элеватором леклюза) удаляют зубы нижней челюсти

- А. Первый моляр
- Б. Третий моляр
- В. Премоляр
- Г. Резец

Отдаленным местным осложнением флегмоны крыловидно-челюстного пространства является

- А. Абсцесс головного мозга
- Б. Мышечная контрактура
- В. Менингоэнцефалит
- Г. Рубцовый выворот верхней губы

Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания, является

- А. Клиентом
- Б. Получателем медицинских услуг
- В. Пациентом
- Г. Пострадавшим

При проведении мандибулярной анестезии способом пальпации скос карпульной иглы ориентирован в сторону

- А. Альвеолярной части
- Б. Ветви нижней челюсти
- В. Зубной дуги
- Г. Ротоглотки

Осложнением воспалительного характера при переломах челюстей является

- А. Периостит
- Б. Нагноение костной раны
- В. Рожистое воспаление
- Г. Фурункулез

Актиномикоз является

- А. Специфическим воспалительным процессом
- Б. Неспецифическим воспалительным процессом
- В. Опухолеподобным процессом
- Г. Пороком развития тканей

Пунктат врождённой кисты шеи вне воспаления имеет вид

- А. Геморрагического экссудата
- Б. Серозно-гнойного экссудата
- В. Прозрачной опалесцирующей жидкости
- Г. Мутной жидкости

К наиболее оптимальным проекциям для лучевой диагностики повреждения тела нижней челюсти относят

- А. Аксиальную, полуаксиальную
- Б. Прямую, боковую
- В. Носо-подбородочную, полуаксиальную
- Г. Панорамную томограмму челюстных костей

При правильном положении третьего моляра и перикороните производится

- А. Аппликация лидокаина
- Б. Иссечение капюшона
- В. Удаление зуба
- Г. Секвестрэктомия

Наиболее частым осложнением затрудненного прорезывания третьего моляра является

- А. Сиалоаденит
- Б. Лимфаденит
- В. Невралгия
- Г. Перикоронит

При перфорации дна верхнечелюстной пазухи после удаления зуба при наличии отделяемого из пазухи необходимо

- А. Провести радикальную верхнечелюстную синусотомию амбулаторно
- Б. Проводить антисептические промывания пазухи до стихания воспаления, затем дообследовать состояние пазухи
- В. Промыть пазуху, мобилизовать лоскут со щеки и ушить наглухо
- Г. Промыть пазуху, затампонировать лунку зуба, зафиксировать направляющие швы

Безработному листок нетрудоспособности

- А. Выдаётся при наличии у него документа о постановке на учёт по безработице
- Б. Выдаётся только при ургентном заболевании
- В. Выдаётся в случае госпитализации
- Г. Не выдаётся

Удаление резцов верхней челюсти выполняют _____ щипцами

- А. Прямыми корневыми
- Б. Клювовидными корневыми
- В. Прямыми коронковыми
- Г. Изогнутыми по плоскости

Щипцы для удаления резцов верхней челюсти

- А. Изогнутые по плоскости
- Б. S-образные с несходящимися щечками
- В. Клювовидные корневые
- Г. Прямые коронковые

При ушивании раны после удаления ретенционных кист используют шов

- А. Косметический
- Б. Кисетный
- В. Узловой
- Г. П-образный

К химическим методам стерилизации относится

- А. Паровой
- Б. Жидкостный
- В. Инфракрасный
- Г. Гласперленовый

Аспирационную пробу проводят для

- А. Профилактики травмы нерва иглой
- Б. Уменьшения отека тканей
- В. Снижения вероятности внутрисосудистого введения анестетика
- Г. Снижения расхода анестетика

Особенности ожогов лица заключаются в

- А. Пигментации
- Б. Значительной аутоинтоксикации
- В. Неравномерном поражении различных отделов кожи лица
- Г. Течении раневого процесса

Для стимулирования цементагенеза применяется

- А. Лимонная кислота
- Б. Тетрациклин
- В. ЭДТА
- Г. Emdogain

Лечение гипертрофического гингивита включает в себя

- А. Антибиотикотерапию
- Б. Гингивэктомию
- В. Открытый кюретаж
- Г. Санация полости рта

Неправильное сращение фрагментов при переломе нижней челюсти происходит вследствие

- А. Скученного положения зубов
- Б. Наличия сопутствующих заболеваний у пострадавшего
- В. Отсутствия репозиции и иммобилизации фрагментов
- Г. Полной адентии челюстей

Ампутация корня зуба включает

- А. Удаление корня вместе с прилегающей к нему коронковой частью зуба
- Б. Удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба
- В. Рассечение зуба на две части (применяется при лечении моляров) в области бифуркации с последующим сглаживанием нависающих краев
- Г. Пересадку удаленного зуба в его же альвеолу

Величина рецессии при клиническом обследовании определяется

- А. Расстоянием от эмалево-цементной границы до уровня гребня десневого края
- Б. Глубиной зондирования десневой борозды
- В. Расстоянием от эмалево-цементной границы до дна кармана при зондировании
- Г. Глубиной зондирования кармана

Доля встречаемости калькулезного сиалоаденита от общего числа неопухолевых заболеваний слюнных желез составляет в среднем

- А. 70%
- Б. 85%
- В. 95%
- Г. 30%

Признание человека инвалидом возможно только при проведении экспертизы

- А. Трудоспособности
- Б. Военно-врачебной
- В. Медико-социальной
- Г. Судебно-медицинской

Для рентгенологического симптома остеолизиса характерно

- А. Уплотнение костной ткани
- Б. Наличие инородного тела в костной ткани
- В. Уменьшение числа костных балок
- Г. Отсутствие части кости

При остром гнойном периостите проводят

- А. Антибиотикотерапию
- Б. Комплексное лечение
- В. Оперативное лечение
- Г. Лекарственную терапию

Травматическую язву дифференцируют с

- А. Эрозивно-язвенной формой плоского лишая
- Б. Раковой язвой
- В. Аллергическим стоматитом
- Г. Многоформной экссудативной эритемой

Механизм дистракционного остеогенеза запускается на этапе компрессии

- А. Лифоцитами
- Б. Фибробластами
- В. Морфогенетическими белками
- Г. Остеобластами

При контакте раны с землей пациенту в обязательном порядке необходимо сделать инъекцию

- А. Антирабической вакцины
- Б. Актинолизата
- В. Альфа-глобулина
- Г. Противостолбнячной сыворотки

При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности формируется и продлевается на срок не более ____ месяцев с даты начала временной нетрудоспособности и не более ____ месяцев при лечении туберкулеза

- А. 6; 8
- Б. 12; 14
- В. 4; 5
- Г. 10; 12

Главную опасность в ближайшие часы после ранений языка, мягкого неба, тканей дна полости рта для жизни пациента представляет

- А. Столбняк
- Б. Нарушение речи
- В. Асфиксия
- Г. Сепсис

Показанием к операции цистотомии является наличие

- А. Кисты, в полость которой проецируется не более 3-х корней зубов
- Б. Обширных кист нижней челюсти с истончением ее основания
- В. Кисты как следствие порока развития одонтогенного эпителия
- Г. Кисты верхней челюсти с отсутствием зубов в ее зоне и сохранением костных стенок

При операции удаления корней центральных резцов верхней челюсти применяют

- А. Клювовидные щипцы со сходящимися щечками
- Б. S-образные щипцы
- В. Штыковидный элеватор
- Г. Прямые щипцы со сходящимися щечками

Вероятной одонтогенной причиной формирования субпериостального абсцесса является

- А. Обострение гранулирующего периодонтита
- Б. Острый пульпит
- В. Повреждение эмали зуба
- Г. Глубокий кариес

Дополнительным методом обследования при ангиовенозной мальформации является

- А. Ангиография
- Б. Сцинтиграфия
- В. Общий анализ крови
- Г. УЗИ вен нижних конечностей

Основным методом лечения очаговой формы эозинофильной гранулемы является

- А. Выскабливание опухоли
- Б. Химиотерапия
- В. Резекция челюсти с одномоментной костной пластикой
- Г. Блок-резекция челюсти

Сочетание ксеростомии и ксерофтальмии и болей в суставах наиболее характерно для

- А. Синдрома Шегрена
- Б. Болезни Крона
- В. Болезни Лайма
- Г. Синдрома Иценко-Кушинга

Для определения регенерации костной ткани после цистэктомии используется

- А. Компьютерная томография
- Б. ПЭТ КТ
- В. УЗИ
- Г. Сцинтиграфия

Ток дарсонваля способен

- А. Снижать регенерацию
- Б. Снижать чувствительность нервных рецепторов кожи
- В. Угнетать процессы обмена
- Г. Вызывать раздражение рецепторов в мышце, вызывая её сокращение

Рак заднего отдела дна полости рта на ранних стадиях метастазирует в

- А. Глубокие шейные лимфоузлы
- Б. Заглоточные и шейные лимфоузлы
- В. Легкие и кости гематогенным путем
- Г. Шейные лимфоузлы

При блокаде передней верхней альвеолярной ветви наступает обезболивание

- А. Премоляров и первого моляра
- Б. Моляров
- В. Резцов и клыков
- Г. Премоляров

Одним из эффективных неинвазивных методов диагностики и мониторинга процесса развития и инволюции инфантильной гемангиомы является метод

- А. Реовазографии
- Б. Гистологического исследования
- В. Компьютерной капилляроскопии
- Г. Ангиографии

Подвижность корня на всём протяжении при бимануальной пальпации указывает на

- А. Полный вывих зуба
- Б. Подвывих зуба
- В. Перелом альвеолярного отростка
- Г. Неполный вывих зуба

При фолликулярных кистах используется лечение

- А. Лучевой терапией
- Б. Оперативное
- В. Комбинированное
- Г. Медикаментозное

Для ушиба характерно

- А. Нарушение чувствительности
- Б. Наличие гематомы, целостность кожи не нарушена
- В. Нарушение целостности кости
- Г. Нарушение целостности кожи, кровотечение

Возмещение вреда, причиненного здоровью пациента врачом лечебного учреждения в результате оказания некачественной медицинской услуги, подлежит возмещению

- А. Страховой медицинской организацией, с которой у ЛПУ заключен договор в рамках обязательного медицинского страхования
- Б. Врачом, причинившим вред здоровью пациента
- В. Фондом обязательного медицинского страхования
- Г. Лечебным учреждением, где оказывалась медицинская услуга

Максимальный срок, на который может выдать листок нетрудоспособности семейный врач, составляет (в днях)

- А. 20
- Б. 15
- В. 10
- Г. 5

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Хирургический метод иммобилизации переломов челюстных костей:

- А. дуга Энгля
- Б. наложение шины Васильева
- В. метод Фальтина-Адамса
- Г. наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
- Д. остеосинтез по Макиенко

Для удаления корней резцов верхней челюсти используют:

- А. прямой элеватор
- Б. клювовидные щипцы
- В. клювовидные с шипом
- Г. S-образные сходящиеся
- Д. S-образные несходящиеся

Установите последовательность обследования пациента при вывихе зуба:

- А) сбор жалоб**
 - Б) объективный осмотр**
 - В) рентгенологическое обследование**
 - Г) ЭОД**
 - Д) сбор анамнеза**
- А. А, Д, Б, В, Г.
Б. А, Д, Б, Г, В.
В. А, В, Г, Б, Д.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между манипуляцией и используемым инструментом:

Манипуляция

А) Для удаления зубов на нижней челюсти с сохраненными коронками используют.

Б) Для удаления зубов

3.8,

4.8 используют.

В) Для удаления дистального корня зуба

4.7 используют.

Г) Для удаления

3.6 и

4.6 зубов с разрушенной коронкой наиболее приемлемы. инструмент

1. Клювовидные щипцы, изогнутые по плоскости.

2. Элеваторы от себя и к себе.

3. Клювовидные шпигцы с несходящимися щечками.

4.Клювовидные щипцы со сходящимися щечками.

А. А-3, Б-1, В-4, Г-2.

Б. А-3, Б-1, В-2, Г-4.

В. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Перфорация дна верхнечелюстной пазухи возникает вследствие:

- А. грубой техники удаления зуба
- Б. низкого расположения дна пазухи и прилегания его к верхушкам корней зубов
- В. деструкция нижней стенки пазухи вследствие периодонтита
- Г. все ответы верные
- Д. деструкция нижней стенки пазухи вследствие образования одонтогенных кист

Основной причиной развития анкилоза ВНЧС является:

- А. артрит
- Б. опухоль
- В. мастоидит
- Г. околоушный гипергидроз
- Д. целлюлит околоушно-жевательной области

Ороназальная цистотомия проводится при:

- А. радикулярных кистах верхней челюсти, проникающих в верхнечелюстной синус
- Б. радикулярных кистах, проникающих в полость носа
- В. резидуальных кистах
- Г. кистах верхней челюсти в пределах двух зубов
- Д. кератокистах нижней челюсти

Ортопедические методы иммобилизации переломов верхней челюсти:

- А. дуга Энгля
- Б. остеосинтез
- В. аппарат Збаржа
- Г. наложение бимаксиллярных шин с працевидной повязкой
- Д. шина Вебера

Под онкологической настороженностью понимают знание:

- А. профессиональных вредностей
- Б. препаратов для лечения опухолей
- В. допустимых доз лучевой терапии
- Г. специальных методов обследования, ранней диагностики
- Д. методов хирургического лечения

В результате нарушения протокола операции удаления зуба образуется:

- А. фолликулярная киста
- Б. радикулярная киста
- В. резидуальная киста
- Г. амелобластома
- Д. кератокиста

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и соответствующим лечением:

Заболевание

А) Обострение хронического рецидивирующего паренхиматозного паротита

Б) Острый калькулезный сиалоденит **Лечение**

1) Антибактериальное

2) Противовоспалительное

3) Десенсибилизирующее

4) Йодид калия внутрь

5) Инмтиляция протеолитических ферментов, антибиотиков

6) Хирургическое (при неэффективности консервативного)

7) Гипербарическая оксигенация

А. А-1, 2,3,4,5,7; Б-1,2,3,4,6.

Б. А-1, 2,3,4,5,7; Б-1,2,4,6.

В. А-1, 2,3,5,7; Б-1,2,3,4,6.

Типичным клиническим признаком периостита является:

А. асимметрия лица

Б. подвижность всех зубов

В. затруднённое открывание рта

Г. выбухание подъязычных валиков

Д. гиперемия и отек переходной складки

Клиническая картина бородавчатого предрака красной каймы губ характеризуется наличием:

А. 2-3 эрозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации

Б. эрозивной поверхностью с инфильтрацией подлежащих тканей

В. атрофичных уплощенных бляшек покрытых корками, "географический" рисунок

Г. ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими, плотно сидящими чешуйками

Д. болезненного узла с бугристой поверхностью, возвышающегося над эпителием на 3-5 мм

Наружное отверстие бокового свища шеи располагается в:

А. носоглотке

Б. щечной области

В. подъязычной области

Г. области корня языка

Д. поднижнечелюстной области

При неблагоприятном течении абсцесса крыло-небной ямки инфекция распространяется в:

- А. лобные синусы
- Б. заднее средостение
- В. переднее средостение
- Г. полость внутреннего уха
- Д. околоушную слюнную железу

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между локализацией кисты и возможным осложнением во время операции: Локализация кист

А) Радикулярная киста в области зубов

1.1,1.2

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8

В) Радикулярная киста в области зубов

1.6,

1.7

Г) Радикулярная киста в области зубов

4.5,

4.4 Осложнения во время операции

1. Травма подбородочного нерва

2. Перфорация дна носовых полостей

3. Перелом нижней челюсти

4. Перфорация дна верхнечелюстного синуса

А. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Причиной хронического неспецифического артрита ВНЧС является:

- А. актиномикоз
- Б. острая травма
- В. околоушный гипергидроз
- Г. хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
- Д. туберкулез

Под онкологической настороженностью понимают знание:

- А. профессиональных вредностей
- Б. допустимых доз лучевой терапии
- В. поздних симптомов злокачественных новообразований
- Г. препаратов для лечения злокачественных новообразований
- Д. системы организации помощи онкологическим больным

Среди осложнений эпидемического паротита не бывает:

- А. менингита
- Б. аметропии
- В. пневмонии
- Г. отита
- Д. орхита

Основным симптомом перелома верхней челюсти является:

- А. головная боль
- Б. носовое кровотечение
- В. патологическая подвижность нижней челюсти
- Г. патологическая подвижность верхнечелюстных костей
- Д. разрывы слизистой оболочки альвеолярных отростков

При отсутствии кровяного сгустка в лунке удаленного зуба развивается:

- А. синусит
- Б. альвеолит
- В. неврит лицевого нерва
- Г. невралгия тройничного нерва
- Д. сиагоденит

Основным методом лечения кист небольшого размера является:

- А. цистэктомия
- Б. склерозирующая терапия
- В. половинная резекция челюсти
- Г. частичная резекция челюсти
- Д. цистотомия

Щипцы для удаления первого и второго правых моляров верхней челюсти называются s-образными:

- А. сходящимися
- Б. с шипом слева
- В. несходящимися
- Г. с шипом справа
- Д. прямыми несходящимися

К отдаленным осложнениям после операции удаления третьего нижнего моляра относятся:

- А. невралгия тройничного нерва
- Б. отлом бугра верхней челюсти
- В. неврит тройничного нерва
- Г. синусит
- Д. анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

Основным методом лечения врожденных кист и свищей шеи является:

- А. криотерапия
- Б. химиотерапия
- В. лучевая терапия
- Г. динамическое наблюдение
- Д. оперативное вмешательство

В результате развития нарушения эмалевого органа в челюстных костях развивается:

- А. радикулярная киста
- Б. фолликулярная киста
- В. кератокиста
- Г. киста резцового канала
- Д. резидуальная киста

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Осложнения

- А) Невропатия**
- Б) Проталкивание корня в верхнечелюстной синус**
- В) Аспирация зуба**
- Г) Перелом нижней челюсти Причина осложнений**

- 1. Работа элеватором при отсутствии фиксации удаляемого зуба пальцами левой руки**
- 2. Грубая работа щипцами и элеватором при удалении**
- 3. Чрезмерное давление элеватора**
- 4. Проталкивание корня в нижнечелюстной канал**

- А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.
- Б. А-4, Б-3, В-2, Г-1.
- В. А-4, Б-3, В-1, Г-2.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между признаками наличия ликвореи при переломе верхней челюсти и методами их верификации: Признаки

А) Наличие крови в ликворе

Б) Носовой платок, смоченный отделяемым, при высыхании остался мягким

В) Носовой платок, смоченный отделяемым, при высыхании стал жестким

Г) Отсутствие крови в ликворе

Д) При нанесении на салфетку отделяемого с примесью крови образуется красное пятно

Е) При нанесении на салфетку отделяемого с примесью крови образуется красное пятно со светлым ореолом по периферии Метод

1. Носового платка

2. Медицинской салфетки

3. Спинномозговая пункция

А. 1-А; 2-Е; 3-Б.

Б. 1-Б; 2-А; 3-Е.

В. 1-Б; 2-Е; 3-А.

Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать с:

А. острым синуситом

Б. околоушным гипергидрозом

В. переломом верхней челюсти

Г. флегмоной поднижнечелюстной области

Д. переломом мыщелкового отростка нижней челюсти

Для создания оттока из верхнечелюстного синуса при остром одонтогенном синусите проводится:

А. удаление «причинного» зуба и создание сообщения через лунку

Б. радикальную синусотомию

В. разрез в области переходной складки на уровне моляров верхней челюсти

Г. щадящую синусотомию

Д. эндодонтическое лечение «причинного» зуба

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между оперативным вмешательством и показанием к нему:

Оперативное вмешательство

- А) Цистотомию в детском возрасте проводят
Б) Цистотомию при ретенции и дистопии клыка проводят
В) Цистотомию у пожилых людей проводят
Г) Цистотомию, с последующим изготовлением obturatora проводят

- Показания**
1. Для исключения второго этапа оперативного вмешательства
 2. Во избежание травмы зачатков зубов
 3. С целью сохранения зуба и дальнейшего ортодонтического лечения
 4. При наличии сопутствующей патологии

А. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В результате воспаления в периапикальных тканях развивается:

- А. фолликулярная киста
Б. радикулярная киста
В. кератокиста
Г. носогубная киста
Д. амелобластома

Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является:

- А. шум в ушах
Б. нарушение глотания
В. множественный кариес
Г. выраженный болевой симптом
Д. резкое ограничение подвижности нижней челюсти

По происхождению верхнечелюстной синусит бывает:

- А. одонтогенным
Б. полипозным
В. хроническим
Г. острым
Д. диффузным

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и соответствующему патогенезу:

Заболевание

А) Интрестициальный сиаладенит

Б) Паренхиматозный сиаладенит Патогенез

1) Рыхлая соединительная ткань в междольковых прослойках

2) Паренхима железы замещена диффузными скоплениями лимфоидных элементов

3) Липоматозная атрофия долек железы

4) Сужение щелевидных просветов некоторых протоков с об-разованием фиброзных муфт

5) Отек и ангиоматоз в междольковых прослойках

6) Вокруг долек железы формируются диффузные, плотные: лимфогистиоцитарные инфильтраты

7) Эпителиальные клетки ацинусов имеют преимущественнф цилиндрическую форму, цитоплазма их вакуолизирована за счет накопления белкового секрета

А. А-1,2,3,4; Б-5, 6, 7.

Б. А-1,2,3; Б-4,5, 6, 7.

В. А-1,2,3,4,5; Б-6, 7.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между манипуляцией и способом проведения:

Манипуляция

А) Сразу после сложного удаления зуба

4.8 следует назначить.

Б) При удалении зуба на нижней челюсти больного усаживают.

В) При удалении зубов на верхней челюсти больного усаживают.

Г) После сложного удаления зуба

4.8 назначают. Способ проведения

1. На уровне локтевого сустава опущенной руки хирурга.

2. На уровне плечевого сустава руки доктора.

3. Антибактериальную и противовоспалительную терапию.

4. Холод на область угла нижней челюсти.

А. А-1, Б-4, В-2, Г-3.

Б. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-3, Г-2.

После наложения бимаксиллярных шин с зацепными петлями резиновые кольца (тягу) меняют:

- А. ежедневно
- Б. ежемесячно
- В. еженедельно
- Г. 3 раза в месяц
- Д. 2 раза в неделю

Возможное осложнение во время операции удаления моляров верхней челюсти:

- А. невралгия тройничного нерва
- Б. паротит
- В. перфорация дна верхнечелюстного синуса
- Г. артрит височно-нижнечелюстного сустава
- Д. неврит тройничного нерва

К дополнительным методам исследования, проводимым для морфологической верификации диагноза "злокачественное новообразование челюстно-лицевой области" относится:

- А. физикальный
- Б. биохимический
- В. цитологический
- Г. иммунологический
- Д. ангиографический

Фолликулярную кисту необходимо дифференцировать с:

- А. одонтомой
- Б. амелобластомой
- В. цементомой
- Г. репаративной гранулемой
- Д. твердой одонтомой

После вскрытия поднадкостничного абсцесса при лечении периостита дренирование раны проводится:

- А. на 2 день
- Б. на 3 день
- В. на 4 день
- Г. сразу после разреза
- Д. на 5 день

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом:

Клинические показатели

А) Носовое кровотечение

Б) Гематома слизистой полости рта

В) Нарушение прикуса

Г) Симптом очков

Д) Уплотнение скуловой области

Е) Искривление спинки носа

1. Перелом костей носа

2. Перелом нижней челюсти

3. Перелом верхней челюсти

4. Перелом скуловой кости

А. 1-А,Е; 2-Б,В; 3-Б,В,Г; 4-Б,Д.

Б. 1-А,Е; 2-Б,В; 3-Б,В; 4-Б,Д,Г.

В. 1-А; 2-Б,В; 3-Б,В,Г; 4-Б,Д,Е.

Для ускорения абсцедирования назначают:

А. парафинотерапия

Б. грязевые аппликации

В. УВЧ в нетепловой дозе

Г. УВЧ в слаботепловой дозе

Д. УФО в субэритемных дозах

О наличии ликвореи при кровотечении из носа или наружного слухового прохода свидетельствует:

А. симптом Малевича

Б. положительная реакция Вассермана

В. положительный тест двойного пятна

Г. снижение количества альбуминов в крови

Д. наличие крепитации в области сосцевидных отростков

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между осложнением и причиной его возникновения:

Осложнения

- А) Отлом коронки удаляемого зуба**
 - Б) Вывих или перелом соседнего зуба**
 - В) Повреждение десны и мягких тканей полости рта**
 - Г) Проталкивание корня зуба в мягкие ткани**
- Причины**

- 1. Захват щипцами слизистой**
- 2. Недостаточное продвижение щечек щипцов**
- 3. Чрезмерное продвижение щипцов при анатомической близости верхнечелюстного синуса**
- 4. Грубая работа элеватора**

А. А-2, Б-1, В-3, Г-4.

Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

В. А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Лечение при вывихе нижней челюсти заключается в:

- А. иммобилизации
- Б. резекции суставного бугорка
- В. прошивании суставной капсулы
- Г. резекции мышечковых отростков нижней челюсти
- Д. введении суставной головки в суставную впадину

Боковая киста шеи локализуется:

- А. по средней линии шеи
- Б. в подподбородочной области
- В. в поднижнечелюстной области
- Г. по переднему краю трапецевидной мышцы
- Д. в средней трети шеи, по переднему краю кивательной мышцы

Типичный оперативный доступ при лечении периостита заключается в разрезе:

- А. окаймляющем угол нижней челюсти
- Б. в подподбородочной области по средней линии
- В. слизистой оболочке по крыло-челюстной складке
- Г. слизистой и надкостницы по переходной складке
- Д. в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти

Для рентгенологической картины фолликулярной кисты характерна деструкция костной ткани:

- А. в виде тающего сахара
- Б. с четкими контурами и тенью зуба в полости
- В. в виде матового стекла
- Г. с нечеткими границами в области образования
- Д. в виде ячеистой структуры

При подозрении на злокачественную опухоль челюстно-лицевой области больного необходимо направить к:

- А. районному онкологу
- Б. специалисту-радиологу
- В. участковому терапевту
- Г. хирургу общего профиля
- Д. специалисту-стоматологу

К предраковым заболеваниям красной каймы губ относятся:

- А. рожистое воспаление
- Б. термические и химические ожоги
- В. бородавчатый предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, хейлит Манганотти
- Г. болезнь Боуэна, пигментная ксеродерма актинический кератоз, предраковый меланоз
- Д. эритроплакия, лейкоплакия, красная волчанка, плоский лишай, подслизистый фиброз

При эпидемическом паротите поражаются слюнные железы:

- А. малые
- Б. околоушные
- В. подъязычные
- Г. поднижнечелюстные
- Д. большие

Радикальная синусотомия отличается от щадящей синусотомии:

- А. наложением широкого сообщения с полостью носа
- Б. дополнительными методами обследования
- В. пластикой ороантрального сообщения
- Г. местной анестезией
- Д. удалением или лечением «причинных» зубов

Цистотомия показана при:

- А. радикулярных кистах в пределах двух зубов
- Б. носонебной кисте
- В. кисте, проникающей в нижнечелюстной канал
- Г. кисте резцового канала
- Д. радикулярных кистах в пределах одного зуба

Показания к цистотомии:

- А. киста в пределах одного зуба
- Б. киста в пределах двух зубов
- В. киста, проникающая в полость носа
- Г. киста в пределах трех зубов
- Д. в полости кисты находятся несколько депульпированных зубов

Срединная киста шеи локализуется:

- А. по средней линии шеи
- Б. в области яремной вырезки
- В. в поднижнечелюстной области
- Г. по переднему краю трапецевидной мышцы
- Д. по переднему краю кивательной мышцы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и лечением: Заболевание

А) Пробождение дна верхнечелюстного синуса во время удаления зуба

Б) Невропатия

В) Аспирация зуба или корня

Г) Отлом альвеолярного отростка челюсти Лечение

1.анальгетики, физиолечение, витамины группы В

2. срочная госпитализация для бронхоскопии и удаления зуба из дыхательных путей

3. удаляют, а слизистую ушивают

4.наложение йодоформной турунды на устье лунки и фиксация щваами

А. А-4, Б-2, В-1, Г-3

Б. А-4, Б-1, В-2, Г-3

В. А-4, Б-1, В-3, Г-2

Для удаления корней резцов верхней челюсти используют:

- А. элеватор Леклюза
- Б. прямые щипцы с несходящимися щёчками
- В. прямые щипцы со сходящимися щечками
- Г. элеватор от себя
- Д. элеватор к себе

Синусотомия не проводится при:

- А. острым синусите
- Б. хроническом полипозном синусите
- В. травматическом синусите
- Г. частых рецидивах синусита вне периода обострения
- Д. обширных ретенционных кистах верхнечелюстных пазух

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Заболевание

А) Хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит

Б) Хронический калькулёзный сиалоденит Клиническая картина

1) Чередование периодов обострения с ремиссией

2) Как правило, поражается одна железа

3) Боль перед или во время еды

4) На контрастной сиалогамме основной выводной проток расширен, вместо протоков 3-4 порядка

5) На контрастной сиалогамме проток «разорван», на остальном протяжении протоки, резко расширены

6) Обострения заболевания часто

А. А- 1,4,7; Б-1,2,3,5.

Б. А- 1,3,4,7; Б-1,2,5.

В. А- 1,2,4,7; Б-1,3,5.

Зондирование протока не позволяет определить:

- А. наличие сужения или его полного заращения
- Б. направление хода протока железы
- В. присутствие в протоке конкремента и место его расположения
- Г. наличие и характер новообразования
- Д. проходимость протока

Основным клиническим проявлением радикулярной кисты нижней челюсти является:

- А. боль
- Б. симптом Венсана
- В. нарушение глотания
- Г. плотное обызвествленное образование
- Д. безболезненная деформация в виде вздутия

Осложнения, возникающие во время операции удаления зуба:

- А. синусит
- Б. периостит
- В. альвеолит
- Г. остеомиелит
- Д. перелом коронки или корня зуба

Клиническая картина предракового гиперкератоза характеризуется наличием:

- А. 2-3 эрозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации
- Б. эрозивной поверхностью с инфильтрацией подлежащих тканей
- В. атрофичных уплощенных бляшек покрытых кор- ками, "географический" рисунок
- Г. ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими, плотно сидящими чешуйками
- Д. болезненного узла с бугристой поверхностью, возвышающегося над эпителием на 3-5 мм

Причиной развития острого одонтогенного остеомиелита челюстей является воспалительный процесс в:

- А. лимфоузлах
- Б. слюнных железах
- В. периапикальных тканях
- Г. верхнечелюстной пазухе
- Д. линии перелома челюсти

Прямыми щипцами удаляют:

- А. вторые моляры верхней челюсти
- Б. премоляры верхней челюсти
- В. третьи моляры нижней челюсти
- Г. резцы верхней челюсти
- Д. резцы нижней челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом:

Клинические показатели:

А) Разрыв слизистой полости рта

Б) Гематома слизистой полости рта

В) Нарушение прикуса

Г) Нарушение положения зуба

Д) Уплотнение скуловой области

Е.) Удлинение нижней трети лица

Диагноз:

1. Вывих зуба

2. Перелом альвеолярного отростка

3. Перелом нижней челюсти

4. Перелом верхней челюсти

5. Перелом скуловой кости

А. 1-А, Б, В, Г; 2-А,Б; 3- А,Б,В; 4- А,Б,В,Е; 5- Б,Д.

Б. 1-А, Б, В, Г; 2-А,Б,В; 3- А,Б,В; 4- А,Б,Е; 5- Б,Д.

В. 1-А, Б, В, Г; 2-А,Б,В; 3- А,Б,В; 4- А,Б,В,Е; 5- Б,Д.

Инкубационный период при эпидемическом паротите колеблется:

А. от 1 до 2 дней

Б. от 3 до 10 дней

В. от 11 до 23 дней

Г. от 30 до 60 дней

Д. от 30 до 90 дней

Показанием к удалению зуба является:

А. острый пульпит

Б. острый периодонтит

В. средний кариес

Г. глубокий кариес

Д. хронический периодонтит

Боковой свищ шеи располагается в области:

А. щитовидной артерии

Б. общей сонной артерии

В. лицевой артерии и вены

Г. лицевой вены и верхней щитовидной артерии

Д. внутренней яремной вены и наружной сонной артерии

Основной консервативный метод иммобилизации отломков челюсти при переломах челюстных костей:

- А. дуга Энгля
- Б. остеосинтез минипластинами
- В. метод Волкова
- Г. наложение бимаксиллярных шин с зацепными петлями, фиксация прикуса резиновой тягой
- Д. остеосинтез по Макиенко

К хроническим воспалительным заболеваниям слюнных желез относится:

- А. Болезнь Шегрена
- Б. Болезнь Микулича
- В. эпидемический паротит
- Г. интерстициальный сиалоаденит
- Д. паротит Герценберга

При неблагоприятном течении абсцесса челюстно-язычного желобка инфекция распространяется в:

- А. околоушную слюнную железу
- Б. субдуральное пространство
- В. крыло-небное венозное сплетение
- Г. венозные синусы головного мозга
- Д. крыловидно-челюстное пространство

Основным этиологическим фактором в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта является:

- А. гиперсаливация
- Б. частичная адентия
- В. предраковые заболевания
- Г. массивные зубные отложения
- Д. заболевания желудочно-кишечного тракта

На рентренограмме при остром одонтогенном синусите определяется:

- А. затемнение обеих верхнечелюстных пазух
- Б. уровень жидкости в пораженной пазухе
- В. затемнение всех придаточных пазух
- Г. интактность обеих верхнечелюстных пазух
- Д. ретенционные кисты верхнечелюстных пазух

Больные хроническим одонтогенным перфоративным синуситом жалуются на:

- А. боли в лобной области
- Б. боли в области зубов верхней челюсти
- В. попадание жидкости из полости рта в полость носа
- Г. боли при глотании
- Д. онемение подглазничной области на стороне поражения

Для удаления премоляров нижней челюсти используют:

- А. S-образные щипцы со сходящимися щечками
- Б. прямые щипцы со сходящимися щечками
- В. клювовидные щипцы с несходящимися щечками
- Г. прямой элеватор
- Д. байонетные щипцы

Одонтогенный синусит это воспаление:

- А. лобной пазухи
- Б. основной пазухи
- В. верхнечелюстной пазухи
- Г. решетчатого лабиринта
- Д. клиновидной пазухи

Ложный паротит Герценберга - это:

- А. лимфогенный паротит
- Б. воспалительная опухоль Кюттнера
- В. острый серозный лимфаденит интракапсулярных лимфатических узлов околоушно-жевательной области
- Г. острый серозный лимфаденит экстракапсулярных лимфатических узлов околоушно-жевательной области

Периостит челюстей необходимо дифференцировать с:

- А. тризмом
- Б. переломом зуба
- В. острым сиалодохитом
- Г. хроническим синуситом
- Д. обострением хронического периодонтита

При синдроме Шегрена отмечается:

- А. увеличение СОЭ
- Б. гипергаммаглобулинемия
- В. положительный ревматоидный фактор
- Г. все ответы верны
- Д. нет верного ответа

Показанием для проведения блокад по Вишневскому является:

- А. отек
- Б. инфильтрат
- В. эмпиема верхнечелюстной пазухи
- Г. инфильтрат с признаками абсцедирования
- Д. синусит

Внутреннее отверстие бокового свища шеи открывается в:

- А. носоглотке
- Б. щечной области
- В. подъязычной области
- Г. поднижнечелюстной области
- Д. области верхнего полюса миндалины

Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать с:

- А. острым отитом
- Б. острым синуситом
- В. околоушным гипергидрозом
- Г. переломом верхней челюсти
- Д. флегмоной поднижнечелюстной области

Для рентгенологической картины радикулярной кисты характерно деструкция костной ткани:

- А. в виде тающего сахара
- Б. в виде матового стекла
- В. с четкими контурами округлой формы в области верхушки корня зуба
- Г. в виде нескольких полостей
- Д. в виде образования с нечеткими контурами

При цитомегаловирусном поражении слюнных желез вирус проникает в организм новорожденного:

- А. гематогенным путем (травма, ссадины)
- Б. лимфогенным путем
- В. трансплацентарно
- Г. контактным путем
- Д. транслингвально

Основной причиной вывихов нижней челюсти является:

- А. артроз ВНЧС
- Б. нижняя макрогнатия
- В. снижение высоты прикуса
- Г. глубокое резцовое перекрытие
- Д. слабость суставной капсулы и связочного аппарата ВНЧС

Больной с диагнозом "злокачественное новообразование" челюстно-лицевой области должен быть направлен к:

- А. районному онкологу
- Б. специалисту-радиологу
- В. участковому терапевту
- Г. хирургу общего профиля
- Д. специалисту-стоматологу

Кровотечение из лунки во время удаления зуба возникает при:

- А. переломе челюсти
- Б. синусите
- В. повышенном артериальном давлении
- Г. пониженном артериальном давлении
- Д. анафилактическом шоке

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Синдромы

- А) Синдром Шегрена**
- Б) Синдром Хеерфорда**
- Симптомы**
- 1) Сиаалорея**
- 2) Ксерофтальмия**
- 3) Гиперпротеинурия**
- 4) Увеит**
- 5) Двусторонний паротит**
- 6) Парез лицевого нерва**

- А. А -1,2,3,4; Б -5,6.
- Б. А -1,2,3; Б -4,5,6.
- В. А -1,2; Б -3,4,5,6.

Возникновению острого одонтогенного синусита предшествуют:

- А. выделение из полости носа
- Б. головные боли
- В. воспалительные явления в области моляров или премоляров верхней челюсти
- Г. пункция пазухи ЛОР-врачом
- Д. физические нагрузки

Основной симптом перелома костей носа:

- А. деформация носа
- Б. подкожная эмфизема
- В. затруднение носового дыхания
- Г. патологическая подвижность костей носа
- Д. кровотечение из носовых ходов

Для удаления корней премоляров верхней челюсти используют:

- А. прямые несходящиеся щипцы
- Б. S-образные щипцы со сходящимися щечками
- В. клювовидные щипцы, изогнутые по плоскости
- Г. S-образные щипцы с несходящимися щечками
- Д. S-образные щипцы с шипом слева

При периостите гнойный процесс локализуется под:

- А. кожей
- Б. мышцей
- В. надкостницей
- Г. наружной кортикальной пластинкой челюсти
- Д. слизистой оболочкой альвеолярного отростка

Характерный симптом при одностороннем переломе мышечкового отростка нижней челюсти:

- А. открытый прикус
- Б. кровотечение из носа
- В. разрыв слизистой альвеолярного отростка
- Г. изменение прикуса моляров со стороны перелома
- Д. изменение прикуса моляров с противоположной стороны от перелома

Болезнь Микулича характеризуется:

- А. нарушением целостности базальной мембраны клеток паренхимы железы, лимфоэпителиальным поражением железы
- Б. массивной мелкоклеточной инфильтрацией, разрастающейся интерстициальной соединительной тканью
- В. массивной мелкоклеточной инфильтрацией, уменьшением количества интерстициальной ткани
- Г. сохранением структуры клеток паренхимы железы, лимфоэпителиальным поражением железы
- Д. нарушением целостности базальной мембраны клеток паренхимы железы, разрастающейся интерстициальной соединительной тканью

Возможное осложнение во время операции удаления моляров и премоляров верхней челюсти:

- А. синусит
- Б. периостит
- В. альвеолит
- Г. остеомиелит
- Д. перфорация дна верхнечелюстной пазухи.

S - образными щипцами с шипом удаляют:

- А. резцы верхней челюсти
- Б. третьи моляры верхней челюсти
- В. моляры верхней челюсти
- Г. премоляры нижней челюсти
- Д. премоляры верхней челюсти

Вправление вывиха нижней челюсти проводится при положении больного:

- А. лежа
- Б. сидя
- В. стоя
- Г. полулежа
- Д. полусидя

Щипцы для удаления клыков нижней челюсти называются

- А. клювовидные сходящиеся
- Б. S-образные щипцы с шипом
- В. клювовидные несходящиеся
- Г. горизонтальные коронковые
- Д. штыковидные щипцы со сходящимися щечками

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между одонтогенной кистой и её клиническим проявлением: Одонтогенные кисты

А) Радикулярная киста в области зубов 23, 24 в стадии нагноения

Б) Зубосодержащая киста в области зуба 38, в стадии воспаления

В) Радикулярная киста верхней челюсти, проникающая в верхнечелюстной синус в стадии ремиссии

Г) Радикулярная киста в области зубов 32, 31, 41, 42 в стадии нагноения Клинические проявления

1. Боль в подбородочной области, выбухание по переходной складке

2. Боль в области верхней челюсти, отек в щечной области, сглаженность носогубной складки

3. Боль в области нижней челюсти, ограничение открывания рта

4. Признаки синусита

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1

Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1

В. А-1, Б-3, В-4, Г-2

К дополнительным методам обследования при одонтогенном синусите не относится:

А. ортопантограмма

Б. рентгенограмма придаточных пазух носа

В. ультразвуковое исследование

Г. компьютерная томография

Д. ЭОД «причинных» зубов

При одонтогенном синусите поражается:

А. один верхнечелюстной синус

Б. два верхнечелюстных синуса

В. лобная пазуха

Г. клиновидная пазуха

Д. решетчатый лабиринт

Верхнечелюстной синус сообщается с полостью носа через соустье расположенное в носовом ходу:

А. переднем

Б. среднем

В. верхнем

Г. нижнем

Д. заднем

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между применяемыми для репозиции инструментами и видом перелома: Инструменты:

- А) Крючок Лимберга
- Б) Элеватор Карапетяна
- В) Элеватор Леклюза
- Г) Элеватор Волкова
- Д) Крючок Фарабефа
- Е) Зажим Кохера Перелом:

- 1. Скуловая кость
- 2. Скуловая дуга
- 3. Кости носа

А. 1-А,Б; 2-А,Б;3-Г.

Б. 1-А,Б; 2-А,Г;3-Г.

В. 1-А,Г; 2-А,Б;3-Г.

Для диагностики конкремента в Вартоновом протоке выполняют рентгенографию

- А. ортопантограмму
- Б. тела нижней челюсти
- В. дна полости рта
- Г. поднижнечелюстной слюнной железы
- Д. томографию поднижнечелюстной слюнной железы

Стадию злокачественного новообразования устанавливают на основании клинических признаков:

- А. жалоб больного
- Б. размеров опухоли
- В. жалоб больного, размеров опухоли
- Г. размеров опухоли, наличия близлежащих метастазов
- Д. размеров опухоли, наличия отдаленных и близлежащих метастазов

Припухлость при гнойно-некротическом паротите чаще имеет характер:

- А. ограниченный
- Б. диффузный
- В. любой

При исследовании секреторной функции околоушной слюнной железы за 20 минут в норме должно выделяться:

- А. 1-3 мл
- Б. 10-12 мл
- В. Не определяется
- Г. 5-7 мл
- Д. 0-1 мл

Пунктат радикулярной кисты вне воспаления имеет вид:

- А. гноя
- Б. крови
- В. мутной жидкости
- Г. опалесцирующей жидкости
- Д. холестотомных масс

Распространенность опухоли ее метастазирование наиболее точно оценивает классификация:

- А. TNM
- Б. клиническая
- В. пятибалльная
- Г. онкологического центра
- Д. онкологического диспансера

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Симптомы при ложном паротите

А) Симптом Хетчкока

Б) Симптом Тресильяна-Урсона Клиническая картина

- 1. Болезненность при надавливании в об-ласти угла нижней челюсти**
- 2. Гиперемия каймы вокруг устья выводного протока околоушной железы**
- 3. Асиалия на стороне поражения**
- 4. Гипосаливация на стороне поражения**
- 5. Выделение гнойного экссудата из устья выводного протока**

А. А-1; Б-2.

Б. А-2; Б-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Заболевание

А) Острый эпидемический паротит

Б) Хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит в стадии обострения.

Клиническая картина

1) Выделение гнойного секрета из устья протока

2) Задержка секрета

3) Высокая контагиозность

4) Железа тестовато-пастозная

5) Железа бугристая, плотная

6) Одновременное поражение поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез

А. А- 2, 4, 6; Б-1, 2, 5.

Б. А- 2, 4, 3, 6; Б-1, 5.

В. А- 2, 4, 3, 6; Б-1, 2, 5.

Одонтогенный перфоративный верхнечелюстной синусит возникает чаще при удалении:

А. моляров верхней челюсти

Б. клыков верхней челюсти

В. резцов верхней челюсти

Г. не зависит от зуба

Д. третьих моляров верхней челюсти

Основным методом лечения кист большого размера является:

А. цистэктомия

Б. цистотомия

В. периостотомия

Г. частичная резекция челюсти

Д. полная резекция челюсти

Ведущий симптом при вывихе нижней челюсти:

А. слезотечение

Б. снижение высоты прикуса

В. невозможность сомкнуть зубы

Г. гипермобильность нижней челюсти

Д. микрогнатия нижней челюсти

К дополнительным методам исследования, проводимым для морфологической верификации диагноза "злокачественное новообразование челюстно-лицевой области" относится:

- А. физикальный
- Б. биохимический
- В. гистологический
- Г. ангиографический
- Д. иммунологический

В день обращения при периостите челюстей необходимо:

- А. вскрыть гнойный очаг
- Б. начать иглорефлексотерапию
- В. сделать новокаиновую блокаду
- Г. назначить физиотерапевтическое лечение
- Д. ввести внутримышечно дыхательные analeптики

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между видом операции и техникой её проведения: Вид операции:

- А) Цистэктомия
 - Б) Цистотомия
 - В) Пластическая цистэктомия
 - Г) Двухэтапная операция
- Техника:**
1. Проводим цистотомию, затем проводим цистэктомию
 2. Удаление оболочки полностью
 3. Удаление передней стенки оболочки кисты
 4. Полное удаление оболочки кисты и дальнейшее ведение под йодоформным тампоном
- А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.
 - Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.
 - В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между аппаратами для иммобилизации при переломах в зависимости от классификации: Аппараты:

А) Шина Тигерштедта

Б) Шина Порта

В) Шина Вебера

Г) Спица Киршнера

Д) Шина Ванкевич

Е) Шина Васильева

Классификация:

1. Назубные

2. Зубонадесневые

3. Надесневые

А. 1-А,Е; 2-В,Д; 3-Б.

Б. 1-А,Д; 2-В,Е; 3-Б.

В. 1-В,Е; 2-А,Д; 3-Б.

Возникновению одонтогенного синусита не способствуют:

А. близкое расположение одонтогенных гнойных очагов

Б. распространение апикального гранулирующего процесса на нижнюю стенку пазухи

В. проталкивание корня в пазуху при удалении зуба

Г. искривление перегородки носа

Д. кариозное поражение моляров и премоляров верхней челюсти

Установите последовательность обследования пациента при переломе костей носа:

А) сбор жалоб

Б) объективный осмотр

В) рентгенологическое обследование

Г) проходимость носовых путей

Д) сбор анамнеза

А. А, Д, Б, Г, В

Б. А, Д, Б, В, Г

В. А, Б, Д, Г, В

Причиной развития острого одонтогенного остеомиелита челюстей является:

А. острый паротит

Б. перелом челюсти

В. острый лимфаденит

Г. снижение реактивности организма

Д. травма плохо изготовленным протезом

Оперативный доступ при лечении абсцесса челюстно-язычного желобка заключается в разрезе:

- А. окаймляющем угол нижней челюсти
- Б. слизистой оболочки челюстно-язычного желобка ближе к внутренней поверхности тела нижней челюсти
- В. в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти
- Г. слизистой оболочки по крыловидно-челюстной складке

Показания к цистотомии:

- А. киста, проникающая в верхнечелюстной синус
- Б. киста в пределах двух зубов
- В. кистогранулема в области верхушки корня зуба
- Г. амелобластома
- Д. субпериостальная киста

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом:

Клинические показатели:

- А) Патологическая подвижность верхней челюсти
 - Б) Боли при давлении на крыловидный отросток клиновидной кости
 - В) Слезотечение
 - Г) Эмфизема лица
 - Д) Симптом очков
 - Е) Ликворея
- Диагноз:**

- 1. Перелом верхней челюсти по Лефор I
- 2. Перелом верхней челюсти по Лефор II
- 3. Перелом верхней челюсти по Лефор III

А. 1-А, Б; 2-А,Б,Г; 3-А,В,Д,Е.

Б. 1-А, Б; 2-А,Б,В,Г; 3-А,Г,Д,Е.

В. 1-А, Б; 2-А,Б,В,Г; 3-А,Г,Е.

Характерный симптом при двустороннем переломе мыщелковых отростка нижней челюсти:

- А. открытый прикус
- Б. кровотечение из носа
- В. разрыв слизистой альвеолярного отростка
- Г. изменение прикуса моляров со стороны перелома
- Д. изменение прикуса моляров с противоположной стороны от перелома

Ксеростомия является следствием

- А. гиперсаливации
- Б. приема кислой пищи
- В. гипосаливации
- Г. приема постной пищи
- Д. приема острой пищи

Рентгенография слюнных желез с искусственным контрастированием НЕ позволяет:

- А. судить о состоянии паренхимы железы
- Б. выявить конкремент в протоке
- В. исследовать секреторную функцию железы
- Г. диагностировать новообразование
- Д. судить о состоянии протоков железы

Возбудителями при абсцессе челюстно-язычного желобка чаще всего являются:

- А. анаэробы
- Б. лучистые грибы
- В. бледные спирохеты
- Г. стафилококки, стрептококки
- Д. туберкулёзные микобактерии

Причиной специфического артрита ВНЧС является:

- А. актиномикоз
- Б. ревматическая атака
- В. околоушный гипергидроз
- Г. хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
- Д. туберкулез

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между аппаратом и методом фиксации при переломах:

Аппарат

А) Спицы Киршнера

Б) Аппарат Збаржа

В) Минипластины и минивинты

Г) Аппарат Рудько

Д) Проволочный шов

Е) Рамка Павлова Метод

1. Прямой остеосинтез

2. Непрямой остеосинтез

А. 1-АВ,Д,Е; 2-Б,Г.

Б. 1-А,Д,Е; 2-Б,Г.

В. 1-А,Д,Е; 2-Б,В,Г.

Срединные и боковые свищи шеи по своему происхождению являются:

А. врождёнными

Б. одонтогенными

В. травматическими

Г. онкологическими

Д. воспалительными

Острый одонтогенный синусит не дифференцируют с:

А. периоститом верхней челюсти

Б. остеомиелитом верхней челюсти

В. ринитом

Г. лимфаденитом

Д. ретенционными кистами верхнечелюстных пазух

Установите последовательность обследования пациента при переломе верхней челюсти:

А) сбор жалоб

Б) объективный осмотр

В) рентгенологическое обследование

Г) определение симптома нагрузки

Д) сбор анамнеза

А. Д, А, Б, Г, В.

Б. А, Д, Б, Г, В.

В. А, Д, Б, В, Г.

Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является:

- А. актиномикоз
- Б. острая травма
- В. околоушный гипергидроз
- Г. хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
- Д. туберкулез

Если причиной периостита является многокорневой зуб, его следует:

- А. удалить
- Б. запломбировать канал зуба до вскрытия абсцесса
- В. запломбировать канал зуба резорцин-формалиновой пастой
- Г. раскрыть зуб перед вскрытием абсцесса
- Д. провести резекцию верхушки корня зуба

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Осложнения после удаления

- А) Альвеолит**
- Б) Остеомиелит лунки**
- В) Парестезия в области ментального отверстия**
- Г) Стоматит**
- Признаки заболевания**
- 1. Язвенные образования на слизистой и налет**
- 2. Боль в лунке удаленного зуба через 1-3 дня, отсутствие сгустка**
- 3. Сильные боли, отечность десны, повышение температуры**
- 4. Онемение подбородка**
- А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.
- Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.
- В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Осложнения после удаления

А) Вывихивание первого верхнего моляра начинают

Б) Вывихивание второго верхнего моляра начинают

В) Премоляры верхней челюсти

Г) Верхний центральный резец Признаки заболевания

1. Комбинируют ротационные движения и раскачивания в вестибулярную и небную стороны

2. В небную сторону

3. В щечную сторону

4. Движения производят в вестибулярную и небную сторону, первое движение наружу

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-4, Б-3, В-2, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между осложнением во время удаления и его признаком:

Манипуляция

А) Удаление третьего моляра верхней челюсти

Б) Корни второго моляра верхней челюсти

В) Корни второго нижнего моляра

Г) Третий нижний моляр Осложнение

1. Проталкивание в верхнечелюстную синус

2. Перелом корня зуба

3. Перелом нижней челюсти

4. Отлом бугра верхней челюсти

А. А-3, Б-1, В-2, Г-4.

Б. А-4, Б-2, В-1, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

Причиной для развития периостита является:

А. ушиб мягких тканей лица

Б. фиброма альвеолярного отростка

В. обострение хронического синусита

Г. обострение хронического периодонтита

Д. перелом мышечкового отростка нижней челюсти

Если причиной периостита является однокорневой зуб, его следует:

- А. удалить
- Б. запломбировать канал зуба до вскрытия абсцесса
- В. запломбировать канал зуба резорцин-формалиновой пастой
- Г. раскрыть зуб перед вскрытием абсцесса
- Д. провести резекцию верхушки корня зуба

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между методом рентгенологического обследования и типом перелома: Метод

- А) Обзорная костей лицевого скелета в прямой проекции
- Б) Ортопантомография
- В) Костей носа в прямой проекции
- Г) Скуловой дуги
- Д) Костей носа в боковой проекции
- Е) Обзорная костей лицевого скелета в аксиальной проекции

- 1. Костей носа
- 2. Нижней челюсти
- 3. Верхней челюсти
- 4. Скуловой кости

- А. 1-В,Д; 2-А,Б; 3-Б; 4- Е.
- Б. 1-В,Д; 2-А,Б; 3-Б,Е; 4- Е.
- В. 1-Д; 2-А,Б,В; 3-Б,Е; 4- Е.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите последовательность действий: Удаление зубов

- А) При удалении резцов и клыков
- Б) При удалении премоляров на нижней челюсти справа
- В) При удалении премоляров на нижней челюсти слева
- Г) При удалении правых моляров на нижней челюсти

- 1.сзади и несколько справа от пациента
- 2.справа и спереди от больного
- 3.справа и кзади от больного
- 4.стоит слева и несколько кпереди от больного

- А. А-2, Б-4, В-3, Г-1.
- Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.
- В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Типичным клиническим признаком абсцесса челюстно-язычного желобка является:

- А. тризм
- Б. отек и гиперемия щечных областей
- В. гиперемия кожи в области нижней губы
- Г. отек и гиперемия тканей дна полости рта
- Д. инфильтрат мягких тканей в позадичелюстной области

В комплекс мероприятий при лечении хронического неспецифического артрита ВНЧС входят

- А. химиотерапия, иглотерапия
- Б. физиотерапия, нормализация окклюзии, разгрузка и покой ВНЧС
- В. физиотерапия, остеотомия нижней челюсти, иммобилизация
- Г. Д) физиотерапия, удаление мышечкового отростка, разгрузка и покой ВНЧС

Остеосинтез по Макиенко проводится:

- А. спицами
- Б. минипластинами
- В. стальной проволокой
- Г. бронзо-алюминиевой лигатурой
- Д. компрессионно-дистракционным аппаратом

Основной причиной вывихов нижней челюсти является:

- А. артрит ВНЧС
- Б. нижняя макрогнатия
- В. снижение высоты прикуса
- Г. глубокое резцовое перекрытие
- Д. снижение высоты суставного бугорка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Характеристика щипцов

- А) Признак стороны имеют щипцы S-образные
 - Б) Признак изгиба имеют щипцы
 - В) Изогнутыми по ребру являются
 - Г) Для удаления верхних третьих моляров используют
- Название Щипцов**

1. S-образные щипцы без шипов

2. Клювовидные щипцы

3. Штыковидные щипцы

4. S-образные с шипом

А. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

Б. А-4, Б-2, В-1, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-3, Г-2.

Показанием для цистэктомии кист челюстей является:

- А. проникновение кисты в полость носа
- Б. проникновение кисты в верхнечелюстной синус
- В. небольшие размеры кисты до трех зубов
- Г. большие размеры кист, более трех зубов
- Д. проникновение кисты в нижнечелюстной канал

К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят:

- А. синусит
- Б. альвеолит
- В. остеомиелит
- Г. гипертонический криз
- Д. артрит височно-нижнечелюстного сустава

Симптом нагрузки при переломах нижней челюсти определяется давлением на:

- А. скуловые кости снизу вверх
- Б. подбородок снизу вверх
- В. подбородок спереди назад
- Г. крючок крыловидного отростка снизу вверх
- Д. альвеолярный отросток сверху вниз

Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти:

- А. наркоз
- Б. проводниковая анестезия
- В. нейролептаналгезия
- Г. стволовая анестезия
- Д. инфильтрационная анестезия

Показания для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти:

- А. привычный вывих
- Б. выраженная гиперсаливация
- В. подозрение на тромбоз вен
- Г. рефлекторная контрактура жевательных мышц
- Д. гематома щеки

Установите последовательность обследования пациента при переломе нижней челюсти:

- А) сбор жалоб**
- Б) объективный осмотр**
- В) рентгенологическое обследование**
- Г) определение симптома нагрузки**
- Д) сбор анамнеза**

А. А, Д, Б, В, Г.

Б. А, Д, Г, Б, В.

В. А, Д, Б, Г, В.

При двустороннем переломе нижней челюсти в области углов смещение фрагмента происходит:

- А. книзу**
- Б. кверху**
- В. медиально**
- Г. латерально**
- Д. дистально**

При обострении хронического синусита в верхнечелюстной пазухе содержится экссудат:

- А. серозный**
- Б. гнойный**
- В. геморрагический**
- Г. кровяной**
- Д. кистозная жидкость**

Для иммобилизации переломов беззубых челюстей применяется шина:

- А. Порта**
- Б. Ванкевич**
- В. Тигерштедта**
- Г. Вебера**
- Д. Васильева**

Дополнительный метод исследования для диагностики переломов верхней челюсти:

- А. ЭОД**
- Б. биопсия**
- В. рентгенография**
- Г. радиоизотопный**
- Д. цитологический**

Неодонтогенной причиной для развития абсцесса окологлоточного пространства является:

- А. острый тонзиллит
- Б. фурункул верхней губы
- В. лимфаденит щечной области
- Г. лимфаденит околоушной области
- Д. острый периодонтит третьих моляров верхней челюсти

Для ускорения очищения гнойной раны назначают:

- А. УВЧ
- Б. массаж
- В. электрофорез
- Г. гальванизацию
- Д. флюктуоризацию

Через какую слизистую оболочку вирус не может проникнуть в организм человека:

- А. носа
- Б. полости рта
- В. нёбных миндалин
- Г. желудка
- Д. конъюнктиву глаза

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Заболевание

- А) Морфологические изменения в патогенезе интерстициального сиалоаденита
 - Б) Морфологические изменения в патогенезе паренхиматозного сиалоаденита
 - В) Морфологические изменения в патогенезе протокового сиалоаденита
- Морфологическая картина**
- 1) Дистрофические изменения эпителиальной ткани ацинусов
 - 2) Метоплазия цилиндрического эпителия в бокаловидные клетки
 - 3) Явления склерозирования стромы железы
- А. А-3, Б-2, В-1.
 - Б. А-2, Б-1, В-3.
 - В. А-3, Б-1, В-2.

Появление припухлости околоушной железы при гнойно-некротическом паротите появляется на фоне:

- А. резкого увеличения слюноотделения
- Б. резкого снижения слюноотделения
- В. нормального выделения слюны

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между классифицированной по группе кистой и её распространением: Распространение кисты

- А) На альвеолярный сегмент одного зуба распространяется
- Б) На альвеолярный сегмент двух-трех зубов
- В) На альвеолярный сегмент более трех зубов
- Г) Смещение и деформация дна верхнечелюстного синуса, при сохранении костной стенки

Классификация по группам

- 1. Киста, оттесняющая верхнечелюстной синус
- 2. Киста малого размера
- 3. Киста среднего размера
- 4. Киста большого размера

А. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Клиническая ситуация

- А) Разъединенные корни первого моляра верхней челюсти
- Б) Разъединенные корни первого и второго нижних моляров
- В) Нижний третий моляр
- Г) Корни нижнего второго моляра при мощной межкорневой перегородки Используемый инструмент

1. Угловым элеватором

2. Элеватор Леклюза при сохраненном соседнем зубе

3. Разъединяют фиссурным бором и вывихивают элеватором

4. Удаляют прямым элеватором

А. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

Б. А-4, Б-2, В-1, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-3, Г-2.

Лечение болезни Микулича и синдрома Шегрена проводится совместно с:

- А. гастроэнтерологом
- Б. стоматологом-гигиенистом
- В. эндокринологом
- Г. все ответы верны
- Д. ревматологом

Для подтверждения диагноза "боковая киста шеи" проводится исследование:

- А. биохимическое
- Б. цитологическое
- В. радиоизотопное
- Г. реакция Вассермана
- Д. рентгенологическое

Поздним местным осложнением абсцесса окологлоточного пространства является:

- А. слюнной свищ
- Б. абсцесс головного мозга
- В. рубцовый выворот нижней губы
- Г. стеноз верхних дыхательных путей
- Д. тромбоз венозных синусов головного мозга

Возможное осложнение во время операции удаления третьего моляра нижней челюсти:

- А. синусит
- Б. периостит
- В. альвеолит
- Г. остеомиелит
- Д. перелом нижней челюсти

Основным этиологическим фактором в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта является:

- А. гиперсаливация
- Б. частичная адентия
- В. массивные зубные отложения
- Г. хроническая травма слизистой оболочки
- Д. заболевания желудочно-кишечного тракта

Осложнения, возникающие непосредственно после операции удаления зуба:

- А. паротит
- Б. кровотечение из лунки удаленного зуба
- В. невралгия тройничного нерва
- Г. артрит височно-нижнечелюстного сустава
- Д. анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

Абсцесса челюстно-язычного желобка необходимо дифференцировать с:

- А. тризмом
- Б. карбункулом нижней губы
- В. флегмоной щечной области
- Г. флегмоной височной области
- Д. абсцессом крыловидно-челюстного пространства

Характерные симптомы острого артрита ВНЧС в начальной стадии:

- А. тризм жевательных мышц
- Б. околоушный гипергидроз
- В. боль, ограничение открывания рта
- Г. боль в шейном отделе позвоночника, иррадиирующая в ВНЧС
- Д. сухость в полости рта

Под онкологической настороженностью понимают знание злокачественных новообразований:

- А. ранних симптомов
- Б. препаратов для лечения
- В. профессиональных вредностей
- Г. допустимых доз лучевой терапии
- Д. методов хирургического лечения

Для острого одонтогенного синусита характерны морфологические изменения слизистой оболочки:

- А. пролиферативные
- Б. полипозные
- В. отек
- Г. полнокровие сосудов
- Д. образование ретенционных кист

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Манипуляция:

- А) Во время удаления фронтальной группы зубов нижней челюсти
- Б) При удалении премоляров на нижней челюсти
- В) Удаление нижнего зуба мудрости
- Г) Удаление премоляров на верхней челюсти

Осложнение:

- 1. Проталкивание зуба в мягкие ткани
- 2. Лентообразный разрыв слизистой с язычной стороны
- 3. Вывих или перелом нижней челюсти
- 4. Перфорация дна верхнечелюстного синуса

А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4.

В. А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Большие пальцы рук врач при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливает на:

- А. углы нижней челюсти
- Б. фронтальную группу зубов верхней челюсти
- В. моляры справа и слева или альвеолярные отростки нижней челюсти
- Г. фронтальную группу зубов нижней челюсти
- Д. моляры справа и слева или альвеолярные отростки верхней челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между распространением кисты и её классификационной группой: Распространение кисты

- А) На альвеолярный сегмент одного зуба распространяется
- Б) На альвеолярный сегмент двух-трех зубов
- В) На альвеолярный сегмент более трех зубов
- Г) Смещение и деформация дна верхнечелюстного синуса, при сохранении костной стенки

Классификация по группам

- 1. киста, оттесняющая верхнечелюстной синус
- 2. киста малого размера
- 3. киста среднего размера
- 4. киста большого размера

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Щипцы для удаления корней резцов верхней челюсти называются:

- А. клювовидными
- Б. прямые сходящиеся
- В. S-образные сходящиеся
- Г. S-образные - шип справа
- Д. S-образные несходящиеся

Наблюдаются ли изменения в паренхиме околоушной железы при лимфогенном сиалодохите:

- А. да
- Б. нет

S- образными щипцами без шипов удаляют:

- А. корни зубов нижней челюсти
- Б. вторые моляры нижней челюсти
- В. третьи моляры верхней челюсти
- Г. премоляры верхней челюсти
- Д. корни зубов верхней челюсти

При эпидемическом паротите:

- А. устье выводного протока не изменено
- Б. имеется гиперемия и отек устья выводного протока
- В. из протока околоушной железы выделяется гной
- Г. имеется гиперемия устья выводного протока и появление гнойного экссудата в слюне
- Д. из протока околоушной железы выделяется мутная слюна

При иссечении срединного свища шеи необходимо резецировать:

- А. щитовидный хрящ
- Б. небную миндалину
- В. участок подъязычной кости
- Г. подчелюстную слюнную железу
- Д. проток подчелюстной слюнной железы

Типичным клиническим признаком абсцесса окологлоточного пространства является:

- А. асимметрия лица
- Б. затруднение дыхания
- В. затруднённое открывание рта
- Г. выбухание подъязычных валиков
- Д. отек и гиперемия щечных областей

Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является:

- А. актиномикоз
- Б. ревматическая атака
- В. околоушный гипергидроз
- Г. изменение окклюзии
- Д. туберкулез

Больные острым синуситом жалуются на:

- А. сильные боли в лобной области
- Б. боли при глотании
- В. гнойные выделения из носа
- Г. ограничение открывание рта
- Д. онемение подглазничной области на стороне поражения

Установите последовательность обследования пациента при переломе скуловой кости:

- А) сбор жалоб**
- Б) объективный осмотр**
- В) рентгенологическое обследование**
- Г) определение участка парестезии**
- Д) сбор анамнеза**

А. А, Д, Г, Б, В.

Б. А, Б, Д, Г, В.

В. А, Д, Б, Г, В.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между применяемыми аппаратами и методами лечения переломов челюстей: Аппараты:

- А) Шина Тигерштедта**
 - Б) Шина Порты**
 - В) Спица Киршнера**
 - Г) Минипластины и минивинты**
 - Д) Проволочный шов**
 - Е) Шина Васильева**
- Методы лечения:**

1. Консервативные

2. Оперативные

А. 1-А, Б, Г; 2- В,Е,Д.

Б. 1-А, Б, Е; 2- В,Г,Д.

В. 1-Г, Б, Е; 2- В,А,Д.

Причиной обострения хронического неспецифического артрита ВНЧС является:

- А. актиномикоз**
- Б. околоушный гипергидроз**
- В. распространение инфекции из окружающих тканей**
- Г. хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии**
- Д. туберкулез**

Клиническая картина хейлита Манганотти характеризуется наличием:

- А. 2-3 эрозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации**
- Б. эрозивной поверхностью с инфильтрацией подлежащих тканей**
- В. атрофичных уплощенных бляшек покрытых корками, "географический" рисунок**
- Г. ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими, плотно сидящими чешуйками**
- Д. болезненного узла с бугристой поверхностью, возвышающегося над эпителием на 3-5 мм**

К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят:

- А. химиотерапию
- Б. СВЧ-гипертермию
- В. лучевую терапию
- Г. комбинированное лечение
- Д. симптоматическую терапию

К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят:

- А. химиотерапию
- Б. криодеструкция
- В. лучевую терапию
- Г. комбинированное лечение
- Д. симптоматическую терапию

Пункция верхнечелюстной пазухи не проводится для:

- А. эвакуации гноя из пазухи
- Б. эвакуации крови из пазухи
- В. удаления полипов из пазухи
- Г. введение медикаментов в пазуху
- Д. промывание пазухи антисептиками при отсутствии свищевого хода

Хирургический метод иммобилизации переломов челюстных костей:

- А. дуга Энгля
- Б. остеосинтез минипластинами
- В. метод Фальтина-Адамса
- Г. наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
- Д. наложение шины Васильева

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между одонтогенной кистой и её клиническим проявлением: Одонтогенные кисты

А) Радикулярная киста в области зубов 23,24 в стадии нагноения

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8, в стадии воспаления

В) Радикулярная киста верхней челюсти, проникающая в верхнечелюстной синус в стадии ремиссии

Г) Радикулярная киста в области зубов 32, 31, 41, 42 в стадии Клинические проявления

1. Боль в подбородочной области, выбухание по переходной складке

2. Боль в области верхней челюсти, отек в щечной области, сглаженность носогубной складки

3. Боль в области нижней челюсти, ограничение открывания рта

4. Признаки синусита

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят:

А. химиотерапию

Б. лучевую терапию

В. иссечение опухоли

Г. комбинированное лечение

Д. симптоматическую терапию

Для удаления третьих моляров верхней челюсти используют:

А. угловой элеватор

Б. прямой элеватор

В. клювовидные щипцы со сходящимися щечками

Г. S- образные щипцы с несходящимися щечками

Д. S- образные щипцы с шипом слева

При вправлении вывиха нижней челюсти давление на моляры сначала осуществляется в направлении:

А. вверх

Б. вбок

В. книзу

Г. снизу вверх

Д. спереди назад

Поздняя первичная хирургическая обработка ран лица проводится спустя

- А. 24 Часа
- Б. 8-12 Часов
- В. 48 Часов
- Г. 72 Часа

Одонтогенной причиной для развития ангины людвига является воспалительный процесс в области

- А. Лимфоузлов щечной области
- Б. Верхней губы
- В. Зубов верхней челюсти
- Г. Моляров нижней челюсти

Недопустимо принимать в амбулаторных условиях пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отнесенных к _____ категории asa

- А. I
- Б. III
- В. IV
- Г. II

Медицинские работники обязаны

- А. Предоставлять информацию в письменном виде по просьбе родственников о состоянии и диагнозе пациента
- Б. Рассказывать представителям средств массовой информации о случаях поступления пациентов с криминальными травмами
- В. Сообщать работодателю о заболевании сотрудника
- Г. Соблюдать врачебную тайну

Заболевания, вызванные актиномицетами, бледной трепонемой и микобактериями туберкулеза, относят к группе заболеваний

- А. Инфекционных
- Б. Специфических
- В. Вирусных
- Г. Неспецифических

Клинически липома от фибролипомы отличается

- А. Цветом образования
- Б. Плотностью тканей
- В. Шириной основания
- Г. Степенью подвижности

Продвигать иглу при проведении туберальной анестезии необходимо на глубину _____ см

- А. 3,0-3,5
- Б. 2,0-2,5
- В. 1,0-1,5
- Г. До 1,0

Среди клинических форм эозинофильной гранулемы различают

- А. Очаговую, диффузную, генерализованную
- Б. Ячеистую, кистозную, литическую
- В. Язвенную, язвенно-некротическую
- Г. Продуктивную, деструктивную

В результате эпидемического паротита может возникнуть осложнение в виде

- А. Ретенционной кисты
- Б. Абсцесса околоушной железы
- В. Слюнного камня
- Г. Слюнного свища

Сроки первичной хирургической обработки ран мягких тканей лица с наложением глухого шва составляют (в часах)

- А. 72
- Б. 48
- В. 24
- Г. 36

На уровень дентофобии перед проведением стоматологического лечения не оказывают прямого действия

- А. Препараты ноотропного действия
- Б. Серотонинселективные антидепрессанты
- В. Анксиолитики
- Г. Блокаторы кальциевых каналов

Основным методом лечения ран мягких тканей лица является

- А. Асептическая мазевая повязка
- Б. Остановка кровотечения
- В. Первичная хирургическая обработка
- Г. Дренаж воспалительного экссудата

Подъязычная слюнная железа располагается в

- А. Боковом клетчаточном пространстве
- Б. Наружном межмышечном промежутке
- В. Нижнем межмышечном промежутке
- Г. Поднижнечелюстном клетчаточном пространстве

При остром гнойном периостите при лабораторных исследованиях наблюдают

- А. Лейкоцитоз, резкий подъем СОЭ
- Б. Лейкоцитоз, незначительное повышение СОЭ или в норме
- В. Незначительное повышение СОЭ
- Г. Все показатели в норме

Разрабатывать и утверждать клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи могут только

- А. Медицинские профессиональные некоммерческие организации
- Б. Министерство здравоохранения РФ и Министерство юстиции РФ
- В. Органы местного самоуправления
- Г. Органы исполнительной власти субъектов РФ

Разрастанию соединительной ткани в месте воздействия может способствовать

- А. УВЧ-терапия
- Б. Индуктотермия
- В. Микроволновая терапия
- Г. Ультратонотерапия

Рентгенологическим признаком вколоченного вывиха зуба является

- А. Неравномерное расширение периодонтальной щели
- Б. Невозможность определить периодонтальную щель
- В. Сужение периодонтальной щели
- Г. Равномерное расширение периодонтальной щели

Ранулой называется

- А. Опухоль подъязычной слюнной железы
- Б. Киста подъязычной слюнной железы
- В. Киста околоушной слюнной железы
- Г. Киста поднижнечелюстной слюнной железы

При ожоге II степени повреждается

- А. Эпидермис и дерма с придатками кожи
- Б. Эпидермис и сосочковый слой дермы
- В. Эпидермис и сетчатый слой дермы
- Г. Эпидермис

Минимальная высота облицовки стен в операционной составляет

- А. От пола до потолка
- Б. 1,9 м
- В. 1,7 м
- Г. 1,8 м

При удалении нижнего клыка можно использовать анестезию

- А. Ментальную
- Б. Туберальную
- В. Торусальную
- Г. По Дубову

Нарушением верхней челюсти при микрогнатии является

- А. Смещение кзади
- Б. Недоразвитие
- В. Несимметричная деформация
- Г. Чрезмерное развитие

Основными клиническими признаками синдрома Шегрена являются

- А. Увеличение слюнных и слёзных желез
- Б. Ксеростомия, ксерофтальмия, ревматоидный полиартрит
- В. Ксеростомия, дисметаболический синдром
- Г. Ксеростомия, анорексия

При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе гражданин направляется на медико-социальную экспертизу не позднее _____ месяцев даты начала временной нетрудоспособности

- А. Шести
- Б. Двух
- В. Трёх
- Г. Четырёх

Оперативный доступ при лечении флегмоны поднижнечелюстной области заключается в разрезе

- А. Окаймляющем угол нижней челюсти
- Б. В поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти, отступив на 1,5-2 см книзу
- В. Параллельно краю нижней челюсти дугообразной формы от угла до угла
- Г. В подбородочной области

Причиной отказа для формирования (выдачи) листка нетрудоспособности может быть

- А. Травма
- Б. Острое заболевание
- В. Обострение хронического заболевания
- Г. Хроническое заболевание в период ремиссии

Карпульный шприц обрабатывается после каждого пациента

- А. Ополаскиванием в дезсредстве
- Б. Двукратным протиранием 70% спиртом через 15 минут
- В. Автоклавированием в автоклаве
- Г. Путём полного погружения в дезраствор в соответствии с режимом используемого дезсредства

На нижней челюсти угловым элеватором преимущественно удаляют

- А. Корни зубов
- Б. Резцы
- В. Клыки
- Г. Премоляры

Противопоказанием к удалению зуба в условиях амбулаторного приема является

- А. Наличие у пациента в анамнезе инфаркта миокарда давности менее чем полгода
- Б. Аллергические реакции на некоторые группы антибиотиков
- В. Сахарный диабет 1-го типа в стадии компенсации
- Г. Хронический одонтогенный верхнечелюстной синусит

Листок нетрудоспособности формируется (выдается) лицам, у которых заболевание или травма наступили в течение _____ со дня прекращения работы по трудовому договору

- А. 2 Месяцев
- Б. 40 Дней
- В. 3 Месяцев
- Г. 30 Дней

Ведущим симптомом при контрактурах нижней челюсти является

- А. Верхняя макрогнатия
- Б. Укорочение ветвей нижней челюсти
- В. Снижение высоты прикуса
- Г. Ограничение подвижности нижней челюсти с сохранением движений в ВНЧС

При удалении первого большого коренного зуба верхней челюсти люксацию начинают в _____ сторону

- А. Язычную
- Б. Губную
- В. Вестибулярную
- Г. Нёбную

После проведения анестезии по гоу-гейтсу происходит блокада нервов

- А. Щёчного и нижнего луночкового
- Б. Язычного, щёчного и нижнего луночкового
- В. Нижнего луночкового
- Г. Язычного и нижнего луночкового

К анестетикам длительного действия (6-12 часов) следует отнести

- А. Анестезин
- Б. Мепивакаин
- В. Прокаин
- Г. Бупивакаин

Основным хирургическим методом лечения при наличии конкремента поднижнечелюстной слюнной железы является

- А. Удаление конкремента
- Б. Экстирпация железы
- В. Рассечение стеноза протока
- Г. Пластика выводного протока

Вывих нижней челюсти необходимо дифференцировать с переломом

- А. Венечного отростка нижней челюсти
- Б. В области ветви нижней челюсти
- В. Мыщелкового отростка нижней челюсти
- Г. В области тела нижней челюсти

Основным видом обезболивания, применяемым при операции удаления зуба, является

- А. Общее (наркоз)
- Б. Нейролептаналгезия
- В. Местное
- Г. Комбинированное

Огнестрельные ранения лица отличаются от ран других областей

- А. Длительным сроком эпителизации раны
- Б. Наличием в ране вторичных ранящих снарядов
- В. Быстрым развитием гнойно-воспалительных осложнений
- Г. Длительным течением фаз очищения и гранулирования раны

Для стерилизации инструментов используют пероксид водорода в концентрации ____ %

- А. 3
- Б. 6
- В. 1
- Г. 4

Целесообразным лечением полного вывиха постоянного резца со сформированным корнем является

- А. Имплантация
- Б. Реплантация зуба с предварительным его пломбированием
- В. Возмещение дефекта съёмным протезом
- Г. Реплантация зуба без пломбирования

Процесс реминерализации эмали зависит от её

- А. Микротвердости
- Б. Проницаемости
- В. Растворимости
- Г. Хрупкости

Неодонтогенное происхождение имеет

- А. Радикулярная киста
- Б. Фолликулярная киста
- В. Кератокиста
- Г. Киста носо-небного канала

При удалении резцов верхней челюсти необходимо использовать _____ анестезию

- А. Резцовую
- Б. Палатинальную
- В. Туберальную
- Г. Торусальную

Для проведения аппликационной анестезии используют

- А. Мепивакаин 2%
- Б. Лидокаин 0.5%
- В. Артикаин 4%
- Г. Лидокаин 10%

Под фиброзной дисплазией понимают

- А. Истинную одонтогенную опухоль
- Б. Костную опухоль
- В. Опухолеподобное образование кости
- Г. Мягкотканную опухоль

При отсутствии кровяного сгустка в лунке удаленного зуба проводят

- А. Кюретаж лунки зуба
- Б. Сдавление краев лунки
- В. Орошение физиологическим раствором
- Г. Орошение раствором хлоргексидина

Местным анестетиком, который рекомендуется применять только в условиях стационара под контролем анестезиолога, является

- А. Мепивакаин
- Б. Лидокаин
- В. Бупивакаин
- Г. Артикаин

Септикотоксемия является _____ периодом ожоговой болезни

- А. Вторым
- Б. Четвертым
- В. Третьим
- Г. Первым

Капиллярная гемангиома по клиническим признакам сходна с

- А. Невусом
- Б. Фибромой
- В. Папилломой
- Г. Гиперемией кожи

При удалении верхнего 7 зуба целесообразно использовать _____ анестезию

- А. Мандибулярную
- Б. Инфраорбитальную
- В. Туберальную
- Г. Резцовую

К методам временной иммобилизации при переломах челюстей относят

- А. Костный шов
- Б. Компрессионно-дистракционный аппарат
- В. Назубные шины
- Г. Стандартные повязки

Клиническая картина мягкой одонтомы характеризуется

- А. 2-3 Эрозиями десны, без тенденции к кровоточивости и эпителизации
- Б. Плотным безболезненным инфильтратом в области нескольких зубов
- В. Безболезненной деформацией челюсти в виде вздутия
- Г. Рыхлым, болезненным, кровоточащим образованием десны

Согласно номенклатуре больницу (в том числе детскую) относят к медицинским организациям

- А. Краевым
- Б. По надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
- В. Лечебно-профилактическим
- Г. Особого типа

Основным хирургическим методом лечения кисты подъязычной слюнной железы является удаление кисты с

- А. Окружающими тканями
- Б. Подъязычной слюнной железой
- В. Подъязычной и поднижнечелюстной слюнными железами
- Г. Частью слизистой оболочки

При удалении

1.8,

1.7,

1.6 зубов врач занимает положение _____ от больного

А. Справа и впереди

Б. Справа и сзади

В. Слева и впереди

Г. Слева и сзади

Выраженная периостальная реакция и утолщение альвеолярного края челюсти с двух сторон бывает при

А. Ретенции третьего моляра

Б. Остром гнойном периостите

В. Остром периодонтите

Г. Остром одонтогенном остеомиелите

К общим соматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят

А. Синусит

Б. Остеомиелит

В. Альвеолит

Г. Коллапс

Синонимом перелома верхней челюсти по Ле Фор I является перелом

А. Альвеолярного отростка

Б. Суббазальный

В. Сагиттальный

Г. Суборбитальный

Рекомендуемый штатный норматив медицинского персонала для стоматологической поликлиники составляет _____ должности врача-анестезиолога-реаниматолога на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов

А. 0,2

Б. 0,15

В. 0,25

Г. 0,12

Основным симптомом перелома нижней челюсти является

А. Разрыв слизистой оболочки альвеолярных отростков

Б. Носовое кровотечение

В. Головная боль

Г. Патологическая подвижность нижней челюсти

Стимулирует слюноотделение

- А. Йодолипол
- Б. Атропин
- В. Йодистый калий
- Г. Хлористый кальций

Под действием тяги мышц смещение центрального фрагмента нижней челюсти при двустороннем ангулярном переломе происходит

- А. Кверху
- Б. Книзу и кзади
- В. Вперед
- Г. Кверху и вперед

При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности может быть сформирован и продлен до дня восстановления трудоспособности по решению врачебной комиссии, но на срок не более ____ месяцев с даты начала временной нетрудоспособности, а при лечении туберкулеза - не более ____ месяцев

- А. 8; 10
- Б. 10; 12
- В. 4; 6
- Г. 6; 8

Позднее осложнение переломов скуловой кости, костей носа и скуловой дуги представляет собой

- А. Вторичные деформации лицевого скелета
- Б. Парез ветвей лицевого нерва
- В. Птоз
- Г. Телеангиоэктазию

Полнослойный кожный лоскут берут преимущественно с

- А. Внутренней поверхности плеча
- Б. Поверхности тыла стопы
- В. Боковой поверхности шеи
- Г. Наружной поверхности бедра

В соответствии с фз № 323 от

21.11.2011 г. «об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пациент имеет право на выбор

- А. Врача и медицинской организации
- Б. Лекарственных средств при лечении в стационаре
- В. Методик лабораторного исследования
- Г. Методик инструментального обследования

Наличие бугристого образования синюшно-бурого цвета, плотноэластической консистенции с участками изъязвления характерно для

- А. Ангиоматозного эпулиса
- Б. Периферической гигантоклеточной репаративной гранулемы
- В. Пиогенной гранулемы
- Г. Сосудистой мальформации кавернозного типа

Термовременные индикаторы используют для контроля

- А. Режимов дезинфекции
- Б. Стерильности изделия
- В. Режимов стерилизации
- Г. Предстерилизационной очистки

Носогубные лимфатические узлы получают лимфу из

- А. Надбровной области
- Б. Верхней губы
- В. Поверхностных частей подглазничной области
- Г. Мягких тканей наружного носа

Верхне-внутренней границей поднижнечелюстной области является

- А. Внутренняя поверхность тела нижней челюсти
- Б. Челюстно-подъязычная мышца
- В. Заднее брюшко двубрюшной мышцы
- Г. Переднее брюшко двубрюшной мышцы

При ожоге iv степени поражаются

- А. Все слои эпидермиса
- Б. Поверхностный эпидермис и капилляры
- В. Кожа и подлежащие ткани
- Г. Поверхностный эпидермис

Ротационные движения применяют при удалении _____ верхней челюсти

- А. Второго премоляра
- Б. Клыков
- В. Первого премоляра
- Г. Первого моляра

Типичным клиническим признаком фурункула лица является болезненный

- А. Инфильтрат в толще мягких тканей
- Б. Участок гиперемии кожи
- В. Инфильтрат багрового цвета с гнойно-некротическими стержнями
- Г. Инфильтрат кожи синюшного цвета

Трансплантационный материал, полученный от самого пациента, называется

- А. Ксеногенный
- Б. Аллогенный
- В. Аллопластический
- Г. Аутогенный

Для подтверждения диагноза «боковая киста шеи» проводится _____ исследование

- А. Радиоизотопное
- Б. Ультразвуковое
- В. Фистулографию
- Г. Биохимическое

Компрессионно-дистракционный остеосинтез у пациента с переломом челюсти нельзя провести с помощью аппарата

- А. ЕК-1Д
- Б. Швыркова и Шамсундинова
- В. Чудакова
- Г. Рудько

Клиническим проявлением кисты челюсти является

- А. Гематома
- Б. Симптом Венсана
- В. Безболезненная деформация в виде вздутия
- Г. Плотное обызвествленное образование

Для аппликационной анестезии в стоматологии применяют анестетик

- А. Артикаин
- Б. Бупивакаин
- В. Прокаин
- Г. Бензокаин

При удалении пигментного невуса разрез необходимо выполнять, отступив от границ пятна на

- А. 2-3 См
- Б. 3-4 Мм
- В. 2 Мм
- Г. 1 См

Согласно классификации вывихов нижней челюсти не существует вывиха

- А. Переднего
- Б. Заднего
- В. Нижнего
- Г. Двустороннего

При подкожной гранулеме окраска кожи на всем протяжении имеет _____ цвет

- А. Красный
- Б. Желтый
- В. Белый
- Г. Багрово-синюшный

В соответствии с классификацией болезней периодонта (л. Н. Дедова, 2002–2007) выделяют формы рецессии десны

- А. Анатомическую, симптоматическую
- Б. Анатомическую, физиологическую
- В. Физиологическую, симптоматическую
- Г. Анатомическую, физиологическую, симптоматическую

По характеру секрета подъязычная слюнная железа является

- А. Серозной
- Б. Серозно-слизистой
- В. Белковой
- Г. Слизисто-белковой

К осложнениям, возникающим во время удаления восьмого зуба верхней челюсти, относится

- А. Синусит
- Б. Остеомиелит лунки
- В. Отлом бугра верхней челюсти
- Г. Неврит носо-нёбного нерва

Полость ретенционной кисты заполнена

- А. Грануляциями
- Б. Детритом
- В. Слюной
- Г. Холестеатомными массами

Работникам предприятий общественного питания, водоснабжения, детских учреждений при наличии у них гельминтоза листок нетрудоспособности формируется (выдается) на

- А. Весь период дегельминтизации
- Б. 5 Дней
- В. 7 Дней
- Г. 10 Дней

Рекомендуемый штатный норматив медицинского персонала для стоматологической поликлиники составляет _____ должность/должности врача-рентгенолога на _____ рентгеновских снимков в год

- А. 1; 20 000
- Б. 2; 12 000
- В. 2; 20 000
- Г. 1; 15 000

При интралигаментарной анестезии игла вводится в круговую связку под углом

- А. 45°
- Б. 90°
- В. 70°
- Г. 30°

В поднимании нижней челюсти не участвует мышца

- А. Медиальная крыловидная
- Б. Латеральная крыловидная
- В. Верхняя часть височной
- Г. Жевательная

Шириной рецессии является

- А. Расстояние от ЦЭС до вершины коронки зуба
- Б. Расстояние между краями десны на уровне ЦЭС
- В. Расстояние от ЦЭС до края десны
- Г. Экватор зуба

Одонтогенный остеомиелит челюсти

- А. Инфекционный гнойно-некротический процесс в челюсти
- Б. Воспалительный процесс костно-мозговых пространств
- В. Воспаления мягких тканей, окружающих коронку прорезывающегося зуба
- Г. Воспаление стенок лунки

При беременности противопоказан

- А. Бупивакаин
- Б. Лидокаин
- В. Мепивакаин
- Г. Артикаин

Неодонтогенной причиной для развития ангины людвига является воспалительный процесс в области

- А. Верхней губы
- Б. Нёбных миндалин
- В. Лимфоузлов щечной области
- Г. Зубов верхней челюсти

К общим осложнениям, возникающим при передозировке анестетика, относят

- А. Побледнение участка кожи
- Б. Невралгию тройничного нерва
- В. Кровотечение
- Г. Двигательное возбуждение, судороги

При флегмоне _____ появляется затруднение при глотании

- А. Скуловой области
- Б. Щечной области
- В. Височной области
- Г. Дна полости рта

Периферическую гигантоклеточную гранулёму следует дифференцировать с

- А. Эпулисом
- Б. Цементомой
- В. Пародонтитом
- Г. Дентиномой

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие симптомов заболеванию: Заболевание:

А) Острый периодонтит

Б) Острый периостит челюсти

В) Острый остеомиелит челюсти

Г) Околочелюстной абсцесс Симптом:

1) Околочелюстные мягкие ткани не изменены;

2) Отек околочелюстных мягких тканей;

3) Инфильтрация околочелюстных мягких тканей;

4) Причинный зуб подвижен, реагирует на перкуссию, соседние зубы неподвижны, на перкуссию не реагируют;

5) Причинный и соседние зубы подвижны, реагируют на перкуссию.

А. А-1,4; Б-2,3; В-3,5; Г-3,4.

Б. А-1,4; Б-2,4; В-3,5; Г-3,5.

В. А-1,4; Б-2,4; В-3,5; Г-3,4.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между формой хронического остеомиелита и его рентгенологической картиной: Форма:

А) Деструктивная

Б) Деструктивно-продуктивная

В) Продуктивная Рентгенологическая картина:

1) Очаги кости с множеством мелких секвестров;

2) Эндостальная и периостальная перестройка кости, склероз;

3) Один или несколько очагов резорбции с тенью секвестра в центре;

4) Оссификация утолщенного периоста;

5) Очаг деструкции костной ткани с нечеткими контурами;

6) Очаг деструкции костной ткани с четкими контурами.

А. А-3, Б-1, В-2.

Б. А-2, Б-1, В-3.

В. А-1, Б-2, В-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между остеопластическим материалом и его составом:

Биокомпозиционные материалы

А) Коллапан

Б) Остим

В) Алломатрикс

Г) Био-Осс Состав

1. Бычья кость

2. Гидроксиапатит, коллаген

3. Гидроксиапатит

4. Трупная кость

А. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между методом оперативного вмешательства и послеоперационным ведением раны: Методы оперативного вмешательства

А) После цистотомии проводят

Б) После цистэктомии

В) После проведения разреза при нагноившейся кисте

Г) После проведения ороназальной цистэктомии Осложнения

1. Выводят йодоформный тампон через носовой ход

2. Смену йодоформного тампона раз в неделю

3. Ушивают рану наглухо

4. Устанавливают дренаж

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Установите последовательность действий этапов удаления зуба:

- А) извлечение зуба
- Б) продвижение щечек щипцов
- В) наложение щипцов
- Г) вывихивание зуба
- Д) кюретаж лунки
- Е) сдавление краев лунки
- Ж) сепарация гладилкой
- З) анестезия
- И) осмотр удаленного зуба

- А. ЗЖВБГАИЕД
- Б. ЗЖВГБАИДЕ
- В. ЗЖВБГАИДЕ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между кистой и методом оперативного вмешательства при её лечении: Кисты:

- А) Нагноившаяся радикулярная киста
 - Б) Радикулярная киста в области зубов 22, 23
 - В) Радикулярная киста в области зубов 16, 17, проникающая в верхнечелюстной синус на 2/3
 - Г) Радикулярная киста на беззубой челюсти в стадии нагноения
- Оперативное вмешательство:
- 1. Пластическая цистэктомия
 - 2. Проводим разрез по типу периостомии
 - 3. Цистэктомия
 - 4. Ороназальная цистотомия

- А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.
- Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.
- В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между формой хронического остеомиелита и его рентгенологической картиной: Форма:

А) Деструктивная

Б) Деструктивно-продуктивная

В) Продуктивная Рентгенологическая картина:

1) Очаги кости с множеством мелких секвестров;

2) Эндостальная и периостальная перестройка кости, склероз;

3) Один или несколько очагов резорбции с тенью секвестра в центре;

4) Оссификация утолщенного периоста;

5) Очаг деструкции костной ткани с нечеткими контурами;

6) Очаг деструкции костной ткани с четкими контурами.

А. А-5; Б-4; В-2.

Б. А-2; Б-5; В-4.

В. А-2; Б-4; В-5.

Для острого одонтогенного синусита не характерны морфологические изменения слизистой оболочки:

А. пролиферативные

Б. полипозные

В. отек

Г. полнокровие сосудов

Д. остеофиты

Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является:

А. актиномикоз

Б. острая травма

В. околоушный гипергидроз

Г. хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии

Д. туберкулез

К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят:

А. химиотерапию

Б. криодеструкция

В. лучевую терапию

Г. комбинированное лечение

Д. симптоматическую терапию

Поздним местным осложнением абсцесса окологлоточного пространства является:

- А. слюнной свищ
- Б. абсцесс головного мозга
- В. рубцовый выворот нижней губы
- Г. стеноз верхних дыхательных путей
- Д. тромбоз венозных синусов головного мозга

Симптом нагрузки при переломах нижней челюсти определяется давлением на:

- А. скуловые кости снизу вверх
- Б. подбородок снизу вверх
- В. подбородок спереди назад
- Г. крючок крыловидного отростка снизу вверх
- Д. альвеолярный отросток сверху вниз

Периостит челюстей необходимо дифференцировать с:

- А. тризмом
- Б. переломом зуба
- В. острым сиалодохитом
- Г. хроническим гайморитом
- Д. обострением хронического периодонтита

Установите последовательность действий при обследовании больных с радикулярной кистой в области интактных зубов

4.2,4.1 и подготовке к операции цистэктомия:

- А) шинированиеребондом
- Б) проведение электроодонтодиагностики зубов
- В) рентгенологическое обследование
- Г) депульпирование зубов
- Д) назначение антибактериальной терапии
- Е) проведение операции не позднее 24 часов
- Ж) клиническое обследование больного
- З) выяснение жалоб у пациента
- И) контрольная рентгенограмма

- А. ЗЖВБГАИЕ
- Б. ЗЖВБАГИЕ
- В. ЗЖБВГАИЕ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А) Ортопедические методы лечения пациентов с заболеваниями ВНЧС

Б) Хирургические методы лечения пациентов с заболеваниями ВНЧС

1) Артроскопия

2) Оклюзионные аппараты

3) Медикаментозная терапия

4) Физиотерапия

5) Артроцентез и лаваж ВНЧС

6) Избирательное пришлифовывание

7) Блокады ВНЧС

А. А-2,5,6; Б- 1,7.

Б. А-2,6; Б- 1,5,7.

В. А-2,6,7; Б- 1,5.

Установите последовательность действий при операции цистотомия в области ретинированного зуба

2.3, с последующим ортодонтическим лечением:

А) мобилизация лоскута

Б) иссечение передней стенки кисты

В) отслоить слизисто-надкостничный лоскут

Г) освобождение коронковой части зуба 23 от нависающей костной ткани

Д) фиксация швами йодоформного тампона

Е) фиксация брекета к зубу 23

Ж) проведение разреза

З) инфильтрационная анестезия

И) закрытие раны йодоформным тампоном

А. ЗЖВБАГИЕ

Б. ЗВЖБГАИЕ

В. ЗЖВБГАИЕ

Установите последовательность манипуляций при оперативном методе лечения перелома нижней челюсти со смещением отломков:

А) доступ к линии перелома

Б) фиксация минипластин

В) фиксация назубных шин

Г) наложение резиновой тяги

Д) репозиция отломков челюсти

А. А, В, Д, Б, Г.

Б. В, А, Д, Г, Б.

В. В, А, Д, Б, Г.

Установите последовательность действий при операции цистэктомия в области зубов 2.1,2.2:

- А) удаление оболочки кисты и резекция верхушек корней зубов**
 - Б) создание перфорационного отверстия**
 - В) отслоение слизисто-надкостничного лоскута**
 - Г) расширение перфорационного отверстия**
 - Д) уложить лоскут на место**
 - Е) наложение швов**
 - Ж) проведение разреза по альвеолярному отростку челюсти**
- З) инфильтрационная анестезия**
- И) мобилизация лоскута**

- А. ЗЖВБГАИЕ**
- Б. ЗЖВБГАЕИ**
- В. ЗВЖБГАИЕ**

Абсцесс челюстно-язычного желобка необходимо дифференцировать с:

- А. тризмом**
- Б. карбункулом нижней губы**
- В. флегмоной щечной области**
- Г. флегмоной височной области**
- Д. абсцессом крыловидно-челюстного пространства**

Установите последовательность обследования пациента при переломе костей носа:

- А) сбор жалоб**
- Б) объективный осмотр**
- В) рентгенологическое обследование**
- Г) проходимость носовых путей**
- Д) сбор анамнеза**

- А. А, Д, Б, Г, В**
- Б. А, Д, Б, В, Г**
- В. А, Б, Д, Г, В**

По происхождению верхнечелюстной синусит бывает:

- А. одонтогенным**
- Б. полипозным**
- В. хроническим**
- Г. острым**
- Д. диффузным**

Боковой свищ шеи располагается в области:

- А. щитовидной артерии
- Б. общей сонной артерии
- В. лицевой артерии и вены
- Г. лицевой вены и верхней щитовидной артерии
- Д. внутренней яремной вены и наружной сонной артерии

Ортопедические методы иммобилизации переломов верхней челюсти:

- А. дуга Энгля
- Б. остеосинтез
- В. аппарат Збаржа
- Г. наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
- Д. шина Вебера

Для диагностики конкремента в Вартоновом протоке выполняют рентгенографию:

- А. ортопантограмму
- Б. тела нижней челюсти
- В. внутриротовую дна полости рта
- Г. поднижнечелюстной слюнной железы
- Д. томографию поднижнечелюстной слюнной железы

Ороназальная цистотомия проводится при:

- А. радикулярных кистах верхней челюсти, проникающих в верхнечелюстной синус
- Б. радикулярных кистах, проникающих в полость носа
- В. резидуальных кистах
- Г. кистах верхней челюсти в пределах двух зубов
- Д. кератокисте

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между методикой лечения и показаниями к ней: Методика лечения

А) Кюретаж

Б) Лоскутная операция по Видман-Нейману Показания

1) Глубина карманов не более 4 мм

2) Глубина карманов более 5-6 мм

3) Ретракция тканей

4) Удаление грануляций

5) Удаление зубных отложений

А. А- 1, 4; Б- 2,3,4,5.

Б. А- 1, 4, 5; Б- 2,3,4.

В. А- 4, 5; Б- 1,2,3,4.

Ложный паротит Герценберга - это:

А. лимфогенный паротит

Б. воспалительная опухоль Кюттнера

В. острый серозный лимфаденит интракапсулярного лимфатического узла околоушно-жевательной области

Г. острый серозный лимфаденит экстракапсулярного лимфатического узла околоушно-жевательной области

Д. калькулезный сиалоаденит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Характеристика щипцов

А) Признак стороны имеют щипцы S-образные

Б) Признак изгиба имеют щипцы

В) Изогнутыми по ребру являются

Г) Для удаления верхних третьих моляров используют Название Щипцов

1.S-образные щипцы без шипов

2. Клювовидные щипцы

3. Штыковидные щипцы

4.S-образные с шипом

А. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

Б. А-4, Б-2, В-1, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-3, Г-2.

Установите последовательность действий при операции цистэктомия на нижней челюсти у больного с зубосодержащей кистой в области третьего моляра:

- А) отслоение оболочки кисты
- Б) при наличии узуры, ее расширение
- В) отслоение слизисто-надкостничного лоскута
- Г) удаление третьего моляра
- Д) мобилизация лоскута и укладка на место
- Е) наложение швов
- Ж) проведение разреза
- З) проводниковая анестезия
- И) удаление оболочки кисты

А. ЗЖВБГАИДЕ

Б. ЗЖВБГАДИЕ

В. ЗЖВБАГИДЕ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Синдромы

- А) Синдром Шегрена
- Б) Синдром Хеерфорда
- 1) Сялорей
- 2) Ксерофтальмия
- 3) Гиперпротеинурия
- 4) Увеит
- 5) Двусторонний паротит
- 6) Парез лицевого нерва

А. А -1,2,3,4; Б -5,6.

Б. А -1,2,3; Б -4,5,6.

В. А -1,2; Б -3,4,5,6.

Установите последовательность манипуляций при лечении перелома верхней челюсти со смещением отломков:

- А) клиническое обследование
- Б) иммобилизация отломков
- В) рентгенологическое обследование
- Г) консультация нейрохирурга
- Д) репозиция отломков

А. А, В, Д, Г, Б.

Б. В, А, Г, Д, Б.

В. А, В, Г, Д, Б.

Если причиной периостита является однокорневой зуб, его следует:

- А. удалить
- Б. запломбировать канал до вскрытия периоста
- В. запломбировать резорцин-формалиновой пастой
- Г. раскрыть полость зуба перед вскрытием периоста
- Д. провести резекцию верхушки корня

При неблагоприятном течении абсцесса крыло-небной ямки инфекция распространяется в:

- А. лобные синусы
- Б. заднее средостение
- В. переднее средостение
- Г. полость внутреннего уха
- Д. околоушную слюнную железу

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и соответствующему патогенезу:

Заболевание

А) Интрестициальный сиаладенит

Б) Паренхиматозный сиаладенит Патогенез

- 1) Рыхлая соединительная ткань в междольковых прослойках
- 2) Паренхима железы замещена диффузными скоплениями лимфоидных элементов
- 3) Липоматозная атрофия долек железы
- 4) Сужение щелевидных просветов некоторых протоков с об-разованием фиброзных муфт
- 5) Отек и ангиоматоз в междольковых прослойках
- 6) Вокруг долек железы формируются диффузные, плотные: лимфогистиоцитарные инфильтраты
- 7) Эпителиальные клетки ацинусов имеют преимущественнф цилиндрическую форму, цитоплазма их вакуолизирована за счет накопления белкового секрета

А. А-1,2,3,4; Б-5, 6, 7.

Б. А-1,2,3; Б-4,5, 6, 7.

В. А-1,2,3,4,5; Б-6, 7.

Лечение болезни Микулича и синдрома Шегрена проводится:

- А. совместно с гастроэнтерологом
- Б. совместно с ревматологом
- В. совместно с эндокринологом
- Г. все ответы верны

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Название операции

А) Цистотомия

Б) Цистэктомия

В) Двухэтапная операция

Г) Пластическая цистэктомия

1. Ведение раны под тампоном , без последующего изготовления obturator

2. Ведение раны под тампоном и последующее изготовление obturator

3. Ушивание раны наглухо

4. Цистотомия с последующей цистэктомией

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-4, Б-3, В-2, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Показание:

А) Свищ верхнечелюстного синуса, хронический гайморит, корень в пазухе

Б) Свищ верхнечелюстного синуса, рубцы вестибулярно

В) Лунка глубокая, интактная пазуха

Г) Лунка не глубокая, дно верхнечелюстного синуса низко

1) Заполнить лунку кровью, закрыть вход в неё йодоформным тампоном и подшить его к краям раны или соседним зубам;

2) Выкроить трапецевидный слизисто-надкостничный лоскут, вестибулярно закрыть им перфорированную лунку;

3) Иссечь свищевой ход, закрыть сообщение с верхнечелюстной пазухой лоскутом с нёба;

4) Радикальная синусотомия, удаление корня из пазухи, пластическое закрытие перфорации.

А. А-2; Б-1; В-3; Г-4.

Б. А-4; Б-2; В-3; Г-2.

В. А-4; Б-3; В-3; Г-2.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между локализацией воспалительного процесса и симптоматическими проявлениями: Локализация:

- А) Влагалище сосудисто-нервного пучка шеи;
 - Б) Окологлоточное пространство;
 - В) Позадичелюстное клетчаточное пространство;
 - Г) Средостение;
 - Д) Крыловидно-нижнечелюстное пространство. Симптомы:
- 1) Боль и припухлость кзади от ветви нижней челюсти;
 - 2) Воспалительный инфильтрат по ходу грудиноключично-сосцевидной мышцы;
 - 3) Боль за грудиной;
 - 4) Чувство тяжести в подглазничной области, усиливающееся при наклоне головы вперёд;
 - 5) Онемение кожи подбородка;
 - 6) Ограниченное открывание рта за счет контрактуры жевательных мышц;
 - 7) Припухлость передней дужки мягкого нёба;
 - 8) Экзофтальм;
 - 9) Сглаженность носогубной складки;
 - 10) Отпечатки зубов на слизистой оболочке.

А. А- 2; Б-7; В-1; Г-2, 5; Д-6.

Б. А- 2; Б-7; В-2; Г-1, 5; Д-6.

В. А- 3; Б-7; В-2; Г-1, 5; Д-6.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между манипуляцией и способом проведения:

Манипуляция

- А) Сразу после сложного удаления зуба
- 4.8 следует назначить.
- Б) При удалении зуба на нижней челюсти больного усаживают.
 - В) При удалении зубов на верхней челюсти больного усаживают.
 - Г) После сложного удаления зуба
- 4.8 назначают. Способ проведения
- 1. На уровне локтевого сустава опущенной руки хирурга.
 - 2. На уровне плечевого сустава руки доктора.
 - 3. Антибактериальную и противовоспалительную терапию.
 - 4. Холод на область угла нижней челюсти.

А. А-1, Б-4, В-2, Г-3.

Б. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-3, Г-2.

Причиной развития острого одонтогенного остеомиелита челюстей является воспалительный процесс в:

- А. лимфоузлах
- Б. слюнных железах
- В. периапикальных тканях
- Г. верхнечелюстной пазухе
- Д. месте перелома челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Манипуляция:

- А) Во время удаления фронтальной группы зубов нижней челюсти
 - Б) При удалении премоляров на нижней челюсти
 - В) Удаление нижнего зуба мудрости
 - Г) Удаление премоляров на верхней челюсти
- Осложнение:**

- 1. Проталкивание зуба в мягкие ткани
- 2. Лентообразный разрыв слизистой с язычной стороны
- 3. Вывих или перелом нижней челюсти
- 4. Перфорация дна верхнечелюстного синуса

А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4.

В. А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие в последовательности патологических изменений в патогенезе гнойного воспаления клетчатки: Признак:

- А) Отек
 - Б) Инфильтрат
 - В) Гнойное расплавление
- Изменение:**
- 1) Инфильтрация тканей клетками воспалительного ряда;
 - 2) Разрастание плотной фиброзной ткани;
 - 3) Пролиферация грануляционной ткани;
 - 4) Выход транссудата в окружающие ткани;
 - 5) Повышение проницаемости сосудистой стенки;
 - 6) Реакция фагоцитоза и формирование демаркационной линии;
 - 7) Альтерация.

А. А- 7,5,4; Б- 7,5,4,1; В- 7,5,4,1.

Б. А- 7,5,4; Б- 7,5,4,1; В- 7,5,4,1; 6.

В. А- 7,5,4; Б- 7,5,1; В- 7,5,4,1; 6.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между одонтогенной кистой и её клиническим проявлением: Одонтогенные кисты

А) Радикулярная киста в области зубов 23,24 в стадии нагноения

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8, в стадии воспаления

В) Радикулярная киста верхней челюсти, проникающая в верхнечелюстной синус в стадии ремиссии

Г) Радикулярная киста в области зубов 32, 31, 41, 42 в стадии Клинические проявления

1. Боль в подбородочной области, выбухание по переходной складке

2. Боль в области верхней челюсти, отек в щечной области, сглаженность носогубной складки

3. Боль в области нижней челюсти, ограничение открывания рта

4. Признаки синусита

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Распространенность опухоли ее метастазирование наиболее точно оценивает классификация:

А. Т N M

Б. клиническая

В. пятибалльная

Г. онкологического центра

Установите последовательность методов лечения вывиха суставного диска ВНЧС без репозиции:

А) окклюзионный аппарат

Б) медикаментозная терапия

В) физиотерапия

Г) артроцентез и лаваж ВНЧС

Д) артроскопия ВНЧС

Е) избирательное пришлифовывание

Ж) иммобилизация нижней челюсти

З) артропластика

И) механотерапия

А. Б, Г, А, И.

Б. А, Г, Б, И.

В. А, Г, И, Б.

Клиническая картина бородавчатого предрака красной каймы губ характеризуется наличием:

- А. 2-3 эррозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации
- Б. эрозивной поверхностью с инфильтрацией подлежащих тканей
- В. атрофичных уплощенных бляшек покрытых корками, "географический" рисунок
- Г. ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими, плотно сидящими чешуйками
- Д. болезненного узла с бугристой поверхностью, возвышающегося над эпителием на 3-5 мм

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между аппаратом и методом фиксации при переломах:

Аппарат

- А) Спицы Киршнера
- Б) Аппарат Збаржа
- В) Минипластины и минивинты
- Г) Аппарат Рудько
- Д) Проволочный шов
- Е) Рамка Павлова

1. Прямой остеосинтез

2. Непрямой остеосинтез

А. 1-АВ,Д,Е; 2-Б,Г.

Б. 1-А,Д,Е; 2-Б,Г.

В. 1-А,Д,Е; 2-Б,В,Г.

Установите последовательность действий при удалении зуба

2.6 с разрушенной коронковой частью:

- А) накладываем байонетные щипцы
- Б) распиливаем бором межкорневую перегородку
- В) проводим отслоение десны гладилкой
- Г) вывихиваем корни по одному путем ротации
- Д) кюретаж лунки
- Е) анестезия
- Ж) продвигаем щипцы
- З) удаляем корни по одному

А. ЕВБАЖЗГД

Б. ЕБВАЖГЗД

В. ЕВБАЖГЗД

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между клинической картиной и проводимой манипуляцией: Клиническая картина

А) Глубина пародонтальных карманов более 6-8 мм

Б) Глубина карманов менее 5 мм Манипуляция

1) Кюретаж

2) Гингивэктомия

3) Гингивотомия

4) Лоскутная операция

5) Френулоэктомия

А. А-1 ; Б-4.

Б. А-3 ; Б-1.

В. А-4 ; Б-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между симптомами, возникающими при распространении воспалительного процесса в соседние клетчаточные пространства: Пространство:

А) Клетчатка сосудистого пучка шеи;

Б) Полость черепа

В) Позадичелюстная область

Г) Переднее средостение Симптом:

1) Кашель, загрудинная боль

2) Головокружение, головная боль

3) Болезненная припухлость кзади от ветви челюсти

4) Болезненная припухлость в области грудино-ключично-сосцевидной мышцы

А. А-3, Б-3, В-2, Г-1.

Б. А-3, Б-2, В-3, Г-1.

В. А-1, Б-2, В-3, Г-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие лечения при остеомиелите лунки в зависимости от стадии воспаления: Стадия:

А) Острая

Б) Подострая

В) Хроническая Лечение:

1) Механическая и медикаментозная обработка лунки;

2) Новокаиновая или тримекаиновая блокада;

3) Разрез слизистой оболочки и надкостницы;

4) Общая антибактериальная и противовоспалительная терапия;

5) Стимуляторы неспецифической резистентности организма;

6) Физическое лечение;

7) Секвестрэктомия

А. А- 1,2,3,4; Б- 6; В- 5,7.

Б. А- 1,2,3,4; Б- 5, 6; В- 5,7.

В. А- 1,3,4; Б- 5, 6; В- 5,7.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид синусита

А) Одонтогенный синусит

Б) Риногенный синусит Этиология

1) Источник инфекции местный воспалительный очаг одонтогенной природы;

2) Экзогенная общая инфекция полости носа: вирусная, аденовирусная;

3) Обычно односторонний, ограниченный процесс на дне в/ч пазухи;

4) Процесс в основном диффузный, как правило, двусторонний;

5) Превалирует первично-хроническое воспаление;

6) Начало всегда в виде катарального острого синусита.

А. А-1,3, 5; Б-2,4, 6.

Б. А-1,3; Б-2,4,5,6.

В. А-1,2,3,5; Б-4,6.

К отдаленным осложнениям после операции удаления третьего нижнего моляра относятся:

А. невралгия тройничного нерва

Б. отлом бугра верхней челюсти

В. неврит тройничного нерва

Г. синусит

Д. анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между оперативным вмешательством и показанием к нему:

Оперативное вмешательство

- А) Цистотомию в детском возрасте проводят
 - Б) Цистотомию при ретенции и дистопии клыка проводят
 - В) Цистотомию у пожилых людей проводят
 - Г) Цистотомию, с последующим изготовлением obturatora проводят
- Показания**

- 1. Для исключения второго этапа оперативного вмешательства
- 2. Во избежание травмы зачатков зубов
- 3. С целью сохранения зуба и дальнейшего ортодонтического лечения
- 4. При наличии сопутствующей патологии

А. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между признаками наличия ликвореи при переломе верхней челюсти и методами их верификации: **Признаки**

- А) Наличие крови в ликворе
 - Б) Носовой платок, смоченный отделяемым, при высыхании остался мягким
 - В) Носовой платок, смоченный отделяемым, при высыхании стал жестким
 - Г) Отсутствие крови в ликворе
 - Д) При нанесении на салфетку отделяемого с примесью крови образуется красное пятно
 - Е) При нанесении на салфетку отделяемого с примесью крови образуется красное пятно со светлым ореолом по периферии
- Метод**

1. Носового платка

2. Медицинской салфетки

3. Спинномозговая пункция

А. 1-А; 2-Е; 3-Б.

Б. 1-Б; 2-А; 3-Е.

В. 1-Б; 2-Е; 3-А.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием пародонта и его рентгенологической картиной: Заболевание

- А) Катаральный гингивит генерализованный
Б) Пародонтит генерализованный Рентгенологическая картина
1) Нет изменений
2) Деструкция разной степени
3) Четкий характер перегородок
4) Сохранение состояния окаймляющих кортикальных пластинок
5) Деструкция разной степени межальвеолярных перегородок

А. А- 1,4; Б- 2,3,5.

Б. А- 1,3,4; Б- 2,5.

В. А- 3,4; Б- 1,2,5.

При исследовании секреторной функции околоушной слюнной железы за 20 минут в норме должно выделяться:

А. 1-3 мл

Б. 10-12 мл

В. Не определяется

Г. 5-7 мл

Установите последовательность манипуляций при лечении перелома скуловой кости со смещением отломков:

- А) клиническое обследование
Б) иммобилизация отломков
В) рентгенологическое обследование
Г) консультация нейрохирурга
Д) репозиция отломков

А. А, В, Г, Д, Б

Б. А, В, Г, Б, Д

В. А, Г, В, Д, Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между основными симптомами заболевания ВНЧС и его нозологической формой: Нозологическая форма

А) Артроз ВНЧС

Б) Вывих суставного диска ВНЧС без репозиции

В) Острый артрит ВНЧС Основные симптомы

1) Ограничение открывания рта

2) Боли в области ВНЧС

3) Девиация

4) Дефлексия

5) Невозможность открыть рот

6) Крепитация при открывании рта

7) «Щелчок» при открывании рта

8) Невозможность закрыть рот

А. А- 6; Б-1,2,3,7; В-1,2,4.

Б. А- 6; Б-1,3,7; В-1,2,4.

В. А- 6; Б-2,3,7; В-1,2,4.

Основной консервативный метод иммобилизации отломков челюсти при переломах челюстных костей:

А. дуга Энгля

Б. остеосинтез минипластинами

В. метод Фальтина-Адамса

Г. наложение бимаксиллярных шин с зацепными петлями, фиксация резиновой тягой

Д. остеосинтез по Макиенко

При неблагоприятном течении абсцесса челюстно-язычного желобка инфекция распространяется в:

А. околоушную слюнную железу

Б. субдуральное пространство

В. крыло-небное венозное сплетение

Г. венозные синусы головного мозга

Д. крыловидно-челюстное пространство

Установите последовательность обследования пациента при вывихе зуба:

- А) сбор жалоб
- Б) объективный осмотр
- В) рентгенологическое обследование
- Г) ЭОД
- Д) сбор анамнеза

А. А, Д, Б, В, Г.

Б. А, Д, Б, Г, В.

В. А, В, Г, Б, Д.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между одонтогенной кистой и её клиническим проявлением: Одонтогенные кисты

- А) Радикулярная киста в области зубов 23, 24 в стадии нагноения
- Б) Зубосодержащая киста в области зуба 38, в стадии воспаления
- В) Радикулярная киста верхней челюсти, проникающая в верхнечелюстной синус в стадии ремиссии
- Г) Радикулярная киста в области зубов 32, 31, 41, 42 в стадии нагноения Клинические проявления

1. Боль в подбородочной области, выбухание по переходной складке

2. Боль в области верхней челюсти, отек в щечной области, сглаженность носогубной складки

3. Боль в области нижней челюсти, ограничение открывания рта

4. Признаки синусита

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1

Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1

В. А-1, Б-3, В-4, Г-2

Пунктат радикулярной кисты вне воспаления имеет вид:

- А. гноя
- Б. крови
- В. мутной жидкости
- Г. опалесцирующей жидкости
- Д. холестотомных масс

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом:

Клинические показатели

А) Носовое кровотечение

Б) Гематома слизистой полости рта

В) Нарушение прикуса

Г) Симптом очков

Д) Уплотнение скуловой области

Е) Искривление спинки носа

1. Перелом костей носа

2. Перелом нижней челюсти

3. Перелом верхней челюсти

4. Перелом скуловой кости

А. 1-А,Е; 2-Б,В; 3-Б,В,Г; 4-Б,Д.

Б. 1-А,Е; 2-Б,В; 3-Б,В; 4-Б,Д,Г.

В. 1-А; 2-Б,В; 3-Б,В,Г; 4-Б,Д,Е.

Радикальная синусотомия отличается от щадящей синусотомии:

А. наложением широкого сообщения с полостью носа

Б. дополнительными методами обследования

В. пластикой ороантрального сообщения

Г. местной анестезией

Д. удалением или лечением «причинных» зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие класса и соответствующей степени рецессии десны: Класс

А) I класс

Б) II класс

1) Рецессия в пределах свободной десны

2) Рецессия в пределах прикрепленной десны

3) Рецессия десны с вовлечением соседних зубов

4) Потеря десны и кости в межзубных промежутках

А. А- 2; Б-1.

Б. А- 1; Б-2.

Синусотомия не проводится при:

- А. острым синусите
- Б. хроническом полипозном синусите
- В. травматическом синусите
- Г. частых рецидивах синусита вне периода обострения
- Д. обширных ретенционных кистах верхнечелюстных пазух

Возбудителями при абсцессе челюстно-язычного желобка чаще всего являются:

- А. анаэробы
- Б. лучистые грибы
- В. бледные спирохеты
- Г. стафилококки, стрептококки
- Д. туберкулёзные микобактерии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между степенью подвижности зубов при заболеваниях пародонта: Степень

- А) 1 степень
 - Б) 2 степень
 - В) 3 степень
- Описание**
- 1) Подвижность по отношению к коронке соседнего зуба
 - 2) Подвижность 1 мм в щечно-язычном и губно-язычном направлении
 - 3) Зуб подвижен во всех направлениях
 - 4) Зуб неподвижен, но может быть наклонен в сторону отсутствующего зуба
- А. А- 1; Б-2; В- 3.
 - Б. А- 1; Б-3; В- 2.
 - В. А- 3; Б-2; В- 1.

Установите последовательность манипуляций при лечении перелома челюсти со смещением отломков:

- А) клиническое обследование
 - Б) иммобилизация отломков
 - В) рентгенологическое обследование
 - Г) консультация нейрохирурга
 - Д) репозиция отломков
- А. А, В, Г, Д, Б
 - Б. А, Г, В, Д, Б
 - В. В, А, Г, Д, Б

Установите последовательность действий при удалении ретенрованного верхнего третьего моляра:

- А) вывихивание зуба
- Б) отслоение слизисто-надкостничного лоскута
- В) разрез по альвеолярному гребню верхней челюсти
- Г) наложение байонетных щипцов
- Д) уложение лоскута на место
- Е) наложение швов
- Ж) анестезия
- З) проведение рентгенограммы
- И) тракция зуба

А. ЗЖВГБАИДЕ

Б. ЗЖВБГАИДЕ

В. ЗЖВБГИАДЕ

Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать с:

- А. острым гайморитом
- Б. околоушным гипергидрозом
- В. переломом верхней челюсти
- Г. флегмоной поднижнечелюстной области
- Д. переломом мыщелкового отростка нижней челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между применяемыми аппаратами и методами лечения переломов челюстей: Аппараты:

- А) Шина Тигерштедта
 - Б) Шина Порты
 - В) Спица Киршнера
 - Г) Минипластины и минивинты
 - Д) Проволочный шов
 - Е) Шина Васильева
- Методы лечения:

1. Консервативные

2. Оперативные

А. 1-А, Б, Г; 2- В,Е,Д.

Б. 1-А, Б, Е; 2- В,Г,Д.

В. 1-Г, Б, Е; 2- В,А,Д.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между зубом и способом удаления: Зубы челюстей

- А) Корни резцов верхней челюсти
Б) Корни второго премоляра верхней челюсти
В) Нижние премоляры
Г) Второй верхний моляр
- Способы удаления
1. Не применяют ротационные движения во время удаления
 2. Не применяют ротационные движения
 3. Для удаления производят вращательные движения
 4. Вывихивание осуществляют в щечную и язычную сторону
- А. А-3, Б-1, В-2, Г-4.
Б. А-3, Б-1, В-4, Г-2.
В. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Установите последовательность действий при нагноившейся радикулярной кисте в области зубов

- 2.3,
2.4:
- А) назначение антибактериальной терапии
Б) введение дренажа
В) эвакуация гнойного содержимого
Г) холод местно
Д) удаление дренажа на пятые сутки
Е) оперативное вмешательство в плановом порядке после стихания воспалительных явлений
Ж) проведение разреза по типу периостотомии
- 3) проведение анестезии
И) динамическое наблюдение и перевязки
- А. ЗЖВБГАИДЕ
Б. ЗЖВБГИАДЕ
В. ЗВЖБГАИДЕ

Установите последовательность обследования пациента при переломе скуловой кости:

- А) сбор жалоб
Б) объективный осмотр
В) рентгенологическое обследование
Г) определение участка парестезии
Д) сбор анамнеза
- А. А, Д, Г, Б, В.
Б. А, Б, Д, Г, В.
В. А, Д, Б, Г, В.

Хирургический метод иммобилизации переломов верхней челюсти:

- А. дуга Энгля
- Б. наложение шины Васильева
- В. метод Федершпиля-Дингмана
- Г. наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
- Д. остеосинтез по Макиенко

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между методом рентгенологического обследования и типом перелома: Метод

- А) Обзорная костей лицевого скелета в прямой проекции
- Б) Ортопантомография
- В) Костей носа в прямой проекции
- Г) Скуловой дуги
- Д) Костей носа в боковой проекции
- Е) Обзорная костей лицевого скелета в аксиальной проекции

- 1. Костей носа
- 2. Нижней челюсти
- 3. Верхней челюсти
- 4. Скуловой кости

- А. 1-В,Д; 2-А,Б; 3-Б; 4- Е.
- Б. 1-В,Д; 2-А,Б; 3-Б,Е; 4- Е.
- В. 1-Д; 2-А,Б,В; 3-Б,Е; 4- Е.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения: Заболевание

- А) Пародонтит
- Б) Гингивит
- 1) Кюретаж открытый
- 2) Кюретаж закрытый
- 3) Снятие зубных отложений
- 4) Лоскутная операция
- 5) Синус-лифтинг

- А. А-1, 2; Б-3,4.
- Б. А-2, 4; Б-1,3.
- В. А-1, 2, 4; Б-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между видом синусита и его клиническими проявлениями:
Вид синусита:

А) Острый синусит

Б) Хронический синусит Клинические проявления:

- 1) Повышение температуры тела, нарушение сна, общая вялость;
- 2) На рентгенограмме обнаруживается понижение прозрачности в/х пазухи;
- 3) На рентгенограмме резкое затемнение в/х пазухи;
- 4) Отмечается отечность, болезненность при пальпации щеки соответствующей стороны;
- 5) Выделение слизи из носового хода соответствующей стороны;
- 6) Появление гнойного отделяемого из соответствующей половины носового хода, с неприятным запахом.

А. А-1,3; Б-2, 4,5,6.

Б. А-1,3,5; Б-2, 4, 6.

В. А-1,3,4,5; Б-2,6.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между локализацией инфильтрата и хирургическим доступом: Локализация инфильтрата:

А) Подъязычная область с двух сторон

Б) Подъязычная и поднижнечелюстная области с одной стороны

В) Поднижнечелюстные области с двух сторон

Г) Все клетчаточные пространства дна полости рта

Д) Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта Хирургический доступ:

- 1) Разрез слизистой оболочки дна полости и разрез кожи в поднижнечелюстной области;
- 2) Воротниковый или дугообразный разрез кожи и разрез кожи в подподбородочной области;
- 3) Разрез слизистой оболочки дна полости рта с двух сторон;
- 4) Разрез кожи в поднижнечелюстных областях с двух сторон;
- 5) Разрез слизистой оболочки дна полости рта с двух сторон, разрез кожи в поднижнечелюстных и в подподбородочной областях;
- 6) Воротниковый или дугообразный разрез кожи и разрез кожи в поднижнечелюстных областях;
- 7) Воротниковый или дугообразный разрез кожи с последующим рассечением челюстно-подъязычной мышцы;
- 8) Разрез слизистой оболочки дна полости рта;
- 9) Разрез кожи и поднижнечелюстной и подподбородочной областях;

А. А- 1; Б-3; В-4; Г- 5; Д-7.

Б. А- 3; Б-1; В-5; Г- 4; Д-7.

В. А- 3; Б-1; В-4; Г- 5; Д-7.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Осложнения после удаления

А) Альвеолит

Б) Остеомиелит лунки

В) Парестезия в области ментального отверстия

Г) Стоматит

1. Язвенные образования на слизистой и налет

2. Боль в лунке удаленного зуба через 1-3 дня, отсутствие сгустка

3. Сильные боли, отечность десны, повышение температуры

4. Онемение подбородка

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Установите последовательность действий при наличии радикулярной кисты в области зубов

1.1,

1.2, 1.3,

1.4, проникающей в полость носа:

А) удаление передней стенки кисты

Б) расширить, обнаруженную узтуру

В) отслоить слизисто-надкостничный лоскут

Г) Рассечение оболочки кисты

Д) вводим йодоформный тампон

Е) после эпителизации краев раны, изготовление obturatora

Ж) проводим разрез по альвеолярному отростку верхней челюсти

З) проведение анестезии

И) резекция верхушки корня причинного зуба

А. ЗЖВГБАИДЕ

Б. ЗЖВБГАИДЕ

В. ЗЖВБГАИЕД

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между методами обследования при пародонтите:

Обследование

А) Общее

Б) Местное Методы

1) Проба Шиллера-Писарева

2) Рентгенологическое

3) Папиллярно-микроскопическое

4) Сбор анамнеза

А. А- 2,3; Б- 1,4.

Б. А- 2,4; Б- 1,3.

В. А- 1,4; Б- 2,3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между симптомом и его описанием: Симптом:

А) Герке

Б) Рутенберга-Ревуцкого

В) Компрессионный Описание:

1) Усиление боли в груди при запрокидывании головы назад;

2) Усиление боли в груди при пассивном смещении трахеи;

3) Усиление боли в груди при пассивном смещении сосудисто-нервного пучка;

4) Появление глубокого втяжения в яремной вырезке при глубоком вдохе;

5) Ригидность длинных мышц спины рефлекторного характера;

6) Появление боли в груди при поколачивании по пяткам вытянутых ног в горизонтальном положении больного.

А. А- 1; Б- 4; В-2.

Б. А- 1; Б- 2; В-6.

В. А- 3; Б- 2; В-6.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Клиническая ситуация

- А) Разъединенные корни первого моляра верхней челюсти
Б) Разъединенные корни первого и второго нижних моляров
В) Нижний третий моляр
Г) Корни нижнего второго моляра при мощной межкорневой перегородки Используемый инструмент

1. Угловым элеватором
2. Элеватор Леклюза при сохраненном соседнем зубе
3. Разъединяют фиссурным бором и вывихивают элеватором
4. Удаляют прямым элеватором

А. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

Б. А-4, Б-2, В-1, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-3, Г-2.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между кистой и причиной её образования: Локализация кист:

- А) Радикулярная киста в области зубов
1. 1.1, 1.2 у ребенка в 1.6 лет
Б) Радикулярная киста в области боковой поверхности корня зуба
2. 3

- В) Разряжение костной ткани между корнями зуба
3. 6

- Г) Разряжение костной ткани по боковой поверхности зуба 44 после протезирования

Причины:

1. Перфорация культевой вкладкой
2. В результате травмы
3. Перфорация боковой стенки корня зуба после пломбировки
4. Перфорация бифуркации

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

К дополнительным методам обследования при одонтогенном синусите не относится:

- А. ортопантограмма
Б. рентгенограмма придаточных пазух носа
В. ультразвуковое исследование
Г. компьютерная томография
Д. ЭОД «причинных» зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВООБЩЕ**. Установите соответствие между оперативным вмешательством и методикой его проведения: Оперативное лечение

А) При проведении цистотомии на уровне 5-х зубов

Б) При проведении цистэктомии в области зубов

2.2,2.3

В) При цистэктомии без сохранения зубов

Г) Оронозальная цистэктомия Методика

1. Удаляют всю оболочку, создают соустье с носовым ходом

2. Создаем окно размером с диаметр кисты

3. Резекция верхушек корней с удалением всей оболочки

4. Удаляем зубы, проецирующиеся в полость кисты и всю оболочку

А. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

При иссечении срединного свища шеи необходимо резецировать:

А. щитовидный хрящ

Б. небную миндалину

В. участок подъязычной кости

Г. подчелюстную слюнную железу

Д. проток подчелюстной слюнной железы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВООБЩЕ**. Установите соответствие зубом и методикой его удаления: Зуб

А) Верхние центральные резцы

Б) Верхние боковые резцы

В) Первый верхний премоляр

Г) Нижние резцы Удаление

1. Вывихивание в вестибулярном направлении

2. Вывихивание ротационными движениями

3. Вывихивание сначала в щёчную, а затем в небную сторону

4. Вывихивание в губную, а затем в язычную сторону

А. А-1, Б-2, В-3, Г-4

Б. А-2, Б-1, В-4, Г-3

В. А-2, Б-1, В-3, Г-4

Установите последовательность действий при обследовании больных с радикулярной кистой в области интактных зубов

4.2,4.1 и подготовке к операции цистэктомии:

- А) шинирование ребондом**
- Б) проведение электроодонтодиагностики зубов**
- В) рентгенологическое обследование**
- Г) депульпирование зубов**
- Д) назначение антибактериальной терапии**
- Е) проведение операции не позднее 24 часов**
- Ж) клиническое обследование больного**
- З) выяснение жалоб у пациента**
- И) контрольная рентгенограмма**

А. ЗЖВБГАДИЕ

Б. ЗЖВБГАИДЕ

В. ЗЖБВГАИДЕ

Показанием для проведения блокад по Вишневскому является:

- А. отек**
- Б. инфильтрат**
- В. эмпиема верхнечелюстной пазухи**
- Г. инфильтрат с признаками абсцедирования**
- Д. синусит**

Наружное отверстие бокового свища шеи располагается в:

- А. носоглотке**
- Б. щечной области**
- В. подъязычной области**
- Г. области корня языка**
- Д. поднижнечелюстной области**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между показателями обследования и диагнозом:

Обследование

- А) Патологическая подвижность нижней челюсти, симптом Венсана
 - Б) Патологическая подвижность верхней челюсти, симптом очков, ликворея
 - В) Патологическая подвижность костей носа, носовое кровотечение, затруднение носового дыхания
 - Г) Уплотнение скуловой области, ступенька по нижнеглазничному краю, онемение в подглазничной области
 - Д) Нарушение прикуса, гематома слизистой полости рта
 - Е) Затемнение верхнечелюстного синуса на рентгенограмме
- Диагноз**

- 1. Костей носа
- 2. Нижней челюсти
- 3. Верхней челюсти
- 4. Скуловой кости

А. 1-В; 2-А, Д; 3-Б,Е; 4-Г,Е.

Б. 1-В,Д; 2-А,Б; 3-Б; 4- Е.

В. 1-В,Д; 2-А,Б; 3-Б,Е; 4- Е.

Установите последовательность действий при операции цистэктомия на нижней челюсти у больного с зубосодержащей кистой в области третьего моляра:

- А) отслоение оболочки кисты
- Б) при наличии узур, ее расширение
- В) отслоение слизисто-надкостничного лоскута
- Г) удаление третьего моляра
- Д) мобилизация лоскута и укладка на место
- Е) наложение швов
- Ж) проведение разреза
- З) проводниковая анестезия
- И) удаление оболочки кисты

А. ЖЗВБГАИЕ

Б. ЗЖВБГИАЕ

В. ЗЖВБГАИЕ

Установите последовательность действий при радикальной кисте в области зубов

1.1,

1.2,1.3,

1.4, проникающей в полость носа:

А) удаление передней стенки кисты

Б) расширить, обнаруженную узур

В) отслоить слизисто-надкостничный лоскут

Г) Рассечение оболочки кисты

Д) вводим йодоформный тампон

Е) после эпителизации краев раны, изготовление obturatora

Ж) проводим разрез по альвеолярному отростку верхней челюсти

З) проведение анестезии

И) резекция верхушки корня причинного зуба

А. ЗЖВБГАИЕ

Б. ЗЖВБГАЕИ

В. ЗЖВГБАИЕ

Для острого одонтогенного синусита не характерны морфологические изменения слизистой оболочки:

А. пролиферативные

Б. полипозные

В. отек

Г. полнокровие сосудов

Д. изъязвления слизистой оболочки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между стадией остеомиелита и его клиническим проявлением: Стадия:

А) Острая

Б) Подострая

В) Хроническая Клиническое проявление:

1) Односторонний инфильтрат;

2) Двусторонний инфильтрат;

3) Флегмона околочелюстных тканей;

4) Образование свищей;

5) Безболезненное утолщение участков кости.

А. А-5, Б-2, В-3.

Б. А-5, Б-3, В-2.

В. А-3, Б-2, В-5.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между локализацией кисты и возможным осложнением во время операции: Локализация кист

А) Радикулярная киста в области зубов

1.1,1.2

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8

В) Радикулярная киста в области зубов

1.6,

1.7

Г) Радикулярная киста в области зубов

4.5,

4.4 Осложнения во время операции

1. Травма подбородочного нерва

2. Перфорация дна полос носа

3. Перелом нижней челюсти

4. Перфорация дна верхнечелюстного синуса

А. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Осложнения

А) Невропатия

Б) Проталкивание корня в верхнечелюстной синус

В) Аспирация зуба

Г) Перелом нижней челюсти Причина осложнений

1. Работа элеватором при отсутствии фиксации удаляемого зуба пальцами левой руки

2. Грубая работа щипцами и элеватором при удалении 3 Чрезмерное давление элеватора

4. Проталкивание корня в нижнечелюстной канал

А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Б. А-4, Б-3, В-2, Г-1.

В. А-4, Б-3, В-1, Г-2.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и его клиническими проявлениями в стадию обострения: Заболевание

- А) Пародонтит
Б) Гингивит Клиническая картина
1) Кровоточивость десен
2) Выделение гноя из кармана
3) Яркая гиперемия десны
4) Боль
5) Озноб

А. А- 2, 4; 2- 1,3.

Б. А- 3, 4; 2- 1,2.

В. А- 1, 4; 2- 2,3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между видом перелома и методом иммобилизации:

Метод иммобилизации:

- А) Шина Тигерштедта
Б) Остеосинтез минипластинами
В) Шина Вебера
Г) Гладкая шина-скоба
Д) Шина Васильева
Е) Спица Киршнера Перелом:
1. Альвеолярного отростка
2. Нижней челюсти без смещения
3. Нижней челюсти в области угла со смещением
4. Нижней челюсти в области ветви без смещения
5. Нижней челюсти в области мышечкового отростка со смещением

А. 1-А,Г; 2-В,Д; 3- А,В,Д; 4-Б,Е.

Б. 1-Г; 2-А,В,Д; 3- А,В,Д; 4-Б,Е.

В. 1-Г; 2-А,В,Д,Е; 3- А,В,Д; 4-Б.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между остеопластическими материалами и их происхождением: Биоконпозиционные материалы:

А) Алломатериалы

Б) Аутоматериал

В) Ксеноматериал

Г) Брефокость Происхождение:

1. Из эмбрионов

2. Из трупных костей

3. Из собственной кости

4. Из костей животных

А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

Клиническая картина хейлита Манганотти характеризуется наличием:

А. 2-3 эрозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации

Б. эрозивной поверхностью с инфильтрацией подлежащих тканей

В. атрофичных уплощенных бляшек покрытых корками, "географический" рисунок

Г. ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими, плотно сидящими чешуйками

Д. болезненного узла с бугристой поверхностью, возвышающегося над эпителием на 3-5 мм

К хроническим воспалительным заболеваниям слюнных желез относится:

А. Болезнь Шегрена

Б. Болезнь Микулича

В. эпидемический паротит

Г. интерстициальный сиалоаденит

Д. ксеростомия полости рта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между комплексом лечебных мероприятий при парадонтите: Комплекс мероприятий

А) Общее лечение

Б) Местное лечение Методы лечения

1) Антибактериальное

2) Противовоспалительное

3) Ортогнатическое и ортодонтическое лечение

4) Профессиональная гигиена

5) Иммуномодуляторная терапия

6) Хирургическое вмешательство на пародонте

А. А- 1,2, 5; Б- 4,5.

Б. А- 1,2; Б- 4, 3,5.

В. А- 1,2, 5; Б- 4, 3,5.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между методами фиксации при различных переломах:

Метод:

А) Остеосинтез минипластинами

Б) Тампонада носовых ходов

В) Метод Федершпиля

Г) Наливной баллон

Д) Метод Фальтина-Адамса

Е) Гипсовая повязка Перелом:

1. Нижняя челюсть

2. Скуловая кость

3. Кости носа

4.Верхняя челюсть

А. 1-Д; 2-Г; 3-А,Б,Е; В.

Б. 1-А; 2-В; 3-Б,Е; Г,Д.

В. 1-А; 2-Г; 3-Б,Е; В,Д.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите последовательность действий: Удаление зубов

- А) При удалении резцов и клыков
Б) При удалении премоляров на нижней челюсти справа
В) При удалении премоляров на нижней челюсти слева
Г) При удалении правых моляров на нижней челюсти Положение врача
1.сзади и несколько справа от пациента
2.справа и спереди от больного
3.справа и кзади от больного
4.стоит слева и несколько кпереди от больного

- А. А-2, Б-4, В-3, Г-1.
Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.
В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие: в какой из фаз гнойного воспалительного процесса тканей лица и челюстей проводятся следующие мероприятия: Фаза

- А) Фаза воспаления (гидратации)
Б) Фаза регенерации (дегидратации) Мероприятия
1) Механическое и физико-химическое воздействие на рану;
2) Биохимическая санация раны активным дренированием и местный диализ;
3) Применение средств стимуляции репаративной регенерации в ране.

- А. А-1,2; Б- 3.
Б. А-1; Б- 2,3.
В. А-2; Б-1,3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между формой заболевания и характером боли: Форма заболевания:

А) Острый периодонтит

Б) Острый периостит

В) Острый остеомиелит Характер боли:

1) Приступообразная, со светлыми промежутками;

2) В зубе и челюсти с иррадиацией;

3) Интенсивная в челюсти;

4) От температурных раздражителей;

5) В причинном зубе;

6) Ноющая, периодическая.

А. А-3, Б- 2, В-5.

Б. А-2, Б- 3, В-5.

В. А-3, Б- 5, В-2.

Для хронического одонтогенного синусита не характерны морфологические изменения слизистой оболочки:

А. пролиферативные

Б. полипозные

В. отек

Г. полнокровие сосудов

Д. образование ретенционных кист

Укажите последовательность лечения генерализованного пародонтита тяжелой степени:

А)обезболивание;

Б) лоскутная операция;

В) обучение правильной гигиене полости рта;

Г) временное шинирование зубов;

Д) удаление наддесневых зубных отложений.

А. ВДАГБ

Б. ДВГАБ

В. ВДГАБ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Заболевание пародонта

А) Гингивит

Б) Пародонтит легкой степени Клиническая картина

1) Отек и воспаление

2) Заметный неприятный запах

3) Отсутствие неприятного запаха

4) Иногда возникающий запах

5) Отсутствие гноя

А. А- 3,4,5; Б-1,2

Б. А- 2,4,5; Б-1,3

В. А- 2,3,4; Б-1,5

Основным этиологическим фактором в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта является:

А. гиперсаливация

Б. частичная адентия

В. массивные зубные отложения

Г. хроническая травма слизистой оболочки

Д. заболевания желудочно-кишечного тракта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между распространением кисты и её классификационной группой: Распространение кисты

А) На альвеолярный сегмент одного зуба распространяется

Б) На альвеолярный сегмент двух-трех зубов

В) На альвеолярный сегмент более трех зубов

Г) Смещение и деформация дна верхнечелюстного синуса, при сохранении костной стенки

Классификация по группам

1. киста, оттесняющая верхнечелюстной синус

2. киста малого размера

3. киста среднего размера

4. киста большого размера

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Установите последовательность действий при проведении цистотомии в области зубов

3.4,3.5,

3.6,

3.7:

- А) удаление передней стенки кисты
- Б) создание входного отверстия
- В) отслоение слизисто–надкостничного лоскута
- Г) расширение входного отверстия
- Д) мобилизация лоскута
- Е) введение йодоформного тампона
- Ж) проведение разреза
- З) проводниковая анестезия
- И) эвакуация содержимого кисты

А. ЗЖБВГАИДЕ

Б. ЗЖВБГАИДЕ

В. ЗЖВБГАИЕД

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между аппаратами для иммобилизации при переломах в зависимости от классификации: Аппараты:

- А) Шина Тигерштедта
 - Б) Шина Порто
 - В) Шина Вебера
 - Г) Спица Киршнера
 - Д) Шина Ванкевич
 - Е) Шина Васильева
- Классификация:

1. Назубные

2. Зубонадесневые

3. Надесневые

А. 1-А,Е; 2-В,Д; 3-Б.

Б. 1-А,Д; 2-В,Е; 3-Б.

В. 1-В,Е; 2-А,Д; 3-Б.

Под онкологической настороженностью понимают знание злокачественных новообразований:

- А. ранних симптомов
- Б. препаратов для лечения
- В. профессиональных вредностей
- Г. допустимых доз лучевой терапии
- Д. поздних симптомов

Установите последовательность манипуляций при лечении перелома нижней челюсти без смещения отломков:

- А) клиническое обследование
- Б) иммобилизация отломков
- В) рентгенологическое обследование
- Г) консультация нейрохирурга
- Д) антибактериальная терапия**

А. А, В, Г, Б, Д.

Б. А, В, Д, Б, Г.

В. А, В, Г, Д, Б.

Основной причиной развития анкилоза ВНЧС является:

- А. артрит
- Б. опухоль
- В. мастоидит
- Г. околоушный гипергидроз
- Д. целлюлит околоушно-жевательной области**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом:

Клинические показатели:

- А) Разрыв слизистой полости рта
 - Б) Гематома слизистой полости рта
 - В) Нарушение прикуса
 - Г) Нарушение положения зуба
 - Д) Уплотнение скуловой области**
- Е.) Удлинение нижней трети лица
- Диагноз:**

1. Вывих зуба

2. Перелом альвеолярного отростка

3. Перелом нижней челюсти

4. Перелом верхней челюсти

5. Перелом скуловой кости

А. 1-А, Б, В, Г; 2-А,Б; 3- А,Б,В; 4- А,Б,В,Е; 5- Б,Д.

Б. 1-А, Б, В, Г; 2-А,Б,В; 3- А,Б,В; 4- А,Б,Е; 5- Б,Д.

В. 1-А, Б, В, Г; 2-А,Б,В; 3- А,Б,В; 4- А,Б,В,Е; 5- Б,Д.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между методом иммобилизации и периодом применения:

- Метод иммобилизации
- А) Теменно-подбородочная повязка
 - Б) Межчелюстное лигатурное скрепление
 - В) Назубные шины
 - Г) Повязка Померанцевой-Урбанской
 - Д) Шина Вебера
 - Е) Шина Порты

- Период применения
- 1. Временная
 - 2. Лечебная
 - 3. Транспортная

- А. 1-А,Б,Г; 2- Б,Д,Е; 3- А,В,Г.
Б. 1-А,Б,Г; 2- В,Д,Е; 3- А,Б,Г.
В. 1-А,Б,Г; 2- В,Д,Е; 3- А,Г.

При эпидемическом паротите поражаются слюнные железы:

- А. малые
- Б. околоушные
- В. подъязычные
- Г. поднижнечелюстные
- Д. малые на небе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Заболевание

- А) Хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит
 - Б) Хронический калькулезный сиалоденит
- Клиническая картина
- 1) Чередование периодов обострения с ремиссией
 - 2) Как правило, поражается одна железа
 - 3) Боль перед или во время еды
 - 4) На контрастной сиалогамме основной выводной проток расширен, вместо протоков 3-4 порядка
 - 5) На контрастной сиалогамме проток «разорван», на остальном протяжении протоки, резко расширены
 - 6) Обострения заболевания часто

- А. А- 1,4,7; Б-1,2,3,5.
Б. А- 1,3,4,7; Б-1,2,5.
В. А- 1,2,4,7; Б-1,3,5.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между кистой и её содержимым: Одонтогенные кисты

А) Радикулярная киста

Б) Зубосодержащая киста в области зуба 38

В) Кератокиста

Г) Пародонтальная киста

1. Не содержит жидкости

2. Опалесцирующая жидкость

3. Содержит зуб в полости кисты

4. Содержит кератиновые массы

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между методами лечения и манипуляциями: Метод лечения

А) Хирургический метод

Б) Терапевтический метод

1) Профессиональная гигиена полости рта

2) Кюретаж

3) Френулопластика

4) Лоскутная операция

5) Остеосинтез

А. А- 2,3,4; Б-1.

Б. А- 2,3; Б-1,4.

В. А- 3,4; Б-1,2.

При вправлении вывиха нижней челюсти давление на моляры сначала осуществляется в направлении:

А. вверх

Б. вбок

В. книзу

Г. снизу вверх

Д. фронтальную группу зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Методы лечения

А) Ортопедические методы лечения пациентов с заболеваниями ВНЧС

Б) Хирургические методы лечения пациентов с заболеваниями ВНЧС Манипуляции

1) Артроскопия

2) Оклюзионные аппараты

3) Медикаментозная терапия

4) Физиотерапия

5) Артроцентез и лаваж ВНЧС

6) Избирательное шлифование

7) Блокады ВНЧС

А. А- 1,2,6; Б- 5,7.

Б. А- 2,5,6; Б- 1,7.

В. А- 2,6; Б- 1,5,7.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между методами лечения и манипуляциями: Метод лечения

А) Хирургический

Б) Терапевтический Манипуляция

1) Удаление над- и поддесневых отложений

2) Лоскутные операции

3) Гингивэктомия

4) Цистэктомия

5) Цистотомия

А. А- 2,3; Б-1.

Б. А- 2; Б-1,3.

В. А- 1,3; Б-2.

Установите последовательность действий при подготовке к удалению зубов:

- А) подготовить операционное поле**
 - Б) подобрать необходимые инструменты**
 - В) придать необходимое положение пациенту в кресле**
 - Г) обработать руки**
 - Д) провести операцию удаления зуба**
 - Е) дать рекомендации пациенту и назначить день повторного осмотра**
 - Ж) психологическая и медикаментозная подготовка пациента**
 - З) выбрать метод обезболивания и провести анестезию**
- А. ЖВБАГЗДН
Б. ЖВБГАЗНД
В. ЖВБГАЗДН

При одонтогенном синусите как правило поражается:

- А. один верхнечелюстной синус**
- Б. два верхнечелюстных синуса**
- В. лобная пазуха**
- Г. клиновидная пазуха**
- Д. решетчатый лабиринт**

Болезнь Микулича характеризуется:

- А. нарушением целостности базальной мембраны клеток паренхимы железы, лимфоэпителиальным поражением железы**
- Б. массивной мелкоклеточной инфильтрацией, разрастающейся интерстициальной соединительной тканью**
- В. массивной мелкоклеточной инфильтрацией, уменьшением количества интерстициальной ткани**
- Г. сохранением структуры клеток паренхимы железы, лимфоэпителиальным поражением железы**

Установите последовательность действий при операции цистотомия в области ретенированного зуба

2.3, с последующим ортодонтическим лечением:

- А) мобилизация лоскута**
 - Б) иссечение передней стенки кисты**
 - В) отслоить слизисто-надкостничный лоскут**
 - Г) освобождение коронковой части зуба 23 от нависающей костной ткани**
 - Д) фиксация швами йодоформного тампона**
 - Е) фиксация брекета к зубу 23**
 - Ж) проведение разреза**
 - З) инфильтрационная анестезия**
 - И) закрытие раны йодоформным тампоном**
- А. ЗЖБВГАИДЕ
Б. ЗЖВБГАДИЕ
В. ЗЖВБГАИДЕ

Установите последовательность обследования пациента при переломе нижней челюсти:

- А) сбор жалоб
- Б) объективный осмотр
- В) рентгенологическое обследование
- Г) определение симптома нагрузки
- Д) сбор анамнеза

А. А, Д, Б, В, Г.

Б. А, Д, Г, Б, В.

В. А, Д, Б, Г, В.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между осложнением и причиной его возникновения:

Осложнения

- А) Отлом коронки удаляемого зуба
- Б) Вывих или перелом соседнего зуба
- В) Повреждение десны и мягких тканей полости рта
- Г) Проталкивание корня зуба в мягкие ткани

1. Захват щипцами слизистой

2. Недостаточное продвижение щечек щипцов

3. Чрезмерное продвижение щипцов при анатомической близости верхнечелюстного синуса

4. Грубая работа элеватора

А. А-2, Б-1, В-3, Г-4.

Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

В. А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между видом операции и техникой её проведения: Вид операции:

- А) Цистэктомия
- Б) Цистотомия
- В) Пластическая цистэктомия
- Г) Двухэтапная операция

1. Проводим цистотомию, затем проводим цистэктомию

2. Удаление оболочки полностью

3. Удаление передней стенки оболочки кисты

4. Полное удаление оболочки кисты и дальнейшее ведение под йодоформным тампоном

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между клетчаточным пространством и клиническими проявлениями во время воспалительного процесса: Клетчаточное пространство:

А) Подъязычное;

Б) Челюстно-язычный желобок. Клинические проявления:

1) Боль при глотании, разговоре, открывании рта, припухлость в области нижней челюсти;

2) Боль и плотная припухлость ниже основания нижней челюсти;

3) Гиперемия, отёк и инфильтрация крыловидно-челюстной складки;

4) Болезненное глотание, затруднённое открывание рта.

А. А-2; Б-4.

Б. А-1; Б-2.

В. А-1; Б-3.

Внутреннее отверстие бокового свища шеи открывается в:

А. носоглотке

Б. щечной области

В. подъязычной области

Г. поднижнечелюстной области

Д. области верхнего полюса миндалина

Установите последовательность действий при нагноившейся радикулярной кисте в области зубов

2.3,

2.4:

А) назначение антибактериальной терапии

Б) введение дренажа

В) эвакуация гнойного содержимого

Г) холод местно

Д) удаление дренажа на пятые сутки

Е) оперативное вмешательство в плановом порядке после стихания воспалительных явлений

Ж) проведение разреза по типу периостотомии

З) проведение анестезии

И) динамическое наблюдение и перевязки

А. ЗЖБВГАИЕ

Б. ЗЖВБГАИЕ

В. ЗЖВБГАЕИ

Показанием для цистэктомии кист челюстей является:

- А. проникание кисты в полость носа
- Б. проникание кисты в верхнечелюстной синус
- В. небольшие размеры кисты до трех зубов
- Г. большие размеры кист, более трех зубов
- Д. проникание кисты в нижнечелюстной канал

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом:

Клинические показатели:

- А) Нарушение целостности кожи
- Б) Наличие гематомы
- В) Целостность кожных покровов не нарушена
- Г) Нарушение целостности кости
- Д) Кровотечение

Е) Нарушение чувствительности Диагноз:

1. Ушиб

2. Ссадина

3. Рана

А. 1-Б,Д; 2-А,В; 3-А,Д,Е.

Б. 1-Б,Е; 2-А,Д; 3-А,Д,В.

В. 1-Б,В; 2-А,Д; 3-А,Д,Е.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Симптомы при ложном паротите

А) Симптом Хетчкока

Б) Симптом Тресильяна-Урсона Клиническая картина

- 1. Болезненность при надавливании в области угла нижней челюсти
- 2. Гиперемия каймы вокруг устья выводного протока околоушной железы
- 3. Асиалия на стороне поражения
- 4. Гипосаливация на стороне поражения
- 5. Выделение гнойного экссудата из устья выводного протока

А. А-1; Б-2.

Б. А-2; Б-1.

Верхнечелюстной синус сообщается с полостью носа через соустье расположенное в носовом ходу:

- А. переднем
- Б. среднем
- В. верхнем
- Г. нижнем
- Д. заднем

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между классифицированной по группе кистой и её распространением: Распространение кисты

- А) На альвеолярный сегмент одного зуба распространяется
 - Б) На альвеолярный сегмент двух-трех зубов
 - В) На альвеолярный сегмент более трех зубов
 - Г) Смещение и деформация дна верхнечелюстного синуса, при сохранении костной стенки
- Классификация по группам**

1. Киста, оттесняющая верхнечелюстной синус

2. Киста малого размера

3. Киста среднего размера

4. Киста большого размера

А. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Заболевание

А) Острый эпидемический паротит

Б) Хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит в стадии обострения.

Клиническая картина

1) Выделение гнойного секрета из устья протока

2) Задержка секрета

3) Высокая контагиозность

4) Железа тестовато-пастозная

5) Железа бугристая, плотная

6) Одновременное поражение поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез

А. А- 2, 4, 6; Б-1, 2, 5.

Б. А- 2, 4, 3, 6; Б-1, 5.

В. А- 2, 4, 3, 6; Б-1, 2, 5.

Консервативный метод лечения переломов беззубых челюстных костей:

- А. дуга Энгля
- Б. остеосинтез минипластинами
- В. метод Фальтина-Адамса
- Г. фиксация отломков челюстей костей через имеющиеся съемные протезы
- Д. остеосинтез по Макиенко

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между кистой и причиной её развития: Одонтогенные кисты

- А) Кератокиста
 - Б) Фолликулярная киста
 - В) Радикулярная киста
 - Г) Пародонтальная киста
- Причины развития**
1. Возникает на основе воспаления в области шейки зуба мудрости
 2. Развивается из остатков эмбриональной ткани
 3. Образуется из остатков ткани эмали
 4. Развивается при воспалении в периапикальных тканях
- А. А-3, Б-2, В-4, Г-1.
 - Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.
 - В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

К предраковым заболеваниям красной каймы губ относятся:

- А. рожистое воспаление
- Б. термический и химические ожоги
- В. бородавчатый предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, хейлит Манганотти
- Г. болезнь Боуэна, пигментная ксеродерма актинический кератоз, предраковый меланоз
- Д. эритроплакия, лейкоплакия, красная волчанка, плоский лишай, подслизистый фиброз

Для иммобилизации переломов беззубых челюстей применяется шина:

- А. Порта
- Б. Ванкевич
- В. Тигерштедта
- Г. Вебера
- Д. Васильева

Причиной обострения хронического неспецифического артрита ВНЧС является:

- А. актиномикоз
- Б. околоушный гипергидроз
- В. распространение инфекции из окружающих тканей
- Г. хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
- Д. туберкулез

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между медикаментозными методами лечения при пародонтите: Метод лечения

- А) Специфический**
- Б) Неспецифический Препараты**
 - 1) Кальций D3-никомед
 - 2) Кальцевит
 - 3) Остеогенон
 - 4) Препараты фтора
 - 5) Морской кальций с D3

А. А- 1,2; Б- 3,4,5.

Б. А- 1,2,3; Б- 4,5.

В. А- 2,3; Б- 1,4,5.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и лечением: Заболевание

- А) Пробождение дна верхнечелюстного синуса во время удаления зуба**
- Б) Невропатия**
- В) Аспирация зуба или корня**
- Г) Отлом альвеолярного отростка челюсти Лечение**
 - 1.анальгетики, физиолечение, витамины группы В
 - 2. срочная госпитализация для бронхоскопии и удаления зуба из дыхательных путей
 - 3. удаляют, а слизистую ушивают
 - 4.наложение йодоформной турунды на устье лунки и фиксация щвами

А. А-4, Б-2, В-1, Г-3

Б. А-4, Б-1, В-2, Г-3

В. А-4, Б-1, В-3, Г-2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Инструменты

- А) Щипцы по целевому назначению различают
Б) Щипцы для удаления верхнего первого и второго моляра с коронковой частью
В) Универсальные штыковидные щипцы
Г) Щипцы для удаления первого и второго нижних моляров
- Характеристика, предназначение
1. Можно удалить зубы верхней челюсти
 2. Для удаления зубов верхней и нижней челюсти коронковые и корневые
 3. S-образный изгиб ручек, широкие несходящиеся щечки, одна из них с шипом
 4. Клювовидные щипцы с несходящимися щечками, с двумя шипами

- А. А-2, Б-1, В-3, Г-4.
Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.
В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между типом движения и его описанием: Тип движения

- А) Синдесмотомия
Б) Люксация
В) Ротация
Г) Тракция
- Описание
1. Раскачивание зуба наружу и внутрь
 2. Вывихивание зуба из лунки
 3. Отделение тканей десны от шейки зуба
 4. Вращение вокруг оси зуба

- А. А-3, Б-1, В-4, Г-2.
Б. А-3, Б-1, В-2, Г-4.
В. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между применяемыми для репозиции инструментами и видом перелома: Инструменты:

- А) Крючок Лимберга
- Б) Элеватор Карапетяна
- В) Элеватор Леклюза
- Г) Элеватор Волкова
- Д) Крючок Фарабефа
- Е) Зажим Кохера Перелом:

1. Скуловая кость
2. Скуловая дуга
3. Кости носа

А. 1-А,Б; 2-А,Б;3-Г.

Б. 1-А,Б; 2-А,Г;3-Г.

В. 1-А,Г; 2-А,Б;3-Г.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом:

Клинические показатели:

- А) Патологическая подвижность верхней челюсти
- Б) Боли при давлении на крыловидный отросток клиновидной кости
- В) Слезотечение
- Г) Эмфизема лица
- Д) Симптом очков
- Е) Ликворея Диагноз:

1. Перелом верхней челюсти по Лефор I
2. Перелом верхней челюсти по Лефор II
3. Перелом верхней челюсти по ЛефорIII

А. 1-А, Б; 2-А,Б,Г; 3-А,В,Д,Е.

Б. 1-А, Б; 2-А,Б ,В,Г; 3-А,Г,Д,Е.

В. 1-А, Б; 2-А,Б ,В,Г; 3-А,Г,Е.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между локализацией инфильтрата и хирургическим доступом: Локализация инфильтрата:

- А) Подъязычная область с двух сторон
 - Б) Подъязычная и поднижнечелюстная области с одной стороны
 - В) Поднижнечелюстные области с двух сторон
 - Г) Все клетчаточные пространства дна полости рта
 - Д) Гнилостно-некротическая флегмона дна полости рта Хирургический доступ:
 - 1) Разрез слизистой оболочки дна полости и разрез кожи в поднижнечелюстной области
 - 2) Воротниковый или дугообразный разрез кожи и разрез кожи в подподбородочной области
 - 3) Разрез слизистой оболочки дна полости рта с двух сторон
 - 4) Разрез кожи в поднижнечелюстных областях с двух сторон
 - 5) Разрез слизистой оболочки дна полости рта с двух сторон, разрез кожи в поднижнечелюстных и в подподбородочной областях
 - 6) Воротниковый или дугообразный разрез кожи и разрез кожи в поднижнечелюстных областях
 - 7) Воротниковый или дугообразный разрез кожи с последующим рассечением челюстно-подъязычной мышцы
- А. А-3, Б-4, В-1, Г-5, Д-7.
Б. А-3, Б-1, В-4, Г-5, Д-7.
В. А-3, Б-1, В-4, Г-7, Д-5.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между зубом и методикой его удаления: Зуб

- А) Верхние клыки
 - Б) Первый верхний моляр
 - В) Нижний клык
 - Г) Третий верхний моляр Удаление:
 - 1. Первое вывихивающее движение в вестибулярную сторону
 - 2. Вестибулооральные маятникообразные движения
 - 3. Используют люксацию и ротацию
 - 4. Вывихивание начинаем в щечную сторону
- А. А-1, Б-4, В-1, Г-3.
Б. А-3, Б-4, В-2, Г-1.
В. А-3, Б-4, В-1, Г-2.

Установите последовательность действий при операции цистэктомии в области зубов 2.1,2.2:

- А) удаление оболочки кисты и резекция верхушек корней зубов**
- Б) создание перфорационного отверстия**
- В) отслоение слизисто-надкостничного лоскута**
- Г) расширение перфорационного отверстия**
- Д) уложить лоскут на место**
- Ж) наложение швов**
- З) проведение разреза по альвеолярному отростку челюсти**
- К) инфильтрационная анестезия**
- Л) мобилизация лоскута**

А. КЗБВГАЛДЖ

Б. КЗВБГЛАДЖ

В. КЗВБГАЛДЖ

Установите последовательность действий при удалении нижних резцов:

- А) сомкнуть щечки щипцов**
- Б) наложить несходящиеся клювовидные щипцы**
- В) анестезия**
- Г) продвинуть щечки щипцов**
- Д) отслоить круговую связку зуба серповидной гладилкой**
- Е) кюретаж лунки**
- Ж) выяснение жалоб у пациента**
- З) тракция зуба**
- И) вывихивание зуба при помощи люксации и ротации**

А. ЖВДБГАЗИЕ

Б. ЖВДБГАЗЕИ

В. ЖВДБАГЗИЕ

Острый одонтогенный синусит не дифференцируют с:

- А. периоститом верхней челюсти**
- Б. остеомиелитом верхней челюсти**
- В. ринитом**
- Г. лимфаденитом**
- Д. ретенционными кистами верхнечелюстных пазух**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между клинической ситуацией и последующим осложнением: Клиническая ситуация

- А) Удаление нижнего третьего моляра
Б) Отсутствие сгустка в лунке удаленного зуба
В) Нижние премоляры
Г) После неполного удаления зуба может развиваться Осложнение

- 1.Альвеолит
2.Остеомиелит челюсти
3. Кровотечение после удаления зуба
4.Неврит третьей ветви тройничного нерва

А. А-3, Б-1, В-4, Г-2.

Б. А-3, Б-1, В-2, Г-4.

В. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между показаниями и используемыми материалами:

Показания:

- А) Для направленной регенерации после цистэктомии используют
Б) Для ускорения регенерации после цистэктомии используют
В) Для профилактики осложнений после цистэктомии используют
Г) После цистотомии используют Используемые материалы:

1. Йодоформный тампон
2. Мембрану
3. Остеопластический материал
4. Антибактериальную и противовоспалительную терапию

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-4, Б-3, В-2, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Кистовидные образования:

А) Радикулярная киста в области зубов

1.6,

1.7

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8

В) Кератокиста

Г) Киста резцового канала Ошибки диагностики:

1. Радикулярная киста

2. Бухты верхнечелюстного синуса

3. Кератокиста

4. Амелобластома

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и соответствующим лечением:

Заболевание

А) Обострение хронического рецидивирующего паренхиматозного паротита

Б) Острый калькулезный сиалоденит Лечение

1) Антибактериальное

2) Противовоспалительное

3) Десенсибилизирующее

4) Йодид калия внутрь

5) Инмтилляция протеолитических ферментов, антибиотиков

6) Хирургическое (при неэффективности консервативного)

7) Гипербарическая оксигенация

А. А-1, 2,3,4,5,7; Б-1,2,3,4,6.

Б. А-1, 2,3,4,5,7; Б-1,2,4,6.

В. А-1, 2,3,5,7; Б-1,2,3,4,6.

Установите последовательность манипуляций при лечении перелома верхней челюсти без смещения отломков:

- А) клиническое обследование**
- Б) иммобилизация отломков**
- В) рентгенологическое обследование**
- Г) консультация нейрохирурга**
- Д) антибактериальная терапия**

А. А, В, Г, Б, Д.

Б. А, В, Б, Г, Д.

В. А, В, Г, Д, Б.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие заболеваний и результатов лечения: Заболевание

- А) Пародонтит**
- Б) Гингивит**
- Результаты лечения**
- 1) Уменьшение кровоточивости десен**
- 2) Уменьшение пародонтальных карманов**
- 3) Увеличение подвижности зубов**
- 4) Десна неплотно прилегает к зубам**
- 5) Уменьшение подвижности зубов**

А. А- 2, 5; Б- 1.

Б. А- 1, 5; Б- 2.

В. А- 2; Б- 1.

Для рентгенологической картины фолликулярной кисты характерна деструкция костной ткани:

- А. в виде тающего сахара**
- Б. с четкими контурами и тенью зуба в полости**
- В. в виде матового стекла**
- Г. с нечеткими границами в области образования**
- Д. в виде ячеистой структуры**

Установите последовательность манипуляций при консервативном методе лечения перелома нижней челюсти со смещением отломков:

- А) изготовление назубных шин**
- Б) проведение анестезии**
- В) фиксация назубных шин**
- Г) наложение резиновой тяги**
- Д) репозиция отломков челюсти**

А. А, Б, В, Д, Г.

Б. А, Б, В, Г, Д.

В. А, В, Б, Д, Г.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между кистой и методом её лечения: Локализация кист

А) Радикулярная киста в области зубов

1.1, 1.2, проникающая в полость носа

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8

В) Радикулярная киста в области зубов

1.6,

1.7, оттесняющая верхнечелюстной синус

Г) Резидуальная киста в пределах удаленного зуба

3.6 Оперативное вмешательство

1. Деление оболочки полностью

2. Цистотомия

3. Цистэктомия с удалением зуба

4. Двухэтапная операция

А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между клетчаточным пространством и симптомами проявления воспалительного процесса: Клетчаточное пространство:

А) Челюстно-язычный желобок

Б) Крыловидно-нижнечелюстное Симптомы:

1) Инфильтрат ниже основания нижней челюсти;

2) Инфильтрат в поднижнечелюстной, подбородочной, подъязычной областях;

3) Глубокий инфильтрат под углом нижней челюсти;

4) Воспалительный инфильтрат крыловидно-нижнечелюстной складки.

А. А- 1, Б- 2.

Б. А- 2, Б- 1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между осложнением во время удаления и его признаком: Манипуляция

А) Удаление третьего моляра верхней челюсти

Б) Корни второго моляра верхней челюсти

В) Корни второго нижнего моляра

Г) Третий нижний моляр Осложнение

1. Проталкивание в верхнечелюстную синус

2. Перелом корня зуба

3. Перелом нижней челюсти

4. Отлом бугра верхней челюсти

А. А-3, Б-1, В-2, Г-4.

Б. А-4, Б-2, В-1, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между одонтогенной кистой и соответствующей ей рентгенологической картине: Одонтогенные кисты

А) Радикулярная киста

Б) Кератокиста

В) Фолликулярная киста

Г) Резидуальная киста Рентгенологическая картина

1. Разряжение костной ткани с четкими контурами в области угла нижней челюсти

2. Разряжение костной ткани округлой формы с четкими контурами, проецируется верхушка корня

3. Деструкция костной ткани и отсутствие верхушки зуба в кисте

4. Разряжение костной ткани вокруг коронковой части зуба

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

В. А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом:

Клинические показатели:

- А) Хемоз
 - Б) Гематома слизистой полости рта
 - В) Нарушение прикуса
 - Г) Симптом очков
 - Д) Уплотнение скуловой области
 - Е) Диплопия
- Диагноз:

- 1. Перелом альвеолярного отростка
- 2. Перелом нижней челюсти
- 3. Перелом верхней челюсти
- 4. Перелом скуловой кости

А. 1-Б; 2-Б,В; 3-А,В,Г,Е; 4- А,Б,Д,Е.

Б. 1-Б; 2-Б,В; 3-А,Б,В,Г,Е; 4- А,Б,Д,Е.

В. 1-Б; 2-Б,В; 3-А,Б,В,Г,Е; 4- А,Б,Е.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между видом кисты и рентгенологической картиной:

Одонтогенные кисты

- А) Радикулярная киста
 - Б) Кератокиста
 - В) Фолликулярная киста
 - Г) Резидуальная киста
- Рентгенологическая картина

- 1. Разряжение костной ткани с четкими контурами в области угла нижней челюсти
- 2. Разряжение костной ткани округлой формы с четкими контурами, проецируется верхушка корня
- 3. Деструкция костной ткани и отсутствие верхушки зуба в кисте
- 4. Разряжение костной ткани вокруг коронковой части зуба

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-1, Б-2, В-4, Г-3.

В. А-2, Б-1, В-3, Г-4.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и дополнительными методами его лечения: Заболевание

- А) Пародонтит
Б) Гингивит Методы обследования
1) Рентгенография
2) Определение индекса гигиены
3) Сбор анамнеза
4) Консультация смежных специалистов
5) Цитологический метод

А. А- 1,3; Б- 2, 3,4.
Б. А- 1,3,4; Б- 2, 3.
В. А- 1,3; Б- 2, 3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между осложнениями и соответствующим им лечению: Осложнение

- А) Нагноение после операции цистэктомия
Б) Перелом челюсти после цистэктомии с удалением зуба
3.8
В) Прорыв в верхнечелюстной синус при цистэктомии
Г) Раннее закрытие входного отверстия после цистотомии Лечение
1. Повторно расширить и изготовить obturator
2. Переводим в цистотомию
3. Бимаксиллярное шинирование, остеосинтез
4. Ороназальная цистэктомия

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.
Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.
В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Установите последовательность манипуляций при лечении перелома костей носа со смещением отломков:

- А) клиническое обследование
Б) иммобилизация отломков
В) рентгенологическое обследование
Г) консультация нейрохирурга
Д) репозиция отломков

А. А, В, Д, Г, Б.
Б. А, Г, В, Д, Б.
В. А, В, Г, Д, Б.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Заболевание

А) Морфологические изменения в патогенезе интерстициального сиалоаденита
Б) Морфологические изменения в патогенезе паренхиматозного сиалоаденита
В) Морфологические изменения в патогенезе протокового сиалоаденита Морфологическая картина

1) Дистрофические изменения эпителиальной ткани ацинусов
2) Метоплазия цилиндрического эпителия в бокаловидные клетки
3) Явления склерозирования стромы железы

А. А-3, Б-2, В-1.
Б. А-2, Б-1, В-3.
В. А-3, Б-1, В-2.

Ведущий симптом при вывихе нижней челюсти:

А. слезотечение
Б. снижение высоты прикуса
В. невозможность сомкнуть зубы
Г. гипермобильность нижней челюсти
Д. макрогнатия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между показаниями и используемыми материалами:

Показания:

А) После цистэктомии костный дефект заполняется
Б) Для ускорения регенерации после цистэктомии костный дефект заполняют
В) После пластической цистэктомии костный дефект заполняют
Г) После ороназальной цистэктомии Используемые материалы:
1. Верхнечелюстной синус заполняют йодоформным тампоном
2. Кровяным сгустком
3. Остеопластическим материалом
4. Йодоформным тампоном

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.
Б. А-2, Б-1, В-4, Г-3.
В. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Оперативный доступ при лечении абсцесса челюстно-язычного желобка заключается в разрезе:

- А. окаймляющем угол нижней челюсти
- Б. слизистой оболочки челюстно-язычного желобка ближе к внутренней поверхности
- В. тела нижней челюсти
- Г. В) в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти
- Д. Г) слизистой оболочки по крыловидно-челюстной складке

Установите последовательность действий при операции пластическая цистэктомия на беззубой челюсти:

- А) удаление оболочки кисты полностью
 - Б) расширение входного отверстия
 - В) отслоение слизисто-надкостничного лоскута
 - Г) вылушивание оболочки кисты
 - Д) вворачивание лоскута в костный дефект
 - Е) введение йодоформной турунды
 - Ж) проведение разреза
 - З) проведение анестезии
 - И) мобилизация лоскута
- А. ЗЖВГБАИЕ
Б. ЗЖБВГАИЕ
В. ЗЖВБГАИЕ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между манипуляцией и используемым инструментом:

Манипуляция

А) Для удаления зубов на нижней челюсти с сохраненными коронками используют.

Б) Для удаления зубов

3.8,

4.8 используют.

В) Для удаления дистального корня зуба

4.7 используют.

Г) Для удаления

3.6 и

4.6 зубов с разрушенной коронкой наиболее приемлемы. инструмент

1. Клювовидные щипцы, изогнутые по плоскости.

2. Элеваторы от себя и к себе.

3. Клювовидные шпигцы с несходящимися щечками.

4.Клювовидные щипцы со сходящимися щечками.

А. А-3, Б-1, В-4, Г-2.

Б. А-3, Б-1, В-2, Г-4.

В. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между показанием и методикой закрытия перфорации верхнечелюстного синуса: Показание:

А) Перфорация верхнечелюстного синуса, хронический синусит, корень в пазухе

Б) Перфорация верхнечелюстного синуса, рубцы вестибулярно

В) Лунка глубокая, синус интактен

Г) Лунка не глубокая, дно верхнечелюстного синуса низко Методика:

1) Заполнить лунку кровью, закрыть вход в неё йодоформным тампоном и подшить его к краям раны или соседним зубам;

2) Выкроить трапецевидный слизисто-надкостничный лоскут, вестибулярно закрыть им перфорированную лунку;

3) Иссечь рубец, закрыть сообщение с верхнечелюстным синусом лоскутом с нёба;

4) Радикальная синусотомия, удаление корня из пазухи, пластическое закрытие перфорации.

А. А-4; Б- 3; В-1; Г-2.

Б. А-4; Б- 3; В-2; Г-1.

В. А-4; Б- 2; В-3; Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между параметрами движения нижней челюсти и их минимальными значениями нормы: Параметр движения:

А)Открывание рта

Б)Протрузия

В)Латеротрузия Минимальные значения нормы:

1) 5 мм.

2) 10 мм.

3) 40 мм.

А. А-1; Б-3; В-2.

Б. А-3; Б-1; В-2.

В. А-1; Б-2; В-3.

Установите последовательность манипуляций при консервативном методе лечения перелома нижней челюсти со смещением отломков:

- А) изготовление назубных шин
- Б) удаление зубов из линии перелома не фиксированного к шине
- В) фиксация назубных шин
- Г) наложение резиновой тяги
- Д) репозиция отломков челюсти

А. Б, В, А, Д, Г.

Б. А, Б, В, Д, Г.

В. А, В, Б, Д, Г.

Возникновению острого одонтогенного синусита предшествуют:

- А. выделение из полости носа
- Б. головные боли
- В. воспалительные явления в области моляров или премоляров верхней челюсти
- Г. пункция пазухи ЛОР-врачом
- Д. физические нагрузки

Установите последовательность обследования пациента при переломе верхней челюсти:

- А) сбор жалоб
- Б) объективный осмотр
- В) рентгенологическое обследование
- Г) определение симптома нагрузки
- Д) сбор анамнеза

А. Д, А, Б, Г, В.

Б. А, Д, Б, Г, В.

В. А, Д, Б, В, Г.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Осложнения после удаления

- А) Вывихивание первого верхнего моляра начинают
 - Б) Вывихивание второго верхнего моляра начинают
 - В) Премоляры верхней челюсти
 - Г) Верхний центральный резец
- Признаки заболевания
- 1. Комбинируют ротационные движения и раскачивания в вестибулярную и небную стороны
 - 2. В небную сторону
 - 3. В щечную сторону
 - 4. Движения производят в вестибулярную и небную сторону, первое движение наружу

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-4, Б-3, В-2, Г-1.

О наличии ликвореи при кровотечении из носа или наружного слухового прохода свидетельствует:

- А. симптом Малевича
- Б. положительная реакция Вассермана
- В. положительный тест двойного пятна
- Г. снижение количества альбуминов в крови
- Д. наличие крепитации в области сосцевидных отростков

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и методом лечения: Заболевание

- А) Пародонтит**
Б) Гингивит **Метод лечения**
1) Обезболивание
2) Обучение гигиене
3) Лоскутная операция
4) Удаление зубных отложений
5) Гингивэктомия

А. А-1,2,3; Б-2, 4,5.

Б. А-1,3; Б-2, 4,5.

В. А-1,2; Б-2,3,4,5.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие локализацией кисты и подготовкой к операции:

Локализация кист

А) Радикулярная киста в области зубов

1.1,1.2

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8

В) Радикулярная киста в области зубов

4.2, 41,

31.Отмечается подвижность зубов 2-й степени

Г) Радикулярная киста в области зубов

3.2,3.3,3.4,3.5,3.6 Подготовка

1. Пломбирование причинного зуба

2. Пломбирование каналов зубов

3. Подготовка не требуется

4. Пломбирование каналов и шинирование ребондом

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

В. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

Установите последовательность действий при удалении ретинированного зуба

3.8 в горизонтальном положении:

А) вывихивание корневой части зуба и удаление

Б) распиливание зуба бором на два фрагмента

В) отслоение слизисто-надкостичного лоскута

Г) вывихивание элеватором коронковой части зуба и удаление

Д) лоскут укладывают на место

Е) наложение швов и введение дренажа по кости

Ж) разрез слизистой в ретромолярной области

З)анестезия

И) кюретаж лунки

А. ЗЖВБГАИДЕ

Б. ЗЖВБГАДИЕ

В. ЗВЖБГАИДЕ

Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через _____ отверстие

А. Сонное

Б. Круглое

В. Остистое

Г. Овальное

Стволовая анестезия нижнечелюстного нерва проводится у _____ отверстия

- А. Сонного
- Б. Остистого
- В. Овального
- Г. Круглого

Дифференциальную диагностику корневых кист челюстей проводят с

- А. Острым перикоронитом
- Б. Зубосодержащей кистой
- В. Обострением хронического пульпита
- Г. Острым гнойным лимфаденитом

При удалении моляров на верхней челюсти показана анестезия

- А. Инфильтрационная
- Б. Мандибулярная
- В. Торусальная
- Г. Резцовая

Признаком вскрытия дна гайморовой пазухи является

- А. Положительная ротоносовая проба
- Б. Выделение гноя из лунки удаленного зуба
- В. Выделение крови из лунки удаленного зуба
- Г. Кровотечение из носа

Способствует развитию фурункулеза челюстно-лицевой области

- А. Эндартереит
- Б. Гипертоническая болезнь
- В. Психические заболевания
- Г. Сахарный диабет

При липоме кожа в области новообразования

- А. Гиперимирована, синюшна
- Б. Спаяна в одной точке
- В. Спаяна по всей площади новообразования
- Г. Свободно собирается в складку

К общесоматическим осложнениям местного обезболивания относят

- А. Анафилактический шок
- Б. Синусит
- В. Альвеолит
- Г. Остеомиелит

Острая ожоговая токсемия является _____ периодом ожоговой болезни

- А. Первым
- Б. Вторым
- В. Третьим
- Г. Четвертым

Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, является

- А. Экстренной
- Б. Неотложной
- В. Плановой
- Г. Реабилитационной

К основным симптомам переломов скуловой кости относят

- А. Симптом «ступеньки» по нижнеглазничному краю, диплопия
- Б. Кровоизлияние в нижнее веко, головокружение
- В. Гематому скуловой области, боль в зубах верхней челюсти на стороне повреждения
- Г. Деформацию носа, гематому

Свободной пересадкой кожи называется

- А. Дезэпидермизация
- Б. Перемещение кожного лоскута на микроанастомозе
- В. Пересадка кожного аутотрансплантата
- Г. Перемещение кожного лоскута на ножке

Закрытый очаговый остеосинтез при переломе нижней челюсти производят при помощи

- А. Спицы Киршнера
- Б. Накостных мини-пластин
- В. Аппарата Рудько
- Г. Костного шва

При остром гнойном периодонтите в анализах крови больного выявляют

- А. Отсутствие изменений
- Б. Лейкопению и палочкоядерный сдвиг вправо
- В. Лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг влево, ускоренное СОЭ
- Г. Лейкопению, эозинопению, лимфоцитоз

Липому не дифференцируют с

- А. Базалиомой
- Б. Плазмоцитомой
- В. Дермоидной кистой
- Г. Лимфангиомой

Чтобы избежать болевой реакции при проведении инъекции необходимо

- А. Медленно вводить иглу
- Б. Обработать место вкола иглы спиртом
- В. Использовать аппликационную анестезию места вкола иглы
- Г. Быстро вводить анестетик

Верхней границей околоушно-жевательной области является

- А. Нижний край скуловой дуги
- Б. Передний край жевательной мышцы
- В. Нижний край тела нижней челюсти
- Г. Задний край ветви нижней челюсти

Показанием для цистотомии является киста

- А. Верхней челюсти, при сохранении костной стенки дна полости носа и верхнечелюстной пазухи
- Б. В полость которой проецируется более 3 зубов
- В. Нижней челюсти, при сохранении достаточной толщины кости
- Г. В полость которой проецируется 1–3 зуба

Анестезия по вайсблату блокирует ____ и ____ ветви тройничного нерва

- А. I; III
- Б. I; II
- В. I; IV
- Г. II; III

Передний треугольник шеи ограничен сверху

- А. Лопаточно-подъязычной мышцей
- Б. Белой линией шеи
- В. Срединной линией шеи
- Г. Нижнем краем нижней челюсти

Имплантат должен быть окружен со всех сторон костной тканью толщиной не меньше

- А. 1,5 Мм
- Б. 0,5 Мм
- В. 1,1 Мм
- Г. 0,8 Мм

Структурным подразделением хирургического отделения поликлиники является

- А. Хирургический кабинет
- Б. Физиотерапевтический кабинет
- В. Зуботехническая лаборатория
- Г. Бактериологический кабинет

Задненижней границей поднижнечелюстной области является

- А. Челюстно-подъязычная мышца
- Б. Заднее брюшко двубрюшной мышцы
- В. Внутренняя поверхность тела нижней челюсти
- Г. Сосцевидный отросток

Какова рентгенологическая картина подострой стадии остеомиелита?

- А. Расширение периодонтальной щели
- Б. Очаги деструкции костной ткани с четкими контурами
- В. Очаговый остеосклероз
- Г. Участки резорбции кости, не имеющие четких границ

Хирургическое лечение периферической гигантоклеточной репаративной гранулемы осуществляется

- А. Эндоскопистом
- Б. Оториноларингологом
- В. Онкологом
- Г. Хирургом-стоматологом

К поздним осложнениям огнестрельных переломов челюстей относится

- А. Шок
- Б. Вторичное кровотечение
- В. Гематома
- Г. Коллапс

При проведении блокады подбородочного нерва депо анестетика создается у ментального отверстия, которое чаще находится

- А. Между вторым премоляром и первым моляром
- Б. Между первым и вторым моляром
- В. Под клыком
- Г. Под вторым премоляром или между первым и вторым премоляром

Осложнением кариеса является

- А. Патологическая стираемость эмали
- Б. Гипоплазия эмали
- В. Периодонтит
- Г. Флюороз

На медико-социальную экспертизу направляются граждане при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе вне зависимости от сроков временной нетрудоспособности, но не позднее ____ месяцев от даты ее начала

- А. 4
- Б. 5
- В. 3
- Г. 6

Мышцей, опускающей нижнюю челюсть является

- А. Двубрюшная
- Б. Круговая мышца рта
- В. Грудино-ключично-сосцевидная
- Г. Собственно жевательная

Состояние организма при недостаточности инсулина характеризуется

- А. Гипергликемией
- Б. Развитием уремической комы
- В. Развитием токсико-септического шока
- Г. Гипогликемией

Показанием для местной энзимотерапии раневого процесса является

- А. Вторичное кровотечение
- Б. Наличие некроза в ране
- В. Первично инфицированная рана
- Г. Наличие в ране инородного тела

Основные источники и пути проникновения инфекции при абсцессе клыковой ямки

- А. Очаги одонтогенной инфекции в области моляров верхней челюсти
- Б. Очаги одонтогенной инфекции в области клыков нижней челюсти
- В. Акнэ в подглазничной области
- Г. Очаги одонтогенной инфекции в области клыков и премоляров верхней челюсти

Причиной развития анкилоза внчс является

- А. Перелом суставного отростка нижней челюсти
- Б. Мастоидит
- В. Эозинофильная гранулема
- Г. Миозит

При альвеолите в первое посещение следует

- А. Сделать кюретаж лунки
- Б. Удалить распавшийся сгусток и рыхло ввести в лунку йодоформную турунду
- В. Сделать тугую тампонаду лунки йодоформной турундой
- Г. Сделать разрез по переходной складке

Больному, имеющему листок нетрудоспособности по ОРВИ с 18.03 по

22.03. И явившемуся на приём к врачу-терапевту участковому 26.03 с признаками пневмонии, показано

- А. Оформить новый больничный лист
- Б. Продлить больничный лист с 26.03 до выздоровления с отметкой о нарушении режима
- В. Продлить больничный лист с 26.03 до выздоровления
- Г. Продлить больничный лист с 23.03 до выздоровления с отметкой о нарушении режима

Поднижнечелюстная слюнная железа иннервируется ветвями

- А. Подбородочного нерва
- Б. Язычного нерва
- В. От поднижнечелюстного нервного узла
- Г. Нижнеальвеолярного нерва

Дополнительный метод лучевой диагностики зубосодержащей кисты

- А. ПЭТ КТ
- Б. УЗИ
- В. Сцинтиграфия
- Г. Компьютерная томография

При наложении бимаксиллярных шин с зацепными петлями резиновые кольца (тягу) меняют

- А. Ежедневно
- Б. Еженедельно
- В. 3 Раза в месяц
- Г. Ежемесячно

Поражение половины или всей челюсти характерно для ее _____ формы хронического одонтогенного остеомиелита

- А. Острой
- Б. Диффузной
- В. Гнойной
- Г. Очаговой

Контроль стерилизации проводят

- А. Азапирамовой и фенолфталеиновой пробами
- Б. Фенолфталеиновой пробой
- В. Бактериологическим методом
- Г. Азапирамовой пробой

Формирование (выдача) листов нетрудоспособности осуществляется юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы (или индивидуальными предпринимателями), имеющими лицензию на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по

- А. Экспертизе временной нетрудоспособности
- Б. Экспертизе стойкой нетрудоспособности
- В. Профилактическим медицинским осмотром
- Г. Профилю «терапия» и «педиатрия»

Характерным признаком радикулярной кисты является

- А. Отсутствие источника инфицирования в виде причинного зуба
- Б. Наличие свища в области кисты
- В. Наличие источника инфицирования в виде причинного зуба
- Г. Наличие инфильтрата в области кисты

Относительным противопоказанием к методике пластики множественных рецессий десны по zucchelli de sanctis (2000) без соединительнотканного трансплантата является

- А. Достаточная глубина преддверия полости рта
- Б. Наличие широких межзубных сосочков
- В. Достаточная толщина десны и подвижной слизистой оболочки
- Г. Зона прикрепленной кератинизированной десны менее 2 мм

Клиническая картина острого одонтогенного остеомиелита челюсти заключается в

- А. Болях в зубах, недомогании, свищевых ходах на коже
- Б. Ознобах, повышении температуры тела до 40°C, симптоме Венсана, подвижности зубов
- В. Подвижности всех зубов на челюсти
- Г. Острых пульсирующих болях в зубе, головной боли, положительном симптоме нагрузки

Полуретенированный зуб

- А. Неправильно расположенный в зубном ряду
- Б. Прорезавшейся через костную ткань и непрорезавшийся через слизистую оболочку
- В. Полное прорезывание зуба через костную ткань или слизистую оболочку
- Г. Не прорезавшийся через костную ткань и слизистую оболочку зуб

Прогностически наиболее неблагоприятная локализация рака слизистой оболочки дна полости рта

- А. Подъязычная область
- Б. Боковой отдел с переходом на язык
- В. Передний отдел
- Г. Задний отдел с переходом на корень языка

Основным показателем работы хирургического отделения стоматологической поликлиники является

- А. Средняя стоимость одного законченного лечения
- Б. Выполнение плана оборота койки
- В. Количество принятых больных в день
- Г. Средняя стоимость УЕТ

Инструмент для удаления корней зубов нижней челюсти

- А. Угловой элеватор
- Б. Клювовидные щипцы с шипом
- В. S-образные не сходящиеся щипцы
- Г. Прямые щипцы

Ампутация корня зуба

- А. Разделение корней зуба
- Б. Рассечение десны
- В. Иссечение части десны
- Г. Отсечение и удаление корня зуба

Органоспецифическим новообразованием челюстно-лицевой области является

- А. Папиллома щеки
- Б. Фиброма языка
- В. Амелобластома челюсти
- Г. Остеома челюсти

Штыковидным элеватором (ключом леклюза) удаляют на нижней челюсти

- А. Третьи моляры
- Б. Резцы
- В. Клыки
- Г. Вторые премоляры

Дополнительным методом исследования при вколоченном вывихе зуба является

- А. Полярография
- Б. Электроодонтометрия
- В. Капилляроскопия
- Г. Бактериологический метод

Для оро-антрального свища характерно сообщение с полостью рта

- А. Через лунку удалённого зуба, которое функционирует менее 7 дней
- Б. Через лунку удалённого зуба, которое функционирует более 14 дней
- В. Которое появилось во время операции удаления зуба
- Г. Которое появилось после пластики местными тканями

К важному анатомическому образованию щечной области относят артерию

- А. Лицевую
- Б. Щечную
- В. Височную
- Г. Ифраорбитальную

Инвалидом признается лицо, имеющее _____ нарушение здоровья, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость

- А. Незначительное; его стационарного лечения
- Б. Обратимое; его санаторно-курортного лечения и реабилитации
- В. Временное; выдачи ему листка нетрудоспособности
- Г. Стойкое; его социальной защиты

При исследовании подъязычной области применяется

- А. Зондирование протоков околоушных слюнных желез
- Б. Бимануальная пальпация
- В. Пальпация точек выхода ветвей тройничного нерва
- Г. Рото-носовая проба

Рак слизистой оболочки дна полости рта развивается из

- А. Эпителиальной ткани
- Б. Лимфатической ткани
- В. Нервной ткани
- Г. Мышечной ткани

Первые рентгенологические признаки деструктивного одонтогенного остеомиелита челюсти проявляются на ____ сутки

- А. 7
- Б. 25
- В. 14
- Г. 20

Боли при глотании при бактериальном паротите обусловлены

- А. Отеком переднего отдела околоушной слюнной железы
- Б. Отеком небных дужек
- В. Отеком глоточного отростка околоушной слюнной железы
- Г. Лимфаденитом поверхностных лицевых лимфоузлов

Первый этап обследования хирургического стоматологического больного

- А. Осмотр мягких тканей лица
- Б. Сбор жалоб
- В. Осмотр ротовой полости
- Г. Изучение общесоматического статуса

Преобладающими клетками инфильтрата при остром гнойном воспалении являются

- А. Нейтрофилы
- Б. Плазматические клетки
- В. Эпителиальные клетки
- Г. Лимфоциты

Местным осложнением при проводниковом обезболивании является

- А. Анафилактический шок
- Б. Коллапс
- В. Отек Квинке
- Г. Гематома

Можно временно не удалять из линии перелома зуб

- А. Если он полностью вывихнут из лунки, но целостность его сохранена
- Б. Интактный, удерживающий отломки в правильном положении
- В. В случае его перелома
- Г. Ретенированный, мешающий плотному сопоставлению фрагментов челюсти

По составу секрета околоушная железа является

- А. Слизисто-белковой
- Б. Серозно-слизистой
- В. Серозной
- Г. Слизистой

Наиболее частым осложнением при переломе носовых костей является

- А. Затрудненное открывание рта
- Б. Кровотечение
- В. Диплопия
- Г. Онемение в подглазничных областях

Количество этапов при пластике губы по аббе составляет

- А. 5
- Б. 2
- В. 4
- Г. 3

К причине развития рецидива при любом виде остеотомии нижней челюсти относят

- А. Послеоперационную гематому
- Б. Технические погрешности при перемещении фрагментов
- В. Повреждение надкостницы
- Г. Травму сосудисто-нервного пучка

Выраженным регенераторным действием обладает

- А. Гальванический ток
- Б. Электрическое поле УВЧ
- В. Флюктуирующий ток
- Г. Индуктотерапия

Основным показателем работы отделения челюстно-лицевой хирургии является

- А. УЕТ в день
- Б. Оборот койки
- В. Количество операций в день
- Г. Количество принятых больных в день

Возникновение односторонней припухлости в подчелюстной области, связанное с приемом пищи, может быть симптомом

- А. Сиалоза
- Б. Лимфаденита
- В. Плеоморфной аденомы
- Г. Слюнно-каменной болезни

Цистэктомия подразумевает

- А. Устранение oro-антрального сообщения
- Б. Частичное удаление оболочки кисты
- В. Полное удаление оболочки кисты
- Г. Тампонаду полости костного дефекта

Диафрагму полости рта образуют мышцы

- А. Шилоподъязычные
- Б. Подбородочно-язычные
- В. Двубрюшные
- Г. Челюстно-подъязычные

Вывихи зубов могут быть

- А. Полными, неполными, вколоченными
- Б. Поперечными, продольными
- В. Неполными, частичными, вколоченными
- Г. Полными, частичными, вколоченными

Депо анестетика при мандибулярной анестезии создают у _____ отверстия

- А. Подбородочного
- Б. Нижнечелюстного
- В. Большого нёбного
- Г. Подглазничного

Этиологической причиной развития мукозита в области дентальных имплантатов является

- А. Микробная инвазия с образованием биопленки на поверхности имплантата
- Б. Наличие 3 мм кератинизированной десны в области имплантата
- В. Наличие промывных пространств в конструкции протеза
- Г. Наличие микрозазора между имплантатом и абатментом

Усиление и пролонгирование эффекта местных анестетиков при добавлении в их раствор сосудосуживающих средств связано с

- А. Образованием комплексного соединения анестетика с сосудосуживающим препаратом
- Б. Замедлением всасывания местного анестетика
- В. Замедлением разрушения местного анестетика
- Г. Гипоксией

Развитию вторичного рака нижней челюсти способствует

- А. Предраковый процесс
- Б. Особенность кровоснабжения
- В. Строение костной ткани
- Г. Сахарный диабет

Основной особенностью проведения наркоза в поликлинике является

- А. Минимальный риск
- Б. Хорошая управляемость
- В. Интубационный наркоз
- Г. Комбинированный наркоз

Дополнительным методом исследования у пациента при болевой дисфункции внчс является

- А. КЛКТ
- Б. МСКТ
- В. МРТ
- Г. УЗИ

Зуб человека состоит из

- А. Периодонта, верхушки, корня
- Б. Коронки, дентина, верхушки
- В. Коронки, шейки, корня
- Г. Пульпы, шейки, цемента

Причиной развития болевой дисфункции внчс является

- А. Невралгия тройничного нерва
- Б. Фурункул челюстно-лицевой области
- В. Неврит лицевого нерва
- Г. Изменение высоты прикуса

Постоянное впрыскивание анестетика по мере продвижения иглы во время местного обезболивания производится с целью

- А. Отслоить надкостницу
- Б. Не поранить сосуд
- В. Быстрого наступления анестезии
- Г. Отслоить слизистую десны

В периодонте преобладают волокна

- А. Коллагеновые
- Б. Эластические
- В. Окситалановые
- Г. Аргирофильные

При иммобилизации переломов верхней челюсти хирургическо-ортопедическим является

- А. Дуга Энгля
- Б. Наложение бимаксиллярных шин с працевидной повязкой
- В. Остеосинтез
- Г. Метод Адамса

Дифференциальную диагностику сифилиса в полости рта проводят с

- А. Глоссалгией
- Б. Десквамативным глосситом
- В. Невралгией тройничного нерва
- Г. Плоским лишаем

Перелом нижней челюсти, возникший на стороне противоположной от удара, называется _____ переломом

- А. Противоположным
- Б. Двухсторонним
- В. Отражённым
- Г. Двойным

Местным отдаленным осложнением цистэктомии является

- А. Глоссит
- Б. Рецидив
- В. Миозит
- Г. Пародонтит

Рентгенокинематографией называется

- А. Рентгенологическое обследование, при котором источник вводится в полость рта
- Б. Рентгенография в положении лежа
- В. Рентгенография движущихся объектов
- Г. Рентгенография на расстоянии

Костную полость при цистотомии заполняют

- А. Коллагеновой губкой
- Б. Йодоформной турундой
- В. Жидкой пластмассой
- Г. Остеопластическим материалом

Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне височной области чаще всего бывает абсцесс в

- А. Щечной области
- Б. Подвисочной ямке
- В. Подбородочной области
- Г. Клыковой ямке

В день обращения при абсцессе челюстно-язычного желобка необходимо

- А. Ввести внутримышечно дыхательные аналептики
- Б. Назначить физиотерапевтическое лечение
- В. Вскрыть гнойный очаг
- Г. Начать иглорефлексотерапию

Ориентиром вкола иглы при анестезии верхнечелюстного нерва по вайсблату служит

- А. Скулоальвеолярный гребень
- Б. Бугор верхней челюсти
- В. Середина трагоорбитальной линии
- Г. Суставной бугорок

По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности после травм и реконструктивных операций может быть выдан и продлен до дня восстановления трудоспособности, но на срок не более ____ месяцев с даты начала временной нетрудоспособности

- А. 8
- Б. 9
- В. 10
- Г. 6

Первые костные изменения одонтогенного остеомиелита при помощи рентгенографии выявляются _____ после начала заболевания

- А. На 6-10 сутки
- Б. На 10-14 сутки
- В. На 2-5 сутки
- Г. Не ранее, чем через месяц

Круглый стебельчатый лоскут, формируемый и поэтапно переносимый к месту дефекта, называется

- А. Острым
- Б. Классическим
- В. Ускоренным
- Г. Шагающим

Идентичность цвета пересаженной кожи и окружающей кожи лица достигается при помощи

- А. Физиотерапии
- Б. Гидромассажа
- В. Криотерапии
- Г. Деэпидермизации

Для остановки кровотечения из стенок лунки проводят

- А. Срочную госпитализацию больного
- Б. Назначение гипотензивной терапии
- В. Переливание крови
- Г. Сдавление кровоточащего участка кости

В комплекс лечения острого одонтогенного остеомиелита челюсти входит

- А. Физиотерапия
- Б. Седативная терапия
- В. Гипотензивная терапия
- Г. Лучевая терапия

[Вернуться в начало](#)