

Тесты с вопросами по специальности «Стоматология хирургическая» для аттестации 1 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/hirurgicheskaya/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Стоматология хирургическая» для аккредитации и других экзаменов (2500 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_hirurg/

2) Тесты для аккредитации «Стоматология ортопедическая» (1900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/ortoped/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Хирургическо-ортопедические методы иммобилизации переломов верхней челюсти:

- А. А) дуга Энгля
- Б. Б) остеосинтез минипластинами
- В. В) метод Федершпиля-Дингмана
- Г. Г) наложение бимаксиллярных шин с пращевидной повязкой
- Д. Д) остеосинтез по Макиенко

Установите последовательность обследования пациента при переломе нижней челюсти:

- А) сбор жалоб**
- Б) объективный осмотр**
- В) рентгенологическое обследование**
- Г) определение симптома нагрузки**
- Д) сбор анамнеза**

А. А, Д, Б, В, Г.

Б. А, Д, Г, Б, В.

В. А, Д, Б, Г, В.

Возможные осложнения во время операции удаления моляров и премоляров верхней челюсти:

- А. А) синусит
- Б. Б) периостит
- В. В) альвеолит
- Г. Г) остеомиелит
- Д. Д) перфорация дна верхнечелюстной пазухи.

Пункция верхнечелюстной пазухи не проводится для:

- А. А) эвакуации гноя из пазухи
- Б. Б) эвакуации крови из пазухи
- В. В) удаления полипов из пазухи
- Г. Г) введение медикаментов в пазуху
- Д. Д) промывание пазухи антисептиками при отсутствии свищевого хода

Через какую слизистую оболочку вирус не может проникнуть в организм человека:

- А. А) носа
- Б. Б) полости рта
- В. В) нёбных миндалин
- Г. Г) желудка
- Д. Д) конъюнктиву глаза

При исследовании секреторной функции околоушной слюнной железы за 20 минут в норме должно выделяться:

- А. А) 1-3 мл
- Б. Б) 10-12 мл
- В. В) Не определяется
- Г. Г) 5-7 мл
- Д. Д) 15-20 мл

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между видом кисты и рентгенологической картиной: **Одонтогенные кисты**

А) Радикулярная киста

Б) Кератокиста

В) Фолликулярная киста

Г) Резидуальная киста

1. Разряжение костной ткани с четкими контурами в области угла нижней челюсти

2. Разряжение костной ткани округлой формы с четкими контурами, проецируется верхушка корня

3. Деструкция костной ткани и отсутствие верхушки зуба в кисте

4. Разряжение костной ткани вокруг коронковой части зуба

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-1, Б-2, В-4, Г-3.

В. А-2, Б-1, В-3, Г-4.

Показанием к удалению зуба является:

А. А) острый пульпит

Б. Б) острый периодонтит

В. В) средний кариес

Г. Г) глубокий кариес

Д. Д) хронический периодонтит

Пунктат радикулярной кисты вне воспаления имеет вид:

А. А) гноя

Б. Б) крови

В. В) мутной жидкости

Г. Г) опалесцирующей жидкости

Д. Д) холестотомных масс

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между манипуляцией и способом проведения: Манипуляция

А) Сразу после сложного удаления зуба

4.8 следует назначить.

Б) При удалении зуба на нижней челюсти больного усаживают.

В) При удалении зубов на верхней челюсти больного усаживают.

Г) После сложного удаления зуба

4.8 назначают. Способ проведения

1. На уровне локтевого сустава опущенной руки хирурга.

2. На уровне плечевого сустава руки доктора.

3. Антибактериальную и противовоспалительную терапию.

4. Холод на область угла нижней челюсти.

А. А-1, Б-4, В-2, Г-3.

Б. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-3, Г-2.

Если причиной периостита является однокорневой зуб, его следует:

А. А) удалить

Б. Б) запломбировать канал до вскрытия периоста

В. В) запломбировать резорцин-формалиновой пастой

Г. Г) раскрыть полость зуба перед вскрытием периоста

Д. Д) покрыть зуб искусственной коронкой

К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят:

А. А) химиотерапию

Б. Б) криодеструкция

В. В) лучевую терапию

Г. Г) комбинированное лечение

Д. Д) симптоматическую терапию

Основным этиологическим фактором в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта является:

А. А) гиперсаливация

Б. Б) частичная адентия

В. В) предраковые заболевания

Г. Г) массивные зубные отложения

Д. Д) заболевания желудочно-кишечного тракта

К хроническим воспалительным заболеваниям слюнных желез относится:

- А. А) Болезнь Шегрена
- Б. Б) Болезнь Микулича
- В. В) эпидемический паротит
- Г. Г) интерстициальный сиалоаденит
- Д. Д) острый паротит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Манипуляция:

- А) Во время удаления фронтальной группы зубов нижней челюсти
 - Б) При удалении премоляров на нижней челюсти
 - В) Удаление нижнего зуба мудрости
 - Г) Удаление премоляров на верхней челюсти
- Осложнение:**

- 1. Проталкивание зуба в мягкие ткани
- 2. Лентообразный разрыв слизистой с язычной стороны
- 3. Вывих или перелом нижней челюсти
- 4. Перфорация дна верхнечелюстного синуса

- А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.
- Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4.
- В. А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Основным методом лечения врожденных кист и свищей шеи является:

- А. А) криотерапия
- Б. Б) химиотерапия
- В. В) лучевая терапия
- Г. Г) динамическое наблюдение
- Д. Д) оперативное вмешательство

Для удаления третьих моляров верхней челюсти используют:

- А. А) угловой элеватор
- Б. Б) прямой элеватор
- В. В) клювовидные щипцы со сходящимися щечками
- Г. Г) S-образные щипцы с несходящимися щечками
- Д. Д) S-образные щипцы с шипом слева

Показания к цистотомии:

- А. А) киста проникающая в верхнечелюстной синус
- Б. Б) киста в пределах двух зубов
- В. В) кистогранулема в области вершины корня зуба
- Г. Г) амелобластома
- Д. Д) субпериостальная киста

При неблагоприятном течении абсцесса крыло-небной ямки инфекция распространяется в:

- А. А) лобные синусы
- Б. Б) заднее средостение
- В. В) переднее средостение
- Г. Г) полость внутреннего уха
- Д. Д) околоушную слюнную железу

К дополнительным методам обследования при одонтогенном синусите не относится:

- А. А) ортопантомограмма
- Б. Б) рентгенограмма придаточных пазух носа
- В. В) ультразвуковое исследование
- Г. Г) компьютерная томография
- Д. Д) ЭОД «причинных» зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между одонтогенной кистой и её клиническим проявлением: Одонтогенные кисты

- А) Радикулярная киста в области зубов 23, 24 в стадии нагноения
 - Б) Зубосодержащая киста в области зуба 38, в стадии воспаления
 - В) Радикулярная киста верхней челюсти, проникающая в верхнечелюстной синус в стадии ремиссии
 - Г) Радикулярная киста в области зубов 32, 31, 41, 42 в стадии нагноения
- Клинические проявления**
- 1. Боль в подбородочной области, вздутие по переходной складке
 - 2. Боль в области верхней челюсти, отек в щечной области, сглаженность носогубной складки
 - 3. Боль в области нижней челюсти, ограничение открывания рта
 - 4. Признаки синусита
- А. А-2, Б-3, В-4, Г-1
 - Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1
 - В. А-1, Б-3, В-4, Г-2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Заболевание

А) Хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит

Б) Хронический калькулезный сиалоденит Клиническая картина

1) Чередование периодов обострения с ремиссией

2) Как правило, поражается одна железа

3) Боль перед или во время еды

4) На контрастной сиалограмме основной выводной проток расширен, вместо протоков 3-4 порядка

5) На контрастной сиалограмме проток «разорван», на остальном протяжении протоки, резко расширены

6) Обострения заболевания часто

А. А- 1,4,7; Б-1,2,3,5.

Б. А- 1,3,4,7; Б-1,2,5.

В. А- 1,2,4,7; Б-1,3,5.

Ороназальная цистотомия проводится при:

А. А) радикулярных кистах верхней челюсти, проникающих в верхнечелюстной синус

Б. Б) радикулярных кистах, проникающих в полость носа

В. В) резидуальных кистах

Г. Г) кистах верхней челюсти в пределах двух зубов

Д. Д) кератокисте

При синдроме Шегрена отмечается:

А. А) увеличение СОЭ

Б. Б) гипергаммаглобулинемия

В. В) положительный ревматоидный фактор

Г. Г) все ответы верны

Д. Д) все ответы неверны

Щипцы для удаления первого и второго правых моляров верхней челюсти называются s-образными:

А. А) сходящимися

Б. Б) с шипом слева

В. В) несходящимися

Г. Г) с шипом справа

Д. Д) прямыми несходящимися

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между кистой и её содержимым:

Одонтогенные кисты

А) Радикулярная киста

Б) Зубосодержащая киста в области зуба 38

В) Кератокиста

Г) Пародонтальная киста

Содержимое

1. Не содержит жидкости

2. Опалесцирующая жидкость

3. Содержит зуб в полости кисты

4. Содержит кератиновые массы

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Для создания оттока из верхнечелюстного синуса при остром одонтогенном синусите проводится:

А. А) удаление «причинного» зуба и создание сообщения через лунку

Б. Б) радикальную синусотомию

В. В) разрез в области переходной складки на уровне моляров верхней челюсти

Г. Г) щадящую синусотомию

Д. Д) эндодонтическое лечение «причинного» зуба

Стадию злокачественного новообразования устанавливают на основании клинических признаков:

А. А) жалоб больного

Б. Б) размеров опухоли

В. В) жалоб больного, размеров опухоли

Г. Г) размеров опухоли, наличия близлежащих метастазов

Д. Д) размеров опухоли, наличия отдаленных и близлежащих метастазов

Для рентгенологической картины фолликулярной кисты характерна деструкция костной ткани:

А. А) в виде тающего сахара

Б. Б) с четкими контурами и тенью зуба в полости

В. В) в виде матового стекла

Г. Г) с нечеткими границами в области образования

Д. Д) в виде ячеистой структуры

Для острого одонтогенного синусита характерны морфологические изменения слизистой оболочки:

- А. А)пролиферативные
- Б. Б) полипозные
- В. В) отек
- Г. Г) полнокровие сосудов
- Д. Д) образование ретенционных кист

Боковой свищ шеи располагается в области:

- А. А) щитовидной артерии
- Б. Б) общей сонной артерии
- В. В) лицевой артерии и вены
- Г. Г) лицевой вены и верхней щитовидной артерии
- Д. Д) внутренней яремной вены и наружной сонной артерии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом: Клинические показатели:

- А) Разрыв слизистой полости рта
 - Б) Гематома слизистой полости рта
 - В) Нарушение прикуса
 - Г) Нарушение положения зуба
 - Д) Уплотнение скуловой области
 - Е.) Удлинение нижней трети лица
- Диагноз:**

- 1. Вывих зуба
 - 2. Перелом альвеолярного отростка
 - 3. Перелом нижней челюсти
 - 4. Перелом верхней челюсти
 - 5. Перелом скуловой кости
- А. 1-А, Б, В, Г; 2-А,Б; 3- А,Б,В; 4- А,Б,В,Е; 5- Б,Д.
Б. 1-А, Б, В, Г; 2-А,Б,В; 3- А,Б,В; 4- А,Б,Е; 5- Б,Д.
В. 1-А, Б, В, Г; 2-А,Б,В; 3- А,Б,В; 4- А,Б,В,Е; 5- Б,Д.

Внутреннее отверстие бокового свища шеи открывается в:

- А. А) носоглотке
- Б. Б) щечной области
- В. В) подъязычной области
- Г. Г) поднижнечелюстной области
- Д. Д) области верхнего полюса нёбной миндалины

Для удаления премоляров нижней челюсти используют:

- А. А) S-образные щипцы со сходящимися щечками
- Б. Б) прямые щипцы со сходящимися щечками
- В. В) клювовидные щипцы с несходящимися щечками
- Г. Г) прямой элеватор
- Д. Д) байонетные щипцы

К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят:

- А. А) химиотерапию
- Б. Б) лучевую терапию
- В. В) иссечение опухоли
- Г. Г) комбинированное лечение
- Д. Д) симптоматическую терапию

Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать с:

- А. А) острым отитом
- Б. Б) острым верхнечелюстным синуситом
- В. В) околоушным гипергидрозом
- Г. Г) переломом верхней челюсти
- Д. Д) флегмоной поднижнечелюстной области

Верхнечелюстной синус сообщается с полостью носа через соустье расположенное в носовом ходу:

- А. А) переднем
- Б. Б) среднем
- В. В) верхнем
- Г. Г) нижнем
- Д. Д) заднем

Возможное осложнение во время операции удаления моляров верхней челюсти:

- А. А) невралгия тройничного нерва
- Б. Б) паротит
- В. В) перфорация дна верхнечелюстного синуса
- Г. Г) артрит височно-нижнечелюстного сустава
- Д. Д) неврит тройничного нерва

К отдаленным осложнениям после операции удаления третьего нижнего моляра относятся:

- А. А) невралгия тройничного нерва
- Б. Б) отлом бугра верхней челюсти
- В. В) неврит тройничного нерва
- Г. Г) синусит
- Д. Д) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

Показанием для цистэктомии кист челюстей является:

- А. А) проникновение кисты в полость носа
- Б. Б) проникновение кисты в верхнечелюстной синус
- В. В) небольшие размеры кисты до трех зубов
- Г. Г) большие размеры кист, более трех зубов
- Д. Д) проникновение кисты в нижнечелюстной канал

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между одонтогенной кистой и её клиническим проявлением: Одонтогенные кисты

А) Радикулярная киста в области зубов 23,24 в стадии нагноения

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8, в стадии воспаления

В) Радикулярная киста верхней челюсти, проникающая в верхнечелюстной синус в стадии ремиссии

Г) Радикулярная киста в области зубов 32, 31, 41, 42 в стадии Клинические проявления

1. Боль в подбородочной области, выбухание по переходной складке

2. Боль в области верхней челюсти, отек в щечной области, сглаженность носогубной складки

3. Боль в области нижней челюсти, ограничение открывания рта

4. Признаки синусита

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между остеопластическим материалом и его составом: Биоконпозиционные материалы

А) Коллапан

Б) Остим

В) Алломатрикс

Г) Био-Осс Состав

1. Бычья кость

2. Гидроксиапатит, коллаген

3. Гидроксиапатит

4. Трупная кость

А. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите последовательность действий: Удаление зубов

А) При удалении резцов и клыков

Б) При удалении премоляров на нижней челюсти справа

В) При удалении премоляров на нижней челюсти слева

Г) При удалении правых моляров на нижней челюсти Положение врача

1. сзади и несколько справа от пациента

2. справа и спереди от больного

3. справа и сзади от больного

4. стоит слева и несколько впереди от больного

А. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Причиной для развития периостита является:

А. А) ушиб мягких тканей лица

Б. Б) фиброма альвеолярного отростка

В. В) обострение хронического синусита

Г. Г) обострение хронического периодонтита

Д. Д) перелом мышечного отростка нижней челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между видом операции и техникой её проведения: Вид операции:

А) Цистэктомия

Б) Цистотомия

В) Пластическая цистэктомия

Г) Двухэтапная операция Техника:

1. Проводим цистотомию, затем проводим цистэктомию

2. Удаление оболочки полностью

3. Удаление передней стенки оболочки кисты

4. Полное удаление оболочки кисты и дальнейшее ведение под йодоформным тампоном

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между аппаратами для иммобилизации при переломах в зависимости от классификации: Аппараты:

А) Шина Тигерштедта

Б) Шина Порта

В) Шина Вебера

Г) Спица Киршнера

Д) Шина Ванкевич

Е) Шина Васильева Классификация:

1. Назубные

2. Зубонадесневые

3. Надесневые

А. 1-А,Е; 2-В,Д; 3-Б.

Б. 1-А,Д; 2-В,Е; 3-Б.

В. 1-В,Е; 2-А,Д; 3-Б.

При ложном паротите:

А. А) устье выводного протока не изменено

Б. Б) имеется гиперемия и отек устья выводного протока

В. В) из протока околоушной железы выделяется гной

Г. Г) имеется гиперемия устья выводного протока и появление гнойного экссудата в слюне

Д. Д) из протока околоушной слюнной железы ничего не выделяется

О наличии ликвореи при кровотечении из носа или наружного слухового прохода свидетельствует:

- А. А) симптом Малевича
- Б. Б) положительная реакция Вассермана
- В. В) положительный тест двойного пятна
- Г. Г) снижение количества альбуминов в крови
- Д. Д) наличие крепитации в области сосцевидных отростков

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между методом иммобилизации и периодом применения: Метод иммобилизации

- А) Теменно-подбородочная повязка
 - Б) Межчелюстное лигатурное скрепление
 - В) Назубные шины
 - Г) Повязка Померанцевой-Урбанской
 - Д) Шина Вебера
 - Е) Шина Порты
- Период применения**

1. Временная

2. Лечебная

3. Транспортная

А. 1-А,Б,Г; 2- Б,Д,Е; 3- А,В,Г.

Б. 1-А,Б,Г; 2- В,Д,Е; 3- А,Б,Г.

В. 1-А,Б,Г; 2- В,Д,Е; 3- А,Г.

Острый артрит ВНЧС необходимо дифференцировать с:

- А. А) острым синуситом
- Б. Б) околоушным гипергидрозом
- В. В) переломом верхней челюсти
- Г. Г) флегмоной поднижнечелюстной области
- Д. Д) переломом мыщелкового отростка нижней челюсти

Типичным клиническим признаком периостита является:

- А. А) асимметрия лица
- Б. Б) подвижность всех зубов
- В. В) затруднённое открывание рта
- Г. Г) выбухание подъязычных валиков
- Д. Д) гиперемия и отек переходной складки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между распространением кисты и её классификационной группой: Распространение кисты

А) На альвеолярный сегмент одного зуба распространяется

Б) На альвеолярный сегмент двух-трех зубов

В) На альвеолярный сегмент более трех зубов

Г) Смещение и деформация дна верхнечелюстного синуса, при сохранении костной стенки

Классификация по группам

1. киста, оттесняющая верхнечелюстной синус

2. киста малого размера

3. киста среднего размера

4. киста большого размера

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Периостит челюстей необходимо дифференцировать с:

А. А) тризмом

Б. Б) переломом зуба

В. В) острым сиалодохитом

Г. Г) хроническим синуситом

Д. Д) обострением хронического периодонтита

Зондирование протока **НЕ** позволяет определить:

А. А) наличие сужения или его полного заращения

Б. Б) направление хода протока железы

В. В) присутствие в протоке конкремента и место его расположения

Г. Г) наличие и характер новообразования

Д. Д) топографию железы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Заболевание

А) Морфологические изменения в патогенезе интерстициального сиалоаденита
Б) Морфологические изменения в патогенезе паренхиматозного сиалоаденита
В) Морфологические изменения в патогенезе протокового сиалоаденита Морфологическая картина

- 1) Дистрофические изменения эпителиальной ткани ацинусов
- 2) Метоплазия цилиндрического эпителия в бокаловидные клетки
- 3) Явления склерозирования стромы железы

А. А-3, Б-2, В-1.

Б. А-2, Б-1, В-3.

В. А-3, Б-1, В-2.

Хирургическо-ортопедические методы иммобилизации переломов верхней челюсти:

А. А) дуга Энгля

Б. Б) остеосинтез минипластинами

В. В) метод Фальтина-Адамса

Г. Г) наложение бимаксиллярных шин с працевидной повязкой

Д. Д) остеосинтез по Макиенко

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между показаниями и используемыми материалами: Показания:

А) После цистэктомии костный дефект заполняется

Б) Для ускорения регенерации после цистэктомии костный дефект заполняют

В) После пластической цистэктомии костный дефект заполняют

Г) После ороназальной цистэктомии Используемые материалы:

1. Верхнечелюстной синус заполняют йодоформным тампоном

2. Кровяным сгустком

3. Остеопластическим материалом

4. Йодоформным тампоном

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

В. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Щипцы для удаления клыков нижней челюсти называются:

- А. А) клювовидные сходящиеся
- Б. Б) S-образные щипцы с шипом
- В. В) клювовидные несходящиеся
- Г. Г) горизонтальные коронковые
- Д. Д) штыковидные щипцы со сходящимися щечками

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между остеопластическими материалами и их происхождением: Биоконпозиционные материалы:

- А) Алломатериалы
 - Б) Аутоматериал
 - В) Ксеноматериал
 - Г) Брефокость
- Происхождение:**
- 1. Из эмбрионов
 - 2. Из трупных костей
 - 3. Из собственной кости
 - 4. Из костей животных
- А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.
Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.
В. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

При подозрении на злокачественную опухоль челюстно-лицевой области больного необходимо направить к:

- А. А) районному онкологу
- Б. Б) специалисту-радиологу
- В. В) участковому терапевту
- Г. Г) хирургу общего профиля
- Д. Д) специалисту-стоматологу

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между осложнением и причиной его возникновения: Осложнения

А) Отлом коронки удаляемого зуба

Б) Вывих или перелом соседнего зуба

В) Повреждение десны и мягких тканей полости рта

Г) Проталкивание корня зуба в мягкие ткани

1. Захват щипцами слизистой

2. Недостаточное продвижение щечек щипцов

3. Чрезмерное продвижение щипцов при анатомической близости верхнечелюстного синуса

4. Грубая работа элеватора

А. А-2, Б-1, В-3, Г-4.

Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

В. А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Показания для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти при:

А. А) привычном вывихе

Б. Б) выраженной гиперсаливации

В. В) подозрении на тромбофлебит угловой вены

Г. Г) рефлекторной контрактуры жевательных мышц

Д. Д) гематома щечной области

Для ускорения очищения гнойной раны назначают:

А. А) УВЧ

Б. Б) массаж

В. В) электрофарез

Г. Г) гальванизацию

Д. Д) флюктуаризацию

Под онкологической настороженностью понимают знание злокачественных новообразований:

А. А) ранних симптомов

Б. Б) препаратов для лечения

В. В) профессиональных вредностей

Г. Г) допустимых доз лучевой терапии

Д. Д) путей метастазирования

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между одонтогенной кистой и соответствующей ей рентгенологической картиной: Одонтогенные кисты

А) Радикулярная киста

Б) Кератокиста

В) Фолликулярная киста

Г) Резидуальная киста

1. Разряжение костной ткани с четкими контурами в области угла нижней челюсти

2. Разряжение костной ткани округлой формы с четкими контурами, проецируется верхушка корня

3. Деструкция костной ткани и отсутствие верхушки зуба в кисте

4. Разряжение костной ткани вокруг коронковой части зуба

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

В. А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Среди осложнений эпидемического паротита не бывает:

А. А) менингита

Б. Б) аметропии

В. В) пневмонии

Г. Г) отита

Д. Д) орхита

Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является:

А. А) шум в ушах

Б. Б) нарушение глотания

В. В) множественный кариес

Г. Г) выраженный болевой симптом

Д. Д) резкое ограничение подвижности нижней челюсти

Основной причиной вывихов нижней челюсти является:

А. А) артроз ВНЧС

Б. Б) нижняя макрогнатия

В. В) снижение высоты прикуса

Г. Г) глубокое резцовое перекрытие

Д. Д) слабость суставной капсулы и связочного аппарата ВНЧС

Для подтверждения диагноза "боковая киста шеи" проводится исследование:

- А. А) биохимическое
- Б. Б) цитологическое
- В. В) радиоизотопное
- Г. Г) реакция Вассермана

Основным методом лечения кист большого размера является:

- А. А) цистэктомия
- Б. Б) цистотомия
- В. В) периостотомия
- Г. Г) частичная резекция челюсти
- Д. Д) полная резекция челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Характеристика щипцов

- А) Признак стороны имеют щипцы S-образные
- Б) Признак изгиба имеют щипцы
- В) Изогнутыми по ребру являются
- Г) Для удаления верхних третьих моляров используют Название Щипцов

- 1. S-образные щипцы без шипов
- 2. Клювовидные щипцы
- 3. Штыковидные щипцы
- 4. S-образные с шипом

- А. А-4, Б-1, В-2, Г-3.
- Б. А-4, Б-2, В-1, Г-3.
- В. А-4, Б-1, В-3, Г-2.

Синусотомия не проводится при:

- А. А) остром синусите
- Б. Б) хроническом полипозном синусите
- В. В) травматическом синусите
- Г. Г) частых рецидивах синусита вне периода обострения
- Д. Д) обширных ретенционных кистах верхнечелюстных пазух

Характерный симптом при двустороннем переломе мыщелковых отростка нижней челюсти:

- А. А) открытый прикус
- Б. Б) кровотечение из носа
- В. В) разрыв слизистой альвеолярного отростка
- Г. Г) изменение прикуса моляров со стороны перелома
- Д. Д) изменение прикуса моляров с противоположной стороны от перелома

Под онкологической настороженностью понимают знание:

- А. А) профессиональных вредностей
- Б. Б) препаратов для лечения опухолей
- В. В) допустимых доз лучевой терапии
- Г. Г) специальных методов обследования, ранней диагностики
- Д. Д) все ответы верны

Причиной специфического артрита ВНЧС является:

- А. А) актиномикоз
- Б. Б) ревматическая атака
- В. В) околоушный гипергидроз
- Г. Г) хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
- Д. Д) острая травма ВНЧС

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Осложнения

- А) Невропатия
 - Б) Проталкивание корня в верхнечелюстной синус
 - В) Аспирация зуба
 - Г) Перелом нижней челюсти Причина осложнений
1. Работа элеватором при отсутствии фиксации удаляемого зуба пальцами левой руки
 2. Грубая работа щипцами и элеватором при удалении
 3. Чрезмерное давление элеватора
 4. Проталкивание корня в нижнечелюстной канал
- А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.
 - Б. А-4, Б-3, В-2, Г-1.
 - В. А-4, Б-3, В-1, Г-2.

Для иммобилизации переломов беззубых челюстей применяется шина:

- А. А) Порта
- Б. Б) Ванкевич
- В. В) Тигерштедта
- Г. Г) Вебера
- Д. Д) Васильева

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между показаниями и используемыми материалами: Показания:

- А) Для направленной регенерации после цистэктомии используют
- Б) Для ускорения регенерации после цистэктомии используют
- В) Для профилактики осложнений после цистэктомии используют
- Г) После цистэктомии используют Используемые материалы:

- 1. Йодоформный тампон
- 2. Мембрану
- 3. Остеопластический материал
- 4. Антибактериальную и противовоспалительную терапию

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-4, Б-3, В-2, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Боковая киста шеи локализуется:

- А. А) по средней линии шеи
- Б. Б) в подподбородочной области
- В. В) в поднижнечелюстной области
- Г. Г) по переднему краю m. trapezius
- Д. Д) в средней трети шеи, по переднему краю m. sternocleidomastoideus

Кровотечение из лунки во время удаления зуба возникает:

- А. А) при переломе челюсти
- Б. Б) синусите
- В. В) повышенном артериальном давлении
- Г. Г) пониженном артериальном давлении
- Д. Д) анафилактическом шоке

Установите последовательность действий при удалении ретинированного зуба 3.8 в горизонтальном положении:

- А) вывихивание корневой части зуба и удаление
- Б) распиливание зуба бором на два фрагмента
- В) отслоение слизисто-надкостичного лоскута
- Г) вывихивание элеватором коронковой части зуба и удаление
- Д) лоскут укладывают на место
- Е) наложение швов и введение дренажа по кости
- Ж) разрез слизистой в ретромолярной области

З) анестезия

И) кюретаж лунки

А. ЗЖВБГАИДЕ

Б. ЗЖВБГАДИЕ

В. ЗВЖБГАИДЕ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между применяемыми для репозиции инструментами и видом перелома: Инструменты:

- А) Крючок Лимберга
 - Б) Элеватор Карапетяна
 - В) Элеватор Леклюза
 - Г) Элеватор Волкова
 - Д) Крючок Фарабефа
 - Е) Зажим Кохера
- Перелом:

- 1. Скуловая кость
- 2. Скуловая дуга
- 3. Кости носа

А. 1-А,Б; 2-А,Б;3-Г.

Б. 1-А,Б; 2-А,Г;3-Г.

В. 1-А,Г; 2-А,Б;3-Г.

Распространенность опухоли, ее метастазирование наиболее точно оценивает классификация:

- А. А) Т N M
- Б. Б) клиническая
- В. В) пятибалльная
- Г. Г) онкологического центра
- Д. Д) универсальная ВОЗ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Осложнения после удаления

А) Альвеолит

Б) Остеомиелит лунки

В) Парестезия в области ментального отверстия

Г) Стоматит

1. Язвенные образования на слизистой и налет

2. Боль в лунке удаленного зуба через 1-3 дня, отсутствие сгустка

3. Сильные боли, отечность десны, повышение температуры

4. Онемение подбородка

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Синдромы

А) Синдром Шегрена

Б) Синдром Хеерфорда

1) Сиа́лорея

2) Ксерофтальмия

3) Гиперпротеинурия

4) Увеит

5) Двусторонний паротит

6) Парез лицевого нерва

А. А -1,2,3,4; Б -5,6.

Б. А -1,2,3; Б -4,5,6.

В. А -1,2; Б -3,4,5,6.

Установите последовательность обследования пациента при переломе скуловой кости:

А) сбор жалоб

Б) объективный осмотр

В) рентгенологическое обследование

Г) определение участка парестезии

Д) сбор анамнеза

А. А, Д, Г, Б, В.

Б. А, Б, Д, Г, В.

В. А, Д, Б, Г, В.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между применяемыми аппаратами и методами лечения переломов челюстей: Аппараты:

А) Шина Тигерштедта

Б) Шина Порта

В) Спица Киршнера

Г) Минипластины и минивинты

Д) Проволочный шов

Е) Шина Васильева Методы лечения:

1. Консервативные

2. Оперативные

А. 1-А, Б, Г; 2- В,Е,Д.

Б. 1-А, Б, Е; 2- В,Г,Д.

В. 1-Г, Б, Е; 2- В,А,Д.

При периостите гнойный процесс локализуется под:

А. А) кожей

Б. Б) мышцей

В. В) надкостницей

Г. Г) наружной кортикальной пластинкой челюсти

Д. Д) слизистой оболочкой альвеолярного отростка

К дополнительным методам исследования, проводимым для уточнения диагноза "злокачественное новообразование челюстно-лицевой области" относится:

А. А) физикальный

Б. Б) биохимический

В. В) цитологический

Г. Г) иммунологический

Д. Д) ангиографический

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Кистовидные образования:

А) Радикулярная киста в области зубов

1.6,

1.7

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8

В) Кератокиста

Г) Киста резцового канала Ошибки диагностики:

1. Радикулярная киста

2. Бухты верхнечелюстного синуса

3. Кератокиста

4. Амелобластома

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Для рентгенологической картины радикулярной кисты характерно:

А. А) резорбция костной ткани в виде тающего сахара

Б. Б) резорбция костной ткани в виде матового стекла

В. В) резорбция костной ткани с четкими контурами округлой формы в области верхушки корня зуба

Г. Г) резорбция костной ткани в виде нескольких полостей

Д. Д) резорбция костной ткани с нечеткими контурами

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между кистой и методом оперативного вмешательства при её лечении: Кисты:

А) Нагноившаяся радикулярная киста

Б) Радикулярная киста в области зубов 22, 23

В) Радикулярная киста в области зубов 16, 17, проникающая в верхнечелюстной синус на 2/3

Г) Радикулярная киста на беззубой челюсти в стадии нагноения Оперативное вмешательство:

1. Пластическая цистэктомия

2. Проводим разрез по типу периостомии

3. Цистэктомия

4. Оронозальная цистотомия

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1.

В. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Больные хроническим одонтогенным перфоративным синуситом жалуются на:

А. А) боли в лобной области

Б. Б) боли в области зубов верхней челюсти

В. В) попадание жидкости из полости рта в полость носа

Г. Г) боли при глотании

Д. Д) онемение подглазничной области на стороне поражения

Основным симптомом перелома верхней челюсти является:

А. А) головная боль

Б. Б) носовое кровотечение

В. В) патологическая подвижность нижней челюсти

Г. Г) патологическая подвижность верхнечелюстных костей

Д. Д) разрывы слизистой оболочки альвеолярных отростков

Больные острым синуситом жалуются на:

А. А) сильные боли в лобной области

Б. Б) боли при глотании

В. В) гнойные выделения из носа

Г. Г) ограничение открывания рта

Д. Д) онемение подглазничной области на стороне поражения

Поздним местным осложнением абсцесса окологлоточного пространства является:

- А. А) слюнной свищ
- Б. Б) абсцесс головного мозга
- В. В) рубцовый выворот нижней губы
- Г. Г) стеноз верхних дыхательных путей
- Д. Д) тромбоз венозных синусов головного мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между кистой и методом её лечения: Локализация кист

А) Радикулярная киста в области зубов

1.1,1.2, проникающая в полость носа

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8

В) Радикулярная киста в области зубов

1.6,

1.7, оттесняющая верхнечелюстной синус

Г) Резидуальная киста в пределах удаленного зуба

3.6 Оперативное вмешательство

1. Деление оболочки полностью

2. Цистотомия

3. Цистэктомия с удалением зуба

4. Двухэтапная операция

А. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом: Клинические показатели:

А) Хемоз

Б) Гематома слизистой полости рта

В) Нарушение прикуса

Г) Симптом очков

Д) Уплотнение скуловой области

Е) Диплопия

1. Перелом альвеолярного отростка

2. Перелом нижней челюсти

3. Перелом верхней челюсти

4. Перелом скуловой кости

А. 1-Б; 2-Б,В; 3-А,В,Г,Е; 4- А,Б,Д,Е.

Б. 1-Б; 2-Б,В; 3-А,Б,В,Г,Е; 4- А,Б,Д,Е.

В. 1-Б; 2-Б,В; 3-А,Б,В,Г,Е; 4- А,Б,Е.

Осложнения, возникающие непосредственно после операции удаления зуба:

А. А) паротит

Б. Б) кровотечение из лунки удаленного зуба

В. В) невралгия тройничного нерва

Г. Г) артрит височно-нижнечелюстного сустава

Д. Д) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

Срединная киста шеи локализуется:

А. А) по средней линии шеи

Б. Б) в области яремной вырезки

В. В) в поднижнечелюстной области

Г. Г) по переднему краю m. Trapezius

Д. Д) в области корня языка

S - образными щипцами с шипом удаляют:

А. А) резцы верхней челюсти

Б. Б) третьи моляры верхней челюсти

В. В) моляры верхней челюсти

Г. Г) премоляры нижней челюсти

Д. Д) премоляры верхней челюсти

Основным методом лечения кист небольшого размера является:

- А. А) цистэктомия
- Б. Б) склерозирующая терапия
- В. В) половинная резекция челюсти
- Г. Г) частичная резекция челюсти
- Д. Д) цистотомия

Основной симптом перелома костей носа:

- А. А) деформация носа
- Б. Б) подкожная эмфизема
- В. В) затруднение носового дыхания
- Г. Г) патологическая подвижность костей носа
- Д. Д) кровотечение из носовых ходов

В комплекс мероприятий при лечении хронического неспецифического артрита ВНЧС входят:

- А. А) химиотерапия, иглотерапия
- Б. Б) физиотерапия, нормализация окклюзии, разгрузка и покой ВНЧС
- В. В) физиотерапия, остеотомия нижней челюсти, иммобилизация
- Г. Г) иглорефлексотерапия
- Д. Д) физиотерапия, удаление мышечного отростка, разгрузка и покой ВНЧС

Припухлость при гнойно-некротическом паротите чаще имеет характер:

- А. А) ограниченный;
- Б. Б) диффузный;
- В. В) любой
- Г. Д) не наблюдается припухлости

При отсутствии кровяного сгустка в лунке удаленного зуба развивается:

- А. А) синусит
- Б. Б) альвеолит
- В. В) неврит лицевого нерва
- Г. Г) невралгия тройничного нерва
- Д. Д) сialоденит

Установите последовательность манипуляций при лечении перелома верхней челюсти без смещения отломков:

- А) клиническое обследование**
- Б) иммобилизация отломков**
- В) рентгенологическое обследование**
- Г) консультация нейрохирурга**
- Д) антибактериальная терапия**

А. А, В, Г, Б, Д.

Б. А, В, Б, Г, Д.

В. А, В, Г, Д, Б.

Для диагностики конкремента в Вартоновом протоке выполняют рентгенографию

- А. А) ортопантомограмму**
- Б. Б) тела нижней челюсти**
- В. В) внутриротовую дна полости рта**
- Г. Г) поднижнечелюстной слюнной железы**
- Д. Д) томографию поднижнечелюстной слюнной железы**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между осложнением во время удаления и его признаком: Манипуляция

- А) Удаление третьего моляра верхней челюсти**
- Б) Корни второго моляра верхней челюсти**
- В) Корни второго нижнего моляра**
- Г) Третий нижний моляр Осложнение**
- 1.Проталкивание в верхнечелюстной синус**
- 2. Перелом корня зуба**
- 3. Перелом нижней челюсти**
- 4.Отлом бугра верхней челюсти**

А. А-3, Б-1, В-2, Г-4.

Б. А-4, Б-2, В-1, Г-3.

В. А-4, Б-1, В-2, Г-3.

Лечение болезни Микулича и синдрома Шегрена проводится:

- А. А) совместно с гастроэнтерологом**
- Б. Б) совместно с ревматологом**
- В. В) совместно с эндокринологом**
- Г. Г) все ответы верны**
- Д. Д) все ответы неверны**

Установите последовательность действий при операции цистэктомии в области зубов 2.1,2.2:

- А) удаление оболочки кисты и резекция верхушек корней зубов**
- Б) создание перфорационного отверстия**
- В) отслоение слизисто-надкостничного лоскута**
- Г) расширение перфорационного отверстия**
- Д) уложить лоскут на место**
- Ж) наложение швов**
- З) проведение разреза по альвеолярному отростку челюсти**
- К) инфильтрационная анестезия**
- Л) мобилизация лоскута**

А. КЗБВГАЛДЖ

Б. КЗВБГЛАДЖ

В. КЗВБГАЛДЖ

К предраковым заболеваниям красной каймы губ относятся:

- А. А) рожистое воспаление
- Б. Б) термический и химические ожоги
- В. В) бородавчатый предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, хейлит Манганотти
- Г. Г) болезнь Боуэна, пигментная ксеродерма актинический кератоз, предраковый меланоз
- Д. Д) эритроплакия, лейкоплакия, красная волчанка, плоский лишай, подслизистый фиброз

К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят:

- А. А) синусит
- Б. Б) альвеолит
- В. В) остеомиелит
- Г. Г) гипертонический криз
- Д. Д) артрит височно-нижнечелюстного сустава

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом: Клинические показатели:

- А) Нарушение целостности кожи
 - Б) Наличие гематомы
 - В) Целостность кожных покровов не нарушена
 - Г) Нарушение целостности кости
 - Д) Кровотечение
 - Е) Нарушение чувствительности
- Диагноз:

- 1. Ушиб
- 2. Ссадина
- 3. Рана

- А. 1-Б,Д; 2-А,В; 3-А,Д,Е.
- Б. 1-Б,Е; 2-А,Д; 3-А,Д,В.
- В. 1-Б,В; 2-А,Д; 3-А,Д,Е.

Лечение при вывихе нижней челюсти заключается в:

- А. А) иммобилизации
- Б. Б) резекции суставного бугорка
- В. В) прошивании суставной капсулы
- Г. Г) резекции мышечковых отростков нижней челюсти
- Д. Д) введении суставной головки в суставную впадину

Возбудителями при абсцессе челюстно-язычного желобка чаще всего являются:

- А. А) анаэробы
- Б. Б) лучистые грибы
- В. В) бледные спирохеты
- Г. Г) стафилококки, стрептококки
- Д. Д) туберкулёзные микобактерии

После наложения бимаксиллярных шин с зацепными петлями резиновые кольца (тягу) меняют:

- А. А) ежедневно
- Б. Б) ежемесячно
- В. В) еженедельно
- Г. Г) 3 раза в месяц
- Д. Д) 2 раза в неделю

Фолликулярную кисту необходимо дифференцировать с:

- А. А) одонтомой
- Б. Б) амелобластомой
- В. В) цементомой
- Г. Г) репаративной гранулемой
- Д. Д) твердой одонтомой

Причиной хронического неспецифического артрита ВНЧС является:

- А. А) актиномикоз
- Б. Б) острая травма
- В. В) околоушный гипергидроз
- Г. Г) хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
- Д. Д) заболевания щитовидной железы

Причиной развития острого одонтогенного остеомиелита челюстей является:

- А. А) острый паротит
- Б. Б) перелом челюсти
- В. В) острый лимфаденит
- Г. Г) снижение реактивности организма
- Д. Д) травма плохо изготовленным протезом

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между клиническими показателями и диагнозом: Клинические показатели:

- А) Патологическая подвижность верхней челюсти
 - Б) Боли при давлении на крыловидный отросток клиновидной кости
 - В) Слезотечение
 - Г) Эмфизема лица
 - Д) Симптом очков
 - Е) Ликворея
- Диагноз:**

1. Перелом верхней челюсти по Лефор I
2. Перелом верхней челюсти по Лефор II
3. Перелом верхней челюсти по Лефор III

- А. 1-А, Б; 2-А,Б,Г; 3-А,В,Д,Е.
- Б. 1-А, Б; 2-А,Б,В,Г; 3-А,Г,Д,Е.
- В. 1-А, Б; 2-А,Б,В,Г; 3-А,Г,Е.

Наблюдаются ли изменения в паренхиме околоушной железы при лимфогенном сиалодохите:

- А. А) да
- Б. Б) нет

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Клиническая ситуация

- А) Разъединенные корни первого моляра верхней челюсти
- Б) Разъединенные корни первого и второго нижних моляров
- В) Нижний третий моляр
- Г) Корни нижнего второго моляра при мощной межкорневой перегородки Используемый инструмент

- 1. Угловым элеватором
- 2. Элеватор Леклюза при сохраненном соседнем зубе
- 3. Разъединяют фиссурным бором и вывихивают элеватором
- 4. Удаляют прямым элеватором

- А. А-4, Б-1, В-2, Г-3.
- Б. А-4, Б-2, В-1, Г-3.
- В. А-4, Б-1, В-3, Г-2.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Симптомы при ложном паротите

- А) Симптом Хетчкока
- Б) Симптом Тресильяна-Урсона Клиническая картина
- 1. Болезненность при надавливании в области угла нижней челюсти
- 2. Гиперемия каймы вокруг устья выводного протока околоушной железы
- 3. Асиалия на стороне поражения
- 4. Гипосаливация на стороне поражения
- 5. Выделение гнойного экссудата из устья выводного протока

- А. А-1; Б-2.
- Б. А-2; Б-1.

Вправление вывиха нижней челюсти проводится при положении больного:

- А. А) лежа
- Б. Б) сидя
- В. В) стоя
- Г. Г) полулежа
- Д. Д) полусидя

Для удаления корней резцов верхней челюсти используют:

- А. А) прямой элеватор
- Б. Б) клювовидные щипцы
- В. В) клювовидные с шипом
- Г. Г) S-образные сходящиеся
- Д. Д) S-образные несходящиеся

Основным этиологическим фактором в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта является:

- А. А) гиперсаливация
- Б. Б) частичная адентия
- В. В) хроническая травма слизистой оболочки
- Г. Г) массивные зубные отложения
- Д. Д) заболевания желудочно-кишечного тракта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между локализацией кисты и возможным осложнением во время операции: Локализация кист

А) Радикулярная киста в области зубов

1.1,1.2

Б) Зубосодержащая киста в области зуба

3.8

В) Радикулярная киста в области зубов

1.6,

1.7

Г) Радикулярная киста в области зубов

4.5,

4.4 Осложнения во время операции

1. Травма подбородочного нерва

2. Перфорация дна носовых полостей

3. Перелом нижней челюсти

4. Перфорация дна верхнечелюстного синуса

А. А-3, Б-2, В-4, Г-1.

Б. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Перфорация дна верхнечелюстной пазухи не возникает вследствие:

- А. А) грубой техники удаления зуба
- Б. Б) низкого расположения дна пазухи и прилегания его к верхушкам корней зубов
- В. В) деструкция нижней стенки пазухи вследствие периодонтита
- Г. Г) удалении моляров нижней челюсти
- Д. Д) деструкция нижней стенки пазухи вследствие образования одонтогенных кист

По происхождению верхнечелюстной синусит бывает:

- А. А) одонтогенным
- Б. Б) полипозным
- В. В) хроническим
- Г. Г) острым
- Д. Д) диффузным

При эпидемическом паротите поражаются слюнные железы:

- А. А) малые
- Б. Б) околоушные
- В. В) подъязычные
- Г. Г) поднижнечелюстные
- Д. Д) все

Наружное отверстие бокового свища шеи располагается в:

- А. А) носоглотке
- Б. Б) щечной области
- В. В) подъязычной области
- Г. Г) области корня языка
- Д. Д) поднижнечелюстной области

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между методами фиксации при различных переломах: Метод:

А) Остеосинтез минипластинами

Б) Тампонада носовых ходов

В) Метод Федершпиля

Г) Наливной баллон

Д) Метод Фальтина-Адамса

Е) Гипсовая повязка Перелом:

1. Нижняя челюсть

2. Скуловая кость

3. Кости носа

4. Верхняя челюсть

А. 1-Д; 2-Г; 3-А,Б,Е; 4-В.

Б. 1-А; 2-В; 3-Б,Е; 4-Г,Д.

В. 1-А; 2-Г; 3-Б,Е; 4-В,Д.

Установите последовательность манипуляций при лечении перелома челюсти со смещением отломков:

А) клиническое обследование

Б) иммобилизация отломков

В) рентгенологическое обследование

Г) консультация нейрохирурга

Д) репозиция отломков

А. А, В, Г, Д, Б

Б. А, Г, В, Д, Б

В. В, А, Г, Д, Б

К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят:

А. А) химиотерапию

Б. Б) СВЧ-гипертермию

В. В) лучевую терапию

Г. Г) комбинированное лечение

Д. Д) симптоматическую терапию

Для ускорения абсцедирования назначают:

А. А) парафинотерапия

Б. Б) грязевые аппликации

В. В) УВЧ в нетепловой дозе

Г. Г) УВЧ в слаботепловой дозе

Д. Д) УФО в субэритемных дозах

Типичный оперативный доступ при периостите заключается в разрезе:

- А. А) окаймляющем угол нижней челюсти
- Б. Б) в подбородочной области по средней линии
- В. В) слизистой оболочке по крыло-челюстной складке
- Г. Г) слизистой и надкостницы по переходной складке
- Д. Д) в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти

Симптом нагрузки при переломах нижней челюсти определяется давлением на:

- А. А) скуловые кости снизу вверх
- Б. Б) подбородок снизу вверх
- В. В) подбородок спереди назад
- Г. Г) крючок крыловидного отростка снизу вверх
- Д. Д) альвеолярный отросток сверху вниз

При двустороннем переломе нижней челюсти в области углов смещение фрагмента происходит

- А. А) книзу
- Б. Б) кверху
- В. В) медиально
- Г. Г) латерально
- Д. Д) дистально

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Установите соответствие между манипуляцией и используемым инструментом: Манипуляция

А) Для удаления зубов на нижней челюсти с сохраненными коронками используют.

Б) Для удаления зубов

3.8,

4.8 используют.

В) Для удаления дистального корня зуба

4.7 используют.

Г) Для удаления

3.6 и

4.6 зубов с разрушенной коронкой наиболее приемлемы. инструмент

1. Клювовидные щипцы, изогнутые по плоскости.

2. Элеваторы от себя и к себе.

3. Клювовидные шпигцы с несходящимися щечками.

4.Клювовидные щипцы со сходящимися щечками.

А. А-3, Б-1, В-4, Г-2.

Б. А-3, Б-1, В-2, Г-4.

В. А-1, Б-3, В-4, Г-2.

Причиной развития острого одонтогенного остеомиелита челюстей является воспалительный процесс в:

- А. А) лимфоузлах
- Б. Б) слюнных железах
- В. В) периапикальных тканях
- Г. Г) верхнечелюстной пазухе
- Д. Д) месте перелома челюсти

Установите последовательность действий при обследовании больных с радикулярной кистой в области интактных зубов

4.2,4.1 и подготовке к операции цистэктомии:

- А) шинирование ребондом
- Б) проведение электроодонтодиагностики зубов
- В) рентгенологическое обследование
- Г) депульпирование зубов
- Д) назначение антибактериальной терапии
- Е) проведение операции не позднее 24 часов
- Ж) клиническое обследование больного
- З) выяснение жалоб у пациента
- И) контрольная рентгенограмма

- А. ЗЖВБГАДИЕ
- Б. ЗЖВБГАИДЕ
- В. ЗЖВБГАИДЕ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между оперативным вмешательством и показанием к нему: Оперативное вмешательство

- А) Цистотомию в детском возрасте проводят
 - Б) Цистотомию при ретенции и дистопии клыка проводят
 - В) Цистотомию у пожилых людей проводят
 - Г) Цистотомию, с последующим изготовлением obturatora проводят
- Показания**
- 1. Для исключения второго этапа оперативного вмешательства
 - 2. Во избежание травмы зачатков зубов
 - 3. С целью сохранения зуба и дальнейшего ортодонтического лечения
 - 4. При наличии сопутствующей патологии
- А. А-3, Б-2, В-4, Г-1.
 - Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.
 - В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Абсцесса челюстно-язычного желобка необходимо дифференцировать с:

- А. А) тризмом
- Б. Б) карбункулом нижней губы
- В. В) флегмоной щечной области
- Г. Г). флегмоной височной области
- Д. Д) абсцессом крыловидно-челюстного пространства

Ксеростомия является следствием

- А. А) гиперсаливации
- Б. Б) приема кислой пищи
- В. В) гипосаливации
- Г. Г) выделения гноя из протока слюнной железы

В результате развития нарушения эмалевого органа в челюстных костях развивается:

- А. А) радикулярная киста
- Б. Б) фолликулярная киста
- В. В) кератокиста
- Г. Г) киста резцового канала
- Д. Д) резидуальная киста

Для удаления корней резцов верхней челюсти используют:

- А. А) элеватор Леклюза
- Б. Б) прямые щипцы с несходящимися щёчками
- В. В) прямые щипцы со сходящимися щечками
- Г. Г) элеватор от себя
- Д. Д) элеватор к себе

S- образными щипцами без шипов удаляют:

- А. А) корни зубов нижней челюсти
- Б. Б) вторые моляры нижней челюсти
- В. В) третьи моляры верхней челюсти
- Г. Г) премоляры верхней челюсти
- Д. Д) корни зубов верхней челюсти

Для удаления корней премоляров верхней челюсти используют:

- А. А) прямые несходящиеся щипцы
- Б. Б) S-образные щипцы со сходящимися щечками
- В. В) клювовидные щипцы , изогнутые по плоскости
- Г. Г) S- образные щипцы с несходящимися щечками
- Д. Д) S- образные щипцы с шипом слева

К дополнительным методам исследования проводимым для уточнения диагноза "злокачественное новообразование челюстно-лицевой области" относится:

- А. А) физикальный
- Б. Б) биохимический
- В. В) гистологический
- Г. Г) ангиографический
- Д. Д) иммунологический

Острый одонтогенный синусит не дифференцируют с:

- А. А) периоститом верхней челюсти
- Б. Б) остеомиелитом верхней челюсти
- В. В) ринитом
- Г. Г) лимфаденитом
- Д. Д) ретенционными кистами верхнечелюстных пазух

Может ли развиваться лимфогенный сиаладенит поднижнечелюстной железы:

- А. А) нет
- Б. Б) да
- В. В) может, но очень редко
- Г. Г) может, периодически

Цистотомия показана при:

- А. А) радикулярных кистах в пределах двух зубов
- Б. Б) носонебной кисте
- В. В) кисте, проникающей в нижнечелюстной канал
- Г. Г) кисте резцового канала
- Д. Д) радикулярных кистах в пределах одного зуба

Возникновению одонтогенного синусита не способствуют:

- А. А) близкое расположение одонтогенных гнойных очагов
- Б. Б) распространение апикального гранулирующего процесса на нижнюю стенку пазухи
- В. В) проталкивание корня в пазуху при удалении зуба
- Г. Г) искривление перегородки носа
- Д. Д) кариозное поражение моляров и премоляров верхней челюсти

Характерный симптом при одностороннем переломе мышечкового отростка нижней челюсти:

- А. А) открытый прикус
- Б. Б) кровотечение из носа
- В. В) разрыв слизистой альвеолярного отростка
- Г. Г) изменение прикуса моляров со стороны перелома
- Д. Д) изменение прикуса моляров с противоположной стороны от перелома

Возможное осложнение во время операции удаления третьего моляра нижней челюсти:

- А. А) синусит
- Б. Б) периостит
- В. В) альвеолит
- Г. Г) остеомиелит
- Д. Д) перелом нижней челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между осложнениями и соответствующим им лечением: Осложнение

- А) Нагноение после операции цистэктомия**
- Б) Перелом челюсти после цистэктомии с удалением зуба**
- 3.8**
- В) Пробождение в верхнечелюстной синус при цистэктомии**
- Г) Раннее закрытие входного отверстия после цистотомии**
- Лечение**
- 1. Повторно расширить и изготовить obturator**
- 2. Переводим в цистотомию**
- 3. Бимаксиллярное шинирование, остеосинтез**
- 4. Оронозальная цистэктомия**

- А. А-2, Б-3, В-4, Г-1.
- Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.
- В. А-2, Б-3, В-1, Г-4.

Показанием для проведения блокад по Вишневскому является:

- А. А) отек
- Б. Б) инфильтрат
- В. В) эмпиема верхнечелюстной пазухи
- Г. Г) инфильтрат с признаками абсцедирования
- Д. Д) синусит

При обострении хронического синусита в верхнечелюстной пазухе содержится экссудат:

- А. А) серозный
- Б. Б) гнойный
- В. В) геморрагический
- Г. Г) кровяной
- Д. Д) кистозная жидкость

Показания к цистотомии:

- А. А) киста в пределах одного зуба
- Б. Б) киста в пределах двух зубов
- В. В) киста, проникающая в полость носа
- Г. Г) киста в пределах трех и более зубов
- Д. Д) в полости кисты находятся несколько депульпированных зубов

Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти:

- А. А) наркоз
- Б. Б) инфильтрационная анестезия
- В. В) нейрорептаналгезия
- Г. Г) стволовая анестезия
- Д. Д) проводниковая анестезия

Установите последовательность обследования пациента при вывихе зуба:

- А) сбор жалоб
 - Б) объективный осмотр
 - В) рентгенологическое обследование
 - Г) ЭОД
 - Д) сбор анамнеза
- А. А, Д, Б, В, Г.
Б. А, Д, Б, Г, В.
В. А, В, Г, Б, Д.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Заболевание

- А) Острый эпидемический паротит**
Б) Хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит в стадии обострения.
- Клиническая картина**
- 1) Выделение гнойного секрета из устья протока
 - 2) Задержка секрета
 - 3) Высокая контагиозность
 - 4) Железа тестовато-пастозная
 - 5) Железа бугристая, плотная
 - 6) Одновременное поражение поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез
- А. А- 2, 4, 6; Б-1, 2, 5.
Б. А- 2, 4, 3, 6; Б-1, 5.
В. А- 2, 4, 3, 6; Б-1, 2, 5.

Радикальная синусотомия отличается от щадящей синусотомии:

- А. А) наложением широкого сообщения с полостью носа
- Б. Б) дополнительными методами обследования
- В. В) пластикой ороантрального сообщения
- Г. Г) местной анестезией
- Д. Д) удалением или лечением «причинных» зубов

Прямыми щипцами удаляют:

- А. А) вторые моляры верхней челюсти
- Б. Б) премоляры верхней челюсти
- В. В) третьи моляры нижней челюсти
- Г. Г) резцы верхней челюсти
- Д. Д) резцы нижней челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между классифицированной по группе кистой и её распространением: Распространение кисты

- А) На альвеолярный сегмент одного зуба распространяется
 - Б) На альвеолярный сегмент двух-трех зубов
 - В) На альвеолярный сегмент более трех зубов
 - Г) Смещение и деформация дна верхнечелюстного синуса, при сохранении костной стенки
- Классификация по группам**

- 1. Киста, оттесняющая верхнечелюстной синус
 - 2. Киста малого размера
 - 3. Киста среднего размера
 - 4. Киста большого размера
- А. А-2, Б-4, В-3, Г-1.
 - Б. А-1, Б-3, В-4, Г-2.
 - В. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

Большие пальцы рук врач при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливает на:

- А. А) углы нижней челюсти
- Б. Б) фронтальную группу зубов
- В. В) моляры справа и слева или альвеолярные отростки
- Г. Г) в поднижнечелюстную область
- Д. Д) премоляры верхней челюсти

Установите последовательность действий при нагноившейся радикулярной кисте в области зубов

2.3,

2.4:

А) назначение антибактериальной терапии

Б) введение дренажа

В) эвакуация гнойного содержимого

Г) холод местно

Д) удаление дренажа на пятые сутки

Е) оперативное вмешательство в плановом порядке после стихания воспалительных явлений

Ж) проведение разреза по типу периостотомии

З) проведение анестезии

И) динамическое наблюдение и перевязки

А. ЗЖВБГАИДЕ

Б. ЗЖВБГИАДЕ

В. ЗВЖБГАИДЕ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и соответствующему патогенезу: Заболевание

А) Интрестициальный сиаладенит

Б) Паренхиматозный сиаладенит Патогенез

1) Рыхлая соединительная ткань в междольковых прослойках

2) Паренхима железы замещена диффузными скоплениями лимфоидных элементов

3) Липоматозная атрофия долек железы

4) Сужение щелевидных просветов некоторых протоков с образованием фиброзных муфт

5) Отек и ангиоматоз в междольковых прослойках

6) Вокруг долек железы формируются диффузные, плотные: лимфогистиоцитарные инфильтраты

7) Эпителиальные клетки ацинусов имеют преимущественно цилиндрическую форму, цитоплазма их вакуолизирована за счет накопления белкового секрета

А. А-1,2,3,4; Б-5, 6, 7.

Б. А-1,2,3; Б-4,5, 6, 7.

В. А-1,2,3,4,5; Б-6, 7.

Срединные и боковые свищи шеи по своему происхождению являются:

А. А) врождёнными

Б. Б) одонтогенными

В. В) травматическими

Г. Г) онкологическими

Д. Д) воспалительными

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между видом перелома и методом иммобилизации: Метод иммобилизации:

А) Шина Тигерштедта

Б) Остеосинтез минипластинами

В) Шина Вебера

Г) Гладкая шина-скоба

Д) Шина Васильева

Е) Спица Киршнера Перелом:

1. Альвеолярного отростка

2. Нижней челюсти без смещения

3. Нижней челюсти в области угла со смещением

4. Нижней челюсти в области ветви без смещения

5. Нижней челюсти в области мыщелкового отростка со смещением

А. 1-А,Г; 2-В,Д; 3- А,В,Д; 4-Б,Е.

Б. 1-Г; 2-А,В,Д; 3- А,В,Д; 4-Б,Е.

В. 1-Г; 2-А,В,Д,Е; 3- А,В,Д; 4-Б.

Клиническая картина бородавчатого предрака красной каймы губ характеризуется наличием:

А. А) 2-3 эрозий, без тенденции к кровоточивости и эпителизации

Б. Б) эрозивной поверхностью с инфильтрацией подлежащих тканей

В. В) атрофичных уплощенных бляшек покрытых корками, "географический" рисунок

Г. Г) ограниченного участка ороговения, покрытого тонкими, плотно сидящими чешуйками

Д. Д) болезненного узла с бугристой поверхностью, возвышающегося над эпителием на 3-5 мм

Установите последовательность обследования пациента при переломе верхней челюсти:

А) сбор жалоб

Б) объективный осмотр

В) рентгенологическое обследование

Г) определение симптома нагрузки

Д) сбор анамнеза

А. Д, А, Б, Г, В.

Б. А, Д, Б, Г, В.

В. А, Д, Б, В, Г.

Если причиной периостита является многокорневой зуб, его следует:

- А. А) удалить
- Б. Б) запломбировать канал до вскрытия периоста
- В. В) запломбировать резорцин-формалиновой пастой
- Г. Г) раскрыть полость зуба перед вскрытием периоста
- Д. Д) покрыть зуб искусственной коронкой

При неблагоприятном течении абсцесса челюстно-язычного желобка инфекция распространяется в:

- А. А) околоушную слюнную железу
- Б. Б) субдуральное пространство
- В. В) крыло-небное венозное сплетение
- Г. Г) венозные синусы головного мозга
- Д. Д) крыловидно-челюстное пространство

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Установите соответствие между заболеванием и лечением:

Заболевание

- А) Прободение дна верхнечелюстного синуса во время удаления зуба
 - Б) Невропатия
 - В) Аспирация зуба или корня
 - Г) Отлом альвеолярного отростка челюсти
- Лечение**
- 1.анальгетики, физиолечение, витамины группы В
 - 2. срочная госпитализация для бронхоскопии и удаления зуба из дыхательных путей
 - 3. удаляют, а слизистую ушивают
 - 4.наложение йодоформной турунды на устье лунки и фиксация щваами
- А. А-4, Б-2, В-1, Г-3
 - Б. А-4, Б-1, В-2, Г-3
 - В. А-4, Б-1, В-3, Г-2

Больной с диагнозом "злокачественное новообразование" челюстно-лицевой области должен быть направлен к:

- А. А) районному онкологу
- Б. Б) специалисту-радиологу
- В. В) участковому терапевту
- Г. Г) хирургу общего профиля
- Д. Д) специалисту-стоматологу

Характерные симптомы острого артрита ВНЧС в начальной стадии:

- А. А) тризм жевательных мышц
- Б. Б) околоушный гипергидроз
- В. В) боль, ограничение открывания рта
- Г. Г) боль в шейном отделе позвоночника, иррадиирующая в ВНЧС
- Д. Д) гипермобильность нижней челюсти

В результате нарушения протокола операции удаления зуба образуется:

- А. А) фолликулярная киста
- Б. Б) радикулярная киста
- В. В) резидуальная киста
- Г. Г) амелобластома
- Д. Д) кератокиста

При цитомегалии слюнных желез вирус проникает в организм ребенка:

- А. А) гематогенным путем (травма, ссадины)
- Б. Б) лимфогенным путем
- В. В) через плаценту
- Г. Г) контактным путем
- Д. Д) воздушно-капельным путем

Типичным клиническим признаком абсцесса окологлоточного пространства является:

- А. А) асимметрия лица
- Б. Б) затруднение дыхания
- В. В) затруднённое открывание рта
- Г. Г) выбухание подъязычных валиков
- Д. Д) отек и гиперемия щечных областей

Ведущий симптом при вывихе нижней челюсти:

- А. А) слезотечение
- Б. Б) снижение высоты прикуса
- В. В) невозможность сомкнуть зубы
- Г. Г) гипермобильность нижней челюсти
- Д. Д) макрогнатия

При иссечении срединного свища шеи необходимо резецировать:

- А. А) щитовидный хрящ
- Б. Б) небную миндалину
- В. В) участок подъязычной кости
- Г. Г) подчелюстную слюнную железу
- Д. Д) проток подчелюстной слюнной железы

Рентгенография слюнных желез с искусственным контрастированием НЕ позволяет:

- А. А) судить о состоянии паренхимы железы
- Б. Б) выявить конкремент в протоке
- В. В) исследовать секреторную функцию железы
- Г. Г) диагностировать новообразование
- Д. Д) судить о состоянии протоков железы

Установите последовательность действий при проведении цистотомии в области зубов

3.4,3.5,

3.6,

3.7:

- А) удаление передней стенки кисты
 - Б) создание входного отверстия
 - В) отслоение слизисто–надкостничного лоскута
 - Г) расширение входного отверстия
 - Д) мобилизация лоскута
 - Е) введение йодоформного тампона
 - Ж) проведение разреза
 - З) проводниковая анестезия
 - И) эвакуация содержимого кисты
- А. ЗЖБВГАИДЕ
Б. ЗЖВБГАИДЕ
В. ЗЖВБГАИЕД

Оперативный доступ при лечении абсцесса челюстно-язычного желобка заключается в разрезе:

- А. А) окаймляющем угол нижней челюсти
- Б. Б) слизистой оболочки челюстно-язычного желобка ближе к внутренней поверхности тела нижней челюсти
- В. В) в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти
- Г. Г) слизистой оболочки по крыловидно-челюстной складке
- Д. Д) по переходной складке в области премоляров

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между признаками наличия ликвореи при переломе верхней челюсти и методами их верификации: Признаки

А) Наличие крови в ликворе

Б) Носовой платок, смоченный отделяемым, при высыхании остался мягким

В) Носовой платок, смоченный отделяемым, при высыхании стал жестким

Г) Отсутствие крови в ликворе

Д) При нанесении на салфетку отделяемого с примесью крови образуется красное пятно

Е) При нанесении на салфетку отделяемого с примесью крови образуется красное пятно со светлым ореолом по периферии

Метод

1. Носового платка

2. Медицинской салфетки

3. Спинномозговая пункция

А. 1-А; 2-Е; 3-Б.

Б. 1-Б; 2-А; 3-Е.

В. 1-Б; 2-Е; 3-А.

Дополнительный метод исследования для диагностики переломов верхней челюсти:

А. А) ЭОД

Б. Б) биопсия

В. В) рентгенография

Г. Г) радиоизотопный

Д. Д) цитологический

Установите последовательность манипуляций при лечении перелома нижней челюсти без смещения отломков:

А) клиническое обследование

Б) иммобилизация отломков

В) рентгенологическое обследование

Г) консультация нейрохирурга

Д) антибактериальная терапия

А. А, В, Г, Б, Д.

Б. А, В, Д, Б, Г.

В. А, В, Г, Д, Б.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Осложнения после удаления

А) Вывихивание первого верхнего моляра начинают

Б) Вывихивание второго верхнего моляра начинают

В) Премоляры верхней челюсти

Г) Верхний центральный резец Признаки заболевания

1. Комбинируют ротационные движения и раскачивания в вестибулярную и небную стороны

2. В небную сторону

3. В щечную сторону

4. Движения производят в вестибулярную и небную сторону, первое движение наружу

А. А-2, Б-1, В-4, Г-3.

Б. А-2, Б-3, В-4, Г-1.

В. А-4, Б-3, В-2, Г-1.

Причиной острого неспецифического артрита ВНЧС является:

А. А) актиномикоз

Б. Б) острая травма

В. В) околоушный гипергидроз

Г. Г) хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии

Д. Д) туберкулез

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между заболеванием и соответствующим лечением: Заболевание

А) Обострение хронического рецидивирующего паренхиматозного паротита

Б) Острый калькулезный сиагоденит Лечение

1) Антибактериальное

2) Противовоспалительное

3) Десенсибилизирующее

4) Йодид калия внутрь

5) Инмтиляция протеолитических ферментов, антибиотиков

6) Хирургическое (при неэффективности консервативного)

7) Гипербарическая оксигенация

А. А-1, 2,3,4,5,7; Б-1,2,3,4,6.

Б. А-1, 2,3,4,5,7; Б-1,2,4,6.

В. А-1, 2,3,5,7; Б-1,2,3,4,6.

Появление припухлости околоушной железы при гнойно-некротическом паротите появляется на фоне:

- А. А) резкого увеличения слюноотделения;
- Б. Б) резкого снижения слюноотделения;
- В. В) нормального выделения слюны
- Г. Г) отсутствия слюноотделения

Остеосинтез по Макиенко проводится:

- А. А) спицами
- Б. Б) минипластинами
- В. В) стальной проволокой
- Г. Г) бронзо-алюминиевой лигатурой
- Д. Д) компрессионно-дистракционным аппаратом

В результате воспаления в периапикальных тканях челюстей развивается:

- А. А) фолликулярная киста
- Б. Б) радикулярная киста
- В. В) кератокиста
- Г. Г) носогубная киста
- Д. Д) амелобластома

Щипцы для удаления корней резцов верхней челюсти называются:

- А. А) клювовидными
- Б. Б) прямые сходящиеся
- В. В) S-образные сходящиеся
- Г. Г) S-образные - шип справа
- Д. Д) S-образные несходящиеся

Под онкологической настороженностью понимают знание:

- А. А) профессиональных вредностей
- Б. Б) допустимых доз лучевой терапии
- В. В) поздних симптомов злокачественных новообразований
- Г. Г) препаратов для лечения злокачественных новообразований
- Д. Д) системы организации помощи онкологическим больным

Причиной обострения хронического неспецифического артрита ВНЧС является:

- А. А) актиномикоз
- Б. Б) околоушный гипергидроз
- В. В) распространение инфекции из окружающих тканей
- Г. Г) хроническая травма ВНЧС в результате изменения окклюзии
- Д. Д) туберкулез

К основным клиническим симптомам первичного рака нижней челюсти относят

- А. Эрозию, язву с инфильтрированными краями
- Б. Подвижность интактных зубов
- В. Обнажение кости
- Г. Гиперсаливацию

Наиболее частым осложнением затрудненного прорезывания третьего моляра является

- А. Лимфаденит
- Б. Перикоронит
- В. Сиалoadенит
- Г. Невралгия

Для 2 класса по классификации миллера характерна

- А. Циркулярная потеря десны и кости в межзубных промежутках
- Б. Рецессия во фронтальном отделе до 3 мм
- В. Рецессия (узкая и широкая) в пределах прикрепленной десны, без потери кости и десны в межзубных промежутках
- Г. Рецессия (узкая и широкая) в пределах свободной десны, без потери кости и десны в межзубных промежутках

Неблагоприятным вариантом исхода острого гнойного периостита челюсти при отсутствии хирургического лечения является распространение гноя в

- А. Мягкие ткани
- Б. Кость
- В. Пародонт
- Г. Кровеносные сосуды

Для удаления третьих верхних моляров используют

- А. Клювовидные щипцы без шипов
- Б. Штыковидный элеватор
- В. Специальные щипцы
- Г. Угловые элеваторы

Проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения обязаны медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, согласно

- А. Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ
- Б. Федеральному закону № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- В. Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
- Г. Программе добровольного медицинского страхования

Высокой активностью действия против неспорогенных анаэробов обладает

- А. Метронидазол
- Б. Офлоксацин
- В. Эритромицин
- Г. Нистатин

При одностороннем вывихе нижней челюсти подбородок смещен

- А. Симметрично вперед
- Б. Симметрично назад
- В. В противоположную от поражения сторону
- Г. В сторону поражения

Для острого одонтогенного остеомиелита челюстей к характерным признакам относят

- А. Жалобы на интенсивные боли в челюсти, возникающие приступообразно
- Б. Субфебрильную температуру тела, отсутствие нарушений общего состояния
- В. Высокую температуру тела, общее тяжелое состояние больного, подвижность причинного и соседних зубов
- Г. Жалобы на периодические ноющие боли в зубе

Анестезия у ментального отверстия наиболее эффективна при удалении

- А. Нижнего третьего моляра
- Б. Нижнего первого премоляра
- В. Верхнего второго моляра
- Г. Верхнего первого премоляра

При отсутствии положительной динамики нехирургических методов лечения при хроническом, продуктивном лимфадените необходимо

- А. Провести курс новокаиновых блокад
- Б. Провести короткофокусную рентген-терапию
- В. Удалить лимфоузел с последующим гистологическим исследованием
- Г. Провести склерозирующую терапию

Причиной ложного паротита герценберга является _____ околоушной слюнной железы

- А. Хронический интерстициальный сиалоаденит
- Б. Острый сиалоаденит
- В. Хронический паренхиматозный сиалоаденит
- Г. Острый лимфаденит в капсуле

Резекцию верхушки корня проводят

- А. Долотом
- Б. Шаровидным бором
- В. Сепарационным диском
- Г. Фиссурным бором

Осложнение при тромбозе угловой вены

- А. Острый гнойный верхнечелюстной синусит
- Б. Медиастинит
- В. Тромбоз пещеристого синуса
- Г. Пансинусит

Нарушение чувствительности у пациентов с переломом верхней челюсти по среднему типу отмечают в _____ области

- А. Щёчной
- Б. Подглазничной
- В. Лобной
- Г. Скуловой

К открытому остеосинтезу относят метод скрепления фрагментов челюсти

- А. С использованием внеротовых аппаратов
- Б. Без рассечения мягких тканей в области перелома
- В. С рассечением мягких тканей в области перелома
- Г. С использованием назубных стандартных шин

Суммарный объем вводимого анестетика при интралигаментарной анестезии однокорневого зуба не должен превышать (в мл)

- А. 0,06
- Б. 0,2
- В. 0,4
- Г. 0,7

Симптом венсана возникает при остеомиелите нижней челюсти в области

- А. Резцов и клыка
- Б. Премоляров и клыка
- В. Резцов и премоляров
- Г. Премоляров и моляров

После проведения мандибулярной анестезии происходит блокада

- А. Язычного и нижнего луночкового нервов
- Б. Язычного, щёчного и нижнего луночкового нервов
- В. Нижнего луночкового нерва
- Г. Щёчного и нижнего луночкового нервов

Суммарный объем вводимого анестетика при мандибулярной анестезии у взрослого пациента составляет (в мл)

- А. 0,5
- Б. 1
- В. 4
- Г. 1,7

Операция резекция верхушки корня противопоказана при

- А. Восстановлении твердых тканей зуба временной коронкой
- Б. Глубоком пародонтальном кармане
- В. Наличии ортодонтического ретейнера
- Г. Наличии культевой вкладки

Блокаду задних верхних луночковых нервов обеспечивает анестезия

- А. Туберальная
- Б. Поднадкостничная
- В. Инфраорбитальная
- Г. Палатинальная

Суставная щель внчс рентгенологически не прослеживается при

- А. Костном анкилозе
- Б. Хроническом артрите
- В. Артрозе
- Г. Фиброзном анкилозе

Основным патогенетическим фактором в течение фиброзной дисплазии является

- А. Острый пульпит
- Б. Перелом челюсти
- В. Рецидив кисты
- Г. Очаговое нарушение костеобразования

Забор аутоотрансплантата проводится в области

- А. Кожы
- Б. Слизистой щеки
- В. Переходной складки
- Г. Неба

Вторая ветвь тройничного нерва называется _____ нерв

- А. Подглазничный (n. infraorbitalis)
- Б. Глазной (n. ophtalmicus)
- В. Нижнечелюстной (n. mandibularis)
- Г. Верхнечелюстной (n. maxillaries)

Огнестрельные переломы челюсти всегда сопровождаются повреждением мягких тканей и являются

- А. Открытыми и всегда инфицированными
- Б. Инфицированными только при попадании в рану инородных предметов
- В. Сквозными и всегда инфицированными
- Г. Инфицированными только в случае вторичного инфицирования

Основным клиническим признаком калькулезного сиалоаденита является

- А. Припухание железы во время приема пищи
- Б. Воспаление устья протока
- В. Гиперсаливация
- Г. Гипосаливация

Характерной особенностью клинической картины ангины людвига является

- А. Вид рожистого воспаления слизистой оболочки полости рта
- Б. Обильное гнойное отделяемое после вскрытия гнойного очага
- В. Гнилостно-гангренозная флегмона дна полости рта
- Г. Ограниченный воспалительный инфильтрат корня языка

К причинам рарефицирующего периостита относят

- А. Кисты челюстей
- Б. Травму
- В. Воспалительные процессы в верхнечелюстных пазухах
- Г. Периодонтитные зубы

Гемисекцией зуба называется

- А. Пересадка удаленного зуба в его же альвеолу
- Б. Удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба;
- В. Удаление верхушки корня зуба
- Г. Удаление корня вместе с прилегающей к нему коронковой частью зуба

Цитологическая картина при язвенной форме рака слизистой оболочки характеризуется наличием клеток

- А. Эпителия атипичных
- Б. Акантолитических
- В. Лангханса
- Г. Плазматических, лимфоидных элементов

Эмболизацию сосудистых мальформаций проводят с помощью препарата

- А. Галотан
- Б. Фибро-вейн
- В. Гидрозин
- Г. Спирт

Форма эозинофильной гранулемы

- А. Кистозная
- Б. Деструктивную
- В. Очаговая
- Г. Литическая

Диагноз «актиномикоз» устанавливается на основании

- А. Рентгенологических данных
- Б. Клинического анализа крови
- В. Цитологического исследования
- Г. Серологического исследования

Местным анестетиком, обладающим высокой кардиотоксичностью, является

- А. Прокаин (новокаин)
- Б. Мепивакаин
- В. Бупивакаин
- Г. Артикаин

Под вестибулопластикой понимается

- А. Пластика преддверия полости рта
- Б. Трансплантация соединительнотканного лоскута с бугра верхней челюсти или твердого неба
- В. Пластика уздечки губы
- Г. Пластика уздечки языка

Двухэтапная цистотомия на верхней челюсти проводится, когда киста больших размеров

- А. Разрушает костное дно полости носа
- Б. Прорастает поднадкостнично
- В. Прорастает в верхнечелюстную пазуху
- Г. Располагается в области премоляров

К вторичному туберкулёзному поражению челюстей может привести активный туберкулёз

- А. Слюнных желёз
- Б. Лёгких
- В. Печени
- Г. Почек

В отличие от перелома верхней челюсти при переломе скуловой кости отсутствует

- А. Кровоизлияние в слизистую оболочку по верхнему своду
- Б. Нарушение воздушности верхнечелюстной пазухи
- В. Нарушение прикуса
- Г. Онемение кожи в подглазничной области

В хронической стадии одонтогенного остеомиелита нижней челюсти следует опасаться

- А. Сиаладенита поднижнечелюстной железы
- Б. Аденофлегмоны (поднижнечелюстных лимфатических) узлов
- В. Патологического перелома
- Г. Травматического перелома

Специальным аппаратом для проведения операции имплантации является

- А. Коагулятор
- Б. Диодный лазер
- В. Физиодиспенсер
- Г. ИВЛ

Норадреналин вызывает _____ артерий и _____ вен

- А. Спазм; расширение
- Б. Расширение; расширение
- В. Спазм; спазм
- Г. Расширение; спазм

Общими принципами лечения больных с переломами челюстей являются

- А. Медикаментозное лечение и физиотерапия
- Б. Хирургическое лечение
- В. Репозиция фрагментов, медикаментозное лечение
- Г. Репозиция, фиксация, иммобилизация фрагментов челюстей

Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении

- А. Формируется (выдается) на 10 дней
- Б. Формируется (выдается) на 7 дней
- В. Не формируется (не выдается)
- Г. Формируется (выдается) на 3 дня

Ведущим симптомом анкилоза височно-нижнечелюстного сустава является

- А. Резкое ограничение подвижности нижней челюсти
- Б. Шум в ушах при резком повороте/наклоне головы
- В. Множественный, быстро прогрессирующий, пришеечный кариес
- Г. Нарушение глотания в утренние часы и после нагрузки на сустав

Медицинской организации присваивается статус клинической, если на базе организации

- А. Проводится подготовка информационно-аналитических материалов
- Б. Проводятся клинические испытания
- В. Осуществляется практическая подготовка медицинских работников
- Г. Ведется научно-исследовательская деятельность

Наружные межмышечные промежутки дна полости рта располагаются между

- А. Челюстно-подъязычной мышцей и слизистой оболочкой дна полости рта
- Б. Подбородочно-язычной и подъязычно-язычной мышцами
- В. Челюстно-подъязычной мышцей и передними брюшками двубрюшных мышц
- Г. Подбородочно-язычными мышцами

К анатомическим нарушениям верхней челюсти при верхней микрогнатии относят

- А. Сагиттальный сдвиг
- Б. Смещение кзади
- В. Недоразвитие
- Г. Несимметричную деформацию

Штыковидным элеватором (элеватором леклюза) удаляют зубы нижней челюсти

- А. Первый моляр
- Б. Третий моляр
- В. Премоляр
- Г. Резец

Отдаленным местным осложнением флегмоны крыловидно-челюстного пространства является

- А. Абсцесс головного мозга
- Б. Мышечная контрактура
- В. Менингоэнцефалит
- Г. Рубцовый выворот верхней губы

Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания, является

- А. Клиентом
- Б. Получателем медицинских услуг
- В. Пациентом
- Г. Пострадавшим

При проведении мандибулярной анестезии способом пальпации скос карпульной иглы ориентирован в сторону

- А. Альвеолярной части
- Б. Ветви нижней челюсти
- В. Зубной дуги
- Г. Ротоглотки

Осложнением воспалительного характера при переломах челюстей является

- А. Периостит
- Б. Нагноение костной раны
- В. Рожистое воспаление
- Г. Фурункулез

Актиномикоз является

- А. Специфическим воспалительным процессом
- Б. Неспецифическим воспалительным процессом
- В. Опухолеподобным процессом
- Г. Пороком развития тканей

Пунктат врождённой кисты шеи вне воспаления имеет вид

- А. Геморрагического экссудата
- Б. Серозно-гнойного экссудата
- В. Прозрачной опалесцирующей жидкости
- Г. Мутной жидкости

К наиболее оптимальным проекциям для лучевой диагностики повреждения тела нижней челюсти относят

- А. Аксиальную, полуаксиальную
- Б. Прямую, боковую
- В. Носо-подбородочную, полуаксиальную
- Г. Панорамную томограмму челюстных костей

При правильном положении третьего моляра и перикороните производится

- А. Аппликация лидокаина
- Б. Иссечение капюшона
- В. Удаление зуба
- Г. Секвестрэктомия

Наиболее частым осложнением затрудненного прорезывания третьего моляра является

- А. Сиалоаденит
- Б. Лимфаденит
- В. Невралгия
- Г. Перикоронит

При перфорации дна верхнечелюстной пазухи после удаления зуба при наличии отделяемого из пазухи необходимо

- А. Провести радикальную верхнечелюстную синусотомию амбулаторно
- Б. Проводить антисептические промывания пазухи до стихания воспаления, затем дообследовать состояние пазухи
- В. Промыть пазуху, мобилизовать лоскут со щеки и ушить наглухо
- Г. Промыть пазуху, затампонировать лунку зуба, зафиксировать направляющие швы

Безработному листок нетрудоспособности

- А. Выдаётся при наличии у него документа о постановке на учёт по безработице
- Б. Выдаётся только при ургентном заболевании
- В. Выдаётся в случае госпитализации
- Г. Не выдаётся

Удаление резцов верхней челюсти выполняют _____ щипцами

- А. Прямыми корневыми
- Б. Клювовидными корневыми
- В. Прямыми коронковыми
- Г. Изогнутыми по плоскости

Щипцы для удаления резцов верхней челюсти

- А. Изогнутые по плоскости
- Б. S-образные с несходящимися щечками
- В. Клювовидные корневые
- Г. Прямые коронковые

При ушивании раны после удаления ретенционных кист используют шов

- А. Косметический
- Б. Кисетный
- В. Узловой
- Г. П-образный

К химическим методам стерилизации относится

- А. Паровой
- Б. Жидкостный
- В. Инфракрасный
- Г. Гласперленовый

Аспирационную пробу проводят для

- А. Профилактики травмы нерва иглой
- Б. Уменьшения отека тканей
- В. Снижения вероятности внутрисосудистого введения анестетика
- Г. Снижения расхода анестетика

Особенности ожогов лица заключаются в

- А. Пигментации
- Б. Значительной аутоинтоксикации
- В. Неравномерном поражении различных отделов кожи лица
- Г. Течении раневого процесса

Для стимулирования цементагенеза применяется

- А. Лимонная кислота
- Б. Тетрациклин
- В. ЭДТА
- Г. Emdogain

Лечение гипертрофического гингивита включает в себя

- А. Антибиотикотерапию
- Б. Гингивэктомию
- В. Открытый кюретаж
- Г. Санация полости рта

Неправильное сращение фрагментов при переломе нижней челюсти происходит вследствие

- А. Скученного положения зубов
- Б. Наличия сопутствующих заболеваний у пострадавшего
- В. Отсутствия репозиции и иммобилизации фрагментов
- Г. Полной адентии челюстей

Ампутация корня зуба включает

- А. Удаление корня вместе с прилегающей к нему коронковой частью зуба
- Б. Удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба
- В. Рассечение зуба на две части (применяется при лечении моляров) в области бифуркации с последующим сглаживанием нависающих краев
- Г. Пересадку удаленного зуба в его же альвеолу

Величина рецессии при клиническом обследовании определяется

- А. Расстоянием от эмалево-цементной границы до уровня гребня десневого края
- Б. Глубиной зондирования десневой борозды
- В. Расстоянием от эмалево-цементной границы до дна кармана при зондировании
- Г. Глубиной зондирования кармана

Доля встречаемости калькулезного сиалоаденита от общего числа неопухолевых заболеваний слюнных желез составляет в среднем

- А. 70%
- Б. 85%
- В. 95%
- Г. 30%

Признание человека инвалидом возможно только при проведении экспертизы

- А. Трудоспособности
- Б. Военно-врачебной
- В. Медико-социальной
- Г. Судебно-медицинской

Для рентгенологического симптома остеолизиса характерно

- А. Уплотнение костной ткани
- Б. Наличие инородного тела в костной ткани
- В. Уменьшение числа костных балок
- Г. Отсутствие части кости

При остром гнойном периостите проводят

- А. Антибиотикотерапию
- Б. Комплексное лечение
- В. Оперативное лечение
- Г. Лекарственную терапию

Травматическую язву дифференцируют с

- А. Эрозивно-язвенной формой плоского лишая
- Б. Раковой язвой
- В. Аллергическим стоматитом
- Г. Многоформной экссудативной эритемой

Механизм дистракционного остеогенеза запускается на этапе компрессии

- А. Лифоцитами
- Б. Фибробластами
- В. Морфогенетическими белками
- Г. Остеобластами

При контакте раны с землей пациенту в обязательном порядке необходимо сделать инъекцию

- А. Антирабической вакцины
- Б. Актинолизата
- В. Альфа-глобулина
- Г. Противостолбнячной сыворотки

При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности формируется и продлевается на срок не более ____ месяцев с даты начала временной нетрудоспособности и не более ____ месяцев при лечении туберкулеза

- А. 6; 8
- Б. 12; 14
- В. 4; 5
- Г. 10; 12

Главную опасность в ближайшие часы после ранений языка, мягкого неба, тканей дна полости рта для жизни пациента представляет

- А. Столбняк
- Б. Нарушение речи
- В. Асфиксия
- Г. Сепсис

Показанием к операции цистотомии является наличие

- А. Кисты, в полость которой проецируется не более 3-х корней зубов
- Б. Обширных кист нижней челюсти с истончением ее основания
- В. Кисты как следствие порока развития одонтогенного эпителия
- Г. Кисты верхней челюсти с отсутствием зубов в ее зоне и сохранением костных стенок

При операции удаления корней центральных резцов верхней челюсти применяют

- А. Клювовидные щипцы со сходящимися щечками
- Б. S-образные щипцы
- В. Штыковидный элеватор
- Г. Прямые щипцы со сходящимися щечками

Вероятной одонтогенной причиной формирования субпериостального абсцесса является

- А. Обострение гранулирующего периодонтита
- Б. Острый пульпит
- В. Повреждение эмали зуба
- Г. Глубокий кариес

Дополнительным методом обследования при ангиовенозной мальформации является

- А. Ангиография
- Б. Сцинтиграфия
- В. Общий анализ крови
- Г. УЗИ вен нижних конечностей

Основным методом лечения очаговой формы эозинофильной гранулемы является

- А. Выскабливание опухоли
- Б. Химиотерапия
- В. Резекция челюсти с одномоментной костной пластикой
- Г. Блок-резекция челюсти

Сочетание ксеростомии и ксерофтальмии и болей в суставах наиболее характерно для

- А. Синдрома Шегрена
- Б. Болезни Крона
- В. Болезни Лайма
- Г. Синдрома Иценко-Кушинга

Для определения регенерации костной ткани после цистэктомии используется

- А. Компьютерная томография
- Б. ПЭТ КТ
- В. УЗИ
- Г. Сцинтиграфия

Ток дарсонваля способен

- А. Снижать регенерацию
- Б. Снижать чувствительность нервных рецепторов кожи
- В. Угнетать процессы обмена
- Г. Вызывать раздражение рецепторов в мышце, вызывая её сокращение

Рак заднего отдела дна полости рта на ранних стадиях метастазирует в

- А. Глубокие шейные лимфоузлы
- Б. Заглоточные и шейные лимфоузлы
- В. Легкие и кости гематогенным путем
- Г. Шейные лимфоузлы

При блокаде передней верхней альвеолярной ветви наступает обезболивание

- А. Премоляров и первого моляра
- Б. Моляров
- В. Резцов и клыков
- Г. Премоляров

Одним из эффективных неинвазивных методов диагностики и мониторинга процесса развития и инволюции инфантильной гемангиомы является метод

- А. Реовазографии
- Б. Гистологического исследования
- В. Компьютерной капилляроскопии
- Г. Ангиографии

Подвижность корня на всём протяжении при бимануальной пальпации указывает на

- А. Полный вывих зуба
- Б. Подвывих зуба
- В. Перелом альвеолярного отростка
- Г. Неполный вывих зуба

При фолликулярных кистах используется лечение

- А. Лучевой терапией
- Б. Оперативное
- В. Комбинированное
- Г. Медикаментозное

Для ушиба характерно

- А. Нарушение чувствительности
- Б. Наличие гематомы, целостность кожи не нарушена
- В. Нарушение целостности кости
- Г. Нарушение целостности кожи, кровотечение

Возмещение вреда, причиненного здоровью пациента врачом лечебного учреждения в результате оказания некачественной медицинской услуги, подлежит возмещению

А. Страховой медицинской организацией, с которой у ЛПУ заключен договор в рамках обязательного медицинского страхования

Б. Врачом, причинившим вред здоровью пациента

В. Фондом обязательного медицинского страхования

Г. Лечебным учреждением, где оказывалась медицинская услуга

Максимальный срок, на который может выдать листок нетрудоспособности семейный врач, составляет (в днях)

А. 20

Б. 15

В. 10

Г. 5