

Тесты с вопросами по специальности «Стоматология общей практики» для аттестации 1, 2 и высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog-praktik/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Стоматология общей практики» для аккредитации и других экзаменов (3600 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/o_stomatolog/

2) Тесты для аккредитации «Стоматология терапевтическая» (2700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_terapevt/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

Навигация по категориям

- [1 категория](#)
- [2 категория](#)
- [высшая категория](#)

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Местноанестезирующие средства, содержащие вазоконстриктор, противопоказаны пациентам, применяющим

- А. Антигистаминные
- Б. Анксиолитики
- В. Трициклические антидепрессанты
- Г. Неопиоидные анальгетики
- Д. Нестероидные противовоспалительные препараты

ПРИ ВКОЛОЧЕННОМ ВЫВИХЕ РЕЗЦОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Провести шинирование и оставить под наблюдение
- В. Репозировать
- Г. Депульпировать и репозировать
- Д. Удалить

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. 8 – 10 месяцев

Б. 45 суток

В. 2 недели

Г. Конец первого месяца

1. Сроки появления остеоидных палочек на дне и стенках лунки после удаления зуба

2. Сроки начала заполнения лунки удаленного зуба мелкопетливой губчатой костной тканью

3. Сроки окончания заполнения лунки удаленного зуба мелкопетливой губчатой костной тканью

4. Сроки, при которых лунка рентгенологически не отличается от окружающей костной ткани при осложненном заживлении (альвеолите или остеомиелите)

А. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

Б. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

В. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2

ДЛЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ

А. Кратковременные интенсивные боли, возникающие от случайных раздражений без нарушений чувствительности

Б. Продолжительная, варьирующая по интенсивности боль, усиливающаяся при давлении по ходу нерва

В. Продолжительные приступообразные боли с иррадиацией в ухо, хруст в височно-нижнечелюстном суставе

Г. Тупые длительные боли с чувством давления и напряжения в верхней челюсти, выделения из носа

Д. Приступообразные ночные боли длительностью 15-30 минут, иррадиирующие в ухо, висок

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Тиреоглоссальная киста

Б. Эктодермы

В. Бранхиогенная киста

Г. Энтодермы и эктодермы

Д. Кистозная тератома

1. Дермоидные кисты развиваются из:

2. Бранхиогенные кисты развиваются из:

3. Синоним дермоида

4. Синоним боковой кисты шеи

5. Синоним срединной кисты шеи

А. А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

Б. А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

В. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Ошибки и осложнения:

А. Нависающий край пломбы, отсутствие контактного пункта

Б. Термический ожог пульпы

В. Вскрытие полости зуба

Г. Дебондинг Этапы лечения, на которых совершены ошибки:

1. Препарирование полости

2. Наложение матрицы

3. Пломбирование полости

4. Полирование пломбы

А. 1БВ, 2А, 3АГ, 4--

Б. 1БВ, 2А, 3Г, 4--

В. 1В, 2А, 3Г, 4--

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Хронический гнойный и гипертрофический альвеолит
 - Б. Рыхлая тампонада лунки йодоформным тампоном
 - В. Антисептические ванночки, противопоказано интенсивное полоскание полости рта
 - Г. «сухая лунка» или остеомиелит
 - Д. Серозная и гнойно-некротическая
1. Тактика врача при течении альвеолита в виде «сухой лунки»
 2. Рекомендации врача после удаления зуба
 3. Формы течения альвеолита
 4. Острые формы альвеолита
 5. Хронические формы альвеолита
- А. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4
Б. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4
В. А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Классы композитных материалов:

- А. Текущие, жидкие
 - Б. Микронаполненные
 - В. Гибридные
 - Г. Универсальные
- Признаки классификации:
1. По размеру частиц наполнителя
 2. По клиническому назначению
 3. По плотности
 4. По способу полимеризации
- А. 1БВ, 2Г, 3А, 4--
Б. 1В, 2Г, 3А, 4--
В. 1БВ, 2ВГ, 3А, 4--

ДЛЯ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ В ОСТРОЙ СТАДИИ ХАРАКТЕРНО

- А. Наличие свищевых ходов по переходной складке в очаге поражения, гиперемия и болезненность мягких тканей
- Б. Воспалительный инфильтрат в области переходной складки
- В. Гиперемия и болезненность мягких тканей, инфильтрация надкостницы по переходной складке
- Г. Воспалительная инфильтрация надкостницы и мягких тканей, прилежащих к очагу поражения челюсти с вестибулярной и оральной поверхности
- Д. Воспалительная инфильтрация мягких тканей, прилежащих к очагу поражения челюсти с вестибулярной и оральной поверхности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЕО-ЛАМПЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ

- А. Гипертонической болезни компенсируемой формы
- Б. Сердечно-сосудистой недостаточности компенсируемой формы
- В. Сердечно-сосудистой недостаточности, компенсируемой электрокардиостимулятором
- Г. Сердечно-легочной недостаточности компенсированной формы
- Д. Сердечно-легочной недостаточности декомпенсированной формы

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЭТО ОСЛОЖНЕНИЕ

- А. приступ стенокардии
- Б. острая почечная недостаточность
- В. инфаркт миокарда
- Г. нарушение мозгового кровообращения
- Д. аритмия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Безболезненные узлы розового или бурого цвета, которые могут изъязвляться с последующим рубцеванием или рассасыванием

Б. Эрозии и язвы

В. Бугорок (люпом)

Г. Мелкие желтовато – красные узлы, которые изъязвляются

Д. Периаденит

1. Характерный признак первичного туберкулеза кожи

2. Элемент при туберкулезной волчанке

3. Признаки милиарно – язвенного туберкулеза

4. Характерный признак туберкулезного лимфаденита

5. Признаки диссеминированного милиарного туберкулеза лица

А. А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 2, Д – 4

В. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Химическая основа материалов:

А.Керамический полисилоксан

Б.Композит+СИЦ

В.Органическая полимерная Матрица+наполнитель

Г.Акриловые или апоксидные Полимеры Группы пломбировочных материалов:

1.Компомеры

2.Композиты

3.Ормомеры

4.Пластмассы

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1Б, 2А, 3В, 4Г

В. 1Б, 2В, 3А, 4Г

КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ГИПОГЛИКЕМИИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СИМПТОМ

А. общей слабости

Б. двигательного беспокойства

В. чувства голода

Г. сухости кожных покровов

Д. тремора пальцев

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ВОСПАЛЕНИЯ ДЕСНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

А. Деформация десневых сосочков

Б. Некроз десневых сосочков

В. Кровоточивость при зондировании десневых сосочков

Г. Резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок

Д. Наличие пародонтального кармана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Нижнелуночковый и язычный

Б. Слизистая оболочка в пределах резцов и клыков с обеих сторон

В. Верхние моляры и соответствующий участок слизистой оболочки альвеолярного отростка с вестибулярной стороны

Г. Резцы, клыки и премоляры, альвеолярный отросток и его слизистая оболочка с вестибулярной стороны, мягкие ткани подглазничной области

Д. Разновидность мандибулярной анестезии

1. Зона обезболивание при инфраорбитальной анестезии

2. Зона обезболивание при туберальной анестезии

3. Обезболивание по Егорову – это:

4. Зона обезболивания резцовой анестезии

5. При внутриротовой мандибулярной анестезии происходит выключение чувствительных ветвей:

А. А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 1

Б. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3

В. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д – 1

ИНТЕРГЛОБУЛЯРНЫЙ ДЕНТИН - ЭТО:

А. Основное вещество между дентинными слоями

Б. Часть дентина, прилегающая к полости зуба

В. Отложения дентина в течении жизни человека

Г. Дентин, образующийся при патологии твердых тканей зуба

Д. Дентин, возникающий в процессе развития зуба

ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ ПО П КЛАССУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

А. Стеклоиономерный цемент

Б. Поликарбоксилатный цемент

В. Гибридный композиционный материал

Г. Микрофильный композиционный материал

Д. Компомер

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Эпителиальные клетки

Б. Мезенхимальные клетки наружного слоя зубного мешочка

В. Макрофаги

Г. Апикальные, апиколатеральные, латеральные, межкорневые

Д. Простая, сложная кистогранулема

Е. 0, 5 см.

Ж. 0, 5 – 1 см.

1. Развитие периодонта происходит за счет

2. Особенностью тканей периодонта является наличие

3. По локализации гранулемы различают

4. Размеры гранулемы не превышают

5. Размеры кистогранулемы

А. А – 2, Б – 3, Г – 1, Е – 4, Ж – 5

Б. А – 2, Б – 1, Г – 4, Е – 3, Ж – 5

В. А – 2, Б – 1, Г – 3, Е – 4, Ж – 5

Допускается постановка искусственных зубов в съёмном пластиночном протезе кпереди от центра альвеолярного гребня на $\frac{2}{3}$ их длины в области:

А. передних зубов нижней челюсти;

Б. передних зубов верхней челюсти;

В. боковых зубов нижней челюсти;

Г. боковых зубов верхней челюсти;

Д. передних и боковых зубов нижней челюсти.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Заболевание, в основе которого лежит нарушение чувствительности, выражающееся в приступообразных болях в зонах иннервации соответствующего нерва

Б. Полное отсутствие произвольных движений мышц

В. Уменьшение силы и (или) амплитуды произвольных движений мышц

Г. Состояние повышенной возбудимости нервной системы в сочетании с ее повышенной истощаемостью

Д. Места выхода ветвей тройничного нерва из костного отверстия в мягкие ткани

Е. Место нахождения триггерных (курковых) зон

1. Точки Валле

2. Невралгия

3. Неврит (невропатия)

4. Паралич

5. Парез

А. А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 5, Д – 1

Б. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 3

В. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Интенсивные приступообразные боли, зачастую – наличие «ауры» или раздражение триггерных зон перед приступом; вегетативные проявления

Б. Неврита

В. 1 месяц

Г. Невралгии

Д. Ноющие боли, часто постоянного характера, сопровождающиеся нарушением чувствительности и двигательными нарушениями

Е. 2 месяца

1. Клинические проявления неврита тройничного нерва

2. Клинические проявления невралгии тройничного нерва

3. Антиконвульсанты эффективны при лечении

4. Длительность болевого синдрома, при котором ставится диагноз хронической боли (при отсутствии морфологического субстрата)

А. А – 2, Г – 3, Д – 4, Е – 1

Б. А – 3, Г – 2, Д – 1, Е – 4

В. А – 2, Г – 3, Д – 1, Е – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Жалобы:

А.Зуб ранее сильно болел, в настоящее время боль возникает при попадании пищи в полость

Б.Боли интенсивные,самопроизвольные, иррадиирующие, усиливаются от горячего, кратковременное ослабление от холодного

В.Быстропроходящие боли от температурных, механических, химических раздражителей, возникшие 2-3 дня назад

Г.Продолжительные боли от всех видов раздражителей, ночные и самопроизвольные боли
Заболевание:

1.Пульпит начальный

2.Пульпит острый

3.Пульпит гнойный

4.Пульпит хронический гипертрофический

А. 1В, 2Г, 3Б, 4А

Б. 1Г, 2В, 3Б, 4А

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ НАЗНАЧАЮТ
МАЗИ**

А. Фотозащитные

Б. Кортикостероидные

В. Противовоспалительные

Г. Антибактериальные

Д. Регенерирующие

ЖЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ, ПРОХОДЯЩЕЕ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ, ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

А. Глоссита

Б. Глоссалгии

В. Ромбовидного глоссита

Г. Десквамативного глоссита

Д. Невралгия тройничного нерва

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. От нескольких месяцев до нескольких лет
- Б. Двустороннее поражение
- В. Одностороннее поражение
- Г. Обычно изменений нет, редко – расширение суставной щели
- Д. Расширение или сужение суставной щели, остеопороз
- Е. 2 – 3 месяца
- Ж. До 1 года
- 1. Для ревматоидного артрита ВНЧС характерно
- 2. Для контактного артрита ВНЧС характерно
- 3. Характерная рентгенологическая картина острого артрита ВНЧС
- 4. Рентгенологическая симптоматика хронического артрита ВНЧС
- 5. Длительность течения острого артрита ВНЧС
- 6. Длительность течения хронического артрита ВНЧС
- А. А – 6, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4, Е – 5
- Б. А – 6, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5, Е – 4
- В. А – 6, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4, Е – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Свойства композитных материалов:

- А. Выделение фтора
- Б. Высокая эластичность
- В. Высокая прочность
- Г. Низкая полимеризационная усадка Группы композитных материалов:
- 1. Текучие
- 2. Гибридные
- 3. Наноккомпозиты
- 4. Компомеры
- А. 1Б, 2В, 3Г, 4А
- Б. 1В, 2Б, 3Г, 4А
- В. 1Б, 2Г, 3А, 4В

ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ВРЕМЕННЫХ РЕЗЦОВ СО СФОРМИРОВАННЫМИ КОРНЯМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Удалить
- В. Зубы трепанировать, запломбировать за верхушки корней
- Г. Зубы трепанировать, запломбировать до верхушек корней
- Д. Репозиция зубов, их фиксация, наблюдение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Седативный эффект

Б. Замедляет процесс заживления раны

В. Атропин

Г. Гексенал

1. Побочный эффект от новокаина

2. Побочный эффект от тримекаина

3. При передозировке новокаина вводят:

4. При передозировке лидокаина вводят:

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3

Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4

В. А – 1, Б – 2, В – 4, Г – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. 10 лет

Б. 6 лет

В. Чрезмерно развитая пазуха, распространяющаяся даже в отростке верхнечелюстной кости

Г. Малые размеры верхнечелюстной пазухи

Д. Боль, чувство тяжести, давления и напряжения в соответствующей половине лица

Е. Выделение гноя или слизи из соответствующей половины носа

1. Наиболее частые симптомы острого гайморита

2. Возраст ребенка, при котором размеры верхнечелюстной пазухи приближаются к таковым взрослого человека

3. Возраст ребенка, при котором нижняя стенка верхнечелюстной пазухи находится на одном уровне с дном полости носа

4. Пневматический тип верхнечелюстной пазухи

5. Возраст ребенка, когда нижняя граница верхнечелюстной пазухи лежит ниже уровня дна полости носа

А. А – 5, Б – 2, В – 3,4, Д – 1

Б. А – 5, Б – 2, 3, В – 1, Д – 4

В. А – 5, Б – 2, 3, В – 4, Д – 1

Укажите местный анестетик, действующий наиболее длительно:

- А. лидокаин
- Б. бупивакаин
- В. прокаин (новокаин)
- Г. артикаин
- Д. мепивакаин

ТОННЕЛЬНОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА

- А. Резцах и клыках
- Б. Клыках и премолярах
- В. Премолярах и резцах
- Г. Молярах и премолярах
- Д. Молярах и резцах

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

- А. Хронический сиалектатический паротит
 - Б. Эпидемический паротит
 - В. Острый серозный лимфаденит интракапсулярного лимфоузла околоушно-жевательной области
 - Г. Интерстициальный сиаладенит
 - Д. Слюнно-каменная болезнь
1. Вирусный сиалоаденит
 2. Ложный паротит Герценберга
 3. Паренхиматозный паротит
 4. Калькулезный сиалоаденит
 5. Склерозирующий субмаксиллит
- А. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5, Д – 4
 - Б. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 5
 - В. А – 1, Б – 2, В – 3, Г – 5, Д – 4

ОСНОВНЫМ ПРИЧИННЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Курение
- Б. Сахарный диабет;
- В. Пародонтопатогенная микрофлора;
- Г. Сердечно-сосудистые заболевания;
- Д. Подвижность зубов.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Плазматические клетки

Б. Эозинофилы

В. Нейтрофильный сдвиг влево

Г. 4 – 5 сутки

Д. Гигантские многоядерные клетки

Е. 2 – 3 сутки

1. Признаки острого воспалительного процесса в общем анализе крови

2. Цитологический признак медленного заживления раны

3. Признак патологического течения раневого процесса

4. Цитологический признак наличия в ране инородного тела

5. Сроки перехода от макрофагальной фазы в фибробластическую при раневом процессе

А. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4

Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4

В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. 120 – 160

Б. 4,5 – 5

В. 200 – 400

Г. 0,8 – 1

Д. 0 – 5 %

Е. 20 – 30 %

1. Количество эритроцитов у здоровых людей ($\times 10^{12}$ в 1 л.)

2. Содержание гемоглобина в крови здоровых взрослых людей.

3. Цветовой показатель в норме

4. Количество тромбоцитов у здоровых людей ($\times 10^9$ в 1 л.)

5. Количество лимфоцитов в мазке крови взрослого человека (на 100 клеток)

6. Количество эритроцитов в мазке крови взрослого человека (на 100 клеток)

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 6, Е – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5, Е – 6

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 6, Е – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Безболезненный карбункул, на месте некроза образуется струп темного цвета, вокруг – стекловидный отек
- Б. Эритематозное пятно имеет следующий вид: центральная часть западает и имеет яркий розово – красный цвет, периферия очага возвышается
- В. Безболезненная, покрытая чешуйками эритема в виде «бабочки без крыльев»
- Г. Манифестация с язвенно – некротического стоматита или гингивита
- Д. Высыпания на коже, группы пузырьков с серозным содержимым по ходу нервных стволов

1. Характерные признаки номы
2. Характерные признаки сибирской язвы
3. Характерные признаки полиморфной экссудативной эритемы
4. Характерные признаки опоясывающего лишая
5. Характерные признаки эритематоза (красной волчанки)

А. А – 2, Б – 3, В – 5, Г – 4, Д – 1

Б. А – 2, Б – 3, В – 5, Г – 1, Д – 4

В. А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Строфантин, коргликон
- Б. Бемегрид
- В. Эуфиллин, дипрофиллин
- Г. Кордиамин
- Д. Нитроглицерин, изокет, нитроминт
1. Дыхательные analeptiki
 2. Сердечные гликозиды
 3. Антагонист гексенала и тиопентала натрия
 4. Бронхолитики
 5. Антиангинальные препараты

А. А – 1, Б – 3, В – 4, Г – 2, Д – 5

Б. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1, Д – 5

В. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 5, Д – 1

После припасовки коронок паяного мостовидного протеза в полости рта повторно определяется центральная окклюзия для:

- А. оценки качества припасовки коронок;
- Б. повторной установки и загипсовки модели с коронками в артикулятор;
- В. точной спайки опорных коронок с промежуточной частью;
- Г. точного моделирования промежуточной части мостовидного протеза (с учетом смыкания зубных рядов в центральной окклюзии);
- Д. повышения эстетики протеза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Абсцедирование
- Б. Подвижность зубов 2 степени
- В. Патология прикуса
- Г. Сахарный диабет
- Д. Кровоточивость десен

Укажите точку приложения действия местных анестетиков:

- А. кора головного мозга
- Б. таламус
- В. лимбическая система
- Г. чувствительные нервные окончания и проводники
- Д. задние рога спинного мозга

НИТРОМИНТ-АЭРОЗОЛЬ (НИТРОСПРЕЙ) - СРЕДСТВО ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ

- А. судорожного припадка
- Б. приступа бронхиальной астмы
- В. приступа стенокардии
- Г. гипертонического криза
- Д. стенотической асфиксии

Наиболее высокую кардиотоксичность имеет

- А. мепивакаин
- Б. лидокаин
- В. бупивакаин
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. артикаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Тенденция к группировке папул

Б. Повторное заражение этим же заболеванием после выздоровления

В. 3 – 4 недели

Г. 1 – 2 месяца

Д. Розеола, папулы, реже – пустулы

Е. Повторное заражение одним и тем же заболеванием у невылеченного больного

1. Реинфекция

2. Суперинфекция

3. Инкубационный период для первичного сифилиса

4. Проявления вторичного сифилиса на коже

5. Признаки рецидивирующего вторичного сифилиса

А. А – 5, Б – 1, В – 3, Д – 2, Е – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Д – 4, Е – 2

В. А – 1, Б – 5, В – 3, Д – 4, Е – 2

Гипертония – состояние, при котором величина АД стойко превышает

А. 120\80 мм.рт.ст

Б. 125\80 мм.рт.ст

В. 130\80 мм.рт.ст

Г. 135\85 мм.рт.ст

Д. 140\90 мм.рт.ст

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Заболевание:

А. Корневая киста остаточная

Б. Периапикальный абсцесс без свища

В. Корневая киста апикальная и боковая

Г. Хронический апикальный периодонтит Код по МКБ-10:

1. K04.5

2. K04.80

3. K04.7

4. K04.81

А. 1Г, 2В, 3Б, 4А

Б. 1Г, 2А, 3Б, 4В

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

Укажите осложнение, наиболее часто наблюдаемое при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов.

- А. ulcerогенный эффект
- Б. лейкопения
- В. повышение артериального давления
- Г. гепатит
- Д. понижение артериального давления

Культевые штифтовые вкладки методом литья изготавливают из:

- А. пластмассы;
- Б. легкоплавкого металла;
- В. сплавов металлов;
- Г. композиционных материалов;
- Д. воска.

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области передних зубов проходит:

- А. не касается зубов;
- Б. в пришеечной области зубов;
- В. посередине коронки зубов;
- Г. перекрывая коронки зубов на $1/3$;
- Д. перекрывая коронки зубов на $2/3$.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Скрепление отломков костным цементом
 - Б. Внутрикостное введение штифта (спицы), наложение на костной минипластины
 - В. Перевязка наружной сонной артерии
 - Г. Репозиция и фиксация отломков, перевязка сосуда в ране
 - Д. При помощи съёмного протеза с преобразованием его в шину и пращи
 - Е. Наложение аппарата Рудько, ЦИТО
 - Ж. Шина с зацепными петлями и межчелюстным натяжением
1. Способ остановки кровотечения при переломах нижней челюсти:
 2. Наиболее щадящий и часто применяемый метод лечения переломов нижней челюсти в пределах зубного ряда
 3. Наиболее простой метод лечения переломов беззубой нижней челюсти
 4. Наиболее легкий и быстро выполнимый метод остеосинтеза
- А. Б – 1, Г – 4, Д – 3, Ж – 2
 - Б. Б – 4, Г – 1, Д – 3, Ж – 2
 - В. Б – 4, Г – 2, Д – 1, Ж – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Разрежение кости позади коронки нижнего «зуба мудрости»

Б. Воспаление мягких тканей, окружающих коронку зуба при его неполном и затрудненном прорезывании

В. Ретенция «зубов мудрости»

Г. Задержка сроков прорезывания нормально сформированного постоянного зуба

Д. Неправильное положение в зубном ряду прорезывавшегося зуба или его аномальное положение в челюсти

1. Ретенция зуба

2. Дистопия зуба

3. Перикоронит

4. Полулуние Вассмунда

5. Одна из причин краевой гнездовой алопеции затылочной области

А. А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 1, Д – 2

В. А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2, Д – 1

Анестетик с минимальной активностью в условиях воспаления:

А. тримекаин

Б. лидокаин

В. мепивакаин

Г. прокаин (новокаин)

Д. артикаин

ПРИСТУП СТЕНОКАРДИИ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ДЛИТСЯ

А. 10 – 30 с

Б. 30 – 60 с

В. 1 - 5 мин

Г. 5 -10 мин

Д. 10 – 20 мин

При прямом методе изготовления культевой вкладки восковая или пластмассовая модель будущей вкладки изготавливается:

А. на модели из обычного медицинского гипса;

Б. на модели из огнеупорной массы;

В. на модели из легкоплавкого металла;

Г. непосредственно в полости рта;

Д. на модели из супергипса.

Моделировка литой коронки может проводиться без использования "адапты":

- А. базисным воском;
- Б. бюгельным воском;
- В. погружным воском;
- Г. липким воском;
- Д. воском для мостовидных работ;

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области боковых зубов проходит:

- А. не касается зубов;
- Б. в пришеечной области зубов;
- В. по середине коронки зубов;
- Г. перекрывая коронки зубов на $1/3$;
- Д. перекрывая коронки зубов на $2/3$.

ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ ГИНГИВО-СТОМАТИТ СОПРОВОЖДАЕТ ТЕЧЕНИЕ

- А. Сифилиса
- Б. ВИЧ-инфекции
- В. Красной волчанки
- Г. Хронического герпетического стоматита
- Д. Многоформной экссудативной эритемы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Сложные эфиры
- Б. Амиды
- В. Этиловые эфиры
- Г. Артикаин и гидрохлорид
- Д. Барбитураты

- 1. Прилокаин относится к группе:
- 2. Мепивакаин относится к группе:
- 3. Бупивакаин относится к группе:
- 4. Ультракаин относится к группе:
- 5. Новокаин относится к группе:

- А. А – 5, Б – 1,2, Г – 4,3
- Б. А – 5, Б – 1,2,3, Г – 4
- В. А – 2, Б – 1,3,4, Г – 5

ПРИЧИННЫЙ ЗУБ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ

- А. Сохраняют обязательно
- Б. Шинируют
- В. Депульпируют
- Г. Удаляют по показаниям
- Д. Удаляют обязательно

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ АРТРИТА ВНЧС С ХРОНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. Выраженное сужение суставной щели, нарушение функции суставной головки.
- Б. Незначительное расширение суставной щели, нарушение функции суставной головки.
- В. Выраженное расширение суставной щели, нарушение функции суставной головки.
- Г. Исчезновение наружных замыкающих кортикальных пластинок, краевые узур, остеопороз и кисты суставной головки
- Д. Ширина суставной щели без изменений, нарушение функции суставной головки.

МИКРОПРОТЕЗ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБА И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ВСЮ ОККЛЮЗИОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

- А. Pinlay
- Б. Inlay
- В. Onlay
- Г. Overlay
- Д. Ney

При какой реакции среды местные анестетики наиболее активны:

- А. нейтральной
- Б. слабощелочной
- В. слабокислой
- Г. кислой
- Д. щелочной

Укажите формулу зуба, для лечения которого необходимо провести проводниковую анестезию с анестетиком на основе артикаина

- А. зуб 36
- Б. зуб 14
- В. зуб 25
- Г. зуб 42
- Д. зуб 33

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Грипп, корь, краснуха, болезнь Боткина
- Б. Прогрессирование и неблагоприятный исход процесса
- В. Гнойно – воспалительные процессы
- Г. Аллергические и паразитарные заболевания
- Д. Воспалительные заболевания, интоксикация
- Е. Мононуклеоз, туберкулез, сифилис

1. Лейкоцитоз наблюдается при заболеваниях:
2. Лейкопения чаще встречается при заболеваниях:
3. Токсическая зернистость лейкоцитов указывает на:
4. Нейтрофилез указывает на:
5. Эозинофилия встречается при:
6. Лимфоцитоз развивается при:

- А. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6
- Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 6
- В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Болевой дисфункции
 - Б. Острого артрита
 - В. Артрозе
 - Г. Хроническом артрите
1. Симптом головной боли в большей степени характерен для:
 2. Резкие боли в суставе в большей степени характерны для:
 3. Щелканье в суставе наблюдаются при:
 4. Хруст в нижнечелюстном суставе наблюдается при:
 5. Тугоподвижность в суставе в конце дня наиболее часто встречается при:
 6. Чувство сведения челюстей после сна наблюдается при:

- А. А – 1, 3, 6, Б – 2, В – 5, Г – 4
- Б. А – 1, 3, Б – 2, В – 4, Г – 5
- В. А – 1, 3, 6, Б – 2, В – 4, Г – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Имеет вид плотной ткани, по плотности соответствует кости
 - Б. Из соединительной ткани
 - В. Из лимфоидной ткани
 - Г. Из слизистой ткани
 - Д. Очаг деструкции кости с нечеткими границами
 - Е. Напоминает кисту
 - Ж. Очаг разрежения костной ткани без четких границ, репаративные процессы в окружающей кости отсутствуют
1. Развитие цементомы происходит
 2. Развитие миксомы происходит
 3. Проявление миксомы на рентгенограмме
 4. Проявление цементомы на рентгенограмме
 5. Проявления одонтогенной карциномы (первичного рака) нижней челюсти на рентгенограмме
- А. А – 1, Б – 4, Г – 2, Д – 3, Ж – 5
Б. А – 4, Б – 1, Г – 2, Д – 3, Ж – 5
В. А – 4, Б – 1, Г – 2, Д – 5, Ж – 3

Укажите группу препаратов, усиливающую и пролонгирующую действие местноанестезирующих средств:

- А. возбуждающие средства
- Б. спазмолитики
- В. α -адреномиметики
- Г. М-холиномиметики
- Д. α -адреноблокаторы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Признаки периодонтита

Б. Заболевания, характеризующиеся распространением воспалительного процесса с периодонта на надкостницу альвеолярного отростка и тело челюсти

В. Инфекционно – аллергический, гнойно – некротический процесс, который развивается в кости под воздействием внешних или внутренних факторов

Г. Очаги разрежения костной ткани различных размеров

Д. Удаление причинного зуба, декомпрессия тканей (в т.ч. костной), дренирование очагов воспаления

Е. Удаление или лечение причинного зуба (по показаниям), вскрытие абсцесса

1. Периостит

2. Остеомиелит

3. Изменения на рентгенограмме при остром периостите

4. Изменения на рентгенограмме при остром одонтогенном остеомиелите на ранних стадиях

5. Оперативное лечение острого одонтогенного периостита

6. Оперативное лечение острого одонтогенного остеомиелита

А. А – 3,4, Б – 1, В – 2, Д – 6, Е - 5

Б. А – 4, Б – 1, В – 2, Д – 6, Е - 5

В. А – 3,4, Б – 2, В – 1, Д – 6, Е - 5

ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ЦЕМЕНТ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ ЯВИТЬСЯ В КЛИНИКУ ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО ОСМОТРА:

А. Один раз в месяц

Б. Один раз в полгода

В. Один раз в год

Г. Только при возникновении жалоб

Д. По желанию пациента

ПРИ ТРАВМЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДИТ

А. Перелом корня

Б. Вывих

В. Ушиб

Г. Скол коронки зуба

Д. Перелом зуба на уровне шейки

ВЕРРУКОЗНУЮ ЛЕЙКОПЛАКИЮ ОТНОСЯТ

А. К раку

Б. К дерматозу

В. К облигатному предраку

Г. К факультативному предраку

Д. Все ответы не верные

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВООБЩЕ.

А. Передние и задние

Б. Травматический, привычный, патологический

В. Острые и застарелые

Г. Односторонние и двусторонние

Д. Полный и неполный

1. В зависимости от величины расхождения суставных поверхностей вывихи нижней челюсти могут быть:

2. С учетом времени прошедшей с момента травмы, вывихи нижней челюсти делятся на:

3. В зависимости от локализации вывихи могут быть:

4. По механизму возникновения различают вывихи:

5. В зависимости от направления смещения суставной головки, вывихи бывают

А. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д – 1

Б. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3

В. А – 5, Б – 2, В – 3, Г – 3, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВООБЩЕ.

А. Зуб

Б. Белесоватым, мутным, тягучим

В. Кровянисто – бурый, без холестерина

Г. Холестеатомные массы

1. Содержимое амелобластомы нижней челюсти чаще бывает

2. Содержимое остеобластомы чаще бывает

3. Содержимое фолликулярной кисты

4. Содержимое эпидермоидной кисты представляет собой

А. А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 4

Б. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4

В. А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

А. Гистиоцитоз (ретикулоэндотелиоз)

Б. Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение

В. Злокачественная эпителиальная опухоль

Г. Очаг разряжения костной ткани без четких границ

Д. Участки неоднородной деструкции костной ткани без наличия полосы остеосклероза по периферии очага

Е. Наличие очагов вновь образованной ткани

1. Первичный рак челюсти – это:

2. Эозинофильная гранулема – это:

3. Рентгенологические проявления первичного рака челюсти

4. Рентгенологические проявления эозинофильной гранулемы

А. А - 1, В - 3, Г - 2, Д - 4

Б. А - 2, В - 1, Г - 3, Д - 4

В. А - 2, В - 1, Г - 4, Д - 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Методы лечения:

А. Герметизация фиссур

Б. Реминерализующая терапия

В. Препарирование и пломбирование Полостей

Г. Обучение гигиене полости рта Стадии кариеса:

1. Стадия пятна

2. Кариес эмали

3. Кариес дентина

4. Осложненный кариес

А. 1АБГ, 2АБВГ, 3ВГ, 4Г

Б. 1АБГ, 2АВГ, 3ВГ, 4Г

В. 1АБГ, 2АБВГ, 3Г, 4Г

МИКРОПРОТЕЗ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБА И РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ОККЛЮЗИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕРЕКРЫТИЕМ ОДНОГО БУГРА

А. Pinlay

Б. Inlay

В. Onlay

Г. Overlay

Д. Ney

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Серозная инфильтрация тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел

Б. Зуд кожи, эозинофилия, в пунктате – клетки Березовского - Штернберга

В. Золотистый стафилококк

Г. Смешанная микрофлора

Д. Гнойное воспаление тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел

Е. Наличие пакетов лимфоузлов, длительный субфебрилитет, положительная реакция Пирке и Манту, наличие в пунктате гигантских клеток Пирогова – Лангханса

Ж. Острое начало заболевания, высокая температура тела, отрицательная проба с актинолизатом

1. Микроорганизм – наиболее частый возбудитель острых лимфаденитов лица и шеи

2. Периаденит

3. Аденофлегмона

4. Характерные признаки туберкулезного лимфаденита

5. Нехарактерные для актиномикоза признаки поражения лимфатических узлов

6. Клиническая симптоматика лимфогранулематоза

А. А – 3, Б – 6, В – 1, Д – 2, Е – 4, Ж – 5

Б. А – 2, Б – 6, В – 1, Д – 3, Е – 5, Ж – 4

В. А – 2, Б – 6, В – 1, Д – 3, Е – 4, Ж – 5

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССОВ И ФЛЕГМОН ЯВЛЯЕТСЯ

А. Новокаиновая блокада с антибиотиками

Б. Послойное вскрытие гнойного очага с введением дренажа

В. Удаление причинного зуба

Г. Проведение физиотерапии

Д. Дезинтоксикационная терапия

Провести депульпирование зуба

2.4 под инфильтрационной анестезией позволяют местноанестезирующие препараты на основе:

А. мепивакаина

Б. лидокаина

В. бензокаина (анестезина)

Г. артикаина

Д. прокаина (новокаина)

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ

- А. Приступообразные ночные боли длительностью 15-30 минут, иррадиирующие в ухо, висок
- Б. Продолжительные, варьирующие по интенсивности боли, усиливающиеся при давлении по ходу нерва
- В. Тупые длительные боли с чувством давления и напряжения в верхней челюсти, выделения из носа
- Г. Продолжительные приступообразные боли с иррадиацией в ухо, хруст в височно-нижнечелюстном суставе
- Д. Кратковременные интенсивные боли, возникающие от случайных раздражений без нарушений чувствительности

Подвижность зубов по Энтину II степени характеризуется подвижностью:

- А. в пределах физиологической нормы;
- Б. в лунке во всех направлениях вокруг своей оси;
- В. в вестибулооральном и медиодистальном направлениях;
- Г. в вертикальном направлении;
- Д. в вестибулооральном направлении.

Укажите процентную концентрацию раствора лидокаина, применяемого в стоматологической практике для инфильтрационной и проводниковой анестезии

- А. 0.50%
- Б. 2%
- В. 3%
- Г. 4%
- Д. 10

РЕСТАВРАЦИЯ ПО МЕТОДИКЕ "ОТКРЫТОГО СЭНДВИЧА" - ЭТО:

- А. Контактный пункт выполнен СИЦ, окклюзионная поверхность - композитом
- Б. Перекрытие базовой подкладки из СИЦ композитом в области контактного пункта и с окклюзионной поверхности
- В. Нанесение СИЦ на слой низкомодульного композита
- Г. Контактный пункт выполнен композитом, окклюзионная поверхность - СИЦ
- Д. Окклюзионная поверхность - композит, контактный пункт - амальгама

ПРИЗНАКАМИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. апноэ, асистолия, отсутствие зрачков. рефлекса
- Б. апноэ, асистолия, арефлексия
- В. апноэ, отсутствие роговичного рефлекса, отсутствие тонуса мышц
- Г. апноэ, отсутствие зрачкового рефлекса, отсутствие тонуса мышц
- Д. апноэ, асистолия, отсутствие коленного рефлекса

ДЛЯ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНО

- А. Сильные кратковременные приступообразные боли
- Б. Длительные ноющие боли
- В. Кратковременные парестезии
- Г. Длительные парестезии
- Д. Симптом Венсана

ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ УСТУП ФОРМИРУЕТСЯ

- А. Супрагингивально
- Б. На уровне края десны
- В. Субгингивально на вестибулярной поверхности
- Г. Субгингивально по всему периметру шейки зуба
- Д. Не формируется

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Закрытый перелом
- Б. При продольном переломе
- В. При сохранении целостности всех стенок лунки
- Г. Открытый перелом
- Д. Перелом зуба со вскрытием пульпы зуба
- Е. При поперечном переломе
- 1. Полный перелом зуба – это
- 2. Полный перелом коронки зуба – это
- 3. Зуб подлежит удалению
- 4. Реплантация зуба возможна
- 5. Полный перелом корня зуба – это
- А. А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1
- Б. А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 2, Д – 1
- В. А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 1, Д – 2

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Острый периодонтит
- Б. Обострившийся хронический периодонтит
- В. Нагноившаяся радикулярная киста
- Г. Общий гнойный пульпит
- Д. Альвеолит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Развивается вследствие попадания в трахею и бронхи рвотных масс, сгустков крови, содержимого полости рта
- Б. Возникает при разрыве мягких тканей неба или задней стенки глотки, когда во время вдоха лоскут перекрывает дыхательные пути
- В. Возникает вследствие закрытия верхних дыхательных путей инородным телом, рвотными массами, кровавым сгустком
- Г. Развивается вследствие западения языка при смещении отломков нижней челюсти, особенно подбородочного отдела
- Д. Развивается вследствие отека голосовых связок и тканей подвязочного пространства или сдавления задних отделов гортани гематомой

1. Дислокационная асфиксия
2. Обтурационная асфиксия
3. Стенотическая асфиксия
4. Клапанная асфиксия
5. Аспирационная асфиксия

- А. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3
- Б. А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 2, Д – 3
- В. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Описание

- А. Ткани зуба имеют разные цвета при различных условиях освещения
- Б. Способность материалов приобретать вид окружающих тканей, сливаться с ними
- В. Способность эмали при естественном освещении испускать бледное мерцание
- Г. Способность зубов поглощать волны ультрафиолетового диапазона и испускать видимый, синеватый свет
- Оптические характеристики зубных тканей и композитов

1. Опалесценция
2. Флуоресценция
3. Метамерия
4. Эффект хамелеона

- А. 1Г, 2В, 3А, 4Б
- Б. 1В, 2А, 3Б, 4Г
- В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Нарушение функции жевания
- Б. Костная крепитация
- В. Неправильный прикус
- Г. Локальная боль, усиливающаяся при пальпации
- Д. Гематома, отек окружающих тканей

К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТ

- А. Болезнь Боуэна и пигментную ксеродермию
- Б. Актинический кератоз, радиационный дерматоз, предраковый меланоз
- В. Бородавчатый (узелковый) предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, абразивный хейлит Манганотти
- Г. Эритроплакию, бородавчатый предрак, ограниченный гиперкератоз, абразивный хейлит Манганотти
- Д. Болезнь Боуэна, лейкоплакия, хроническая трещина губы

ЭКВИВАЛЕНТОМ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

- А. тяжесть за грудиной
- Б. дискомфорт
- В. стеснение в груди
- Г. длительная боль в области верхушки сердца
- Д. чувство нехватки воздуха

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Обширная деструкция костной ткани с зазубренными краями
 - Б. Имеет вид мелких полостей, разделенных костными перегородками
 - В. Очаг неравномерного интенсивного затемнения с неровными границами
 - Г. Ограниченное разряжение костной ткани с четкими границами
1. Описание ячеистой формы остеобластомы
 2. Описание солидной формы остеобластомы
 3. Описание литической формы остеобластомы
 4. Описание кистозной формы остеобластомы
- А. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4
 - Б. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2
 - В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4

ПРИКУС-ЭТО ВИД СМЫКАНИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ В ПОЛОЖЕНИИ ОККЛЮЗИИ:

- А. Центральной
- Б. Боковой левой
- В. Передней
- Г. Дистальной
- Д. Боковой правой

Наиболее высокой диффузионной способностью обладает:

- А. лидокаин
- Б. артикаин
- В. прокаин (новокаин)
- Г. мепивакаин
- Д. бупивакаин

КАКУЮ ФОРМУ ИМЕЕТ СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ВНЧС

- А. Шаровидную
- Б. Овальную
- В. Эллипсоидную
- Г. Цилиндрическую
- Д. Дисковидную

ДИАГНОЗ "ГЛУБОКИЙ КАРИЕС" СООТВЕТСТВУЕТ ДИАГНОЗУ ПО МКБ-10:

- А. Кариез эмали
- Б. Кариез дентина
- В. Кариез цемента
- Г. Гиперемия пульпы
- Д. Д)Рецидивирующий кариес

CEREC – ЭТО

- А. Система компьютерного изготовления вкладок и коронок
- Б. Система адгезионной фиксации безметалловых вкладок
- В. Система реставрации зубов стандартными керамическими вкладками
- Г. Воск для прямой моделировки вкладок
- Д. Система ультразвукового препарирования под стандартные керамическиекладки

ВОЗБУДИТЕЛЕМ РОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Эпидермальный стафилококк
- Б. Пемолитический стрептококк
- В. Бактероиды, клостридии
- Г. Кишечная и синегнойная палочки
- Д. Актиномицеты

ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМОСТЬ ПУЛЬПЫ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ

- А. Возрастает
- Б. Остается без изменений
- В. Снижается
- Г. Колеблется
- Д. Не определяется

Применение замковых креплений для фиксации съёмного протеза даёт возможность:

- А. уменьшить рвотный рефлекс;
- Б. улучшить дикцию;
- В. повысить эстетику;
- Г. улучшить фиксацию протеза;
- Д. уменьшить травму десны.

ПРИЗНАКИ ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ

- А. Усиление воспаления в окружности язвы
- Б. Уменьшение воспаления в окружности язвы
- В. Уплотнение краев и основания язвы
- Г. Усиление боли
- Д. Уменьшение боли

ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОТТИСК С:

- А. Нижней челюсти без протеза
- Б. Нижней челюсти с протезом
- В. Верхней челюсти и нижней челюсти без протеза
- Г. Нижней челюсти с протезом и верхней челюсти
- Д. Слепки снимать не нужно

ПРОСВЕТ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТ ПРИ

- А. аспирационной асфиксии
- Б. обтурационной
- В. клапанной
- Г. стенотической
- Д. странгуляционной

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВИНИРОВ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Низкий уровень гигиены полости рта
- Б. Депульпированные зубы
- В. Деминерализация после ортодонтического лечения
- Г. Диастема шириной 1 мм
- Д. Наличие старых, изменивших цвет, пломб

НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА У ВЗРОСЛЫХ ВЫПОЛНЯЮТ С ЧАСТОТОЙ

- А. 60 компрессий в 1 мин
- Б. 60 – 80 в 1 мин
- В. 80 в 1 мин
- Г. 80 - 100 в 1 мин
- Д. не менее 100 в 1 мин

СЛИВАЮЩИЕСЯ В РИСУНОК ПАПУЛЫ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- А. Лейкоплакия
- Б. Герпес
- В. Красная волчанка
- Г. Плоский лишай
- Д. Опоясывающий лишай

Высшая (максимально допустимая) разовая доза артикаина для детей:

- А. 2,2 мг/кг
- Б. 3,0 мг/кг
- В. 4,4 мг/кг
- Г. 5,0 мг/кг
- Д. 7 мг/кг

Для снятия психоэмоционального напряжения в условиях стоматологической поликлиники используют:

- А. снотворные
- Б. анксиолитики (транквилизаторы)
- В. наркотические анальгетики
- Г. ненаркотические анальгетики
- Д. антидепрессанты

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Показания:

А. Препарирование без выхода на аппроксимальную грань и кариесрезистентных пациентов

Б. Скрытые полости до контактного пункта сочетание полостей 2 и 1 класса

В. Полость в придесневой области до контактного пункта у зубов с высокой коронкой

Г. Распространение полости на контактный пункт, замена старой реставрации Методики препарирования и пломбирования полостей 2 класса:

1. Техника горизонтального туннеля

2. Техника сквозного вертикального туннеля

3. Техника несквозного вертикального туннеля

4. Препарирование и пломбирование стандартными керамическими вкладками

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1А, 2Б, 3В, 4Г

В. 1Г, 2Б, 3А, 4В

ПРИ СНЯТИИ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ У ПАЦИЕНТА С ЯЗВЕННО- НЕКРОТИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ ВЕНСАНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД:

А. Ручной;

Б. Ультразвуковой;

В. Пескоструйный;

Г. Сочетанный ручной и ультразвуковой

Д. Сочетанный ручной и пескоструйный

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОКАЗАНЫ ДЛЯ ЛИЦ

А. Кариесвосприимчивых

Б. Кариерезистентных

В. Молодого возраста

Г. В детском возрасте.

Д. Пожилого возраста

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Инфильтрации и абсцедирования

Б. Внесение инородного тела

В. Из гранулемы, тяжа причинного зуба

Г. Из гранулемы

Д. Хроническая

Е. Обострившееся хроническое

1. Неодонтогенная гранулема развивается в следствие

2. Одонтогенная гранулема состоит

3. Неодонтогенная гранулема состоит

4. Течение подкожной гранулемы

5. Стадии клинического течения одонтогенной подкожной гранулемы лица

А. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3

Б. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4

В. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4

МЕСТОМ ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ ПРИ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИЦЕВОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧКА В ОБЛАСТИ

А. Ветви нижней челюсти впереди козелка уха соответствующей стороны

Б. Основания нижней челюсти соответственно подбородочному отверстию

В. VII шейного позвонка

Г. Края нижней челюсти впереди жевательной мышцы

Д. Переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышц

КУРКОВЫЕ (ТРИГГЕРНЫЕ) ЗОНЫ ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЭТО УЧАСТКИ

А. Гиперстезии

Б. Гипостезии

В. Раздражение которых провоцирует приступ боли

Г. Парастезии

Д. Анестезии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Тавегил

Б. Метронидазол

В. Неспорообразующие анаэробы

Г. Гентамицин

Д. Стафилококки

1. Высокой активностью против неспорообразующих анаэробов обладают

2. Бета – лактомазу (пенициллиназу) выделяют

3. Ототоксическим действием обладает

4. Десенсибилизирующий препарат

А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3

В. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2

Пациенту с язвенно-некротическим стоматитом необходимо обработать слизистую оболочку полости рта антибактериальным препаратом. Какой местный анестетик следует использовать для поверхностного обезболивания слизистой оболочки

А. бупивакаин

Б. мепивакаин

В. артикаин

Г. прокаин (новокаин)

Д. лидокаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Для иммобилизации отломков нижней челюсти в области угла

Б. Для иммобилизации отломков при линейных переломах нижней челюсти в пределах от центральных резцов до премоляров

В. Шина, фиксирующаяся на зубах верхней челюсти, а боковые крылья – пилоты опущены вниз

Г. Пластмассовая шина, охватывающая зубы; плотно прилежащая к десневому краю и опирающаяся на альвеолярный отросток челюсти

Д. Шина состоящая из базисных пластинок на альвеолярные отростки верхней и нижней челюсти, которые скрепляются в единый блок, а в переднем отделе имеется отверстие для приема пищи

1. Гладкая шина – скоба используется:

2. Шина Вебера – это

3. Шина Порта – это

4. Шина Ванкевича - это

А. Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

Б. Б – 4, В – 1, Г – 2, Д – 3

В. Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

ТЯЖЁЛАЯ ОДЫШКА, УЧАСТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЫШЦ В АКТЕ ДЫХАНИЯ, ВЗДУТИЕ ШЕЙНЫХ ВЕН, ВЫБУХАНИЕ НАДКЛЮЧИЧНЫХ ЯМОК, ВЫРАЖЕННЫЙ ЦИАНОЗ ХАРАКТЕРИЗУЮТ

А. асфиксию обтурационную

Б. приступ бронхиальной астмы

В. асфиксию аспирационную

Г. большой эпилептический припадок

Д. приступ стенокардии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Удаление новообразования с капсулой

Б. Инвазивный рост

В. Резекция челюсти в пределах здоровой ткани

Г. Новообразование формируется в определенном возрасте и в дальнейшем в размерах не увеличивается

Д. Лучевая терапия

1. Характер роста для амелобластом

2. Характер роста одонтом

3. Принцип лечения амелобластом

4. Принцип лечения одонтом

А. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Б. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4

Укажите формулу зуба, для лечения которого достаточно проведение инфильтрационной анестезии с анестетиком на основе артикаина

А. зуб 31

Б. зуб 48

В. зуб 37

Г. зуб 46

Д. зуб 38

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ЭМАЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЕ КОНТАКТ С КОМПОЗИТОМ ПО ПРИНЦИПУ

А. Микросцепления

Б. Химического взаимодействия

В. Адгезии

Г. Макросцепления

Д. Макросцепления и химического взаимодействия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Понижение АД

Б. Повышение АД

В. Не влияет

Г. Барбитураты

Д. Миорелаксанты

Е. Атропин или метацин

1. Влияние эфира для наркоза на АД

2. Влияние фторотана на АД

3. Препараты, расслабляющие скелетную и дыхательную мускулатуру

4. Препараты, применяемые для подавления саливации при наркозе

5. Влияние кеталара на АД

А. А – 2, Б – 1,5, Д – 4, Е – 3

Б. А – 2, Б – 1,5, Д – 3, Е – 4

В. А – 1, Б – 2,5, Д – 3, Е – 4

Местноанестезирующий препарат с минимальной проникающей способностью через гистогематические барьеры:

А. мепивакин

Б. лидокаин

В. бупивакаин (маркаин)

Г. прокаин (новокаин)

Д. артикаин

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

А. Местная гипоплазия эмали

Б. Флюороз

В. Тетрациклиновые зубы

Г. Системная гипоплазия эмали

Д. Несовершенный амелогенез

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Инфекционная болезнь, которая характеризуется тяжелой интоксикацией, поражением кожи и лимфатического аппарата

Б. 8 – 10 дней

В. Инфекционное заболевание, протекающее в виде быстро прогрессирующей формы влажной гангрены лица, челюстей, тканей полости рта на фоне резкого снижения реактивности организма

Г. 15 – 18 дней

Д. Инфекционная болезнь, характеризующаяся очаговым серозным или серозно-геморрагическим воспалением кожи, лихорадкой и интоксикацией

Е. 12 – 14 дней

1. Цикл развития фурункулов

2. Цикл развития карбункулов

3. Рожь

4. Сибирская язва

5. Нома

А. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3, Д – 2

Б. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 5, Д – 3

В. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2, Д – 3

Создание чрезмерной конусности стенок при препарировании под металлокерамическую коронку приводит к:

А. неэстетичности коронки;

Б. снижению прочности коронки;

В. к травме десны;

Г. к ослаблению фиксации коронки;

Д. делает коронку более долговечной.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Низкий уровень иммунитета, выраженная сенсibilизация организма, слабовирулентная микрофлора

Б. Низкий уровень иммунитета, выраженная сенсibilизация организма и значительная вирулентность микрофлоры

В. Кариозные зубы, пародонтит, зубные отложения, тонзиллиты

Г. Достаточная напряженность иммунитета, низкий уровень сенсibilизации организма, высокая вирулентность микрофлоры

Д. Тонзиллиты

1. Наиболее частая причина сенсibilизации организма к хронической инфекции

2. Нормергическая форма воспаления наблюдается при

3. Гиперергическая форма воспаления развивается при

4. Гипоергическая форма воспалительной реакции возникает при

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. У взрослых

Б. Боль в челюсти подвижных зубов

В. У детей и лиц молодого возраста

Г. Деформация челюсти

1. Первые симптомы при центральной остеосаркоме челюстей

2. Первые симптомы при периферической остеосаркоме челюстей

3. Остеобластическая форма саркомы челюсти чаще встречается

4. Остеолитическая форма саркомы челюсти чаще всего встречается

А. А – 1, Б – 4, В – 3, Г – 2

Б. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1

В. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Не ранее, чем через 12 часов после травмы, гематома не выходит за пределы круговой мышцы глаза
- Б. Звук треснувшего горшка, возникающий при постукивании по зубам поврежденной стороны
- В. Ликворея, возникающая при переломе пирамиды височной кости
- Г. Ликворея через дефект твердой мозговой оболочки в области пластинки решетчатой кости или в месте перелома клиновидной кости
- Д. Боль по ходу щели перелома при надавливании указательным пальцем на крючки клювовидных отростков клиновидной кости
- Е. Гематомы появляются сразу после травмы и имеют распространенный характер
1. При изолированных переломах верхней челюсти «симптом очков» появляется:
2. При изолированных переломах костей основания черепа «симптом очков» появляется:
3. Положительный симптом Малевича
4. Положительный симптом Герена
5. Назальная ликворея
6. Ушная ликворея
- А. А – 2, Б – 3, В – 6, Г – 5, Д – 4, Е – 1
- Б. А – 2, Б – 6, В – 5, Г – 3, Д – 4, Е – 1
- В. А – 2, Б – 3, В – 6, Г – 4, Д – 5, Е – 1

ЭНДОДОНТ ВКЛЮЧАЕТ

- А. Пульпу и дентин
- Б. Пульпу зуба
- В. Пульпу зуба, периодонтальную связку,
- Г. Пульпу зуба, периодонтальную связку, альвеолу
- Д. Пульпу зуба, периодонтальную связку, альвеолу, десну

При изготовлении металлокерамической коронки чрезмерное укорочение культи зуба может привести к:

- А. нарушению эстетики;
- Б. функциональным нарушениям;
- В. сколу керамики;
- Г. расцементировки коронки;
- Д. травме десны.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Синдром Хеерфорда

Б. Болезнь Микулича

В. Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение

Г. Синдром Шегрена

1. Заболевание, для которого характерна триада: ксеростомия, ксерофтальмия, ревматоидный полиартрит

2. Заболевание слюнных желез, сходное по клинической картине с опухолью

3. Заболевание, при котором у больного увеличиваются все слюнные и слезные железы

4. Заболевание, сопровождающееся триадой: припухлость околоушной слюнной железы, иридоциклит, парез лицевого нерва

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1

ПАЦИЕНТУ В СОСТОЯНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА ВВОДЯТ

А. подкожно

Б. подъязычно

В. внутривенно

Г. внутримышечно

Д. внутрисердечно

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. С неба на ножке

Б. Удаление причинного зуба, назначение местных сосудосуживающих средств, ФТЛ

В. С вестибулярной поверхности вестибулярного отростка

Г. Удаление причинного зуба, пункции промывания пазухи, симптоматическое лечение

Д. Удаление причинного зуба, гайморотомия

1. Лечение острого одонтогенного серозного гайморита

2. Лечение острого одонтогенного гнойного гайморита

3. Лечение хронического одонтогенного гайморита

4. Чаще всего ороантральное сообщение закрывается путем слизисто-надкостничного лоскута взятого

А. Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3

Б. Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

В. Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

Показанием к постановке искусственных зубов на «приточке» в съёмном пластиночном протезе на верхней челюсти является:

- А. чрезмерная выраженность альвеолярной части нижней челюсти;
- Б. чрезмерная выраженность альвеолярного отростка верхней челюсти в области боковых зубов;
- В. «короткая» нижняя губа;
- Г. «короткая» верхняя губа;
- Д. выраженная уздечка нижней губы.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. 2 недели
- Б. 1 неделя
- В. 19 – 23 сутки
- Г. 3 недели
- Д. 16 – 18 день

- 1. Сроки эпителизации лунок однокорневых зубов в норме
- 2. Сроки эпителизации лунок многокорневых зубов в норме
- 3. Задержка эпителизации лунок однокорневых зубов при воспалении
- 4. Задержка эпителизации лунок многокорневых зубов при воспалении
- 5. Сроки полного заполнения лунки грануляционной тканью в норме

- А. А – 4,5, Б – 1, В – 2, Д – 3
- Б. А – 4,5, Б – 3, В – 1, Д – 2
- В. А – 4,5, Б – 3, В – 2, Д – 1

ЭТОТ ПРЕПАРАТ СНИЖАЕТ ТОНУС СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ

- А. эуфиллин
- Б. диазепам
- В. кофеин
- Г. но-шпа
- Д. папаверин

ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ КАРИЕСВОСПРИИМЧИВОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- А. До иммунных зон
- Б. Профилактически иссекая окружающую деминерализованную эмаль
- В. Миниинвазивным методом
- Г. Депульпируют зуб
- Д. С позиций щадящего препарирования

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Осложнения:

А.Отсутствие сухого блеска

Б.Дебондинг

В.Ожог пульпы

Г.Интоксикация пульпы Ошибки при изготовлении прямых виниров:

1.при препарировании

2.при протравливании и нанесении адгезива

3.при работе с композитом

4.при шлифовании и полировании

А. 1Г, 2В, 3Б, 4А

Б. 1В, 2Г, 3Б, 4А

В. 1В, 2А, 3Б, 4Г

ПУЛЬС У ПАЦИЕНТА БЕЗ СОЗНАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ НАД ПРОЕКЦИЕЙ

А. лучевой артерии

Б. плечевой

В. наружной сонной

Г. локтевой

Д. общей сонной

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОСТИ ПО V КЛАССУ СКОС ПРЕПАРИРУЮТ

А. По эмали

Б. По цементу корня

В. По эмали и цементу корня

Г. Не формируют

Д. На усмотрение врача

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Размер частиц Наполнителя:

А. 0,04-0,4 мкм

Б. 0,04-5 мкм

В. 8-45 мкм

Г. 1-5 мкм Класс композитного материала:

1. Макронаполненные

2. Микронаполненные

3. Мининаполненные

4. Гибридные

А. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Б. 1В, 2А, 3Г, 4Б

В. 1А, 2В, 3Г, 4Б

Укажите высшую (максимально допустимую) разовую дозу артикаина для взрослых:

А. 2,5 мг/кг

Б. 3,5 мг/кг

В. 4,5 мг/кг

Г. 5 мг/кг

Д. 7 мг/кг

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Рентгенологическая картина:

А. Выраженные периапикальные деструктивные изменения костной ткани

Б. Участок разряжения костной ткани с четкими контурами более 5 мм

В. Изменений не выявляется Заболевание:

1. Острый апикальный периодонтит

2. Хронический апикальный периодонтит

3. Радикулярная киста

4. Хронический пульпит

А. 1В, 2А, 3Б, 4В

Б. 1Б, 2А, 3В, 4В

В. 1В, 2А, 3Б, 4А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Базально – клеточный рак
 - Б. Внутриэпителиальный рак слизистой оболочки
 - В. Внутриэпидермальный кожный рак
 - Г. Разновидность старческой кератомы
 - Д. Злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментобразующих клеток
1. Кожный рог – это:
 2. Болезнь Боуэна – это:
 3. Эритроплазия Кейра – это:
 4. Меланома – это:
 5. Базалиома – это
- А. А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 4
 - Б. А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 1, Д – 4
 - В. А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 4, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Очаг интенсивного затемнения с четкими и ровными границами, окруженной полоской просветления шириной около 1 мм
 - Б. Неоднородный очаг округлой формы с чередованием участков разрежение и уплотнение
 - В. Гомогенный очаг затемнения округлой формы с четкими границами
 - Г. Гомогенный очаг затемнения нечеткими и неровными границами
 - Д. Очаг деструкции кости с нечеткими границами, окруженный ободком склерозированной ткани
1. Рентгенологическая картина губчатой остеомы челюсти
 2. Рентгенологическая картина компактной остеомы челюсти
 3. Рентгенологическая картина оссифицирующего периостита
 4. Рентгенологическая картина одонтомы
 5. Рентгенологическая картина остеоида - остеомы
- А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5
 - Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 5
 - В. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5

Пациенту, страдающему бронхиальной астмой и имеющему повышенную чувствительность к сульфитам, для проведения местного обезболивания перед лечением зуба следует выбрать

- А. 2% раствор мепивакаин+ эпинефрин (адреналин) 1: 100 000
- Б. 3% раствор мепивакаина
- В. 4% раствор артикаина + эпинефрин (адреналин) 1: 200 000
- Г. 4% раствор артикаина + эпинефрин (адреналин) 1: 100 000
- Д. 2% раствор лидокаина + эпинефрин (адреналин) 1: 100 000

ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ

- А. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, дренирование раны, удаление причинного зуба
- Б. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, назначение антибиотиков, ротовых ванн, УВЧ
- В. Удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн
- Г. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, дренирование раны, удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн
- Д. Медикаментозная терапия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Анаэробы
 - Б. Пустулезная, бугорковая, смешанная
 - В. Создает условия для развития актиномицетов
 - Г. Абсцедирующая, гуммозная, смешанная
 - Д. Образование инфильтратов, которые могут нагнаиваться
 - Е. Препятствует развитию актиномицетов
 - Ж. Наличие гуммозных образований клетчатки
1. Кожная форма актиномикоза
 2. Подкожная форма актиномикоза
 3. Для подкожно – мышечной формы актиномикоза характерно
 4. Актиномицеты, обладающие большей патогенностью
 5. Роль пиогенной (банальной микрофлоры) при актиномикозе
- А. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3, Д – 2
 - Б. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2, Д – 3
 - В. А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 2, Д – 3

Подвижность зубов по Энтину I степени характеризуется подвижностью:

- А. в пределах физиологической нормы;
- Б. в лунке во всех направлениях вокруг своей оси;
- В. в вестибулооральном и медиодистальном направлениях;
- Г. в вертикальном направлении;
- Д. в вестибулооральном направлении.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Методы реставрации:

А. Пломба

Б. Прямой винир

В. Непрямой винир

Г. Искусственная коронка Показания:

1. Изменения цвета зуба после эндодонтического лечения

2. Незначительный по площади клиновидный дефект

3. Диастема

4. Флюороз

А. 1БВ, 2А, 3БВГ, 4БВ

Б. 1БВ, 2А, 3БВ, 4БВ

В. 1БВ, 2БА, 3БВГ, 4БВ

НАЛИЧИЕ У РЕБЕНКА УСТОЙЧИВОЙ ПРИВЫЧКИ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ПОСТОЯННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ЯЗЫКА МЕЖДУ ЗУБАМИ, ФОРМИРУЕТ

А. Мезиальную окклюзию

Б. Глубокую резцовую окклюзию

В. Дистальную окклюзию

Г. Вертикальную резцовую дизокклюзию

Д. Вестибулоокклюзию

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Не ранее, чем через 2 недели
- Б. Гайморотомия с пластикой соустья
- В. Можно, при наличии кровотечения
- Г. Можно во всех случаях
- Д. Нельзя
- Е. Промывание пазухи растворами антисептиков, пластика соустья после ликвидации воспаления

1. Хирургическая тактика врача при перфорации верхнечелюстной пазухи во время удаления зуба на фоне острого гайморита (без наличия корня зуба в пазухе)
2. Метод удаления корня зуба, внедренного в верхнечелюстную пазуху
3. Можно ли тампонировать лунку йодоформным тампоном при перфорации дна верхнечелюстной пазухи
4. Наиболее благоприятные сроки для удаления корня зуба, внедренного в мягкие ткани во время удаления

- А. А – 4, Б – 2, Д – 3, Е – 1
- Б. А – 4, Б – 2, Д – 1, Е – 3
- В. А – 4, Б – 3, Д – 2, Е – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Монокультура анаэробов
- Б. Гиперкапния, аэрация тканей
- В. Аэробы, факультативные и облигатные анаэробы
- Г. Бактероиды, фузобактерии
- Д. Монокультура стафилококка
- Е. Кишечная палочка, протей

1. Бактерии, вызывающие гнойно – воспалительные процессы в челюстно - лицевой области
2. К облигатным неспорообразующим бактериям относятся
3. Условия не способствующие развитию бактериальной инфекции
4. При нагноении лимфоузлов из гнойных очагов высеваются
5. Микроорганизмы, которые чаще всего высеваются при одонтогенных абсцессах

- А. А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 2, Д – 4
- Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 2, Д – 4
- В. А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Комбинированный

Б. Открытый

В. Ожоговый шок

Г. Ожоговая септикотоксемия

Д. Ожоговая токсемия

1. Первый период ожоговой болезни

2. Второй период ожоговой болезни

3. Третий период ожоговой болезни

4. Наиболее частый метод лечения ожогов лица

А. Б – 4, В – 1, Г – 2, Д – 3

Б. Б – 4, В – 3, Г – 1, Д – 2

В. Б – 4, В – 1, Г – 3, Д – 2

Компонент местнообезболивающего препарата, наиболее часто провоцирующий развитие аллергических реакций

А. местный анестетик

Б. вазоконстриктор

В. бисульфит натрия

Г. ЭДТА

Д. натрия хлорид

ВЫДЕЛИТЕ СИМПТОМ, НЕ УКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ В КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ КОЛЛАПСА

А. артериальная гипотония

Б. бледные, холодные и влажные кожные покровы

В. гипотонус

Г. расширенный зрачок

Д. двигательное беспокойство

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А. Деформация десневых сосочков

Б. Некроз десневых сосочков

В. Кровоточивость при зондировании десневых сосочков

Г. Резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок

Д. Наличие пародонтального кармана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Имеются дочерние кисты, которые необходимо удалить
 - Б. Причинный зуб подлежит обязательному удалению
 - В. Причинный зуб удаляют или резецируют верхушку корня
 - Г. Проводится оро – антральная цистэктомия
 - 1. Особенность хирургического лечения (цистэктомия) радикулярных кист челюстей
 - 2. Особенность хирургического лечения (цистэктомия) фолликулярных кист челюстей
 - 3. Особенность хирургического лечения (цистэктомия) парадентальных кист
 - 4. Особенность оперативного лечения эпидермоидных кист
- А. А – 1, Б – 2, 3, В – 4
Б. А – 4, Б – 1, 3, В – 2
В. А – 4, Б – 2, 3, В – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Множество правильно сформированных спаянных между собой деформированных зубов
 - Б. Беспорядочно перемешанные ткани нескольких зубов
 - В. Ткани одного зуба
 - Г. Несколько зачатков зубов
 - 1. Структура простой одонтомы
 - 2. Структура сложной одонтомы
 - 3. Структура смешанной одонтомы
 - 4. Структура составной одонтомы
- А. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2
Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3
В. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Коринфар, капотен

Б. Аминокапроновая кислота или памба

В. Ятрогенное

Г. Идиопатическое

Д. Рутин или аскорутин

Е. фитоменадион или дицинон

1. При гипопротромбинемии для остановки кровотечения назначают:

2. Кровотечение, возникшее после хирургического вмешательства

3. При повышении фибринолитической активности для остановки кровотечения назначают:

4. Для остановки кровотечения при повышенной проницаемости сосудов назначают:

5. Для остановки кровотечения при повышенном АД назначают:

А. А – 5, Б – 3, В – 2, Д – 4, Е – 1

Б. А – 5, Б – 3, В – 2, Д – 1, Е – 4

В. А – 5, Б – 2, В – 3, Д – 4, Е – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Заболевание:

А. Острый пульпит

Б. Пульпит хронический

В. Пульпит неуточненный

Г. Пульпит хронический язвенный Код по МКБ-10:

1. K04.09

2. K04.01

3. K04.03

4. K04.04

А. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Б. 1Г, 2В, 3А, 4Б

В. 1Г, 2А, 3В, 4Б

Укажите процентную концентрацию раствора лидокаина в аэрозоли, применяемого в стоматологической практике для аппликационной анестезии

А. 0.50%

Б. 2%

В. 3%

Г. 4%

Д. 10

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на нижней челюсти в области зубов проходит:

- А. не касается зубов;
- Б. перекрывая коронки зубов на 2/3
- В. в пришеечной области зубов;
- Г. перекрывая коронки зубов на 1/3;
- Д. посередине коронки зубов;

ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ У РЕБЕНКА ПОЛУТОРА ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Провести шинирование и оставить под наблюдение
- В. Репозировать
- Г. Депульпировать и репозировать
- Д. Удалить

При изготовлении металлокерамической коронки минимально допускаемая толщина металлического каркаса из неблагоприятных сплавов:

- А. 0,1 мм;
- Б. 0,2 мм;
- В. 0,25 мм;
- Г. 0,3 мм;
- Д. 0,5 мм.

БОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЕ АМБУЛАТОРНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БЕРЕМЕННЫХ

- А. в 1 триместре
- Б. в 1 и 2 триместрах
- В. во 2 триместре
- Г. во 2 и 3 триместрах
- Д. в 3 триместре

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Острое начало заболевания, боль при глотании, высокая температура тела воспалительная контрактура нижней челюсти, припухлость и болезненность поднижнечелюстных и подподбородочной областей

Б. Острое начало, резкие боли, рот полуоткрыт, высокая температура, увеличение размеров и ограничение подвижности языка, затрудненное глотание и дыхание

В. Наличие разрушенного моляра нижней челюсти, гиперемия кожи, отечность, болезненность и припухлость мягких тканей поднижнечелюстной области

Г. Разлитая отечность мягких тканей щеки, сглаженность носогубной складки, болезненность открывания рта

Д. Тромбофлебит угловой вены, острый гнойный гайморит или обострение хронического гайморита

Е. Ограничение открывание рта, отечность и болезненность за бугром верхней челюсти, распирающая головная боль

1. Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны

2. Клинические признаки флегмоны дна полости рта

3. Клинические признаки флегмоны корня языка

4. Типичные причины флегмоны глазницы

5. Клинические признаки флегмоны щеки

6. Клинические признаки флегмоны крылонебной ямки

А. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6

Б. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 6, Е – 4

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 6

Укажите формулу зуба, для лечения пульпита которого необходимо провести проводниковую анестезию с анестетиком на основе артикаина

А. зуб 47

Б. зуб 24

В. зуб 35

Г. зуб 41

Д. зуб 32

Укажите местный анестетик группы сложных эфиров:

А. лидокаин

Б. прокаин (новокаин)

В. артикаин

Г. бупивакаин (маркаин)

Д. мепивакаин (скандонест)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

Б. Стадия истощения секретообразования и дистрофических изменений

В. Стадия липоматоза и фиброза

Г. Рентгенография мягких тканей дна полости рта

Д. Стадия гиперсекреции

1. Рентгенографическая проекция для выявления камня в переднем отделе выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы

2. Рентгенографическая проекция для выявления камня в паренхиме поднижнечелюстной слюнной железы

3. Начальная стадия сиалоза

4. Клинически выраженная стадия сиалоза

5. Поздняя стадия сиалоза

А. А – 4, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 3

Б. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3, Д – 1

В. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Решетчатой кости с разрывом слизистой оболочки

Б. Лобных отростков верхней челюсти и костей носа

В. Вниз

Г. Вниз и кнутри

1. Отломки при переломе скуловой дуги обычно смещаются:

2. В каком направлении возможна диплопия при значительном смещении отломков скуловой кости

3. Смещение костей носа у его основания указывает на перелом:

4. Подкожная крепитация при повреждении кости носа свидетельствует о переломе:

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. 5 % раствором сульфата меди

Б. 1 – 2 % раствором лимонной или уксусной кислоты

В. 2 – 3 % раствором гидрокарбоната натрия

Г. 20 % раствором сахара (глюкозы)

Д. 4 – 5 % раствором гидрокарбоната натрия

1. Химическую нейтрализацию кислот проводят:

2. Химическую нейтрализацию щелочей проводят:

3. Химическую нейтрализацию негашеной извести проводят:

4. Химическую нейтрализацию солей тяжелых металлов проводят

5. Химическую нейтрализацию фосфора проводят:

А. А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 3, Д – 4

Б. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 4, Д – 3

В. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Из эпителиального и мезенхимального компонентов

Б. Одонтогенная опухоль

В. Из эпителиальных тканей

Г. Порог развития зубных тканей

1. Амелобластома – это:

2. Одонтома – это:

3. Амелобластома развивается

4. Одонтома развивается

А. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Б. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1

В. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Не существует

Б. Хронический периодонтит

В. 1 – 3 и 8 – 9 месяцы

Г. 6 месяцев

Д. Период обострения

Е. 2 – 3 и 6 – 7 месяцы

1. Показание к плановому удалению зуба

2. Абсолютное противопоказание для удаления зуба

3. Сроки планового удаления зубов после инфаркта миокарда

4. Временное противопоказание к удалению зубов у беременных в следующие сроки

5. Временное противопоказание к удалению зубов при психических заболеваниях

А. А – 2, Б – 1, В – –, Г – 3, Д – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – –, Г – 5, Д – 3

В. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 2

ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А. Наследственность;

Б. Наличие микробного налета;

В. Вредные привычки;

Г. Подвижность зубов;

Д. Травма

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Шов, накладываемый на 15 – 30 сутки после операции с предварительным иссечением грануляции, рубцов и мобилизацией краев раны

Б. Шов, накладываемый на гнойную рану во время хирургической обработки, но затягиваемый через 24 – 72 часа при стихании воспаления; или шов, накладываемый на 2 – 7 сутки после операции

В. Шов, накладываемый на рану непосредственно после вскрытия гнойного очага

Г. Шов, накладываемый на 8 – 14 сутки после операции без предварительного иссечения грануляции

1. Первичный шов

2. Первичный отсроченный шов

3. Вторичный ранний шов

4. Вторичный поздний шов

А. А – 2, Б – 4, В – 1, Г – 3

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3

В. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1

Укажите местный анестетик, используемый в стоматологии около 100 лет

А. бупивакаин

Б. мепивакаин

В. артикаин

Г. прокаин (новокаин)

Д. лидокаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Малые протоки подъязычной слюнной железы

Б. Проток околоушной слюнной железы

В. Проток поднижнечелюстной слюнной железы

Г. Общий проток подъязычной слюнной железы

1. Стенопов проток

2. Вартонов проток

3. Барталинов проток

4. Ривиниевы протоки

А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3

Б. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

В. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТИФТА ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ КОРНЯ СОСТАВЛЯЕТ

- А. 1/3
- Б. 1/2
- В. 2/3
- Г. Всю длину корня
- Д. Длина штифта не имеет значения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВООБЩЕ.

- А. Болевой дисфункции
- Б. Остром артрите
- В. Артрозе
- Г. Хроническом артрите

- 1. Костные структуры ВНЧС при рентгенологическом исследовании не изменены при:
- 2. Склероз кортикальной пластинки суставной головки и бугорка наблюдается при:
- 3. Наличие экзофитов на суставных поверхностях встречается при:
- 4. Деформация суставной головки нижней челюсти наблюдается при:
- 5. Уплотнение суставного бугорка происходит при:

- А. А – 1, Б – 1, В – 2, 3, 4, 5
- Б. А – 1, Б – 2, В – 3, 4, 5
- В. А – 1, Б – 1,5, В – 2, 3, 4

Местноанестезирующий препарат, не оказывающий значительного влияния на сосуды:

- А. лидокаин
- Б. артикаин
- В. прокаин (новокаин)
- Г. мепивакаин
- Д. бупивакаин

Укажите группу зубов, для депульпирования которых инфильтрационной анестезии обычно недостаточно

- А. резцы и клыки верхней челюсти
- Б. резцы и клыки нижней челюсти
- В. премоляры верхней и нижней челюсти
- Г. моляры верхней челюстей
- Д. моляры нижней челюсти.

Артикаин можно использовать у детей с

- А. 6 месяцев
- Б. 1 года
- В. 2 лет
- Г. 4 лет
- Д. 5 лет

Препарат, используемый для всех видов местной анестезии:

- А. мепивакаин
- Б. лидокаин
- В. бензокаин (анестезин)
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. артикаин

УКАЗАТЬ ОШИБКИ ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

- А. Нависающий край пломбы
- Б. Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба
- В. Химический ожог пульпы зуба
- Г. Хроническое воспаление десневого края
- Д. Отсутствие контактного пункта

ИНИЦИАТОРОМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА СВЕТООВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Камфорохинон
- Б. Пероксид бензоила
- В. Ароматические амины
- Г. Пероксид бензоила и ароматические амины
- Д. Камфорохинон и ароматические амины

УКАЗАТЬ ОШИБКИ ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

- А. Отлом истонченной стенки коронковой части зуба
- Б. Неполное удаление инфицированного дентина, химический ожог пульпы зуба
- В. Нависающий край пломбы, отсутствие контактного пункта
- Г. Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба
- Д. Десневое кровотечение

В МИКРОНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТАХ РАЗМЕР ЧАСТИЦ НАПОЛНИТЕЛЯ (МКМ):

- А. 1 - 100
- Б. 50
- В. более 1
- Г. 1
- Д. менее 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Рассечение зуба на две части в области бифуркации с последующим сглаживанием нависающих краев, проведение кюретажа, покрытие коронкой

Б. Удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба

В. Удаление корня вместе с прилежащей коронковой частью

Г. Пересадка удаленного зуба в другую альвеолу

Д. Пересадка удаленного зуба в его же альвеолу

1. Аутотрансплантация зуба

2. Гемисекция зуба

3. Ампутация корня

4. Коронаро – радикулярная сепарация

5. Реплантация зуба

А. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1, Д – 5

Б. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 5

В. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Расширение и сужение протока

Б. Сужение протоков на всем протяжении

В. «Гроздь винограда»

Г. «Чернильное пятно»

Д. Без изменений

1. Сиалографический признак разрастания в паренхиме слюнной железы соединительной ткани

2. Сиалографический признак наличия поражения протока слюнной железы

3. Сиалографический признак лимфогенного паротита характеризуется скоплением контраста в виде:

4. Сиалографический признак паренхиматозного паротита характеризуется скоплением контраста в виде:

5. Сиалограмма ложного паротита Герценберга

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 3

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 5

Высшая (максимально допустимая) разовая доза лидокаина:

- А. 2,2 мг/кг
- Б. 4,4 мг/кг
- В. 5,0 мг/кг
- Г. 6 мг/кг
- Д. 7 мг/кг

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Жалобы:

- А. Незначительные болевые ощущения при накусывании на зуб
 - Б. Постоянные, постепенно нарастающие боли, «симптом выросшего зуба», болезненное накусывание на зуб
 - В. Постоянные ноющие, пульсирующие боли, болезненность при накусывании
 - Г. Часто протекает бессимптомно
- Заболевание:**

- 1. Острый апикальный периодонтит
- 2. Хронический апикальный периодонтит
- 3. Корневая киста
- 4. Периапикальный абсцесс без свища

- А. 1Б, 2А, 3В, 4Г
- Б. 1Б, 2А, 3Г, 4В
- В. 1Б, 2В, 3Г, 4А

К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА ОТНОСЯТ

- А. Болезнь Боуэна
- Б. Болезнь Боуэна и пигментную ксеродермию;
- В. Болезнь Боуэна, актинический кератоз, предраковый меланоз
- Г. Болезнь Боуэна, бородавчатый (узелковый) предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз;
- Д. Болезнь Боуэна, абразивный хейлит Манганотти.

ПРИ КЛИНИКЕ ОСТРОГО ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- А. Диабет
- Б. Заболевания крови
- В. Гастрит
- Г. Язвенную болезнь желудка
- Д. Острый панкреатит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Мази с НПВС

Б. Противовоспалительные болеутоляющие антигистаминные

В. Иммуномодуляторы

Г. До снятия острых воспалительных явлений

Д. После снятия острых воспалительных явлений

Е. Бишофит, медицинская желчь

1. Ортопедическое лечение при артритах проводится:

2. Препараты, применяемые для лечения острой фазы артрита ВНЧС

3. Препараты для местного лечения артритов в хронической фазе

4. Препараты для местного лечения артритов в острой фазе

А. А – 4, Б – 1, Д – 2, Е – 3

Б. А – 4, Б – 2, Д – 1, Е – 3

В. А – 4, Б – 2, Д – 3, Е – 1

Дифференциальную диагностику бессимптомного течения кариеса дентина проводят с

А. Кариесом эмали

Б. Хроническим пульпитом

В. Деструктивной формой флюороза

Г. Хроническим периодонтитом

Период «физиологического покоя» для корней временных зубов длится _____ года

А. 2,5-3

Б. 3,5-4

В. 1-1,5

Г. 1,5-2

Ребенку 6 лет рекомендуется использовать зубную пасту с концентрацией фторидов (в ppm)

А. 500

Б. 2500-5000

В. 1000

Г. 100-200

Основным учетным документом является

А. История болезни

Б. Листок нетрудоспособности

В. Контрольная карта диспансерного наблюдения

Г. Амбулаторная карта

К анестетикам длительного действия (6-12 часов) следует отнести

- А. Прокаин
- Б. Анестезин
- В. Бупивакаин
- Г. Мепивакаин

Метод хирургического лечения пародонтита при глубине пародонтального кармана до 5 мм включает в себя

- А. Гингивэктомию
- Б. Лоскутную операцию
- В. Гингивотомию
- Г. Открытый кюретаж

Пластмассовая рамка системы коффердама по сравнению с металлической дает преимущество

- А. Снижает вероятность возникновения аллергии
- Б. Более плотно прилегает к коже лица
- В. Не видна на снимке при проведении рентгенологического обследования
- Г. Более долговечна

Нистатин для лечения кандидоза у детей назначают из расчета в суточной дозе _____ на 1 кг массы тела (в ед.)

- А. 100000
- Б. 250000
- В. 150000
- Г. 50000

Гингивит - это заболевание

- А. Инфекционное
- Б. Дистрофическое
- В. Опухолевидное
- Г. Воспалительное

Детям старше 3 лет для профилактики кариеса рекомендуют зубные пасты

- А. Лечебно-профилактические с растительными добавками
- Б. Лечебно-профилактические с фторидом
- В. Лечебно-профилактические с антисептиками
- Г. Гигиенические

Воспаление маргинальной десны по индексу рма оценивают кодом

- А. 1
- Б. 3
- В. 2
- Г. 4

К пассивным формам стоматологического просвещения относят

- А. Беседы с пациентом на стоматологическом приеме
- Б. Лекции по профилактике стоматологических заболеваний с последующей дискуссией
- В. Занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
- Г. Телевизионную рекламу

При методе профилактического пломбирования в постоянных зубах со зрелой эмалью применяются

- А. Силикофосфатный цемент и амальгама
- Б. Стеклоиономерный цемент и силикофосфатный цемент
- В. Композиционные герметики и жидкотекучие композиты
- Г. Компомеры и фосфатный цемент

Элементом поражения при хейлите манганотти является

- А. Рубец
- Б. Трещина
- В. Чешуйка
- Г. Эрозия

Для клинического отбеливания используют перекись карбамида в концентрациях

- А. 5-7
- Б. 25-30
- В. 35-40
- Г. 10-12

При внешнем осмотре больных с декомпенсированной формой 3 степени повышенного стирания зубов выявляется

- А. «Птичье лицо»
- Б. Ассиметрия лица
- В. Старческое выражение лица
- Г. Сглаженность носогубных складок

Подвижность зубов оценивают при помощи

- А. Рентгенодиагностики
- Б. Перитестметрии
- В. Реопародонтографии
- Г. Гнатодинамометрии

При препарировании под керамическую вкладку создание скосов эмали и тонких участков

- А. Показано только в области моляров
- Б. Зависит от клинической ситуации
- В. Противопоказано
- Г. Показано только в пределах эмали

Борта и дно стандартной оттисковой ложки должны стоять от зубов на (в мм)

- А. 3-5
- Б. 1-2
- В. 5-7
- Г. 6-9

Под кистой челюсти понимают

- А. Опухолеподобное образование
- Б. Стадию развития инфильтрата
- В. Соединительнотканную опухоль
- Г. Опухоль из зубообразующего эпителия

Нежелательным действием новокаина является

- А. Эйфория
- Б. Повышение артериального давления
- В. Понижение артериального давления
- Г. Пристрастие

К показателям объема работы поликлиники относится число

- А. Врачей на 10000 жителей
- Б. Посещений жителей на одного врача
- В. Врачебных посещений на 1 жителя
- Г. Посещений жителей за год

Заболевание слюнных желез, сопровождающееся явлениями блефароконъюнктивита и снижением секреции слезных желез (ксерофтальмия), относят к

- А. Хроническому паренхиматозному паротиту
- Б. Хроническому сиалодохиту
- В. Синдрому Шегрена
- Г. Слюннокаменной болезни

Превращение преамелобластов в амелобласты инициируется

- А. Образованием дентина
- Б. Образованием эмали
- В. Образованием связки периодонта
- Г. Вростанием зубного сосочка в эпителиальный тяж

К участникам обязательного медицинского страхования относят

- А. Врачей
- Б. Главных врачей
- В. Средний медицинский персонал
- Г. Страховые медицинские организации

Профилактике клиновидного дефекта способствует

- А. Применение фторидсодержащих зубных паст
- Б. Обучение техники чистки зубов
- В. Полоскание рта антисептическими растворами
- Г. Замена источника водоснабжения

К противопоказаниям к проведению интралигаментарной анестезии относят

- А. Детский возраст
- Б. Непереносимость лидокаина
- В. Наличие в анамнезе эндокардита
- Г. Наличие страха перед вмешательством

Основным направлением первичной профилактики стоматологических заболеваний является комплекс мер, направленных на

- А. Предупреждение осложнений возникшего заболевания
- Б. Предупреждение их возникновения
- В. Профилактику зубочелюстных аномалий
- Г. Восстановление анатомической и функциональной целостности зубочелюстной системы

При хирургическом лечении рецессии десны i и ii классов (р. D. Miller) _____ закрытие поверхности корня _____

- А. Возможно; на 50%
- Б. Невозможно
- В. Невозможно; на 100%
- Г. Возможно; на 100%

Рабочая поверхность столов для стерильного инструментария протирается специальной ветошью, смоченной раствором хлорамина (в процентах)

- А. 1
- Б. 5
- В. 0,5
- Г. 1,5

Воздушно-абразивный метод удаления зубных отложений противопоказан пациентам с

- А. Бронхиальной астмой
- Б. Артериальной гипертензией
- В. Кардиостимулятором
- Г. Сахарным диабетом

С целью контроля пломбирования корневого канала рентгенологическое исследование проводится с

- А. Произвольно зафиксированным гуттаперчевым штифтом
- Б. Внесённым в корневой канал силером
- В. Зафиксированными на рабочую длину мастер-штифтом с силером
- Г. Зафиксированными на рабочую длину мастер-штифтом без силеров

Требованием к лечебным подкладочным материалам является

- А. Длительное время твердения
- Б. Короткое время замешивания
- В. Обладание одонтотропным действием
- Г. Обладание анестезирующим действием

Конструкция кламмера джексона представляет собой

- А. Кламмер, имеющий две окклюзионные накладки, расположенные в смежных фиссурах моляров или премоляров и по два плеча с каждой стороны на каждом зубе
- Б. Кламмер, имеющий пружинящие Т-образные отростки, отходящие от каркаса протеза и располагающиеся с обеих сторон опорного зуба
- В. Опорно-удерживающий кламмер в виде петли, перекидываемой через межзубные промежутки на вестибулярную поверхность зуба, где она располагается ниже экватора
- Г. Отростки базиса протеза, прилегающие к зубам ниже экватора с вестибулярной стороны

При проведении электроодонтодиагностики больного зуба целесообразно начать измерение с

- А. Антагониста
- Б. Такого же зуба на противоположной стороне зубной дуги
- В. Любого другого зуба
- Г. Причинного зуба

Электровозбудимость пульпы при хроническом гангренозном пульпите (в мка)

- А. 100-200
- Б. 30-60
- В. 60-90
- Г. 15-25

К недостаткам цельнолитых коронок относится

- А. Высокая прочность
- Б. Плотное прилегание в пришеечной части зуба
- В. Отсутствие эстетичности
- Г. Точное воспроизведение рельефа анатомической формы зуба

К зубам, чаще поражаемым системной гипоплазией эмали, относятся

- А. Молочные резцы
- Б. Молочные моляры
- В. Постоянные резцы, клыки и первые моляры
- Г. Постоянные премоляры

Рентгенологическим признаком ушиба постоянного зуба в первые 2-3 дня после травмы является

- А. Расширение периодонтальной щели у верхушки зуба
- Б. Отсутствие периодонтальной щели у верхушки зуба
- В. Равномерное расширение периодонтальной щели
- Г. Отсутствие изменений на рентгенограмме

Зоной гранулемы, характеризующейся активностью остеобластов и фибробластов, является зона

- А. Стимуляции
- Б. Контаминации
- В. Распада и деминерализации
- Г. Некроза

К деформации окклюзионной поверхности зубных рядов приводит

- А. Наличие множественных клиновидных дефектов
- Б. Плоский лишай
- В. Генерализованный катаральный гингивит
- Г. Повышенная стираемость твердых тканей зубов

Стоматологическое просвещение для беременных женщин включает

- А. Беседы о гигиене полости рта
- Б. Беседы по гигиене жилища
- В. Лекции о функции слюнных желез
- Г. Обучение навыкам снятия зубного камня

При эпидемическом паротите поражается

- А. Стенонов проток
- Б. Строма
- В. Паренхима
- Г. Протоки II и III порядков

Воспаление межзубной и маргинальной десны характерно для _____ степени

- А. Пародонтита легкой
- Б. Пародонтита средней
- В. Пародонтоза тяжелой
- Г. Пародонтита тяжелой

К причине эндемического флюороза относят

- А. Системные заболевания матери в период беременности
- Б. Инфекционное заболевание ребенка на первом году жизни
- В. Повышенное содержание фторида в питьевой воде
- Г. Недостаток фтора в организме ребенка

Данные электроодонтодиагностики при кариесе дентина составляют (в мка)

- А. 25–30
- Б. 2–6
- В. 10–12
- Г. 100

Полость ретенционной кисты слюнной железы заполнена

- А. Кристаллами холестерина
- Б. Холестеатомными массами
- В. Детритом
- Г. Слюной

Главной целью создания эндодонтического доступа является

- А. Локализовать устья каналов и обеспечить прямолинейный доступ к каналам
- Б. Расширить кариозную полость и провести экстирпацию пульпы
- В. Провести ампутацию коронковой пульпы и локализовать устья каналов
- Г. Расширить кариозную полость и провести ампутацию пульпы

Риск развития рецессии максимальный при ширине кератинизированной десны (в мм)

- А. Менее 10
- Б. Более 2
- В. Менее 5
- Г. Менее 2

Гипосаливация способствует развитию

- А. Стираемости эмали
- Б. Эрозии
- В. Кариеса
- Г. Флюороза

Ключевой возрастной группой для оценки состояния постоянных зубов в популяции является возраст (в годах)

- А. 15
- Б. 35-44
- В. 12
- Г. 6

Местным анестетиком, не оказывающим сосудорасширяющее действие, является

- А. Лидокаин
- Б. Прокаин
- В. Мепивакаин
- Г. Артикаин

Метод «серебрения» применяют при лечении

- А. Начальных форм кариеса постоянных зубов
- Б. Хронического фиброзного пульпита
- В. Начальных форм кариеса временных зубов
- Г. Хронического гранулирующего периодонтита

Для изготовления металлокерамической коронки используется модель из

- А. Супергипса
- Б. Плотной пластмассы
- В. Обычного гипса
- Г. Легкоплавкого металла

Способом повышения эффективности реминерализующей терапии является

- А. Увлажнение поверхности зуба
- Б. Использование электрофореза
- В. Использование антисептиков
- Г. Использование кариес-маркера

Первая степень вертикального зубоальвеолярного удлинения характеризуется смещением зуба

- А. В пределах жевательных бугорков
- Б. От 1/3 до 1/2 высоты клинической коронки
- В. Оголением шейки зуба
- Г. Более 1/2 высоты клинической коронки

Развитию ретенционных кист малых слюнных желез способствует

- А. Сужение протоков и гипертрофия паренхимы
- Б. Расширение протоков
- В. Расширение протоков и гипертрофия паренхимы
- Г. Сужение протоков и атрофия паренхимы

Гипсовые модели по оттискам из альгинатных материалов следует отливать после выведения последних изо рта не позднее чем через (в часах)

- А. 6
- Б. 12
- В. 1
- Г. 3

Нистатин для лечения кандидоза у детей назначают из расчета в суточной дозе _____ ед. На 1 кг массы тела

- А. 250000
- Б. 50000
- В. 100000
- Г. 150000

Эритроцитарная порфирия вызывает флюоресцирующее свечение

- А. Белое
- Б. Голубое
- В. Зеленое
- Г. Красное

Искусственные коронки классифицируют по

- А. Методу окрашивания
- Б. Окклюзионным контактам
- В. Групповой принадлежности зуба
- Г. Технологии изготовления

Эрозия зубов является

- А. Эндемическим заболеванием, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде
- Б. Нарушением эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и постоянных зубов
- В. Прогрессирующей убылью тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии
- Г. Пороком развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей

Для определения тяжести пародонтита необходимо провести

- А. Компьютерную томографию
- Б. Ультразвуковое исследование
- В. Магнитно-резонансное исследование
- Г. Рентгенологическое исследование

От сдавления дыхательной трубки наступает _____ асфиксия

- А. Дислокационная
- Б. Аспирационная
- В. Клапанная
- Г. Стенотическая

Для стимуляции эпителизации эрозий при лечении острого герпетического стоматита рекомендуются аппликации

- А. Кератопластиков
- Б. Антиоксидантов
- В. Протеолитических ферментов
- Г. Антибиотиков

Наиболее тяжелая форма системной гипоплазии эмали

- А. Аплазия
- Б. Чашеобразная
- В. Пятнистая
- Г. Бороздчатая

Зубные пасты со средним показателем абразивности следует применять

- А. 2-3 Раза в месяц
- Б. Ежедневно, 2 раза в день
- В. Ежедневно, 1 раз в день
- Г. 1-2 Раза в неделю

Краевая рецессия тканей? Пародонта по миллеру при пародонтозе тяжелой? Степени соответствует ____ классу

- А. 2
- Б. 1
- В. 4
- Г. 3

Травматическую язву дифференцируют с

- А. Глоссалгией
- Б. Раковой язвой
- В. Аллергическим стоматитом
- Г. Многоформной экссудативной эритемой

Одним из критериев оценки индекса ohi-s является

- А. Степень кровоточивости десен
- Б. Уровень зубного налета
- В. Нуждаемость в лечении заболеваний пародонта
- Г. Уровень гигиены рта

Второй этап имплантации на верхней челюсти проводится через

- А. 6 Недель
- Б. 3 Месяца
- В. 6 Месяцев
- Г. 3 Недели

Для снижения риска перфорации искривленного канала необходимо

- А. Применить препарат ЭДТА
- Б. Применить вращающиеся инструменты
- В. Изогнуть К-риммер по кривизне канала
- Г. Отказаться от обработки канала

После наложения мышьяковистой пасты кариозную полость закрывают

- А. Дентин-пастой
- Б. Фосфат-цементом
- В. Цинкоксидэвгеноловой пастой
- Г. Искусственным дентином (водным)

Обнажение поверхности корня зуба проявляется _____ зубов

- А. На контактной поверхности
- Б. Только на вестибулярной поверхности
- В. Только на оральной поверхности
- Г. Как на вестибулярной, так и на оральной поверхностях

При переломе коронки в пределах эмали проводится

- А. Сошлифовывание острых краев дефекта
- Б. Изготовление керамического винира
- В. Покрытие зуба защитной ортодонтической коронкой
- Г. Восстановление дефекта композитным материалом

При неправильном положении третьего моляра и перикороните проводят

- А. Удаление зуба
- Б. Иссечение капюшона
- В. Секвестрэктомию
- Г. Апликации лидокаина

Наиболее характерным видом травмы для детей в возрасте 4 - 5 лет является

- А. Перелом зуба
- Б. Вывих зуба
- В. Перелом нижней челюсти
- Г. Вывих височно-нижнечелюстного сустава

Подготовка моделей при изготовлении имедиат-протезов включает

- А. Дублирование модели
- Б. Параллеломерию
- В. Срезание зубов
- Г. Изготовление коронок

К недостаткам эластичных акриловых материалов для двухслойных базисов относят

- А. Длительное сохранение эластичности
- Б. Химическое соединение с жестким акриловым базисом протеза
- В. Высокую степень твердости
- Г. Усадку

Все молочные зубы должны прорезаться к _____ (в годах)

- А. 1,5
- Б. 2,5
- В. 3,5
- Г. 4,5

Причиной возникновения диплопии при переломе скуловой кости является

- А. Травма зрительного нерва
- Б. Смещение глазного яблока
- В. Травма глазного яблока
- Г. Воспалительная реакция

Эрозивная форма флюороза характеризуется

- А. Темно-коричневыми пятнами, обширными и глубокими дефектами эмали
- Б. Хорошо очерченными пигментированными пятнами и крапинками на фоне матовой эмали
- В. Небольшими меловидными полосками-штрихами
- Г. Хорошо выраженными меловидными пятнами без полосок

Возникновение односторонней припухлости в подчелюстной области, связанное с приемом пищи, может быть симптомом

- А. Лимфаденита
- Б. Плеоморфной аденомы
- В. Слюнно-каменной болезни
- Г. Сиалоза

Металлом, который вводят в золотой сплав для снижения температуры плавления, является

- А. Медь
- Б. Кобальт
- В. Кадмий
- Г. Серебро

Фактором, способствующим возникновению хейлита манганотти является

- А. Пониженная саливация
- Б. Бактериальная инфекция
- В. Инсоляция
- Г. Стресс

Для профилактики гиперчувствительности зубов после профессионального отбеливания проводят

- А. Профессиональную гигиену полости рта
- Б. Мотивацию пациента к отказу от курения
- В. Полоскание раствором хлоргексидина
- Г. Аппликации кальцийсодержащими средствами

Ориентиром расположения пришеечной части фронтальной группы искусственных зубов в съёмном пластиночном протезе является

- А. Линия улыбки
- Б. Перегородка носа
- В. Фильтрум верхней губы
- Г. Уздечка верхней губы

Наиболее предпочтительное применение экстратолстых типов резиновых экранов системы коффердама

- А. Для изоляции зубов любой групповой принадлежности
- Б. При изоляции зубов в плотном контакте
- В. При повышенной ретракции мягких тканей
- Г. Для изоляции третьих моляров

При нетрудоспособности, возникшей вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения, выдаётся

- А. Выписной эпикриз
- Б. Справка о нетрудоспособности
- В. Листок нетрудоспособности с кодом 021
- Г. Справка произвольной формы

Белая матовая шероховатая поверхность эмали характерна для

- А. Начального кариеса в стадии стабилизации
- Б. Флюороза слабой степени тяжести
- В. Флюороза умеренной степени тяжести
- Г. Начального кариеса в активной стадии

Методика ВОЗ предусматривает стоматологическое обследование детей в возрасте (лет)

- А. 6, 12, 15
- Б. 2, 8, 16
- В. 3, 9, 14
- Г. 1, 5, 10

Для холодной стерилизации стоматологических зеркал используют ____%_____

- А. 6; Раствор перекиси водорода
- Б. 0,5; Раствор хлорамина
- В. 1; Раствор перекиси водорода
- Г. 75; Метиловый спирт

Основное вещество пульпы представлено

- А. Мукопротеинами
- Б. Протеогликанами
- В. Мукополисахаридами
- Г. Гликопротеинами

Глубина поражения твердых тканей зубов при II степени повышенного стирания составляет

- А. До 1/3 длины коронки
- Б. От 2/3 длины коронки до шейки и более
- В. От 1/3 до 2/3 длины коронки
- Г. От 1/3 до 1/2 длины коронки

Устье вартонова протока располагается в

- А. Челюстно-язычном желобке
- Б. Ретромолярном пространстве
- В. Верхнем своде преддверия рта
- Г. Области подъязычного сосочка

Для проводниковой мандибулярной анестезии применяют карпульную иглу ____ g ____ мм

- А. 27; 35
- Б. 30; 25
- В. 30; 35
- Г. 27; 25

Лунка зуба после удаления заживает

- А. Вторичным натяжением
- Б. Под струпом
- В. Третичным натяжением
- Г. Первичным натяжением

Минимальное расстояние от платформы имплантата до зуба составляет ____ мм

- А. 2
- Б. 1,5
- В. 0,5
- Г. 1

Резекцию верхушки корня проводят

- А. Фиссурным бором
- Б. Шаровидным бором
- В. Сепарационным диском
- Г. Долотом

Длительность болевого приступа при остром пульпите составляет (в минутах)

- А. 60-90
- Б. 30-60
- В. 10-30
- Г. Более 90

В хирургической стоматологии наиболее часто применяют

- А. Томографию
- Б. Рентгеноскопию
- В. Панорамную рентгенографию
- Г. Внутриротовую рентгенографию

Самым неблагоприятным для прогрессирования рецессии является _____ тип слизистой

- А. Тонкий
- Б. Толстый
- В. Гипертрофированный
- Г. Смешанный

Оттискным материалом, относящимся к альгинатным, является

- А. Сиэласт
- Б. Репин
- В. Гипс
- Г. Упин

Эндодонтическим инструментом для прохождения корневого канала является

- А. Спредер
- Б. Пульпэкстрактор
- В. К-файл
- Г. Н-файл (бурав Хедстрема)

При частоте дыхательных движений у пациента перед плановым стоматологическим вмешательством более 28 в минуту, сопровождающихся кашлем и хрипами, врач должен

- А. Провести плановое лечение
- Б. Отложить лечение на другой день
- В. Провести профессиональную гигиену
- Г. Отложить лечение и направить пациента на обследование к терапевту

Раскрытие полости зуба в премолярах верхней челюсти проводится в направлении

- А. Медиально-дистальном
- Б. По оси зуба
- В. Вестибуло-оральном
- Г. Вестибуло-дистальном

Под обращаемостью понимают

- А. Отношение числа всех посещений больными амбулаторно-поликлинического учреждения к общему числу обслуживаемого населения
- Б. Соотношение числа всех первичных посещений по поводу болезни к общему числу обслуживаемого населения
- В. Число больных, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу заболевания
- Г. Абсолютное число всех первичных и повторных посещений больными медицинской организации

После лабораторного этапа «изготовление каркаса металлокерамической коронки» следующий клинический этап

- А. Определение центрального соотношения челюстей
- Б. Определение центральной окклюзии
- В. Припасовка каркаса в полости рта
- Г. Повторное получение оттисков

Для оценки состояния пульпы зуба после травмы применяют

- А. Одонтопародонтограмму
- Б. Термо- и электроодонтодиагностику (ЭОД)
- В. Электрофорез
- Г. Криодеструкцию

Для обработки слизистой оболочки рта у детей до 6 месяцев при кандидозе используют

- А. Йода раствор
- Б. Гексорал спрей
- В. Буры в глицерине раствор
- Г. Бриллиантового зеленого раствор

При гипертрофическом гингивите для склерозирующей терапии применяют ____% раствор____

- А. 3; Н 2 О 2
- Б. 40; Формалина
- В. 30; Трихлоруксусной кислоты
- Г. 30; AgNO 3

Для изготовления вкладок применяется сплав золота ____ пробы

- А. 750
- Б. 583
- В. 586
- Г. 900

Детям школьного возраста рекомендуется использовать зубные пасты с концентрацией фторидов (ppm)

- А. 100-200
- Б. 1000-1450
- В. 500-1000
- Г. 2500-5000

Желто-коричневое окрашивание десны при проведении пробы шиллера –писарева обусловлено наличием в эпителии десны

- А. Гепарина
- Б. Брадикинина
- В. Гистамина
- Г. Гликогена

К iii классу в соответствии с классификацией (р. D. Miller) относят рецессию десны

- А. Выходящую за пределы прикрепленной десны, сочетающуюся с атрофией (резорбцией) кости межальвеолярных перегородок
- Б. В пределах свободной десны
- В. Выходящую за пределы прикрепленной десны, без потери костной ткани
- Г. В пределах прикрепленной десны

К инициатору полимеризации материала светового отверждения относят

- А. Ароматические амины
- Б. Пероксид бензоила
- В. Камфорахинон
- Г. Пероксид бензоила и ароматические амины

Основной причиной развития воспалительных заболеваний пародонта считают

- А. Наследственность
- Б. Подвижность зубов
- В. Микробный налет
- Г. Вредные привычки

Окклюдатор – аппарат, воспроизводящий

- А. Движения нижней челюсти вперед
- Б. Все движения нижней челюсти
- В. Смыкание и размыкание челюстей
- Г. Движения нижней челюсти назад

2 категория

[Вернуться в начало](#)

ПРИКУС-ЭТО ВИД СМЫКАНИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ В ПОЛОЖЕНИИ ОККЛЮЗИИ:

- А. Центральной
- Б. Боковой левой
- В. Передней
- Г. Дистальной
- Д. Боковой правой

ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ВРЕМЕННЫХ РЕЗЦОВ СО СФОРМИРОВАННЫМИ КОРНЯМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Удалить
- В. Зубы трепанировать, запломбировать за верхушки корней
- Г. Зубы трепанировать, запломбировать до верхушек корней
- Д. Репозиция зубов, их фиксация, наблюдение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. 10 лет
 - Б. 6 лет
 - В. Чрезмерно развитая пазуха, распространяющаяся даже в отростке верхнечелюстной кости
 - Г. Малые размеры верхнечелюстной пазухи
 - Д. Боль, чувство тяжести, давления и напряжения в соответствующей половине лица
 - Е. Выделение гноя или слизи из соответствующей половины носа
1. Наиболее частые симптомы острого гайморита
 2. Возраст ребенка, при котором размеры верхнечелюстной пазухи приближаются к таковым взрослого человека
 3. Возраст ребенка, при котором нижняя стенка верхнечелюстной пазухи находится на одном уровне с дном полости носа
 4. Пневматический тип верхнечелюстной пазухи
 5. Возраст ребенка, когда нижняя граница верхнечелюстной пазухи лежит ниже уровня дна полости носа
- А. А – 5, Б – 2, В – 3,4, Д – 1
 - Б. А – 5, Б – 2, 3, В – 1, Д – 4
 - В. А – 5, Б – 2, 3, В – 4, Д – 1

При изготовлении металлокерамической коронки чрезмерное укорочение культи зуба может привести к:

- А. нарушению эстетики;
- Б. функциональным нарушениям;
- В. сколу керамики;
- Г. расцементировки коронки;
- Д. травме десны.

Компонент местнообезболивающего препарата, наиболее часто провоцирующий развитие аллергических реакций

- А. местный анестетик
- Б. вазоконстриктор
- В. бисульфит натрия
- Г. ЭДТА
- Д. натрия хлорид

ПРИСТУП СТЕНОКАРДИИ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ДЛИТСЯ

- А. 10 – 30 с
- Б. 30 – 60 с
- В. 1 - 5 мин
- Г. 5 -10 мин
- Д. 10 – 20 мин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Описание

- А.Ткани зуба имеют разные цвета при различных условиях освещения
 - Б.Способность материалов приобретать вид окружающих тканей, сливаться с ними
 - В.Способность эмали при естественном освещении испускать бледное мерцание
 - Г.Способность зубов поглощать волны ультрафиолетового диапазона и испускать видимый, синеватый свет
- Оптические характеристики зубных тканей и композитов**

- 1.Опалесценция
- 2.Флуоресценция
- 3.Метамерия
- 4.Эффект хамелеона

- А. 1Г, 2В, 3А, 4Б
- Б. 1В, 2А, 3Б, 4Г
- В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМОСТЬ ПУЛЬПЫ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ

- А. Возрастает
- Б. Остается без изменений
- В. Снижается
- Г. Колеблется
- Д. Не определяется

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на нижней челюсти в области зубов проходит:

- А. не касается зубов
- Б. перекрывая коронки зубов на 2/3
- В. в пришеечной области зубов
- Г. перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. посередине коронки зубов

ПРИЗНАКИ ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ

- А. Усиление воспаления в окружности язвы
- Б. Уменьшение воспаления в окружности язвы
- В. Уплотнение краев и основания язвы
- Г. Усиление боли
- Д. Уменьшение боли

МЕСТОМ ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ ПРИ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИЦЕВОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧКА В ОБЛАСТИ

- А. Ветви нижней челюсти впереди козелка уха соответствующей стороны
- Б. Основания нижней челюсти соответственно подбородочному отверстию
- В. VII шейного позвонка
- Г. Края нижней челюсти впереди жевательной мышцы
- Д. Переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышц

ИНТЕРГЛОБУЛЯРНЫЙ ДЕНТИН - ЭТО:

- А. Основное вещество между дентинными слоями
- Б. Часть дентина, прилегающая к полости зуба
- В. Отложения дентина в течении жизни человека
- Г. Дентин, образующийся при патологии твердых тканей зуба
- Д. Дентин, возникающий в процессе развития зуба

ТОННЕЛЬНОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА

- А. Резцах и клыках
- Б. Клыках и премолярах
- В. Премолярах и резцах
- Г. Молярах и премолярах
- Д. Молярах и резцах

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Расширение и сужение протока

Б. Сужение протоков на всем протяжении

В. «Гроздь винограда»

Г. «Чернильное пятно»

Д. Без изменений

1. Сиалографический признак разрастания в паренхиме слюнной железы соединительной ткани

2. Сиалографический признак наличия поражения протока слюнной железы

3. Сиалографический признак лимфогенного паротита характеризуется скоплением контраста в виде:

4. Сиалографический признак паренхиматозного паротита характеризуется скоплением контраста в виде:

5. Сиалограмма ложного паротита Герценберга

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 3

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 5

К физиологическим видам прикуса относятся:

А. глубокий;

Б. прогнатический;

В. бипрогнатический;

Г. перекрестный;

Д. открытый.

Укажите точку приложения действия местных анестетиков:

А. кора головного мозга

Б. таламус

В. лимбическая система

Г. чувствительные нервные окончания и проводники

Д. задние рога спинного мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. 8 – 10 месяцев

Б. 45 суток

В. 2 недели

Г. Конец первого месяца

1. Сроки появления остеоидных палочек на дне и стенках лунки после удаления зуба

2. Сроки начала заполнения лунки удаленного зуба мелкопетлистой губчатой костной тканью

3. Сроки окончания заполнения лунки удаленного зуба мелкопетлистой губчатой костной тканью

4. Сроки, при которых лунка рентгенологически не отличается от окружающей костной ткани при осложненном заживлении (альвеолите или остеомиелите)

А. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

Б. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

В. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2

В МИКРОНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТАХ РАЗМЕР ЧАСТИЦ НАПОЛНИТЕЛЯ (МКМ):

А. 1 - 100

Б. 50

В. более 1

Г. 1

Д. менее 1

При изготовлении металлопластмассовой коронки соединение пластмассы с литым каркасом осуществляется за счет:

А. химического соединения;

Б. формирования ретенционных пунктов с помощью "перл" (шариков);

В. образования окисной пленки;

Г. взаимной диффузии материалов;

Д. вырезания "окна" на вестибулярной поверхности коронки.

К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА ОТНОСЯТ

А. Болезнь Боуэна

Б. Болезнь Боуэна и пигментную ксеродермию

В. Болезнь Боуэна, актинический кератоз, предраковый меланоз

Г. Болезнь Боуэна, бородавчатый (узелковый) предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз

Д. Болезнь Боуэна, абразивный хейлит Манганотти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Разрежение кости позади коронки нижнего «зуба мудрости»

Б. Воспаление мягких тканей, окружающих коронку зуба при его неполном и затрудненном прорезывании

В. Ретенция «зубов мудрости»

Г. Задержка сроков прорезывания нормально сформированного постоянного зуба

Д. Неправильное положение в зубном ряду прорезывавшегося зуба или его аномальное положение в челюсти

1. Ретенция зуба

2. Дистопия зуба

3. Перикоронит

4. Полулуние Вассмунда

5. Одна из причин краевой гнездовой алопеции затылочной области

А. А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 1, Д – 2

В. А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2, Д – 1

Для починки съемного протеза на нижней челюсти при отломе удерживающего кламмера необходимо получить оттиск с:

А. нижней челюсти с протезом;

Б. двух челюстей без протеза;

В. нижней челюсти без протеза;

Г. верхней челюсти и оттиск с нижней челюсти с протезом;

Д. двух челюстей без протеза и с нижней челюсти с протезом.

Укажите формулу зуба, для лечения которого необходимо провести проводниковую анестезию с анестетиком на основе артикаина

А. зуб 3.6

Б. зуб 1.4

В. зуб 2.5

Г. зуб 4.2

Д. зуб 3.3

ЭКВИВАЛЕНТОМ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

А. тяжесть за грудиной

Б. дискомфорт

В. стеснение в груди

Г. длительная боль в области верхушки сердца

Д. чувство нехватки воздуха

РЕСТАВРАЦИЯ ПО МЕТОДИКЕ "ОТКРЫТОГО СЭНДВИЧА" - ЭТО:

- А. Контактный пункт выполнен СИЦ, окклюзионная поверхность - композитом
- Б. Перекрытие базовой подкладки из СИЦ композитом в области контактного пункта и с окклюзионной поверхности
- В. Нанесение СИЦ на слой низкомодульного композита
- Г. Контактный пункт выполнен композитом, окклюзионная поверхность - СИЦ
- Д. Окклюзионная поверхность - композит, контактный пункт - амальгама

ОСНОВНЫМ ПРИЧИННЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Курение
- Б. Сахарный диабет
- В. Пародонтопатогенная микрофлора
- Г. Сердечно-сосудистые заболевания
- Д. Подвижность зубов

ЭНДОДОНТ ВКЛЮЧАЕТ

- А. Пульпу и дентин
- Б. Пульпу зуба
- В. Пульпу зуба, периодонтальную связку,
- Г. Пульпу зуба, периодонтальную связку, альвеолу
- Д. Пульпу зуба, периодонтальную связку, альвеолу, десну

Местноанестезирующие средства, содержащие вазоконстриктор, противопоказаны пациентам, применяющим

- А. Антигистаминные
- Б. Анксиолитики
- В. Трициклические антидепрессанты
- Г. Неопиоидные анальгетики
- Д. Нестероидные противовоспалительные препараты

Оптимальное расположение кламмерной линии на нижней челюсти:

- А. диагональное;
- Б. сагиттальное;
- В. поперечное;
- Г. вестибуло-оральное;
- Д. точечное.

ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОТТИСК С:

- А. Нижней челюсти без протеза
- Б. Нижней челюсти с протезом
- В. Верхней челюсти и нижней челюсти без протеза
- Г. Нижней челюсти с протезом и верхней челюсти
- Д. Слепки снимать не нужно

КУРКОВЫЕ (ТРИГГЕРНЫЕ) ЗОНЫ ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЭТО УЧАСТКИ

- А. Гиперстезии
- Б. Гипостезии
- В. Раздражение которых провоцирует приступ боли
- Г. Парастезии
- Д. Анестезии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Свойства композитных материалов:

- А. Выделение фтора
 - Б. Высокая эластичность
 - В. Высокая прочность
 - Г. Низкая полимеризационная усадка
- Группы композитных материалов:**

- 1. Текучие
- 2. Гибридные
- 3. Наноккомпозиты
- 4. Компомеры

- А. 1Б, 2В, 3Г, 4А
- Б. 1В, 2Б, 3Г, 4А
- В. 1Б, 2Г, 3А, 4В

ДЛЯ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНО

- А. Сильные кратковременные приступообразные боли
- Б. Длительные ноющие боли
- В. Кратковременные парастезии
- Г. Длительные парастезии
- Д. Симптом Венсана

Укажите процентную концентрацию раствора лидокаина в аэрозоли, применяемого в стоматологической практике для аппликационной анестезии

- А. 0.5%
- Б. 2%
- В. 3%
- Г. 4%
- Д. 10%

ЭТОТ ПРЕПАРАТ СНИЖАЕТ ТОНУС СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ

- А. эуфиллин
- Б. диазепам
- В. кофеин
- Г. но-шпа
- Д. папаверин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Рентгенологическая картина:

А. Выраженные периапикальные деструктивные изменения костной ткани

Б. Участок разрыхления костной ткани с четкими контурами более 5мм

В. Изменений не выявляется Заболевание:

- 1. Острый апикальный периодонтит**
- 2. Хронический апикальный периодонтит**
- 3. Радикулярная киста**
- 4. Хронический пульпит**

А. 1В, 2А, 3Б, 4В

Б. 1Б, 2А, 3В, 4В

В. 1В, 2А, 3Б, 4А

Наиболее высокую кардиотоксичность имеет

- А. мепивакаин
- Б. лидокаин
- В. бупивакаин
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. артикаин

Моделирование цельнолитой коронки производят на:

- А. гипсовом штампе
- Б. гипсовой модели
- В. разборной модели
- Г. огнеупорной модели
- Д. штампе из легкоплавкого металла

ПРИЗНАКАМИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. апноэ, асистолия, отсутствие зрачков. рефлекса
- Б. апноэ, асистолия, арефлексия
- В. апноэ, отсутствие роговичного рефлекса, отсутствие тонуса мышц
- Г. апноэ, отсутствие зрачкового рефлекса, отсутствие тонуса мышц
- Д. апноэ, асистолия, отсутствие коленного рефлекса

Оптимальное расположение кламмерной линии на верхней челюсти:

- А. сагиттальное
- Б. поперечное
- В. вестибуло—оральное
- Г. диагональное
- Д. точечное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Заболевание:

- А. Корневая киста остаточная
- Б. Периапикальный абсцесс без свища
- В. Корневая киста апикальная и боковая
- Г. Хронический апикальный периодонтит Код по МКБ-10:
 - 1. K04.5
 - 2. K04.80
 - 3. K04.7
 - 4. K04.81
- А. 1Г, 2В, 3Б, 4А
- Б. 1Г, 2А, 3Б, 4В
- В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВИНИРОВ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Низкий уровень гигиены полости рта
- Б. Депульпированные зубы
- В. Деминерализация после ортодонтического лечения
- Г. Диастема шириной 1 мм
- Д. Наличие старых, изменивших цвет, пломб

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Жалобы:

- А.Зуб ранее сильно болел, в настоящее время боль возникает при попадании пищи в полость
 - Б.Боли интенсивные,самопроизвольные, иррадиирующие, усиливаются от горячего, кратковременное ослабление от холодного
 - В.Быстропроходящие боли от температурных, механических, химических раздражителей, возникшие 2-3 дня назад
 - Г.Продолжительные боли от всех видов раздражителей, ночные и самопроизвольные боли
- Заболевание:**

- 1.Пульпит начальный
 - 2.Пульпит острый
 - 3.Пульпит гнойный
 - 4.Пульпит хронический гипертрофический
- А. 1В, 2Г, 3Б, 4А
 - Б. 1Г, 2В, 3Б, 4А
 - В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ КАРИЕСВОСПРИИМЧИВОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- А. До иммунных зон
- Б. Профилактически иссекая окружающую деминерализованную эмаль
- В. Миниинвазивным методом
- Г. Депульпируют зуб
- Д. С позиций щадящего препарирования

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Хронический гнойный и гипертрофический альвеолит

Б. Рыхлая тампонада лунки йодоформным тампоном

В. Антисептические ванночки, противопоказано интенсивное полоскание полости рта

Г. «сухая лунка» или остеомиелит

Д. Серозная и гнойно-некротическая

1. Тактика врача при течении альвеолита в виде «сухой лунки»

2. Рекомендации врача после удаления зуба

3. Формы течения альвеолита

4. Острые формы альвеолита

5. Хронические формы альвеолита

А. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4

Б. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4

В. А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 4

ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ

А. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, дренирование раны, удаление причинного зуба

Б. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, назначение антибиотиков, ротовых ванн, УВЧ

В. Удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн

Г. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, дренирование раны, удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн

Д. Медикаментозная терапия

При отломе коронковой части зуба на уровне десны зуб восстанавливают:

А. полукоронкой

Б. экваторной коронкой

В. вкладкой

Г. съемным протезом

Д. штифтовой конструкцией

Для поверхностной анестезии слизистой оболочки может применяться

А. мепивакин

Б. тетракаин (дикаин)

В. бупивакаин (маркаин)

Г. прокаин (новокаин)

Д. артикаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

А. Не существует

Б. Хронический периодонтит

В. 1 – 3 и 8 – 9 месяцы

Г. 6 месяцев

Д. Период обострения

Е. 2 – 3 и 6 – 7 месяцы

1. Показание к плановому удалению зуба

2. Абсолютное противопоказание для удаления зуба

3. Сроки планового удаления зубов после инфаркта миокарда

4. Временное противопоказание к удалению зубов у беременных в следующие сроки

5. Временное противопоказание к удалению зубов при психических заболеваниях

А. А – 2, Б – 1, В – –, Г – 3, Д – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – –, Г – 5, Д – 3

В. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

А. Плазматические клетки

Б. Эозинофилы

В. Нейтрофильный сдвиг влево

Г. 4 – 5 сутки

Д. Гигантские многоядерные клетки

Е. 2 – 3 сутки

1. Признаки острого воспалительного процесса в общем анализе крови

2. Цитологический признак медленного заживления раны

3. Признак патологического течения раневого процесса

4. Цитологический признак наличия в ране инородного тела

5. Сроки перехода от макрофагальной фазы в фибробластическую при раневом процессе

А. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4

Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4

В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4

**МИКРОПРОТЕЗ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБА И
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ОККЛЮЗИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕРЕКРЫТИЕМ ОДНОГО БУГРА**

- А. Pinlay
- Б. Inlay
- В. Onlay
- Г. Overlay
- Д. Ney

Артикаин можно использовать у детей с

- А. 6 месяцев
- Б. 1 года
- В. 2 лет
- Г. 4 лет
- Д. 5 лет

Высшая (максимально допустимая) разовая доза артикаина для детей:

- А. 2,2 мг/кг
- Б. 3,0 мг/кг
- В. 4,4 мг/кг
- Г. 5,0 мг/кг
- Д. 7 мг/кг

Подвижность зубов по Энтину I степени характеризуется подвижностью:

- А. в пределах физиологической нормы
- Б. в лунке во всех направлениях вокруг своей оси
- В. в вестибулооральном и медиодистальном направлениях
- Г. в вертикальном направлении
- Д. в вестибулооральном направлении

Проверка окклюзионных контактов на этапе припасовки несъемного мостовидного протеза проводится при окклюзиях:

- А. центральной и сагиттальных;
- Б. боковых, сагиттальных и центральной;
- В. сагиттальных и боковых;
- Г. сагиттальных;
- Д. центральной.

После припасовки коронок паяного мостовидного протеза в полости рта повторно определяется центральная окклюзия для:

- А. оценки качества припасовки коронок
- Б. повторной установки и загипсовки модели с коронками в артикулятор
- В. точной спайки опорных коронок с промежуточной частью
- Г. точного моделирования промежуточной части мостовидного протеза (с учетом смыкания зубных рядов в центральной окклюзии)
- Д. повышения эстетики протеза

При изготовлении консольного несъемного протеза отрицательным является:

- А. необходимость депульпации опорных зубов
- Б. препарирование большого количества зубов
- В. наличие опрокидывающего момента в области опорных зубов
- Г. неудовлетворительное эстетическое качество
- Д. сошлифовывание большого количества тканей опорных зубов

Получение оттиска при починке съемного пластиночного протеза не требуется при:

- А. отломе плеча кламмера;
- Б. переломе или трещине базиса;
- В. необходимости установки дополнительного зуба;
- Г. переносе кламмера;
- Д. отломе искусственного зуба.

Моделировка из воска штампованной коронки проводится на:

- А. разборной модели
- Б. огнеупорной модели
- В. гипсовом столбике
- Г. металлическом штампике
- Д. гипсовой модели

Пациенту, страдающему бронхиальной астмой и имеющему повышенную чувствительность к сульфитам, для проведения местного обезболивания перед лечением зуба следует выбрать

- А. 2% раствор мепивакаин+ эпинефрин (адреналин) 1: 100 000
- Б. 3% раствор мепивакаина
- В. 4% раствор артикаина + эпинефрин (адреналин) 1: 200 000
- Г. 4% раствор артикаина + эпинефрин (адреналин) 1: 100 000
- Д. 2% раствор лидокаина + эпинефрин (адреналин) 1: 100 000

ДЛЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ

- А. Кратковременные интенсивные боли, возникающие от случайных раздражений без нарушений чувствительности
- Б. Продолжительная, варьирующая по интенсивности боль, усиливающаяся при давлении по ходу нерва
- В. Продолжительные приступообразные боли с иррадиацией в ухо, хруст в височно-нижнечелюстном суставе
- Г. Тупые длительные боли с чувством давления и напряжения в верхней челюсти, выделения из носа
- Д. Приступообразные ночные боли длительностью 15-30 минут, иррадиирующие в ухо, висок

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ

- А. Приступообразные ночные боли длительностью 15-30 минут, иррадиирующие в ухо, висок
- Б. Продолжительные, варьирующие по интенсивности боли, усиливающиеся при давлении по ходу нерва
- В. Тупые длительные боли с чувством давления и напряжения в верхней челюсти, выделения из носа
- Г. Продолжительные приступообразные боли с иррадиацией в ухо, хруст в височно-нижнечелюстном суставе
- Д. Кратковременные интенсивные боли, возникающие от случайных раздражений без нарушений чувствительности

Собственно жевательная мышца по функции относится к группе мышц:

- А. опускающих нижнюю челюсть
- Б. смещающих нижнюю челюсть вперед
- В. поднимающих нижнюю челюсть
- Г. смещающих нижнюю челюсть вправо
- Д. смещающих нижнюю челюсть влево

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. С неба на ножке

Б. Удаление причинного зуба, назначение местных сосудосуживающих средств, ФТЛ

В. С вестибулярной поверхности вестибулярного отростка

Г. Удаление причинного зуба, пункции промывания пазухи, симптоматическое лечение

Д. Удаление причинного зуба, гайморотомия

1. Лечение острого одонтогенного серозного гайморита

2. Лечение острого одонтогенного гнойного гайморита

3. Лечение хронического одонтогенного гайморита

4. Чаще всего ороантральное сообщение закрывается путем слизисто-надкостничного лоскута взятого

А. Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3

Б. Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

В. Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

Местноанестезирующий препарат с минимальной проникающей способностью через гистогематические барьеры:

А. мепивакин

Б. лидокаин

В. бупивакаин (маркаин)

Г. прокаин (новокаин)

Д. артикаин

ТЯЖЁЛАЯ ОДЫШКА, УЧАСТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЫШЦ В АКТЕ ДЫХАНИЯ, ВЗДУТИЕ ШЕЙНЫХ ВЕН, ВЫБУХАНИЕ НАДКЛЮЧИЧНЫХ ЯМОК, ВЫРАЖЕННЫЙ ЦИАНОЗ ХАРАКТЕРИЗУЮТ

А. асфиксию обтурационную

Б. приступ бронхиальной астмы

В. асфиксию аспирационную

Г. большой эпилептический припадок

Д. приступ стенокардии

Съемный пластиночный протез, при дефекте зубного ряда, нуждается в припасовке в полости рта вследствие:

А. наличия поднатурений в области естественных зубов

Б. возможных ошибок при постановке искусственных зубов

В. нарушений пропорций при подготовке пластмассы

Г. нарушений режима полимеризации пластмассы

Д. индивидуальных особенностей пациента

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Деформация десневых сосочков
- Б. Некроз десневых сосочков
- В. Кровоточивость при зондировании десневых сосочков
- Г. Резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок
- Д. Наличие пародонтального кармана

При изготовлении штифтовой конструкции оптимальная длина штифта относительно длины корня составляет:

- А. 1/3;
- Б. 2/3;
- В. 1/2;
- Г. всю длину корня;
- Д. длина штифта не имеет значения.

CEREC – ЭТО

- А. Система компьютерного изготовления вкладок и коронок
- Б. Система адгезионной фиксации безметалловых вкладок
- В. Система реставрации зубов стандартными керамическими вкладками
- Г. Воск для прямой моделировки вкладок
- Д. Система ультразвукового препарирования под стандартные керамические вкладки

БОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЕ АМБУЛАТОРНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БЕРЕМЕННЫХ

- А. в 1 триместре
- Б. в 1 и 2 триместрах
- В. во 2 триместре
- Г. во 2 и 3 триместрах
- Д. в 3 триместре

Укажите формулу зуба, для лечения которого достаточно проведение инфильтрационной анестезии с анестетиком на основе артикаина

- А. зуб 3.1
- Б. зуб 4.8
- В. зуб 3.7
- Г. зуб 4.6
- Д. зуб 3.8

Для снятия психоэмоционального напряжения в условиях стоматологической поликлиники используют:

- А. снотворные
- Б. анксиолитики (транквилизаторы)
- В. наркотические анальгетики
- Г. ненаркотические анальгетики
- Д. антидепрессанты

КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ГИПОГЛИКЕМИИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СИМПТОМ

- А. общей слабости
- Б. двигательного беспокойства
- В. чувства голода
- Г. сухости кожных покровов
- Д. тремора пальцев

ПАЦИЕНТУ В СОСТОЯНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА ВВОДЯТ

- А. подкожно
- Б. подъязычно
- В. внутривенно
- Г. внутримышечно
- Д. внутрисердечно

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ЭМАЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЕ КОНТАКТ С КОМПОЗИТОМ ПО ПРИНЦИПУ

- А. Микросцепления
- Б. Химического взаимодействия
- В. Адгезии
- Г. Макросцепления
- Д. Макросцепления и химического взаимодействия

Применение замковых креплений для фиксации съёмного протеза даёт возможность:

- А. уменьшить рвотный рефлекс
- Б. улучшить дикцию
- В. повысить эстетику
- Г. улучшить фиксацию протеза
- Д. уменьшить травму десны

Штифтовая культевая вкладка может быть изготовлена на:

- А. зубы любой группы
- Б. однокорневые зубы верхней челюсти
- В. премоляры верхней челюсти
- Г. премоляры нижней челюсти
- Д. однокорневые зубы нижней челюсти

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Нарушение функции жевания
- Б. Костная крепитация
- В. Неправильный прикус
- Г. Локальная боль, усиливающаяся при пальпации
- Д. Гематома, отек окружающих тканей

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ АРТРИТА ВНЧС С ХРОНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. Выраженное сужение суставной щели, нарушение функции суставной головки
- Б. Незначительное расширение суставной щели, нарушение функции суставной головки
- В. Выраженное расширение суставной щели, нарушение функции суставной головки
- Г. Исчезновение наружных замыкающих кортикальных пластинок, краевые узур, остеопороз и кисты суставной головки
- Д. Ширина суставной щели без изменений, нарушение функции суставной головки

Окклюзия – это:

- А. всевозможные смыкания зубных рядов верхней и нижней челюстей
- Б. положение нижней челюсти относительно верхней в состоянии относительного физиологического покоя
- В. всевозможные положения нижней челюсти относительно верхней
- Г. соотношение беззубых челюстей
- Д. вид прикуса

Для изготовления штампованных коронок применяют штампы, отлитые из:

- А. хромокобальтового сплава
- Б. легкоплавкого сплава
- В. серебряно-палладиевого сплава
- Г. свинца
- Д. олова

Укажите группу зубов, для депульпирования которых инфильтрационной анестезии обычно недостаточно

- А. резцы и клыки верхней челюсти
- Б. резцы и клыки нижней челюсти
- В. премоляры верхней и нижней челюсти
- Г. моляры верхней челюстей
- Д. моляры нижней челюсти.

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

- А. Местная гипоплазия эмали
- Б. Флюороз
- В. Тетрациклиновые зубы
- Г. Системная гипоплазия эмали
- Д. Несовершенный амелогенез

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Показания:

- А. Препарирование без выхода на аппроксимальную грань и кариесрезистентных пациентов
- Б. Скрытые полости до контактного пункта сочетание полостей 2 и 1 класса
- В. Полость в придесневой области до контактного пункта у зубов с высокой коронкой
- Г. Распространение полости на контактный пункт, замена старой реставрации Методики препарирования и пломбирования полостей 2 класса:

- 1. Техника горизонтального тоннеля
- 2. Техника сквозного вертикального тоннеля
- 3. Техника несквозного вертикального тоннеля
- 4. Препарирование и пломбирование стандартными керамическими вкладками

- А. 1В, 2Б, 3А, 4Г
- Б. 1А, 2Б, 3В, 4Г
- В. 1Г, 2Б, 3А, 4В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

- А. Рассечение зуба на две части в области бифуркации с последующим сглаживанием нависающих краев, проведение кюретажа, покрытие коронкой
- Б. Удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба
- В. Удаление корня вместе с прилежащей коронковой частью
- Г. Пересадка удаленного зуба в другую альвеолу
- Д. Пересадка удаленного зуба в его же альвеолу

- 1. Аутотрансплантация зуба
- 2. Гемисекция зуба
- 3. Ампутация корня
- 4. Коронаро – радикулярная сепарация
- 5. Реплантация зуба

- А. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1, Д – 5
- Б. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 5
- В. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5

ПРИ СНЯТИИ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ У ПАЦИЕНТА С ЯЗВЕННО- НЕКРОТИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ ВЕНСАНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД:

- А. Ручной
- Б. Ультразвуковой
- В. Пескоструйный
- Г. Сочетанный ручной и ультразвуковой
- Д. Сочетанный ручной и пескоструйный

Подвижность зубов по Энтину II степени характеризуется подвижностью:

- А. в пределах физиологической нормы
- Б. в лунке во всех направлениях вокруг своей оси
- В. в вестибулооральном и медиодистальном направлениях
- Г. в вертикальном направлении
- Д. в вестибулооральном направлении

ПРИ КЛИНИКЕ ОСТРОГО ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- А. Диабет
- Б. Заболевание крови
- В. Гастрит
- Г. Язвенную болезнь желудка
- Д. Острый панкреатит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Инфильтрации и абсцедирования
 - Б. Внедрение инородного тела
 - В. Из гранулемы, тяжа причинного зуба
 - Г. Из гранулемы
 - Д. Хроническая
 - Е. Обострившееся хроническое
 - 1. Неодонтогенная гранулема развивается в следствие
 - 2. Одонтогенная гранулема состоит
 - 3. Неодонтогенная гранулема состоит
 - 4. Течение подкожной гранулемы
 - 5. Стадии клинического течения одонтогенной подкожной гранулемы лица
- А. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3
Б. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4
В. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОКАЗАНЫ ДЛЯ ЛИЦ

- А. Кариесвосприимчивых
- Б. Кариерезистентных
- В. Молодого возраста
- Г. В детском возрасте.
- Д. Пожилого возраста

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

- А. Нижнелуночковый и язычный
 - Б. Слизистая оболочка в пределах резцов и клыков с обеих сторон
 - В. Верхние моляры и соответствующий участок слизистой оболочки альвеолярного отростка с вестибулярной стороны
 - Г. Резцы, клыки и премоляры, альвеолярный отросток и его слизистая оболочка с вестибулярной стороны, мягкие ткани подглазничной области
 - Д. Разновидность мандибулярной анестезии
1. Зона обезболивание при инфраорбитальной анестезии
 2. Зона обезболивание при туберальной анестезии
 3. Обезболивание по Егорову – это:
 4. Зона обезболивания резцовой анестезии
 5. При внутриротовой мандибулярной анестезии происходит выключение чувствительных ветвей:
- А. А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 1
 - Б. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3
 - В. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3

ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ ГИНГИВО-СТОМАТИТ СОПРОВОЖДАЕТ ТЕЧЕНИЕ

- А. Сифилиса
- Б. ВИЧ-инфекции
- В. Красной волчанки
- Г. Хронического герпетического стоматита
- Д. Многоформной экссудативной эритемы

При изготовлении литой цельнометаллической коронки моделировка воском анатомической формы производится в объеме (по сравнению с естественным зубом):

- А. равном
- Б. меньшем на толщину 1мм
- В. большем на толщину 1мм
- Г. меньшем на толщину компенсационного лака
- Д. большем на толщину компенсационного лака

ЖЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ, ПРОХОДЯЩЕЕ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ, ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А. Глоссита
- Б. Глоссалгии
- В. Ромбовидного глоссита
- Г. Десквамативного глоссита
- Д. Невралгия тройничного нерва

Местноанестезирующий препарат, не оказывающий значительного влияния на сосуды:

- А. лидокаин
- Б. артикаин
- В. прокаин (новокаин)
- Г. мепивакаин
- Д. бупивакаин

ВОЗБУДИТЕЛЕМ РОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Эпидермальный стафилококк
- Б. Пемолитический стрептококк
- В. Бактероиды, клостридии
- Г. Кишечная и синегнойная палочки
- Д. Актиномицеты

К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТ

- А. Болезнь Боуэна и пигментную ксеродермию
- Б. Актинический кератоз, радиационный дерматоз, предраковый меланоз
- В. Бородавчатый (узелковый) предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, абразивный хейлит Манганотти
- Г. Эритроплакию, бородавчатый предрак, ограниченный гиперкератоз, абразивный хейлит Манганотти
- Д. Болезнь Боуэна, лейкоплакия, хроническая трещина губы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Седативный эффект

Б. Замедляет процесс заживления раны

В. Атропин

Г. Гексенал

1. Побочный эффект от новокаина

2. Побочный эффект от тримекаина

3. При передозировке новокаина вводят:

4. При передозировке лидокаина вводят:

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3

Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4

В. А – 1, Б – 2, В – 4, Г – 3

Создание чрезмерной конусности стенок при препарировании под металлокерамическую коронку приводит к:

А. неэстетичности коронки;

Б. снижению прочности коронки;

В. к травме десны;

Г. к ослаблению фиксации коронки;

Д. делает коронку более долговечной.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Заболевание:

А. Острый пульпит

Б. Пульпит хронический

В. Пульпит неуточненный

Г. Пульпит хронический язвенный Код по МКБ-10:

1. K04.09

2. K04.01

3. K04.03

4. K04.04

А. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Б. 1Г, 2В, 3А, 4Б

В. 1Г, 2А, 3В, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Методы лечения:

А.Герметизация фиссур

Б.Реминерализующая терапия

В.Препарирование и пломбирование полостей

Г.Обучение гигиене полости рта Стадии кариеса:

1.Стадия пятна

2.Кариес эмали

3.Кариес дентина

4.Осложненный кариес

А. 1АБГ, 2АБВГ, 3ВГ, 4Г

Б. 1АБГ, 2АВГ, 3ВГ, 4Г

В. 1АБГ, 2АБВГ, 3Г, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Низкий уровень иммунитета, выраженная сенсibilизация организма, слабовирулентная микрофлора

Б. Низкий уровень иммунитета, выраженная сенсibilизация организма и значительная вирулентность микрофлоры

В. Кариозные зубы, пародонтит, зубные отложения, тонзиллиты

Г. Достаточная напряженность иммунитета, низкий уровень сенсibilизации организма, высокая вирулентность микрофлоры

Д. Тонзиллиты

1. Наиболее частая причина сенсibilизации организма к хронической инфекции

2. Нормергическая форма воспаления наблюдается при

3. Гиперергическая форма воспаления развивается при

4. Гипоергическая форма воспалительной реакции возникает при

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Грипп, корь, краснуха, болезнь Боткина
Б. Прогрессирование и неблагоприятный исход процесса
В. Гнойно – воспалительные процессы
Г. Аллергические и паразитарные заболевания
Д. Воспалительные заболевания, интоксикация
Е. Мононуклеоз, туберкулез, сифилис
1. Лейкоцитоз наблюдается при заболеваниях:
2. Лейкопения чаще встречается при заболеваниях:
3. Токсическая зернистость лейкоцитов указывает на:
4. Нейтрофилез указывает на:
5. Эозинофилия встречается при:
6. Лимфоцитоз развивается при:
- А. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6
Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 6
В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6

ДИАГНОЗ "ГЛУБОКИЙ КАРИЕС" СООТВЕТСТВУЕТ ДИАГНОЗУ ПО МКБ-10:

- А. Кариес эмали
Б. Кариес дентина
В. Кариес цемента
Г. Гиперемия пульпы
Д. Рецидивирующий кариес

Пациенту с язвенно-некротическим стоматитом необходимо обработать слизистую оболочку полости рта антибактериальным препаратом. Какой местный анестетик следует использовать для поверхностного обезболивания слизистой оболочки

- А. бупивакаин
Б. мепивакаин
В. артикаин
Г. прокаин (новокаин)
Д. лидокаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Строфантин, коргликон

Б. Бемегрид

В. Эуфиллин, дипрофиллин

Г. Кордиамин

Д. Нитроглицерин, изокет, нитроминт

1. Дыхательные analeptiki

2. Сердечные гликозиды

3. Антагонист гексенала и тиопентала натрия

4. Бронхолитики

5. Антиангинальные препараты

А. А – 1, Б – 3, В – 4, Г – 2, Д – 5

Б. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1, Д – 5

В. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 5, Д – 1

ПРИ ВКЛОЧЕННОМ ВЫВИХЕ РЕЗЦОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

А. Оставить под наблюдение

Б. Провести шинирование и оставить под наблюдение

В. Репозировать

Г. Депульпировать и репозировать

Д. Удалить

ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А. Наследственность

Б. Наличие микробного налета

В. Вредные привычки

Г. Подвижность зубов

Д. Травма

Препарат, используемый для всех видов местной анестезии:

А. мепивакаин

Б. лидокаин

В. бензокаин (анестезин)

Г. прокаин (новокаин)

Д. артикаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Методы реставрации:

А.Пломба

Б.Прямой винир

В.Непрямой винир

Г.Искусственная коронка Показания:

1.Изменения цвета зуба после эндодонтического лечения

2.Незначительный по площади клиновидный дефект

3.Диастема

4.Флюороз

А. 1БВ, 2А, 3БВГ, 4БВ

Б. 1БВ, 2А, 3БВ, 4БВ

В. 1БВ, 2БА, 3БВГ, 4БВ

При припасовке литых мостовидных протезов, точность прилегания коронок к культиям опорных зубов оценивается с помощью:

А. эластического слепочного материала

Б. базисного воска

В. гипса

Г. копировальной бумаги

Д. моделировочного воска

Для спайки коронок из нержавеющей стали применяют припой на основе:

А. золота

Б. серебра

В. платины

Г. титана

Д. кадмия

Укажите формулу зуба, для лечения пульпита которого необходимо провести проводниковую анестезию с анестетиком на основе артикаина

А. зуб 4.7

Б. зуб 2.4

В. зуб 3.5

Г. зуб 4.1

Д. зуб 3.2

Анатомическая шейка зуба соответствует:

- А. границе над- и поддесневой частей зуба
- Б. экватору зуба
- В. переходу эмали в цемент корня
- Г. дну зубодесневого желобка
- Д. дну патологического зубодесневого кармана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

А. 2 недели

Б. 1 неделя

В. 19 – 23 сутки

Г. 3 недели

Д. 16 – 18 день

1. Сроки эпителизации лунок однокорневых зубов в норме

2. Сроки эпителизации лунок многокорневых зубов в норме

3. Задержка эпителизации лунок однокорневых зубов при воспалении

4. Задержка эпителизации лунок многокорневых зубов при воспалении

5. Сроки полного заполнения лунки грануляционной тканью в норме

А. А – 4,5, Б – 1, В – 2, Д -3

Б. А – 4,5, Б – 3, В – 1, Д -2

В. А – 4,5, Б – 3, В – 2, Д -1

Промежуточная часть мостовидного протеза в области боковых зубов по отношению к десне:

А. не касается

Б. прилегает к ней по всей поверхности

В. прилегает только на скатах альвеолярного гребня

Г. касается по вершине альвеолярного гребня в двух точках

Д. касается по вершине альвеолярного гребня в одной точке

Все боковые стенки опорных зубов при изготовлении паяного мостовидного протеза препарируются:

А. с наклоном в сторону дефекта зубного ряда

Б. параллельно между собой

В. с наклоном в сторону от дефекта зубного ряда

Г. параллельно с рядом стоящим зубом

Д. только параллельно продольной оси зуба

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Монокультура анаэробов

Б. Гиперкапния, аэрация тканей

В. Аэробы, факультативные и облигатные анаэробы

Г. Бактероиды, фузобактерии

Д. Монокультура стафилококка

Е. Кишечная палочка, протей

1. Бактерии, вызывающие гнойно – воспалительные процессы в челюстно - лицевой области

2. К облигатным неспорообразующим бактериям относятся

3. Условия не способствующие развитию бактериальной инфекции

4. При нагноении лимфоузлов из гнойных очагов высеваются

5. Микроорганизмы, которые чаще всего высеваются при одонтогенных абсцессах

А. А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 2, Д – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 2, Д – 4

В. А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 4

УКАЗАТЬ ОШИБКИ ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

А. Отлом истонченной стенки коронковой части зуба

Б. Неполное удаление инфицированного дентина, химический ожог пульпы зуба

В. Нависающий край пломбы, отсутствие контактного пункта

Г. Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба

Д. Десневое кровотечение

НИТРОМИНТ-АЭРОЗОЛЬ (НИТРОСПРЕЙ) - СРЕДСТВО ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ

А. судорожного припадка

Б. приступа бронхиальной астмы

В. приступа стенокардии

Г. гипертонического криза

Д. стенотической асфиксии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Размер частиц Наполнителя:

А. 0,04-0,4 мкм

Б. 0,04-5 мкм

В. 8-45 мкм

Г. 1-5 мкм Класс композитного материала:

1. Макронаполненные

2. Микронаполненные

3. Мининаполненные

4. Гибридные

А. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Б. 1В, 2А, 3Г, 4Б

В. 1А, 2В, 3Г, 4Б

Провести депульпирование зуба

2.4 под инфильтрационной анестезией позволяют местноанестезирующие препараты на основе:

А. мепивакаина

Б. лидокаина

В. бензокаина (анестезина)

Г. артикаина

Д. прокаина (новокаина)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А. Абсцедирование

Б. Подвижность зубов 2 степени

В. Патология прикуса

Г. Сахарный диабет

Д. Кровоточивость десен

Коэффициенты выносливости пародонта зубов, предложенные

В.Ю. Курляндским, получены на основании данных исследований:

А. анатомических особенностей строения зубов;

Б. подвижности зубов;

В. жевательных проб;

Г. абсолютной силы жевательных мышц;

Д. гнатодинамометрии.

ДЛЯ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ В ОСТРОЙ СТАДИИ ХАРАКТЕРНО

- А. Наличие свищевых ходов по переходной складке в очаге поражения, гиперемия и болезненность мягких тканей
- Б. Воспалительный инфильтрат в области переходной складки
- В. Гиперемия и болезненность мягких тканей, инфильтрация надкостницы по переходной складке
- Г. Воспалительная инфильтрация надкостницы и мягких тканей, прилежащих к очагу поражения челюсти с вестибулярной и оральной поверхности
- Д. Воспалительная инфильтрация мягких тканей, прилежащих к очагу поражения челюсти с вестибулярной и оральной поверхности

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТИФТА ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ КОРНЯ СОСТАВЛЯЕТ

- А. 1/3
- Б. 1/2
- В. 2/3
- Г. Всю длину корня
- Д. Длина штифта не имеет значения

ВЕРРУКОЗНУЮ ЛЕЙКОПЛАКИЮ ОТНОСЯТ

- А. К раку
- Б. К дерматозу
- В. К облигатному предраку
- Г. К факультативному предраку

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССОВ И ФЛЕГМОН ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Новокаиновая блокада с антибиотиками
- Б. Послойное вскрытие гнойного очага с введением дренажа
- В. Удаление причинного зуба
- Г. Проведение физиотерапии
- Д. Дезинтоксикационная терапия

Укажите процентную концентрацию раствора лидокаина, применяемого в стоматологической практике для инфильтрационной и проводниковой анестезии

- А. 0.5%
- Б. 2%
- В. 3%
- Г. 4%
- Д. 1%

На этапе "проверка конструкции съемного протеза" при полном отсутствии зубов в случае выявления занижения высоты нижнего отдела необходимо заново определить центральное соотношение челюстей:

- А. сняв боковые зубы с нижнего воскового базиса и приклеив пластинку воска к нему
- Б. с помощью новых восковых базисов с окклюзионными валиками
- В. сняв боковые зубы с верхнего воскового базиса и приклеив пластинку воска к нему
- Г. сняв боковые зубы с верхнего и нижнего восковых базисов и приклеив пластинку воска к нижнему восковому базису
- Д. приклеив пластинку воска на зубы нижнего воскового базиса

ПРИ ТРАВМЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДИТ

- А. Перелом корня
- Б. Вывих
- В. Ушиб
- Г. Скол коронки зуба
- Д. Перелом зуба на уровне шейки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Химическая основа материалов:

А.Керамический полисилоксан

Б.Композит+СИЦ

В.Органическая полимерная Матрица+наполнитель

Г.Акриловые или апоксидные Полимеры Группы пломбировочных материалов:

1.Компомеры

2.Композиты

3.Ормомеры

4.Пластмассы

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1Б, 2А, 3В, 4Г

В. 1Б, 2В, 3А, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Эпителиальные клетки

Б. Мезенхимальные клетки наружного слоя зубного мешочка

В. Макрофаги

Г. Апикальные, апиколатеральные, латеральные, межкорневые

Д. Простая, сложная кистогранулема

Е. 0, 5 см.

Ж. 0, 5 – 1 см.

1. Развитие периодонта происходит за счет

2. Особенностью тканей периодонта является наличие

3. По локализации гранулемы различают

4. Размеры гранулемы не превышают

5. Размеры кистогранулемы

А. А – 2, Б – 3, Г – 1, Е – 4, Ж – 5

Б. А – 2, Б – 1, Г – 4, Е – 3, Ж – 5

В. А – 2, Б – 1, Г – 3, Е – 4, Ж – 5

Укажите группу препаратов, усиливающую и пролонгирующую действие местноанестезирующих средств:

А. возбуждающие средства

Б. спазмолитики

В. α-адреномиметики

Г. М-холиномиметики

Д. α-адреноблокаторы

Культевые штифтовые вкладки методом литья изготавливают из:

А. пластмассы

Б. легкоплавкого металла

В. сплавов металлов

Г. композиционных материалов

Д. воска

ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ЦЕМЕНТ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ ЯВИТЬСЯ В КЛИНИКУ ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО ОСМОТРА:

А. Один раз в месяц

Б. Один раз в полгода

В. Один раз в год

Г. Только при возникновении жалоб

Д. По желанию пациента

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Жалобы:

А. Незначительные болевые ощущения при накусывании на зуб

Б. Постоянные, постепенно нарастающие боли, «симптом выросшего зуба», болезненное накусывание на зуб

В. Постоянные ноющие, пульсирующие боли, болезненность при накусывании

Г. Часто протекает бессимптомно Заболевание:

1. Острый апикальный периодонтит

2. Хронический апикальный периодонтит

3. Корневая киста

4. Периапикальный абсцесс без свища

А. 1Б, 2А, 3В, 4Г

Б. 1Б, 2А, 3Г, 4В

В. 1Б, 2В, 3Г, 4А

Укажите местный анестетик группы сложных эфиров:

А. лидокаин

Б. прокаин (новокаин)

В. артикаин

Г. бупивакаин (маркаин)

Д. мепивакаин (скандонест)

ВЫДЕЛИТЕ СИМПТОМ, НЕ УКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ В КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ КОЛЛАПСА

А. артериальная гипотония

Б. бледные, холодные и влажные кожные покровы

В. гипотонус

Г. расширенный зрачок

Д. двигательное беспокойство

Допускается постановка искусственных зубов в съёмном пластиночном протезе кпереди от центра альвеолярного гребня на 2/3 их длины в области:

А. передних зубов нижней челюсти

Б. передних зубов верхней челюсти

В. боковых зубов нижней челюсти

Г. боковых зубов верхней челюсти

Д. передних и боковых зубов нижней челюсти

ИНИЦИАТОРОМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Камфорохинон
- Б. Пероксид бензоила
- В. Ароматические амины
- Г. Пероксид бензоила и ароматические амины
- Д. Камфорохинон и ароматические амины

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Понижение АД

Б. Повышение АД

В. Не влияет

Г. Барбитураты

Д. Миорелаксанты

Е. Атропин или метацин

1. Влияние эфира для наркоза на АД

2. Влияние фторотана на АД

3. Препараты, расслабляющие скелетную и дыхательную мускулатуру

4. Препараты, применяемые для подавления саливации при наркозе

5. Влияние кеталара на АД

А. А – 2, Б – 1,5, Д – 4, Е – 3

Б. А – 2, Б – 1,5, Д – 3, Е – 4

В. А – 1, Б – 2,5, Д – 3, Е – 4

Укажите местный анестетик, используемый в стоматологии около 100 лет

- А. бупивакаин
- Б. мепивакаин
- В. артикаин
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. лидокаин

Противопоказанием к изготовлению искусственной коронки является:

- А. подвижность зуба третьей степени
- Б. патологическая стираемость твердых тканей
- В. наличие гиперэстезии
- Г. снижение высоты нижнего отдела лица
- Д. необходимость укорочения зуба при феномене Попова-Годона

При изготовлении металлокерамической коронки рабочий оттиск снимают массой:

- А. силиконовой
- Б. альгинатной
- В. фторкаучуковой
- Г. термопластичной
- Д. цинкоксида-эвгеноловой

Зубная формула

2.4 соответствует:

- А. первому премоляру на нижней челюсти справа
- Б. второму премоляру на верхней челюсти справа
- В. второму премоляру на нижней челюсти справа
- Г. первому премоляру на верхней челюсти слева
- Д. первому премоляру на верхней челюсти справа

Укажите высшую (максимально допустимую) разовую дозу артикаина для взрослых:

- А. 2,5 мг/кг
- Б. 3,5 мг/кг
- В. 4,5 мг/кг
- Г. 5 мг/кг
- Д. 7 мг/кг

При изготовлении металлокерамической коронки минимально допускаемая толщина металлического каркаса из неблагородных сплавов:

- А. 0,1 мм;
- Б. 0,2 мм;
- В. 0,25 мм;
- Г. 0,3 мм;
- Д. 0,5 мм.

Анестетик с минимальной активностью в условиях воспаления:

- А. тримекаин
- Б. лидокаин
- В. мепивакаин
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. артикаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Ошибки и осложнения:

А. Нависающий край пломбы, отсутствие контактного пункта

Б. Термический ожог пульпы

В. Вскрытие полости зуба

Г. Дебондинг Этапы лечения, на которых совершены ошибки:

1. Препарирование полости

2. Наложение матрицы

3. Пломбирование полости

4. Полирование пломбы

А. 1БВ, 2А, 3АГ, 4--

Б. 1БВ, 2А, 3Г, 4--

В. 1В, 2А, 3Г, 4--

Требования к корням зубов, используемым для штифтовых конструкций:

А. подвижность 2-3 степени

Б. толщина стенок корня не менее одного миллиметра

В. канал распломбирован на 1/3

Г. расширение периодонтальной щели

Д. канал не запломбирован до верхушки на 1/3

При изготовлении цельнолитой коронки рабочий оттиск получают с помощью массы

А. силиконовой

Б. альгинатной

В. фторкаучуковой

Г. термопластичной

Д. цинкоксида-эвгеноловой

В случае фиксации бокового смещения нижней челюсти на этапе определения центрального соотношения челюстей характер соотношения зубных рядов при проверке конструкции протеза следующий:

А. бугорковый контакт между антагонистами, сагиттальная щель во фронтальном участке, снижение высоты нижнего отдела лица

Б. бугорковый контакт между антагонистами в боковом участке с одной стороны и просвет с другой, завышение высоты нижнего отдела лица

В. фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, высота нижнего отдела лица в норме

Г. фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, снижение высоты нижнего отдела лица

Д. фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, завышение высоты нижнего отдела лица

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЕО-ЛАМПЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ

- А. Гипертонической болезни компенсируемой формы
- Б. Сердечно-сосудистой недостаточности компенсируемой формы
- В. Сердечно-сосудистой недостаточности, компенсируемой электрокардиостимулятором
- Г. Сердечно-легочной недостаточности компенсированной формы
- Д. Сердечно-легочной недостаточности декомпенсированной формы

ПРОСВЕТ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТ ПРИ

- А. аспирационной асфиксии
- Б. обтурационной
- В. клапанной
- Г. стенотической
- Д. странгуляционной

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области боковых зубов проходит:

- А. не касается зубов
- Б. в пришеечной области зубов
- В. по середине коронки зубов
- Г. перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. перекрывая коронки зубов на 2/3

При препарировании зуба под металлокерамическую коронку возможно создание уступа-скоса в пришеечной области под углом:

- А. 135°
- Б. 50°
- В. 70°
- Г. 150°
- Д. 170°

ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ УСТУП ФОРМИРУЕТСЯ

- А. Супрагингивально
- Б. На уровне края десны
- В. Субгингивально на вестибулярной поверхности
- Г. Субгингивально по всему периметру шейки зуба
- Д. Не формируется

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Серозная инфильтрация тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел

Б. Зуд кожи, эозинофилия, в пунктате – клетки Березовского - Штернберга

В. Золотистый стафилококк

Г. Смешанная микрофлора

Д. Гнойное воспаление тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел

Е. Наличие пакетов лимфоузлов, длительный субфебрилитет, положительная реакция Пирке и Манту, наличие в пунктате гигантских клеток Пирогова – Лангханса

Ж. Острое начало заболевания, высокая температура тела, отрицательная проба с актинолизатом

1. Микроорганизм – наиболее частый возбудитель острых лимфаденитов лица и шеи

2. Периаденит

3. Аденофлегмона

4. Характерные признаки туберкулезного лимфаденита

5. Нехарактерные для актиномикоза признаки поражения лимфатических узлов

6. Клиническая симптоматика лимфогрануломатоза

А. А – 3, Б – 6, В – 1, Д – 2, Е – 4, Ж – 5

Б. А – 2, Б – 6, В – 1, Д – 3, Е – 5, Ж – 4

В. А – 2, Б – 6, В – 1, Д – 3, Е – 4, Ж – 5

Разборная гипсовая модель отливается при изготовлении:

А. штампованной коронки

Б. цельнолитой коронки

В. бюгельного протеза

Г. съемного мостовидного протеза

Д. пластиночного протеза

Показанием к постановке искусственных зубов на «приточке» в съёмном пластиночном протезе на верхней челюсти является:

А. чрезмерная выраженность альвеолярной части нижней челюсти

Б. чрезмерная выраженность альвеолярного отростка верхней челюсти в области боковых зубов

В. «короткая» нижняя губа

Г. «короткая» верхняя губа

Д. выраженная уздечка нижней губы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Сложные эфиры

Б. Амиды

В. Этиловые эфиры

Г. Артикаин и гидрохлорид

Д. Барбитураты

1. Прилокаин относится к группе:

2. Мепивакаин относится к группе:

3. Бупивакаин относится к группе:

4. Ультракаин относится к группе:

5. Новокаин относится к группе:

А. А – 5, Б – 1,2, Г – 4,3

Б. А – 5, Б – 1,2,3, Г – 4

В. А – 2, Б – 1,3,4, Г – 5

МИКРОПРОТЕЗ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБА И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ВСЮ ОККЛЮЗИОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

А. Pinlay

Б. Inlay

В. Onlay

Г. Overlay

Д. Ney

ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ У РЕБЕНКА ПОЛУТОРА ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

А. Оставить под наблюдение

Б. Провести шинирование и оставить под наблюдение

В. Репозировать

Г. Депульпировать и репозировать

Д. Удалить

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Осложнения:

А.Отсутствие сухого блеска

Б.Дебондинг

В.Ожог пульпы

Г.Интоксикация пульпы Ошибки при изготовлении прямых виниров:

1.при препарировании

2.при протравливании и нанесении адгезива

3.при работе с композитом

4.при шлифовании и полировании

А. 1Г, 2В, 3Б, 4А

Б. 1В, 2Г, 3Б, 4А

В. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Признаки периодонтита

Б. Заболевания, характеризующиеся распространением воспалительного процесса с периодонта на надкостницу альвеолярного отростка и тело челюсти

В. Инфекционно – аллергический, гнойно – некротический процесс, который развивается в кости под воздействием внешних или внутренних факторов

Г. Очаги разрежения костной ткани различных размеров

Д. Удаление причинного зуба, декомпрессия тканей (в т.ч. костной), дренирование очагов воспаления

Е. Удаление или лечение причинного зуба (по показаниям), вскрытие абсцесса

1. Периостит

2. Остеомиелит

3. Изменения на рентгенограмме при остром периостите

4. Изменения на рентгенограмме при остром одонтогенном остеомиелите на ранних стадиях

5. Оперативное лечение острого одонтогенного периостита

6. Оперативное лечение острого одонтогенного остеомиелита

А. А – 3,4, Б – 1, В – 2, Д – 6, Е - 5

Б. А – 4, Б – 1, В – 2, Д – 6, Е - 5

В. А – 3,4, Б – 2, В – 1, Д – 6, Е - 5

Моделировка литой коронки может проводиться без использования "адапты":

- А. базисным воском;
- Б. бюгельным воском;
- В. погружным воском;
- Г. липким воском;
- Д. воском для мостовидных работ;

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Острый периодонтит
- Б. Обострившийся хронический периодонтит
- В. Нагноившаяся радикулярная киста
- Г. Общий гнойный пульпит
- Д. Альвеолит

Для припасовки штампованной коронки в клинике врач получает коронку:

- А. на гипсовом столбике
- Б. на гипсовой модели
- В. на металлическом штампе
- Г. без штампа
- Д. готовую коронку (отполированную)

ПРИЧИННЫЙ ЗУБ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ

- А. Сохраняют обязательно
- Б. Шинируют
- В. Депульпируют
- Г. Удаляют по показаниям
- Д. Удаляют обязательно

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ВОСПАЛЕНИЯ ДЕСНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Деформация десневых сосочков
- Б. Некроз десневых сосочков
- В. Кровоточивость при зондировании десневых сосочков
- Г. Резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок
- Д. Наличие пародонтального кармана

Показанием к изготовлению мостовидного протеза является:

- А. дефект коронковой части зуба
- Б. патологическая стираемость
- В. пародонтит тяжелой степени
- Г. включенный дефект зубного ряда
- Д. концевой односторонний дефект зубного ряда

УКАЗАТЬ ОШИБКИ ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

- А. Нависающий край пломбы
- Б. Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба
- В. Химический ожог пульпы зуба
- Г. Хроническое воспаление десневого края
- Д. Отсутствие контактного пункта

При какой реакции среды местные анестетики наиболее активны:

- А. нейтральной
- Б. слабощелочной
- В. слабокислой
- Г. кислой
- Д. щелочной

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЭТО ОСЛОЖНЕНИЕ

- А. приступ стенокардии
- Б. острая почечная недостаточность
- В. инфаркт миокарда
- Г. нарушение мозгового кровообращения
- Д. аритмия

КАКУЮ ФОРМУ ИМЕЕТ СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ВНЧС

- А. Шаровидную
- Б. Овальную
- В. Эллипсовидную
- Г. Цилиндрическую
- Д. Дисковидную

ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ ПО II КЛАССУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- А. Стеклоиономерный цемент
- Б. Поликарбоксилатный цемент
- В. Гибридный композиционный материал
- Г. Микрофильный композиционный материал
- Д. Компомер

При починке съемного протеза на нижней челюсти в связи с потерей естественного зуба необходимо получить оттиск с:

- А. нижней челюсти без протеза;
- Б. нижней челюсти с протезом;
- В. верхней челюсти и нижней челюсти без протеза;
- Г. нижней челюсти с протезом и верхней челюсти;
- Д. оттиск снимать не нужно.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ НАЗНАЧАЮТ
МАЗИ

- А. Фотозащитные
- Б. Кортикостероидные
- В. Противовоспалительные
- Г. Антибактериальные
- Д. Регенерирующие

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Классы композитных материалов:

- А. Текущие, жидкие**
- Б. Микронаполненные**
- В. Гибридные**
- Г. Универсальные** Признаки классификации:

- 1. По размеру частиц наполнителя**
- 2. По клиническому назначению**
- 3. По плотности**
- 4. По способу полимеризации**

- А. 1БВ, 2Г, 3А, 4--
- Б. 1В, 2Г, 3А, 4--
- В. 1БВ, 2ВГ, 3А, 4--

СЛИВАЮЩИЕСЯ В РИСУНОК ПАПУЛЫ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА ХАРАКТЕРНЫ
ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- А. Лейкоплакия
- Б. Герпес
- В. Красная волчанка
- Г. Плоский лишай
- Д. Опоясывающий лишай

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Не ранее, чем через 2 недели

Б. Гайморотомия с пластикой соустья

В. Можно, при наличии кровотечения

Г. Можно во всех случаях

Д. Нельзя

Е. Промывание пазухи растворами антисептиков, пластика соустья после ликвидации воспаления

1. Хирургическая тактика врача при перфорации верхнечелюстной пазухи во время удаления зуба на фоне острого гайморита (без наличия корня зуба в пазухе)

2. Метод удаления корня зуба, внедренного в верхнечелюстную пазуху

3. Можно ли тампонировать лунку йодоформным тампоном при перфорации дна верхнечелюстной пазухи?

4. Наиболее благоприятные сроки для удаления корня зуба, внедренного в мягкие ткани во время удаления

А. А – 4, Б – 2, Д – 3, Е – 1

Б. А – 4, Б – 2, Д – 1, Е – 3

В. А – 4, Б – 3, Д – 2, Е – 1

При изготовлении цельнолитых коронок применяется сплав золота пробы:

А. 750

Б. 375

В. 583

Г. 900

Д. 915

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Коринфар, капотен

Б. Аминокапроновая кислота или памба

В. Ятрогенное

Г. Идиопатическое

Д. Рутин или аскорутин

Е. фитоменадион или дицинон

1. При гипопротромбинемии для остановки кровотечения назначают:

2. Кровотечение, возникшее после хирургического вмешательства

3. При повышении фибринолитической активности для остановки кровотечения назначают:

4. Для остановки кровотечения при повышенной проницаемости сосудов назначают:

5. Для остановки кровотечения при повышенном АД назначают:

А. А – 5, Б – 3, В – 2, Д – 4, Е – 1

Б. А – 5, Б – 3, В – 2, Д – 1, Е – 4

В. А – 5, Б – 2, В – 3, Д – 4, Е – 1

Высшая (максимально допустимая) разовая доза лидокаина:

А. 2,2 мг/кг

Б. 4,4 мг/кг

В. 5,0 мг/кг

Г. 6 мг/кг

Д. 7 мг/кг

Наиболее высокой диффузионной способностью обладает:

А. лидокаин

Б. артикаин

В. прокаин (новокаин)

Г. мепивакаин

Д. бупивакаин

Гипертония – состояние, при котором величина АД стойко превышает

А. 120\80 мм.рт.ст

Б. 125\80 мм.рт.ст

В. 130\80 мм.рт.ст

Г. 135\85 мм.рт.ст

Д. 140\90 мм.рт.ст

Проверка окклюзионных контактов на этапе припасовки искусственной коронки проводится в окклюзиях:

- А. сагиттальных
- Б. сагиттальных и центральной
- В. центральной и боковых
- Г. боковых и сагиттальных
- Д. сагиттальных, боковых и центральной

Укажите местный анестетик, действующий наиболее длительно:

- А. лидокаин
- Б. бупивакаин
- В. прокаин (новокаин)
- Г. артикаин
- Д. мепивакаин

Укажите осложнение, наиболее часто наблюдаемое при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов.

- А. язвенно-эрозивный эффект
- Б. лейкопения
- В. повышение артериального давления
- Г. гепатит
- Д. понижение артериального давления

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области передних зубов проходит:

- А. не касается зубов
- Б. в пришеечной области зубов
- В. посередине коронки зубов
- Г. перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. перекрывая коронки зубов на 2/3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. 120 – 160

Б. 4,5 – 5

В. 200 – 400

Г. 0,8 – 1

Д. 0 – 5 %

Е. 20 – 30 %

1. Количество эритроцитов у здоровых людей ($\times 10^{12}$ в 1 л.)

2. Содержание гемоглобина в крови здоровых взрослых людей.

3. Цветовой показатель в норме

4. Количество тромбоцитов у здоровых людей ($\times 10^9$ в 1 л.)

5. Количество лимфоцитов в мазке крови взрослого человека (на 100 клеток)

6. Количество эритроцитов в мазке крови взрослого человека (на 100 клеток)

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 6, Е – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5, Е – 6

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 6, Е – 5

ПУЛЬС У ПАЦИЕНТА БЕЗ СОЗНАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ НАД ПРОЕКЦИЕЙ

А. лучевой артерии

Б. плечевой

В. наружной сонной

Г. локтевой

Д. общей сонной

НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА У ВЗРОСЛЫХ ВЫПОЛНЯЮТ С ЧАСТОТОЙ

А. 60 компрессий в 1 мин

Б. 60 – 80 в 1 мин

В. 80 в 1 мин

Г. 80 - 100 в 1 мин

Д. не менее 100 в 1 мин

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОСТИ ПО V КЛАССУ СКОС ПРЕПАРИРУЮТ

А. По эмали

Б. По цементу корня

В. По эмали и цементу корня

Г. Не формируют

Д. На усмотрение врача

НАЛИЧИЕ У РЕБЕНКА УСТОЙЧИВОЙ ПРИВЫЧКИ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ПОСТОЯННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ЯЗЫКА МЕЖДУ ЗУБАМИ, ФОРМИРУЕТ

- А. Мезиальную окклюзию
- Б. Глубокую резцовую окклюзию
- В. Дистальную окклюзию
- Г. Вертикальную резцовую дизокклюзию
- Д. Вестибулоокклюзию

За степень атрофии лунки зуба принимается размер, полученный при зондировании патологического зубодесневого кармана в области:

- А. медиальной стороны
- Б. дистальной стороны
- В. наибольшей атрофии
- Г. вестибулярной поверхности
- Д. оральной поверхности

Схема, отображающая состояние опорно-удерживающего аппарата зубов верхней и нижней челюстей, называется

- А. Мастиокациографией
- Б. Гнатодинамометрией
- В. Реопародонтограммой
- Г. Одонтопародонтограммой

Эмалевая микроабразия - это удаление поверхностного слоя эмали с помощью

- А. Пескоструйного аппарата типа хендибластер
- Б. Воздействия концентрированных кислот
- В. Воздействия щелочей
- Г. Препарирования алмазными борами мелкозернистыми

Аппаратным методом исследования жевательных мышц является

- А. Периотестометрия
- Б. Электромиография
- В. Функциография
- Г. Реопародонтография

Правильная последовательность применения полировочных паст с фторидами считается

- А. Крупнозернистая, среднезернистая, мелкозернистая
- Б. Среднезернистая, крупнозернистая, мелкозернистая
- В. Мелкозернистая, среднезернистая, крупнозернистая
- Г. Крупнозернистая, мелкозернистая, среднезернистая

При кариесе эмали

- А. Боль при зондировании стенок кариозной полости
- Б. Боль при зондировании по дну кариозной полости в одной точке
- В. Зондирование болезненно по всему дну кариозной полости
- Г. Зондирование безболезненное

Исследование кровообращения в тканях пародонта называют

- А. Миотонометрией
- Б. Реопародонтографией
- В. Электромиографией
- Г. Мasticациографией

Для расчёта показателя заболеваемости конкретным заболеванием необходимы данные о числе случаев конкретного заболевания и

- А. Среднегодовой численности населения
- Б. Числе случаев заболеваний в предыдущие годы
- В. Числе лиц, прошедших медосмотр
- Г. Численности трудоспособного населения

Эпидемиологическое стоматологическое обследование населения проводят специалисты

- А. Стоматологические медицинские сестры
- Б. Гигиенисты
- В. Врачи-эпидемиологи
- Г. Врачи-стоматологи

О наличии пародонтального кармана судят по

- А. Кровоточивости десны
- Б. Погружению зонда на глубину 3 мм и более
- В. Погружению зонда на глубину менее 3 мм
- Г. Изменению на рентгенограмме

Клиническим методом диагностики кандидоза является

- А. Исследование мазка на наличие флоры
- Б. Опрос
- В. Клинический анализ крови
- Г. Рентгенография

Детектор кариеса используют для выявления _____ дентина

- А. Вторичного
- Б. Иррегулярного
- В. Третичного
- Г. Кариозного

При электроодонтодиагностике пассивный электрод фиксируется

- А. На шее
- Б. На губе пациента
- В. На плече
- Г. В руке пациента

Специфическим лимфаденитом называется лимфаденит, вызванный

- А. Кишечной палочкой
- Б. Стрептококком
- В. Лучистым грибом
- Г. Стафилококком в сочетании со стрептококком

При плобмировании амальгамой кариозных полостей II класса в качестве изолирующей прокладки применяют

- А. Силицин
- Б. Цинк-сульфатный цемент
- В. Фосфат-цемент
- Г. Искусственный дентин (дентин-паста)

Пломбирование каналов молочных резцов с разрушенной коронкой производят

- А. Фосфат-цементом
- Б. Водным дентином
- В. Пастой из окиси цинка на масляной основе
- Г. Штифом

При обнажении поверхности корня зуба на 6 мм и кармане в 5 мм следует предположить

- А. Язвенно-некротический гингивит
- Б. Пародонтит тяжелой степени
- В. Фиброматоз десны
- Г. Гипертрофический гингивит фиброзной формы

Площадь стоматологического кабинета должна составлять не менее (в кв.м)

- А. 7
- Б. 14
- В. 12
- Г. 10

Равномерное горизонтальное снижение высоты межальвеолярных перегородок до 1/3 является рентгенологическим признаком _____ степени

- А. Пародонтоза легкой
- Б. Пародонтоза средней
- В. Пародонтита средней
- Г. Пародонтита легкой

Доза фтора в питьевой воде, при которой развивается деструктивная форма флюороза, составляет

- А. 1 Мг/л
- Б. 0,5 Мг/л
- В. 2–3 Мг/л
- Г. 7–9 и выше мг/л

Для некротизации пульпы достаточно мышьяковистой пасты (в г)

- А. 0,1
- Б. 0,001
- В. 0,01
- Г. 0,0008

Пародонтальную повязку применяют для

- А. Шинирования зубов перед операцией
- Б. Защиты кровяного сгустка от внешних воздействий после кюретажа
- В. Шинирования зубов после операции
- Г. Заполнения кармана во время гингивэктомии

При фиксации абатмента к аналогу имплантата на разборной рабочей модели следует прикладывать усилие (в н/см²)

- А. 25
- Б. 10
- В. 15
- Г. 35

Для удаления измененного дентина используют ____ бор

- А. Пламевидный
- Б. Шаровидный с алмазным напылением
- В. Шаровидный твердосплавный
- Г. Фиссурный

Согласно современным санитарно-эпидемиологическим требованиям количество установок в кабинете терапевтической стоматологии не должно превышать

- А. Пяти
- Б. Четырех
- В. Трех
- Г. Двух

Эпителий зубного зачатка является основой для образования

- А. Цемента
- Б. Дентина, пульпы
- В. Эмали, насмитовой оболочки
- Г. Альвеолярной костной ткани

К клинической картине при полном вывихе временного или постоянного зуба относится

- А. Укорочение видимой части коронки
- Б. Пустая лунка зуба
- В. Увеличение видимой части коронки
- Г. Смещение коронки в сторону

Хронический гипертрофический пульпит является следствием

- А. Острого очагового пульпита
- Б. Хронического фиброзного пульпита (длительное течение)
- В. Глубокого кариеса
- Г. Хронического гангренозного пульпита

Ориентиром вкола иглы при анестезии верхнечелюстного нерва по вайсблату является

- А. Середина трагоорбитальной линии
- Б. Скулоальвеолярный гребень
- В. Крыло носа
- Г. Суставной бугорок

К клинической характеристике эмали зубов при системной гипоплазии относят

- А. Хрупкую, слущивающуюся эмаль
- Б. Меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- В. Симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации
- Г. Окрашивание коронок зубов в жёлтый цвет

Для обработки воспаленной слизистой оболочки рта детей первых месяцев жизни применяют _____ пероксида водорода раствор (в процентах)

- А. 3
- Б. 0,5
- В. 10
- Г. 2

Для определения центральной окклюзии в клинику поступают гипсовые модели

- А. С восковыми базисами и окклюзионными валиками
- Б. С восковыми базисами и искусственными зубами
- В. С восковыми базисами, установленные в окклюдатор
- Г. Установленные в артикулятор

Детям рекомендуется использовать фторидсодержащие ополаскиватели с возраста (лет)

- А. 6
- Б. 12
- В. 2
- Г. 4

Первый постоянный моляр прорезывается в возрасте (лет)

- А. 6
- Б. 4
- В. 10
- Г. 12

Наиболее неблагоприятным при развитии заболеваний пародонта является _____ прикус

- А. Дистальный
- Б. Открытый
- В. Прямой
- Г. Глубокий

К эндогенной причине развития повышенного стирания зубов относят

- А. Профессиональные вредности
- Б. Зубочелюстные аномалии
- В. Нарушение функции эндокринной системы
- Г. Функциональную перегрузку зубов

Чаще всего причиной одонтогенного остеомиелита челюстей в период временного прикуса являются

- А. Боковые резцы
- Б. Клыки
- В. Центральные резцы
- Г. Моляры

При удалении нижнего второго моляра проводят анестезию

- А. По Берше
- Б. Торусальную по Вейсбрем
- В. По Егорову
- Г. По Гоу-Гейтсу

Методом стоматологического просвещения является

- А. Выставки средств гигиены
- Б. Беседа с пациентом
- В. Брошюры и буклеты
- Г. Телевизионная реклама

Самостоятельное использование флоссов рекомендуется с возраста _____ лет

- А. 4-5
- Б. 6-8
- В. 9-12
- Г. 15-16

Одним из методов лечения зубов при системной гипоплазии эмали является

- А. Удаление наиболее пораженных зубов с последующим ортодонтическим лечением
- Б. Электроодонтодиагностика
- В. Внутрикоронковое отбеливание
- Г. Микроабразивное препарирование с последующей реставрацией

При начальных формах кариеса временных зубов применяют

- А. Нитрат серебра 20-30%
- Б. Нитрат серебра 0,5%
- В. Протеолитические ферменты
- Г. Иодиол

Разлитое острое гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов называется

- А. Рожистое воспаление
- Б. Фурункул
- В. Карбункул
- Г. Абсцесс

Поперечный срез рабочей части к-file имеет форму

- А. Квадратную
- Б. Круглую
- В. Треугольную
- Г. Овальную

Метод выявления путей введения протеза при параллелометрии

- А. Горизонтальный
- Б. Смешанный
- В. Вертикальный
- Г. Выбора

Симптом никольского при многоформной экссудативной эритеме

- А. Положительный
- Б. Отрицательный
- В. Зависит от этиологии заболевания
- Г. Положительный при тяжелой форме

Боли при остром гнойном периодонтите характеризуются как

- А. Острые, пульсирующие, иррадиирующие
- Б. Острые, пульсирующие, иррадиируют, усиливаются по ночам, накусывание на зуб безболезненное
- В. Острые, пульсирующие, иррадиирующие, усиливаются в горизонтальном положении и физической нагрузке
- Г. Ноющие, нерезко выраженные, не иррадиируют по ходу ветвей тройничного нерва, усиливаются при накусывании

Метод хирургического лечения пародонтита при глубине пародонтального кармана до 4 мм предполагает осуществление

- А. Лоскутной операции
- Б. Гингивэктомии
- В. Кюретажа карманов
- Г. Гингивотомии

Спина врача стоматолога при работе с микроскопом фиксируется

- А. В полусогнутом положении
- Б. В прямом положении
- В. В зависимости от позиции пациента
- Г. Сбоку от пациента

Для ускорения заживления элементов при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите (храс) применяют

- А. Мазь клотримазол
- Б. Флореналевую мазь
- В. Гель солкосерил
- Г. Мазь ацикловир

Длина пульпоэкстрактора для фронтальных зубов верхней челюсти равна (в мм)

- А. 44
- Б. 22
- В. 41
- Г. 46

Глубина кабинета терапевтической стоматологии должна быть не более (в метрах)

- А. 6
- Б. 8
- В. 20
- Г. 15

При препарировании зуба самой болезненной зоной является

- А. Дентинно-цементное соединение
- Б. Эмалево-дентинное соединение
- В. Эмаль
- Г. Цемент

Лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия об их возврате с мотивированным обоснованием причин возврата в течение срока

- А. 30 Дней
- Б. В день приема заявления
- В. От 3 до 7 рабочих дней
- Г. 3 Рабочих дней

Наиболее неблагоприятным при развитии заболеваний пародонта является _____ прикус

- А. Перекрестный
- Б. Глубокий
- В. Открытый
- Г. Прямой

Цветом зубов, лучше всего поддающимся отбеливанию является

- А. Серо-коричневый
- Б. Розово-красный
- В. Серо-красный
- Г. Желто-коричневый

Заболеванием, при котором прорезывается один зуб изменённой формы, является

- А. Флюороз
- Б. Системная гипоплазия
- В. Синдром Стентона - Капдепона
- Г. Местная гипоплазия

Оптимальная концентрация фтора в питьевой воде умеренных широт составляет (в мг/л)

- А. 2,0-3,0
- Б. 1,0-1,2
- В. 0,5-0,9
- Г. 0,3-0,8

По методу изготовления коронки делятся на

- А. Литые, штампованные, полимеризованные, фрезерования, лазерного спекания
- Б. Металлические, фарфоровые, ситалловые, пластмассовые, комбинированные
- В. Полные, полукоронки, экваторные, окончатые, трехчетвертные, телескопические, культевые
- Г. Провизорные, восстановительные, фиксирующие, шинирующие, ортодонтические

При выдаче листка нетрудоспособности на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности, либо в связи с его порчей или утерей по решению врачебной комиссии взамен ранее выданного листка нетрудоспособности

- А. Оформляется выписка из протокола врачебной комиссии
- Б. Оформляется дубликат листка нетрудоспособности
- В. Допускается выдача дуплета листка нетрудоспособности
- Г. Оформляется копия листка нетрудоспособности с внесенными в нее исправлениями

Клювовидными щипцами со сходящимися щечками удаляют_____ челюсти

- А. 3-И моляры верхней
- Б. Резцы нижней
- В. Корни зубов нижней
- Г. Премоляры верхней

Микроретенция пломбировочного материала характеризуется

- А. Проникновением адгезива и пломбировочного материала в микропространства протравленной эмали
- Б. Фиксацией пломбы за счет анкеров, пинов, постов
- В. Фиксацией пломбы за счет конвергенции стенок кариозной полости
- Г. Фиксацией пломбировочного материала в ретенционных пунктах

Количество лимфоцитов в мазке крови здорового взрослого человека (на 100 клеток) составляет (в процентах)

- А. 5-10
- Б. 20-30
- В. 40-50
- Г. 10-15

Температурный режим, поддерживаемый в стоматологическом кабинете в холодное время года, составляет (в градусах)

- А. 18-23
- Б. 23-28
- В. 15-16
- Г. 17-18

Наиболее частой причиной пульпита во временных молярах является

- А. Химическая травма пульпы
- Б. Термическая травма пульпы
- В. Механическая травма пульпы
- Г. Инфицирование из кариозной полости

Для инфильтрационной анестезии в стоматологии применяют раствор артикаина в концентрации (в процентах)

- А. 4
- Б. 1
- В. 0,5
- Г. 2

При препарировании зуба под фарфоровую коронку создают _____ под углом _____ градусов

- А. Уступ-скос; 90 только с вестибулярной стороны
- Б. Уступ-скос; 135 только с вестибулярной стороны
- В. Циркулярный уступ; 90
- Г. Циркулярный уступ; 135

К местным противопоказаниям к проведению отбеливания относят

- А. Молочные зубы у детей
- Б. Беременность
- В. Аллергию на перекись
- Г. Наличие гиперестезии

При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть

- А. Отклонена назад
- Б. Отклонена вправо
- В. Отклонена назад и влево
- Г. Наклонена вперед

Предпочтительным методом лечения при пульпите постоянных моляров у ребенка 6 лет является

- А. Девитальная экстирпация
- Б. Витальная экстирпация
- В. Девитальная ампутация
- Г. Витальная ампутация

К антидотам мышьяковистой кислоты относят

- А. Метронидазол (трихопол)
- Б. Препараты йода
- В. Препараты брома
- Г. Облепиховое масло

Дифференциальный диагноз хронического фиброзного периодонтита, кроме других форм периодонтита, проводится

- А. С хроническим гранулематозным периодонтитом
- Б. С хроническим гранулирующим периодонтитом
- В. С хроническим фиброзным пульпитом
- Г. Со средним кариесом

Контрольное обследование послеоперационной области после кюретажа целесообразно провести через

- А. 1 Год
- Б. 1 Месяц
- В. 6 Месяцев
- Г. 1 Неделю

К показаниям к премедикации относят

- А. Сопутствующие заболевания органов кровообращения
- Б. Выраженный страх перед стоматологическим вмешательством
- В. Обширность стоматологического вмешательства
- Г. Сопутствующие заболевания органов дыхания

Маргинальной является десна

- А. Покрывающая нёбо
- Б. Окружающая зуб, включая десневой сосочек
- В. Окружающая зуб без десневого сосочка
- Г. Покрывающая альвеолярный отросток

Маркерным заболеванием полости рта, сопровождающим ВИЧ-инфекцию, является

- А. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит
- Б. Хронический рецидивирующий герпетический стоматит
- В. Глоссалгия
- Г. Плоский лишай

При лечении кариеса цемента предпочтительнее использовать пломбировочный материал

- А. Композит
- Б. Амальгама
- В. Стеклоиономерный цемент
- Г. Компомер

Сроки формирования секвестров при одонтогенном остеомиелите нижней челюсти составляют

- А. 6 Месяцев
- Б. 3-5 Недель
- В. 6-7 Недель и более
- Г. 10-12 Суток

Основным преимуществом амальгамы без гамма-2-фазы является

- А. Изменение объема
- Б. Устойчивость к коррозии
- В. Рентгеноконтрастность
- Г. Пластичность

К возможному изменению при местной гипоплазии эмали относят

- А. Пятна на зубах одного периода минерализации
- Б. «Рифленую» эмаль на всех зубах
- В. Облитерацию полостей всех зубов
- Г. Пигментированное пятно на эмали одного зуба

Гипертрофический гингивит фиброзной формы дифференцируют с

- А. Герпетическим гингивостоматитом
- Б. Пародонтозом
- В. Гингивитом Венсана
- Г. Эпулисом

Кламмер, имеющий две окклюзионные накладки, расположенные в смежных фиссурах моляров или премоляров и по два плеча с каждой стороны на каждом зубе, называют кламмером

- А. Бонвиля
- Б. Аккера
- В. Кемени
- Г. Роуча

Наличие ложного кармана является признаком хронического

- А. Простого маргинального гингивита
- Б. Язвенного гингивита
- В. Гиперпластического гингивита
- Г. Пародонтита

При системной гипоплазии эмали поражаются

- А. Только первые моляры
- Б. Временные и постоянные резцы
- В. Зубы одного периода формирования
- Г. Зубы-антагонисты

Значение индекса рецессии десны (s. Stahl, a. Morris) 26-50% соответствует _____ степени

- А. Тяжелой?
- Б. Средней?
- В. Начальной?
- Г. Легкой?

Клинический признак, характерный для дисплазии капдепона

- А. «Гипсовые» зубы
- Б. «Рифленые» зубы
- В. Стираемость твердых тканей зуба без обнажения пульпы
- Г. Наличие ночных болей с иррадиацией по ветвям тройничного нерва

Дифференциальный диагноз обострения хронического пульпита проводится с

- А. Острым периодонтитом
- Б. Гиперемией пульпы
- В. Хроническим апикальным периодонтитом
- Г. Острыми формами пульпита

Дифференциальную диагностику кариеса эмали проводят с

- А. Кариесом дентина
- Б. Очаговым пульпитом
- В. Гипоплазией эмали
- Г. Гиперемией пульпы

Пластика десны по miller проводится

- А. Прямым закрытием свободным десневым трансплантатом
- Б. С боковым смещением лоскута
- В. С коронковым смещением лоскута
- Г. Полулунным лоскутом с коронковым смещением

Основным хирургическим методом лечения сиалолитиаза поднижнечелюстной слюнной железы (если конкремент в железе) является

- А. Пластика выводного протока
- Б. Экстирпация железы
- В. Удаление конкремента
- Г. Рассечение стеноза протока

При проведении эндодонтического лечения зуба

4.3 наиболее эффективным методом обезболивания является _____ анестезия

- А. Торусальная
- Б. Резцовая
- В. Инфильтрационная
- Г. Мандибулярная

Каким эпителием выстлана верхнечелюстная пазуха у взрослых

- А. Многослойным мерцательным
- Б. Плоским неороговевающим
- В. Цилиндрическим
- Г. Кубическим

Для пломбирования кариозной полости 2 класса во временном зубе с несформированным корнем применяют

- А. Стеклоиономерные цементы
- Б. Композиты химического отверждения
- В. Композиты светового отверждения
- Г. Цинкфосфатные цементы

При остром гнойном периостите причинный временный однокорневой зуб следует

- А. Пломбировать и произвести резекцию верхушки корня
- Б. Шинировать
- В. Удалить
- Г. Трепанировать и пломбировать

Первой стадией созревания пластмассы является стадия

- А. Тянущихся нитей
- Б. Тестообразная
- В. Мокрого песка
- Г. Резиноподобная

В сплав 900-й пробы золота входит меди _%

- А. 5,5
- Б. 5,0
- В. 8,5
- Г. 6,0

Десневой край стандартных металлических коронок укорачивают

- А. Ножницами для металла
- Б. Полировочным диском
- В. Бором с алмазным напылением
- Г. Полировочной головкой для углового наконечника

Для уменьшения процессов резорбции костной ткани к.миш предложил концепцию

- А. Сбалансированной окклюзии протезов с опорой на имплантаты
- Б. Перераспределения жевательной нагрузки
- В. Двухэтапной методики имплантации
- Г. Постепенной прогрессивной нагрузки на кость

Показатель обеспеченности населения врачебным, средним и младшим медицинским персоналом вычисляется в

- А. Проценте
- Б. Продецимилле
- В. Показателе наглядности
- Г. Промиле

Овальная форма поражения твердых тканей зубов характерна для

- А. Кариеса
- Б. Мраморной болезни
- В. Клиновидного дефекта
- Г. Эрозии эмали

Чрезмерное утолщение рогового слоя эпителия

- А. Акантолиз
- Б. Спонгиоз
- В. Вакуольная дистрофия
- Г. Гиперкератоз

Определение функционального состояния пульпы зуба осуществляется при проведении

- А. Реопародонтографии
- Б. Электроодонтодиагностики
- В. Реодонтографии
- Г. Термодиагностики

Вскрытие полости зуба интактных моляров верхней челюсти производят в области

- А. Передней фиссуры
- Б. Небного бугра
- В. Щечного бугра
- Г. Задней фиссуры

Альгинатные оттисковые материалы относятся к

- А. Кристаллизующимся материалам
- Б. Нанонаполненным материалам
- В. Обратимым гидроколлоидам
- Г. Необратимым гидроколлоидам

Повышение температуры тела характерно для

- А. Кариеса
- Б. Острого пульпита
- В. Периапикального абсцесса без свища
- Г. Хронического пульпита

Наиболее неблагоприятным сочетанием больничных показателей является _____ оборота койки и _____ летальности

- А. Увеличение; снижение
- Б. Уменьшение; увеличение
- В. Уменьшение; снижение
- Г. Увеличение; увеличение

Пастой на основе окиси цинка и эвгенола для пломбирования корневых каналов является

- А. Форфенан
- Б. Каласепт
- В. Апексит
- Г. Эндометазон

При формировании кариозной полости II класса дополнительная площадка служит для

- А. Профилактического иссечения
- Б. Укрепления зуба
- В. Эстетики
- Г. Улучшения фиксации пломбы

Среднее число дней работы койки в году вычисляется по формуле

- А. (Число проведенных больными койко-дней) / (число выписанных больных)
- Б. (Число выписанных больных) / (число среднегодовых коек)
- В. (Число койко-дней, фактически проведенных больными) / (число среднегодовых коек)
- Г. (Число койко-дней, фактически проведенных больными) / (число дней в году)

Индекс sr_i у взрослых даёт информацию о/об

- А. Степени тяжести флюороза
- Б. Интенсивности заболеваний пародонта
- В. Интенсивности кариеса зубов
- Г. Гигиеническом состоянии полости рта

Стимулирует слюноотделение

- А. Пилокарпин
- Б. Атропин
- В. Йодистый калий
- Г. Хлоргексидин

При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности может быть сформирован и продлен до дня восстановления трудоспособности по решению врачебной комиссии, но на срок не более ____ месяцев с даты начала временной нетрудоспособности, а при лечении туберкулеза - не более ____ месяцев

- А. 10; 12
- Б. 8; 10
- В. 6; 8
- Г. 4; 6

Чаще воспаляется у детей слюнная железа

- А. Подъязычная
- Б. Малая губ
- В. Поднижнечелюстная
- Г. Околоушная

Для эпидемического паротита у детей характерно

- А. Одновременное поражение других слюнных желез
- Б. Гнойное расплавление паренхимы железы
- В. Наличие воспалительного инфильтрата
- Г. Выделение гноя из устья выводного протока

Вазоконстрикторы вызывают

- А. Расширение сосудов
- Б. Сужение сосудов
- В. Гиперемию кожных покровов
- Г. Анальгезию

Почему ишемизация тканей усиливает и пролонгирует действие анестетиков?

- А. Увеличивается всасывание анестетика в кровь
- Б. Уменьшается выделение медиаторов из пресинаптических везикул
- В. Сужение сосудов замедляет всасывание анестетика в кровь
- Г. Проявляется только резорбтивное действие

Ultracain ds forte содержит в своем составе адреналин в разведении

- А. 1 100000
- Б. 1 50000
- В. 1 200000
- Г. 1 150000

Операция удаления зуба показана при

- А. Хроническом фронтите
- Б. Хроническом гайморите
- В. Хроническом сфеноидите
- Г. Одонтогенном гемисинусите

Метод исследования пульсовых колебаний кровенаполнения сосудов пародонта, основанный на графической регистрации изменений полного электрического сопротивления тканей пародонта, называется

- А. Допплерография
- Б. Реопародонтография
- В. Флуориметрия
- Г. Гнатодинамометрия

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

ОСНОВНЫМ ПРИЧИННЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Курение
- Б. Сахарный диабет
- В. Пародонтопатогенная микрофлора
- Г. Сердечно-сосудистые заболевания
- Д. Подвижность зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ И КРАТНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОМ АППЛИКАЦИЙ. Концентрация фторида: (%): 1 - 1 2 - 2 Кратность применения:

- А. Ежедневно
 - Б. 1 раз в неделю
 - В. 1 раз в месяц
 - Г. 1 раз в полгода
 - Д. 1 раз в год
- А. 1- Г, 2- Д
Б. 1- А, 2- Д
В. 1- Б, 2- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УДАЛЕНИИ ЗУБНОГО НАЛЕТА С КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОМОЩЬЮ ФЛОССОВ. Действие:

- А. перемещение зубной нити и очищение контактной поверхности другого рядом стоящего зуба
 - Б. замена использованного участка зубной нити на новый чистый
 - В. накручивание зубной нити на средние пальцы обеих рук и фиксирование ее большими пальцами
 - Г. продвижение зубной нити по контактной поверхности одного из рядом стоящих зубов и ее очищение
 - Д. введение зубной нити в межзубный промежуток
 - Е. выведение зубной нити из межзубного промежутка
 - Ж. очищение контактных поверхностей следующих зубов
- А. 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-Е, 5-А, 6-Б, 7-Ж
Б. 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-А, 5-Е, 6-Б, 7-Ж
В. 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-А, 5-Е, 6-Ж, 7-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ И КРАТНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОМ ОПОЛАСКИВАНИЯ. Концентрация фторида (%):**

1. 0,05

2. 0,1

3. 0,2 Кратность применения:

А. 1 раз в год

Б. 1 раз в месяц

В. 1 раз в 2 недели

Г. 1 раз в неделю

Д. Ежедневно

А. 1-Д, 2- В, 3- Г

Б. 1-Д, 2- Г, 3- В

В. 1-А, 2- Г, 3- Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Острое начало заболевания, боль при глотании, высокая температура тела воспалительная контрактура нижней челюсти, припухлость и болезненность поднижнечелюстных и подподбородочной областей

Б. Острое начало, резкие боли, рот полуоткрыт, высокая температура, увеличение размеров и ограничение подвижности языка, затрудненное глотание и дыхание

В. Наличие разрушенного моляра нижней челюсти, гиперемия кожи, отечность, болезненность и припухлость мягких тканей поднижнечелюстной области

Г. Разлитая отечность мягких тканей щеки, сглаженность носогубной складки, болезненность открывания рта

Д. Тромбофлебит угловой вены, острый гнойный гайморит или обострение хронического гайморита

Е. Ограничение открывание рта, отечность и болезненность за бугром верхней челюсти, распирающая головная боль

1. Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны

2. Клинические признаки флегмоны дна полости рта

3. Клинические признаки флегмоны корня языка

4. Типичные причины флегмоны глазницы

5. Клинические признаки флегмоны щеки

6. Клинические признаки флегмоны крылонебной ямки

А. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6

Б. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 6, Е – 4

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 6

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид местного обезболивания:

А. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1:200 000.

Б. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000

Показания к применению:

1. Операция удаление зуба

2.6 у практически здорового пациента 18 лет

2. Операция удаление зуба

4.7 у практически здорового пациента 17 лет

3. Операция удаление зуба

3.5 у пациента 18 лет с гипертонической болезнью

4. Операция удаление зуба

1.4 у пациента 16 лет с диабетом в анамнезе

5. Операция удаление зуба

6.5 у пациента 10 лет

А. А-1,4,5,Б-1,3

Б. А-1,3,4,Б-1,5

В. А-1,3,4,5,Б-1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Понижение АД

Б.Повышение АД

В. Не влияет

Г. Барбитураты

Д. Миорелаксанты

Е. Атропин или метацин

1. Влияние эфира для наркоза на АД

2. Влияние фторотана на АД

3. Препараты, расслабляющие скелетную и дыхательную мускулатуру

4. Препараты, применяемые для подавления саливации при наркозе

5. Влияние кеталара на АД

А. А – 2, Б – 1,5, Д – 4, Е – 3

Б. А – 2, Б – 1,5, Д – 3, Е – 4

В. А – 1, Б – 2,5, Д – 3, Е – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Коринфар, капотен

Б. Аминокапроновая кислота или памба

В. Ятрогенное

Г. Идиопатическое

Д. Рутин или аскорутин

Е. фитоменадион или дицинон

1. При гипопротромбинемии для остановки кровотечения назначают:

2. Кровотечение, возникшее после хирургического вмешательства

3. При повышении фибринолитической активности для остановки кровотечения назначают:

4. Для остановки кровотечения при повышенной проницаемости сосудов назначают:

5. Для остановки кровотечения при повышенном АД назначают:

А. А – 5, Б – 3, В – 2, Д – 4, Е – 1

Б. А – 5, Б – 3, В – 2, Д – 1, Е – 4

В. А – 5, Б – 2, В – 3, Д – 4, Е – 1

ИНТЕРГЛОБУЛЯРНЫЙ ДЕНТИН - ЭТО:

А. Основное вещество между дентинными слоями

Б. Часть дентина, прилегающая к полости зуба

В. Отложения дентина в течении жизни человека

Г. Дентин, образующийся при патологии твердых тканей зуба

Д. Дентин, возникающий в процессе развития зуба

ВОЗБУДИТЕЛЕМ РОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

А. Эпидермальный стафилококк

Б. Пемолитический стрептококк

В. Бактероиды, клостридии

Г. Кишечная и синегнойная палочки

Д. Актиномицеты

КУРКОВЫЕ (ТРИГГЕРНЫЕ) ЗОНЫ ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЭТО УЧАСТКИ

А. Гиперстезии

Б. Гипостезии

В. Раздражение которых провоцирует приступ боли

Г. Парастезии

Д. Анестезии

ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ ПО П КЛАССУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- А. Стеклоиономерный цемент
- Б. Поликарбоксилатный цемент
- В. Гибридный композиционный материал
- Г. Микрофильный композиционный материал
- Д. Компомер

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Безболезненный карбункул, на месте некроза образуется струп темного цвета, вокруг – стекловидный отек
- Б. Эритематозное пятно имеет следующий вид: центральная часть западает и имеет яркий розово – красный цвет, периферия очага возвышается
- В. Безболезненная, покрытая чешуйками эритема в виде «бабочки без крыльев»
- Г. Манифестация с язвенно – некротического стоматита или гингивита
- Д. Высыпания на коже, группы пузырьков с серозным содержимым по ходу нервных стволов

- 1. Характерные признаки номы
- 2. Характерные признаки сибирской язвы
- 3. Характерные признаки полиморфной экссудативной эритемы
- 4. Характерные признаки опоясывающего лишая
- 5. Характерные признаки эритематоза (красной волчанки)

- А. А – 2, Б – 3, В – 5, Г – 4, Д – 1
- Б. А – 2, Б – 3, В – 5, Г – 1, Д – 4
- В. А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между методами анестезии и возможностью её проведения у разных групп зубов. Методы анестезии:

- А. Инфильтрационная
- Б. Интралигаментарная Группы зубов:
- 1. центральные резцы
- 2. клыки
- 3. моляры нижней челюсти
- 4. моляры верхней челюсти
- 5. премоляры

- А. А-1, 3, 4, 5, Б-2, 4, 5
- Б. А-5, 2, 4, 5, Б-3, 4, 1
- В. А-1, 2, 4, 5, Б-3, 4, 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

А. Не существует

Б. Хронический периодонтит

В. 1 – 3 и 8 – 9 месяцы

Г. 6 месяцев

Д. Период обострения

Е. 2 – 3 и 6 – 7 месяцы

1. Показание к плановому удалению зуба

2. Абсолютное противопоказание для удаления зуба

3. Сроки планового удаления зубов после инфаркта миокарда

4. Временное противопоказание к удалению зубов у беременных в следующие сроки

5. Временное противопоказание к удалению зубов при психических заболеваниях

А. А – 2, Б – 1, В – -, Г – 3, Д – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – -, Г – 5, Д – 3

В. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ МЕТОДА ВИТАЛЬНОГО ОКРАШИВАНИЯ ЭМАЛИ Действие:

А. ополаскивание полости рта водой, регистрация данных

Б. нанесение раствора метиленовой сини на эмаль

В. очищение зуба от налета

Г. изоляция от слюны

Д. высушивание эмали

А. 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-А, 5-Б

Б. 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-Б, 5-А

В. 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-Д, 5-А

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТИФТА ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ КОРНЯ СОСТАВЛЯЕТ

А. 1/3

Б. 1/2

В. 2/3

Г. Всю длину корня

Д. Длина штифта не имеет значения

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОСТИ ПО V КЛАССУ СКОС ПРЕПАРИРУЮТ

- А. По эмали
- Б. По цементу корня
- В. По эмали и цементу корня
- Г. Не формируют
- Д. На усмотрение врача

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Признаки периодонтита**
 - Б. Заболевания, характеризующиеся распространением воспалительного процесса с периодонта на надкостницу альвеолярного отростка и тело челюсти**
 - В. Инфекционно – аллергический, гнойно – некротический процесс, который развивается в кости под воздействием внешних или внутренних факторов**
 - Г. Очаги разрежения костной ткани различных размеров**
 - Д. Удаление причинного зуба, декомпрессия тканей (в т.ч. костной), дренирование очагов воспаления**
 - Е. Удаление или лечение причинного зуба (по показаниям), вскрытие абсцесса**
- 1. Периостит**
 - 2. Остеомиелит**
 - 3. Изменения на рентгенограмме при остром периостите**
 - 4. Изменения на рентгенограмме при остром одонтогенном остеомиелите на ранних стадиях**
 - 5. Оперативное лечение острого одонтогенного периостита**
 - 6. Оперативное лечение острого одонтогенного остеомиелита**
- А. А – 3,4, Б – 1, В – 2, Д – 6, Е - 5
 - Б. А – 4, Б – 1, В – 2, Д – 6, Е - 5
 - В. А – 3,4, Б – 2, В – 1, Д – 6, Е - 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Зуб

Б. Белесоватым, мутным, тягучим

В. Кровянисто – бурым, без холестерина

Г. Холестеатомные массы

1. Содержимое амелобластомы нижней челюсти чаще бывает

2. Содержимое остеобластомы чаще бывает

3. Содержимое фолликулярной кисты

4. Содержимое эпидермоидной кисты представляет собой

А. А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 4

Б. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4

В. А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Методы анестезии:

А. Инфильтрационная.

Б. Интралигаментарная.

В. Интрасептальная. Состав анестезирующего раствора:

1) 4% р-р артикаина + р-р адреналина 1:100 000;

2) 3% р-р мепивакаина;

3) 4% р-р артикаина + р-р адреналина 1:200 000;

4) 4% р-р артикаина.

А. А-1, 2, 3, Б-1, 3, В-1

Б. А-1, 2, 3, Б-1, 3, В-1, 3

В. А-1, 2, Б-1, 3, В-1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. 10 лет

Б. 6 лет

В. Чрезмерно развитая пазуха, распространяющаяся даже в отростке верхнечелюстной кости

Г. Малые размеры верхнечелюстной пазухи

Д. Боль, чувство тяжести, давления и напряжения в соответствующей половине лица

Е. Выделение гноя или слизи из соответствующей половины носа

1. Наиболее частые симптомы острого гайморита

2. Возраст ребенка, при котором размеры верхнечелюстной пазухи приближаются к таковым взрослого человека

3. Возраст ребенка, при котором нижняя стенка верхнечелюстной пазухи находится на одном уровне с дном полости носа

4. Пневматический тип верхнечелюстной пазухи

5. Возраст ребенка, когда нижняя граница верхнечелюстной пазухи лежит ниже уровня дна полости носа

А. А – 5, Б – 2, В – 3,4, Д – 1

Б. А – 5, Б – 2, 3, В – 1, Д – 4

В. А – 5, Б – 2, 3, В – 4, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Классы композитных материалов:

А. Текущие, жидкие

Б. Микронаполненные

В. Гибридные

Г. Универсальные

1. По размеру частиц наполнителя

2. По клиническому назначению

3. По плотности

4. По способу полимеризации

А. 1БВ, 2Г, 3А, 4--

Б. 1В, 2Г, 3А, 4--

В. 1БВ, 2ВГ, 3А, 4--

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОБСЛЕДОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА. Действие:**

А. проведение дополнительных методов обследования

Б. сбор анамнеза жизни

В. выявление жалоб

Г. внешний осмотр

Д. сбор анамнеза заболевания

Е. внутриротовой осмотр

А. 1- Б,В, Д, Г, Е, А

Б. 1- В, Б, Д, Г, Е, А

В. 1- А,В, Б, Д, Г, Е

МЕСТОМ ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ ПРИ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИЦЕВОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧКА В ОБЛАСТИ

А. Ветви нижней челюсти впереди козелка уха соответствующей стороны

Б. Основания нижней челюсти соответственно подбородочному отверстию

В. VII шейного позвонка

Г. Края нижней челюсти впереди жевательной мышцы

Д. Переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышц

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ

А. Приступообразные ночные боли длительностью 15-30 минут, иррадиирующие в ухо, висок

Б. Продолжительные, варьирующие по интенсивности боли, усиливающиеся при давлении по ходу нерва

В. Тупые длительные боли с чувством давления и напряжения в верхней челюсти, выделения из носа

Г. Продолжительные приступообразные боли с иррадиацией в ухо, хруст в височно-нижнечелюстном суставе

Д. Кратковременные интенсивные боли, возникающие от случайных раздражений без нарушений чувствительности

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР ЗУБА СТЕКЛОИОНОМЕРНЫМ ЦЕМЕНТОМ (СИЦ) Действие:**

- А. изоляция от слюны
- Б. высушивание зуба
- В. очищение жевательной поверхности зуба от налета
- Г. проверка окклюзионной высоты прикуса
- Д. внесение СИЦ и распределение по фиссурам, отверждение

А. 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Д, 5-Г

Б. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д, 5-Г

В. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г, 5-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПОКРЫТИЯ ЗУБОВ ФТОРГЕЛЕМ Действие:**

- А. высушивание зубов перед покрытием фторгелем
- Б. покрытие зубов фторгелем
- В. очищение зубов от налета
- Г. изоляция от слюны ватными валиками
- Д. экспозиция фторгеля на зубах в течение 1-2 минут
- Е. рекомендации пациенту воздержаться от приема пищи в течение двух часов, от чистки зубов и приема очень твердой пищи в течение 12-24 часов

А. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б, 5-Д, 6-Е

Б. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б, 5-Е, 6-Д

В. 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б, 5-Д, 6-Е

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Базально – клеточный рак
 - Б. Внутриэпителиальный рак слизистой оболочки
 - В. Внутриэпидермальный кожный рак
 - Г. Разновидность старческой кератомы
 - Д. Злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментобразующих клеток
1. Кожный рог – это:
 2. Болезнь Боуэна – это:
 3. Эритроплазия Кейра – это:
 4. Меланома – это:
 5. Базалиома – это
- А. А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 4
 - Б. А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 1, Д – 4
 - В. А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 4, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Недоразвитие нижней челюсти
 - Б. Аномалия развития челюстных костей, характеризующаяся выступанием нижней челюсти вперед в следствие ее чрезмерного развития
 - В. Недоразвитие верхней челюсти
 - Г. Аномалия развития челюсти, характеризующаяся выдвинутым положением верхней челюсти вперед в следствие ее чрезмерного развития
1. Прогения – это:
 2. Микрогения – это:
 3. Прогения – это:
 4. Микрогнатия – это:
- А. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1
 - Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3
 - В. А – 1, Б – 3, В – 4, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Тиреоглоссальная киста

Б. Эктодермы

В. Бранхиогенная киста

Г. Энтодермы и эктодермы

Д. Кистозная тератома

1. Дермоидные кисты развиваются из:

2. Бранхиогенные кисты развиваются из:

3. Синоним дермоида

4. Синоним боковой кисты шеи

5. Синоним срединной кисты шеи

А. А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

Б. А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

В. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Разрезание кости позади коронки нижнего «зуба мудрости»

Б. Воспаление мягких тканей, окружающих коронку зуба при его неполном и затрудненном прорезывании

В. Ретенция «зубов мудрости»

Г. Задержка сроков прорезывания нормально сформированного постоянного зуба

Д. Неправильное положение в зубном ряду прорезывавшегося зуба или его аномальное положение в челюсти

1. Ретенция зуба

2. Дистопия зуба

3. Перикоронит

4. Полулуние Вассмунда

5. Одна из причин краевой гнездной алопеции затылочной области

А. А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 1, Д – 2

В. А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УДАЛЕНИИ ЗУБНОГО НАЛЕТА С КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОМОЩЬЮ ФЛОССОВ** Действие:

- А. перемещение зубной нити и очищение контактной поверхности другого рядом стоящего зуба
- Б. замена использованного участка зубной нити на новый чистый
- В. накручивание зубной нити на средние пальцы обеих рук и фиксирование ее указательными пальцами
- Г. продвижение зубной нити по контактной поверхности одного из рядом стоящих зубов и ее очищение
- Д. введение зубной нити в межзубный промежуток
- Е. выведение зубной нити из межзубного промежутка
- Ж. очищение контактных поверхностей следующих зубов

А. 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-А, 5-Е, 6-Ж, 7-Б

Б. 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-А, 5-Е, 6-Б, 7-Ж

В. 1-В, 2-Д, 3-А, 4-Г, 5-Е, 6-Б, 7-Ж

ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ЦЕМЕНТ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ ЯВИТЬСЯ В КЛИНИКУ ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО ОСМОТРА:

- А. Один раз в месяц
- Б. Один раз в полгода
- В. Один раз в год
- Г. Только при возникновении жалоб
- Д. По желанию пациента

ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Наследственность
- Б. Наличие микробного налета
- В. Вредные привычки
- Г. Подвижность зубов
- Д. Травма

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ВОСПАЛЕНИЯ ДЕСНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Деформация десневых сосочков
- Б. Некроз десневых сосочков
- В. Кровоточивость при зондировании десневых сосочков
- Г. Резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок
- Д. Наличие пародонтального кармана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Методы анестезии:

А. Инфильтрационная

Б. Интралигаментарная

В. Мандибулярная Длина инъекционной иглы:

1. 32мм;

2. 25 мм;

3. 16 мм;

4. 8 мм;

5. 10 мм;

6. 12 мм.

А. А-2,3, Б-3, 4, 5, 6, В-1

Б. А-2,3, Б-5, 4, 6, В-1,3

В. А-2,3, Б-3, 4, 5, 6, В-1,2

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ НАЗНАЧАЮТ
МАЗИ**

А. Фотозащитные

Б. Кортикостероидные

В. Противовоспалительные

Г. Антибактериальные

Д. Регенерирующие

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Не ранее, чем через 12 часов после травмы, гематома не выходит за пределы круговой мышцы глаза
- Б. Звук треснувшего горшка, возникающий при постукивании по зубам поврежденной стороны
- В. Ликворея, возникающая при переломе пирамиды височной кости
- Г. Ликворея через дефект твердой мозговой оболочки в области пластинки решетчатой кости или в месте перелома клиновидной кости
- Д. Боль по ходу щели перелома при надавливании указательным пальцем на крючки клювовидных отростков клиновидной кости
- Е. Гематомы появляются сразу после травмы и имеют распространенный характер
1. При изолированных переломах верхней челюсти «симптом очков» появляется:
2. При изолированных переломах костей основания черепа «симптом очков» появляется:
3. Положительный симптом Малевича
4. Положительный симптом Герена
5. Назальная ликворея
6. Ушная ликворея
- А. А – 2, Б – 3, В – 6, Г – 5, Д – 4, Е – 1
- Б. А – 2, Б – 6, В – 5, Г – 3, Д – 4, Е – 1
- В. А – 2, Б – 3, В – 6, Г – 4, Д – 5, Е – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ИНДЕКСА РНР Действие:**

- А. интерпретация значения индекса
- Б. окрашивание поверхностей индексных зубов
- В. расчет индекса РНР по формуле
- Г. определение кода для каждого зуба
- А. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В
- Б. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А
- В. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Малые протоки подъязычной слюнной железы

Б. Проток околоушной слюнной железы

В. Проток поднижнечелюстной слюнной железы

Г. Общий проток подъязычной слюнной железы

1. Стенопов проток

2. Вартонов проток

3. Барталинов проток

4. Ривиниевы протоки

А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3

Б. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

В. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Клинические проявления:

А. Отсутствие эмали на определенном участке зуба

Б. Волнистая, точечная, борозчатая эмаль

В. Симметричные белые или желтые пятна

Г. Зубы Гетчинсона, Фурнье, Пфлюгера

1. Изменение цвета эмали

2. Недоразвитие эмали

3. Аплазия эмали

4. Недоразвитие дентина

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1Б, 2Б, 3В, 4А

В. 1А, 2В, 3В, 4Б

ДЛЯ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНО

А. Сильные кратковременные приступообразные боли

Б. Длительные ноющие боли

В. Кратковременные парестезии

Г. Длительные парестезии

Д. Симптом Венсана

КАКУЮ ФОРМУ ИМЕЕТ СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ВНЧС

- А. Шаровидную
- Б. Овальную
- В. Эллипсовидную
- Г. Цилиндрическую
- Д. Дисковидную

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Размер частиц Наполнителя:

- А. 0,04-0,4 мкм
 - Б. 0,04-5 мкм
 - В. 8-45 мкм
 - Г. 1-5 мкм
- Класс композитного материала:
- 1. Макронаполненные
 - 2. Микронаполненные
 - 3. Мининаполненные
 - 4. Гибридные
- А. 1В, 2А, 3Б, 4Г
 - Б. 1В, 2А, 3Г, 4Б
 - В. 1А, 2В, 3Г, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. 5 % раствором сульфата меди
 - Б. 1 – 2 % раствором лимонной или уксусной кислоты
 - В. 2 – 3 % раствором гидрокарбоната натрия
 - Г. 20 % раствором сахара (глюкозы)
 - Д. 4 – 5 % раствором гидрокарбоната натрия
- 1. Химическую нейтрализацию кислот проводят:
 - 2. Химическую нейтрализацию щелочей проводят:
 - 3. Химическую нейтрализацию негашеной извести проводят:
 - 4. Химическую нейтрализацию солей тяжелых металлов проводят
 - 5. Химическую нейтрализацию фосфора проводят:
- А. А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 3, Д – 4
 - Б. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 4, Д – 3
 - В. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Дифференцируют с:

А. Поверхностный кариес

Б. Клиновидный дефект

В. Несовершенный амелогенез

Г. Кислотный некроз Заболевание:

1. Флюороз

2. Гипоплазия эмали

3. Синдром Стейтоно-Капдепона

4. Эрозия

А. 1А, 2В, 3А, 4БАГ,

Б. 1А, 2А, 3В, 4БАГ,

В. 1А, 2А, 3В, 4БГ,

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

А. Нарушение функции жевания

Б. Костная крепитация

В. Неправильный прикус

Г. Локальная боль, усиливающаяся при пальпации

Д. Гематома, отек окружающих тканей

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Инфекционная болезнь, которая характеризуется тяжелой интоксикацией, поражением кожи и лимфатического аппарата

Б. 8 – 10 дней

В. Инфекционное заболевание, протекающее в виде быстро прогрессирующей формы влажной гангрены лица, челюстей, тканей полости рта на фоне резкого снижения реактивности организма

Г. 15 – 18 дней

Д. Инфекционная болезнь, характеризующаяся очаговым серозным или серозно-геморрагическим воспалением кожи, лихорадкой и интоксикацией

Е. 12 – 14 дней

1. Цикл развития фурункулов

2. Цикл развития карбункулов

3. Рожа

4. Сибирская язва

5. Нома

А. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3, Д – 2

Б. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 5, Д – 3

В. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ Действие:**

А. обильное смачивание рыхлого ватного тампона реминерализующим раствором и размещение его на поверхности зубов

Б. высушивание зубов воздухом

В. экспозиция реминерализующего средства

Г. очищение зубов от зубных отложений

Д. изоляция зубов от слюны ватными валиками

Е. рекомендации пациенту

А. 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-А, 5-Е, 6-В

Б. 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-А, 5-В, 6-Е

В. 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-В, 5-А, 6-Е

ПРИ ТРАВМЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДИТ

- А. Перелом корня
- Б. Вывих
- В. Ушиб
- Г. Скол коронки зуба
- Д. Перелом зуба на уровне шейки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ АППЛИКАЦИИ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИМИ РАСТВОРАМИ Действие:

- А. рекомендации
 - Б. очищение зубов от налета
 - В. нанесение раствора на зубы
 - Г. изоляция зубов от слюны
 - Д. высушивание эмали зубов
 - Е. экспозиция раствора
 - Ж. удаление средства из полости рта
- А. 1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-В, 5-Е, 6-А, 7-Ж
Б. 1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-В, 5-Е, 6-Ж, 7-А
В. 1-Б, 2-Г, 3-Е, 4-В, 5-Д, 6-Ж, 7-А

ДЛЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ

- А. Кратковременные интенсивные боли, возникающие от случайных раздражений без нарушений чувствительности
- Б. Продолжительная, варьирующая по интенсивности боль, усиливающаяся при давлении по ходу нерва
- В. Продолжительные приступообразные боли с иррадиацией в ухо, хруст в височно-нижнечелюстном суставе
- Г. Тупые длительные боли с чувством давления и напряжения в верхней челюсти, выделения из носа
- Д. Приступообразные ночные боли длительностью 15-30 минут, иррадиирующие в ухо, висок

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Деформация десневых сосочков
- Б. Некроз десневых сосочков
- В. Кровоточивость при зондировании десневых сосочков
- Г. Резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок
- Д. Наличие пародонтального кармана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

А. Низкий уровень иммунитета, выраженная сенсibilизация организма, слабовирулентная микрофлора

Б. Низкий уровень иммунитета, выраженная сенсibilизация организма и значительная вирулентность микрофлоры

В. Кариозные зубы, пародонтит, зубные отложения, тонзиллиты

Г. Достаточная напряженность иммунитета, низкий уровень сенсibilизации организма, высокая вирулентность микрофлоры

Д. Тонзиллиты

1. Наиболее частая причина сенсibilизации организма к хронической инфекции

2. Нормергическая форма воспаления наблюдается при

3. Гиперергическая форма воспаления развивается при

4. Гипоергическая форма воспалительной реакции возникает при

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Максимально допустимая доза:

А. 5 лет

Б. 27 лет Возраст пациента:

1. 2 мг/кг

2. 5 мг/кг

3. 7 мг/кг

4. 9 мг/кг

5. 12 мг/кг

А. А-1, Б-2

Б. А-2, Б-3

В. А-1, Б-3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Этиологический фактор:

- А.Неправильная чистка зубов щеткой
 - Б.Эндокринные нарушения
 - В.Наследственное нарушение
 - Г.Заболевания пародонта
- Заболевание:

- 1.Пришеечный некроз
- 2.Несовершенный амелогенез
- 3.Мраморная болезнь
- 4.Клиновидный дефект

- А. 1Б, 2В, 3В, 4А
- Б. 1А, 2В, 3В, 4Б
- В. 1Б, 2Б, 3В, 4А

CEREC – ЭТО

- А. Система компьютерного изготовления вкладок и коронок
- Б. Система адгезионной фиксации безметалловых вкладок
- В. Система реставрации зубов стандартными керамическими вкладками
- Г. Воск для прямой моделировки вкладок
- Д. Система ультразвукового препарирования под стандартные керамическиекладки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. 120 – 160
- Б. 4,5 – 5
- В. 200 – 400
- Г. 0,8 – 1
- Д. 0 – 5 %
- Е. 20 – 30 %

- 1. Количество эритроцитов у здоровых людей ($\times 10^{12}$ в 1 л.)
- 2. Содержание гемоглобина в крови здоровых взрослых людей.
- 3. Цветовой показатель в норме
- 4. Количество тромбоцитов у здоровых людей ($\times 10^9$ в 1 л.)
- 5. Количество лимфоцитов в мазке крови взрослого человека (на 100 клеток)
- 6. Количество эритроцитов в мазке крови взрослого человека (на 100 клеток)

- А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 6, Е - 5
- Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5, Е - 6
- В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 6, Е - 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Синдром Хеерфордта

Б. Болезнь Микулича

В. Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение

Г. Синдром Шегрена

1. Заболевание, для которого характерна триада: ксеростомия, ксерофтальмия, ревматоидный полиартрит

2. Заболевание слюнных желез, сходное по клинической картине с опухолью

3. Заболевание, при котором у больного увеличиваются все слюнные и слезные железы

4. Заболевание, сопровождающееся триадой: припухлость околоушной слюнной железы, иридоциклит, парез лицевого нерва

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Анестетик с вазоконстриктором:

А. Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000

Б. Артиакин 4% с эпинефрином 1: 200 000 Пациенты с общесоматической патологией:

1. Инфаркт миокарда

2. Инсульт

3. Гипертоническая болезнь

4. Диабет

5. Язвенная болезнь желудка

6. Калькулезный холецистит

А. А-2,3,4, Б-1,2,5

Б. А-2,А-5,Б-1,3,4

В. А-5,6,Б-1,2,3,4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Тавегил

Б. Метронидазол

В. Неспорообразующие анаэробы

Г. Гентамицин

Д. Стафилококки

1. Высокой активностью против неспорообразующих анаэробов обладают

2. Бета – лактомазу (пенициллиназу) выделяют

3. Ототоксическим действием обладает

4. Десенсибилизирующий препарат

А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3

В. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Не ранее, чем через 2 недели

Б. Гайморотомия с пластикой соустья

В. Можно, при наличии кровотечения

Г. Можно во всех случаях

Д. Нельзя

Е. Промывание пазухи растворами антисептиков, пластика соустья после ликвидации воспаления

1. Хирургическая тактика врача при перфорации верхнечелюстной пазухи во время удаления зуба на фоне острого гайморита (без наличия корня зуба в пазухе)

2. Метод удаления корня зуба, внедренного в верхнечелюстную пазуху

3. Можно ли тампонировать лунку йодоформным тампоном при перфорации дна верхнечелюстной пазухи?

4. Наиболее благоприятные сроки для удаления корня зуба, внедренного в мягкие ткани во время удаления

А. А – 4, Б – 2, Д – 3, Е – 1

Б. А – 4, Б – 2, Д – 1, Е – 3

В. А – 4, Б – 3, Д – 2, Е – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Хронический гнойный и гипертрофический альвеолит
Б. Рыхлая тампонада лунки йодоформным тампоном
В. Антисептические ванночки, противопоказано интенсивное полоскание полости рта
Г. «сухая лунка» или остеомиелит
Д. Серозная и гнойно-некротическая
1. Тактика врача при течении альвеолита в виде «сухой лунки»
2. Рекомендации врача после удаления зуба
3. Формы течения альвеолита
4. Острые формы альвеолита
5. Хронические формы альвеолита
- А. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4
Б. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4
В. А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Из эпителиального и мезенхимального компонентов
Б. Одонтогенная опухоль
В. Из эпителиальных тканей
Г. Порог развития зубных тканей
1. Амелобластома – это:
2. Одонтома – это:
3. Амелобластома развивается
4. Одонтома развивается
- А. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2
Б. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1
В. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

ПРИ КЛИНИКЕ ОСТРОГО ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- А. Диабет
Б. Заболевания крови
В. Гастрит
Г. Язвенную болезнь желудка
Д. Острый панкреатит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Строфантин, коргликон
 - Б. Бемегрид
 - В. Эуфиллин, дипрофиллин
 - Г. Кордиамин
 - Д. Нитроглицерин, изокет, нитроминт
 - 1. Дыхательные analeptiki
 - 2. Сердечные гликозиды
 - 3. Антагонист гексенала и тиопентала натрия
 - 4. Бронхолитики
 - 5. Антиангинальные препараты
- А. А – 1, Б – 3, В – 4, Г – 2, Д – 5
Б. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1, Д – 5
В. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 5, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Определение:

- А. Плотное образование, состоящее из бактерий, расположенных в матрице
 - Б. Бесструктурное образование, состоящее из гликопротеидов слюны
 - В. Скопление бактерий, плотно фиксированных на поверхности зуба
 - Г. Твердые зубные отложения, как результат кальцификации зубного налета Поверхностные образования на зубах:
 - 1. Пелликула
 - 2. Зубная бляшка
 - 3. Зубной налет
 - 4. Зубной камень
- А. 1В, 2Б, 3А, 4Г
Б. 1Б, 2В, 3А, 4Г
В. 1Б, 2А, 3В, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Основа метода:

А. Применение Carisolve для коагуляции кариозного дентина и дальнейшего его удаления

Б. Использование наконечника «Соникфлекс»

В. Применение ротационных и ручных инструментов

Г. Действие фокусированного потока частиц оксида алюминия Методы препарирования твердых тканей:

1. Механический

2. Химико-механический

3. Воздушно-абразивный

4. Пневматический

А. 1В, 2Б, 3Г, 4А

Б. 1Г, 2А, 3В, 4Б

В. 1В, 2А, 3Г, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Методы лечения:

А. Реминерализация.

Б. Пломбирование

В. Изготовление винира.

Г. Изготовление искусственной коронки. Заболевания:

1. Эрозия

2. Клиновидный дефект

3. Несовершенный амелогенез.

4. Флюороз

А. 1АВГ, 2АБВ, 3АГ, 4ВГ

Б. 1АБВГ, 2АБ, 3АГ, 4ВГ

В. 1АБВ, 2АБ, 3АГ, 4ВГ

ПРИКУС-ЭТО ВИД СМЫКАНИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ В ПОЛОЖЕНИИ ОККЛЮЗИИ:

А. Центральной

Б. Боковой левой

В. Передней

Г. Дистальной

Д. Боковой правой

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. От нескольких месяцев до нескольких лет
Б. Двустороннее поражение
В. Одностороннее поражение
Г. Обычно изменений нет, редко – расширение суставной щели
Д. Расширение или сужение суставной щели, остеопороз
Е. 2 – 3 месяца
Ж. До 1 года
1. Для ревматоидного артрита ВНЧС характерно
2. Для контактного артрита ВНЧС характерно
3. Характерная рентгенологическая картина острого артрита ВНЧС
4. Рентгенологическая симптоматика хронического артрита ВНЧС
5. Длительность течения острого артрита ВНЧС
6. Длительность течения хронического артрита ВНЧС
- А. А – 6, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4, Е – 5
Б. А – 6, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5, Е – 4
В. А – 6, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4, Е – 5

ЭНДОДОНТ ВКЛЮЧАЕТ

- А. Пульпу и дентин
Б. Пульпу зуба
В. Пульпу зуба, периодонтальную связку,
Г. Пульпу зуба, периодонтальную связку, альвеолу
Д. Пульпу зуба, периодонтальную связку, альвеолу, десну

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЕО-ЛАМПЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ

- А. Гипертонической болезни компенсируемой формы
Б. Сердечно-сосудистой недостаточности компенсируемой формы
В. Сердечно-сосудистой недостаточности, компенсируемой электрокардиостимулятором
Г. Сердечно-легочной недостаточности компенсированной формы
Д. Сердечно-легочной недостаточности декомпенсированной формы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Методы реставрации:

А.Пломба

Б.Прямой винир

В.Непрямой винир

Г.Искусственная коронка Показания:

1.Изменения цвета зуба после эндодонтического лечения

2.Незначительный по площади клиновидный дефект

3.Диастема

4.Флюороз

А. 1БВ, 2А, 3БВГ, 4БВ

Б. 1БВ, 2А, 3БВ, 4БВ

В. 1БВ, 2БА, 3БВГ, 4БВ

ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ

А. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, дренирование раны, удаление причинного зуба

Б. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, назначение антибиотиков, ротовых ванн, УВЧ

В. Удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн

Г. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, дренирование раны, удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн

Д. Медикаментозная терапия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Осложнения:

А.Отсутствие сухого блеска

Б.Дебондинг

В.Ожог пульпы

Г.Интоксикация пульпы Ошибки при изготовлении прямых виниров:

1.при препарировании

2.при протравливании и нанесении адгезива

3.при работе с композитом

4.при шлифовании и полировании

А. 1Г, 2В, 3Б, 4А

Б. 1В, 2Г, 3Б, 4А

В. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Определение:

А. Число людей, имеющих заболевание на момент обследования

Б. Число пораженных, удаленных и пломбированных зубов на одного обследованного

Г. Число новых случаев заболевания за определенный промежуток времени Показатель:

1. Заболеваемость

2. Распространенность

3. Интенсивность

А. 1Г, 2А, 3Б

Б. 1Г, 2А, 3Б

В. 1А, 2Г, 3Б

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОКАЗАНЫ ДЛЯ ЛИЦ

А. Кариесвосприимчивых

Б. Кариерезистентных

В. Молодого возраста

Г. В детском возрасте.

Д. Пожилого возраста

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Монокультура анаэробов

Б. Гиперкапния, аэрация тканей

В. Аэробы, факультативные и облигатные анаэробы

Г. Бактероиды, фузобактерии

Д. Монокультура стафилококка

Е. Кишечная палочка, протей

1. Бактерии, вызывающие гнойно – воспалительные процессы в челюстно - лицевой области

2. К облигатным неспорообразующим бактериям относятся

3. Условия не способствующие развитию бактериоидной инфекции

4. При нагноении лимфоузлов из гнойных очагов высеваются

5. Микроорганизмы, которые чаще всего высеваются при одонтогенных абсцессах

А. А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 2, Д – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 2, Д – 4

В. А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Заболевание:

А. Корневая киста остаточная

Б. Периапикальный абсцесс без свища

В. Корневая киста апикальная и боковая

Г. Хронический апикальный периодонтит Код по МКБ-10:

1. K04.5

2. K04.80

3. K04.7

4. K04.81

А. 1Г, 2В, 3Б, 4А

Б. 1Г, 2А, 3Б, 4В

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Ошибки и осложнения:

А. Нависающий край пломбы, отсутствие контактного пункта

Б. Термический ожог пульпы

В. Вскрытие полости зуба

Г. Дебондинг Этапы лечения, на которых совершены ошибки:

1. Препарирование полости

2. Наложение матрицы

3. Пломбирование полости

4. Полирование пломбы

А. 1БВ, 2А, 3АГ, 4--

Б. 1БВ, 2А, 3Г, 4--

В. 1В, 2А, 3Г, 4--

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

А. Острый периодонтит

Б. Обострившийся хронический периодонтит

В. Нагноившаяся радикулярная киста

Г. Общий гнойный пульпит

Д. Альвеолит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Интенсивные приступообразные боли, зачастую – наличие «ауры» или раздражение триггерных зон перед приступом; вегетативные проявления

Б. Неврита

В. 1 месяц

Г. Невралгии

Д. Ноющие боли, часто постоянного характера, сопровождающиеся нарушением чувствительности и двигательными нарушениями

Е. 2 месяца

1. Клинические проявления неврита тройничного нерва

2. Клинические проявления невралгии тройничного нерва

3. Антikonвульсанты эффективны при лечении

4. Длительность болевого синдрома, при котором ставится диагноз хронической боли (при отсутствии морфологического субстрата)

А. А – 2, Г – 3, Д – 4, Е – 1

Б. А – 3, Г – 2, Д – 1, Е – 4

В. А – 2, Г – 3, Д – 1, Е – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Тенденция к группировке папул

Б. Повторное заражение этим же заболеванием после выздоровления

В. 3 – 4 недели

Г. 1 – 2 месяца

Д. Розеола, папулы, реже – пустулы

Е. Повторное заражение одним и тем же заболеванием у невылеченного больного

1. Реинфекция

2. Суперинфекция

3. Инкубационный период для первичного сифилиса

4. Проявления вторичного сифилиса на коже

5. Признаки рецидивирующего вторичного сифилиса

А. А – 5, Б – 1, В – 3, Д – 2, Е – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Д – 4, Е – 2

В. А – 1, Б – 5, В – 3, Д – 4, Е – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИРОТОВОГО ОСМОТРА** Действие:

А. определение состояния слизистой оболочки полости рта (языка, дна полости рта, щек, твердого и мягкого неба)

Б. определение прикуса

В. осмотр преддверия полости рта

Г. обследование зубных рядов и зубов

Д. оценка состояния тканей пародонта.

А. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д, 5-Г

Б. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г, 5-Д

В. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д, 5-Г

МИКРОПРОТЕЗ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБА И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ВСЮ ОККЛЮЗИОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

А. Pinlay

Б. Inlay

В. Onlay

Г. Overlay

Д. Ney

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Тестовое задание №200 **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР ЗУБА СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМ ГЕРМЕТИКОМ.** Действие:

А. протравливание фиссуры кислотой

Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета

В. изоляция от слюны, высушивание зуба

Г. отмывание кислоты из фиссуры

Д. проверка окклюзионной высоты прикуса

Е. повторная изоляция зуба от слюны

Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам

З. высушивание протравленной поверхности фиссуры

И. отверждение герметика с помощью поляризационной лампы

А. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-Е, 6-З, 7-Ж, 8-Д, 9-И

Б. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-Ж, 6-З, 7-Е, 8-И, 9-Д

В. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-Е, 6-З, 7-Ж, 8-И, 9-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕИНВАЗИВНОЙ МЕТОДИКИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР** Действие:

- А. протравливание фиссуры кислотой
- Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета
- В. изоляция от слюны, высушивание зуба
- Г. отмывание кислоты из фиссуры
- Д. проверка окклюзионной высоты прикуса
- Е. повторная изоляция зуба от слюны
- Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам, отверждение

3. высушивание протравленной поверхности фиссуры.

А. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-З, 6-Е, 7-Ж, 8-Д

Б. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-Е, 6-З, 7-Ж, 8-Д

В. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А, 5-Е, 6-З, 7-Ж, 8-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Сложные эфиры
 - Б. Амиды
 - В. Этиловые эфиры
 - Г. Артикаин и гидрохлорид
 - Д. Барбитураты
1. Прилокаин относится к группе:
 2. Мепивакаин относится к группе:
 3. Бупивакаин относится к группе:
 4. Ультракаин относится к группе:
 5. Новокаин относится к группе:

А. А – 5, Б – 1,2, Г – 4,3

Б. А – 5, Б – 1,2,3, Г – 4

В. А – 2, Б – 1,3,4, Г – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЧИСТКИ ЗУБОВ** Действие:

- А. повторное определение гигиенического индекса
- Б. демонстрация пациенту метода чистки на обучающей модели зубов
- В. индивидуальный подбор средств гигиены полости рта
- Г. чистка зубов под контролем врача гигиениста стоматологического
- Д. определение гигиенического индекса

А. 1-Д, 2-Б, 3-Г, 4-А, 5-В

Б. 1-Д, 2-Б, 3-Г, 4-В, 5-А

В. 1-Д, 2-Г, 3-Б, 4-А, 5-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.**

- А. Болевой дисфункции
- Б. Остром артрите
- В. Артрозе
- Г. Хроническом артрите

1. Костные структуры ВНЧС при рентгенологическом исследовании не изменены при:

2. Склероз кортикальной пластинки суставной головки и бугорка наблюдается при:

3. Наличие экзофитов на суставных поверхностях встречается при:

4. Деформация суставной головки нижней челюсти наблюдается при:

5. Уплотнение суставного бугорка происходит при:

А. А – 1, Б – 1, В – 2, 3, 4, 5

Б. А – 1, Б – 2, В – 3, 4, 5

В. А – 1, Б – 1,5, В – 2, 3, 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Группы методов местной анестезии:

А. Основные

Б. Дополнительные (пародонтальные) Методы анестезии:

1. мандибулярная;
2. торусальная;
3. инфильтрационная;
4. интралигаментарная;
5. инфраорбитальная;
6. внутрипульпарная;
7. интрасептальная.

А. А-1, 2, 3, 4, Б-5, 6, 7

Б. А-1, 2, 3, 5, Б-4, 6, 7

В. А-1, 2, 3, 6, Б-4, 5, 7

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Мази с НПВС

Б. Противовоспалительные болеутоляющие антигистаминные

В. Иммуномодуляторы

Г. До снятия острых воспалительных явлений

Д. После снятия острых воспалительных явлений

Е. Бишофит, медицинская желчь

1. Ортопедическое лечение при артритах проводится:
2. Препараты, применяемые для лечения острой фазы артрита ВНЧС
3. Препараты для местного лечения артритов в хронической фазе
4. Препараты для местного лечения артритов в острой фазе

А. А – 4, Б – 1, Д – 2, Е – 3

Б. А – 4, Б – 2, Д – 1, Е – 3

В. А – 4, Б – 2, Д – 3, Е – 1

РЕСТАВРАЦИЯ ПО МЕТОДИКЕ "ОТКРЫТОГО СЭНДВИЧА" - ЭТО:

А. Контактный пункт выполнен СИЦ, окклюзионная поверхность - композитом

Б. Перекрытие базовой подкладки из СИЦ композитом в области контактного пункта и с окклюзионной поверхности

В. Нанесение СИЦ на слой низкомодульного композита

Г. Контактный пункт выполнен композитом, окклюзионная поверхность - СИЦ

Д. Окклюзионная поверхность - композит, контактный пункт - амальгама

ПРИ ВКОЛОЧЕННОМ ВЫВИХЕ РЕЗЦОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Провести шинирование и оставить под наблюдение
- В. Репозировать
- Г. Депульпировать и репозировать
- Д. Удалить

СЛИВАЮЩИЕСЯ В РИСУНОК ПАПУЛЫ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- А. Лейкоплакия
- Б. Герпес
- В. Красная волчанка
- Г. Плоский лишай
- Д. Опоясывающий лишай

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Имеет вид плотной ткани, по плотности соответствует кости
 - Б. Из соединительной ткани
 - В. Из лимфоидной ткани
 - Г. Из слизистой ткани
 - Д. Очаг деструкции кости с нечеткими границами
 - Е. Напоминает кисту
 - Ж. Очаг разрежения костной ткани без четких границ, репаративные процессы в окружающей кости отсутствуют
1. Развитие цементомы происходит
 2. Развитие миксомы происходит
 3. Проявление миксомы на рентгенограмме
 4. Проявление цементомы на рентгенограмме
 5. Проявления одонтогенной карциномы (первичного рака) нижней челюсти на рентгенограмме
- А. А – 1, Б – 4, Г – 2, Д – 3, Ж – 5
 - Б. А – 4, Б – 1, Г – 2, Д – 3, Ж – 5
 - В. А – 4, Б – 1, Г – 2, Д – 5, Ж – 3

ВЕРРУКОЗНУЮ ЛЕЙКОПЛАКИЮ ОТНОСЯТ

- А. К раку
- Б. К дерматозу
- В. К облигатному предраку
- Г. К факультативному предраку

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. С неба на ножке

Б. Удаление причинного зуба, назначение местных сосудосуживающих средств, ФТЛ

В. С вестибулярной поверхности вестибулярного отростка

Г. Удаление причинного зуба, пункции промывания пазухи, симптоматическое лечение

Д. Удаление причинного зуба, гайморотомия

1. Лечение острого одонтогенного серозного гайморита

2. Лечение острого одонтогенного гнойного гайморита

3. Лечение хронического одонтогенного гайморита

4. Чаще всего ороантральное сообщение закрывается путем слизисто-надкостничного лоскута взятого

А. Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3

Б. Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

В. Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Код МКБ-10:

А. К03.0 БК00.40

В. К03.2

Г. К00.52 Заболевание:

1. Эрозия зубов

2. Повышенное стирание зубов

3. Гипоплазия эмали

4. Незавершенный одонтогенез.

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1А, 2В, 3Б, 4Г

В. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Жалобы:

А. Незначительные болевые ощущения при накусывании на зуб

Б. Постоянные, постепенно нарастающие боли, «симптом выросшего зуба», болезненное накусывание на зуб

В. Постоянные ноющие, пульсирующие боли, болезненность при накусывании

Г. Часто протекает бессимптомно Заболевание:

1. Острый апикальный периодонтит

2. Хронический апикальный периодонтит

3. Корневая киста

4. Периапикальный абсцесс без свища

А. 1Б, 2А, 3В, 4Г

Б. 1Б, 2А, 3Г, 4В

В. 1Б, 2В, 3Г, 4А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Антистафилококковый иммуноглобулин

Б. 2 – 4 дня

В. 1 – 2 часа

Г. 1 - 2 месяца

Д. стафилококковый анатоксин

1. Сроки повышения резистентности организма после пассивной иммунизации

2. Сроки повышения резистентности организма после активной иммунизации

3. Сроки лечебного действия препарата при пассивной иммунизации

4. Средство активной иммунизации

5. Средство пассивной иммунизации

А. А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 4

Б. А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 4, Д – 2

В. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 2, Д – 4

ДИАГНОЗ "ГЛУБОКИЙ КАРИЕС" СООТВЕТСТВУЕТ ДИАГНОЗУ ПО МКБ-10:

А. Кариес эмали

Б. Кариес дентина

В. Кариес цемента

Г. Гиперемия пульпы

Д. Д) Рецидивирующий кариес

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Группы методов местной анестезии:

А. Инфильтрационные

Б. Проводниковые Методы анестезии:

1. инфильтрационная
 2. интралигаментарная
 3. резцовая
 4. небная
 5. торусальная
 6. интрасептальная
 7. мандибулярная
- А. А-1, 3, 6, Б-2, 4, 5, 7
Б. А-1, 2, 6, Б-3, 4, 5
В. А-1, 2, 6, Б-3, 4, 5, 7

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ АРТРИТА ВНЧС С ХРОНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. Выраженное сужение суставной щели, нарушение функции суставной головки.
Б. Незначительное расширение суставной щели, нарушение функции суставной головки.
В. Выраженное расширение суставной щели, нарушение функции суставной головки.
Г. Исчезновение наружных замыкающих кортикальных пластинок, краевые узур, остеопороз и кисты суставной головки
Д. Ширина суставной щели без изменений, нарушение функции суставной головки.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид местного обезболивания:

А. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000

Б. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% без вазоконстриктора (Ultracain

Д) Показания к применению:

1. Операция удаления зуба

1.4 у практически здорового пациента

2. Операция удаления зуба

3.8 у практически здорового пациента

3. Кюретаж пародонтальных карманов у пациента с диабетом в анамнезе

4. Операция вскрытия субпериостальный абсцесс у пациента с гипертонической болезнью в анамнезе

5. Операция удаления зуба

5.4 у пациента 10 лет

А. А-1, 5, Б-3, 4

Б. А-1, Б-3, 4, 5

В. А-1, Б-4, 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Очаг интенсивного затемнения с четкими и ровными границами, окруженной полоской просветления шириной около 1 мм

Б. Неоднородный очаг округлой формы с чередованием участков разрежения и уплотнения

В. Гомогенный очаг затемнения округлой формы с четкими границами

Г. Гомогенный очаг затемнения нечеткими и неровными границами

Д. Очаг деструкции кости с нечеткими границами, окруженный ободком склерозированной ткани

1. Рентгенологическая картина губчатой остеомы челюсти

2. Рентгенологическая картина компактной остеомы челюсти

3. Рентгенологическая картина оссифицирующего периостита

4. Рентгенологическая картина одонтомы

5. Рентгенологическая картина остеоида - остеомы

А. А - 4, Б - 1, В - 2, Г - 3, Д - 5

Б. А - 4, Б - 2, В - 1, Г - 3, Д - 5

В. А - 2, Б - 1, В - 4, Г - 3, Д - 5

ТОННЕЛЬНОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА

- А. Резцах и клыках
- Б. Клыках и премолярах
- В. Премолярах и резцах
- Г. Молярах и премолярах
- Д. Молярах и резцах

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР ЗУБА ХИМИОТВЕРЖДАЕМЫМ ГЕРМЕТИКОМ. Действие:

- А. протравливание фиссуры кислотой
 - Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета
 - В. изоляция от слюны, высушивание зуба
 - Г. отмывание кислоты из фиссуры
 - Д. проверка окклюзионной высоты прикуса
 - Е. повторная изоляция зуба от слюны
 - Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам, отверждение
- 3. высушивание протравленной поверхности фиссуры.**
- А. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-З, 7-Д, 8-Ж
 - Б. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-Ж, 7-З, 8-Д
 - В. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-З, 7-Ж, 8-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Групповая принадлежность:

- А. сложные эфиры
 - Б. амиды Анестетики:
1. Лидокаин
 2. Прокаин /новокаин
 3. Артикаин
 4. Мепивакаин
 5. Тетракаин /дикаин
- А. А-2,5, Б-1,3,4
 - Б. А-2,3,4, Б-1,2,5
 - В. А-5,6,Б-1,2,3,4

ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ВРЕМЕННЫХ РЕЗЦОВ СО СФОРМИРОВАННЫМИ КОРНЯМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Удалить
- В. Зубы трепанировать, запломбировать за верхушки корней
- Г. Зубы трепанировать, запломбировать до верхушек корней
- Д. Репозиция зубов, их фиксация, наблюдение

ПРИЗНАКИ ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ

- А. Усиление воспаления в окружности язвы
- Б. Уменьшение воспаления в окружности язвы
- В. Уплотнение краев и основания язвы
- Г. Усиление боли
- Д. Уменьшение боли

НАЛИЧИЕ У РЕБЕНКА УСТОЙЧИВОЙ ПРИВЫЧКИ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ПОСТОЯННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ЯЗЫКА МЕЖДУ ЗУБАМИ, ФОРМИРУЕТ:

- А. Мезиальную окклюзию
- Б. Глубокую резцовую окклюзию
- В. Дистальную окклюзию
- Г. Вертикальную резцовую дизокклюзию
- Д. Вестибулоокклюзию

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Хронический сиалэктатический паротит
 - Б. Эпидемический паротит
 - В. Острый серозный лимфаденит интракапсулярного лимфоузла околоушно-жевательной области
 - Г. Интерстициальный сиаладенит
 - Д. Слюнно-каменная болезнь
1. Вирусный сиалоаденит
 2. Ложный паротит Герценберга
 3. Паренхиматозный паротит
 4. Калькулезный сиалоаденит
 5. Склерозирующий субмаксиллит
- А. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5, Д – 4
 - Б. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 5
 - В. А – 1, Б – 2, В – 3, Г – 5, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Плазматические клетки

Б. Эозинофилы

В. Нейтрофильный сдвиг влево

Г. 4 – 5 сутки

Д. Гигантские многоядерные клетки

Е. 2 – 3 сутки

1. Признаки острого воспалительного процесса в общем анализе крови

2. Цитологический признак медленного заживления раны

3. Признак патологического течения раневого процесса

4. Цитологический признак наличия в ране инородного тела

5. Сроки перехода от макрофагальной фазы в фибробластическую при раневом процессе

А. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4

Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4

В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Описание

А. Ткани зуба имеют разные цвета при различных условиях освещения

Б. Способность материалов приобретать вид окружающих тканей, сливаться с ними

В. Способность эмали при естественном освещении испускать бледное мерцание

Г. Способность зубов поглощать волны ультрафиолетового диапазона и испускать видимый, синеватый свет

Оптические характеристики зубных тканей и композитов

1. Опалесценция

2. Флуоресценция

3. Метамерия

4. Эффект хамелеона

А. 1Г, 2В, 3А, 4Б

Б. 1В, 2А, 3Б, 4Г

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Решетчатой кости с разрывом слизистой оболочки

Б. Лобных отростков верхней челюсти и костей носа

В. Вниз

Г. Вниз и кнутри

1. Отломки при переломе скуловой дуги обычно смещаются:

2. В каком направлении возможна диплопия при значительном смещении отломков скуловой кости

3. Смещение костей носа у его основания указывает на перелом:

4. Подкожная крепитация при повреждении кости носа свидетельствует о переломе:

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Заболевание, в основе которого лежит нарушение чувствительности, выражающееся в приступообразных болях в зонах иннервации соответствующего нерва

Б. Полное отсутствие произвольных движений мышц

В. Уменьшение силы и (или) амплитуды произвольных движений мышц

Г. Состояние повышенной возбудимости нервной системы в сочетании с ее повышенной истощаемостью

Д. Места выхода ветвей тройничного нерва из костного отверстия в мягкие ткани

Е. Место нахождения триггерных (курковых) зон

1. Точки Валле

2. Невралгия

3. Неврит (невропатия)

4. Паралич

5. Парез

А. А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 5, Д – 1

Б. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 3

В. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Обширная деструкция костной ткани с зазубренными краями**
- Б. Имеет вид мелких полостей, разделенных костными перегородками**
- В. Очаг неравномерного интенсивного затемнения с неровными границами**
- Г. Ограниченное разряжение костной ткани с четкими границами**

- 1. Описание ячеистой формы остеобластомы**
- 2. Описание солидной формы остеобластомы**
- 3. Описание литической формы остеобластомы**
- 4. Описание кистозной формы остеобластомы**

- А. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4**
- Б. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2**
- В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Особенности препарирования:

А. Полость формируется до видимо здоровых тканей, эмаль протравливается по краю и в области фиссур

Б. Иссечение всех пораженных кариесом тканей, расширение до иммунных зон

В. Полость формируется до видимо здоровых тканей, фиссуры раскрываются в пределах эмали

Г. Щадящее препарирование до видимо здоровых участков Варианты профилактического пломбирования:

- 1. Создание ограниченного контура полости**
- 2. Профилактическое пломбирование с неинвазивной герметизацией фиссур**
- 3. Профилактическое пломбирование с инвазивной герметизацией фиссур**
- 4. Расширенное профилактическое пломбирование**

- А. 1Г, 2В, 3А, 4Б**
- Б. 1Г, 2Б, 3В, 4А**
- В. 1Г, 2А, 3В, 4Б**

К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА ОТНОСЯТ

- А. Болезнь Боуэна**
- Б. Болезнь Боуэна и пигментную ксеродермию;**
- В. Болезнь Боуэна, актинический кератоз, предраковый меланоз**
- Г. Болезнь Боуэна, бородавчатый (узелковый) предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз;**
- Д. Болезнь Боуэна, абразивный хейлит Манганотти.**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Для иммобилизации отломков нижней челюсти в области угла
- Б. Для иммобилизации отломков при линейных переломах нижней челюсти в пределах от центральных резцов до премоляров
- В. Шина, фиксирующаяся на зубах верхней челюсти, а боковые крылья – пилоты опущены вниз
- Г. Пластмассовая шина, охватывающая зубы; плотно прилежащая к десневому краю и опирающаяся на альвеолярный отросток челюсти
- Д. Шина состоящая из базисных пластинок на альвеолярные отростки верхней и нижней челюсти, которые скрепляются в единый блок, а в переднем отделе имеется отверстие для приема пищи

1. Гладкая шина – скоба используется:

2. Шина Вебера – это

3. Шина Порта – это

4. Шина Ванкевича - это

А. Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

Б. Б – 4, В – 1, Г – 2, Д – 3

В. Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между выбором способа и средства местного обезболивания и показаниями к его применению. Вид местного обезболивания:

А. Инфильтрационная анестезия с анестетиком артикаином 3% с эпинефрином 1:100 000

Б. Проводниковая анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000

Показания к применению:

1. Депульпирование зуба

2.5

2. Депульпирование зуба

4.6

3. Депульпирование зуба

3.8

4.Депульпирование зуба

1.3

5.Депульпирование зуба

2.7

А. А-1,4,5,Б-2,3

Б. А-1,5,Б-2,3,4

В. А-1,4,5,Б-2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ УДАЛЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ НАДДЕСНЕВЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ** Действие:

- А. полирование поверхностей зубов
 - Б. удаление зубного камня
 - В. покрытие зубов фторлаком (фторгелем)
 - Г. антисептическая обработка десен
- А. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В,
Б. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А,
В. 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В,

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Рентгенологическая картина:

- А. Выраженные периапикальные деструктивные изменения костной ткани
 - Б. Участок разряжения костной ткани с четкими контурами более 5мм
 - В. Изменений не выявляется Заболевание:
1. Острый апикальный периодонтит
 2. Хронический апикальный периодонтит
 3. Радикулярная киста
 4. Хронический пульпит
- А. 1В, 2А, 3Б, 4В
Б. 1Б, 2А, 3В, 4В
В. 1В, 2А, 3Б, 4А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Методы лечения:

- А. Герметизация фиссур
 - Б. Реминерализующая терапия
 - В. Препарирование и пломбирование полостей
 - Г. Обучение гигиене полости рта Стадии кариеса:
1. Стадия пятна
 2. Кариес эмали
 3. Кариес дентина
 4. Осложненный кариес
- А. 1АБГ, 2АБВГ, 3ВГ, 4Г
Б. 1АБГ, 2АВГ, 3ВГ, 4Г
В. 1АБГ, 2АБВГ, 3Г, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Развивается вследствие попадания в трахею и бронхи рвотных масс, сгустков крови, содержимого полости рта

Б. Возникает при разрыве мягких тканей неба или задней стенки глотки, когда во время вдоха лоскут перекрывает дыхательные пути

В. Возникает вследствие закрытия верхних дыхательных путей инородным телом, рвотными массами, кровавым сгустком

Г. Развивается вследствие западения языка при смещении отломков нижней челюсти, особенно подбородочного отдела

Д. Развивается вследствие отека голосовых связок и тканей подвязочного пространства или сдавления задних отделов гортани гематомой

1. Дислокационная асфиксия

2. Обтурационная асфиксия

3. Стенотическая асфиксия

4. Клапанная асфиксия

5. Аспирационная асфиксия

А. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3

Б. А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 2, Д – 3

В. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д – 1

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ЭМАЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЕ КОНТАКТ С КОМПОЗИТОМ ПО ПРИНЦИПУ

А. Микросцепления

Б. Химического взаимодействия

В. Адгезии

Г. Макросцепления

Д. Макросцепления и химического взаимодействия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Химическая основа материалов:

А.Керамический полисилоксан

Б.Композит+СИЦ

В.Органическая полимерная Матрица+наполнитель

Г.Акриловые или апоксидные Полимеры Группы пломбировочных материалов:

1.Компомеры

2.Композиты

3.Ормомеры

4.Пластмассы

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1Б, 2А, 3В, 4Г

В. 1Б, 2В, 3А, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПОЛОСКАНИЕ РТА ФТОРИДСОДЕРЖАЩИМИ РАСТВОРАМИ Действие:**

А. подготовка раствора фторида

Б. Рекомендации

В. контролируемая чистка зубов

Г. полоскание полости рта

А. 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б

Б. 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г

В. 1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Анаэробы

Б. Пустулезная, бугорковая, смешанная

В. Создает условия для развития актиномицетов

Г. Абсцедирующая, гуммозная, смешанная

Д. Образование инфильтратов, которые могут нагнаиваться

Е. Препятствует развитию актиномицетов

Ж. Наличие гуммозных образований клетчатки

1. Кожная форма актиномикоза

2. Подкожная форма актиномикоза

3. Для подкожно – мышечной формы актиномикоза характерно

4. Актиномицеты, обладающие большей патогенностью

5. Роль пиогенной (банальной микрофлоры) при актиномикозе

А. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3, Д – 2

Б. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2, Д – 3

В. А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 2, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ «УРОКА ГИГИЕНЫ» В ШКОЛЕ.** Действие:

А. чистка зубов под контролем гигиениста стоматологического

Б. повторное определение гигиенического индекса у школьников

В. индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта

Г. демонстрация гигиенистом техники чистки зубов на обучающей модели

Д. определение гигиенического индекса у школьников

Е. беседа со школьниками по вопросам рационального ухода за полостью рта

Ж. отработка школьниками на демонстрационных моделях техники чистки зубов

А. 1-Е, 2-Г, 3-Ж, 4-Д, 5-А, 6-Б, 7-В

Б. 1-Е, 2-Г, 3-Д, 4-Ж, 5-А, 6-Б, 7-В

В. 1-Е, 2-Г, 3-Ж, 4-Д, 5-А, 6-В, 7-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

Б. Стадия истощения секретобразования и дистрофических изменений

В. Стадия липоматоза и фиброза

Г. Рентгенография мягких тканей дна полости рта

Д. Стадия гиперсекреции

1. Рентгенографическая проекция для выявления камня в переднем отделе выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы

2. Рентгенографическая проекция для выявления камня в паренхиме поднижнечелюстной слюнной железы

3. Начальная стадия сиалоза

4. Клинически выраженная стадия сиалоза

5. Поздняя стадия сиалоза

А. А – 4, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 3

Б. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3, Д – 1

В. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Свойства композитных материалов:

А.Выделение фтора

Б.Высокая эластичность

В.Высокая прочность

Г.Низкая полимеризационная усадка Группы композитных материалов:

1.Текущие

2.Гибридные

3.Нанокомпозиты

4.Компомеры

А. 1Б, 2В, 3Г, 4А

Б. 1В, 2Б, 3Г, 4А

В. 1Б, 2Г, 3А, 4В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Возраст пациента:

- А. 10 лет
 - Б. 21 год
 - В. 45 лет
 - Г. 79 лет
- Максимально допустимая доза:
- 1. 4,4 мг/кг
 - 2. 5,4 мг/кг
 - 3. 6,4 мг/кг
 - 4. 7,4 мг/кг
 - 5. 8,4 мг/кг
- А. А-1,Б-1, В-1,Г-1
 - Б. А-1,Б-2, В-3,Г-4
 - В. А-2,Б-3, В-4,Г-5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Серозная инфильтрация тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел
 - Б. Зуд кожи, эозинофилия, в пунктате – клетки Березовского - Штернберга
 - В. Золотистый стафилококк
 - Г. Смешанная микрофлора
 - Д. Гнойное воспаление тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел
 - Е. Наличие пакетов лимфоузлов, длительный субфебрилитет, положительная реакция Пирке и Манту, наличие в пунктате гигантских клеток Пирогова – Лангханса
 - Ж. Острое начало заболевания, высокая температура тела, отрицательная проба с актинолизатом
- 1. Микроорганизм – наиболее частый возбудитель острых лимфаденитов лица и шеи
 - 2. Периаденит
 - 3. Аденофлегмона
 - 4. Характерные признаки туберкулезного лимфаденита
 - 5. Нехарактерные для актиномикоза признаки поражения лимфатических узлов
 - 6. Клиническая симптоматика лимфогрануломатоза
- А. А – 3, Б – 6, В – 1, Д – 2, Е – 4, Ж – 5
 - Б. А – 2, Б – 6, В – 1, Д – 3, Е – 5, Ж – 4
 - В. А – 2, Б – 6, В – 1, Д – 3, Е – 4, Ж – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Методы анестезии:

А. Интралигаментарная

Б. Инфильтрационная Показания к проведению анестезии:

1. лечение кариеса;
2. лечение пульпита;
3. удаление зубов по поводу хронического апикального периодонтита (вне обострения)
4. депульпирование интактных зубов;
5. лечение пародонтита;
6. лечение острого апикального периодонтита.

А. А-1, 3, 4, Б-1, 2, 3, 4, 5, 6

Б. А-1, 2, 3, 4, Б-1, 2, 3, 4, 5, 6

В. А-1, 2, 3, 4, Б-1, 2, 4, 5, 6

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССОВ И ФЛЕГМОН ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Новокаиновая блокада с антибиотиками
- Б. Послойное вскрытие гнойного очага с введением дренажа
- В. Удаление причинного зуба
- Г. Проведение физиотерапии
- Д. Дезинтоксикационная терапия

УКАЗАТЬ ОШИБКИ ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

- А. Нависающий край пломбы
- Б. Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба
- В. Химический ожог пульпы зуба
- Г. Хроническое воспаление десневого края
- Д. Отсутствие контактного пункта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Гистиоцитоз (ретикулоэндотелиоз)

Б. Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение

В. Злокачественная эпителиальная опухоль

Г. Очаг разряжения костной ткани без четких границ

Д. Участки неоднородной деструкции костной ткани без наличия полосы остеосклероза по периферии очага

Е. Наличие очагов вновь образованной ткани

1. Первичный рак челюсти – это:

2. Эозинофильная гранулема – это:

3. Рентгенологические проявления первичного рака челюсти

4. Рентгенологические проявления эозинофильной гранулемы

А. А - 1, В - 3, Г - 2, Д - 4

Б. А - 2, В - 1, Г - 3, Д - 4

В. А - 2, В - 1, Г - 4, Д - 3

ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ ГИНГИВО-СТОМАТИТ СОПРОВОЖДАЕТ ТЕЧЕНИЕ

А. Сифилиса

Б. ВИЧ-инфекции

В. Красной волчанки

Г. Хронического герпетического стоматита

Д. Многоформной экссудативной эритемы

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А. Абсцедирование

Б. Подвижность зубов 2 степени

В. Патология прикуса

Г. Сахарный диабет

Д. Кровоточивость десен

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид местного обезболивания:

А. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Мепивакаин 3% по переходной складке

Б. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000 по переходной складке Показания к применению:

1. Депульпирование зуба

2.4 у практически здорового пациента

2. Депульпирование зуба

4.6 у практически здорового пациента

3. Депульпирование зуба

3.2 у пациента с гипертонической болезнью

4.Депульпирование зуба

1.3 у пациента с инфарктом миокарда в анамнезе

5.Лечение кариеса дентина зуба

5.5 у пациента 5 лет

А. А-4,5, Б-1,3

Б. А-3,4,5, Б-1

В. А-3,4, Б-1,5

К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТ

А. Болезнь Боуэна и пигментную ксеродермию

Б. Актинический кератоз, радиационный дерматоз, предраковый меланоз

В. Бородавчатый (узелковый) предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, абразивный хейлит Манганотти

Г. Эритроплакию, бородавчатый предрак, ограниченный гиперкератоз, абразивный хейлит Манганотти

Д. Болезнь Боуэна, лейкоплакия, хроническая трещина губы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Показания:

А. Препарирование без выхода на аппроксимальную грань и кариесрезистентных пациентов

Б. Скрытые полости до контактного пункта сочетание полостей 2 и 1 класса

В. Полость в придесневой области до контактного пункта у зубов с высокой коронкой

Г. Распространение полости на контактный пункт, замена старой реставрации Методики препарирования и пломбирования полостей 2 класса:

1. Техника горизонтального тоннеля

2. Техника сквозного вертикального тоннеля

3. Техника несквозного вертикального тоннеля

4. Препарирование и пломбирование стандартными керамическими вкладками

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1А, 2Б, 3В, 4Г

В. 1Г, 2Б, 3А, 4В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Расширение и сужение протока

Б. Сужение протоков на всем протяжении

В. «Гроздь винограда»

Г. «Чернильное пятно»

Д. Без изменений

1. Сиалографический признак разрастания в паренхиме слюнной железы соединительной ткани

2. Сиалографический признак наличия поражения протока слюнной железы

3. Сиалографический признак лимфогенного паротита характеризуется скоплением контраста в виде:

4. Сиалографический признак паренхиматозного паротита характеризуется скоплением контраста в виде:

5. Сиалограмма ложного паротита Герценберга

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 3

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Методы анестезии:

А. Инфильтрационная.

Б. Интралигаментарная.

В. Мандибулярная. Время наступления анестезии (латентный период):

1) 15-45 с;

2) 1-2 мин.;

3) 10-15 мин.;

4) 30 мин.

А. А-1, Б-2, В-3

Б. А-3, Б-1, В-2

В. А-2, Б-1, В-3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Жалобы:

А.Зуб ранее сильно болел, в настоящее время боль возникает при попадании пищи в полость

Б.Боли интенсивные,самопроизвольные, иррадиирующие, усиливаются от горячего, кратковременное ослабление от холодного

В.Быстропроходящие боли от температурных, механических, химических раздражителей, возникшие 2-3 дня назад

Г.Продолжительные боли от всех видов раздражителей, ночные и самопроизвольные боли
Заболевание:

1.Пульпит начальный

2.Пульпит острый

3.Пульпит гнойный

4.Пульпит хронический гипертрофический

А. 1В, 2Г, 3Б, 4А

Б. 1Г, 2В, 3Б, 4А

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Анестетик с вазоконстриктором:

А. Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000

Б. Артикаин 4% с эпинефрином 1: 200 000 Стоматологические манипуляции:

1. Операция удаления третьего моляра нижней челюсти

2. Лоскутная операция при пародонтите средней степени тяжести

3. Вскрытие пародонтального абсцесса

4. Формирование кариозной полости

5. Депульпирование моляра нижней челюсти

6. Операция имплантации

А. А-1,2,5,6,Б-3,4

Б. А-2,5,6,Б-1,3,4

В. А-1,2,6,Б-3,4,5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Шов, накладываемый на 15 – 30 сутки после операции с предварительным иссечением грануляции, рубцов и мобилизацией краев раны

Б. Шов, накладываемый на гнойную рану во время хирургической обработки, но затягиваемый через 24 – 72 часа при стихании воспаления; или шов, накладываемый на 2 – 7 сутки после операции

В. Шов, накладываемый на рану непосредственно после вскрытия гнойного очага

Г. Шов, накладываемый на 8 – 14 сутки после операции без предварительного иссечения грануляции

1. Первичный шов

2. Первичный отсроченный шов

3. Вторичный ранний шов

4. Вторичный поздний шов

А. А – 2, Б – 4, В – 1, Г – 3

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3

В. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОСМОТРА** Действие:

- А. визуальная оценка вида кожных покровов (цвет, целостность)
 - Б. оценка состояние красной каймы губ, видимых слизистых
 - В. визуальная оценка степени выраженности носогубных, подбородочных и шейных складок
 - Г. пальпация регионарных лимфатических узлов
 - Д. исследование височно-нижнечелюстного сустава
 - Е. оценка конфигурации и симметричности лица
- А. 1-Е, 2-А, 3-В, 4-Г, 5-Б, 6-Д
Б. 1-Е, 2-А, 3-Г, 4-Б, 5-В, 6-Д
В. 1-Е, 2-А, 3-В, 4-Б, 5-Г, 6-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.**

- А. Скрепление отломков костным цементом
 - Б. Внутрикостное введение штифта (спицы), наложение накостной минипластины
 - В. Перевязка наружной сонной артерии
 - Г. Репозиция и фиксация отломков, перевязка сосуда в ране
 - Д. При помощи съемного протеза с преобразованием его в шину и пращи
 - Е. Наложение аппарата Рудько, ЦИТО
 - Ж. Шина с зацепными петлями и межчелюстным натяжением
1. Способ остановки кровотечения при переломах нижней челюсти:
2. Наиболее щадящий и часто применяемый метод лечения переломов нижней челюсти в пределах зубного ряда
3. Наиболее простой метод лечения переломов беззубой нижней челюсти
4. Наиболее легкий и быстро выполнимый метод остеосинтеза
- А. Б – 1, Г – 4, Д – 3, Ж – 2
Б. Б – 4, Г – 1, Д – 3, Ж – 2
В. Б – 4, Г – 2, Д – 1, Ж – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Метоксифлюран

Б. Дроперидол и транквилизаторы

В. Закись азота

Г. Сочетание транквилизаторов и анальгетиков

Д. Комбинация нейролептиков и анальгетиков

1. При применении кеталара наблюдается галлюцинации. Какие препараты вводят, чтобы нивелировать галлюциногенный эффект

2. «Веселящий газ»

3. Препарат для ингаляционного наркоза с более мощным наркотическим действием

4. Нейролептаналгезия

5. Атаралгезия

А. А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 1

Б. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д – 1

В. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Способы обезболивания

А. инфильтрационная, проводниковая анестезия

Б. аппликационная анестезия Анестетики

1. Тетракаин/дикаин

2. Лидокаин

3. Артикаин

4. Мепивакаин

5. Бензокаин/анестезин

А. А-2,3,4, Б-1,2,5

Б. А-2,А-5,Б-1,3,4

В. А-5,6,Б-1,2,3,4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Транзиторная, лабильная, стабильная
- Б. Фиброзная, ангиоматозная
- В. Капиллярная, ветвистая, кавернозная, смешанная
- Г. Капиллярная, кистозная, кавернозная
- Д. Ограниченная, разлитая

- 1. Формы эпюлида
 - 2. Виды гемангиом мягких тканей по строению
 - 3. Виды лимфангиом по строению
 - 4. Варианты лимфедемы губ
- А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3
 - Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3
 - В. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. 8 – 10 месяцев
 - Б. 45 суток
 - В. 2 недели
 - Г. Конец первого месяца
- 1. Сроки появления остеоидных палочек на дне и стенках лунки после удаления зуба
 - 2. Сроки начала заполнения лунки удаленного зуба мелкопетлистой губчатой костной тканью
 - 3. Сроки окончания заполнения лунки удаленного зуба мелкопетлистой губчатой костной тканью
 - 4. Сроки, при которых лунка рентгенологически не отличается от окружающей костной ткани при осложненном заживлении (альвеолите или остеомиелите)
- А. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1
 - Б. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2
 - В. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

А. Рассечение зуба на две части в области бифуркации с последующим сглаживанием нависающих краев, проведение кюретажа, покрытие коронкой

Б. Удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба

В. Удаление корня вместе с прилежащей коронковой частью

Г. Пересадка удаленного зуба в другую альвеолу

Д. Пересадка удаленного зуба в его же альвеолу

1. Аутотрансплантация зуба

2. Гемисекция зуба

3. Ампутация корня

4. Коронаро – радикулярная сепарация

5. Реплантация зуба

А. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1, Д – 5

Б. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 5

В. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

А. Грипп, корь, краснуха, болезнь Боткина

Б. Прогрессирование и неблагоприятный исход процесса

В. Гнойно – воспалительные процессы

Г. Аллергические и паразитарные заболевания

Д. Воспалительные заболевания, интоксикация

Е. Мононуклеоз, туберкулез, сифилис

1. Лейкоцитоз наблюдается при заболеваниях:

2. Лейкопения чаще встречается при заболеваниях:

3. Токсическая зернистость лейкоцитов указывает на:

4. Нейтрофилез указывает на:

5. Эозинофилия встречается при:

6. Лимфоцитоз развивается при:

А. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6

Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 6

В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6

В МИКРОНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТАХ РАЗМЕР ЧАСТИЦ НАПОЛНИТЕЛЯ (МКМ):

- А. 1 - 100
- Б. 50
- В. более 1
- Г. 1
- Д. менее 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Закрытый перелом
- Б. При продольном переломе
- В. При сохранении целостности всех стенок лунки
- Г. Открытый перелом
- Д. Перелом зуба со вскрытием пульпы зуба
- Е. При поперечном переломе
- 1. Полный перелом зуба – это
- 2. Полный перелом коронки зуба – это
- 3. Зуб подлежит удалению
- 4. Реплантация зуба возможна
- 5. Полный перелом корня зуба – это
- А. А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1
- Б. А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 2, Д – 1
- В. А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 1, Д – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Код МКБ-10:

- А. К00.30
- Б. К00.40
- В. К00.50
- Г. К02.1 Заболевание:
- 1. Гипоплазия эмали
- 2. Незавершенный амелогенез
- 3. Эрозия зубов
- 4. Эндемическая (флюорозная) крапчатость эмали
- А. 2Б, 1В, 4-- , 3А
- Б. 1Б, 2В, 3-- , 4А
- В. 4Б, 2В, 3-- , 1А

**МИКРОПРОТЕЗ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБА И
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ОККЛЮЗИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕРЕКРЫТИЕМ ОДНОГО БУГРА**

- А. Pinlay
- Б. Inlay
- В. Onlay
- Г. Overlay
- Д. Ney

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.
Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный
компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе
выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН
ВООБЩЕ.**

- А. Удаление новообразования с капсулой**
- Б. Инвазивный рост**
- В. Резекция челюсти в пределах здоровой ткани**
- Г. Новообразование формируется в определенном возрасте и в дальнейшем в размерах не
увеличивается**
- Д. Лучевая терапия**
- 1. Характер роста для амелобластом**
- 2. Характер роста одонтом**
- 3. Принцип лечения амелобластом**
- 4. Принцип лечения одонтом**
- А. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2
- Б. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1
- В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.
Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный
компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе
выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН
ВООБЩЕ.**

- А. Седативный эффект**
- Б. Замедляет процесс заживления раны**
- В. Атропин**
- Г. Гексенал**
- 1. Побочный эффект от новокаина**
- 2. Побочный эффект от тримекаина**
- 3. При передозировке новокаина вводят:**
- 4. При передозировке лидокаина вводят:**
- А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3
- Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4
- В. А – 1, Б – 2, В – 4, Г – 3

УКАЗАТЬ ОШИБКИ ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

- А. Отлом истонченной стенки коронковой части зуба
- Б. Неполное удаление инфицированного дентина, химический ожог пульпы зуба
- В. Нависающий край пломбы, отсутствие контактного пункта
- Г. Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба
- Д. Десневое кровотечение

ДЛЯ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ В ОСТРОЙ СТАДИИ ХАРАКТЕРНО

- А. Наличие свищевых ходов по переходной складке в очаге поражения, гиперемия и болезненность мягких тканей
- Б. Воспалительный инфильтрат в области переходной складки
- В. Гиперемия и болезненность мягких тканей, инфильтрация надкостницы по переходной складке
- Г. Воспалительная инфильтрация надкостницы и мягких тканей, прилежащих к очагу поражения челюсти с вестибулярной и оральной поверхности
- Д. Воспалительная инфильтрация мягких тканей, прилежащих к очагу поражения челюсти с вестибулярной и оральной поверхности

ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ КАРИЕСВОСПРИИМЧИВОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- А. До иммунных зон
- Б. Профилактически иссекая окружающую деминерализованную эмаль
- В. Миниинвазивным методом
- Г. Депульпируют зуб
- Д. С позиций щадящего препарирования

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕГО МУССА (GC TOOTH MOUSSE) ДЛЯ ЗУБОВ Действие:

- А. рекомендации пациенту - воздержаться от приема пищи в течение 40-50 минут
 - Б. очищение зубов от зубных отложений
 - В. нанесение мусса на зубы
 - Г. изоляция зубов от слюны
 - Д. высушивание эмали зубов
 - Е. экспозиция средства
- А. 1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-В, 5-Е, 6-А
 - Б. 1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-В, 5-А, 6-Е
 - В. 1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-В, 5-Е, 6-А

ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОТТИСК С:

- А. Нижней челюсти без протеза
- Б. Нижней челюсти с протезом
- В. Верхней челюсти и нижней челюсти без протеза
- Г. Нижней челюсти с протезом и верхней челюсти
- Д. Слепки снимать не нужно

ЖЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ, ПРОХОДЯЩЕЕ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ, ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А. Глоссита
- Б. Глоссалгии
- В. Ромбовидного глоссита
- Г. Десквамативного глоссита
- Д. Невралгия тройничного нерва

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ЭТАПОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА Действие:

- А. удаление зубного налета с контактных поверхностей флоссами
 - Б. антисептическая обработка
 - В. контролируемая чистка зубов
 - Г. шлифование пломб и полирование поверхностей зубов, в том числе корней
 - Д. обработка зубов фторидсодержащими или реминерализирующими препаратами
 - Е. удаление минерализованных зубных отложений
- А. 1-В, 2-Б, 3-Е, 4-А, 5-Д, 6-Г
Б. 1-В, 2-Б, 3-Е, 4-А, 5-Г, 6-Д
В. 1-В, 2-Е, 3-Б, 4-А, 5-Г, 6-Д

ПРИ СНЯТИИ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ У ПАЦИЕНТА С ЯЗВЕННО- НЕКРОТИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ ВЕНСАНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД:

- А. Ручной
- Б. Ультразвуковой
- В. Пескоструйный
- Г. Сочетанный ручной и ультразвуковой
- Д. Сочетанный ручной и пескоструйный

ПРИЧИННЫЙ ЗУБ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ

- А. Сохраняют обязательно
- Б. Шинируют
- В. Депульпируют
- Г. Удаляют по показаниям
- Д. Удаляют обязательно

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Имеются дочерние кисты, которые необходимо удалить
 - Б. Причинный зуб подлежит обязательному удалению
 - В. Причинный зуб удаляют или резецируют верхушку корня
 - Г. Проводится оро – антральная цистэктомия
 - 1. Особенность хирургического лечения (цистэктомия) радикулярных кист челюстей
 - 2. Особенность хирургического лечения (цистэктомия) фолликулярных кист челюстей
 - 3. Особенность хирургического лечения (цистэктомия) парадентальных кист
 - 4. Особенность оперативного лечения эпидермоидных кист
- А. А – 1, Б – 2, 3, В – 4
Б. А – 4, Б – 1, 3, В – 2
В. А – 4, Б – 2, 3, В – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Инфильтрации и абсцедирования
 - Б. Внедрение инородного тела
 - В. Из гранулемы, тяжа причинного зуба
 - Г. Из гранулемы
 - Д. Хроническая
 - Е. Обострившееся хроническое
 - 1. Неодонтогенная гранулема развивается в следствие
 - 2. Одонтогенная гранулема состоит
 - 3. Неодонтогенная гранулема состоит
 - 4. Течение подкожной гранулемы
 - 5. Стадии клинического течения одонтогенной подкожной гранулемы лица
- А. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3
Б. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4
В. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4

ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМОСТЬ ПУЛЬПЫ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ

- А. Возрастает
- Б. Остается без изменений
- В. Снижается
- Г. Колеблется
- Д. Не определяется

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПОКРЫТИЯ ЗУБОВ ФТОРЛАКОМ Действие:

- А. высушивание зубов перед покрытием фторлаком
 - Б. нанесение фторлака на зубы тонким слоем
 - В. очищение зубов от налета
 - Г. изоляция от слюны ватными валиками
 - Д. высушивание зубов после покрытия фторлаком
 - Е. удаление избытка лака, попавшего на слизистую оболочку
 - Ж. рекомендации пациенту воздержаться от приема пищи в течение двух часов, от чистки зубов и приема очень твердой пищи в течение 12-24 часов
- А. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б, 5-Е, 6-Ж, 7-Д
Б. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б, 5-Е, 6-Д, 7-Ж
В. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Е, 5-Б, 6-Д, 7-Ж

ИНИЦИАТОРОМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА СВЕТООВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Камфорохинон
- Б. Пероксид бензоила
- В. Ароматические амины
- Г. Пероксид бензоила и ароматические амины
- Д. Камфорохинон и ароматические амины

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид местного обезболивания:

А. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000

Б. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% без вазоконстриктора (Ultracain

Д) Показания к применению:

1. Депульпирование зуба

2.4 у практически здорового пациента

2. Депульпирование зуба

4.6 у практически здорового пациента

3. Депульпирование зуба

3.2 у пациента с гипертонической болезнью

4. Депульпирование зуба

1.3 у пациента с инфарктом миокарда в анамнезе

5. Депульпирование зуба

2.5 у пациента 13 лет

А. А-1,3, Б-4, 5

Б. А-1, Б-3,4, 5

В. А-1, Б-3,4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Первая стадия

Б. Вторая стадия

В. Третья стадия

Г. Четвертая стадия

1. Рак кожи лица (по классификации TNM) обозначен следующим образом: T1 N2 M0.

Какова стадия распространения рака?

2. Рак кожи лица: T1 N0 M0. Какова стадия распространения рака?

3. Рак нижней губы: T2 N0 M0. Какова стадия распространения рака?

4. Рак слизистой оболочки полости рта: T1 N1 M0. Какова стадия распространения рака?

А. А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 1, 5

Б. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1, 5

В. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1, 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Безболезненные узлы розового или бурого цвета, которые могут изъязвляться с последующим рубцеванием или рассасыванием

Б. Эрозии и язвы

В. Бугорок (люпом)

Г. Мелкие желтовато – красные узлы, которые изъязвляются

Д. Периаденит

1. Характерный признак первичного туберкулеза кожи

2. Элемент при туберкулезной волчанке

3. Признаки милиарно – язвенного туберкулеза

4. Характерный признак туберкулезного лимфаденита

5. Признаки диссеминированного милиарного туберкулеза лица

А. А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 2, Д – 4

В. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4

ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ УСТУП ФОРМИРУЕТСЯ

А. Супрагингивально

Б. На уровне края десны

В. Субгингивально на вестибулярной поверхности

Г. Субгингивально по всему периметру шейки зуба

Д. Не формируется

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. 2 недели

Б. 1 неделя

В. 19 – 23 сутки

Г. 3 недели

Д. 16 – 18 день

1. Сроки эпителизации лунок однокорневых зубов в норме

2. Сроки эпителизации лунок многокорневых зубов в норме

3. Задержка эпителизации лунок однокорневых зубов при воспалении

4. Задержка эпителизации лунок многокорневых зубов при воспалении

5. Сроки полного заполнения лунки грануляционной тканью в норме

А. А – 4,5, Б – 1, В – 2, Д – 3

Б. А – 4,5, Б – 3, В – 1, Д – 2

В. А – 4,5, Б – 3, В – 2, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВООБЩЕ.

А. Наследственность, биологическая неполноценность половых клеток, инфекционное заболевание матери в ранние сроки беременности, аборт

Б. Втянутая линейная бороздка на коже губы и выемка на красной кайме

В. Дефект верхней губы по всей высоте с захватом нижних отделов носового хода

Г. Воздействие медикаментов, гипоксия, ионизирующее излучение, неполноценное питание, травма живота в ранние сроки беременности, патогенная микрофлора

1. Скрытое несращение верхней губы – это:

2. Неполное (частичное) несращение верхней губы – это:

3. Полное несращение верхней губы

4. Эндогенные причины развития врожденных уродств лица

5. Экзогенные причины развития врожденных уродств лица

А. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3

Б. А – 1, Б – 4, В – 3, Г – 5

В. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВООБЩЕ.

А. Передние и задние

Б. Травматический, привычный, патологический

В. Острые и застарелые

Г. Односторонние и двусторонние

Д. Полный и неполный

1. В зависимости от величины расхождения суставных поверхностей вывихи нижней челюсти могут быть:

2. С учетом времени прошедшей с момента травмы, вывихи нижней челюсти делятся на:

3. В зависимости от локализации вывихи могут быть:

4. По механизму возникновения различают вывихи:

5. В зависимости от направления смещения суставной головки, вывихи бывают

А. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д – 1

Б. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3

В. А – 5, Б – 2, В – 3, Г – 3, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид местного обезболивания:

А. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Мепивакаин 3% .

Б. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000 по переходной складке. Показания к применению:

1. Операция удаление зуба

2.6 у практически здорового пациента

2. Операция удаление зуба

4.6 у практически здорового пациента

3. Кюретаж пародонтальных карманов у пациента с диабетом

4. Операция вскрытия пародонтального абсцесса у пациента с инфарктом миокарда в анамнезе

5. Операция удаление зуба

7.5 у пациента 9 лет

А. А-3, 4,5, Б-1

Б. А-3, 4,5, Б-1,2

В. А-2, 4,5, Б-1,3

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ:

А. Местная гипоплазия эмали

Б. Флюороз

В. Тетрациклиновые зубы

Г. Системная гипоплазия эмали

Д. Несовершенный амелогенез

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Комбинированный

Б. Открытый

В. Ожоговый шок

Г. Ожоговая септикотоксемия

Д. Ожоговая токсемия

1. Первый период ожоговой болезни

2. Второй период ожоговой болезни

3. Третий период ожоговой болезни

4. Наиболее частый метод лечения ожогов лица

А. Б – 4, В – 1, Г – 2, Д – 3

Б. Б – 4, В – 3, Г – 1, Д – 2

В. Б – 4, В – 1, Г – 3, Д – 2

ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ У РЕБЕНКА ПОЛУТОРА ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Провести шинирование и оставить под наблюдение
- В. Репозировать
- Г. Депульпировать и репозировать
- Д. Удалить

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Заболевание:

- А. Острый пульпит
- Б. Пульпит хронический
- В. Пульпит неутонченный
- Г. Пульпит хронический язвенный Код по МКБ-10:

1. K04.09

2. K04.01

3. K04.03

4. K04.04

А. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Б. 1Г, 2В, 3А, 4Б

В. 1Г, 2А, 3В, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР ЗУБА ГЕРМЕТИКОМ ИНВАЗИВНОЙ МЕТОДИКОЙ Действие:

- А. протравливание фиссуры кислотой
- Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета
- В. изоляция от слюны, высушивание зуба
- Г. отмывание кислоты из фиссуры
- Д. проверка окклюзионной высоты прикуса
- Е. повторная изоляция зуба от слюны
- Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам, отверждение
- З. высушивание протравленной поверхности фиссуры
- И. раскрытие фиссуры алмазным бором

А. 1-Б, 2-В, 3-И, 4-А, 5-Г, 6-Е, 7-З, 8-Ж, 9-Д

Б. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-И, 5-Г, 6-Е, 7-З, 8-Ж, 9-Д

В. 1-Б, 2-В, 3-И, 4-А, 5-Г, 6-Е, 7-З, 8-Д, 9-Ж

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Эпителиальные клетки

Б. Мезенхимальные клетки наружного слоя зубного мешочка

В. Макрофаги

Г. Апикальные, апиколатеральные, латеральные, межкорневые

Д. Простая, сложная кистогранулема

Е. 0, 5 см.

Ж. 0, 5 – 1 см.

1. Развитие периодонта происходит за счет

2. Особенностью тканей периодонта является наличие

3. По локализации гранулемы различают

4. Размеры гранулемы не превышают

5. Размеры кистогранулемы

А. А – 2, Б – 3, Г – 1, Е – 4, Ж – 5

Б. А – 2, Б – 1, Г – 4, Е – 3, Ж – 5

В. А – 2, Б – 1, Г – 3, Е – 4, Ж – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Болевой дисфункции

Б. Острого артрита

В. Артрозе

Г. Хроническом артрите

1. Симптом головной боли в большей степени характерен для:

2. Резкие боли в суставе в большей степени характерны для:

3. Щелканье в суставе наблюдаются при:

4. Хруст в нижнечелюстном суставе наблюдается при:

5. Тугоподвижность в суставе в конце дня наиболее часто встречается при

6. Чувство сведения челюстей после сна наблюдается при:

А. А – 1, 3, 6, Б – 2, В – 5, Г – 4

Б. А – 1, 3, Б – 2, В – 4, Г – 5

В. А – 1, 3, 6, Б – 2, В – 4, Г – 5

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВИНІРОВ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ:

А. Низкий уровень гигиены полости рта

Б. Депульпированные зубы

В. Деминерализация после ортодонтического лечения

Г. Диастема шириной 1 мм

Д. Наличие старых, изменивших цвет, пломб

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Максимально допустимая доза:

А. 7 мг/кг

Б. 5 мг/кг Возраст пациента:

1. 6 лет

2. 10 лет

3. 29 лет

4. 40 лет

5. 67 лет

А. А-2,3,4,5,Б-1

Б. А-3,4,Б-1,2,5

В. А-3,4,5,Б-1,2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. У взрослых

Б. Боль в челюсти подвижных зубов

В. У детей и лиц молодого возраста

Г. Деформация челюсти

1. Первые симптомы при центральной остеосаркоме челюстей

2. Первые симптомы при периферической остеосаркоме челюстей

3. Остеобластическая форма саркомы челюсти чаще встречается

4. Остеолитическая форма саркомы челюсти чаще всего встречается

А. А – 1, Б – 4, В – 3, Г – 2

Б. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1

В. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАППЫ** Действие:

- А.** высушивание зубов
- Б.** удаление мягкого зубного налета
- В.** внесение реминерализующего средства в каппу
- Г.** экспозиция реминерализующего средства
- Д.** изоляция зубов от слюны
- Е.** фиксация каппы на зубах
- Ж.** снятие каппы

- А. 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-Ж, 7-Г
- Б. 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-Е, 5-В, 6-Г, 7-Ж
- В. 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-Г, 7-Ж

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А.** Множество правильно сформированных спаянных между собой деформированных зубов
- Б.** Беспорядочно перемешанные ткани нескольких зубов
- В.** Ткани одного зуба
- Г.** Несколько зачатков зубов
- 1.** Структура простой одонтомы
- 2.** Структура сложной одонтомы
- 3.** Структура смешанной одонтомы
- 4.** Структура составной одонтомы

- А. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2
- Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3
- В. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Абсолютным противопоказанием к проведению дентальной имплантации считают

- А.** Множественный кариес зубов
- Б.** Аллергические заболевания
- В.** Неудовлетворительную гигиену полости рта
- Г.** Флюороз

Базис съёмного пластиночного протеза при полном отсутствии зубов изготавливается из

- А.** Фарфора
- Б.** Воска
- В.** Каучука
- Г.** Пластмассы

После проведения мандибулярной анестезии область обезболивания охватывает зубы нижней челюсти

- А. Ткани щечной области
- Б. Со стороны инъекции
- В. Только мягкие ткани подбородочной области
- Г. И мягкие ткани подбородочной области, дна полости рта и языка со стороны инъекции

У первых постоянных моляров в сменном прикусе кариес чаще возникает

- А. В пришеечной области
- Б. На апроксимальных поверхностях
- В. На буграх
- Г. В фиссурах

Жалобы при ушибах временных и постоянных зубов в первые 2-3 дня после травмы на

- А. Подвижность зуба 2-3 степени
- Б. Интенсивные приступообразные боли
- В. Ноющие боли при накусывании
- Г. Онемение области ушиба

При планировании изготовления несъемной конструкции недостаточное количество опорных зубов может привести к

- А. Дисфункции ВНЧС
- Б. Сколу облицовочного материала ортопедической конструкции
- В. Повышенному стиранию зубов-антагонистов
- Г. Функциональной перегрузке пародонта опорных зубов

К минерализованным зубным отложениям относят

- А. Пелликулу
- Б. Пищевые остатки
- В. Мягкий зубной налет
- Г. Зубной камень

Коронковая часть анкерного штифта покрывается опакером с целью

- А. Обеспечения прочности реставрации
- Б. Увеличения рентгеноконтрастности
- В. Улучшения эстетики
- Г. Улучшения ретенции

К клиническим признакам неполного вывиха временного и постоянного зуба в первые дни после травмы относят

- А. Укорочение видимой части коронки, отсутствие подвижности
- Б. Погружение зуба в лунку до десны
- В. Неизменённая видимая часть коронки, незначительная подвижность
- Г. Смещение коронки в различных направлениях, подвижность зуба II-III степени

Последовательность местного лечения язвенно-некротического стоматита венсана

- А. Нанесение антимикробных средств, удаление некротического налета, антисептическая обработка, наложение изолирующей повязки
- Б. Обезболивание, удаление некротического налета, обработка протеолитическими ферментами, антисептическая обработка
- В. Обезболивание, обработка протеолитическими ферментами, удаление некротического налета, антисептическая обработка, нанесение антимикробных средств
- Г. Обезболивание, антисептическая обработка, нанесение протеолитических ферментов, нанесение антимикробных средств

Под потребностью населения в госпитализации понимается

- А. Доля населения, нуждающегося в госпитализации
- Б. Число коек на определённую численность населения
- В. Число врачебных должностей стационара на определённую численность населения
- Г. Доля госпитализированных за год больных

С помощью индекса арі определяют наличие налета на поверхностях зубов

- А. Вестибулярных
- Б. Проксимальных
- В. Окклюзионных
- Г. Оральных

Наличие ложного десневого кармана характерно для

- А. Пародонтита
- Б. Катарального гингивита
- В. Гипертрофического гингивита
- Г. Пародонтоза

Преобладающей микрофлорой инфекционного периодонтита являются

- А. Вейлонеллы
- Б. Простейшие
- В. Стафилококки
- Г. Стрептококки

С патологией прорезывания зубов связаны кисты

- А. Радикулярные
- Б. Эпидермоидные
- В. Фолликулярные
- Г. Парадентальные

Основным дифференциально-диагностическим признаком эрозии твёрдых тканей, отличающим её от клиновидного дефекта, является

- А. Окрашивание метиленовым синим
- Б. Болезненное зондирование
- В. Положительная холодовая проба
- Г. Форма дефекта

По методу изготовления различают _____мостовидные протезы

- А. Цельнолитые, полимеризованные, паяные
- Б. Паяные, пластмассовые, комбинированные
- В. Неметаллические, металлокерамические, фарфоровые
- Г. Комбинированные, металлические, неметаллические

Прямые щипцы используют для удаления

- А. Клыков верхней челюсти
- Б. Резцов нижней челюсти
- В. Временных моляров верхней челюсти
- Г. Постоянных моляров верхней челюсти

Одним из дополнительных методов обследования стоматологического больного является

- А. Термодиагностика
- Б. Перкуссия
- В. Зондирование
- Г. Пальпация

Волокна периодонта, идущие под углом к оси зуба называются

- А. Циркулярные
- Б. Косые
- В. Альвеолярные гребешковые
- Г. Трансептальные

К этиотропному средству лечения острого герпетического стоматита относят

- А. Противовирусное
- Б. Антисептическое
- В. Кератопластическое
- Г. Жаропонижающее

По классификации Lekholm и Zarb рыхлая кортикально-губчатая кость соответствует типу кости

- А. D3
- Б. D4
- В. D2
- Г. D1

Причиной возникновения гипоплазии эмали является

- А. Истирание эмали
- Б. Действие кислот
- В. Токсическое действие фторидов
- Г. Нарушение минерализации эмали

Пигментированный налет наиболее целесообразно удалять методом

- А. Ультразвуковым
- Б. Ручным
- В. Воздушно-абразивным
- Г. Звуковым

Местной анестезией называется

- А. Выключение тактильной чувствительности
- Б. Психоседативная терапия
- В. Выключение всех видов чувствительности при отсутствии сознания
- Г. Выключение болевой чувствительности на определенном участке при сохранении сознания

Выявление малых кистозных очагов при сиалографии околоушной слюнной железы характерно для

- А. Ранулы
- Б. Сиалолитиаза
- В. Сиалоза
- Г. Хронического сиалоаденита

Температура, которую должна выдерживать огнеупорная модель и при этом не деформироваться, равна

- А. 1000–1100 °С
- Б. 800–900 °С
- В. 600–800 °С
- Г. 1400–1600 °С

Материал для пломбирования постоянных зубов у детей не должен обладать

- А. Выделением фторида
- Б. Адгезией
- В. Биосовместимостью
- Г. Цитотоксичностью

Показатель общей заболеваемости характеризует

- А. Удельный вес конкретного заболевания
- Б. Распространённость заболеваний среди населения
- В. Изменения распространённости заболеваний во времени
- Г. Распространённость только социально-значимых заболеваний

Радикальная гайморотомия с наложением соустья с нижним носовым ходом проводится по методу

- А. Берше-Дубова
- Б. Егорова
- В. Губайдуллина-Вайсмунд
- Г. Калдвелл-Люка

Пульсовое давление при выраженном сосудистом коллапсе

- А. Увеличивается
- Б. Остается неизменным
- В. Уменьшается
- Г. Вариабельно

Имплантатом, предложенным Branemark, был

- А. Винтовой разборный
- Б. Субпериостальный
- В. Базальный
- Г. Пластиночный

Устранить дисколорит витальных зубов (легкая степень), развившийся в результате применения тетрациклина в детстве, можно методом

- А. Резекцией дентина
- Б. Микроабразии
- В. Внутреннего отбеливания
- Г. Внешнего отбеливания

Окклюдатор воспроизводит

- А. Сагиттальные и боковые движения нижней челюсти
- Б. Только вертикальные движения нижней челюсти
- В. Только сагиттальные движения нижней челюсти
- Г. Только боковые движения нижней челюсти

Периодонтом называют соединительную ткань, состоящую из

- А. Волокон, сосудов
- Б. Кровеносных и лимфатических сосудов, сосудов, нервов, волокон
- В. Межклеточного вещества, клеток, волокон, прослоек рыхлой
- Г. Клеток, волокон, сосудов и нервных окончаний

Коронковую часть пульпы удаляют

- А. Колесовидным бором
- Б. Зондом
- В. Штопфером
- Г. Экскаватором

Формирование корней временных моляров заканчивается к _____ годам

- А. 2
- Б. 7
- В. 6
- Г. 4

Складчатый язык является

- А. Последствием травмы
- Б. Последствием приема острой пищи
- В. Врожденной аномалией развития
- Г. Результатом хронической травмы зубами

При установлении инвалидности со степенью ограничения способности к трудовой деятельности срок временной нетрудоспособности завершается датой

- А. Регистрации документов в бюро медико-социальной экспертизы
- Б. Закрытия листка нетрудоспособности
- В. Открытия листка нетрудоспособности
- Г. Непосредственно предшествующей дню регистрации документов в бюро медико-социальной экспертизы

При декомпенсированной форме генерализованного (ii или iii степени) повышенного стирания имеет место

- А. Последовательная дезокклюзия
- Б. Перестройка миостатического рефлекса
- В. Постепенная дезокклюзия
- Г. Коррекция формы зубных рядов

После исчезновения первичных кожных элементов при крапивнице

- А. Отмечают отсутствие изменений
- Б. Остается гипопигментация
- В. Остается шелушение
- Г. Остается гиперпигментация

При проведении мандибулярной анестезии целевым пунктом ведения анестетика является _____ отверстие

- А. Нижнечелюстное
- Б. Круглое
- В. Подбородочное
- Г. Овальное

Лечебная тактика врача при остром гнойном периостите челюсти состоит из

- А. Пункции поднадкостничного абсцесса, создания оттока экссудата через корневые каналы причинного зуба, назначения ротовых ванн
- Б. Вскрытия поднадкостничного абсцесса, назначения антибиотиков, ротовых ванн, ультравысокочастотной терапии
- В. Вскрытия поднадкостничного абсцесса, удаления причинного зуба, назначения сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн
- Г. Удаления причинного зуба, назначения сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн

Под полостью зуба понимают пульпарную камеру и

- А. Систему корневых каналов
- Б. Магистральные корневые каналы
- В. Дно полости зуба
- Г. Апикальную дельту

Операция перемещения уздечки верхней губы необходима для

- А. Нормализации артикуляции языка
- Б. Устранения инфантильного глотания
- В. Нормализации положения 11 и 21
- Г. Нормализации роста апикального базиса нижней челюсти

Для obturation открытых дентинных канальцев в пасты для чувствительных зубов добавляют

- А. Хлоргексидин
- Б. Гидроксиапатит
- В. Пирофосфаты
- Г. Карбамид

Для профессионального отбеливания зубов применяется

- А. Трифосфат натрия
- Б. Гидратированный кремний
- В. Сульфат натрия
- Г. Перекись карбамида

Перкуссия зуба проводится

- А. Определением отклонения зуба от оси
- Б. Постукиванием по зубу для определения состояния пародонта
- В. Оценкой внешнего вида, цвета, целостности эмали с использованием зонда и зеркала
- Г. Ощупыванием для определения припухлости, уплотнения и подвижности органов или тканей

Для ускорения затвердевания гипса в воду добавляют

- А. 2,5–3 % Поваренной соли
- Б. 3% Перекись водорода
- В. 2–3 % Сахара
- Г. 2–3 % Тетрабората натрия

Для обеспечения нормальной работоспособности зрительного анализатора врача-стоматолога наиболее важна такая характеристика света, как

- А. Спектр излучения
- Б. Равномерность в разных точках помещения
- В. Уровень освещенности
- Г. Отсутствие блескости

При местной гипоплазии эмали характерны жалобы пациента на

- А. Косметический недостаток
- Б. Подвижность зубов
- В. Боли от горячего раздражителя
- Г. Ночные боли

Глубина поражения твердых тканей зуба при iii степени повышенного стирания достигает _____ длины коронки

- А. От 2/3; до его шейки
- Б. От 1/3 до 2/3
- В. До 1/3
- Г. От 1/3 до 1/2

Уровни интенсивности кариеса по ВОЗ определены для возрастных групп (в годах)

- А. 12 и 35-44
- Б. 15 и 18
- В. 12 и 15
- Г. 6 и 12

Афты беднара встречаются преимущественно у детей

- А. Младшего школьного возраста
- Б. Старшего школьного возраста
- В. Первых месяцев жизни
- Г. Дошкольного возраста

Вкол иглы при подглазничной анестезии проводят

- А. На уровне верхнего моляра
- Б. В проекции верхушек корней медиального и латерального резца
- В. На уровне верхнего клыка
- Г. На уровне второго премоляра

Рентгенологически периимплантит характеризуется

- А. Наличием секвестров
- Б. Никак не проявляется
- В. Образованием апикальной гранулёмы
- Г. Резорбцией кости

Для кисты характерны размеры

- А. 0,5-0,8 См
- Б. От 0,5 до 3 см
- В. Свыше 1 см
- Г. До 0,5 см

Патологический процесс твердых тканей зубов, развивающийся после их прорезывания, при котором происходят деминерализация и протеолиз с последующим образованием дефекта под воздействием внешних и внутренних факторов называют

- А. Гипоплазией
- Б. Эрозией
- В. Кариесом
- Г. Истиранием

Гиперемия кожи лица, шеи является клиническим симптомом

- А. Сердечно-сосудистого коллапса
- Б. Обморока
- В. Анафилактического шока
- Г. Острой сердечной недостаточности

Перед снятием двухслойного оттиска ретракция десны необходима, чтобы

- А. Обезболить десневой край
- Б. Остановить кровотечение
- В. Получить точный отпечаток поддесневой части зуба
- Г. Получить точный отпечаток наддесневой части зуба

Показатель хирургической активности в стационаре является процентным отношением числа

- А. Проведённых хирургических операций к числу больных, выписанных из хирургического отделения
- Б. Прооперированных больных к числу больных, выписанных из хирургического отделения
- В. Проведённых хирургических операций к числу больных, выбывших из хирургического отделения
- Г. Прооперированных больных к числу больных, выбывших из хирургического отделения

Правила наложения щипцов при удалении временных и постоянных зубов

- А. Отличаются при удалении на верхней челюсти; не отличаются – на нижней
- Б. Не отличаются
- В. Отличаются при удалении на нижней челюсти; не отличаются – на верхней
- Г. Отличаются

Наибольшее количество «смазанного слоя» образуется в результате препарирования корневого канала

- А. Ручными стальными
- Б. Ручными Ni-Ti
- В. Вращающимися Ni-Ti
- Г. Эндоактиватором

К системным факторам риска возникновения кариеса зубов у детей относится

- А. Употребление легкоферментируемых углеводов
- Б. Низкое содержание фторидов в воде
- В. Наличие ортодонтических конструкций
- Г. Низкая скорость секреции слюны

Периферическая зона пульпы образована клетками

- А. Фибробластами
- Б. Цементобластами
- В. Остеобластами
- Г. Одонтобластами

Зубную щетку средней жесткости рекомендуется использовать взрослым с

- А. Гиперестезией зубов
- Б. Флюорозом
- В. Хроническим пародонтитом
- Г. Клиновидными дефектами

К 1 классу переломов коронки зуба по классификации ellis и davey относится

- А. Отлом коронки зуба
- Б. Перелом коронки зуба с обнажением пульпы
- В. Простой перелом коронки зуба, не затрагивающий дентин или затрагивающий небольшое его количество
- Г. Перелом коронки зуба, затрагивающий большое количество дентина без обнажения пульпы

К рассасывающимся шовным материалам, применяемым при пластике рецессий десны, относят

- А. Кетгут, коллаген
- Б. Политетрафторэтилен
- В. Шелк, полиамид
- Г. Пролен, полипропилен

У детей до 3-х лет кариесом чаще поражаются _____ челюсти

- А. Резцы нижней
- Б. Моляры верхней
- В. Резцы верхней
- Г. Моляры нижней

К IV классу в соответствии с классификацией? Рецессии десны (р. D. Miller) относят

- А. Рецессию в пределах свободной десны
- Б. Рецессию, выходящую за пределы прикрепленной десны без потери костной ткани
- В. Рецессию в пределах прикрепленной десны
- Г. Утрату кости и мягких тканей пародонта по периметру зуба

Наиболее частой локализацией одонтогенных воспалительных процессов является _____ языка

- А. Корень
- Б. Кончик
- В. Боковая поверхность
- Г. Спинка

Причиной развития локализованного гипертрофического гингивита является

- А. Хроническая травма зубодесневого сосочка
- Б. Прием пациентом психотропных препаратов
- В. Острая травма зубодесневого сосочка
- Г. Токсикоз второй половины беременности

Показанием к проведению методики микроабразии при флюорозе являются _____ на эмали

- А. Поверхностные коричневые пятна
- Б. Поверхностные дефекты глубиной 1 мм
- В. Беловатые прожилки и штрихи
- Г. Поверхностные дефекты глубиной 2 мм

Примерное соотношение мономера и полимера при замешивании пластмассы в объемных частях

- А. 1:1
- Б. 1:3
- В. 1:2
- Г. 2:3

Вправление суставных элементов внчс осуществляет шина

- А. Репонирующая
- Б. Релаксирующая
- В. Повышающая
- Г. Защитная

Синдром мелькерссона-розенталя включает складчатый язык и

- А. Эксфолиативный хейлит
- Б. Макроглоссит
- В. Макрохейлит
- Г. Десквамативный глоссит

Резорбция кортикальной пластинки кости вершин межальвеолярных перегородок характерна для

- А. Фиброматоза
- Б. Хронического катарального гингивита
- В. Пародонтальной кисты
- Г. Пародонтита легкой степени

При цистэктомии у детей рана

- А. Частично закрывается лоскутом
- Б. Ушивается с оставлением активного дренажа
- В. Ушивается наглухо
- Г. Тампонируется йодоформным тампоном

Для лечения гиперестезии зубов используют

- А. Компомеры
- Б. Герметики
- В. Десенситайзеры
- Г. Антисептики

К первому этапу при инструментальной обработке корневого канала относят

- А. Расширение устьев корневого канала
- Б. Определение длины корневого канала
- В. Расширение апикального отверстия
- Г. Антисептическую обработку

При удалении ретинированных третьих моляров нижней челюсти используют разрез по

- А. Крайлю
- Б. Ковтуновичу
- В. Житницкому
- Г. Колдуэлу-Люку

Сколько форм зубочелюстных деформаций выделяет в.а.пономарёва?

- А. 4
- Б. 2
- В. 1
- Г. 3

Удаление сверхкомплектного зуба, располагающегося в области зубов

- 1.1,**
2.1 и обуславливающего наличие диастемы, следует производить в возрасте ребенка (в годах)
- А. 8-9
 - Б. 9-10
 - В. 5-7
 - Г. 7-8

Наиболее часто при плановой санации полости рта у детей встречается хроническая _____ форма пульпита

- А. Неуточненная
- Б. Язвенная
- В. Гипертрофическая
- Г. Фиброзная

Альгинатную оттискную массу замешивают на

- А. Горячей воде
- Б. Физиологическом растворе
- В. Прилагаемом к материалу катализаторе
- Г. Холодной воде

Врачу- стоматологу перед началом медицинского вмешательства совместно с пациентом необходимо оформить

- А. Талон пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях
- Б. Добровольное информированное согласие
- В. Амбулаторную карту пациента
- Г. Листок нетрудоспособности

Противопоказанием к использованию наркоза для санации полости рта в поликлинике может явиться

- А. Возраст до 3-х лет
- Б. Наличие острого респираторного заболевания
- В. Аллергия к местным анестетикам
- Г. Болезнь Дауна

При проведении эпидемиологического стоматологического обследования населения по методике ВОЗ используют набор инструментов, включающий в себя

- А. Зеркало, пародонтальный зонд, пинцет
- Б. Зеркало, стоматологический зонд, пародонтальный зонд
- В. Стоматологический зонд, пинцет, экскаватор
- Г. Стоматологический зонд, пинцет, штопфер

К биоинертным материалам относятся

- А. Цирконий
- Б. Гидроксиапатит
- В. Хромокобальтовые сплавы
- Г. Нержавеющая сталь

При изготовлении съемных протезов качество окклюзионного контакта искусственных зубов в полости рта проверяется

- А. С помощью бюгельного воска
- Б. С помощью базисного воска
- В. С помощью артикуляционной бумаги
- Г. Визуально

Физико-биологический метод фиксации съемного протеза при полном отсутствии зубов обеспечивается

- А. Кламмерами и замковыми креплениями
- Б. Замковыми креплениями и адгезией
- В. Функциональной присасываемостью и кламмерами замковыми креплениями и адгезией
- Г. Адгезией и функциональной присасываемостью

Удерживающий? Кламмер состоит из тела, плеча

- А. Отростка, ответвления и окклюзионной накладки
- Б. Отростка
- В. Отростка и окклюзионной накладки
- Г. Отростка и ответвления

Корни постоянных резцов и первых моляров заканчивают свое формирование к (в годах)

- А. 15
- Б. 12
- В. 10
- Г. 14

Режущий край верхних резцов под металлокерамическую коронку препарируют на глубину (в миллиметрах)

- А. 1,5-2,0
- Б. 1,0-1,2
- В. 0,7-0,9
- Г. 0,5-0,6

Диагноз и все последующие разделы медицинской карты стоматологического больного (форма №043/у) заполняются

- А. Заведующим отделением
- Б. Медсестрой
- В. Лечащим врачом
- Г. Регистратором

Согласно классификации dean для очень слабого флюороза характерны

- А. Хаотично расположенные маленькие непрозрачные белые пятна, занимающие менее 25% поверхности зуба
- Б. Коричневые пятна неправильной формы, меловидно-белый цвет всей поверхности эмали
- В. Обширные непрозрачные белые пятна, занимающие не более 50% поверхности зуба
- Г. Слабые очаги помутнения эмали, от нескольких беловатых прожилок до хаотично расположенных белых пятнышек

Граница базиса полного съемного протеза с вестибулярной стороны проходит

- А. По переходной складке, обходя подвижные тяжи слизистой оболочки и уздечки
- Б. Перекрывая подвижные тяжи слизистой оболочки и уздечки
- В. Перекрывая только уздечки
- Г. Перекрывая подвижные тяжи слизистой оболочки

Гистологически пульпа зуба состоит из

- А. Нервных, кровеносных, лимфатических сосудов
- Б. Нервных, кровеносных, лимфатических сосудов и клеточных элементов
- В. Лимфатических сосудов
- Г. Клеточных элементов и соединительной ткани

Для дифференциальной диагностики начального кариеса используют

- А. Зондирование
- Б. Метод термометрии
- В. ЭОД
- Г. Рентгенологический метод

Редкий, слабого наполнения пульс характерен для

- А. Анафилактического шока
- Б. Обморока
- В. Аллергической реакции
- Г. Сердечно-сосудистого коллапса

При препарировании под металлокерамическую коронку создание чрезмерной конусности культи зуба приводит к

- А. Эстетическому дефекту в области режущего края коронки
- Б. Эстетическому дефекту в области шейки зуба
- В. Травме пародонта
- Г. Ослаблению фиксации коронки

Чаще всего встречается у детей любого возраста хронический

- А. Периодонтит в стадии обострения
- Б. Фиброзный периодонтит
- В. Гранулематозный периодонтит
- Г. Гранулирующий периодонтит

Съёмные шинирующие протезы изготавливают методом

- А. Литья
- Б. CAD|CAM технологии
- В. Штамповки
- Г. Ковки

При интактном резце показатели электровозбудимости (эод) снимают с

- А. Угла коронки
- Б. Апроксимальной поверхности зуба
- В. Середины режущего края
- Г. Вестибулярной поверхности в пришеечной области

Выносливость пародонта зубов определяется при помощи

- А. Кимографа
- Б. Гнатодинамометра
- В. Коэффициента Джонсона-Вебера
- Г. Фагодинамометра

Витальные нижние резцы препарируют с уступом шириной до (в миллиметрах)

- А. 1,0
- Б. 2,0
- В. 0,5
- Г. 1,5

К общему противопоказанию к отбеливанию зубов относят

- А. Обширную реставрацию
- Б. Аллергию на пероксид водорода, беременность, кормление грудью
- В. Выраженное воспаление пародонта
- Г. Большую пульпарную полость

Главную опасность в ближайшие часы после ранений языка, мягкого неба, тканей дна полости рта для жизни пациента представляет

- А. Столбняк
- Б. Асфиксия
- В. Нарушение речи
- Г. Сепсис

Федеральный и территориальные фонды омс являются организациями

- А. Некоммерческими
- Б. Государственными казёнными
- В. Государственными бюджетными
- Г. Коммерческими

Обязательным этапом при проведении реминерализирующей терапии при лечении кариеса эмали является

- А. Нанесение адгезивной системы
- Б. Очищение зуба от налета
- В. Нанесение защитного лака
- Г. Протравливание эмали

При наличии корней, выступающих в полость радикулярной кисты, для диагностики витальности пульпы зуба проводят

- А. Контрастирование полости кисты
- Б. Компьютерную томографию
- В. Электроодонтодиагностику
- Г. Ультразвуковое исследование

К этиологическим факторам развития флюороза относят

- А. Заболевания, нарушающие минеральный обмен в период формирования эмали
- Б. Передачу патологии твердых тканей по наследству
- В. Интоксикацию фтором
- Г. Хронический периодонтит молочного зуба

Особенности препарирования глубокой кариозной полости

- А. Формирование отвесных стенок
- Б. Сохранение на дне полости деминерализованного, размягченного дентина
- В. Формирование неровного дна в зависимости от глубины поражения и топографии полости зуба
- Г. Формирование плоского дна

При калибровке специалистов, участвующих в эпидемиологическом стоматологическом обследовании населения, совпадение результатов обследования должно быть не менее (в процентах):

- А. 95
- Б. 70
- В. 50
- Г. 85

Ноющая боль, усиливающаяся при накусывании на зуб, характеризует

- А. Гнойный пульпит
- Б. Хронический апикальный периодонтит
- В. Периостит
- Г. Периапикальный абсцесс без свища

Затруднённое, учащённое дыхание с экспираторной одышкой является характерным для

- А. Болевого шока
- Б. Сердечно-сосудистого коллапса
- В. Обморока
- Г. Анафилактического шока

Дифференциальную диагностику фурункула проводят с

- А. Гемангиомой
- Б. Нагноением эпидермальной кисты
- В. Флегмоной
- Г. Рожистым воспалением

[Вернуться в начало](#)