

Тесты с вопросами по специальности «Стоматология общей практики» для аттестации 1 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog-praktik/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Стоматология общей практики» для аккредитации и других экзаменов (3600 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/o_stomatolog/

2) Тесты для аккредитации «Стоматология терапевтическая» (2700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_terapevt/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Местноанестезирующие средства, содержащие вазоконстриктор, противопоказаны пациентам, применяющим

- А. Антигистаминные
- Б. Анксиолитики
- В. Трициклические антидепрессанты
- Г. Неопиоидные анальгетики
- Д. Нестероидные противовоспалительные препараты

ПРИ ВКОЛОЧЕННОМ ВЫВИХЕ РЕЗЦОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Провести шинирование и оставить под наблюдение
- В. Репозировать
- Г. Депульпировать и репозировать
- Д. Удалить

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. 8 – 10 месяцев
 - Б. 45 суток
 - В. 2 недели
 - Г. Конец первого месяца
1. Сроки появления остеонных палочек на дне и стенках лунки после удаления зуба
 2. Сроки начала заполнения лунки удаленного зуба мелкопетливой губчатой костной тканью
 3. Сроки окончания заполнения лунки удаленного зуба мелкопетливой губчатой костной тканью
 4. Сроки, при которых лунка рентгенологически не отличается от окружающей костной ткани при осложненном заживлении (альвеолите или остеомиелите)
- А. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1
 - Б. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2
 - В. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2

ДЛЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ

- А. Кратковременные интенсивные боли, возникающие от случайных раздражений без нарушений чувствительности
- Б. Продолжительная, варьирующая по интенсивности боль, усиливающаяся при давлении по ходу нерва
- В. Продолжительные приступообразные боли с иррадиацией в ухо, хруст в височно-нижнечелюстном суставе
- Г. Тупые длительные боли с чувством давления и напряжения в верхней челюсти, выделения из носа
- Д. Приступообразные ночные боли длительностью 15-30 минут, иррадиирующие в ухо, висок

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Тиреоглоссальная киста

Б. Эктодермы

В. Бранхиогенная киста

Г. Энтодермы и эктодермы

Д. Кистозная тератома

1. Дермоидные кисты развиваются из:

2. Бранхиогенные кисты развиваются из:

3. Синоним дермоида

4. Синоним боковой кисты шеи

5. Синоним срединной кисты шеи

А. А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

Б. А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

В. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Ошибки и осложнения:

А. Нависающий край пломбы, отсутствие контактного пункта

Б. Термический ожог пульпы

В. Вскрытие полости зуба

Г. Дебондинг Этапы лечения, на которых совершены ошибки:

1. Препарирование полости

2. Наложение матрицы

3. Пломбирование полости

4. Полирование пломбы

А. 1БВ, 2А, 3АГ, 4--

Б. 1БВ, 2А, 3Г, 4--

В. 1В, 2А, 3Г, 4--

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Хронический гнойный и гипертрофический альвеолит
- Б. Рыхлая тампонада лунки йодоформным тампоном
- В. Антисептические ванночки, противопоказано интенсивное полоскание полости рта
- Г. «сухая лунка» или остеомиелит
- Д. Серозная и гнойно-некротическая

1. Тактика врача при течении альвеолита в виде «сухой лунки»
2. Рекомендации врача после удаления зуба
3. Формы течения альвеолита
4. Острые формы альвеолита
5. Хронические формы альвеолита

А. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4

Б. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4

В. А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Классы композитных материалов:

- А. Текущие, жидкие
 - Б. Микронаполненные
 - В. Гибридные
 - Г. Универсальные
- Признаки классификации:

1. По размеру частиц наполнителя
2. По клиническому назначению
3. По плотности
4. По способу полимеризации

А. 1БВ, 2Г, 3А, 4--

Б. 1В, 2Г, 3А, 4--

В. 1БВ, 2ВГ, 3А, 4--

ДЛЯ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ В ОСТРОЙ СТАДИИ ХАРАКТЕРНО

- А. Наличие свищевых ходов по переходной складке в очаге поражения, гиперемия и болезненность мягких тканей
- Б. Воспалительный инфильтрат в области переходной складки
- В. Гиперемия и болезненность мягких тканей, инфильтрация надкостницы по переходной складке
- Г. Воспалительная инфильтрация надкостницы и мягких тканей, прилежащих к очагу поражения челюсти с вестибулярной и оральной поверхности
- Д. Воспалительная инфильтрация мягких тканей, прилежащих к очагу поражения челюсти с вестибулярной и оральной поверхности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЕО-ЛАМПЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ

- А. Гипертонической болезни компенсируемой формы
- Б. Сердечно-сосудистой недостаточности компенсируемой формы
- В. Сердечно-сосудистой недостаточности, компенсируемой электрокардиостимулятором
- Г. Сердечно-легочной недостаточности компенсированной формы
- Д. Сердечно-легочной недостаточности декомпенсированной формы

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЭТО ОСЛОЖНЕНИЕ

- А. приступ стенокардии
- Б. острая почечная недостаточность
- В. инфаркт миокарда
- Г. нарушение мозгового кровообращения
- Д. аритмия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Безболезненные узлы розового или бурого цвета, которые могут изъязвляться с последующим рубцеванием или рассасыванием

Б. Эрозии и язвы

В. Бугорок (люпом)

Г. Мелкие желтовато – красные узлы, которые изъязвляются

Д. Периаденит

1. Характерный признак первичного туберкулеза кожи

2. Элемент при туберкулезной волчанке

3. Признаки милиарно – язвенного туберкулеза

4. Характерный признак туберкулезного лимфаденита

5. Признаки диссеминированного милиарного туберкулеза лица

А. А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 2, Д – 4

В. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Химическая основа материалов:

А.Керамический полисилоксан

Б.Композит+СИЦ

В.Органическая полимерная Матрица+наполнитель

Г.Акриловые или апоксидные Полимеры Группы пломбировочных материалов:

1.Компомеры

2.Композиты

3.Ормомеры

4.Пластмассы

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1Б, 2А, 3В, 4Г

В. 1Б, 2В, 3А, 4Г

КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ГИПОГЛИКЕМИИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СИМПТОМ

А. общей слабости

Б. двигательного беспокойства

В. чувства голода

Г. сухости кожных покровов

Д. тремора пальцев

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ВОСПАЛЕНИЯ ДЕСНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

А. Деформация десневых сосочков

Б. Некроз десневых сосочков

В. Кровоточивость при зондировании десневых сосочков

Г. Резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок

Д. Наличие пародонтального кармана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Нижнелуночковый и язычный

Б. Слизистая оболочка в пределах резцов и клыков с обеих сторон

В. Верхние моляры и соответствующий участок слизистой оболочки альвеолярного отростка с вестибулярной стороны

Г. Резцы, клыки и премоляры, альвеолярный отросток и его слизистая оболочка с вестибулярной стороны, мягкие ткани подглазничной области

Д. Разновидность мандибулярной анестезии

1. Зона обезболивание при инфраорбитальной анестезии

2. Зона обезболивание при туберальной анестезии

3. Обезболивание по Егорову – это:

4. Зона обезболивания резцовой анестезии

5. При внутриротовой мандибулярной анестезии происходит выключение чувствительных ветвей:

А. А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д -1

Б. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д -3

В. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д -1

ИНТЕРГЛОБУЛЯРНЫЙ ДЕНТИН - ЭТО:

А. Основное вещество между дентинными слоями

Б. Часть дентина, прилегающая к полости зуба

В. Отложения дентина в течении жизни человека

Г. Дентин, образующийся при патологии твердых тканей зуба

Д. Дентин, возникающий в процессе развития зуба

ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ ПО П КЛАССУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

А. Стеклоиономерный цемент

Б. Поликарбоксилатный цемент

В. Гибридный композиционный материал

Г. Микрофильный композиционный материал

Д. Компомер

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Эпителиальные клетки

Б. Мезенхимальные клетки наружного слоя зубного мешочка

В. Макрофаги

Г. Апикальные, апиколлатеральные, латеральные, межкорневые

Д. Простая, сложная кистогранулема

Е. 0, 5 см.

Ж. 0, 5 – 1 см.

1. Развитие периодонта происходит за счет

2. Особенностью тканей периодонта является наличие

3. По локализации гранулемы различают

4. Размеры гранулемы не превышают

5. Размеры кистогранулемы

А. А – 2, Б – 3, Г – 1, Е – 4, Ж – 5

Б. А – 2, Б – 1, Г – 4, Е – 3, Ж – 5

В. А – 2, Б – 1, Г – 3, Е – 4, Ж – 5

Допускается постановка искусственных зубов в съёмном пластиночном протезе кпереди от центра альвеолярного гребня на 2/3 их длины в области:

А. передних зубов нижней челюсти;

Б. передних зубов верхней челюсти;

В. боковых зубов нижней челюсти;

Г. боковых зубов верхней челюсти;

Д. передних и боковых зубов нижней челюсти.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Заболевание, в основе которого лежит нарушение чувствительности, выражающееся в приступообразных болях в зонах иннервации соответствующего нерва

Б. Полное отсутствие произвольных движений мышц

В. Уменьшение силы и (или) амплитуды произвольных движений мышц

Г. Состояние повышенной возбудимости нервной системы в сочетании с ее повышенной истощаемостью

Д. Места выхода ветвей тройничного нерва из костного отверстия в мягкие ткани

Е. Место нахождения триггерных (курковых) зон

1. Точки Валле

2. Невралгия

3. Неврит (невропатия)

4. Паралич

5. Парез

А. А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 5, Д – 1

Б. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 3

В. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Интенсивные приступообразные боли, зачастую – наличие «ауры» или раздражение триггерных зон перед приступом; вегетативные проявления

Б. Неврита

В. 1 месяц

Г. Невралгии

Д. Ноющие боли, часто постоянного характера, сопровождающиеся нарушением чувствительности и двигательными нарушениями

Е. 2 месяца

1. Клинические проявления неврита тройничного нерва

2. Клинические проявления невралгии тройничного нерва

3. Антikonвульсанты эффективны при лечении

4. Длительность болевого синдрома, при котором ставится диагноз хронической боли (при отсутствии морфологического субстрата)

А. А – 2, Г – 3, Д – 4, Е – 1

Б. А – 3, Г – 2, Д – 1, Е – 4

В. А – 2, Г – 3, Д – 1, Е – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Жалобы:

А. Зуб ранее сильно болел, в настоящее время боль возникает при попадании пищи в полость

Б. Боли интенсивные, самопроизвольные, иррадиирующие, усиливаются от горячего, кратковременное ослабление от холодного

В. Быстро проходящие боли от температурных, механических, химических раздражителей, возникшие 2-3 дня назад

Г. Продолжительные боли от всех видов раздражителей, ночные и самопроизвольные боли
Заболевание:

1. Пульпит начальный

2. Пульпит острый

3. Пульпит гнойный

4. Пульпит хронический гипертрофический

А. 1В, 2Г, 3Б, 4А

Б. 1Г, 2В, 3Б, 4А

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ НАЗНАЧАЮТ МАЗИ

А. Фотозащитные

Б. Кортикостероидные

В. Противовоспалительные

Г. Антибактериальные

Д. Регенерирующие

ЖЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ, ПРОХОДЯЩЕЕ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ, ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

А. Глоссита

Б. Глоссалгии

В. Ромбовидного глоссита

Г. Десквамативного глоссита

Д. Невралгия тройничного нерва

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. От нескольких месяцев до нескольких лет
- Б. Двустороннее поражение
- В. Одностороннее поражение
- Г. Обычно изменений нет, редко – расширение суставной щели
- Д. Расширение или сужение суставной щели, остеопороз
- Е. 2 – 3 месяца
- Ж. До 1 года
- 1. Для ревматоидного артрита ВНЧС характерно
- 2. Для контактного артрита ВНЧС характерно
- 3. Характерная рентгенологическая картина острого артрита ВНЧС
- 4. Рентгенологическая симптоматика хронического артрита ВНЧС
- 5. Длительность течения острого артрита ВНЧС
- 6. Длительность течения хронического артрита ВНЧС
- А. А – 6, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4, Е – 5
- Б. А – 6, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5, Е – 4
- В. А – 6, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4, Е – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Свойства композитных материалов:

- А. Выделение фтора
- Б. Высокая эластичность
- В. Высокая прочность
- Г. Низкая полимеризационная усадка Группы композитных материалов:
- 1. Текущие
- 2. Гибридные
- 3. Наноккомпозиты
- 4. Компомеры
- А. 1Б, 2В, 3Г, 4А
- Б. 1В, 2Б, 3Г, 4А
- В. 1Б, 2Г, 3А, 4В

ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ВРЕМЕННЫХ РЕЗЦОВ СО СФОРМИРОВАННЫМИ КОРНЯМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Удалить
- В. Зубы трепанировать, запломбировать за верхушки корней
- Г. Зубы трепанировать, запломбировать до верхушек корней
- Д. Репозиция зубов, их фиксация, наблюдение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Седативный эффект

Б. Замедляет процесс заживления раны

В. Атропин

Г. Гексенал

1. Побочный эффект от новокаина

2. Побочный эффект от тримекаина

3. При передозировке новокаина вводят:

4. При передозировке лидокаина вводят:

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3

Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4

В. А – 1, Б – 2, В – 4, Г – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. 10 лет

Б. 6 лет

В. Чрезмерно развитая пазуха, распространяющаяся даже в отростке верхнечелюстной кости

Г. Малые размеры верхнечелюстной пазухи

Д. Боль, чувство тяжести, давления и напряжения в соответствующей половине лица

Е. Выделение гноя или слизи из соответствующей половины носа

1. Наиболее частые симптомы острого гайморита

2. Возраст ребенка, при котором размеры верхнечелюстной пазухи приближаются к таковым взрослого человека

3. Возраст ребенка, при котором нижняя стенка верхнечелюстной пазухи находится на одном уровне с дном полости носа

4. Пневматический тип верхнечелюстной пазухи

5. Возраст ребенка, когда нижняя граница верхнечелюстной пазухи лежит ниже уровня дна полости носа

А. А – 5, Б – 2, В – 3, 4, Д – 1

Б. А – 5, Б – 2, 3, В – 1, Д – 4

В. А – 5, Б – 2, 3, В – 4, Д – 1

Укажите местный анестетик, действующий наиболее длительно:

- А. лидокаин
- Б. бупивакаин
- В. прокаин (новокаин)
- Г. артикаин
- Д. мепивакаин

ТОННЕЛЬНОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА

- А. Резцах и клыках
- Б. Клыках и премолярах
- В. Премолярах и резцах
- Г. Молярах и премолярах
- Д. Молярах и резцах

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Хронический сиалэктатический паротит
- Б. Эпидемический паротит
- В. Острый серозный лимфаденит интракапсулярного лимфоузла околоушно-жевательной области
- Г. Интерстициальный сиаладенит
- Д. Слюнно-каменная болезнь
- 1. Вирусный сиалоаденит
- 2. Ложный паротит Герценберга
- 3. Паренхиматозный паротит
- 4. Калькулезный сиалоаденит
- 5. Склерозирующий субмаксиллит
- А. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5, Д – 4
- Б. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 5
- В. А – 1, Б – 2, В – 3, Г – 5, Д – 4

ОСНОВНЫМ ПРИЧИННЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Курение
- Б. Сахарный диабет;
- В. Пародонтопатогенная микрофлора;
- Г. Сердечно-сосудистые заболевания;
- Д. Подвижность зубов.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Плазматические клетки

Б. Эозинофилы

В. Нейтрофильный сдвиг влево

Г. 4 – 5 сутки

Д. Гигантские многоядерные клетки

Е. 2 – 3 сутки

1. Признаки острого воспалительного процесса в общем анализе крови

2. Цитологический признак медленного заживления раны

3. Признак патологического течения раневого процесса

4. Цитологический признак наличия в ране инородного тела

5. Сроки перехода от макрофагальной фазы в фибробластическую при раневом процессе

А. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4

Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4

В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. 120 – 160

Б. 4,5 – 5

В. 200 – 400

Г. 0,8 – 1

Д. 0 – 5 %

Е. 20 – 30 %

1. Количество эритроцитов у здоровых людей ($\times 10^{12}$ в 1 л.)

2. Содержание гемоглобина в крови здоровых взрослых людей.

3. Цветовой показатель в норме

4. Количество тромбоцитов у здоровых людей ($\times 10^9$ в 1 л.)

5. Количество лимфоцитов в мазке крови взрослого человека (на 100 клеток)

6. Количество эритроцитов в мазке крови взрослого человека (на 100 клеток)

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 6, Е – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5, Е – 6

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 6, Е – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Безболезненный карбункул, на месте некроза образуется струп темного цвета, вокруг – стекловидный отек

Б. Эритематозное пятно имеет следующий вид: центральная часть западает и имеет яркий розово – красный цвет, периферия очага возвышается

В. Безболезненная, покрытая чешуйками эритема в виде «бабочки без крыльев»

Г. Манифестация с язвенно – некротического стоматита или гингивита

Д. Высыпания на коже, группы пузырьков с серозным содержимым по ходу нервных стволов

1. Характерные признаки номы

2. Характерные признаки сибирской язвы

3. Характерные признаки полиморфной экссудативной эритемы

4. Характерные признаки опоясывающего лишая

5. Характерные признаки эритематоза (красной волчанки)

А. А – 2, Б – 3, В – 5, Г – 4, Д – 1

Б. А – 2, Б – 3, В – 5, Г – 1, Д – 4

В. А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Строфантин, коргликон

Б. Бемегрид

В. Эуфиллин, дипрофиллин

Г. Кордиамин

Д. Нитроглицерин, изокет, нитроминт

1. Дыхательные analeptiki

2. Сердечные гликозиды

3. Антагонист гексенала и тиопентала натрия

4. Бронхолитики

5. Антиангинальные препараты

А. А – 1, Б – 3, В – 4, Г – 2, Д – 5

Б. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1, Д – 5

В. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 5, Д – 1

После припасовки коронок паяного мостовидного протеза в полости рта повторно определяется центральная окклюзия для:

- А. оценки качества припасовки коронок;
- Б. повторной установки и загипсовки модели с коронками в артикулятор;
- В. точной спайки опорных коронок с промежуточной частью;
- Г. точного моделирования промежуточной части мостовидного протеза (с учетом смыкания зубных рядов в центральной окклюзии);
- Д. повышения эстетики протеза.

ПРОТИВПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Абсцедирование
- Б. Подвижность зубов 2 степени
- В. Патология прикуса
- Г. Сахарный диабет
- Д. Кровоточивость десен

Укажите точку приложения действия местных анестетиков:

- А. кора головного мозга
- Б. таламус
- В. лимбическая система
- Г. чувствительные нервные окончания и проводники
- Д. задние рога спинного мозга

НИТРОМИНТ-АЭРОЗОЛЬ (НИТРОСПРЕЙ) - СРЕДСТВО ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ

- А. судорожного припадка
- Б. приступа бронхиальной астмы
- В. приступа стенокардии
- Г. гипертонического криза
- Д. стенотической асфиксии

Наиболее высокую кардиотоксичность имеет

- А. мепивакаин
- Б. лидокаин
- В. бупивакаин
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. артикаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Тенденция к группировке папул

Б. Повторное заражение этим же заболеванием после выздоровления

В. 3 – 4 недели

Г. 1 – 2 месяца

Д. Розеола, папулы, реже – пустулы

Е. Повторное заражение одним и тем же заболеванием у невылеченного больного

1. Реинфекция

2. Суперинфекция

3. Инкубационный период для первичного сифилиса

4. Проявления вторичного сифилиса на коже

5. Признаки рецидивирующего вторичного сифилиса

А. А – 5, Б – 1, В – 3, Д – 2, Е – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Д – 4, Е – 2

В. А – 1, Б – 5, В – 3, Д – 4, Е – 2

Гипертония – состояние, при котором величина АД стойко превышает

А. 120\80 мм.рт.ст

Б. 125\80 мм.рт.ст

В. 130\80 мм.рт.ст

Г. 135\85 мм.рт.ст

Д. 140\90 мм.рт.ст

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Заболевание:

А. Корневая киста остаточная

Б. Периапикальный абсцесс без свища

В. Корневая киста апикальная и боковая

Г. Хронический апикальный периодонтит Код по МКБ-10:

1. K04.5

2. K04.80

3. K04.7

4. K04.81

А. 1Г, 2В, 3Б, 4А

Б. 1Г, 2А, 3Б, 4В

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

Укажите осложнение, наиболее часто наблюдаемое при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов.

- А. ulcerогенный эффект
- Б. лейкопения
- В. повышение артериального давления
- Г. гепатит
- Д. понижение артериального давления

Культевые штифтовые вкладки методом литья изготавливают из:

- А. пластмассы;
- Б. легкоплавкого металла;
- В. сплавов металлов;
- Г. композиционных материалов;
- Д. воска.

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области передних зубов проходит:

- А. не касается зубов;
- Б. в пришеечной области зубов;
- В. посередине коронки зубов;
- Г. перекрывая коронки зубов на 1/3;
- Д. перекрывая коронки зубов на 2/3.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Скрепление отломков костным цементом
 - Б. Внутрикостное введение штифта (спицы), наложение накостной минипластины
 - В. Перевязка наружной сонной артерии
 - Г. Репозиция и фиксация отломков, перевязка сосуда в ране
 - Д. При помощи съёмного протеза с преобразованием его в шину и пращи
 - Е. Наложение аппарата Рудько, ЦИТО
 - Ж. Шина с зацепными петлями и межчелюстным натяжением
1. Способ остановки кровотечения при переломах нижней челюсти:
 2. Наиболее щадящий и часто применяемый метод лечения переломов нижней челюсти в пределах зубного ряда
 3. Наиболее простой метод лечения переломов беззубой нижней челюсти
 4. Наиболее легкий и быстро выполнимый метод остеосинтеза
- А. Б – 1, Г – 4, Д – 3, Ж – 2
 - Б. Б – 4, Г – 1, Д – 3, Ж – 2
 - В. Б – 4, Г – 2, Д – 1, Ж – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Разрезание кости позади коронки нижнего «зуба мудрости»

Б. Воспаление мягких тканей, окружающих коронку зуба при его неполном и затрудненном прорезывании

В. Ретенция «зубов мудрости»

Г. Задержка сроков прорезывания нормально сформированного постоянного зуба

Д. Неправильное положение в зубном ряду прорезывавшегося зуба или его аномальное положение в челюсти

1. Ретенция зуба

2. Дистопия зуба

3. Перикоронит

4. Полулуние Вассмунда

5. Одна из причин краевой гнездовой алопеции затылочной области

А. А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 1, Д – 2

В. А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2, Д – 1

Анестетик с минимальной активностью в условиях воспаления:

А. тримекаин

Б. лидокаин

В. мепивакаин

Г. прокаин (новокаин)

Д. артикаин

ПРИСТУП СТЕНОКАРДИИ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ДЛИТСЯ

А. 10 – 30 с

Б. 30 – 60 с

В. 1 - 5 мин

Г. 5 -10 мин

Д. 10 – 20 мин

При прямом методе изготовления культевой вкладки восковая или пластмассовая модель будущей вкладки изготавливается:

А. на модели из обычного медицинского гипса;

Б. на модели из огнеупорной массы;

В. на модели из легкоплавкого металла;

Г. непосредственно в полости рта;

Д. на модели из супергипса.

Моделировка литой коронки может проводиться без использования "адапты":

- А. базисным воском;
- Б. бюгельным воском;
- В. погружным воском;
- Г. липким воском;
- Д. воском для мостовидных работ;

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области боковых зубов проходит:

- А. не касается зубов;
- Б. в пришеечной области зубов;
- В. по середине коронки зубов;
- Г. перекрывая коронки зубов на 1/3;
- Д. перекрывая коронки зубов на 2/3.

ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ ГИНГИВО-СТОМАТИТ СОПРОВОЖДАЕТ ТЕЧЕНИЕ

- А. Сифилиса
- Б. ВИЧ-инфекции
- В. Красной волчанки
- Г. Хронического герпетического стоматита
- Д. Многоформной экссудативной эритемы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Сложные эфиры
- Б. Амиды
- В. Этиловые эфиры
- Г. Артикаин и гидрохлорид
- Д. Барбитураты

- 1. Прилокаин относится к группе:
- 2. Мепивакаин относится к группе:
- 3. Бупивакаин относится к группе:
- 4. Ультракаин относится к группе:
- 5. Новокаин относится к группе:

- А. А – 5, Б – 1,2, Г – 4,3
- Б. А – 5, Б – 1,2,3, Г – 4
- В. А – 2, Б – 1,3,4, Г – 5

ПРИЧИННЫЙ ЗУБ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ

- А. Сохраняют обязательно
- Б. Шинируют
- В. Депульпируют
- Г. Удаляют по показаниям
- Д. Удаляют обязательно

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ АРТРИТА ВНЧС С ХРОНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. Выраженное сужение суставной щели, нарушение функции суставной головки.
- Б. Незначительное расширение суставной щели, нарушение функции суставной головки.
- В. Выраженное расширение суставной щели, нарушение функции суставной головки.
- Г. Исчезновение наружных замыкающих кортикальных пластинок, краевые узур, остеопороз и кисты суставной головки
- Д. Ширина суставной щели без изменений, нарушение функции суставной головки.

МИКРОПРОТЕЗ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБА И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ВСЮ ОККЛЮЗИОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

- А. Pinlay
- Б. Inlay
- В. Onlay
- Г. Overlay
- Д. Ney

При какой реакции среды местные анестетики наиболее активны:

- А. нейтральной
- Б. слабощелочной
- В. слабокислой
- Г. кислой
- Д. щелочной

Укажите формулу зуба, для лечения которого необходимо провести проводниковую анестезию с анестетиком на основе артикаина

- А. зуб 36
- Б. зуб 14
- В. зуб 25
- Г. зуб 42
- Д. зуб 33

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Грипп, корь, краснуха, болезнь Боткина
 - Б. Прогрессирование и неблагоприятный исход процесса
 - В. Гнойно – воспалительные процессы
 - Г. Аллергические и паразитарные заболевания
 - Д. Воспалительные заболевания, интоксикация
 - Е. Мононуклеоз, туберкулез, сифилис
1. Лейкоцитоз наблюдается при заболеваниях:
 2. Лейкопения чаще встречается при заболеваниях:
 3. Токсическая зернистость лейкоцитов указывает на:
 4. Нейтрофилез указывает на:
 5. Эозинофилия встречается при:
 6. Лимфоцитоз развивается при:
- А. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6
 - Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 6
 - В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Болевой дисфункции
 - Б. Острого артрита
 - В. Артрозе
 - Г. Хроническом артрите
1. Симптом головной боли в большей степени характерен для:
 2. Резкие боли в суставе в большей степени характерны для:
 3. Щелканье в суставе наблюдаются при:
 4. Хруст в нижнечелюстном суставе наблюдается при:
 5. Тугоподвижность в суставе в конце дня наиболее часто встречается при:
 6. Чувство сведения челюстей после сна наблюдается при:
- А. А – 1, 3, 6, Б – 2, В – 5, Г – 4
 - Б. А – 1, 3, Б – 2, В – 4, Г – 5
 - В. А – 1, 3, 6, Б – 2, В – 4, Г – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Имеет вид плотной ткани, по плотности соответствует кости
Б. Из соединительной ткани
В. Из лимфоидной ткани
Г. Из слизистой ткани
Д. Очаг деструкции кости с нечеткими границами
Е. Напоминает кисту
Ж. Очаг разрежения костной ткани без четких границ, репаративные процессы в окружающей кости отсутствуют
1. Развитие цементомы происходит
 2. Развитие миксомы происходит
 3. Проявление миксомы на рентгенограмме
 4. Проявление цементомы на рентгенограмме
 5. Проявления одонтогенной карциномы (первичного рака) нижней челюсти на рентгенограмме
- А. А – 1, Б – 4, Г – 2, Д – 3, Ж – 5
Б. А – 4, Б – 1, Г – 2, Д – 3, Ж – 5
В. А – 4, Б – 1, Г – 2, Д – 5, Ж – 3

Укажите группу препаратов, усиливающую и пролонгирующую действие местноанестезирующих средств:

- А. возбуждающие средства
Б. спазмолитики
В. α -адреномиметики
Г. М-холиномиметики
Д. α -адреноблокаторы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Признаки периодонтита

Б. Заболевания, характеризующиеся распространением воспалительного процесса с периодонта на надкостницу альвеолярного отростка и тело челюсти

В. Инфекционно – аллергический, гнойно – некротический процесс, который развивается в кости под воздействием внешних или внутренних факторов

Г. Очаги разрежения костной ткани различных размеров

Д. Удаление причинного зуба, декомпрессия тканей (в т.ч. костной), дренирование очагов воспаления

Е. Удаление или лечение причинного зуба (по показаниям), вскрытие абсцесса

1. Периостит

2. Остеомиелит

3. Изменения на рентгенограмме при остром периостите

4. Изменения на рентгенограмме при остром одонтогенном остеомиелите на ранних стадиях

5. Оперативное лечение острого одонтогенного периостита

6. Оперативное лечение острого одонтогенного остеомиелита

А. А – 3,4, Б – 1, В – 2, Д – 6, Е – 5

Б. А – 4, Б – 1, В – 2, Д – 6, Е – 5

В. А – 3,4, Б – 2, В – 1, Д – 6, Е – 5

ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ЦЕМЕНТ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ ЯВИТЬСЯ В КЛИНИКУ ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО ОСМОТРА:

А. Один раз в месяц

Б. Один раз в полгода

В. Один раз в год

Г. Только при возникновении жалоб

Д. По желанию пациента

ПРИ ТРАВМЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДИТ

А. Перелом корня

Б. Вывих

В. Ушиб

Г. Скол коронки зуба

Д. Перелом зуба на уровне шейки

ВЕРРУКОЗНУЮ ЛЕЙКОПЛАКИЮ ОТНОСЯТ

- А. К раку
- Б. К дерматозу
- В. К облигатному предраку
- Г. К факультативному предраку
- Д. Все ответы не верные

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Передние и задние
- Б. Травматический, привычный, патологический
- В. Острые и застарелые
- Г. Односторонние и двусторонние
- Д. Полный и неполный

1. В зависимости от величины расхождения суставных поверхностей вывихи нижней челюсти могут быть:
2. С учетом времени прошедшей с момента травмы, вывихи нижней челюсти делятся на:
3. В зависимости от локализации вывихи могут быть:
4. По механизму возникновения различают вывихи:
5. В зависимости от направления смещения суставной головки, вывихи бывают

- А. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д – 1
- Б. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3
- В. А – 5, Б – 2, В – 3, Г – 3, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Зуб
 - Б. Белесоватым, мутным, тягучим
 - В. Кровянисто – бурым, без холестерина
 - Г. Холестеатомные массы
1. Содержимое амелобластомы нижней челюсти чаще бывает
 2. Содержимое остеобластомы чаще бывает
 3. Содержимое фолликулярной кисты
 4. Содержимое эпидермоидной кисты представляет собой

- А. А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 4
- Б. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4
- В. А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Гистиоцитоз (ретикулоэндотелиоз)

Б. Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение

В. Злокачественная эпителиальная опухоль

Г. Очаг разряжения костной ткани без четких границ

Д. Участки неоднородной деструкции костной ткани без наличия полосы остеосклероза по периферии очага

Е. Наличие очагов вновь образованной ткани

1. Первичный рак челюсти – это:

2. Эозинофильная гранулема – это:

3. Рентгенологические проявления первичного рака челюсти

4. Рентгенологические проявления эозинофильной гранулемы

А. А - 1, В - 3, Г - 2, Д - 4

Б. А - 2, В - 1, Г - 3, Д - 4

В. А - 2, В - 1, Г - 4, Д - 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Методы лечения:

А. Герметизация фиссур

Б. Реминерализующая терапия

В. Препарирование и пломбирование Полостей

Г. Обучение гигиене полости рта Стадии кариеса:

1. Стадия пятна

2. Кариес эмали

3. Кариес дентина

4. Осложненный кариес

А. 1АБГ, 2АБВГ, 3ВГ, 4Г

Б. 1АБГ, 2АВГ, 3ВГ, 4Г

В. 1АБГ, 2АБВГ, 3Г, 4Г

МИКРОПРОТЕЗ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБА И РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ОККЛЮЗИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕРЕКРЫТИЕМ ОДНОГО БУГРА

А. Pinlay

Б. Inlay

В. Onlay

Г. Overlay

Д. Ney

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Серозная инфильтрация тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел
- Б. Зуд кожи, эозинофилия, в пунктате – клетки Березовского - Штернберга
- В. Золотистый стафилококк
- Г. Смешанная микрофлора
- Д. Гнойное воспаление тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел
- Е. Наличие пакетов лимфоузлов, длительный субфебрилитет, положительная реакция Пирке и Манту, наличие в пунктате гигантских клеток Пирогова – Лангханса
- Ж. Острое начало заболевания, высокая температура тела, отрицательная проба с актинолизатом
1. Микроорганизм – наиболее частый возбудитель острых лимфаденитов лица и шеи
 2. Периаденит
 3. Аденофлегмона
 4. Характерные признаки туберкулезного лимфаденита
 5. Нехарактерные для актиномикоза признаки поражения лимфатических узлов
 6. Клиническая симптоматика лимфогранулематоза
- А. А – 3, Б – 6, В – 1, Д – 2, Е – 4, Ж – 5
- Б. А – 2, Б – 6, В – 1, Д – 3, Е – 5, Ж – 4
- В. А – 2, Б – 6, В – 1, Д – 3, Е – 4, Ж – 5

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССОВ И ФЛЕГМОН ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Новокаиновая блокада с антибиотиками
- Б. Послойное вскрытие гнойного очага с введением дренажа
- В. Удаление причинного зуба
- Г. Проведение физиотерапии
- Д. Дезинтоксикационная терапия

Провести депульпирование зуба

2.4 под инфильтрационной анестезией позволяют местноанестезирующие препараты на основе:

- А. мепивакаина
- Б. лидокаина
- В. бензокаина (анестезина)
- Г. артикаина
- Д. прокаина (новокаина)

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ

- А. Приступообразные ночные боли длительностью 15-30 минут, иррадиирующие в ухо, висок
- Б. Продолжительные, варьирующие по интенсивности боли, усиливающиеся при давлении по ходу нерва
- В. Тупые длительные боли с чувством давления и напряжения в верхней челюсти, выделения из носа
- Г. Продолжительные приступообразные боли с иррадиацией в ухо, хруст в височно-нижнечелюстном суставе
- Д. Кратковременные интенсивные боли, возникающие от случайных раздражений без нарушений чувствительности

Подвижность зубов по Энтину II степени характеризуется подвижностью:

- А. в пределах физиологической нормы;
- Б. в лунке во всех направлениях вокруг своей оси;
- В. в вестибулооральном и медиодистальном направлениях;
- Г. в вертикальном направлении;
- Д. в вестибулооральном направлении.

Укажите процентную концентрацию раствора лидокаина, применяемого в стоматологической практике для инфильтрационной и проводниковой анестезии

- А. 0.50%
- Б. 2%
- В. 3%
- Г. 4%
- Д. 10

РЕСТАВРАЦИЯ ПО МЕТОДИКЕ "ОТКРЫТОГО СЭНДВИЧА" - ЭТО:

- А. Контактный пункт выполнен СИЦ, окклюзионная поверхность - композитом
- Б. Перекрытие базовой подкладки из СИЦ композитом в области контактного пункта и с окклюзионной поверхности
- В. Нанесение СИЦ на слой низкомодульного композита
- Г. Контактный пункт выполнен композитом, окклюзионная поверхность - СИЦ
- Д. Окклюзионная поверхность - композит, контактный пункт - амальгама

ПРИЗНАКАМИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. апноэ, асистолия, отсутствие зрачков. рефлекса
- Б. апноэ, асистолия, арефлексия
- В. апноэ, отсутствие роговичного рефлекса, отсутствие тонуса мышц
- Г. апноэ, отсутствие зрачкового рефлекса, отсутствие тонуса мышц
- Д. апноэ, асистолия, отсутствие коленного рефлекса

ДЛЯ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНО

- А. Сильные кратковременные приступообразные боли
- Б. Длительные ноющие боли
- В. Кратковременные парестезии
- Г. Длительные парестезии
- Д. Симптом Венсана

ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ УСТУП ФОРМИРУЕТСЯ

- А. Супрагингивально
- Б. На уровне края десны
- В. Субгингивально на вестибулярной поверхности
- Г. Субгингивально по всему периметру шейки зуба
- Д. Не формируется

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Закрытый перелом
- Б. При продольном переломе
- В. При сохранении целостности всех стенок лунки
- Г. Открытый перелом
- Д. Перелом зуба со вскрытием пульпы зуба
- Е. При поперечном переломе
- 1. Полный перелом зуба – это
- 2. Полный перелом коронки зуба – это
- 3. Зуб подлежит удалению
- 4. Реплантация зуба возможна
- 5. Полный перелом корня зуба – это
- А. А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1
- Б. А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 2, Д – 1
- В. А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 1, Д – 2

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Острый периодонтит
- Б. Обострившийся хронический периодонтит
- В. Нагноившаяся радикулярная киста
- Г. Общий гнойный пульпит
- Д. Альвеолит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Развивается вследствие попадания в трахею и бронхи рвотных масс, сгустков крови, содержимого полости рта

Б. Возникает при разрыве мягких тканей неба или задней стенки глотки, когда во время вдоха лоскут перекрывает дыхательные пути

В. Возникает вследствие закрытия верхних дыхательных путей инородным телом, рвотными массами, кровавым сгустком

Г. Развивается вследствие западения языка при смещении отломков нижней челюсти, особенно подбородочного отдела

Д. Развивается вследствие отека голосовых связок и тканей подвязочного пространства или сдавления задних отделов гортани гематомой

1. Дислокационная асфиксия

2. Обтурационная асфиксия

3. Стенотическая асфиксия

4. Клапанная асфиксия

5. Аспирационная асфиксия

А. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3

Б. А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 2, Д – 3

В. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Описание

А. Ткани зуба имеют разные цвета при различных условиях освещения

Б. Способность материалов приобретать вид окружающих тканей, сливаться с ними

В. Способность эмали при естественном освещении испускать бледное мерцание

Г. Способность зубов поглощать волны ультрафиолетового диапазона и испускать видимый, синеватый свет

1. Опалесценция

2. Флуоресценция

3. Метамерия

4. Эффект хамелеона

А. 1Г, 2В, 3А, 4Б

Б. 1В, 2А, 3Б, 4Г

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Нарушение функции жевания
- Б. Костная крепитация
- В. Неправильный прикус
- Г. Локальная боль, усиливающаяся при пальпации
- Д. Гематома, отек окружающих тканей

К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТ

- А. Болезнь Боуэна и пигментную ксеродермию
- Б. Актинический кератоз, радиационный дерматоз, предраковый меланоз
- В. Бородавчатый (узелковый) предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, абразивный хейлит Манганотти
- Г. Эритроплакию, бородавчатый предрак, ограниченный гиперкератоз, абразивный хейлит Манганотти
- Д. Болезнь Боуэна, лейкоплакия, хроническая трещина губы

ЭКВИВАЛЕНТОМ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

- А. тяжесть за грудиной
- Б. дискомфорт
- В. стеснение в груди
- Г. длительная боль в области верхушки сердца
- Д. чувство нехватки воздуха

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Обширная деструкция костной ткани с зазубренными краями
- Б. Имеет вид мелких полостей, разделенных костными перегородками
- В. Очаг неравномерного интенсивного затемнения с неровными границами
- Г. Ограниченное разряжение костной ткани с четкими границами

- 1. Описание ячеистой формы остеобластомы
- 2. Описание солидной формы остеобластомы
- 3. Описание литической формы остеобластомы
- 4. Описание кистозной формы остеобластомы

- А. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4
- Б. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2
- В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4

ПРИКУС-ЭТО ВИД СМЫКАНИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ В ПОЛОЖЕНИИ ОККЛЮЗИИ:

- А. Центральной
- Б. Боковой левой
- В. Передней
- Г. Дистальной
- Д. Боковой правой

Наиболее высокой диффузионной способностью обладает:

- А. лидокаин
- Б. артикаин
- В. прокаин (новокаин)
- Г. мепивакаин
- Д. бупивакаин

КАКУЮ ФОРМУ ИМЕЕТ СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ВНЧС

- А. Шаровидную
- Б. Овальную
- В. Эллипсоидную
- Г. Цилиндрическую
- Д. Дисковидную

ДИАГНОЗ "ГЛУБОКИЙ КАРИЕС" СООТВЕТСТВУЕТ ДИАГНОЗУ ПО МКБ-10:

- А. Кариез эмали
- Б. Кариез дентина
- В. Кариез цемента
- Г. Гиперемия пульпы
- Д. Д)Рецидивирующий кариес

CEREC – ЭТО

- А. Система компьютерного изготовления вкладок и коронок
- Б. Система адгезионной фиксации безметалловых вкладок
- В. Система реставрации зубов стандартными керамическими вкладками
- Г. Воск для прямой моделировки вкладок
- Д. Система ультразвукового препарирования под стандартные керамические вкладки

ВОЗБУДИТЕЛЕМ РОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Эпидермальный стафилококк
- Б. Пемолитический стрептококк
- В. Бактероиды, клостридии
- Г. Кишечная и синегнойная палочки
- Д. Актиномицеты

ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМОСТЬ ПУЛЬПЫ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ

- А. Возрастает
- Б. Остается без изменений
- В. Снижается
- Г. Колеблется
- Д. Не определяется

Применение замковых креплений для фиксации съёмного протеза даёт возможность:

- А. уменьшить рвотный рефлекс;
- Б. улучшить дикцию;
- В. повысить эстетику;
- Г. улучшить фиксацию протеза;
- Д. уменьшить травму десны.

ПРИЗНАКИ ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ

- А. Усиление воспаления в окружности язвы
- Б. Уменьшение воспаления в окружности язвы
- В. Уплотнение краев и основания язвы
- Г. Усиление боли
- Д. Уменьшение боли

ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОТТИСК С:

- А. Нижней челюсти без протеза
- Б. Нижней челюсти с протезом
- В. Верхней челюсти и нижней челюсти без протеза
- Г. Нижней челюсти с протезом и верхней челюсти
- Д. Слепки снимать не нужно

ПРОСВЕТ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТ ПРИ

- А. аспирационной асфиксии
- Б. обтурационной
- В. клапанной
- Г. стенотической
- Д. странгуляционной

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВИНИРОВ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Низкий уровень гигиены полости рта
- Б. Депульпированные зубы
- В. Деминерализация после ортодонтического лечения
- Г. Диастема шириной 1 мм
- Д. Наличие старых, изменивших цвет, пломб

НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА У ВЗРОСЛЫХ ВЫПОЛНЯЮТ С ЧАСТОТОЙ

- А. 60 компрессий в 1 мин
- Б. 60 – 80 в 1 мин
- В. 80 в 1 мин
- Г. 80 - 100 в 1 мин
- Д. не менее 100 в 1 мин

СЛИВАЮЩИЕСЯ В РИСУНОК ПАПУЛЫ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- А. Лейкоплакия
- Б. Герпес
- В. Красная волчанка
- Г. Плоский лишай
- Д. Опоясывающий лишай

Высшая (максимально допустимая) разовая доза артикаина для детей:

- А. 2,2 мг/кг
- Б. 3,0 мг/кг
- В. 4,4 мг/кг
- Г. 5,0 мг/кг
- Д. 7 мг/кг

Для снятия психоэмоционального напряжения в условиях стоматологической поликлиники используют:

- А. снотворные
- Б. анксиолитики (транквилизаторы)
- В. наркотические анальгетики
- Г. ненаркотические анальгетики
- Д. антидепрессанты

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Показания:

А. Препарирование без выхода на аппроксимальную грань и кариесрезистентных пациентов

Б. Скрытые полости до контактного пункта сочетание полостей 2 и 1 класса

В. Полость в пришеечной области до контактного пункта у зубов с высокой коронкой

Г. Распространение полости на контактный пункт, замена старой реставрации Методики препарирования и пломбирования полостей 2 класса:

1. Техника горизонтального туннеля

2. Техника сквозного вертикального туннеля

3. Техника несквозного вертикального туннеля

4. Препарирование и пломбирование стандартными керамическими вкладками

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1А, 2Б, 3В, 4Г

В. 1Г, 2Б, 3А, 4В

ПРИ СНЯТИИ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ У ПАЦИЕНТА С ЯЗВЕННО- НЕКРОТИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ ВЕНСАНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД:

А. Ручной;

Б. Ультразвуковой;

В. Пескоструйный;

Г. Сочетанный ручной и ультразвуковой

Д. Сочетанный ручной и пескоструйный

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОКАЗАНЫ ДЛЯ ЛИЦ

А. Кариесвосприимчивых

Б. Кариесрезистентных

В. Молодого возраста

Г. В детском возрасте.

Д. Пожилого возраста

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Инфильтрации и абсцедирования

Б. Внедрение инородного тела

В. Из гранулемы, тяжа причинного зуба

Г. Из гранулемы

Д. Хроническая

Е. Обострившееся хроническое

1. Неодонтогенная гранулема развивается в следствие

2. Одонтогенная гранулема состоит

3. Неодонтогенная гранулема состоит

4. Течение подкожной гранулемы

5. Стадии клинического течения одонтогенной подкожной гранулемы лица

А. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3

Б. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4

В. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4

МЕСТОМ ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ ПРИ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИЦЕВОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧКА В ОБЛАСТИ

А. Ветви нижней челюсти впереди козелка уха соответствующей стороны

Б. Основания нижней челюсти соответственно подбородочному отверстию

В. VII шейного позвонка

Г. Края нижней челюсти впереди жевательной мышцы

Д. Переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышц

КУРКОВЫЕ (ТРИГГЕРНЫЕ) ЗОНЫ ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЭТО УЧАСТКИ

А. Гиперстезии

Б. Гипостезии

В. Раздражение которых провоцирует приступ боли

Г. Парастезии

Д. Анестезии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Тавегил

Б. Метронидазол

В. Неспорообразующие анаэробы

Г. Гентамицин

Д. Стафилококки

1. Высокой активностью против неспорообразующих анаэробов обладают

2. Бета – лактомазу (пенициллиназу) выделяют

3. Ототоксическим действием обладает

4. Десенсибилизирующий препарат

А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3

В. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2

Пациенту с язвенно-некротическим стоматитом необходимо обработать слизистую оболочку полости рта антибактериальным препаратом. Какой местный анестетик следует использовать для поверхностного обезболивания слизистой оболочки

А. бупивакаин

Б. мепивакаин

В. артикаин

Г. прокаин (новокаин)

Д. лидокаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Для иммобилизации отломков нижней челюсти в области угла

Б. Для иммобилизации отломков при линейных переломах нижней челюсти в пределах от центральных резцов до премоляров

В. Шина, фиксирующаяся на зубах верхней челюсти, а боковые крылья – пилоты опущены вниз

Г. Пластмассовая шина, охватывающая зубы; плотно прилежащая к десневому краю и опирающаяся на альвеолярный отросток челюсти

Д. Шина состоящая из базисных пластинок на альвеолярные отростки верхней и нижней челюсти, которые скрепляются в единый блок, а в переднем отделе имеется отверстие для приема пищи

1. Гладкая шина – скоба используется:

2. Шина Вебера – это

3. Шина Порта – это

4. Шина Ванкевича - это

А. Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

Б. Б – 4, В – 1, Г – 2, Д – 3

В. Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

ТЯЖЁЛАЯ ОДЫШКА, УЧАСТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЫШЦ В АКТЕ ДЫХАНИЯ, ВЗДУТИЕ ШЕЙНЫХ ВЕН, ВЫБУХАНИЕ НАДКЛЮЧИЧНЫХ ЯМОК, ВЫРАЖЕННЫЙ ЦИАНОЗ ХАРАКТЕРИЗУЮТ

А. асфиксию обтурационную

Б. приступ бронхиальной астмы

В. асфиксию аспирационную

Г. большой эпилептический припадок

Д. приступ стенокардии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Удаление новообразования с капсулой

Б. Инвазивный рост

В. Резекция челюсти в пределах здоровой ткани

Г. Новообразование формируется в определенном возрасте и в дальнейшем в размерах не увеличивается

Д. Лучевая терапия

1. Характер роста для амелобластом

2. Характер роста одонтом

3. Принцип лечения амелобластом

4. Принцип лечения одонтом

А. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Б. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4

Укажите формулу зуба, для лечения которого достаточно проведение инфильтрационной анестезии с анестетиком на основе артикаина

А. зуб 31

Б. зуб 48

В. зуб 37

Г. зуб 46

Д. зуб 38

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ЭМАЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЕ КОНТАКТ С КОМПОЗИТОМ ПО ПРИНЦИПУ

А. Микросцепления

Б. Химического взаимодействия

В. Адгезии

Г. Макросцепления

Д. Макросцепления и химического взаимодействия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Понижение АД

Б.Повышение АД

В. Не влияет

Г. Барбитураты

Д. Миорелаксанты

Е. Атропин или метацин

1. Влияние эфира для наркоза на АД

2. Влияние фторотана на АД

3. Препараты, расслабляющие скелетную и дыхательную мускулатуру

4. Препараты, применяемые для подавления саливации при наркозе

5. Влияние кеталара на АД

А. А – 2, Б – 1,5, Д – 4, Е – 3

Б. А – 2, Б – 1,5, Д – 3, Е – 4

В. А – 1, Б – 2,5, Д – 3, Е – 4

Местноанестезирующий препарат с минимальной проникающей способностью через гистогематические барьеры:

А. мепивакин

Б. лидокаин

В. бупивакаин (маркаин)

Г. прокаин (новокаин)

Д. артикаин

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

А. Местная гипоплазия эмали

Б. Флюороз

В. Тетрациклиновые зубы

Г. Системная гипоплазия эмали

Д. Несовершенный амелогенез

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Инфекционная болезнь, которая характеризуется тяжелой интоксикацией, поражением кожи и лимфатического аппарата

Б. 8 – 10 дней

В. Инфекционное заболевание, протекающее в виде быстро прогрессирующей формы влажной гангрены лица, челюстей, тканей полости рта на фоне резкого снижения реактивности организма

Г. 15 – 18 дней

Д. Инфекционная болезнь, характеризующаяся очаговым серозным или серозно-геморрагическим воспалением кожи, лихорадкой и интоксикацией

Е. 12 – 14 дней

1. Цикл развития фурункулов

2. Цикл развития карбункулов

3. Рожь

4. Сибирская язва

5. Нома

А. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3, Д – 2

Б. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 5, Д – 3

В. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2, Д – 3

Создание чрезмерной конусности стенок при препарировании под металлокерамическую коронку приводит к:

А. неэстетичности коронки;

Б. снижению прочности коронки;

В. к травме десны;

Г. к ослаблению фиксации коронки;

Д. делает коронку более долговечной.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Низкий уровень иммунитета, выраженная сенсibilизация организма, слабовирулентная микрофлора

Б. Низкий уровень иммунитета, выраженная сенсibilизация организма и значительная вирулентность микрофлоры

В. Кариозные зубы, пародонтит, зубные отложения, тонзиллиты

Г. Достаточная напряженность иммунитета, низкий уровень сенсibilизации организма, высокая вирулентность микрофлоры

Д. Тонзиллиты

1. Наиболее частая причина сенсibilизации организма к хронической инфекции

2. Нормергическая форма воспаления наблюдается при

3. Гиперергическая форма воспаления развивается при

4. Гипоергическая форма воспалительной реакции возникает при

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. У взрослых

Б. Боль в челюсти подвижных зубов

В. У детей и лиц молодого возраста

Г. Деформация челюсти

1. Первые симптомы при центральной остеосаркоме челюстей

2. Первые симптомы при периферической остеосаркоме челюстей

3. Остеобластическая форма саркомы челюсти чаще встречается

4. Остеолитическая форма саркомы челюсти чаще всего встречается

А. А – 1, Б – 4, В – 3, Г – 2

Б. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1

В. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Не ранее, чем через 12 часов после травмы, гематома не выходит за пределы круговой мышцы глаза

Б. Звук треснувшего горшка, возникающий при постукивании по зубам поврежденной стороны

В. Ликворея, возникающая при переломе пирамиды височной кости

Г. Ликворея через дефект твердой мозговой оболочки в области пластинки решетчатой кости или в месте перелома клиновидной кости

Д. Боль по ходу щели перелома при надавливании указательным пальцем на крючки клювовидных отростков клиновидной кости

Е. Гематомы появляются сразу после травмы и имеют распространённый характер

1. При изолированных переломах верхней челюсти «симптом очков» появляется:

2. При изолированных переломах костей основания черепа «симптом очков» появляется:

3. Положительный симптом Малевича

4. Положительный симптом Герена

5. Назальная ликворея

6. Ушная ликворея

А. А – 2, Б – 3, В – 6, Г – 5, Д – 4, Е – 1

Б. А – 2, Б – 6, В – 5, Г – 3, Д – 4, Е – 1

В. А – 2, Б – 3, В – 6, Г – 4, Д – 5, Е – 1

ЭНДОДОНТ ВКЛЮЧАЕТ

А. Пульпу и дентин

Б. Пульпу зуба

В. Пульпу зуба, периодонтальную связку,

Г. Пульпу зуба, периодонтальную связку, альвеолу

Д. Пульпу зуба, периодонтальную связку, альвеолу, десну

При изготовлении металлокерамической коронки чрезмерное укорочение культи зуба может привести к:

А. нарушению эстетики;

Б. функциональным нарушениям;

В. сколу керамики;

Г. расцементировки коронки;

Д. травме десны.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Синдром Хеерфорда

Б. Болезнь Микулича

В. Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение

Г. Синдром Шегрена

1. Заболевание, для которого характерна триада: ксеростомия, ксерофтальмия, ревматоидный полиартрит

2. Заболевание слюнных желез, сходное по клинической картине с опухолью

3. Заболевание, при котором у больного увеличиваются все слюнные и слезные железы

4. Заболевание, сопровождающееся триадой: припухлость околоушной слюнной железы, иридоциклит, парез лицевого нерва

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1

ПАЦИЕНТУ В СОСТОЯНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА ВВОДЯТ

А. подкожно

Б. подъязычно

В. внутривенно

Г. внутримышечно

Д. внутрисердечно

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. С неба на ножке

Б. Удаление причинного зуба, назначение местных сосудосуживающих средств, ФТЛ

В. С вестибулярной поверхности вестибулярного отростка

Г. Удаление причинного зуба, пункции промывания пазухи, симптоматическое лечение

Д. Удаление причинного зуба, гайморитомия

1. Лечение острого одонтогенного серозного гайморита

2. Лечение острого одонтогенного гнойного гайморита

3. Лечение хронического одонтогенного гайморита

4. Чаще всего ороантральное сообщение закрывается путем слизисто-надкостничного лоскута взятого

А. Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3

Б. Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

В. Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

Показанием к постановке искусственных зубов на «приточке» в съёмном пластиночном протезе на верхней челюсти является:

- А. чрезмерная выраженность альвеолярной части нижней челюсти;
- Б. чрезмерная выраженность альвеолярного отростка верхней челюсти в области боковых зубов;
- В. «короткая» нижняя губа;
- Г. «короткая» верхняя губа;
- Д. выраженная уздечка нижней губы.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. 2 недели
- Б. 1 неделя
- В. 19 – 23 сутки
- Г. 3 недели
- Д. 16 – 18 день

- 1. Сроки эпителизации лунок однокорневых зубов в норме
- 2. Сроки эпителизации лунок многокорневых зубов в норме
- 3. Задержка эпителизации лунок однокорневых зубов при воспалении
- 4. Задержка эпителизации лунок многокорневых зубов при воспалении
- 5. Сроки полного заполнения лунки грануляционной тканью в норме

- А. А – 4,5, Б – 1, В – 2, Д – 3
- Б. А – 4,5, Б – 3, В – 1, Д – 2
- В. А – 4,5, Б – 3, В – 2, Д – 1

ЭТОТ ПРЕПАРАТ СНИЖАЕТ ТОНУС СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ

- А. эуфиллин
- Б. диазепам
- В. кофеин
- Г. но-шпа
- Д. папаверин

ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ КАРИЕСВОСПРИИМЧИВОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- А. До иммунных зон
- Б. Профилактически иссекая окружающую деминерализованную эмаль
- В. Миниинвазивным методом
- Г. Депульпируют зуб
- Д. С позиций щадящего препарирования

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Осложнения:

А.Отсутствие сухого блеска

Б.Дебондинг

В.Ожог пульпы

Г.Интоксикация пульпы Ошибки при изготовлении прямых виниров:

1.при препарировании

2.при протравливании и нанесении адгезива

3.при работе с композитом

4.при шлифовании и полировании

А. 1Г, 2В, 3Б, 4А

Б. 1В, 2Г, 3Б, 4А

В. 1В, 2А, 3Б, 4Г

ПУЛЬС У ПАЦИЕНТА БЕЗ СОЗНАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ НАД ПРОЕКЦИЕЙ

А. лучевой артерии

Б. плечевой

В. наружной сонной

Г. локтевой

Д. общей сонной

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОСТИ ПО V КЛАССУ СКОС ПРЕПАРИРУЮТ

А. По эмали

Б. По цементу корня

В. По эмали и цементу корня

Г. Не формируют

Д. На усмотрение врача

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Размер частиц Наполнителя:

А. 0,04-0,4 мкм

Б. 0,04-5 мкм

В. 8-45 мкм

Г. 1-5 мкм Класс композитного материала:

1. Макронаполненные

2. Микронаполненные

3. Мининаполненные

4. Гибридные

А. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Б. 1В, 2А, 3Г, 4Б

В. 1А, 2В, 3Г, 4Б

Укажите высшую (максимально допустимую) разовую дозу артикаина для взрослых:

А. 2,5 мг/кг

Б. 3,5 мг/кг

В. 4,5 мг/кг

Г. 5 мг/кг

Д. 7 мг/кг

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Рентгенологическая картина:

А. Выраженные периапикальные деструктивные изменения костной ткани

Б. Участок разряжения костной ткани с четкими контурами более 5 мм

В. Изменений не выявляется Заболевание:

1. Острый апикальный периодонтит

2. Хронический апикальный периодонтит

3. Радикалярная киста

4. Хронический пульпит

А. 1В, 2А, 3Б, 4В

Б. 1Б, 2А, 3В, 4В

В. 1В, 2А, 3Б, 4А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Базально – клеточный рак

Б. Внутриэпителиальный рак слизистой оболочки

В. Внутриэпидермальный кожный рак

Г. Разновидность старческой кератомы

Д. Злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментообразующих клеток

1. Кожный рог – это:

2. Болезнь Боуэна – это:

3. Эритроплазия Кейра – это:

4. Меланома – это:

5. Базалиома – это

А. А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 4

Б. А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 1, Д – 4

В. А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 4, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Очаг интенсивного затемнения с четкими и ровными границами, окруженной полоской просветления шириной около 1 мм

Б. Неоднородный очаг округлой формы с чередованием участков разрежения и уплотнение

В. Гомогенный очаг затемнения округлой формы с четкими границами

Г. Гомогенный очаг затемнения нечеткими и неровными границами

Д. Очаг деструкции кости с нечеткими границами, окруженный ободком склерозированной ткани

1. Рентгенологическая картина губчатой остеомы челюсти

2. Рентгенологическая картина компактной остеомы челюсти

3. Рентгенологическая картина оссифицирующего периостита

4. Рентгенологическая картина одонтомы

5. Рентгенологическая картина остеонид - остеомы

А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 5

В. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5

Пациенту, страдающему бронхиальной астмой и имеющему повышенную чувствительность к сульфитам, для проведения местного обезболивания перед лечением зуба следует выбрать

- А. 2% раствор мепивакаин+ эпинефрин (адреналин) 1: 100 000
- Б. 3% раствор мепивакаина
- В. 4% раствор артикаина + эпинефрин (адреналин) 1: 200 000
- Г. 4% раствор артикаина + эпинефрин (адреналин) 1: 100 000
- Д. 2% раствор лидокаина + эпинефрин (адреналин) 1: 100 000

ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ

- А. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, дренирование раны, удаление причинного зуба
- Б. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, назначение антибиотиков, ротовых ванн, УВЧ
- В. Удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн
- Г. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, дренирование раны, удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн
- Д. Медикаментозная терапия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Анаэробы
 - Б. Пустулезная, бугорковая, смешанная
 - В. Создает условия для развития актиномицетов
 - Г. Абсцедирующая, гуммозная, смешанная
 - Д. Образование инфильтратов, которые могут нагнаиваться
 - Е. Препятствует развитию актиномицетов
 - Ж. Наличие гуммозных образований клетчатки
1. Кожная форма актиномикоза
 2. Подкожная форма актиномикоза
 3. Для подкожно – мышечной формы актиномикоза характерно
 4. Актиномицеты, обладающие большей патогенностью
 5. Роль пиогенной (банальной микрофлоры) при актиномикозе
- А. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3, Д – 2
 - Б. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2, Д – 3
 - В. А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 2, Д – 3

Подвижность зубов по Энтину I степени характеризуется подвижностью:

- А. в пределах физиологической нормы;
- Б. в лунке во всех направлениях вокруг своей оси;
- В. в вестибулооральном и медиодистальном направлениях;
- Г. в вертикальном направлении;
- Д. в вестибулооральном направлении.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Методы реставрации:

А.Пломба

Б.Прямой винир

В.Непрямой винир

Г.Искусственная коронка Показания:

1.Изменения цвета зуба после эндодонтического лечения

2.Незначительный по площади клиновидный дефект

3.Диастема

4.Флюороз

А. 1БВ, 2А, 3БВГ, 4БВ

Б. 1БВ, 2А, 3БВ, 4БВ

В. 1БВ, 2БА, 3БВГ, 4БВ

НАЛИЧИЕ У РЕБЕНКА УСТОЙЧИВОЙ ПРИВЫЧКИ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ПОСТОЯННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ЯЗЫКА МЕЖДУ ЗУБАМИ, ФОРМИРУЕТ

А. Мезиальную окклюзию

Б. Глубокую резцовую окклюзию

В. Дистальную окклюзию

Г. Вертикальную резцовую дизокклюзию

Д. Вестибулоокклюзию

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Не ранее, чем через 2 недели

Б. Гайморотомия с пластикой соустья

В. Можно, при наличии кровотечения

Г. Можно во всех случаях

Д. Нельзя

Е. Промывание пазухи растворами антисептиков, пластика соустья после ликвидации воспаления

1. Хирургическая тактика врача при перфорации верхнечелюстной пазухи во время удаления зуба на фоне острого гайморита (без наличия корня зуба в пазухе)

2. Метод удаления корня зуба, внедренного в верхнечелюстную пазуху

3. Можно ли тампонировать лунку йодоформным тампоном при перфорации дна верхнечелюстной пазухи

4. Наиболее благоприятные сроки для удаления корня зуба, внедренного в мягкие ткани во время удаления

А. А – 4, Б – 2, Д – 3, Е – 1

Б. А – 4, Б – 2, Д – 1, Е – 3

В. А – 4, Б – 3, Д – 2, Е – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Монокультура анаэробов

Б. Гиперкапния, аэрация тканей

В. Аэробы, факультативные и облигатные анаэробы

Г. Бактероиды, фузобактерии

Д. Монокультура стафилококка

Е. Кишечная палочка, протей

1. Бактерии, вызывающие гнойно – воспалительные процессы в челюстно - лицевой области

2. К облигатным неспорообразующим бактериям относятся

3. Условия не способствующие развитию бактериоидной инфекции

4. При нагноении лимфоузлов из гнойных очагов высеваются

5. Микроорганизмы, которые чаще всего высеваются при одонтогенных абсцессах

А. А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 2, Д – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 2, Д – 4

В. А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Комбинированный
 - Б. Открытый
 - В. Ожоговый шок
 - Г. Ожоговая септикотоксемия
 - Д. Ожоговая токсемия
 - 1. Первый период ожоговой болезни
 - 2. Второй период ожоговой болезни
 - 3. Третий период ожоговой болезни
 - 4. Наиболее частый метод лечения ожогов лица
- А. Б – 4, В – 1, Г – 2, Д – 3
Б. Б – 4, В – 3, Г – 1, Д – 2
В. Б – 4, В – 1, Г – 3, Д – 2

Компонент местнообезболивающего препарата, наиболее часто провоцирующий развитие аллергических реакций

- А. местный анестетик
- Б. вазоконстриктор
- В. бисульфит натрия
- Г. ЭДТА
- Д. натрия хлорид

ВЫДЕЛИТЕ СИМПТОМ, НЕ УКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ В КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ КОЛЛАПСА

- А. артериальная гипотония
- Б. бледные, холодные и влажные кожные покровы
- В. гипотонус
- Г. расширенный зрачок
- Д. двигательное беспокойство

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Деформация десневых сосочков
- Б. Некроз десневых сосочков
- В. Кровоточивость при зондировании десневых сосочков
- Г. Резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок
- Д. Наличие пародонтального кармана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Имеются дочерние кисты, которые необходимо удалить

Б. Причинный зуб подлежит обязательному удалению

В. Причинный зуб удаляют или резецируют верхушку корня

Г. Проводится оро – антральная цистэктомия

1. Особенность хирургического лечения (цистэктомия) радикулярных кист челюстей

2. Особенность хирургического лечения (цистэктомия) фолликулярных кист челюстей

3. Особенность хирургического лечения (цистэктомия) парадентальных кист

4. Особенность оперативного лечения эпидермоидных кист

А. А – 1, Б – 2, 3, В – 4

Б. А – 4, Б – 1, 3, В – 2

В. А – 4, Б – 2, 3, В – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Множество правильно сформированных спаянных между собой деформированных зубов

Б. Беспорядочно перемешанные ткани нескольких зубов

В. Ткани одного зуба

Г. Несколько зачатков зубов

1. Структура простой одонтомы

2. Структура сложной одонтомы

3. Структура смешанной одонтомы

4. Структура составной одонтомы

А. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3

В. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Коринфар, капотен

Б. Аминокапроновая кислота или памба

В. Ятрогенное

Г. Идиопатическое

Д. Рутин или аскорутин

Е. фитоменадион или дицинон

1. При гипопротромбинемии для остановки кровотечения назначают:

2. Кровотечение, возникшее после хирургического вмешательства

3. При повышении фибринолитической активности для остановки кровотечения назначают:

4. Для остановки кровотечения при повышенной проницаемости сосудов назначают:

5. Для остановки кровотечения при повышенном АД назначают:

А. А – 5, Б – 3, В – 2, Д – 4, Е – 1

Б. А – 5, Б – 3, В – 2, Д – 1, Е – 4

В. А – 5, Б – 2, В – 3, Д – 4, Е – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Заболевание:

А. Острый пульпит

Б. Пульпит хронический

В. Пульпит неуточненный

Г. Пульпит хронический язвенный Код по МКБ-10:

1. K04.09

2. K04.01

3. K04.03

4. K04.04

А. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Б. 1Г, 2В, 3А, 4Б

В. 1Г, 2А, 3В, 4Б

Укажите процентную концентрацию раствора лидокаина в аэрозоли, применяемого в стоматологической практике для аппликационной анестезии

А. 0.50%

Б. 2%

В. 3%

Г. 4%

Д. 10

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на нижней челюсти в области зубов проходит:

- А. не касается зубов;
- Б. перекрывая коронки зубов на 2/3
- В. в пришеечной области зубов;
- Г. перекрывая коронки зубов на 1/3;
- Д. посередине коронки зубов;

ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ У РЕБЕНКА ПОЛУТОРА ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Провести шинирование и оставить под наблюдение
- В. Репозировать
- Г. Депульпировать и репозировать
- Д. Удалить

При изготовлении металлокерамической коронки минимально допускаемая толщина металлического каркаса из неблагоприятных сплавов:

- А. 0,1 мм;
- Б. 0,2 мм;
- В. 0,25 мм;
- Г. 0,3 мм;
- Д. 0,5 мм.

БОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЕ АМБУЛАТОРНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БЕРЕМЕННЫХ

- А. в 1 триместре
- Б. в 1 и 2 триместрах
- В. во 2 триместре
- Г. во 2 и 3 триместрах
- Д. в 3 триместре

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Острое начало заболевания, боль при глотании, высокая температура тела воспалительная контрактура нижней челюсти, припухлость и болезненность поднижнечелюстных и подподбородочной областей
- Б. Острое начало, резкие боли, рот полуоткрыт, высокая температура, увеличение размеров и ограничение подвижности языка, затрудненное глотание и дыхание
- В. Наличие разрушенного моляра нижней челюсти, гиперемия кожи, отечность, болезненность и припухлость мягких тканей поднижнечелюстной области
- Г. Разлитая отечность мягких тканей щеки, сглаженность носогубной складки, болезненность открывания рта
- Д. Тромбофлебит угловой вены, острый гнойный гайморит или обострение хронического гайморита
- Е. Ограничение открывание рта, отечность и болезненность за бугром верхней челюсти, распирающая головная боль
1. Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны
 2. Клинические признаки флегмоны дна полости рта
 3. Клинические признаки флегмоны корня языка
 4. Типичные причины флегмоны глазницы
 5. Клинические признаки флегмоны щеки
 6. Клинические признаки флегмоны крылонебной ямки
- А. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6
- Б. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 6, Е – 4
- В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 6

Укажите формулу зуба, для лечения пульпита которого необходимо провести проводниковую анестезию с анестетиком на основе артикаина

- А. зуб 47
- Б. зуб 24
- В. зуб 35
- Г. зуб 41
- Д. зуб 32

Укажите местный анестетик группы сложных эфиров:

- А. лидокаин
- Б. прокаин (новокаин)
- В. артикаин
- Г. бупивакаин (маркаин)
- Д. мепивакаин (скандонест)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

Б. Стадия истощения секреторного образования и дистрофических изменений

В. Стадия липоматоза и фиброза

Г. Рентгенография мягких тканей дна полости рта

Д. Стадия гиперсекреции

1. Рентгенографическая проекция для выявления камня в переднем отделе выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы

2. Рентгенографическая проекция для выявления камня в паренхиме поднижнечелюстной слюнной железы

3. Начальная стадия сиалоза

4. Клинически выраженная стадия сиалоза

5. Поздняя стадия сиалоза

А. А – 4, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 3

Б. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3, Д – 1

В. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Решетчатой кости с разрывом слизистой оболочки

Б. Лобных отростков верхней челюсти и костей носа

В. Вниз

Г. Вниз и кнутри

1. Отломки при переломе скуловой дуги обычно смещаются:

2. В каком направлении возможна диплопия при значительном смещении отломков скуловой кости

3. Смещение костей носа у его основания указывает на перелом:

4. Подкожная крепитация при повреждении кости носа свидетельствует о переломе:

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. 5 % раствором сульфата меди

Б. 1 – 2 % раствором лимонной или уксусной кислоты

В. 2 – 3 % раствором гидрокарбоната натрия

Г. 20 % раствором сахара (глюкозы)

Д. 4 – 5 % раствором гидрокарбоната натрия

1. Химическую нейтрализацию кислот проводят:

2. Химическую нейтрализацию щелочей проводят:

3. Химическую нейтрализацию негашеной извести проводят:

4. Химическую нейтрализацию солей тяжелых металлов проводят

5. Химическую нейтрализацию фосфора проводят:

А. А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 3, Д – 4

Б. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 4, Д – 3

В. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Из эпителиального и мезенхимального компонентов

Б. Одонтогенная опухоль

В. Из эпителиальных тканей

Г. Порог развития зубных тканей

1. Амелобластома – это:

2. Одонтома – это:

3. Амелобластома развивается

4. Одонтома развивается

А. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Б. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1

В. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Не существует

Б. Хронический периодонтит

В. 1 – 3 и 8 – 9 месяцы

Г. 6 месяцев

Д. Период обострения

Е. 2 – 3 и 6 – 7 месяцы

1. Показание к плановому удалению зуба

2. Абсолютное противопоказание для удаления зуба

3. Сроки планового удаления зубов после инфаркта миокарда

4. Временное противопоказание к удалению зубов у беременных в следующие сроки

5. Временное противопоказание к удалению зубов при психических заболеваниях

А. А – 2, Б – 1, В – -, Г – 3, Д – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – -, Г – 5, Д – 3

В. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 2

ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А. Наследственность;

Б. Наличие микробного налета;

В. Вредные привычки;

Г. Подвижность зубов;

Д. Травма

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Шов, накладываемый на 15 – 30 сутки после операции с предварительным иссечением грануляции, рубцов и мобилизацией краев раны

Б. Шов, накладываемый на гнойную рану во время хирургической обработки, но заживаемый через 24 – 72 часа при стихании воспаления; или шов, накладываемый на 2 – 7 сутки после операции

В. Шов, накладываемый на рану непосредственно после вскрытия гнойного очага

Г. Шов, накладываемый на 8 – 14 сутки после операции без предварительного иссечения грануляции

1. Первичный шов

2. Первичный отсроченный шов

3. Вторичный ранний шов

4. Вторичный поздний шов

А. А – 2, Б – 4, В – 1, Г – 3

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3

В. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1

Укажите местный анестетик, используемый в стоматологии около 100 лет

А. бупивакаин

Б. мепивакаин

В. артикаин

Г. прокаин (новокаин)

Д. лидокаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Малые протоки подъязычной слюнной железы

Б. Проток околоушной слюнной железы

В. Проток поднижнечелюстной слюнной железы

Г. Общий проток подъязычной слюнной железы

1. Стенопов проток

2. Вартонов проток

3. Барталинов проток

4. Ривиниевы протоки

А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3

Б. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

В. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТИФТА ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ КОРНЯ СОСТАВЛЯЕТ

- А. 1/3
- Б. 1/2
- В. 2/3
- Г. Всю длину корня
- Д. Длина штифта не имеет значения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Болевой дисфункции
 - Б. Остром артрите
 - В. Артрозе
 - Г. Хроническом артрите
1. Костные структуры ВНЧС при рентгенологическом исследовании не изменены при:
 2. Склероз кортикальной пластинки суставной головки и бугорка наблюдается при:
 3. Наличие экзостозов на суставных поверхностях встречается при:
 4. Деформация суставной головки нижней челюсти наблюдается при:
 5. Уплотнение суставного бугорка происходит при:
- А. А – 1, Б – 1, В – 2, 3, 4, 5
 - Б. А – 1, Б – 2, В – 3, 4, 5
 - В. А – 1, Б – 1, 5, В – 2, 3, 4

Местноанестезирующий препарат, не оказывающий значительного влияния на сосуды:

- А. лидокаин
- Б. артикаин
- В. прокаин (новокаин)
- Г. мепивакаин
- Д. бупивакаинSd

Укажите группу зубов, для депульпирования которых инфильтрационной анестезии обычно недостаточно

- А. резцы и клыки верхней челюсти
- Б. резцы и клыки нижней челюсти
- В. премоляры верхней и нижней челюсти
- Г. моляры верхней челюстей
- Д. моляры нижней челюсти.

Артикаин можно использовать у детей с

- А. 6 месяцев
- Б. 1 года
- В. 2 лет
- Г. 4 лет
- Д. 5 лет

Препарат, используемый для всех видов местной анестезии:

- А. мепивакаин
- Б. лидокаин
- В. бензокаин (анестезин)
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. артикаин

УКАЗАТЬ ОШИБКИ ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

- А. Нависающий край пломбы
- Б. Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба
- В. Химический ожог пульпы зуба
- Г. Хроническое воспаление десневого края
- Д. Отсутствие контактного пункта

ИНИЦИАТОРОМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА СВЕТООВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Камфорохинон
- Б. Пероксид бензоила
- В. Ароматические амины
- Г. Пероксид бензоила и ароматические амины
- Д. Камфорохинон и ароматические амины

УКАЗАТЬ ОШИБКИ ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

- А. Отлом истонченной стенки коронковой части зуба
- Б. Неполное удаление инфицированного дентина, химический ожог пульпы зуба
- В. Нависающий край пломбы, отсутствие контактного пункта
- Г. Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба
- Д. Десневое кровотечение

В МИКРОНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТАХ РАЗМЕР ЧАСТИЦ НАПОЛНИТЕЛЯ (МКМ):

- А. 1 - 100
- Б. 50
- В. более 1
- Г. 1
- Д. менее 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Рассечение зуба на две части в области бифуркации с последующим сглаживанием нависающих краев, проведение кюретажа, покрытие коронкой

Б. Удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба

В. Удаление корня вместе с прилежащей коронковой частью

Г. Пересадка удаленного зуба в другую альвеолу

Д. Пересадка удаленного зуба в его же альвеолу

1. Аутоотрансплантация зуба

2. Гемисекция зуба

3. Ампутация корня

4. Коронаро – радикулярная сепарация

5. Реплантация зуба

А. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1, Д – 5

Б. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 5

В. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Расширение и сужение протока

Б. Сужение протоков на всем протяжении

В. «Гроздь винограда»

Г. «Чернильное пятно»

Д. Без изменений

1. Сиалографический признак разрастания в паренхиме слюнной железы соединительной ткани

2. Сиалографический признак наличия поражения протока слюнной железы

3. Сиалографический признак лимфогенного паротита характеризуется скоплением контраста в виде:

4. Сиалографический признак паренхиматозного паротита характеризуется скоплением контраста в виде:

5. Сиалограмма ложного паротита Герценберга

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 3

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 5

Высшая (максимально допустимая) разовая доза лидокаина:

- А. 2,2 мг/кг
- Б. 4,4 мг/кг
- В. 5,0 мг/кг
- Г. 6 мг/кг
- Д. 7 мг/кг

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Жалобы:

А. Незначительные болевые ощущения при накусывании на зуб
Б. Постоянные, постепенно нарастающие боли, «симптом выросшего зуба», болезненное накусывание на зуб

В. Постоянные ноющие, пульсирующие боли, болезненность при накусывании

Г. Часто протекает бессимптомно

- Заболевание:**
1. Острый апикальный периодонтит
 2. Хронический апикальный периодонтит
 3. Корневая киста
 4. Периапикальный абсцесс без свища

- А. 1Б, 2А, 3В, 4Г
- Б. 1Б, 2А, 3Г, 4В
- В. 1Б, 2В, 3Г, 4А

К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА ОТНОСЯТ

- А. Болезнь Боуэна
- Б. Болезнь Боуэна и пигментную ксеродермию;
- В. Болезнь Боуэна, актинический кератоз, предраковый меланоз
- Г. Болезнь Боуэна, бородавчатый (узелковый) предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз;
- Д. Болезнь Боуэна, абразивный хейлит Манганотти.

ПРИ КЛИНИКЕ ОСТРОГО ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- А. Диабет
- Б. Заболевания крови
- В. Гастрит
- Г. Язвенную болезнь желудка
- Д. Острый панкреатит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Мази с НПВС

Б. Противовоспалительные болеутоляющие антигистаминные

В. Иммуномодуляторы

Г. До снятия острых воспалительных явлений

Д. После снятия острых воспалительных явлений

Е. Бишофит, медицинская желчь

1. Ортопедическое лечение при артритах проводится:

2. Препараты, применяемые для лечения острой фазы артрита ВНЧС

3. Препараты для местного лечения артритов в хронической фазе

4. Препараты для местного лечения артритов в острой фазе

А. А – 4, Б – 1, Д – 2, Е – 3

Б. А – 4, Б – 2, Д – 1, Е – 3

В. А – 4, Б – 2, Д – 3, Е – 1

Дифференциальную диагностику бессимптомного течения кариеса дентина проводят с

А. Кариесом эмали

Б. Хроническим пульпитом

В. Деструктивной формой флюороза

Г. Хроническим периодонтитом

Период «физиологического покоя» для корней временных зубов длится _____ года

А. 2,5-3

Б. 3,5-4

В. 1-1,5

Г. 1,5-2

Ребенку 6 лет рекомендуется использовать зубную пасту с концентрацией фторидов (в ppm)

А. 500

Б. 2500-5000

В. 1000

Г. 100-200

Основным учетным документом является

А. История болезни

Б. Листок нетрудоспособности

В. Контрольная карта диспансерного наблюдения

Г. Амбулаторная карта

К анестетикам длительного действия (6-12 часов) следует отнести

- А. Прокаин
- Б. Анестезин
- В. Бупивакаин
- Г. Мепивакаин

Метод хирургического лечения пародонтита при глубине пародонтального кармана до 5 мм включает в себя

- А. Гингивозктомию
- Б. Лоскутную операцию
- В. Гингивотомию
- Г. Открытый кюретаж

Пластмассовая рамка системы коффердама по сравнению с металлической дает преимущество

- А. Снижает вероятность возникновения аллергии
- Б. Более плотно прилегает к коже лица
- В. Не видна на снимке при проведении рентгенологического обследования
- Г. Более долговечна

Нистатин для лечения кандидоза у детей назначают из расчета в суточной дозе _____ на 1 кг массы тела (в ед.)

- А. 100000
- Б. 250000
- В. 150000
- Г. 50000

Гингивит - это заболевание

- А. Инфекционное
- Б. Дистрофическое
- В. Опухолевидное
- Г. Воспалительное

Детям старше 3 лет для профилактики кариеса рекомендуют зубные пасты

- А. Лечебно-профилактические с растительными добавками
- Б. Лечебно-профилактические с фтором
- В. Лечебно-профилактические с антисептиками
- Г. Гигиенические

Воспаление маргинальной десны по индексу рма оценивают кодом

- А. 1
- Б. 3
- В. 2
- Г. 4

К пассивным формам стоматологического просвещения относят

- А. Беседы с пациентом на стоматологическом приеме
- Б. Лекции по профилактике стоматологических заболеваний с последующей дискуссией
- В. Занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
- Г. Телевизионную рекламу

При методе профилактического пломбирования в постоянных зубах со зрелой эмалью применяются

- А. Силикофосфатный цемент и амальгама
- Б. Стеклоиономерный цемент и силикофосфатный цемент
- В. Композиционные герметики и жидкотекучие композиты
- Г. Компомеры и фосфатный цемент

Элементом поражения при хейлите манганотти является

- А. Рубец
- Б. Трещина
- В. Чешуйка
- Г. Эрозия

Для клинического отбеливания используют перекись карбамида в концентрации

- А. 5-7
- Б. 25-30
- В. 35-40
- Г. 10-12

При внешнем осмотре больных с декомпенсированной формой 3 степени повышенного стирания зубов выявляется

- А. «Птичье лицо»
- Б. Ассиметрия лица
- В. Старческое выражение лица
- Г. Сглаженность носогубных складок

Подвижность зубов оценивают при помощи

- А. Рентгенодиагностики
- Б. Периотестметрии
- В. Реопародонтографии
- Г. Гнатодинамометрии

При препарировании под керамическую вкладку создание сколов эмали и тонких участков

- А. Показано только в области моляров
- Б. Зависит от клинической ситуации
- В. Противопоказано
- Г. Показано только в пределах эмали

Борта и дно стандартной оттисковой ложки должны стоять от зубов на (в мм)

- А. 3-5
- Б. 1-2
- В. 5-7
- Г. 6-9

Под кистой челюсти понимают

- А. Опухолеподобное образование
- Б. Стадию развития инфильтрата
- В. Соединительнотканную опухоль
- Г. Опухоль из зубообразующего эпителия

Нежелательным действием новокаина является

- А. Эйфория
- Б. Повышение артериального давления
- В. Понижение артериального давления
- Г. Пристрастие

К показателям объема работы поликлиники относится число

- А. Врачей на 10000 жителей
- Б. Посещений жителей на одного врача
- В. Врачебных посещений на 1 жителя
- Г. Посещений жителей за год

Заболевание слюнных желез, сопровождающееся явлениями блефароконъюнктивита и снижением секреции слезных желез (ксерофтальмия), относят к

- А. Хроническому паренхиматозному паротиту
- Б. Хроническому сиалодохиту
- В. Синдрому Шегрена
- Г. Слюннокаменной болезни

Превращение преамелобластов в амелобласты инициируется

- А. Образованием дентина
- Б. Образованием эмали
- В. Образованием связки периодонта
- Г. Вращением зубного сосочка в эпителиальный тяж

К участникам обязательного медицинского страхования относят

- А. Врачей
- Б. Главных врачей
- В. Средний медицинский персонал
- Г. Страховые медицинские организации

Профилактике клиновидного дефекта способствует

- А. Применение фторидсодержащих зубных паст
- Б. Обучение техники чистки зубов
- В. Полоскание рта антисептическими растворами
- Г. Замена источника водоснабжения

К противопоказаниям к проведению интравидеомануальной анестезии относят

- А. Детский возраст
- Б. Непереносимость лидокаина
- В. Наличие в анамнезе эндокардита
- Г. Наличие страха перед вмешательством

Основным направлением первичной профилактики стоматологических заболеваний является комплекс мер, направленных на

- А. Предупреждение осложнений возникшего заболевания
- Б. Предупреждение их возникновения
- В. Профилактику зубочелюстных аномалий
- Г. Восстановление анатомической и функциональной целостности зубочелюстной системы

При хирургическом лечении рецессии десны i и ii классов (р. D. Miller) _____ закрытие поверхности корня _____

- А. Возможно; на 50%
- Б. Невозможно
- В. Невозможно; на 100%
- Г. Возможно; на 100%

Рабочая поверхность столов для стерильного инструментария протирается специальной ветошью, смоченной раствором хлорамина (в процентах)

- А. 1
- Б. 5
- В. 0,5
- Г. 1,5

Воздушно-абразивный метод удаления зубных отложений противопоказан пациентам с

- А. Бронхиальной астмой
- Б. Артериальной гипертензией
- В. Кардиостимулятором
- Г. Сахарным диабетом

С целью контроля пломбирования корневого канала рентгенологическое исследование проводится с

- А. Произвольно зафиксированным гуттаперчевым штифтом
- Б. Внесённым в корневой канал силером
- В. Зафиксированными на рабочую длину мастер-штифтом с силером
- Г. Зафиксированными на рабочую длину мастер-штифтом без силеров

Требованием к лечебным подкладочным материалам является

- А. Длительное время твердения
- Б. Короткое время замешивания
- В. Обладание одонтотропным действием
- Г. Обладание анестезирующим действием

Конструкция кламмера джексона представляет собой

- А. Кламмер, имеющий две окклюзионные накладки, расположенные в смежных фиссурах моляров или премоляров и по два плеча с каждой стороны на каждом зубе
- Б. Кламмер, имеющий пружинящие Т-образные отростки, отходящие от каркаса протеза и располагающиеся с обеих сторон опорного зуба
- В. Опорно-удерживающий кламмер в виде петли, перекидываемой через межзубные промежутки на вестибулярную поверхность зуба, где она располагается ниже экватора
- Г. Отростки базиса протеза, прилегающие к зубам ниже экватора с вестибулярной стороны

При проведении электроодонтодиагностики больного зуба целесообразно начать измерение с

- А. Антагониста
- Б. Такого же зуба на противоположной стороне зубной дуги
- В. Любого другого зуба
- Г. Причинного зуба

Электровозбудимость пульпы при хроническом гангренозном пульпите (в мка)

- А. 100-200
- Б. 30-60
- В. 60-90
- Г. 15-25

К недостаткам цельнолитых коронок относится

- А. Высокая прочность
- Б. Плотное прилегание в пришеечной части зуба
- В. Отсутствие эстетичности
- Г. Точное воспроизведение рельефа анатомической формы зуба

К зубам, чаще поражаемым системной гипоплазией эмали, относятся

- А. Молочные резцы
- Б. Молочные моляры
- В. Постоянные резцы, клыки и первые моляры
- Г. Постоянные премоляры

Рентгенологическим признаком ушиба постоянного зуба в первые 2-3 дня после травмы является

- А. Расширение периодонтальной щели у верхушки зуба
- Б. Отсутствие периодонтальной щели у верхушки зуба
- В. Равномерное расширение периодонтальной щели
- Г. Отсутствие изменений на рентгенограмме

Зоной гранулемы, характеризующейся активностью остеобластов и фибробластов, является зона

- А. Стимуляции
- Б. Контаминации
- В. Распада и деминерализации
- Г. Некроза

К деформации окклюзионной поверхности зубных рядов приводит

- А. Наличие множественных клиновидных дефектов
- Б. Плоский лишай
- В. Генерализованный катаральный гингивит
- Г. Повышенная стираемость твердых тканей зубов

Стоматологическое просвещение для беременных женщин включает

- А. Беседы о гигиене полости рта
- Б. Беседы по гигиене жилища
- В. Лекции о функции слюнных желез
- Г. Обучение навыкам снятия зубного камня

При эпидемическом паротите поражается

- А. Стенонов проток
- Б. Строма
- В. Паренхима
- Г. Протоки II и III порядков

Воспаление межзубной и маргинальной десны характерно для _____ степени

- А. Пародонтита легкой
- Б. Пародонтита средней
- В. Пародонтоза тяжелой
- Г. Пародонтита тяжелой

К причине эндемического флюороза относят

- А. Системные заболевания матери в период беременности
- Б. Инфекционное заболевание ребенка на первом году жизни
- В. Повышенное содержание фторида в питьевой воде
- Г. Недостаток фтора в организме ребенка

Данные электроодонтодиагностики при кариесе дентина составляют (в мка)

- А. 25–30
- Б. 2–6
- В. 10–12
- Г. 100

Полость ретенционной кисты слюнной железы заполнена

- А. Кристаллами холестерина
- Б. Холестеатомными массами
- В. Детритом
- Г. Слюной

Главной целью создания эндодонтического доступа является

- А. Локализовать устья каналов и обеспечить прямолинейный доступ к каналам
- Б. Расширить кариозную полость и провести экстирпацию пульпы
- В. Провести ампутацию коронковой пульпы и локализовать устья каналов
- Г. Расширить кариозную полость и провести ампутацию пульпы

Риск развития рецессии максимальный при ширине кератинизированной десны (в мм)

- А. Менее 10
- Б. Более 2
- В. Менее 5
- Г. Менее 2

Гипосаливация способствует развитию

- А. Стираемости эмали
- Б. Эрозии
- В. Кариеса
- Г. Флюороза

Ключевой возрастной группой для оценки состояния постоянных зубов в популяции является возраст (в годах)

- А. 15
- Б. 35-44
- В. 12
- Г. 6

Местным анестетиком, не оказывающим сосудорасширяющее действие, является

- А. Лидокаин
- Б. Прокаин
- В. Мепивакаин
- Г. Артикаин

Метод «серебрения» применяют при лечении

- А. Начальных форм кариеса постоянных зубов
- Б. Хронического фиброзного пульпита
- В. Начальных форм кариеса временных зубов
- Г. Хронического гранулирующего периодонтита

Для изготовления металлокерамической коронки используется модель из

- А. Супергипса
- Б. Плотной пластмассы
- В. Обычного гипса
- Г. Легкоплавкого металла

Способом повышения эффективности реминерализирующей терапии является

- А. Увлажнение поверхности зуба
- Б. Использование электрофореза
- В. Использование антисептиков
- Г. Использование кариес-маркера

Первая степень вертикального зубоальвеолярного удлинения характеризуется смещением зуба

- А. В пределах жевательных бугорков
- Б. От 1/3 до 1/2 высоты клинической коронки
- В. Оголением шейки зуба
- Г. Более 1/2 высоты клинической коронки

Развитию ретенционных кист малых слюнных желез способствует

- А. Сужение протоков и гипертрофия паренхимы
- Б. Расширение протоков
- В. Расширение протоков и гипертрофия паренхимы
- Г. Сужение протоков и атрофия паренхимы

Гипсовые модели по оттискам из альгинатных материалов следует отливать после выведения последних изо рта не позднее чем через (в часах)

- А. 6
- Б. 12
- В. 1
- Г. 3

Нистатин для лечения кандидоза у детей назначают из расчета в суточной дозе _____

ед. На 1 кг массы тела

- А. 250000
- Б. 50000
- В. 100000
- Г. 150000

Эритроцитарная порфирия вызывает флюоресцирующее свечение

- А. Белое
- Б. Голубое
- В. Зеленое
- Г. Красное

Искусственные коронки классифицируют по

- А. Методу окрашивания
- Б. Оклюзионным контактам
- В. Групповой принадлежности зуба
- Г. Технологии изготовления

Эрозия зубов является

- А. Эндемическим заболеванием, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде
- Б. Нарушением эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и постоянных зубов
- В. Прогрессирующей убылью тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии
- Г. Пороком развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей

Для определения тяжести пародонтита необходимо провести

- А. Компьютерную томографию
- Б. Ультразвуковое исследование
- В. Магнитно-резонансное исследование
- Г. Рентгенологическое исследование

От сдавления дыхательной трубки наступает _____ асфиксия

- А. Дислокационная
- Б. Аспирационная
- В. Клапанная
- Г. Стенотическая

Для стимуляции эпителизации эрозий при лечении острого герпетического стоматита рекомендуются аппликации

- А. Кератопластиков
- Б. Антиоксидантов
- В. Протеолитических ферментов
- Г. Антибиотиков

Наиболее тяжелая форма системной гипоплазии эмали

- А. Аплазия
- Б. Чашеобразная
- В. Пятнистая
- Г. Бороздчатая

Зубные пасты со средним показателем абразивности следует применять

- А. 2-3 Раза в месяц
- Б. Ежедневно, 2 раза в день
- В. Ежедневно, 1 раз в день
- Г. 1-2 Раза в неделю

Краевая рецессия тканей? Пародонта по миллеру при пародонтозе тяжелой? Степени соответствует ____ классу

- А. 2
- Б. 1
- В. 4
- Г. 3

Травматическую язву дифференцируют с

- А. Глоссалгией
- Б. Раковой язвой
- В. Аллергическим стоматитом
- Г. Многоформной экссудативной эритемой

Одним из критериев оценки индекса ohi-s является

- А. Степень кровоточивости десен
- Б. Уровень зубного налета
- В. Нуждаемость в лечении заболеваний пародонта
- Г. Уровень гигиены рта

Второй этап имплантации на верхней челюсти проводится через

- А. 6 Недель
- Б. 3 Месяца
- В. 6 Месяцев
- Г. 3 Недели

Для снижения риска перфорации искривленного канала необходимо

- А. Применить препарат ЭДТА
- Б. Применить вращающиеся инструменты
- В. Изогнуть К-ример по кривизне канала
- Г. Отказаться от обработки канала

После наложения мышьяковистой пасты кариозную полость закрывают

- А. Дентин-пастой
- Б. Фосфат-цементом
- В. Цинкоксидэвгеноловой пастой
- Г. Искусственным дентином (водным)

Обнажение поверхности корня зуба проявляется _____ зубов

- А. На контактной поверхности
- Б. Только на вестибулярной поверхности
- В. Только на оральной поверхности
- Г. Как на вестибулярной, так и на оральной поверхностях

При переломе коронки в пределах эмали проводится

- А. Сошлифовывание острых краев дефекта
- Б. Изготовление керамического винира
- В. Покрытие зуба защитной ортодонтической коронкой
- Г. Восстановление дефекта композитным материалом

При неправильном положении третьего моляра и перикороните проводят

- А. Удаление зуба
- Б. Иссечение капюшона
- В. Секвестрэктомию
- Г. Апликации лидокаина

Наиболее характерным видом травмы для детей в возрасте 4 - 5 лет является

- А. Перелом зуба
- Б. Вывих зуба
- В. Перелом нижней челюсти
- Г. Вывих височно-нижнечелюстного сустава

Подготовка моделей при изготовлении имедиат-протезов включает

- А. Дублирование модели
- Б. Параллелометрию
- В. Срезание зубов
- Г. Изготовление коронок

К недостаткам эластичных акриловых материалов для двухслойных базисов относят

- А. Длительное сохранение эластичности
- Б. Химическое соединение с жестким акриловым базисом протеза
- В. Высокую степень твердости
- Г. Усадку

Все молочные зубы должны прорезаться к _____ (в годах)

- А. 1,5
- Б. 2,5
- В. 3,5
- Г. 4,5

Причиной возникновения диплопии при переломе скуловой кости является

- А. Травма зрительного нерва
- Б. Смещение глазного яблока
- В. Травма глазного яблока
- Г. Воспалительная реакция

Эрозивная форма флюороза характеризуется

- А. Темно-коричневыми пятнами, обширными и глубокими дефектами эмали
- Б. Хорошо очерченными пигментированными пятнами и крапинками на фоне матовой эмали
- В. Небольшими меловидными полосками-штрихами
- Г. Хорошо выраженными меловидными пятнами без полосок

Возникновение односторонней припухлости в подчелюстной области, связанное с приемом пищи, может быть симптомом

- А. Лимфаденита
- Б. Плеоморфной аденомы
- В. Слюнно-каменной болезни
- Г. Сиалоза

Металлом, который вводят в золотой сплав для снижения температуры плавления, является

- А. Медь
- Б. Кобальт
- В. Кадмий
- Г. Серебро

Фактором, способствующим возникновению хейлита манганотти является

- А. Пониженная саливация
- Б. Бактериальная инфекция
- В. Инсоляция
- Г. Стресс

Для профилактики гиперчувствительности зубов после профессионального отбеливания проводят

- А. Профессиональную гигиену полости рта
- Б. Мотивацию пациента к отказу от курения
- В. Полоскание раствором хлоргексидина
- Г. Аппликации кальцийсодержащими средствами

Ориентиром расположения пришеечной части фронтальной группы искусственных зубов в съёмном пластиночном протезе является

- А. Линия улыбки
- Б. Перегородка носа
- В. Филтрум верхней губы
- Г. Уздечка верхней губы

Наиболее предпочтительное применение экстратолстых типов резиновых экранов системы коффердама

- А. Для изоляции зубов любой групповой принадлежности
- Б. При изоляции зубов в плотном контакте
- В. При повышенной ретракции мягких тканей
- Г. Для изоляции третьих моляров

При нетрудоспособности, возникшей вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения, выдаётся

- А. Выписной эпикриз
- Б. Справка о нетрудоспособности
- В. Листок нетрудоспособности с кодом 021
- Г. Справка произвольной формы

Белая матовая шероховатая поверхность эмали характерна для

- А. Начального кариеса в стадии стабилизации
- Б. Флюороза слабой степени тяжести
- В. Флюороза умеренной степени тяжести
- Г. Начального кариеса в активной стадии

Методика ВОЗ предусматривает стоматологическое обследование детей в возрасте (лет)

- А. 6, 12, 15
- Б. 2, 8, 16
- В. 3, 9, 14
- Г. 1, 5, 10

Для холодной стерилизации стоматологических зеркал используют ____%_____

- А. 6; Раствор перекиси водорода
- Б. 0,5; Раствор хлорамина
- В. 1; Раствор перекиси водорода
- Г. 75; Метиловый спирт

Основное вещество пульпы представлено

- А. Мукопротеинами
- Б. Протеогликанами
- В. Мукополисахаридами
- Г. Гликопротеинами

Глубина поражения твердых тканей зубов при II степени повышенного стирания составляет

- А. До 1/3 длины коронки
- Б. От 2/3 длины коронки до шейки и более
- В. От 1/3 до 2/3 длины коронки
- Г. От 1/3 до 1/2 длины коронки

Устье вартонова протока располагается в

- А. Челюстно-язычном желобке
- Б. Ретромолярном пространстве
- В. Верхнем своде преддверия рта
- Г. Области подъязычного сосочка

Для проводниковой мандибулярной анестезии применяют карпульную иглу ____ g ____ мм

- А. 27; 35
- Б. 30; 25
- В. 30; 35
- Г. 27; 25

Лунка зуба после удаления заживает

- А. Вторичным натяжением
- Б. Под струпом
- В. Третичным натяжением
- Г. Первичным натяжением

Минимальное расстояние от платформы имплантата до зуба составляет ____ мм

- А. 2
- Б. 1,5
- В. 0,5
- Г. 1

Резекцию верхушки корня проводят

- А. Фиссурным бором
- Б. Шаровидным бором
- В. Сепарационным диском
- Г. Долотом

Длительность болевого приступа при остром пульпите составляет (в минутах)

- А. 60-90
- Б. 30-60
- В. 10-30
- Г. Более 90

В хирургической стоматологии наиболее часто применяют

- А. Томографию
- Б. Рентгеноскопию
- В. Панорамную рентгенографию
- Г. Внутриротовую рентгенографию

Самым неблагоприятным для прогрессирования рецессии является _____ тип слизистой

- А. Тонкий
- Б. Толстый
- В. Гипертрофированный
- Г. Смешанный

Оттискным материалом, относящимся к альгинатным, является

- А. Сиэласт
- Б. Репин
- В. Гипс
- Г. Упин

Эндодонтическим инструментом для прохождения корневого канала является

- А. Спредер
- Б. Пульпэкстрактор
- В. К-файл
- Г. Н-файл (бурав Хедстрема)

При частоте дыхательных движений у пациента перед плановым стоматологическим вмешательством более 28 в минуту, сопровождающихся кашлем и хрипами, врач должен

- А. Провести плановое лечение
- Б. Отложить лечение на другой день
- В. Провести профессиональную гигиену
- Г. Отложить лечение и направить пациента на обследование к терапевту

Раскрытие полости зуба в премолярах верхней челюсти проводится в направлении

- А. Медиально-дистальном
- Б. По оси зуба
- В. Вестибуло-оральном
- Г. Вестибуло-дистальном

Под обращаемостью понимают

- А. Отношение числа всех посещений больными амбулаторно-поликлинического учреждения к общему числу обслуживаемого населения
- Б. Соотношение числа всех первичных посещений по поводу болезни к общему числу обслуживаемого населения
- В. Число больных, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу заболевания
- Г. Абсолютное число всех первичных и повторных посещений больными медицинской организации

После лабораторного этапа «изготовление каркаса металлокерамической коронки» следующий клинический этап

- А. Определение центрального соотношения челюстей
- Б. Определение центральной окклюзии
- В. Припасовка каркаса в полости рта
- Г. Повторное получение оттисков

Для оценки состояния пульпы зуба после травмы применяют

- А. Одонтопародонтограмму
- Б. Термо- и электроодонтодиагностику (ЭОД)
- В. Электрофорез
- Г. Криодеструкцию

Для обработки слизистой оболочки рта у детей до 6 месяцев при кандидозе используют

- А. Йода раствор
- Б. Гексорал спрей
- В. Буры в глицерине раствор
- Г. Бриллиантового зеленого раствор

При гипертрофическом гингивите для склерозирующей терапии применяют ____% раствор ____

- А. 3; H_2O_2
- Б. 40; Формалина
- В. 30; Трихлоруксусной кислоты
- Г. 30; $AgNO_3$

Для изготовления вкладок применяется сплав золота ____ пробы

- А. 750
- Б. 583
- В. 586
- Г. 900

Детям школьного возраста рекомендуется использовать зубные пасты с концентрацией фторидов (ppm)

- А. 100-200
- Б. 1000-1450
- В. 500-1000
- Г. 2500-5000

Желто-коричневое окрашивание десны при проведении пробы шиллера –писарева обусловлено наличием в эпителии десны

- А. Гепарина
- Б. Брадикинина
- В. Гистамина
- Г. Гликогена

К iii классу в соответствии с классификацией (р. D. Miller) относят рецессию десны

- А. Выходящую за пределы прикрепленной десны, сочетающуюся с атрофией (резорбцией) кости межальвеолярных перегородок
- Б. В пределах свободной десны
- В. Выходящую за пределы прикрепленной десны, без потери костной ткани
- Г. В пределах прикрепленной десны

К инициатору полимеризации материала светового отверждения относят

- А. Ароматические амины
- Б. Пероксид бензоила
- В. Камфорахинон
- Г. Пероксид бензоила и ароматические амины

Основной причиной развития воспалительных заболеваний пародонта считают

- А. Наследственность
- Б. Подвижность зубов
- В. Микробный налет
- Г. Вредные привычки

Окклюдатор – аппарат, воспроизводящий

- А. Движения нижней челюсти вперед
- Б. Все движения нижней челюсти
- В. Смыкание и размыкание челюстей
- Г. Движения нижней челюсти назад