

Тесты с вопросами по специальности «Стоматология общей практики» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog-praktik/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Стоматология общей практики» для аккредитации и других экзаменов (3600 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/o_stomatolog/

2) Тесты для аккредитации «Стоматология терапевтическая» (2700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_terapevt/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

ПРИКУС-ЭТО ВИД СМЫКАНИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ В ПОЛОЖЕНИИ ОККЛЮЗИИ:

- А. Центральной
- Б. Боковой левой
- В. Передней
- Г. Дистальной
- Д. Боковой правой

ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ВРЕМЕННЫХ РЕЗЦОВ СО СФОРМИРОВАННЫМИ КОРНЯМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Удалить
- В. Зубы трепанировать, запломбировать за верхушки корней
- Г. Зубы трепанировать, запломбировать до верхушек корней
- Д. Репозиция зубов, их фиксация, наблюдение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. 10 лет
 - Б. 6 лет
 - В. Чрезмерно развитая пазуха, распространяющаяся даже в отростке верхнечелюстной кости
 - Г. Малые размеры верхнечелюстной пазухи
 - Д. Боль, чувство тяжести, давления и напряжения в соответствующей половине лица
 - Е. Выделение гноя или слизи из соответствующей половины носа
1. Наиболее частые симптомы острого гайморита
 2. Возраст ребенка, при котором размеры верхнечелюстной пазухи приближаются к таковым взрослого человека
 3. Возраст ребенка, при котором нижняя стенка верхнечелюстной пазухи находится на одном уровне с дном полости носа
 4. Пневматический тип верхнечелюстной пазухи
 5. Возраст ребенка, когда нижняя граница верхнечелюстной пазухи лежит ниже уровня дна полости носа
- А. А – 5, Б – 2, В – 3,4, Д – 1
 - Б. А – 5, Б – 2, 3, В – 1, Д – 4
 - В. А – 5, Б – 2, 3, В – 4, Д – 1

При изготовлении металлокерамической коронки чрезмерное укорочение культи зуба может привести к:

- А. нарушению эстетики;
- Б. функциональным нарушениям;
- В. сколу керамики;
- Г. расцементировки коронки;
- Д. травме десны.

Компонент местнообезболивающего препарата, наиболее часто провоцирующий развитие аллергических реакций

- А. местный анестетик
- Б. вазоконстриктор
- В. бисульфит натрия
- Г. ЭДТА
- Д. натрия хлорид

ПРИСТУП СТЕНОКАРДИИ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ДЛИТСЯ

- А. 10 – 30 с
- Б. 30 – 60 с
- В. 1 - 5 мин
- Г. 5 -10 мин
- Д. 10 – 20 мин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Описание

- А.Ткани зуба имеют разные цвета при различных условиях освещения
 - Б.Способность материалов приобретать вид окружающих тканей, сливаться с ними
 - В.Способность эмали при естественном освещении испускать бледное мерцание
 - Г.Способность зубов поглощать волны ультрафиолетового диапазона и испускать видимый, синеватый свет
- Оптические характеристики зубных тканей и композитов**
- 1.Опалесценция
 - 2.Флуоресценция
 - 3.Метамерия
 - 4.Эффект хамелеона
- А. 1Г, 2В, 3А, 4Б
 - Б. 1В, 2А, 3Б, 4Г
 - В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМОСТЬ ПУЛЬПЫ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ

- А. Возрастает
- Б. Остается без изменений
- В. Снижается
- Г. Колеблется
- Д. Не определяется

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на нижней челюсти в области зубов проходит:

- А. не касается зубов
- Б. перекрывая коронки зубов на 2/3
- В. в пришеечной области зубов
- Г. перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. посередине коронки зубов

ПРИЗНАКИ ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ

- А. Усиление воспаления в окружности язвы
- Б. Уменьшение воспаления в окружности язвы
- В. Уплотнение краев и основания язвы
- Г. Усиление боли
- Д. Уменьшение боли

МЕСТОМ ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ ПРИ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИЦЕВОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧКА В ОБЛАСТИ

- А. Ветви нижней челюсти впереди козелка уха соответствующей стороны
- Б. Основания нижней челюсти соответственно подбородочному отверстию
- В. VII шейного позвонка
- Г. Края нижней челюсти впереди жевательной мышцы
- Д. Переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышц

ИНТЕРГЛОБУЛЯРНЫЙ ДЕНТИН - ЭТО:

- А. Основное вещество между дентинными слоями
- Б. Часть дентина, прилегающая к полости зуба
- В. Отложения дентина в течении жизни человека
- Г. Дентин, образующийся при патологии твердых тканей зуба
- Д. Дентин, возникающий в процессе развития зуба

ТОННЕЛЬНОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА

- А. Резцах и клыках
- Б. Клыках и премолярах
- В. Премолярах и резцах
- Г. Молярах и премолярах
- Д. Молярах и резцах

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Расширение и сужение протока

Б. Сужение протоков на всем протяжении

В. «Гроздь винограда»

Г. «Чернильное пятно»

Д. Без изменений

1. Сиалографический признак разрастания в паренхиме слюнной железы соединительной ткани

2. Сиалографический признак наличия поражения протока слюнной железы

3. Сиалографический признак лимфогенного паротита характеризуется скоплением контраста в виде:

4. Сиалографический признак паренхиматозного паротита характеризуется скоплением контраста в виде:

5. Сиалограмма ложного паротита Герценберга

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 3

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 5

К физиологическим видам прикуса относятся:

А. глубокий;

Б. прогнатический;

В. бипрогнатический;

Г. перекрестный;

Д. открытый.

Укажите точку приложения действия местных анестетиков:

А. кора головного мозга

Б. таламус

В. лимбическая система

Г. чувствительные нервные окончания и проводники

Д. задние рога спинного мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. 8 – 10 месяцев

Б. 45 суток

В. 2 недели

Г. Конец первого месяца

1. Сроки появления остеоидных палочек на дне и стенках лунки после удаления зуба

2. Сроки начала заполнения лунки удаленного зуба мелкопетлистой губчатой костной тканью

3. Сроки окончания заполнения лунки удаленного зуба мелкопетлистой губчатой костной тканью

4. Сроки, при которых лунка рентгенологически не отличается от окружающей костной ткани при осложненном заживлении (альвеолите или остеомиелите)

А. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

Б. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

В. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2

В МИКРОНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТАХ РАЗМЕР ЧАСТИЦ НАПОЛНИТЕЛЯ (МКМ):

А. 1 - 100

Б. 50

В. более 1

Г. 1

Д. менее 1

При изготовлении металлопластмассовой коронки соединение пластмассы с литым каркасом осуществляется за счет:

А. химического соединения;

Б. формирования ретенционных пунктов с помощью "перл" (шариков);

В. образования окисной пленки;

Г. взаимной диффузии материалов;

Д. вырезания "окна" на вестибулярной поверхности коронки.

К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА ОТНОСЯТ

А. Болезнь Боуэна

Б. Болезнь Боуэна и пигментную ксеродермию

В. Болезнь Боуэна, актинический кератоз, предраковый меланоз

Г. Болезнь Боуэна, бородавчатый (узелковый) предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз

Д. Болезнь Боуэна, абразивный хейлит Манганотти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Разрезание кости позади коронки нижнего «зуба мудрости»

Б. Воспаление мягких тканей, окружающих коронку зуба при его неполном и затрудненном прорезывании

В. Ретенция «зубов мудрости»

Г. Задержка сроков прорезывания нормально сформированного постоянного зуба

Д. Неправильное положение в зубном ряду прорезывавшегося зуба или его аномальное положение в челюсти

1. Ретенция зуба

2. Дистопия зуба

3. Перикоронит

4. Полулуние Вассмунда

5. Одна из причин краевой гнездовой алопеции затылочной области

А. А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 1, Д – 2

В. А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2, Д – 1

Для починки съемного протеза на нижней челюсти при отломе удерживающего кламмера необходимо получить оттиск с:

А. нижней челюсти с протезом;

Б. двух челюстей без протеза;

В. нижней челюсти без протеза;

Г. верхней челюсти и оттиск с нижней челюсти с протезом;

Д. двух челюстей без протеза и с нижней челюсти с протезом.

Укажите формулу зуба, для лечения которого необходимо провести проводниковую анестезию с анестетиком на основе артикаина

А. зуб 3.6

Б. зуб 1.4

В. зуб 2.5

Г. зуб 4.2

Д. зуб 3.3

ЭКВИВАЛЕНТОМ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

А. тяжесть за грудиной

Б. дискомфорт

В. стеснение в груди

Г. длительная боль в области верхушки сердца

Д. чувство нехватки воздуха

РЕСТАВРАЦИЯ ПО МЕТОДИКЕ "ОТКРЫТОГО СЭНДВИЧА" - ЭТО:

- А. Контактный пункт выполнен СИЦ, окклюзионная поверхность - композитом
- Б. Перекрытие базовой подкладки из СИЦ композитом в области контактного пункта и с окклюзионной поверхности
- В. Нанесение СИЦ на слой низкомодульного композита
- Г. Контактный пункт выполнен композитом, окклюзионная поверхность - СИЦ
- Д. Окклюзионная поверхность - композит, контактный пункт - амальгама

ОСНОВНЫМ ПРИЧИННЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Курение
- Б. Сахарный диабет
- В. Пародонтопатогенная микрофлора
- Г. Сердечно-сосудистые заболевания
- Д. Подвижность зубов

ЭНДОДОНТ ВКЛЮЧАЕТ

- А. Пульпу и дентин
- Б. Пульпу зуба
- В. Пульпу зуба, периодонтальную связку,
- Г. Пульпу зуба, периодонтальную связку, альвеолу
- Д. Пульпу зуба, периодонтальную связку, альвеолу, десну

Местноанестезирующие средства, содержащие вазоконстриктор, противопоказаны пациентам, применяющим

- А. Антигистаминные
- Б. Анксиолитики
- В. Трициклические антидепрессанты
- Г. Неопиоидные анальгетики
- Д. Нестероидные противовоспалительные препараты

Оптимальное расположение кламмерной линии на нижней челюсти:

- А. диагональное;
- Б. сагиттальное;
- В. поперечное;
- Г. вестибуло-оральное;
- Д. точечное.

ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОТТИСК С:

- А. Нижней челюсти без протеза
- Б. Нижней челюсти с протезом
- В. Верхней челюсти и нижней челюсти без протеза
- Г. Нижней челюсти с протезом и верхней челюсти
- Д. Слепки снимать не нужно

КУРКОВЫЕ (ТРИГГЕРНЫЕ) ЗОНЫ ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЭТО УЧАСТКИ

- А. Гиперстезии
- Б. Гипостезии
- В. Раздражение которых провоцирует приступ боли
- Г. Парастезии
- Д. Анестезии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Свойства композитных материалов:

- А.Выделение фтора
- Б.Высокая эластичность
- В.Высокая прочность
- Г.Низкая полимеризационная усадка Группы композитных материалов:

- 1.Текущие
- 2.Гибридные
- 3.Наноккомпозиты
- 4.Компомеры

- А. 1Б, 2В, 3Г, 4А
- Б. 1В, 2Б, 3Г, 4А
- В. 1Б, 2Г, 3А, 4В

ДЛЯ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНО

- А. Сильные кратковременные приступообразные боли
- Б. Длительные ноющие боли
- В. Кратковременные парастезии
- Г. Длительные парастезии
- Д. Симптом Венсана

Укажите процентную концентрацию раствора лидокаина в аэрозоли, применяемого в стоматологической практике для аппликационной анестезии

- А. 0.5%
- Б. 2%
- В. 3%
- Г. 4%
- Д. 10%

ЭТОТ ПРЕПАРАТ СНИЖАЕТ ТОНУС СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ

- А. эуфиллин
- Б. диазепам
- В. кофеин
- Г. но-шпа
- Д. папаверин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Рентгенологическая картина:

А.Выраженные периапикальные деструктивные изменения костной ткани

Б.Участок разряжения костной ткани с четкими контурами более 5мм

В.Изменений не выявляется Заболевание:

1.Острый апикальный периодонтит

2.Хронический апикальный периодонтит

3.Радикулярная киста

4.Хронический пульпит

А. 1В, 2А, 3Б, 4В

Б. 1Б, 2А, 3В, 4В

В. 1В, 2А, 3Б, 4А

Наиболее высокую кардиотоксичность имеет

- А. мепивакаин
- Б. лидокаин
- В. бупивакаин
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. артикаин

Моделирование цельнолитой коронки производят на:

- А. гипсовом штампе
- Б. гипсовой модели
- В. разборной модели
- Г. огнеупорной модели
- Д. штампике из легкоплавкого металла

ПРИЗНАКАМИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. апноэ, асистолия, отсутствие зрачков. рефлекса
- Б. апноэ, асистолия, арефлексия
- В. апноэ, отсутствие роговичного рефлекса, отсутствие тонуса мышц
- Г. апноэ, отсутствие зрачкового рефлекса, отсутствие тонуса мышц
- Д. апноэ, асистолия, отсутствие коленного рефлекса

Оптимальное расположение кламмерной линии на верхней челюсти:

- А. сагиттальное
- Б. поперечное
- В. вестибуло–оральное
- Г. диагональное
- Д. точечное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Заболевание:

- А. Корневая киста остаточная
- Б. Периапикальный абсцесс без свища
- В. Корневая киста апикальная и боковая
- Г. Хронический апикальный периодонтит Код по МКБ-10:

1. K04.5

2. K04.80

3. K04.7

4. K04.81

А. 1Г, 2В, 3Б, 4А

Б. 1Г, 2А, 3Б, 4В

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВИНИРОВ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Низкий уровень гигиены полости рта
- Б. Депульпированные зубы
- В. Деминерализация после ортодонтического лечения
- Г. Диастема шириной 1 мм
- Д. Наличие старых, изменивших цвет, пломб

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Жалобы:

- А. Зуб ранее сильно болел, в настоящее время боль возникает при попадании пищи в полость
- Б. Боли интенсивные, самопроизвольные, иррадиирующие, усиливаются от горячего, кратковременное ослабление от холодного
- В. Быстро проходящие боли от температурных, механических, химических раздражителей, возникшие 2-3 дня назад
- Г. Продолжительные боли от всех видов раздражителей, ночные и самопроизвольные боли

- 1. Пульпит начальный
- 2. Пульпит острый
- 3. Пульпит гнойный
- 4. Пульпит хронический гипертрофический

- А. 1В, 2Г, 3Б, 4А
- Б. 1Г, 2В, 3Б, 4А
- В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ КАРИЕСВОСПРИИМЧИВОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- А. До иммунных зон
- Б. Профилактически иссекая окружающую деминерализованную эмаль
- В. Миниинвазивным методом
- Г. Депульпируют зуб
- Д. С позиций щадящего препарирования

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Хронический гнойный и гипертрофический альвеолит

Б. Рыхлая тампонада лунки йодоформным тампоном

В. Антисептические ванночки, противопоказано интенсивное полоскание полости рта

Г. «сухая лунка» или остеомиелит

Д. Серозная и гнойно-некротическая

1. Тактика врача при течении альвеолита в виде «сухой лунки»

2. Рекомендации врача после удаления зуба

3. Формы течения альвеолита

4. Острые формы альвеолита

5. Хронические формы альвеолита

А. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4

Б. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4

В. А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 4

ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ

А. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, дренирование раны, удаление причинного зуба

Б. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, назначение антибиотиков, ротовых ванн, УВЧ

В. Удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн

Г. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, дренирование раны, удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн

Д. Медикаментозная терапия

При отломе коронковой части зуба на уровне десны зуб восстанавливают:

А. полукоронкой

Б. экваторной коронкой

В. вкладкой

Г. съемным протезом

Д. штифтовой конструкцией

Для поверхностной анестезии слизистой оболочки может применяться

А. мепивакин

Б. тетракаин (дикаин)

В. бупивакаин (маркаин)

Г. прокаин (новокаин)

Д. артикаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

А. Не существует

Б. Хронический периодонтит

В. 1 – 3 и 8 – 9 месяцы

Г. 6 месяцев

Д. Период обострения

Е. 2 – 3 и 6 – 7 месяцы

1. Показание к плановому удалению зуба

2. Абсолютное противопоказание для удаления зуба

3. Сроки планового удаления зубов после инфаркта миокарда

4. Временное противопоказание к удалению зубов у беременных в следующие сроки

5. Временное противопоказание к удалению зубов при психических заболеваниях

А. А – 2, Б – 1, В – -, Г – 3, Д – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – -, Г – 5, Д – 3

В. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

А. Плазматические клетки

Б. Эозинофилы

В. Нейтрофильный сдвиг влево

Г. 4 – 5 сутки

Д. Гигантские многоядерные клетки

Е. 2 – 3 сутки

1. Признаки острого воспалительного процесса в общем анализе крови

2. Цитологический признак медленного заживления раны

3. Признак патологического течения раневого процесса

4. Цитологический признак наличия в ране инородного тела

5. Сроки перехода от макрофагальной фазы в фибробластическую при раневом процессе

А. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4

Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4

В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4

**МИКРОПРОТЕЗ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБА И
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ОККЛЮЗИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕРЕКРЫТИЕМ ОДНОГО БУГРА**

- А. Pinlay
- Б. Inlay
- В. Onlay
- Г. Overlay
- Д. Ney

Артикаин можно использовать у детей с

- А. 6 месяцев
- Б. 1 года
- В. 2 лет
- Г. 4 лет
- Д. 5 лет

Высшая (максимально допустимая) разовая доза артикаина для детей:

- А. 2,2 мг/кг
- Б. 3,0 мг/кг
- В. 4,4 мг/кг
- Г. 5,0 мг/кг
- Д. 7 мг/кг

Подвижность зубов по Энтину I степени характеризуется подвижностью:

- А. в пределах физиологической нормы
- Б. в лунке во всех направлениях вокруг своей оси
- В. в вестибулооральном и медиодистальном направлениях
- Г. в вертикальном направлении
- Д. в вестибулооральном направлении

Проверка окклюзионных контактов на этапе припасовки несъемного мостовидного протеза проводится при окклюзиях:

- А. центральной и сагиттальных;
- Б. боковых, сагиттальных и центральной;
- В. сагиттальных и боковых;
- Г. сагиттальных;
- Д. центральной.

После припасовки коронок паяного мостовидного протеза в полости рта повторно определяется центральная окклюзия для:

- А. оценки качества припасовки коронок
- Б. повторной установки и загипсовки модели с коронками в артикулятор
- В. точной спайки опорных коронок с промежуточной частью
- Г. точного моделирования промежуточной части мостовидного протеза (с учетом смыкания зубных рядов в центральной окклюзии)
- Д. повышения эстетики протеза

При изготовлении консольного несъемного протеза отрицательным является:

- А. необходимость депульпации опорных зубов
- Б. препарирование большого количества зубов
- В. наличие опрокидывающего момента в области опорных зубов
- Г. неудовлетворительное эстетическое качество
- Д. сошлифовывание большого количества тканей опорных зубов

Получение оттиска при починке съемного пластиночного протеза не требуется при:

- А. отломе плеча кламмера;
- Б. переломе или трещине базиса;
- В. необходимости установки дополнительного зуба;
- Г. переносе кламмера;
- Д. отломе искусственного зуба.

Моделировка из воска штампованной коронки проводится на:

- А. разборной модели
- Б. огнеупорной модели
- В. гипсовом столбике
- Г. металлическом штампики
- Д. гипсовой модели

Пациенту, страдающему бронхиальной астмой и имеющему повышенную чувствительность к сульфитам, для проведения местного обезболивания перед лечением зуба следует выбрать

- А. 2% раствор мепивакаин+ эпинефрин (адреналин) 1: 100 000
- Б. 3% раствор мепивакаина
- В. 4% раствор артикаина + эпинефрин (адреналин) 1: 200 000
- Г. 4% раствор артикаина + эпинефрин (адреналин) 1: 100 000
- Д. 2% раствор лидокаина + эпинефрин (адреналин) 1: 100 000

ДЛЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ

- А. Кратковременные интенсивные боли, возникающие от случайных раздражений без нарушений чувствительности
- Б. Продолжительная, варьирующая по интенсивности боль, усиливающаяся при давлении по ходу нерва
- В. Продолжительные приступообразные боли с иррадиацией в ухо, хруст в височно-нижнечелюстном суставе
- Г. Тупые длительные боли с чувством давления и напряжения в верхней челюсти, выделения из носа
- Д. Приступообразные ночные боли длительностью 15-30 минут, иррадиирующие в ухо, висок

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ

- А. Приступообразные ночные боли длительностью 15-30 минут, иррадиирующие в ухо, висок
- Б. Продолжительные, варьирующие по интенсивности боли, усиливающиеся при давлении по ходу нерва
- В. Тупые длительные боли с чувством давления и напряжения в верхней челюсти, выделения из носа
- Г. Продолжительные приступообразные боли с иррадиацией в ухо, хруст в височно-нижнечелюстном суставе
- Д. Кратковременные интенсивные боли, возникающие от случайных раздражений без нарушений чувствительности

Собственно жевательная мышца по функции относится к группе мышц:

- А. опускающих нижнюю челюсть
- Б. смещающих нижнюю челюсть вперед
- В. поднимающих нижнюю челюсть
- Г. смещающих нижнюю челюсть вправо
- Д. смещающих нижнюю челюсть влево

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. С неба на ножке

Б. Удаление причинного зуба, назначение местных сосудосуживающих средств, ФТЛ

В. С вестибулярной поверхности вестибулярного отростка

Г. Удаление причинного зуба, пункции промывания пазухи, симптоматическое лечение

Д. Удаление причинного зуба, гайморотомия

1. Лечение острого одонтогенного серозного гайморита

2. Лечение острого одонтогенного гнойного гайморита

3. Лечение хронического одонтогенного гайморита

4. Чаще всего ороантральное сообщение закрывается путем слизисто-надкостничного лоскута взятого

А. Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3

Б. Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

В. Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

Местноанестезирующий препарат с минимальной проникающей способностью через гистогематические барьеры:

А. мепивакин

Б. лидокаин

В. бупивакаин (маркаин)

Г. прокаин (новокаин)

Д. артикаин

ТЯЖЁЛАЯ ОДЫШКА, УЧАСТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЫШЦ В АКТЕ ДЫХАНИЯ, ВЗДУТИЕ ШЕЙНЫХ ВЕН, ВЫБУХАНИЕ НАДКЛЮЧИЧНЫХ ЯМОК, ВЫРАЖЕННЫЙ ЦИАНОЗ ХАРАКТЕРИЗУЮТ

А. асфиксию обтурационную

Б. приступ бронхиальной астмы

В. асфиксию аспирационную

Г. большой эпилептический припадок

Д. приступ стенокардии

Съемный пластиночный протез, при дефекте зубного ряда, нуждается в припасовке в полости рта вследствие:

А. наличия поднатурных в области естественных зубов

Б. возможных ошибок при постановке искусственных зубов

В. нарушений пропорций при подготовке пластмассы

Г. нарушений режима полимеризации пластмассы

Д. индивидуальных особенностей пациента

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Деформация десневых сосочков
- Б. Некроз десневых сосочков
- В. Кровоточивость при зондировании десневых сосочков
- Г. Резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок
- Д. Наличие пародонтального кармана

При изготовлении штифтовой конструкции оптимальная длина штифта относительно длины корня составляет:

- А. 1/3;
- Б. 2/3;
- В. 1/2;
- Г. всю длину корня;
- Д. длина штифта не имеет значения.

CEREC – ЭТО

- А. Система компьютерного изготовления вкладок и коронок
- Б. Система адгезионной фиксации безметалловых вкладок
- В. Система реставрации зубов стандартными керамическими вкладками
- Г. Воск для прямой моделировки вкладок
- Д. Система ультразвукового препарирования под стандартные керамическиекладки

БОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЕ АМБУЛАТОРНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БЕРЕМЕННЫХ

- А. в 1 триместре
- Б. в 1 и 2 триместрах
- В. во 2 триместре
- Г. во 2 и 3 триместрах
- Д. в 3 триместре

Укажите формулу зуба, для лечения которого достаточно проведение инфильтрационной анестезии с анестетиком на основе артикаина

- А. зуб 3.1
- Б. зуб 4.8
- В. зуб 3.7
- Г. зуб 4.6
- Д. зуб 3.8

Для снятия психоэмоционального напряжения в условиях стоматологической поликлиники используют:

- А. снотворные
- Б. анксиолитики (транквилизаторы)
- В. наркотические анальгетики
- Г. ненаркотические анальгетики
- Д. антидепрессанты

КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ГИПОГЛИКЕМИИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СИМПТОМ

- А. общей слабости
- Б. двигательного беспокойства
- В. чувства голода
- Г. сухости кожных покровов
- Д. тремора пальцев

ПАЦИЕНТУ В СОСТОЯНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА ВВОДЯТ

- А. подкожно
- Б. подъязычно
- В. внутривенно
- Г. внутримышечно
- Д. внутрисердечно

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ЭМАЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЕ КОНТАКТ С КОМПОЗИТОМ ПО ПРИНЦИПУ

- А. Микросцепления
- Б. Химического взаимодействия
- В. Адгезии
- Г. Макросцепления
- Д. Макросцепления и химического взаимодействия

Применение замковых креплений для фиксации съёмного протеза даёт возможность:

- А. уменьшить рвотный рефлекс
- Б. улучшить дикцию
- В. повысить эстетику
- Г. улучшить фиксацию протеза
- Д. уменьшить травму десны

Штифтовая культевая вкладка может быть изготовлена на:

- А. зубы любой группы
- Б. однокорневые зубы верхней челюсти
- В. премоляры верхней челюсти
- Г. премоляры нижней челюсти
- Д. однокорневые зубы нижней челюсти

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Нарушение функции жевания
- Б. Костная крепитация
- В. Неправильный прикус
- Г. Локальная боль, усиливающаяся при пальпации
- Д. Гематома, отек окружающих тканей

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ АРТРИТА ВНЧС С ХРОНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. Выраженное сужение суставной щели, нарушение функции суставной головки
- Б. Незначительное расширение суставной щели, нарушение функции суставной головки
- В. Выраженное расширение суставной щели, нарушение функции суставной головки
- Г. Исчезновение наружных замыкающих кортикальных пластинок, краевые узурры, остеопороз и кисты суставной головки
- Д. Ширина суставной щели без изменений, нарушение функции суставной головки

Окклюзия – это:

- А. всевозможные смыкания зубных рядов верхней и нижней челюстей
- Б. положение нижней челюсти относительно верхней в состоянии относительного физиологического покоя
- В. всевозможные положения нижней челюсти относительно верхней
- Г. соотношение беззубых челюстей
- Д. вид прикуса

Для изготовления штампованных коронок применяют штампы, отлитые из:

- А. хромокобальтового сплава
- Б. легкоплавкого сплава
- В. серебряно-палладиевого сплава
- Г. свинца
- Д. олова

Укажите группу зубов, для депульпирования которых инфильтрационной анестезии обычно недостаточно

- А. резцы и клыки верхней челюсти
- Б. резцы и клыки нижней челюсти
- В. премоляры верхней и нижней челюсти
- Г. моляры верхней челюстей
- Д. моляры нижней челюсти.

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

- А. Местная гипоплазия эмали
- Б. Флюороз
- В. Тетрациклиновые зубы
- Г. Системная гипоплазия эмали
- Д. Несовершенный амелогенез

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Показания:

- А. Препарирование без выхода на аппроксимальную грань и кариесрезистентных пациентов**
 - Б. Скрытые полости до контактного пункта сочетание полостей 2 и 1 класса**
 - В. Полость в придесневой области до контактного пункта у зубов с высокой коронкой**
 - Г. Распространение полости на контактный пункт, замена старой реставрации Методики препарирования и пломбирования полостей 2 класса:**
 - 1. Техника горизонтального тоннеля**
 - 2. Техника сквозного вертикального тоннеля**
 - 3. Техника несквозного вертикального тоннеля**
 - 4. Препарирование и пломбирование стандартными керамическими вкладками**
- А. 1В, 2Б, 3А, 4Г
 - Б. 1А, 2Б, 3В, 4Г
 - В. 1Г, 2Б, 3А, 4В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Рассечение зуба на две части в области бифуркации с последующим сглаживанием нависающих краев, проведение кюретажа, покрытие коронкой**
 - Б. Удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба**
 - В. Удаление корня вместе с прилежащей коронковой частью**
 - Г. Пересадка удаленного зуба в другую альвеолу**
 - Д. Пересадка удаленного зуба в его же альвеолу**
 - 1. Аутотрансплантация зуба**
 - 2. Гемисекция зуба**
 - 3. Ампутация корня**
 - 4. Коронаро – радикулярная сепарация**
 - 5. Реплантация зуба**
- А. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1, Д – 5
 - Б. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 5
 - В. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5

ПРИ СНЯТИИ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ У ПАЦИЕНТА С ЯЗВЕННО- НЕКРОТИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ ВЕНСАНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД:

- А. Ручной
- Б. Ультразвуковой
- В. Пескоструйный
- Г. Сочетанный ручной и ультразвуковой
- Д. Сочетанный ручной и пескоструйный

Подвижность зубов по Энтину II степени характеризуется подвижностью:

- А. в пределах физиологической нормы
- Б. в лунке во всех направлениях вокруг своей оси
- В. в вестибулооральном и медиодистальном направлениях
- Г. в вертикальном направлении
- Д. в вестибулооральном направлении

ПРИ КЛИНИКЕ ОСТРОГО ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- А. Диабет
- Б. Заболевание крови
- В. Гастрит
- Г. Язвенную болезнь желудка
- Д. Острый панкреатит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

- А. Инфильтрации и абсцедирования
 - Б. Внедрение инородного тела
 - В. Из гранулемы, тяжа причинного зуба
 - Г. Из гранулемы
 - Д. Хроническая
 - Е. Обострившееся хроническое
 - 1. Неодонтогенная гранулема развивается в следствие
 - 2. Одонтогенная гранулема состоит
 - 3. Неодонтогенная гранулема состоит
 - 4. Течение подкожной гранулемы
 - 5. Стадии клинического течения одонтогенной подкожной гранулемы лица
- А. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д - 3
Б. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д - 4
В. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д - 4

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОКАЗАНЫ ДЛЯ ЛИЦ

- А. Кариесвосприимчивых
- Б. Кариерезистентных
- В. Молодого возраста
- Г. В детском возрасте.
- Д. Пожилого возраста

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Нижнелуночковый и язычный
 - Б. Слизистая оболочка в пределах резцов и клыков с обеих сторон
 - В. Верхние моляры и соответствующий участок слизистой оболочки альвеолярного отростка с вестибулярной стороны
 - Г. Резцы, клыки и премоляры, альвеолярный отросток и его слизистая оболочка с вестибулярной стороны, мягкие ткани подглазничной области
 - Д. Разновидность мандибулярной анестезии
1. Зона обезболивание при инфраорбитальной анестезии
 2. Зона обезболивание при туберальной анестезии
 3. Обезболивание по Егорову – это:
 4. Зона обезболивания резцовой анестезии
 5. При внутриротовой мандибулярной анестезии происходит выключение чувствительных ветвей:
- А. А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 1
 - Б. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3
 - В. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3

ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ ГИНГИВО-СТОМАТИТ СОПРОВОЖДАЕТ ТЕЧЕНИЕ

- А. Сифилиса
- Б. ВИЧ-инфекции
- В. Красной волчанки
- Г. Хронического герпетического стоматита
- Д. Многоформной экссудативной эритемы

При изготовлении литой цельнометаллической коронки моделировка воском анатомической формы производится в объеме (по сравнению с естественным зубом):

- А. равном
- Б. меньшем на толщину 1мм
- В. большем на толщину 1мм
- Г. меньшем на толщину компенсационного лака
- Д. большем на толщину компенсационного лака

ЖЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ, ПРОХОДЯЩЕЕ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ, ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А. Глоссита
- Б. Глоссалгии
- В. Ромбовидного глоссита
- Г. Десквамативного глоссита
- Д. Невралгия тройничного нерва

Местноанестезирующий препарат, не оказывающий значительного влияния на сосуды:

- А. лидокаин
- Б. артикаин
- В. прокаин (новокаин)
- Г. мепивакаин
- Д. бупивакаинSd

ВОЗБУДИТЕЛЕМ РОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Эпидермальный стафилококк
- Б. Пемолитический стрептококк
- В. Бактероиды, клостридии
- Г. Кишечная и синегнойная палочки
- Д. Актиномицеты

К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТ

- А. Болезнь Боуэна и пигментную ксеродермию
- Б. Актинический кератоз, радиационный дерматоз, предраковый меланоз
- В. Бородавчатый (узелковый) предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, абразивный хейлит Манганотти
- Г. Эритроплакию, бородавчатый предрак, ограниченный гиперкератоз, абразивный хейлит Манганотти
- Д. Болезнь Боуэна, лейкоплакия, хроническая трещина губы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Седативный эффект

Б. Замедляет процесс заживления раны

В. Атропин

Г. Гексенал

1. Побочный эффект от новокаина

2. Побочный эффект от тримекаина

3. При передозировке новокаина вводят:

4. При передозировке лидокаина вводят:

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3

Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4

В. А – 1, Б – 2, В – 4, Г – 3

Создание чрезмерной конусности стенок при препарировании под металлокерамическую коронку приводит к:

А. неэстетичности коронки;

Б. снижению прочности коронки;

В. к травме десны;

Г. к ослаблению фиксации коронки;

Д. делает коронку более долговечной.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Заболевание:

А. Острый пульпит

Б. Пульпит хронический

В. Пульпит неуточненный

Г. Пульпит хронический язвенный Код по МКБ-10:

1. K04.09

2. K04.01

3. K04.03

4. K04.04

А. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Б. 1Г, 2В, 3А, 4Б

В. 1Г, 2А, 3В, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Методы лечения:

А.Герметизация фиссур

Б.Реминерализующая терапия

В.Препарирование и пломбирование полостей

Г.Обучение гигиене полости рта Стадии кариеса:

1.Стадия пятна

2.Кариес эмали

3.Кариес дентина

4.Осложненный кариес

А. 1АБГ, 2АБВГ, 3ВГ, 4Г

Б. 1АБГ, 2АВГ, 3ВГ, 4Г

В. 1АБГ, 2АБВГ, 3Г, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Низкий уровень иммунитета, выраженная сенсibilизация организма, слабовирулентная микрофлора

Б. Низкий уровень иммунитета, выраженная сенсibilизация организма и значительная вирулентность микрофлоры

В. Кариозные зубы, пародонтит, зубные отложения, тонзиллиты

Г. Достаточная напряженность иммунитета, низкий уровень сенсibilизации организма, высокая вирулентность микрофлоры

Д. Тонзиллиты

1. Наиболее частая причина сенсibilизации организма к хронической инфекции

2. Нормергическая форма воспаления наблюдается при

3. Гиперергическая форма воспаления развивается при

4. Гипоергическая форма воспалительной реакции возникает при

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Грипп, корь, краснуха, болезнь Боткина
 - Б. Прогрессирование и неблагоприятный исход процесса
 - В. Гнойно – воспалительные процессы
 - Г. Аллергические и паразитарные заболевания
 - Д. Воспалительные заболевания, интоксикация
 - Е. Мононуклеоз, туберкулез, сифилис
1. Лейкоцитоз наблюдается при заболеваниях:
 2. Лейкопения чаще встречается при заболеваниях:
 3. Токсическая зернистость лейкоцитов указывает на:
 4. Нейтрофилез указывает на:
 5. Эозинофилия встречается при:
 6. Лимфоцитоз развивается при:
- А. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6
 - Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 6
 - В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6

ДИАГНОЗ "ГЛУБОКИЙ КАРИЕС" СООТВЕТСТВУЕТ ДИАГНОЗУ ПО МКБ-10:

- А. Карии эмали
- Б. Карии дентина
- В. Карии цемента
- Г. Гиперемия пульпы
- Д. Рецидивирующий карии

Пациенту с язвенно-некротическим стоматитом необходимо обработать слизистую оболочку полости рта антибактериальным препаратом. Какой местный анестетик следует использовать для поверхностного обезболивания слизистой оболочки

- А. бупивакаин
- Б. мепивакаин
- В. артикаин
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. лидокаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Строфантин, коргликон
Б. Бемеград
В. Эуфиллин, дипрофиллин
Г. Кордиамин
Д. Нитроглицерин, изокет, нитроминт
1. Дыхательные аналептики
2. Сердечные гликозиды
3. Антагонист гексенала и тиопентала натрия
4. Бронхолитики
5. Антиангинальные препараты
- А. А – 1, Б – 3, В – 4, Г – 2, Д – 5
Б. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1, Д – 5
В. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 5, Д – 1

ПРИ ВКОЛОЧЕННОМ ВЫВИХЕ РЕЗЦОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
Б. Провести шинирование и оставить под наблюдение
В. Репозировать
Г. Депульпировать и репозировать
Д. Удалить

ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Наследственность
Б. Наличие микробного налета
В. Вредные привычки
Г. Подвижность зубов
Д. Травма

Препарат, используемый для всех видов местной анестезии:

- А. мепивакаин
Б. лидокаин
В. бензокаин (анестезин)
Г. прокаин (новокаин)
Д. артикаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Методы реставрации:

А.Пломба

Б.Прямой винир

В.Непрямой винир

Г.Искусственная коронка Показания:

1.Изменения цвета зуба после эндодонтического лечения

2.Незначительный по площади клиновидный дефект

3.Диастема

4.Флюороз

А. 1БВ, 2А, 3БВГ, 4БВ

Б. 1БВ, 2А, 3БВ, 4БВ

В. 1БВ, 2БА, 3БВГ, 4БВ

При припасовке литых мостовидных протезов, точность прилегания коронок к культи опорных зубов оценивается с помощью:

А. эластического слепочного материала

Б. базисного воска

В. гипса

Г. копировальной бумаги

Д. моделировочного воска

Для спайки коронок из нержавеющей стали применяют припой на основе:

А. золота

Б. серебра

В. платины

Г. титана

Д. кадмия

Укажите формулу зуба, для лечения пульпита которого необходимо провести проводниковую анестезию с анестетиком на основе артикаина

А. зуб 4.7

Б. зуб 2.4

В. зуб 3.5

Г. зуб 4.1

Д. зуб 3.2

Анатомическая шейка зуба соответствует:

- А. границе над- и поддесневой частей зуба
- Б. экватору зуба
- В. переходу эмали в цемент корня
- Г. дну зубодесневого желобка
- Д. Д)дну патологического зубодесневого кармана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. 2 недели
 - Б. 1 неделя
 - В. 19 – 23 сутки
 - Г. 3 недели
 - Д. 16 – 18 день
1. Сроки эпителизации лунок однокорневых зубов в норме
 2. Сроки эпителизации лунок многокорневых зубов в норме
 3. Задержка эпителизации лунок однокорневых зубов при воспалении
 4. Задержка эпителизации лунок многокорневых зубов при воспалении
 5. Сроки полного заполнения лунки грануляционной тканью в норме
- А. А – 4,5, Б – 1, В – 2, Д -3
 - Б. А – 4,5, Б – 3, В – 1, Д -2
 - В. А – 4,5, Б – 3, В – 2, Д -1

Промежуточная часть мостовидного протеза в области боковых зубов по отношению к десне:

- А. не касается
- Б. прилегает к ней по всей поверхности
- В. прилегает только на скатах альвеолярного гребня
- Г. касается по вершине альвеолярного гребня в двух точках
- Д. касается по вершине альвеолярного гребня в одной точке

Все боковые стенки опорных зубов при изготовлении паяного мостовидного протеза препарируются:

- А. с наклоном в сторону дефекта зубного ряда
- Б. параллельно между собой
- В. с наклоном в сторону от дефекта зубного ряда
- Г. параллельно с рядом стоящим зубом
- Д. только параллельно продольной оси зуба

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Монокультура анаэробов

Б. Гиперкапния, аэрация тканей

В. Аэробы, факультативные и облигатные анаэробы

Г. Бактероиды, фузобактерии

Д. Монокультура стафилококка

Е. Кишечная палочка, протей

1. Бактерии, вызывающие гнойно – воспалительные процессы в челюстно - лицевой области

2. К облигатным неспорообразующим бактериям относятся

3. Условия не способствующие развитию бактериоидной инфекции

4. При нагноении лимфоузлов из гнойных очагов высеваются

5. Микроорганизмы, которые чаще всего высеваются при одонтогенных абсцессах

А. А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 2, Д – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 2, Д – 4

В. А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 4

УКАЗАТЬ ОШИБКИ ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

А. Отлом истонченной стенки коронковой части зуба

Б. Неполное удаление инфицированного дентина, химический ожог пульпы зуба

В. Нависающий край пломбы, отсутствие контактного пункта

Г. Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба

Д. Десневое кровотечение

НИТРОМИНТ-АЭРОЗОЛЬ (НИТРОСПРЕЙ) - СРЕДСТВО ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ

А. судорожного припадка

Б. приступа бронхиальной астмы

В. приступа стенокардии

Г. гипертонического криза

Д. стенотической асфиксии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Размер частиц Наполнителя:

А. 0,04-0,4 мкм

Б. 0,04-5 мкм

В. 8-45 мкм

Г. 1-5 мкм Класс композитного материала:

1. Макронаполненные

2. Микронаполненные

3. Мининаполненные

4. Гибридные

А. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Б. 1В, 2А, 3Г, 4Б

В. 1А, 2В, 3Г, 4Б

Провести депульпирование зуба

2.4 под инфильтрационной анестезией позволяют местноанестезирующие препараты на основе:

А. мепивакаина

Б. лидокаина

В. бензокаина (анестезина)

Г. артикаина

Д. прокаина (новокаина)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А. Абсцедирование

Б. Подвижность зубов 2 степени

В. Патология прикуса

Г. Сахарный диабет

Д. Кровоточивость десен

Коэффициенты выносливости пародонта зубов, предложенные

В.Ю.Курляндским, получены на основании данных исследований:

А. анатомических особенностей строения зубов;

Б. подвижности зубов;

В. жевательных проб;

Г. абсолютной силы жевательных мышц;

Д. гнатодинамометрии.

ДЛЯ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ В ОСТРОЙ СТАДИИ ХАРАКТЕРНО

- А. Наличие свищевых ходов по переходной складке в очаге поражения, гиперемия и болезненность мягких тканей
- Б. Воспалительный инфильтрат в области переходной складки
- В. Гиперемия и болезненность мягких тканей, инфильтрация надкостницы по переходной складке
- Г. Воспалительная инфильтрация надкостницы и мягких тканей, прилежащих к очагу поражения челюсти с вестибулярной и оральной поверхности
- Д. Воспалительная инфильтрация мягких тканей, прилежащих к очагу поражения челюсти с вестибулярной и оральной поверхности

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТИФТА ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ КОРНЯ СОСТАВЛЯЕТ

- А. 1/3
- Б. 1/2
- В. 2/3
- Г. Всю длину корня
- Д. Длина штифта не имеет значения

ВЕРРУКОЗНУЮ ЛЕЙКОПЛАКИЮ ОТНОСЯТ

- А. К раку
- Б. К дерматозу
- В. К облигатному предраку
- Г. К факультативному предраку

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССОВ И ФЛЕГМОН ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Новокаиновая блокада с антибиотиками
- Б. Послойное вскрытие гнойного очага с введением дренажа
- В. Удаление причинного зуба
- Г. Проведение физиотерапии
- Д. Дезинтоксикационная терапия

Укажите процентную концентрацию раствора лидокаина, применяемого в стоматологической практике для инфильтрационной и проводниковой анестезии

- А. 0.5%
- Б. 2%
- В. 3%
- Г. 4%
- Д. 1%

На этапе "проверка конструкции съемного протеза" при полном отсутствии зубов в случае выявления занижения высоты нижнего отдела необходимо заново определить центральное соотношение челюстей:

- А. сняв боковые зубы с нижнего воскового базиса и приклеив пластинку воска к нему
- Б. с помощью новых восковых базисов с окклюзионными валиками
- В. сняв боковые зубы с верхнего воскового базиса и приклеив пластинку воска к нему
- Г. сняв боковые зубы с верхнего и нижнего восковых базисов и приклеив пластинку воска к нижнему восковому базису
- Д. приклеив пластинку воска на зубы нижнего воскового базиса

ПРИ ТРАВМЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДИТ

- А. Перелом корня
- Б. Вывих
- В. Ушиб
- Г. Скол коронки зуба
- Д. Перелом зуба на уровне шейки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Химическая основа материалов:

- А.Керамический полисилоксан
 - Б.Композит+СИЦ
 - В.Органическая полимерная Матрица+наполнитель
 - Г.Акриловые или апоксидные Полимеры Группы пломбировочных материалов:
- 1.Компомеры
 - 2.Композиты
 - 3.Ормомеры
 - 4.Пластмассы
- А. 1В, 2Б, 3А, 4Г
 - Б. 1Б, 2А, 3В, 4Г
 - В. 1Б, 2В, 3А, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Эпителиальные клетки

Б. Мезенхимальные клетки наружного слоя зубного мешочка

В. Макрофаги

Г. Апикальные, апиколлатеральные, латеральные, межкорневые

Д. Простая, сложная кистогранулема

Е. 0, 5 см.

Ж. 0, 5 – 1 см.

1. Развитие периодонта происходит за счет

2. Особенностью тканей периодонта является наличие

3. По локализации гранулемы различают

4. Размеры гранулемы не превышают

5. Размеры кистогранулемы

А. А – 2, Б – 3, Г – 1, Е – 4, Ж – 5

Б. А – 2, Б – 1, Г – 4, Е – 3, Ж – 5

В. А – 2, Б – 1, Г – 3, Е – 4, Ж – 5

Укажите группу препаратов, усиливающую и пролонгирующую действие местноанестезирующих средств:

А. возбуждающие средства

Б. спазмолитики

В. α-адреномиметики

Г. М-холиномиметики

Д. α-адреноблокаторы

Культевые штифтовые вкладки методом литья изготавливают из:

А. пластмассы

Б. легкоплавкого металла

В. сплавов металлов

Г. композиционных материалов

Д. воска

ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ЦЕМЕНТ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ ЯВИТЬСЯ В КЛИНИКУ ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО ОСМОТРА:

А. Один раз в месяц

Б. Один раз в полгода

В. Один раз в год

Г. Только при возникновении жалоб

Д. По желанию пациента

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Жалобы:

А. Незначительные болевые ощущения при накусывании на зуб

Б. Постоянные, постепенно нарастающие боли, «симптом выросшего зуба», болезненное накусывание на зуб

В. Постоянные ноющие, пульсирующие боли, болезненность при накусывании

Г. Часто протекает бессимптомно

1. Острый апикальный периодонтит

2. Хронический апикальный периодонтит

3. Корневая киста

4. Периапикальный абсцесс без свища

А. 1Б, 2А, 3В, 4Г

Б. 1Б, 2А, 3Г, 4В

В. 1Б, 2В, 3Г, 4А

Укажите местный анестетик группы сложных эфиров:

А. лидокаин

Б. прокаин (новокаин)

В. артикаин

Г. бупивакаин (маркаин)

Д. мепивакаин (скандонест)

ВЫДЕЛИТЕ СИМПТОМ, НЕ УКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ В КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ КОЛЛАПСА

А. артериальная гипотония

Б. бледные, холодные и влажные кожные покровы

В. гипотонус

Г. расширенный зрачок

Д. двигательное беспокойство

Допускается постановка искусственных зубов в съёмном пластиночном протезе кпереди от центра альвеолярного гребня на 2/3 их длины в области:

А. передних зубов нижней челюсти

Б. передних зубов верхней челюсти

В. боковых зубов нижней челюсти

Г. боковых зубов верхней челюсти

Д. передних и боковых зубов нижней челюсти

ИНИЦИАТОРОМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА СВЕТООВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Камфорохинон
- Б. Пероксид бензоила
- В. Ароматические амины
- Г. Пероксид бензоила и ароматические амины
- Д. Камфорохинон и ароматические амины

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Понижение АД
 - Б. Повышение АД
 - В. Не влияет
 - Г. Барбитураты
 - Д. Миорелаксанты
 - Е. Атропин или метацин
1. Влияние эфира для наркоза на АД
 2. Влияние фторотана на АД
 3. Препараты, расслабляющие скелетную и дыхательную мускулатуру
 4. Препараты, применяемые для подавления саливации при наркозе
 5. Влияние кеталара на АД
- А. А – 2, Б – 1,5, Д – 4, Е – 3
 - Б. А – 2, Б – 1,5, Д – 3, Е – 4
 - В. А – 1, Б – 2,5, Д – 3, Е – 4

Укажите местный анестетик, используемый в стоматологии около 100 лет

- А. бупивакаин
- Б. мепивакаин
- В. артикаин
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. лидокаин

Противопоказанием к изготовлению искусственной коронки является:

- А. подвижность зуба третьей степени
- Б. патологическая стираемость твердых тканей
- В. наличие гиперестезии
- Г. снижение высоты нижнего отдела лица
- Д. необходимость укорочения зуба при феномене Попова-Годона

При изготовлении металлокерамической коронки рабочий оттиск снимают массой:

- А. силиконовой
- Б. альгинатной
- В. фторкаучуковой
- Г. термопластичной
- Д. цинкоксидаэвгеноловой

Зубная формула

2.4 соответствует:

- А. первому премоляру на нижней челюсти справа
- Б. второму премоляру на верхней челюсти справа
- В. второму премоляру на нижней челюсти справа
- Г. первому премоляру на верхней челюсти слева
- Д. первому премоляру на верхней челюсти справа

Укажите высшую (максимально допустимую) разовую дозу артикаина для взрослых:

- А. 2,5 мг/кг
- Б. 3,5 мг/кг
- В. 4,5 мг/кг
- Г. 5 мг/кг
- Д. 7 мг/кг

При изготовлении металлокерамической коронки минимально допускаемая толщина металлического каркаса из неблагоприятных сплавов:

- А. 0,1 мм;
- Б. 0,2 мм;
- В. 0,25 мм;
- Г. 0,3 мм;
- Д. 0,5 мм.

Анестетик с минимальной активностью в условиях воспаления:

- А. тримекаин
- Б. лидокаин
- В. мепивакаин
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. артикаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Ошибки и осложнения:

А. Нависающий край пломбы, отсутствие контактного пункта

Б. Термический ожог пульпы

В. Вскрытие полости зуба

Г. Дебондинг Этапы лечения, на которых совершены ошибки:

1. Препарирование полости

2. Наложение матрицы

3. Пломбирование полости

4. Полирование пломбы

А. 1БВ, 2А, 3АГ, 4--

Б. 1БВ, 2А, 3Г, 4--

В. 1В, 2А, 3Г, 4--

Требования к корням зубов, используемым для штифтовых конструкций:

А. подвижность 2-3 степени

Б. толщина стенок корня не менее одного миллиметра

В. канал распломбирован на 1/3

Г. расширение периодонтальной щели

Д. канал не запломбирован до верхушки на 1/3

При изготовлении цельнолитой коронки рабочий оттиск получают с помощью массы

А. силиконовой

Б. альгинатной

В. фторкаучуковой

Г. термопластичной

Д. цинкоксида-эвгеноловой

В случае фиксации бокового смещения нижней челюсти на этапе определения центрального соотношения челюстей характер соотношения зубных рядов при проверке конструкции протеза следующий:

А. бугорковый контакт между антагонистами, сагиттальная щель во фронтальном участке, снижение высоты нижнего отдела лица

Б. бугорковый контакт между антагонистами в боковом участке с одной стороны и просвет с другой, завышение высоты нижнего отдела лица

В. фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, высота нижнего отдела лица в норме

Г. фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, снижение высоты нижнего отдела лица

Д. фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, завышение высоты нижнего отдела лица

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЕО-ЛАМПЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ

- А. Гипертонической болезни компенсируемой формы
- Б. Сердечно-сосудистой недостаточности компенсируемой формы
- В. Сердечно-сосудистой недостаточности, компенсируемой электрокардиостимулятором
- Г. Сердечно-легочной недостаточности компенсированной формы
- Д. Сердечно-легочной недостаточности декомпенсированной формы

ПРОСВЕТ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТ ПРИ

- А. аспирационной асфиксии
- Б. обтурационной
- В. клапанной
- Г. стенотической
- Д. странгуляционной

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области боковых зубов проходит:

- А. не касается зубов
- Б. в пришеечной области зубов
- В. по середине коронки зубов
- Г. перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. перекрывая коронки зубов на 2/3

При препарировании зуба под металлокерамическую коронку возможно создание уступа-скоса в пришеечной области под углом:

- А. 135°
- Б. 50°
- В. 70°
- Г. 150°
- Д. 170°

ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ УСТУП ФОРМИРУЕТСЯ

- А. Супрагингивально
- Б. На уровне края десны
- В. Субгингивально на вестибулярной поверхности
- Г. Субгингивально по всему периметру шейки зуба
- Д. Не формируется

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Серозная инфильтрация тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел
- Б. Зуд кожи, эозинофилия, в пунктате – клетки Березовского - Штернберга
- В. Золотистый стафилококк
- Г. Смешанная микрофлора
- Д. Гнойное воспаление тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел
- Е. Наличие пакетов лимфоузлов, длительный субфебрилитет, положительная реакция Пирке и Манту, наличие в пунктате гигантских клеток Пирогова – Лангханса
- Ж. Острое начало заболевания, высокая температура тела, отрицательная проба с актинолизатом
1. Микроорганизм – наиболее частый возбудитель острых лимфаденитов лица и шеи
 2. Периаденит
 3. Аденофлегмона
 4. Характерные признаки туберкулезного лимфаденита
 5. Нехарактерные для актиномикоза признаки поражения лимфатических узлов
 6. Клиническая симптоматика лимфогранулематоза
- А. А – 3, Б – 6, В – 1, Д – 2, Е – 4, Ж – 5
- Б. А – 2, Б – 6, В – 1, Д – 3, Е – 5, Ж – 4
- В. А – 2, Б – 6, В – 1, Д – 3, Е – 4, Ж – 5

Разборная гипсовая модель отливается при изготовлении:

- А. штампованной коронки
- Б. цельнолитой коронки
- В. бюгельного протеза
- Г. съемного мостовидного протеза
- Д. пластиночного протеза

Показанием к постановке искусственных зубов на «приточке» в съёмном пластиночном протезе на верхней челюсти является:

- А. чрезмерная выраженность альвеолярной части нижней челюсти
- Б. чрезмерная выраженность альвеолярного отростка верхней челюсти в области боковых зубов
- В. «короткая» нижняя губа
- Г. «короткая» верхняя губа
- Д. выраженная уздечка нижней губы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Сложные эфиры

Б. Амиды

В. Этиловые эфиры

Г. Артикаин и гидрохлорид

Д. Барбитураты

1. Прилокаин относится к группе:

2. Мепивакаин относится к группе:

3. Бупивакаин относится к группе:

4. Ультракаин относится к группе:

5. Новокаин относится к группе:

А. А – 5, Б – 1,2, Г – 4,3

Б. А – 5, Б – 1,2,3, Г – 4

В. А – 2, Б – 1,3,4, Г – 5

МИКРОПРОТЕЗ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБА И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ВСЮ ОККЛЮЗИОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

А. Pinlay

Б. Inlay

В. Onlay

Г. Overlay

Д. Ney

ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ У РЕБЕНКА ПОЛУТОРА ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

А. Оставить под наблюдение

Б. Провести шинирование и оставить под наблюдение

В. Репозировать

Г. Депульпировать и репозировать

Д. Удалить

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Осложнения:

А.Отсутствие сухого блеска

Б.Дебондинг

В.Ожог пульпы

Г.Интоксикация пульпы Ошибки при изготовлении прямых виниров:

1.при препарировании

2.при протравливании и нанесении адгезива

3.при работе с композитом

4.при шлифовании и полировании

А. 1Г, 2В, 3Б, 4А

Б. 1В, 2Г, 3Б, 4А

В. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Признаки периодонтита

Б. Заболевания, характеризующиеся распространением воспалительного процесса с периодонта на надкостницу альвеолярного отростка и тело челюсти

В. Инфекционно – аллергический, гнойно – некротический процесс, который развивается в кости под воздействием внешних или внутренних факторов

Г. Очаги разрежения костной ткани различных размеров

Д. Удаление причинного зуба, декомпрессия тканей (в т.ч. костной), дренирование очагов воспаления

Е. Удаление или лечение причинного зуба (по показаниям), вскрытие абсцесса

1. Периостит

2. Остеомиелит

3. Изменения на рентгенограмме при остром периостите

4. Изменения на рентгенограмме при остром одонтогенном остеомиелите на ранних стадиях

5. Оперативное лечение острого одонтогенного периостита

6. Оперативное лечение острого одонтогенного остеомиелита

А. А – 3,4, Б – 1, В – 2, Д – 6, Е - 5

Б. А – 4, Б – 1, В – 2, Д – 6, Е - 5

В. А – 3,4, Б – 2, В – 1, Д – 6, Е - 5

Моделировка литой коронки может проводиться без использования "адапты":

- А. базисным воском;
- Б. бюгельным воском;
- В. погружным воском;
- Г. липким воском;
- Д. воском для мостовидных работ;

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Острый периодонтит
- Б. Обострившийся хронический периодонтит
- В. Нагноившаяся радикулярная киста
- Г. Общий гнойный пульпит
- Д. Альвеолит

Для припасовки штампованной коронки в клинике врач получает коронку:

- А. на гипсовом столбике
- Б. на гипсовой модели
- В. на металлическом штампе
- Г. без штампа
- Д. готовую коронку (отполированную)

ПРИЧИННЫЙ ЗУБ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ

- А. Сохраняют обязательно
- Б. Шинируют
- В. Депульпируют
- Г. Удаляют по показаниям
- Д. Удаляют обязательно

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ВОСПАЛЕНИЯ ДЕСНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Деформация десневых сосочков
- Б. Некроз десневых сосочков
- В. Кровоточивость при зондировании десневых сосочков
- Г. Резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок
- Д. Наличие пародонтального кармана

Показанием к изготовлению мостовидного протеза является:

- А. дефект коронковой части зуба
- Б. патологическая стираемость
- В. пародонтит тяжелой степени
- Г. включенный дефект зубного ряда
- Д. концевой односторонний дефект зубного ряда

УКАЗАТЬ ОШИБКИ ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

- А. Нависающий край пломбы
- Б. Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба
- В. Химический ожог пульпы зуба
- Г. Хроническое воспаление десневого края
- Д. Отсутствие контактного пункта

При какой реакции среды местные анестетики наиболее активны:

- А. нейтральной
- Б. слабощелочной
- В. слабокислой
- Г. кислой
- Д. щелочной

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ НЕ ВЫЗЫВАЕТ ЭТО ОСЛОЖНЕНИЕ

- А. приступ стенокардии
- Б. острая почечная недостаточность
- В. инфаркт миокарда
- Г. нарушение мозгового кровообращения
- Д. аритмия

КАКУЮ ФОРМУ ИМЕЕТ СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ВНЧС

- А. Шаровидную
- Б. Овальную
- В. Эллипсоидную
- Г. Цилиндрическую
- Д. Дисковидную

ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ ПО П КЛАССУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- А. Стеклоиономерный цемент
- Б. Поликарбоксилатный цемент
- В. Гибридный композиционный материал
- Г. Микрофильный композиционный материал
- Д. Компомер

При починке съемного протеза на нижней челюсти в связи с потерей естественного зуба необходимо получить оттиск с:

- А. нижней челюсти без протеза;
- Б. нижней челюсти с протезом;
- В. верхней челюсти и нижней челюсти без протеза;
- Г. нижней челюсти с протезом и верхней челюсти;
- Д. оттиск снимать не нужно.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ НАЗНАЧАЮТ МАЗИ

- А. Фотозащитные
- Б. Кортикостероидные
- В. Противовоспалительные
- Г. Антибактериальные
- Д. Регенерирующие

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Классы композитных материалов:

- А. Текущие, жидкие
 - Б. Микронаполненные
 - В. Гибридные
 - Г. Универсальные
- Признаки классификации:**
- 1. По размеру частиц наполнителя
 - 2. По клиническому назначению
 - 3. По плотности
 - 4. По способу полимеризации
- А. 1БВ, 2Г, 3А, 4--
 - Б. 1В, 2Г, 3А, 4--
 - В. 1БВ, 2ВГ, 3А, 4--

СЛИВАЮЩИЕСЯ В РИСУНОК ПАПУЛЫ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- А. Лейкоплакия
- Б. Герпес
- В. Красная волчанка
- Г. Плоский лишай
- Д. Опоясывающий лишай

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Не ранее, чем через 2 недели

Б. Гайморотомия с пластикой соустья

В. Можно, при наличии кровотечения

Г. Можно во всех случаях

Д. Нельзя

Е. Промывание пазухи растворами антисептиков, пластика соустья после ликвидации воспаления

1. Хирургическая тактика врача при перфорации верхнечелюстной пазухи во время удаления зуба на фоне острого гайморита (без наличия корня зуба в пазухе)

2. Метод удаления корня зуба, внедренного в верхнечелюстную пазуху

3. Можно ли тампонировать лунку йодоформным тампоном при перфорации дна верхнечелюстной пазухи?

4. Наиболее благоприятные сроки для удаления корня зуба, внедренного в мягкие ткани во время удаления

А. А – 4, Б – 2, Д – 3, Е – 1

Б. А – 4, Б – 2, Д – 1, Е – 3

В. А – 4, Б – 3, Д – 2, Е – 1

При изготовлении цельнолитых коронок применяется сплав золота пробы:

А. 750

Б. 375

В. 583

Г. 900

Д. 915

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Коринфар, капотен

Б. Аминокапроновая кислота или памба

В. Ятрогенное

Г. Идиопатическое

Д. Рутин или аскорутин

Е. фитоменадион или дицинон

1. При гипопротромбинемии для остановки кровотечения назначают:

2. Кровотечение, возникшее после хирургического вмешательства

3. При повышении фибринолитической активности для остановки кровотечения назначают:

4. Для остановки кровотечения при повышенной проницаемости сосудов назначают:

5. Для остановки кровотечения при повышенном АД назначают:

А. А – 5, Б – 3, В – 2, Д – 4, Е – 1

Б. А – 5, Б – 3, В – 2, Д – 1, Е – 4

В. А – 5, Б – 2, В – 3, Д – 4, Е – 1

Высшая (максимально допустимая) разовая доза лидокаина:

А. 2,2 мг/кг

Б. 4,4 мг/кг

В. 5,0 мг/кг

Г. 6 мг/кг

Д. 7 мг/кг

Наиболее высокой диффузионной способностью обладает:

А. лидокаин

Б. артикаин

В. прокаин (новокаин)

Г. мепивакаин

Д. бупивакаин

Гипертония – состояние, при котором величина АД стойко превышает

А. 120\80 мм.рт.ст

Б. 125\80 мм.рт.ст

В. 130\80 мм.рт.ст

Г. 135\85 мм.рт.ст

Д. 140\90 мм.рт.ст

Проверка окклюзионных контактов на этапе припасовки искусственной коронки проводится в окклюзиях:

- А. сагиттальных
- Б. сагиттальных и центральной
- В. центральной и боковых
- Г. боковых и сагиттальных
- Д. сагиттальных, боковых и центральной

Укажите местный анестетик, действующий наиболее длительно:

- А. лидокаин
- Б. бупивакаин
- В. прокаин (новокаин)
- Г. артикаин
- Д. мепивакаин

Укажите осложнение, наиболее часто наблюдаемое при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов.

- А. ulcerогенный эффект
- Б. лейкопения
- В. повышение артериального давления
- Г. гепатит
- Д. понижение артериального давления

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области передних зубов проходит:

- А. не касается зубов
- Б. в пришеечной области зубов
- В. посередине коронки зубов
- Г. перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. перекрывая коронки зубов на 2/3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. 120 – 160

Б. 4,5 – 5

В. 200 – 400

Г. 0,8 – 1

Д. 0 – 5 %

Е. 20 – 30 %

1. Количество эритроцитов у здоровых людей ($\times 10^{12}$ в 1 л.)

2. Содержание гемоглобина в крови здоровых взрослых людей.

3. Цветовой показатель в норме

4. Количество тромбоцитов у здоровых людей ($\times 10^9$ в 1 л.)

5. Количество лимфоцитов в мазке крови взрослого человека (на 100 клеток)

6. Количество эритроцитов в мазке крови взрослого человека (на 100 клеток)

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 6, Е – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5, Е – 6

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 6, Е – 5

ПУЛЬС У ПАЦИЕНТА БЕЗ СОЗНАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ НАД ПРОЕКЦИЕЙ

А. лучевой артерии

Б. плечевой

В. наружной сонной

Г. локтевой

Д. общей сонной

НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА У ВЗРОСЛЫХ ВЫПОЛНЯЮТ С ЧАСТОТОЙ

А. 60 компрессий в 1 мин

Б. 60 – 80 в 1 мин

В. 80 в 1 мин

Г. 80 - 100 в 1 мин

Д. не менее 100 в 1 мин

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОСТИ ПО V КЛАССУ СКОС ПРЕПАРИРУЮТ

А. По эмали

Б. По цементу корня

В. По эмали и цементу корня

Г. Не формируют

Д. На усмотрение врача

НАЛИЧИЕ У РЕБЕНКА УСТОЙЧИВОЙ ПРИВЫЧКИ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ПОСТОЯННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ЯЗЫКА МЕЖДУ ЗУБАМИ, ФОРМИРУЕТ

- А. Мезиальную окклюзию
- Б. Глубокую резцовую окклюзию
- В. Дистальную окклюзию
- Г. Вертикальную резцовую дизокклюзию
- Д. Вестибулоокклюзию

За степень атрофии лунки зуба принимается размер, полученный при зондировании патологического зубодесневого кармана в области:

- А. медиальной стороны
- Б. дистальной стороны
- В. наибольшей атрофии
- Г. вестибулярной поверхности
- Д. оральной поверхности

Схема, отображающая состояние опорно-удерживающего аппарата зубов верхней и нижней челюстей, называется

- А. Мастиокациографией
- Б. Гнатодинамометрией
- В. Реопародонтограммой
- Г. Одонтопародонтограммой

Эмалевая микроабразия - это удаление поверхностного слоя эмали с помощью

- А. Пескоструйного аппарата типа хендибластер
- Б. Воздействия концентрированных кислот
- В. Воздействия щелочей
- Г. Препарирования алмазными борами мелкозернистыми

Аппаратным методом исследования жевательных мышц является

- А. Периотестометрия
- Б. Электромиография
- В. Функциография
- Г. Реопародонтография

Правильная последовательность применения полировочных паст с фторидами считается

- А. Крупнозернистая, среднезернистая, мелкозернистая
- Б. Среднезернистая, крупнозернистая, мелкозернистая
- В. Мелкозернистая, среднезернистая, крупнозернистая
- Г. Крупнозернистая, мелкозернистая, среднезернистая

При кариесе эмали

- А. Боль при зондировании стенок кариозной полости
- Б. Боль при зондировании по дну кариозной полости в одной точке
- В. Зондирование болезненно по всему дну кариозной полости
- Г. Зондирование безболезненное

Исследование кровообращения в тканях пародонта называют

- А. Миотонометрией
- Б. Реопародонтографией
- В. Электромиографией
- Г. Мастикациографией

Для расчёта показателя заболеваемости конкретным заболеванием необходимы данные о числе случаев конкретного заболевания и

- А. Среднегодовой численности населения
- Б. Числе случаев заболеваний в предыдущие годы
- В. Числе лиц, прошедших медосмотр
- Г. Численности трудоспособного населения

Эпидемиологическое стоматологическое обследование населения проводят специалисты

- А. Стоматологические медицинские сестры
- Б. Гигиенисты
- В. Врачи-эпидемиологи
- Г. Врачи-стоматологи

О наличии пародонтального кармана судят по

- А. Кровоточивости десны
- Б. Погружению зонда на глубину 3 мм и более
- В. Погружению зонда на глубину менее 3 мм
- Г. Изменению на рентгенограмме

Клиническим методом диагностики кандидоза является

- А. Исследование мазка на наличие флоры
- Б. Опрос
- В. Клинический анализ крови
- Г. Рентгенография

Детектор кариеса используют для выявления _____ дентина

- А. Вторичного
- Б. Иррегулярного
- В. Третичного
- Г. Кариозного

При электроодонтодиагностике пассивный электрод фиксируется

- А. На шее
- Б. На губе пациента
- В. На плече
- Г. В руке пациента

Специфическим лимфаденитом называется лимфаденит, вызванный

- А. Кишечной палочкой
- Б. Стрептококком
- В. Лучистым грибом
- Г. Стафилококком в сочетании со стрептококком

При пломбировании амальгамой кариозных полостей II класса в качестве изолирующей прокладки применяют

- А. Силицин
- Б. Цинк-сульфатный цемент
- В. Фосфат-цемент
- Г. Искусственный дентин (дентин-паста)

Пломбирование каналов молочных резцов с разрушенной коронкой производят

- А. Фосфат-цементом
- Б. Водным дентином
- В. Пастой из окиси цинка на масляной основе
- Г. Штифтом

При обнажении поверхности корня зуба на 6 мм и кармане в 5 мм следует предположить

- А. Язвенно-некротический гингивит
- Б. Пародонтит тяжелой степени
- В. Фиброматоз десны
- Г. Гипертрофический гингивит фиброзной формы

Площадь стоматологического кабинета должна составлять не менее (в кв.м)

- А. 7
- Б. 14
- В. 12
- Г. 10

Равномерное горизонтальное снижение высоты межальвеолярных перегородок до 1/3 является рентгенологическим признаком _____ степени

- А. Пародонтоза легкой
- Б. Пародонтоза средней
- В. Пародонтита средней
- Г. Пародонтита легкой

Доза фтора в питьевой воде, при которой развивается деструктивная форма флюороза, составляет

- А. 1 Мг/л
- Б. 0,5 Мг/л
- В. 2–3 Мг/л
- Г. 7–9 И выше мг/л

Для некротизации пульпы достаточно мышьяковистой пасты (в г)

- А. 0,1
- Б. 0,001
- В. 0,01
- Г. 0,0008

Пародонтальную повязку применяют для

- А. Шинирования зубов перед операцией
- Б. Защиты кровяного сгустка от внешних воздействий после кюретажа
- В. Шинирования зубов после операции
- Г. Заполнения кармана во время гингивэктомии

При фиксации абатмента к аналогу имплантата на разборной рабочей модели следует прикладывать усилие (в н/см²)

- А. 25
- Б. 10
- В. 15
- Г. 35

Для удаления измененного дентина используют ____ бор

- А. Пламевидный
- Б. Шаровидный с алмазным напылением
- В. Шаровидный твердосплавный
- Г. Фиссурный

Согласно современным санитарно-эпидемиологическим требованиям количество установок в кабинете терапевтической стоматологии не должно превышать

- А. Пяти
- Б. Четырех
- В. Трех
- Г. Двух

Эпителий зубного зачатка является основой для образования

- А. Цемента
- Б. Дентина, пульпы
- В. Эмали, насмитовой оболочки
- Г. Альвеолярной костной ткани

К клинической картине при полном вывихе временного или постоянного зуба относится

- А. Укорочение видимой части коронки
- Б. Пустая лунка зуба
- В. Увеличение видимой части коронки
- Г. Смещение коронки в сторону

Хронический гипертрофический пульпит является следствием

- А. Острого очагового пульпита
- Б. Хронического фиброзного пульпита (длительное течение)
- В. Глубокого кариеса
- Г. Хронического гангренозного пульпита

Ориентиром вкола иглы при анестезии верхнечелюстного нерва по вайсблату является

- А. Середина трагоорбитальной линии
- Б. Скулоальвеолярный гребень
- В. Крыло носа
- Г. Суставной бугорок

К клинической характеристике эмали зубов при системной гипоплазии относят

- А. Хрупкую, слущивающуюся эмаль
- Б. Меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- В. Симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации
- Г. Окрашивание коронок зубов в жёлтый цвет

Для обработки воспаленной слизистой оболочки рта детей первых месяцев жизни применяют _____ пероксида водорода раствор (в процентах)

- А. 3
- Б. 0,5
- В. 10
- Г. 2

Для определения центральной окклюзии в клинику поступают гипсовые модели

- А. С восковыми базисами и окклюзионными валиками
- Б. С восковыми базисами и искусственными зубами
- В. С восковыми базисами, установленные в окклюдатор
- Г. Установленные в артикулятор

Детям рекомендуется использовать фторидсодержащие ополаскиватели с возраста (лет)

- А. 6
- Б. 12
- В. 2
- Г. 4

Первый постоянный моляр прорезывается в возрасте (лет)

- А. 6
- Б. 4
- В. 10
- Г. 12

Наиболее неблагоприятным при развитии заболеваний пародонта является _____ прикус

- А. Дистальный
- Б. Открытый
- В. Прямой
- Г. Глубокий

К эндогенной причине развития повышенного стирания зубов относят

- А. Профессиональные вредности
- Б. Зубочелюстные аномалии
- В. Нарушение функции эндокринной системы
- Г. Функциональную перегрузку зубов

Чаще всего причиной одонтогенного остеомиелита челюстей в период временного прикуса являются

- А. Боковые резцы
- Б. Клыки
- В. Центральные резцы
- Г. Моляры

При удалении нижнего второго моляра проводят анестезию

- А. По Берше
- Б. Торусальную по Вейсбрем
- В. По Егорову
- Г. По Гоу-Гейтсу

Методом стоматологического просвещения является

- А. Выставки средств гигиены
- Б. Беседа с пациентом
- В. Брошюры и буклеты
- Г. Телевизионная реклама

Самостоятельное использование флоссов рекомендуется с возраста _____ лет

- А. 4-5
- Б. 6-8
- В. 9-12
- Г. 15-16

Одним из методов лечения зубов при системной гипоплазии эмали является

- А. Удаление наиболее пораженных зубов с последующим ортодонтическим лечением
- Б. Электроодонтодиагностика
- В. Внутрикоронковое отбеливание
- Г. Микроабразивное препарирование с последующей реставрацией

При начальных формах кариеса временных зубов применяют

- А. Нитрат серебра 20-30%
- Б. Нитрат серебра 0,5%
- В. Протеолитические ферменты
- Г. Иодиол

Разлитое острое гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов называется

- А. Рожистое воспаление
- Б. Фурункул
- В. Карбункул
- Г. Абсцесс

Поперечный срез рабочей части к-file имеет форму

- А. Квадратную
- Б. Круглую
- В. Треугольную
- Г. Овальную

Метод выявления путей введения протеза при параллелометрии

- А. Горизонтальный
- Б. Смешанный
- В. Вертикальный
- Г. Выбора

Симптом никольского при многоформной экссудативной эритеме

- А. Положительный
- Б. Отрицательный
- В. Зависит от этиологии заболевания
- Г. Положительный при тяжелой форме

Боли при остром гнойном периодонтите характеризуются как

- А. Острые, пульсирующие, иррадиирующие
- Б. Острые, пульсирующие, иррадиируют, усиливаются по ночам, накусывание на зуб безболезненное
- В. Острые, пульсирующие, иррадиирующие, усиливаются в горизонтальном положении и физической нагрузке
- Г. Ноющие, нерезко выраженные, не иррадиируют по ходу ветвей тройничного нерва, усиливаются при накусывании

Метод хирургического лечения пародонтита при глубине пародонтального кармана до 4 мм предполагает осуществление

- А. Лоскутной операции
- Б. Гингивэктомии
- В. Кюретажа карманов
- Г. Гингивотомии

Спина врача стоматолога при работе с микроскопом фиксируется

- А. В полусогнутом положении
- Б. В прямом положении
- В. В зависимости от позиции пациента
- Г. Сбоку от пациента

Для ускорения заживления элементов при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите (храс) применяют

- А. Мазь клотримазол
- Б. Флореналевую мазь
- В. Гель солкосерил
- Г. Мазь ацикловир

Длина пульпоэкстрактора для фронтальных зубов верхней челюсти равна (в мм)

- А. 44
- Б. 22
- В. 41
- Г. 46

Глубина кабинета терапевтической стоматологии должна быть не более (в метрах)

- А. 6
- Б. 8
- В. 20
- Г. 15

При препарировании зуба самой болезненной зоной является

- А. Дентинно-цементное соединение
- Б. Эмалево-дентинное соединение
- В. Эмаль
- Г. Цемент

Лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия об их возврате с мотивированным обоснованием причин возврата в течение срока

- А. 30 Дней
- Б. В день приема заявления
- В. От 3 до 7 рабочих дней
- Г. 3 Рабочих дней

Наиболее неблагоприятным при развитии заболеваний пародонта является _____ прикус

- А. Перекрестный
- Б. Глубокий
- В. Открытый
- Г. Прямой

Цветом зубов, лучше всего поддающимся отбеливанию является

- А. Серо-коричневый
- Б. Розово-красный
- В. Серо-красный
- Г. Желто-коричневый

Заболеванием, при котором прорезывается один зуб изменённой формы, является

- А. Флюороз
- Б. Системная гипоплазия
- В. Синдром Стентона - Капдепона
- Г. Местная гипоплазия

Оптимальная концентрация фтора в питьевой воде умеренных широт составляет (в мг/л)

- А. 2,0-3,0
- Б. 1,0-1,2
- В. 0,5-0,9
- Г. 0,3-0,8

По методу изготовления коронки делятся на

- А. Литые, штампованные, полимеризованные, фрезерованные, лазерного спекания
- Б. Металлические, фарфоровые, ситалловые, пластмассовые, комбинированные
- В. Полные, полукоронки, экваторные, окончатые, трехчетвертные, телескопические, культевые
- Г. Провизорные, восстановительные, фиксирующие, шинирующие, ортодонтические

При выдаче листка нетрудоспособности на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности, либо в связи с его порчей или утерей по решению врачебной комиссии взамен ранее выданного листка нетрудоспособности

- А. Оформляется выписка из протокола врачебной комиссии
- Б. Оформляется дубликат листка нетрудоспособности
- В. Допускается выдача дуплета листка нетрудоспособности
- Г. Оформляется копия листка нетрудоспособности с внесенными в нее исправлениями

Клювовидными щипцами со сходящимися щечками удаляют _____ челюсти

- А. 3-И моляры верхней
- Б. Резцы нижней
- В. Корни зубов нижней
- Г. Премоляры верхней

Микроретенция пломбировочного материала характеризуется

- А. Проникновением адгезива и пломбировочного материала в микропространства протравленной эмали
- Б. Фиксацией пломбы за счет анкеров, пинов, постов
- В. Фиксацией пломбы за счет конвергенции стенок кариозной полости
- Г. Фиксацией пломбировочного материала в ретенционных пунктах

Количество лимфоцитов в мазке крови здорового взрослого человека (на 100 клеток) составляет (в процентах)

- А. 5-10
- Б. 20-30
- В. 40-50
- Г. 10-15

Температурный режим, поддерживаемый в стоматологическом кабинете в холодное время года, составляет (в градусах)

- А. 18-23
- Б. 23-28
- В. 15-16
- Г. 17-18

Наиболее частой причиной пульпита во временных молярах является

- А. Химическая травма пульпы
- Б. Термическая травма пульпы
- В. Механическая травма пульпы
- Г. Инфицирование из кариозной полости

Для инфильтрационной анестезии в стоматологии применяют раствор артикаина в концентрации (в процентах)

- А. 4
- Б. 1
- В. 0,5
- Г. 2

При препарировании зуба под фарфоровую коронку создают _____ под углом _____ градусов

- А. Уступ-скос; 90 только с вестибулярной стороны
- Б. Уступ-скос; 135 только с вестибулярной стороны
- В. Циркулярный уступ; 90
- Г. Циркулярный уступ; 135

К местным противопоказаниям к проведению отбеливания относят

- А. Молочные зубы у детей
- Б. Беременность
- В. Аллергию на перекись
- Г. Наличие гиперестезии

При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть

- А. Отклонена назад
- Б. Отклонена вправо
- В. Отклонена назад и влево
- Г. Наклонена вперед

Предпочтительным методом лечения при пульпите постоянных моляров у ребенка 6 лет является

- А. Девитальная экстирпация
- Б. Витальная экстирпация
- В. Девитальная ампутация
- Г. Витальная ампутация

К антидотам мышьяковистой кислоты относят

- А. Метронидазол (трихопол)
- Б. Препараты йода
- В. Препараты брома
- Г. Облепиховое масло

Дифференциальный диагноз хронического фиброзного периодонтита, кроме других форм периодонтита, проводится

- А. С хроническим гранулематозным периодонтитом
- Б. С хроническим гранулирующим периодонтитом
- В. С хроническим фиброзным пульпитом
- Г. Со средним кариесом

Контрольное обследование послеоперационной области после кюретажа целесообразно провести через

- А. 1 Год
- Б. 1 Месяц
- В. 6 Месяцев
- Г. 1 Неделю

К показаниям к премедикации относят

- А. Сопутствующие заболевания органов кровообращения
- Б. Выраженный страх перед стоматологическим вмешательством
- В. Обширность стоматологического вмешательства
- Г. Сопутствующие заболевания органов дыхания

Маргинальной является десна

- А. Покрывающая нёбо
- Б. Окружающая зуб, включая десневой сосочек
- В. Окружающая зуб без десневого сосочка
- Г. Покрывающая альвеолярный отросток

Маркерным заболеванием полости рта, сопровождающим ВИЧ-инфекцию, является

- А. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит
- Б. Хронический рецидивирующий герпетический стоматит
- В. Глоссалгия
- Г. Плоский лишай

При лечении кариеса цемента предпочтительнее использовать пломбировочный материал

- А. Композит
- Б. Амальгама
- В. Стеклоиономерный цемент
- Г. Компомер

Сроки формирования секвестров при одонтогенном остеомиелите нижней челюсти составляют

- А. 6 Месяцев
- Б. 3-5 Недель
- В. 6-7 Недель и более
- Г. 10-12 Суток

Основным преимуществом амальгамы без гамма-2-фазы является

- А. Изменение объема
- Б. Устойчивость к коррозии
- В. Рентгеноконтрастность
- Г. Пластичность

К возможному изменению при местной гипоплазии эмали относят

- А. Пятна на зубах одного периода минерализации
- Б. «Рифленую» эмаль на всех зубах
- В. Облитерацию полостей всех зубов
- Г. Пигментированное пятно на эмали одного зуба

Гипертрофический гингивит фиброзной формы дифференцируют с

- А. Герпетическим гингивостоматитом
- Б. Пародонтозом
- В. Гингивитом Венсана
- Г. Эпулисом

Кламмер, имеющий две окклюзионные накладки, расположенные в смежных фиссурах моляров или премоляров и по два плеча с каждой стороны на каждом зубе, называют кламмером

- А. Бонвиля
- Б. Аккера
- В. Кемени
- Г. Роуча

Наличие ложного кармана является признаком хронического

- А. Простого маргинального гингивита
- Б. Язвенного гингивита
- В. Гиперпластического гингивита
- Г. Пародонтита

При системной гипоплазии эмали поражаются

- А. Только первые моляры
- Б. Временные и постоянные резцы
- В. Зубы одного периода формирования
- Г. Зубы-антагонисты

Значение индекса рецессии десны (s. Stahl, a. Morris) 26-50% соответствует _____ степени

- А. Тяжелой?
- Б. Средней?
- В. Начальной?
- Г. Легкой?

Клинический признак, характерный для дисплазии капдепона

- А. «Гипсовые» зубы
- Б. «Рифленые» зубы
- В. Стираемость твердых тканей зуба без обнажения пульпы
- Г. Наличие ночных болей с иррадиацией по ветвям тройничного нерва

Дифференциальный диагноз обострения хронического пульпита проводится с

- А. Острым периодонтитом
- Б. Гиперемией пульпы
- В. Хроническим апикальным периодонтитом
- Г. Острыми формами пульпита

Дифференциальную диагностику кариеса эмали проводят с

- А. Кариесом дентина
- Б. Очаговым пульпитом
- В. Гипоплазией эмали
- Г. Гиперемией пульпы

Пластика десны по miller проводится

- А. Прямым закрытием свободным десневым трансплантатом
- Б. С боковым смещением лоскута
- В. С коронковым смещением лоскута
- Г. Полулунным лоскутом с коронковым смещением

Основным хирургическим методом лечения сиалолитиаза поднижнечелюстной слюнной железы (если конкремент в железе) является

- А. Пластика выводного протока
- Б. Экстирпация железы
- В. Удаление конкремента
- Г. Рассечение стеноза протока

При проведении эндодонтического лечения зуба

4.3 наиболее эффективным методом обезболивания является _____ анестезия

- А. Торусальная
- Б. Резцовая
- В. Инфильтрационная
- Г. Мандибулярная

Каким эпителием выстлана верхнечелюстная пазуха у взрослых

- А. Многослойным мерцательным
- Б. Плоским неороговевающим
- В. Цилиндрическим
- Г. Кубическим

Для пломбирования кариозной полости 2 класса во временном зубе с несформированным корнем применяют

- А. Стеклоиономерные цементы
- Б. Композиты химического отверждения
- В. Композиты светового отверждения
- Г. Цинкфосфатные цементы

При остром гнойном периостите причинный временный однокорневой зуб следует

- А. Пломбировать и произвести резекцию верхушки корня
- Б. Шинировать
- В. Удалить
- Г. Трепанировать и пломбировать

Первой стадией созревания пластмассы является стадия

- А. Тянувшихся нитей
- Б. Тестообразная
- В. Мокрого песка
- Г. Резиноподобная

В сплав 900-й пробы золота входит меди _%

- А. 5,5
- Б. 5,0
- В. 8,5
- Г. 6,0

Десневой край стандартных металлических коронок укорачивают

- А. Ножницами для металла
- Б. Полировочным диском
- В. Бором с алмазным напылением
- Г. Полировочной головкой для углового наконечника

Для уменьшения процессов резорбции костной ткани к.миш предложил концепцию

- А. Сбалансированной окклюзии протезов с опорой на имплантаты
- Б. Перераспределения жевательной нагрузки
- В. Двухэтапной методики имплантации
- Г. Постепенной прогрессивной нагрузки на кость

Показатель обеспеченности населения врачебным, средним и младшим медицинским персоналом вычисляется в

- А. Проценте
- Б. Продецимилле
- В. Показателе наглядности
- Г. Промиле

Овальная форма поражения твердых тканей зубов характерна для

- А. Кариеса
- Б. Мраморной болезни
- В. Клиновидного дефекта
- Г. Эрозии эмали

Чрезмерное утолщение рогового слоя эпителия

- А. Акантолиз
- Б. Спонгиоз
- В. Вакуольная дистрофия
- Г. Гиперкератоз

Определение функционального состояния пульпы зуба осуществляется при проведении

- А. Рентгенопанорамной рентгенографии
- Б. Электроодонтодиагностики
- В. Рентгенографии
- Г. Термодиагностики

Вскрытие полости зуба интактных моляров верхней челюсти производят в области

- А. Передней фиссуры
- Б. Небного бугра
- В. Щечного бугра
- Г. Задней фиссуры

Альгинатные оттисковые материалы относятся к

- А. Кристаллизующимся материалам
- Б. Нанонаполненным материалам
- В. Обратимым гидроколлоидам
- Г. Необратимым гидроколлоидам

Повышение температуры тела характерно для

- А. Кариеса
- Б. Острого пульпита
- В. Периапикального абсцесса без свища
- Г. Хронического пульпита

Наиболее неблагоприятным сочетанием больничных показателей является _____ оборота койки и _____ летальности

- А. Увеличение; снижение
- Б. Уменьшение; увеличение
- В. Уменьшение; снижение
- Г. Увеличение; увеличение

Пастой на основе окиси цинка и эвгенола для пломбирования корневых каналов является

- А. Форфенан
- Б. Каласепт
- В. Апексит
- Г. Эндометазон

При формировании кариозной полости II класса дополнительная площадка служит для

- А. Профилактического иссечения
- Б. Укрепления зуба
- В. Эстетики
- Г. Улучшения фиксации пломбы

Среднее число дней работы койки в году вычисляется по формуле

- А. (Число проведенных больными койко-дней) / (число выписанных больных)
- Б. (Число выписанных больных) / (число среднегодовых коек)
- В. (Число койко-дней, фактически проведенных больными) / (число среднегодовых коек)
- Г. (Число койко-дней, фактически проведенных больными) / (число дней в году)

Индекс sr_i у взрослых даёт информацию о/об

- А. Степени тяжести флюороза
- Б. Интенсивности заболеваний пародонта
- В. Интенсивности кариеса зубов
- Г. Гигиеническом состоянии полости рта

Стимулирует слюноотделение

- А. Пилокарпин
- Б. Атропин
- В. Йодистый калий
- Г. Хлоргексидин

При благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности может быть сформирован и продлен до дня восстановления трудоспособности по решению врачебной комиссии, но на срок не более ____ месяцев с даты начала временной нетрудоспособности, а при лечении туберкулеза - не более ____ месяцев

- А. 10; 12
- Б. 8; 10
- В. 6; 8
- Г. 4; 6

Чаще воспаляется у детей слюнная железа

- А. Подъязычная
- Б. Малая губ
- В. Поднижнечелюстная
- Г. Околоушная

Для эпидемического паротита у детей характерно

- А. Одновременное поражение других слюнных желез
- Б. Гнойное расплавление паренхимы железы
- В. Наличие воспалительного инфильтрата
- Г. Выделение гноя из устья выводного протока

Вазоконстрикторы вызывают

- А. Расширение сосудов
- Б. Сужение сосудов
- В. Гиперемию кожных покровов
- Г. Анальгезию

Почему ишемизация тканей усиливает и пролонгирует действие анестетиков?

- А. Увеличивается всасывание анестетика в кровь
- Б. Уменьшается выделение медиаторов из пресинаптических везикул
- В. Сужение сосудов замедляет всасывание анестетика в кровь
- Г. Проявляется только резорбтивное действие

Ultracain ds forte содержит в своем составе адреналин в разведении

- А. 1 100000
- Б. 1 50000
- В. 1 200000
- Г. 1 150000

Операция удаления зуба показана при

- А. Хроническом фронтите
- Б. Хроническом гайморите
- В. Хроническом сфеноидите
- Г. Одонтогенном гемисинусите

Метод исследования пульсовых колебаний кровенаполнения сосудов пародонта, основанный на графической регистрации изменений полного электрического сопротивления тканей пародонта, называется

- А. Допплерография
- Б. Реопародонтография
- В. Флуориметрия
- Г. Гнатодинамометрия