

Тесты с вопросами по специальности «Стоматология общей практики» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog-praktik/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Стоматология общей практики» для аккредитации и других экзаменов (3600 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/o_stomatolog/

2) Тесты для аккредитации «Стоматология терапевтическая» (2700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_terapevt/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

ОСНОВНЫМ ПРИЧИНЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Курение
- Б. Сахарный диабет
- В. Пародонтопатогенная микрофлора
- Г. Сердечно-сосудистые заболевания
- Д. Подвижность зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ И КРАТНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОМ АППЛИКАЦИЙ.** Концентрация фторида: (%): 1 - 1 2 - 2 Кратность применения:

- А. Ежедневно
 - Б. 1 раз в неделю
 - В. 1 раз в месяц
 - Г. 1 раз в полгода
 - Д. 1 раз в год
- А. 1- Г, 2- Д
Б. 1- А, 2- Д
В. 1- Б, 2- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УДАЛЕНИИ ЗУБНОГО НАЛЕТА С КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОМОЩЬЮ ФЛОССОВ.** Действие:

- А. перемещение зубной нити и очищение контактной поверхности другого рядом стоящего зуба
 - Б. замена использованного участка зубной нити на новый чистый
 - В. накручивание зубной нити на средние пальцы обеих рук и фиксирование ее большими пальцами
 - Г. продвижение зубной нити по контактной поверхности одного из рядом стоящих зубов и ее очищение
 - Д. введение зубной нити в межзубный промежуток
 - Е. выведение зубной нити из межзубного промежутка
 - Ж. очищение контактных поверхностей следующих зубов
- А. 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-Е, 5-А, 6-Б, 7-Ж
Б. 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-А, 5-Е, 6-Б, 7-Ж
В. 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-А, 5-Е, 6-Ж, 7-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ И КРАТНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОМ ОПОЛАСКИВАНИЯ.** Концентрация фторида (%):

1. 0,05

2. 0,1

3. 0,2 Кратность применения:

А. 1 раз в год

Б. 1 раз в месяц

В. 1 раз в 2 недели

Г. 1 раз в неделю

Д. Ежедневно

А. 1-Д, 2- В, 3- Г

Б. 1-Д, 2- Г, 3- В

В. 1-А, 2- Г, 3- Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Острое начало заболевания, боль при глотании, высокая температура тела воспалительная контрактура нижней челюсти, припухлость и болезненность поднижнечелюстных и подподбородочной областей

Б. Острое начало, резкие боли, рот полуоткрыт, высокая температура, увеличение размеров и ограничение подвижности языка, затрудненное глотание и дыхание

В. Наличие разрушенного моляра нижней челюсти, гиперемия кожи, отечность, болезненность и припухлость мягких тканей поднижнечелюстной области

Г. Разлитая отечность мягких тканей щеки, сглаженность носогубной складки, болезненность открывания рта

Д. Тромбофлебит угловой вены, острый гнойный гайморит или обострение хронического гайморита

Е. Ограничение открывание рта, отечность и болезненность за бугром верхней челюсти, распирающая головная боль

1. Клинические признаки одонтогенной поднижнечелюстной флегмоны

2. Клинические признаки флегмоны дна полости рта

3. Клинические признаки флегмоны корня языка

4. Типичные причины флегмоны глазницы

5. Клинические признаки флегмоны щеки

6. Клинические признаки флегмоны крылонебной ямки

А. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6

Б. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 6, Е – 4

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 6

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Вид местного обезболивания:

А. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1:200 000.

Б. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000
Показания к применению:

1. Операция удаление зуба
- 2.6 у практически здорового пациента 18 лет
2. Операция удаление зуба
- 4.7 у практически здорового пациента 17 лет
3. Операция удаление зуба
- 3.5 у пациента 18 лет с гипертонической болезнью
4. Операция удаление зуба
- 1.4 у пациента 16 лет с диабетом в анамнезе
5. Операция удаление зуба
- 6.5 у пациента 10 лет

А. А-1,4,5,Б-1,3

Б. А-1,3,4,Б-1,5

В. А-1,3,4,5,Б-1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Понижение АД

Б.Повышение АД

В. Не влияет

Г. Барбитураты

Д. Миорелаксанты

Е. Атропин или метацин

1. Влияние эфира для наркоза на АД
2. Влияние фторотана на АД
3. Препараты, расслабляющие скелетную и дыхательную мускулатуру
4. Препараты, применяемые для подавления саливации при наркозе
5. Влияние кеталара на АД

А. А – 2, Б – 1,5, Д – 4, Е – 3

Б. А – 2, Б – 1,5, Д – 3, Е – 4

В. А – 1, Б – 2,5, Д – 3, Е – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Коринфар, капотен

Б. Аминокапроновая кислота или памба

В. Ятрогенное

Г. Идиопатическое

Д. Рутин или аскорутин

Е. фитоменадион или дицинон

1. При гипопротромбинемии для остановки кровотечения назначают:

2. Кровотечение, возникшее после хирургического вмешательства

3. При повышении фибринолитической активности для остановки кровотечения назначают:

4. Для остановки кровотечения при повышенной проницаемости сосудов назначают:

5. Для остановки кровотечения при повышенном АД назначают:

А. А – 5, Б – 3, В – 2, Д – 4, Е – 1

Б. А – 5, Б – 3, В – 2, Д – 1, Е – 4

В. А – 5, Б – 2, В – 3, Д – 4, Е – 1

ИНТЕРГЛОБУЛЯРНЫЙ ДЕНТИН - ЭТО:

А. Основное вещество между дентинными слоями

Б. Часть дентина, прилегающая к полости зуба

В. Отложения дентина в течении жизни человека

Г. Дентин, образующийся при патологии твердых тканей зуба

Д. Дентин, возникающий в процессе развития зуба

ВОЗБУДИТЕЛЕМ РОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

А. Эпидермальный стафилококк

Б. Пемолитический стрептококк

В. Бактероиды, клостридии

Г. Кишечная и синегнойная палочки

Д. Актиномицеты

КУРКОВЫЕ (ТРИГГЕРНЫЕ) ЗОНЫ ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ЭТО УЧАСТКИ

А. Гиперстезии

Б. Гипостезии

В. Раздражение которых провоцирует приступ боли

Г. Парастезии

Д. Анестезии

ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ ПО П КЛАССУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- А. Стеклоиономерный цемент
- Б. Поликарбоксилатный цемент
- В. Гибридный композиционный материал
- Г. Микрофильный композиционный материал
- Д. Компомер

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Безболезненный карбункул, на месте некроза образуется струп темного цвета, вокруг – стекловидный отек
- Б. Эритематозное пятно имеет следующий вид: центральная часть западает и имеет яркий розово – красный цвет, периферия очага возвышается
- В. Безболезненная, покрытая чешуйками эритема в виде «бабочки без крыльев»
- Г. Манифестация с язвенно – некротического стоматита или гингивита
- Д. Высыпания на коже, группы пузырьков с серозным содержимым по ходу нервных стволов

- 1. Характерные признаки номы
- 2. Характерные признаки сибирской язвы
- 3. Характерные признаки полиморфной экссудативной эритемы
- 4. Характерные признаки опоясывающего лишая
- 5. Характерные признаки эритематоза (красной волчанки)

- А. А – 2, Б – 3, В – 5, Г – 4, Д – 1
- Б. А – 2, Б – 3, В – 5, Г – 1, Д – 4
- В. А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Установите соответствие между методами анестезии и возможностью её проведения у разных групп зубов. Методы анестезии:

- А. Инфильтрационная
- Б. Интралигаментарная Группы зубов:
- 1. центральные резцы
- 2. клыки
- 3. моляры нижней челюсти
- 4. моляры верхней челюсти
- 5. премоляры

- А. А-1, 3, 4, 5, Б-2, 4, 5
- Б. А-5, 2, 4, 5, Б-3, 4, 1
- В. А-1, 2, 4, 5, Б-3, 4, 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Не существует

Б. Хронический периодонтит

В. 1 – 3 и 8 – 9 месяцы

Г. 6 месяцев

Д. Период обострения

Е. 2 – 3 и 6 – 7 месяцы

1. Показание к плановому удалению зуба

2. Абсолютное противопоказание для удаления зуба

3. Сроки планового удаления зубов после инфаркта миокарда

4. Временное противопоказание к удалению зубов у беременных в следующие сроки

5. Временное противопоказание к удалению зубов при психических заболеваниях

А. А – 2, Б – 1, В – -, Г – 3, Д – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – -, Г – 5, Д – 3

В. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ МЕТОДА ВИТАЛЬНОГО ОКРАШИВАНИЯ ЭМАЛИ Действие:

А. ополаскивание полости рта водой, регистрация данных

Б. нанесение раствора метиленовой сини на эмаль

В. очищение зуба от налета

Г. изоляция от слюны

Д. высушивание эмали

А. 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-А, 5-Б

Б. 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-Б, 5-А

В. 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-Д, 5-А

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШТИФТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШТИФТА ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ КОРНЯ СОСТАВЛЯЕТ

А. 1/3

Б. 1/2

В. 2/3

Г. Всю длину корня

Д. Длина штифта не имеет значения

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОСТИ ПО V КЛАССУ СКОС ПРЕПАРИРУЮТ

- А. По эмали
- Б. По цементу корня
- В. По эмали и цементу корня
- Г. Не формируют
- Д. На усмотрение врача

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Признаки периодонтита**
- Б. Заболевания, характеризующиеся распространением воспалительного процесса с периодонта на надкостницу альвеолярного отростка и тело челюсти**
- В. Инфекционно – аллергический, гнойно – некротический процесс, который развивается в кости под воздействием внешних или внутренних факторов**
- Г. Очаги разрежения костной ткани различных размеров**
- Д. Удаление причинного зуба, декомпрессия тканей (в т.ч. костной), дренирование очагов воспаления**
- Е. Удаление или лечение причинного зуба (по показаниям), вскрытие абсцесса**
- 1. Периостит**
- 2. Остеомиелит**
- 3. Изменения на рентгенограмме при остром периостите**
- 4. Изменения на рентгенограмме при остром одонтогенном остеомиелите на ранних стадиях**
- 5. Оперативное лечение острого одонтогенного периостита**
- 6. Оперативное лечение острого одонтогенного остеомиелита**
- А. А – 3,4, Б – 1, В – 2, Д – 6, Е - 5
- Б. А – 4, Б – 1, В – 2, Д – 6, Е - 5
- В. А – 3,4, Б – 2, В – 1, Д – 6, Е - 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Зуб

Б. Белесоватым, мутным, тягучим

В. Кровянисто – бурый, без холестерина

Г. Холестеатомные массы

1. Содержимое амелобластомы нижней челюсти чаще бывает

2. Содержимое остеобластомы чаще бывает

3. Содержимое фолликулярной кисты

4. Содержимое эпидермоидной кисты представляет собой

А. А – 1, Б – 3, В – 2, Г – 4

Б. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4

В. А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Методы анестезии:

А. Инфильтрационная.

Б. Интралигаментарная.

В. Интрасептальная. Состав анестезирующего раствора:

1) 4% р-р артикаина + р-р адреналина 1:100 000;

2) 3% р-р мепивакаина;

3) 4% р-р артикаина + р-р адреналина 1:200 000;

4) 4% р-р артикаина.

А. А-1, 2, 3, Б-1, 3, В-1

Б. А-1, 2, 3, Б-1, 3, В-1, 3

В. А-1, 2, Б-1, 3, В-1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. 10 лет

Б. 6 лет

В. Чрезмерно развитая пазуха, распространяющаяся даже в отростке верхнечелюстной кости

Г. Малые размеры верхнечелюстной пазухи

Д. Боль, чувство тяжести, давления и напряжения в соответствующей половине лица

Е. Выделение гноя или слизи из соответствующей половины носа

1. Наиболее частые симптомы острого гайморита

2. Возраст ребенка, при котором размеры верхнечелюстной пазухи приближаются к таковым взрослого человека

3. Возраст ребенка, при котором нижняя стенка верхнечелюстной пазухи находится на одном уровне с дном полости носа

4. Пневматический тип верхнечелюстной пазухи

5. Возраст ребенка, когда нижняя граница верхнечелюстной пазухи лежит ниже уровня дна полости носа

А. А – 5, Б – 2, В – 3,4, Д – 1

Б. А – 5, Б – 2, 3, В – 1, Д – 4

В. А – 5, Б – 2, 3, В – 4, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Классы композитных материалов:

А. Текущие, жидкие

Б. Микронаполненные

В. Гибридные

Г. Универсальные

1. По размеру частиц наполнителя

2. По клиническому назначению

3. По плотности

4. По способу полимеризации

А. 1БВ, 2Г, 3А, 4--

Б. 1В, 2Г, 3А, 4--

В. 1БВ, 2ВГ, 3А, 4--

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА.** Действие:

А. проведение дополнительных методов обследования

Б. сбор анамнеза жизни

В. выявление жалоб

Г. внешний осмотр

Д. сбор анамнеза заболевания

Е. внутриротовой осмотр

А. 1- Б,В, Д, Г, Е, А

Б. 1- В, Б, Д, Г, Е, А

В. 1- А,В, Б, Д, Г, Е

МЕСТОМ ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ ПРИ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИЦЕВОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧКА В ОБЛАСТИ

А. Ветви нижней челюсти впереди козелка уха соответствующей стороны

Б. Основания нижней челюсти соответственно подбородочному отверстию

В. VII шейного позвонка

Г. Края нижней челюсти впереди жевательной мышцы

Д. Переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышц

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ

А. Приступообразные ночные боли длительностью 15-30 минут, иррадиирующие в ухо, висок

Б. Продолжительные, варьирующие по интенсивности боли, усиливающиеся при давлении по ходу нерва

В. Тупые длительные боли с чувством давления и напряжения в верхней челюсти, выделения из носа

Г. Продолжительные приступообразные боли с иррадиацией в ухо, хруст в височно-нижнечелюстном суставе

Д. Кратковременные интенсивные боли, возникающие от случайных раздражений без нарушений чувствительности

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР ЗУБА СТЕКЛОИОНОМЕРНЫМ ЦЕМЕНТОМ (СИЦ)**

Действие:

- А. изоляция от слюны
- Б. высушивание зуба
- В. очищение жевательной поверхности зуба от налета
- Г. проверка окклюзионной высоты прикуса
- Д. внесение СИЦ и распределение по фиссурам, отверждение

А. 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Д, 5-Г

Б. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д, 5-Г

В. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г, 5-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПОКРЫТИЯ ЗУБОВ ФТОРГЕЛЕМ** Действие:

- А. высушивание зубов перед покрытием фторгелем
- Б. покрытие зубов фторгелем
- В. очищение зубов от налета
- Г. изоляция от слюны ватными валиками
- Д. экспозиция фторгеля на зубах в течение 1-2 минут
- Е. рекомендации пациенту воздержаться от приема пищи в течение двух часов, от чистки зубов и приема очень твердой пищи в течение 12-24 часов

А. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б, 5-Д, 6-Е

Б. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б, 5-Е, 6-Д

В. 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б, 5-Д, 6-Е

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Базально – клеточный рак

Б. Внутриэпителиальный рак слизистой оболочки

В. Внутриэпидермальный кожный рак

Г. Разновидность старческой кератомы

Д. Злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментообразующих клеток

1. Кожный рог – это:

2. Болезнь Боуэна – это:

3. Эритроплазия Кейра – это:

4. Меланома – это:

5. Базалиома – это

А. А – 3, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 4

Б. А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 1, Д – 4

В. А – 5, Б – 3, В – 2, Г – 4, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Недоразвитие нижней челюсти

Б. Аномалия развития челюстных костей, характеризующаяся выступанием нижней челюсти вперед в следствие ее чрезмерного развития

В. Недоразвитие верхней челюсти

Г. Аномалия развития челюсти, характеризующаяся выдвинутым положением верхней челюсти вперед в следствие ее чрезмерного развития

1. Прогения – это:

2. Микрогения – это:

3. Прогения – это:

4. Микрогнатия – это:

А. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1

Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3

В. А – 1, Б – 3, В – 4, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Тиреоглоссальная киста

Б. Эктодермы

В. Бранхиогенная киста

Г. Энтодермы и эктодермы

Д. Кистозная тератома

1. Дермоидные кисты развиваются из:

2. Бранхиогенные кисты развиваются из:

3. Синоним дермоида

4. Синоним боковой кисты шеи

5. Синоним срединной кисты шеи

А. А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

Б. А – 5, Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

В. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Разрезание кости позади коронки нижнего «зуба мудрости»

Б. Воспаление мягких тканей, окружающих коронку зуба при его неполном и затрудненном прорезывании

В. Ретенция «зубов мудрости»

Г. Задержка сроков прорезывания нормально сформированного постоянного зуба

Д. Неправильное положение в зубном ряду прорезывавшегося зуба или его аномальное положение в челюсти

1. Ретенция зуба

2. Дистоция зуба

3. Перикоронит

4. Полулуние Вассмунда

5. Одна из причин краевой гнездной алопеции затылочной области

А. А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 1, Д – 2

В. А – 4, Б – 3, В – 5, Г – 2, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УДАЛЕНИИ ЗУБНОГО НАЛЕТА С КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОМОЩЬЮ ФЛОССОВ** Действие:

- А. перемещение зубной нити и очищение контактной поверхности другого рядом стоящего зуба
- Б. замена использованного участка зубной нити на новый чистый
- В. накручивание зубной нити на средние пальцы обеих рук и фиксирование ее указательными пальцами
- Г. продвижение зубной нити по контактной поверхности одного из рядом стоящих зубов и ее очищение
- Д. введение зубной нити в межзубный промежуток
- Е. выведение зубной нити из межзубного промежутка
- Ж. очищение контактных поверхностей следующих зубов

А. 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-А, 5-Е, 6-Ж, 7-Б

Б. 1-В, 2-Д, 3-Г, 4-А, 5-Е, 6-Б, 7-Ж

В. 1-В, 2-Д, 3-А, 4-Г, 5-Е, 6-Б, 7-Ж

ПОСЛЕ ФИКСАЦИИ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ЦЕМЕНТ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ ЯВИТЬСЯ В КЛИНИКУ ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО ОСМОТРА:

- А. Один раз в месяц
- Б. Один раз в полгода
- В. Один раз в год
- Г. Только при возникновении жалоб
- Д. По желанию пациента

ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В РАЗВИТИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Наследственность
- Б. Наличие микробного налета
- В. Вредные привычки
- Г. Подвижность зубов
- Д. Травма

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ВОСПАЛЕНИЯ ДЕСНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Деформация десневых сосочков
- Б. Некроз десневых сосочков
- В. Кровоточивость при зондировании десневых сосочков
- Г. Резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок
- Д. Наличие пародонтального кармана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Методы анестезии:

А. Инфильтрационная

Б. Интралигаментарная

В. Мандибулярная Длина инъекционной иглы:

1. 32мм;

2. 25 мм;

3. 16 мм;

4. 8 мм;

5. 10 мм;

6. 12 мм.

А. А-2,3, Б-3, 4, 5, 6, В-1

Б. А-2,3, Б-5, 4, 6, В-1,3

В. А-2,3, Б-3, 4, 5, 6, В-1,2

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ НАЗНАЧАЮТ
МАЗИ**

А. Фотозащитные

Б. Кортикостероидные

В. Противовоспалительные

Г. Антибактериальные

Д. Регенерирующие

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Не ранее, чем через 12 часов после травмы, гематома не выходит за пределы круговой мышцы глаза

Б. Звук треснувшего горшка, возникающий при постукивании по зубам поврежденной стороны

В. Ликворея, возникающая при переломе пирамиды височной кости

Г. Ликворея через дефект твердой мозговой оболочки в области пластинки решетчатой кости или в месте перелома клиновидной кости

Д. Боль по ходу щели перелома при надавливании указательным пальцем на крючки клювовидных отростков клиновидной кости

Е. Гематомы появляются сразу после травмы и имеют распространенный характер

1. При изолированных переломах верхней челюсти «симптом очков» появляется:

2. При изолированных переломах костей основания черепа «симптом очков» появляется:

3. Положительный симптом Малевича

4. Положительный симптом Герена

5. Назальная ликворея

6. Ушная ликворея

А. А – 2, Б – 3, В – 6, Г – 5, Д – 4, Е – 1

Б. А – 2, Б – 6, В – 5, Г – 3, Д – 4, Е – 1

В. А – 2, Б – 3, В – 6, Г – 4, Д – 5, Е – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ИНДЕКСА РНР** Действие:

А. интерпретация значения индекса

Б. окрашивание поверхностей индексных зубов

В. расчет индекса РНР по формуле

Г. определение кода для каждого зуба

А. 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

Б. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А

В. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Малые протоки подъязычной слюнной железы

Б. Проток околоушной слюнной железы

В. Проток поднижнечелюстной слюнной железы

Г. Общий проток подъязычной слюнной железы

1. Стенопов проток

2. Вартонов проток

3. Барталинов проток

4. Ривиниевы протоки

А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3

Б. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

В. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Клинические проявления:

А. Отсутствие эмали на определенном участке зуба

Б. Волнистая, точечная, борозчатая эмаль

В. Симметричные белые или желтые пятна

Г. Зубы Гетчинсона, Фурнье, Пфлюгера

1. Изменение цвета эмали

2. Недоразвитие эмали

3. Аплазия эмали

4. Недоразвитие дентина

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1Б, 2Б, 3В, 4А

В. 1А, 2В, 3В, 4Б

ДЛЯ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНО

А. Сильные кратковременные приступообразные боли

Б. Длительные ноющие боли

В. Кратковременные парестезии

Г. Длительные парестезии

Д. Симптом Венсана

КАКУЮ ФОРМУ ИМЕЕТ СУСТАВНАЯ ГОЛОВКА ВНЧС

- А. Шаровидную
- Б. Овальную
- В. Эллипсоидную
- Г. Цилиндрическую
- Д. Дисковидную

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Размер частиц Наполнителя:

А. 0,04-0,4 мкм

Б. 0,04-5 мкм

В. 8-45 мкм

Г. 1-5 мкм Класс композитного материала:

1. Макронаполненные

2. Микронаполненные

3. Мининаполненные

4. Гибридные

А. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Б. 1В, 2А, 3Г, 4Б

В. 1А, 2В, 3Г, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. 5 % раствором сульфата меди

Б. 1 – 2 % раствором лимонной или уксусной кислоты

В. 2 – 3 % раствором гидрокарбоната натрия

Г. 20 % раствором сахара (глюкозы)

Д. 4 – 5 % раствором гидрокарбоната натрия

1. Химическую нейтрализацию кислот проводят:

2. Химическую нейтрализацию щелочей проводят:

3. Химическую нейтрализацию негашеной извести проводят:

4. Химическую нейтрализацию солей тяжелых металлов проводят

5. Химическую нейтрализацию фосфора проводят:

А. А – 2, Б – 5, В – 1, Г – 3, Д – 4

Б. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 4, Д – 3

В. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Дифференцируют с:

А. Поверхностный кариес

Б. Клиновидный дефект

В. Несовершенный амелогенез

Г. Кислотный некроз

1. Флюороз

2. Гипоплазия эмали

3. Синдром Стейнтона-Капдепона

4. Эрозия

А. 1А, 2В, 3А, 4БАГ,

Б. 1А, 2А, 3В, 4БАГ,

В. 1А, 2А, 3В, 4БГ,

ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

А. Нарушение функции жевания

Б. Костная крепитация

В. Неправильный прикус

Г. Локальная боль, усиливающаяся при пальпации

Д. Гематома, отек окружающих тканей

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Инфекционная болезнь, которая характеризуется тяжелой интоксикацией, поражением кожи и лимфатического аппарата

Б. 8 – 10 дней

В. Инфекционное заболевание, протекающее в виде быстро прогрессирующей формы влажной гангрены лица, челюстей, тканей полости рта на фоне резкого снижения реактивности организма

Г. 15 – 18 дней

Д. Инфекционная болезнь, характеризующаяся очаговым серозным или серозно-геморрагическим воспалением кожи, лихорадкой и интоксикацией

Е. 12 – 14 дней

1. Цикл развития фурункулов

2. Цикл развития карбункулов

3. Рожь

4. Сибирская язва

5. Нома

А. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3, Д – 2

Б. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 5, Д – 3

В. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ** Действие:

А. обильное смачивание рыхлого ватного тампона реминерализующим раствором и размещение его на поверхности зубов

Б. высушивание зубов воздухом

В. экспозиция реминерализующего средства

Г. очищение зубов от зубных отложений

Д. изоляция зубов от слюны ватными валиками

Е. рекомендации пациенту

А. 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-А, 5-Е, 6-В

Б. 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-А, 5-В, 6-Е

В. 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-В, 5-А, 6-Е

ПРИ ТРАВМЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДИТ

- А. Перелом корня
- Б. Вывих
- В. Ушиб
- Г. Скол коронки зуба
- Д. Перелом зуба на уровне шейки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ АППЛИКАЦИИ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИМИ РАСТВОРАМИ Действие:

- А. рекомендации
- Б. очищение зубов от налета
- В. нанесение раствора на зубы
- Г. изоляция зубов от слюны
- Д. высушивание эмали зубов
- Е. экспозиция раствора
- Ж. удаление средства из полости рта

- А. 1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-В, 5-Е, 6-А, 7-Ж
- Б. 1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-В, 5-Е, 6-Ж, 7-А
- В. 1-Б, 2-Г, 3-Е, 4-В, 5-Д, 6-Ж, 7-А

ДЛЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ

- А. Кратковременные интенсивные боли, возникающие от случайных раздражений без нарушений чувствительности
- Б. Продолжительная, варьирующая по интенсивности боль, усиливающаяся при давлении по ходу нерва
- В. Продолжительные приступообразные боли с иррадиацией в ухо, хруст в височно-нижнечелюстном суставе
- Г. Тупые длительные боли с чувством давления и напряжения в верхней челюсти, выделения из носа
- Д. Приступообразные ночные боли длительностью 15-30 минут, иррадиирующие в ухо, висок

РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. Деформация десневых сосочков
- Б. Некроз десневых сосочков
- В. Кровоточивость при зондировании десневых сосочков
- Г. Резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок
- Д. Наличие пародонтального кармана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Низкий уровень иммунитета, выраженная сенсibilизация организма, слабовирулентная микрофлора

Б. Низкий уровень иммунитета, выраженная сенсibilизация организма и значительная вирулентность микрофлоры

В. Кариозные зубы, пародонтит, зубные отложения, тонзиллиты

Г. Достаточная напряженность иммунитета, низкий уровень сенсibilизации организма, высокая вирулентность микрофлоры

Д. Тонзиллиты

1. Наиболее частая причина сенсibilизации организма к хронической инфекции

2. Нормергическая форма воспаления наблюдается при

3. Гиперергическая форма воспаления развивается при

4. Гипоергическая форма воспалительной реакции возникает при

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Максимально допустимая доза:

А. 5 лет

Б. 27 лет Возраст пациента:

1. 2 мг/кг

2. 5 мг/кг

3. 7 мг/кг

4. 9 мг/кг

5. 12 мг/кг

А. А-1, Б-2

Б. А-2, Б-3

В. А-1, Б-3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Этиологический фактор:

- А.Неправильная чистка зубов щеткой
- Б.Эндокринные нарушения
- В.Наследственное нарушение
- Г.Заболевания пародонта Заболевание:

- 1.Пришеечный некроз
- 2.Несовершенный амелогенез
- 3.Мраморная болезнь
- 4.Клиновидный дефект

- А. 1Б, 2В, 3В, 4А
- Б. 1А, 2В, 3В, 4Б
- В. 1Б, 2Б, 3В, 4А

CEREC – ЭТО

- А. Система компьютерного изготовления вкладок и коронок
- Б. Система адгезионной фиксации безметалловых вкладок
- В. Система реставрации зубов стандартными керамическими вкладками
- Г. Воск для прямой моделировки вкладок
- Д. Система ультразвукового препарирования под стандартные керамические вкладки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. 120 – 160
- Б. 4,5 – 5
- В. 200 – 400
- Г. 0,8 – 1
- Д. 0 – 5 %
- Е. 20 – 30 %

- 1. Количество эритроцитов у здоровых людей ($\times 10^{12}$ в 1 л.)
- 2. Содержание гемоглобина в крови здоровых взрослых людей.
- 3. Цветовой показатель в норме
- 4. Количество тромбоцитов у здоровых людей ($\times 10^9$ в 1 л.)
- 5. Количество лимфоцитов в мазке крови взрослого человека (на 100 клеток)
- 6. Количество эритроцитов в мазке крови взрослого человека (на 100 клеток)

- А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 6, Е – 5
- Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5, Е – 6
- В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 6, Е – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Синдром Хеерфорда

Б. Болезнь Микулича

В. Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение

Г. Синдром Шегрена

1. Заболевание, для которого характерна триада: ксеростомия, ксерофтальмия, ревматоидный полиартрит

2. Заболевание слюнных желез, сходное по клинической картине с опухолью

3. Заболевание, при котором у больного увеличиваются все слюнные и слезные железы

4. Заболевание, сопровождающееся триадой: припухлость околоушной слюнной железы, иридоциклит, парез лицевого нерва

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 3, Б – 4, В – 2, Г – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Анестетик с вазоконстриктором:

А. Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000

Б. Артикаин 4% с эпинефрином 1: 200 000 Пациенты с общесоматической патологией:

1. Инфаркт миокарда

2. Инсульт

3. Гипертоническая болезнь

4. Диабет

5. Язвенная болезнь желудка

6. Калькулезный холецистит

А. А-2,3,4, Б-1,2,5

Б. А-2, А-5, Б-1,3,4

В. А-5,6, Б-1,2,3,4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Тавегил

Б. Метронидазол

В. Неспорообразующие анаэробы

Г. Гентамицин

Д. Стафилококки

1. Высокой активностью против неспорообразующих анаэробов обладают

2. Бета – лактомазу (пенициллиназу) выделяют

3. Ототоксическим действием обладает

4. Десенсибилизирующий препарат

А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3

В. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Не ранее, чем через 2 недели

Б. Гайморотомия с пластикой соустья

В. Можно, при наличии кровотечения

Г. Можно во всех случаях

Д. Нельзя

Е. Промывание пазухи растворами антисептиков, пластика соустья после ликвидации воспаления

1. Хирургическая тактика врача при перфорации верхнечелюстной пазухи во время удаления зуба на фоне острого гайморита (без наличия корня зуба в пазухе)

2. Метод удаления корня зуба, внедренного в верхнечелюстную пазуху

3. Можно ли тампонировать лунку йодоформным тампоном при перфорации дна верхнечелюстной пазухи?

4. Наиболее благоприятные сроки для удаления корня зуба, внедренного в мягкие ткани во время удаления

А. А – 4, Б – 2, Д – 3, Е – 1

Б. А – 4, Б – 2, Д – 1, Е – 3

В. А – 4, Б – 3, Д – 2, Е – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Хронический гнойный и гипертрофический альвеолит
 - Б. Рыхлая тампонада лунки йодоформным тампоном
 - В. Антисептические ванночки, противопоказано интенсивное полоскание полости рта
 - Г. «сухая лунка» или остеомиелит
 - Д. Серозная и гнойно-некротическая
1. Тактика врача при течении альвеолита в виде «сухой лунки»
 2. Рекомендации врача после удаления зуба
 3. Формы течения альвеолита
 4. Острые формы альвеолита
 5. Хронические формы альвеолита
- А. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4
Б. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4
В. А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Из эпителиального и мезенхимального компонентов
 - Б. Одонтогенная опухоль
 - В. Из эпителиальных тканей
 - Г. Порог развития зубных тканей
1. Амелобластома – это:
 2. Одонтома – это:
 3. Амелобластома развивается
 4. Одонтома развивается
- А. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2
Б. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1
В. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

ПРИ КЛИНИКЕ ОСТРОГО ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- А. Диабет
- Б. Заболевания крови
- В. Гастрит
- Г. Язвенную болезнь желудка
- Д. Острый панкреатит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Строфантин, коргликон

Б. Бемебрид

В. Эуфиллин, дипрофиллин

Г. Кордиамин

Д. Нитроглицерин, изокет, нитроминт

1. Дыхательные analeptiki

2. Сердечные гликозиды

3. Антагонист гексенала и тиопентала натрия

4. Бронхолитики

5. Антиангинальные препараты

А. А – 1, Б – 3, В – 4, Г – 2, Д – 5

Б. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1, Д – 5

В. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 5, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Определение:

А. Плотное образование, состоящее из бактерий, расположенных в матрице

Б. Бесструктурное образование, состоящее из гликопротеидов слюны

В. Скопление бактерий, плотно фиксированных на поверхности зуба

Г. Твердые зубные отложения, как результат кальцификации зубного налета

Поверхностные образования на зубах:

1. Пелликула

2. Зубная бляшка

3. Зубной налет

4. Зубной камень

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1Б, 2В, 3А, 4Г

В. 1Б, 2А, 3В, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Основа метода:

А. Применение Carisolve для коагуляции кариозного дентина и дальнейшего его удаления

Б. Использование наконечника «Соникфлекс»

В. Применение ротационных и ручных инструментов

Г. Действие фокусированного потока частиц оксида алюминия Методы препарирования твердых тканей:

1. Механический

2. Химико-механический

3. Воздушно-абразивный

4. Пневматический

А. 1В, 2Б, 3Г, 4А

Б. 1Г, 2А, 3В, 4Б

В. 1В, 2А, 3Г, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Методы лечения:

А. Реминерализация.

Б. Пломбирование

В. Изготовление винира.

Г. Изготовление искусственной коронки. Заболевание:

1. Эрозия

2. Клиновидный дефект

3. Несовершенный амелогенез.

4. Флюороз

А. 1АВГ, 2АБВ, 3АГ, 4ВГ

Б. 1АБВГ, 2АБ, 3АГ, 4ВГ

В. 1АБВ, 2АБ, 3АГ, 4ВГ

ПРИКУС-ЭТО ВИД СМЫКАНИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ В ПОЛОЖЕНИИ ОККЛЮЗИИ:

А. Центральной

Б. Боковой левой

В. Передней

Г. Дистальной

Д. Боковой правой

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. От нескольких месяцев до нескольких лет
- Б. Двустороннее поражение
- В. Одностороннее поражение
- Г. Обычно изменений нет, редко – расширение суставной щели
- Д. Расширение или сужение суставной щели, остеопороз
- Е. 2 – 3 месяца
- Ж. До 1 года
- 1. Для ревматоидного артрита ВНЧС характерно
- 2. Для контактного артрита ВНЧС характерно
- 3. Характерная рентгенологическая картина острого артрита ВНЧС
- 4. Рентгенологическая симптоматика хронического артрита ВНЧС
- 5. Длительность течения острого артрита ВНЧС
- 6. Длительность течения хронического артрита ВНЧС
- А. А – 6, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4, Е – 5
- Б. А – 6, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5, Е – 4
- В. А – 6, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4, Е – 5

ЭНДОДОНТ ВКЛЮЧАЕТ

- А. Пульпу и дентин
- Б. Пульпу зуба
- В. Пульпу зуба, периодонтальную связку,
- Г. Пульпу зуба, периодонтальную связку, альвеолу
- Д. Пульпу зуба, периодонтальную связку, альвеолу, десну

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛЕО-ЛАМПЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ

- А. Гипертонической болезни компенсируемой формы
- Б. Сердечно-сосудистой недостаточности компенсируемой формы
- В. Сердечно-сосудистой недостаточности, компенсируемой электрокардиостимулятором
- Г. Сердечно-легочной недостаточности компенсированной формы
- Д. Сердечно-легочной недостаточности декомпенсированной формы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Методы реставрации:

А.Пломба

Б.Прямой винир

В.Непрямой винир

Г.Искусственная коронка Показания:

1.Изменения цвета зуба после эндодонтического лечения

2.Незначительный по площади клиновидный дефект

3.Диастема

4.Флюороз

А. 1БВ, 2А, 3БВГ, 4БВ

Б. 1БВ, 2А, 3БВ, 4БВ

В. 1БВ, 2БА, 3БВГ, 4БВ

ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРИОСТИТЕ ЧЕЛЮСТИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ

А. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, дренирование раны, удаление причинного зуба

Б. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, назначение антибиотиков, ротовых ванн, УВЧ

В. Удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн

Г. Вскрытие поднадкостничного абсцесса, дренирование раны, удаление причинного зуба, назначение сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн

Д. Медикаментозная терапия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Осложнения:

А.Отсутствие сухого блеска

Б.Дебондинг

В.Ожог пульпы

Г.Интоксикация пульпы Ошибки при изготовлении прямых виниров:

1.при препарировании

2.при протравливании и нанесении адгезива

3.при работе с композитом

4.при шлифовании и полировании

А. 1Г, 2В, 3Б, 4А

Б. 1В, 2Г, 3Б, 4А

В. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Определение:

А. Число людей, имеющих заболевание на момент обследования

Б. Число пораженных, удаленных и пломбированных зубов на одного обследованного

Г. Число новых случаев заболевания за определенный промежуток времени Показатель:

1. Заболеваемость

2. Распространенность

3. Интенсивность

А. 1Г, 2А, 3Б

Б. 1Г, 2А, 3Б

В. 1А, 2Г, 3Б

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОКАЗАНЫ ДЛЯ ЛИЦ

А. Кариесвосприимчивых

Б. Кариерезистентных

В. Молодого возраста

Г. В детском возрасте.

Д. Пожилого возраста

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Монокультура анаэробов

Б. Гиперкапния, аэрация тканей

В. Аэробы, факультативные и облигатные анаэробы

Г. Бактероиды, фузобактерии

Д. Монокультура стафилококка

Е. Кишечная палочка, протей

1. Бактерии, вызывающие гнойно – воспалительные процессы в челюстно - лицевой области

2. К облигатным неспорообразующим бактериям относятся

3. Условия не способствующие развитию бактериальной инфекции

4. При нагноении лимфоузлов из гнойных очагов высеваются

5. Микроорганизмы, которые чаще всего высеваются при одонтогенных абсцессах

А. А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 2, Д – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 2, Д – 4

В. А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Заболевание:

А. Корневая киста остаточная

Б. Периапикальный абсцесс без свища

В. Корневая киста апикальная и боковая

Г. Хронический апикальный периодонтит Код по МКБ-10:

1. K04.5

2. K04.80

3. K04.7

4. K04.81

А. 1Г, 2В, 3Б, 4А

Б. 1Г, 2А, 3Б, 4В

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Ошибки и осложнения:

А. Нависающий край пломбы, отсутствие контактного пункта

Б. Термический ожог пульпы

В. Вскрытие полости зуба

Г. Дебондинг Этапы лечения, на которых совершены ошибки:

1. Препарирование полости

2. Наложение матрицы

3. Пломбирование полости

4. Полирование пломбы

А. 1БВ, 2А, 3АГ, 4--

Б. 1БВ, 2А, 3Г, 4--

В. 1В, 2А, 3Г, 4--

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

А. Острый периодонтит

Б. Обострившийся хронический периодонтит

В. Нагноившаяся радикулярная киста

Г. Общий гнойный пульпит

Д. Альвеолит

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Интенсивные приступообразные боли, зачастую – наличие «ауры» или раздражение триггерных зон перед приступом; вегетативные проявления

Б. Неврита

В. 1 месяц

Г. Невралгии

Д. Ноющие боли, часто постоянного характера, сопровождающиеся нарушением чувствительности и двигательными нарушениями

Е. 2 месяца

1. Клинические проявления неврита тройничного нерва

2. Клинические проявления невралгии тройничного нерва

3. Антиконвульсанты эффективны при лечении

4. Длительность болевого синдрома, при котором ставится диагноз хронической боли (при отсутствии морфологического субстрата)

А. А – 2, Г – 3, Д – 4, Е – 1

Б. А – 3, Г – 2, Д – 1, Е – 4

В. А – 2, Г – 3, Д – 1, Е – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Тенденция к группировке папул

Б. Повторное заражение этим же заболеванием после выздоровления

В. 3 – 4 недели

Г. 1 – 2 месяца

Д. Розеола, папулы, реже – пустулы

Е. Повторное заражение одним и тем же заболеванием у невылеченного больного

1. Реинфекция

2. Суперинфекция

3. Инкубационный период для первичного сифилиса

4. Проявления вторичного сифилиса на коже

5. Признаки рецидивирующего вторичного сифилиса

А. А – 5, Б – 1, В – 3, Д – 2, Е – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Д – 4, Е – 2

В. А – 1, Б – 5, В – 3, Д – 4, Е – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИРОТОВОГО ОСМОТРА** Действие:

А. определение состояния слизистой оболочки полости рта (языка, дна полости рта, щек, твердого и мягкого неба)

Б. определение прикуса

В. осмотр преддверия полости рта

Г. обследование зубных рядов и зубов

Д. оценка состояния тканей пародонта.

А. 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Д, 5-Г

Б. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г, 5-Д

В. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д, 5-Г

МИКРОПРОТЕЗ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБА И ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ВСЮ ОККЛЮЗИОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

А. Pinlay

Б. Inlay

В. Onlay

Г. Overlay

Д. Ney

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Тестовое задание №200 **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР ЗУБА СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМ ГЕРМЕТИКОМ.** Действие:

А. протравливание фиссуры кислотой

Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета

В. изоляция от слюны, высушивание зуба

Г. отмывание кислоты из фиссуры

Д. проверка окклюзионной высоты прикуса

Е. повторная изоляция зуба от слюны

Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам

З. высушивание протравленной поверхности фиссуры

И. отверждение герметика с помощью поляризационной лампы

А. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-Е, 6-З, 7-Ж, 8-Д, 9-И

Б. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-Ж, 6-З, 7-Е, 8-И, 9-Д

В. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-Е, 6-З, 7-Ж, 8-И, 9-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕИНВАЗИВНОЙ МЕТОДИКИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР**

Действие:

- А. протравливание фиссуры кислотой
- Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета
- В. изоляция от слюны, высушивание зуба
- Г. отмывание кислоты из фиссуры
- Д. проверка окклюзионной высоты прикуса
- Е. повторная изоляция зуба от слюны
- Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам, отверждение
- З. высушивание протравленной поверхности фиссуры.

А. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-З, 6-Е, 7-Ж, 8-Д

Б. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-Е, 6-З, 7-Ж, 8-Д

В. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А, 5-Е, 6-З, 7-Ж, 8-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Сложные эфиры
- Б. Амиды
- В. Этиловые эфиры
- Г. Артикаин и гидрохлорид
- Д. Барбитураты
- 1. Прилокаин относится к группе:
- 2. Мепивакаин относится к группе:
- 3. Бупивакаин относится к группе:
- 4. Ультракаин относится к группе:
- 5. Новокаин относится к группе:

А. А – 5, Б – 1,2, Г – 4,3

Б. А – 5, Б – 1,2,3, Г – 4

В. А – 2, Б – 1,3,4, Г – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЧИСТКИ ЗУБОВ** Действие:

- А. повторное определение гигиенического индекса
- Б. демонстрация пациенту метода чистки на обучающей модели зубов
- В. индивидуальный подбор средств гигиены полости рта
- Г. чистка зубов под контролем врача гигиениста стоматологического
- Д. определение гигиенического индекса

А. 1-Д, 2-Б, 3-Г, 4-А, 5-В

Б. 1-Д, 2-Б, 3-Г, 4-В, 5-А

В. 1-Д, 2-Г, 3-Б, 4-А, 5-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Болевой дисфункции
 - Б. Остром артрите
 - В. Артрозе
 - Г. Хроническом артрите
1. Костные структуры ВНЧС при рентгенологическом исследовании не изменены при:
 2. Склероз кортикальной пластинки суставной головки и бугорка наблюдается при:
 3. Наличие экзостозов на суставных поверхностях встречается при:
 4. Деформация суставной головки нижней челюсти наблюдается при:
 5. Уплотнение суставного бугорка происходит при:

А. А – 1, Б – 1, В – 2, 3, 4, 5

Б. А – 1, Б – 2, В – 3, 4, 5

В. А – 1, Б – 1,5, В – 2, 3, 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Группы методов местной анестезии:

А. Основные

Б. Дополнительные (пародонтальные) Методы анестезии:

1. мандибулярная;

2. торусальная;

3. инфильтрационная;

4. интралигаментарная;

5. инфраорбитальная;

6. внутрипульпарная;

7. интрасептальная.

А. А-1, 2, 3, 4, Б-5, 6, 7

Б. А-1, 2, 3, 5, Б-4, 6, 7

В. А-1, 2, 3, 6, Б-4, 5, 7

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Мази с НПВС

Б. Противовоспалительные болеутоляющие антигистаминные

В. Иммуномодуляторы

Г. До снятия острых воспалительных явлений

Д. После снятия острых воспалительных явлений

Е. Бишофит, медицинская желчь

1. Ортопедическое лечение при артритах проводится:

2. Препараты, применяемые для лечения острой фазы артрита ВНЧС

3. Препараты для местного лечения артритов в хронической фазе

4. Препараты для местного лечения артритов в острой фазе

А. А – 4, Б – 1, Д – 2, Е – 3

Б. А – 4, Б – 2, Д – 1, Е – 3

В. А – 4, Б – 2, Д – 3, Е – 1

РЕСТАВРАЦИЯ ПО МЕТОДИКЕ "ОТКРЫТОГО СЭНДВИЧА" - ЭТО:

А. Контактный пункт выполнен СИЦ, окклюзионная поверхность - композитом

Б. Перекрытие базовой подкладки из СИЦ композитом в области контактного пункта и с окклюзионной поверхности

В. Нанесение СИЦ на слой низкомолекулярного композита

Г. Контактный пункт выполнен композитом, окклюзионная поверхность - СИЦ

Д. Окклюзионная поверхность - композит, контактный пункт - амальгама

ПРИ ВКОЛОЧЕННОМ ВЫВИХЕ РЕЗЦОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Провести шинирование и оставить под наблюдение
- В. Репозировать
- Г. Депульпировать и репозировать
- Д. Удалить

СЛИВАЮЩИЕСЯ В РИСУНОК ПАПУЛЫ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ РТА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- А. Лейкоплакия
- Б. Герпес
- В. Красная волчанка
- Г. Плоский лишай
- Д. Опоясывающий лишай

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

- А. Имеет вид плотной ткани, по плотности соответствует кости
 - Б. Из соединительной ткани
 - В. Из лимфоидной ткани
 - Г. Из слизистой ткани
 - Д. Очаг деструкции кости с нечеткими границами
 - Е. Напоминает кисту
 - Ж. Очаг разрежения костной ткани без четких границ, репаративные процессы в окружающей кости отсутствуют
1. Развитие цементомы происходит
 2. Развитие миксомы происходит
 3. Проявление миксомы на рентгенограмме
 4. Проявление цементомы на рентгенограмме
 5. Проявления одонтогенной карциномы (первичного рака) нижней челюсти на рентгенограмме
- А. А – 1, Б – 4, Г – 2, Д – 3, Ж – 5
 - Б. А – 4, Б – 1, Г – 2, Д – 3, Ж – 5
 - В. А – 4, Б – 1, Г – 2, Д – 5, Ж – 3

ВЕРРУКОЗНУЮ ЛЕЙКОПЛАКИЮ ОТНОСЯТ

- А. К раку
- Б. К дерматозу
- В. К облигатному предраку
- Г. К факультативному предраку

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. С неба на ножке

Б. Удаление причинного зуба, назначение местных сосудосуживающих средств, ФТЛ

В. С вестибулярной поверхности вестибулярного отростка

Г. Удаление причинного зуба, пункции промывания пазухи, симптоматическое лечение

Д. Удаление причинного зуба, гайморитомия

1. Лечение острого одонтогенного серозного гайморита

2. Лечение острого одонтогенного гнойного гайморита

3. Лечение хронического одонтогенного гайморита

4. Чаще всего ороантральное сообщение закрывается путем слизисто-надкостничного лоскута взятого

А. Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3

Б. Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

В. Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Код МКБ-10:

А. K03.0 BК00.40

В. K03.2

Г. K00.52 Заболевание:

1. Эрозия зубов

2. Повышенное стирание зубов

3. Гипоплазия эмали

4. Незавершенный одонтогенез.

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1А, 2В, 3Б, 4Г

В. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Жалобы:

А. Незначительные болевые ощущения при накусывании на зуб

Б. Постоянные, постепенно нарастающие боли, «симптом выросшего зуба», болезненное накусывание на зуб

В. Постоянные ноющие, пульсирующие боли, болезненность при накусывании

Г. Часто протекает бессимптомно

1. Острый апикальный периодонтит

2. Хронический апикальный периодонтит

3. Корневая киста

4. Периапикальный абсцесс без свища

А. 1Б, 2А, 3В, 4Г

Б. 1Б, 2А, 3Г, 4В

В. 1Б, 2В, 3Г, 4А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Антистафилококковый иммуноглобулин

Б. 2 – 4 дня

В. 1 – 2 часа

Г. 1 - 2 месяца

Д. стафилококковый анатоксин

1. Сроки повышения резистентности организма после пассивной иммунизации

2. Сроки повышения резистентности организма после активной иммунизации

3. Сроки лечебного действия препарата при пассивной иммунизации

4. Средство активной иммунизации

5. Средство пассивной иммунизации

А. А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 4

Б. А – 5, Б – 3, В – 1, Г – 4, Д – 2

В. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 2, Д – 4

ДИАГНОЗ "ГЛУБОКИЙ КАРИЕС" СООТВЕТСТВУЕТ ДИАГНОЗУ ПО МКБ-10:

А. Карии эмали

Б. Карии дентина

В. Карии цемента

Г. Гиперемия пульпы

Д. Д) Рецидивирующий карии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Группы методов местной анестезии:

А. Инфильтрационные

Б. Проводниковые Методы анестезии:

1. инфильтрационная
 2. интралигаментарная
 3. резцовая
 4. небная
 5. торусальная
 6. интрасептальная
 7. мандибулярная
- А. А-1, 3, 6, Б-2, 4, 5, 7
Б. А-1, 2, 6, Б-3, 4, 5
В. А-1, 2, 6, Б-3, 4, 5, 7

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ АРТРИТА ВНЧС С ХРОНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ

- А. Выраженное сужение суставной щели, нарушение функции суставной головки.
Б. Незначительное расширение суставной щели, нарушение функции суставной головки.
В. Выраженное расширение суставной щели, нарушение функции суставной головки.
Г. Исчезновение наружных замыкающих кортикальных пластинок, краевые узур, остеопороз и кисты суставной головки
Д. Ширина суставной щели без изменений, нарушение функции суставной головки.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Вид местного обезболивания:

А. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000

Б. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артиакин 4% без вазоконстриктора (Ultracain D) Показания к применению:

1. Операция удаления зуба

1.4 у практически здорового пациента

2. Операция удаления зуба

3.8 у практически здорового пациента

3. Кюретаж пародонтальных карманов у пациента с диабетом в анамнезе

4. Операция вскрытия субпериостальный абсцесс у пациента с гипертонической болезнью в анамнезе

5. Операция удаления зуба

5.4 у пациента 10 лет

А. А-1, 5, Б-3, 4

Б. А-1, Б-3, 4, 5

В. А-1, Б-4, 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

А. Очаг интенсивного затемнения с четкими и ровными границами, окруженной полоской просветления шириной около 1 мм

Б. Неоднородный очаг округлой формы с чередованием участков разрежение и уплотнение

В. Гомогенный очаг затемнения округлой формы с четкими границами

Г. Гомогенный очаг затемнения нечеткими и неровными границами

Д. Очаг деструкции кости с нечеткими границами, окруженный ободком склерозированной ткани

1. Рентгенологическая картина губчатой остеомы челюсти

2. Рентгенологическая картина компактной остеомы челюсти

3. Рентгенологическая картина оссифицирующего периостита

4. Рентгенологическая картина одонтомы

5. Рентгенологическая картина остеонид - остеомы

А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д - 5

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д - 5

В. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д - 5

ТОННЕЛЬНОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА

- А. Резцах и клыках
- Б. Клыках и премолярах
- В. Премолярах и резцах
- Г. Молярах и премолярах
- Д. Молярах и резцах

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР ЗУБА ХИМИОТВЕРЖДАЕМЫМ ГЕРМЕТИКОМ.

Действие:

- А. протравливание фиссуры кислотой
- Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета
- В. изоляция от слюны, высушивание зуба
- Г. отмывание кислоты из фиссуры
- Д. проверка окклюзионной высоты прикуса
- Е. повторная изоляция зуба от слюны
- Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам, отверждение
- З. высушивание протравленной поверхности фиссуры.

- А. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-З, 7-Д, 8-Ж
- Б. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-Ж, 7-З, 8-Д
- В. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-З, 7-Ж, 8-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Групповая принадлежность:

- А. сложные эфиры
- Б. амиды Анестетики:
- 1. Лидокаин
- 2. Прокаин /новокаин
- 3. Артикаин
- 4. Мепивакаин
- 5. Тетракаин /дикаин

- А. А-2,5, Б-1,3,4
- Б. А-2,3,4, Б-1,2,5
- В. А-5,6,Б-1,2,3,4

ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ВРЕМЕННЫХ РЕЗЦОВ СО СФОРМИРОВАННЫМИ КОРНЯМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Удалить
- В. Зубы трепанировать, запломбировать за верхушки корней
- Г. Зубы трепанировать, запломбировать до верхушек корней
- Д. Репозиция зубов, их фиксация, наблюдение

ПРИЗНАКИ ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЯЗВЫ

- А. Усиление воспаления в окружности язвы
- Б. Уменьшение воспаления в окружности язвы
- В. Уплотнение краев и основания язвы
- Г. Усиление боли
- Д. Уменьшение боли

НАЛИЧИЕ У РЕБЕНКА УСТОЙЧИВОЙ ПРИВЫЧКИ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ПОСТОЯННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ЯЗЫКА МЕЖДУ ЗУБАМИ, ФОРМИРУЕТ:

- А. Мезиальную окклюзию
- Б. Глубокую резцовую окклюзию
- В. Дистальную окклюзию
- Г. Вертикальную резцовую дизокклюзию
- Д. Вестибулоокклюзию

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Хронический сиалэктатический паротит
 - Б. Эпидемический паротит
 - В. Острый серозный лимфаденит интракапсулярного лимфоузла околоушно-жевательной области
 - Г. Интерстициальный сиаладенит
 - Д. Слюнно-каменная болезнь
 - 1. Вирусный сиалoadенит
 - 2. Ложный паротит Герценберга
 - 3. Паренхиматозный паротит
 - 4. Калькулезный сиалoadенит
 - 5. Склерозирующий субмаксиллит
- А. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5, Д – 4
Б. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 5
В. А – 1, Б – 2, В – 3, Г – 5, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Плазматические клетки

Б. Эозинофилы

В. Нейтрофильный сдвиг влево

Г. 4 – 5 сутки

Д. Гигантские многоядерные клетки

Е. 2 – 3 сутки

1. Признаки острого воспалительного процесса в общем анализе крови

2. Цитологический признак медленного заживления раны

3. Признак патологического течения раневого процесса

4. Цитологический признак наличия в ране инородного тела

5. Сроки перехода от макрофагальной фазы в фибробластическую при раневом процессе

А. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4

Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4

В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Описание

А. Ткани зуба имеют разные цвета при различных условиях освещения

Б. Способность материалов приобретать вид окружающих тканей, сливаться с ними

В. Способность эмали при естественном освещении испускать бледное мерцание

Г. Способность зубов поглощать волны ультрафиолетового диапазона и испускать видимый, синеватый свет

1. Опалесценция

2. Флуоресценция

3. Метамерия

4. Эффект хамелеона

А. 1Г, 2В, 3А, 4Б

Б. 1В, 2А, 3Б, 4Г

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Решетчатой кости с разрывом слизистой оболочки

Б. Лобных отростков верхней челюсти и костей носа

В. Вниз

Г. Вниз и кнутри

1. Отломки при переломе скуловой дуги обычно смещаются:

2. В каком направлении возможна диплопия при значительном смещении отломков скуловой кости

3. Смещение костей носа у его основания указывает на перелом:

4. Подкожная крепитация при повреждении кости носа свидетельствует о переломе:

А. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Б. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

В. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Заболевание, в основе которого лежит нарушение чувствительности, выражающееся в приступообразных болях в зонах иннервации соответствующего нерва

Б. Полное отсутствие произвольных движений мышц

В. Уменьшение силы и (или) амплитуды произвольных движений мышц

Г. Состояние повышенной возбудимости нервной системы в сочетании с ее повышенной истощаемостью

Д. Места выхода ветвей тройничного нерва из костного отверстия в мягкие ткани

Е. Место нахождения триггерных (курковых) зон

1. Точки Валле

2. Невралгия

3. Неврит (невропатия)

4. Паралич

5. Парез

А. А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 5, Д – 1

Б. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 3

В. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Обширная деструкция костной ткани с зазубренными краями
- Б. Имеет вид мелких полостей, разделенных костными перегородками
- В. Очаг неравномерного интенсивного затемнения с неровными границами
- Г. Ограниченное разряжение костной ткани с четкими границами

1. Описание ячеистой формы остеобластомы
2. Описание солидной формы остеобластомы
3. Описание литической формы остеобластомы
4. Описание кистозной формы остеобластомы

- А. А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 4
- Б. А – 3, Б – 1, В – 4, Г – 2
- В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Особенности препарирования:

А. Полость формируется до видимо здоровых тканей, эмаль протравливается по краю и в области фиссур

Б. Иссечение всех пораженных кариесом тканей, расширение до иммунных зон

В. Полость формируется до видимо здоровых тканей, фиссуры раскрываются в пределах эмали

Г. Щадящее препарирование до видимо здоровых участков
Варианты профилактического пломбирования:

1. Создание ограниченного контура полости
2. Профилактическое пломбирование с неинвазивной герметизацией фиссур
3. Профилактическое пломбирование с инвазивной герметизацией фиссур
4. Расширенное профилактическое пломбирование

- А. 1Г, 2В, 3А, 4Б
- Б. 1Г, 2Б, 3В, 4А
- В. 1Г, 2А, 3В, 4Б

К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА ОТНОСЯТ

- А. Болезнь Боуэна
- Б. Болезнь Боуэна и пигментную ксеродермию;
- В. Болезнь Боуэна, актинический кератоз, предраковый меланоз
- Г. Болезнь Боуэна, бородавчатый (узелковый) предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз;
- Д. Болезнь Боуэна, абразивный хейлит Манганотти.

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Для иммобилизации отломков нижней челюсти в области угла

Б. Для иммобилизации отломков при линейных переломах нижней челюсти в пределах от центральных резцов до премоляров

В. Шина, фиксирующаяся на зубах верхней челюсти, а боковые крылья – пилоты опущены вниз

Г. Пластмассовая шина, охватывающая зубы; плотно прилежащая к десневому краю и опирающаяся на альвеолярный отросток челюсти

Д. Шина состоящая из базисных пластинок на альвеолярные отростки верхней и нижней челюсти, которые скрепляются в единый блок, а в переднем отделе имеется отверстие для приема пищи

1. Гладкая шина – скоба используется:

2. Шина Вебера – это

3. Шина Порто – это

4. Шина Ванкевича - это

А. Б – 1, В – 4, Г – 2, Д – 3

Б. Б – 4, В – 1, Г – 2, Д – 3

В. Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Установите соответствие между выбором способа и средства местного обезболивания и показаниями к его применению. Вид местного обезболивания:

А. Инфильтрационная анестезия с анестетиком артикаином 3% с эпинефрином 1:100 000

Б. Проводниковая анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000

Показания к применению:

1. Депульпирование зуба

2.5

2. Депульпирование зуба

4.6

3. Депульпирование зуба

3.8

4. Депульпирование зуба

1.3

5. Депульпирование зуба

2.7

А. А-1,4,5,Б-2,3

Б. А-1,5,Б-2,3,4

В. А-1,4,5,Б-2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ УДАЛЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ НАДДЕСНЕВЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ**

Действие:

- А. полирование поверхностей зубов
- Б. удаление зубного камня
- В. покрытие зубов фторлаком (фторгелем)
- Г. антисептическая обработка десен

А. 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В,

Б. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А,

В. 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В,

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Рентгенологическая картина:

- А. Выраженные периапикальные деструктивные изменения костной ткани
- Б. Участок разряжения костной ткани с четкими контурами более 5мм
- В. Изменений не выявляется Заболевание:

1. Острый апикальный периодонтит

2. Хронический апикальный периодонтит

3. Радикулярная киста

4. Хронический пульпит

А. 1В, 2А, 3Б, 4В

Б. 1Б, 2А, 3В, 4В

В. 1В, 2А, 3Б, 4А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Методы лечения:

А.Герметизация фиссур

Б.Реминерализующая терапия

В.Препарирование и пломбирование полостей

Г.Обучение гигиене полости рта Стадии кариеса:

1.Стадия пятна

2.Кариес эмали

3.Кариес дентина

4.Осложненный кариес

А. 1АБГ, 2АБВГ, 3ВГ, 4Г

Б. 1АБГ, 2АВГ, 3ВГ, 4Г

В. 1АБГ, 2АБВГ, 3Г, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Развивается вследствие попадания в трахею и бронхи рвотных масс, сгустков крови, содержимого полости рта

Б. Возникает при разрыве мягких тканей неба или задней стенки глотки, когда во время вдоха лоскут перекрывает дыхательные пути

В. Возникает вследствие закрытия верхних дыхательных путей инородным телом, рвотными массами, кровяным сгустком

Г. Развивается вследствие западения языка при смещении отломков нижней челюсти, особенно подбородочного отдела

Д. Развивается вследствие отека голосовых связок и тканей подвязочного пространства или сдавления задних отделов гортани гематомой

1. Дислокационная асфиксия

2. Обтурационная асфиксия

3. Стенотическая асфиксия

4. Клапанная асфиксия

5. Аспирационная асфиксия

А. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3

Б. А – 5, Б – 4, В – 1, Г – 2, Д – 3

В. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д – 1

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ЭМАЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЕ КОНТАКТ С КОМПОЗИТОМ ПО ПРИНЦИПУ

- А. Микросцепления
- Б. Химического взаимодействия
- В. Адгезии
- Г. Макросцепления
- Д. Макросцепления и химического взаимодействия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Химическая основа материалов:

- А.Керамический полисилоксан
- Б.Композит+СИЦ
- В.Органическая полимерная Матрица+наполнитель
- Г.Акриловые или апоксидные Полимеры Группы пломбировочных материалов:

- 1.Компомеры
- 2.Композиты
- 3.Ормомеры
- 4.Пластмассы

- А. 1В, 2Б, 3А, 4Г
- Б. 1Б, 2А, 3В, 4Г
- В. 1Б, 2В, 3А, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПОЛОСКАНИЕ РТА ФТОРИДСОДЕРЖАЩИМИ РАСТВОРАМИ Действие:

- А. подготовка раствора фторида
- Б. Рекомендации
- В. контролируемая чистка зубов
- Г. полоскание полости рта

- А. 1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б
- Б. 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г
- В. 1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Анаэробы
 - Б. Пустулезная, бугорковая, смешанная
 - В. Создает условия для развития актиномицетов
 - Г. Абсцедирующая, гуммозная, смешанная
 - Д. Образование инфильтратов, которые могут нагнаиваться
 - Е. Препятствует развитию актиномицетов
 - Ж. Наличие гуммозных образований клетчатки
1. Кожная форма актиномикоза
 2. Подкожная форма актиномикоза
 3. Для подкожно – мышечной формы актиномикоза характерно
 4. Актиномицеты, обладающие большей патогенностью
 5. Роль пиогенной (банальной микрофлоры) при актиномикозе
- А. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3, Д – 2
Б. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 2, Д – 3
В. А – 4, Б – 5, В – 1, Г – 2, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ «УРОКА ГИГИЕНЫ» В ШКОЛЕ.** Действие:

- А. чистка зубов под контролем гигиениста стоматологического
 - Б. повторное определение гигиенического индекса у школьников
 - В. индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта
 - Г. демонстрация гигиенистом техники чистки зубов на обучающей модели
 - Д. определение гигиенического индекса у школьников
 - Е. беседа со школьниками по вопросам рационального ухода за полостью рта
 - Ж. отработка школьниками на демонстрационных моделях техники чистки зубов
- А. 1-Е, 2-Г, 3-Ж, 4-Д, 5-А, 6-Б, 7-В
Б. 1-Е, 2-Г, 3-Д, 4-Ж, 5-А, 6-Б, 7-В
В. 1-Е, 2-Г, 3-Ж, 4-Д, 5-А, 6-В, 7-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

Б. Стадия истощения секретообразования и дистрофических изменений

В. Стадия липоматоза и фиброза

Г. Рентгенография мягких тканей дна полости рта

Д. Стадия гиперсекреции

1. Рентгенографическая проекция для выявления камня в переднем отделе выводного протока поднижнечелюстной слюнной железы

2. Рентгенографическая проекция для выявления камня в паренхиме поднижнечелюстной слюнной железы

3. Начальная стадия сиалоза

4. Клинически выраженная стадия сиалоза

5. Поздняя стадия сиалоза

А. А – 4, Б – 2, В – 5, Г – 1, Д – 3

Б. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 3, Д – 1

В. А – 2, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Свойства композитных материалов:

А.Выделение фтора

Б.Высокая эластичность

В.Высокая прочность

Г.Низкая полимеризационная усадка Группы композитных материалов:

1.Текучие

2.Гибридные

3.Наноккомпозиты

4.Компомеры

А. 1Б, 2В, 3Г, 4А

Б. 1В, 2Б, 3Г, 4А

В. 1Б, 2Г, 3А, 4В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Возраст пациента:

А. 10 лет

Б. 21 год

В. 45 лет

Г. 79 лет Максимально допустимая доза:

1. 4,4 мг/кг

2. 5,4 мг/кг

3. 6,4 мг/кг

4. 7,4 мг/кг

5. 8,4 мг/кг

А. А-1,Б-1, В-1,Г-1

Б. А-1,Б-2, В-3,Г-4

В. А-2,Б-3, В-4,Г-5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Серозная инфильтрация тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел

Б. Зуд кожи, эозинофилия, в пунктате – клетки Березовского - Штернберга

В. Золотистый стафилококк

Г. Смешанная микрофлора

Д. Гнойное воспаление тканей, окружающих воспалительно измененный лимфатический узел

Е. Наличие пакетов лимфоузлов, длительный субфебрилитет, положительная реакция Пирке и Манту, наличие в пунктате гигантских клеток Пирогова – Лангханса

Ж. Острое начало заболевания, высокая температура тела, отрицательная проба с актинолизатом

1. Микроорганизм – наиболее частый возбудитель острых лимфаденитов лица и шеи

2. Периаденит

3. Аденофлегмона

4. Характерные признаки туберкулезного лимфаденита

5. Нехарактерные для актиномикоза признаки поражения лимфатических узлов

6. Клиническая симптоматика лимфогранулематоза

А. А – 3, Б – 6, В – 1, Д – 2, Е – 4, Ж – 5

Б. А – 2, Б – 6, В – 1, Д – 3, Е – 5, Ж – 4

В. А – 2, Б – 6, В – 1, Д – 3, Е – 4, Ж – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Методы анестезии:

А. Интралигаментарная

Б. Инфильтрационная Показания к проведению анестезии:

1. лечение кариеса;

2. лечение пульпита;

3. удаление зубов по поводу хронического апикального периодонтита (вне обострения)

4. депульпирование интактных зубов;

5. лечение пародонтита;

6. лечение острого апикального периодонтита.

А. А-1, 3, 4, Б-1, 2, 3, 4, 5, 6

Б. А-1, 2, 3, 4, Б-1, 2, 3, 4, 5, 6

В. А-1, 2, 3, 4, Б-1, 2, 4, 5, 6

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССОВ И ФЛЕГМОН ЯВЛЯЕТСЯ

А. Новокаиновая блокада с антибиотиками

Б. Послойное вскрытие гнойного очага с введением дренажа

В. Удаление причинного зуба

Г. Проведение физиотерапии

Д. Дезинтоксикационная терапия

УКАЗАТЬ ОШИБКИ ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

А. Нависающий край пломбы

Б. Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба

В. Химический ожог пульпы зуба

Г. Хроническое воспаление десневого края

Д. Отсутствие контактного пункта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Гистиоцитоз (ретикулоэндотелиоз)

Б. Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение

В. Злокачественная эпителиальная опухоль

Г. Очаг разряжения костной ткани без четких границ

Д. Участки неоднородной деструкции костной ткани без наличия полосы остеосклероза по периферии очага

Е. Наличие очагов вновь образованной ткани

1. Первичный рак челюсти – это:

2. Эозинофильная гранулема – это:

3. Рентгенологические проявления первичного рака челюсти

4. Рентгенологические проявления эозинофильной гранулемы

А. А - 1, В - 3, Г - 2, Д - 4

Б. А - 2, В - 1, Г - 3, Д - 4

В. А - 2, В - 1, Г - 4, Д - 3

ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ ГИНГИВО-СТОМАТИТ СОПРОВОЖДАЕТ ТЕЧЕНИЕ

А. Сифилиса

Б. ВИЧ-инфекции

В. Красной волчанки

Г. Хронического герпетического стоматита

Д. Многоформной экссудативной эритемы

ПРОТИВПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А. Абсцедирование

Б. Подвижность зубов 2 степени

В. Патология прикуса

Г. Сахарный диабет

Д. Кровоточивость десен

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид местного обезболивания:

А. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Мепивакаин 3% по переходной складке

Б. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000 по переходной складке Показания к применению:

1. Депульпирование зуба

2.4 у практически здорового пациента

2. Депульпирование зуба

4.6 у практически здорового пациента

3. Депульпирование зуба

3.2 у пациента с гипертонической болезнью

4. Депульпирование зуба

1.3 у пациента с инфарктом миокарда в анамнезе

5. Лечение кариеса дентина зуба

5.5 у пациента 5 лет

А. А-4,5, Б-1,3

Б. А-3,4,5, Б-1

В. А-3,4, Б-1,5

К ОБЛИГАТНЫМ ПРЕДРАКАМ КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ ОТНОСЯТ

А. Болезнь Боуэна и пигментную ксеродермию

Б. Актинический кератоз, радиационный дерматоз, предраковый меланоз

В. Бородавчатый (узелковый) предрак, ограниченный предраковый гиперкератоз, абразивный хейлит Манганотти

Г. Эритроплакию, бородавчатый предрак, ограниченный гиперкератоз, абразивный хейлит Манганотти

Д. Болезнь Боуэна, лейкоплакия, хроническая трещина губы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Показания:

А. Препарирование без выхода на аппроксимальную грань и кариесрезистентных пациентов

Б. Скрытые полости до контактного пункта сочетание полостей 2 и 1 класса

В. Полость в придесневой области до контактного пункта у зубов с высокой коронкой

Г. Распространение полости на контактный пункт, замена старой реставрации Методики препарирования и пломбирования полостей 2 класса:

1. Техника горизонтального туннеля

2. Техника сквозного вертикального туннеля

3. Техника несквозного вертикального туннеля

4. Препарирование и пломбирование стандартными керамическими вкладками

А. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Б. 1А, 2Б, 3В, 4Г

В. 1Г, 2Б, 3А, 4В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**.

А. Расширение и сужение протока

Б. Сужение протоков на всем протяжении

В. «Гроздья винограда»

Г. «Чернильное пятно»

Д. Без изменений

1. Сиалографический признак разрастания в паренхиме слюнной железы соединительной ткани

2. Сиалографический признак наличия поражения протока слюнной железы

3. Сиалографический признак лимфогенного паротита характеризуется скоплением контраста в виде:

4. Сиалографический признак паренхиматозного паротита характеризуется скоплением контраста в виде:

5. Сиалограмма ложного паротита Герценберга

А. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 3, Д – 5

Б. А – 2, Б – 1, В – 4, Г – 5, Д – 3

В. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 4, Д – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Методы анестезии:

А. Инфильтрационная.

Б. Интралигаментарная.

В. Мандибулярная. Время наступления анестезии (латентный период):

1) 15-45 с;

2) 1-2 мин.;

3) 10-15 мин.;

4) 30 мин.

А. А-1, Б-2, В-3

Б. А-3, Б-1, В-2

В. А-2, Б-1, В-3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Жалобы:

А.Зуб ранее сильно болел, в настоящее время боль возникает при попадании пищи в полость

Б.Боли интенсивные,самопроизвольные, иррадиирующие, усиливаются от горячего, кратковременное ослабление от холодного

В.Быстропроходящие боли от температурных, механических, химических раздражителей, возникшие 2-3 дня назад

Г.Продолжительные боли от всех видов раздражителей, ночные и самопроизвольные боли Заболевание:

1.Пульпит начальный

2.Пульпит острый

3.Пульпит гнойный

4.Пульпит хронический гипертрофический

А. 1В, 2Г, 3Б, 4А

Б. 1Г, 2В, 3Б, 4А

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Анестетик с вазоконстриктором:

А. Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000

Б. Артикаин 4% с эпинефрином 1: 200 000 Стоматологические манипуляции:

1. Операция удаления третьего моляра нижней челюсти
2. Лоскутная операция при пародонтите средней степени тяжести
3. Вскрытие пародонтального абсцесса
4. Формирование кариозной полости
5. Депульпирование моляра нижней челюсти
6. Операция имплантации

А. А-1,2,5,6,Б-3,4

Б. А-2,5,6,Б-1,3,4

В. А-1,2,6,Б-3,4,5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

А. Шов, накладываемый на 15 – 30 сутки после операции с предварительным иссечением грануляции, рубцов и мобилизацией краев раны

Б. Шов, накладываемый на гнойную рану во время хирургической обработки, но затягиваемый через 24 – 72 часа при стихании воспаления; или шов, накладываемый на 2 – 7 сутки после операции

В. Шов, накладываемый на рану непосредственно после вскрытия гнойного очага

Г. Шов, накладываемый на 8 – 14 сутки после операции без предварительного иссечения грануляции

1. Первичный шов

2. Первичный отсроченный шов

3. Вторичный ранний шов

4. Вторичный поздний шов

А. А – 2, Б – 4, В – 1, Г – 3

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3

В. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОСМОТРА** Действие:

- А. визуальная оценка вида кожных покровов (цвет, целостность)
- Б. оценка состояние красной каймы губ, видимых слизистых
- В. визуальная оценка степени выраженности носогубных, подбородочных и шейных складок
- Г. пальпация регионарных лимфатических узлов
- Д. исследование височно-нижнечелюстного сустава
- Е. оценка конфигурации и симметричности лица

- А. 1-Е, 2-А, 3-В, 4-Г, 5-Б, 6-Д
- Б. 1-Е, 2-А, 3-Г, 4-Б, 5-В, 6-Д
- В. 1-Е, 2-А, 3-В, 4-Б, 5-Г, 6-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Скрепление отломков костным цементом
- Б. Внутрикостное введение штифта (спицы), наложение на костной минипластины
- В. Перевязка наружной сонной артерии
- Г. Репозиция и фиксация отломков, перевязка сосуда в ране
- Д. При помощи съемного протеза с преобразованием его в шину и пращи
- Е. Наложение аппарата Рудько, ЦИТО
- Ж. Шина с зацепными петлями и межчелюстным натяжением
- 1. Способ остановки кровотечения при переломах нижней челюсти:
- 2. Наиболее щадящий и часто применяемый метод лечения переломов нижней челюсти в пределах зубного ряда
- 3. Наиболее простой метод лечения переломов беззубой нижней челюсти
- 4. Наиболее легкий и быстро выполнимый метод остеосинтеза

- А. Б – 1, Г – 4, Д – 3, Ж – 2
- Б. Б – 4, Г – 1, Д – 3, Ж – 2
- В. Б – 4, Г – 2, Д – 1, Ж – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Метоксифлюран

Б. Дроперидол и транквилизаторы

В. Закись азота

Г. Сочетание транквилизаторов и анальгетиков

Д. Комбинация нейролептиков и анальгетиков

1. При применении кеталара наблюдается галлюцинации. Какие препараты вводят, чтобы нивелировать галлюциногенный эффект

2. «Веселящий газ»

3. Препарат для ингаляционного наркоза с более мощным наркотическим действием

4. Нейролептаналгезия

5. Атаралгезия

А. А – 4, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 1

Б. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д – 1

В. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Способы обезболивания

А. инфильтрационная, проводниковая анестезия

Б. аппликационная анестезия Анастетики

1. Тетракаин/дикаин

2. Лидокаин

3. Артикаин

4. Мепивакаин

5. Бензокаин/анестезин

А. А-2,3,4, Б-1,2,5

Б. А-2,А-5,Б-1,3,4

В. А-5,6,Б-1,2,3,4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Транзиторная, лабильная, стабильная
- Б. Фиброзная, ангиоматозная
- В. Капиллярная, ветвистая, кавернозная, смешанная
- Г. Капиллярная, кистозная, кавернозная
- Д. Ограниченная, разлитая

- 1. Формы эпюлида
- 2. Виды гемангиом мягких тканей по строению
- 3. Виды лимфангиом по строению
- 4. Варианты лимфедемы губ

А. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3

В. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. 8 – 10 месяцев

Б. 45 суток

В. 2 недели

Г. Конец первого месяца

- 1. Сроки появления остеонидных палочек на дне и стенках лунки после удаления зуба
- 2. Сроки начала заполнения лунки удаленного зуба мелкопетливой губчатой костной тканью
- 3. Сроки окончания заполнения лунки удаленного зуба мелкопетливой губчатой костной тканью
- 4. Сроки, при которых лунка рентгенологически не отличается от окружающей костной ткани при осложненном заживлении (альвеолите или остеомиелите)

А. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1

Б. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

В. А – 3, Б – 4, В – 1, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Рассечение зуба на две части в области бифуркации с последующим сглаживанием нависающих краев, проведение кюретажа, покрытие коронкой

Б. Удаление всего корня при сохранении коронковой части зуба

В. Удаление корня вместе с прилежащей коронковой частью

Г. Пересадка удаленного зуба в другую альвеолу

Д. Пересадка удаленного зуба в его же альвеолу

1. Аутоотрансплантация зуба

2. Гемисекция зуба

3. Ампутация корня

4. Коронаро – радикулярная сепарация

5. Реплантация зуба

А. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1, Д – 5

Б. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2, Д – 5

В. А – 4, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Грипп, корь, краснуха, болезнь Боткина

Б. Прогрессирование и неблагоприятный исход процесса

В. Гнойно – воспалительные процессы

Г. Аллергические и паразитарные заболевания

Д. Воспалительные заболевания, интоксикация

Е. Мононуклеоз, туберкулез, сифилис

1. Лейкоцитоз наблюдается при заболеваниях:

2. Лейкопения чаще встречается при заболеваниях:

3. Токсическая зернистость лейкоцитов указывает на:

4. Нейтрофилез указывает на:

5. Эозинофилия встречается при:

6. Лимфоцитоз развивается при:

А. А – 3, Б – 2, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6

Б. А – 2, Б – 1, В – 3, Г – 5, Д – 4, Е – 6

В. А – 2, Б – 3, В – 1, Г – 5, Д – 4, Е – 6

В МИКРОНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТАХ РАЗМЕР ЧАСТИЦ НАПОЛНИТЕЛЯ (МКМ):

- А. 1 - 100
- Б. 50
- В. более 1
- Г. 1
- Д. менее 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. Закрытый перелом
- Б. При продольном переломе
- В. При сохранении целостности всех стенок лунки
- Г. Открытый перелом
- Д. Перелом зуба со вскрытием пульпы зуба
- Е. При поперечном переломе
- 1. Полный перелом зуба – это
- 2. Полный перелом коронки зуба – это
- 3. Зуб подлежит удалению
- 4. Реплантация зуба возможна
- 5. Полный перелом корня зуба – это
- А. А – 5, Б – 4, В – 3, Г – 2, Д – 1
- Б. А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 2, Д – 1
- В. А – 5, Б – 3, В – 4, Г – 1, Д – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Код МКБ-10:

- А. K00.30
- Б. K00.40
- В. K00.50
- Г. K02.1 Заболевание:
- 1. Гипоплазия эмали
- 2. Незавершенный амелогенез
- 3. Эрозия зубов
- 4. Эндемическая (флюорозная) крапчатость эмали
- А. 2Б, 1В, 4-- , 3А
- Б. 1Б, 2В, 3-- , 4А
- В. 4Б, 2В, 3-- , 1А

**МИКРОПРОТЕЗ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНАТОМИЧЕСКУЮ ФОРМУ ЗУБА И
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ОККЛЮЗИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕРЕКРЫТИЕМ ОДНОГО БУГРА**

- A. Pinlay
- Б. Inlay
- B. Onlay
- Г. Overlay
- Д. Ney

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.
Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный
буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой
пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО
РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.**

- A. Удаление новообразования с капсулой
- Б. Инвазивный рост
- B. Резекция челюсти в пределах здоровой ткани
- Г. Новообразование формируется в определенном возрасте и в дальнейшем в размерах не увеличивается
- Д. Лучевая терапия
- 1. Характер роста для амелобластом
- 2. Характер роста одонтом
- 3. Принцип лечения амелобластом
- 4. Принцип лечения одонтом
- A. A – 4, Б – 1, B – 3, Г – 2
- Б. A – 4, Б – 2, B – 3, Г – 1
- B. A – 2, Б – 1, B – 3, Г – 4

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.
Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный
буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой
пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО
РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.**

- A. Седативный эффект
- Б. Замедляет процесс заживления раны
- B. Атропин
- Г. Гексенал
- 1. Побочный эффект от новокаина
- 2. Побочный эффект от тримекаина
- 3. При передозировке новокаина вводят:
- 4. При передозировке лидокаина вводят:
- A. A – 2, Б – 1, B – 4, Г – 3
- Б. A – 2, Б – 1, B – 3, Г – 4
- B. A – 1, Б – 2, B – 4, Г – 3

УКАЗАТЬ ОШИБКИ ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

- А. Отлом истонченной стенки коронковой части зуба
- Б. Неполное удаление инфицированного дентина, химический ожог пульпы зуба
- В. Нависающий край пломбы, отсутствие контактного пункта
- Г. Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба
- Д. Десневое кровотечение

ДЛЯ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ В ОСТРОЙ СТАДИИ ХАРАКТЕРНО

- А. Наличие свищевых ходов по переходной складке в очаге поражения, гиперемия и болезненность мягких тканей
- Б. Воспалительный инфильтрат в области переходной складки
- В. Гиперемия и болезненность мягких тканей, инфильтрация надкостницы по переходной складке
- Г. Воспалительная инфильтрация надкостницы и мягких тканей, прилежащих к очагу поражения челюсти с вестибулярной и оральной поверхности
- Д. Воспалительная инфильтрация мягких тканей, прилежащих к очагу поражения челюсти с вестибулярной и оральной поверхности

ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ КАРИЕСВОСПРИИМЧИВОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- А. До иммунных зон
- Б. Профилактически иссекая окружающую деминерализованную эмаль
- В. Миниинвазивным методом
- Г. Депульпируют зуб
- Д. С позиций щадящего препарирования

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕГО МУССА (GC TOOTH MOUSSE) ДЛЯ ЗУБОВ Действие:

- А. рекомендации пациенту - воздержаться от приема пищи в течение 40-50 минут
 - Б. очищение зубов от зубных отложений
 - В. нанесение мусса на зубы
 - Г. изоляция зубов от слюны
 - Д. высушивание эмали зубов
 - Е. экспозиция средства
- А. 1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-В, 5-Е, 6-А
Б. 1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-В, 5-А, 6-Е
В. 1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-В, 5-Е, 6-А

ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОТТИСК С:

- А. Нижней челюсти без протеза
- Б. Нижней челюсти с протезом
- В. Верхней челюсти и нижней челюсти без протеза
- Г. Нижней челюсти с протезом и верхней челюсти
- Д. Слепки снимать не нужно

ЖЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ, ПРОХОДЯЩЕЕ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ, ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- А. Глоссита
- Б. Глоссалгии
- В. Ромбовидного глоссита
- Г. Десквамативного глоссита
- Д. Невралгия тройничного нерва

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ЭТАПОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА
Действие:

- А. удаление зубного налета с контактных поверхностей флоссами
 - Б. антисептическая обработка
 - В. контролируемая чистка зубов
 - Г. шлифование пломб и полирование поверхностей зубов, в том числе корней
 - Д. обработка зубов фторидсодержащими или реминерализирующими препаратами
 - Е. удаление минерализованных зубных отложений
- А. 1-В, 2-Б, 3-Е, 4-А, 5-Д, 6-Г
Б. 1-В, 2-Б, 3-Е, 4-А, 5-Г, 6-Д
В. 1-В, 2-Е, 3-Б, 4-А, 5-Г, 6-Д

ПРИ СНЯТИИ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ У ПАЦИЕНТА С ЯЗВЕННО- НЕКРОТИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ ВЕНСАНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД:

- А. Ручной
- Б. Ультразвуковой
- В. Пескоструйный
- Г. Сочетанный ручной и ультразвуковой
- Д. Сочетанный ручной и пескоструйный

ПРИЧИННЫЙ ЗУБ ПРИ ОСТРОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ

- А. Сохраняют обязательно
- Б. Шинируют
- В. Депульпируют
- Г. Удаляют по показаниям
- Д. Удаляют обязательно

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Имеются дочерние кисты, которые необходимо удалить
 - Б. Причинный зуб подлежит обязательному удалению
 - В. Причинный зуб удаляют или резецируют верхушку корня
 - Г. Проводится оро – антральная цистэктомия
 - 1. Особенность хирургического лечения (цистэктомия) радикулярных кист челюстей
 - 2. Особенность хирургического лечения (цистэктомия) фолликулярных кист челюстей
 - 3. Особенность хирургического лечения (цистэктомия) парадентальных кист
 - 4. Особенность оперативного лечения эпидермоидных кист
- А. А – 1, Б – 2, 3, В – 4
Б. А – 4, Б – 1, 3, В – 2
В. А – 4, Б – 2, 3, В – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Инфильтрации и абсцедирования
 - Б. Внедрение инородного тела
 - В. Из гранулемы, тяжа причинного зуба
 - Г. Из гранулемы
 - Д. Хроническая
 - Е. Обострившееся хроническое
 - 1. Неодонтогенная гранулема развивается в следствие
 - 2. Одонтогенная гранулема состоит
 - 3. Неодонтогенная гранулема состоит
 - 4. Течение подкожной гранулемы
 - 5. Стадии клинического течения одонтогенной подкожной гранулемы лица
- А. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 4, Д – 3
Б. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4
В. А – 5, Б – 2, В – 1, Г – 3, Д – 4

ЭЛЕКТРОВОЗБУДИМОСТЬ ПУЛЬПЫ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ

- А. Возрастает
- Б. Остается без изменений
- В. Снижается
- Г. Колеблется
- Д. Не определяется

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПОКРЫТИЯ ЗУБОВ ФТОРЛАКОМ Действие:

- А. высушивание зубов перед покрытием фторлаком
 - Б. нанесение фторлака на зубы тонким слоем
 - В. очищение зубов от налета
 - Г. изоляция от слюны ватными валиками
 - Д. высушивание зубов после покрытия фторлаком
 - Е. удаление избытка лака, попавшего на слизистую оболочку
 - Ж. рекомендации пациенту воздержаться от приема пищи в течение двух часов, от чистки зубов и приема очень твердой пищи в течение 12-24 часов
- А. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б, 5-Е, 6-Ж, 7-Д
Б. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б, 5-Е, 6-Д, 7-Ж
В. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Е, 5-Б, 6-Д, 7-Ж

ИНИЦИАТОРОМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА СВЕТООВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Камфорохинон
- Б. Пероксид бензоила
- В. Ароматические амины
- Г. Пероксид бензоила и ароматические амины
- Д. Камфорохинон и ароматические амины

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид местного обезболивания:

А. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000

Б. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% без вазоконстриктора (Ultracain D) Показания к применению:

1. Депульпирование зуба
- 2.4 у практически здорового пациента
2. Депульпирование зуба
- 4.6 у практически здорового пациента
3. Депульпирование зуба
- 3.2 у пациента с гипертонической болезнью
4. Депульпирование зуба
- 1.3 у пациента с инфарктом миокарда в анамнезе
5. Депульпирование зуба
- 2.5 у пациента 13 лет

А. А-1,3, Б-4, 5

Б. А-1, Б-3,4, 5

В. А-1, Б-3,4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Первая стадия

Б. Вторая стадия

В. Третья стадия

Г. Четвертая стадия

1. Рак кожи лица (по классификации TNM) обозначен следующим образом: T1 N2 M0. Какова стадия распространения рака?

2. Рак кожи лица: T1 N0 M0. Какова стадия распространения рака?

3. Рак нижней губы: T2 N0 M0. Какова стадия распространения рака?

4. Рак слизистой оболочки полости рта: T1 N1 M0. Какова стадия распространения рака?

А. А – 2, Б – 4, В – 3, Г – 1, 5

Б. А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1, 5

В. А – 4, Б – 3, В – 2, Г – 1, 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Безболезненные узлы розового или бурого цвета, которые могут изъязвляться с последующим рубцеванием или рассасыванием

Б. Эрозии и язвы

В. Бугорок (люпом)

Г. Мелкие желтовато – красные узлы, которые изъязвляются

Д. Периаденит

1. Характерный признак первичного туберкулеза кожи

2. Элемент при туберкулезной волчанке

3. Признаки милиарно – язвенного туберкулеза

4. Характерный признак туберкулезного лимфаденита

5. Признаки диссеминированного милиарного туберкулеза лица

А. А – 1, Б – 5, В – 2, Г – 3, Д – 4

Б. А – 5, Б – 1, В – 3, Г – 2, Д – 4

В. А – 5, Б – 1, В – 2, Г – 3, Д – 4

ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ЗУБА ПОД ШТАМПОВАННУЮ КОРОНКУ УСТУП ФОРМИРУЕТСЯ

А. Супрагингивально

Б. На уровне края десны

В. Субгингивально на вестибулярной поверхности

Г. Субгингивально по всему периметру шейки зуба

Д. Не формируется

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. 2 недели

Б. 1 неделя

В. 19 – 23 сутки

Г. 3 недели

Д. 16 – 18 день

1. Сроки эпителизации лунок однокорневых зубов в норме

2. Сроки эпителизации лунок многокорневых зубов в норме

3. Задержка эпителизации лунок однокорневых зубов при воспалении

4. Задержка эпителизации лунок многокорневых зубов при воспалении

5. Сроки полного заполнения лунки грануляционной тканью в норме

А. А – 4,5, Б – 1, В – 2, Д – 3

Б. А – 4,5, Б – 3, В – 1, Д – 2

В. А – 4,5, Б – 3, В – 2, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Наследственность, биологическая неполноценность половых клеток, инфекционное заболевание матери в ранние сроки беременности, аборт

Б. Втянутая линейная бороздка на коже губы и выемка на красной кайме

В. Дефект верхней губы по всей высоте с захватом нижних отделов носового хода

Г. Воздействие медикаментов, гипоксия, ионизирующее излучение, неполноценное питание, травма живота в ранние сроки беременности, патогенная микрофлора

1. Скрытое несращение верхней губы – это:

2. Неполное (частичное) несращение верхней губы – это:

3. Полное несращение верхней губы

4. Эндогенные причины развития врожденных уродств лица

5. Экзогенные причины развития врожденных уродств лица

А. А – 4, Б – 1, В – 5, Г – 3

Б. А – 1, Б – 4, В – 3, Г – 5

В. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Передние и задние

Б. Травматический, привычный, патологический

В. Острые и застарелые

Г. Односторонние и двусторонние

Д. Полный и неполный

1. В зависимости от величины расхождения суставных поверхностей вывихи нижней челюсти могут быть:

2. С учетом времени прошедшей с момента травмы, вывихи нижней челюсти делятся на:

3. В зависимости от локализации вывихи могут быть:

4. По механизму возникновения различают вывихи:

5. В зависимости от направления смещения суставной головки, вывихи бывают

А. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 3, Д – 1

Б. А – 5, Б – 4, В – 2, Г – 1, Д – 3

В. А – 5, Б – 2, В – 3, Г – 3, Д – 1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Вид местного обезболивания:

А. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Мепивакаин 3% .

Б. Инфильтрационная анестезия с анестетиком Артикаин 4% с эпинефрином 1: 100 000 по переходной складке. Показания к применению:

1. Операция удаление зуба

2.6 у практически здорового пациента

2. Операция удаление зуба

4.6 у практически здорового пациента

3. Кюретаж пародонтальных карманов у пациента с диабетом

4. Операция вскрытия пародонтального абсцесса у пациента с инфарктом миокарда в анамнезе

5. Операция удаление зуба

7.5 у пациента 9 лет

А. А-3, 4,5, Б-1

Б. А-3, 4,5, Б-1,2

В. А-2, 4,5, Б-1,3

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ:

А. Местная гипоплазия эмали

Б. Флюороз

В. Тетрациклиновые зубы

Г. Системная гипоплазия эмали

Д. Несовершенный амелогенез

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

А. Комбинированный

Б. Открытый

В. Ожоговый шок

Г. Ожоговая септикотоксемия

Д. Ожоговая токсемия

1. Первый период ожоговой болезни

2. Второй период ожоговой болезни

3. Третий период ожоговой болезни

4. Наиболее частый метод лечения ожогов лица

А. Б – 4, В – 1, Г – 2, Д – 3

Б. Б – 4, В – 3, Г – 1, Д – 2

В. Б – 4, В – 1, Г – 3, Д – 2

ПРИ НЕПОЛНОМ ВЫВИХЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ У РЕБЕНКА ПОЛУТОРА ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А. Оставить под наблюдение
- Б. Провести шинирование и оставить под наблюдение
- В. Репозировать
- Г. Депульпировать и репозировать
- Д. Удалить

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Заболевание:

- А. Острый пульпит
- Б. Пульпит хронический
- В. Пульпит неутонченный
- Г. Пульпит хронический язвенный Код по МКБ-10:

1. K04.09

2. K04.01

3. K04.03

4. K04.04

А. 1В, 2А, 3Б, 4Г

Б. 1Г, 2В, 3А, 4Б

В. 1Г, 2А, 3В, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР ЗУБА ГЕРМЕТИКОМ ИНВАЗИВНОЙ МЕТОДИКОЙ Действие:

- А. протравливание фиссуры кислотой
- Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета
- В. изоляция от слюны, высушивание зуба
- Г. отмывание кислоты из фиссуры
- Д. проверка окклюзионной высоты прикуса
- Е. повторная изоляция зуба от слюны
- Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам, отверждение
- З. высушивание протравленной поверхности фиссуры
- И. раскрытие фиссуры алмазным бором

А. 1-Б, 2-В, 3-И, 4-А, 5-Г, 6-Е, 7-З, 8-Ж, 9-Д

Б. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-И, 5-Г, 6-Е, 7-З, 8-Ж, 9-Д

В. 1-Б, 2-В, 3-И, 4-А, 5-Г, 6-Е, 7-З, 8-Д, 9-Ж

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Эпителиальные клетки

Б. Мезенхимальные клетки наружного слоя зубного мешочка

В. Макрофаги

Г. Апикальные, апиколлатеральные, латеральные, межкорневые

Д. Простая, сложная кистогранулема

Е. 0, 5 см.

Ж. 0, 5 – 1 см.

1. Развитие периодонта происходит за счет

2. Особенностью тканей периодонта является наличие

3. По локализации гранулемы различают

4. Размеры гранулемы не превышают

5. Размеры кистогранулемы

А. А – 2, Б – 3, Г – 1, Е – 4, Ж – 5

Б. А – 2, Б – 1, Г – 4, Е – 3, Ж – 5

В. А – 2, Б – 1, Г – 3, Е – 4, Ж – 5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

А. Болевой дисфункции

Б. Острого артрита

В. Артрозе

Г. Хроническом артрите

1. Симптом головной боли в большей степени характерен для:

2. Резкие боли в суставе в большей степени характерны для:

3. Щелканье в суставе наблюдаются при:

4. Хруст в нижнечелюстном суставе наблюдается при:

5. Тугоподвижность в суставе в конце дня наиболее часто встречается при

6. Чувство сведения челюстей после сна наблюдается при:

А. А – 1, 3, 6, Б – 2, В – 5, Г – 4

Б. А – 1, 3, Б – 2, В – 4, Г – 5

В. А – 1, 3, 6, Б – 2, В – 4, Г – 5

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВИНІРОВ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. Низкий уровень гигиены полости рта
- Б. Депульпированные зубы
- В. Деминерализация после ортодонтического лечения
- Г. Диастема шириной 1 мм
- Д. Наличие старых, изменивших цвет, пломб

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Максимально допустимая доза:

- А. 7 мг/кг
 - Б. 5 мг/кг
- Возраст пациента:**
- 1. 6 лет
 - 2. 10 лет
 - 3. 29 лет
 - 4. 40 лет
 - 5. 67 лет
- А. А-2,3,4,5,Б-1
 - Б. А-3,4,Б-1,2,5
 - В. А-3,4,5,Б-1,2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

- А. У взрослых
 - Б. Боль в челюсти подвижных зубов
 - В. У детей и лиц молодого возраста
 - Г. Деформация челюсти
- 1. Первые симптомы при центральной остеосаркоме челюстей
 - 2. Первые симптомы при периферической остеосаркоме челюстей
 - 3. Остеобластическая форма саркомы челюсти чаще встречается
 - 4. Остеолитическая форма саркомы челюсти чаще всего встречается
- А. А – 1, Б – 4, В – 3, Г – 2
 - Б. А – 4, Б – 2, В – 3, Г – 1
 - В. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. **УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАППЫ** Действие:

- А. высушивание зубов
- Б. удаление мягкого зубного налета
- В. внесение реминерализирующего средства в каппу
- Г. экспозиция реминерализирующего средства
- Д. изоляция зубов от слюны
- Е. фиксация каппы на зубах
- Ж. снятие каппы

А. 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-Ж, 7-Г

Б. 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-Е, 5-В, 6-Г, 7-Ж

В. 1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-Г, 7-Ж

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

- А. Множество правильно сформированных спаянных между собой деформированных зубов
- Б. Беспорядочно перемешанные ткани нескольких зубов
- В. Ткани одного зуба
- Г. Несколько зачатков зубов
1. Структура простой одонтомы
 2. Структура сложной одонтомы
 3. Структура смешанной одонтомы
 4. Структура составной одонтомы

А. А – 4, Б – 1, В – 3, Г – 2

Б. А – 4, Б – 2, В – 1, Г – 3

В. А – 4, Б – 3, В – 1, Г – 2

Абсолютным противопоказанием к проведению дентальной имплантации считают

- А. Множественный кариес зубов
- Б. Аллергические заболевания
- В. Неудовлетворительную гигиену полости рта
- Г. Флюороз

Базис съёмного пластиночного протеза при полном отсутствии зубов изготавливается из

- А. Фарфора
- Б. Воска
- В. Каучука
- Г. Пластмассы

После проведения мандибулярной анестезии область обезболивания охватывает зубы нижней челюсти

- А. Ткани щечной области
- Б. Со стороны инъекции
- В. Только мягкие ткани подбородочной области
- Г. И мягкие ткани подбородочной области, дна полости рта и языка со стороны инъекции

У первых постоянных моляров в сменном прикусе кариес чаще возникает

- А. В пришеечной области
- Б. На апроксимальных поверхностях
- В. На буграх
- Г. В фиссурах

Жалобы при ушибах временных и постоянных зубов в первые 2-3 дня после травмы на

- А. Подвижность зуба 2-3 степени
- Б. Интенсивные приступообразные боли
- В. Ноющие боли при накусывании
- Г. Онемение области ушиба

При планировании изготовления несъемной конструкции недостаточное количество опорных зубов может привести к

- А. Дисфункции ВНЧС
- Б. Сколу облицовочного материала ортопедической конструкции
- В. Повышенному стиранию зубов-антагонистов
- Г. Функциональной перегрузке пародонта опорных зубов

К минерализованным зубным отложениям относят

- А. Пелликулу
- Б. Пищевые остатки
- В. Мягкий зубной налет
- Г. Зубной камень

Коронковая часть анкерного штифта покрывается опакером с целью

- А. Обеспечения прочности реставрации
- Б. Увеличения рентгеноконтрастности
- В. Улучшения эстетики
- Г. Улучшения ретенции

К клиническим признакам неполного вывиха временного и постоянного зуба в первые дни после травмы относят

- А. Укорочение видимой части коронки, отсутствие подвижности
- Б. Погружение зуба в лунку до десны
- В. Неизменённая видимая часть коронки, незначительная подвижность
- Г. Смещение коронки в различных направлениях, подвижность зуба II-III степени

Последовательность местного лечения язвенно-некротического стоматита венсана

- А. Нанесение антимикробных средств, удаление некротического налета, антисептическая обработка, наложение изолирующей повязки
- Б. Обезболивание, удаление некротического налета, обработка протеолитическими ферментами, антисептическая обработка
- В. Обезболивание, обработка протеолитическими ферментами, удаление некротического налета, антисептическая обработка, нанесение антимикробных средств
- Г. Обезболивание, антисептическая обработка, нанесение протеолитических ферментов, нанесение антимикробных средств

Под потребностью населения в госпитализации понимается

- А. Доля населения, нуждающегося в госпитализации
- Б. Число коек на определённую численность населения
- В. Число врачебных должностей стационара на определённую численность населения
- Г. Доля госпитализированных за год больных

С помощью индекса арі определяют наличие налета на поверхностях зубов

- А. Вестибулярных
- Б. Проксимальных
- В. Окклюзионных
- Г. Оральных

Наличие ложного десневого кармана характерно для

- А. Пародонтита
- Б. Катарального гингивита
- В. Гипертрофического гингивита
- Г. Пародонтоза

Преобладающей микрофлорой инфекционного периодонтита являются

- А. Вейлонеллы
- Б. Простейшие
- В. Стафилококки
- Г. Стрептококки

С патологией прорезывания зубов связаны кисты

- А. Радикулярные
- Б. Эпидермоидные
- В. Фолликулярные
- Г. Парадентальные

Основным дифференциально-диагностическим признаком эрозии твёрдых тканей, отличающим её от клиновидного дефекта, является

- А. Окрашивание метиленовым синим
- Б. Болезненное зондирование
- В. Положительная холодовая проба
- Г. Форма дефекта

По методу изготовления различают _____мостовидные протезы

- А. Цельнолитые, полимеризованные, паяные
- Б. Паяные, пластмассовые, комбинированные
- В. Неметаллические, металлокерамические, фарфоровые
- Г. Комбинированные, металлические, неметаллические

Прямые щипцы используют для удаления

- А. Клыков верхней челюсти
- Б. Резцов нижней челюсти
- В. Временных моляров верхней челюсти
- Г. Постоянных моляров верхней челюсти

Одним из дополнительных методов обследования стоматологического больного является

- А. Термодиагностика
- Б. Перкуссия
- В. Зондирование
- Г. Пальпация

Волокна периодонта, идущие под углом к оси зуба называются

- А. Циркулярные
- Б. Косые
- В. Альвеолярные гребешковые
- Г. Трансептальные

К этиотропному средству лечения острого герпетического стоматита относят

- А. Противовирусное
- Б. Антисептическое
- В. Кератопластическое
- Г. Жаропонижающее

По классификации Lekholm и Zarb рыхлая кортикально-губчатая кость соответствует типу кости

- А. D3
- Б. D4
- В. D2
- Г. D1

Причиной возникновения гипоплазии эмали является

- А. Истирание эмали
- Б. Действие кислот
- В. Токсическое действие фторидов
- Г. Нарушение минерализации эмали

Пигментированный налет наиболее целесообразно удалять методом

- А. Ультразвуковым
- Б. Ручным
- В. Воздушно-абразивным
- Г. Звуковым

Местной анестезией называется

- А. Выключение тактильной чувствительности
- Б. Психоседативная терапия
- В. Выключение всех видов чувствительности при отсутствии сознания
- Г. Выключение болевой чувствительности на определенном участке при сохранении сознания

Выявление малых кистозных очагов при сиалографии околоушной слюнной железы характерно для

- А. Ранулы
- Б. Сиалолитиаза
- В. Сиалоза
- Г. Хронического сиалоаденита

Температура, которую должна выдерживать огнеупорная модель и при этом не деформироваться, равна

- А. 1000–1100 °С
- Б. 800–900 °С
- В. 600–800 °С
- Г. 1400–1600 °С

Материал для пломбирования постоянных зубов у детей не должен обладать

- А. Выделением фторида
- Б. Адгезией
- В. Биосовместимостью
- Г. Цитотоксичностью

Показатель общей заболеваемости характеризует

- А. Удельный вес конкретного заболевания
- Б. Распространённость заболеваний среди населения
- В. Изменения распространённости заболеваний во времени
- Г. Распространённость только социально-значимых заболеваний

Радикальная гайморотомия с наложением соустья с нижним носовым ходом проводится по методу

- А. Берше-Дубова
- Б. Егорова
- В. Губайдуллина-Вайсмунд
- Г. Калдвелл-Люка

Пульсовое давление при выраженном сосудистом коллапсе

- А. Увеличивается
- Б. Остается неизменным
- В. Уменьшается
- Г. Вариабельно

Имплантатом, предложенным Branemark, был

- А. Винтовой разборный
- Б. Субпериостальный
- В. Базальный
- Г. Пластиночный

Устранить дисколорит витальных зубов (легкая степень), развившийся в результате применения тетрациклина в детстве, можно методом

- А. Резекцией дентина
- Б. Микроабразии
- В. Внутреннего отбеливания
- Г. Внешнего отбеливания

Окклюдатор воспроизводит

- А. Сагиттальные и боковые движения нижней челюсти
- Б. Только вертикальные движения нижней челюсти
- В. Только сагиттальные движения нижней челюсти
- Г. Только боковые движения нижней челюсти

Периодонтом называют соединительную ткань, состоящую из

- А. Волокон, сосудов
- Б. Кровеносных и лимфатических сосудов, сосудов, нервов, волокон
- В. Межклеточного вещества, клеток, волокон, прослоек рыхлой
- Г. Клеток, волокон, сосудов и нервных окончаний

Коронковую часть пульпы удаляют

- А. Колесовидным бором
- Б. Зондом
- В. Штопфером
- Г. Экскаватором

Формирование корней временных моляров заканчивается к _____ годам

- А. 2
- Б. 7
- В. 6
- Г. 4

Складчатый язык является

- А. Последствием травмы
- Б. Последствием приема острой пищи
- В. Врожденной аномалией развития
- Г. Результатом хронической травмы зубами

При установлении инвалидности со степенью ограничения способности к трудовой деятельности срок временной нетрудоспособности завершается датой

- А. Регистрации документов в бюро медико-социальной экспертизы
- Б. Закрытия листка нетрудоспособности
- В. Открытия листка нетрудоспособности
- Г. Непосредственно предшествующей дню регистрации документов в бюро медико-социальной экспертизы

При декомпенсированной форме генерализованного (ii или iii степени) повышенного стирания имеет место

- А. Последовательная дезокклюзия
- Б. Перестройка миостатического рефлекса
- В. Постепенная дезокклюзия
- Г. Коррекция формы зубных рядов

После исчезновения первичных кожных элементов при крапивнице

- А. Отмечают отсутствие изменений
- Б. Остается гипопигментация
- В. Остается шелушение
- Г. Остается гиперпигментация

При проведении мандибулярной анестезии целевым пунктом ведения анестетика является _____ отверстие

- А. Нижнечелюстное
- Б. Круглое
- В. Подбородочное
- Г. Овальное

Лечебная тактика врача при остром гнойном периостите челюсти состоит из

- А. Пункции поднадкостничного абсцесса, создания оттока экссудата через корневые каналы причинного зуба, назначения ротовых ванн
- Б. Вскрытия поднадкостничного абсцесса, назначения антибиотиков, ротовых ванн, ультравысокочастотной терапии
- В. Вскрытия поднадкостничного абсцесса, удаления причинного зуба, назначения сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн
- Г. Удаления причинного зуба, назначения сульфаниламидных и антигистаминных препаратов, ротовых ванн

Под полостью зуба понимают пульпарную камеру и

- А. Систему корневых каналов
- Б. Магистральные корневые каналы
- В. Дно полости зуба
- Г. Апикальную дельту

Операция перемещения уздечки верхней губы необходима для

- А. Нормализации артикуляции языка
- Б. Устранения инфантильного глотания
- В. Нормализации положения 11 и 21
- Г. Нормализации роста апикального базиса нижней челюсти

Для obturation открытых дентинных канальцев в пасты для чувствительных зубов добавляют

- А. Хлоргексидин
- Б. Гидроксиапатит
- В. Пирофосфаты
- Г. Карбамид

Для профессионального отбеливания зубов применяется

- А. Трифосфат натрия
- Б. Гидратированный кремний
- В. Сульфат натрия
- Г. Перекись карбамида

Перкуссия зуба проводится

- А. Определением отклонения зуба от оси
- Б. Постукиванием по зубу для определения состояния пародонта
- В. Оценкой внешнего вида, цвета, целостности эмали с использованием зонда и зеркала
- Г. Ощупыванием для определения припухлости, уплотнения и подвижности органов или тканей

Для ускорения затвердевания гипса в воду добавляют

- А. 2,5–3 % Поваренной соли
- Б. 3% Перекись водорода
- В. 2–3 % Сахара
- Г. 2–3 % Тетрабората натрия

Для обеспечения нормальной работоспособности зрительного анализатора врача-стоматолога наиболее важна такая характеристика света, как

- А. Спектр излучения
- Б. Равномерность в разных точках помещения
- В. Уровень освещенности
- Г. Отсутствие блескости

При местной гипоплазии эмали характерны жалобы пациента на

- А. Косметический недостаток
- Б. Подвижность зубов
- В. Боли от горячего раздражителя
- Г. Ночные боли

Глубина поражения твердых тканей зуба при iii степени повышенного стирания достигает _____ длины коронки

- А. От 2/3; до его шейки
- Б. От 1/3 до 2/3
- В. До 1/3
- Г. От 1/3 до 1/2

Уровни интенсивности кариеса по ВОЗ определены для возрастных групп (в годах)

- А. 12 и 35-44
- Б. 15 и 18
- В. 12 и 15
- Г. 6 и 12

Афты беднара встречаются преимущественно у детей

- А. Младшего школьного возраста
- Б. Старшего школьного возраста
- В. Первых месяцев жизни
- Г. Дошкольного возраста

Вкол иглы при подглазничной анестезии проводят

- А. На уровне верхнего моляра
- Б. В проекции верхушек корней медиального и латерального резца
- В. На уровне верхнего клыка
- Г. На уровне второго премоляра

Рентгенологически периимплантит характеризуется

- А. Наличием секвестров
- Б. Никак не проявляется
- В. Образованием апикальной гранулёмы
- Г. Резорбцией кости

Для кисты характерны размеры

- А. 0,5-0,8 См
- Б. От 0,5 до 3 см
- В. Свыше 1 см
- Г. До 0,5 см

Патологический процесс твердых тканей зубов, развивающийся после их прорезывания, при котором происходят деминерализация и протеолиз с последующим образованием дефекта под воздействием внешних и внутренних факторов называют

- А. Гипоплазией
- Б. Эрозией
- В. Кариесом
- Г. Истиранием

Гиперемия кожи лица, шеи является клиническим симптомом

- А. Сердечно-сосудистого коллапса
- Б. Обморока
- В. Анафилактического шока
- Г. Острой сердечной недостаточности

Перед снятием двухслойного оттиска ретракция десны необходима, чтобы

- А. Обезболить десневой край
- Б. Остановить кровотечение
- В. Получить точный отпечаток поддесневой части зуба
- Г. Получить точный отпечаток наддесневой части зуба

Показатель хирургической активности в стационаре является процентным отношением числа

- А. Проведённых хирургических операций к числу больных, выписанных из хирургического отделения
- Б. Прооперированных больных к числу больных, выписанных из хирургического отделения
- В. Проведённых хирургических операций к числу больных, выбывших из хирургического отделения
- Г. Прооперированных больных к числу больных, выбывших из хирургического отделения

Правила наложения щипцов при удалении временных и постоянных зубов

- А. Отличаются при удалении на верхней челюсти; не отличаются – на нижней
- Б. Не отличаются
- В. Отличаются при удалении на нижней челюсти; не отличаются – на верхней
- Г. Отличаются

Наибольшее количество «смазанного слоя» образуется в результате препарирования корневого канала

- А. Ручными стальными
- Б. Ручными Ni-Ti
- В. Вращающимися Ni-Ti
- Г. Эндоактиватором

К системным факторам риска возникновения кариеса зубов у детей относится

- А. Употребление легкоферментируемых углеводов
- Б. Низкое содержание фторидов в воде
- В. Наличие ортодонтических конструкций
- Г. Низкая скорость секреции слюны

Периферическая зона пульпы образована клетками

- А. Фибробластами
- Б. Цементобластами
- В. Остеобластами
- Г. Одонтобластами

Зубную щетку средней жесткости рекомендуется использовать взрослым с

- А. Гиперестезией зубов
- Б. Флюорозом
- В. Хроническим пародонтитом
- Г. Клиновидными дефектами

К 1 классу переломов коронки зуба по классификации ellis и davey относится

- А. Отлом коронки зуба
- Б. Перелом коронки зуба с обнажением пульпы
- В. Простой перелом коронки зуба, не затрагивающий дентин или затрагивающий небольшое его количество
- Г. Перелом коронки зуба, затрагивающий большое количество дентина без обнажения пульпы

К рассасывающимся шовным материалам, применяемым при пластике рецессий десны, относят

- А. Кетгут, коллаген
- Б. Политетрафторэтилен
- В. Шелк, полиамид
- Г. Пролен, полипропилен

У детей до 3-х лет кариесом чаще поражаются _____ челюсти

- А. Резцы нижней
- Б. Моляры верхней
- В. Резцы верхней
- Г. Моляры нижней

К iv классу в соответствии с классификацией? Рецессии десны (р. D. Miller) относят

- А. Рецессию в пределах свободной? десны
- Б. Рецессию, выходящую за пределы прикрепленной? десны без потери костной? ткани
- В. Рецессию в пределах прикрепленной? десны
- Г. Утрату кости и мягких тканей пародонта по периметру зуба

Наиболее частой локализацией одонтогенных воспалительных процессов является _____ языка

- А. Корень
- Б. Кончик
- В. Боковая поверхность
- Г. Спинка

Причиной развития локализованного гипертрофического гингивита является

- А. Хроническая травма зубодесневого сосочка
- Б. Прием пациентом психотропных препаратов
- В. Острая травма зубодесневого сосочка
- Г. Токсикоз второй половины беременности

Показанием к проведению методики микроабразии при флюорозе являются _____ на эмали

- А. Поверхностные коричневые пятна
- Б. Поверхностные дефекты глубиной 1 мм
- В. Беловатые прожилки и штрихи
- Г. Поверхностные дефекты глубиной 2 мм

Примерное соотношение мономера и полимера при замешивании пластмассы в объемных частях

- А. 1:1
- Б. 1:3
- В. 1:2
- Г. 2:3

Вправление суставных элементов внчс осуществляет шина

- А. Репонирующая
- Б. Релаксирующая
- В. Повышающая
- Г. Защитная

Синдром мелькерссона-розенталя включает складчатый язык и

- А. Эксфолиативный хейлит
- Б. Макроглоссит
- В. Макрохейлит
- Г. Десквамативный глоссит

Резорбция кортикальной пластинки кости вершин межальвеолярных перегородок характерна для

- А. Фиброматоза
- Б. Хронического катарального гингивита
- В. Пародонтальной кисты
- Г. Пародонтита легкой степени

При цистэктомии у детей рана

- А. Частично закрывается лоскутом
- Б. Ушивается с оставлением активного дренажа
- В. Ушивается наглухо
- Г. Тампонируется йодоформным тампоном

Для лечения гиперестезии зубов используют

- А. Компомеры
- Б. Герметики
- В. Десенситайзеры
- Г. Антисептики

К первому этапу при инструментальной обработке корневого канала относят

- А. Расширение устьев корневого канала
- Б. Определение длины корневого канала
- В. Расширение апикального отверстия
- Г. Антисептическую обработку

При удалении ретинированных третьих моляров нижней челюсти используют разрез по

- А. Крайлю
- Б. Ковтуновичу
- В. Житницкому
- Г. Колдуэлу-Люку

Сколько форм зубочелюстных деформаций выделяет в.а.пономарёва?

- А. 4
- Б. 2
- В. 1
- Г. 3

Удаление сверхкомплектного зуба, располагающегося в области зубов

**1.1,
2.1 и обуславливающего наличие диастемы, следует производить в возрасте ребенка (в годах)**

- А. 8-9
- Б. 9-10
- В. 5-7
- Г. 7-8

Наиболее часто при плановой санации полости рта у детей встречается хроническая _____ форма пульпита

- А. Неуточненная
- Б. Язвенная
- В. Гипертрофическая
- Г. Фиброзная

Альгинатную оттискную массу замешивают на

- А. Горячей воде
- Б. Физиологическом растворе
- В. Прилагаемом к материалу катализаторе
- Г. Холодной воде

Врачу- стоматологу перед началом медицинского вмешательства совместно с пациентом необходимо оформить

- А. Талон пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях
- Б. Добровольное информированное согласие
- В. Амбулаторную карту пациента
- Г. Листок нетрудоспособности

Противопоказанием к использованию наркоза для санации полости рта в поликлинике может явиться

- А. Возраст до 3-х лет
- Б. Наличие острого респираторного заболевания
- В. Аллергия к местным анестетикам
- Г. Болезнь Дауна

При проведении эпидемиологического стоматологического обследования населения по методике ВОЗ используют набор инструментов, включающий в себя

- А. Зеркало, пародонтальный зонд, пинцет
- Б. Зеркало, стоматологический зонд, пародонтальный зонд
- В. Стоматологический зонд, пинцет, экскаватор
- Г. Стоматологический зонд, пинцет, штопфер

К биоинертным материалам относятся

- А. Цирконий
- Б. Гидроксиапатит
- В. Хромокобальтовые сплавы
- Г. Нержавеющая сталь

При изготовлении съемных протезов качество окклюзионного контакта искусственных зубов в полости рта проверяется

- А. С помощью бюгельного воска
- Б. С помощью базисного воска
- В. С помощью артикуляционной бумаги
- Г. Визуально

Физико-биологический метод фиксации съемного протеза при полном отсутствии зубов обеспечивается

- А. Кламмерами и замковыми креплениями
- Б. Замковыми креплениями и адгезией
- В. Функциональной присасываемостью и кламмерами замковыми креплениями и адгезией
- Г. Адгезией и функциональной присасываемостью

Удерживающий? Кламмер состоит из тела, плеча

- А. Отростка, ответвления и окклюзионной накладки
- Б. Отростка
- В. Отростка и окклюзионной накладки
- Г. Отростка и ответвления

Корни постоянных резцов и первых моляров заканчивают свое формирование к (в годах)

- А. 15
- Б. 12
- В. 10
- Г. 14

Режущий край верхних резцов под металлокерамическую коронку препарируют на глубину (в миллиметрах)

- А. 1,5-2,0
- Б. 1,0-1,2
- В. 0,7-0,9
- Г. 0,5-0,6

Диагноз и все последующие разделы медицинской карты стоматологического больного (форма №043/у) заполняются

- А. Заведующим отделением
- Б. Медсестрой
- В. Лечащим врачом
- Г. Регистратором

Согласно классификации dean для очень слабого флюороза характерны

- А. Хаотично расположенные маленькие непрозрачные белые пятна, занимающие менее 25% поверхности зуба
- Б. Коричневые пятна неправильной формы, меловидно-белый цвет всей поверхности эмали
- В. Обширные непрозрачные белые пятна, занимающие не более 50% поверхности зуба
- Г. Слабые очаги помутнения эмали, от нескольких беловатых прожилок до хаотично расположенных белых пятнышек

Граница базиса полного съемного протеза с вестибулярной стороны проходит

- А. По переходной складке, обходя подвижные тяжи слизистой оболочки и уздечки
- Б. Перекрывая подвижные тяжи слизистой оболочки и уздечки
- В. Перекрывая только уздечки
- Г. Перекрывая подвижные тяжи слизистой оболочки

Гистологически пульпа зуба состоит из

- А. Нервных, кровеносных, лимфатических сосудов
- Б. Нервных, кровеносных, лимфатических сосудов и клеточных элементов
- В. Лимфатических сосудов
- Г. Клеточных элементов и соединительной ткани

Для дифференциальной диагностики начального кариеса используют

- А. Зондирование
- Б. Метод термометрии
- В. ЭОД
- Г. Рентгенологический метод

Редкий, слабого наполнения пульс характерен для

- А. Анафилактического шока
- Б. Обморока
- В. Аллергической реакции
- Г. Сердечно-сосудистого коллапса

При препарировании под металлокерамическую коронку создание чрезмерной конусности культи зуба приводит к

- А. Эстетическому дефекту в области режущего края коронки
- Б. Эстетическому дефекту в области шейки зуба
- В. Травме пародонта
- Г. Ослаблению фиксации коронки

Чаще всего встречается у детей любого возраста хронический

- А. Периодонтит в стадии обострения
- Б. Фиброзный периодонтит
- В. Гранулематозный периодонтит
- Г. Гранулирующий периодонтит

Съёмные шинирующие протезы изготавливают методом

- А. Литья
- Б. CAD|CAM технологии
- В. Штамповки
- Г. Ковки

При интактном резце показатели электровозбудимости (эод) снимают с

- А. Угла коронки
- Б. Апроксимальной поверхности зуба
- В. Середины режущего края
- Г. Вестибулярной поверхности в пришеечной области

Выносливость пародонта зубов определяется при помощи

- А. Кимографа
- Б. Гнатодинамометра
- В. Коэффициента Джонсона-Вебера
- Г. Фагодинамометра

Витальные нижние резцы препарируют с уступом шириной до (в миллиметрах)

- А. 1,0
- Б. 2,0
- В. 0,5
- Г. 1,5

К общему противопоказанию к отбеливанию зубов относят

- А. Обширную реставрацию
- Б. Аллергию на пероксид водорода, беременность, кормление грудью
- В. Выраженное воспаление пародонта
- Г. Большую пульпарную полость

Главную опасность в ближайшие часы после ранений языка, мягкого неба, тканей дна полости рта для жизни пациента представляет

- А. Столбняк
- Б. Асфиксия
- В. Нарушение речи
- Г. Сепсис

Федеральный и территориальные фонды омс являются организациями

- А. Некоммерческими
- Б. Государственными казёнными
- В. Государственными бюджетными
- Г. Коммерческими

Обязательным этапом при проведении реминерализирующей терапии при лечении кариеса эмали является

- А. Нанесение адгезивной системы
- Б. Очищение зуба от налета
- В. Нанесение защитного лака
- Г. Протравливание эмали

При наличии корней, выступающих в полость радикулярной кисты, для диагностики витальности пульпы зуба проводят

- А. Контрастирование полости кисты
- Б. Компьютерную томографию
- В. Электроодонтодиагностику
- Г. Ультразвуковое исследование

К этиологическим факторам развития флюороза относят

- А. Заболевания, нарушающие минеральный обмен в период формирования эмали
- Б. Передачу патологии твердых тканей по наследству
- В. Интоксикацию фтором
- Г. Хронический периодонтит молочного зуба

Особенности препарирования глубокой кариозной полости

- А. Формирование отвесных стенок
- Б. Сохранение на дне полости деминерализованного, размягченного дентина
- В. Формирование неровного дна в зависимости от глубины поражения и топографии полости зуба
- Г. Формирование плоского дна

При калибровке специалистов, участвующих в эпидемиологическом стоматологическом обследовании населения, совпадение результатов обследования должно быть не менее (в процентах):

- А. 95
- Б. 70
- В. 50
- Г. 85

Ноющая боль, усиливающаяся при накусывании на зуб, характеризует

- А. Гнойный пульпит
- Б. Хронический апикальный периодонтит
- В. Периостит
- Г. Периапикальный абсцесс без свища

Затруднённое, учащённое дыхание с экспираторной одышкой является характерным для

- А. Болевого шока
- Б. Сердечно-сосудистого коллапса
- В. Обморока
- Г. Анафилактического шока

Дифференциальную диагностику фурункула проводят с

- А. Гемангиомой
- Б. Нагноением эпидермальной кисты
- В. Флегмоной
- Г. Рожистым воспалением

[Вернуться в начало](#)