

Тесты с вопросами по специальности «Стоматология ортопедическая» для аттестации 1 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/ortopedicheskaya/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Стоматология ортопедическая» для аккредитации и других экзаменов (1900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/ortoped/

2) Стоматология ортопедическая — ситуационные задачи

→ medik-otvet.ru/product/stomat-ortoped/

3) Тесты для аккредитации «Стоматология хирургическая» (2500 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_hirurg/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

1 категория

[Вернуться в начало](#)

При изготовлении металлокерамической коронки минимально допускаемая толщина металлического каркаса из неблагоприятных сплавов

- А. 0,1 мм
- Б. 0,2 мм
- В. 0,25 мм
- Г. 0,3 мм
- Д. 0,5 мм

Изготовление полного съёмного протеза на верхней челюсти с укороченными границами может привести к

- А. Прикусыванию щёк
- Б. Прикусыванию губ
- В. Сбрасыванию протеза во время функции
- Г. Балансу протеза
- Д. Нарушению эстетики

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между зонами податливости слизистой оболочки по классификации Люнда и их топографией. Зоны податливости слизистой оболочки по Люнду:

- 1. Железистая;
 - 2. Жировая. Топография:
 - А. Альвеолярный отросток;
 - Б. Область небных складок;
 - В. Срединная часть твердого неба;
 - Г. Дистальная треть твердого неба;
 - Д. Переходная складка.
- А. 1Г, 2Б
 - Б. 1А, 2Б
 - В. 1 В, 2Б

Относительным противопоказанием к применению металлокерамических коронок является

- А. Невыраженная анатомическая форма естественных зубов
- Б. Чрезмерная выраженность экваторов естественных зубов
- В. Депульпированные зубы
- Г. Недостаточная высота коронок естественных зубов
- Д. Эстетический дефект естественных зубов

Создание чрезмерно широкого уступа в пришеечной области приводит к

- А. К затруднённому наложению коронки
- Б. Ослаблению фиксации коронки
- В. Травме пародонта
- Г. Нарушению эстетики коронки
- Д. Отлому коронковой части зуба вместе с коронкой

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области передних зубов проходит

- А. Не касается зубов
- Б. В пришеечной области зубов
- В. Посередине коронки зубов
- Г. Перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. Перекрывая коронки зубов на 2/3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видом постановки искусственных зубов и характером дефекта зубного ряда. Вид постановки искусственных зубов:

1. На приточке;
 2. На искусственной десне. Дефект зубного ряда характеризуется отсутствием зубов:
- А. Передних на нижней челюсти;
 - Б. Боковых ;
 - В. Передних на верхней челюсти при значительной атрофии альвеолярного отростка;
 - Г. Передних на верхней челюсти при резко выраженном альвеолярном отростке; Д. Одного переднего на верхней челюсти.

- А. 1ГД, 2АБВ
- Б. 1АБ, 2ДГВ
- В. 1АБ, 2ВГ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видами функциональных оттисков и способом их получения. Функциональные оттиски:

1. Компрессионные;
 2. Разгружающие;
 3. Дифференцированные (комбинированные). Способ получения оттисков:
 - А. Стандартной перфорированной ложкой альгинатным оттискным материалом;
 - Б. Стандартной перфорированной ложкой альгинатным оттискным материалом;
 - В. Жесткой индивидуальной ложкой, перфорированной в определенных участках оттискными массами высокой степени текучести;
 - Г. Жесткой индивидуальной ложкой с помощью двух материалов, обладающих разной степенью текучести;
 - Д. Жесткой индивидуальной ложкой малотекучими, с относительно высокой степенью вязкости, материалами (термопластические) или силиконовыми массами с низкой степенью вязкости;
 - Е. Жесткой индивидуальной ложкой малотекучими, с относительно высокой степенью вязкости, материалами (термопластические) или силиконовыми массами с низкой степенью вязкости.
- А. 1Г, 2Б, 3В
Б. 1А, 2В, 3Б
В. 1В, 2Б, 3А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между причинами починки съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти и компонентами действия. Причина починки съёмного протеза:

1. Перелом базиса протеза;
 2. Отлом плеча кламмера;
 3. Удаление естественного зуба. Компоненты действия:
 - А. Получить оттиск с верхней челюсти без протеза;
 - Б. Получить оттиск с верхней челюсти с протезом;
 - В. Получить оттиск с двух челюстей без протеза;
 - Г. Получить оттиск с нижней челюсти и с верхней челюсти с протезом;
 - Д. Оттиски получать не нужно.
- А. 1А, 2Б, 3Г
Б. 1Д, 2Б, 3Г
В. 1Д, 2А, 3Г

Граница полных съёмных протезов проходит

- А. Не доходя переходной складки 1,5 – 2,0 мм
- Б. Перекрывая переходную складку на 1,5 – 2,0 мм
- В. По пассивно-подвижной слизистой оболочке
- Г. По активно-подвижной слизистой оболочке
- Д. По линии mylohyoideus

Неудовлетворительная фиксация полного съёмного протеза на верхней челюсти может быть связана с

- А. Большим количеством остаточного мономера в базисе
- Б. Изготовлением базиса из бесцветной пластмассы
- В. Использованием фарфоровых зубов
- Г. Удлиненными границами протеза
- Д. Гранулярной пористостью (мраморностью) базиса

Все боковые стенки опорных зубов при изготовлении паяного мостовидного протеза препарируются

- А. С наклоном в сторону дефекта зубного ряда
- Б. Параллельно между собой
- В. С наклоном в сторону от дефекта зубного ряда
- Г. Параллельно с рядом стоящим зубом
- Д. Только параллельно продольной оси зуба

Параллелометрия проводится

- А. До моделировки каркаса бюгельного протеза
- Б. Перед нанесением рисунка каркаса бюгельного протеза
- В. При припасовке каркаса бюгельного протеза на модели в лаборатории
- Г. При проверке каркаса бюгельного протеза в клинике
- Д. При проверке каркаса бюгельного протеза в клинике
- Е. При дублировании модели

Возможные осложнения при пользовании металлокерамическими мостовидными протезами

- А. Изменение цвета облицовки
- Б. Быстрое истирание облицовки
- В. Повышенное истирание естественных зубов-антагонистов
- Г. Повышение жевательной эффективности
- Д. Улучшение качества жизни

При недостаточно хорошей фиксации полного съёмного протеза, обусловленной удлинёнными границами базиса, необходимо

- А. Изготовить новый протез
- Б. Провести коррекцию краев протеза
- В. Уточнить границы протеза самотвердеющей пластмассой
- Г. Получить оттиск, используя протез, и провести перебазировку в лаборатории
- Д. Провести перебазировку эластичной базисной пластмассой

При изготовлении металлопластмассовой коронки соединение пластмассы с литым каркасом осуществляется за счет

- А. Химического соединения
- Б. Формирования ретенционных пунктов с помощью "перл" (шариков)
- В. Образования окисной пленки
- Г. Взаимной диффузии материалов
- Д. Вырезания

Создание большой конусности зуба при препарировании приведет к

- А. Отколу облицовки
- Б. Повреждению десневого края
- В. Повреждению пародонта
- Г. Расцементирования коронки
- Д. Перегрузке опорного аппарата зуба-антагониста

При отломе коронковой части зуба на уровне десны зуб восстанавливают

- А. Полукоронкой
- Б. Экваторной коронкой
- В. Вкладкой
- Г. Съёмным протезом
- Д. Штифтовой конструкцией

Изготовление полного съёмного протеза с удлинёнными границами на нижней челюсти может привести к

- А. Прикусыванию щёк
- Б. Прикусыванию губ
- В. Сбрасыванию протеза во время функции
- Г. Повышенному рвотному рефлексу
- Д. Нарушению эстетики

После припасовки коронок паяного мостовидного протеза в полости рта повторно определяется центральная окклюзия для

- А. Оценки качества припасовки коронок
- Б. Повторной установки и загипсовки модели с коронками в артикулятор
- В. Точной спайки опорных коронок с промежуточной частью
- Г. Точного моделирования промежуточной части мостовидного протеза (с учетом смыкания зубных рядов в центральной окклюзии)
- Д. Повышения эстетики протеза

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между типами слизистой оболочки по классификации Суппли и их характеристикой.

Типы слизистой оболочки по Суппли:

1. Третий;

2. Четвертый. Характеристика:

- А. Избыточно податлива, разрыхлена, сильно увлажнена;
 - Б. Бледно розового цвета, умеренно увлажнена и податлива, с нормальным порогом болевой чувствительности;
 - В. Тонкая, сухая, малоподатлива, повышенная болевая чувствительность;
 - Г. Складчатая, с «болтающимся» альвеолярным гребнем. .
- А. 1Б, 2В
 - Б. 1В, 2Б
 - В. 1А, 2Г

Причины скола керамического покрытия с металлокерамической коронки

- А. Наличие гирлянды
- Б. Неудовлетворительная гигиена полости рта
- В. Наличие в полости рта съемного протеза
- Г. Не выверенные окклюзионные контакты
- Д. Обширные пломбы на зубах – антагонистах

Правильная последовательность подготовки каркаса металлокерамической коронки перед нанесением и обжигом керамической массы

- А. Обезжиривание каркаса, пескоструйная обработка, создание окисной пленки (обжиг)
- Б. Пескоструйная обработка, обезжиривание каркаса, создание окисной пленки (обжиг)
- В. Создание окисной пленки (обжиг), пескоструйная обработка, обезжиривание
- Г. Пескоструйная обработка, создание окисной пленки (обжиг), обезжиривание
- Д. Обезжиривание, создание окисной пленки (обжиг), пескоструйная обработка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления металлопластмассовой коронки. Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;

5. Клинические этапы изготовления:

А. Фиксация коронки;

Б. Припасовка каркаса, выбор цвета облицовки ;

В. Препарирование зуба и получение оттисков ;

Г. Определение центральной окклюзии;

Д. Припасовка коронки.

А. 1А, 2Б, 3Г, 4Д, 5В

Б. 1В, 2Г, 3Б, 4Д, 5А

В. 1Б, 2В, 3Д, 4А, 5Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность лабораторных этапов изготовления цельнолитой коронки. Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.4

5.;

6. Лабораторные этапы изготовления цельнолитой коронки:

А. Изготовление колпачка из адапты;

Б. Шлифовка, полировка;

В. Отливка из сплава металла;

Г. Изготовление разборной модели;

Д. Припасовка на модели;

Е. Моделирование коронки.

А. 1А, 2Б, 3Г, 4В, 5Е, 6Д

Б. 1Г, 2А, 3Е, 4В, 5Д, 6Б

В. 1В, 2Г, 3А, 4Б, 5Д, 6Е

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью атрофии костной ткани альвеолы и характеристикой атрофии лунки зуба (по

В.Ю.Курляндскому). Степень атрофии:

1. Первая;
2. Вторая;
3. Третья;
4. Четвертая. Характеристика атрофии лунки зуба (по

В.Ю.Курляндскому):

- А. Полная атрофия костной ткани альвеолы, зуб удерживается лишь мягкими тканями;;
- Б. Атрофия костной ткани альвеолы на 3/4 его длины;
- В. Атрофия костной ткани альвеолы на 1/2 его длины;
- Г. Атрофия костной ткани альвеолы на 1/4 его длины.

А. 1А, 2Б, 3Г, 4В

Б. 1Г, 2В, 3Б, 4А

В. 1Б, 2Г, 3В, 4А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность подготовки литого каркаса и нанесения керамической массы. Порядок:

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4.;
- 5.;
6. Компонент действия:
 - А. Нанесение эмали;
 - Б. Создание окисной пленки;
 - В. Абразивная обработка каркаса;
 - Г. Обезжиривание каркаса;
 - Д. Нанесение дентина;
 - Е. Нанесение опака.

А. 1Б, 2А, 3Г, 4В, 5Е, 6Д

Б. 1Е, 2Д, 3А, 4Б, 5Г, 6В

В. 1В, 2Г, 3Б, 4Е, 5Д, 6А

При наличии сильных болей больному рекомендуется съемный пластиночный протез

- А. Не снимать до посещения врача
- Б. Снять и надеть за 3-4 часа перед посещением врача
- В. Снять и сразу придти к врачу
- Г. Снять и надеть, когда пройдут болевые ощущения
- Д. Снять и после исчезновения воспалительных явлений придти к врачу

Неудовлетворительная фиксация полного съёмного протеза на нижней челюсти может быть связана с

- А. Неправильным выбором цвета искусственных зубов
- Б. Неправильным выбором формы искусственных зубов
- В. Изготовлением базиса из бесцветной пластмассы
- Г. Гранулярной пористостью (мраморностью) базиса
- Д. Укороченными границами протеза

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области боковых зубов проходит

- А. Не касается зубов
- Б. В пришеечной области зубов
- В. По середине коронки зубов
- Г. Перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. Перекрывая коронки зубов на 2/3

Паковка пластмассы в кювету проводится на стадии

- А. Песочной
- Б. Тянущихся нитей
- В. Тестообразной
- Г. Резиноподобной
- Д. Твердой

К возможным недостаткам мостовидного протеза из нержавеющей стали относятся

- А. Низкая жевательная эффективность
- Б. Привкус металла в полости рта
- В. Быстрое стирание зубов-антагонистов
- Г. Появление подвижности зубов-антагонистов
- Д. Неприятный запах изо рта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классом дефектов зубных рядов по Кеннеди и характеристикой дефекта зубного ряда. Класс по Кеннеди:

1. III;

2. IV. Дефект зубного ряда:

А. Двусторонний концевой дефект;

Б. Включенный дефект в боковом отделе;

В. Дефект в переднем (фронтальном) отделе;

Г. Односторонний концевой дефект.

А. 1А, 2Б

Б. 1В, 2Б

В. 1Б, 2В

После припасовки коронок паяного мостовидного протеза в полости рта повторно определяется центральная окклюзия для

А. Точного моделирования промежуточной части мостовидного протеза (с учетом смыкания зубных рядов в центральной окклюзии)

Б. Оценки качества припасовки коронок

В. Повторной установки и загипсовки модели с коронками в окклюдатор

Г. Точной спайки опорных коронок с промежуточной частью. Повышения эстетики протеза

Д. Повышения эстетики протеза

Создание чрезмерной конусности стенок при препарировании под металлокерамическую коронку приводит к

А. Неэстетичности коронки

Б. Снижению прочности коронки

В. К травме десны

Г. К ослаблению фиксации коронки

Д. Делает коронку более долговечной

Изготовление полного съёмного протеза на нижнюю челюсть с удлинённой дистальной границей может привести к

А. Прикусыванию щёк

Б. Сбрасыванию протеза во время функции

В. Прикусыванию губ

Г. Нарушению дикции

Д. Нарушению эстетики

Относительным противопоказанием к применению металлокерамических коронок является

- А. Ортогнатический прикус
- Б. Бипрогнатический прикус
- В. Прогенический прикус
- Г. Парафункция жевательных мышц (бруксизм)
- Д. Прямой прикус

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между способом гипсовки восковой композиции в кювету и видом протеза. Способ гипсовки восковой композиции:

- 1. Прямой;
 - 2. Обратный;
 - 3. Комбинированный. Вид протеза:
 - А. Съёмные пластиночные протезы, с постановкой искусственных зубов «на приточке» и на искусственной десне;
 - Б. Съёмные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов;
 - В. Съёмные пластиночные протезы с постановкой искусственных зубов «на приточке».
- А. 1А, 2Б, 3В
Б. 1В, 2Б, 3А
В. 1Б, 2В, 3А

Для полимеризации пластмассы кювету помещают в

- А. Воду холодную
- Б. Воду кипящую
- В. Вакуумную печь
- Г. Воду нагретую до 80°
- Д. Муфельную печь

Промежуточная часть мостовидного протеза в области боковых зубов по отношению к десне

- А. Не касается
- Б. Прилегает к ней по всей поверхности
- В. Прилегает только на скатах альвеолярного гребня
- Г. Касается по вершине альвеолярного гребня в двух точках
- Д. Касается по вершине альвеолярного гребня в одной точке

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между названием углов путей при движении нижней челюсти и их значениями. Углы при движении нижней челюсти:

1. Сагиттальный угол суставного пути;
2. Сагиттальный угол резцового пути;
3. Трансверзальный угол резцового пути (готический угол);
4. Боковой угол суставного пути (угол Беннета). Угол равен (градусы):

А. 17;

Б. 40 – 60;

В. 30 – 40;

Г. 100 –

110.

А. 1В, 2Б, 3Г, 4А

Б. 1А, 2В, 3Б, 4А

В. 1Б, 2А, 3Г, 4В

Показанием к постановке искусственных зубов на «приточке» в съёмном пластиночном протезе на верхней челюсти является

А. Чрезмерная выраженность альвеолярной части

Б. Чрезмерная выраженность альвеолярного отростка верхней челюсти в области боковых зубов;

В. Отростка верхней челюсти в области боковых зубов

Г. «короткая» верхняя губа

Д. Выраженная уздечка нижней губы

Отросток удерживающего кламмера должен располагаться

А. Между экватором и десной

Б. Между экватором и окклюзионной поверхностью

В. На вестибулярной поверхности зуба

Г. В области ската альвеолярного гребня с оральной стороны

Д. По центру альвеолярного гребня в базисе под искусственными зубами

После проведения этапа определения центрального соотношения челюстей восковые базисы с окклюзионными валиками

А. Используют для постановки искусственных зубов

Б. Сохраняют до этапа проверки конструкции протезов

В. Сохраняют до полного изготовления протезов и их наложения

Г. Переплавляют для повторного использования воска

Д. Выдают пациенту на руки

Плечо удерживающего кламмера съёмного протеза касается зуба и располагается

- А. На жевательной поверхности зуба
- Б. Между жевательной поверхностью зуба и экватором
- В. На экваторе
- Г. У режущего края резцов
- Д. Между экватором и пришеечной областью

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между типами беззубой нижней челюсти по классификации

В.Ю. Курдьяндского и характерными признаками. Классификация

В.Ю. Курдьяндского для беззубой нижней челюсти:

- 1. Первый тип ;2. Второй тип ;
- 3. Третий тип;4. Четвертый тип;
- 5. Пятый тип; Признаки:

А. Альвеолярная часть атрофирована в боковых отделах ;Б. Альвеолярная часть атрофирована до уровня мест прикрепления мышц ;

В. Альвеолярная часть атрофирована в переднем отделе ;

Г. Альвеолярная часть выступает над уровнем мест прикрепления мышц ;

Д. Альвеолярная часть атрофирована ниже уровня мест прикрепления мышц

А. 1Б, 2А, 3Д, 4Б, 5В

Б. 1Г , 2Б, 3Д, 4А, 5В

В. 1А, 2Б, 3Д, 4В, 5Д

Относительным противопоказанием к применению металлокерамических коронок является

- А. Недостаточная высота коронок естественных зубов
- Б. Плоская форма естественных зубов
- В. Чрезмерная выраженность экваторов естественных зубов
- Г. Депульпированные зубы
- Д. Эстетический дефект естественных зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между значениями и терминами. Значение:

1. Всевозможные положения нижней челюсти относительно верхней;
2. Смыкание зубных рядов или групп зубов верхней и нижней челюстей;
3. Соотношение зубных рядов в центральной окклюзии. Термины:

- А. Прикус;
- Б. Ортогнатический прикус;
- В. Артикуляция;
- Г. Окклюзия;
- Д. Центральное соотношение челюстей;
- Е. Центральная окклюзия.

А. 1Б, 2Г, 3А

Б. 1В, 2Г, 3А

В. 1В, 2Б, 3А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между зонами податливости слизистой оболочки по классификации Люнда и их топографией. Зоны податливости слизистой оболочки по Люнду:

1. Железистая;
 2. Жировая. Топография:
- А. Альвеолярный отросток
 - Б. Область небных складок;
 - В. Срединная часть твердого неба;
 - Г. Дистальная треть твердого неба;
 - Д. Переходная складка.

А. 1А, 2В

Б. 1Г, 2Б

В. 1 В, 2Б

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на нижней челюсти в области зубов проходит

- А. Не касается зубов
- Б. Перекрывая коронки зубов на 2/3
- В. В пришеечной области зубов
- Г. Перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. Посередине коронки зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между локализацией заболевания пародонта и методом стабилизации при ортопедическом лечении . Локализованный пародонтит:

1. С распространением на всю переднюю группу зубов;
 2. С односторонним распространением на боковую группу зубов;
 3. С двусторонним распространением на боковые группы зубов. Метод стабилизации:
 - А. Фронтальная стабилизация;
 - Б. Сагиттальная стабилизация;
 - В. Парасагиттальная стабилизация--;
 - Г. Фронтно-сагиттальная стабилизация;
 - Д. Стабилизация по дуге;
 - Е. Стабилизация по дуге в сочетании с парасагиттальной стабилизацией.
- А. 1А, 2Б, 3В
Б. 1Б, 2В, 3А
В. 1Б, 2А, 3В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления бюгельных протезов . Порядок:

- 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 - 4.;
 5. Клинические этапы изготовления:
 - А. Проверка конструкции протеза;
 - Б. Припасовка и наложение протеза;
 - В. Получение оттисков;
 - Г. Определение центральной окклюзии;
 - Д. Припасовка каркаса бюгельного протеза.
- А. 1А, 2Г, 3Б, 4В, 5Д
Б. 1В, 2Г, 3Д, 4А, 5Б
В. 1А, 2Б, 3Г, 4Д, 5В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность действий на этапе определения центрального соотношения челюстей при изготовлении пластиночных протезов при дефектах зубных рядов. Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;

5. Компонент действия:

А. Приклеивание разогретой пластинки воска и фиксация центрального соотношения челюстей;

Б. Припасовка восковых базисов с окклюзионными валиками с учетом высоты физиологического покоя ;

В. Оценка качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками ;

Г. Проверка правильности определения центрального соотношения челюстей и нанесение клинических ориентиров;

Д. Определение высоты нижнего отдела лица в состоянии относительного физиологического покоя.

А. 1В, 2Д, 3Б, 4А, 5Г

Б. 1А, 2Б, 3Д, 4В, 5Г

В. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между разными классификациями кламмеров и видами кламмеров. Классификация кламмеров:

1. По методу изготовления;

2. По форме профильного сечения;

3. По конфигурации ;

4. По функции. Виды кламмеров:

А. Дентальные, денто-альвеолярные, альвеолярные;

Б. Металлические, пластмассовые;

В. Жесткие, полуподвижные, шарнирные;

Г. Гнутые, литые, полимеризованные;

Д. Круглые, полукруглые, ленточные;

Е. Одноплечие, двухплечие, перекидные, двойные, многозвеньевые;

Ж. Удерживающие, опорно-удерживающие.

А. 1А, 2Б, 3Г, 4Е

Б. 1Г, 2Д, 3Е, 4Ж

В. 1А, 2Б, 3Ж, 4В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления металлокерамической коронки . Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;

5. Клинические этапы изготовления:

А. Припасовка коронки ;

Б. Фиксация коронки ;

В. Припасовка каркаса, выбор цвета облицовки;

Г. Определение центральной окклюзии ;

Д. Препарирование зуба и получение оттисков .

А. 1Д, 2Г, 3В, 4А, 5Б

Б. 1А, 2Б, 3Г, 4Д, 5В

В. 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В

Дуга бюгельного протеза располагается относительно слизистой оболочки

А. Никогда не касаясь

Б. Всегда слегка касаясь

В. Всегда плотно прилегая

Г. Слегка касаясь при жевании

Д. Плотно прилегая при жевании

При изготовлении цельнолитых коронок применяется сплав золота пробы

А. 750

Б. 375

В. 583

Г. 900

Д. 915

За степень атрофии лунки зуба принимается размер, полученный при зондировании патологического зубодесневого кармана в области

А. Медиальной стороны

Б. Дистальной стороны

В. Наибольшей атрофии

Г. Вестибулярной поверхности

Д. Оральной поверхности

Для спайки коронок из нержавеющей стали применяют припой на основе

- А. Золота
- Б. Серебра
- В. Платины
- Г. Титана
- Д. Кадмия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классом дефектов зубных рядов по

Е.И. Гаврилову и характеристикой дефекта зубного ряда. Класс по Гаврилову:

- 1. I;
 - 2. II;
 - 3. III;
 - 4. IV. Дефект зубного ряда:
 - А. Концевые дефекты (односторонние, двусторонние);
 - Б. Комбинированные дефекты;
 - В. Включенные дефекты (боковые – односторонние, двусторонние, передние);
 - Г. Челюсти с одиночно сохранившимися зубами.
- А. 1Б, 2В
 - Б. 1А, 2В
 - В. 1Б, 2А

При препарировании зуба под цельнолитую коронку с жевательной поверхности или режущего края сошлифовывают ткани зуба примерно на (в мм)

- А. 0,1 – 0,3
- Б. 0,3 – 0,6
- В. 0,7 – 1
- Г. 1,5 – 2,0
- Д. 2,0 – 2,5

Моделировка литой коронки может проводиться без использования "адапты"

- А. Базисным воском
- Б. Бюгельным воском
- В. Погружным воском
- Г. Липким воском
- Д. Воском для мостовидных работ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видом шинирования и методом стабилизации при ортопедическом лечении заболеваний пародонта. Шинирование:

1. Передней группы зубов ;
2. Боковой группы зубов ;
3. Двух боковых групп зубов;
4. Всех групп зубов. Вид стабилизации:

- А. Сагиттальная;
- Б. Фронтальная;
- Д. По дуге;
- Е. Парасагиттальной;
- Ж. Фронтально-сагиттальной.

- А. 1Б, 2А, 3Е, 4Д
- Б. 1А, 2Б, 3Е, 4Д
- В. 1Б, 2А, 3Д, 4Е

Для изготовления штампованных коронок применяют штампы, отлитые из

- А. Хромокобальтового сплава
- Б. Легкоплавкого сплава
- В. Серебряно-палладиевого сплава
- Г. Свинца
- Д. Олова

Причинами расцементирования цельнолитой коронки являются

- А. Отсутствие экватора коронки
- Б. Удлиненный край коронки
- В. Отсутствие контакта с зубами-антагонистами
- Г. Чрезмерное укорочение зуба при препарировании
- Д. Отсутствие контакта с зубами-антагонистами

Починку базиса съемного пластиночного протеза невозможно провести при

- А. Множественном мелкооскольчатом переломе
- Б. Отломе сразу нескольких искусственных зубов
- В. Отломе края протеза
- Г. Сложном рельефе по линии перелома
- Д. Одновременном отломе плеча кламмера и края протеза

При полимеризации пластмассы быстрый нагрев кюветы приводит к образованию в базисе протеза

- А. Трещин
- Б. Газовой пористости
- В. Гранулярной пористости
- Г. Внутренних напряжений
- Д. Пористости сжатия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между группой цемента для фиксации ортопедических конструкций и их названием. Цементы для фиксации:

- 1. Цинк-фосфатные цементы;
 - 2. Стеклоиономерные цементы. Название:
 - А. Кетакцемизимикикс (KetacCemEasymix);
 - Б. Унифас-2;
 - В. Фуджил (Fuji I);
 - Г. Адгезор (Adhesor).
- А. 1БГ, 2АВ
 - Б. 1АБ, 2ВГ
 - В. 1АВ, 2БГ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью атрофии костной ткани лунки зуба и состоянием опорно-удерживающего аппарата зубов по

В.Ю. Курляндскому . Степень атрофии костной ткани лунки зуба:

- 1. $\frac{1}{4}$;
 - 2. $\frac{1}{2}$;
 - 3. $\frac{3}{4}$. Состояние опорно-удерживающего аппарата зуба:
 - А. Компенсированное;
 - Б. Субкомпенсированное;
 - В. Декомпенсированное.
- А. 1А, 2Б, 3В
 - Б. 1В, 2Б, 3А
 - В. 1Б, 2А, 3В

Определение центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов начинают с

- А. Оформления вестибулярного овала на верхнем окклюзионном валике
- Б. Припасовки нижнего воскового базиса с окклюзионными валиками в соответствии с высотой нижнего отдела лица
- В. Нанесения клинических ориентиров для постановки зубов
- Г. Фиксации центрального соотношения челюстей
- Д. Формирования протетической плоскости на верхнем окклюзионном валике

При изготовлении штифтовой конструкции оптимальная длина штифта относительно длины корня составляет

- А. 1/3
- Б. 2/3
- В. 1/2
- Г. Всю длину корня
- Д. Длина штифта не имеет значения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между разным подходом при пальпации мышц челюстно-лицевой области и названием мышц. При обследовании мышечной системы челюстно-лицевой области пальпируются:

1. Со стороны кожных покровов;
2. Со стороны полости рта. Название мышцы:

- А. Собственно жевательные мышцы;
- Б. Наружные крыловидные мышцы;
- В. Внутренние крыловидные мышцы;
- Г. Височные мышцы;
- Д. Мышцы дна полости рта;
- Е. Заднее брюшко двубрюшной мышцы.

- А. 1А,Г,Е, 2Б,В,Д
- Б. 1АБВ, 2ДЕГ
- В. 1ДЕГ, 2АБВ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видом постановки искусственных зубов в съёмном протезе при дефекте зубного ряда и условиями в полости рта. Вид постановки искусственных зубов:

1. На приточке;

2. На искусственной десне. Условия в полости рта:

А. При невыраженном альвеолярном отростке верхней челюсти в переднем участке зубного ряда;

Б. «Короткая» верхняя губа;

В. При выраженном альвеолярном отростке верхней челюсти в переднем участке зубного ряда;

Г. При концевом одностороннем дефекте зубного ряда

А. 1БВ, 2А, Г

Б. 1А, 2БГ,

В. 1АБ, 2Г,

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между правильной последовательностью проведения клинического этапа коррекция съёмного пластиночного протеза при частичном дефекте зубного ряда и компонентами действия. Правильная последовательность:

1.

2.

3.

4.

5. Компоненты действия::

А. Рекомендации пациенту по правилам пользования протезом;

Б. Обследование протезного ложа, при необходимости коррекция; В. Жалобы пациента;

Г. Проверка фиксации протеза ;

Д. Сошлифовывание преждевременных окклюзионных контактов.

А. 1А, 2В, 3Г, 4Д, 5Б

Б. 1В, 2Б, 3Д, 4Г, 5А

В. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В

Причинами расцементирования металлопластмассовой коронки являются

А. Отсутствие контакта с соседними зубами

Б. отсутствие контакта с зубами-антагонистами

В. Плохое обезжиривание и высушивание зуба

Г. удлинённый край коронки

Д. Отсутствие экватора коронки

Перед фиксацией центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов создают углубления на окклюзионных валиках

- А. Нижнем на окклюзионной поверхности
- Б. Верхнем на окклюзионной поверхности
- В. Нижнем и верхнем на окклюзионных поверхностях
- Г. Расположение углублений не имеет значения
- Д. Нижнем и верхнем на вестибулярных поверхностях

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между способами передачи жевательного давления по Румпелю и видами протезов. Способы передачи жевательного давления:

- 1. Физиологический;
 - 2. Нефизиологический;
 - 3. Полуфизиологический. Вид протеза:
 - А. Мостовидный;
 - Б. Съёмный пластиночный;
 - В. Бюгельный.
- А. 1А, 2В, 3Б
 - Б. 1А, 2Б, 3В
 - В. 1В, 2Б, 3А

При препарировании зуба под металлокерамическую коронку возможно создание уступа-скоса в пришеечной области под углом

- А. 135°
- Б. 50°
- В. 70°
- Г. 150°
- Д. 170°

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классом дефектов зубных рядов по

Е.И. Гаврилову и характеристикой дефекта зубного ряда. Класс по Гаврилову:

1. III;

2. IV. Дефект зубного ряда:

А. Концевые дефекты (односторонние, двусторонние);

Б. Комбинированные дефекты;

В. Включенные дефекты (боковые – односторонние, двусторонние, передние); Г. Челюсти с одиночно сохранившимися зубами.

А. 1Б, 2Г

Б. 1А, 2Б

В. 1В, 2А

Разборная гипсовая модель отливается при изготовлении

А. Штампованной коронки

Б. Цельнолитой коронки

В. Бюгельного протеза

Г. Съёмного мостовидного протеза

Д. Пластиночного протеза

$\frac{3}{4}$ степени атрофии лунки зуба соответствует

А. 1,5 высоте анатомической коронки зуба

Б. Двум размерам высоты анатомической коронки зуба

В. Одной высоте анатомической коронки зуба Г. Половине высоты анатомической коронки зуба Д. Меньше половины высоты анатомической коронки зуба

Г. Половине высоты анатомической коронки зуба

Д. Меньше половины высоты анатомической коронки зуба

Первая коррекция съёмного пластиночного протеза проводится

А. В день наложения протеза

Б. На следующий день после наложения протеза

В. Через неделю после наложения протеза

Г. Через месяц

Д. Только при появлении болей

Для проведения этапа "определение центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов" в клинику поступают

- А. Гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками
- Б. Восковые базисы с окклюзионными валиками
- В. Гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками, зафиксированные в окклюдатор
- Г. Гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками, зафиксированные в артикулятор
- Д. Гипсовые модели с восковыми базисами и искусственными зубами

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между местом коррекции индивидуальной ложки на верхней челюсти при полном отсутствии зубов и проведением функциональной пробы. Проведение функциональной пробы;

1. «Глотание»; 2. «Широкое открывание рта»;
3. «Вытягивание вперед губ, сложенных трубочкой»; 4. «Всасывание щёк». Место коррекции индивидуальной ложки:

А. В области альвеолярных бугров и крылочелюстных складок;
Б. Дистальный край ложки ; В. В области щёчных складок ; Г. Вестибулярный край между клыками.

- А. 1Б, 2А, 3Г, 4В
- Б. 1А, 2Б, 3Г, 4В
- В. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классом дефектов зубных рядов по Кеннеди и характеристикой дефекта зубного ряда. Классы по Кеннеди:

1. Первый;
 2. Второй;
 3. Третий;
 4. Четвертый. Дефекты зубных рядов:
- А. Односторонний дистально не ограниченный (концевой);
Б. Двусторонний дистально не ограниченный (концевой); В. В области передних зубов (включенный);
Г. Односторонний дистально ограниченный (включенный) в области боковых зубов.

- А. 1А, 2Б, 3Г, 4В
- Б. 1Б, 2А, 3Г, 4В
- В. 1Б, 2В, 3Г, 4А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между понятиями «центральное соотношение челюстей», «центральная окклюзия» и вариантами соотношения зубов – антагонистов. В клинике определяется:

1. Центральное соотношение челюстей;
 2. Центральная окклюзия. Соотношение зубов – антагонистов:
 - А. При наличии антагонистов в трех функционально ориентированных группах зубов;
 - Б. При наличии 1 или 2 пар зубов-антагонистов;
 - В. При отсутствии зубов-антагонистов
- А. 1А, 2В
Б. 1В, 2Б
В. 1А, 2Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между движениями нижней челюсти и мышцами. Функция:

1. Выдвижение нижней челюсти вперед;
 2. Смещение нижней челюсти в сторону. Мышцы:
 - А. Одностороннее сокращение латеральных крыловидных;
 - Б. Челюстно – подъязычные;
 - В. Двухстороннее сокращение латеральных крыловидных;
 - Г. Височные;
 - Д. Собственно жевательные;
 - Е. Медиальные крыловидные;
 - Ж. Подбородочно – подъязычные;
 3. Двубрюшная.
- А. 1В, 2А
Б. 1Б, 2А
В. 1А, 2Б

Требования к корням зубов, используемым для штифтовых конструкций

- А. Подвижность 2-3 степени
- Б. Толщина стенок корня не менее одного миллиметра
- В. Канал распломбирован на 1/3
- Г. Расширение периодонтальной щели
- Д. Канал не запломбирован до верхушки на 1/3

Культевые штифтовые вкладки методом литья изготавливают из

- А. Пластмассы
- Б. Легкоплавкого металла
- В. Сплавов металлов
- Г. Композиционных материалов
- Д. Воска

Граница съемного протеза при полном отсутствии зубов на нижней челюсти по отношению к позадимолярному (ретромолярному) бугорку

- А. Перекрывает его полностью
- Б. Не доходит до бугорка на 1мм
- В. Не доходит до бугорка на 5мм
- Г. Располагается посередине бугорка
- Д. Перекрывает бугорок на 2/3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между типами слизистой оболочки по классификации Суппли и их характеристикой. Типы слизистой оболочки по Суппли:

- 1. Первый;
 - 2. Второй. Характеристика:
 - А. Избыточно податлива, разрыхлена, сильно увлажнена;
 - Б. Бледно розового цвета, умеренно увлажнена и податлива, с нормальным порогом болевой чувствительности;
 - В. Тонкая, сухая, малоподатлива, повышенная болевая чувствительность;
 - Г. Складчатая, с «болтающимся» альвеолярным гребнем.
- А. 1А, 2 В
 - Б. 1Б, 2В
 - В. 1Б, 2А

Определение центрального соотношения челюстей для изготовления пластиночных протезов при дефектах зубных рядов начинают с

- А. Припасовки восковых базисов с окклюзионными валиками с учетом высоты физиологического покоя
- Б. Проверки правильности определения центрального соотношения челюстей
- В. Нанесения клинических ориентиров для постановки искусственных зубов
- Г. Оценки качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками
- Д. Приклеивания разогретой пластинки воска и фиксация центрального соотношения челюстей

В случае фиксации бокового смещения нижней челюсти на этапе определения центрального соотношения челюстей характер соотношения зубных рядов при проверке конструкции протеза следующий

- А. Бугорковый контакт между антагонистами, сагиттальная щель во фронтальном участке, снижение высоты нижнего отдела лица
- Б. Бугорковый контакт между антагонистами в боковом участке с одной стороны и просвет с другой, завышение высоты нижнего отдела лица
- В. Фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, высота нижнего отдела лица в норме
- Г. Фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, снижение высоты нижнего отдела лица
- Д. Фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, завышение высоты нижнего отдела лица

Гранулярная пористость в пластмассе образуется вследствие

- А. Быстрого нагрева кюветы
- Б. Недостаточного сжатия пластмассы
- В. Быстрого охлаждения кюветы
- Г. Нарушения температуры нагрева кюветы
- Д. Нарушения технологии приготовления пластмассы

Трансверзальное расположение кламмерной линии благоприятно для фиксации съёмного протеза

- А. На верхней челюсти
- Б. На нижней челюсти
- В. На верхней и нижней челюстях
- Г. При «болтающемся гребне» на верхней челюсти
- Д. При высокой степени атрофии альвеолярного отростка

Противопоказанием к изготовлению искусственной коронки является

- А. Подвижность зуба третьей степени
- Б. Патологическая стираемость твердых тканей
- В. Наличие гиперэстезии
- Г. Снижение высоты нижнего отдела лица
- Д. Необходимость укорочения зуба при феномене Попова-Годона

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между материалом и областью его применения. Наименование материала:

1. Изолирующий лак «Изокол»;
2. Акриловая пластмасса «Фторакс»;
3. Припой ;
4. Липкий воск;
5. Альгинатный материал «Уреен». Область его применения: А. Получение оттисков;
Б. Базисы съемных пластиночных протезов, базисы ортодонтических аппаратов;
В. Пайка частей мостовидных протезов;
Г. Временное соединение частей протезов
- Д. Изоляция поверхности модели на этапе замены воска на пластмассу.

А. 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д

Б. 1Д, 2Б, 3В, 4Г, 5А

В. 1Д, 2А, 3В, 4Г, 5Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между разными классификациями и видом зубных протезов. Классификация:

1. По назначению;
2. По методу изготовления. Зубные протезы:
А. Коронки, полукоронки, экваторные коронки, телескопические коронки;
Б. Коронки комбинированные, металлические, неметаллические;
В. Литые, штампованные, полимеризованные; Г. Восстановительные, опорные, шинирующие.

А. 1Г, 2В

Б. 1А, 2В

В. 1Г, 2Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видом гипса и его формулой. Гипс:

1. Природный;
2. Медицинский. Формула:
А. Полуводный ; Б. Двуводный

А. 1А, 2Б

Б. 1Б, 2А

В. 1Б, 2Б

На этапе "проверка конструкции съемного протеза" При полном отсутствии зубов в случае выявления занижения высоты нижнего отдела необходимо заново определить центральное соотношение челюстей

- А. Сняв боковые зубы с нижнего воскового базиса и приклеив пластинку воска к нему
- Б. С помощью новых восковых базисов с окклюзионными валиками
- В. Сняв боковые зубы с верхнего воскового базиса и приклеив пластинку воска к нему
- Г. Сняв боковые зубы с верхнего и нижнего восковых базисов и приклеив пластинку воска к нижнему восковому базису
- Д. Приклеив пластинку воска на зубы нижнего воскового базиса

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность этапов литья частей зубных протезов. Порядок:1.;

2.;

3.;

4.;

5.;

6.;

7.;

8. Компонент действия:

- А. Отделка частей зубных протезов;
- Б. Освобождение литых протезов от формовочной массы;
- В. Заполнение опоки формовочной массой;
- Г. Высушивание и прожигание опоки в муфельной печи;
- Д. Снятие подпочного конуса и выплавление воска;
- Е. Нагревание опоки и расплавление сплава;
- Ж. Нагнетание расплавленного сплава в форму;

3. Создание литниковой системы.

- А. 1А, 2Б, 3В, 4З, 5Е, 6Ж, 7Г, 8Д
- Б. 1А, 2Ж, 3З, 4Г, 5Б, 6В, 7Д, 8Е
- В. 1З, 2В, 3Д, 4Г, 5Е, 6Ж, 7Б, 8А

При припасовке литых мостовидных протезов, точность прилегания коронок к культи опорных зубов оценивается с помощью

- А. Эластического слепочного материала
- Б. Базисного воска
- В. Гипса
- Г. Копировальной бумаги
- Д. Моделировочного воска

Причинами расцементирования металлокерамической коронки являются:

- А. Чрезмерная конусность отпрепарированной культи зуба
- Б. Отсутствие экватора коронки
- В. Отсутствие контакта с соседними зубами
- Г. Отсутствие контакта с зубами-антагонистами
- Д. Удлиненный край коронки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между съёмными пластиночными протезами, изготовленными на нижнюю или верхнюю челюсть, и наиболее рациональным расположением кламмерной линии для их фиксации. Съёмный пластиночный протез изготовлен на нижнюю или верхнюю челюсть:

- 1. Нижняя;
 - 2. Верхняя. Благоприятное расположение кламмерной линии:
 - А. Диагональное;
 - Б. Сагиттальное;
 - В. Поперечное.
- А. 1Б, 2В
 - Б. 1А, 2Б
 - В. 1В, 2А

Повторная фиксация центрального соотношения челюстей методом наложения восковой пластинки на искусственные зубы нижней челюсти возможно при

- А. Завышении высоты нижнего отдела лица
- Б. Снижении высоты нижнего отдела лица
- В. При смещении нижней челюсти влево
- Г. При смещении нижней челюсти вправо
- Д. При смещении нижней челюсти вперед

Первая степень патологической подвижности зуба по Энтину характеризуется визуально определяемым смещением зуба в направлении

- А. Вертикальном
- Б. Вестибуло-оральном
- В. Вестибуло-оральном и мезио-дистальном
- Г. Круговом
- Д. Мезио-дистальном

При изготовлении консольного несъемного протеза отрицательным является

- А. Необходимость депульпации опорных зубов
- Б. Препарирование большого количества зубов
- В. Наличие опрокидывающего момента в области опорных зубов
- Г. Неудовлетворительное эстетическое качество
- Д. Сошлифовывание большого количества тканей опорных зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между терминами, применяемыми при проведении избирательного пришлифовывания зубов, и их значением. Термин:

1. Центральная окклюзия;
 2. Эксцентрическая окклюзия;
 3. Привычный прикус (привычная или вторичная окклюзия);
 4. Центрический суперконтакт;
 5. Функциональная окклюзия (артикуляция). Значение: А. Окклюзионные контакты зубов при переходе из центральной в переднюю и боковые окклюзии;
 - Б. Множественные фиссурно-бугорковые контакты зубных рядов при центральном положении головок височно-нижнечелюстного сустава в суставных ямках;
 - В. Динамические контакты зубных рядов в центральной, боковой и передней окклюзиях;
 - Г. Суперконтакт в центральной окклюзии;
 - Д. Всякое максимальное множественное смыкание зубных рядов, возможное без центрального положения суставных головок в ямках.
- А. 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В
Б. 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5Г
В. 1В, 2А, 3Д, 4Г, 5Б

Бюгельный протез состоит из

- А. Дуги
- Б. Искусственных зубов и дуги
- В. Дуги, кламмеров и каркаса
- Г. Дуги, кламмеров и седловидных частей с искусственными зубами
- Д. Кламмеров и седловидных частей

Окклюзия – это

- А. Всевозможные смыкания зубных рядов верхней и нижней челюстей
- Б. Положение нижней челюсти относительно верхней в состоянии относительного физиологического покоя
- В. Всевозможные положения нижней челюсти относительно верхней
- Г. Соотношение беззубых челюстей
- Д. Вид прикуса

Тело удерживающего кламмера съёмного протеза отстоит от боковой поверхности опорного зуба и располагается

- А. В пришеечной области
- Б. Между жевательной поверхностью зуба и экватором
- В. Между экватором и пришеечной областью
- Г. На экваторе
- Д. Слегка касается маргинальной десны

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью подвижности зуба по классификации

Д.А. Энтина и направлением визуально определяемого смещения зуба. Степень подвижности зуба по Энтину:

1. Первая;
2. Вторая. Направление визуально определяемого смещения зуба:

- А. Вертикальное;
- Б. Вестибуло-оральное и медио-дистальное;
- В. Круговое;
- Г. Вестибуло-оральное.

- А. 1Г, 2А
- Б. 1Г, 2Б
- В. 1В, 2А

Место коррекции индивидуальной ложки на нижней челюсти при проведении функциональной пробы «широкое открывание рта»

- А. Вестибулярный край в области моляров и передних зубов
- Б. Вестибулярный край в области бугра верхней челюсти
- В. Язычный край в области моляров
- Г. Язычный край в области премоляров
- Д. От позадиомолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии

Противопоказанием к изготовлению культевой штифтовой вкладки является

- А. Атрофия костной ткани стенок альвеол 1 степени
- Б. Разрушение коронковой части зуба с сохранением 3 мм над уровнем десны
- В. Наличие твёрдых тканей зуба на уровне десневого края
- Г. Разрушение твёрдых тканей зуба ниже уровня десневого края более 3,0 мм
- Д. Разрушение твёрдых тканей зуба ниже уровня десневого края на 0,5 мм

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность изготовления культевой штифтовой вкладки прямым методом. Порядок:

1.;

2.;

3.;

4. Компонент действия:

А. Моделирование восковой композиции вкладки ;

Б. Припасовка и фиксация культевой вкладки ;

В. Распломбирование канала и подготовка надкорневой части зуба ;

Г. Отливка вкладки из сплава металла.

А. 1А, 2Б, 3В, 4Г

Б. 1В, 2А, 3Г, 4Б

В. 1Б, 2А, 3Г, 4В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью атрофии костной ткани альвеолы и уменьшением выносливости пародонта в одонтопародонтограмме

В.Ю. Курляндского. Степень атрофии костной ткани альвеолы:

1. 1/4;

2. 1/2;

1. 3/4;

2. Более 3/4. Уменьшение выносливости пародонта по

В.Ю. Курляндскому:

А. 75%;

Б. 50%;

В. 25%;

Г. Более 75%

А. 1А, 2В, 3Г, 4Б

Б. 1Б, 2В, 3А, 4Г

В. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между углом, образованным межальвеолярными линиями и протетической плоскостью, и показаниями к постановке искусственных зубов по разному типу. Угол, образованный межальвеолярными линиями и протетической плоскостью, градусах :

1. Менее 80 ;

2. 80 – 90 ;

3. более

90 . Показания к постановке искусственных зубов по типу:

А. Ортогнатическому;

Б. Прогеническому;

В. Прогнатическому;

Г. Бипрогнатическому.

А. 1Б,2А,3В

Б. 1В, 2Б

В. 1А, 2Б, 3В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами определения высоты нижнего отдела лица и основных признаков.

Методы определения высоты нижнего отдела лица:

1. Антропометрический;

2. Анатомо- физиологический;

3. Функциональный. Признаки:

А. Проводится оценка внешнего вида пациента и высоты нижнего отдела лица при относительном физиологическом покое мышц;

Б. Основывается на принципе пропорциональности (метод Канторовича и метод Водсворта – Уайта);

В. Основывается на анализе силы мышечного сокращения с помощью аппарата (АОЦО).

А. 1А, 2Б, 3В

Б. 1В, 2А, 3Б

В. 1Б, 2А,3В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления цельнолитого мостовидного протеза с пластмассовой облицовкой .

Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;

5. Клинические этапы изготовления цельнолитого мостовидного протеза с пластмассовой облицовкой :

А. Фиксация протеза на опорных зубах цементом;

Б. Определение центральной окклюзии ;

В. Препарирование зубов, получение оттисков;

Г. Припасовка мостовидного протеза;

Д. Припасовка цельнолитого каркаса, выбор цвета облицовки.

А. 1Г, 2А, 3Б, 4Д, 5Г

Б. 1В, 2Б, 3Д, 4Г, 5А

В. 1Б. 2А, 3Д, 4В, 5Г

"Мраморность" базиса пластиночного протеза возникает при

А. Несоблюдении температурного режима полимеризации

Б. Нарушении прессования

В. Резком охлаждении кюветы после окончания полимеризации

Г. Неплотном соединении частей кюветы

Д. Отсутствии изолирующего слоя на гипсовой модели перед паковкой пластмассы

Место коррекции индивидуальной ложки на нижней челюсти при проведении функциональной пробы «вытягивание вперед губ, сложенных трубочкой»

А. Язычный край в области премоляров

Б. Вестибулярный край между клыками

В. Вестибулярный край в области моляров

Г. Язычный край в области моляров

Д. От позадиомолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии

Съемный пластиночный протез, при дефекте зубного ряда, нуждается в припасовке в полости рта вследствие

А. Наличия поднатурений в области естественных зубов

Б. Возможных ошибок при постановке искусственных зубов

В. Нарушений пропорций при подготовке пластмассы

Г. Нарушений режима полимеризации пластмассы

Д. Индивидуальных особенностей пациента

Анатомическая шейка зуба соответствует

- А. Границе над- и поддесневой частей зуба
- Б. Экватору зуба
- В. Переходу эмали в цемент корня
- Г. Дну зубодесневого желобка
- Д. Дну патологического зубодесневого кармана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между местом коррекции индивидуальной ложки на нижней челюсти при полном отсутствии зубов и проведением функциональной пробы. Проведение функциональной пробы: 1. «Глотание»; 2. «Широкое открывание рта»; 3. «Вытягивание вперед губ, сложенных трубочкой»;

4. «Высовывание языка по направлению к кончику носа»;

5. «Дотрагивание кончиком языка до щеки». Место коррекции индивидуальной ложки:

А. Вестибулярный край в области моляров и передних зубов ;

Б. Вестибулярный край между клыками; В. От позадиомолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии;

Г. 1 см от средней линии на подъязычном крае ложки со стороны противоположной смещению языка;

Д. У уздечки языка.

А. 1А, 2В, 3Д, 4Г, 5Б

Б. 1Б, 2Д, 3Г, 4Б, 5А

В. 1В, 2А, 3Б, 4Д, 5Г

Проверка окклюзионных контактов на этапе припасовки несъемного мостовидного протеза проводится при окклюзиях

- А. Центральной и сагиттальных
- Б. Боковых, сагиттальных и центральной
- В. Сагиттальных и боковых
- Г. Сагиттальных
- Д. Центральной

При изготовлении металлокерамической коронки чрезмерное укорочение культи зуба может привести к

- А. Нарушению эстетики
- Б. Функциональным нарушениям
- В. Сколу керамики
- Г. Расцементировки коронки
- Д. Травме десны

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность проведения этапа определения центрального соотношения челюстей при изготовлении полных съемных протезов. Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;

5.;

6.; 7. Компонент действия:

А. Определение высоты нижнего отдела лица в состоянии относительного физиологического покоя;

Б. Нанесение клиновидных углублений на верхнем восковом окклюзионном валике, приклеивание разогретой пластинки воска на нижний окклюзионный валик, фиксация центрального соотношения челюстей;

В. Создание протетической плоскости на верхнем восковом окклюзионном валике;

Г. Нанесение клинических ориентиров для подбора и постановки зубов;

Д. Припасовка восковых базисов с окклюзионными валиками с учетом высоты нижнего отдела лица в физиологическом покое ;

Е. Оценка качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками;

Ж. Формирование вестибулярного овала на верхнем восковом окклюзионном валике и определение его высоты.

А. 1Е, 2Ж, 3В, 4А, 5Д, 6Б, 7Г

Б. 1Ж, 2Е, 3А, 4В, 5Б, 6Г, 7Д

В. 1А, 2Е, 3Ж, 4Б, 5В, 6Г, 7Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между терминами артикуляция, прикус и их значениями. Термин:

1. Артикуляция;

2. Прикус. Значение:

А. Вид смыкания зубов в центральной окклюзии;

Б. Всевозможные движения нижней челюсти ;

В. Вид смыкания зубов в передней окклюзии;

Г. Вид смыкания зубов в боковой окклюзии.

А. 1А, 2А

Б. 1А, 2Б

В. 1Б, 2А

При изготовлении консольного несъёмного Протеза отрицательным является

- А. Наличие опрокидывающего момента в области опорных зубов
- Б. Необходимость депульпации опорных зубов
- В. Препарирование большого количества зубов. Неудовлетворительное эстетическое качество
- Д. Сошлифовывание большого количества тканей опорных зубов
- Г. Неудовлетворительное эстетическое качество
- Д. Сошлифовывание большого количества тканей опорных зубов

Съемные протезы с металлическими базами применяются

- А. При прямом прикусе
- Б. При непереносимости пластмассовых протезов
- В. При пониженной секреции слюны
- Г. При резкой атрофии альвеолярного отростка
- Д. При повышенной секреции слюны

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинико – лабораторных этапов изготовления съемного пластиночного протеза . Порядок:1.;

2.;

3.;

4.;

5.;

6.;

7.;

8. Клинико – лабораторные этапы изготовления съемного пластиночного протеза :

- А. Коррекция протеза;
- Б. Постановка искусственных зубов ;
- В. Припасовка и наложение протеза;
- Г. Определение центральной окклюзии;
- Д. Проверка конструкции протеза;
- Е. Замена воскового базиса на пластмассовый ;
- Ж. Получение оттисков, отливка гипсовых моделей; Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.

А. 1Б, 2А, 3В, 4Ж, 5Е, 6Д, 7Г, 8З

Б. 1Ж, 2З, 3Г, 4Б, 5Д, 6Е, 7В, 8А

В. 1А, 2Ж, 3З, 4Г, 5Е, 6Д, 7Б, 8В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видом искусственной коронки и сплавом металла. Вид искусственной коронки:

1. Цельнолитая коронка; 2. Каркас металлокерамической коронки;

3. Штампованная коронка;

4. Каркас металлопластмассовой коронки. Сплав металла:

А. Хромоникелевый сплав; Б. Золотой сплав 900‰; В. Золотой сплав 750‰

А. 1 БГ, 2В, 3А, 4БВ

Б. 1АВ, 2А, 3Б, 4А, В

В. 1Б, 2ВГ, 3А, 4Г

Дистальный край съемного протеза при полном отсутствии зубов на верхней челюсти при прямом соотношении челюстей должен

А. Перекрывать границу твердого и мягкого неба на 1 – 2 мм

Б. Проходить строго по границе твердого и мягкого неба

В. Перекрывать границу твердого и мягкого неба на 3 – 5 мм

Г. Не доходить до границы твердого неба на 5 – 7 мм

Д. Перекрывать границу твердого и мягкого неба на 5 – 7 мм

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между кламмерами системы Нея и показаниями к их применению. Кламмера системы Нея:

1. I типа - Аккера;

2. II типа - Роуча;

3. III типа - Аккера-Роуча;

4. IV типа – заднего или обратного действия;

5. V типа – круговой одноплечий. Показания к применению: А. Используется на одиночностоящих молярах;

Б. Располагается на премолярах и клыках при дефектах I и II класса по Кеннеди;

В. Представляет собой комбинацию первых двух типов и показан, когда на одной поверхности зуба, например, вестибулярной, целесообразно применить кламмер одного типа, а на оральной – другого;

Г. Применяется на молярах и премолярах при дефектах 3 класса по Кеннеди, клинический экватор хорошо выражен и расположен по середине оральной и вестибулярной поверхностей коронковой части зуба;

Д. Применяют на зубах с резко выраженным экватором независимо от уровня его расположения, а также при наклоне зуба, когда кламмер классического типа нельзя применить.

А. 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д

Б. 1Б, 2А, 3В, 4Д, 5Г

В. 1Г, 2Д, 3В, 4Б, 5А

На этапе "проверка конструкции съемного протеза" при полном отсутствии зубов в случае выявления завышения высоты нижнего отдела лица необходимо заново определить центральное соотношение челюстей

- А. С помощью новых восковых базисов с окклюзионными валиками
- Б. Сняв боковые зубы с верхнего воскового базиса и приклеив к нему пластинку воска
- В. Приклеив пластинку воска на боковые зубы нижнего воскового базиса
- Г. Сняв боковые зубы с нижнего воскового базиса и приклеив к нему пластинку воска
- Д. Приклеив пластинку воска на передние зубы нижнего воскового базиса

При препарировании зуба под металлокерамическую коронку с жевательной поверхности или режущего края сошлифовывают ткани зуба примерно на (в мм)

- А. 0,1 – 0,3
- Б. 0,3 – 0,6
- В. 1,5 – 1,8
- Г. 0,7 – 1,0
- Д. 2,5 – 3,0

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между нижней или верхней челюстью и сроками остеоинтеграции дентальных имплантатов. Нижняя или верхняя челюсть:

1. На нижней челюсти;

2. На верхней челюсти. Сроки остеоинтеграции дентальных имплантатов, в месяцах:

- А. 3 – 4 ;
- Б. 5 – 6 ;
- В. 7 –
- 8.
- А. 1Б, 2В
- Б. 1А, 2Б
- В. 1В, 2Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классификациями беззубых челюстей различных авторов и количеством типов челюстей. Классификация беззубых челюстей:

1. Шредер;
 2. Дойников;
 3. Келлер;
 4. Курляндский. Типы:
 - А. 5 типов атрофии на верхней челюсти и 5 типов атрофии на нижней челюсти.;
 - Б. 3 типа атрофии на верхней челюсти.;
 - В. 5 типов атрофии на нижней челюсти.;
 - Г. 4 типа атрофии на верхней челюсти.;
 - Д. 4 типа атрофии на нижней челюсти.
- А. 1В, 2А, 3Д, 4Б
Б. 1Б, 2А, 3Д, 4В
В. 1Б, 2В, 3Д, 4А, 5Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами параллелометрии и показаниями и сущности метода. Методы параллелометрии:

1. Произвольный ;
 2. Метод Новака;
 3. Логический метод. Показания и сущность метода:
 - А. Целесообразно использовать при планировании четырех и более кламмеров в конструкции опирающегося протеза. Основан на изменении топографии линии клинического экватора при изменении угла наклона модели.;
 - Б. Применяется при минимальном числе планируемых в конструкции протеза кламмеров и параллельности осей зубов, модель фиксируется в горизонтальном положении.;
 - В. Применяется при числе опорных зубов не более четырех и взаимном наклоне их осей. Основан на определении средней оси наклона зуба и фиксации модели при совпадении средней оси со стержнем параллелометра.
- А. 1А, 2В, 3Б
Б. 1Б, 2В, 3А
В. 1А, 2Б, 3В

Ориентиром для постановки центральных резцов на верхней челюсти служит расположение

- А. Крыльев носа
- Б. Уздечки верхней губы
- В. Линии эстетического центра лица
- Г. Филтрума верхней губы
- Д. Носо-губных складок

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между типами кламмеров системы фирмы Neu и их применением. Разновидность кламмера:

1. Кламмер I типа (Аккера);
 2. Кламмер II типа (Роуча);
 3. Кламмер III типа (комбинированный);
 4. Кламмер IV типа (обратного действия);
 5. Кламмер V типа (круговой с двумя окклюзионными накладками). Применение:
- А. При дистальном наклоне клыков, премоляров или моляров, когда линия обзора высоко приподнимается к апроксимальной дистальной стенке, а опорная зона практически отсутствует;
 - Б. При срединном расположении линии обзора на крупных зубах;
 - В. При комбинированном наклоне одиночного моляра в сагиттальном и одновременно трансверзальном направлениях;
 - Г. При вестибулярном наклоне премоляров и передних зубов, ограничивающих дефект зубного ряда без дистальной опоры;
 - Д. При наклоне моляра или премоляра в вестибулярную или оральную сторону.
- А. 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д
 - Б. 1В, 2А, 3Д, 4Г, 5Б
 - В. 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между типами беззубой верхней челюсти по классификации

А.И. Дойникова и характерными признаками. Классификация

А.И. Дойникова для беззубой верхней челюсти: 1. Первый тип

2. Второй тип

3. Третий тип 4. Четвертый тип

5. Пятый тип. Признаки:

А. Средняя степень атрофии альвеолярного отростка, средней глубины небо ;

Б. Почти полное отсутствие альвеолярного отростка, резко уменьшенные размеры тела челюсти и альвеолярных бугров, плоское небо;

В. Альвеолярный отросток хорошо выражен в переднем отделе и резко атрофирован в боковых отделах ;

Г. Высокий альвеолярный отросток, хорошо выраженные альвеолярные бугры, глубокое небо;

Д. Альвеолярный отросток резко атрофирован в переднем отделе и хорошо выражен в боковых отделах.

А. 1Г, 2А, 3Г, 4В, 5Д

Б. 1А, 2Б, 3Д, 4В, 5Г

В. 1Г, 2А, 3Б, 4В, 5Д

Создание чрезмерной конусности культи зуба при препарировании под металлокерамическую коронку обуславливает

А. Травму пародонта

Б. Затрудненное наложение протеза

В. Ослабление фиксации протеза

Г. Эстетический дефект в области шейки зуба

Д. Снижение жевательной эффективности

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между назначением и видом пластмассы. Назначение:

1. Материал для базиса съемного протеза;
2. Эластическая подкладка. Вид пластмассы:

А. «Госсил»;
Б. «Фторакс»;
В. «Этакрил»;
Г. «Синма-М».

А. 1БВ; 2А

Б. 1А, 2В

В. 1АБ, 2Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность лабораторных этапов изготовления полных съемных протезов. Порядок:

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4.;
- 5.;

6. Лабораторные этапы изготовления полных съемных протезов:

А. Обработка, шлифовка, полировка;
Б. Постановка искусственных зубов;
В. Гипсовка моделей в артикулятор ;
Г. Гипсовка в кювету, паковка пластмассы и её полимеризация ;
Д. Получение гипсовых моделей и изготовление индивидуальных ложек;
Е. Получение гипсовых моделей и изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.

А. 1Б, 2А, 3В, 4Г, 5Д, 6Е

Б. 1Б, 2В, 3Г, 4А, 5Д, 6Е

В. 1Д, 2Е, 3В, 4Б, 5Г, 6А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между понятиями «центральное соотношение челюстей», «центральная окклюзия» и вариантами соотношения зубов – антагонистов. В клинике определяется:

1. Центральное соотношение челюстей;
2. Центральная окклюзия. Соотношение зубов – антагонистов:
 - А. При наличии антагонистов в трех функционально ориентированных группах зубов;
 - Б. При наличии 1 или 2 пар зубов-антагонистов;
 - В. При отсутствии зубов-антагонистов.

А. 1В, 2Б

Б. 1Б, 2В

В. 1В, 2А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видом композиции и областью ее применения. Восковая композиция:

1. Липкий воск;
2. Моделировочный воск «Лавакс»;
3. «Ортокор»;
4. Базисный воск. Область применения:
 - А. Моделирование вкладок;
 - Б. Склеивание частей протезов;
 - В. Оформление края индивидуальной ложки;
 - Г. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками, моделирование базисов съемных пластиночных протезов.

А. 1Г, 2А, 3В, 4Б

Б. 1Б, 2В, 3А, 4Г

В. 1Б, 2А, 3В, 4Г

При лечении болезней пародонта у пациентов с сохранившимися зубными рядами используется съемная шина Эльбрехта, которая состоит из

- А. Многозвеньевых кламмеров на все зубы с элементами перекидных кламмеров, окклюзионных накладок
- Б. Колпачковых коронок на фронтальную группу зубов
- В. Пластиночного протеза с когтевидными отростками
- Г. Бюгельного протеза с многозвеньевыми кламмерами на боковые зубы
- Д. Бюгельного протеза с когтевидными отростками

При прямом методе изготовления культевой вкладки восковая или пластмассовая модель будущей вкладки изготавливается на

- А. Модели из обычного медицинского гипса
- Б. Модели из огнеупорной массы
- В. Модели из легкоплавкого металла
- Г. Непосредственно в полости рта
- Д. Модели из супергипса

При препарировании зуба под цельнолитую коронку боковые стенки должны

- А. Быть строго параллельно
- Б. Слегка дивергировать
- В. Конвергировать под углом $6 - 8^\circ$
- Г. Конвергировать под углом $10 - 15^\circ$
- Д. Конвергировать под углом $15 - 20^\circ$

Получение оттиска при починке съемного пластиночного протеза не требуется при

- А. Отломе плеча кламмера
- Б. Переломе или трещине базиса
- В. Необходимости установки дополнительного зуба
- Г. Переносе кламмера
- Д. Отломе искусственного зуба

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления полных съемных протезов. Порядок:

- 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 - 4.;
 - 5.;
 - 6. Клинические этапы изготовления:
 - А. Припасовка индивидуальных ложек и получение функциональных оттисков ;
 - Б. Проверка конструкции протезов ;
 - В. Коррекция;
 - Г. Определение центрального соотношения челюстей;
 - Д. Получение анатомических оттисков;
 - Е. Припасовка и наложение протезов .
- А. 1А, 2Б, 3В, 4Е, 5Г, 6Д
 - Б. 1Д, 2А, 3Г, 4Б, 5Е, 6В
 - В. 1 Б, 2Г, 3В, 4А, 5Д, 6Е

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите правильную последовательность проведения обследования и заполнения истории болезни. Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;5.;

6.;

7.;

8.;

9.;

10.;

11. Компонент действия: А. Обследование полости рта;

Б. Диагноз;

В. Развитие настоящего заболевания;

Г. Паспортные данные ;

Д. Внешний осмотр;

Е. Дневник лечения ;

Ж. Определение вида прикуса;

З. Проведение дополнительных обследований;

И. Жалобы;

К. Перенесенные и сопутствующие заболевания;

Л. План лечения.

А. 1А, 2Г, 3Б, 4В, 5Е, 6Д, 7Ж, 8Л, 9И, 10К

Б. 1Б, 2А, 3В, 4К, 5З, 6И, 7Д, 8Л, 9Ж, 10З, 11Е

В. 1Г, 2И, 3К, 4В, 5Д, 6А, 7Ж, 8З, 9Б, 10Л, 11Е

Газовая пористость базиса протеза возникает из-за следующих причин

А. Недостаточное сжатие пластмассы

Б. Быстрое охлаждение кюветы

В. Быстрый нагрев кюветы

Г. Нарушение пропорций полимера и мономера

Д. Испарение мономера с не закрытой созревающей пластмассы

Моделирование цельнолитой коронки производят на

А. Гипсовом штампе

Б. Гипсовой модели

В. Разборной модели

Г. Огнеупорной модели

Д. Штампике из легкоплавкого металла

При починке съемного протеза на нижней челюсти в связи с потерей естественного зуба необходимо получить оттиск с

- А. Нижней челюсти без протеза
- Б. Нижней челюсти с протезом
- В. Верхней челюсти и нижней челюсти без протеза
- Г. Нижней челюсти с протезом и верхней челюсти
- Д. Оттиск снимать не нужно

При проведении функциональных проб по Гербсту при изготовлении полных съемных протезов амплитуда движений нижней челюсти зависит от

- А. Типа соотношения челюстей
- Б. Степени атрофии челюсти
- В. Типа слизистой оболочки
- Г. Размера нижней челюсти
- Д. Высоты нижнего отдела лица

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между движениями нижней челюсти и осуществляющих их мышцами. Функция:

- 1. Поднимание нижней челюсти;
- 2. Опускание нижней челюсти. Мышцы:
 - А. Одностороннее сокращение латеральных крыловидных;
 - Б. Челюстно – подъязычные; В. Двухстороннее сокращение латеральных крыловидных;
 - Г. Височные;
 - Д. Собственно жевательные;
 - Е. Медиальные крыловидные;
 - Ж. Подбородочно – подъязычные;
- 3. Двубрюшная.
 - А. 1 АБЕ, 2ДЖЗ
 - Б. 1АДЕ, 2БВЖ
 - В. 1ГДЕ, 2БЖЗ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между разными классификациями кламмеров и видами кламмеров. Классификация кламмеров:

1. По способу соединения с протезом;
 2. По материалу;
 3. По месту расположения плеча;
 4. По конфигурации . Виды кламмеров:
 - А. Дентальные, денто-альвеолярные, альвеолярные;
 - Б. Металлические, пластмассовые
 - В. Жесткие, полуподвижные, шарнирные;
 - Г. Гнутые, литые, полимеризованные;
 - Д. круглые, полукруглые, ленточные;
 - Е. Одноплечие, двухплечие, перекидные, двойные, многозвеньевые;
 - Ж. Удерживающие, опорно-удерживающие.
- А. 1В, 2Б, 3А, 4Е
Б. 1А, 2В, 3Б, 4Е
В. 1Б, 2В, 3А, 4Г

Для ускорения адаптации к съемному протезу после его наложения рекомендуется

- А. Снимать протез несколько раз в течение дня
- Б. Первые 3 дня надевать протез только на ночь
- В. Пользоваться протезом только во время еды
- Г. Пользоваться протезом днем и снимать на ночь первую неделю
- Д. Пользоваться протезом днем и не снимать на ночь первую неделю

Собственно жевательная мышца по функции относится к группе мышц

- А. Опускающих нижнюю челюсть
- Б. Смещающих нижнюю челюсть вперед
- В. Поднимающих нижнюю челюсть
- Г. Смещающих нижнюю челюсть вправо
- Д. Смещающих нижнюю челюсть влево

Оптимальное расположение кламмерной линии на верхней челюсти

- А. Сагиттальное
- Б. Поперечное
- В. Вестибуло – оральное
- Г. Диагональное
- Д. Точечное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления фарфоровой коронки. Порядок:

1.;

2.;

3.;4. Клинические этапы изготовления фарфоровой коронки:А. Фиксация коронки ;

Б. Препарирование зуба, получение оттисков;

В. Припасовка коронки;

Г. Определение центральной окклюзии .

А. 1Б, 2Г, 3В, 4А

Б. 1А, 2В, 3Б, 4Г

В. 1А, 2В, 3Г, 4Б

Дуга бюгельного протеза на нижней челюсти располагается

А. У шеек зубов

Б. Между шейками зубов и переходной складкой дна полости рта

В. У переходной складки дна полости рта

Г. Между шейками зубов и окклюзионной поверхностью

Д. У переходной складки преддверия полости рта

При препарировании зуба для изготовления штампованной коронки с боковых поверхностей осуществляют сошлифовку

А. Соответственно периметру шейки зуба

Б. На толщину материала коронки

В. Только экватор

Г. Только с вестибулярной поверхности

Д. Только с язычной поверхности

Сагиттальное расположение кламмерной линии неблагоприятно для фиксации съёмного протеза

А. Только на верхней челюсти

Б. Только на нижней челюсти

В. На верхней и нижней челюстях

Г. При «болтающемся гребне» на верхней челюсти

Д. При «болтающемся гребне» на нижней челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между изменением линейных размеров в процессе использования материалов и видом материала. Материал:

1. Усадка;

2. Расширение. Изменение линейного размера:

А.

А. Оттискная масса;

Б.

Б. Гипс;

В.

В. Формовочная масса;

Г.

Г. Керамическая масса;

Д.

Д. Сплавы металлов.

А. 1АГД, 2БВ

Б. 1АД, 2БВ

В. 1Д, 2В

К физиологическим видам прикуса относятся

А. Глубокий

Б. Прогнатический

В. Бипрогнатический

Г. Перекрестный

Д. Открытый

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между сплавом металла и видом искусственной коронки. Сплав металла :

1. Хромоникелевый сплав;

2. Золотой сплав 900‰;

3. Золото-платиновый сплав 750‰. Вид искусственной коронки : А. Цельнолитая коронка;

Б. Каркас металлокерамической коронки;

В. Штампованная коронка;

Г. Каркас металлопластмассовой коронки.

А. 1Г, 2А, 3Б, Г

Б. 1ВГ, 2А, 3Б

В. 1АБГ, 2В, 3А, Г

После лабораторного этапа «постановка искусственных зубов» следующий клинический этап

- А. Определение центральной окклюзии
- Б. Коррекция протеза
- В. Проверка конструкции протеза
- Г. Замена воска на пластмассу
- Д. Отделка протеза

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классификацией вторичных деформаций по

В.А. Пономаревой и их признаками. Классификация вторичных деформаций по

В.А. Пономаревой:

- 1. Первая форма;
- 2. Вторая форма; 1-ая подгруппа;
- 3. Вторая форма; 2-ая подгруппа. Признаки:

А. Одновременно со смещением зуба есть видимое увеличение альвеолярного отростка, но не отмечается обнажения корня и образования десневого кармана;

Б. Смещение зуба сопровождается явлением атрофии тканей пародонта и обнажением цемента корня с резорбцией тканей пародонта на уровне $\frac{1}{2}$ и более высоты корня;

В. Сопровождается патологической стираемостью зубов на фоне частичного отсутствия зубов со снижением высоты нижнего отдела лица;

Г. Смещение зуба сопровождается увеличением альвеолярной кости и обнажением цемента корня в пределах $\frac{1}{4}$ высоты корня.

А. 1А, 2В, 3Б

Б. 1В, 2Г, 3Б

В. 1А, 2Г, 3Б

Техник моделирует будущую штампованную искусственную коронку по объему в отношении к восстанавливаемому зубу

- А. Больше по объему восстанавливаемого зуба на толщину сплава металла
- Б. Равный по объему восстанавливаемого зуба
- В. Больше по объему восстанавливаемого зуба на 1 – 1,5 мм
- Г. Меньше по объему восстанавливаемого зуба на толщину сплава металла
- Д. Меньше по объему восстанавливаемого зуба на 1 – 1,5 мм

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видами оттискового материала и его названием. Оттисковый материал:

1. А-силиконовый материал;
2. С-силиконовый материал;
3. Полиэфирный материал. Название:

- А. Импрегум;
Б. Экзофлекс;
В. Спидекс.

А. 1А, 2Б, 3В

Б. 1Б, 2В, 3А

В. 1В, 2А, 3Б

При изготовлении литой цельнометаллической коронки моделировка воском анатомической формы производится в объеме (по сравнению с естественным зубом)

- А. Равном
Б. Меньшем на толщину 1мм
В. Большем на толщину 1мм
Г. Меньшем на толщину компенсационного лака
Д. Большем на толщину компенсационного лака

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью атрофии костной ткани альвеолы и высотой анатомической коронки зуба. Степень атрофии костной ткани альвеолы :

1. 3/4;
2. Более 3/4. Высота анатомической коронки зуба:

- А. Две высоты анатомической коронки зуба;
Б. Одна высота анатомической коронки зуба;
В. Полторы высоты анатомической коронки зуба;
Г. Половина высоты анатомической коронки зуба.

А. 1В, 2А

Б. 1В, 2Б

В. 1Б, 2А

Причиной утолщения базиса съёмного протеза является

- А. Неточность получения оттиска
Б. Неточное соединение частей кюветы при паковке пластмассы
В. Деформация протеза в момент извлечения его из кюветы после полимеризации
Г. Нарушение пропорций полимера и мономера при подготовке пластмассы
Д. Неправильный выбор вида гипсовки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между ориентирами для постановки искусственных зубов и их расположением на восковом окклюзионном валике. Ориентиры для постановки искусственных зубов:

1. Срединная линия лица;
 2. Линия клыков;
 3. Линия улыбки. Отметки на восковом окклюзионном валике:
 - А. Вертикальная линия, соответствующая крылу носа;
 - Б. Линия, соответствующая краю максимально приподнятой верхней губы;
 - В. Вертикальная линия, делящая лицо на две половины;
 - Г. Вертикальная линия, соответствующая кончику носа.
- А. 1В, 2А, 3Б
Б. 1А, 2Б, 3В
В. 1Б, 2А, 3В

При постановке зубов в артикуляторе выверяются окклюзии

- А. Боковые левые, боковые правые
- Б. Боковые правые и левые, передние
- В. Передние, центральная
- Г. Центральная
- Д. Центральная, передние, боковые

Диагональное расположение кламмерной линии благоприятно для фиксации съёмного протеза

- А. На верхней челюсти
- Б. На нижней челюсти
- В. На верхней и нижней челюстях
- Г. При «болтающемся гребне» на нижней челюсти
- Д. При высокой степени атрофии альвеолярной части

При припасовке съёмного протеза копировальная (артикуляционная) бумага используется для

- А. Выявления участков базиса, мешающих наложению протеза в области естественных зубов
- Б. Выявления степени изоляции торуса
- В. Коррекции участков базиса, травмирующих слизистую оболочку
- Г. Выявления степени изоляции экзостозов
- Д. Уточнения границ базиса протеза

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видами мостовидных протезов и их опорными элементами. Мостовидные протезы:

1. Съёмные;
 2. Несъёмные. Опорные элементы:
 - А. Коронки;
 - Б. Полукоронки;
 - В. Аттачменты;
 - Г. Кламмера.
- А. 1В, Г, 2А
Б. 1Г, 2АБ
В. 1В, Г, 2А, Б

Причиной скола керамической облицовки у металлокерамического мостовидного протеза может быть

- А. Промежуточная часть седловидной формы
- Б. Неудовлетворительная гигиена полости рта
- В. Наличие в полости рта съёмного протеза
- Г. Наличие искусственных коронок на зубах-антагонистах
- Д. Ошибки при обжиге и охлаждении керамической облицовки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между терминами, применяемыми при проведении избирательного пришлифовывания зубов, и их значением. Термин:

1. Центральная окклюзия
 2. Эксцентрическая окклюзия;
 3. Привычный прикус (привычная или вторичная окклюзия);
 4. Центрический суперконтакт;
 5. Функциональная окклюзия (артикуляция). Значение:
 - А. Окклюзионные контакты зубов при переходе из центральной в переднюю и боковые окклюзии;
 - Б. Множественные фиссурно-бугорковые контакты зубных рядов при центральном положении головок височно-нижнечелюстного сустава в суставных ямках;
 - В. Динамические контакты зубных рядов в центральной, боковой и передней окклюзиях;
 - Г. Суперконтакт в центральной окклюзии;
 - Д. Всякое максимальное множественное смыкание зубных рядов, возможное без центрального положения суставных головок в ямках.
- А. 1В, 2А, 3Д, 4Г, 5Б
Б. 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В
В. 1Б, 2А, 3Д, 4В, 5Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методом избирательного пришлифовывания по авторам и методикой проведения. Метод избирательного пришлифовывания по:

1. Jankelson;

2. Schuyler. Методика:

А. Пришлифовывание проводится в несколько посещений; устраняются преждевременные окклюзионные контакты в дистальной и центральной окклюзиях;

Б. Устраняются преждевременные контакты в центральной, передней, боковых окклюзиях.

А. 1Б, 2А

Б. 1А, 2Б

В. 1В, 2Б

Вторая степень патологической подвижности зуба по Энтину характеризуется визуально определяемым смещением зуба в направлении

А. Круговом

Б. Вертикальном

В. Вестибуло-оральном

Г. Вестибуло-оральном и мезио-дистальном

Д. Мезио-дистальном

Проверка окклюзионных контактов на этапе припасовки искусственной коронки проводится в окклюзиях

А. Сагиттальных

Б. Сагиттальных и центральной

В. Центральной и боковых

Г. Боковых и сагиттальных

Д. Сагиттальных, боковых и центральной

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между ориентирами для постановки искусственных зубов и их расположением на восковом окклюзионном валике. Ориентиры для постановки искусственных зубов:

1. Срединная линия лица;
 2. Линия клыков;
 3. Линия улыбки. Параметры расположения искусственных зубов:
 - А. Определяет ширину фронтальной группы зубов;
 - Б. Определяет расположение щек искусственных зубов;
 - В. Определяет расположение центральных резцов;
 - Г. Определяет видимую часть центральных резцов, из-под красной каймы верхней губы в покое.
- А. 1В, 2А, 3Б
Б. 1А, 2Б, 3В
В. 1В, 2Б, 3А

Штампованная коронка при припасовке в полости должна накладываться на культю зуба

- А. С небольшим возрастающим усилием
- Б. Без усилия
- В. Свободно
- Г. Со «щелчком»
- Д. С большим усилием

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность действий на этапе определения центральной окклюзии с помощью восковых базисов с окклюзионными валиками при наличии антагонизирующих пар зубов. Порядок: 1.;

- 2.;
- 3.;
- 4.;
- 5.; 6. Компонент действия:
- А. Оценка качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками ;
 - Б. Сопоставление гипсовых моделей в центральной окклюзии и проверка правильности ее определения;
 - В. Одновременная припасовка верхнего и нижнего восковых валиков до смыкания зубов-антагонистов ;
 - Г. Поочередная припасовка верхнего и нижнего валиков до смыкания зубов-антагонистов ;
 - Д. Нанесение ориентиров для постановки искусственных зубов ; Е. Приклеивание разогретой пластинки воска на восковые валики и фиксация центральной окклюзии.
- А. 1Б, 2А, 3Г, 4В, 5Д, 6Е
Б. 1Е, 2А, 3Б, 4Г, 5В, 6Д
В. 1А, 2Г, 3В, 4Е, 5Д, 6Б

Допускается постановка искусственных зубов в съёмном пластиночном протезе кпереди от центра альвеолярного гребня на 2/3 их длины в области

- А. Передних зубов нижней челюсти
- Б. Передних зубов верхней челюсти
- В. Боковых зубов нижней челюсти
- Г. Боковых зубов верхней челюсти
- Д. Передних и боковых зубов нижней челюсти

Место коррекции индивидуальной ложки на нижней челюсти при проведении функциональной пробы «глотание»

- А. Вестибулярный край между клыками
- Б. Вестибулярный край в области моляров и передней группы зубов
- В. Язычный край в области моляров
- Г. От позадиомолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии
- Д. Язычный край в области премоляров

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие номером зоны в классификации степени податливости слизистой оболочки по Люнду и локализацией участка слизистой оболочки . Классификация степени податливости по Люнду:

- 1. 1 зона;
 - 2. 2 зона;
 - 3. 3 зона;
 - 4. 4 зона. Участок слизистой оболочки в области:
 - А. Альвеолярного отростка верхней челюсти;
 - Б. Срединного небного шва ;
 - В. В переднем отделе твердого неба;
 - Д. В дистальном участке твердого неба
- А. 1А, 2Б, 3Г, 4Е
 - Б. 1Б, 2А, 3В, 4Д
 - В. 1В, 2Б, 3Г, 4А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между показаниями к проведению ортопедического лечения на имплантатах и клиническими условиями в полости рта. Показания к проведению ортопедического лечения на имплантатах:

1. Абсолютные ;
 2. Относительные. Клинические условия в полости рта:
 - А. Полное отсутствие зубов на обеих челюстях независимо от степени атрофии альвеолярной кости;
 - Б. Полное отсутствие зубов (особенно на нижней челюсти) при высокой степени атрофии;
 - В. Отсутствие 1 – 2 зубов при интактных соседних зубах;
 - Г. Наличие большого по протяженности дефекта зубного ряда во фронтальном отделе (IV класс по Кеннеди);
 - Д. Наличие дистально неограниченных дефектов зубных рядов (I и II классов по Кеннеди).;
 - Е. Одиночный сохранившийся зуб (по Е.И. Гаврилову).
- А. 1АБ, 2ВГД
Б. 1БВ, 2АГД
В. 1АВ, 2БГД

Применение замковых креплений для фиксации съёмного протеза даёт возможность

- А. Уменьшить рвотный рефлекс
- Б. Улучшить дикцию
- В. Повысить эстетику
- Г. Улучшить фиксацию протеза
- Д. Уменьшить травму десны

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления пластмассовой коронки. Порядок:

- 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 4. Клинические этапы изготовления пластмассовой коронки:
 - А. Припасовка коронки;
 - Б. Препарирование зуба, получение оттисков;
 - В. Фиксация коронки;
 - Г. Определение центральной окклюзии .
- А. 1В, 2Б, 3Г, 4А
Б. 1А, 2Б, 3В, 4Г
В. 1Б, 2Г, 3А, 4В

Для починки съемного протеза на нижней челюсти при отломе удерживающего кламмера необходимо получить оттиск с

- А. Нижней челюсти с протезом
- Б. Двух челюстей без протеза
- В. Нижней челюсти без протеза
- Г. Верхней челюсти и оттиск с нижней челюсти с протезом
- Д. Двух челюстей без протеза и с нижней челюсти с протезом

$\frac{1}{4}$ степень атрофии лунки зуба соответствует

- А. Двум размерам высоты анатомической коронки зуба
- Б. 1,5 высоте анатомической коронки зуба
- В. Одной высоте анатомической коронки зуба
- Г. Менее половины высоты анатомической коронки зуба
- Д. Половине высоты анатомической коронки зуба

Коррекцию индивидуальной ложки на нижней челюсти при проведении функциональной пробы «глотание» необходимо провести

- А. Язычный край в области моляров
- Б. Вестибулярный край в области моляров
- В. От позадиомолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии
- Г. Вестибулярный край между клыками

Основной деталью протеза по гаврилову для лечения ложного сустава является

- А. Петли
- Б. Крючки
- В. Пружина
- Г. Гантель

Металлический штамп и контрштамп используется при методе изготовления коронки

- А. Комбинированном
- Б. Внутреннем
- В. Литья
- Г. Наружном

При вправлении вывиха нижней челюсти давление на подбородок осуществляется в направлении

- А. Вбок
- Б. Книзу
- В. Снизу вверх и кзади
- Г. Вверх

При починке съемного протеза на нижнюю челюсть в связи с потерей естественного зуба необходимо снять оттиск

- А. С двух челюстей без протеза
- Б. Только с верхней челюсти
- В. С нижней челюсти с протезом и слепок с верхней челюсти
- Г. С нижней челюсти без протеза

Показание к изготовлению имедиат-протезов

- А. Деформации зубных рядов
- Б. Артроз височно-нижнечелюстного сустава
- В. Множественный кариес
- Г. Удаление зубов в связи с пародонтитом

Активатор в самотвердеющую пластмассу добавлен в

- А. Порошок
- Б. Жидкость и порошок
- В. Катализатор
- Г. Жидкость

При изготовлении кламмеров адамса с крючками для наложения резиновой тяги на зубы, стоящие в зубном ряду крючок располагается в

- А. Трансверзальной плоскости
- Б. Сагиттальной плоскости
- В. Фронтальной плоскости
- Г. Вертикальной плоскости

При иропз равным 0,6-0,8 показана следующая конструкция

- А. Керамическая вкладка
- Б. Коронка
- В. Реставрация низкомодульным композитом
- Г. Композитная вкладка

Починка базиса съемного протеза невозможна при

- А. Отломе кламмера
- Б. Трещине в базисе протеза
- В. Отломе края протеза
- Г. Множественном мелкооскольчатом переломе

При изготовлении имедиат-протезов режим полимеризации

- А. Не имеет значения
- Б. Замедляется
- В. Соблюдается
- Г. Ускоряется

Значение торка, достаточное для немедленной нагрузки

- А. 15
- Б. 20
- В. 10
- Г. 35

При всех формах повышенной стираемости показаны _____ ортопедические конструкции

- А. Металлокерамические
- Б. Штампованные
- В. Цельнолитые
- Г. Металлопластмассовые

Под непосредственным пластиночным протезом процессы регенерации лунки зуба

- А. Не изменяются
- Б. Останавливаются
- В. Ускоряются
- Г. Замедляются

Односторонний концевой дефект в боковом отделе по классификации кеннеди соответствует классу

- А. II
- Б. IV
- В. III
- Г. I

При изготовлении штифтовой конструкции длина штифта относительно длины корня составляет

- А. 1 / 3
- Б. 1 / 2
- В. 2 / 3
- Г. Всю длину корня

При подготовке полости зуба под вкладку фальц формируют только для _____ вкладок

- А. Керамических
- Б. Композитных
- В. Металлических
- Г. Гуттаперчевых

Аппарат Брюкля действует по принципу

- А. Сочетанного действия
- Б. Перемещения нижней челюсти назад
- В. Сдерживания роста нижней челюсти
- Г. Вестибулярного перемещения передних верхних зубов

Пластмассовая коронка изготавливается из

- А. Альгинатных масс
- Б. Термопластических масс
- В. Силиконовых масс
- Г. Полимеров акрилового ряда

Угол сагиттального суставного пути образуется при

- А. Движении нижней челюсти вправо
- Б. Движении нижней челюсти вперед
- В. Открывании рта
- Г. Движении нижней челюсти влево

Параллелометрия служит для

- А. Определения центральной окклюзии
- Б. Определения пути введения бюгельного протеза в полость рта
- В. Определения жевательной эффективности опорных зубов
- Г. Изучения давления бюгельного протеза на опорные зубы

Анатомический оттиск получают

- А. Индивидуальной ложкой с применением индивидуальных проб
- Б. Старым протезом
- В. Индивидуальной ложкой
- Г. Стандартной ложкой

Расстояние между ретенционными элементами (седла) каркаса бюгельного протеза и альвеолярным отростком

- А. 2,8-3,2 Мм
- Б. 0,5-0,6 Мм
- В. 0,2-0,3 Мм
- Г. 1,7-2,0 Мм

При определении центрального соотношения челюстей с помощью восковых базисов с окклюзионными валиками на верхний из них наносят разметку в виде _____ линии

- А. Зубной
- Б. Центральной
- В. Зрачковой
- Г. Носо-ушной

Тело удерживающего кламмера имедиат-протеза располагается на опорном зубе с

- А. Его окклюзионной поверхности
- Б. Его апроксимальной стороны
- В. Его вестибулярной поверхности
- Г. Оральной стороны его поверхности

При починке протеза после смешивания компонентов пластмассы наступает стадия

- А. Резиноподобная
- Б. Тянущихся нитей
- В. Песочная
- Г. Тестообразная

В опускании нижней челюсти участвует мышца

- А. Медиальная крыловидная
- Б. Подбородочно-подъязычная
- В. Височная
- Г. Латеральная крыловидная

К противопоказанию к клиническому методу перебазировки относят

- А. Тонкую сухую слизистую
- Б. Хронические заболевания слизистой
- В. Гипертрофированную слизистую
- Г. Нормальную слизистую

Если слизистая оболочка протезного ложа соответствует второму классу по суппле, то необходимо получить _____ оттиск

- А. Функциональный
- Б. Компрессионный
- В. Разгружающий
- Г. Дифференцированный

При очаговом пародонтите допустимо использовать стабилизацию

- А. Фронтально-сагитальную
- Б. Парасагитальную
- В. Отдельных групп зубов
- Г. По дуге

Отсутствие суставной щели внчс, наличие сплошного конгломерата на месте суставной головки нижней челюсти и суставной ямки височной кости являются рентгенологическими признаками

- А. Костного анкилоза
- Б. Хронического артрита
- В. Вторичного деформирующего остеоартроза
- Г. Привычного вывиха

Паковку пластмассы в кювету проводят в стадии

- А. Резиноподобной
- Б. Тестообразной или рвущихся нитей
- В. Мокрого песка
- Г. Тянувшихся нитей

По способу передачи жевательного давления на пародонт опорных зубов несъемные металлокерамические мостовидные протезы являются

- А. Физиологическими
- Б. Полуфизиологическими
- В. Биологическими
- Г. Нефизиологическими

Признаком снижения межальвеолярной высоты является

- А. Сглаженность носогубных и подбородочных складок
- Б. Углубление носогубных и подбородочных складок
- В. Удлинение нижнего отдела лица
- Г. Потеря жевательных зубов

Исследование кровообращения в тканях пародонта относят к

- А. Рентгенопериодонтографии
- Б. Мастикациографии
- В. Электромиографии
- Г. Миотонометрии

Суппле предложил классификацию

- А. Методов получения оттисков
- Б. Оттисковых материалов
- В. Форм скатов альвеолярных частей
- Г. Типов слизистой оболочки рта

Среднее значение между высотой нижнего отдела лица в центральной окклюзии и в положении относительно физиологического покоя при ортогнатическом прикусе равно (в мм)

- А. 2–4
- Б. 1
- В. 5–6
- Г. 10

Ко второму классу по классификации нею относится кламмер

- А. Роуча
- Б. Кольцевой
- В. Бонвиля
- Г. Комбинированный

Относительным противопоказанием к изготовлению металлокерамических конструкций является

- А. Ортогнатический прикус
- Б. Бруксизм
- В. Бипрогнатия
- Г. Физиологическая опистогнатия

К поздним осложнениям огнестрельных ранений относят

- А. Потерю зубов
- Б. Асфиксию
- В. Кровотечение
- Г. Стойкие контрактуры

Легче установить диагноз генерализованного пародонтита по

- А. Ортопантомограмме
- Б. Магнитно-резонансной томографии
- В. Внутриротовой рентгенограмме 2-3 зубов
- Г. Панорамной рентгенограмме верхней или нижней челюсти

Камперовская горизонталь – это линия, проходящая через точки, расположенные у

- А. Кончика носа и середины мочки уха
- Б. Основания крыльев носа и середины козелка уха
- В. Основания крыльев носа и середины мочки уха
- Г. Кончика носа и середины козелка уха

Тампонирующее проникающее дефекта верхней челюсти при снятии анатомического оттиска проводят с помощью

- А. Базисного воска
- Б. Ватного тампона
- В. Силиконового материала высокой плотности
- Г. Марлевого тампона

Проекцией для рентгенографии при диагностике переломов нижней челюсти является

- А. Полуаксиальная
- Б. Аксиальная
- В. Прямая
- Г. Косая

Первой фазой адаптации к съемным протезам (по в. Ю. Курляндскому) является фаза

- А. Полного торможения
- Б. Замедленного торможения
- В. Раздражения
- Г. Возбуждения

Силиконовые слепочные материалы относятся к

- А. Эластическим
- Б. Термопластическим
- В. Гидроколлоидным
- Г. Кристаллизующимся

При болезненной пальпации жевательных мышц, отсутствии рентгенологических изменений в височно-нижнечелюстном суставе возможен диагноз

- А. Артроз
- Б. Артрит
- В. Остеома суставного отростка нижней челюсти
- Г. Мышечно-суставная дисфункция

Возникновению локализованной формы повышенной стираемости зубов способствует

- А. Первичная травматическая окклюзия
- Б. Ошибки при терапевтическом лечении зубов
- В. Ошибки при хирургическом лечении зубов
- Г. Привычный вывих внчс

К профилактическим аппаратам относится

- А. Боксерская шина по Ревзину
- Б. Формирующий аппарат по Бетельману
- В. Складной протез по Оксману
- Г. Пластмассовая шина по Марею-Егорову

Согласно классификации дефектов зубных рядов гаврилова е.и. К первой группе относят дефекты

- А. Концевые односторонние и двусторонние
- Б. Включенные боковые (односторонние и двусторонние) и передние
- В. Коронок всех зубов
- Г. Комбинированные

При использовании метода последовательной дезокклюзии при частичном отсутствии зубов, осложненном зубочелюстными деформациями, дезокклюзия между антагонизирующими и естественными зубами должна составлять не более (в мм)

- А. 3
- Б. 1
- В. 2
- Г. 4

Металлокерамический мостовидный протез применяют при

- А. Полном отсутствии зубов
- Б. Дефектах зубного ряда второго и первого класса по Кеннеди
- В. Дефектах зубного ряда первого и четвертого класса по Кеннеди
- Г. Дефектах зубного ряда третьего и четвертого класса по Кеннеди

Зубная формула зуба

4.3 обозначает

- А. Клык нижней челюсти справа
- Б. Клык нижней челюсти слева
- В. Первый моляр нижней челюсти справа
- Г. Второй моляр нижней челюсти слева

Удерживающим элементом имедиат-протеза являются

- А. Вкладки
- Б. Замковые крепления
- В. Коронки
- Г. Кламмеры

Положение модели в параллелометре может быть

- А. Среднее
- Б. Нижнее
- В. Переднее
- Г. Верхнее

К неметаллическим коронкам можно отнести

- А. Цельнолитые
- Б. Металлокерамические
- В. Цельнокерамические, пластмассовые
- Г. Металлоакриловые

Перед транспортировкой челюстно-лицевого раненого самолетом (вертолетом) необходимо снять межчелюстные резиновые тяги, чтобы

- А. Избежать смещения отломков
- Б. Избежать механоасфиксии
- В. Больной мог разговаривать
- Г. Не мешали кормлению

Базис съёмного пластиночного протеза изготавливается из

- А. Каучука
- Б. Акриловых пластмасс
- В. Гипса
- Г. Фарфора

Метод функционального исследования мышечной системы на основе графической регистрации биопотенциалов мышц называется

- А. Мasticациография
- Б. Реопародонтография
- В. Электромиография
- Г. Миотонометрия

Для настройки артикулятора на индивидуальную функцию необходимо использовать _____ метод

- А. Аксиографический
- Б. Параллелометрический
- В. Электромиографический
- Г. Рентгенокинематографический

Показанием для проведения наркоза при вправлении вывиха нижней челюсти является

- А. Выраженная гиперсаливация
- Б. Рефлекторная контрактура жевательных мышц
- В. Привычный вывих
- Г. Подозрение на тромбофлебит угловой вены

Ортопедические аппараты, применяемые для лечения больных с дефектом неба, делят на

- А. Обтураторы
- Б. Разобщающие пластинки
- В. Несъемные
- Г. Разобщающие пластинки и обтураторы

Стандартные кламмера, применяемые при починке съемного протеза изготавливают из

- А. КХС
- Б. Сплава на основе титана
- В. Золотого сплава
- Г. Нержавеющей стали

Вредные привычки у детей, которые приводят к возникновению зубочелюстных аномалий

- А. Сосание пальца, сосание языка, подкладывание кулачка под щеку
- Б. Не своевременное удаление молочных зубов
- В. Медленное пережевывание пищи
- Г. Плохая гигиена полости рта

Жевательная нагрузка концентрируется в области

- А. Клыков и премоляров
- Б. Только моляров
- В. Моляров и премоляров
- Г. Резцов и клыков

Для отливки цельнолитых коронок применяется сплав

- А. Легкоплавкий
- Б. Медный
- В. Нержавеющая сталь
- Г. Кобальто-хромовый

Для измерения тонуса жевательных мышц применяется

- А. Электромиография
- Б. Миотонометрия
- В. Гнатодинамометрия
- Г. Реопародонтография

Базис прикусного шаблона для определения конструктивного прикуса перекрывает

- А. Оральные поверхности жевательных зубов на 2/3, фронтальных – на 1/3
- Б. Оральные поверхности жевательных зубов на высоту коронки, фронтальных – на 2/3
- В. Режущие края фронтальных зубов и окклюзионные поверхности жевательных на 1/2
- Г. Режущие края и окклюзионные поверхности всех зубов

После наложения съемного пластиночного протеза в полости рта пациента назначают коррекцию

- А. На следующий день
- Б. Через 3 дня
- В. При появлении неприятных ощущений
- Г. Через неделю

При определении центральной окклюзии горизонтальным ориентиром на лице служит линия

- А. Камперовская
- Б. Зрачковая
- В. Срединная
- Г. Улыбки

Для получения рабочих оттисков при изготовлении металлокерамических конструкций используют

- А. Силиконовый материал
- Б. Гипс
- В. Альгинатный материал
- Г. Термопластический материал

Расстояние между дугой и слизистой оболочкой полости рта на нижней челюсти

- А. 0,5 Мм
- Б. 0,8-1,0 Мм
- В. 2,5 Мм
- Г. Зависит от формы ската альвеолярной части

К функциональным изменениям височно-нижнечелюстного сустава после полной утраты зубов относят

- А. Истончение внутрисуставного диска
- Б. Уплотнение суставной ямки
- В. Атрофию суставного бугорка
- Г. Смещение суставной головки нижней челюсти кзади и вверх

Для замены воска на пластмассу при изготовлении боксерской шины метод гипсовки

- А. Прямой
- Б. Комбинированный
- В. Не имеет значения
- Г. Обратный

Для припасовки металлокерамической в клинике врач получает коронку из лаборатории на

- А. Металлическом штампе
- Б. Гипсовом столбике
- В. Разборной гипсовой модели
- Г. Гипсовой модели

Охлаждение конструкции после обжига проводят

- А. В соответствии с программой для обжига керамики
- Б. При открытой печи для обжига керамики
- В. Принудительно с помощью фена и др.
- Г. При комнатной температуре

Склеиваемые детали протеза пропитываются при починке

- А. Эфиром
- Б. Бензином
- В. Мономером
- Г. Спиртом

Удерживающий? Кламмер состоит из

- А. Тела, плеча, отростка, ответвления и окклюзионной накладки
- Б. Тела, плеча, отростка и окклюзионной накладки
- В. Тела, плеча и отростка
- Г. Тела, плеча, отростка и ответвления

Штифтовые зубы показаны при

- А. Отсутствии коронковой части
- Б. Дефекте твердых тканей зубов
- В. Дефекте коронковой части зуба
- Г. Дефекте зубного ряда

Имmediат-протезы из пластмассы полируют при помощи

- А. Боров
- Б. Карборундовых камней
- В. Фрез
- Г. Фетровых фильцев, щеток

Стоматологические магниты, используемые в конструкциях зубочелюстных протезов

- А. Кобальто-хромовые
- Б. Никель-титановые
- В. Самарий-кобальтовые
- Г. Платино-кобальтовые

Дополнительным методом исследования в клинике ортопедической стоматологии является

- А. Опрос
- Б. Пальпация
- В. Осмотр
- Г. Рентгенография

Сроки пользования ортодонтическими аппаратами при заболеваниях внчс составляют

- А. Одна неделя
- Б. Две недели
- В. Три-шесть месяцев
- Г. Один месяц

Стадия, характеризующаяся потерей липкости, хорошей пластичностью и меньшей текучестью, называется

- А. Тянущихся нитей
- Б. Песочная
- В. Тестообразная
- Г. Резиноподобная

Величина зернистости алмазного бора, предназначенного для финишной обработки зуба под металлокерамическую реставрацию, составляет (в микронах)

- А. 20
- Б. 40
- В. 60
- Г. 100

По суппле наличие разрыхленной, избыточно податливой слизистой оболочки, покрывающей заднюю треть твердого неба и альвеолярную часть нижней челюсти, относится к классу

- А. Второму
- Б. Первому
- В. Четвертому
- Г. Третьему

Суставной признак центральной окклюзии

- А. Суставная головка находится на скате суставного бугорка
- Б. Суставная головка находится у основания ската суставного бугорка
- В. Суставная головка находится впереди суставного бугорка
- Г. Суставная головка находится на вершине ската суставного бугорка

Строение вестибулярной дуги с двумя полукруглыми изгибами

- А. Средняя часть, 2 полукруглых изгиба, 2 отростка
- Б. Средняя часть, 2 полукруглых изгиба, отросток
- В. Средняя часть, крючок, 2 полукруглых изгиба, отросток
- Г. Средняя часть, крючок, 2 полукруглых изгиба, 2 отростка

Метод исследования пульсовых колебаний кровенаполнения сосудов пародонта, основанный на графической регистрации изменений полного электрического сопротивления тканей пародонта, называется

- А. Допплерография
- Б. Флуориметрия
- В. Гнатодинамометрия
- Г. Реопародонтография

Высота цоколя рабочей модели для планирования бюгельного протеза при параллелометрии

- А. 50 – 60 Мм
- Б. 10 – 15 Мм
- В. 35 – 40 Мм
- Г. 20 – 25 Мм

В четном ряду цветов пластмассы «синма», выпускаемой промышленностью, отсутствуют цвета под №

- А. 14, 16
- Б. 4, 6
- В. 18, 22
- Г. 10, 12

Для фиксации шарнира по оксману в протезах при ложных суставах применяется

- А. Цемент
- Б. Самоотвердеющая пластмасса
- В. Этакрил
- Г. Гипс

Толщина платиновой фольги, применяемой для изготовления фарфоровых коронок, составляет (в мм)

- А. 0,1
- Б. 0,25
- В. 0,025
- Г. 0,075

Оптимальная толщина фарфоровой коронки ____мм

- А. 2,5
- Б. 3,0
- В. 0,5-1,0
- Г. 1,2-1,5

Конструктивные элементы аппарата хургиной

- А. Верхнечелюстная пластинка, кламмеры, перекидные крючки на резцы, накусочная плоскость,
- Б. Верхнечелюстная пластинка, перекидные крючки на резцы, накусочная плоскость, расширяющий винт
- В. Верхнечелюстная пластинка, кламмеры, накусочная плоскость, расширяющий винт
- Г. Верхнечелюстная пластинка, кламмеры, перекидные крючки на резцы, накусочная плоскость, расширяющий винт

При изготовлении имедиат-протеза используют искусственные зубы

- А. Пластмассовые
- Б. Металлические
- В. Золотые
- Г. Титановые

Фазами адаптации к съемному пластиночному протезу (по в. Ю. Курляндскому) являются

- А. Ближайшая, быстрая, отделенная
- Б. Раздражение, частичное торможение, полное торможение
- В. Успокоение, привыкание, адаптация
- Г. Медленная, быстрая, очень быстрая

Место припаивания крючков или штанг на скользящей вестибулярной дуге энгеля находится

- А. В области боковых резцов
- Б. В области вторых премоляров
- В. У дистальной поверхности клыков
- Г. У мезиальной поверхности клыков

К средним дефектам зубных рядов относят отсутствие _____ зубов

- А. Более 6
- Б. Не более 3
- В. От 4 до 6
- Г. Более 8

Названия 3 взаимноперпендикулярных плоскостей в ортодонтии

- А. Вертикальная, сагиттальная, трансверзальная
- Б. Фронтальная, сагиттальная, трансверзальная
- В. Вертикальная, горизонтальная, трансверзальная
- Г. Фронтальная, горизонтальная, трансверзальная

Неравномерная толщина базиса протеза приводит к

- А. Травмированию слизистой оболочки
- Б. Поломке протеза
- В. Неравномерному погружению в подлежащие ткани
- Г. Нарушению фиксации

К iv классу по классификации полостей по Блеку относятся полости

- А. На вершинах бугров и пришеечной зоне вестибулярной и оральной поверхности
- Б. На вершинах бугров
- В. В пришеечной зоне вестибулярной и оральной поверхности
- Г. На контактной поверхности, углах и режущего края передних зубов

Припасовка мостовидного протеза в клинике проводится после этапа

- А. Полировки
- Б. Снятия оттиска с коронками
- В. Пайки
- Г. Отбеливания

К гипербалансирующим окклюзионным нарушениям относят

- А. Преждевременные контакты на медиотрузионной стороне, способствующие контактам зубов латеротрузионной стороны
- Б. Преждевременные контакты на медиотрузионной стороне, препятствующие контактам зубов латеротрузионной стороны
- В. Преждевременные окклюзионные контакты на медиотрузионной стороне
- Г. Окклюзионные контакты на рабочей стороне, разобщающие зубы на медиотрузионной стороне

На рентгенограммах суставная щель в норме

- А. 1 Мм
- Б. Имеет одинаковую ширину на всем протяжении
- В. Спереди шире, сзади уже
- Г. Узкая у верхнего полюса головки нижней челюсти, широкая в переднем и заднем отделах

Вторая степень подвижности зубов по д.а. Энтину характеризуется движениями зуба

- А. В направлении вестибуло-оральном и медио-дистальном, включая вертикальное
- Б. Во всех направлениях, включая ротацию
- В. В направлении вестибуло-оральном
- Г. В направлении вестибуло-оральном и медио-дистальном

Отрицательные свойства пластмассовых коронок

- А. Низкая устойчивость к истиранию
- Б. Сложность изготовления
- В. Относительная эстетичность
- Г. Хрупкость

Десневой физиологический желобок имеет глубину не более (в мм)

- А. 0,5-1,0
- Б. 4-5
- В. 2-3
- Г. 6-7

Для укрепления протеза носа лучше использовать

- А. Очки
- Б. Самоотвердеющую пластмассу
- В. Клей
- Г. Пружины

Диаметр проволоки для изготовления кламмера адамса

- А. 0,8 Мм
- Б. 0,6 Мм
- В. 1,0 Мм
- Г. 1,2 Мм

Измерение тонуса жевательных мышц называется

- А. Миотонометрией
- Б. Мастикациографией
- В. Реопародонтографией
- Г. Электромиографией

При починке съемного протеза пластмассовый зуб с базисом соединяются

- А. Физически
- Б. Химически
- В. Комбинированно
- Г. Механически

К третьему классу по классификации пелу относится кламмер

- А. Комбинированный
- Б. Кольцевой
- В. Бонвиля
- Г. Джексона

По прицельной дентальной рентгенограмме можно проанализировать состояние

- А. Межзубных перегородок
- Б. Язычных стенок
- В. Губных стенок
- Г. Щечных стенок

По классификации оксмана значительная равномерная атрофия альвеолярного гребня беззубой челюсти относится к _____ типу

- А. Третьему
- Б. Первому
- В. Четвертому
- Г. Второму

Абсолютным противопоказанием к изготовлению металлокерамических конструкций считают

- А. Низкие, мелкие или плоские клинические коронки с тонкими стенками
- Б. Парафункцию жевательных мышц
- В. Аномалии прикуса с глубоким резцовым перекрытием
- Г. Заболевания пародонта легкой степени тяжести

Ортодонтические коронки штампуются методом

- А. Шовным
- Б. Внутренним
- В. По выбору зубного техника
- Г. Комбинированным и наружным

К какой фазе адаптации по в.

Ю. Курляндскому будет соответствовать использование пластиночного протеза на 21-е сутки его наложения?

- А. Фаза привыкания
- Б. Фаза частичного торможения
- В. Фаза полного торможения
- Г. Фаза раздражения

Минимальная толщина отштампованной коронки _____ мм

- А. 0,5
- Б. 0,22-0,25
- В. 0,8
- Г. 1,0

Форма металлической дуги каркаса бюгельного протеза нижней челюсти

- А. Круглая
- Б. В зависимости от формы альвеолярного отростка
- В. Плоская
- Г. Каплевидная

Движение, которое суставная головка совершает при латеротрузии на балансирующей стороне, называют

- А. Медиальным смещением
- Б. Дистракцией
- В. Трансляцией
- Г. Ротацией вокруг вертикальной оси

На втором этапе протезирования дефектов верхней челюсти с полной утратой зубов изготавливают

- А. Разобщающую пластинку
- Б. Протез-обтуратор
- В. Формирующий протез-обтуратор
- Г. Аналог протеза-обтуратора

Степень атрофии альвеолярного отростка (альвеолярной части) определяется уровнем расположения вершины гребня по отношению к

- А. Зубам-антагонистам
- Б. Шейкам естественных зубов
- В. Переходной складке
- Г. Оклюзионной поверхности естественных зубов

При позднем (отсроченном) протезировании рабочие оттиски получают

- А. В день удаления зубов, сразу после операции
- Б. Через 4 недели после удаления зубов
- В. До удаления зубов
- Г. Через 1-5 дней? после удаления зубов

Применение регулятора функции i типа показано при прикусе

- А. Перекрестном
- Б. Прямом
- В. Дистальном блокирующем
- Г. Дистальном с протрузией резцов на верхней челюсти

Свойством развальцовывания обладают

- А. Титановые сплавы
- Б. Оксид циркония
- В. Серебряно-палладиевые сплавы
- Г. Золотые сплавы

Опорный зуб под пластмассовую коронку препарируют, снимая ткань на (в миллиметрах)

- А. 1,8-2,0
- Б. 0,3-0,4
- В. 0,5-0,6
- Г. 1,2-1,5

Для изготовления пружины калвелиса чаще всего используется проволока диаметром

- А. 0,8 Мм
- Б. 0,6 Мм
- В. 1,0 Мм
- Г. 1,2 Мм

Зоны слизистой оболочки твердого неба с обширными сосудистыми полями по е. И. Гаврилову относят к

- А. Подслизистым
- Б. Сосудистым
- В. Амортизационным
- Г. Буферным

Назначение муфельной печи

- А. Закаливание опоки
- Б. Расплавление металлов
- В. Затвердевание гипса
- Г. Обжиг керамики

При тяжелых анатомических условиях на нижней челюсти рекомендуется изготовить базис

- А. Из бесцветной пластмассой
- Б. Из гипса
- В. Жесткий акриловый
- Г. С мягкой подкладкой

Выдвижение нижней челюсти происходит в результате работы мышц

- А. Височных
- Б. Двухстороннего сокращения латеральных крыловидных
- В. Одностороннего сокращения латеральных крыловидных
- Г. Двубрюшных

Дистальный край съемного протеза при полном отсутствии зубов на верхней челюсти при ортогнатическом соотношении челюстей должен

- А. Перекрывать границу твердого и мягкого неба на 3-5 мм
- Б. Не доходить до границы твердого неба на 5-7 мм
- В. Проходить строго по границе твердого и мягкого неба
- Г. Перекрывать границу твердого и мягкого неба на 1-2 мм

Для отображения на базисе съемного пластиночного протеза области травмированной слизистой оболочки используют

- А. Цемент
- Б. Воск
- В. Водный дентин или корректор
- Г. Спирт

Огнеупорную модель отдублированную в гелине после ее получения высушивают

- А. Сушильном шкафу при температуре 200-220 градусов
- Б. Фотополимеризаторе
- В. На воздухе
- Г. Микроволновк