

Тесты с вопросами по специальности «Стоматология ортопедическая» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/ortopedicheskaya/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Стоматология ортопедическая» для аккредитации и других экзаменов (1900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/ortoped/

2) Стоматология ортопедическая — ситуационные задачи

→ medik-otvet.ru/product/stomat-ortoped/

3) Тесты для аккредитации «Стоматология хирургическая» (2500 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_hirurg/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления съемных пластиночных протезов . Порядок:

- 1.
 - 2.
 - 3.
 4. Клинические этапы изготовления:
 - А. Проверка конструкции протеза;
 - Б. Припасовка и наложение протеза;
 - В. Получение оттисков;
 - Г. Определение центральной окклюзии.
- А. 1В, 2Г, 3А, 4Б
Б. 1Б, 2А, 3Г, 4В
В. 1А, 2Б, 3В, 4Г

Моделировка литой коронки может проводиться без использования "адапты"

- А. Базисным воском
- Б. Бюгельным воском
- В. Погружным воском
- Г. Липким воском
- Д. Воском для мостовидных работ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раз или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью атрофии костной ткани лунки зуба и состоянием опорно-удерживающего аппарата зубов по

В.Ю. Курляндскому. Степень атрофии костной ткани лунки зуба:

1. $\frac{1}{4}$;
 2. $\frac{1}{2}$;
 3. $\frac{3}{4}$. Состояние опорно-удерживающего аппарата зуба:
 - А. Компенсированное;
 - Б. Субкомпенсированное;
 - В. Декомпенсированное.
- А. 1В, 2Б, 3А
Б. 1Б, 2А, 3В
В. 1А, 2Б, 3В

Паковка пластмассы в кювету проводится на стадии

- А. Песочной
- Б. Тянущихся нитей
- В. Тестообразной
- Г. Резиноподобной
- Д. Твердой

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Тестовое задание №190: Установите правильную последовательность действий на этапе определения центральной окклюзии с помощью восковых базисов с окклюзионными валиками при наличии антагонизирующих пар зубов. Порядок:1.2.3.4.5.6. Компонент действия:

- А. Оценка качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками;
- Б. Сопоставление гипсовых моделей в центральной окклюзии и проверка правильности ее определения;
- В. Одновременная припасовка верхнего и нижнего восковых валиков до смыкания зубов-антагонистов;
- Г. Поочередная припасовка верхнего и нижнего валиков до смыкания зубов-антагонистов;
- Д. Нанесение ориентиров для постановки искусственных зубов ;
- Е. Приклеивание разогретой пластинки воска на восковые валики и фиксация центральной окклюзии.

- А. 1А, 2Г, 3В, 4Е, 5Д, 6Б
- Б. 1Г, 2А, 3Е, 4В, 5Б, 6Д
- В. 1В, 2Е, 3А, 4Г, 5Д, 6Б

Ориентиром для постановки центральных резцов на верхней челюсти служит расположение

- А. Крыльев носа
- Б. Уздечки верхней губы
- В. Линии эстетического центра лица
- Г. Филтрума верхней губы
- Д. Носо-губных складок

ПОКАЗАНИЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУЛЬТЕВОЙ ШТИФТОВОЙ ВКЛАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А. разрушение твёрдых тканей зуба на уровне десны
- Б. атрофия костной ткани стенок альвеол III и IV степени
- В. подвижность корня II – III степени
- Г. разрушение твёрдых тканей зуба ниже уровня десневого края до 1/2 длины корня
- Д. резорбция костной ткани на 1/2 длины корня

ОШИБКА НА ЭТАПЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ:

- А. хронической травмы слизистой оболочки полости рта съёмными конструкциями
- Б. снижение высоты нижнего отдела лица
- В. дисфункции ВНЧС
- Г. аллергической реакцией на акрилаты
- Д. образования газовой пористости

Трансверзальное расположение кламмерной линии благоприятно для фиксации съёмного протеза

- А. На верхней челюсти
- Б. На нижней челюсти
- В. На верхней и нижней челюстях
- Г. При «болтающемся гребне» на верхней челюсти
- Д. При высокой степени атрофии альвеолярного отростка

При препарировании зуба под цельнолитую коронку с жевательной поверхности или режущего края сошлифовывают ткани зуба примерно на (в мм)

- А. 0,1 – 0,3
- Б. 0,3 – 0,6
- В. 0,7 – 1
- Г. 1,5 – 2,0
- Д. 2,0 – 2,5

Изготовление полного съёмного протеза с удлинёнными границами на нижней челюсти может привести к

- А. Прикусыванию щёк
- Б. Прикусыванию губ
- В. Сбрасыванию протеза во время функции
- Г. Повышенному рвотному рефлексу
- Д. Нарушению эстетики

Неудовлетворительная фиксация полного съёмного протеза на верхней челюсти может быть связана с

- А. Большим количеством остаточного мономера в базисе
- Б. Изготовлением базиса из бесцветной пластмассы
- В. Использованием фарфоровых зубов
- Г. Удлинёнными границами протеза
- Д. Гранулярной пористостью (мраморностью) базиса

НАИБОЛЕЕ ИНЕРТНЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЮТСЯ СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ

- А. золота
- Б. никеля
- В. кобальта
- Г. алюминия
- Д. хрома

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между понятиями «центральное соотношение челюстей», «центральная окклюзия» и вариантами соотношения зубов – антагонистов. В клинике определяется:

- 1. Центральное соотношение челюстей;
 - 2. Центральная окклюзия. Соотношение зубов – антагонистов:
 - А. При наличии антагонистов в трех функционально ориентированных группах зубов;
 - Б. При наличии 1 или 2 пар зубов-антагонистов;
 - В. При отсутствии зубов-антагонистов.
- А. 1А, 2В
 - Б. 1В, 2Б
 - В. 1Б, 2В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность этапов изготовления воскового базиса с окклюзионным валиком. Порядок:

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5. Компонент действия:
 - А. Изготовление валика из воска и его монолитное укрепление на восковом базисе;
 - Б. Формирование воскового базиса на модели по расчерченным границам ;
 - В. Оплавление краев воскового базиса над пламенем горелки ;
 - Г. Укрепление воскового базиса металлической проволокой;
 - Д. Смачивание гипсовой модели водой .
- А. 1Б, 2Д, 3А, 4Г, 5В
 - Б. 1Д, 2Б, 3Г, 4А, 5В
 - В. 1В, 2Б, 3А, 4Г, 5Д

При проведении функциональных проб по Гербсту при изготовлении полных съемных протезов амплитуда движений нижней челюсти зависит от

- А. Типа соотношения челюстей
- Б. Степени атрофии челюсти
- В. Типа слизистой оболочки
- Г. Размера нижней челюсти
- Д. Высоты нижнего отдела лица

К возможным недостаткам мостовидного протеза из нержавеющей стали относятся

- А. Низкая жевательная эффективность
- Б. Привкус металла в полости рта
- В. Быстрое стирание зубов-антагонистов
- Г. Появление подвижности зубов-антагонистов
- Д. Неприятный запах изо рта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью атрофии костной ткани альвеолы и уменьшением выносливости пародонта в одонтопародонтограмме

В.Ю. Курляндского. Степень атрофии костной ткани альвеолы:

- 1. 1/4;
- 2. 1/2;
- 3. 3/4;
- 4. Более 3/4. Уменьшение выносливости пародонта по

В.Ю. Курляндскому:

- А. 75%;
 - Б. 50%;
 - В. 25%;
 - Г. Более 75%.
- А. 1Г, 2Б, 3А, 4В
Б. 1В, 2А, 3Б, 4Г
В. 1А, 2Г, 3В, 4Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность действий на этапе определения центрального соотношения челюстей при изготовлении пластиночных протезов при дефектах зубных рядов. Порядок: 1.2.3.4.5. Компонент действия:

А. Приклеивание разогретой пластинки воска и фиксация центрального соотношения челюстей;

Б. Припасовка восковых базисов с окклюзионными валиками с учетом высоты физиологического покоя;

В. Оценка качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками;

Г. Проверка правильности определения центрального соотношения челюстей и нанесение клинических ориентиров;

Д. Определение высоты нижнего отдела лица в состоянии относительного физиологического покоя.

А. 1Д, 2В, 3А, 4Б, 5Г

Б. 1В, 2Д, 3Б, 4А, 5Г

В. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В

Требования к корням зубов, используемым для штифтовых конструкций

А. Подвижность 2-3 степени

Б. Толщина стенок корня не менее одного миллиметра

В. Канал распломбирован на 1/3

Г. Расширение периодонтальной щели

Д. Канал не запломбирован до вершины на 1/3

УМЕНЬШЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОВЫШЕННОМ СТИРАНИИ ЗУБОВ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ

А. нарушение связей между призмами эмали

Б. привыкания пациента

В. образования заместительного дентина

Г. подвижности зубов

Д. изменения химического состава эмали

Применение замковых креплений для фиксации съёмного протеза даёт возможность

А. Уменьшить рвотный рефлекс

Б. Улучшить дикцию

В. Повысить эстетику

Г. Улучшить фиксацию протеза

Д. Уменьшить травму десны

Повторная фиксация центрального соотношения челюстей методом наложения восковой пластинки на искусственные зубы нижней челюсти возможно при

- А. Завышении высоты нижнего отдела лица
- Б. Снижении высоты нижнего отдела лица
- В. При смещении нижней челюсти влево
- Г. При смещении нижней челюсти вправо
- Д. При смещении нижней челюсти вперед

$\frac{1}{4}$ степень атрофии лунки зуба соответствует

- А. Двум размерам высоты анатомической коронки зуба
- Б. 1,5 высоте анатомической коронки зуба
- В. Одной высоте анатомической коронки зуба
- Г. Менее половины высоты анатомической коронки зуба
- Д. Половине высоты анатомической коронки зуба

Проверка окклюзионных контактов на этапе припасовки искусственной коронки проводится в окклюзиях

- А. Сагиттальных
- Б. Сагиттальных и центральной
- В. Центральной и боковых
- Г. Боковых и сагиттальных
- Д. Сагиттальных, боковых и центральной

При изготовлении металлокерамической коронки минимально допускаемая толщина металлического каркаса из неблагоприятных сплавов

- А. 0,1 мм
- Б. 0,2 мм
- В. 0,25 мм
- Г. 0,3 мм
- Д. 0,5 мм

Для починки съемного протеза на нижней челюсти при отломе удерживающего кламмера необходимо получить оттиск с

- А. Нижней челюсти с протезом
- Б. Двух челюстей без протеза
- В. Нижней челюсти без протеза
- Г. Верхней челюсти и оттиск с нижней челюсти с протезом
- Д. Двух челюстей без протеза и с нижней челюсти с протезом

$\frac{3}{4}$ степени атрофии лунки зуба соответствует

- А. 1,5 высоте анатомической коронки зуба
- Б. Двум размерам высоты анатомической коронки зуба
- В. Одной высоте анатомической коронки зуба
- Г. Половине высоты анатомической коронки зуба
- Д. Менее половины высоты анатомической коронки зуба
- Е. Половине высоты анатомической коронки зуба
- Ж. Менее половины высоты анатомической коронки зуба

При изготовлении литой цельнометаллической коронки моделировка воском анатомической формы производится в объеме (по сравнению с естественным зубом

- А. Равном
- Б. Меньшем на толщину 1мм
- В. Больше на толщину 1мм
- Г. Меньшем на толщину компенсационного лака
- Д. Больше на толщину компенсационного лака

При постановке зубов в артикуляторе выверяются окклюзии

- А. Боковые левые, боковые правые
- Б. Боковые правые и левые, передние
- В. Передние, центральная
- Г. Центральная
- Д. Центральная, передние, боковые

При изготовлении металлопластмассовой коронки соединение пластмассы с литым каркасом осуществляется за счет

- А. Химического соединения
- Б. Формирования ретенционных пунктов с помощью перл
- В. Образования окисной пленки
- Г. Взаимной диффузии материалов
- Д. Вырезания

Определение центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов начинают с

- А. Оформления вестибулярного овала на верхнем окклюзионном валике
- Б. Припасовки нижнего воскового базиса с окклюзионными валиками в соответствии с высотой нижнего отдела лица
- В. Нанесения клинических ориентиров для постановки зубов
- Г. Фиксации центрального соотношения челюстей
- Д. Формирования протетической плоскости на верхнем окклюзионном валике

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между разными классификациями и видом зубных протезов. Классификация:

1. По конструкции;

2. По материалу. Зубные протезы:

А. Коронки, полукоронки, экваторные коронки, телескопические коронки;

Б. Коронки комбинированные, металлические, неметаллические;

В. Литые, штампованные, полимеризованные;

Г. Восстановительные, опорные, шинирующие.

А. 1Б, 2Г

Б. 1А, 2Б

В. 1В, 2А

Техник моделирует будущую штампованную искусственную коронку по объему в отношении к восстанавливаемому зубу

А. Больше по объему восстанавливаемого зуба на толщину сплава металла

Б. Равный по объему восстанавливаемого зуба

В. Больше по объему восстанавливаемого зуба на 1 – 1,5 мм

Г. Меньше по объему восстанавливаемого зуба на толщину сплава металла

Д. Меньше по объему восстанавливаемого зуба на 1 – 1,5 мм

Определение центрального соотношения челюстей для изготовления пластиночных протезов при дефектах зубных рядов начинают с

А. Припасовки восковых базисов с окклюзионными валиками с учетом высоты физиологического покоя

Б. Проверки правильности определения центрального соотношения челюстей

В. Нанесения клинических ориентиров для постановки искусственных зубов

Г. Оценки качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками

Д. Приклеивания разогретой пластинки воска и фиксация центрального соотношения челюстей

Оптимальное расположение кламмерной линии на верхней челюсти

А. Сагиттальное

Б. Поперечное

В. Вестибуло – оральное

Г. Диагональное

Д. Точечное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью подвижности зуба по классификации

Д.А. Энтина и направлением визуально определяемого смещения зуба. Степень подвижности зуба по Энтину:

1. Первая;

2. Вторая. Направление визуально определяемого смещения зуба:

А. Вертикальное;

Б. Вестибуло-оральное и медио-дистальное;

В. Круговое;

Г. Вестибуло-оральное.

А. 1Г, 2Б

Б. 1В, 2А

В. 1Б, 2А

При препарировании зуба под цельнолитую коронку боковые стенки должны

А. Быть строго параллельно

Б. Слегка дивергировать

В. Конвергировать под углом $6 - 8^\circ$

Г. Конвергировать под углом $10 - 15^\circ$

Д. Конвергировать под углом $15 - 20^\circ$

Допускается постановка искусственных зубов в съёмном пластиночном протезе кпереди от центра альвеолярного гребня на $2/3$ их длины в области

А. Передних зубов нижней челюсти

Б. Передних зубов верхней челюсти

В. Боковых зубов нижней челюсти

Г. Боковых зубов верхней челюсти

Д. Передних и боковых зубов нижней челюсти

Для спайки коронок из нержавеющей стали применяют припой на основе

А. Золота

Б. Серебра

В. Платины

Г. Титана

Д. Кадмия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность лабораторных этапов изготовления цельнолитой коронки. Порядок:

1.2.3.4.5.6. Лабораторные этапы изготовления цельнолитой коронки:

- А. Изготовление колпачка из адапты;**
- Б. Шлифовка, полировка;**
- В. Отливка из сплава металла;**
- Г. Изготовление разборной модели;**
- Д. Припасовка на модели;**
- Е. Моделирование коронки.**

А. 1Б, 2А, 3В, 4Е, 5Д, 6Г

Б. 1Г, 2А, 3Е, 4В, 5Д, 6Б

В. 1А, 2Г, 3Д, 4В, 5Е, 6Б

Получение оттиска при починке съемного пластиночного протеза не требуется при

- А. Отломе плеча кламмера
- Б. Переломе или трещине базиса
- В. Необходимости установки дополнительного зуба
- Г. Переносе кламмера
- Д. Отломе искусственного зуба

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗА ОТСУТСТВУЕТ ЭТАП:

- А. проверки конструкции протеза
- Б. определения высоты нижнего отдела лица
- В. припасовки протеза
- Г. определение центрального соотношения челюстей
- Д. получение анатомических оттисков

Создание большой конусности зуба при препарировании приведет к

- А. Отколу облицовки
- Б. Повреждению десневого края
- В. Повреждению пародонта
- Г. Расцементировки коронки
- Д. Перегрузке опорного аппарата зуба-антагониста

Для полимеризации пластмассы кювету помещают в

- А. Воду холодную
- Б. Воду кипящую
- В. Вакуумную печь
- Г. Воду нагретую до 80°
- Д. Муфельную печь

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность лабораторных этапов изготовления бюгельных протезов. Порядок:1.2.3.4.5.6. Лабораторные этапы изготовления:

- А. Гипсовка в кювету, паковка пластмассы и её полимеризация ;
- Б. Постановка искусственных зубов;
- В. Обработка, шлифовка, полировка;
- Г. Гипсовка моделей в артикулятор;
- Д. Изготовление каркаса бюгельного протеза;
- Е. Получение гипсовых моделей и изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.

А. 1Е, 2Г, 3Д, 4Б, 5А, 6В

Б. 1Г, 2Е, 3В, 4Б, 5А, 6Д

В. 1В, 2Г, 3Д, 4А, 5Б, 6Е

Изготовление полного съёмного протеза на верхней челюсти с укороченными границами может привести к

- А. Прикусыванию щёк
- Б. Прикусыванию губ
- В. Сбрасыванию протеза во время функции
- Г. Балансу протеза
- Д. Нарушению эстетики

Вторая степень патологической подвижности зуба по Энтину характеризуется визуально определяемым смещением зуба в направлении

- А. Круговом
- Б. Вертикальном
- В. Вестибуло-оральном
- Г. Вестибуло-оральном и мезио-дистальном
- Д. Мезио-дистальном

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области боковых зубов проходит

- А. Не касается зубов
- Б. В пришеечной области зубов
- В. По середине коронки зубов
- Г. Перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. Перекрывая коронки зубов на 2/3

Сагиттальное расположение кламмерной линии неблагоприятно для фиксации съёмного протеза

- А. Только на верхней челюсти
- Б. Только на нижней челюсти
- В. На верхней и нижней челюстях
- Г. При «болтающемся гребне» на верхней челюсти
- Д. При «болтающемся гребне» на нижней челюсти

НЕПРАВИЛЬНО СФОРМИРОВАННАЯ ПРОТЕТИЧЕСКАЯ ПЛОСКОСТЬ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА ВЫЗЫВАЕТ:

- А. «парниковый эффект»
- Б. многоформную экссудативную эритему
- В. дисфункцию ВНЧС
- Г. гальванизм
- Д. аллергические реакции

Анатомическая шейка зуба соответствует

- А. Границе над- и поддесневой частей зуба
- Б. Экватору зуба
- В. Переходу эмали в цемент корня
- Г. Дну зубодесневого желобка
- Д. Дну патологического зубодесневого кармана

"Мраморность" базиса пластиночного протеза возникает при

- А. Несоблюдении температурного режима полимеризации
- Б. Нарушении прессования
- В. Резком охлаждении кюветы после окончания полимеризации
- Г. Неплотном соединении частей кюветы
- Д. Отсутствии изолирующего слоя на гипсовой модели перед паковкой пластмассы

При припасовке съёмного протеза копировальная (артикуляционная) бумага используется для

- А. Выявления участков базиса, мешающих наложению протеза в области естественных зубов
- Б. Выявления степени изоляции торуса
- В. Коррекции участков базиса, травмирующих слизистую оболочку
- Г. Выявления степени изоляции экзостозов
- Д. Уточнения границ базиса протеза

В случае фиксации бокового смещения нижней челюсти на этапе определения центрального соотношения челюстей характер соотношения зубных рядов при проверке конструкции протеза следующий

- А. Бугорковый контакт между антагонистами, сагиттальная щель во фронтальном участке, снижение высоты нижнего отдела лица
- Б. Бугорковый контакт между антагонистами в боковом участке с одной стороны и просвет с другой, завышение высоты нижнего отдела лица
- В. Фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, высота нижнего отдела лица в норме
- Г. Фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, снижение высоты нижнего отдела лица
- Д. Фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, завышение высоты нижнего отдела лица

Перед фиксацией центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов создают углубления на окклюзионных валиках

- А. Нижнем на окклюзионной поверхности
- Б. Верхнем на окклюзионной поверхности
- В. Нижнем и верхнем на окклюзионных поверхностях
- Г. Расположение углублений не имеет значения
- Д. Нижнем и верхнем на вестибулярных поверхностях

Починку базиса съемного пластиночного протеза невозможно провести при

- А. Множественном мелкооскольчатом переломе
- Б. Отломе сразу нескольких искусственных зубов
- В. Отломе края протеза
- Г. Сложном рельефе по линии перелома
- Д. Одновременном отломе плеча кламмера и края протеза

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классом дефектов зубных рядов по Кеннеди и характеристикой дефекта зубного ряда. Классы по Кеннеди:

1. Первый;
 2. Второй;
 3. Третий;
 4. Четвертый. Дефекты зубных рядов:
 - А. Односторонний дистально не ограниченный (концевой);
 - Б. Двусторонний дистально не ограниченный (концевой);
 - В. В области передних зубов (включенный);
 - Г. Односторонний дистально ограниченный (включенный) в области боковых зубов.
- А. 1А, 2Б, 3В
Б. 1В, 2Б, 3А
В. 1Б, 2А, 3В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность стадий полимеризации пластмассы. Порядок:

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 5. Стадии полимеризации пластмассы :А. Тестообразная;
Б. Тянущихся нитей;
В. Твердая;
Г. Песочная;
Д. Резиноподобная.
- А. 1Г, 2Б, 3А, 4Д, 5В
Б. 1А, 2Д, 3Г, 4Б, 5В
В. 1В, 2Б, 3Д, 4А, 5Г

Гнутые удерживающие кламмера изготавливают из сплава

- А. Кобальтохромового
- Б. Хромоникелевого без содержания железа
- В. Нержавеющей стали
- Г. Серебряно-палладиевого
- Д. Золотого 900°

Относительным противопоказанием к применению металлокерамических коронок является

- А. Ортогнатический прикус
- Б. Бипрогнатический прикус
- В. Прогенический прикус
- Г. Парафункция жевательных мышц (бруксизм)
- Д. Прямой прикус

ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КРОНОК ЯВЛЯЕТСЯ

- А. парафункция жевательных мышц (бруксизм)
- Б. бипрогнатический прикус
- В. прогенический прикус
- Г. ортогнатический прикус
- Д. отягощенный анамнез

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области передних зубов проходит

- А. Не касается зубов
- Б. В пришеечной области зубов
- В. Посередине коронки зубов
- Г. Перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. Перекрывая коронки зубов на 2/3

Отросток удерживающего кламмера должен располагаться

- А. Между экватором и десной
- Б. Между экватором и окклюзионной поверхностью
- В. На вестибулярной поверхности зуба
- Г. В области ската альвеолярного гребня с оральной стороны
- Д. По центру альвеолярного гребня в базисе под искусственными зубами

ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

- А. сократительную способность мимических мышц
- Б. чувствительность твердых тканей зубов
- В. высоту нижнего отдела лица
- Г. гематокрит
- Д. глубину зубодесневых карманов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между характерными признаками беззубой верхней челюсти и их типами по классификации Шредера. Классификация Шредера беззубой верхней челюсти:

1. Почти полное отсутствие альвеолярного отростка, резко уменьшенные размеры тела челюсти и альвеолярных бугров, плоское небо;
2. Средняя степень атрофии альвеолярного отростка, средней глубины небо;
3. Высокий альвеолярный отросток, хорошо выраженные альвеолярные бугры, глубокое небо. Признаки:

А. Первый тип;

Б. Второй тип;

В. Третий тип.

А. 1А , 2Б, 3В

Б. 1Б , 2В, 3А

В. 1В , 2Б, 3А

Окклюзия – это

А. Всевозможные смыкания зубных рядов верхней и нижней челюстей

Б. Положение нижней челюсти относительно верхней в состоянии относительного физиологического покоя

В. Всевозможные положения нижней челюсти относительно верхней

Г. Соотношение беззубых челюстей

Д. Вид прикуса

Относительным противопоказанием к применению металлокерамических коронок является

А. Недостаточная высота коронок естественных зубов

Б. Плоская форма естественных зубов

В. Чрезмерная выраженность экваторов естественных зубов

Г. Депульпированные зубы

Д. Эстетический дефект естественных зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между характерными признаками беззубой нижней челюсти и их типами по классификации Келлера. Классификация Келлера беззубой нижней челюсти:

1. Альвеолярная часть хорошо выражена в переднем отделе и резко атрофирована в боковых отделах;
 2. Альвеолярная часть резко атрофирована в переднем отделе и хорошо выражена в боковых отделах;
 3. Незначительная, равномерная атрофия альвеолярной части;
 4. Выраженная равномерная атрофия альвеолярной части. Тип:
- А. Первый тип;
Б. Второй тип;
В. Третий тип;
Г. Четвертый тип.
- А. 1Г , 2В, 3Б, 4А
Б. 1А , 2Б, 3В, 4А
В. 1В , 2Г, 3А, 4Б

При изготовлении консольного несъёмного Протеза отрицательным является

- А. Наличие опрокидывающего момента в области опорных зубов
Б. Необходимость депульпации опорных зубов
В. Препарирование большого количества зубов
Г. Неудовлетворительное эстетическое качество
Д. Сошлифовывание большого количества тканей опорных зубов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОГО ЖЕВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ:

- А. 5 - 10 сек.
Б. 14 - 16сек.
В. 0,5 - 1 сек.
Г. 3 – 4 сек.
Д. 20-30 сек.

Гранулярная пористость в пластмассе образуется вследствие

- А. Быстрого нагрева кюветы
Б. Недостаточного сжатия пластмассы
В. Быстрого охлаждения кюветы
Г. Нарушения температуры нагрева кюветы
Д. Нарушения технологии приготовления пластмассы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность проведения обследования и заполнения истории болезни. Порядок: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

11. Компонент действия:

- А. Обследование полости рта;
- Б. Диагноз;
- В. Развитие настоящего заболевания;
- Г. Паспортные данные ;
- Д. Внешний осмотр;
- Е. Дневник лечения ;
- Ж. Определение вида прикуса;
- З.Проведение дополнительных обследований;
- И. Жалобы;
- К.Перенесенные и сопутствующие заболевания;
- Л. План лечения.

А. 1Е, 2И, 3К, 4В, 5А, 6Д, 7Ж, 8Б, 9З, 10Л, 11Г

Б. 1Д, 2И, 3К, 4В, 5Г, 6А, 7З, 8Ж, 9Б, 10Е, 11Л

В. 1Г, 2И, 3К, 4В, 5Д, 6А, 7Ж, 8З, 9Б, 10Л, 11Е

При припасовке литых мостовидных протезов, точность прилегания коронок к культи опорных зубов оценивается с помощью

- А. Эластического слепочного материала
- Б. Базисного воска
- В. Гипса
- Г. Копировальной бумаги
- Д. Моделировочного воска

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между значениями и терминами. Значение:

- 1. Всевозможные положения нижней челюсти относительно верхней;
- 2. Смыкание зубных рядов или групп зубов верхней и нижней челюстей;
- 3. Соотношение зубных рядов в центральной окклюзии. Термины:

- А. Прикус;
- Б. Ортогнатический прикус;
- В. Артикуляция;
- Г. Окклюзия;
- Д. Центральное соотношение челюстей;
- Е. Центральная окклюзия.

А. 1В, 2Г, 3А

Б. 1В, 2А, 3Е

В. 1А, 2В, 3С

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления штампованной коронки. Порядок: 1.2.3.4. Клинические этапы изготовления штампованной коронки:

- А. Фиксация коронки;
- Б. Препарирование зуба, получение оттисков;
- В. Определение центральной окклюзии;
- Г. Припасовка коронки.

А. 1Б, 2В, 3Г, 4А

Б. 1Г, 2А, 3Б, 4В

В. 1А, 2Г, 3В, 4Б

Первая коррекция съемного пластиночного протеза проводится

- А. В день наложения протеза
- Б. На следующий день после наложения протеза
- В. Через неделю после наложения протеза
- Г. Через месяц
- Д. Только при появлении болей

Место коррекции индивидуальной ложки на нижней челюсти при проведении функциональной пробы «широкое открывание рта»

- А. Вестибулярный край в области моляров и передних зубов
- Б. Вестибулярный край в области бугра верхней челюсти
- В. Язычный край в области моляров
- Г. Язычный край в области премоляров
- Д. От позадиомолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии

Правильная последовательность подготовки каркаса металлокерамической коронки перед нанесением и обжигом керамической массы

- А. Обезжиривание каркаса, пескоструйная обработка, создание окисной пленки (обжиг)
- Б. Пескоструйная обработка, обезжиривание каркаса, создание окисной пленки (обжиг)
- В. Создание окисной пленки (обжиг), пескоструйная обработка, обезжиривание
- Г. Пескоструйная обработка, создание окисной пленки (обжиг), обезжиривание
- Д. Обезжиривание, создание окисной пленки (обжиг), пескоструйная обработка

Граница полных съёмных протезов проходит

- А. Не доходя переходной складки 1,5 – 2,0 мм
- Б. Перекрывая переходную складку на 1,5 – 2,0 мм
- В. По пассивно-подвижной слизистой оболочке
- Г. По активно-подвижной слизистой оболочке
- Д. По линии mylohyoideus

Бюгельный протез состоит из

- А. Дуги
- Б. Искусственных зубов и дуги
- В. Дуги, кламмеров и каркаса
- Г. Дуги, кламмеров и седловидных частей с искусственными зубами
- Д. Кламмеров и седловидных частей

ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ В/Ч, ЯВЛЯЕТСЯ

- А. центр лица
- Б. уздечка языка
- В. уздечка верхней губы
- Г. уздечка нижней губы
- Д. линия Купидона

При изготовлении консольного несъемного протеза отрицательным является

- А. Необходимость депульпации опорных зубов
- Б. Препарирование большого количества зубов
- В. Наличие опрокидывающего момента в области опорных зубов
- Г. Неудовлетворительное эстетическое качество
- Д. Сошлифовывание большого количества тканей опорных зубов

При изготовлении металлокерамической коронки чрезмерное укорочение культи зуба может привести к

- А. Нарушению эстетики
- Б. Функциональным нарушениям
- В. Сколу керамики
- Г. Расцементирования коронки
- Д. Травме десны

ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ I СТЕПЕНИ СМЕЩЕНИЕ ЗУБА ОТНОСИТЕЛЬНО ОККЛЮЗИОННОЙ ПЛОСКОСТИ ПРОИСХОДИТ:

- А. до уровня линии Ретциуса
- Б. на 1/3 длины коронки
- В. на 1/2 длины коронки зуба
- Г. на всю длину коронки
- Д. до уровня дентина коронки

**ДЛЯ ПРОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЛАСТМАСЫ С МЕТАЛЛОМ НА КАРКАС
МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ НАНОСИТСЯ**

- А. перлы
- Б. компенсационный лак
- В. окисная пленка
- Г. адаптовый колпачок
- Д. липкий воск

**Съемный пластиночный протез, при дефекте зубного ряда, нуждается в припасовке в
полости рта вследствие**

- А. Наличия поднутрений в области естественных зубов
- Б. Возможных ошибок при постановке искусственных зубов
- В. Нарушений пропорций при подготовке пластмассы
- Г. Нарушений режима полимеризации пластмассы
- Д. Индивидуальных особенностей пациента

МЯГКИЕ ПОДКЛАДКИ В СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗАХ БЫВАЮТ

- А. акриловые
- Б. силиконовые
- В. тефлоновые
- Г. нейлоновые
- Д. формальдегидные

**После проведения этапа определения центрального соотношения челюстей восковые
базисы с окклюзионными валиками**

- А. Используют для постановки искусственных зубов
- Б. Сохраняют до этапа проверки конструкции протезов
- В. Сохраняют до полного изготовления протезов и их наложения
- Г. Переплавляют для повторного использования воска
- Д. Выдают пациенту на руки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между разновидностями физиологического прикуса и соотношением зубных рядов в центральной окклюзии. Разновидности физиологического прикуса:

1. Ортогнатический;
 2. Прямой;
 3. Бипрогнатический. Соотношение зубных рядов в центральной окклюзии:
 - А. Резцы верхней и нижней челюстей касаются режущими краями;
 - Б. Резцы верхней челюсти перекрывают резцы нижней челюсти не более $1/3$ высоты коронки;
 - В. Резцы верхней и нижней челюсти наклонены вестибулярно, но сохранен режуще-бугорковый контакт;
 - Г. Резцы нижней челюсти перекрывают резцы верхней челюсти не более $1/3$ высоты коронки с сохранением режуще-бугоркового контакта.
- А. 1А, 2Б, 3В
Б. 1В, 2Б, 3А
В. 1Б, 2А, 3В

Возможные осложнения при пользовании металлокерамическими мостовидными протезами

- А. Изменение цвета облицовки
- Б. Быстрое истирание облицовки
- В. Повышенное истирание естественных зубов-антагонистов
- Г. Повышение жевательной эффективности
- Д. Улучшение качества жизни

На этапе "проверка конструкции съемного протеза" При полном отсутствии зубов в случае выявления занижения высоты нижнего отдела необходимо заново определить центральное соотношение челюстей

- А. Сняв боковые зубы с нижнего воскового базиса и приклеив пластинку воска к нему
- Б. С помощью новых восковых базисов с окклюзионными валиками
- В. Сняв боковые зубы с верхнего воскового базиса и приклеив пластинку воска к нему
- Г. Сняв боковые зубы с верхнего и нижнего восковых базисов и приклеив пластинку воска к нижнему восковому базису
- Д. Приклеив пластинку воска на зубы нижнего воскового базиса

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА СЛЕДУЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП

- А. замена воска на пластмассу
- Б. постановка искусственных зубов
- В. изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками
- Г. определение центральной окклюзии
- Д. проведение параллелометрии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность лабораторных этапов изготовления полных съемных протезов. Порядок:1.2.3.4.5.6. Лабораторные этапы изготовления полных съемных протезов:

А. Обработка, шлифовка, полировка;

Б. Постановка искусственных зубов;

В. Гипсовка моделей в артикулятор;

Г. Гипсовка в кювету, паковка пластмассы и её полимеризация ;

Д. Получение гипсовых моделей и изготовление индивидуальных ложек

Е. Получение гипсовых моделей и изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.

А. 1В, 2А, 3Д, 4Б, 5Г, 6Е

Б. 1Е, 2Д, 3А, 4Б, 5Г, 6В

В. 1Д, 2Е, 3В, 4Б, 5Г, 6А

Для ускорения адаптации к съемному протезу после его наложения рекомендуется

А. Снимать протез несколько раз в течение дня

Б. Первые 3 дня надевать протез только на ночь

В. Пользоваться протезом только во время еды

Г. Пользоваться протезом днем и снимать на ночь первую неделю

Д. Пользоваться протезом днем и не снимать на ночь первую неделю

Параллелометрия проводится

А. До моделировки каркаса бюгельного протеза

Б. Перед нанесением рисунка каркаса бюгельного протеза

В. При припасовке каркаса бюгельного протеза на модели в

Г. Лаборатории

Д. При проверке каркаса бюгельного протеза в клинике

Е. При дублировании модели

Причиной скола керамической облицовки у металлокерамического мостовидного протеза может быть

А. Промежуточная часть седловидной формы

Б. Неудовлетворительная гигиена полости рта

В. Наличие в полости рта съемного протеза

Г. Наличие искусственных коронок на зубах-антагонистах

Д. Ошибки при обжиге и охлаждении керамической облицовки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью подвижности зуба (по Энтину) и визуально определяемым направлением смещения зуба. Степень подвижности зуба (по Энтину):

1.Первая;

2.Вторая;

3.Третья. Смещение зуба в направлениях:

А.Вестибуло-оральном, медио-дистальном и вертикальном;

Б.Вестибуло-оральном и медио-дистальном;

В.Вестибуло-оральном.

А. 1В, 2Б, 3А

Б. 1А, 2Б, 3В

В. 1Б, 2В, 3А

После припасовки коронок паяного мостовидного протеза в полости рта повторно определяется центральная окклюзия для

А. Точного моделирования промежуточной части мостовидного протеза (с учетом смыкания зубных рядов в центральной окклюзии)

Б. Оценки качества припасовки коронок

В. Повторной установки и загипсовки модели с коронками в окклюдатор

Г. Точной спайки опорных коронок с промежуточной частьюД. Повышения эстетики протеза

Д. Повышения эстетики протеза

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления полных съемных протезов. Порядок:1.2.3.4.5.6. Клинические этапы изготовления:

А. Припасовка индивидуальных ложек и получение функциональных оттисков ;

Б. Проверка конструкции протезов ;

В. Коррекция;

Г. Определение центрального соотношения челюстей;

Д.Получение анатомических оттисков;

Е. Припасовка и наложение протезов .

А. 1Д, 2А, 3Г, 4Б, 5Е, 6В

Б. 1А, 2Д, 3Б, 4Г, 5Е, 6В

В. 1Д, 2А, 3Г, 4Б, 5Е, 6В

После припасовки коронок паяного мостовидного протеза в полости рта повторно определяется центральная окклюзия для

- А. Оценки качества припасовки коронок
- Б. Повторной установки и заливки модели с коронками в артикулятор
- В. Точной спайки опорных коронок с промежуточной частью
- Г. Точного моделирования промежуточной части мостовидного протеза (с учетом смыкания зубных рядов в центральной окклюзии)
- Д. Повышения эстетики протеза

Противопоказанием к изготовлению искусственной коронки является

- А. Подвижность зуба третьей степени
- Б. Повышенная стираемость твердых тканей
- В. Наличие гиперестезии
- Г. Снижение высоты нижнего отдела лица
- Д. Необходимость укорочения зуба при феномене Попова-Годона

Съемные протезы с металлическими базами применяются

- А. При прямом прикусе
- Б. При непереносимости пластмассовых протезов
- В. При пониженной секреции слюны
- Г. При резкой атрофии альвеолярного отростка
- Д. При повышенной секреции слюны

Дуга бюгельного протеза располагается относительно слизистой оболочки

- А. Никогда не касаясь
- Б. Всегда слегка касаясь
- В. Всегда плотно прилегая
- Г. Слегка касаясь при жевании
- Д. Плотно прилегая при жевании

Относительным противопоказанием к применению металлокерамических коронок является

- А. Невыраженная анатомическая форма естественных зубов
- Б. Чрезмерная выраженность экваторов естественных зубов
- В. Депульпированные зубы
- Г. Недостаточная высота коронок естественных зубов
- Д. Эстетический дефект естественных зубов

Создание чрезмерной конусности стенок при препарировании под металлокерамическую коронку приводит к

- А. Неэстетичности коронки
- Б. Снижению прочности коронки
- В. К травме десны
- Г. К ослаблению фиксации коронки
- Д. Делает коронку более долговечной

Причинами расцементирования цельнолитой коронки являются

- А. Отсутствие экватора коронки
- Б. Удлиненный край коронки
- В. Отсутствие контакта с зубами-антагонистами
- Г. Чрезмерное укорочение зуба при препарировании
- Д. Отсутствие контакта с зубами-антагонистами

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классом дефектов зубных рядов по Кеннеди и характеристикой дефекта зубного ряда. Класс по Кеннеди:

- 1. I;
- 2. II. Дефект зубного ряда:
- А. Двусторонний концевой дефект;
- Б. Включенный дефект в боковом отделе;
- В. Дефект в переднем (фронтальном) отделе;
- Г. Односторонний концевой дефект.
- А. 1А, 2Г
- Б. 1Б, 2А
- В. 1В, 2А

Собственно жевательная мышца по функции относится к группе мышц

- А. Опускающих нижнюю челюсть
- Б. Смещающих нижнюю челюсть вперед
- В. Поднимающих нижнюю челюсть
- Г. Смещающих нижнюю челюсть вправо
- Д. Смещающих нижнюю челюсть влево

Дистальный край съёмного протеза при полном отсутствии зубов на верхней челюсти при прямом соотношении челюстей должен

- А. Перекрывать границу твердого и мягкого неба на 1 – 2 мм
- Б. Проходить строго по границе твердого и мягкого неба
- В. Перекрывать границу твердого и мягкого неба на 3 – 5 мм
- Г. Не доходить до границы твердого неба на 5 – 7 мм
- Д. Перекрывать границу твердого и мягкого неба на 5 – 7 мм

Причинами расцементирования металлопластмассовой коронки являются

- А. Отсутствие контакта с соседними зубами
- Б. отсутствие контакта с зубами-антагонистами
- В. Плохое обезжиривание и высушивание зуба
- Г. удлинённый край коронки
- Д. Отсутствие экватора коронки

Плечо удерживающего кламмера съёмного протеза касается зуба и располагается

- А. На жевательной поверхности зуба
- Б. Между жевательной поверхностью зуба и экватором
- В. На экваторе
- Г. У режущего края резцов
- Д. Между экватором и пришеечной областью

При наличии сильных болей больному рекомендуется съёмный пластиночный протез

- А. Не снимать до посещения врача
- Б. Снять и надеть за 3-4 часа перед посещением врача
- В. Снять и сразу придти к врачу
- Г. Снять и надеть, когда пройдут болевые ощущения
- Д. Снять и после исчезновения воспалительных явлений придти к врачу

Изготовление полного съёмного протеза на нижнюю челюсть с удлинённой дистальной границей может привести к

- А. Прикусыванию щёк
- Б. Сбрасыванию протеза во время функции
- В. Прикусыванию губ
- Г. Нарушению дикции
- Д. Нарушению эстетики

УКАЖИТЕ ПРОТЕЗ, МАКСИМАЛЬНО ПЕРЕДАЮЩИЙ ЖЕВАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПОЛУФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

- А. бюгельный
- Б. мостовидный
- В. частично съемный пластиночный
- Г. полный съемный
- Д. комбинированный

Штампованная коронка при припасовке в полости рта должна накладываться на культю зуба

- А. С небольшим возрастающим усилием
- Б. Без усилия
- В. Свободно
- Г. Со «щелчком»
- Д. С большим усилием

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А. анализ диагностических моделей
- Б. анализ крови
- В. зондирование зубодесневых карманов
- Г. проба Ильиной-Маркосян
- Д. периотестометрия

ТОЛЩИНУ КАРКАСА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ КОРОНКИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- А. микрометром
- Б. эстезиометром
- В. электромиографом
- Г. гнатодинаметром
- Д. периотестом

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность лабораторных этапов изготовления штампованной коронки. Порядок:

1.2.3.4.5.6.7. Компонент действия:

- А. Окончательная штамповка;
- Б. Изготовление штампов из легкоплавкого сплава;
- В. Изготовление гипсового столбика;
- Г. Шлифовка, полировка;
- Д. Предварительная штамповка;
- Е. Получение гипсовых моделей ;
- Ж. Моделировка коронки воском .

А. 1В, 2Ж, 3Е, 4Б, 5А, 6Д, 7Г

Б. 1Е, 2Ж, 3В, 4Б, 5Д, 6А, 7Г

В. 1Е, 2В, 3Ж, 4Б, 5А, 6Д, 7Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видами съёмных протезов и способом передачи жевательного давления по Румпелю. Вид протеза:

- 1. Бюгельный;
- 2. Пластиночный;
- 3. Мостовидный. Способ передачи жевательного давления:
- А. Нефизиологический;
- Б. Физиологический;
- В. Полуфизиологический.

А. 1Б, 2А, 3В

Б. 1А, 2В, 3Б

В. 1В, 2А, 3Б

Для изготовления штампованных коронок применяют штампы, отлитые из

- А. Хромокобальтового сплава
- Б. Легкоплавкого сплава
- В. Серебряно-палладиевого сплава
- Г. Свинца
- Д. Олова

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность лабораторных этапов изготовления съемных пластиночных протезов. Порядок:1.2.3.4.5. Лабораторные этапы изготовления:А. Гипсовка в кювету, паковка пластмассы и её полимеризация ;
Б. Постановка искусственных зубов;
В. Обработка, шлифовка, полировка;
Г. Гипсовка моделей в артикулятор;
Д. Получение гипсовых моделей и изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.

А. 1Г, 2Д, 3В, 4А, 5Б

Б. 1В, 2Г, 3А, 4Б, 5Д

В. 1Д, 2Г, 3Б, 4А, 5В

При изготовлении штифтовой конструкции оптимальная длина штифта относительно длины корня составляет

А. 1/3

Б. 2/3

В. 1/2

Г. Всю длину корня

Д. Длина штифта не имеет значения

Газовая пористость базиса протеза возникает из-за следующих причин

А. Недостаточное сжатие пластмассы

Б. Быстрое охлаждение кюветы

В. Быстрый нагрев кюветы

Г. Нарушение пропорций полимера и мономера

Д. Испарение мономера с не закрытой созревающей пластмассы

НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПРИ СНЯТИИ ОТТИСКА ДЛЯ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К:

А. остеомиелиту

Б. изменению высоты нижнего отдела лица

В. дисфункции ВНЧС

Г. неудовлетворительной фиксации съемного протеза

Д. повышенному тонуусу жевательных мышц

КОНСТРУКЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕСЪЕМНОГО МОСТОВИДНОГО МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЮТСЯ

- А. керамические массы
- Б. воск
- В. слепочные массы
- Г. гипс
- Д. акриловые пластмассы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления паяного мостовидного протеза. Порядок:1.2.3.4.5.6.7. Клинические этапы изготовления паяного мостовидного протеза:

- А. Припасовка коронок;
- Б. Получение оттисков;
- В. Определение центральной окклюзии;
- Г. Фиксация мостовидного протеза;
- Д. Получение оттиска с коронками;
- Е. Препарирование зубов под коронки;
- Ж .Припасовка мостовидного протеза в полости рта.

- А. 1Б, 2Е, 3Г, 4А, 5Д, 6Ж, 7В
- Б. 1Е, 2Б, 3В, 4А, 5Д, 6Ж, 7Г
- В. 1Г, 2Б, 3В, 4Д, 5А, 6Ж, 7Е

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления металлокерамической коронки. Порядок:1.2.3.4.5. Клинические этапы изготовления:

- А. Припасовка коронки;
- Б. Фиксация коронки;
- В. Припасовка каркаса, выбор цвета облицовки;
- Г. Определение центральной окклюзии ;
- Д. Препарирование зуба и получение оттисков.

- А. 1Г, 2Д, 3Б, 4А, 5В
- Б. 1А, 2Б, 3В, 4Д, 5Г
- В. 1Д, 2Г, 3В, 4А, 5Б

Противопоказанием к изготовлению культевой штифтовой вкладки является

- А. Атрофия костной ткани стенок альвеол 1 степени
- Б. Разрушение коронковой части зуба с сохранением 3 мм над уровнем десны
- В. Наличие твёрдых тканей зуба на уровне десневого края
- Г. Разрушение твёрдых тканей зуба ниже уровня десневого края более 3,0 мм
- Д. Разрушение твёрдых тканей зуба ниже уровня десневого края на 0,5 мм

На этапе "проверка конструкции съемного протеза" при полном отсутствии зубов в случае выявления завышения высоты нижнего отдела лица необходимо заново определить центральное соотношение челюстей

- А. С помощью новых восковых базисов с окклюзионными валиками
- Б. Сняв боковые зубы с верхнего воскового базиса и приклеив к нему пластинку воска
- В. Приклеив пластинку воска на боковые зубы нижнего воскового базиса
- Г. Сняв боковые зубы с нижнего воскового базиса и приклеив к нему пластинку воска
- Д. Приклеив пластинку воска на передние зубы нижнего воскового базиса

ОККЛЮЗИОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ВОСКОВОГО ВАЛИКА ВО ФРОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ФОРМИРУЮТ ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛИНИИ

- А. зрачковой
- Б. носовой
- В. ушной
- Г. зубной
- Д. комиссуральной

При препарировании зуба под металлокерамическую коронку с жевательной поверхности или режущего края сошлифовывают ткани зуба примерно на (в мм)

- А. 0,1 – 0,3
- Б. 0,3 – 0,6
- В. 1,5 – 1,8
- Г. 0,7 – 1,0
- Д. 2,5 – 3,0

Промежуточная часть мостовидного протеза в области боковых зубов по отношению к десне

- А. Не касается
- Б. Прилегает к ней по всей поверхности
- В. Прилегает только на скатах альвеолярного гребня
- Г. Касается по вершине альвеолярного гребня в двух точках
- Д. Касается по вершине альвеолярного гребня в одной точке

Культевые штифтовые вкладки методом литья изготавливают из

- А. Пластмассы
- Б. Легкоплавкого металла
- В. Сплавов металлов
- Г. Композиционных материалов
- Д. Воска

ВИДЫ ОККЛЮЗИОННЫХ КРИВЫХ

- А. сагиттальная Шпея и трансверзальная Уилсона
- Б. сагиттальная Уилсона и фронтальная Бонвиля
- В. трансверзальная Шпея и вертикальная Гиза
- Г. фронтальная Бонвиля и вертикальная Гиза
- Д. сагиттальная Камперовская и вертикальная Шпея

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью атрофии костной ткани альвеолы и высотой анатомической коронки зуба. Степень атрофии костной ткани альвеолы:

- 1. 3/4;
 - 2. Более 3/4. Высота анатомической коронки зуба:
- А. Две высоты анатомической коронки зуба;
 - Б. Одна высота анатомической коронки зуба;
 - В. Полторы высоты анатомической коронки зуба;
 - Г. Половина высоты анатомической коронки зуба.
- А. 1В, 2А
 - Б. 1Б, 2А
 - В. 1Б, 2В

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ

- А. проверка конструкции протеза, коррекция протеза
- Б. замена воска на пластмассу, полировка
- В. определение центральной окклюзии, постановка искусственных зубов
- Г. снятие оттисков, постановка искусственных зубов
- Д. нанесение анатомических ориентиров, паковка пластмассы

С ПОМОЩЬЮ КРАМПОНОВ, В БАЗИСЕ ПРОТЕЗА УДЕРЖИВАЮТСЯ ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ

- А. фарфоровые
- Б. пластмассовые
- В. литые
- Г. комбинированные
- Д. керамические

Создание чрезмерно широкого уступа в пришеечной области приводит к

- А. К затруднённому наложению коронки
- Б. Ослаблению фиксации коронки
- В. Травме пародонта
- Г. Нарушению эстетики коронки
- Д. Отлому коронковой части зуба вместе с коронкой

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на нижней челюсти в области зубов проходит

- А. Не касается зубов
- Б. Перекрывая коронки зубов на 2/3
- В. В пришеечной области зубов
- Г. Перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. Посередине коронки зубов

При недостаточно хорошей фиксации полного съёмного протеза, обусловленной удлинёнными границами базиса, необходимо

- А. Изготовить новый протез
- Б. Провести коррекцию краев протеза
- В. Уточнить границы протеза самотвердеющей пластмассой
- Г. Получить оттиск, используя протез, и провести перебазировку в лаборатории
- Д. Провести перебазировку эластичной базисной пластмассой

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между разными классификациями и видом зубных протезов. Классификация:

1. По назначению;

2. По методу изготовления. Зубные протезы:

- А. Коронки, полукоронки, экваторные коронки, телескопические коронки;
- Б. Коронки комбинированные, металлические, неметаллические;
- В. Литые, штампованные, полимеризованные;
- Г. Восстановительные, опорные, шинирующие.

А. 1Г, 2В

Б. 1В, 2Г

В. 1А, 2Б

Граница съемного протеза при полном отсутствии зубов на нижней челюсти по отношению к позадиомолярному (ретромолярному) бугорку

- А. Перекрывает его полностью
- Б. Не доходит до бугорка на 1мм
- В. Не доходит до бугорка на 5мм
- Г. Располагается посередине бугорка
- Д. Перекрывает бугорок на 2/3

НАИБОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- А. анатомо-физиологический
- Б. анатомический
- В. антропометрический
- Г. статический
- Д. логический

К физиологическим видам прикуса относятся

- А. Глубокий
- Б. Прогнатический
- В. Бипрогнатический
- Г. Перекрестный
- Д. Открытый

Проверка окклюзионных контактов на этапе припасовки несъемного мостовидного протеза проводится при окклюзиях

- А. Центральной и сагиттальных
- Б. Боковых, сагиттальных и центральной
- В. Сагиттальных и боковых
- Г. Сагиттальных
- Д. Центральной

Первая степень патологической подвижности зуба по Энтину характеризуется визуально определяемым смещением зуба в направлении

- А. Вертикальном
- Б. Вестибуло-оральном
- В. Вестибуло-оральном и мезио-дистальном
- Г. Круговом
- Д. Мезио-дистальном

Оптимальное расположение кламмерной линии на нижней челюсти

- А. Диагональное
- Б. Сагиттальное
- В. Поперечное
- Г. Вестибуло-оральное
- Д. Точечное

При лечении болезней пародонта у пациентов с сохранившимися зубными рядами используется съемная шина Эльбрехта, которая состоит из

- А. Многозвеньевых кламмеров на все зубы с элементами перекидных кламмеров, окклюзионных накладок
- Б. Колпачковых коронок на фронтальную группу зубов
- В. Пластиночного протеза с когтевидными отростками
- Г. Бюгельного протеза с многозвеньевыми кламмерами на боковые зубы
- Д. Бюгельного протеза с когтевидными отростками

К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕГРУЗКЕ ЗУБОВ ПРИВОДИТ

- А. кислотный некроз
- Б. хроническая травма слизистой оболочки полости рта
- В. частичная потеря зубов
- Г. острый гингивит
- Д. кариес дентина

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видами мостовидных протезов и их опорными элементами. Мостовидные протезы:

- 1. Съемные;**
 - 2. Несъемные. Опорные элементы:**
 - А. Коронки;**
 - Б. Полуколонки;**
 - В. Аттачменты;**
 - Г. Кламмера.**
- А. 1А, 2Б, 3В
 - Б. 1Б, 2А, 3В
 - В. 1В, 2Б, 3А

ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ III СТЕПЕНИ СМЕЩЕНИЕ ЗУБА ОТНОСИТЕЛЬНО ОККЛЮЗИОННОЙ ПЛОСКОСТИ ПРОИСХОДИТ

- А. на 2/3 длины коронки и более 2
- Б. на 1/2 длины коронки зуба
- В. на толщину эмалевого слоя
- Г. на всю длину коронки
- Д. до уровня дентина

При изготовлении цельнолитых коронок применяется сплав золота пробы

- А. 750
- Б. 375
- В. 583
- Г. 900
- Д. 915

Дуга бюгельного протеза на нижней челюсти располагается

- А. У шеек зубов
- Б. Между шейками зубов и переходной складкой дна полости рта
- В. У переходной складки дна полости рта
- Г. Между шейками зубов и окклюзионной поверхностью
- Д. У переходной складки преддверия полости рта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления металлопластмассовой коронки. Порядок:1.2.3.4.5. Клинические этапы изготовления:

- А. Фиксация коронки;
- Б. Припасовка каркаса, выбор цвета облицовки;
- В. Препарирование зуба и получение оттисков;
- Г. Определение центральной окклюзии;
- Д. Припасовка коронки.

- А. 1В, 2Г, 3Б, 4Д, 5А
- Б. 1Б, 2А, 3В, 4Д, 5Г
- В. 1А, 2Г, 3Д, 4Б, 5В

ЭТАП ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

- А. выверение окклюзионных взаимоотношений
- Б. гипсовку модели в артикуляторе
- В. примерку каркаса мостовидного протеза
- Г. наложение съемного протеза
- Д. выбор цвета

Для проведения этапа "определение центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов" в клинику поступают

- А. Гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками
- Б. Восковые базисы с окклюзионными валиками
- В. Гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками, зафиксированные в окклюдатор
- Г. Гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками, зафиксированные в артикулятор
- Д. Гипсовые модели с восковыми базисами и искусственными зубами

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления цельнолитого мостовидного протеза с пластмассовой облицовкой .

Порядок:

1.2.3.4.5. Клинические этапы изготовления цельнолитого мостовидного протеза с пластмассовой облицовкой:

- А. Фиксация протеза на опорных зубах цементом;
- Б. Определение центральной окклюзии;
- В. Препарирование зубов, получение оттисков;
- Г. Припасовка мостовидного протеза;
- Д. Припасовка цельнолитого каркаса, выбор цвета облицовки.

А. 1В, 2Б, 3Д, 4Г, 5А

Б. 1Д, 2А, 3В, 4Г, 5Б

В. 1А, 2Б, 3Г, 4Д, 5В

При полимеризации пластмассы быстрый нагрев кюветы приводит к образованию в базисе протеза

- А. Трещин
- Б. Газовой пористости
- В. Гранулярной пористости
- Г. Внутренних напряжений
- Д. Пористости сжатия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между способами передачи жевательного давления по Румпелю и видами протезов. Способы передачи жевательного давления:

1. Физиологический;
 2. Нефизиологический;
 3. Полуфизиологический. Вид протеза:
 - А. Мостовидный;
 - Б. Съёмный пластиночный;
 - В. Бюгельный
- А. 1Б, 2А, 3В
Б. 1В, 2Б, 3А
В. 1А, 2Б, 3В

Место коррекции индивидуальной ложки на нижней челюсти при проведении функциональной пробы «глотание»

- А. Вестибулярный край между клыками
Б. Вестибулярный край в области моляров и передней группы зубов
В. Язычный край в области моляров
Г. От позадимолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии
Д. Язычный край в области премоляров

При починке съёмного протеза на нижней челюсти в связи с потерей естественного зуба необходимо получить оттиск с

- А. Нижней челюсти без протеза
Б. Нижней челюсти с протезом
В. Верхней челюсти и нижней челюсти без протеза
Г. Нижней челюсти с протезом и верхней челюсти
Д. Оттиск снимать не нужно

НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫЕ КОРРОЗИИ СПЛАВЫ, ПРИ СМЕЩЕНИИ PH В КИСЛУЮ СТОРОНУ

- А. на основе кобальта
Б. на основе золота
В. на основе никеля
Г. на основе титана
Д. на основе кадмия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность изготовления культевой штифтовой вкладки прямым методом. Порядок: 1; 2; 3;

4. Компонент действия:

А. Моделирование восковой композиции вкладки;

Б. Припасовка и фиксация культевой вкладки;

В. Распломбирование канала и подготовка надкорневой части зуба;

Г. Отливка вкладки из сплава металла.

А. 1Б, 2Г, 3Б, 4А

Б. 1В, 2А, 3Г, 4Б

В. 1В, 2А, 3Г, 4Б

Причиной утолщения базиса съемного протеза является

А. Неточность получения оттиска

Б. Неточное соединение частей кюветы при паковке пластмассы

В. Деформация протеза в момент извлечения его из кюветы после полимеризации

Г. Нарушение пропорций полимера и мономера при подготовке пластмассы

Д. Неправильный выбор вида гипсовки

Разборная гипсовая модель отливается при изготовлении

А. Штампованной коронки

Б. Цельнолитой коронки

В. Бюгельного протеза

Г. Съемного мостовидного протеза

Д. Пластиночного протеза

ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НАЗЫВАЕТСЯ

А. коррозией

Б. стабилизацией

В. реакцией восстановления

Г. гальваностегией

Д. электролизом

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность действий на этапе определения центральной окклюзии с помощью восковых базисов с окклюзионными валиками при наличии антагонизирующих пар зубов. Порядок:1.2.3.4.5.6. Компонент действия:

- А. Оценка качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками;**
- Б. Сопоставление гипсовых моделей в центральной окклюзии и проверка правильности ее определения;**
- В. Одновременная припасовка верхнего и нижнего восковых валиков до смыкания зубов-антагонистов;**
- Г. Поочередная припасовка верхнего и нижнего валиков до смыкания зубов-антагонистов;**
- Д. Нанесение ориентиров для постановки искусственных зубов**
- Е. Приклеивание разогретой пластинки воска на восковые валики и фиксация центральной окклюзии.**

А. 1А, 2Г, 3В, 4Е, 5Д, 6Б

Б. 1Б, 2Г, 3Д, 4Е, 5В, 6А

В. 1Е, 2Г, 3Б, 4А, 5Д, 6В

После лабораторного этапа «постановка искусственных зубов» следующий клинический этап

- А. Определение центральной окклюзии
- Б. Коррекция протеза
- В. Проверка конструкции протеза
- Г. Замена воска на пластмассу
- Д. Отделка протеза

Моделирование цельнолитой коронки производят на

- А. Гипсовом штампе
- Б. Гипсовой модели
- В. Разборной модели
- Г. Огнеупорной модели
- Д. Штампике из легкоплавкого металла

Все боковые стенки опорных зубов при изготовлении паяного мостовидного протеза препарируются

- А. С наклоном в сторону дефекта зубного ряда
- Б. Параллельно между собой
- В. С наклоном в сторону от дефекта зубного ряда
- Г. Параллельно с рядом стоящим зубом
- Д. Только параллельно продольной оси зуба

Диагональное расположение кламмерной линии благоприятно для фиксации съёмного протеза

- А. На верхней челюсти
- Б. На нижней челюсти
- В. На верхней и нижней челюстях
- Г. При «болтающемся гребне» на нижней челюсти
- Д. При высокой степени атрофии альвеолярной части

К ЛАБОРАТОРНЫМ ЭТАПАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ ОТНОСЯТСЯ

- А. постановка искусственных зубов, замена воска на пластмассу
- Б. коррекция протеза
- В. снятие оттисков
- Г. проверка конструкции протеза
- Д. выверение окклюзионных взаимоотношений

СОЗДАНИЕ БОЛЬШОЙ КОНУСНОСТИ ЗУБА ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ПРИВЕДЕТ К:

- А. расцементировке коронки
- Б. повреждению десневого края опорного зуба
- В. повреждению пародонта опорного зуба
- Г. отколу керамической массы
- Д. к стиранию зуба антогониста

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность действий на этапе определения центрального соотношения челюстей при изготовлении пластиночных протезов при дефектах зубных рядов. Порядок: 1.2.3.4.5. Компонент действия:

- А. Приклеивание разогретой пластинки воска и фиксация центрального соотношения челюстей;
 - Б. Припасовка восковых базисов с окклюзионными валиками с учетом высоты физиологического покоя;
 - В. Оценка качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками ;
 - Г. Проверка правильности определения центрального соотношения челюстей и нанесение клинических ориентиров;
 - Д. Определение высоты нижнего отдела лица в состоянии относительного физиологического покоя.
- А. 1Д, 2Б, 3В, 4Г, 5А
 - Б. 1В, 2Д, 3Б, 4А, 5Г
 - В. 1Г, 2А, 3Б, 4Д, 5В

Показанием к постановке искусственных зубов на «приточке» в съёмном пластиночном протезе на верхней челюсти является

- А. Чрезмерная выраженность альвеолярной части
- Б. Чрезмерная выраженность альвеолярного
- В. Отростка верхней челюсти в области боковых зубов
- Г. «короткая» верхняя губа
- Д. Выраженная уздечка нижней губы

Неудовлетворительная фиксация полного съёмного протеза на нижней челюсти может быть связана с

- А. Неправильным выбором цвета искусственных зубов
- Б. Неправильным выбором формы искусственных зубов
- В. Изготовлением базиса из бесцветной пластмассы
- Г. Гранулярной пористостью (мраморностью) базиса
- Д. Укороченными границами протеза

Создание чрезмерной конусности культи зуба при препарировании под металлокерамическую коронку обуславливает

- А. Травму пародонта
- Б. Затрудненное наложение протеза
- В. Ослабление фиксации протеза
- Г. Эстетический дефект в области шейки зуба
- Д. Снижение жевательной эффективности

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность лабораторных этапов изготовления паяного мостовидного протеза . Порядок:1.2.3.4.5. Лабораторные этапы изготовления паяного мостовидного протеза:А. Литье промежуточной части, пайка, шлифовка и полировка;
Б. Изготовление опорных частей;
В. Отливка гипсовых моделей и изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками;
Г. Изготовление гипсовых моделей с опорными частями ;
Д. Моделировка промежуточной части.**

- А. 1Б, 2В, 3А, 4Д, 5Г
- Б. 1В, 2Б, 3Г, 4Д, 5А
- В. 1А, 2Б, 3Д, 4Г, 5В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между причинами починки съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти и компонентами действия. Причина починки съёмного протеза:

1. Перелом базиса протеза;

2. Отлом плеча кламмера;

3. Удаление естественного зуба. Компоненты действия:

А. Получить оттиск с верхней челюсти без протеза;

Б. Получить оттиск с верхней челюсти с протезом;

В. Получить оттиск с двух челюстей без протеза;

Г. Получить оттиск с нижней челюсти и с верхней челюсти с протезом; Д. Оттиски получать не нужно.

А. 1А, 2Б, 3В

Б. 1Д, 2Б, 3Г

В. 1Д, 2Б, 3Г

НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫЕ КОРРОЗИИ СПЛАВЫ

А. на основе никеля

Б. разнородные

В. на основе золота

Г. на основе кобальта

Д. на основе кадмия

Место коррекции индивидуальной ложки на нижней челюсти при проведении функциональной пробы «вытягивание вперед губ, сложенных трубочкой»

А. Язычный край в области премоляров

Б. Вестибулярный край между клыками

В. Вестибулярный край в области моляров

Г. Язычный край в области моляров

Д. От позадимолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии

Тело удерживающего кламмера съёмного протеза отстоит от боковой поверхности опорного зуба и располагается

А. В пришеечной области

Б. Между жевательной поверхностью зуба и экватором

В. Между экватором и пришеечной областью

Г. На экваторе

Д. Слегка касается маргинальной десны

ПАКОВКА ПЛАСТМАССЫ В КЮВЕТУ ПРОВОДЯТ В СТАДИИ:

- А. песочной
- Б. тестообразной
- В. тянущихся нитей
- Г. затвердевшей
- Д. жидкой

За степень атрофии лунки зуба принимается размер, полученный при зондировании патологического зубодесневого кармана в области

- А. Медиальной стороны
- Б. Дистальной стороны
- В. Наибольшей атрофии
- Г. Вестибулярной поверхности
- Д. Оральной поверхности

ВРЕМЕННЫЕ СЪЕМНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В ЦЕЛЯХ:

- А. определения конгруэнтности протеза
- Б. замещения дефектов зубных рядов и восстановления высоты нижнего отдела лица на период проведения хирургической и эндодонтической подготовки
- В. функционального анализа окклюзии
- Г. исследования характера свободных движений нижней челюсти
- Д. исследования тонуса жевательных мышц

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между съёмными пластиночными протезами, изготовленными на нижнюю или верхнюю челюсть, и наиболее рациональным расположением кламмерной линии для их фиксации. Съёмный пластиночный протез изготовлен на нижнюю или верхнюю челюсть:

- 1. Нижняя;
 - 2. Верхняя. Благоприятное расположение кламмерной линии:
 - А. Диагональное;
 - Б. Сагиттальное;
 - В. Поперечное.
- А. 1В, 2Б
 - Б. 1В, 2А
 - В. 1А, 2Б

При препарировании зуба под металлокерамическую коронку возможно создание уступа-скоса в пришеечной области под углом

- А. 135°
- Б. 50°
- В. 70°
- Г. 150°
- Д. 170°

ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ II СТЕПЕНИ СМЕЩЕНИЕ ЗУБА ОТНОСИТЕЛЬНО ОККЛЮЗИОННОЙ ПЛОСКОСТИ ПРОИСХОДИТ

- А. на 1/2 длины коронки зуба
- Б. на всю длину коронки
- В. на толщину эмалевого слоя
- Г. до уровня дентина
- Д. до уровня анатомической шейки зуба

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ЭТАПА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ СЛЕДУЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП

- А. постановка искусственных зубов
- Б. замена воска на пластмассу
- В. полировка протеза
- Г. изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками
- Д. проведение параллелометрии

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНОГО ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ КЮВЕТУ ПОМЕЩАЮТ

- А. в холодную воду
- Б. в воду с температурой 60 С
- В. в кипящую воду
- Г. в горячий пар под давлением
- Д. в воду комнатной температуры

При прямом методе изготовления культевой вкладки восковая или пластмассовая модель будущей вкладки изготавливается на

- А. Модели из обычного медицинского гипса
- Б. Модели из огнеупорной массы
- В. Модели из легкоплавкого металла
- Г. Непосредственно в полости рта
- Д. Модели из супергипса

Причинами расцементирования металлокерамической коронки являются:

- А. Чрезмерная конусность отпрепарированной культи зуба
- Б. Отсутствие экватора коронки
- В. Отсутствие контакта с соседними зубами
- Г. Отсутствие контакта с зубами-антагонистами
- Д. Удлиненный край коронки

При отломе коронковой части зуба на уровне десны зуб восстанавливают

- А. Полукоронкой
- Б. Экваторной коронкой
- В. Вкладкой
- Г. Съёмным протезом
- Д. Штифтовой конструкцией

ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО СТИРАНИЯ ЗУБОВ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ

- А. аномалия прикуса
- Б. гингивит
- В. профессиональная гигиена полости рта
- Г. заболевания сердечнососудистой системы
- Д. непереносимость к стоматологическим материалам

При препарировании зуба для изготовления штампованной коронки с боковых поверхностей осуществляют сошлифовку

- А. Соответственно периметру шейки зуба
- Б. На толщину материала коронки
- В. Только экватор
- Г. Только с вестибулярной поверхности
- Д. Только с язычной поверхности

Причины скола керамического покрытия с металлокерамической коронки

- А. Наличие гирлянды
- Б. Неудовлетворительная гигиена полости рта
- В. Наличие в полости рта съёмного протеза
- Г. Не выверенные окклюзионные контакты
- Д. Обширные пломбы на зубах – антагонистах

ОШИБКА НА ЭТАПЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К:

- А. боковому или передне-заднему смещению нижней челюсти
- Б. несоблюдению зрачковой линии
- В. неправильному выбору оттискного материала
- Г. нарушению границ протезного ложа
- Д. изменению эстетических параметров

На нижней челюсти наибольшей податливостью обладает слизистая оболочка в области

- А. Слизистого бугорка
- Б. Середины альвеолярного гребня
- В. Орального ската альвеолярного отростка
- Г. Вестибулярного ската альвеолярного отростка

К надесневым относят шины

- А. Тигерштедта
- Б. Порты
- В. Вебера
- Г. Ванкевич

Изоляционный лак наносится между

- А. Гипсовой культей зуба и восковым колпачком
- Б. Слоем керамики и слоем глазури
- В. Металлическим колпачком и слоем керамики
- Г. Слоями керамики

Основной метод фиксации съемных пластинчатых протезов при полном отсутствии зубов

- А. Биофизический
- Б. Биомеханический
- В. Физический
- Г. Механический

Показанием к применению съемного протеза с дублированным зубным рядом является

- А. Расщелина мягкого неба
- Б. Внесуставная контрактура
- В. Несросшийся перелом
- Г. Неправильно сросшийся перелом

Лечение больных с деформациями зубных рядов II степени I формы включает

- А. Циркулярную гингивотомию
- Б. Изготовление имедиат-протезов
- В. Пришлифовывание зубов
- Г. Метод постепенной дезокклюзии

Второй тип по классификации Келлера характеризуется

- А. Атрофией фронтального отдела альвеолярной части и хорошо выраженным альвеолярным гребнем в области боковых зубов
- Б. Хорошо выраженной альвеолярной частью, подвижной слизистой оболочкой, расположенной далеко от вершины альвеолярного гребня
- В. Хорошо выраженной альвеолярной частью во фронтальном участке и резкой атрофией в области боковых зубов
- Г. Резкой равномерной атрофией всей альвеолярной части, подвижной слизистой оболочкой, расположенной почти на уровне гребня верхней челюсти

Плечо кламмера Аккера должно иметь форму

- А. Клиновидную
- Б. Прямую
- В. Саблевидную
- Г. Кольцевидную

Для изготовления диагностических моделей наиболее целесообразно применять оттисковые массы

- А. Альгинатные
- Б. Силиконовые
- В. Термопластические
- Г. Тиоколовые

Количество зон коррекции индивидуальной ложки для нижней челюсти

- А. 7
- Б. 5
- В. 8
- Г. 6

При определении центрального соотношения челюстей окклюзионную поверхность воскового валика в боковом участке формируют параллельно линии

- А. Волосистой части головы
- Б. Нижних зубов
- В. Смыкания губ
- Г. Носо-ушной

Подготовку пластмассового теста осуществляют в емкости из

- А. Металла
- Б. Полиуретана
- В. Стекла
- Г. Пластмассы

При постановке искусственных зубов, по васильеву, в ортогнатическом прикусе дистально-щечный бугор второго моляра отстоит от стекла на (в мм)

- А. 4,0
- Б. 2,5
- В. 1,0
- Г. 0,5

При внешнем осмотре больных с декомпенсированной формой повышенной стираемости зубов выявляется

- А. Углубление носогубных складок
- Б. «Птичье» лицо
- В. Асимметрия лица
- Г. Увеличение нижней трети лица

К угловым параметрам, получаемым при проведении функциональной пробы «латеротрузия» относят

- А. Параметры треугольника Бонвиля
- Б. Угол клыкового ведения
- В. Угол сагиттального резцового пути
- Г. Угол сагиттального суставного пути

Абсолютная сила жевательных мышц по веберу (в кг)

- А. 139
- Б. 390
- В. 30
- Г. 90

Корень зуба 47 предпочтительный для основного штифта штифтово-культевой вкладки

- А. Медиальный
- Б. Нёбный
- В. Язычный
- Г. Дистальный

При внешнем осмотре больных с декомпенсированной формой повышенной стираемости зубов выявляется

- А. Асимметрия лица
- Б. Углубление носогубных складок
- В. «Птичье» лицо
- Г. Гиперемия кожных покровов

Функция тел кламмера аддамса

- А. Способность отгибаться при прохождении через экватор зуба
- Б. Опорная часть кламмера
- В. Фиксация кламмера на зубе
- Г. Фиксация кламмера в базисе аппарата

Количество путей выведения вкладки

- А. Один
- Б. Три
- В. Четыре
- Г. Два

При постановке зубов в окклюдаторе выверяются окклюзии

- А. Центральная
- Б. Боковые левые
- В. Боковые правые
- Г. Передние, центральная

К кламмерам с точечным прикосновением к зубам относят

- А. Стреловидный кламмер Шварца
- Б. Опорно-удерживающий кламмер
- В. Кламмер Роуча
- Г. Комбинированный кламмер

Возможна ли фиксация пластмассовых коронок на временный цемент

- А. Да, если это одиночная коронка
- Б. Да, если у пациента нет бруксизма
- В. Нет
- Г. Да

Тактика специалистов при обнаружении газовых пор

- А. Наложение протеза на челюсть
- Б. Перебазировка протеза
- В. Починка протезов
- Г. Изготовление нового протеза

Телескопическая коронка используется для фиксации протезов

- А. Съёмного пластиночного
- Б. Несъёмного мостовидного
- В. Полного съёмного
- Г. Консольного

В ортопедической стоматологии для лечения болезней пародонта используют

- А. Фторирование твердых тканей зубов
- Б. Шинирование с восстановлением зубных рядов путем изготовления шин-протезов
- В. Лечение некариозных поражений твердых тканей зубов
- Г. Лечение кариозных поражений твердых тканей зубов

Штифтово-культевую вкладку перед отливкой моделируют из

- А. Силикона
- Б. Акриловой пластмассы
- В. Композита
- Г. Беззольной пластмассы

Для изготовления гнутых кламмеров в съёмном имедиат протезе применяют

- А. Серебreno-палладиевый сплав
- Б. Нержавеющую сталь
- В. Золото 900 пробы
- Г. Хром-кобальтовый сплав

При починке протеза склеиваемые детали пропитываются (насыщаются)

- А. Спиртом
- Б. Мономером
- В. Эфиром
- Г. Бензином

При изготовлении металлокерамической коронки с «гирляндой» проводят моделирование

- А. С язычной (небной) стороны
- Б. По жевательным буграм
- В. По режущему краю
- Г. Не моделируют вовсе

Морфологические изменения челюстей после полной утраты зубов

- А. Атрофия альвеолярных гребней
- Б. Увеличение амплитуды движений нижней челюсти
- В. Появление боли в области височно-нижнечелюстного сустава
- Г. Изменение характера движений нижней челюсти

Отсутствие изоляции торуса может привести к

- А. Прикусыванию щёк
- Б. Чрезмерному выделению слюны
- В. Балансу протеза
- Г. Нарушению эстетики

Вертикальные оси верхних фронтальных зубов относительно средней линии располагают

- А. С дистальным наклоном
- Б. Параллельно
- В. С медиальным наклоном
- Г. На усмотрение зубного техника в зависимости от протяженности дефекта

Условием, при котором не определяют центральное соотношение челюстей, является

- А. Наличие в 2 функционально-ориентированных группах зубов-антагонистов
- Б. Наличие в 3 функционально-ориентированных группах зубов-антагонистов
- В. Наличие в 1 функционально-ориентированной группе зубов-антагонистов
- Г. Патологическая генерализованная горизонтальная стертость со снижением высоты нижнего отдела лица

Укажите пластмассу на основе акрилатов для изготовления пластмассовых коронок

- А. Ортосил
- Б. Эладент
- В. Фторадент
- Г. Синма

Иммобилизацию отломков верхней челюсти проводят

- А. Аппаратом Катца
- Б. Складным протезом по Оксману
- В. Стандартным комплектом Збаржа
- Г. Шиной Ванкевич с наклонной плоскостью

К приобретенным дефектам челюстно-лицевой области относится

- А. Расщелина верхней губы
- Б. Расщелина альвеолярного отростка
- В. Расщелина мягкого нёба
- Г. Микростомия

Дополнительным методом диагностики зубочелюстной системы является

- А. Рентгенологическое исследование
- Б. Перкуссия
- В. Пальпация
- Г. Зондирование

При частичном отсутствии зубов съемный пластиночный протез с удерживающими кламмерами передает жевательное давление на

- А. Слизистую оболочку полости рта
- Б. Слизистую оболочку и естественные зубы
- В. Оставшиеся зубы
- Г. Жевательные мышцы

Бюгельная конструкция представляет собой протез

- А. Съёмный с опорно-удерживающими кламмерами, часть базиса в котором заменена бюгелем (дугой)
- Б. С опорно-удерживающими кламмерами
- В. Металлический каркас, выполненный в виде рамы
- Г. Съёмный, опирающийся на зубы за счет кламмеров

Съемные пластиночные протезы восстанавливают жевательную эффективность до (в процентах)

- А. 70
- Б. 90
- В. 30
- Г. 50

Этап, не входящий в процесс изготовления керамических реставраций методом cad-cam

- А. Сканирования
- Б. Прессования
- В. Моделирования
- Г. Конструирования

При изготовлении цельнокерамической коронки формируют уступ

- А. Только на язычной поверхности зуба
- Б. Циркулярный
- В. Только на небной поверхности зуба
- Г. Только с апроксимальных сторон

К истончению штампованной коронки приводит

- А. Протягивание гильзы большим количеством пуансонов
- Б. Чрезмерная обработка эластичным резиновым кругом
- В. Чрезмерное время отбеливания
- Г. Частая термическая обработка

Местом расположения жировой зоны податливости слизистой оболочки по люнду является

- А. Срединная часть твердого нёба
- Б. Дистальная треть твердого нёба
- В. Передняя треть твердого нёба
- Г. Альвеолярный отросток

Газовая пористость базиса протеза возникает из-за

- А. Быстрого охлаждения кюветы
- Б. Быстрого нагрева кюветы
- В. Испарения мономера с незакрытой созревающей пластмассы
- Г. Недостаточного сжатия пластмассы

Опорные элементы, применяемые в съемных ортодонтических аппаратах

- А. Коронки
- Б. Брекетты
- В. Кольца
- Г. Кламмера

Один из вариантов препарирования зуба под ортодонтическую коронку

- А. Препарирование не производится
- Б. Снимается слой твердых тканей на толщину металла
- В. Больше снимается твердых тканей с вестибулярной стороны
- Г. Больше снимается твердых тканей с оральной стороны

Расплавление золотого сплава при литье производится

- А. Высокочастотным полем электрического тока
- Б. Вольтовой дугой
- В. Газовой горелкой
- Г. Бензиновой горелкой

Съемный пластиночный протез при частичном отсутствии зубов состоит из

- А. Базиса
- Б. Все варианты правильные
- В. Искусственных зубов
- Г. Удерживающих элементов

Восковой шаблон с окклюзионными валиками изготавливают из _____ воска

- А. Базисного
- Б. Липкого
- В. Моделировочного
- Г. Бюгельного

Верхняя граница штанги для дистального перемещения клыков

- А. Находится на уровне проекции $1/3$ величины корня
- Б. Не доходит до десневого края на $1/3$ высоты коронки
- В. Находится на уровне проекции $1/2$ величины корня
- Г. Находится на уровне проекции вершины корня у переходной складки

Перед изготовлением разборной модели по пиндекс системе штифты устанавливаются

- А. Не устанавливаются
- Б. В проекции всех зубов
- В. В проекции каждого отпрепарированного зуба, соседних с ними зубов и беззубого участка челюсти
- Г. В проекции беззубого участка челюсти

Для замены воска на пластмассу при изготовлении шины порта применяют метод гипсовки

- А. Обратный
- Б. Прямой
- В. Комбинированный
- Г. Гипсовка не проводится

При превышении температуры костной ткани сверхкритических величин происходит

- А. Некроз
- Б. Инфильтрация
- В. Отек
- Г. Гиперемия

По классификации кеннеди двусторонний концевой дефект относится к/ко _____ классу

- А. 3
- Б. 1
- В. 2
- Г. 4

Слой снимаемого гипса при изготовлении имедиат-протеза не превышает _____ мм

- А. 0,5
- Б. 1,5
- В. 2,0
- Г. 2,5

Комплекс патологических клинических симптомов, связанных с наличием индуцированных гальванических токов, возникающих в полости рта между металлическими зубными протезами, называется

- А. Гальванопокрывание
- Б. Гальваностегия
- В. Гальванопластика
- Г. Гальваноз

Для более длительного пребывания пластмассы в тестообразном состоянии можно

- А. Пластмассу поместить в холодильник
- Б. Залить поверхность разведенной пластмассы холодной водой
- В. Постоянно перемешивать пластмассовое тесто
- Г. Использовать большее количество мономера

Для проведения починки пластиночного протеза необходимо снимать вспомогательный слепок в случае

- А. Переноса кламмера
- Б. Перелома в базисе
- В. Отлома плеча кламмера
- Г. Отлома искусственного зуба

Окклюзия, при которой средняя линия не совпадает, называется

- А. Задняя
- Б. Боковая
- В. Центральная
- Г. Передняя

Перед паковкой пластмассы при изготовлении пластинки с окклюзионными накладками методом холодной полимеризации части кламмеров адамса под накладками

- А. Не нуждаются в изоляции
- Б. Изолируются воском отростки кламмеров
- В. Изолируются воском плечо, рабочие углы, тела кламмеров
- Г. Изолируются воском тела, якорные части кламмеров

Расширения не только зубного ряда, но и его апикального базиса достигают с помощью

- А. Расширяющей пластинки с винтом
- Б. Аппарата Энгля
- В. Регулятора функций Френкеля
- Г. Расширяющей пластинки с пружиной Коффина, Коллера

При лейкоплакии и красном плоском лишае целесообразно изготовить протезы

- А. Съёмные пластиночные с кламмерами по Кемени
- Б. С опорно-удерживающими кламмерами с последующим нанесением слоя серебра
- В. Съёмные пластиночные
- Г. Бюгельные с опорно-удерживающими кламмерами

Репонирующий аппарат катца

- А. Внутриворотовой
- Б. Комбинированный внутри-внеротовой
- В. Внеротовой
- Г. Зубонадесневой

К недостаткам альгинатных оттисковых материалов относят

- А. Высокую усадку
- Б. Токсичность
- В. Эластичность
- Г. Низкую усадку

При припасовке частичного съемного протеза копировальная (артикуляционная) бумага используется для

- А. Выявления участков в области естественных зубов, мешающих наложению протеза
- Б. Коррекции участков базиса, травмирующих слизистую оболочку
- В. Выявления степени изоляции экзостозов
- Г. Выявления степени изоляции торуса

Постановка искусственных зубов по сферической поверхности применяется при прикусе

- А. Ортогнатическом
- Б. Прогнатическом
- В. Прямом
- Г. Прогеническом

Второй этап имплантации на верхней челюсти проводится через

- А. 3 Недели
- Б. 3 Месяца
- В. 6 Недель
- Г. 6 Месяцев

При повышенном стирании твердых тканей зубов 1 степени ортопедическое лечение проводится

- А. В 3 этапа
- Б. В 4 этапа
- В. В 2 этапа
- Г. Одномоментно

К характеристикам первого класса слизистой оболочки по суппле относятся

- А. Избыточно податлива, разрыхлена, слюна густой консистенции
- Б. Тонкая, мало-податлива, болезненна при пальпации, слюна жидкой консистенции
- В. Бледно-розового цвета, умеренно-увлажнена и податлива
- Г. Складчатая, с «болтающимся» гребнем

При полном отсутствии зубов на нижней челюсти граница съёмного протеза по отношению к ретромолярному бугорку

- А. Не доходит до него на 5 мм
- Б. Располагается по середине его
- В. Перекрывает его
- Г. Не доходит до него на 1 мм

К дополнительным методам обследования относится

- А. Определение разности потенциалов металлических включений
- Б. Оценка качества конструкций зубных протезов
- В. Осмотр (слизистой оболочки и органов полости рта)
- Г. Опрос (выявление характерных жалоб и сбор анамнеза)

К группе внутриротовых назубных проволочных фиксирующих аппаратов — относится шина

- А. Порта
- Б. Вебера
- В. Тигерштедта
- Г. Ванкевич

Нормальные показатели микротоков в полости рта составляют ____ мВ

- А. 90-200
- Б. 70-120
- В. 70-90
- Г. До 50

Челюстные протезы-обтураторы для замещения дефектов верхней челюсти должны

- А. Дистальным краем базиса перекрывать линию А
- Б. Иметь зазор между обтуратором и дефектом
- В. Плотно прилегать к протезному полю по краю дефекта
- Г. Обтуратором полностью замещать дефект

Главный критерий выбора опорного зуба под опорно-удерживающий кламмер

- А. Высота клинической коронки
- Б. Выраженность анатомического экватора
- В. Устойчивость зуба
- Г. Подвижность

При проведении функциональной пробы «широкое открывание рта» местом коррекции индивидуальной ложки на нижнюю челюсть является

- А. Язычный край в области моляров
- Б. Вестибулярный край в области моляров и передних зубов
- В. Вестибулярный край между клыками
- Г. От позадиомолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии

Какую пластмассу дольше всего используют для изготовления пластмассовых коронок

- А. Полиметилметакрилат
- Б. Поливинилэтилметакрилат
- В. Светоотверждаемый уретандиметакрилат
- Г. Полиэтилметакрилат

Кобальто-хромовый сплав какой имеет состав

- А. Хром 66-67%, кобальт 26-30%, никель 3-5%, молибден 4-5,5%, другие металлы
- Б. Никель 66-67%, хром 26-30%, кобальт 3-5%, молибден 4-5,5%, другие металлы
- В. Кобальт 66-67%, никель 26-30%, хром 3-5%, молибден 4-5,5%, другие металлы
- Г. Кобальт 66-67%, хром 26-30%, никель 3-5%, молибден 4-5,5%, другие металлы

Коррекцию индивидуальной ложки на нижней челюсти при проведении функциональной пробы «широкое открывание рта» необходимо провести

- А. Язычный край в области моляров
- Б. Вестибулярный край между клыками
- В. Вестибулярный край в области моляров и передних зубов
- Г. От позадиомолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии

Схема, отображающая состояние опорно-удерживающего аппарата зубов верхней и нижней челюстей, представляет собой

- А. Реопародонтограмму
- Б. Гнатодинамометрию
- В. Одонтопародонтограмму
- Г. Мастиокациографию

На «приточке» устанавливают

- А. Жевательные зубы нижней челюсти
- Б. Фронтальные зубы нижней челюсти
- В. Жевательные зубы верхней челюсти
- Г. Фронтальные зубы при выраженном альвеолярном отростке

Съемные пластиночные протезы по способу передачи жевательного давления относятся к

- А. Механическим
- Б. Физиологичным
- В. Нефизиологичным
- Г. Полуфизиологичным

Первая степень подвижности зуба по энтину определяется в направлении

- А. Мезио-дистальном
- Б. Круговом
- В. Вертикальном
- Г. Вестибуло-оральном

При атрофичной слизистой оболочке показаны _____ оттиски

- А. Разгружающие
- Б. Компрессионные
- В. Функциональные
- Г. Дифференцированные

Бюгельный протез состоит из дуги, кламмеров, искусственных зубов и

- А. Виниров
- Б. Вкладок
- В. Седловидных частей
- Г. Коронки

Наложение съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на этапе его припасовки может быть затруднено

- А. За счет невыраженного экватора зубов
- Б. Вследствие занижения высоты нижнего отдела лица
- В. Вследствие поднутрений базиса
- Г. За счет выраженности жевательных бугров искусственных зубов

Аппаратным методом исследования жевательных мышц является

- А. Реопародонтография
- Б. Периотестометрия
- В. Функциография
- Г. Электромиография

При иммедиа-протезировании зубного ряда при пародонтите в процессе подготовки альвеолярногоотростка на модели слой снимаемого гипса не превышает_____ мм

- А. 1,5
- Б. 2,0
- В. 0,5
- Г. 2,5

К этапу изготовления иммедиа-протеза относят

- А. Починка протеза
- Б. Изготовление obturatora
- В. Получение оттисков
- Г. Примерка конструкции протеза

Длинный край штампованной коронки укорачивают при помощи

- А. Сепарационных дисков
- Б. Стальных фрез и боров
- В. Алмазных абразивов
- Г. Вулканитовых дисков

При полной адентии жевательные мышцы

- А. Не изменяются
- Б. Уменьшаются в объёме
- В. Увеличиваются в объёме
- Г. Гипертрофируются

К формирующим аппаратам относится

- А. Аппарат Катца
- Б. Шина Порта
- В. Складной протез по Оксману
- Г. Протез при ложном суставе с шарнирами по принципу \"спирали\" по Ванштейну

В съёмном протезе выше линии улыбки расположены шейки искусственных зубов

- А. Центральных резцов
- Б. Первых премоляров
- В. Боковых резцов
- Г. Клыков

При фиксации абатмента к аналогу имплантата на разборной рабочей модели следует прикладывать усилие (в н/см²)

- А. 35
- Б. 10
- В. 15
- Г. 25

Ретенционные элементы (седла) каркаса бюгельного протеза служат для

- А. Удержания бюгельного протеза в полости рта
- Б. Соединения элементов бюгельного протеза
- В. Компенсации жевательного давления
- Г. Удержания пластмассового базиса бюгельного протеза

Аппарат «самсон» используется для

- А. Окончательной штамповки
- Б. Подготовки золота к штамповке
- В. Протягивания гильз
- Г. Протяжки кламмерной проволоки

Концевые дефекты зубного ряда по е.и. Гаврилову относятся к/ко _____ классу

- А. Первому
- Б. Второму
- В. Третьему
- Г. Четвертому

При протезировании с опорой на дентальные имплантаты врач получает оттиск

- А. Альгинатный
- Б. Разгружающий
- В. Гипсом
- Г. Двухслойный

Нормальным показателем микротоков полости рта является (в мка)

- А. 1–3
- Б. 2–5
- В. 3–7
- Г. 2–6

К аппаратам воспроизводящим движения нижней челюсти относится

- А. Артикулятор
- Б. Параллелометр
- В. Эстезиометр
- Г. Гнатодинамометр

На металлический каркас покрытый опаком последовательно наносят

- А. Эффект-массу и глазурь
- Б. Опак-дентин, дентин, эффект - массы и эмаль
- В. Глазурь, эмаль, дентин, опак
- Г. Эмаль и глазурь, дентин

Большинство восков использующихся в зубопротезном производстве на сегодняшний день являются

- А. Растительными
- Б. Минеральными
- В. Синтетическими
- Г. Животными

Специальным аппаратом для проведения операции имплантации является

- А. ИВЛ
- Б. Диодный лазер
- В. Физиодиспенсер
- Г. Коагулятор

В лабораторию поступил оттиск с оттяжками в области опорных зубов, ваша тактика

- А. Отлить оттиск и изготовить литой каркас обычным методом
- Б. После изготовления разборной модели отгравировать шейку после изготовления разборной модели отфрезеровать шейку
- В. После изготовления разборной модели отфрезеровать шейку
- Г. Вернуть оттиск в клинику для снятия нового оттиска

Число обрабатываемых поверхностей, которые выделяют при препарировании зуба под металлокерамическую коронку, равно

- А. 6
- Б. 4
- В. 5
- Г. 3

Среднестатистические (ориентировочные) сроки остеоинтеграции имплантатов на нижней челюсти составляют

- А. 1-2 Недели
- Б. 8-10 Месяцев
- В. 2-4 Месяца
- Г. 5-8 Месяцев

Артикуляцией называют

- А. Передняя окклюзия
- Б. Цепь сменяющих друг друга окклюдий
- В. Характер смыкания зубов в центральной окклюзии
- Г. Всевозможные движения нижней челюсти по отношению к верхней

Паковочная масса представляет собой материал, из которого изготавливают

- А. Рабочую модель
- Б. Форму для литья металлов
- В. Разборную модель
- Г. Форму для фиксации окклюзии

Четвертый класс по классификации дефектов зубных рядов кеннеди

- А. Включенный дефект в боковом отделе зубного ряда
- Б. Двусторонний концевой дефект
- В. Включенный дефект в переднем отделе зубного ряда
- Г. Односторонний концевой дефект

При изготовлении металлокерамической коронки рабочий оттиск снимают _____ массой

- А. Силиконовой
- Б. Термопластичной
- В. Альгинатной
- Г. Фторкаучуковой

При иропз, равном 0,6 – 0,8, показана

- А. Реставрация низкомодульным композитом
- Б. Керамическая вкладка
- В. Штифтовая вкладка
- Г. Коронка

Первый слой керамики, наносимый на металлический колпачок при изготовлении металлокерамической коронки

- А. Опаковый
- Б. Глазурь
- В. Эмалевый
- Г. Дентинный

Можно ли облицовывать штифтово-культевую вкладку изготовленную из кобальт хромового сплава методом фрезерования для улучшения эстетики

- А. Нет
- Б. Да, но только на фронтальную группу зубов
- В. Да
- Г. Да, но только на жевательную группу зубов

Кламмеры по функции классифицируются на

- А. Дентальные, дентоальвеолярные, альвеолярные
- Б. Удерживающие, опорно-удерживающие
- В. Металлические, пластмассовые
- Г. Жесткие, полуподвижные, шарнирные

Паковка пластмассы при изготовлении базиса ортодонтического аппарата производится в стадии

- А. Тянущихся нитей
- Б. Резиноподобная
- В. Тестообразная
- Г. Песочная

К большим дефектам зубных рядов относят отсутствие _____ зубов

- А. От 4 до 6
- Б. Более 6
- В. Не более 3
- Г. От 1 до 2

К требованиям, предъявляемым к восковым базисам при изготовлении полных съемных протезов, относят

- А. Перекрытие щечно-десневых тяжей и уздечки языка, плотное прилегание к модели на всем протяжении
- Б. Плотное прилегание к модели, отсутствие балансировки, закругленные края, доходящие до границ протезного ложа
- В. Расположение границы базиса на 3 мм, которое перекрывает переходную складку для создания клапанной зоны
- Г. Расположение границы базиса на 2 мм не доходя до границ протезного ложа

При изготовлении шины тигерштедта используется

- А. Кламмерная проволока
- Б. Алюминиевая проволока
- В. Пластмасса
- Г. Ортодонтическая проволока

При изготовлении имедиат-протеза на верхнюю челюсть на гипсовой модели небная поверхность

- А. Не подвергается обработке
- Б. Срезается на 2 мм
- В. Закругляется
- Г. Утолщается

Верхняя граница верхнегубных пелотов регулятора функции френкеля iii проходит

- А. Выше уровня основания носа
- Б. Не доходя до основания носа
- В. Доходя до основания носа
- Г. На уровне прикрепления уздечки верхней губы

Для облицовки штифтовых зубов применяется пластмасса

- А. Синма-М, Синма-74
- Б. Этакрил
- В. Редонт
- Г. Карбопласт

Опока представляет собой

- А. Емкость для расплавления металла
- Б. Рабочую модель
- В. Форму для литья
- Г. Огнеупорную модель

Для литья каркаса бюгельного протеза используют

- А. CrCo сплав
- Б. CrNi сплав
- В. Легкоплавкий сплав
- Г. Нержавеющую сталь

Починку протеза с добавлением зуба производят

- А. Без снятия слепка на фиксирующей модели
- Б. Непосредственно в полости рта
- В. С предварительным снятием слепка зубного ряда с протезом
- Г. Со снятием слепка зубного ряда без протеза

Выраженные альвеолярные отростки и бугры, глубокое небо, высоко расположенная переходная складка характеризуют тип челюсти по шредеру

- А. II
- Б. IV
- В. I
- Г. III

Бруксизм является

- А. Дневной парафункцией
- Б. Ночной парафункцией
- В. Нормой для пожилых
- Г. Вредной привычкой

Показание для изготовления керамических виниров

- А. Изменение цвета и формы зуба
- Б. ИРОПЗ=0,6
- В. Подвижность зуба 3 степени
- Г. Глубокий патологический прикус

Небный бюгель является элементом ортодонтического аппарата

- А. Аппарат Брюкля
- Б. Регулятор функции Френкеля I типа
- В. Открытый активатор Кламонта
- Г. Пропульсор Мюлемана

Первая коррекция съемного пластиночного протеза производится _____ наложения протеза

- А. Через неделю после
- Б. На следующий день после
- В. Через месяц после
- Г. В день

Расстояние между линией улыбки и краем окклюзионного валика определяет

- А. Положение верхней губы
- Б. Ширину центральных резцов верхней челюсти
- В. Высоту нижнего отдела лица
- Г. Высоту центральных резцов верхней челюсти

К признакам неправильно сросшихся отломков при переломе нижней челюсти относят

- А. Нарушение окклюзии
- Б. Затруднение акта глотания
- В. Нарушение функции речи
- Г. Нарушение функции дыхания

Материал, из которого изготавливаются прикусные валики, называется

- А. Базисный воск
- Б. Паттерн резин
- В. Лавакс
- Г. Воск для моделировки мостовидных протезов