

Тесты с вопросами по специальности «Стоматология ортопедическая» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/ortopedicheskaya/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Стоматология ортопедическая» для аккредитации и других экзаменов (1900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/ortoped/

2) Стоматология ортопедическая — ситуационные задачи

→ medik-otvet.ru/product/stomat-ortoped/

3) Тесты для аккредитации «Стоматология хирургическая» (2500 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_hirurg/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Изготовление полного съёмного протеза на верхней челюсти с укороченными границами может привести к

- А. Прикусыванию щёк
- Б. Прикусыванию губ
- В. Сбрасыванию протеза во время функции
- Г. Балансу протеза
- Д. Нарушению эстетики

Проверка окклюзионных контактов на этапе припасовки несъемного мостовидного протеза проводится при окклюзиях

- А. Центральной и сагиттальных
- Б. Боковых, сагиттальных и центральной
- В. Сагиттальных и боковых
- Г. Сагиттальных
- Д. Центральной

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между способом гипсовки восковой композиции в кювету и видом протеза. Способ гипсовки восковой композиции:

- 1. Прямой;
 - 2. Обратный;
 - 3. Комбинированный. Вид протеза:
 - А. Съёмные пластиночные протезы, с постановкой искусственных зубов «на приточке» и на искусственной десне;
 - Б. Съёмные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов;
 - В. Съёмные пластиночные протезы с постановкой искусственных зубов «на приточке».
- А. 1А, 2Б, 3В
Б. 1В, 2Б, 3А
В. 1Б, 2В, 3А

Создание чрезмерно широкого уступа в пришеечной области приводит к

- А. К затруднённому наложению коронки
- Б. Ослаблению фиксации коронки
- В. Травме пародонта
- Г. Нарушению эстетики коронки
- Д. Отлому коронковой части зуба вместе с коронкой

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между типами беззубой верхней челюсти по классификации

А.И. Дойникова и характерными признаками. Классификация

А.И. Дойникова для беззубой верхней челюсти: 1. Первый тип

2. Второй тип

3. Третий тип 4. Четвертый тип

5. Пятый тип. Признаки:

А. Средняя степень атрофии альвеолярного отростка, средней глубины небо ;

Б. Почти полное отсутствие альвеолярного отростка, резко уменьшенные размеры тела челюсти и альвеолярных бугров, плоское небо;

В. Альвеолярный отросток хорошо выражен в переднем отделе и резко атрофирован в боковых отделах ;

Г. Высокий альвеолярный отросток, хорошо выраженные альвеолярные бугры, глубокое небо;

Д. Альвеолярный отросток резко атрофирован в переднем отделе и хорошо выражен в боковых отделах.

А. 1Г, 2А, 3Б, 4В, 5Д

Б. 1А, 2Б, 3Д, 4В, 5Г

В. 1Г, 2Б, 3В, 4А, 5Г

В случае фиксации бокового смещения нижней челюсти на этапе определения центрального соотношения челюстей характер соотношения зубных рядов при проверке конструкции протеза следующий

А. Бугорковый контакт между антагонистами, сагиттальная щель во фронтальном участке, снижение высоты нижнего отдела лица

Б. Бугорковый контакт между антагонистами в боковом участке с одной стороны и просвет с другой, завышение высоты нижнего отдела лица

В. Фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, высота нижнего отдела лица в норме

Г. Фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, снижение высоты нижнего отдела лица

Д. Фиссурно-бугорковый контакт между антагонистами, завышение высоты нижнего отдела лица

На этапе "проверка конструкции съемного протеза" при полном отсутствии зубов в случае выявления завышения высоты нижнего отдела лица необходимо заново определить центральное соотношение челюстей

- А. С помощью новых восковых базисов с окклюзионными валиками
- Б. Сняв боковые зубы с верхнего воскового базиса и приклеив к нему пластинку воска
- В. Приклеив пластинку воска на боковые зубы нижнего воскового базиса
- Г. Сняв боковые зубы с нижнего воскового базиса и приклеив к нему пластинку воска
- Д. Приклеив пластинку воска на передние зубы нижнего воскового базиса

После припасовки коронок паяного мостовидного протеза в полости рта повторно определяется центральная окклюзия для

- А. Оценки качества припасовки коронок
- Б. Повторной установки и заливки модели с коронками в артикулятор
- В. Точной спайки опорных коронок с промежуточной частью
- Г. Точного моделирования промежуточной части мостовидного протеза (с учетом смыкания зубных рядов в центральной окклюзии)
- Д. Повышения эстетики протеза

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классом дефектов зубных рядов по

Е.И. Гаврилову и характеристикой дефекта зубного ряда. Класс по Гаврилову:

1. III;

2.IV. Дефект зубного ряда:

А. Концевые дефекты (односторонние, двусторонние);

Б. Комбинированные дефекты;

В. Включенные дефекты (боковые – односторонние, двусторонние, передние); Г. Челюсти с одиночно сохранившимися зубами.

А. 1Б, 2Г

Б. 1А, 2Б

В. 1В, 2А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между разным подходом при пальпации мышц челюстно-лицевой области и названием мышц. При обследовании мышечной системы челюстно-лицевой области пальпируются:

1. Со стороны кожных покровов;
 2. Со стороны полости рта. Название мышцы:
 - А. Собственно жевательные мышцы;
 - Б. Наружные крыловидные мышцы;
 - В. Внутренние крыловидные мышцы;
 - Г. Височные мышцы;
 - Д. Мышцы дна полости рта;
 - Е. Заднее брюшко двубрюшной мышцы.
- А. 1А,Г,Е, 2Б,В,Д
Б. 1АБВ, 2ДЕГ
В. 1ДЕГ, 2АБВ

При недостаточно хорошей фиксации полного съемного протеза, обусловленной удлиненными границами базиса, необходимо

- А. Изготовить новый протез
- Б. Провести коррекцию краев протеза
- В. Уточнить границы протеза самотвердеющей пластмассой
- Г. Получить оттиск, используя протез, и провести перебазировку в лаборатории
- Д. Провести перебазировку эластичной базисной пластмассой

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность изготовления культевой штифтовой вкладки прямым методом. Порядок:

- 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 4. Компонент действия:
 - А. Моделирование восковой композиции вкладки ;
 - Б. Припасовка и фиксация культевой вкладки ;
 - В. Распломбирование канала и подготовка надкорневой части зуба ;
 - Г. Отливка вкладки из сплава металла.
- А. 1А, 2Б, 3В, 4Г
Б. 1В, 2А, 3Г, 4Б
В. 1Б, 2А, 3Г, 4В

Граница полных съёмных протезов проходит

- А. Не доходя переходной складки 1,5 – 2,0 мм
- Б. Перекрывая переходную складку на 1,5 – 2,0 мм
- В. По пассивно-подвижной слизистой оболочке
- Г. По активно-подвижной слизистой оболочке
- Д. По линии mylohyoideus

Неудовлетворительная фиксация полного съёмного протеза на нижней челюсти может быть связана с

- А. Неправильным выбором цвета искусственных зубов
- Б. Неправильным выбором формы искусственных зубов
- В. Изготовлением базиса из бесцветной пластмассы
- Г. Гранулярной пористостью (мраморностью) базиса
- Д. Укороченными границами протеза

Дуга бюгельного протеза на нижней челюсти располагается

- А. У шеек зубов
- Б. Между шейками зубов и переходной складкой дна полости рта
- В. У переходной складки дна полости рта
- Г. Между шейками зубов и окклюзионной поверхностью
- Д. У переходной складки преддверия полости рта

$\frac{1}{4}$ степень атрофии лунки зуба соответствует

- А. Двум размерам высоты анатомической коронки зуба
- Б. 1,5 высоте анатомической коронки зуба
- В. Одной высоте анатомической коронки зуба
- Г. Меньше половины высоты анатомической коронки зуба
- Д. Половине высоты анатомической коронки зуба

Причины скола керамического покрытия с металлокерамической коронки

- А. Наличие гирлянды
- Б. Неудовлетворительная гигиена полости рта
- В. Наличие в полости рта съёмного протеза
- Г. Не выверенные окклюзионные контакты
- Д. Обширные пломбы на зубах – антагонистах

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между терминами, применяемыми при проведении избирательного пришлифовывания зубов, и их значением. Термин:

1. Центральная окклюзия;
2. Эксцентрическая окклюзия;
3. Привычный прикус (привычная или вторичная окклюзия);
4. Центрический суперконтакт;
5. Функциональная окклюзия (артикуляция). Значение: А. Окклюзионные контакты зубов при переходе из центральной в переднюю и боковые окклюзии;
- Б. Множественные фиссурно-бугорковые контакты зубных рядов при центральном положении головок височно-нижнечелюстного сустава в суставных ямках;
- В. Динамические контакты зубных рядов в центральной, боковой и передней окклюзиях;
- Г. Суперконтакт в центральной окклюзии;
- Д. Всякое максимальное множественное смыкание зубных рядов, возможное без центрального положения суставных головок в ямках.

А. 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В

Б. 1Б, 2А, 3Д, ВГ, 5Г

В. 1В, 2А, 3Д, 4Г, 5Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинико – лабораторных этапов изготовления съемного пластиночного протеза . Порядок: 1.;

2.;

3.;

4.;

5.;

6.;

7.;

8. Клинико – лабораторные этапы изготовления съемного пластиночного протеза :

А. Коррекция протеза;

Б. Постановка искусственных зубов ;

В. Припасовка и наложение протеза;

Г. Определение центральной окклюзии;

Д. Проверка конструкции протеза;

Е. Замена воскового базиса на пластмассовый ;

Ж. Получение оттисков, отливка гипсовых моделей;

З. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.

А. 1Б, 2А, 3В, 4Ж, 5Е, 6Д, 7Г, 8З

Б. 1Ж, 2З, 3Г, 4Б, 5Д, 6Е, 7В, 8А

В. 1А, 2Ж, 3З, 4Г, 5Е, 6Д, 7Б, 8В

Проверка окклюзионных контактов на этапе припасовки искусственной коронки проводится в окклюзиях

- А. Сагиттальных
- Б. Сагиттальных и центральной
- В. Центральной и боковых
- Г. Боковых и сагиттальных
- Д. Сагиттальных, боковых и центральной

Отросток удерживающего кламмера должен располагаться

- А. Между экватором и десной
- Б. Между экватором и окклюзионной поверхностью
- В. На вестибулярной поверхности зуба
- Г. В области ската альвеолярного гребня с оральной стороны
- Д. По центру альвеолярного гребня в базисе под искусственными зубами

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность лабораторных этапов изготовления цельнолитой коронки. Порядок:

- 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 - 4.4
 - 5.;
 - 6. Лабораторные этапы изготовления цельнолитой коронки:
- А. Изготовление колпачка из адапты;
 - Б. Шлифовка, полировка;
 - В. Отливка из сплава металла;
 - Г. Изготовление разборной модели;
 - Д. Припасовка на модели;
 - Е. Моделирование коронки.
- А. 1А, 2Б, 3Г, 4В, 5Е, 6Д
 - Б. 1Г, 2А, 3Е, 4В, 5Д, 6Б
 - В. 1В, 2Г, 3А, 4Б, 5Д, 6Е

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между зонами податливости слизистой оболочки по классификации Люнда и их топографией. Зоны податливости слизистой оболочки по Люнду:

1. Железистая;
 2. Жировая. Топография:
 - А. Альвеолярный отросток;
 - Б. Область небных складок;
 - В. Срединная часть твердого неба;
 - Г. Дистальная треть твердого неба;
 - Д. Переходная складка.
- А. 1Г, 2Б
Б. 1А, 2Б
В. 1 В, 2Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видами функциональных оттисков и способом их получения . Функциональные оттиски:

1. Компрессионные;
 2. Разгружающие;
 3. Дифференцированные (комбинированные). Способ получения оттисков:
 - А. Стандартной перфорированной ложкой альгинатным оттискным материалом;
 - Б. Стандартной перфорированной ложкой альгинатным оттискным материалом;
 - В. Жесткой индивидуальной ложкой, перфорированной в определенных участках оттискными массами высокой степени текучести;
 - Г. Жесткой индивидуальной ложкой с помощью двух материалов, обладающих разной степенью текучести;
 - Д. Жесткой индивидуальной ложкой малотекучими, с относительно высокой степенью вязкости, материалами (термопластические) или силиконовыми массами с низкой степенью вязкости;
 - Е. Жесткой индивидуальной ложкой малотекучими, с относительно высокой степенью вязкости, материалами (термопластические) или силиконовыми массами с низкой степенью вязкости.
- А. 1Г, 2Б, 3В
Б. 1А, 2В, 3Б
В. 1В, 2Б, 3А

При препарировании зуба под металлокерамическую коронку возможно создание уступа-скоса в пришеечной области под углом

- А. 135°
- Б. 50°
- В. 70°
- Г. 150°
- Д. 170°

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами определения высоты нижнего отдела лица и основных признаков.

Методы определения высоты нижнего отдела лица:

1. Антропометрический;
2. Анатомо-физиологический;
3. Функциональный. Признаки:

А. Проводится оценка внешнего вида пациента и высоты нижнего отдела лица при относительном физиологическом покое мышц;

Б. Основывается на принципе пропорциональности (метод Канторовича и метод Водсворта – Уайта);

В. Основывается на анализе силы мышечного сокращения с помощью аппарата (АОЦО).

- А. 1А, 2Б, 3В
- Б. 1В, 2А, 3Б
- В. 1Б, 2А, 3В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность действий на этапе определения центрального соотношения челюстей при изготовлении пластиночных протезов при дефектах зубных рядов. Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;

5. Компонент действия:

А. Приклеивание разогретой пластинки воска и фиксация центрального соотношения челюстей;

Б. Припасовка восковых базисов с окклюзионными валиками с учетом высоты физиологического покоя ;

В. Оценка качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками ;

Г. Проверка правильности определения центрального соотношения челюстей и нанесение клинических ориентиров;

Д. Определение высоты нижнего отдела лица в состоянии относительного физиологического покоя.

А. 1В, 2Д, 3Б, 4А, 5Г

Б. А)1А, 2Б, 3Д, 4В, 5Г

В. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В

Бюгельный протез состоит из

А. Дуги

Б. Искусственных зубов и дуги

В. Дуги, кламмеров и каркаса

Г. Дуги, кламмеров и седловидных частей с искусственными зубами

Д. Кламмеров и седловидных частей

Противопоказанием к изготовлению культевой штифтовой вкладки является

А. Атрофия костной ткани стенок альвеол 1 степени

Б. Разрушение коронковой части зуба с сохранением 3 мм над уровнем десны

В. Наличие твёрдых тканей зуба на уровне десневого края

Г. Разрушение твёрдых тканей зуба ниже уровня десневого края более 3,0 мм

Д. Разрушение твёрдых тканей зуба ниже уровня десневого края на 0,5 мм

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между углом, образованным межальвеолярными линиями и протетической плоскостью, и показаниями к постановке искусственных зубов по разному типу. Угол, образованный межальвеолярными линиями и протетической плоскостью, градусах :

1. Менее 80 ;

2. 80 – 90 ;

3. более

90 . Показания к постановке искусственных зубов по типу:

А. Ортогнатическому;

Б. Прогеническому;

В. Прогнатическому;

Г. Бипрогнатическому.

А. 1Б,2А,3В

Б. 1В, 2Б

В. 1А, 2Б, 3В

Требования к корням зубов, используемым для штифтовых конструкций

А. Подвижность 2-3 степени

Б. Толщина стенок корня не менее одного миллиметра

В. Канал распломбирован на 1/3

Г. Расширение периодонтальной щели

Д. Канал не запломбирован до верхушки на 1/3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления металлокерамической коронки . Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;

5. Клинические этапы изготовления:

А. Припасовка коронки;

Б. Фиксация коронки ;

В. Припасовка каркаса, выбор цвета облицовки;

Г. Определение центральной окклюзии ;

Д. Препарирование зуба и получение оттисков .

А. 1Д, 2Г, 3В, 4А, 5Б

Б. 1А, 2Б, 3Г, 4Д, 5В

В. 1Б, 2А, 3Г, 4Д, 5В

Неудовлетворительная фиксация полного съёмного протеза на верхней челюсти может быть связана с

- А. Большим количеством остаточного мономера в базисе
- Б. Изготовлением базиса из бесцветной пластмассы
- В. Использованием фарфоровых зубов
- Г. Удлиненными границами протеза
- Д. Гранулярной пористостью (мраморностью) базиса

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видами оттискового материала и его названием. Оттисковый материал:

1. А-силиконовый материал;
2. С-силиконовый материал;
3. Полиэфирный материал. Название:

- А. Импрегум;
- Б. Экзофлекс;
- В. Спидекс.

А. 1А, 2Б, 3В

Б. 1Б, 2В, 3А

В. 1В, 2А, 3Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между типами слизистой оболочки по классификации Суппли и их характеристикой.

Типы слизистой оболочки по Суппли:

1. Первый;
2. Второй. Характеристика:
 - А. Избыточно податлива, разрыхлена, сильно увлажнена;
 - Б. Бледно розового цвета, умеренно увлажнена и податлива, с нормальным порогом болевой чувствительности;
 - В. Тонкая, сухая, малоподатлива, повышенная болевая чувствительность;
 - Г. Складчатая, с «болтающимся» альвеолярным гребнем.

А. 1А, 2 В

Б. 1Б, 2В

В. 1Б, 2А

Место коррекции индивидуальной ложки на нижней челюсти при проведении функциональной пробы «глотание»

- А. Вестибулярный край между клыками
- Б. Вестибулярный край в области моляров и передней группы зубов
- В. Язычный край в области моляров
- Г. От позадиомолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии
- Д. Язычный край в области премоляров

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между понятиями «центральное соотношение челюстей», «центральная окклюзия» и вариантами соотношения зубов – антагонистов. В клинике определяется:

- 1. Центральное соотношение челюстей;
 - 2. Центральная окклюзия. Соотношение зубов – антагонистов:
- А. При наличии антагонистов в трех функционально ориентированных группах зубов;
 - Б. При наличии 1 или 2 пар зубов-антагонистов;
 - В. При отсутствии зубов-антагонистов.
- А. 1В, 2Б
 - Б. 1Б, 2В
 - В. 1В, 2А

После проведения этапа определения центрального соотношения челюстей восковые базисы с окклюзионными валиками

- А. Используют для постановки искусственных зубов
- Б. Сохраняют до этапа проверки конструкции протезов
- В. Сохраняют до полного изготовления протезов и их наложения
- Г. Переплавляют для повторного использования воска
- Д. Выдают пациенту на руки

При припасовке литых мостовидных протезов, точность прилегания коронок к культиям опорных зубов оценивается с помощью

- А. Эластического слепочного материала
- Б. Базисного воска
- В. Гипса
- Г. Копировальной бумаги
- Д. Моделировочного воска

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между движениями нижней челюсти и мышцами. Функция:

1. Выдвижение нижней челюсти вперед;
2. Смещение нижней челюсти в сторону. Мышцы:
 - А. Одностороннее сокращение латеральных крыловидных;
 - Б. Челюстно – подъязычные;
 - В. Двухстороннее сокращение латеральных крыловидных;
 - Г. Височные;
 - Д. Собственно жевательные;
 - Е. Медиальные крыловидные;
 - Ж. Подбородочно – подъязычные;
3. Двубрюшная.
 - А. 1В, 2А
 - Б. 1Б, 2А
 - В. 1А, 2Б

Для спайки коронок из нержавеющей стали применяют припой на основе

- А. Золота
- Б. Серебра
- В. Платины
- Г. Титана
- Д. Кадмия

Параллелометрия проводится

- А. До моделировки каркаса бюгельного протеза
- Б. Перед нанесением рисунка каркаса бюгельного протеза
- В. При припасовке каркаса бюгельного протеза на модели в
- Г. Лаборатории
- Д. При проверке каркаса бюгельного протеза в клинике
- Е. При дублировании модели

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность проведения этапа определения центрального соотношения челюстей при изготовлении полных съемных протезов. Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;

5.;

6.; 7. Компонент действия:

А. Определение высоты нижнего отдела лица в состоянии относительного физиологического покоя;

Б. Нанесение клиновидных углублений на верхнем восковом окклюзионном валике, приклеивание разогретой пластинки воска на нижний окклюзионный валик, фиксация центрального соотношения челюстей;

В. Создание протетической плоскости на верхнем восковом окклюзионном валике;

Г. Нанесение клинических ориентиров для подбора и постановки зубов;

Д. Припасовка восковых базисов с окклюзионными валиками с учетом высоты нижнего отдела лица в физиологическом покое ;

Е. Оценка качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками;

Ж. Формирование вестибулярного овала на верхнем восковом окклюзионном валике и определение его высоты.

А. 1Е, 2Ж, 3В, 4А, 5Д, 6Б, 7Г

Б. 1Ж, 2Е, 3А, 4В, 5Б, 6Г, 7Д

В. 1А, 2Е, 3Ж, 4Б, 5В, 6Г, 7Д

Относительным противопоказанием к применению металлокерамических коронок является

А. Ортогнатический прикус

Б. Бипрогнатический прикус

В. Прогенический прикус

Г. Парафункция жевательных мышц (бруксизм)

Д. Прямой прикус

Для полимеризации пластмассы кювету помещают в

А. Воду холодную

Б. Воду кипящую

В. Вакуумную печь

Г. Воду нагретую до 80°

Д. Муфельную печь

Съемные протезы с металлическими базами применяются

- А. При прямом прикусе
- Б. При непереносимости пластмассовых протезов
- В. При пониженной секреции слюны
- Г. При резкой атрофии альвеолярного отростка
- Д. При повышенной секреции слюны

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между ориентирами для постановки искусственных зубов и их расположением на восковом окклюзионном валике. Ориентиры для постановки искусственных зубов:

1. Срединная линия лица;
 2. Линия клыков;
 3. Линия улыбки. Параметры расположения искусственных зубов:
- А. Определяет ширину фронтальной группы зубов;
 - Б. Определяет расположение шеек искусственных зубов;
 - В. Определяет расположение центральных резцов;
 - Г. Определяет видимую часть центральных резцов, из-под красной каймы верхней губы в покое.
- А. 1В, 2А, 3Б
 - Б. 1А, 2Б, 3В
 - В. 1В, 2Б, 3А

При постановке зубов в артикуляторе выверяются окклюзии

- А. Боковые левые, боковые правые
- Б. Боковые правые и левые, передние
- В. Передние, центральная
- Г. Центральная
- Д. Центральная, передние, боковые

К физиологическим видам прикуса относятся

- А. Глубокий
- Б. Прогнатический
- В. Бипрогнатический
- Г. Перекрестный
- Д. Открытый

Гранулярная пористость в пластмассе образуется вследствие

- А. Быстрого нагрева кюветы
- Б. Недостаточного сжатия пластмассы
- В. Быстрого охлаждения кюветы
- Г. Нарушения температуры нагрева кюветы
- Д. Нарушения технологии приготовления пластмассы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классом дефектов зубных рядов по

Е.И. Гаврилову и характеристикой дефекта зубного ряда. Класс по Гаврилову:

- 1. I;
 - 2. II;
 - 3. III;
 - 4. IV. Дефект зубного ряда:
 - А. Концевые дефекты (односторонние, двусторонние);
 - Б. Комбинированные дефекты;
 - В. Включенные дефекты (боковые – односторонние, двусторонние, передние);
 - Г. Челюсти с одиночно сохранившимися зубами.
- А. 1Б, 2В
 - Б. 1А, 2В
 - В. 1Б, 2А

Все боковые стенки опорных зубов при изготовлении паяного мостовидного протеза препарируются

- А. С наклоном в сторону дефекта зубного ряда
- Б. Параллельно между собой
- В. С наклоном в сторону от дефекта зубного ряда
- Г. Параллельно с рядом стоящим зубом
- Д. Только параллельно продольной оси зуба

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видом постановки искусственных зубов в съёмном протезе при дефекте зубного ряда и условиями в полости рта. Вид постановки искусственных зубов:

1. На приточке;

2. На искусственной десне. Условия в полости рта:

А. При невыраженном альвеолярном отростке верхней челюсти в переднем участке зубного ряда;

Б. «Короткая» верхняя губа;

В. При выраженном альвеолярном отростке верхней челюсти в переднем участке зубного ряда;

Г. При концевом одностороннем дефекте зубного ряда

А. 1БВ, 2А, Г

Б. 1А, 2БГ, 3В

В. 1АБ, 2Г, 3В

Починку базиса съёмного пластиночного протеза невозможно провести при

А. Множественном мелкооскольчатом переломе

Б. Отломе сразу нескольких искусственных зубов

В. Отломе края протеза

Г. Сложном рельефе по линии перелома

Д. Одновременном отломе плеча кламмера и края протеза

Промежуточная часть мостовидного протеза в области боковых зубов по отношению к десне

А. Не касается

Б. Прилегает к ней по всей поверхности

В. Прилегает только на скатах альвеолярного гребня

Г. Касается по вершине альвеолярного гребня в двух точках

Д. Касается по вершине альвеолярного гребня в одной точке

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на нижней челюсти в области зубов проходит

А. Не касается зубов

Б. Перекрывая коронки зубов на 2/3

В. В пришеечной области зубов

Г. Перекрывая коронки зубов на 1/3

Д. Посередине коронки зубов

При препарировании зуба под цельнолитую коронку боковые стенки должны

- А. Быть строго параллельно
- Б. Слегка дивергировать
- В. Конвергировать под углом $6 - 8^\circ$
- Г. Конвергировать под углом $10 - 15^\circ$
- Д. Конвергировать под углом $15 - 20^\circ$

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между локализацией заболевания пародонта и методом стабилизации при ортопедическом лечении . Локализованный пародонтит:

- 1. С распространением на всю переднюю группу зубов;
- 2. С односторонним распространением на боковую группу зубов;
- 3. С двусторонним распространением на боковые группы зубов. Метод стабилизации:

- А. Фронтальная стабилизация;
- Б. Сагиттальная стабилизация;
- В. Парасагиттальная стабилизация-;
- Г. Фронтно-сагиттальная стабилизация;
- Д. Стабилизация по дуге;
- Е. Стабилизация по дуге в сочетании с парасагиттальной стабилизацией.

- А. 1А, 2Б, 3В
- Б. 1Б, 2В, 3А
- В. 1Б, 2А, 3В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классификациями беззубых челюстей различных авторов и количеством типов челюстей. Классификация беззубых челюстей:

- 1. Шредер;
- 2. Дойников;
- 3. Келлер;
- 4. Курляндский. Типы:
- А. 5 типов атрофии на верхней челюсти и 5 типов атрофии на нижней челюсти.;
- Б. 3 типа атрофии на верхней челюсти.;
- В. 5 типов атрофии на нижней челюсти.;
- Г. 4 типа атрофии на верхней челюсти.;
- Д. 4 типа атрофии на нижней челюсти.

- А. 1В, 2А, 3Д, 4Б
- Б. 1Б, 2А, 3Д, 4В
- В. 1Б, 2В, 3Д, 4А, 5Г

Гнутые удерживающие кламмера изготавливают из сплава

- А. Кобальтохромового
- Б. Хромоникелевого без содержания железа
- В. Нержавеющей стали
- Г. Серебряно-палладиевого
- Д. Золотого 900°

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между типами беззубой нижней челюсти по классификации

В.Ю. Курдьяндского и характерными признаками. Классификация

В.Ю. Курдьяндского для беззубой нижней челюсти:

- 1. Первый тип ;2. Второй тип ;
- 3. Третий тип;4. Четвертый тип;
- 5. Пятый тип; Признаки:

А. Альвеолярная часть атрофирована в боковых отделах ;Б. Альвеолярная часть атрофирована до уровня мест прикрепления мышц ;

В. Альвеолярная часть атрофирована в переднем отделе ;

Г. Альвеолярная часть выступает над уровнем мест прикрепления мышц ;

Д. Альвеолярная часть атрофирована ниже уровня мест прикрепления мышц

А. 1Б, 2А, 3Д, 4Б, 5В

Б. 1Г , 2Б, 3Д, 4А, 5В

В. 1А, 2Б, 3Д, 4В, 5Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раз или не выбран вовсе. Установите соответствие между терминами, применяемыми при проведении избирательного пришлифовывания зубов, и их значением. Термин:

1. Центральная окклюзия
 2. Эксцентрическая окклюзия;
 3. Привычный прикус (привычная или вторичная окклюзия);
 4. Центрический суперконтакт;
 5. Функциональная окклюзия (артикуляция). Значение:
 - А. Оклюзионные контакты зубов при переходе из центральной в переднюю и боковые окклюзии;
 - Б. Множественные фиссурно-бугорковые контакты зубных рядов при центральном положении головок височно-нижнечелюстного сустава в суставных ямках;
 - В. Динамические контакты зубных рядов в центральной, боковой и передней окклюзиях;
 - Г. Суперконтакт в центральной окклюзии;
 - Д. Всякое максимальное множественное смыкание зубных рядов, возможное без центрального положения суставных головок в ямках.
- А. 1В, 2А, 3Д, 5Б
Б. 1Б, 2А, 3Д, 5В
В. 1Б, 2А, 3Д, 5Г

Газовая пористость базиса протеза возникает из-за следующих причин

- А. Недостаточное сжатие пластмассы
- Б. Быстрое охлаждение кюветы
- В. Быстрый нагрев кюветы
- Г. Нарушение пропорций полимера и мономера
- Д. Испарение мономера с не закрытой созревающей пластмассы

Изготовление полного съёмного протеза с удлинёнными границами на нижней челюсти может привести к

- А. Прикусыванию щёк
- Б. Прикусыванию губ
- В. Сбрасыванию протеза во время функции
- Г. Повышенному рвотному рефлексу
- Д. Нарушению эстетики

Техник моделирует будущую штампованную искусственную коронку по объёму в отношении к восстанавливаемому зубу

- А. Больше по объёму восстанавливаемого зуба на толщину сплава металла
- Б. Равный по объёму восстанавливаемого зуба
- В. Больше по объёму восстанавливаемого зуба на 1 – 1,5 мм
- Г. Меньше по объёму восстанавливаемого зуба на толщину сплава металла
- Д. Меньше по объёму восстанавливаемого зуба на 1 – 1,5 мм

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между разными классификациями кламмеров и видами кламмеров. Классификация кламмеров:

1. По методу изготовления;
 2. По форме профильного сечения;
 3. По конфигурации ;
 4. По функции. Виды кламмеров:
 - А. Дентальные, денто-альвеолярные, альвеолярные;
 - Б. Металлические, пластмассовые;
 - В. Жесткие, полуподвижные, шарнирные;
 - Г. Гнутые, литые, полимеризованные;
 - Д. Круглые, полукруглые, ленточные;
 - Е. Одноплечие, двухплечие, перекидные, двойные, многосвязные;
 - Ж. Удерживающие, опорно-удерживающие.
- А. 1А, 2Б, 3Г, 4Е
Б. 1Г, 2Д, 3Е, 4Ж
В. 1А, 2Б, 3Ж, 4В

Плечо удерживающего кламмера съёмного протеза касается зуба и располагается

- А. На жевательной поверхности зуба
- Б. Между жевательной поверхностью зуба и экватором
- В. На экваторе
- Г. У режущего края резцов
- Д. Между экватором и пришеечной областью

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью атрофии костной ткани альвеолы и высотой анатомической коронки зуба. Степень атрофии костной ткани альвеолы :

1. 3/4;
 2. Более 3/4. Высота анатомической коронки зуба:
 - А. Две высоты анатомической коронки зуба;
 - Б. Одна высота анатомической коронки зуба;
 - В. Полторы высоты анатомической коронки зуба;
 - Г. Половина высоты анатомической коронки зуба.
- А. 1В, 2А
Б. 1В, 2Б
В. 1Б, 2А

Разборная гипсовая модель отливается при изготовлении

- А. Штампованной коронки
- Б. Цельнолитой коронки
- В. Бюгельного протеза
- Г. Съёмного мостовидного протеза
- Д. Пластиночного протеза

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью подвижности зуба по классификации

Д.А. Энтина и направлением визуально определяемого смещения зуба. Степень подвижности зуба по Энтину:

- 1. Первая;
 - 2. Вторая. Направление визуально определяемого смещения зуба:
 - А. Вертикальное;
 - Б. Вестибуло-оральное и медио-дистальное;
 - В. Круговое;
 - Г. Вестибуло-оральное.
- А. 1Г, 2А
 - Б. 1Г, 2Б
 - В. 1В, 2А

Для изготовления штампованных коронок применяют штампы, отлитые из

- А. Хромокобальтового сплава
- Б. Легкоплавкого сплава
- В. Серебряно-палладиевого сплава
- Г. Свинца
- Д. Олова

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классификацией вторичных деформаций по

В.А. Пономаревой и их признаками. Классификация вторичных деформаций по

В.А. Пономаревой:

1. Первая форма;

2. Вторая форма; 1-ая подгруппа;

3. Вторая форма; 2-ая подгруппа. Признаки:

А. Одновременно со смещением зуба есть видимое увеличение альвеолярного отростка, но не отмечается обнажения корня и образования десневого кармана;

Б. Смещение зуба сопровождается явлением атрофии тканей пародонта и обнажением цемента корня с резорбцией тканей пародонта на уровне $\frac{1}{2}$ и более высоты корня;

В. Сопровождается патологической стираемостью зубов на фоне частичного отсутствия зубов со снижением высоты нижнего отдела лица;

Г. Смещение зуба сопровождается увеличением альвеолярной кости и обнажением цемента корня в пределах $\frac{1}{4}$ высоты корня.

А. 1А, 2В, 3Б

Б. 1В, 2Г, 3Б

В. 1А, 2Г, 3Б

Моделирование цельнолитой коронки производят на

А. Гипсовом штампе

Б. Гипсовой модели

В. Разборной модели

Г. Огнеупорной модели

Д. Штампике из легкоплавкого металла

При изготовлении штифтовой конструкции оптимальная длина штифта относительно длины корня составляет

А. $\frac{1}{3}$

Б. $\frac{2}{3}$

В. $\frac{1}{2}$

Г. Всю длину корня

Д. Длина штифта не имеет значения

Перед фиксацией центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов создают углубления на окклюзионных валиках

А. Нижнем на окклюзионной поверхности

Б. Верхнем на окклюзионной поверхности

В. Нижнем и верхнем на окклюзионных поверхностях

Г. Расположение углублений не имеет значения

Д. Нижнем и верхнем на вестибулярных поверхностях

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления бюгельных протезов . Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;

5. Клинические этапы изготовления:

А. Проверка конструкции протеза;

Б. Припасовка и наложение протеза;

В. Получение оттисков;

Г. Определение центральной окклюзии;

Д. Припасовка каркаса бюгельного протеза.

А. 1А, 2Г, 3Б, 4В, 5Д

Б. 1В, 2Г, 3Д, 4А, 5Б

В. 1А, 2Б, 3Г, 4Д, 5В

Окклюзия – это

А. Всевозможные смыкания зубных рядов верхней и нижней челюстей

Б. Положение нижней челюсти относительно верхней в состоянии относительного физиологического покоя

В. Всевозможные положения нижней челюсти относительно верхней

Г. Соотношение беззубых челюстей

Д. Вид прикуса

При изготовлении металлокерамической коронки чрезмерное укорочение культи зуба может привести к

А. Нарушению эстетики

Б. Функциональным нарушениям

В. Сколу керамики

Г. Расцементирования коронки

Д. Травме десны

При припасовке съемного протеза копировальная (артикуляционная) бумага используется для

А. Выявления участков базиса, мешающих наложению протеза в области естественных зубов

Б. Выявления степени изоляции торуса

В. Коррекции участков базиса, травмирующих слизистую оболочку

Г. Выявления степени изоляции экзостозов

Д. Уточнения границ базиса протеза

Для проведения этапа "определение центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов" в клинику поступают

- А. Гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками
- Б. Восковые базисы с окклюзионными валиками
- В. Гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками, зафиксированные в окклюдатор
- Г. Гипсовые модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками, зафиксированные в артикулятор
- Д. Гипсовые модели с восковыми базисами и искусственными зубами

Возможные осложнения при пользовании металлокерамическими мостовидными протезами

- А. Изменение цвета облицовки
- Б. Быстрое истирание облицовки
- В. Повышенное истирание естественных зубов-антагонистов
- Г. Повышение жевательной эффективности
- Д. Улучшение качества жизни

Тело удерживающего кламмера съёмного протеза отстоит от боковой поверхности опорного зуба и располагается

- А. В пришеечной области
- Б. Между жевательной поверхностью зуба и экватором
- В. Между экватором и пришеечной областью
- Г. На экваторе
- Д. Слегка касается маргинальной десны

Создание чрезмерной конусности стенок при препарировании под металлокерамическую коронку приводит к

- А. Неэстетичности коронки
- Б. Снижению прочности коронки
- В. К травме десны
- Г. К ослаблению фиксации коронки
- Д. Делает коронку более долговечной

После лабораторного этапа «постановка искусственных зубов» следующий клинический этап

- А. Определение центральной окклюзии
- Б. Коррекция протеза
- В. Проверка конструкции протеза
- Г. Замена воска на пластмассу
- Д. Отделка протеза

Определение центрального соотношения челюстей для изготовления пластиночных протезов при дефектах зубных рядов начинают с

- А. Припасовки восковых базисов с окклюзионными валиками с учетом высоты физиологического покоя
- Б. Проверки правильности определения центрального соотношения челюстей
- В. Нанесения клинических ориентиров для постановки искусственных зубов
- Г. Оценки качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками
- Д. Приклеивания разогретой пластинки воска и фиксация центрального соотношения челюстей

Вторая степень патологической подвижности зуба по Энтину характеризуется визуально определяемым смещением зуба в направлении

- А. Круговом
- Б. Вертикальном
- В. Вестибуло-оральном
- Г. Вестибуло-оральном и мезио-дистальном
- Д. Мезио-дистальном

При прямом методе изготовления культевой вкладки восковая или пластмассовая модель будущей вкладки изготавливается на

- А. Модели из обычного медицинского гипса
- Б. Модели из огнеупорной массы
- В. Модели из легкоплавкого металла
- Г. Непосредственно в полости рта
- Д. Модели из супергипса

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между кламмерами системы Нея и показаниями к их применению. Кламмера системы Нея:

1. I типа - Аккера;
2. II типа - Роуча;
3. III типа - Аккера-Роуча;
4. IV типа – заднего или обратного действия;
5. V типа – круговой одноплечий. Показания к применению: А. Используется на одиночностоящих молярах;
Б. Располагается на премолярах и клыках при дефектах I и II класса по Кеннеди;
В. Представляет собой комбинацию первых двух типов и показан, когда на одной поверхности зуба, например, вестибулярной, целесообразно применить кламмер одного типа, а на оральной – другого;
Г. Применяется на молярах и премолярах при дефектах 3 класса по Кеннеди, клинический экватор хорошо выражен и расположен по середине оральной и вестибулярной поверхностей коронковой части зуба;
Д. Применяют на зубах с резко выраженным экватором независимо от уровня его расположения, а также при наклоне зуба, когда кламмер классического типа нельзя применить.

А. 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д

Б. 1Б, 2А, 3В, 4Д, 5Г

В. 1Г, 2Д, 3В, 4Б, 5А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видом гипса и его формулой. Гипс:

1. Природный;
2. Медицинский. Формула:
А. Полуводный ; Б . Двуводный

А. 1А, 2Б

Б. 1Б, 2А

В. 1Б, 2Б

Трансверзальное расположение кламмерной линии благоприятно для фиксации съёмного протеза

А. На верхней челюсти

Б. На нижней челюсти

В. На верхней и нижней челюстях

Г. При «болтающемся гребне» на верхней челюсти

Д. При высокой степени атрофии альвеолярного отростка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видом композиции и областью ее применения. Восковая композиция:

1. Липкий воск;
 2. Моделировочный воск «Лавакс»;
 3. «Ортокор»;
 4. Базисный воск. Область применения:
 - А. Моделирование вкладок;
 - Б. Склеивание частей протезов;
 - В. Оформление края индивидуальной ложки;
 - Г. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками, моделирование базисов съемных пластиночных протезов.
- А. 1Г, 2А, 3В, 4Б
Б. 1Б, 2В, 3А, 4Г
В. 1Б, 2А, 3В, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью атрофии костной ткани альвеолы и уменьшением выносливости пародонта в одонтопародонтограмме

В.Ю. Курляндского. Степень атрофии костной ткани альвеолы:

1. 1/4;
2. 1/2;
3. 3/4;
2. Более 3/4. Уменьшение выносливости пародонта по

В.Ю. Курляндскому:

- А. 75%;
 - Б. 50%;
 - В. 25%;
 - Г. Более 75%
- А. 1А, 2В, 3Г, 4Б
Б. 1Б, 2В, 3А, 4Г
В. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Оптимальное расположение кламмерной линии на нижней челюсти

- А. Диагональное
- Б. Сагиттальное
- В. Поперечное
- Г. Вестибуло-оральное
- Д. Точечное

Сагиттальное расположение кламмерной линии неблагоприятно для фиксации съёмного протеза

- А. Только на верхней челюсти
- Б. Только на нижней челюсти
- В. На верхней и нижней челюстях
- Г. При «болтающемся гребне» на верхней челюсти
- Д. При «болтающемся гребне» на нижней челюсти

Повторная фиксация центрального соотношения челюстей методом наложения восковой пластинки на искусственные зубы нижней челюсти возможно при

- А. Завышении высоты нижнего отдела лица
- Б. Снижении высоты нижнего отдела лица
- В. При смещении нижней челюсти влево
- Г. При смещении нижней челюсти вправо
- Д. При смещении нижней челюсти вперед

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления полных съёмных протезов. Порядок:

- 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 - 4.;
 - 5.;
 - 6. Клинические этапы изготовления:
 - А. Припасовка индивидуальных ложек и получение функциональных оттисков ;
 - Б. Проверка конструкции протезов ;
 - В. Коррекция;
 - Г. Определение центрального соотношения челюстей;
 - Д. Получение анатомических оттисков;
 - Е. Припасовка и наложение протезов .
- А. 1А, 2Б, 3В, 4Е, 5Г, 6Д
Б. 1Д, 2А, 3Г, 4Б, 5Е, 6В
В. 1 Б, 2Г, 3В, 4А, 5Д, 6Е

"Мраморность" базиса пластиночного протеза возникает при

- А. Несоблюдении температурного режима полимеризации
- Б. Нарушении прессования
- В. Резком охлаждении кюветы после окончания полимеризации
- Г. Неплотном соединении частей кюветы
- Д. Отсутствии изолирующего слоя на гипсовой модели перед паковкой пластмассы

Оптимальное расположение кламмерной линии на верхней челюсти

- А. Сагиттальное
- Б. Поперечное
- В. Вестибуло – оральное
- Г. Диагональное
- Д. Точечное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видом постановки искусственных зубов и характером дефекта зубного ряда. Вид постановки искусственных зубов:

1. На приточке;
 2. На искусственной десне. Дефект зубного ряда характеризуется отсутствием зубов:
- А. Передних на нижней челюсти;
 - Б. Боковых ;
 - В. Передних на верхней челюсти при значительной атрофии альвеолярного отростка;
 - Г. Передних на верхней челюсти при резко выраженном альвеолярном отростке; Д. Одного переднего на верхней челюсти.
- А. 1ГД, 2АБВ
 - Б. 1АБ, 2ДГВ
 - В. 1АБ, 2ВГ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между терминами артикуляция, прикус и их значениями. Термин:

1. Артикуляция;
 2. Прикус. Значение:
- А. Вид смыкания зубов в центральной окклюзии;
 - Б. Всевозможные движения нижней челюсти ;
 - В. Вид смыкания зубов в передней окклюзии;
 - Г. Вид смыкания зубов в боковой окклюзии.
- А. 1А, 2А
 - Б. 1А, 2Б
 - В. 1Б, 2А

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области передних зубов проходит

- А. Не касается зубов
- Б. В пришеечной области зубов
- В. Посередине коронки зубов
- Г. Перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. Перекрывая коронки зубов на 2/3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между местом коррекции индивидуальной ложки на нижней челюсти при полном отсутствии зубов и проведением функциональной пробы. Проведение функциональной пробы: 1. «Глотание»; 2. «Широкое открывание рта»; 3. «Вытягивание вперед губ, сложенных трубочкой»;

4. «Высовывание языка по направлению к кончику носа»;

5. «Дотрагивание кончиком языка до щеки». Место коррекции индивидуальной ложки:

А. Вестибулярный край в области моляров и передних зубов ;

Б. Вестибулярный край между клыками; В. От позадиомолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии;

Г. 1 см от средней линии на подъязычном крае ложки со стороны противоположной смещению языка;

Д. У уздечки языка.

А. 1А, 2В, 3Д, 4Г, 5Б

Б. 1Б, 2Д, 3Г, 4Б, 5А

В. 1В, 2А, 3Б, 4Д, 5Г

При препарировании зуба для изготовления штампованной коронки с боковых поверхностей осуществляют сошлифовку

- А. Соответственно периметру шейки зуба
- Б. На толщину материала коронки
- В. Только экватор
- Г. Только с вестибулярной поверхности
- Д. Только с язычной поверхности

Штампованная коронка при припасовке в полости рта должна накладываться на культю зуба

- А. С небольшим возрастающим усилием
- Б. Без усилия
- В. Свободно
- Г. Со «щелчком»
- Д. С большим усилием

Дистальный край съёмного протеза при полном отсутствии зубов на верхней челюсти при прямом соотношении челюстей должен

- А. Перекрывать границу твердого и мягкого неба на 1 – 2 мм
- Б. Проходить строго по границе твердого и мягкого неба
- В. Перекрывать границу твердого и мягкого неба на 3 – 5 мм
- Г. Не доходить до границы твердого неба на 5 – 7 мм
- Д. Перекрывать границу твердого и мягкого неба на 5 – 7 мм

Место коррекции индивидуальной ложки на нижней челюсти при проведении функциональной пробы «широкое открывание рта»

- А. Вестибулярный край в области моляров и передних зубов
- Б. Вестибулярный край в области бугра верхней челюсти
- В. Язычный край в области моляров
- Г. Язычный край в области премоляров
- Д. От позадимолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии

При изготовлении цельнолитых коронок применяется сплав золота пробы

- А. 750
- Б. 375
- В. 583
- Г. 900
- Д. 915

К возможным недостаткам мостовидного протеза из нержавеющей стали относятся

- А. Низкая жевательная эффективность
- Б. Привкус металла в полости рта
- В. Быстрое стирание зубов-антагонистов
- Г. Появление подвижности зубов-антагонистов
- Д. Неприятный запах изо рта

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность лабораторных этапов изготовления полных съемных протезов. Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;

5.;

6. Лабораторные этапы изготовления полных съемных протезов:

А. Обработка, шлифовка, полировка;

Б. Постановка искусственных зубов;

В. Гипсовка моделей в артикулятор ;

Г. Гипсовка в кювету, паковка пластмассы и её полимеризация ;

Д. Получение гипсовых моделей и изготовление индивидуальных ложек;

Е. Получение гипсовых моделей и изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.

А. 1Б, 2А, 3В, 4Г, 5Д, 6Е

Б. 1Б, 2В, 3Г, 4А, 5Д, 6Е

В. 1Д, 2Е, 3В, 4Б, 5Г, 6А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между понятиями «центральное соотношение челюстей», «центральная окклюзия» и вариантами соотношения зубов – антагонистов. В клинике определяется:

1. Центральное соотношение челюстей;

2. Центральная окклюзия. Соотношение зубов – антагонистов:

А. При наличии антагонистов в трех функционально ориентированных группах зубов:

Б. При наличии 1 или 2 пар зубов-антагонистов;

В. При отсутствии зубов-антагонистов

А. 1А, 2В

Б. 1В, 2Б

В. 1А, 2Б

При проведении функциональных проб по Гербсту при изготовлении полных съемных протезов амплитуда движений нижней челюсти зависит от

А. Типа соотношения челюстей

Б. Степени атрофии челюсти

В. Типа слизистой оболочки

Г. Размера нижней челюсти

Д. Высоты нижнего отдела лица

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между типами кламмеров системы фирмы Neu и их применением. Разновидность кламмера:

1. Кламмер I типа (Аккера);
 2. Кламмер II типа (Роуча);
 3. Кламмер III типа (комбинированный);
 4. Кламмер IV типа (обратного действия);
 5. Кламмер V типа (круговой с двумя окклюзионными накладками). Применение:
 - А. При дистальном наклоне клыков, премоляров или моляров, когда линия обзора высоко приподнимается к апроксимальной дистальной стенке, а опорная зона практически отсутствует;
 - Б. При срединном расположении линии обзора на крупных зубах;
 - В. При комбинированном наклоне одиночного моляра в сагиттальном и одновременно трансверзальном направлениях;
 - Г. При вестибулярном наклоне премоляров и передних зубов, ограничивающих дефект зубного ряда без дистальной опоры;
 - Д. При наклоне моляра или премоляра в вестибулярную или оральную сторону.
- А. 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д
Б. 1В, 2А, 3Д, 4Г, 5Б
В. 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В

Диагональное расположение кламмерной линии благоприятно для фиксации съёмного протеза

- А. На верхней челюсти
- Б. На нижней челюсти
- В. На верхней и нижней челюстях
- Г. При «болтающемся гребне» на нижней челюсти
- Д. При высокой степени атрофии альвеолярной части

Определение центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов начинают с

- А. Оформления вестибулярного овала на верхнем окклюзионном валике
- Б. Припасовки нижнего воскового базиса с окклюзионными валиками в соответствии с высотой нижнего отдела лица
- В. Нанесения клинических ориентиров для постановки зубов
- Г. Фиксации центрального соотношения челюстей
- Д. Формирования протетической плоскости на верхнем окклюзионном валике

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления пластмассовой коронки. Порядок:

1.;

2.;

3.;

4. Клинические этапы изготовления пластмассовой коронки:

А. Припасовка коронки;

Б. Препарирование зуба, получение оттисков;

В. Фиксация коронки;

Г. Определение центральной окклюзии .

А. 1В, 2Б, 3Г, 4А

Б. 1А, 2Б, 3В, 4Г

В. 1Б, 2Г, 3А, 4В

Дуга бюгельного протеза располагается относительно слизистой оболочки

А. Никогда не касаясь

Б. Всегда слегка касаясь

В. Всегда плотно прилегая

Г. Слегка касаясь при жевании

Д. Плотно прилегая при жевании

Первая степень патологической подвижности зуба по Энтину характеризуется визуально определяемым смещением зуба в направлении

А. Вертикальном

Б. Вестибуло-оральном

В. Вестибуло-оральном и мезио-дистальном

Г. Круговом

Д. Мезио-дистальном

Съемный пластиночный протез, при дефекте зубного ряда, нуждается в припасовке в полости рта вследствие

А. Наличия поднатурений в области естественных зубов

Б. Возможных ошибок при постановке искусственных зубов

В. Нарушений пропорций при подготовке пластмассы

Г. Нарушений режима полимеризации пластмассы

Д. Индивидуальных особенностей пациента

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между движениями нижней челюсти и осуществляющих их мышцами. Функция:

1. Поднимание нижней челюсти;

2. Опускание нижней челюсти. Мышцы:

А. Одностороннее сокращение латеральных крыловидных;

Б. Челюстно – подъязычные; В. Двухстороннее сокращение латеральных крыловидных;

Г. Височные;

Д. Собственно жевательные;

Е. Медиальные крыловидные;

Ж. Подбородочно – подъязычные;

3. Двубрюшная.

А. 1 АБЕ, 2 ДЖЗ

Б. 1 АДЕ, 2 БВЖ

В. 1 ГДЕ, 2 БЖЗ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между группой цемента для фиксации ортопедических конструкций и их названием.

Цементы для фиксации:

1. Цинк-фосфатные цементы;

2. Стеклоиономерные цементы. Название:

А. Кетакцемизимикикс (KetacCemEasymix);

Б. Унифас-2;

В. Фуджи (Fuji I);

Г. Адгезор (Adhesor).

А. 1 БГ, 2 АВ

Б. А) 1 АБ, 2 ВГ

В. 1 АВ, 2 БГ

Граница съемного протеза при полном отсутствии зубов на нижней челюсти по отношению к позадиомолярному (ретромолярному) бугорку

А. Перекрывает его полностью

Б. Не доходит до бугорка на 1 мм

В. Не доходит до бугорка на 5 мм

Г. Располагается посередине бугорка

Д. Перекрывает бугорок на 2/3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между съёмными пластиночными протезами, изготовленными на нижнюю или верхнюю челюсть, и наиболее рациональным расположением кламмерной линии для их фиксации. Съёмный пластиночный протез изготовлен на нижнюю или верхнюю челюсть:

1. Нижняя;
 2. Верхняя. Благоприятное расположение кламмерной линии:
 - А. Диагональное;
 - Б. Сагиттальное;
 - В. Поперечное.
- А. 1Б, 2В
Б. 1А, 2Б
В. 1В, 2А

Противопоказанием к изготовлению искусственной коронки является

- А. Подвижность зуба третьей степени
- Б. Патологическая стираемость твердых тканей
- В. Наличие гиперэстезии
- Г. Снижение высоты нижнего отдела лица
- Д. Необходимость укорочения зуба при феномене Попова-Годона

При изготовлении металлопластмассовой коронки соединение пластмассы с литым каркасом осуществляется за счет

- А. Химического соединения
- Б. Формирования ретенционных пунктов с помощью "перл" (шариков);
- В. Образования окисной пленки
- Г. Взаимной диффузии материалов
- Д. Вырезания

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность подготовки литого каркаса и нанесения керамической массы. Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;

5.;

6. Компонент действия:

А. Нанесение эмали;

Б. Создание окисной пленки;

В. Абразивная обработка каркаса;

Г. Обезжиривание каркаса;

Д. Нанесение дентина;

Е. Нанесение опака.

А. 1Б, 2А, 3Г, 4В, 5Е, 6Д

Б. 1Е, 2Д, 3А, 4Б, 5Г, 6В

В. 1В, 2Г, 3Б, 4Е, 5Д, 6А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между ориентирами для постановки искусственных зубов и их расположением на восковом окклюзионном валике. Ориентиры для постановки искусственных зубов:

1. Срединная линия лица;

2. Линия клыков;

3. Линия улыбки. Отметки на восковом окклюзионном валике:

А. Вертикальная линия, соответствующая крылу носа;

Б. Линия, соответствующая краю максимально приподнятой верхней губы;

В. Вертикальная линия, делящая лицо на две половины;

Г. Вертикальная линия, соответствующая кончику носа.

А. 1В, 2А, 3Б

Б. 1А, 2Б, 3В

В. 1Б, 2А, 3В

Первая коррекция съемного пластиночного протеза проводится

А. В день наложения протеза

Б. На следующий день после наложения протеза

В. Через неделю после наложения протеза

Г. Через месяц

Д. Только при появлении болей

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью атрофии костной ткани лунки зуба и состоянием опорно-удерживающего аппарата зубов по

В.Ю. Курляндскому . Степень атрофии костной ткани лунки зуба:

1. $\frac{1}{4}$;

2. $\frac{1}{2}$;

3. $\frac{3}{4}$. Состояние опорно-удерживающего аппарата зуба:

А. Компенсированное;

Б. Субкомпенсированное;

В. Декомпенсированное.

А. 1А, 2Б, 3В

Б. 1В, 2Б, 3А

В. 1Б, 2А, 3В

После припасовки коронок паяного мостовидного протеза в полости рта повторно определяется центральная окклюзия для

А. Точного моделирования промежуточной части мостовидного протеза (с учетом смыкания зубных рядов в центральной окклюзии)

Б. Оценки качества припасовки коронок

В. Повторной установки и заливки модели с коронками в окклюдатор

Г. Точной спайки опорных коронок с промежуточной частьюД. Повышения эстетики протеза

Д. Повышения эстетики протеза

Причиной утолщения базиса съемного протеза является

А. Неточность получения оттиска

Б. Неточное соединение частей кюветы при паковке пластмассы

В. Деформация протеза в момент извлечения его из кюветы после полимеризации

Г. Нарушение пропорций полимера и мономера при подготовке пластмассы

Д. Неправильный выбор вида гипсовки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между назначением и видом пластмассы. Назначение:

1. Материал для базиса съемного протеза;
2. Эластическая подкладка. Вид пластмассы:

А. «Госсил»;
Б. «Фторакс»;
В. «Этакрил»;
Г. «Синма-М».

А. 1БВ; 2А
Б. 1А, 2В
В. 1АБ, 2Г

Причинами расцементирования металлокерамической коронки являются:

- А. Чрезмерная конусность отпрепарированной культи зуба
Б. Отсутствие экватора коронки
В. Отсутствие контакта с соседними зубами
Г. Отсутствие контакта с зубами-антагонистами
Д. Удлиненный край коронки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между показаниями к проведению ортопедического лечения на имплантатах и клиническими условиями в полости рта. Показания к проведению ортопедического лечения на имплантатах:

1. Абсолютные ;
 2. Относительные. Клинические условия в полости рта:
- А. Полное отсутствие зубов на обеих челюстях независимо от степени атрофии альвеолярной кости;
Б. Полное отсутствие зубов (особенно на нижней челюсти) при высокой степени атрофии;
В. Отсутствие 1 – 2 зубов при интактных соседних зубах;
Г. Наличие большого по протяженности дефекта зубного ряда во фронтальном отделе (IV класс по Кеннеди);
Д. Наличие дистально неограниченных дефектов зубных рядов (I и II классов по Кеннеди).; Е. Одиночный сохранившийся зуб (по Е.И. Гаврилову).

А. 1АБ, 2ВГД
Б. 1БВ, 2АГД
В. 1АВ, 2БГД

Правильная последовательность подготовки каркаса металлокерамической коронки перед нанесением и обжигом керамической массы

- А. Обезжиривание каркаса, пескоструйная обработка, создание окисной пленки (обжиг)
- Б. Пескоструйная обработка, обезжиривание каркаса, создание окисной пленки (обжиг)
- В. Создание окисной пленки (обжиг), пескоструйная обработка, обезжиривание
- Г. Пескоструйная обработка, создание окисной пленки (обжиг), обезжиривание
- Д. Обезжиривание, создание окисной пленки (обжиг), пескоструйная обработка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие номером зоны в классификации степени податливости слизистой оболочки по Люнду и локализацией участка слизистой оболочки. Классификация степени податливости по Люнду:

- 1. 1 зона;
 - 2. 2 зона;
 - 3. 3 зона;
 - 4. 4 зона. Участок слизистой оболочки в области:
 - А. Альвеолярного отростка верхней челюсти;
 - Б. Срединного небного шва ;
 - В. В переднем отделе твердого неба;
 - Д. В дистальном участке твердого неба
- А. 1А, 2Б, 3Г, 4Е
 - Б. 1Б, 2А, 3В, 4Д
 - В. 1В, 2Б, 3Г, 4А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между зонами податливости слизистой оболочки по классификации Люнда и их топографией. Зоны податливости слизистой оболочки по Люнду:

- 1. Железистая;
 - 2. Жировая. Топография:
 - А. Альвеолярный отросток
 - Б. Область небных складок;
 - В. Срединная часть твердого неба;
 - Г. Дистальная треть твердого неба;
 - Д. Переходная складка.
- А. 1А, 2В
 - Б. 1Г, 2Б
 - В. 1 В, 2Б

Для ускорения адаптации к съемному протезу после его наложения рекомендуется

- А. Снимать протез несколько раз в течение дня
- Б. Первые 3 дня надевать протез только на ночь
- В. Пользоваться протезом только во время еды
- Г. Пользоваться протезом днем и снимать на ночь первую неделю
- Д. Пользоваться протезом днем и не снимать на ночь первую неделю

Место коррекции индивидуальной ложки на нижней челюсти при проведении функциональной пробы «вытягивание вперед губ, сложенных трубочкой»

- А. Язычный край в области премоляров
- Б. Вестибулярный край между клыками
- В. Вестибулярный край в области моляров
- Г. Язычный край в области моляров
- Д. От позадиомолярного бугорка до челюстно-подъязычной линии

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классом дефектов зубных рядов по Кеннеди и характеристикой дефекта зубного ряда. Классы по Кеннеди:

- 1. Первый;
 - 2. Второй;
 - 3. Третий;
 - 4. Четвертый. Дефекты зубных рядов:
 - А. Односторонний дистально не ограниченный (концевой);
 - Б. Двусторонний дистально не ограниченный (концевой); В. В области передних зубов (включенный);
 - Г. Односторонний дистально ограниченный (включенный) в области боковых зубов.
- А. 1А, 2Б, 3Г, 4В
 - Б. 1Б, 2А, 3Г, 4В
 - В. 1Б, 2В, 3Г, 4А

Создание чрезмерной конусности культи зуба при препарировании под металлокерамическую коронку обуславливает

- А. Травму пародонта
- Б. Затрудненное наложение протеза
- В. Ослабление фиксации протеза
- Г. Эстетический дефект в области шейки зуба
- Д. Снижение жевательной эффективности

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видом искусственной коронки и сплавом металла. Вид искусственной коронки:

1. Цельнолитая коронка; 2. Каркас металлокерамической коронки;

3. Штампованная коронка;

4. Каркас металлопластмассовой коронки. Сплав металла:

А. Хромоникелевый сплав; Б. Золотой сплав 900‰; В. Золотой сплав 750‰

А. 1 БГ, 2В, 3А, 4БВ

Б. 1АВ, 2А, 3Б, 4А

В. 1Б, 2ВГ, 3А, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления фарфоровой коронки. Порядок:

1.;

2.;

3.; 4. Клинические этапы изготовления фарфоровой коронки: А. Фиксация коронки ;

Б. Препарирование зуба, получение оттисков;

В. Припасовка коронки;

Г. Определение центральной окклюзии .

А. 1Б, 2Г, 3В, 4А

Б. 1А, 2В, 3Б, 4Г

В. 1А, 2В, 3Г, 4Б

Допускается постановка искусственных зубов в съёмном пластиночном протезе кпереди от центра альвеолярного гребня на 2/3 их длины в области

А. Передних зубов нижней челюсти

Б. Передних зубов верхней челюсти

В. Боковых зубов нижней челюсти

Г. Боковых зубов верхней челюсти

Д. Передних и боковых зубов нижней челюсти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между классом дефектов зубных рядов по Кеннеди и характеристикой дефекта зубного ряда. Класс по Кеннеди:

1. III;

2. IV. Дефект зубного ряда:

А. Двусторонний концевой дефект;

Б. Включенный дефект в боковом отделе;

В. Дефект в переднем (фронтальном) отделе;

Г. Односторонний концевой дефект.

А. 1А, 2Б

Б. 1В, 2Б

В. 1Б, 2В

Ориентиром для постановки центральных резцов на верхней челюсти служит расположение

А. Крыльев носа

Б. Уздечки верхней губы

В. Линии эстетического центра лица

Г. Филтрума верхней губы

Д. Носо-губных складок

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность действий на этапе определения центральной окклюзии с помощью восковых базисов с окклюзионными валиками при наличии антагонизирующих пар зубов. Порядок: 1.;

2.;

3.;

4.;

5.; 6. Компонент действия:

А. Оценка качества изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками ;

Б. Сопоставление гипсовых моделей в центральной окклюзии и проверка правильности ее определения;

В. Одновременная припасовка верхнего и нижнего восковых валиков до смыкания зубов-антагонистов ;

Г. Поочередная припасовка верхнего и нижнего валиков до смыкания зубов-антагонистов ;

Д. Нанесение ориентиров для постановки искусственных зубов ; Е. Приклеивание разогретой пластинки воска на восковые валики и фиксация центральной окклюзии.

А. 1Б, 2А, 3Г, 4В, 5Д, 6Е

Б. 1Е, 2А, 3Б, 4Г, 5В, 6Д

В. 1А, 2Г, 3В, 4Е, 5Д, 6Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления цельнолитого мостовидного протеза с пластмассовой облицовкой .

Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;

5. Клинические этапы изготовления цельнолитого мостовидного протеза с пластмассовой облицовкой :

А. Фиксация протеза на опорных зубах цементом;

Б. Определение центральной окклюзии ;

В. Препарирование зубов, получение оттисков;

Г. Припасовка мостовидного протеза;

Д. Припасовка цельнолитого каркаса, выбор цвета облицовки.

А. 1Г, 2А, 3Б, 4Д, 5Г

Б. 1В, 2Б, 3Д, 4Г, 5А

В. 1Б. 2А, 3Д, 4В, 5Г

Причинами расцементирования металлопластмассовой коронки являются

А. Отсутствие контакта с соседними зубами

Б. отсутствие контакта с зубами-антагонистами

В. Плохое обезжиривание и высушивание зуба

Г. удлинённый край коронки

Д. Отсутствие экватора коронки

Культевые штифтовые вкладки методом литья изготавливают из

А. Пластмассы

Б. Легкоплавкого металла

В. Сплавов металлов

Г. Композиционных материалов

Д. Воска

При препарировании зуба под металлокерамическую коронку с жевательной поверхности или режущего края сошлифовывают ткани зуба примерно на (в мм)

А. 0,1 – 0,3

Б. 0,3 – 0,6

В. 1,5 – 1,8

Г. 0,7 – 1,0

Д. 2,5 – 3,0

При изготовлении консольного несъёмного Протеза отрицательным является

- А. Наличие опрокидывающего момента в области опорных зубов
- Б. Необходимость депульпации опорных зубов
- В. Препарирование большого количества зубов
- Г. Неудовлетворительное эстетическое качество
- Д. Сошлифовывание большого количества тканей опорных зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видом шинирования и методом стабилизации при ортопедическом лечении заболеваний пародонта. Шинирование:

- 1. Передней группы зубов ;
- 2. Боковой группы зубов ;
- 3. Двух боковых групп зубов;
- 4. Всех групп зубов. Вид стабилизации:

- А. Сагиттальная;
- Б. Фронтальная;
- В. По дуге;
- Г. Парасагиттальной;
- Д. Фронтально-сагиттальной.

- А. 1Б, 2А, 3Е, 4Д
- Б. 1А, 2Б, 3Е, 4Д
- В. 1Б, 2А, 3Д, 4Е

Относительным противопоказанием к применению металлокерамических коронок является

- А. Невыраженная анатомическая форма естественных зубов
- Б. Чрезмерная выраженность экваторов естественных зубов
- В. Депульпированные зубы
- Г. Недостаточная высота коронок естественных зубов
- Д. Эстетический дефект естественных зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между типами слизистой оболочки по классификации Суппли и их характеристикой. Типы слизистой оболочки по Суппли:

1. Третий;
 2. Четвертый. Характеристика:
 - А. Избыточно податлива, разрыхлена, сильно увлажнена;
 - Б. Бледно розового цвета, умеренно увлажнена и податлива, с нормальным порогом болевой чувствительности;
 - В. Тонкая, сухая, малоподатлива, повышенная болевая чувствительность;
 - Г. Складчатая, с «болтающимся» альвеолярным гребнем. .
- А. 1Б, 2В
Б. 1В, 2Б
В. 1А, 2Г

Причиной скола керамической облицовки у металлокерамического мостовидного протеза может быть

- А. Промежуточная часть седловидной формы
- Б. Неудовлетворительная гигиена полости рта
- В. Наличие в полости рта съемного протеза
- Г. Наличие искусственных коронок на зубах-антагонистах
- Д. Ошибки при обжиге и охлаждении керамической облицовки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между материалом и областью его применения . Наименование материала:

1. Изолирующий лак «Изокол»;
 2. Акриловая пластмасса «Фторакс»;
 3. Припой ;
 4. Липкий воск;
 5. Альгинатный материал «Уреен». Область его применения:А. Получение оттисков;
Б. Базисы съемных пластиночных протезов, базисы ортодонтических аппаратов;
В. Пайка частей мостовидных протезов;
Г. Временное соединение частей протезов
Д. Изоляция поверхности модели на этапе замены воска на пластмассу.
- А. 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д
Б. 1Д, 2Б, 3В, 4Г, 5А
В. 1Д, 2А, 3В, 4Г, 5Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между правильной последовательностью проведения клинического этапа коррекция съёмного пластиночного протеза при частичном дефекте зубного ряда и компонентами действия. Правильная последовательность:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5. Компоненты действия;

А. Рекомендации пациенту по правилам пользования протезом;

Б. Обследование протезного ложа, при необходимости коррекция; В. Жалобы пациента;

Г. Проверка фиксации протеза ;

Д. Сошлифовывание преждевременных окклюзионных контактов.

А. 1А, 2В, 3Г, 4Д, 5Б

Б. 1В, 2Б, 3Д, 4Г, 5А

В. 1Г, 2Д, 3А, 4Б, 5В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между местом коррекции индивидуальной ложки на верхней челюсти при полном отсутствии зубов и проведением функциональной пробы. Проведение функциональной пробы;

1. «Глотание»; 2. «Широкое открывание рта»;

3. «Вытягивание вперед губ, сложенных трубочкой»; 4. «Всасывание щёк». Место коррекции индивидуальной ложки:

А. В области альвеолярных бугров и крылочелюстных складок;

Б. Дистальный край ложки ; В. В области щёчных складок ; Г. Вестибулярный край между клыками.

А. 1Б, 2А, 3Г, 4В

Б. 1А, 2Б, 3Г, 4В

В. 1В, 2Б, 3А, 4Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между изменением линейных размеров в процессе использования материалов и видом материала. Материал:

1. Усадка;

2. Расширение. Изменение линейного размера:

А. Оттискная масса;

Б. Гипс;

В. Формовочная масса;

Г. Керамическая масса;

Д. Сплавы металлов.

А. 1АГД, 2БВ

Б. 1АД, 2БВ

В. 1Д, 2В

Применение замковых креплений для фиксации съёмного протеза даёт возможность

А. Уменьшить рвотный рефлекс

Б. Улучшить дикцию

В. Повысить эстетику

Г. Улучшить фиксацию протеза

Д. Уменьшить травму десны

При починке съёмного протеза на нижней челюсти в связи с потерей естественного зуба необходимо получить оттиск с

А. Нижней челюсти без протеза

Б. Нижней челюсти с протезом

В. Верхней челюсти и нижней челюсти без протеза

Г. Нижней челюсти с протезом и верхней челюсти

Д. Оттиск снимать не нужно

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите правильную последовательность проведения обследования и заполнения истории болезни. Порядок:

1.;

2.;

3.;

4.;5.;

6.;

7.;

8.;

9.;

10.;

11. Компонент действия: А. Обследование полости рта;

Б. Диагноз;

В. Развитие настоящего заболевания;

Г. Паспортные данные ;

Д. Внешний осмотр;

Е. Дневник лечения ;

Ж. Определение вида прикуса;

З. Проведение дополнительных обследований;

И. Жалобы;

К. Перенесенные и сопутствующие заболевания;

Л. План лечения.

А. 1А, 2Г, 3Б, 4В, 5Е, 6Д, 7Ж, 8Л, 9И, 10К

Б. 1Б, 2А, 3В, 4К, 5З, 6И, 7Д, 8Л, 9Ж, 10З, 11Е

В. 1Г, 2И, 3К, 4В, 5Д, 6А, 7Ж, 8З, 9Б, 10Л, 11Е

При изготовлении металлокерамической коронки минимально допускаемая толщина металлического каркаса из неблагоприятных сплавов

А. 0,1 мм

Б. 0,2 мм

В. 0,25 мм

Г. 0,3 мм

Д. 0,5 мм

Относительным противопоказанием к применению металлокерамических коронок является

А. Недостаточная высота коронок естественных зубов

Б. Плоская форма естественных зубов

В. Чрезмерная выраженность экваторов естественных зубов

Г. Депульпированные зубы

Д. Эстетический дефект естественных зубов

При препарировании зуба под цельнолитую коронку с жевательной поверхности или режущего края сошлифовывают ткани зуба примерно на (в мм)

- А. 0,1 – 0,3
- Б. 0,3 – 0,6
- В. 0,7 – 1
- Г. 1,5 – 2,0
- Д. 2,0 – 2,5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью атрофии костной ткани альвеолы и характеристикой атрофии лунки зуба (по

В.Ю.Курляндскому). Степень атрофии:

- 1. Первая;
- 2. Вторая;
- 3. Третья;
- 4. Четвертая. Характеристика атрофии лунки зуба (по В.Ю.Курляндскому):

- А. Полная атрофия костной ткани альвеолы, зуб удерживается лишь мягкими тканями;;
- Б. Атрофия костной ткани альвеолы на 3/4 его длины;
- В. Атрофия костной ткани альвеолы на 1/2 его длины;
- Г. Атрофия костной ткани альвеолы на 1/4 его длины.

- А. 1А, 2Б, 3Г, 4В
- Б. 1Г, 2В, 3Б, 4А
- В. 1Б, 2Г, 3В, 4А

Получение оттиска при починке съемного пластиночного протеза не требуется при

- А. Отломе плеча кламмера
- Б. Переломе или трещине базиса
- В. Необходимости установки дополнительного зуба
- Г. Переносе кламмера
- Д. Отломе искусственного зуба

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность этапов литья частей зубных протезов. Порядок: 1.;

2.;

3.;

4.;

5.;

6.;

7.;

8. Компонент действия:

А. Отделка частей зубных протезов;

Б. Освобождение литых протезов от формовочной массы;

В. Заполнение опоки формовочной массой;

Г. Высушивание и прожигание опоки в муфельной печи;

Д. Снятие подопочного конуса и выплавление воска;

Е. Нагревание опоки и расплавление сплава;

Ж. Нагнетание расплавленного сплава в форму;

3. Создание литниковой системы.

А. 1А, 2Б, 3В, 4З, 5Е, 6Ж, 7Г, 8Д

Б. 1А, 2Ж, 3З, 4Г, 5Б, 6В, 7Д, 8Е

В. 1З, 2В, 3Д, 4Г, 5Е, 6Ж, 7Б, 8А

При лечении болезней пародонта у пациентов с сохранившимися зубными рядами используется съёмная шина Эльбрехта, которая состоит из

А. Многозвеньевых кламмеров на все зубы с элементами перекидных кламмеров, окклюзионных накладок

Б. Колпачковых коронок на фронтальную группу зубов

В. Пластиночного протеза с когтевидными отростками

Г. Бюгельного протеза с многозвеньевыми кламмерами на боковые зубы

Д. Бюгельного протеза с когтевидными отростками

Показанием к постановке искусственных зубов на «приточке» в съёмном пластиночном протезе на верхней челюсти является

А. Чрезмерная выраженность альвеолярной части нижней челюсти;

Б. Чрезмерная выраженность альвеолярного отростка верхней челюсти в области боковых зубов;

В. Отростка верхней челюсти в области боковых зубов

Г. «короткая» верхняя губа

Д. Выраженная уздечка нижней губы

При отломе коронковой части зуба на уровне десны зуб восстанавливают

- А. Полукоронкой
- Б. Экваторной коронкой
- В. Вкладкой
- Г. Съёмным протезом
- Д. Штифтовой конструкцией

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между названием углов путей при движении нижней челюсти и их значениями. Углы при движении нижней челюсти:

1. Сагиттальный угол суставного пути;
2. Сагиттальный угол резцового пути;
3. Трансверзальный угол резцового пути (готический угол);
4. Боковой угол суставного пути (угол Беннета). Угол равен (градусы):

- А. 17;
 - Б. 40 – 60;
 - В. 30 – 40;
 - Г. 100 – 110.
- А. 1В, 2Б, 3Г, 4А
Б. 1А, 2В, 3Б, 4А
В. 1Б, 2А, 3Г, 4В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления металлопластмассовой коронки. Порядок:

- 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 - 4.;
 5. Клинические этапы изготовления:
- А. Фиксация коронки;
 - Б. Припасовка каркаса, выбор цвета облицовки ;
 - В. Препарирование зуба и получение оттисков ;
 - Г. Определение центральной окклюзии;
 - Д. Припасовка коронки.
- А. 1А, 2Б, 3Г, 4Д, 5В
Б. 1В, 2Г, 3Б, 4Д, 5А
В. 1Б, 2В, 3Д, 4А, 5Г

На этапе "проверка конструкции съемного протеза" При полном отсутствии зубов в случае выявления занижения высоты нижнего отдела необходимо заново определить центральное соотношение челюстей

- А. Сняв боковые зубы с нижнего воскового базиса и приклеив пластинку воска к нему
- Б. С помощью новых восковых базисов с окклюзионными валиками
- В. Сняв боковые зубы с верхнего воскового базиса и приклеив пластинку воска к нему
- Г. Сняв боковые зубы с верхнего и нижнего восковых базисов и приклеив пластинку воска к нижнему восковому базису
- Д. Приклеив пластинку воска на зубы нижнего воскового базиса

$\frac{3}{4}$ степени атрофии лунки зуба соответствует

- А. 1,5 высоте анатомической коронки зуба
- Б. Двум размерам высоты анатомической коронки зуба
- В. Одной высоте анатомической коронки зуба
- Г. Половине высоты анатомической коронки зуба
- Д. Меньше половины высоты анатомической коронки зуба

За степень атрофии лунки зуба принимается размер, полученный при зондировании патологического зубодесневого кармана в области

- А. Медиальной стороны
- Б. Дистальной стороны
- В. Наибольшей атрофии
- Г. Вестибулярной поверхности
- Д. Оральной поверхности

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между значениями и терминами. Значение:

- 1. Всевозможные положения нижней челюсти относительно верхней;
- 2. Смыкание зубных рядов или групп зубов верхней и нижней челюстей;
- 3. Соотношение зубных рядов в центральной окклюзии. Термины:
- А. Прикус;
- Б. Ортогнатический прикус;
- В. Артикуляция;
- Г. Окклюзия;
- Д. Центральное соотношение челюстей;
- Е. Центральная окклюзия.

- А. 1Б, 2Г, 3А
- Б. 1В, 2Г, 3А
- В. 1В, 2Б, 3А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами параллелометрии и показаниями и сущности метода. Методы параллелометрии:

1. Произвольный ;

2. Метод Новака;

3. Логический метод. Показания и сущность метода:

А. Целесообразно использовать при планировании четырех и более кламмеров в конструкции опирающегося протеза. Основан на изменении топографии линии клинического экватора при изменении угла наклона модели.;

Б. Применяется при минимальном числе планируемых в конструкции протеза кламмеров и параллельности осей зубов, модель фиксируется в горизонтальном положении.;

В. Применяется при числе опорных зубов не более четырех и взаимном наклоне их осей. Основан на определении средней оси наклона зуба и фиксации модели при совпадении средней оси со стержнем параллелометра.

А. 1А, 2В, 3Б

Б. 1Б, 2В, 3А

В. 1А, 2Б, 3В

Анатомическая шейка зуба соответствует

А. Границе над- и поддесневой частей зуба

Б. Экватору зуба

В. Переходу эмали в цемент корня

Г. Дну зубодесневого желобка

Д. Дну патологического зубодесневого кармана

Собственно жевательная мышца по функции относится к группе мышц

А. Опускающих нижнюю челюсть

Б. Смещающих нижнюю челюсть вперед

В. Поднимающих нижнюю челюсть

Г. Смещающих нижнюю челюсть вправо

Д. Смещающих нижнюю челюсть влево

Для починки съемного протеза на нижней челюсти при отломе удерживающего кламмера необходимо получить оттиск с

А. Нижней челюсти с протезом

Б. Двух челюстей без протеза

В. Нижней челюсти без протеза

Г. Верхней челюсти и оттиск с нижней челюсти с протезом

Д. Двух челюстей без протеза и с нижней челюсти с протезом

При изготовлении консольного несъемного протеза отрицательным является

- А. Необходимость депульпации опорных зубов
- Б. Препарирование большого количества зубов
- В. Наличие опрокидывающего момента в области опорных зубов
- Г. Неудовлетворительное эстетическое качество
- Д. Сошлифовывание большого количества тканей опорных зубов

Моделировка литой коронки может проводиться без использования "адапты"

- А. Базисным воском
- Б. Бюгельным воском
- В. Погружным воском
- Г. Липким воском
- Д. Воском для мостовидных работ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между способами передачи жевательного давления по Румпелю и видами протезов. Способы передачи жевательного давления:

- 1. Физиологический;
 - 2. Нефизиологический;
 - 3. Полуфизиологический. Вид протеза:
- А. Мостовидный;
 - Б. Съемный пластиночный;
 - В. Бюгельный.
- А. 1А, 2В, 3Б
 - Б. 1А, 2Б, 3В
 - В. 1В, 2Б, 3А

При наличии сильных болей больному рекомендуется съемный пластиночный протез

- А. Не снимать до посещения врача
- Б. Снять и надеть за 3-4 часа перед посещением врача
- В. Снять и сразу придти к врачу
- Г. Снять и надеть, когда пройдут болевые ощущения
- Д. Снять и после исчезновения воспалительных явлений придти к врачу

Граница базиса съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти в области боковых зубов проходит

- А. Не касается зубов
- Б. В пришеечной области зубов
- В. По середине коронки зубов
- Г. Перекрывая коронки зубов на 1/3
- Д. Перекрывая коронки зубов на 2/3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между разными классификациями и видом зубных протезов. Классификация:

1. По назначению;
 2. По методу изготовления. Зубные протезы:
 - А. Коронки, полукоронки, экваторные коронки, телескопические коронки;
 - Б. Коронки комбинированные, металлические, неметаллические;
 - В. Литые, штампованные, полимеризованные; Г. Восстановительные, опорные, шинирующие.
- А. 1Г, 2В
 - Б. 1А, 2В
 - В. 1Г, 2Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методом избирательного пришлифовывания по авторам и методикой проведения. Метод избирательного пришлифовывания по:

1. Jankelson;
 2. Schuyler. Методика:
 - А. Пришлифовывание проводится в несколько посещений; устраняются преждевременные окклюзионные контакты в дистальной и центральной окклюзиях;
 - Б. Устраняются преждевременные контакты в центральной, передней, боковых окклюзиях.
- А. 1Б, 2А
 - Б. 1А, 2Б
 - В. 1В, 2Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раз или не выбран вовсе. Установите соответствие между причинами починки съёмного пластиночного протеза на верхней челюсти и компонентами действия. Причина починки съёмного протеза:

1. Перелом базиса протеза;

2. Отлом плеча кламмера;

3. Удаление естественного зуба. Компоненты действия:

А. Получить оттиск с верхней челюсти без протеза;

Б. Получить оттиск с верхней челюсти с протезом;

В. Получить оттиск с двух челюстей без протеза;

Г. Получить оттиск с нижней челюсти и с верхней челюсти с протезом;

Д. Оттиски получать не нужно.

А. 1А, 2Б, 3Г

Б. 1Д, 2Б, 3Г

В. 1Д, 2А, 3Г

Паковка пластмассы в кювету проводится на стадии

А. Песочной

Б. Тянующихся нитей

В. Тестообразной

Г. Резиноподобной

Д. Твердой

Причинами расцементирования цельнолитой коронки являются

А. Отсутствие экватора коронки

Б. Удлиненный край коронки В. Отсутствие контакта с зубами-антагонистами; Г. Чрезмерное укорочение зуба при препарировании; Д. Отсутствие контакта с зубами-антагонистами

В. Отсутствие контакта с зубами-антагонистами

Г. Чрезмерное укорочение зуба при препарировании;

Д. Отсутствие контакта с зубами-антагонистами

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между разными классификациями кламмеров и видами кламмеров. Классификация кламмеров:

1. По способу соединения с протезом;
 2. По материалу;
 3. По месту расположения плеча;
 4. По конфигурации . Виды кламмеров:
 - А. Дентальные, денто-альвеолярные, альвеолярные;
 - Б. Металлические, пластмассовые
 - В. Жесткие, полуподвижные, шарнирные;
 - Г. Гнутые, литые, полимеризованные;
 - Д. круглые, полукруглые, ленточные;
 - Е. Одноплечие, двухплечие, перекидные, двойные, многозвеньевые;
 - Ж. Удерживающие, опорно-удерживающие.
- А. 1В, 2Б, 3А, 4Е
Б. 1А, 2В, 3Б, 4Е
В. 1Б, 2В, 3А, 4Г

Создание большой конусности зуба при препарировании приведет к

- А. Отколу облицовки
- Б. Повреждению десневого края
- В. Повреждению пародонта
- Г. Расцементировки коронки
- Д. Перегрузке опорного аппарата зуба-антагониста

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между сплавом металла и видом искусственной коронки. Сплав металла :

1. Хромоникелевый сплав;
 2. Золотой сплав 900‰;
 3. Золото-платиновый сплав 750‰. Вид искусственной коронки :
 - А. Цельнолитая коронка;
 - Б. Каркас металлокерамической коронки;
 - В. Штампованная коронка;
 - Г. Каркас металлопластмассовой коронки.
- А. 1Г, 2А, 3 Б, Г
Б. 1ВГ, 2А, 3Б
В. 1АБГ, 2В, 3А, Г

При изготовлении литой цельнометаллической коронки моделировка воском анатомической формы производится в объеме (по сравнению с естественным зубом

- А. Равном
- Б. Меньшем на толщину 1мм
- В. Большем на толщину 1мм
- Г. Меньшем на толщину компенсационного лака
- Д. Большем на толщину компенсационного лака

Изготовление полного съёмного протеза на нижнюю челюсть с удлинённой дистальной границей может привести к

- А. Прикусыванию щёк
- Б. Сбрасыванию протеза во время функции
- В. Прикусыванию губ
- Г. Нарушению дикции
- Д. Нарушению эстетики

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между нижней или верхней челюстью и сроками остеоинтеграции дентальных имплантатов. Нижняя или верхняя челюсть:

1. На нижней челюсти;

2. На верхней челюсти. Сроки остеоинтеграции дентальных имплантатов, в месяцах:

А. 3 – 4 ;

Б. 5 – 6 ;

В. 7 –

8.

А. 1Б, 2В

Б. 1А, 2Б

В. 1В, 2Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите буквенный компонент из правой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между видами мостовидных протезов и их опорными элементами. Мостовидные протезы:

1. Съёмные;

2. Несъёмные. Опорные элементы:

А. Коронки;

Б. Полукоронки;

В. Аттачменты;

Г. Кламмера.

А. 1В, Г, 2А

Б. 1Г, 2АБ

В. 1В, Г, 2А, Б

Возможная причина балансирования съёмного протеза в полости рта

А. Неизолированный торус

Б. Удлинение границ протеза

В. Завышение прикуса

Г. Занижение прикуса

Кламмер кемени представляет собой

А. Кламмер, имеющий окклюзионную накладку и два опорно-удерживающих плеча

Б. Отростки базиса протеза, прилегающие к зубам ниже экватора с вестибулярной стороны

В. Кламмер, разделенный на три части – независимая окклюзионная накладка и два т-образных удерживающих плеча, соединенных телом с удлиненным основанием

Г. Полукруглый кламмер, который начинается опорным плечом, переходит в окклюзионную накладку и заканчивается опорно-удерживающим плечом

При ортопедическом лечении неправильно сросшихся переломов используются

А. Протезы с дублирующим зубным рядом

Б. Протезы с двуслойным базисом

В. Искусственные коронки

Г. Каппы

Средняя длина корня центрального резца верхней челюсти составляет (в мм)

А. 12,5

Б. 11,0

В. 12,0

Г. 13,3

Наиболее информативным методом рентгенодиагностики при выявлении положения верхней челюсти по отношению к основанию черепа является

- А. Дентальная рентгенография
- Б. Телерентгенография
- В. Ортопантомография
- Г. Рентгенокинематография

Автор классификации беззубых верхних челюстей

- А. Курляндский
- Б. Келлер
- В. Оксман
- Г. Шредер

При непосредственном протезировании на нижней челюсти подготовка гипсовой модели заключается в сошлифовывании гипса с альвеолярного

- А. Гребня на 1-1,5 мм
- Б. Отростка на 2-3 мм
- В. Гребня на 2-3 мм
- Г. Отростка на 1-1,5 мм

Укажите возможные способы фиксации зубочелюстных протезов-обтураторов

- А. Стандартные
- Б. Внеротовые
- В. Комбинированные (внутри- и внеротовые)
- Г. Внутриротовые

Ориентир линии бугров указывает на

- А. Торус
- Б. Дистальную границу базиса
- В. Постановку последнего искусственного зуба
- Г. Подвижность альвеолярных бугорков

Мышца, поднимающая нижнюю челюсть

- А. Masseter
- Б. Pterygoideus lateralise
- В. Platysma
- Г. Digastricus

Коронка, завышающая прикус, может получиться по причине

- А. Неправильной моделировки жевательной поверхности в окклюдаторе или без него
- Б. Неточного отпечатка шеек зубов на модели
- В. Отсутствия антагонистов
- Г. Неточной сборки слепка

Мышца, участвующая в трансверзальных движениях нижней челюсти

- А. Челюстно-подъязычная
- Б. Латеральная крыловидная
- В. Подбородочно-подъязычная
- Г. Собственно жевательная

С оральной стороны граница базиса протеза перекрывает сохранившиеся фронтальные зубы нижней челюсти по отношению к высоте коронки на

- А. 1/2
- Б. 1/3
- В. 3/4
- Г. 2/3

Толщина окклюзионной лапки (накладки) у основания не менее _____ мм

- А. 0,6
- Б. 0,5
- В. 1,0
- Г. 0,8

За полировкой при изготовлении мостовидного протеза с фасетками следует этап работы

- А. Моделирование восковой композиции и замена воска на пластмассу
- Б. Замена воска на пластмассу
- В. Припасовка
- Г. Фиксация протеза

Способность протеза противостоять силам, сбрасывающим его вдоль пути снятия протеза (вертикальное направление)

- А. Стабилизация
- Б. Опора протеза
- В. Фиксация
- Г. Ретенция

Последним лабораторным этапом изготовления литой цельнометаллической коронки является

- А. Припасовка на модели
- Б. Заключительный обжиг
- В. Глазурование
- Г. Полировка

Типичное расположение небной дуги бюгельного протеза при дефектах зубных рядов iii класса по кеннеди

- А. Переднее
- Б. Передне-среднее
- В. Заднее
- Г. Среднее

При постановке искусственных зубов по васильеву в ортогнатическом прикусе латеральный резец соотносится со стеклом

- А. Отстоит на 1,5 мм
- Б. Касается
- В. Отстоит на 2,0 мм
- Г. Отстоит на 0,5 мм

Штифтовый зуб по ильиной-маркосян имеет

- А. Наддесневой колпачок
- Б. Амортизационную вкладку
- В. Пластмассовый зуб из гарнитура
- Г. Пластинку с оральной стороны

В состоянии относительного физиологического покоя зубные ряды в норме

- А. Разобщены на 2-4 мм
- Б. Сомкнуты
- В. Разобщены на 0,5-1 мм
- Г. Разобщены на 5-7 мм

Отсутствие снижения высоты нижнего отдела лица при компенсированной форме повышенного стирания твердых тканей зубов обусловлено

- А. Перемещением зубов
- Б. Ростом альвеолярной кости
- В. Смещением нижней челюсти
- Г. Изменением взаимоотношений внчс

Имmediат протезы выполняют функцию

- А. Защитную
- Б. Репаративную
- В. Двигательную
- Г. Трофическую

Обследование пациента начинают с применения _____ методов

- А. Рентгенологических
- Б. Лабораторных
- В. Основных
- Г. Цитологических

Объемное соотношение мономера и полимера при подготовке пластмассового «теста» составляет

- А. 1:2
- Б. 1:3
- В. 1:4
- Г. 1:1

Самую низкую усадку при отверждении имеют _____ материалы

- А. А- силиконовые
- Б. Альгинатные
- В. С-силиконовые
- Г. Полисульфидные

Окклюзиограмма применяется для определения

- А. Окклюзионной высоты
- Б. Окклюзионных контактов
- В. Выносливости тканей пародонта
- Г. Степени подвижности зубов

Основой классификации кенеди является

- А. Степень подвижности зубов
- Б. Степень атрофии альвеолярного отростка
- В. Степень атрофии слизистой оболочки
- Г. Топография дефекта зубного ряда

Восковая композиция фасеток для пластмассы моделируется в объеме

- А. Незначительно меньшем, чем соседний зуб
- Б. Равном соседнему зубу
- В. Увеличенном, с учетом будущей обработки пластмассы
- Г. Значительно меньшем, чем соседний зуб

Основным критерием к удалению зуба при пародонтите является

- А. Инфекции ротоглотки
- Б. Степень сохранности резервных сил пародонта
- В. Степень подвижности зуба
- Г. Инфекция полости рта

Методом моделировки литого каркаса металлокерамической коронки является

- А. Погружение гипсового штампа в разогретый воск с последующей моделировкой
- Б. Нанесение базисного воска на модель с помощью моделировочных инструментов
- В. Изготовление платинового колпачка и нанесение на него воска
- Г. Изготовление трех колпачков из полимерной пленки различной толщины

Ретенционная часть плеча опорно-удерживающего кламмера располагается в зоне

- А. Оклюзионной
- Б. Экваторной
- В. Гингивальной
- Г. Дистальной

Наиболее благоприятна для имедиат протезирования слизистая

- А. Податливая
- Б. Тонкая
- В. Подвижная
- Г. Плотная

При препарировании окклюзионной поверхности зуба под штампованную коронку из золотого сплава ее сошлифовывают на толщину (в мм)

- А. 0,55-0,6
- Б. 0,28-0,3
- В. 0,65-0,8
- Г. 0,45-0,5

Протетическая плоскость в боковых отделах параллельна линии

- А. Зрачковой
- Б. Камперовской
- В. Альвеолярного гребня
- Г. Франкфуртской

При изготовлении штампованных коронок твердые ткани зубов сошлифовываются

- А. До диаметра шейки зуба
- Б. На 1-2 мм
- В. До слоя дентина
- Г. На 0,5-1 мм

При изготовлении штифтово-культевой вкладки для отображения внутрикорневой части в момент получения оттиска используют

- А. Проволоку
- Б. Беззольный штифт
- В. Стекловолоконный штифт
- Г. Зубочистку

Восковая композиция перед гипсовкой в кювету приклеивается по периметру к модели, чтобы

- А. На всякий случай
- Б. Между воском и моделью не попал жидкий гипс
- В. Воск не деформировался во время гипсовки
- Г. Она не упала с модели при гипсовке

При I степени повышенной стираемости твердых тканей зубов показано применение

- А. Пластиночных протезов
- Б. Штифтовых конструкций
- В. Вкладок и окклюзионных накладок
- Г. Дуговых протезов

При ложном суставе съемный протез изготавливается с

- А. Двумя фрагментами и подвижной фиксацией между ними
- Б. Металлическим базисом
- В. Пластмассовым базисом
- Г. Одним базисом

Кламмер аккера представляет собой

- А. Т-образный кламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба
- Б. Два металлических плеча и окклюзионную накладку, соединенную с седлом каркаса бюгельного протеза
- В. Одноплечий кламмер с одной или двумя накладками, соединенный с седлом каркаса бюгельного протеза
- Г. Одно металлическое плечо, охватывающее весь зуб и медиальную накладку, соединенную с дугой при помощи соединителя

По способу передачи жевательного давления, к физиологическим конструкциям относят

- А. Съёмные пластиночные протезы
- Б. Бюгельные протезы
- В. Съёмные протезы на имплантатах
- Г. Коронки

Последним клиническим этапом изготовления металлокерамической коронки является

- А. Коррекция контактных пунктов
- Б. Контроль прилегания внутренней поверхности коронки к культе зуба
- В. Коррекция окклюзионных контактов
- Г. Фиксация на цемент

Для получения разборной модели используются

- А. Восковые перлы
- Б. Кламмерная проволока
- В. Ретенционные шарики
- Г. Штифты

Эстезиометром определяют

- А. Податливость слизистой оболочки
- Б. Болевую чувствительность
- В. Подвижность слизистой оболочки
- Г. Выносливость пародонта

Какие противопоказания к имедиат-протезу

- А. Включенный дефект зубного ряда
- Б. Полный зубной ряд
- В. Дистальный дефект зубного ряда
- Г. Отсутствие фронтальных зубов

Ось зуба штифтово-культевой вкладкой можно отклонить на угол

- А. 30%
- Б. 20%
- В. 45%
- Г. 90%

При расположении элементов в опорно-удерживающем кламмере значимой является

- А. Линия вертикали
- Б. Линия анатомического экватора
- В. Линия клинического экватора
- Г. Продольная ось зуба

Готовая коронка при припасовке на гипсовой штампик по отношению к линии клинической шейки должна перекрывать на ____ мм

- А. 2,0
- Б. 1,0
- В. 1,5
- Г. 0,5

При нефиксированной высоте нижнего отдела лица модели фиксируются в артикулятор

- А. По восковым шаблонам с прикусными валиками
- Б. Произвольно
- В. По стеклу
- Г. По постановочному столику

Травматическая окклюзия, развивающаяся при наличии патологии в тканях пародонта (пародонтоз, пародонтит), называется

- А. Компенсированной
- Б. Первичной
- В. Вторичной
- Г. Декомпенсированной

Лабораторные этапы изготовления фарфоровой коронки включают: изготовление разборной модели, получение

- А. Платинового колпачка, нанесение фарфоровой массы, обжиг, полировку
- Б. Платинового колпачка, нанесение фарфоровой массы, обжиг, глазирование
- В. Колпачка из адапты, нанесение фарфоровой массы, обжиг, глазирование
- Г. Платинового колпачка, получение оттиска с модели, нанесение фарфоровой массы, обжиг

При изготовлении кламмеров адамса на последние в зубном ряду зубы отростки

- А. Изготавливаются максимально мезиально
- Б. Изготавливаются максимально дистально
- В. Изготавливается только мезиальный отросток
- Г. Направление не имеет значения

При резекции нижней челюсти

- А. Протез с шарниром по Гаврилову
- Б. Протез с obturatorом
- В. Резекционный протез по Оксману
- Г. Протез с дублирующим зубным рядом

Ведущим симптомом анкилоза внчс является

- А. Резкое ограничение подвижности нижней челюсти
- Б. Шум в ушах
- В. Выраженный болевой симптом
- Г. Нарушение глотания

Какой период пользования имедиат-протезом до

- А. 1 Года
- Б. 4-Х лет
- В. 2-Х лет
- Г. 3 Месяцев

Полимеризация пластмассы при атмосферном давлении производится при температуре (в градусах по цельсию)

- А. 200
- Б. 120
- В. 680
- Г. 100

Для изготовления цельнокерамической коронки рабочий оттиск получают массой

- А. Твердокристаллической
- Б. Силиконовой
- В. Альгинантной
- Г. Термопластической

Как характеризуется слизистая оболочка четвертого класса по суппли?

- А. Избыточно податлива, разрыхлена, слюна густой консистенции
- Б. Складчатая, с «болтающимся» гребнем
- В. Тонкая, малоподатливая, болезненна при пальпации, слюна жидкой консистенции
- Г. Бледно-розового цвета, умеренно увлажнена и податлива (с нормальным порогом болевой чувствительности)

Гипсовые модели по силиконовым отткам следует изготавливать не позднее

- А. 3-4 Часов
- Б. 20 Минут
- В. 24 Часов
- Г. 72 Часов

Моделирование под штампованную коронку начинаем с

- А. Создания контактных пунктов
- Б. Любого из предложенных вариантов
- В. Нанесения порции расплавленного воска
- Г. Нанесения малой порции кипящего воска

Аппарат андрезена-хойпля с винтом относится к аппаратам

- А. Комбинированным
- Б. Механическим
- В. Биомеханическим
- Г. Функциональным

При необходимости иммедиат-протез изготавливают

- А. Через 5-7 дней после удаления зубов
- Б. Через 30 дней после удаления зуба
- В. Через 2 недели после удаления зубов
- Г. До оперативного вмешательства

Часть кламмера, которая охватывает коронку зуба и располагается в зоне между экватором и шейкой, представляет собой

- А. Плечо
- Б. Отросток
- В. Тело
- Г. Накладку

Жесткий базис съемного протеза изготавливают из пластмассы

- А. Поливинилсилоксановой
- Б. Силиконовой
- В. Акриловой
- Г. Полихлорвиниловой

Характеристика третьего класса слизистой оболочки по суппле

- А. Бледно-розового цвета, умеренно увлажнена и податлива
- Б. Тонкая, мало-податливая, болезненна при пальпации, слюна жидкой консистенции складчатая, с «болтающимся» гребнем
- В. Нормальным порогом болевой чувствительности)
- Г. Избыточно податлива, разрыхлена, слюна густой консистенции

Оптическим оттиском называется изображение, полученное с помощью

- А. Радиовизиографа
- Б. 3D сканера
- В. Силиконовой оттисковой массы
- Г. Внутриротовой фотокамеры

Главный недостаток бюгельных протезов по сравнению с пластиночными

- А. Не могут быть дополнены в случае изменения конструкции во время протезирования
- Б. Показания к применению значительно ограничены
- В. Требуется наличие литейной лаборатории
- Г. Трудоемки в изготовлении

К первому классу по классификации пелу относится кламмер

- А. Аккера
- Б. Кольцевой
- В. Бонвиля
- Г. Джексона

В какой последовательности располагаются стадии затвердевания беззольной пластмассы?

- А. Порошок - мокрый песок - тестообразная стадия - стадия тянущихся нитей - кристаллическая
- Б. Порошок - тестообразная стадия - стадия тянущихся нитей - мокрый песок - кристаллическая
- В. Порошок - стадия тянущихся нитей - тестообразная стадия - мокрый песок - кристаллическая
- Г. Порошок - мокрый песок - стадия тянущихся нитей - тестообразная стадия - кристаллическая

Величина уступа под пластмассовые коронки колеблется в пределах

- А. 0,1-0,2 Мм
- Б. 1,0-1,5 Мм
- В. 0,5-1,0 Мм
- Г. 0,3-0,4 Мм

Преимущество пластмассовых искусственных зубов в съемном протезе перед фарфоровыми зубами проявляется в

- А. Хорошем соединении с базисом протеза
- Б. Большой твердости
- В. Возможности поставить зубы на приточке
- Г. Возможности поставить зубы при глубоком прикусе

С помощью параллелометрии определяется

- А. Межевая линия
- Б. Горизонтальная ось наклона модели
- В. Вертикальная ось опорных зубов
- Г. Вертикальная ось наклона модели

К акриловым базисным пластмассам, применяемым при изготовлении имедиат-протезов, не относится

- А. Ортосил-М
- Б. Этакрил
- В. Фторакс
- Г. Протакрил

Устойчивость полных съемных протезов в покое относят к

- А. Когезии
- Б. Адгезии
- В. Стабилизации
- Г. Фиксации

Для добавления искусственного зуба при починке протеза получают оттиск _____ массой

- А. Гидроколлоидной
- Б. Цинкоксиэвгеноловой
- В. Альгинатной
- Г. Термопластической

Назначение плечевой массы

- А. Увеличение прочности керамической облицовки
- Б. Придание блеска керамической массе
- В. Придание прозрачности керамической массе
- Г. Улучшение эстетических характеристик коронки

При изготовлении одиночной пластмассовой коронки, оттиск снимают с

- А. Обеих челюстей
- Б. Челюсти, на которую будет изготовлена коронка
- В. Фрагмента челюсти с отпрепарированным зубом
- Г. Челюсти с отпрепарированным зубом

Оттисные материалы используемые при изготовлении металлокерамических протезов

- А. Гипс
- Б. Силиконовые
- В. Альгинатные
- Г. Эпоксидные

Одонтопародонтограмма содержит информацию о состоянии

- А. Костной ткани пародонта
- Б. Жевательных мышц
- В. Слизистой оболочки полости рта
- Г. Капилляров десны

Тиксотропностью считают

- А. Свойство оттисных материалов сохранять свою форму и не стекать под действием силы тяжести
- Б. Интенсивность взаимодействия жидкости с поверхностью твердого тела
- В. Способность материала восстанавливать свою форму после прекращения действия внешних сил, вызвавших изменение его формы (деформацию)
- Г. Сопротивление материала вдавливанию в него посторонних предметов

Выберите материалы для изготовления штифтово-культевой вкладки на боковой группе зубов

- А. Моделировочный воск
- Б. Золото 500 пробы
- В. КХС
- Г. Пластмасса акрилоксид

Пластмассовый зуб со штифтом изготавливают

- А. В лаборатории
- Б. В полости рта
- В. На заводе
- Г. Фабрично

В положении центрального соотношения челюстей головки нижней челюсти располагаются _____ суставного бугорка

- А. У основания ската
- Б. У вершины
- В. За вершиной
- Г. У середины ската

Получать оттиск при субпериостальной имплантации рекомендуется

- А. Силиконовыми материалами
- Б. Гипсом
- В. Альгинатными материалами
- Г. Силикатными материалами

Протезным ложем для базиса полного съемного пластиночного протеза на верхнюю челюсть является

- А. Небная поверхность сохранившихся зубов и слизистая оболочка мягкого неба
- Б. Слизистая оболочка альвеолярного отростка и мягкого неба
- В. Слизистая оболочка альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба
- Г. Слизистая оболочка альвеолярного отростка и твердого неба

Последним клиническим этапом изготовления металлокерамической коронки является

- А. Коррекция контактных пунктов
- Б. Выверение окклюзионного взаимоотношения
- В. Фиксация на цемент
- Г. Коррекция окклюзионных контактов

Наиболее тяжелым осложнением при неправильном лечении глубокого прикуса может быть

- А. Повреждение пародонта оставшихся зубов
- Б. Нарушение речи
- В. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава
- Г. Увеличение атрофии альвеолярных отростков

Дуга бюгельного протеза является _____ элементом

- А. Ретенционным
- Б. Шинирующим
- В. Соединительным
- Г. Опорно-удерживающим

Для изготовления металлокерамической коронки рабочий оттиск получают массой

- А. Альгинантной
- Б. Термопластической
- В. Нейлоновой
- Г. Силиконовой

Трансверзальной компенсаторной является кривая

- А. Шредера
- Б. Шпее
- В. Гербера
- Г. Уилсона

Промежуточная часть металлокерамического мостовидного протеза может быть представлена

- А. Вкладкой
- Б. Виниром
- В. Фасеткой
- Г. Штифтовым зубом

При наличии сильных болей после наложения протеза пациенту рекомендуется съемный пластиночный протез

- А. Снять и надеть, когда пройдут болевые ощущения
- Б. Снять и после исчезновения болевых ощущений прийти к врачу
- В. Не снимать до посещения врача
- Г. Снять и надеть за 2-4 часа перед посещением врача

К этиологическим факторам очагового пародонтита в области передних зубов относят

- А. Снижение высоты нижнего отдела лица
- Б. Перекрестный прикус
- В. Ошибку при выборе вида опорно-удерживающих кламмеров
- Г. Глубокое резцовое перекрытие

Зуб под пластмассовую коронку моделируют _____ воском

- А. Погружным
- Б. Базисным
- В. Моделировочным или прозрачным
- Г. Пришеечным

По способу передачи жевательного давления к нефизиологическим относится

- А. Бюгельный протез
- Б. Мостовидный протез
- В. Съёмный пластиночный протез
- Г. Коронка

Причиной формирования ложного сустава является

- А. Поздняя иммобилизация отломков
- Б. Неправильное составление костных отломков
- В. Образ жизни
- Г. Раннее протезирование

Дефекты зубных рядов по классификации кеннеди делятся на

- А. Три класса
- Б. Два класса
- В. Четыре класса
- Г. Пять классов

При постановке искусственных зубов по васильеву в ортогнатическом прикусе дистально-небный бугор второго моляра отстоит от стекла на

- А. 0,5 Мм
- Б. 1,5 Мм
- В. 1,0 Мм
- Г. 2,0 Мм

Контакт передних зубов встык, при котором имеется дизокклюзия (разобшение) боковых зубов, называется

- А. Задняя контактная позиция
- Б. Передняя окклюзия
- В. Боковая окклюзия
- Г. Центральная окклюзия

К статическим методам определения центрального соотношения относится _____ метод

- А. Антропометрический
- Б. Фонетический
- В. Электромиографический
- Г. Анатомо-физиологический

Сплав золота для изготовления вкладок

- А. 583 Пробы
- Б. 586 Пробы
- В. 750 Пробы
- Г. 900 Пробы

Сплав золота 750-й пробы (злсрплм-750-80) какую имеет температуру плавления

- А. 1060-1160°C
- Б. 955-1055°C
- В. 755-855°C
- Г. 800-950°C

При припасовке готовой металлокерамической конструкции врач контролирует

- А. Толщину каркаса коронки
- Б. Плотный фиссурно-бугорковый контакт
- В. Прочность коронки
- Г. Толщину облицовки

На рабочих гипсовых моделях границы базиса и фиксирующих элементов съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов наносятся

- А. Пациентом
- Б. Техником
- В. Не наносятся
- Г. Врачом

Подвижность зуба I степени по энтину характеризуется как

- А. Перемещение зуба только в вестибулооральном направлении
- Б. Вращение зуба в лунке во всех направлениях вокруг своей оси
- В. Перемещение зуба, только в вестибулооральном и медиодистальном направлениях
- Г. Перемещение зуба в вестибулооральном, медиодистальном, вертикальном направлениях

При разрушении окклюзионной поверхности зуба по в.ю. Милекевичу (иропз) более 0,6 показано лечение

- А. Вкладкой
- Б. Пломбой
- В. Искусственной коронкой
- Г. Штифтовой конструкцией

Для полирования протеза после починки используют

- А. Металлическую щетку
- Б. Карборундовые головки
- В. Войлочные фильцы, волосяные и текстильные щётки
- Г. Фрезы

Для устранения диастемы используется

- А. Вестибулярная дуга со срединным «М»-образным изгибом
- Б. Вестибулярная дуга с одним полукруглым изгибом
- В. Скоба
- Г. Вестибулярная дуга с двумя полукруглыми изгибами

С какой стороны опорного зуба располагается тело удерживающего кламмера имедиат протеза

- А. Окклюзионной
- Б. Апроксимальной
- В. Вестибулярной
- Г. Оральной

Третий тип беззубой нижней челюсти по классификации келлера характеризуется

- А. Хорошо выраженной альвеолярной частью в переднем отделе и резко атрофичной в боковом
- Б. Незначительной равномерной атрофией альвеолярной части
- В. Резко атрофированной альвеолярной частью в переднем отделе и хорошо выраженной в боковом
- Г. Полной атрофией альвеолярной части

При нефиксированной высоте нижнего отдела лица, модели фиксируются в артикулятор

- А. По постановочному столику
- Б. По восковым шаблонам с прикусными валиками
- В. По стеклу
- Г. Произвольно

Кламмер обратного действия

- А. Одноплечий кламмер с одной или двумя накладками соединенный с седлом каркаса бюгельного протеза
- Б. Металлическое плечо на язычной поверхности опорного зуба, дистальной накладки и т-образного кламмера на вестибулярной поверхности опорного зуба
- В. Т-образный кламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба
- Г. Два металлических плеча и окклюзионную накладку, соединенную с седлом каркаса бюгельного протеза

Обязательно ли, пароструить штифтово-культевую вкладку изготовленную из ккс методом литья перед отправкой в клинику

- А. На усмотрение техника
- Б. Да
- В. Нет
- Г. Да, но только изготовленную на жевательную группу зубов

Амальгама представляет собой

- А. Соединение металла с ртутью
- Б. Сплав металлов
- В. Смесь металлов
- Г. Металлический цемент

В первое посещение при полном отсутствии зубов после диагностических исследований и принятия решения о протезировании приступают к

- А. Снятию анатомических оттисков для изготовления индивидуальных оттисковых ложек
- Б. Снятию функциональных оттисков при помощи индивидуальных ложек
- В. Постановке искусственных зубов на воске
- Г. Определению центрального соотношения при помощи восковых базисов с окклюзионными валиками

Для постановки искусственных зубов изготавливают валики

- А. Окклюзионные
- Б. Постановочные
- В. Фиксирующие
- Г. Протетические

Уровень расположения поддесневого уступа должен быть на

- А. 1/3 От глубины зубодесневой бороздки
- Б. 1/2-2/3 От индивидуальной глубины зубодесневой бороздки
- В. Ниже индивидуальной глубины зубодесневой бороздки
- Г. На одном уровне с зубодесневой бороздкой

Тело кламмера должно располагаться

- А. На вестибулярной поверхности зуба ниже экватора
- Б. На вестибулярной поверхности зуба выше экватора
- В. На апроксимальной поверхности зуба на уровне экватора
- Г. В естественных фиссурах

Штифтовая культевая вкладка может быть изготовлена на

- А. Однокорневые зубы
- Б. Зубы любой группы
- В. Резцы, клыки и премоляры
- Г. Моляры

Вокс-ап моделирование на этапе планирования имплантологического лечения является

- А. Прототипом будущей ортопедической конструкции
- Б. Постоянной ортопедической конструкцией
- В. Временной пластмассовой каппой
- Г. Временной конструкцией на период остеоинтеграции имплантатов

Одним из условий успешного ортодонтического лечения является

- А. Отсутствие места в зубном ряду и наличие препятствий на пути перемещаемого зуба
- Б. Отсутствие места в зубном ряду
- В. Наличие места в зубном ряду
- Г. Наличие препятствий на пути перемещаемого зуба

Основные функции височной мышцы

- А. Поднимает нижнюю челюсть
- Б. Выдвигает вперед нижнюю челюсть
- В. Опускает нижнюю челюсть
- Г. Поднимает и тянет назад выдвинутую вперед нижнюю челюсть

Главное преимущество культевой вкладки перед штифтовыми зубами в

- А. Эстетичности
- Б. Широком показании к применению
- В. Простоте изготовления
- Г. Щадящей препаровке

На этапе препарирования зуба под литую коронку используют

- А. Фрезу
- Б. Алмазный диск
- В. Алмазный бор
- Г. Твердосплавный бор

При изготовлении цельнокерамических конструкций методом послойного нанесения керамической массы обжиг производят на

- А. Виртуальной модели
- Б. Силиконовой модели
- В. Огнеупорной модели
- Г. Восковой модели

Регулятор функций френкеля для раннего лечения наиболее показан в возрасте

- А. От 9 до 10 лет
- Б. От 3 до 4 лет
- В. От 4 до 5,5 лет
- Г. От 5,5 до 7 лет

Виды починок съемного пластиночного протеза

- А. Только клиническая
- Б. Только прямая
- В. Прямая и непрямая
- Г. Клиническая и лабораторная

Перед снятием рабочего оттиска ретракция десны необходима для того, чтобы

- А. Получить точное отображение наддесневой части зуба
- Б. Остановить кровотечение
- В. Получить точное отображение поддесневой части зуба
- Г. Высушить поверхность культи зуба

Методом временной иммобилизации является

- А. Шина-скоба
- Б. Шина Васильева
- В. Шина с распорочным изгибом
- Г. Стандартная транспортная повязка

Гипсовые модели по альгинатным оттискам следует изготавливать не позднее

- А. 24 Часов
- Б. 72 Часов
- В. 20 Минут
- Г. 3-4 Часов

Материалы, используемые для изготовления металлокерамических протезов

- А. Вспомогательные и формовочные
- Б. Вспомогательные и конструкционные
- В. Конструкционные и изоляционные
- Г. Изоляционные и формовочные

Температура отжига гильз из нержавеющей стали

- А. 500-700°C
- Б. 1050-1100°C
- В. 700-900°C
- Г. 900-1050°C

Подготовка пластмассового теста для починки съемного протеза проходит в _____ банке

- А. Закрытой; при комнатной температуре
- Б. Закрытой; в прохладном месте
- В. Открытой; в теплом месте
- Г. Открытой; для улетучивания излишнего мономера

[Вернуться в начало](#)