

Тесты с вопросами по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/sud_med_ekspert/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты для аккредитации и других экзаменов «Судебно-медицинская экспертиза» (3800 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/med_ekspert/

2) Тесты для аккредитации «Судебный эксперт» (3700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/sudebnii-ekspert/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Образцы биологического характера для сравнительного исследования у живых лиц имеет право получить (изъять):

- А. Следователь
- Б. Специалист в области судебной медицины
- В. Иной специалист
- Г. Средний медицинский работник бюро судебно-медицинской экспертизы

Наличие жидкости среды утопления в пазухе основной кости - это признак:

- А. Свешникова
- Б. Пупарева
- В. Крушевского
- Г. Фабрикантова

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Механизм возникновения черепно-мозговой травмы:

1. Черепно-мозговая травма при ударе тупым твердым предметом с большой площадью соударения по теменной области головы. Объем формируемого повреждения:

А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;

Б. Множественные повреждения внутренних органов;

В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;

Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;

Д. Симметричность наружных повреждений

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

При внезапной смерти детей и лиц молодого возраста проводится исследование содержания:

А. Комплексное биохимическое исследование

Б. Глюкозы, сердечного тропонина-I, миоглобина

В. Глюкозы, мочевины, креатинина, гликозилированного гемоглобина

Г. Глюкозы, миоглобина, желчных пигментов, кетоновых тел гликогена

Поражение почек в виде закупорки канальцев нерастворимыми кристаллами характерно для отравления:

А. Сулема

Б. Четыреххлористый углерод

В. Фенол

Г. Этиленгликоль

К осмотру трупа на месте его обнаружения в качестве специалиста в области судебной медицины **НЕ** могут привлечь:

А. Хирурга

Б. Терапевта

В. Акушера-гинеколога

Г. Провизора

При смерти от асфиксии наблюдается:

- А. Малокровие внутренних органов
- Б. Кровоизлияния в мочевой пузырь
- В. Переполнение кровью правой половины сердца
- Г. Розово-красные трупные пятна

При проведении пробы Сунцова (на воздушную эмболию) НЕ производят:

- А. Срединный разрез ниже яремной вырезки
- Б. Вскрытие сердечной сорочки до выделения органов грудной полости
- В. Пересечение грудино-ключичных сочленений полулунными разрезами
- Г. Заполнение сердечной сорочки водой

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

1. Признаками аборта являются:

- А. Наличие частиц плацентарной ткани в полости матки;
- Б. Наличие повреждений стенки матки;
- В. Наличие выделений из влагалища;
- Г. верно все;

Д. верно А,

Б.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

К вторичным снарядам при выстреле из огнестрельного оружия не относят:

- А. Осколки и частицы преграды
- Б. Обрывки одежды
- В. Осколки разорвавшейся пули
- Г. Осколки костей

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Наличие соединительно-тканых перемычек между стенками. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Наличие загрязнения одежды и кожи смазочными материалами устанавливают, исследуя объект:

А. В инфракрасных лучах

Б. В ультрафиолетовых лучах

В. В рентгеновских лучах

Г. Контактно-диффузионным методом

К наркотическим средствам относят:

А. Кокаин

Б. Морфин

В. Этиленгликоль

Г. Этанол

Из перечисленных ядов наиболее выраженными местно некротизирующим и гемолитическим действием обладает:

А. Азотная кислота

Б. Карболовая кислота

В. Уксусная кислота

Г. Нашатырный спирт

Признаком новорожденности в судебной медицине считают отсутствие демаркационного воспаления пупочного кольца, определяемого:

А. Визуально

Б. Гистологически

В. Гистохимически

Г. Биохимически

Комбинированная травма характеризуется повреждениями:

- А. Нескольких частей тела
- Б. От действия нескольких различных повреждающих факторов
- В. От неоднократного действия одного повреждающего фактора
- Г. Одежды пострадавшего

Объективными признаками биологической смерти НЕ являются:

- А. Трупные пятна
- Б. Понижение температуры тела до 2-3 градусов
- В. Трупное окоченение
- Г. Отсутствие реакции зрачков на свет

Основным в механизме образования резаной раны является:

- А. Расслоение ткани клинком режущего орудия
- Б. Рассечение тканей лезвием клинка
- В. Трение «щечек» клинка о края раны и осаднение кожи
- Г. Размятие ткани клинком режущего орудия

Дифференциальную диагностику резаной и рваной ран основывают на:

- А. Соотношении длины и глубины раны
- Б. Локализации повреждения
- В. Наличии соединительно-тканых перемычек в области концов раны
- Г. Наличии остроугольных концов

«Аггравация» - это:

- А. Изображение симптомов несуществующего заболевания
- Б. Преуменьшение симптомов действительно имеющегося заболевания
- В. Отрицание симптомов несуществующего заболевания
- Г. Преувеличение симптомов действительно имеющегося заболевания

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Выделение кишечника. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид морфологического признака:

1. Цвет мышцы на разрезе. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Признаками ожогов II степени, отличающими их от гнилостных пузырей, являются:

- А. Единичные эритроциты в жидкости из пузырей
- Б. Припухлость краев
- В. Наличие белка в жидкости из пузырей
- Г. Красноватое дно пузыря

При выделении ДНК с использованием магнитных частиц связывание ДНК производится при температуре:

- А. + 700С
- Б. +24 С
- В. +100С
- Г. -200С

Основным в механизме образования колотой раны является:

- А. Разрушение тканей острием
- Б. Раздвигание тканей боковыми поверхностями стержня
- В. Размятие тканей рукояткой
- Г. Скорость погружения

Скоропостижной (по данным ВОЗ) считается смерть, если от начала клинических проявлений болезни до смерти прошло:

- А. До 6 часов
- Б. 6-12 часов
- В. 12-24 часа
- Г. Более суток

В результате проведения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств эксперт составляет:

- А. Акт
- Б. Заключение
- В. Протокол
- Г. Выписку

Судебно-биохимическому исследованию НЕ подлежит:

- А. Цельная кровь из бедренной вены
- Б. Кровь верхнего сагиттального синуса твердой мозговой оболочки
- В. Перикардальная жидкость
- Г. Кровь из брюшной полости

В состав судебно-медицинской экспертной комиссии НЕ могут входить:

- А. Следователи
- Б. Врачи клинических специальностей
- В. Судебные эксперты
- Г. Эксперты-криминалисты

Основной механизм действия цианидов на организм человека состоит в следующем:

- А. Блокирование цитохромоксидазы клеток
- Б. Перевод гемоглобина в метгемоглобин
- В. Нарушение кислотно-щелочного равновесия в крови
- Г. Паралич дыхательного центра

Врач не будет привлечен к уголовной ответственности за неоказание медицинской помощи в случае, если:

- А. Врач на момент вызова к больному был болен
- Б. Врач-терапевт отказался смотреть хирургического больного
- В. Врач отказался принять больного другого участка
- Г. Врач отказался принять иногороднего больного

Врач-гинеколог не будет привлечен к уголовной ответственности за производство аборта во внебольничных условиях в случае, когда:

- А. Производство аборта не вызвало осложнений
- Б. Операция произведена многодетной матери
- В. Имеется письменное заявление супругов, не желающих иметь детей
- Г. Оперативное вмешательство произведено для устранения опасности для жизни женщины

Характерный морфологический признак при смертельном отравлении окисью углерода:

- А. Ярко-розовая окраска крови, тканей, трупных пятен
- Б. Вишнево-синюшная окраска крови, тканей, трупных пятен
- В. Жидкое состояние крови
- Г. Отек ложа и стенки желчного пузыря

Гистологическим признаком электрометки является:

- А. Отсутствие пустот в роговом и блестящем слое эпидермиса
- Б. Утолщение зернистого слоя
- В. Перпендикулярная поверхности кожи ориентация ядер клеток
- Г. Уплотнение эпидермиса, базофилия дермы

В состав копоти выстрела не могут входить следующие металлы:

- А. Железо
- Б. Медь
- В. Сурьма
- Г. Ртуть

Врач может быть привлечен к уголовной ответственности за неоказание:

- А. Специализированной медицинской помощи
- Б. Медико-санитарной помощи
- В. Медико-социальной помощи
- Г. Первой неотложной медицинской помощи

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид транспортной травмы:

1. Травма в кабине автомобиля. Объем формируемых повреждений:

- А. Расчленение тела;
- Б. Бампер-перелом;
- В. Отпечаток протектора;
- Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;
- Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Для определения концентрации карбоксигемоглобина в крови используется:

- А. Газожидкостная хроматография
- Б. Спектрофотометрическое исследование
- В. Гистохимическое исследование
- Г. Биохимическое исследование

Образование пятен Вишневского обусловлено:

- А. Острым нарушением трофики стенки желудка
- Б. Резкими колебаниями артериального давления
- В. Понижением проницаемости сосудистой стенки
- Г. Жидким состоянием крови

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид транспортной травмы:

1. Травма от переезда тела колесами автомобиля. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Тканевая гипоксия развивается при:

А. Отравлении оксидом углерода

Б. Отравлении цианидами

В. Закрытии дыхательных путей

Г. Общем перегревании организма

Стадия имбибиции трупных пятен обычно формируется по истечении:

А. 2- 4 часа

Б. 8-10 часов

В. 12-18 часов

Г. 24-30 часов

Синильная кислота при нормальных условиях представляет собой:

А. Бесцветную жидкость с запахом горького миндаля

Б. Аморфный порошок с запахом горького миндаля

В. Газ без цвета и запаха

Г. Газ с запахом горького миндаля

Соединительно-тканые перемычки между краями характерны для:

А. Резаных ран

Б. Рубленых ран

В. Ушибленных ран

Г. Огнестрельных ран

Рубящий предмет характеризуется наличием:

- А. Острого края и большой массы
- Б. Только острого края
- В. Острого конца и острого края
- Г. Широкого обуха

Многооскольчатый «паутинообразный» перелом костей черепа причиняют:

- А. Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под прямым углом
- Б. Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под острым углом
- В. Предметы с широкой, неограниченной травмирующей поверхностью
- Г. Все перечисленное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Текст должен быть подписан понятыми. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

- А. Наружное и внутреннее исследование трупа;
- Б. Судебно-медицинский диагноз;
- В. Оба раздела;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Колющие предметы характеризуются наличием:

- А. Острого конца и удлиненного клинка
- Б. Лезвия и обушка
- В. Двух лезвий
- Г. Острого конца, лезвия и большей массы

В судебно-медицинском отношении новорожденным считают младенца, прожившего после рождения:

- А. Около суток
- Б. Более суток
- В. Трое суток
- Г. До 7 суток

От трения образуется:

- А. Ссадина (осаднение)
- Б. Рваная рана
- В. Ушибленная рана
- Г. Ушибленно-рваная рана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Массивная кровопотеря вследствие травматической ампутации голени. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Квалифицирующим признаком тяжести вреда здоровью, причиненного открытым переломом диафиза большеберцовой кости, является:

- А. Опасность для жизни
- Б. Потеря органа либо утрата им его функций
- В. Длительность расстройства здоровья
- Г. Утрата общей трудоспособности

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Механизм возникновения травмы:

1. Повреждения при падении с большой высоты. Объем формируемого повреждения:

А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;

Б. Множественные повреждения внутренних органов;

В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;

Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;

Д. Симметричность наружных повреждений

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Диагностическими признаками ушибленной раны не являются:

А. Осадненные края

Б. Вывернутые волосяные луковицы

В. Острые концы раны

Г. Соединительно-тканые перемычки между краями и стенками раны

В случаях выстрелов с дальней дистанции может наблюдаться отложение копоти, основным признаком которого является:

А. Отложение копоти на внутренней поверхности первого слоя одежды

Б. Лучеобразное отложение копоти в области входного отверстия огнестрельной раны

В. Наличие свободного промежутка между краем огнестрельной раны и началом отложения копоти

Г. Незначительный радиус отложения копоти, не превышающий 1—1,5 см

В судебно-медицинское понятие «острый предмет» входит:

А. Предмет, имеющий только острый край (лезвие)

Б. Предмет, имеющий только острый конец (острие)

В. Предмет, имеющий большую массу

Г. Предмет способный причинять повреждения острием и (или) лезвием

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Выраженность изгибов. Описание конкретного органа трупа:

А. Описание сердца;

Б. Описание печени;

В. Описание легких;

Г. Описание головного мозга;

Д. Описание селезенки

А. 1-Д

Б. 1-А

В. 1-Б

Г. 1-Г

Д. 1-В

Предельные сроки проведения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств:

А. Не более 1 недели

Б. Не более 2 недели

В. Не более 1 месяца

Г. Не более 2 месяцев

Алкогольное опьянение на течение общего охлаждения тела:

А. Не оказывает действия

Б. Ускоряет процесс

В. Замедляет процесс

Г. Исключает охлаждение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Токсическое химическое соединение:

1. Метанол. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

В результате местного действия кислот в тканях развивается:

- А. Коагуляционный некроз
- Б. Колликовационный некроз
- В. Гнойное воспаление
- Г. Продуктивное воспаление

Отложение дополнительных факторов выстрела на внутренних слоях одежды возможно при условии:

- А. Выстрела в пределах действия копоти и порошинок
- Б. Выстрела с дальней дистанции
- В. Выстрела в пределах действия только порошинок
- Г. Выстрела в упор

Миомаляция после инфаркта миокарда появляется:

- А. В первые сутки
- Б. Через 3-5 дней
- В. Через 7-10 дней
- Г. Через 2-3 недели

Основной причиной возникновения пояска осаднения у входного огнестрельного отверстия является:

- А. Быстрое вращательное движение пули относительно продольной оси
- Б. Большая скорость полета пули в момент ранения человека
- В. Прогибание кожных покровов и трение их о поверхность пули
- Г. Значительная температура снаряда вследствие преодоления сопротивления воздуха

При удавлении петель кровоизлияния в странгуляционной борозде образуются:

- А. По верхнему краю
- Б. По нижнему краю
- В. В дне борозды
- Г. По обоим краям в одинаковой степени

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид морфологического признака.

1. Состояние переднего края. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Из перечисленных признаков на наличие беременности достоверно указывает:

- А. Увеличение размеров матки
- Б. Нагрубание и выделения из молочных желез
- В. Сердцебиение плода
- Г. Увеличение размеров живота

Правило изъятия пальто при обнаружении на подкладке пятен, похожих на сперму, для направления в судебно-биологическую лабораторию:

- А. Вырезать подкладку строго по контуру пятен
- Б. Вырезать подкладку на участке 10х10 см, в центре которого находятся пятна
- В. Произвести соскоб пятен на чистую бумагу
- Г. Изъять пальто целиком

При невозможности направить биологические жидкости на биохимический анализ сразу после взятия, объекты можно хранить:

- А. В холодильнике при температуре +4 - 8 °С не более 10 суток
- Б. В морозильной камере не более 24 ч
- В. При комнатной температуре не более 24 ч
- Г. В холодильнике при температуре +4 - 8 °С не более 1 мес

При проведении судебно-медицинской экспертизы по материалам дел оформляется:

- А. Заключение экспертов
- Б. Заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы
- В. Акт комиссионной судебно-медицинской экспертизы
- Г. Заключение комплексной судебно-медицинской экспертизы

Наличие дефекта ткани в области входного огнестрельного отверстия зависит от:

- А. Величины кинетической энергии огнестрельного снаряда
- Б. Диаметра огнестрельного снаряда
- В. Действия дополнительных факторов выстрела
- Г. Особенности повреждаемых тканей

Для дифференциальной диагностики участка посмертного подсыхания кожи (пергаментного пятна) и ссадины необходимо провести:

- А. Морфологическое исследование
- Б. Рентгенологическое исследование
- В. Цитологическое исследование
- Г. Гистологическое исследование

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Разрешается употреблять специальные медицинские термины. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

- А. Наружное и внутреннее исследование трупа;
- Б. Судебно-медицинский диагноз;
- В. Оба раздела;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Выраженность субплевральных кровоизлияний. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;**
- Б. Описание печени;**
- В. Описание легких;**
- Г. Описание головного мозга;**
- Д. Описание селезенки**

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Образцы крови от трупа для определения ее групповой принадлежности изымаются:

- А. Из брюшной полости, после извлечения органокомплекса
- Б. Из сосудов головного мозга
- В. Из полости сердца или крупных сосудов
- Г. Из пальца

Реакция имеет отрицательное судебно-химическое значение, если:

- А. Отсутствие результата реакции указывает на отсутствие каких-либо групп веществ
- Б. Положительное протекание реакции не позволяет сделать однозначный вывод о присутствующих в объекте веществах
- В. Отсутствие результата реакции указывает на необходимость дополнительных исследований
- Г. Положительное протекание реакции указывает на наличие какого-либо вещества или группы веществ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Резко выраженные признаки мацерации кожи. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-Д

Б. 1-А

В. 1-Б

Г. 1-Г

Для дырчатых переломов плоских костей, причиненных колющим предметом характерно:

А. Наличие сплошного двустороннего краевого скола

Б. Отсутствие краевого скола

В. Наличие скола внутренней пластинки

Г. Обязательное формирование радиальных трещин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

1. Уголовная ответственность за изнасилование предусмотрена статьей УК РФ:

А. 121;

Б. 111;

В. 131;

Г. 201

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

К морфологическим признакам мертворожденности, выявляемым при исследовании трупов младенцев, НЕ относятся:

А. Легкие плотные, равномерной окраски

Б. Кусочки, вырезанные из легких, тонут в воде

В. Гиалиновые мембраны в альвеолах

Г. Альвеолы спавшиеся

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Отделение органов от комплекса. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

К производным гемоглобина НЕ относятся следующие соединения:

- А. Гемохромоген
- Б. Гематопорфирин
- В. Гематин
- Г. Карбоксигемоглобин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид морфологического признака:

1. Соскоб пульпы. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Миоглобин содержится в:

- А. Печени
- Б. Мышечной ткани
- В. Костном мозге
- Г. Эритроцитах

Дополнительный разрез образуется при:

- А. Ударе рукояткой ножа
- Б. Нанесении нескольких ударов ножом
- В. Извлечении клинка
- Г. Наличии у клинка пятки или бородки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Направление судебно-следственных органов. Вид составляемого документа:

- А. Акт судебно-медицинского исследования;
- Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В

Для проведения общего судебно-химического анализа от трупа изымают:

- А. Органы и ткани по усмотрению судебно-медицинского эксперта
- Б. Сердце, легкое, почки, печень, мозг, кровь
- В. Желудок и начальную часть кишечника с содержимым, кровь, мочу, печень, легкое
- Г. Желудок и начальную часть тонкого кишечника с содержимым, часть толстой кишки с содержимым, почку и мочу, печень и желчный пузырь, головной мозг, легкое

При исследовании трупа в случае смерти от удушения кистями рук наблюдаются:

- А. «Полулунные» ссадины и овальные кровоподтеки на шее
- Б. Переломы шейного отдела позвоночника
- В. Кровоизлияния в межпозвоночных дисках
- Г. Карминовый отек легких

Персональный состав врачей судебно-медицинских экспертов для производства экспертизы определяет:

- А. Дознаватель
- Б. Следователь
- В. Заведующий подразделением или Начальник бюро
- Г. Судья

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Изложение данных о состоянии органов носит описательный характер. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Направление главного врача больницы. Вид составляемого документа:

А. Акт судебно-медицинского исследования;

Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

В первые часы окраска кровоподтека:

А. Багрово-красная

Б. Красная с коричневатым оттенком

В. Коричневато-желтоватая

Г. Буровато-зеленоватая

Повреждающим фактором может являться:

А. Любое материальное тело или явление

Б. Возраст потерпевшего

В. Состояние здоровья потерпевшего

Г. Сопутствующие заболевания

При аллергическом (анафилактическом) шоке в крови, бронхиальном секрете, в межклеточных пространствах микроскопически обнаруживается повышенное содержание:

- А. Лимфоцитов
- Б. Моноцитов
- В. Эозинофилов
- Г. Нейтрофилов

Надрывы интимы общих сонных артерий (признак Амюсса) обнаруживается при:

- А. Удавлении петель
- Б. Удавлении руками
- В. Обтурации дыхательных путей
- Г. Повешении в петле

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Свойство острого предмета:

1. Тип заточки клинка. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Постановление судебно-следственных органов. Вид составляемого документа:

- А. Протокол допроса;
- Б. Сообщение о преступлении;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-Г

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-А

К фазам асфиктического процесса не относится:

- А. Инспираторная одышка
- Б. Экспираторная одышка
- В. Терминальное дыхание
- Г. Гипертермия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Травма почки с последующим ее удалением:

- А. тяжкий вред, причиненный здоровью человека;
- Б. Средней тяжести вред здоровью;
- В. Легкий вред здоровью;
- Г. Не устанавливается

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Надрезы эпидермиса у концов раны. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

К повреждениям от резкого изменения барометрического давления относят:

А. Кислородное голодание

Б. Отравление кислородом

В. Множественные переломы ребер и костей таза

Г. Декомпрессионную кессонную болезнь

Типичной локализацией ишемических инфарктов головного мозга при гипертонической болезни и атеросклеротическом поражении мозговых артерий является:

А. Кора больших полушарий мозга

Б. Белое вещество больших полушарий, ствол мозга

В. Мозжечок

Г. Типичная локализация отсутствует

По УПК РФ эксперт не имеет право:

А. Знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы

Б. ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения

В. Участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в процессуальных действиях

Г. Производить допросы по вопросам, относящимся к предмету экспертизы

Не является квалифицирующим признаком тяжкого вреда здоровью:

А. Вред опасный для жизни человека

Б. Прерывание беременности

В. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть

Г. Длительность расстройства здоровья свыше 21 дня

Осмотр трупа на месте его обнаружения организует:

- А. Следователь
- Б. Врач
- В. Врач-специалист в области судебной медицины
- Г. Секретарь суда

"Ятрогении" представляют собой:

- А. Дефекты оказания медицинской помощи, характеризующие ошибочное поведение пациента
- Б. Повреждения, характеризующие противоправность врачебных действий
- В. Причинение вреда здоровью пациента в результате диагностических, лечебных, профилактических мероприятий
- Г. Заболевания, вызванные воздействием ядов

Основной причиной полиморфизма огнестрельных повреждений при выстрелах из обрезов являются:

- А. Увеличение расстояния полета дополнительных факторов выстрела
- Б. Фрагментация огнестрельного снаряда при ударе о тело
- В. Деформация ствола оружия и нарушение правильности полета огнестрельного снаряда
- Г. Уменьшение действия предпулевого воздуха вследствие укорочения ствола оружия

В структуре причин скоропостижной смерти ведущее место занимают болезни:

- А. Сердечно-сосудистой системы
- Б. Центральной и периферической нервной системы
- В. Пищеварительной системы
- Г. Дыхательной системы

Стадия гипостаза трупных пятен обычно наблюдается при давности наступления смерти не более:

- А. 5- 8 часов
- Б. 8-10 часов
- В. 12-14 часов
- Г. 14-20 часов

Компрессия грудной клетки в переднезаднем направлении обычно приводит к образованию симметричных переломов ребер по анатомическим линиям:

- А. Окологрудинным
- Б. Околопозвоночным
- В. Лопаточным
- Г. Подмышечным

Основной механизм кессонной болезни:

- А. Баротравма легких от повышения давления
- Б. Кислородное отравление вследствие повышения давления воздуха в кессоне
- В. Азотное отравление вследствие повышения давления воздуха в кессоне
- Г. Развитие газовой эмболии

Возглавлять судебно-медицинскую экспертную комиссию имеет право:

- А. Главный врач
- Б. Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы
- В. Прокурор района
- Г. Начальник медицинского учреждения

Судебно-медицинский эксперт несет ответственность, предусмотренную статьями УК РФ, при:

- А. Заведомо ложное заключение эксперта
- Б. Отказе эксперта от дачи заключения
- В. Уклонении эксперта от дачи заключения
- Г. Не выходе эксперта на работу

Для локальных переломов ребер НЕ характерны:

- А. Ровные края излома на внутренней костной пластинке
- Б. Разрыв пристеночной плевры в области перелома
- В. Повреждение легкого отломками ребер
- Г. Ровные края излома на наружной костной пластинке

При заборе биоматериала от трупов для молекулярно-генетического исследования:

- А. В качестве консерванта используется формалин
- Б. В качестве консерванта используется этанол
- В. В качестве консерванта используется изопропанол
- Г. Консерванты не используются

Внутренние органы человека, через которые проходят опасные для жизни пути (петли) электрического тока:

- А. Головной мозг
- Б. Сердце, головной мозг
- В. Сердце, легкие
- Г. Легкие, головной мозг, печень

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Постановление органов дознания. Вид составляемого документа:

А. Акт судебно-медицинского исследования;

Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-Г

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-А

Легочную и желудочно-кишечную пробы проводят для установления:

А. Доношенности

Б. Установления сроков внутриутробной жизни

В. Жизнеспособности плода

Г. Продолжительности внеутробной жизни и живорожденности

Исследуя труп новорожденного, срединный разрез производят от:

А. Подбородка

Б. Вырезки грудины

В. Красной каймы нижней губы

Г. Щитовидного хряща гортани

Смертельное отравление кислородом развивается при дыхании:

А. Чистым кислородом с повышенным парциальным давлением

Б. Чистым кислородом с пониженным парциальным давлением

В. Газовыми смесями с пониженным парциальным давлением кислорода

Г. Газовыми смесями без их увлажнения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Механизм возникновения черепно-мозговой травмы:

1. Черепно-мозговая травма при ударе предметом с ограниченной поверхностью соударения. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Дополнительные факторы выстрела обнаруживаются только по ходу раневого канала при выстреле с:

- А. Плотным упором
- Б. Неполным упором.
- В. Близкой дистанции.
- Г. Неблизкой дистанции

Анализ специфических вариантов гена амелогенина производится с целью:

- А. Установление половой принадлежности
- Б. Установление групповой принадлежности
- В. Установление отцовства
- Г. Установление материнства

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие полых органов. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Содержание гликогена и глюкозы в печени и в мышцах при общем действии низкой температуры:

- А. Повышается
- Б. Остается неизменным
- В. Может варьировать от повышения до снижения
- Г. Снижается

Наиболее характерный признак в случае падения из положения стоя навзничь:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы
- Б. Множественные повреждения внутренних органов
- В. Дырчатый перелом костей свода черепа
- Г. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара

К ранним трупным изменениям **НЕ** относятся:

- А. Трупное высыхание
- Б. Охлаждение трупа
- В. Трупное окоченение
- Г. Суправитальные реакции

Для биохимических исследований необходимо изымать биологические жидкости из трупа:

- А. Не позднее 7 суток после наступления смерти
- Б. Не позднее первых 24 часов после наступления смерти
- В. Не позднее 3 суток после наступления смерти
- Г. Не позднее 10 суток после наступления смерти

На прижизненное пребывание потерпевшего в очаге пожара указывает:

- А. Наличие копоти в трахее и бронхах
- Б. Термический ожог верхних дыхательных путей
- В. Наличие копоти в пазухе основной кости черепа
- Г. Все вышеперечисленное

Гистологическое исследование кожи из области странгуляционной борозды позволяет установить:

- А. Количество оборотов петли на шее
- Б. Причину смерти
- В. Прижизненность формирования странгуляционной борозды
- Г. Характеристику петли

В обязанности специалиста в области судебной медицины, вызванного для участия в следственных действиях, НЕ входит:

- А. Явиться по вызову следователя и участвовать в производстве следственного действия
- Б. Содействовать следователю в обнаружении и закреплении изъятых доказательств
- В. Давать пояснения по поводу выполняемых им действий
- Г. Давать заключение

Секвенирование - это:

- А. Установление нуклеотидной последовательности ДНК
- Б. Установление количества ДНК в образце
- В. Очистка препарата ДНК от ингибиторов
- Г. Установление групповой принадлежности

Положительный результат пробы Бокариуса свидетельствует:

- А. О прижизненности странгуляционной борозды
- Б. О посмертном происхождении странгуляционной борозды
- В. Доказательного значения не имеет
- Г. О давности смерти

Смерть при отравлении снотворными веществами наступает в результате:

- А. Паралича дыхательного центра
- Б. Паралича сосудодвигательного центра
- В. Паралича дыхательной мускулатуры и диафрагмы
- Г. Острой почечной недостаточности, уремии

Микроскопические изменения органов и тканей, которые НЕ наблюдаются при поражении молнией:

- А. Нарушения кровообращения и сосудистой проницаемости в головном мозге и внутренних органах
- Б. Множественные периваскулярные кровоизлияния и капиллярное полнокровие в подкорковых узлах головного мозга
- В. Пикноз ядер миоцитов, гепатоцитов и эпителии извитых канальцев почек
- Г. Отек и разрыхление слизистого и подслизистого слоев стенки желудка и кишок

Назовите один из обязательных методов исследования при огнестрельной травме:

- А. Электронно-микроскопический
- Б. Метод «цветных отпечатков»
- В. Биохимический
- Г. Ботанический

Метгемоглобинемия является ведущим симптомом отравления:

- А. Цианистым калием
- Б. Этиленгликолем
- В. Мышьяковистым водородом
- Г. Бертолетовой солью

Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью производится на основании:

- А. Направления лечебно-профилактического учреждения
- Б. Предложения МСЭК
- В. Направления органов следствия
- Г. Постановления правоохранительных органов

От удара тупым твердым предметом с неограниченной поверхностью на костях черепа образуются переломы:

- А. Террасовидные
- Б. Вдавленные
- В. Многооскольчатые
- Г. Винтообразные

При подозрении на отравление ФОС целесообразно исследование:

- А. Содержание мочевины, креатинина
- Б. Содержание метгемоглобина
- В. Активность эритроцитарной холинэстеразы
- Г. Глюкозы и миоглобина

Денатурация ДНК происходит при температуре:

- А. 72 градусов С
- Б. 55 градусов С
- В. 95 градусов С
- Г. 75 градусов С

К механизмам действия на организм человека фосфорорганических соединений относится:

- А. Блокирование сульфгидрильных групп
- Б. Ингибирование цитохромоксидаз
- В. Образование свободных радикалов
- Г. Угнетение холинэстеразы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. На месте происшествия (обнаружения трупа) врач-специалист в области судебной медицины осуществляет работу:

- А) на основании указаний следователя.
- Б) по определению суда.
- В) по собственной инициативе.
- Г) верно все.
- Д) верно А,
- Б.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Преобладание глубины раневого канала над длиной кожной раны. Свойства травмирующего предмета:

- А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;
- Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Б
- Б. 1-А
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Достоверным признаком огнестрельности повреждений является:

- А. Сквозной характер ранения
- Б. Дефект ткани
- В. Дырчатый перелом
- Г. Порох и продукты его сгорания

Направление удара колющим предметом устанавливается по:

- А. Направлению длинника раны
- Б. Форме раны
- В. Направлению раневого канала
- Г. Разной глубине раны у ее концов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Состояние клапанов. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1-В
- Д. 1-Д

Оптимальное число определений температуры тела трупа в течение часа:

- А. Однократное
- Б. Двукратное
- В. Четырехкратное
- Г. Шестикратное

При ожоге 2-й степени морфологические изменения возникают в:

- А. Толще дермы
- Б. Дерме и подкожной жировой клетчатке
- В. Глубоких тканях
- Г. Эпидермисе

Основным поражающим фактором при «холостом» выстреле является:

- А. Механическое действие копоти и порошинок
- Б. Механическое действие частиц металла
- В. Механическое действие пороховых газов
- Г. Химическое действие пороховых газов

К условиям окружающей среды, способствующим мумификации трупа, не относятся:

- А. Повышенная температура
- Б. Хорошая аэрация
- В. Сухая, пористая почва
- Г. Влажная, плотная почва

Исследуя труп младенца, судебно-медицинский эксперт должен ответить на следующие вопросы:

- А. Является ли младенец новорожденным
- Б. Является ли он живорожденным
- В. Какова причина смерти
- Г. Всё вышеперечисленное

Ссадина - это повреждение:

- А. Не распространяющееся глубже сосочкового слоя дермы
- Б. Распространяющееся глубже сосочкового слоя дермы
- В. Образующееся по механизму растяжения
- Г. Образующееся по механизму сдавления

Тип утопления, при котором отсутствуют выраженные диагностические признаки:

- А. Аспирационный
- Б. Спастический (асфиктический)
- В. Рефлекторный (синкопальный)
- Г. Смешанный

К аспирационной относят асфиксию от:

- А. Удушения руками
- Б. Закрытия рта и носа инородными телами
- В. Попадания в дыхательные пути сыпучих веществ, жидкостей
- Г. Сдавления груди и живота

К деструктивным ядам не относят:

- А. Сулему (дихлорид ртути)
- Б. Каломель (хлорид ртути)
- В. Мышьяковистый ангидрид
- Г. Сульфат бария

Инттоксикация - это:

- А. Способность организма переносить воздействие яда без развития токсического эффекта
- Б. Способность вещества вызывать нарушения физиологических функций организма, в результате чего возникают симптомы интоксикации (заболевания), а при тяжелых поражениях - его гибель
- В. Накопление биологически активного вещества (материальная кумуляция) или вызываемых им эффектов (функциональная кумуляция) при повторных воздействиях ядов
- Г. Патологическое состояние, вызванное общим действием на организм токсических веществ эндогенного или экзогенного происхождения

Для механизма «растяжение» характерны:

- А. Односторонность, центростремительность
- Б. Односторонность, центробежность
- В. Двусторонность, центробежность
- Г. Двусторонность, центростремительность

Наиболее характерным признаком падения со значительной высоты является:

- А. Разрывы внутренних органов
- Б. Компрессионные переломы тел позвонков
- В. Переломы костей голеней
- Г. Кровоизлияния в "подвешивающий аппарат" внутренних органов

Электрометки на ладонях и стопах обычно НЕ имеют:

- А. Плотную поверхность
- Б. Валикообразно возвышающиеся края
- В. Отслоение дермы с образованием пузырей
- Г. Серовато-белую и серовато-желтоватую окраску

Врач будет привлечен к уголовной ответственности в следующем случае:

- А. Неблагоприятный исход обусловлен недостаточными знаниями врача, несовершенством методов диагностики и атипичностью заболевания
- Б. Смерть больного обусловлена профессиональным невежеством врача
- В. Врач объективно не мог предвидеть неблагоприятного исхода назначенного лечения
- Г. Смерть больного обусловлена поздним обращением за медицинской помощью

Условием образования оксида углерода (II) являются:

- А. Горение углеродсодержащих материалов в условиях недостатка кислорода
- Б. Горение углеродсодержащих материалов в условиях низких температур
- В. Горение углеродсодержащих материалов в условиях высоких температур
- Г. Интенсивное горение углеродсодержащих материалов

Края выходной огнестрельной пулевой раны:

- А. Ровные и покатые
- Б. Мелкофестончатые, часто завернуты внутрь
- В. Неровные, часто вывернуты наружу
- Г. Ровные, разможенные

Вторичная структура ДНК:

- А. Двойная спираль
- Б. Кольцевая одноцепочечная
- В. Кольцевая двойная спираль
- Г. Линейная одноцепочечная

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы тупым предметом:

1. Ушибленная рана мягких тканей головы. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

«Повреждение» - это:

- А. Нарушение анатомической целостности или физиологической функции тканей
- Б. Повреждение, возникшее от воздействия тупого (-ых) твердого (-ых) предмета (-ов)
- В. Нарушение целостности кожных покровов и мягких тканей от действия химического вещества на слизистые оболочки
- Г. Расстройство здоровья от резкого повышения температуры тела

При концентрации карбоксигемоглобина в крови на уровне 80-90% наблюдают следующие клинические признаки:

- А. Никаких симптомов отравления не наблюдают
- Б. Тяжелая головная боль, туман в глазах, тошнота, рвота, коллапс
- В. Кома, судороги, учащение сердечной деятельности и дыхания. Возможна смерть
- Г. Смерть меньше, чем за час дыхания

Для установления прижизненного (посмертного) образования ран поврежденные ткани необходимо направить в лабораторию:

- А. Химическую
- Б. Физико-техническую
- В. Спектральную
- Г. Гистологическую

Хрящ с повреждением следует сохранять для последующего микротрасологического исследования в:

- А. Растворе формалина
- Б. Этанол
- В. Высушенном виде
- Г. Глицерине

Идиомускулярная опухоль в скелетных мышцах трупа, находящегося в условиях комнатной температуры, вызывается в пределах:

- А. До 6-8 часов после смерти
- Б. 9-10 часов после смерти
- В. 13-18 часов после смерти
- Г. 18-24 часа после смерти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Оба конца раны острые. Причинение травмы:

- А. Своей рукой;
- Б. Чужой рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие перикарда. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1-В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Токсическое химическое соединение:

1. Цианистый калий. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Безусловным доказательством смерти от аспирационной асфиксии является обнаружение аспирационных масс в:

- А. Ротовой полости
- Б. Трахее и крупных бронхах
- В. Бронхах среднего калибра
- Г. Мелких бронхах и альвеолах

Действие режущей кромки колюще-режущего предмета проявляется:

- А. Осаднением
- Б. Кровоизлиянием
- В. Лезвийным разрезом
- Г. Тупым концом

Препарат кожи с повреждением следует сохранять для последующего медико-криминалистического исследования:

- А. Фиксированным в формалине
- Б. Фиксированным в спирте
- В. Фиксированным в ацетоне
- Г. В высушенном виде

Судебно-медицинская экспертная комиссия НЕ решает вопрос:

- А. О правильности лечения больного
- Б. О виновности врача в неблагоприятном исходе лечения
- В. О причине смерти больного
- Г. О причинно-следственной связи между проводившим лечением и наступлением смерти

Достоверными признаками смерти, устанавливаемыми на месте обнаружения трупа, НЕ являются:

- А. Признак Белоглазова
- Б. Трупные пятна и трупное окончание
- В. Снижение температуры тела ниже 30 градусов по Цельсию
- Г. Поздние трупные изменения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Наличие грубого порока развития. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г

Исследование влагалищного содержимого на наличие сперматозоидов имеет смысл, если после полового акта прошло не более:

- А. 1 дня
- Б. 2-3 дней
- В. 4-5 дней
- Г. 6-7 дней

Наиболее частые причины скоропостижной смерти у пожилых людей:

- А. Заболевания дыхательной системы
- Б. Заболевания сердечно-сосудистой системы
- В. Заболевания пищеварительной системы
- Г. Заболевания мочевыделительной системы

Смерть в первые сутки при облучении высокими дозами ионизирующей радиации наступает от:

- А. «Лучевого шока»
- Б. Обширных лучевых поражений кожи
- В. Разрушения защитных сил организма и инфекционных осложнений
- Г. Совокупности всех перечисленных причин

При ожоге кожи 1-й степени морфологические изменения возникают в:

- А. Эпидермисе
- Б. Толще дермы
- В. Подкожной жировой основе и коже
- Г. Глубоких тканях

Смертельной концентрацией карбоксигемоглобина в крови является:

- А. 20%
- Б. 40%
- В. 50%
- Г. Более 50%

Отделы, не предусмотренные в бюро судебно-медицинской экспертизы:

- А. Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов с гистологическим отделением
- Б. Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц
- В. Отдел судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств
- Г. Отдел судебно-биологической экспертизы

Поза озябшего человека («эмбриона») у лиц, погибших от общего переохлаждения в состоянии выраженного алкогольного опьянения, наблюдается:

- А. Практически всегда
- Б. Иногда
- В. Практически не наблюдается
- Г. Алкоголь не имеет значение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Травматическая ампутация 1 пальца левой кисти у правши. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Врач может быть привлечен к уголовной ответственности за неоказание неотложной помощи больному:

- А. При остром гангренозном аппендиците
- Б. При кровотечении из поверхностных вен предплечья
- В. При прободной язве желудка
- Г. При ущемленной грыже

К специфическим морфологическим признакам гипертонической болезни относят признаки НЕ относится:

- А. Склероз мозговых артерий
- Б. Кардиосклероз
- В. Гипертрофия левого желудочка сердца
- Г. Артериолонефросклероз

В условиях комнатной температуры трупные пятна появляются в среднем через:

- А. 30-40 минут после наступления смерти
- Б. 2-4 часа после наступления смерти
- В. 7-12 часов после наступления смерти
- Г. 18-24 часа после наступления смерти

Основной причиной горной (высотной) болезни являются:

- А. Понижение атмосферного давления
- Б. Снижение содержания кислорода в воздухе на высоте
- В. Снижение парциального давления кислорода в воздухе на высоте
- Г. Баротравма легких

Смазка (осалка) в области входного отверстия обнаруживается:

- А. При каждом выстреле
- Б. При первом и втором выстреле
- В. При выстрелах с близкого расстояния
- Г. При выстрелах с неблизкого расстояния

Возникновение идиомускулярной опухоли в условиях комнатной температуры возможно при давности наступления смерти не более:

- А. 5-6 часов
- Б. 6-7 часов
- В. 7-8 часов
- Г. 8-9 часов

Объекты судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств хранятся:

- А. В канцелярии бюро
- Б. У врача судебно-медицинского эксперта судебно-биологического отделения, производящего экспертизу
- В. У заведующего судебно-биологическим отделением
- Г. У старшей медицинской сестры судебно-биологического отделения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Не разрешается употреблять специальные медицинские термины. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

- А. Наружное и внутреннее исследование трупа;
- Б. Судебно-медицинский диагноз;
- В. Оба раздела;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Под «общей трудоспособностью» подразумевается:

- А. Возможность человека к самообслуживанию
- Б. Способность выполнять труд неограниченный период
- В. Способность выполнять квалифицированные виды труда
- Г. Способность выполнять неквалифицированный труд

Для механизма «сдавление» характерны:

- А. Односторонность, центростремительность
- Б. Центробежность
- В. Двусторонность, центростремительность
- Г. Односторонность, центробежность

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Характер скоса обушка. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

К значительному скоплению жидкой или свернувшейся крови, образующейся на непитающей поверхности, относят ____ крови

- А. Лужу
- Б. Пятна
- В. Брызги
- Г. Мазок

При прямой травме от удара по лучевой стороне предплечья образуется переломо-вывих галеацци, характеризующийся переломом

- А. Бедренной кости с разрывом связок коленного сустава и вывихом в этом суставе
- Б. Лучевой кости в нижней трети с разрывом дистального лучелоктевого сустава и вывихом в этом суставе
- В. Лучевой кости в типичном месте с вывихом ладьевидной кости
- Г. Плечевой кости и вывихом ключицы

В результате попадания жидкой крови под влиянием силы поверхностного натяжения в щель между двумя близко расположенными поверхностями образуются

- А. Брызги
- Б. Потёки
- В. Лужи
- Г. Затеки

Причиной остановки дыхания при смерти от электротравмы может быть, в том числе

- А. Сдавление продолговатого мозга
- Б. Обтурация дыхательных путей
- В. Гиповентиляция ствола мозга
- Г. Тоническое сокращение диафрагмы

Второй экземпляр протокола осмотра места происшествия передается

- А. Криминалисту
- Б. Адвокату
- В. Понятым
- Г. Судебно-медицинскому эксперту

Расстояние от пупка до лонного сочленения доношенного новорожденного младенца составляет (в см)

- А. 17,2-17,3
- Б. 12-13
- В. 9-10
- Г. 6,7-6,8

По результатам плавательной пробы с желудочно-кишечным трактом можно установить

- А. Доношенность
- Б. Причину смерти
- В. Зрелость
- Г. Продолжительность внеутробной жизни

Растрескивание костей черепа при оледенении головного мозга вследствие увеличения его объема является признаком

- А. Пупарева
- Б. Касьянова
- В. Краевского
- Г. Райского

Закрытую тупую травму груди с размождением бронхов квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Опасное для жизни
- Б. Стойкой утраты общей трудоспособности
- В. Угрожающее жизни состояние
- Г. Незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

Перелом дуги одного поясничного позвонка с синдромом «конского хвоста» по степени вреда здоровью квалифицируют, как повреждение, причинившее

- А. Вред здоровью средней степени тяжести
- Б. Незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- В. Тяжкий вред здоровью
- Г. Легкий вред здоровью

Дегидратацией кожи и поверхностно расположенных слизистых, обусловленных испарением влаги с поверхности тела умершего, является

- А. Трупное окоченение
- Б. Охлаждение трупа
- В. Трупный аутолиз
- Г. Высыхание трупа

Закрытая тупая травма правого бедра с разрывом бедренной вены квалифицируется как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Не причинившая
- В. Тяжкий
- Г. Лёгкий

При проведении судебно-медицинской экспертизы гнилостноизмененного трупа обязательным основным объектом для исследования на диатомовый планктон (альгологический анализ) с целью подтверждения факта наступления смерти в результате утопления в воде является

- А. Затылочная кость
- Б. Ключица
- В. Ребро
- Г. Костный мозг

Травматическое периферическое повреждение тройничного нерва, повлекшее значительное нарушение его функции, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 15%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Опасный для жизни
- В. Легкий
- Г. Тяжкий

Действие горящих смол чаще всего приводит к образованию ожогов ____ степени

- А. 2
- Б. 1
- В. 4
- Г. 3

Закрытую тупую травму таза с разможением матки, полученную в результате мотоциклетной травмы, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Длительный
- В. Средней тяжести
- Г. Лёгкий

Повреждение «конского хвоста», повлекшее гипералгезию, нарушение рефлекторной дуги, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 40%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Тяжкий
- В. Средней тяжести
- Г. Легкий

Повреждение крестцового сплетения, повлекшее отсутствие движений в нижних конечностях и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 70%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Опасный для жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

К признакам снижения температуры тела ниже 32°С относят

- А. Судороги
- Б. Нарушение памяти
- В. Прекращение мышечной дрожи
- Г. Отсутствие двигательных и волевых функций

К действиям, причиняющим страдания или заболевания путем длительного лишения тепла, относят

- А. Стресс
- Б. Истязания
- В. Мучения
- Г. Побои

Примерное соотношение размера поражения наружных половых органов по правилу «девятки» составляет (в процентах)

- А. 1
- Б. 14
- В. 18
- Г. 9

Сопроводительное письмо к заключению эксперта должно содержать необходимые

- А. Паспортные данные руководителя ГСМЭУ
- Б. Реквизиты следователя
- В. Реквизиты ГСМЭУ
- Г. Персональные данные эксперта

Лобная плагиоцефалия характеризуется преждевременным синостозированием

- А. Венечного шва черепа с двух сторон
- Б. Височно-скулового шва с одной стороны
- В. Затылочно-сосцевидного шва черепа с одной стороны
- Г. Венечного шва черепа с одной стороны

Повреждение «конского хвоста» со значительным нарушением функции тазовых органов, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 60%, квалифицируют как причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Легкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Тяжкий

Закрытую травму живота с развитием острой печеночной недостаточности тяжелой степени квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Лёгкий
- В. Тяжкий
- Г. Длительный

Повреждение плечевого сплетения, повлекшее нарушение чувствительности, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Тяжкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Средней тяжести

Закрытую тупую травму таза с отрывом фаллопиевой трубы, полученную в результате транспортной травмы, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Длительный
- Б. Средней тяжести
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

Закрытую тупую травму таза с отрывом предстательной железы, полученную в результате транспортной травмы, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Длительный
- Б. Средней тяжести
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

При монолобулярном циррозе печени поражается

- А. 4 Печеночных долики
- Б. 3 Печеночных долики
- В. 2 Печеночных долики
- Г. 1 Печеночная доляка

Посттравматическое удаление одного глазного яблока, обладавшего зрением до травмы, оценивается по признаку

- А. Развития угрожающего жизни состояния
- Б. Длительности расстройства здоровья
- В. Опасности для жизни
- Г. Стойкой утраты общей трудоспособности

Случаи с содержанием сперматозоидов 10-19 млн/мл относят к

- А. Некроспермии
- Б. Олигоспермии 1 степени
- В. Астеноспермии
- Г. Азооспермии

Тупая закрытая травма живота, осложнившаяся развитием сепсиса, квалифицируется как вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Не причинившая
- В. Лёгкий
- Г. Средней тяжести

Видом травмирующего воздействия является

- А. Расслаивание
- Б. Раздвигание
- В. Удар
- Г. Рассечение

Обнаружение кокаина в биологическом материале осуществляют посредством

- А. Метода цветных отпечатков
- Б. Рентгенфлюоресценции
- В. Фотометрии
- Г. Тонкослойной хроматографии

Ухудшение состояния здоровья человека, обусловленное дефектом оказания медицинской помощи, как причинение вреда здоровью

- А. Рассматривается
- Б. Не рассматривается
- В. Рассматривается только в случае смерти пациента
- Г. Рассматривается только при наличии тяжкого вреда

К морфологическим признакам краев перелома в зоне долома относят

- А. Ровные, хорошо сопоставимые края
- Б. Зернистую поверхность
- В. Отвесные, хорошо сопоставимые края
- Г. Выкрашивание и отщеп компактного вещества

Посттравматическое резкое ограничение движений в левых локтевом и плечевом суставах, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 35%, квалифицируют как причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Тяжкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Лёгкий

К исследованиям для подтверждения смертельного отравления цианидами относят

- А. Гистохимическое
- Б. Судебно-химическое
- В. Гистологическое
- Г. Цитологическое

При комнатной температуре охлаждение трупа составляет примерно (в градусах по цельсию) в час

- А. 3
- Б. 2
- В. 4
- Г. 1

Острая лучевая болезнь средней степени возникает при общей поглощенной дозе облучения (в греях)

- А. 0,5-1,5
- Б. 5,0-7,0
- В. 7,5-9,5
- Г. 2,0-4,0

Хроническим заболеванием, возникающим в результате нарушения, в том числе жирового обмена, и характеризующимся поражением артерий мышечноэластического типа в виде очагового отложения в интиме белков является

- А. Атеросклероз
- Б. Инфаркт
- В. Инсульт
- Г. Некроз

Травматическую экзартикуляцию большого пальца правой кисти, равную 25% стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируют как повреждение

- А. Причинившее легкий вред здоровью
- Б. Причинившее тяжкий вред здоровью
- В. Не причинившее вред здоровью
- Г. Причинившее вред здоровью средней тяжести

Обязательному отражению в протоколе осмотра трупа на месте его обнаружения подлежит описание

- А. Позы трупа
- Б. Внутренних органов
- В. Направления раневого канала
- Г. Глубины раны

При температуре окружающей среды, равной +20°С, время развития трупного охлаждения длится до (в часах)

- А. 10-15
- Б. 15-20
- В. 24-30
- Г. 20-24

К наружным признакам новорожденности относят

- А. Расположение яичек в мошонке
- Б. Пушковые волосы в области плеч
- В. Сыровидную смазку в естественных складках кожи тела
- Г. Упругость хрящей носа

При развитии экссудативного воспаления в зоне повреждения образуется первым

- А. Фибрин
- Б. Гнойный экссудат
- В. Геморрагический экссудат
- Г. Фибринстабилизирующий фактор

Формирование на коже пузырей с кровянистым содержимым без некроза мягких тканей свидетельствует о _____ степени обморожения

- А. 3
- Б. 4
- В. 2
- Г. 1

К автомобильной травме относят повреждения, полученные при

- А. Ударе о предметы стоящего автомобиля
- Б. Падении человека на проезжую часть дороги
- В. Сдавлении тела между движущимися транспортными средствами (автомобилями)
- Г. Падении на стоящий автомобиль

Перелом височной кости квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Тяжкий
- В. Длительный
- Г. Лёгкий

Об ударе по спине твёрдым тупым предметом с круглой травмирующей поверхностью под углом 90 градусов можно судить при обнаружении ссадины _____ формы

- А. Кольцевидной
- Б. Полукруглой
- В. Звёздчатой
- Г. Дуговидной

Объем, способы, приемы, методы и методики экспертных исследований при вскрытии трупа определяет

- А. Следователь
- Б. Руководитель ГСЭУ
- В. Судья
- Г. Врач – судебно-медицинский эксперт

Кислородное голодание наблюдается при переходе в условия пониженного барометрического давления и приводит к развитию ____ болезни

- А. Меньера
- Б. Кессонной
- В. Горной
- Г. Лучевой

Шаговое напряжение возникает при касании обеими ногами земли на расстоянии _____ см друг от друга

- А. 120-145
- Б. 60-80
- В. 150-170
- Г. 95-120

Реакцию зрачков на введение вегетотропных препаратов можно наблюдать при давности наступления смерти, не превышающей (в часах)

- А. 6-8
- Б. 1-2
- В. 20-24
- Г. 15-18

Перелом-вывих галеацци по степени вреда здоровью квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Опасный для жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Лёгкий

Установление последовательности ранений груди выполняется на основании признака

- А. Никифорова – Шавиньи
- Б. Сабинского
- В. Рассказова – Лукомского – Пальтауфа
- Г. Деменчака

Смерть от острого отравления этиловым спиртом может наступить от угнетения дыхательного центра

- А. Гипофиза
- Б. Мозжечка
- В. Продолговатого мозга
- Г. Среднего мозга

При повешении странгуляционная борозда в типичном случае бывает

- А. Косонисходящая
- Б. Множественная
- В. Косовосходящая
- Г. Горизонтальная

Повреждение «конского хвоста», повлекшее лёгкие расстройства чувствительности без нарушения функции тазовых органов и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Тяжкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Легкий

Закрытый перелом лодыжек обеих берцовых костей в сочетании с переломом суставной поверхности большеберцовой кости и разрывом дистального межберцового синдесмоза с подвывихом и вывихом стопы правой нижней конечности, вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, квалифицируется как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Опасный для жизни
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

При производстве судебно-медицинской экспертизы лиц мужского пола обычно устанавливают способность к

- А. Вынашиванию ребенка
- Б. Зачатию ребенка
- В. Рождению ребенка
- Г. Половому сношению

Рану волосистой части головы, проникающую в полость черепа без повреждения вещества головного мозга, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Средней тяжести
- В. Длительный
- Г. Лёгкий

В протоколе осмотра места происшествия могут быть отражены

- А. Предложения понятых по алгоритму осмотра
- Б. Замечания участников следственного действия
- В. Допросы свидетелей
- Г. Допросы понятых

Травматический отрыв мочеточника квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Стойкой утраты общей трудоспособности
- Б. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- В. Угрожающее жизни состояние
- Г. Опасное для жизни

Причиной смерти при резаных повреждениях шеи может быть

- А. Воздушная эмболия
- Б. Анафилактический шок
- В. Апоплексия головного мозга
- Г. Странгуляционная асфиксия

При подозрении на менингококковую инфекцию кроме стандартного рекомендуемого перечня объектов дополнительно следует изъять

- А. Мозговые оболочки
- Б. Легкие
- В. Почки
- Г. Лимфатические узлы

Для диагностики прижизненного образования странгуляционной борозды выполняют пробу

- А. Галена – Шрейера
- Б. Гоппе – Зейлера
- В. Владимирского
- Г. Бокариуса

Травматическое периферическое повреждение подъязычного нерва, повлекшее умеренное нарушение его функции, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Опасный для жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Исходом несмертельных отравлений едкими ядами является

- А. Спленомегалия
- Б. Стеноз пищевода
- В. Артериальная гипертензия
- Г. Простатит

Квалифицирующим признаком установления тяжести вреда здоровью в случае развития травматического шок III степени является

- А. Опасность для жизни
- Б. Кратковременное расстройство здоровья
- В. Угрожающее жизни состояние
- Г. Длительное расстройство здоровья

Травму живота с отрывом печени квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Опасное для жизни
- Б. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- В. Стойкой утраты общей трудоспособности
- Г. Угрожающее жизни состояние

Каломель относится к ____ средствам

- А. Жаропонижающим
- Б. Спазмолитическим
- В. Гипотензивным
- Г. Слабительным

Повреждение спинного мозга на уровне шейного отдела позвоночника, повлекшее грубые расстройства чувствительности, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 100%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Опасный для жизни
- В. Легкий
- Г. Средней тяжести

Закрытая тупая сочетанная травма груди и живота с разрывом аорты квалифицируется как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Тяжкий
- В. Не причинившая
- Г. Лёгкий

К группе психоаналептиков относят

- А. Кофеин
- Б. Фенобарбитал
- В. Циклобарбитал
- Г. Ноксирон

К признакам снижения температуры тела ниже 29-31°С относят

- А. Дизартрию
- Б. Отморожения I-II степени
- В. Брадикардию
- Г. Ознобление кожи

В динамической стадии осмотра трупа допускается

- А. Исследование раневого канала
- Б. Изъятие крови из крупных сосудов
- В. Вскрытие головного мозга
- Г. Переворачивание трупа

Наиболее характерными признаками падения со значительной высоты являются

- А. Переломы бедренных костей
- Б. Переломы костей голеней
- В. Компрессионные переломы тел позвонков
- Г. Кровоизлияния в подвешивающий аппарат внутренних органов

Механизм образования электроожогов связан с _____ действие электрического тока, в том числе

- А. Механическим
- Б. Световым
- В. Тепловым
- Г. Ударным

Трупную кровь для микробиологического исследования берут из

- А. Подключичной артерии
- Б. Нижней поллой вены
- В. Аорты
- Г. Сердца

«Гофрирование» одежды при транспортной травме возникает в результате

- А. Растяжения
- Б. Трения
- В. Сдавления
- Г. Кручения

Умеренно выраженное ограничение движений в тазобедренном суставе при его сгибании от 70° до 80°, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 25%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Угрожающий жизни
- Б. Тяжкий
- В. Средней тяжести
- Г. Легкий

К медицинским критериям квалифицирующих признаков в отношении средней тяжести вреда здоровью относят

- А. Заболевание токсикоманией
- Б. Угрожающее жизни состояние
- В. Длительное расстройство здоровья
- Г. Кратковременное расстройство здоровья

Около 10 процентов поступившего в организм алкоголя в неизменном виде выводится, в том числе с

- А. Мочой
- Б. Слюной
- В. Кровью
- Г. Калом

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения осуществляется с участием

- А. Врача-специалиста в области судебной медицины
- Б. Санитара
- В. Среднего медицинского работника
- Г. Работника бюро ритуальных услуг

Относительно высокая концентрация этанола в желудочном содержимом, более высокий уровень его содержания в моче по отношению к крови означает о том, что от приема спиртных напитков до наступления смерти прошло не менее (в часах)

- А. 9
- Б. 7
- В. 5
- Г. 3

Повреждение спинного мозга на уровне грудного отдела позвоночника, повлекшее нарушения дыхания и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 100%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Опасный для жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Легкий

Огнестрельное пулевое ранение, проникающее в позвоночный канал грудного отдела позвоночника, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Длительный
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Перелом верхней стенки правой глазницы квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Длительный
- В. Лёгкий
- Г. Средней тяжести

Смертельная концентрация карбоксигемоглобина в крови составляет (в процентах)

- А. 30
- Б. 20
- В. 60
- Г. 40

Образование ссадины или кровоподтека наблюдается при _____ действии пули

- А. Клиновидном
- Б. Пробивном
- В. Разрывном
- Г. Ушибающем

При определении половой принадлежности крови половые различия обнаруживаются в ядрах сегментоядерных лейкоцитов, в которых имеются полоспецифические отростки типов а и

- А. С
- Б. Д
- В. Б
- Г. Е

При вскрытии трупа по методу шора внутренние органы

- А. Извлекаются и исследуются в пяти топографических комплексах
- Б. Вскрываются и исследуются на месте, без извлечения из трупа
- В. Извлекаются единым целым и исследуются без отделения от органокомплекса
- Г. Извлекаются и исследуются отдельно

Форма и размерные характеристики поперечного сечения колющего предмета отражаются в повреждении

- А. Большого сальника
- Б. Стенки кишечника
- В. Стенки желудка
- Г. Перикарда

В месте контакта с источником электрического тока образуются

- А. Гематомы
- Б. Электроожоги
- В. Раны
- Г. Кровоподтеки

В процессе проведения акушерско-гинекологического исследования эксперт берет, в том числе содержимое

- А. Желудка
- Б. Влагалища
- В. Толстой кишки
- Г. Тонкой кишки

Травматическое разможнение почки квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Стойкой утраты общей трудоспособности
- Б. Опасное для жизни
- В. Угрожающее жизни состояние
- Г. Незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

Острое отравление неустановленным наркотическим веществом, осложнившееся комой II степени, квалифицируется как вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Тяжкий
- В. Средней тяжести
- Г. Не причинившее

Повреждение шейного сплетения, повлекшее атрофию мышц, снижение силы, резкое расстройство чувствительности, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 40%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Легкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Средней тяжести

Признаком прижизненности при травме груди является

- А. Повреждение легких концами отломков ребер
- Б. Подкожная эмфизема
- В. Сгибательный перелом грудины
- Г. Разрыв медиастинальной плевры

При поражении электрическим током возникновении фибрилляции сердца связано, в том числе с поражением

- А. Коронарных артерий
- Б. Аорты
- В. Верхней поллой вены
- Г. Сонных артерий

Закрытый оскольчатый перелом диафиза плечевой кости по степени вреда здоровью квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Опасный для жизни
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

Потеря зрения на один глаз оценивается по признаку

- А. Развития угрожающего жизни состояния
- Б. Длительности расстройства здоровья
- В. Опасности для жизни
- Г. Стойкой утраты общей трудоспособности

