

Тесты с вопросами по специальности «Терапия» для аттестации 2 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/terapia/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «терапия» для аккредитации и других экзаменов (5500 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/terapiya/

2) Тесты для аккредитации «Общая врачебная практика» (3000 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/vrachebnaya/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Что понимается под одинофагией?

- А. Ощущение затрудненного прохождения пищи по пищеводу;
- Б. Ощущение болезненного прохождения пищи по пищеводу;
- В. Невозможность глотания;
- Г. Срыгивание после приема пищи;
- Д. Жгучие боли после приема пищи

Что из нижеперечисленного не является фактором риска развития тромбозов?

- А. Лейденская мутация V фактора свертывающей системы крови
- Б. Малая талассемия
- В. Открытая простатэктомия
- Г. Антифосфолипидный синдром
- Д. Волчаночный антикоагулянт

Какое из перечисленных признаков характерны для первичной легочной гипертензии?

- А. Тромбоэмболия легочных артерий в анамнезе.
- Б. Кардиомегалия.
- В. Хроническое легочное сердце.
- Г. Митральная регургитация
- Д. Все верно

Показанием для назначения сердечных гликозидов при ХСН является:

- А. гипертрофия миокарда левого желудочка по ЭХО - КГ
- Б. фракция выброса левого желудочка менее 30 % по ЭХО - КГ
- В. наличие зон гипокинеза по ЭХО - КГ
- Г. дилатация левых отделов сердца по ЭХО - КГ
- Д. дилатация правых камер сердца по ЭХО - КГ

Современная классификация пневмоний включает:

- А. Застойную пневмонию
- Б. «бензиновую» пневмонию
- В. Эозинофильную пневмонию
- Г. Хроническую пневмонию
- Д. Нозокомиальную пневмонию

Какие основные принципы в полной мере характеризуют Школы пациентов (школы здоровья) как вид профилактического группового консультирования?

- А. Групповое профилактическое консультирование осуществляют средние медицинские работники
- Б. Целевые группы пациентов, небольшая численность, цикл занятий
- В. Целевые группы пациентов
- Г. Цикл занятий

Какой из нижеперечисленных препаратов неприемлем для начального лечения пациента с ХОБЛ средней тяжести ($50\% < \text{ОФВ1} < 80\%$ от должного) с симптомами одышки при физической нагрузке и при отсутствии анамнеза обострений?

- А. В-агонист длительного действия
- Б. Холинолитик длительного действия
- В. Метилксантин длительного действия
- Г. Антагонист лейкотриеновых (LTC/D) рецепторов
- Д. Антагонист рецепторов эндотелина

Для какого заболевания характерны черные пигментные (билирубиновые) камни?

- А. Сахарный диабет;
- Б. Метаболический синдром;
- В. Первичный билиарный холангит;
- Г. Первичный склерозирующий холангит;
- Д. Гемолитическая анемия

Какой метод исследования является наиболее информативным в диагностике гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с щелочным характером рефлюктата?

- А. Рентгенологическое исследование пищевода;
- Б. Эзофаготономанометрия;
- В. Суточное мониторирование внутрипищеводного pH;
- Г. Г.Сцинтиграфия пищевода;
- Д. Суточная pH-импедансометрия

Этиологический агент, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, SARS), относится к следующему семейству вирусов:

- А. Аденовирусы
- Б. Коронавирусы
- В. Вирус простого герпеса
- Г. Метапневмовирус человека
- Д. Вирус парагриппа

Назовите заболевание почек, при котором артериальная гипертензия встречается относительно редко:

- А. Диабетическая нефропатия
- Б. Амилоидоз почек
- В. IgA-нефропатия
- Г. Волчаночный нефрит
- Д. Склеродермическая нефропатия

Осложнениями тромболитической терапии могут быть:

- А. кровотечения
- Б. разрывы миокарда
- В. инсульты
- Г. анафилактический шок
- Д. все вышеперечисленное

Какие факторы ассоциируются с развитием остеопороза?

- А. Наличие у пациента сахарного диабета
- Б. Прием глюкокортикоидов
- В. Переломы у родителей
- Г. Ревматоидный артрит
- Д. Ранняя менопауза
- Е. Все перечисленные

Что не является манифестацией инфекции, вызванной *Aspergillus*?

- А. Аспергиллома
- Б. Фиброзирующий медиастинит
- В. Хроническая инфекция
- Г. Астмоподобный синдром
- Д. Все верно

При каких из перечисленных заболеваний хорошо описана легочная гипертензия?

- А. Синдром Эйзенменгера (Eisenmenger)
- Б. Тетрада Фалло (Fallot)
- В. Портальная гипертензия
- Г. Множественная миелома
- Д. Верно А и В

При первичном инфекционном эндокардите у больных наркоманией повышается вероятность поражения клапана:

- А. Аортального
- Б. Митрального
- В. Митрального и аортального
- Г. Трикуспидального
- Д. Клапана легочной артерии

Чем особенно опасны смолы, содержащиеся в табачном дыме?

- А. Смолы «виновны» в возникновении табачной зависимости
- Б. Смолы - основные виновники возникновения хронического кислородного голодания в организме
- В. Смолы - основные виновники развития рака и заболеваний легких
- Г. Все вышеперечисленное

Типичные патофизиологические изменения при обострении бронхиальной астмы включают:

- А. Снижение остаточного объема
- Б. Снижение диффузионной емкости легких
- В. Альвеолярную гипервентиляцию
- Г. Снижение ОФВ1
- Д. Снижение максимального экспираторного давления

Показанием к назначению диуретиков при ХСН является:

- А. профилактика отеочного синдрома
- Б. отеки нижних конечностей
- В. одышка (без застойных явлений в легких)
- Г. артериальная гипертензия
- Д. перенесенный инфаркт миокарда

При легочном сердце всегда отмечается:

- А. Гипертрофия и дилатация правого желудочка
- Б. Гипертрофия и дилатация левого предсердия
- В. Увеличение левого желудочка
- Г. Шунтирование крови справа налево
- Д. Плевральный выпот

При определении показаний к проведению противовирусной терапии у больных хроническим вирусным гепатитом С учитываются следующие параметры, кроме:

- А. Степени повышения активности трансаминаз;
- Б. Давности заболевания;
- В. Вирусной нагрузки;
- Г. Степени фиброза печени;
- Д. Гистологической активности

Препараты для лечения гипертонической болезни:

- А. ингибиторы АПФ, блокаторы рецептора ангиотензина, антагонисты кальция, бета–адреноблокаторы, диуретики
- Б. ингибиторы АПФ, нитраты, антагонисты кальция, бета–адреноблокаторы, сердечные гликозиды
- В. ингибиторы АПФ, сартаны, статины, бета–адреноблокаторы, нитраты, дезагреганты
- Г. ингибиторы АПФ, нитраты, антагонисты кальция, бета–адреноблокаторы, диуретики
- Д. ингибиторы АПФ, сартаны, препараты центрального действия, нитраты, статины

Показанием к отмене статинов является:

- А. повышение трансаминаз печени более чем в 3 раза по сравнению с нормой
- Б. повышение КФК более чем в 3 раза по сравнению с нормой
- В. повышение КФК более чем в 5 раза по сравнению с нормой
- Г. все, кроме Б
- Д. все, кроме В

Маркерами поражения почек, позволяющими диагностировать хроническую болезнь почек являются:

- А. Стойкие изменения в анализах мочи
- Б. Изменения в почках при визуализирующих исследованиях
- В. Изменения биохимических показателей крови
- Г. Стойкое снижение уровня клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин/1,73 м²
- Д. Все перечисленные

Выявление артериальной гипертензии при проведении профосмотра является показанием к установлению следующей группы здоровья

- А. I группа
- Б. II группа
- В. IIIa группа
- Г. IIIб группа

Установите соответствие между липидными параметрами плазмы у здоровых лиц с умеренным или низким сердечно-сосудистым риском и их оптимальными значениями:

Липидные параметры:

- А. Общий холестерин;
- Б. холестерин липопротеидов низкой плотности;
- В. холестерин липопротеидов высокой плотности;
- Г. триглицериды. Ммоль/л:

- 1. <3,0;
- 2. <5,0;
- 3. <1,7;
- 4. >1,0 (мужчины), 1,2 (женщины).

- А. А - 2; Б - 1; В - 4; Г - 3
- Б. А - 1; Б - 3; В - 4; Г - 3
- В. А - 1; Б - 2; В - 3; Г - 4

Экссудативный фарингит могут вызывать следующие микробные агенты:

- А. Риновирусы, коронавирусы
- Б. *Corynebacterium diphtheria*
- В. Респираторно-синцитиальный вирус
- Г. *Streptococcus pyogenes*,
- Д. Верно Б и Г

Щеточная кайма в нефроне имеется в:

- А. Проксимальном канальце
- Б. Петле Генле
- В. Дистальном извитом канальце
- Г. Связующем отделе
- Д. Собирательной трубке

Что из нижеперечисленного является наиболее распространенной причиной нетромботической эмболии легочной артерии в мире?

- А. Шистосомоз
- Б. Амниотическая жидкость
- В. Капли жира
- Г. Пузырьки воздуха
- Д. Бактериальные эмболы при сепсисе

Современная классификация гипертонического криза:

- А. осложненный/неосложненный
- Б. симпатoadреналовый/вагоинсулярный
- В. гипокинетический/гиперкинетический
- Г. метаболический/неметаболический
- Д. жизнеоопасный/нежизнеоопасный

Какое из нижеперечисленных состояний не связано с бронхоэктатической болезнью?

- А. Аллергический бронхолегочный аспергиллез
- Б. Недостаточность альфа1-антитрипсина
- В. Муковисцидоз
- Г. Синдром приобретенного иммунодефицита
- Д. Облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией

Какой патогенетический механизм лежит в основе позднего демпинг-синдрома?

- А. Быстрое поступление гиперосмолярного содержимого в тощую кишку;
- Б. Нарушение проходимости приводящей и отводящей петель.
- В. Наличие анастомозита;
- Г. Гипогликемия, связанная с освобождением инсулина;
- Д. Рефлюкс желчи

Установите связь между заболеваниями и имеющимися признаками. Заболевание:

1.Болезнь Крона

2.Неспецифический язвенный колит Признаки:

А.Кишечные кровотечения

Б. Воспалительные инфильтраты в правой подвздошной области

В. Прерывистый характер поражения кишечника

Г. Восходящий характер поражения кишечника

Д. Поражения перианальной области

Е. Высокий титр антител к нейтрофильным гранулоцитам (p-ANCA)

А. 1-Б,В, Д 2- А,Г,Е

Б. 1-А,Б,В, Д 2- Г,Е

В. 1- В, Д 2- А,Б,Г,Е

Г. 1-Б,В,Г 2- А,Д, Е

При гипертриглицеридемии необходимо ограничить прежде всего потребление:

А. белков;

Б. жиров;

В. сахара;

Г. алкоголя;

Д. жиров, сахара и алкоголя.

При выборе препарата для лечения гипертонической болезни в первую очередь учитывают:

А. наличие у больного поражения органов-мишеней

Б. уровень мочевой кислоты в крови

В. приверженность к лечению

Г. отсутствие клинических проявлений и дискомфорта от повышения артериального давления

Д. изменения сосудов глазного дна

Какие препараты включаются в эрадикационную схему квадротерапии?

А. Ингибиторы протонной помпы, препараты висмута, кларитромицин и метронидазол;

Б. Ингибиторы протонной помпы, препараты висмута, амоксициллин и метронидазол;

В. Ингибиторы протонной помпы, препараты висмута, тетрациклин и метронидазол;

Г. Ингибиторы протонной помпы, препараты висмута, тетрациклин и кларитромицин;

Д. Ингибиторы протонной помпы, препараты висмута, тетрациклин и амоксициллин.

Для какого заболевания выявление антинейтрофильных антител является патогномоничным признаком?

- А. Гранулематоз Вегенера
- Б. Анкилозирующий спондилит
- В. Системная красная волчанка
- Г. Остеоартроз
- Д. Подагра

При обострении бронхиальной астмы запрещен прием следующих препаратов:

- А. антибиотиков
- Б. системных глюкокортикостероидов
- В. седативных
- Г. теофиллинов
- Д. антагонистов кальция

Патологические изменения при хроническом течении бронхиальной астмы включают:

- А. Гипертрофию гладкой мускулатуры дыхательных путей
- Б. Гиперплазию бокаловидных клеток эпителия бронхов
- В. Образование слизистых пробок в просвете мелких бронхов
- Г. Эозинофильную инфильтрацию бронхиального эпителия и субэпителиальных областей
- Д. все вышеперечисленные

С какой целью применяется метод рентгенологического исследования желудка с двойным контрастированием?

- А. Для лучшей оценки эластичности стенки желудка;
- Б. Для более точной характеристики эвакуации из желудка;
- В. Для лучшего выявления изменений рельефа слизистой оболочки желудка;
- Г. Для дифференциального диагноза между доброкачественными и злокачественными поражениями желудка;
- Д. Для более точного определения формы и положения желудка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Название лекарственного вещества:

А. лизиноприл

Б. метопролол

В. Аторвастатин

Г. Валсартан

Д. Клонидин Класс препаратов:

1. гипотензивные центрального действия

2. бета- адреноблокаторы

3. блокаторы рецептора ангиотензина

4. статины

5. ингибиторы АПФ

А. А-1, Б-1, В-2, Г-3, Д-1

Б. А-5, Б-1, В-1, Г-2, Д-3

В. А-1, Б-1, В-3, Г-3, Д-1

Г. А-2, Б-2, В-1, Г-1, Д-3

Д. А-5 Б-2 В-4 Г-3 Д-1

Риск сердечно-сосудистой патологии высок при окружности талии у женщин:

А. 88 и более;

Б. 94 и более;

В. 102 и более;

Г. 110 и более;

Д. нет правильного ответа

Дисфункция голосовых связок (VCD) может имитировать клинику бронхиальной астмы. Какое(ие) из нижеперечисленных высказываний соответствует(ют) истине?

А. VCD бывает только у работников здравоохранения.

Б. VCD может быть установлена по инспираторной кривой поток-объем.

В. Вдыхание кислородно-гелиевой смеси может облегчить симптомы.

Г. Отрицательный результат фиброларингоскопии исключает диагноз этого заболевания.

Д. Верно Б и В

Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в первую очередь :

А. Направлен на ограничение прав курящих граждан в России

Б. Направлен на снижение распространенности потребления табака среди населения Российской Федерации

В. Ограничивает полномочия и сфер деятельности табачных компаний на территории Российской Федерации.

Г. Регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в соответствии с рамочной конвенцией ВОЗ.

Безболевая ишемия миокарда более характерна для больных:

- А. с гипертонической болезнью
- Б. с сахарным диабетом
- В. с хронической сердечной недостаточностью
- Г. с метаболическим синдромом
- Д. с ХОБЛ

При артериальной гипертонии необходимо, в первую очередь, ограничить:

- А. белки;
- Б. соль;
- В. растительное масло;
- Г. фрукты;
- Д. нет правильного ответа

Обнаружение антимитохондриальных антител служит признаком

- А. Аутоиммунного гепатита;
- Б. Первичного склерозирующего холангита;
- В. Первичного билиарного холангита;
- Г. Болезни Вильсона;
- Д. Болезни Жильбера;

Риск сердечно-сосудистой патологии высок при окружности талии у мужчин:

- А. 80 и более;
- Б. 94 и более;
- В. 102 и более;
- Г. 110 и более;
- Д. нет правильного ответа

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках

Название лекарственного вещества:

А. амиодарон

Б. кандесартан

В. Периндоприл

Г. амлодипин

Д. розувастатин Класс препаратов:

1. антиаритмики

2. блокатор кальциевых каналов

3. блокаторы рецептора ангиотензина

4. статины

5. ингибиторы АПФ

А. А-1 Б – 3 В – 5 Г- 2 Д – 4

Б. А-2 Б-2 В-1 Г-2 Д-4

В. А-1 Б-1 В-1 Г-1 Д-1

Г. А-2 Б-2 В-2 Г-3 Д-3

«Внебольничной» считается пневмония, возникшая:

А. вне стационара или диагностированная в первые 48 часов от момента госпитализации

Б. у пациента, находившегося в доме сестринского ухода

В. У пациента, находившегося в отделении длительного медицинского наблюдения более 14 дней

Г. на 10 день пребывания в отделении неврологии

Д. в день выписки из стационара

Как часто должна проводиться маммография обеих молочных желез у женщин в рамках диспансеризации?

А. ежегодно

Б. раз в 2 года

В. каждые 5 лет

Г. раз в 3 года

Установите соответствие между имеющимися отличительными признаками и заболеванием. Отличительные признаки:

А.Бледно-желтые наложения на гиперемированной слизистой оболочке пищевода

Б.Увеличение содержания эозинофилов в слизистой оболочке пищевода > 15 в поле зрения

В.Ослабление иммунной системы организма

Г.Сочетание с бронхиальной астмой и крапивницей

Д.Эффективность флутиказона

Е.Эффективность будезонида

Ж. Пожилой возраст

Заболевание:

1.Эозинофильный эзофагит

2. Кандидозный эзофагит

А. 1 - Б, Г, Е 2 - А, В, Д, Ж

Б. 1 - В, Б, В, Г 2 - А, Б, В, Ж

В. 1 - А, Б, В 2 - А, В, Д, Е

Г. 1 - А, Б, Г 2 - А, В, Д, Ж

Выберите наиболее точное определение подагры, отражающее суть болезни:

А. Системное ревматическое заболевание, развивающееся на фоне гиперурикемии

Б. Болезнь, связанная с метаболическими нарушениями, приводящими к гиперурикемии и артриту

В. Болезнь, характеризующаяся отложением кристаллов моноурата натрия в различных тканях и развивающегося в связи с этим воспалением у лиц с гиперурикемией

Г. Болезнь, характеризующая острым артритом первого плюснефалангового сустава

Д. Заболевание, характеризующееся рецидивами острых приступов артрита и развивающееся преимущественно у мужчин среднего и пожилого возраста

Укажите первоначальную локализацию гастритических изменений, вызванных инфекцией *Helicobacter pylori*:

А. Субкардиальный отдел;

Б. Фундальный отдел;

В. Антральный отдел;

Г. Г. Вся слизистая оболочка желудка;

Д. Вся слизистая оболочка желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки.

Какие белки относятся к белкам острой фазы воспаления?

А. С-реактивный белок

Б. Сывороточный амилоидный белок А

В. Гаптоглобин

Г. Фибриноген

Д. Все перечисленные

При торакоцентезе обнаружена кровянистая жидкость. Результат какого из перечисленных тестов используется для определения, является ли это гемотораксом?

- А. Жидкость сворачивается в пробирке.
- Б. Гематокрит плевральной жидкости составляет 50% или более от гематокрита периферической крови.
- В. Гематокрит плевральной жидкости превышает 10%.
- Г. Число эритроцитов в плевральной жидкости превышает 1,000,000/мкл
- Д. Все тесты малоинформативны

Диспансеризация проводится ежегодно

- А. у пациентов с 3 группой здоровья
- Б. в возрасте 40 лет и старше
- В. в любом возрасте старше 18 лет
- Г. по желанию пациента

У каких пациентов будет рассматриваться необходимость биопсии легких для диагностики лимфангиомиоматоза?

- А. Некурящая женщина с туберозным склерозом, у которой имеются кистозные поражения в легких при КТ высоких разрешений.
- Б. Курящая женщина с туберозным склерозом и кистозными поражениями в легких при КТ высоких разрешений
- В. Женщина с тонкостенными кистами, характерными для ЛАМ, при КТВР и наличием образования в почке, соответствующим ангиомиолипому
- Г. Все ответы неверны
- Д. Все вышеперечисленное

Клиническими проявлениями гипертрофической кардиомиопатии являются:

- 1. одышка;**
- 2. стенокардия напряжения;**
- 3. обмороки;**
- 4. нарушения ритма сердца.**
- А. правильные ответы 1, 2 и 3;
- Б. правильные ответы 1 и 3;
- В. правильные ответы 2 и 4;
- Г. правильные ответ 4;
- Д. правильные ответы 1, 2, 3 и 4.

Какой лечебный эффект в основном определяет включение препарата в категорию базисные противовоспалительные препараты БПВП при ревматоидном артрите?

- А. Противовоспалительный
- Б. Антидеструктивный
- В. Аналгетический
- Г. Противоотечный
- Д. Ни один из перечисленных

Что из нижеперечисленного свидетельствует о наличии бронхиальной обструкции?

- А. Снижение ОФВ1
- Б. Снижение ФЖЕЛ
- В. Снижение ОФВ1/ФЖЕЛ
- Г. Кашель и отделение мокроты
- Д. Анамнез курения

Каким из перечисленных болезней наиболее рискуют заболеть дети, подверженные воздействию окружающего табачного дыма?

- А. воспаление среднего уха
- Б. бронхиальная астма
- В. инфекции верхних дыхательных путей
- Г. бронхит и пневмония
- Д. все перечисленное

К эффективным формам профилактического консультирования относится

- А. Директивное консультирование (готовые советы, рекомендации)
- Б. Недирективное консультирование (взаимное обсуждение с пациентом и совместный выбор тактики)

Причинами кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта служат все нижеперечисленные заболевания, кроме:

- А. Эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки;
- Б. Разрыва варикозно-расширенных вен пищевода и желудка;
- В. Опухолей пищевода и желудка
- Г. Ангидисплазии желудка
- Д. Аксиальных грыж пищеводного отверстия диафрагмы

Абдоминальный (мужской) тип ожирения является фактором риска преимущественно заболеваний:

- А. сердца;
- Б. артерий;
- В. вен;
- Г. А и Б;
- Д. суставов;

Самой частой причиной железодефицитной анемии у мужчин является:

- А. кровопотеря из желудочно-кишечного тракта;
- Б. гломусные опухоли;
- В. алкогольный гепатит;
- Г. гематурическая форма гломерулонефрита;
- Д. рак почки.

Установите соответствие между состоянием питания и индексом массы тела (кг/м²):

Состояние питания:

- А. Дефицит массы тела
 - Б. Нормальная масса тела
 - В. Избыточная масса тела
 - Г. Ожирение I степени
 - Д. Ожирение II степени
 - Е. Ожирение III степени
- Индекс массы тела (кг/м²)**

- 1. ≥ 40
- 2. 18,5-24,9
- 3. 25,0-29,9
- 4. 30,0-34,9
- 5. 35,0-39,9
- 6. $< 18,5$

- А. А-6, Б-2, В-3, Г-4, Д-5, Е-1
- Б. А-1, Б-2, В-3, Г-4, Д-5, Е-6
- В. А-6, Б-3, В-2, Г-4, Д-5, Е-1
- Г. А-6, Б-2, В-3, Г-5, Д-4, Е-1

Препаратом первой линии для лечения язвенного колита является:

- А. Циклоспорин
- Б. Метотрексат
- В. Азатиоприн
- Г. Месалазин
- Д. Инфликсимаб

Какая злокачественная опухоль возникает на фоне пищевода Баррета?

- А. Плоскоклеточный рак;
- Б. Аденокарцинома пищевода;
- В. Мелкоклеточный рак
- Г. Г.Саркома
- Д. Злокачественная лимфома

Какое(ие) из нижеприведенных утверждений соответсвует(ют) истине в отношении первичной (идиопатической) легочной гипертензии?

- А. Чаще встречается у мужчин, чем у женщин, заболеваемость увеличивается с возрастом
- Б. При рентгенографии органов грудной клетки в типичных случаях выявляются билатеральные затемнения
- В. Одышка – наиболее распространенный симптом
- Г. Показатели максимальной объемной скорости выдоха находятся в пределах нормы
- Д. Верно В и Г

Соотнесите показатель индекса массы тела (кг/м²) и риск сопутствующих заболеваний (в рамках метаболического синдрома): Индекс массы тела (кг/м²):

- А. <18,5;
 - Б. 18,5-24,9;
 - В. 25,0-29,9;
 - Г. 30,0-34,9;
 - Д. 35,0-39,9;
 - Е. ≥ 40 Риск сопутствующих заболеваний:
- 1. Чрезвычайно высокий;
 - 2. Очень высокий;
 - 3. Высокий;
 - 4. Повышенный;
 - 5. Обычный;
 - 6. Низкий (повышен риск других заболеваний)
- А. А-6, Б-5, В-4, Г-3, Д-2, Е-1
 - Б. А-2, Б-2, В-3, Г-3, Д-1, Е-1
 - В. А-1, Б-1, В-2, Г-2, Д-1, Е-1
 - Г. А-2,Б-2, В-3, Г-1, Д-1, Е-1

В случае обнаружения у донора в крови дефицита железа следует:

- А. включить в его рацион орехи, икру, гранаты, морковь;
- Б. рекомендовать ему съедать в течение полугода по 1 кг яблок ежедневно;
- В. перелить тщательно подобранную эритроцитарную массу;
- Г. назначить ему на длительный срок препараты железа перорально;
- Д. назначить ему препараты железа перорально в течение 14 дней.

Препарат для эмпирической терапии нетяжелой внебольничной пневмонии у пациентов без сопутствующих заболеваний, не принимавших антибактериальные средства ≥ 2 суток за последние 3 месяца:

- А. Амоксициллин
- Б. Имипенем
- В. Ципрофлоксацин
- Г. Цефоперазон
- Д. Линезолид

С целью снижения общего холестерина используют:

- А. витамины
- Б. статины
- В. фибраты
- Г. препараты чеснока
- Д. все вышеперечисленные

Что из нижеперечисленного не является свидетельством профессионального характера бронхиальной астмы?

- А. 15% снижение ОФВ1 в рабочее время
- Б. Появление симптомов только в рабочие дни
- В. 15% снижение ОФВ1 после специфического ингаляционного провокационного теста с предполагаемым провоцирующим фактором
- Г. Положительный метахолиновый тест
- Д. Суточная вариабельность ПСВ $>20\%$ только по рабочим дням

Вирусный бронхолит

- А. Распространен у младенцев и маленьких детей, редко встречается у взрослых
- Б. У детей постарше сопровождается сухими хрипами
- В. Часто вызывается респираторно-синцитиальным вирусом
- Г. Верно 1 и 3
- Д. Все вышеперечисленное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Название лекарственного вещества

А. дигоксин

Б. спиронолактон

В. Фуросемид

Г. ирбесартан

Д. моноприл Класс препаратов

1. сердечные гликозиды

2. антагонисты минералокортикоидных рецепторов

3. блокаторы рецептора ангиотензина

4. диуретики

5. ингибиторы АПФ

А. А-1 Б – 2 В – 4 Г- 3 Д – 5

Б. А-1 Б-1 В-1 Г-1 Д-1

В. А-2 Б-2 В-1 Г-2 Д-4

Г. А-2 Б-2 В-2 Г-3 Д-3

Какие компоненты табачного дыма – основные виновники сердечно-сосудистых заболеваний?

А. окись углерода

Б. полоний 210

В. окись углерода и никотин

Г. смолы и цианистый водород

Причиной железодефицитной анемии у беременной женщины может быть:

1. гипervолемия;

2. многоплодная беременность;

3. несовместимость с мужем по системе АВО;

4. имевшийся ранее латентный дефицит железа.

А. если правильны ответы 1, 2 и 3;

Б. если правильны ответы 1 и 3;

В. если правильны ответы 2 и 4;

Г. если правильный ответ 4;

Д. если правильны ответы 1, 2, 3 и 4.

Эффективность тромболизиса оценивается по:

А. динамике выраженности подъемов сегмента ST

Б. незначительному повышению кардиоспецифических ферментов

В. купированию болевого синдрома

Г. все вышеперечисленное

Д. ничего из вышеперечисленного

К IIБ стадии ХСН по классификации Стражеско и Василенко относят:

- А. одышку, ослабление первого тона на верхушке сердца
- Б. одышку, отеки нижних конечностей
- В. асцит, ослабление первого тона на верхушке сердца
- Г. одышку, трофические изменения нижних конечностей
- Д. отеки нижних конечностей, ослабление первого тона на верхушке сердца

**Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках
Название лекарственного вещества:**

А. эналаприл

Б. бисопролол

В. Гидрохлоротиазид

Г. Лозартан

Д. триметазидин Класс препаратов:

1. метаболики

2. бета- адреноблокаторы

3. блокаторы рецептора ангиотензина

4. диуретики

5. ингибиторы АПФ

А. А-5 Б-2 В-4 Г-3 Д-1

Б. А-1, Б-1, В-2, Г-3, Д-1

В. А-2, Б-2, В-1, Г-1, Д-3

Г. А-5, Б-2, В-1, Г-2, Д-5

**Типичными признаками хронического панкреатита служат нижеперечисленные
симптомы, кроме**

А. Болей в животе;

Б. Диареи;

В. Запоров;

Г. Желтухи;

Д. Потери массы тела

Установите связь между заболеваниями и эндоскопическими изменениями слизистой оболочки желудка Заболевание:

1. В12-дефицитная анемия
 2. Болезнь Менетрие
 3. НПВП-гастропатия
 4. Синдром Маллори-Вейсса
- Эндоскопические изменения:**
- А. Поверхностные надрывы слизистой оболочки гастроэзофагеального перехода
 - Б. Атрофический фундальный гастрит
 - В. Складки слизистой оболочки желудка в виде «мозговых извилин»
 - Г. Множественные эрозии и поверхностные язвы желудка
- А. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А
Б. 1-А, 2-Б, 3-В, 4-А
В. 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А
Г. 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А

Какое осложнение развивается при закупорке конкрементом протока желчного пузыря?

- А. Механическая желтуха;
- Б. Острый билиарный панкреатит;
- В. Острый холангит;
- Г. Водянка желчного пузыря
- Д. Флегмона желчного пузыря

Какие доброкачественные опухоли пищевода встречаются наиболее часто?

- А. Аденомы;
- Б. Папилломы;
- В. Лейомиомы;
- Г. Г.Фибромы;
- Д. Липомы.

Установите связь между иммунологическими изменениями и заболеванием Заболевание:

1. Целиакия
 2. Первичный билиарный холангит
 3. Аутоиммунный гепатит
- Показатели иммунологического анализа:**
- А. Антитела к гладкой мускулатуре
 - Б. Антитела к митохондриям
 - В. Антитела к глиадину
 - Г. Антитела к эндомиозину
 - Д. Антитела к тканевой транскламиназе
 - Е. Антинуклеарные антитела
 - Ж. Антитела к микросомальному антигену печени и почек
- А. 1-В,Г,Д 2-Б, 3-А,Е,Ж
Б. 1-В,Г 2-Б, 3-А, Д,Е,Ж
В. 1-В,Г,Д,Ж 2-Б, 3-А,Е
Г. 1-В,Г,Д,Е 2-Б, 3-А,Ж

Какие проявления не характерны для остеоартрита?

- А. Механический тип болей
- Б. Деформация суставов
- В. Ухудшение общего состояния больных
- Г. Ограничение подвижности суставов
- Д. Преимущественное поражение нагрузочных суставов

Краткое профилактическое консультирование включает в себя

- А. Обучение, мотивацию пациентов по изменению образа жизни, составление плана по коррекции факторов риска
- Б. Консультацию психолога
- В. Проведение анкетирования на выявление факторов риска ХНИЗ
- Г. Адресное информирование, совет

Какие из перечисленных клинических состояний признаны взаимосвязанными с развитием клинической картины острого повреждения легких?

- А. Сепсис
- Б. Пневмония
- В. Передозировка наркотических веществ
- Г. Острый панкреатит
- Д. Все вышеперечисленное

Установите соответствие между вносимыми изменениями в рационе и фактором риска:

Фактор риска

- А. Гиперурикемия
 - Б. Гипергликемия
 - В. Гиперхолестеринемия
 - Г. Гипертриглицеридемия
 - Д. Повышенная свертываемость крови
- Рацион**

- 1. Ограничение жиров
- 2. Нет верного ответа
- 3. Низкоуглеводные диеты
- 4. Ограничение калорийности
- 5. Ограничение животного белка

- А. А-5; Б-3; В-1,4; Г-1; Д-2
- Б. А-4; Б-3; В-1; Г-2; Д-5
- В. А-1; Б-3; Г-2; В-4; Д-5
- Г. Г)А-1; Б-2; В-3; Г-4; Д-5

Назначение системных глюкокортикостероидов показано в следующих ситуациях:

- А. монотерапия ХОБЛ
- Б. лечение обострения ХОБЛ
- В. в качестве базисной терапии при стабильном течении ХОБЛ
- Г. для улучшения прогноза заболевания
- Д. в целях уменьшения скорости снижения бронхиальной проходимости

Для неспецифического язвенного колита характерны следующие данные обследования, кроме:

- А. Восходящего характера поражения;
- Б. Локализации изменений преимущественно в слизистой оболочке;
- В. Трансмурального характера поражения;
- Г. Формирования псевдополипов
- Д. Микроабсцессов крипт

В чем проявляется вредное воздействие курения на органы дыхания?

- А. Табачный дым повреждает реснитчатый эпителий и механизм мукоцилиарного очищения
- Б. Карбоксигемоглобин блокирует перенос кислорода, приводя к кислородному голоданию
- В. Нарушается баланс между протеолитическими ферментами и их ингибиторами
- Г. А и В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Название лекарственного вещества:

- А. ацетилсалициловая кислота
- Б. небиволол
- В. Симвастатин
- Г. варфарин

Д. рамиприл Класс препаратов:

- 1. статины
- 2. бета– адреноблокаторы
- 3. дезагреганты
- 4. антикоагулянты
- 5. ингибиторы АПФ

А. А-1 Б – 2 В – 4 Г- 3 Д – 5

Б. А-3 Б – 2 В – 1 Г- 4 Д – 5

В. А-2 Б-2 В-1 Г-2 Д-4

Г. А-2 Б-2 В-2 Г-3 Д-3

Какие из перечисленных препаратов являются легочными вазодилататорами?

- А. Эпопростенол
- Б. Метамфетамин
- В. Босентан
- Г. Силденафил
- Д. Верно А, В и Г

Выделите неверное положение для экстракапиллярного гломерулонефрита

- А. Возможен антительный механизм развития
- Б. Возможен иммунокомплексный механизм развития
- В. Возможно отсутствие иммунных депозитов при иммунофлюоресцентном исследовании биоптата почки
- Г. Может развиваться при других уже имеющихся формах гломерулонефрита
- Д. Клинически быстро прогрессирующее течение отмечается редко

Какой препарат является наиболее подходящим средством первой линии для лечения пациентов с диссеминированными микозами прогрессирующего течения или протекающими с поражением ЦНС?

- А. Каспофунгин
- Б. Вориконазол
- В. Флуконазол
- Г. Амфотерицин
- Д. Все неверно

Для какого из нижеперечисленных заболеваний характерен аутоиммунный атрофический гастрит?

- А. Лучевое поражение желудка;
- Б. Цирроз печени с синдромом портальной гипертензии;
- В. Болезнь Шенлейна-Геноха;
- Г. Г.В12-дефицитная анемия;
- Д. Системные васкулиты.

Что является абсолютным противопоказанием к применению антикоагулянтов?

- А. артериальная гипертензия
- Б. ишемический инсульт в анамнезе
- В. продолжающееся кровотечение
- Г. хронический гломерулонефрит
- Д. язвенная болезнь желудка

Когда боль при остеоартрозе может называться хронической?

- А. длительность боли составляет от 1 недели и более
- Б. длительность боли составляет от 3 недель и более
- В. длительность боли составляет от 1 месяца и более
- Г. длительность боли составляет от 2 месяцев и более
- Д. длительность боли составляет от 3 месяцев и более

Какое основное показание для применения видеокапсульной эндоскопии?

- А. Оценка процессов переваривания и всасывания в тонкой кишке;
- Б. Подозрение на наличие неустановленного источника кровотечения в тонкой кишке
- В. Подозрение на наличие неустановленного источника кровотечения в толстой кишке
- Г. Изучение двигательной функции кишечника;
- Д. Диагностика воспалительных изменений толстой кишки.

Основными препаратами в лечении ХСН являются:

- А. блокаторы системы РААС, нитраты, диуретики, дезагреганты
- Б. блокаторы системы РААС, статины, диуретики, дезагреганты, нитраты, бета-адреноблокаторы
- В. блокаторы системы РААС, антагонисты альдостерона, диуретики, сердечные гликозиды, бета-адреноблокаторы
- Г. блокаторы системы РААС, статины, диуретики, дезагреганты, нитраты, бета-адреноблокаторы, антагонисты альдостерона
- Д. блокаторы системы РААС, сердечные гликозиды, диуретики, дезагреганты, нитраты, бета-адреноблокаторы

Показанием к назначению статинов при ХСН являются:

- А. отеки нижних конечностей
- Б. перенесенный инфаркт миокарда
- В. одышка
- Г. нарушения сердечного ритма
- Д. гипертоническая болезнь

Какие из перечисленных исследований при отрицательном ответе исключают диагноз эмболии легочной артерии у пациентов с низкой вероятностью легочной эмболии?

- А. Дуплексное ультразвуковое исследование
- Б. Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия
- В. Спиральная компьютерная томография
- Г. Уровень D-димера
- Д. Верно Б, В и Г

Установите соответствие между компонентами табачного дыма и их действием на организм курящего. Компоненты табачного дыма:

А. Окись углерода

Б. Полоний 210

В. Никотин

Г. Смолы

Д. Цианистый водород Действие компонентов на организм:

1. Часто является основной причиной рака легкого, вызванного курением.

2. Оказывает повреждающее воздействие на ткани бронхиального дерева и легких, обуславливает развитие бронхита и эмфиземы

3. Способствует развитию атеросклероза.

4. Способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, за счет того, что вызывает хроническое кислородное голодание.

5. Является психоактивным веществом, вызывает хроническую интоксикацию и зависимость.

А. 1-Б,Г 2-Г,Д 3-В,А 4-А 5-В

Б. 1-Б,Г,Д 2-Г,Д 3-В,А 4-А 5-В

В. 1-Б,Г 2-Г,Д 3-В,А 4-А 5-А,Б,В

Г. 1-А, Б,Г 2-А, Г,Д 3-А, В,А 4-А 5-В

В патогенезе сердечной недостаточности рассматривается:

А. гиперактивация только системы РААС

Б. гиперактивация только системы САС

В. гиперактивация систем РААС и САС

Г. гиперактивация парасимпатической нервной системы

Д. ничего из вышеперечисленного

Основные классы липопротеидов в плазме крови:

А. ЛОНП

Б. ЛНП

В. ЛВП

Г. хиломикроны

Д. все вышеперечисленные

При каких заболеваниях может наблюдаться развитие следующего симптомокомплекса: микрогнатия, сакроилиит, артрит, анкилоз шейного отдела позвоночника?

А. Ревматоидный артрит

Б. Синдром Рейтера

В. Ювенильный хронический артрит

Г. Острая ревматическая лихорадка

Д. Все перечисленное верно

Какой из перечисленных цитокинов стал первой «терапевтической мишенью» для генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП)?

- А. Интерлейкин 6
- Б. Фактор некроза опухоли - альфа
- В. Интерлейкин 1
- Г. Интерлейкин 12/23
- Д. Все перечисленные

Какое из нижеследующих утверждений является верным в отношении идиопатического легочного фиброза?

- А. Вирус Эпштейна-Барр при исследовании методом гибридизации in situ выявляется в биопсийном материале большинства пациентов
- Б. Величина фибробластных фокусов при гистопатологическом исследовании является значимым предиктором выживаемости у пациентов с обычной интерстициальной пневмонией.
- В. Легочный капиллярит, характеризующийся нейтрофильной инфильтрацией и некрозом альвеолярных перегородок, является наиболее распространенной гистолопатологической находкой при обострении заболевания.
- Г. Наиболее распространенной гистолопатологической находкой являются гигантские многоядерные клетки с неправильной формы гранулемами
- Д. Все неверно

Установите связь между лабораторными изменениями и имеющимися клиническими синдромами. Клинические синдромы

1. Гемолитическая желтуха

2. Паренхиматозная желтуха

3. Механическая желтуха Лабораторные изменения

А. Повышение уровня непрямого и прямого билирубина в крови

Б. Повышение уровня прямого билирубина в крови

В. Повышение уровня непрямого билирубина в крови

Г. Исчезновение стеркобилина в кале

Д. Появление билирубина в моче

Е. Повышение уровня уробилина в моче

Ж. Появление билирубина и повышение уровня уробилина в моче

А. 1-В 2- А, Ж, Е 3- Б, Г, Д

Б. 1-В, Е, 2- А, Ж, 3- Б, Г, Д

В. 1-В 2- А, Ж, Е 3- Б, Г, Д

Г. 1-А, В, Е, 2- Ж 3- Б, Г, Д

Железо всасывается лучше всего:

- А. в форме ферритина;
- Б. в форме гемосидерина;
- В. в форме гема;
- Г. в виде свободного трехвалентного железа;
- Д. в виде свободного двухвалентного железа

Женский тип ожирения (тип «груши») является фактором риска преимущественно заболеваний:

- А. печени;
- Б. легких;
- В. опорно-двигательного аппарата;
- Г. почек;
- Д. нет правильного ответа

Лабораторным проявлением синдрома цитолиза служит:

- А. Снижение уровня альбуминов в крови;
- Б. Повышение активности щелочной фосфатазы;
- В. Повышение активности трансаминаз
- Г. Повышение активности гамма-глутамилтрансферазы;
- Д. Повышение уровня аммиака в крови

Какое из нижеперечисленных утверждений о муковисцидозе не соответствует истине?

- А. Муковисцидоз является рецессивным наследственным заболеванием.
- Б. Известно более 500 мутаций гена муковисцидоза (CFTR)
- В. Потовый тест на хлориды является стандартным диагностическим исследованием при муковисцидозе.
- Г. Нормальный потовый тест исключает диагноз муковисцидоз
- Д. Иногда муковисцидоз не диагностируется до взрослого возраста

Какой патогенетический механизм обуславливает повреждающее действие нестероидных противовоспалительных препаратов на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки?

- А. Повышение секреции соляной кислоты;
- Б. Повышение выработки пепсина;
- В. Увеличение продукции гастрина;
- Г. Нарушение моторики желудка и двенадцатиперстной кишки;
- Д. Блокирование активности фермента циклооксигеназы-2.

Наиболее эффективным способом предотвращения внезапной сердечной смерти у больных дилатационной кардиомиопатией является:

- А. бета-адреноблокаторы
- Б. амиодарон
- В. прокаинамид
- Г. соталол
- Д. кардиовертер-дефибриллятор

Холестерин:

- А. образуется в печени
- Б. поступает с пищей
- В. только поступает с пищей, не образуясь в организме
- Г. образуется в дистальной части тонкой кишки
- Д. все верно, кроме В

Локализация инфаркта миокарда при наличии патологического зубца Q, подъемов сегмента ST и отрицательных зубцов T в отведениях I, aVL, V2-V6:

- А. инфаркт нижней стенки
- Б. передне-боковой инфаркт
- В. инфаркт боковой стенки
- Г. передне-перегородочный инфаркт
- Д. инфаркт задней стенки

Из пищевого рациона больных целиакией должны быть исключены продукты приготовленные из следующих злаковых культур: кроме

- А. Риса;
- Б. Ячменя;
- В. Овса;
- Г. Ржи
- Д. Пшеницы

При каких из перечисленных заболеваний характерно повышенное давление заклинивания легочных капилляров?

- А. Первичная легочная гипертензия
- Б. Митральный стеноз
- В. Легочные артериовенозные мальформации
- Г. Легочное сердце
- Д. Верно А, В и Г

В лечении синдрома раздраженного кишечника с диареей применяются следующие препараты, кроме:

- А. Лоперамида
- Б. Пробиотиков
- В. Рифаксимины
- Г. Трициклических антидепрессантов
- Д. Пруклоприда

Абсолютным противопоказанием к применению статинов является:

- А. острые заболевания печени
- Б. декомпенсированный цирроз печени
- В. беременность
- Г. обострение дерматополимиозита
- Д. все вышеперечисленные

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Название лекарственного вещества

А. нитроглицерин

Б. дигоксин

В. Ивабрадин

Г. дилтиазем

Д. пропранолол Класс препаратов

1. сердечные гликозиды

2. бета– адреноблокаторы

3. блокатор кальциевых каналов

4. блокаторы f каналов синусового узла

5. нитраты

А. А-5 Б – 1 В – 4 Г- 3 Д – 2

Б. А-5 Б – 2 В – 4 Г- 3 Д – 1

В. А-2 Б-2 В-2 Г-3 Д-3

Г. А-1 Б – 2 В – 4 Г- 3 Д – 5

Какие клинические признаки псориатического артрита?

- А. Поражение дистальных межфаланговых суставов
- Б. Мутилирующий артрит.
- В. Ассиметричный олигоартрит.
- Г. Все перечисленные
- Д. Никакой из перечисленных

Какой из перечисленных симптомов чаще всего наблюдается при острой тромбоэмболии легочной артерии?

- А. Кровохарканье, не объяснимое другими причинами
- Б. Внезапно возникшие плевральные боли
- В. Синкопальное состояние
- Г. Внезапно появившаяся одышка
- Д. Кашель

Установите связь между заболеваниями и эндоскопическими изменениями слизистой оболочки толстой кишки. Заболевание

1. Болезнь Крона

2. Псевдомембранозный колит

3. Язвенный колит Эндоскопические изменения:

А. Поверхностные язвы в виде «запонки»

Б. Картина «булыжной мостовой»

В. Налеты кремового цвета, сливающиеся между собой

Г. Щелевидные язвы

Д. Контактная кровоточивость

Е. Псевдополипы

А. 1-Б,Г 2-В, 3-А,Д,Е

Б. 1-А, Б, 2-Б,В, 3-Г

В. 1-А,Б, В, 2-В, 3-Б, Г

Г. 1-В, 2-А, Б, 3-А, Б, Г

Какие из нижеперечисленных утверждений о бронхиолите соответствуют истине?

А. Облитерирующий бронхиолит является основной причиной смерти в отдаленном периоде у людей, перенесших трансплантацию комплекса сердце-легкие.

Б. Рентгенографическая картина при облитерирующем бронхиолите часто представлена милиарным или нодулярным паттерном и мозаичной перфузией.

В. Облитерирующий бронхиолит может быть диагностирован на основании функциональных легочных тестов

Г. Никакая терапия не продемонстрировала свою эффективность при лечении облитерирующего альвеолита

Д. верно А и Б

Наиболее выраженной липидснижающей активностью обладает:

А. аторвастатин

Б. розувастатин

В. симвастатин

Г. правастатин

Д. нет правильного ответа

При частично контролируемой бронхиальной астме необходима следующая коррекция терапии:

А. выбор минимального объема поддерживающей терапии

Б. целесообразно увеличение объема терапии («ступень вверх») для достижения контроля

В. лечить как легкое обострение

Г. лечить как тяжелое обострение

Д. коррекция терапии не целесообразна

К статинам относятся:

- А. симвастатин
- Б. эзетимиб
- В. фенофибрат
- Г. Омега-3 кислот этиловые эфиры
- Д. никотиновая кислота

Что является характерным побочным действием антикоагулянтов?

- А. сухой кашель
- Б. брадикардия
- В. артериальная гипертония
- Г. кровотечения
- Д. отеки лодыжек и голеней

При лечении гипермоторных дискинезий пищевода эффективны все препараты, кроме:

- А. Домперидона;
- Б. Пролонгированных нитратов;
- В. Блокаторов кальциевых каналов;
- Г. Г.Спазмолитиков;
- Д. Холинолитиков

Основные причины алиментарной формы (первичного) ожирения:

- А. низкая физическая активность;
- Б. переедание;
- В. гормональная недостаточность;
- Г. А и Б;
- Д. нет правильного ответа

Какие ревматические заболевания характеризуются обязательным увеличением СОЭ?

- А. Остеоартроз
- Б. Системная красная волчанка
- В. Ревматическая полимиалгия
- Г. Системная склеродермия
- Д. Все перечисленное

Характеристики изменения формы суставов, используемые в ревматологической практике?

- А. Припухлость
- Б. Деформация
- В. Дефигурация
- Г. Все перечисленные
- Д. Ни одна из перечисленных

Какова оптимальная продолжительность занятий в школах пациентов (школах здоровья)?

- А. 90 минут
- Б. 60 минут
- В. 30 минут
- Г. 20 минут
- Д. 15 минут

При гиперхолестеринемии необходимо в первую очередь ограничить потребление:

- А. животных жиров;
- Б. соль;
- В. растительное масло;
- Г. фрукты, овощи;
- Д. нет правильного ответа

Синдром портальной гипертензии характеризуется следующими симптомами, кроме:

- А. Асцита;
- Б. Гепатомегалии;
- В. Спленомегалии;
- Г. Желтухи;
- Д. Варикозного расширения вен пищевода и желудка

Какие суставы наиболее часто поражаются при ревматоидном артрите в дебюте заболевания?

- А. Локтевые суставы
- Б. Дистальные межфаланговые суставы кисти
- В. Проксимальные межфаланговые суставы кисти
- Г. Коленные суставы
- Д. Голеностопные суставы

Для синдрома мальабсорбции характерны следующие клинические симптомы, кроме:

- А. Диареи со стеатореей;
- Б. Болей в животе;
- В. Отеков;
- Г. Признаков дефицита витаминов;
- Д. Потери массы тела

При классическом синдроме Леффлера описаны инфильтраты, вызванные миграцией через легкие гельминтов:

- А. Аскариды
- Б. Кишечная угрица (стронгилоидида)
- В. Филярии
- Г. Анкилостома
- Д. Все неверно

Что из нижеперечисленного включено в определение бронхиальной астмы согласно консенсусному документу GINA (Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы)?

- А. Вариабельное ограничение экспираторного воздушного потока
- Б. Гетерогенное заболевание, которое характеризуется хроническим воспалением дыхательных путей
- В. Утолщение lamina reticularis (базальной мембраны)
- Г. Проявляется повторяющимися респираторными симптомами
- Д. Верно А, Б и Г

Какой из нижеперечисленных возбудителей не является важным легочным патогеном при муковисцидозе?

- А. *Pseudomonas aeruginosa*
- Б. *Burkholderia cepacia*
- В. *Staphylococcus aureus*
- Г. *Streptococcus pneumoniae*
- Д. Нетуберкулезные микобактерии

Назовите основные методологические принципы профилактического консультирования:

- А. Сотрудничество с пациентом
- Б. Побуждение к изменениям
- В. Обучение пациента
- Г. Все вышеперечисленное

Какие лекарственные средства относятся к базисным противовоспалительным препаратам для лечения ревматоидного артрита?

- А. Метотрексат
- Б. Сульфасалазин
- В. Лефлуномид
- Г. Гидроксихлорохин
- Д. Все перечисленные

Фибраты рекомендуется применять:

- А. постоянно
- Б. делать перерыв в приеме в выходные
- В. через день
- Г. делать перерывы в лечении
- Д. курсами (после нормализации уровня триглицеридов в плазме крови отменить)

Бронхоэктатической болезни не соответствует утверждение:

- А. Заболевание может манифестировать в любом возрасте от младенчества до старости.
- Б. Заболевание всегда связано с хроническими или рецидивирующими инфекциями.
- В. Заболевание не может быть окончательно диагностировано при обычной рентгенографии органов грудной клетки.
- Г. Хотя заболевание может поражать любые участки легких, в настоящее время наиболее распространено поражение средней доли справа и/или язычковых сегментов верхней доли левого легкого.
- Д. При данном заболевании может отмечаться обратимая обструкция дыхательных путей, и оно может быть ошибочно принято за бронхиальную астму.

Легочная эмфизема у курящих развивается:

- А. как клиническое проявление дисбаланса в системе протеазы - антипротеазы
- Б. как результат осложнения хронического обструктивного бронхита
- В. как результат повреждения естественного очистительного механизма легких
- Г. Б и В

Рентгенологическими признаками язвенной болезни являются все нижеперечисленные, кроме:

- А. «Ниши» на контуре или рельефе слизистой оболочки;
- Б. «Дефекта наполнения» в стенке желудка;
- В. Симптома «указующего перста» на противоположной стенке желудка;
- Г. Конвергенции складок слизистой оболочки к «нише»;
- Д. Рубцово-язвенной деформации желудка и двенадцати перстной кишки.

Источником подавляющего большинства клинически значимых тромбозов легочных артерий являются

- А. Поверхностные вены голени
- Б. Глубокие вены нижних конечностей
- В. Вены таза
- Г. Подключичная и подкрыльцовая вены
- Д. Правые отделы сердца

Что следует рекомендовать при лечении больных с постпрандиальным дистресс-синдромом?

- А. Антациды;
- Б. Антисекреторные препараты;
- В. Прокинетики;
- Г. Г.Спазмолитики
- Д. Ферментные препараты.

Какой из перечисленных вариантов лечения показан пациентам с гидростатическим острым отеком легких, развившимся вследствие дисфункции левого желудочка?

- А. Диуретики при отсутствии гипотонии
- Б. Вазодилататоры
- В. Дигоксин
- Г. Кислородотерапия
- Д. Верно А, Б и Г

Каковы нормальные показатели рН в теле желудка в нормальных условиях?

- А. 1-1,5;
- Б. 1,6-2,0;
- В. 1,2-2,0
- Г. > 3;
- Д. > 4

Диагноз стабильной стенокардии устанавливается на основании:

- А. характерной клинической картины
- Б. нормального уровня сердечного тропонина в крови
- В. специфических изменений на ЭКГ при холтеровском мониторировании
- Г. по результатам нагрузочных проб
- Д. все вышеперечисленное
- Е. только А и Г

Проба Зимницкого заключается в:

- А. Определении количества форменных элементов, выделившихся с мочой за сутки
- Б. Последовательном определении величины относительной плотности и количества мочи, собранной в течение суток за 3-часовые периоды
- В. Количественном определении форменных элементов в 1 мл мочи
- Г. Определении клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции по клиренсу эндогенного креатинина
- Д. Определении скорости клубочковой фильтрации

Какие побочные эффекты могут развиваться на фоне нестероидных противовоспалительных препаратов?

- А. Язва желудка
- Б. Нарушения функции почек
- В. Отеки
- Г. Повышение АД
- Д. Все перечисленные

Назовите обязательный признак диареи:

- А. Увеличение частоты актов дефекации > 3 раз в сутки;
- Б. Увеличение суточной массы кала > 300 г;
- В. Повышение содержание воды в кале > 85%;
- Г. Появление неотложных позывов на дефекацию;
- Д. Сочетание всех четырех признако

Установите связь между имеющимися симптомами и осложнениями язвенной болезни
Осложнения язвенной болезни:

- 1. Пенетрация язвы
 - 2. Рубцово-язвенный стеноз привратника
 - 3. Язвенное кровотечение
- Симптомы:**
- А. Черный дегтеобразный стул
 - Б. Рвота содержимым типа «кофейной гущи»
 - В. Упорный характер боли, потеря ее связи с приемом пищи
 - Г. «Шум плеска» при толчкообразной пальпации
 - Д. Рвота пищей, съеденной накануне
- А. 1 - В, 2 - Г, 3 - А, Б
 - Б. 1-А, 2-Б, В, 3-Г
 - В. 1-А, В, 2-В, 3-Б, Г
 - Г. 1-В, 2-А, Б, 3-Г

Индекс массы тела в норме должен быть равен:

- А. 5 - 9;
- Б. 10 - 14;
- В. 15 - 19;
- Г. 20 - 25;
- Д. 18,5-24,9

Для контроля за действием варфарина используется:

- А. время свертывания крови
- Б. протромбин
- В. АЧТВ
- Г. МНО
- Д. количество тромбоцитов

При каком(их) аутоиммунном(ых) заболевании(ях) вырабатываются органонеспецифические аутоантитела?

- А. Диффузный токсический зоб
- Б. Болезнь Аддисона
- В. Сахарный диабет I типа
- Г. Системная красная волчанка
- Д. Все перечисленные

Установите соответствие между типами курительного поведения и их характерными проявлениями

Проявления типа курительного поведения:

- А. Данный тип курения обусловлен физической привязанностью к табаку. Человек закуривает, когда снижается концентрация никотина в крови. Курит в любой ситуации, вопреки запретам.
- Б. Курят, чтобы сдержать гнев, преодолеть застенчивость, собраться с духом, разобраться в неприятной ситуации. Относятся к курению как к средству, снижающему эмоциональное напряжение
- В. Курильщику важны "курительные" аксессуары: зажигалки, пепельницы, сорт сигарет. Курят обычно мало.
- Г. Человек может не знать, сколько выкуривает в день, курит много: 35 и более сигарет в сутки. Курят чаще за работой, чем в часы отдыха; чем интенсивнее работа, тем чаще в руке сигарета.
- Д. Курят только в комфортных условиях. С помощью курения человек получает "дополнительное удовольствие" к отдыху. Бросают курить долго, много раз возвращаясь к курению.
- Е. Курят когда работа не ладится. У курящих с данным типом отмечается высокая степень психологической зависимости от никотина

- Тип курительного поведения:**
- 1. «Стимуляция»
 - 2. «Игра с сигаретой»
 - 3. «Расслабление»
 - 4. «Поддержка»
 - 5. «Жажда»
 - 6. «Рефлекс»

- А. 1-Е 2-В, 3-Д, 4-Б, 5-А, 6-Г
- Б. 1-Е 2-В, 3-4-Б, 5-А, 6-А,Б,Г
- В. 1-Г 2-В, 3-4-Б, 5-А, 6-Е
- Г. 1-Е 2-А,Б,В, 3-4-Б, 5-А, 6-Г

Среди методов выявления потери крови через желудочно-кишечный тракт самым информативным является:

- А. проба Грегерсена;
- Б. проба Вебера;
- В. определение кровопотери с помощью радиоактивного хрома;
- Г. определение уровня железа в кале;
- Д. фиброгастроскопия.

Лекарственная терапия неосложненного инфаркта миокарда включает:

- А. дезагреганты, антикоагулянты, бета– адреноблокаторы, статины, ингибиторы АПФ
- Б. дезагреганты, антикоагулянты, бета– адреноблокаторы, статины, нитраты, глюкокортикостероиды
- В. дезагреганты, метаболики, статины, ингибиторы АПФ
- Г. дезагреганты, нитраты, статины, ингибиторы АПФ, НПВС
- Д. нитраты, бета– адреноблокаторы, статины, метаболики, эуфиллин

Показанием к назначению статинов является уровень общего холестерина:

- А. более 5,0 ммоль/л
- Б. более 3,0 ммоль/л
- В. более 6,0 ммоль/л
- Г. более 4,0 ммоль/л
- Д. необходимо определение холестерина липопротеидов низкой плотности в плазме крови

Показанием для смены антибиотика при лечении пневмонии является

- А. Отсутствие убедительного эффекта от терапии через 12-18 часов
- Б. Принадлежность препарата к группе макролидов
- В. Клиническая неэффективность, о которой можно судить через 48-72 часа терапии
- Г. Профилактика развития резистентности микрофлоры
- Д. Сохранение гнойной мокроты через двое суток терапии

Диагностические критерии саркоидоза Американского торакального общества включают все нижеперечисленное, кроме:

- А. Соответствующая клиническая и рентгенографическая картина заболевания
- Б. Положительный тест Квейма (Kveim)
- В. Выявление гранулем без казеозного некроза при биопсии
- Г. Исключение других сходных заболеваний
- Д. Все верно

Ограничить потребление поваренной соли можно:

- А. убрав солонку со стола;
- Б. недосаливая при кулинарной обработке
- В. избегая солений;
- Г. А, Б, В;
- Д. нет правильного ответа

Функциональные продукты необходимы в основном для:

- А. лечения больных в стационаре;
- Б. профилактики наркомании
- В. помощи при отказе от курения;
- Г. достижения сбалансированности рациона;
- Д. нет правильного ответа

Установлено, что курение сигарет является потенциальным фактором риска развития всех перечисленных интерстициальных заболеваний легких, кроме

- А. Респираторный бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких
- Б. Обычной интерстициальной пневмонии
- В. Легочный гранулематоз из клеток лангерганса (эозинофильная гранулема легкого)
- Г. Гиперчувствительный пневмонит
- Д. Криптогенная интерстициальная пневмония

Какой препарат рассматривается как «золотой стандарт» лечения ревматоидного артрита?

- А. Глюкокортикоиды
- Б. Нестероидные противовоспалительные препараты
- В. Метотрексат
- Г. Циклофосфамид
- Д. Все перечисленные

Если у пациента в рамках диспансеризации не были выявлены хронические неинфекционные заболевания, однако имеется гепатит В, по поводу которого он состоит на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста, то такому пациенту должна быть присвоена следующая группа здоровья

- А. I группа
- Б. II группа
- В. IIIa группа
- Г. IIIб группа

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках
Название лекарственного вещества:

А. верапамил

Б. атенолол

В. Торасемид

Г. олмесартан

Д. триметазидин Класс препаратов:

1. метаболиты

2. бета– адреноблокаторы

3. блокаторы рецептора ангиотензина

4. диуретики

5. блокаторы кальциевых каналов

А. А-3 Б – 2 В – 1 Г- 4 Д – 5

Б. А-5 Б – 2 В – 4 Г- 3 Д – 1

В. А-1 Б – 2 В – 4 Г- 3 Д – 5

Г. А-2 Б-2 В-2 Г-3 Д-3

За сутки железа может всосаться не более:

А. 0,5-1,0 мг;

Б. 2,0-2,5 мг;

В. 4,0-4,5 мг;

Г. 10,0-12,01 мг;

Д. 7,0-8,0 мг.

Меры с доказанной эффективностью по лечению бронхоэктазов при муковисцидозе включают:

А. Хроническое назначение антистафилококковых антибиотиков

Б. Регулярную физиотерапию органов грудной клетки, направленную на эвакуацию секрета и очищение дыхательных путей

В. Ингаляционные β-адренергические агонисты

Г. Азитромицин длительно

Д. Верно 2 и 4

Наиболее часто при хроническом панкреатите развиваются следующие осложнения, кроме

А. Псевдокист поджелудочной железы;

Б. Гастродуоденальных язв;

В. Стеноза двенадцатиперстной кишки

Г. Метаболических нарушений;

Д. Рака поджелудочной железы

Какие из методов лечения остеоартрита наиболее эффективны?

- А. Медикаментозное лечение
- Б. Ортопедическая коррекция
- В. Лечебная физкультура
- Г. Диета, направленная на снижение веса
- Д. Комплексное лечение

Чем опасно курение беременной женщины для здоровья будущего малыша?

- А. Ребенок может быть предрасположен к респираторным заболеваниям
- Б. Ребенок может родиться с низкой массой тела
- В. Ребенок может быть предрасположен к сердечно-сосудистым заболеваниям
- Г. Все перечисленное
- Д. Только А и Б

Эзофагогастроскопия в рамках 1 этапа диспансеризации проводится:

- А. однократно в 45 лет
- Б. однократно в 18 лет
- В. каждые 5 лет
- Г. раз в 10 лет

Показаниями для госпитализации при обострении ХОБЛ являются все нижеперечисленные клинические характеристики, кроме:

- А. обострение средней степени тяжести
- Б. значительное нарастание интенсивности симптомов, таких как внезапно развившаяся тяжелая одышка
- В. тяжелая ХОБЛ
- Г. появление новых клинических признаков (цианоз, периферические отеки)
- Д. впервые возникшие аритмии

Для ХОБЛ тяжелой степени обструкции (GOLD III) характерны следующие показатели:

- А. $30\% \leq \text{ОФВ1} < 50\%$ от должных величин после пробы с бронходилататором
- Б. $30\% \leq \text{ОФВ1} < 50\%$ от должных величин до пробы с бронходилататором
- В. $\text{ОФВ1} < 30\%$ от должных величин или $\text{ОФВ1} < 50\%$ от должных величин в сочетании с хронической ДН или правожелудочковой недостаточностью
- Г. $\text{ОФВ1} \geq 80\%$ от должных величин
- Д. $50\% \leq \text{ОФВ1} < 80\%$ от должных величин

Какие из перечисленных типов легочных васкулитов протекают с преимущественным поражением только мелких сосудов?

- А. Синдром Чардж-Стросса (Churg-Strauss)
- Б. Микроскопический полиангиит
- В. Гигантоклеточный артериит
- Г. Верно Б и В

К предраковым можно отнести все нижеперечисленные заболевания желудка, кроме:

- А. Полипоза желудка;
- Б. Гастрита культи желудка;
- В. Болезни Менетрие;
- Г. Атрофического гастрита;
- Д. Эрозивного гастрита

Какое заболевание наиболее часто проявляется острым моноартритом?

- А. Подагра
- Б. Идиопатический диффузный гиперостоз скелета
- В. Болезнь Шейермана –Мау
- Г. Ревматоидный артрит
- Д. Все перечисленные

Установите связь между заболеваниями и морфологическими изменениями слизистой оболочки толстой кишки Заболевание:

1. Болезнь Крона

2. Неспецифический язвенный колит Морфологические изменения:

А. Абсцессы крипт

Б. Уменьшение числа бокаловидных клеток

В. Гранулемы с многоядерными клетками

Г. Инфильтрация собственной пластинки лимфоцитами и плазматическими клетками

Д. Гранулоцитарная инфильтрация поверхностного эпителия

А. 1-А,Б,Д 2-А, В,Г

Б. 1-А,Б,Д 2-В,Г

В. 1-А,Б 2-В,Г,Д

Г. 1-А,Б,Д 2-Б,В,Г

Для лечение гипертриглицеридемии используются:

- А. никотиновая кислота
- Б. фибраты
- В. витамины
- Г. препараты чеснока
- Д. гепатопротекторы

Какой из перечисленных симптомов является общим для всех пациентов с легочным сердцем?

- А. Периферические отеки и набухание шейных вен
- Б. Низкая сатурация артериальной крови (гипоксемия)
- В. Легочная гипертензия
- Г. Низкий ОВФ1
- Д. Электрокардиографические изменения

Современная классификация инфаркта миокарда:

- А. с зубцом Q, без зубца Q
- Б. трансмуральный, нетрансмуральный
- В. крупноочаговый, мелкоочаговый
- Г. субэпикардальный, субэндокардиальный

При гипертонической болезни в сочетании с сахарным диабетом 2 типа предпочтительно назначение:

- А. бета-адреноблокаторов
- Б. прямых ингибиторов ренина
- В. Блокаторов кальциевых каналов
- Г. ингибиторов АПФ
- Д. петлевых диуретиков

Какие признаки позволяют заподозрить анкилозирующий спондилит?

- А. Боли воспалительного ритма в пояснице, крестце и позвоночнике
- Б. Артрит крупных суставов преимущественно нижних конечностей у мужчин моложе 40 лет
- В. Выраженная утренняя скованность
- Г. Улучшение состояния после физических упражнений
- Д. Увеит
- Е. Все перечисленные

Причиной остронефритического синдрома могут быть:

- А. Острый гломерулонефрит (постстрептококковый, сывороточный)
- Б. Другие гломерулонефриты, связанные с инфекцией
- В. Хронический гломерулонефрит
- Г. Системные заболевания (системная красная волчанка, системные васкулиты, синдром Гудпасчера)
- Д. Все перечисленные варианты верны

При отсутствии противопоказаний лечение ОКС с подъемом сегмента ST, включает в себя:

- А. тромболизис, дезагреганты, антикоагулянты, бета – адреноблокаторы, статины, ингибиторы АПФ
- Б. дезагреганты, антикоагулянты, бета– адреноблокаторы, блокаторы рецептора ангиотензина, нитраты, эуфиллин
- В. тромболизис, нитраты, метаболики, статины, ингибиторы АПФ, глюкокортикоиды
- Г. дезагреганты, нитраты, статины, ингибиторы АПФ, НПВС
- Д. нитраты, бета– адреноблокаторы, статины, метаболики

Согласно Федеральному закону от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на рабочих местах, рабочих зонах организованных в помещениях:

- А. Курение не запрещено
- Б. Курение запрещено за исключением специально выделенных мест для курения
- В. Курение полностью запрещено
- Г. Нет определенных правил относительно курения.

Немедикаментозные методы лечения ХСН включают:

- А. диета
- Б. кардиоресинхронизирующие устройства
- В. трансплантация сердца
- Г. искусственный левый желудочек
- Д. все перечисленное

Для болей в животе при синдроме раздраженного кишечника характерны следующие особенности, кроме:

- А. Локализуются преимущественно в подвздошных областях;
- Б. Распространяются по всему животу;
- В. Уменьшаются после дефекации;
- Г. Не возникают в ночное время;
- Д. Сопровождаются диареей или запорами.

Базисными препаратами для лечения стабильной стенокардии являются:

- А. дезагреганты, бета– адреноблокаторы, статины, ингибиторы АПФ
- Б. дезагреганты, бета – адреноблокаторы, статины, нитраты
- В. дезагреганты, метаболики, статины, ингибиторы АПФ
- Г. дезагреганты, нитраты, статины, ингибиторы АПФ
- Д. нитраты, бета– адреноблокаторы, статины, метаболики

Окончательный диагноз идиопатического легочного фиброза требует выявления одного из нижеперечисленных гистопатологических паттернов при хирургической биопсии легких?

- А. Острая интерстициальная пневмония (AIP)
- Б. Десквамативная интерстициальная пневмония (DIP)
- В. Обычная интерстициальная пневмония (UIP)
- Г. Неспецифическая интерстициальная пневмония (NSIP)
- Д. Организующаяся пневмония

Какой из перечисленных тестов является чувствительным и достаточно точным показателем клинического развития отека легких?

- А. Рентгенография органов грудной клетки
- Б. Метаболический ацидоз
- В. Повышение давления в дыхательных путях при механической вентиляции легких
- Г. Ультразвуковое исследование органов грудной клетки
- Д. ЭХО-КГ

К внешним факторам, влияющим на возникновение и развитие бронхиальной астмы относятся все перечисленные, кроме:

- А. аллергенов помещений (клещи домашней пыли, шерсть домашних животных)
- Б. внешних аллергенов (пыльца, грибы, в том числе плесневые и дрожжевые)
- В. инфекции (главным образом, вирусные)
- Г. профессиональных сенсibilизаторов
- Д. ожирения

Осложнениями инфаркта миокарда могут быть:

- А. острая левожелудочковая недостаточность, аритмии, разрывы миокарда, тромбоэмболии, перикардит, пневмония, миокардит
- Б. острая левожелудочковая недостаточность, аритмии, разрывы миокарда, тромбоэмболии, эндокардит
- В. острая левожелудочковая недостаточность, аритмии, разрывы миокарда, тромбоэмболии, перикардит, правожелудочковая недостаточность
- Г. острая левожелудочковая недостаточность, аритмии, разрывы миокарда, тромбоэмболии, язвенная болезнь желудка, пневмония, миокардит
- Д. острая левожелудочковая недостаточность, аритмии, разрывы миокарда, тромбоэмболии, перикардит, пиелонефрит, миокардит

Сердечной недостаточностью могут осложняться:

- А. гипертоническая болезнь
- Б. ишемическая болезнь сердца
- В. кардиомиопатии
- Г. пороки сердца
- Д. все вышеперечисленное

Окончанием первичного периода сифилиса является

- А. Развитие продромальных явлений
- Б. Появление генерализованных высыпаний
- В. Появление полиаденита
- Г. Заживление твердого шанкра

Фонд омс формируется за счёт

- А. Доходов от использования временно свободных финансов
- Б. Подоходного налога
- В. Безвозмездных кредитов банков
- Г. Страховых взносов на обязательное медицинское страхование

Эндоскопическим признаком активного н.р.-ассоциированного гастрита является

- А. Бледная слизистая (рельеф складок сглажен)
- Б. Резко выраженная складчатость слизистой и большое количество слизи
- В. Наличие рубцовых изменений на слизистой желудка
- Г. Гиперемия слизистой с точечными кровоизлияниями

Риск усиления гепатотоксического действия парацетамола увеличивается на фоне

- А. Приема алкоголя, антигистаминных препаратов
- Б. Приема омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, антацидов
- В. Хронической болезни почек с3а
- Г. Интенсивных физических нагрузок, обильного питья

Увеличение размеров печени у больных сахарным диабетом является результатом

- А. Гепатита
- Б. Цирроза
- В. Жирового гепатоза
- Г. Диабетической нефропатии

Больные в ремиссии аутоиммунной тромбоцитопенической пурпуры должны

- А. Питаться с применением гипоаллергенных диет
- Б. Избегать массовых скоплений людей
- В. Исключить физические нагрузки, занятия спортом
- Г. Иметь нормальный режим труда и отдыха

При хламидийном уретрите и цервиците наблюдаются выделения

- А. Пенистые или гнойные с запахом рыбы
- Б. Стекловидно-слизистые или слизисто-гнойные по утрам
- В. Слизистые с запахом рыбы по утрам
- Г. Творожистые, после приема острой, соленой пищи

При определении степени тяжести цирроза, прогностический индекс child-pugh не включает клинико- лабораторный показатель

- А. Количества тромбоцитов
- Б. Протромбинового времени/индекс
- В. Стадии печеночной энцефалопатии
- Г. Наличия асцита

Продолжительность жизни тромбоцитов в норме составляет _____ суток

- А. 7-11
- Б. 14-21
- В. 3-5
- Г. 5-7

При обнаружении эозинофилии в периферической крови большое диагностическое значение имеет наличие в кале

- А. Яиц глистов
- Б. Кристаллов Шарко-Лейдена
- В. Жирных кислот
- Г. Клеток кишечного эпителия

Повышение артериального давления при феохромоцитоме обусловлено усилением выработки

- А. Альдостерона
- Б. Тироксина
- В. Преднизолона
- Г. Адреналина

Эритематозная или пятнисто-папулезная сыпь с фарингитом и аденопатией характерна при инфицировании вирусом

- А. Варицелла-зостер
- Б. Простого герпеса 2 типа
- В. Простого герпеса 1 типа
- Г. Эпштейна-Барр

При инфекции COVID-19 при развитии острого респираторного дистресс-синдрома наибольшим значением для мониторинга состояния и оценки эффекта терапии обладают

- А. ИЛ?6, D?димер
- Б. АЛТ, АСТ
- В. Лейкоцитоз, анемия
- Г. Тропонин, NT pro-BNP

Для первичного инфекционного эндокардита у наркоманов характерно

- А. Поражение трехстворчатого клапана
- Б. Тромбэмболия в артерии нижних конечностей
- В. Наличие грибковой и стафилококковой этиологии
- Г. Тромбэмболия в мозг

Нарушением характерным для гипотиреоза является

- А. Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий
- Б. Гипергликемия
- В. Дислипидемия
- Г. Злокачественная артериальная гипертензия

Интерфероны представляют собой

- А. Нуклеопротеиды
- Б. Гликопротеиды
- В. Фосфопротеиды
- Г. Липопротеиды

Лейкопения с относительным лимфоцитозом и абсолютной нейтропенией встречается при

- А. Остром лейкозе
- Б. Хроническом лейкозе
- В. Лимфогранулематозе
- Г. Апластической анемии

Показанием к применению сердечных гликозидов для лечения сердечной недостаточности является

- А. Тахиформа фибрилляции предсердий
- Б. А-В блокада с периодами Самойлова-Венкебаха
- В. Рестриктивная кардиомиопатия с наличием ХСН
- Г. Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия

При хронических заболеваниях печени гепатопульмональный синдром проявляется

- А. Снижением диффузионной способности легких
- Б. Увеличением лёгочного сосудистого сопротивления
- В. Повышением среднего давления в лёгочной артерии более 25 мм. рт.ст.
- Г. Снижением сердечного выброса

При подозрении на вирусную этиологию хронического гепатита следует провести исследование

- А. Маркеров вирусов гепатита
- Б. Ультразвуковое органов брюшной полости
- В. АЛТ, АСТ, билирубина, белковых фракций, щелочной фосфатазы
- Г. Ткани печени иммуногистохимическим методом

Контроль адекватности применения антикоагулянтов непрямого действия осуществляется по определению

- А. С-реактивного белка
- Б. Протромбинового индекса
- В. МНО
- Г. Уровня фибриногена

Больной корью наиболее заразен в

- А. Катаральном периоде и на первые сутки появления сыпи
- Б. Конце периода высыпания
- В. Периоде пигментации сыпи
- Г. Инкубационном периоде

При подозрении на патологию желчевыводящих путей наиболее информативным исследованием является

- А. Ультразвуковое исследование желчевыводящих путей
- Б. Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастированием
- В. МР-холангиография
- Г. Магнитно-резонансная томография брюшной полости

Разовая доза ибупрофена составляет (в мг)

- А. 10-30
- Б. 8-16
- В. 7,5-15
- Г. 200-400

Двигательные расстройства характерны для

- А. Болезни Вильсона
- Б. Идиопатического гемохроматоза
- В. Первичного билиарного цирроза
- Г. Первичного склерозирующего холангита

При в12-дефицитиней анемии в общем анализе крови может наблюдаться склонность к

- А. Панцитопении
- Б. Лейкоцитозу
- В. Появлению миелоцитов
- Г. Тромбоцитозу

К группе бета2-агонистов, обладающих пролонгированным действием, относят

- А. Формотерол
- Б. Тиотропия бромид
- В. Беродуал
- Г. Фенотерол

К антикоагулянтам непрямого действия относится

- А. Клопидогрель
- Б. Варфарин
- В. Гепарин
- Г. Викасол

В амбулаторных условиях в рекомендованных схемах лечения больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 легкого течения используется

- А. Ремдесивир
- Б. Балоксавир
- В. Левилимаб
- Г. Умифеновир

Активностью против атипичной флоры (микоплазма, хламидии, легионелла) обладает

- А. Амоксициллин
- Б. Цефтриаксон
- В. Кларитромицин
- Г. Гентамицин

Диарея, бронхообструкция, правосторонний фиброз эндокарда, приливы крови к лицу и туловищу характерны для

- А. Гастрономы
- Б. Карциноида
- В. Соматостатиномы
- Г. Випомы

Болезнь виллебранда проявляется

- А. Тромбозами и геморрагиями
- Б. Тромбоцитопенией
- В. Тромбоцитопатией
- Г. Васкулитно-пурпурной кровоточивостью

Для новой коронавирусной инфекции COVID-19 типичным является _____ механизм передачи

- А. Вертикальный
- Б. Контактный
- В. Фекально-оральный
- Г. Трансмиссивный

Для болезни Рейтера в диагностике характерно

- А. Появление протеинурии
- Б. Повышение ревматоидного фактора
- В. Повышение СОЭ
- Г. Наличие хламидийного уретрита

Багрово-синюшная окраска лица, ушей, ладоней характерна для

- А. Множественной миеломы
- Б. Эритремии
- В. Геморрагического васкулита
- Г. Лимфогрануломатоза

Заведующий отделением должен провести осмотр пациента в течение (в сутках)

- А. Первых
- Б. Трех
- В. Четырех
- Г. Двух

Жалобы на покраснение, припухлость, скованность дистальных межфаланговых суставов характерны для

- А. Эрозивного остеоартрита
- Б. Ревматоидного артрита
- В. Системной красной волчанки
- Г. Склеродермии

К физикальным признакам задержки жидкости в организме относят

- А. Гипертензию, хрипы в легких
- Б. Темно-желтый цвет мочи
- В. Головокружение
- Г. Сниженный диурез

Моча бесцветная и имеет низкую относительную плотность при

- А. Полиурии на фоне сахарного диабета
- Б. Полиурии на фоне усиленного питья
- В. Раннем гестозе
- Г. Усиленном потоотделении

Неселективным бета-адреноблокатором является

- А. Метопролол
- Б. Небиволол
- В. Надолол
- Г. Эсмолол

При ревматоидном артрите чаще всего поражаются суставы

- А. Проксимальные межфаланговые
- Б. Позвоночника
- В. Крестцово-подвздошные
- Г. Коленные

Эндокринные нарушения при хронической болезни почек характеризуются увеличением уровней циркулирующих гормонов

- А. Эритропоэтина
- Б. Инсулина
- В. Кальцитриола
- Г. Прогестерона

Максимальная суточная доза парацетамола, которую не рекомендовано превышать из-за возможности развития центрлобулярного некроза печени, составляет (в граммах)

- А. 4,0
- Б. 5,0
- В. 6,0
- Г. 3,0

Больному с лёгкой интермиттирующей формой бронхиальной астмы следует назначить

- А. Бета-агонисты по потребности
- Б. Бета-агонисты ежедневно
- В. Эуфиллин
- Г. Теофиллин

К характерным рентгенологическим признакам гонартроза относят

- А. Асептический некроз
- Б. Кальциноз хряща
- В. Костные эрозии
- Г. Сужение суставной щели

Осмотическая диарея отмечается при

- А. Синдроме раздраженной кишки
- Б. Хроническом панкреатите
- В. Язвенном колите
- Г. Гастроиноме

Средством, разжижающим мокроту путем разрушения сульфгидрильных связей, является

- А. Бромгексин
- Б. N-ацетилцистеин
- В. Амброксол
- Г. Химопсин

К наиболее значимым факторам развития бронхиальной астмы относят

- А. Атопию
- Б. Вирусные инфекции
- В. Лекарственные препараты
- Г. Пищевую аллергию

Вторичный гипотиреоз отличается от первичного

- А. Сниженным уровнем ТТГ
- Б. Повышенным уровнем ТТГ
- В. Увеличением размеров щитовидной железы
- Г. Снижением уровня продукции Т4

Ориентировочный срок временной нетрудоспособности при персистирующей бронхиальной астме тяжелого течения составляет _____ дней

- А. 70-80
- Б. 60-70
- В. 50-60
- Г. 85-90

Препаратом с возможным использованием в виде ингаляций через небулайзер является

- А. Салметерол
- Б. Формотерол
- В. Индакатерол
- Г. Сальбутамол

Клиническим симптомокомплексом, характерным для синдрома дрезслера, является сочетание

- А. Плеврита, миокардита, асцита
- Б. Лихорадки, кардиалгии, отеков нижних конечностей
- В. Бронхита, миокардита, лихорадки
- Г. Перикардита, плеврита, пневмонита

Отрицательный зубец r, который располагается после преждевременного, но неизмененного комплекса qrs, характерен для

- А. Ритма коронарного синуса
- Б. Предсердной экстрасистолии
- В. Атриовентрикулярной экстрасистолии
- Г. Желудочковой экстрасистолии

Права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи, установленные базовой программой обязательного медицинского страхования, являются едиными

- А. В границах муниципального образования
- Б. На территориях, определяемых Правительством РФ
- В. На всей территории РФ
- Г. На территории субъекта РФ

Лечение больного со стенокардией напряжения II функционального класса начинают с назначения

- А. Нитратов пролонгированного действия
- Б. Мочегонных препаратов
- В. Препаратов метаболического действия
- Г. Бета-адреноблокаторов

Листок нетрудоспособности по уходу за больным взрослым членом семьи при лечении в амбулаторных условиях лечащий врач может выдать на срок не более чем на _____ дней по каждому случаю заболевания

- А. 45
- Б. 15
- В. 30
- Г. 7

Зубец q на ЭКГ здорового человека отражает

- А. Возбуждение межжелудочковой перегородки
- Б. Электрическую систолу желудочков
- В. Время активации желудочков
- Г. Возбуждение основания правого желудочка

Лечение псевдомембранозного колита в легкой форме следует начинать с применения метронидазола

- А. Только внутрь
- Б. В свечах и в виде ректальной пены
- В. Только внутривенно
- Г. Внутрь и внутривенно

Характерным синдромом в начальном периоде заболевания при кори является

- А. Гастроэнтеритический
- Б. Гепато-лиенальный
- В. Колитический
- Г. Катаральный

«Золотым стандартом» исследования околоносовых пазух при подозрении на синусит является

- А. Ультразвуковое исследование околоносовых пазух
- Б. Магнитно-резонансная томография
- В. Рентгенография
- Г. Компьютерная томография

Реакция на пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (диаскинтест) считается отрицательной при

- А. Наличии гиперемии любого размера без инфильтрата
- Б. Наличии гиперемии до 3 мм без инфильтрата
- В. Гиперемии любого размера и/или инфильтрата до 2 мм
- Г. Полном отсутствии инфильтрата или гиперемии

Результат теста на толерантность к d-ксилозе зависит от

- А. Всасывающей функции тонкой кишки
- Б. Желудочной секреции ферментов
- В. Экзогенной функции поджелудочной железы
- Г. Наличия печеночной недостаточности

Основным методом диагностики хронической обструктивной болезни легких является

- А. Рентгенография органов грудной клетки
- Б. Анализ мокроты
- В. Бронхоскопическое исследование
- Г. Исследование функции внешнего дыхания

Цитостатическим действием обладает

- А. Ампициллин
- Б. Эритромицин
- В. Рубомицин
- Г. Тетрациклин

При аортальной недостаточности точка максимальной громкости шума находится в/во _____межреберье _____от грудины

- А. Третьем; справа
- Б. Втором; слева
- В. Третьем; слева
- Г. Четвертом; справа

Если пострадавший внезапно побледнел, перестал реагировать на окружающее, то начинать оказывать первую помощь необходимо с

- А. Привлечения помощника для проведения сердечно-легочной реанимации
- Б. Проверки признаков дыхания, при отсутствии - проведения сердечно-легочной реанимации
- В. Проведения оценки обстановки и обеспечения безопасных условий для оказания первой помощи
- Г. Открытия дыхательных путей, проверки пульса на магистральных артериях

Федеральный фонд омс

- А. Осуществляет контроль за использованием средств ОМС страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями, в том числе проводят проверки и ревизии
- Б. Утверждает дифференцированные подушевые нормативы финансового обеспечения обязательного медицинского страхования
- В. Аккумулирует средства ОМС и управляет ими
- Г. Администрирует страховые взносы на ОМС неработающего населения

Диагностическим маркёром вирусного гепатита а является

- А. Anti-HEV IgM
- Б. Anti-HAV IgM
- В. Anti-HCV IgM
- Г. Anti-HDV IgG

У пациентки с АГ при разнице АД на левой и правой руках в 20 мм рт.ст. В первую очередь следует заподозрить

- А. Атеросклеротическое поражение плечевой артерии
- Б. Болезнь Кушинга
- В. Болезнь Такаyasу
- Г. Болезнь Аддисона

Приступ сильной боли в пояснице с иррадиацией по ходу мочеточника в паховую область наблюдается при

- А. Цистите
- Б. Пиелонефрите
- В. Мочекаменной болезни
- Г. Гломерулонефрите

Жалобы на парестезии в стопах и неустойчивость походки при v12-дефицитной анемии обусловлены

- А. Гипокалиемией
- Б. Ангипатией артерий нижних конечностей
- В. Фуникулярным миелозом
- Г. Энцефалопатией

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов требует проведения дифференциальной диагностики с

- А. Внемгпитальной пневмонией
- Б. Периферическим раком легкого
- В. Корью
- Г. Лимфогранулематозом

При подагре не следует в качестве антигипертензивного средства применять

- А. Метопролол
- Б. Гидрохлортиазид
- В. Амлодипин
- Г. Моксонидин

Средние дозы ингаляционного глюкокортикостероида будесонида для базисной терапии бронхиальной астмы составляют (в мкг)

- А. 400-800
- Б. 800-1600
- В. 2000-2500
- Г. 1600-2000